

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM
PADA NY “N” DENGAN *POST SECTIO CAESAREA*
DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR
17 JUNI – 29 JULI 2022**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

**Nurul Wana
70400119024**

**PRODI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Wana
Nim : 70400119024
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 27 Februari 2001
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar-benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2022

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Nurul Wana
70400119024

PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nurul Wana
Nim : 70400119024
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum Pada Ny "N" Dengan
Post Sectio Caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 17 Juni
– 29 Juli 2022

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Samata-Gowa, Agustus 2022

Pembimbing I



Firdayanti, S.SiTi, M.Keb
NIP : 19751113 200604 2 001

Pembimbing II



Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb
NIP : 19870924 201903 2 012

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum Pada Ny “N” Dengan *Post Sectio Caesarea* Di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 17 Juni – 29 Juli 2022**”, yang disusun oleh **Nurul Wana Nim 70400119024**. Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Senin, 08 Agustus 2022**, bertepatan dengan **Tanggal 10 Muharram 1444 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 08 Agustus 2022
10 Muharram 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing 1	: Firdayanti, S.SiT, M.Keb	(.....)
Pembimbing 2	: Ferawati Taherong S.ST., M.Keb	(.....)
Penguji 1	: Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb	(.....)
Penguji 2	: Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini yang mengambil judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum Pada Ny ‘N’ Dengan *Post Sectio Caesarea* di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 17 Juni – 29 Juli 2022”.

Terselesainya Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengkhaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materalik baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini hingga selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Almarhum ayah tercinta Tabir Sulaeman. Ibundaku tercinta Rosmin Tabir, yang kini menjadi orang tua tunggal untukku. Ibu terhebat yang telah ikhlas membesarkan, mengasuh, mendidik dan bekerja keras pagi ketemu pagi untuk bagaimana penulis bisa tetap melanjutkan pendidikan. Lantunan do'anya tak pernah dan selalu mensupport penulis dalam segala hal, serta untuk adikku tersayang Nurul Wanda yang selalu memberi semangat.
2. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D. Selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, beserta seluruh Staff administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa selama masa pendidikan.
4. Firdayanti, S.SiT., M.Keb selaku Ketua Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Sekaligus selaku pembimbing I saya yang telah membimbing, menuntun, dan mendidik serta senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan. Tak pernah berhenti memberikan motivasi kepada penulis sehingga Karya Tulis Ilmiah ini bisa selesai.
5. Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga Karya Tulis Ilmiah ini bisa selesai.
6. Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb selaku penguji yang telah menyempatkan waktu, memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan bersifat islamiah dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Para dosen jurusan Kebidanan yang telah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa pendidikan.
9. Direktur RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai

10. Para sahabat saya M. Hidayatullah, Rizky Adzania Dahlan, Nur Aenun Alwi, Indah Agustina, Nurdiati dan Artika yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
11. Para teman-teman Kebidanan khususnya angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan warna warni bangku perkuliahan. Kepada semua teman-teman Himpunan Mahasiswa Diploma (HMD) Kebidanan, teman-teman Organisasi Pecinta Alam Sahabat Alam Adventure (OSAA), teman-teman Tamalate Scout, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.

Akhirul Kalam, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaannya maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya di Kebidanan. Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk ini penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan Karya Tulis Ilmiah. Terima Kasih

Samata-Gowa, Agustus 2022
Penulis,

Nurul Wana
Nim : 70400119024

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Tulis Ilmiah	ii
Halaman Persetujuan Karya Tulis Ilmiah	iii
Halaman Pengesahan Karya Tulis Ilmiah.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Metode Penulisan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka tentang Masa Nifas	
1. Pengertian.....	10
2. Tahapan Masa Nifas.....	13
3. Perubahan Fisiologis Masa Nifas.....	13
4. Perubahan Psikologi Masa Nifas	23
5. Kebutuhan Dasar Ibu Masa Nifas	27
6. Program Masa Nifas.....	33

B. Tinjauan Pustaka tentang <i>Sectio Caesarea</i>	
1. Konsep Dasar <i>Sectio Caesarea</i>	35
2. Indikasi <i>Sectio Caesarea</i>	40
3. Komplikasi <i>Sectio Caesarea</i>	43
4. Proses Penyembuhan Luka <i>Post Sectio Caesarea</i>	57
5. Asuhan Luka <i>Sectio Caesarea</i>	48
6. Perawatan pasca operasi oleh Bidan	48
C. Tinjauan tentang Proses Manajemen Kebidanan	
1. Pengertian.....	50
2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan.....	50
3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).....	56

BAB III STUDI KASUS

A. Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney	60
B. Pendokumentasian Tanggal 17 Juni 2022.....	85
C. Kunjungan Tanggal 17 Juni 2022.....	89
D. Kunjungan Tanggal 18 Juni 2022.....	96
E. Kunjungan Tanggal 24 Juni 2022.....	102
F. Kunjungan Tanggal 02 Juli 2022.....	107
G. Kunjungan Tanggal 29 Juli 2022.....	111
H. Matriks Kunjungan	115

BAB IV PEMBAHASAN

A. Langkah I : Identifikasi data dasar.....	121
B. Langkah II : Identifikasi diagnosa / masalah aktual	126
C. Langkah III : Identifikasi diagnosa / masalah potensial	128
D. Langkah IV : Tindakan segera / Kolaborasi / Rujukan.....	130
E. Langkah V : Rencana Tindakan.....	130

F. Langkah VI : Implementasi	135
G. Langkah VII : Evaluasi	138
H. Pendokumentasian	139

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	141
B. Saran	142

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Uterus	14
Gambar 2.2 Serviks	16
Gambar 2.3 Karakteristik Lochea	16
Gambar 2.4 Anatomi Payudara	18
Gambar 2.5 Refleks Prolaktin dan Refleks Let Down Reflex	19
Gambar 2.6.1 Perawatan Payudara	31
Gambar 2.6.2 Perawatan Payudara	31
Gambar 2.6.3 Perawatan Payudara	32
Gambar 2.7.1 <i>Sectio Caesarea Transperitonealis Profunda</i>	38
Gambar 2.7.2 <i>Sectio Caesarea Klasik</i>	39
Gambar 2.8 <i>Visual Analogue Scale (VAS)</i> Sebagai Alat Ukur Nyeri	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 TFU dan Berat Uterus Berdasarkan Masa Involusio Uteri	15
Tabel 2.2 Mobilisasi Dini pada Ibu <i>Post Sectio Caesarea</i>	28
Tabel 2.3 Kunjungan Masa Nifas.....	34
Tabel 3.1 Matriks Kunjungan	115



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Kegiatan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar
- Lampiran 2 : Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Rumah
- Lampiran 3 : Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Rumah
- Lampiran 4 : Keterangan Layak Etik
- Lampiran 5 : Izin Penelitian PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran 6 : Izin Penelitian RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar





ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, JULY 2022

Name : Nurul Wana
Reg. Number : 70400119024
Supervisor I : Firdayanti, S.SiT., M.Keb
Supervisor II : Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb
“Postpartum Midwifery Care Management for Mrs “N” with Sectio Caesarea Sutures at RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar in 2022”

Sectio caesarea is a surgical procedure taken to save the mother and baby during the process of delivery. Based on the data obtained from RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar, it was apparent that normal deliveries in the hospital comprised about 53%, while it was around 47% for sectio caesarea delivery.

Therefore, the major purpose of this research was to investigate and conduct postpartum midwifery care management on Mrs “N” with the case of sectio caesarea sutures at RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar. The study was conducted for approximately 6 weeks in 2022. This study was conducted based on the 7-stage of Varney midwifery care management and SOAP documentation procedure.

Overall, the assessment was conducted on the post sectio caesarea sutures suffered by Mrs. N. After the assessment and treatments, the pain level was reduced, and the suture wound recovered and dried in which there was no sign of infection. In addition, the lochia was seen to be normal without any odor and potential complications. However, the patient was expected to regularly breastfeed her baby, to get enough rest, and to pray to Allah SWT.

This study concluded that the treatments given considered to be successful shown by the reduction of pain, smooth breastfeeding, the dry of wound, and no potential infections found. In general, the baby’s condition was also good, and the mother could do various activities. Hence, it could be suggested that the results of this study were in line with previous research and theories.

Key words: Postpartum, *Sectio Caesarea*, 7-stage of Varney

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, JULI 2022

Nama : Nurul Wana

Nim : 70400119024

Pembimbing I : Firdayanti, S.SiT., M.Keb

Pembimbing II : Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb

“Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum Pada Ny “N” Dengan Luka Jahitan *Post Sectio Caesarea* Di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar Tahun 2022”

Sectio caesarea ialah proses penyelamatan pada ibu dan bayi melalui persalinan dengan tindakan pembedahan. Data yang diperoleh di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar, pada tahun 2021 ibu melahirkan dengan normal 53% dan *sectio caesarea* sekitar 47% kasus.

Oleh karena itu, karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum pada Ny “N” dengan Luka Jahitan *Post Sectio Caesarea* Di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar Tahun 2022 selama ± 6 minggu dengan melakukan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Pada Ny “N” dengan luka jahitan *post sectio caesarea* telah dilakukan, pengkajian tingkatan nyeri berkurang, rutin menyusui secara *on demand* dan tidak memberikan susu formula, luka bekas jahitan kering dan tidak ada tanda infeksi, observasi pengeluaran lochea normal dan tidak berbau, tidak ada tanda-tanda bahaya pada bayi, ibu istirahat yang cukup, dan berprasangka baik kepada Allah SWT.

Kesimpulan dari studi kasus menunjukkan bahwa asuhan yang diberikan berhasil. Dengan tingkatan nyeri berkurang, ASI lancar, luka bekas operasi kering dan tidak ada infeksi, keadaan bayi baik dan tidak ada tanda bahaya, ibu sudah bisa beraktivitas dengan baik. Studi kasus disimpulkan tidak didapatkan kesenjangan teori dengan didapatkan dilapangan.

Kata kunci : Postpartum, *Sectio Caesarea*, 7 langkah Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementrian Kesehatan RI (2015) melansirkan bahwa *World Health Organization* (WHO) mengatakan pravelensi sekitar 99% kematian ibu terjadi di negara berkembang. Demografi dan kesehatan Indonesia menyatakan jumlah AKI (Angka Kematian Ibu) berjumlah 305/100.000 kelahiran hidup. Terdapat beberapa faktor penyebab kematian ibu, salah satunya ialah metode persalinan. Hal ini memang fisiologis, tetapi bisa menjadi patologis ketika tindakan dilakukan dengan metode persalinan secara *sectio caesarea* (Sihotang, dkk, 2018:176).

Sectio caesarea adalah tindakan yang instan dan mudah, namun tindakan ini mempunyai bahaya komplikasi. Misalnya, kerusakan organ-organ seperti vesika urinaria dan uterus saat berlangsungnya pembedahan, komplikasi anastesi, perdarahan, infeksi, dan tromboemboli. Kematian pada ibu secara *sectio caesarea* lebih tinggi dibandingkan secara pervaginam. Tak hanya itu, takipneu sementara bayi baru lahir sering terjadi pada persalinan secara *sectio caesarea* serta trauma persalinan tidak bisa dipungkiri. (Viandika dan Setiasari, 2020:2).

Gibson, 2010 dalam Viandika, (2020:1) mengatakan angka *sectio caesarea* tiap tahun meningkat, dilihat dari data *World Health Organization* (WHO) mengatakan standar rata-rata dari *sectio caesarea* di sebuah negara sekitar 5-15% per 1000 angka kelahiran didunia. Rumah sakit pemerintah sekitar 11% dan Rumah sakit

swasta lebih dari 30%. Buku Lenovo, 2009 dalam Viandika, (2020:2) WHO mengatakan proses persalinan *sectio caesarea* di seluruh negara di tahun 2007-2008 meningkat hingga 110.000 tiap kelahiran di semua Asia.

Sectio caesarea terjadi disebabkan beberapa masalah. Baik itu masalah dari ibu, seperti kehamilan usia lanjut, preeklampsia-eklampsia, riwayat sesar pada kehamilan sebelumnya, penyakit tertentu, infeksi saluran persalinan dan sebagainya. Sedangkan masalah dari bayi, seperti ukuran kepala bayi dan panggul ibu, kelainan letak bayi, plasenta previa, janin besar, dan gameli. Adapun keputusan yang harus diambil segera jika terjadi kondisi darurat, seperti persalinan lama, ketuban pecah dini, kontraksi lemah, gawat janin dan sebagainya (Indriati, 2012). Prevalensi faktor risiko pada ibu yang melahirkan atau akan di operasi *sectio caesarea* ialah 34% dengan ketuban pecah dini; 5,49% dengan preeklampsia; 5,14% dengan perdarahan; 4.40% dengan kelainan letak janin; 4,25% dengan jalan lahir tertutup; 2,3% karena rahim robek (Risksedas, 2012 dalam Viandika, 2020:2).

Kematian dan kesakitan ibu hamil dan ibu bersalin serta bayi baru lahir telah lama menjadi masalah terlebih di negara-negara berkembang. Prevalensinya 25-30% kematian pada wanita usia subur dikarenakan sesuatu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan juga nifas (Prawirohardjo, 2009 dalam Viandika, 2020:).

Astutik, 2017 dalam Mardhika, (2021:169) menjelaskan bahwa WHO mengatakan tingkat ibu bersalin dengan *sectio caesarea* 5 kali lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ibu dengan *sectio caesarea* tercatat menduduki peringkat ketiga (19,2%)

di Asia pada tahun 2015. (WHO) *Sectio caesarea* adalah usaha untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi jika terdapat masalah atau indikasi.

Sectio caesarea bisa menyebabkan beberapa resiko maupun komplikasi dimana terdapat tanda serta gejala infeksi seperti nyeri (dolor), panas (kalor), bengkak (tumor), kemerahan (rubor), perubahan fungsi dari jaringan yang mengalami infeksi (fungsi laesa). Risiko atau komplikasi yang lain ialah seperti perdarahan terjadi bekuan darah (tromboemboli) dan hilangnya obat bius dengan sendirinya setelah melahirkan (reaksi anastesi). Tindakan *sectio caesarea* menyebabkan nyeri pada abdomen yang berasal dari luka insisi saat operasi (Arwani, 2012 dalam Anggiana, 2021:3).

Akbar, 2014 dalam Anggiana, (2021:3) mengatakan bahwa sebagian besar pasien dengan *post sectio caesarea* mengalami intensitas nyeri dari ringan hingga berat, proses melahirkan dengan *sectio caesarea* mempunyai nyeri lebih tinggi sekitar 27,3% dibandingkan dengan proses melahirkan normal yang hanya sekitar 9%. Rasa nyeri meningkat pada hari pertama *post sectio caesarea*.

Menurut Solehati, 2013 dalam Anggiana, (2021:4) 75% dari pasien bedah mengalami nyeri sedang hingga berat sesudah operasi. Lama nyeri dapat bertahan dari 24 sampai 48 jam. Ibu *post sectio caesarea* bisa mengalami nyeri dan efek dari nyeri akan membuat aktifitas jadi terganggu dan menjadi terbatas, *Activity Of Daily Living* (ADL) terganggu, *Bonding Attachment* (ikatan kasih sayang) terganggu dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) tidak dilakukan sebab adanya peningkatan intensitas nyeri jika ibu bergerak.

Perdarahan di luka jahit *post sectio caesarea* terjadi sebab tidak adanya mobilisasi dini yang menyebabkan kontraksi rahim menjadi lemah dan terjadi pelebaran pembuluh darah yang bisa mengakibatkan perdarahan. Nyerinya juga berdampak pada pemberian ASI pada bayi serta kurangnya perawatan bayi yang dilakukan sang ibu yang membuat ASI sebagai makanan yang memiliki gizi pas untuk bayi tidak bisa diberikan secara penuh (Purwanti, 2009 dalam Masadah, 2020 : 65). Nyeri diuraikan menjadi empat. Nilai 0 bagi yang tidak nyeri, nilai 1-4 bagi nyeri ringan, nilai 5-7 bagi nyeri sedang, dan nilai 8-10 bagi yang nyeri hebat. (Masadah, dkk, 2010:67)

Berdasarkan data yang diambil dari RSIA Khadijah 1 Makassar, pada tahun 2017 ibu melahirkan normal sekitar 51% dan ibu *post sectio* sekitar 49% kasus, tahun 2018 ibu melahirkan normal sekitar 51% dan ibu *post sectio* sekitar 49% kasus, tahun 2019 ibu melahirkan normal sekitar 54% dan ibu *post sectio* sekitar 46% kasus, tahun 2020 ibu melahirkan normal sekitar 58% dan ibu *post sectio* sekitar 42% kasus, tahun 2021 ibu melahirkan normal sekitar 53% dan ibu *post sectio* sekitar 47% kasus.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum Pada Ny “N” dengan *Post Sectio Caesarea*” di RSIA Khadijah 1 Makassar 17 Juni – 29 Juli 2022.

B. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penulisan Karya Tulis Ilmiah ini : Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum Pada Ny “N” dengan *Post Sectio Caesarea* di RSIA Khadijah 1 Makassar 17 Juni – 29 Juli 2022.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dapat melaksanakan Asuhan Kebidanan Postpartum Pada Ny “N” dengan *Post Sectio Caesarea* di RSIA Khadijah 1 Makassar 17 Juni – 29 Juli 2022 dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilakukan pengkajian dan analisis data dasar ibu postpartum pada Ny “N” dengan *post sectio caesarea* di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 17 Juni – 29 Juli 2022.
- b. Diidentifikasi diagnosa/masalah aktual pada ibu postpartum pada Ny “N” dengan *post sectio caesarea* di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 17 Juni – 29 Juli 2022.
- c. Diidentifikasi diagnosa/masalah potensial pada ibu postpartum pada Ny “N” dengan *post sectio caesarea* di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 17 Juni – 29 Juli 2022.

- d. Diidentifikasi perlunya tindakan segera, kolaborasi, dan rujukan pada ibu postpartum pada Ny “N” dengan *post sectio caesarea* di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 17 Juni – 29 Juli 2022.
- e. Ditetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu postpartum dengan luka jahitan pada Ny “N” dengan *post sectio caesarea* di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 17 Juni – 29 Juli 2022.
- f. Dilaksanakan tindakan asuhan yang disusun pada ibu postpartum pada Ny “N” dengan *post sectio caesarea* di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 17 Juni – 29 Juli 2022.
- g. Diketahui hasil tindakannya yang telah dilakukan pada ibu postpartum pada Ny “N” dengan *post sectio caesarea* di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 17 Juni – 29 Juli 2022.
- h. Didokumentasikan hasil tindakan yang telah dilakukan pada ibu postpartum pada Ny “N” dengan *post sectio caesarea* di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar 17 Juni – 29 Juli 2022.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan pada kasus tersebut diatas adalah :

1. Manfaat Praktis

Adapun sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar

2. Manfaat Institusi

Untuk menambah bahan bacaan bagi pembaca di perpustakaan dan informasi mengenai asuhan kebidanan pada ibu postpartum khususnya dengan *post sectio caesarea*

3. Manfaat Ilmiah

Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan serta bahan acuan bagi penulis selanjutnya

4. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah yang sangat berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan baru tentang ibu postpartum dengan *post sectio caesarea*.

E. Metode Penulisan

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan postpartum khususnya dengan *post sectio caesarea*

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan oleh Hellen Verney, dengan 7 langkah yang meliputi : Identifikasi Data Dasar, Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual, Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial, Tindakan Tindakan segera/Kolaborasi/Rujukan,

Rencana Asuhan/Intervensi, Implementasi dan Evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan

3. Studi Dokumentasi

Studi yang mempelajari status ibu baik yang bersumber dari catatan buku status pasien seperti catatan dokter dan bidan

4. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan ibu, keluarga ibu dan dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang digunakan untuk menulis Karya Tulis Ilmiah ini terdiri dari :

BAB I Pendahuluan. Berisikan tentang Latar belakang, Ruang lingkup penulisan, Tujuan penulisan, Manfaat penulisan, Metode penulisan, Sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Berisikan tentang Tinjauan umum masa nifas meliputi : Pengertian masa nifas, Tahapan masa nifas, Perubahan masa nifas, Kebutuhan dasar masa nifas, Kebijakan program pada masa nifas. Tinjauan umum tentang *sectio caesarea* yang terdiri dari Pengertian *sectio caesarea*, Indikasi *sectio caesarea*, Komplikasi *sectio caesarea*, Intensitas nyeri, Perawatan pasca operasi oleh bidan dan proses manajemen kebidanan meliputi Pengertian manajemen asuhan kebidanan, Tahapan manajemen kebidanan, Pendokumentasian asuhan kebidanan.

BAB III Studi Kasus. Berisi tentang Pengkajian, Interpretasi data, Diagnosa potensial, Tindakan segera, Perencanaan, Penatalaksanaan dan Evaluasi serta data perkembangan dengan SOAP.

BAB IV Pembahasan. Berisi tentang kesenjangan studi kasus antara nyata pada bab III dan dasar teori yang diambil pada bab II, mulai dari pengumpulan data dasar sampai dengan evaluasi

BAB V Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti pembahasan Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas *Post Sectio Caesarea*. Saran merupakan alternatif pemecahan masalah dan tanggapan. Kesimpulan yang berupa kesenjangan pemecahan masalah hendaknya bersifat realistis dan operasional yang artinya saran itupun dapat dilaksanakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Umum Masa Nifas*

1. Pengertian

Masa nifas atau masa puerperium adalah masa setelah persalinan selesai sampai 6 minggu atau 42 hari. Selama masa nifas, organ reproduksi secara perlahan akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil. perubahan organ reproduksi ini disebut *involutio* (Maritalia, 2014:11).

Terdapat nifas untuk perempuan yang proses sudah melahirkan ataupun dengan *sectio cesarea*, dengan catatan sesudah operasi tampak darah yang keluar dari rahim (Yusron, 2021 : 91). Dalam hadist Ummu Salamah, ia menyampaikan bahwa “pada masa Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam, kaum wanita menunggu masa nifasnya selama 40 hari atau 40 malam” (Bahren, Raehanul. 2018:43)

Dalam masa nifas ada beberapa yang harus dihindari oleh ibu, yaitu sebagai berikut :

- a. Larangan melakukan Shalat. Dilihat dari hadits nabi SAW yang diwariskan oleh Fatimah Binti Abi Hubaisy yang artinya “Apabila haid, tinggalkan shalat” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tarmidzi dan An-Nasa’i)
- b. Larangan melakukan puasa dengan ketentuan puasa yang ditinggalkan karena haid dan nifas harus diqada dihari lainnya.

- c. Larangan melakukan tawaf. Larangan ini berdasarkan hadits yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kepada Aisyah RA “Apabila engkau dalam keadaan haid, kerjakanlah hal-hal yang dikerjakan oleh orang-orang haji lainnya, tetapi engkau tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah kecuali setelah suci” (HR. Bukhari, Muslim)
- d. Larangan bergaul suami istri. Larangan ini didasarkan atas Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2: 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ لَا فَاعِلَةٌ لَهَا فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهَا حَتَّىٰ يَظْهَرَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya :

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah “Haid itu adalah suatu kotoran”. Maka, Jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri (Kementrian Agama RI, 2019:35).

Makna ayat diatas adalah haid merupakan darah yang keluar bersama jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan di rahim perempuan. Keluarnya secara periodik, sesuai dengan periode pelepasan sel telur ke rahim. Kondisi seperti itu yang dianggap kotor dan menjadikan perempuan tidak suci secara syar‘i, termasuk tidak suci untuk digauli suaminya.

Quraish Shihab menjelaskan “Haid adalah gangguan.” Maksudnya, haid mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis wanita, juga terhadap pria. Dengan keluarnya darah yang segar, mengakibatkan gangguan pada jasmani wanita. Rasa sakit seringkali melilit perutnya akibat rahim berkontraksi.

Secara medis. Perlunya *itizal* (tidak berhubungan seks) pada waktu haid sebab darah haid yang mengganggu dan terasa menyakitkan bagi organ reproduksi perempuan, dimana dapat menyebabkan perdarahan dan peradangan, dan mungkin laki-laki kena penyakit sipilis dan menderita impotensi, baik laki-laki maupun perempuan (Tafsir Al-Qur’an Tematik:32)

Kesimpulan tentang ayat diatas menjelaskan bahwa : Allah SWT melarang suami menggauli istrinya saat masa haidh ataupun masa nifas. Selain karena keluarnya darah kotor, akan timbul masalah pada kesehatan laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya masalah pada fisik yang mengganggu kenyamanan, tetapi juga gangguan pada psikis pada laki-laki maupun perempuan.

2. Tahapan Masa Nifas

Masa nifas dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu :

- a. *Puerperium*. Masa pemulihan awal dimana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan.
- b. *Puerperium intermedial*. Masa pemulihan organ reproduksi akan kembali ke keadaan sebelum hamil. Masa ini berlangsung selama enam minggu atau 42 hari.


- c. *Remote puerperium*. Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna terutama bila ibu selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi. (Maritalia, 2014:12)

3. *Perubahan Fisiologis Masa Nifas*

Pada masa nifas, organ reproduksi interna dan eksterna akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan ini terjadi secara berangsur-angsur dan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Selain organ reproduksi, beberapa perubahan fisiologi yang terjadi selama masa nifas akan dibahas berikur ini.

a. Uterus

Uterus merupakan organ reproduksi interna yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah alpukat yang sedikit gepeng dan berukuran sebesar telur ayam. Panjang uterus sekitar 7-8 cm, lebar sekitar 5-5,5 cm dan tebal sekitar 2,5cm (Maritalia, 2014).



Gambar 2.1 Uterus
Sumber : Kaharuddin, 2012

Pada uterus ada proses perubahan retroresif yang menyebabkan berkurangnya ukuran uterus atau disebut involusio uteri. Proses involusio uteri ada beberapa tahapan, yaitu :

- 1) Autolysis, ialah proses penghancuran diri sendiri yang terjadi di dalam otot uterin.
- 2) Atrofi jaringan, ialah jaringan berpoliferasi dengan adanya penghentian produksi estrogen dalam jumlah besar yang menyertai pelepasan plasenta.
- 3) Efek oksitosin, ialah zat yang merangsang myometrium uterus sehingga dapat berkontraksi (Marmi, 2012).


Tabel 2.1 TFU dan Berat Uterus Berdasarkan Masa Involusio Uteri

Involusio	Tinggi Fundus Uteri	Berat Uterus
Bayi lahir	Setinggi pusat, 2 jari di bawah pusat	1.000 gr
1 minggu	Tidak teraba di atas simfisis pubis	750 gr
2 minggu	Tidak teraba di atas simfisis pubis	500 gr
6 minggu	Normal	50 gr
8 minggu	Normal	30 gr

Sumber : Salehah, 2009 dalam Astuti, 2022

b. Serviks

Serviks merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim. Serviks menghubungkan uterus dengan saluran vagina sebagai jalan keluarnya janin menuju saluran vagina pada saat persalinan. Setelah 2 jam persalinan serviks hanya dapat dilewati oleh 2-3 jari dan setelah 1 minggu persalinan hanya dapat dilewati oleh 1 jari (Maritalia, 2014).



Gambar 2.2 Serviks
Sumber : Kaharuddin, 2012

c. Vagina

Secara fisiologis, lochea yang dikeluarkan dari cavum uteri akan berbeda karakteristiknya dari hari ke hari. Hal ini disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada dinding uterus akibat penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron.



Gambar 2.3 Karakteristik Lochea
Sumber : Zahroh, NF. 2021

Karakteristik lochea dalam masa nifas adalah sebagai berikut :

- 1) Lochea rubra / kruenta. Timbul pada hari 1-2 postpartum; terdiri dari darah segar bercampur sisa-sisa selaput ketuban, sisa-sisa verniks kaseosa, lanugo dan mekoneum.
- 2) Lochea Sanguinolenta. Timbul pada hari ke 3 sampai dengan hari ke 7 postpartum; karakteristi lochea sanguinolenta berupa darah bercampur lendir
- 3) Lochea Serosa. Timbul setelah 1 minggu postpartum, cairan berwarna agak kuning kecoklatan
- 4) Lochea Alba. Timbul setelah 2 minggu postpartum dan hanya merupakan cairan putih.

Normalnya lochea agak berbau amis, kecuali bila terjadi infeksi pada jalan lahir, baunya akan berubah menjadi berbau busuk. Bila lochea berbau busuk segera ditangani agar ibu tidak mengalami infeksi lanjut atau sepsis.


d. Vulva

Vulva merupakan organ reproduksi eksterna, berbentuk lonjong, bagian depan dibatasi clitoris, bagian belakang oleh perineum, bagian kiri dan kanan oleh labia minora. Vulva juga mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi.

e. Payudara (*Mammae*)

Selama kehamilan hormon prolaktin dari plasenta meningkat tetapi ASI belum keluar karena pengaruh hormon estrogen yang masih tinggi. Kadar estrogen


dan progesteron akan menurun pada saat hari kedua atau ketiga pasca persalinan, sehingga terjadi sekresi ASI.



Gambar 2.4 Anatomi Payudara
Sumber : Kaharuddin, 2012

Pada hari pertama ASI mengandung kolostrum, yaitu cairan berwarna agak kuning dan sedikit lebih kental dari ASI yang disekresi. Pada proses laktasi terdapat dua refleks yang berperan, yaitu refleks prolaktin dan refleks aliran yang timbul akibat perangsangan puting susu dikarenakan isapan bayi.

1) Refleks Prolaktin



Gambar 2.5 Reflek Prolaktin dan Refleks Let Down Reflex
Sumber : Perinasia, 2011 dalam Widayanti, 2014

Hisapan bayi akan merangsang puting susu dan kalang payudara, karena ujung-ujung saraf sensoris yang berfungsi sebagai reseptor mekanik. Rangsangan ini diteruskan ke hipotalamus melalui medulla spinalis hipotalamus dan akan menekan pengeluaran faktor penghambat sekresi prolaktin. Faktor pemacu sekresi prolaktin akan merangsang hipofise anterior sehingga keluar prolaktin. Hormon ini merangsang sel-sel alveoli yang berfungsi untuk membuat ASI.

2) Refleksi Aliran (*let down reflex*)

Rangsangan puting susu tidak hanya diteruskan pada kelenjar hipofise depan tapi juga pada kelenjar hipofise bagian belakang yang berfungsi mengeluarkan hormon oksitosin. Hormon ini berfungsi memacu kontraksi otot polos yang ada pada dinding alveolus dan dinding saluran, sehingga ASI dipompa keluar. Semakin sering menyusui, pengosongan alveolus dan saluran semakin baik, sehingga kemungkinan terjadinya bendungan ASI makin kecil, dan menyusui menjadi lancar (Maritalia, 2014).

Menurut Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah dalam salah satu kitab yang berjudul *Ad Daa' A Ad Dawaa*, do'a merupakan obat bagi segala penyakit. Melalui do'a hati ibu yang menyusui bisa menjadi tenang dan ASI akan lancar sebab percaya bahwa Allah SWT akan mengambulkan permohonan hamba-Nya.

Do'a ketika menyusui tertuang dalam QS. Asy- Syu'ara'/26:78-80

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya :

“(Allah) yang telah menciptakanku. Maka. Dia (pula) yang memberi petunjuk kepadaku (78). Dia (pula) yang memberiku makan dan minum (79). Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku (80) (Kementrian Agama RI, 2019).

f. Tanda-tanda Vital

Tanda – tanda vital merupakan indikator penting pada tubuh yang dapat berubah bila tubuh mengalami gangguan atau masalah. Tanda-tanda vital yang berubah selama masa nifas adalah :

- 1) Suhu tubuh. Suhu tubuh dapat meningkat sekitar $0,5^{\circ}$ Celsius dari keadaan normal ($36^{\circ}\text{C} - 37,5^{\circ}\text{C}$), namun tidak lebih dari 38° Celsius.
- 2) Nadi. Denyut nadi normal berkisar antara 60 – 80 kali permenit. Setelah proses persalinan selesai frekuensi denyut nadi sediki lebih lambat. Pada masa nifas biasanya denyut nadi akan kembali normal
- 3) Tekanan darah. Tekanan darah normal untuk systole antara 110 – 140 mmHg dan untuk diastole antara 60 – 80 mmHg. Bila tekanan darah lebih dari 30 mmHg pada systole atau lebih dari 15 mmHg pada diastole perlu dicurigai timbulnya hipertensi atau pre eklampsia post partum
- 4) Pernafasan. Frekuensi pernafasan normal berkisar antara 18 – 24 kali per menit. Pada saat partus frekuensi penafasan akan meningkat karena kebutuhan oksigen yang tinggi untuk tenaga ibu meneran/mengejan dan mempertahankan agar persediaan oksigen ke janin tetap terpenuhi.

g. Hormon

Selama kehamilan terjadi peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi mempertahankan agar dinding uterus tetap tumbuh dan berproliferasi sebagai media tempat tumbuh dan berkembangnya hasil konsepsi. Sekitar 1 -2 minggu sebelum partus, hormon tersebut akan menurun. Di trimester kedua, terjadi peningkatan kadar hormon prolaktin dan prostaglandin yang berfungsi merangsang pembentukan air susu dan memicu sekresi dan menyebabkan timbulnya kontraksi uterus.

h. Sistem Peredaran Darah (*Cardio Vascular*)

Terdapat hubungan antara sirkulasi darah ibu dengan sirkulasi janin melalui plasenta. Setelah janin lahir, hubungan sirkulasi darah tersebut akan terputus sehingga volume darah ibu relatif akan meningkat. Keadaan ini terjadi sekitar 1 sampai 2 minggu setelah melahirkan.

i. Sistem Pencernaan

Pada ibu yang melahirkan dengan cara operasi (*sectio caesarea*) biasanya membutuhkan waktu sekitar 1-3 hari agar fungsi saluran cerna dan nafsu makan dapat kembali normal. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan tonus otot selama proses persalinan.

j. Sistem Perkemihan

Perubahan hormonal pada masa hamil menyebabkan peningkatan fungsi ginjal. Pada 12 jam pertama postpartum, ibu mulai membuang kelebihan cairan yang tertimbun di jaringan selama ia hamil. Kehilangan cairan melalui keringat dan

peningkatan jumlah urin menyebabkan penurunan berat badan sekitar 2,5 kg selama post partum.

k. Sistem Integumen

Perubahan kulit selama kehamilan berupa hiperpigmentasi pada wajah (cloasma gravidarum), leher, mammae, dinding perut dan beberapa lipatan sendi karena pengaruh hormon, akan menghilang selama masa nifas.

l. Sistem Musculoskeletal

Setelah proses persalinan selesai, dinding perut akan menjadi longgar, kendur dan melebar selama beberapa minggu atau bahkan sampai beberapa bulan akibat peregangan yang begitu lama selama hamil. Ambulasi dini, mobilisasi dan senam nifas sangat dianjurkan untuk mengatasi masalah tersebut (Maritalia, 2014 : 17-29).

4. *Perubahan Psikologi Masa Nifas*

Minggu-minggu pertama masa nifas merupakan masa rentan bagi seorang ibu. Teruntuk ibu baru (primipara) mungkin frustrasi karena merasa tidak kompeten dalam merawat bayi dan tidak mampu mengontrol situasi.

a. Adaptasi Psikologis Ibu dalam Masa Nifas

- 1) Fase *Taking In*. Fase ketergantungan yang berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Ibu terfokus pada dirinya sendiri sehingga cenderung pasif terhadap lingkungannya. Pada fase ini, kebutuhan istirahat, asupan nutrisi dan komunikasi yang baik harus dapat terpenuhi.

- 2) Fase *Taking Hold*. Fase yang berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab dalam perawatan bayinya. Penuhi kebutuhan ibu dengan memberikan penyuluhan serta cara perawatan bayi, cara menyusui yang baik dan benar, mobilisasi postpartum, senam nifas, nutrisi, istirahat, kebersihan diri dan lain-lain.
- 3) Fase *Letting Go*. Fase ibu berlangsung 10 hari sesudah melahirkan, fase menerima tanggungjawab akan peran barunya sebagai seorang ibu. Ibu mulai dapat menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya dan siap menjadi pelindung bagi bayinya.

b. Postpartum Blues (*Baby Blues*)

Fase ini biasanya muncul sekitar 2 hari sampai 2 minggu sejak kelahiran bayi. Ibu yang mengalami *baby blues* akan mengalami perubahan perasaan, menangis, cemas, kesepian, khawatir yang berlebihan mengenai sang bayi, penurunan gairah sex, dan kurang percaya diri terhadap kemampuan menjadi seorang ibu.

c. Depresi PostPartum

Kesedihan atau kemurungan yang dialami ibu pada masa nifas merupakan hal yang normal, namun akan hilang sendiri dalam dua minggu sesudah melahirkan setelah ibu melewati proses adaptasi. Jika depresi berkepanjangan ibu perlu mendapatkan perawatan dan terapi khusus di rumah sakit.

d. Respon Antara Ibu dan Bayi Setelah Persalinan

a) *Touch* (sentuhan)

Sentuhan yang dilakukan ibu pada bayinya seperti membelai-belai kepala bayi dengan lembut, mencium bayi, menyentuh wajah dan ekstremitas, memeluk dan menggendong bayi, dapat membuat bayi merasa aman dan nyaman.

b) *Eye To Eye Contact* (kontak mata)

Bayi baru lahir dapat memusatkan perhatian pada suatu obyek, satu jam setelah kelahiran pada jarak sekitar 20-25 cm, dan dapat memusatkan pandangan sebaik orang dewasa pada usia sekitar 4 bulan.

c) *Odor* (bau badan)

Ketika dilakukan IMD (Inisiasi Menyusu Dini), kedua telapak tangan bayi tidak boleh dibersihkan agar bau air ketuban yang ada di tangan tersebut tetap terjaga dan menjadi panduan bagi bayi untuk menemukan puting susu ibunya.

d) *Body Warm* (kehangatan tubuh)

Selain mencegah *hypothermi*, IMD juga dapat meningkatkan *bounding attachment* antara ibu dan bayi, meng-explore bayi dalam menemukan puting susu ibunya sebagai langkah awal kehidupan dalam mempertahankan diri.

e) *Voice* (suara)

Sejak dilahirkan, bayi dapat mendengar suara-suara dan membedakan nada, meskipun suara-suara tersebut terhalang selama beberapa hari oleh cairan amnion dari rahim yang melekat pada telinga.

f) *Entrainment* (gaya bahasa)

Nada suara ibu ketika berkomunikasi dengan bayinya seperti bercerita, mengajak bercanda atau sedang memarahi bayi, secara perlahan mulai dapat dipahami dan dipelajari bayi.

g) *Biorhythmic* (irama kehidupan)

Selama kurang lebih 40 minggu di dalam rahim, janin terbiasa mendengar suara detak jantung ibu. Dari suara detak jantung tersebut, janin mencoba mengenali biorhythmic ibunya dan menyesuaikan dengan irama dirinya sendiri. Setelah lahir, suara detak jantung ibu masih akan tetap berpengaruh terhadap bayi (Maritalia, 2014:30-38).

5. *Kebutuhan Dasar Ibu Masa Nifas*

a. Nutrisi dan Cairan

Ibu nifas harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh ibu pasca melahirkan dan untuk persiapan produksi ASI, bervariasi dan seimbang, terpenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, zat besi, vitamin dan mineral untuk mengatasi anemia, cairan dan serat untuk memperlancar ekskresi.

Ibu *post sectio caesarea* harus menghindari makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia, pedas dan menimbulkan gas karena perut biasanya menimbulkan masalah *post sectio caesarea*. Bila terdapat gas dalam perut, ibu bisa merasakan nyeri yang menusuk. Gerak fisik dan bangun dari tempat tidur,

pernapasan dalam, dan bergoyang di kursi dapat membantu mencegah dan menghilangkan gas (Nurjannah, dkk, 2013).




b. Ambulasi / Mobilisasi Dini

Wahyani, 2013 dalam Novianti (2018) Mobilisasi dini dapat membantu proses penyembuhan luka ibu dengan *post sectio caesarea*.

Mobilisasi dini untuk ibu dengan *post sectio caesarea* dilakukan tahap demi tahap sebagai berikut :

- 1) Dimulai dari bergerak, otot-otot perut menjadi kuat dan bisa mengurangi nyeri. Hal ini bisa mempercepat proses penyembuhan, bergerak bisa merangsang peristaltik sehingga faal usus dan kandung kemih akan membaik.
- 2) Mencegah terjadi trombosis dan tromboemboli, mobilisasi membuat sirkulasi darah menjadi normal/lancar sehingga resiko terjadinya trombosis dan tromboemboli bisa di hindari.

Tabel 2.2 Mobilisasi dini pada ibu *post sectio caesarea*

NO	Keterangan	Waktu	Gerakan
1	Menggerakan pergelangan kaki ke depan ke belakang dan gerakan memutar setelah itu memindahkan / menggeser kaki dari posisi yang semula	6 Jam pertama <i>post sectio caesarea</i>	
2	Ibu berlatih miring kanan dan miring kiri yang kemudian dilanjutkan ibu berlatih menyusui bayi dengan posisi miring sama seperti gambar disamping	6 – 10 Jam <i>post sectio caesarea</i>	
3	Menganjurkan ibu untuk duduk semi fowler dan menyusui bayi dengan posisi semi fowler	24 Jam pertama <i>post sectio caesarea</i>	

4	Mengajarkan ibu untuk latihan berjalan dan mengajarkan menyusui dengan posisi duduk tegak	2 – 5 Hari <i>post sectio caesarea</i>	
---	---	---	---

Sumber : Mawarni, 2018

c. Eliminasi

Memasuki masa nifas, ibu diharapkan untuk berkemih dalam 6-8 jam pertama. Pengeluaran urin masih tetap dipantau dan diharapkan setiap kali berkemih urin yang keluar minimal sekitar 150 ml (Maritalia, 2014)

d. Istirahat

Masa nifas sangat erat kaitannya dengan gangguan pola tidur yang dialami ibu, terutama segera setelah melahirkan. Secara teoritis, pola tidur akan kembali mendekati normal dalam 2 sampai 3 minggu setelah persalinan. Kebutuhan tidur rata-rata pada orang dewasa sekitar 7 – 8 jam per 24 jam (Maritalia, 2014).

e. Seksual

Ibu yang baru melahirkan boleh melakukan hubungan seksual kembali setelah 6 minggu persalinan. Batas waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa itu semua luka akibat persalinan, termasuk luka episiotomi dan luka bekas *Sectio Caesarea* (SC) biasanya telah sembuh dengan baik (Maritalia, 2014 : 47-53).

f. Perawatan Payudara

Adapun cara merawat payudara yang dapat dilakukan :


1) Pijat Payudara:

- a) Sokong payudara kiri dengan tangan kiri (kanan dengan tangan kanan) dua atau tiga jari dari tangan yang berlawanan membuat gerakan memutar sambil menekan, dari pangkal payudara dan berakhir dengan gerakan spiral pada daerah puting susu, setiap payudara minimal 2 kali gerakan (Hardiana, 2016 dalam Novianti, 2018)




Gambar 2.6.1 : Menyokong payudara
Sumber : (Hardiana, 2016 dalam Novianti, 2018)

- b) Tempatkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara. Urut lagi dari tangan sambil mengangkat kedua payudara dan lepaskan kedua payudara perlahan-lahan sambil membuat sentakan kecil. Lakukan gerakan ini ± 30 kali



Gambar 2.6.2 : Telapak tangan diantara kedua payudara
Sumber : (Hardiana, 2016 dalam Novianti, 2018)

- c) Sokong payudara dengan satu tangan, sedangkan tangan lain mengurut payudara dengan sisi kelingking dari arah tepi ke arah puting susu. Lakukan gerakan ini ± 30 kali setiap payudara



Gambar 2.6.3 : Mengurut ke sisi puting
Sumber : (Hardiana, 2016 dalam Novianti, 2018)

- d) Pengompresan. Kompres kedua payudara dengan waslap hangat selama 2 menit, kemudian ganti dengan kompres dingin selama 1 menit. Kompres berganti-ganti selama 3 kali berturut-turut akhiri dengan kompres hangat (Hardiana, 2016 dalam Novianti, 2018)
- 2) Menjaga payudara tetap bersih dan kering, terutama bagian puting susu
 - 3) Apabila puting susu lecet, oleskan kolostrum atau ASI yang keluar di sekitar puting setiap kali selesai menyusui. Menyusui tetap dilakukan dimulai dari puting susu yang tidak lecet
 - 4) Apabila lecet sangat berat, dapat diistirahatkan selama 24 jam. ASI dikeluarkan dan diminumkan menggunakan sendok.
 - 5) Apabila payudara bengkak akibat pembendungan ASI maka ibu dapat melakukan :

- a) Pengompresan payudara dengan menggunakan kain basah dan hangat selama 5 menit
- b) Urut payudara dari arah pangkal ke puting atau gunakan sisir untuk mengurut payudara dengan arah “Z” menuju puting.
- c) Keluarkan ASI sebagian dari bagian depan payudara sehingga puting susu menjadi lunak
- d) Susukan bayi setiap 2-3 jam. Apabila bayi tidak dapat mengisap seluruh ASI, sisanya keluarkan dengan tangan. (Sulistiyawati, 2009)

6. Program Masa Nifas

Walyani 2017, dalam Zohrah, (2021). Paling sedikit 4 kali melakukan kunjungan pada masa nifas, yang bertujuan :

- a. Menilai kesejahteraan ibu dan bayi
- b. Melakukan pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan kesehatan ibu nifas dan bayi
- c. Mendeteksi adanya komplikasi atau masalah yang terjadi pada masa nifas
- d. Menangani komplikasi atau masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan ibu nifas maupun bayi.

Tabel 2.3 Kunjungan Masa Nifas

Kunjungan	Waktu	Tujuan
1	6 – 8 jam setelah persalinan	<ol style="list-style-type: none"> a. Mencegah terjadinya perdarahan pada masa nifas b. Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan dan memberikan rujukan bila perdarahan berlanjut

		<ul style="list-style-type: none"> c. Memberikan konseling kepada ibu atau salah satu anggota keluarga mengenai bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri d. Pemberian ASI pada masa awal menjadi ibu e. Mengajarkan ibu untuk memperat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir f. Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi
2	6 hari setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan involusi uteri berjalan normal, uterus berkontraksi, fundus di bawah umbilicus tidak ada perdarahan abnormal, dan tidak ada bau b. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau kelainan pasca melahirkan c. Memastikan ibu mendapat cukup cairan, makanan, dan istirahat d. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak ada tanda-tanda penyulit e. Memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan pada bayi, cara merawat tali pusat, dan menjaga bayi agar tetap hangat
3	2 minggu setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan involusi uteri berjalan normal, uterus berkontraksi, fundus di bawah umbilicus tidak ada perdarahan abnormal, dan tidak ada bau b. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau kelainan pasca melahirkan c. Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan, dan istirahat d. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak ada tanda-tanda infeksi e. Memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan pada bayi, cara merawat tali pusat, dan menjaga bayi agar tetap hangat

4	6 minggu setelah persalinan	a. Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang dialami atau bayinya b. Memberikan konseling untuk KB secara dini
---	-----------------------------	--

Sumber : Walyani, 2017 dalam Zohrah, 2021

B. Tinjauan Pustaka Sectio Caesarea

1. Konsep Dasar *Sectio Caesarea*

a. Pengertian

Sectio caesarea adalah menyelamatkan ibu dan bayi melalui proses pembedahan. Tindakan ini dilakukan oleh dokter spesialis kandungan dan obstetrik, biasanya karena bayi terlalu lama di jalan lahir maupun indikasi medis lain untuk menyelamatkan ibu dan bayi. (Hardjan H. 2016:24)

Sectio caesarea adalah proses pengeluaran janin melalui melalui pembedahan pada bagian lapisan perut dan dinding uterus (Indyani, dkk., 2021 : 184). Operasi sesar ialah proses penyelamatan pada ibu dan bayi melalui persalinan dengan tindakan pembedahan (Hardjan, 2016:24).

Enhanced Recovery After Caesarian Surgery (ERACS) merupakan suatu program yang mempercepat proses pemulihan setelah *sectio caesarea*. Serangkaian perawatan dimulai dari persiapan preoperatif, intraoperatif, dan perawatan *post* operatif sampai dengan waktu pasien pulang ke rumah. Konsep ERACS ialah pengembangan dari konsep *Enhanced Recovery After Surgery* (ERAS), yaitu konsep ERAS pertama kali digunakan pada pasien dengan operasi bedah digestif. Beberapa

pusat bersalin yang menggunakan ERAS memperlihatkan keunggulan yaitu mengurangi rawat inap di rumah sakit, menurunkan insiden terjadinya komplikasi, serta membantu pengembalian fungsional menjadi lebih cepat. Oleh sebab itu, konsep ERAS kini diterapkan pada tindakan operasi dibidang lain termasuk di bidang *obstetri* (Tika, dkk, 2022:2386-2388).

Islam adalah agama yang sangat peduli dan memperhatikan umatnya. Dari berbagai aspek sudah diatur dalam Al-Qur'an dan dilengkapi dengan terjemahan. Dari awal mula konsepsi hingga meninggalnya umat islam sudah diatur oleh Allah SWT (Hamdani, 2012:12).

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 155-157

وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ
 الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ
 عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

Terjemahnya :

“Kami akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang sabar (155) (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji‘ūn (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali) (156). Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk (157) (kementrian Agama RI, 2019 : 24)

Makna ayat diatas adalah dalam kehidupan nyata sehari-hari manusia berhadapan dengan berbagai kondisi, ada yang menyenangkan dan ada pula yang tidak menyenangkan. Kehidupan yang kita alami silih berganti, tidak selamanya

menyedihkan dan juga tidak selamanya membahagiakan. Bahkan, banyak diantara manusia yang telah menyadari makna kehidupan mampu mengatasi dan mengelola kesedihan yang menyimpannya menjadi sesuatu yang diterima sebagai suatu kenyataan, serta tidak larut berkepanjangan dalam kesedihan itu. (Tafsir Al-Qur'an Tematik, 2009)


Kesimpulan tentang ayat diatas menjelaskan bahwa : langit tidak selalu biru, kebahagiaan dan kesedihan sepaket di dunia ini. Ujian merupakan jembatan seorang mukmin untuk meraih kebaikan yang berlimpah dari Allah SWT. Dan akan ada hikmah serta anugerah yang sedang menunggu setelah ujian, sebagaimana kehadiran pelangi yang selalu dinanti setelah hujan atau badai reda.

b. Macam-macam *sectio caesarea*

Wiknjosastro, 2007 dalam Putri, (2019) *sectio caesarea* bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

1) *Sectio Caesarea Transperitonealis Profunda*

Jenis operasi yang sering dilakukan dengan cara membedah bagian bawah rahim. Beberapa keuntungannya, yaitu perdarahan luka insisi tidak banyak, bahaya peritonitis tidak besar, parut pada uterus biasanya kuat sehingga bahaya ruptur uteri tidak besar dan luka dapat sembuh lebih sempurna (Putri, EM. 2019:11).



Gambar 2.7.1 SC *Transperitonealis Profunda*
Sumber : Ekasari, Setiyani. 2012

2) *Sectio Caesarea Klasik (sectio caesarea corporal)*

Jenis operasi dengan membuat irisan pada titik tengah antara korpus uteri dan bagian bawah di atas batas plika vasio uterine yang dilakukan jika ada halangan saat proses *sectio caesarea corporal*, misal karena uterus melekat kuat pada dinding abdomen sebab adanya riwayat persalinan *sectio caesarea* sebelumnya. Kerugiannya memiliki lebih besar resiko peritonitis dan 4 kali lebih bahaya ruptur uteri pada kehamilan selanjutnya (Putri, EM. 2019 : 12).



Gambar 2.7.2 SC Klasik
Sumber : Ekasari, Setiyani. 2012

3) *Sectio Caesarea Ekstraperitoneal*

Jenis operasi dengan membedah dinding dan fasia perut dan musculus rectus dipisahkan secara tumpul. Vesika urinaria diretraksi ke bawah sedangkan lipatan peritoneum dipotong ke arah kepala untuk memaparkan segmen bawah uterus. Jenis operasi ini dilakukan untuk mengurangi bahaya dari infeksi puerperal, tetapi dengan adanya kemajuan pengobatan terhadap infeksi, pembedahan *sectio caesarea* ini sudah tidak banyak dilakukan sebab adanya kesulitan dalam melakukan pembedahan (Putri, EM. 2019:12).

2. **Indikasi *Sectio Caesarea***

Tindakan SC dilakukan dengan indikasi, bila bisa di usahakan untuk melahirkan dengan pervaginam tindakan SC tidak disarankan. Adapun contoh indikasi ialah faktor dari ibu dan bayi yang memiliki risiko tinggi, bukan alasan pribadi (Safitri, 2021 : 15).

Solehati, 2017 dalam Safitri (2021) menjabarkan indikasi faktor ibu dan faktor janin :

a. Distosia Bahu

Distosia ialah keadaan dimana persalinan lama yang disebabkan penyulit dalam persalinan. Beberapa faktor diantaranya, kelainan his, kelelahan mendedan, kelainan pada jalan lahir, kelainan letak janin dan bentuk janin, dan bisa juga karena psikologis ibu

b. *Cepalo Pelvic Disporption*

CPD ialah ketidakseimbangan atau ketidakcocokan antara kepala janin dan panggul ibu, misalnya panggul tidak sesuai dengan besar kepala janin. Sehingga tidak memungkinkan untuk kepala janin melewati rongga panggul dan bagian sempit panggul.

c. Pre Eklampsia Berat Eklampsia

PEB ialah kondisi dimana ibu memiliki tekanan darah tinggi, hal ini biasa terjadi di usia kehamilan tua serta ditemukannya protein dalam urin. Apabila dibiarkan akan berbahaya, karena membuat ibu kejang-kejang dan kondisi ini tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal.

d. Gagal Induksi

Induksi ialah salah satu jalan keluar ketika ibu tetap ingin mengusahakan melahirkan normal meskipun jalan lahir terlambat untuk membuka dan janin harus dikeluarkan saat itu. Tetapi induksi juga kadang mengalami kegagalan

e. Riwayat *sectio caesaraea*

Operasi sesar lebih dari satu kali adalah indikasi untuk dilakukan kembali operasi sesar. Ini dikarenakan telah terjadi luka insisi pada abdomen ibu di persalinan sebelumnya yang bisa mengakibatkan robekan pada uterus jika ibu melahirkan secara normal.

f. Plasenta previa

Plasenta previa ialah keadaan dimana letak plasenta berada pada bagian bawah rahim dan menutupi sebagian atau semua jalan lahir. Plasenta previa ada tiga jenis; plasenta previa marginalis, plasenta previa partialis, dan plasenta previa totalis.

g. Usia >35 tahun

Usia reproduksi ideal perempuan ialah 20-35 tahun. Dimana usia dibawah 20 tahun, organ reproduksi belum begitu sempurna yang bisa mengakibatkan komplikasi pada *obstetric*. Usia 35 tahun keatas mempunyai risiko besar tiga kali lipat untuk dilakukannya persalinan secara *sectio caesarea*, karena berbagai masalah sering muncul, misalnya preeklampsia berat, kelelahan dalam mengedan, plasenta previa totalis dan sebagainya.

h. Ketuban Pecah Dini (KPD)

Ketuban pecah dini ialah keadaan dimana selaput ketuban pecah sebelum waktunya, sehingga bayi harus dikeluarkan segera karena air ketuban akan merembes dan tinggal sedikit atau bisa sampai habis. Hal ini memudahkan untuk bakteri dari vagina bisa masuk.

i. Letak lintang

Letak lintang ialah kondisi dimana sumbu janin tidak sejajar atau tegak searah dengan sumbu ibu, letak kepala dan bokong mengolok. Bahu biasanya menjadi bagian terendah atau shoulder presentation (Manuaba, 2010 dalam Safitri, 2021:12).

j. *Intrauterine Fetal Death (IUFD)*

WHO dan *The American College of Obstetricians and Gynecologist* berpendapat *Intrauterine Fetal Death (IUFD)* ialah kondisi janin dengan berat badan kurang lebih 350 gram atau pada usia kehamilan 20 minggu mengalami kematian dalam uterus (Safitri, 2021 : 8-12).

3. Komplikasi *Sectio Caesarea*

Komplikasi yang bisa saja terjadi setelah tindakan *sectio caesarea* ialah :

a. Nyeri

Tindakan *post sectio caesarea* meninggalkan sayatan pada kulit abdomen yang menyebabkan terputusnya jaringan yang telah di insisi. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya zat kimia, kemudian dibawa oleh serabut delta A dan C yang mempunyai peran membawa transmisi nyeri dari medula spinalis menuju thalamus. Otak akan memperspeksikan nyeri yang membuat pasien merasakan nyeri pada daerah insisi saat efek anestesi sudah hilang (Nadyah, 2013).

Ada beberapa alat ukur yang sudah umum dipakai untuk mengukur intensitas nyeri ialah *Visual Analogue Scule (VAS)* atau *Numeric Pain Scule (NPS)*



Gambar 2.8 *Visual Analogue Scule (VAS)* sebagai alat ukur nyeri
Sumber : Nadyah, 2013

Secara total minimum adalah pembacaan *Visual Analogue Scale* (VAS) atau *Numeric Pain Scale* (NPS) *score* total minimum adalah (-1) dan *score* total maksimum (5) (Nadyah, 2013).

b. Syok

Syok ialah kondisi dimana tanda-tanda vital, nadi dan pernafasan mengalami peningkatan, tekanan darah menurun, oliguria, penderita gelisah, ekkstremitas dan muka dingin, serta warna kulit ke abu-abuan. Syok terjadi karena hemoragi yang terjadi pada 24 jam pertama pascabedah, sepsis, neurogenik dan kardiogenik (Nurjannah, dkk, 2020).

c. Kecemasan

Kecemasan yang dirasakan ibu dengan *post sectio caesarea* ialah harus bergantung kepada orang lain bahkan ancaman kematian. Adapun salah satu terapi untuk mengatasi kecemasan pada ibu yaitu dengan *Progressive Muscle Relaxation* (OMR) dengan merangsang pikiran ibu sehingga mengakibatkan ketegangan fisiologis yang biasanya ditandai dengan ketegangan otot. Dengan merilekskan otot maka akan menurunkan ketegangan pada ibu (Rahmawati, dkk, 2017).

d. Infeksi

Kulit merupakan bagian yang bisa menjaga tubuh dari kuman. Jaringan kulit adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kulit, kalau jaringan pada kulit rusak maka memungkinkan atau memberikan jalan untuk kuman bisa masuk ke dalam tubuh sehingga terjadi infeksi (Hidayat dalam Utami, 2015:7).

e. Sub Involusi Uteri

Sub involusio uteri ialah kondisi dimana uterus gagal untuk mengikuti pola normal involusio/proses pengembalian rahim seperti semula tidak berjalan dengan baik, sehingga proses pengecilan rahim menjadi terhambat. Ditandai dengan lambatnya pengecilan rahim, adanya perdarahan tidak wajar, pengeluaran lochea rubra yang panjang dan tidak sesuai, serta tinggi fundus uteri yang tidak sesuai dengan kondisi normal (Mardiana & Emi, 2021)

Perbedaan involusi uterus dengan *sectio caesarea* menjadi lebih lama dibandingkan dengan ibu bersalin dengan proses pervaginam, selain itu nyeri di dominasi pada bagian abdomen yang telah dibedah serta gas yang terdapat pada usus halus (Jhonson dalam Utami, 2015).

f. Infeksi saluran kemih

Infeksi saluran kemih bisa terjadi pada pasien dengan *post sectio caesarea*, terutama pada ibu yang dikateter. Ibu mengalami demam dan merasakan nyeri saat berkemih, hasil pemeriksaan urine (disekresi melalui kateter) mengandung leukosit didalamnya. Hal ini disimpulkan setelah melihat adanya peningkatan leukosit esterase (Nurjannah, dkk, 2020).

g. Distensi perut

Pada pasca laparotomi tidak jarang perut bisa sedikit kembung, namun setelah flatus keluar keadaan perut akan kembali menjadi normal. Selain itu jika didapati distensi perut bertambah, terdapat timpani diatas perut saat di ketok, serta ibu merasa mual dan ingin muntah (Nurjannah, dkk, 2020).

h. Infeksi puerperal

Infeksi puerperal biasanya bersifat ringan, didapati suhu mengalami peningkatan selama beberapa hari dalam masa nifas, bersifat berat seperti tromboflebitis, sepsis, peritonitis, dan lainnya (Nurjannah, dkk, 2020).

i. Terbukanya luka operasi eviserasi

Jahitan pada luka bekas *sectio caesarea* bisa terbuka karena beberapa faktor, diantaranya : luka dijahit tetapi tidak sempurna, distensi pada perut, batuk atau muntah keras, dan bisa berujung infeksi (Nurjannah, dkk, 2020).

4. Proses Penyembuhan Luka *Post Sectio Caesarea*

Proses penyembuhan luka terdiri dari tiga fase yaitu inflamasi, proliferasi (*epitelisasi*), dan maturasi (*remodeling*).

- a. Pada fase inflamasi, penyembuhan luka pada fase ini terjadi hingga hari kelima setelah pembedahan. Namun fase ini bisa saja singkat jika tidak terjadi infeksi.
- b. Fase proliferasi adalah fase dimana terjadinya penurunan jumlah sel-sel inflamasi, tanda-tanda radang berkurang, munculnya sel fibroblast, pembentukan pembuluh darah baru. Pada fase ini terjadi juga epitelisasi yaitu proses pembentukan kembali lapisan kulit yang rusak.
- c. Fase maturasi adalah fase dimana proses penyembuhan luka dimulai dari ke-21 hingga 1 tahun yang dimana proses ini didasari dari pergantian kolagen tipe-3 menjadi kolagen tipe-1. Perubahan peningkatan kolagen terjadi secara signifikan pada minggu ketiga hingga minggu keenam setelah luka.

Faktor-faktor yang mempercepat penyembuhan luka dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu usia, anemia, penyakit penyerta, faskulirisasi, nutrisi, kegemukan, obat-obatan, merokok, mobilisasi dini, personal hygiene dan stress.

5. Asuhan Luka *Sectio Caesarea*

Perawatan luka adalah tindakan guna merawat luka dimana tidak sulit untuk merawatnya, tetapi jika tidak tepat dalam merawat akan berakhir fatal. Sebab itu, pastikan tidak salah dalam merawat luka operasi, pembalutan dilakukan untuk mencegah infeksi silang (masuk melalui luka) dan membantu proses penyembuhan luka.

Pengobatan luka selanjutnya menggunakan betadine atau sejenisnya, setelah luka bersih cuci tangan kembali dan keringkan.

- a. Setiap 1 minggu kasa harus dibuka
- b. Bersihkan jika keluar darah dan langsung ganti kasa
- c. Jaga luka agar tetap kering
- d. Menjaga kebersihan
- e. Gunakan bahan plastik atau pembalut kedap air (opset) (Nurjannah, dkk, 2020:215-217).

6. Perawatan Pasca Operasi oleh Bidan

- a. Periksa tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu serta jumlah urine yang tertampung. Memeriksa/mengukur jumlah perdarahan selama operasi

- b. Buat laporan operasi dan mencantumkan hasil pemeriksaan dalam lembar laporan yang ada. Catat lama operasi, jenis kelamin, nilai apgar dan kondisi bayi lahir.
- c. Berikan edukasi secara rinci, lengkap dan jelas mengenai : nama, obat, dosis, cara pemberian, dan waktu pemberian obat
- d. Nasihat dan konseling paca operasi diantaranya : Anjuran pada keluarga untuk mengawasi ibu, terkhusus pada bekas luka jahit. Sampaikan hasil pemeriksaan (identitas bayi). Berikan konseling mengenai upaya untuk mencegah atau menunda kehamilan dulu dan sampaikan risiko yang akan dihadapi oleh pasien nantinya (Nurjannah, dkk, 2020 : 214-215).
- e. Anjuran terapi *murrotal*. Salah satu teknik non farmakologis untuk mengurangi nyeri ialah dengan teknik distraksi pendengaran atau mendengarkan musik. Musik yang sering digunakan untuk membantu mengurangi nyeri pada pasien *post sectio caesarea* adalah Murrotal Al-Qur'an (Musbikin, 2012 dalam Purwati, 2016).

Terapi murrotal Al-Qur'an yang sering dilantunkan salah satunya ialah QS. Ar-Rahman/55:13

بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

“Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan (wahai jin dan manusia)”

C. Tinjauan Tentang Proses Manajemen Kebidanan

1. Pengertian

Manajemen Kebidanan merupakan proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan yang didasari dengan teori ilmiah, penemuan, keterampilan secara logis dalam tahapannya guna mengambil keputusan yang berfokus pada klien.

2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

Hellen Varney (1997) menguraikan 7 langkah proses dalam manajemen yang dimulai dari pengumpulan data hingga dengan evaluasi. Semua tindakan dari manajemen kebidanan didokumentasikan sebagai entuk tanggung jawan serta tanggung gugatan bidan terhadap tindakan yang telah diberikan/lakukan dan juga sebagai referensi dan penelitian.

Proses manajemen kebidanan diuraikan sebagai berikut.

a. Langkah I : Identifikasi Data Dasar.

Langkah pertama ini berisi semua informasi yang akurat dan lengkap dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan kondisi ibu. Dimana terdiri dari data subjektif dan objektif. Data subjektif menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data ibu melalui anamnesa, seperti identitas/biodata, riwayat menstruasi, riwayat persalinan dan nifas, biopsikologi spiritual dan pengetahuan ibu. Sedangkan data objektif menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan yang

dilakukan bidan terhadap ibu, seperti pemerikaan penunjang (laboratorium), tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik terfokus (inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi).

Pada ibu post partum dengan *post sectio caesarea*, saat anamnesa didapatkan informasi : anak ketiga, posrpartum 2 jam yang lalu, melahirkan 2 kali dan keguguran 1 kali, riwayat persalinan sebelumnya ialah *sectio caesarea* dengan indikasi ketuban pecah dini, dilakukan *sectio caesarea* dengan indikasi riwayat *sectio caesarea*, ASI belum ada, keluhan nyeri pada perut bagian bawah, merasa pusing ketika membuka mata dan merasa ingin mual jika diajak berbicara terlalu lama.

Pada pemeriksaan fisik jika pada ibu dengan *post sectio caesarea*, didapatkan hasil : keadaan umum cukup, kesadaran komposmentis, ekspresi tampak meringis, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80x/menit, suhu 36,2°C, pernafasan 20x/menit, tampak pengeluaran kolostrum, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras, tinggi fundud uteri 2 jari dibawah pusat, pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau, tampak luka *post sectio caesarea* melintang dibalut menggunakan kasa steril pada abdomen, tidak terdapat tanda-tanda infeksi.

b. Langkah II : Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual

Langkah ini dilakukan identifikasi pada diagnosa atau masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Pada kasus *post sectio caesarea* ditegakkan diagnosa kebidanan yaitu P_2A_1 dengan *post sectio caesarea* 2 jam yang lalu.

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial

Langkah ini bidan mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosa sebelumnya yang sudah diidentifikasi. Pada kasus *post sectio caesarea* berpotensi terjadi infeksi luka jahitan, sub involusio uteri, syok, infeksi saluran kemih, dan terbukanya luka operasi eviserasi.

d. Langkah IV : Tindakan Segera / Kolaborasi / Rujukan

Langkah ini melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi ibu. Tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera, kolaborasi atau rujukan.

e. Langkah V : Rencana Tindakan

Langkah ini bidan menyusun rencana berdasarkan langkah sebelumnya. Rencana asuhan komprehensif bukan hanya meliputi kondisi pasien, tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap pasien. Setiap rencana asuhan harus disertai oleh klien dan bidan agar dapat melaksanakan dengan efektif.

Pada teori Saifuddin dalam Nurjannah (2020), penatalaksanaan bagi ibu dengan *post sectio caesarea* ialah : pasien dirawat dalam kamar pulih dengan pengawasan tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan dalam 1 jam tiap 15 menit, anjurkan pasien tidur menghadap kesamping dan pastikan jalan nafas bebas, letakkan tangan yang di infus disamping pasien agar cairannya mengalir dengan baik, dan anjurkan untuk mobilisasi dengan menggerakkan kaki tangan dan tangannya dalam 6-12 jam, setelah itu duduk, jika memungkinkan pada 24 jam *post sectio caesarea* pasien dianjurkan jalan, dan mandi sendiri pada hari kedua.

Anjuran untuk tetap menyusui bayinya, anjuran untuk makan makanan yang tinggi protein seperti buah (berry, stroberi, anggur dan jeruk) , sayuran hijau (bayam), kacang-kacangan, ikan (gabus) atau daging untuk membantu penyembuhan luka, ajarkan ibu teknik relaksasi nafas dalam untuk membantu mengurangi rasa nyeri, anjurkan mengganti perban 3 hari sekali, anjurkan menjaga kebersihan diri terlebih di sekitar luka bekas operasi, anjurkan kontrol kembali ke dokter kandungan 1 minggu *post sectio* yang mana jika operasinya di rumah sakit C anjurkan untuk kontrol ke puskesmas dan jika operasinya di rumah sakit A maka anjurkan kontrol di rumah sakit tersebut.

Anjurkan ibu untuk selalu berdzikir, bersyukur dan berprasangka baik kepada Allah SWT atas semua yang dialaminya, ajarkan do'a ketika menyusui, anjurkan ibu untuk mendengarkan murrotal selain untuk menenangkan pasien juga bisa membantu mengurangi nyeri menurut penelitian.

Berikan support kepada pasien agar semangat menjalani tugas barunya sebagai seorang ibu, semangat menyusui dan memberitahu bahwa hari pertama sampai ketiga memang biasanya ASI masih kurang, tidak cemas terhadap kondisinya nyeri dan luka akan segera membaik, meyakinkan bahwa bisa melewatinya, anjuran ibu untuk tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga, anjurkan suami untuk selalu mensupport istrinya dan tidak insecure atas perubahan dirinya, anjuran kepada suami atau keluarga untuk membantu ibu atau selalu terlibat dalam merawat bayi agar ibu tidak kelelahan dan berujung stress.

Merencanakan kunjungan ulang atau kunjungan rumah, umumnya dilakukan 4 kali kunjungan ibu nifas normal. Pada kasus *post sectio* akan dilakukan 6 kali kunjungan terhadap ibu karena adanya luka yang tidak normal serta menilai intensitas nyeri yang dirasakan, yaitu pada kunjungan I 2 jam *post sectio*, kunjungan II 6 jam *post sectio*, kunjungan III hari kedua, kunjungan IV satu minggu pertama, kunjungan V dua minggu pertama dan kunjungan V pada 6 minggu postpartum.

f. Langkah VI : Implementasi

Langkah ini melaksanakan seluruh rencana asuhan yang sudah disusun pada langkah sebelumnya dengan efisien dan memastikan masalah aktual teratasi dan masalah potensial tidak terjadi. Menganjurkan ibu agar senantiasa berdo'a, berdzikir, bersyukur dan selalu mengingat Allah SWT. Dan melakukan kunjungan ulang atau kunjungan rumah untuk menilai ada dan tidak ada masalah serta mencegah terjadinya masalah.

g. Langkah VII : Evaluasi

Langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari rencana dan asuhan yang telah diberikan. Bidan harus melakukan pengamatan atau observasi terhadap masalah yang dihadapi pasien, apakah masalah atau keluhan teratasi, sebagian telah dipecahkan atau mungkin timbul masalah baru.

Evaluasi pada kasus *post sectio caesarea* mengevaluasi kembali observasi keadaan umum, apakah tanda-tanda vital dalam batas normal, TFU dan kontraksi uterus baik, pengeluaran lochia normal, berkurangnya keluhan nyeri, sudah bisa bergerak sedikit demi sedikit, ASI sudah lancar atau belum, apakah terdapat tanda-

tanda infeksi pada luka jahit, serta apakah ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang sudah dianjurkan.

Pada kunjungan ulang atau kunjungan rumah yang dilakukan didapatkan hasil tidak terdapat masalah atau tanda-tanda infeksi pada luka jahit dan masalah psikologis teratasi dimana ibu bisa menerima keadannya dan percaya diri untuk merawat bayinya.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Pendokumentasian adalah sumber informasi yang diperlukan bidan, untuk memberikan asuhan dalam mengatasi masalah klien. Pengkajian hingga evaluasi yang dilakukan berdasarkan proses 7 langkah Varney dikembangkan dan dituangkan berdasarkan format Subjektif, Objektif, Assesment/Analisis, Planning, Implementasi dan Evaluasi (SOAP)

a. Subjektif

Cakupan dari langkah I, data yang diperoleh dari hasil anamnesa pada ibu postpartum dengan *post sectio caesarea*, meliputi : anak ketiga, postpartum 2 jam yang lalu, melahirkan 2 kali dan keguguran 1 kali, riwayat persalinan sebelumnya ialah *sectio caesarea* dengan indikasi ketuban pecah dini, dilakukan *sectio caesarea* dengan indikasi riwayat *sectio caesarea*, ASI belum ada, keluhan nyeri pada perut bagian bawah, merasa pusing ketika membuka mata dan merasa ingin mual jika diajak berbicara terlalu lama.

b. Objektif

Cakupan dari langkah I, data yang diperoleh oleh bidan setelah melakukan pemeriksaan keadaan umum, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik.

Pada pemeriksaan fisik jika pada ibu postpartum dengan *post sectio caesarea*, didapatkan hasil : keadaan umum cukup, kesadaran komposmentis, ekspresi tampak meringis, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80x/menit, suhu 36,2°C, pernafasan 20x/menit, tampak pengeluaran kolostrum, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras, tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat, pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau, tampak luka *post sectio caesarea* melintang dibalut menggunakan kasa steril pada abdomen, tidak terdapat tanda-tanda infeksi.

c. Assesment (A)

Cakupan dari langkah II, III, dan IV dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana ditegakkan diagnosa berdasarkan data subjektif dan objektif yang diperoleh.

Pada kasus *post sectio caesarea* ditegakkan diagnosa “P₂A₁ dengan *post sectio caesarea* 2 jam yang lalu”. Dan berpotensi terjadi infeksi luka jahitan, sub involusio uteri, syok, infeksi saluran kemih, dan terbukanya luka operasi eviserasi.

d. Planning (P)

Cakupan dari langkah V, VI, dan VII dalam proses manajemen asuhan kebidanan. Planning dilakukan berdasarkan keputusan untuk memastikan masalah aktual teratasi dan masalah potensial tidak terjadi.

Pada langkah ini merencanakan, memberikan dan mengevaluasi asuhan kebidanan yang sesuai dengan kebutuhan ibu. Adapun asuhan yang akan diberikan pada ibu dengan nyeri luka jahit *post sectio* ialah : mengawasi tanda-tanda vital, menganjurkan ibu tidur menghadap samping, memastikan cairan mengalir dengan baik, menganjurkan mobilisasi dengan menggerakkan tangan dan kaki dalam 6-12 jam, setelah itu duduk, jika memungkinkan pada 24 jam *post sectio* menganjurkan ibu jalan, dan mandi pada hari kedua.

Menganjurkan ibu tetap menyusui bayinya, menganjurkan untuk makan makanan yang tinggi protein seperti buah (berry, stroberi, anggur dan jeruk), sayuran hijau (bayam), kacang-kacangan, ikan (gabus) atau daging untuk membantu penyembuhan luka, mengajarkan relaksasi nafas untuk mengurangi nyeri, menganjurkan mengganti perban 3 hari sekali, menganjurkan menjaga kebersihan di sekitar luka bekas operasi, menganjurkan kontrol ke dokter kandungan 1 minggu *post sectio*.

Menganjurkan ibu untuk selalu berdzikir, bersyukur dan berprasangka baik kepada Allah SWT atas semua yang dialaminya, mengajarkan do'a ketika menyusui, menganjurkan ibu mendengarkan murrotal untuk menenangkan dan mengurangi nyeri.

Memberikan support kepada ibu agar semangat menjalani tugas barunya, semangat untuk tetap menyusui dan memberitahu bahwa hari pertama sampai ketiga memang biasanya ASI masih kurang, tidak cemas dengan kondisi nyerinya dan luka akan segera membaik, meyakinkan bahwa ibu bisa melewatinya, menganjurkan ibu untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga, menganjurkan suami atau keluarga untuk membantu ibu dan selalu terlibat dalam merawat bayi agar ibu tidak kelelahan dan berujung stress.

Merencanakan kunjungan ulang atau kunjungan rumah, umumnya dilakukan 4 kali kunjungan ibu nifas normal. Pada kasus *post sectio* akan dilakukan 6 kali kunjungan terhadap ibu karena adanya luka yang tidak normal serta menilai intensitas nyeri yang dirasakan, yaitu pada kunjungan I 2 jam *post sectio*, kunjungan II 6 jam *post sectio*, kunjungan III hari pertama, kunjungan IV satu minggu pertama, kunjungan V dua minggu pertama dan kunjungan V pada 6 minggu postpartum.

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM
PADA NY “N” DENGAN *POST SECTIO CAESAREA*
DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR
TANGGAL 17 JUNI 2022

No Register : 109xxx
Tanggal Masuk : 16 Juni 2022 Jam : 15.48 wita
Tanggal Operasi : 17 Juni 2022 Jam : 07.30 wita
Tanggal Pengkajian : 17 Juni 2022 Jam : 10.30 wita
Nama Pengkaji : Nurul Wana

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas Istri / Suami

Nama : Ny “N” / Tn”M”
Umur : 27 Tahun / 34 Tahun
Nikah/lamanya : 1x / ± 4 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : S1 / S1
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Sungguminasa

B. Data Biologis

1. Keluhan Utama

Ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi *sectio caessarea* pada tanggal 17 Juni 2022, jam 10.30 wita.

2. Riwayat Keluhan Utama

- a. Nyeri yang dirasakan setelah operasi *sectio caesarea* pada tanggal 17 Juni 2022, jam 09.30 wita.
- b. Sifat nyeri yang dirasakan menetap pada abdomen di atas simfisis dengan luka bekas operasi *sectio caesarea* melintang
- c. Ibu merasa pusing ketika membuka mata.
- d. Ibu merasa ingin mual jika diajak berbicara terlalu lama.

C. Riwayat Reproduksi

1. Riwayat menstruasi

- a. Menarche : 14 Tahun
- b. Lama haid : 4-5 hari
- c. Siklus haid : 28-30 hari
- d. Dismenorhea : -

2. Riwayat Gynecologi

- a. Ibu tidak pernah menderita penyakit infeksi pada organ reproduksi
- b. Ibu tidak pernah menderita penyakit pada kelamin

3. Riwayat KB

Ibu sekarang menjadi akseptor KB IUD/Spiral, dipasang saat operasi berlangsung

D. Riwayat ANC

1. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan ketiga
2. HPHT 22 Oktober 2021
3. HTP 29 Juni 2022
4. Pemeriksaan ANC 6 kali di tempat praktik dokter
5. Ibu mengkonsumsi table Fe sebanyak \pm 90 butir selama kehamilan
6. Selama hamil, ibu tidak pernah mengalami mual muntah berlebihan, nyeri perut hebat, perdarahan dan tanda-tanda bahaya kehamilan lainnya

E. Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas yang Lalu

1. Kehamilan pertama tahun 2018, ibu mengalami abortus pada usia kehamilan 2 bulan
2. Kehamilan kedua pada tahun 2020, kehamilan aterm, jenis persalinan *sectio caesarea* dengan indikasi ketubah pecah dini (KPD) di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar dan ditolong oleh dokter spesialis obgyn, keadaan bayi hidup, jenis kelamin laki-laki dengan BBL: 3200 gram dan PBL:50cm. Masa nifas berjalan dengan normal.
3. Kehamilan sekarang, Tahun 2022

F. Riwayat Persalinan Sekarang

1. Ibu masuk rumah sakit tanggal 16 Juni 2022, jam 15.48 wita dengan rujukan dari klinik dokter spesialis obgyn. Dengan diagnosa G₃P₁A₁ aterm rencana *sectio caesarea* dengan indikasi riwayat *sectio caesarea*.
2. Ibu menjalani operasi *sectio caesarea* pada tanggal 17 Juni 2022 jam 07.30 wita sampai jam 08.30 wita. Bayi lahir dengan jenis kelamin laki-laki, BBL 3400 gram, PBL:50 cm, dan apgar score 8/10

G. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1. Kebutuhan nutrisi

Sebelum hamil, ibu makan 3 kali sehari porsi sedang dengan nasi, sayur, lauk. Minum 6-8 gelas air putih, dengan segelas susu di pagi dan malam hari. Ibu juga suka mengkonsumsi buah-buahan.

2. Eliminasi

Sebelum hamil kebiasaan BAK 3-5 kali dan BAB sekali sehari. Setelah 2 jam *post sectio caessarea* kateter masih terpasang dengan jumlah urine \pm 500 ml dan ibu belum BAB.

3. Istirahat

Kebiasaan ibu tidur di siang 1-2 jam dan di malam hari 6-8 jam. 2 jam *post sectio caesarea* ibu berusaha tidur agar tidak pusing dan merasa mual.

H. Riwayat Kesehatan yang Lalu dan Riwayat Kesehatan Keluarga

1. Ibu tidak pernah menderita penyakit jantung, hipertensi, asma, diabetes melitus, dan penyakit lainnya.
2. Ibu tidak pernah menderita penyakit hepatitis, TB, HIV/AIDS, atau penyakit menular lainnya.
3. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit turunan keluarga.
4. Ibu memiliki riwayat operasi *sectio caesarea* sebelumnya.
5. Ibu tidak memiliki riwayat ketergantungan obat-obatan dan alkohol.
6. Ibu tidak memiliki riwayat alergi

I. Riwayat Psikologis, Sosial, Ekonomi dan Spiritual

1. Ibu merasa bahagia dan tidak sabar ingin melihat bayinya
2. Suami dan keluarga senang dengan kelahiran bayinya
3. Hubungan ibu dengan keluarga terjalin dengan baik
4. Suami adalah pengambil keputusan utama dalam keluarga
5. Status ekonomi keluarga diatas rata-rata, penghasilan \pm 4 jt perbulan
6. Ibu dan keluarga selalu berdo'a dan berdzikir agar keadaan ibu dan bayinya selalu baik.

J. Pemeriksaan Terfokus *Post Sectio Caesarea* setelah 2 jam

1. Keadaan umum ibu cukup
2. Kesadaran ibu composmentis

3. Pemeriksaan *head to toe*

a. Wajah

Tidak ada *oedema*, tampak pucat dan ekspresi meringis

b. Mata

Simetris kiri dan kanan, conjungtiva merah muda, sklera putih

c. Dada

Melekat obat *durogesic patch*, bersih dan kering

d. Payudara

Simetris kiri dan kanan, hiperpigmentasi *areola mammae*, puting susu menonjol, tidak ada massa, tidak ada nyeri tekan, ada pengeluaran kolostrum

e. Abdomen

Tampak luka *post sectio caesarea* melintang dibalut menggunakan kasa steril

f. Genitalia

Terpasang kateter tetap, masih memakai popok dewasa

g. Ekstremitas

1) Ekstremitas atas

Simetris kiri dan kanan, tidak ada *oedema*, terpasang infus *dextrose*

2) Ekstremitas bawah

Simetris kiri dan kanan, tidak ada varises, tidak ada *oedema*, tidak ada nyeri tekan

4. Pemeriksaan penunjang 2 jam *post sectio caesarea* tanggal 17 Juni 2022

Hb : 10.0 gr/dl

LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL

Diagnosa : Ny "N", P₂A₁ dengan *Post Sectio Caesarea*

Masalah Aktual : Nyeri luka jahitan *post sectio caesarea*

1. P₂A₁ dengan *Post sectio caesarea*

Data Subjektif :

- a. Ibu melahirkan anak ketiga dengan operasi *sectio caesarea* pada tanggal 17 Juni 2022 jam 07.30 wita, setelah melahirkan 1 kali dan keguguran 1 kali

Data Objektif :

- a. Pengkajian tanggal 17 Juni 2022, jam 10.30 wita
- b. Tampak luka *post sectio caesarea* melintang dibalut menggunakan kasa steril pada abdomen

Analisa dan interpretasi data :

Ibu di operasi *sectio caesarea* tanggal 17 juni 2022 jam 07.30 wita dan selesai pada jam 08.30 wita, waktu pengkajian 10.30 yang artinya sudah berada pada masa nifas 2 jam *post sectio caesarea*. (Fitrihadi, dkk, 2018).

2. Nyeri luka *post sectio caesarea*

Data subjektif :

- a. Ibu melahirkan anak ketiga dengan operasi *sectio caesarea* pada tanggal 17 Juni 2022 jam 07.30 wita, setelah melahirkan 1 kali dan keguguran 1 kali
- b. Ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi *sectio caesarea*
- c. Sifat nyeri yang dirasakan menetap pada abdomen di atas simfisis dengan luka bekas operasi *sectio caesarea* melintang

Data Objektif :

- a. Ekspresi wajah tampak meringis
- b. Tampak luka *post sectio caesarea* melintang dibalut menggunakan kasa steril pada abdomen

Analisa dan interpretasi data :

Tindakan *post sectio caesarea* meninggalkan sayatan pada kulit abdomen yang menyebabkan terputusnya jaringan yang telah di insisi. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya zat kimia, kemudian dibawa oleh serabut delta A dan C yang mempunyai peran membawa transmisi nyeri dari medula spinalis menuju thalamus. Otak akan memperspeksikan nyeri yang membuat pasien merasakan nyeri pada daerah insisi saat efek anestesi sudah hilang (Nadyah, 2013).

LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL

Diagnosa : Ny "N", P₂A₁ dengan *Post Sectio Caesarea*

Masalah potensial : Antisipasi infeksi luka jahitan

1. Infeksi luka jahitan

Data Subjektif :

- a. Ibu melahirkan anak ketiga dengan operasi *sectio caesarea* pada tanggal 17 Juni 2022 jam 07. 30 wita, setelah melahirkan 1 kali dan keguguran 1 kali
- b. Ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi *sectio caesarea*
- c. Sifat nyeri yang dirasakan menetap pada abdomen di atas simfisis dengan luka bekas operasi *sectio caesarea* melintang

Data Objektif

- a. Pengkajian tanggal 17 Juni 2022, jam 10.30 wita
- b. Tampak luka *post sectio caesarea* melintang dibalut menggunakan kasa steril pada abdomen

Analisa dan interpretasi data :

Kulit merupakan bagian yang bisa menjaga tubuh dari kuman. Jaringan kulit adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kulit, kalau jaringan pada kulit rusak maka memungkinkan atau memberikan jalan untuk kuman bisa masuk ke dalam tubuh sehingga terjadi infeksi (Hidayat dalam Utami, 2015:7).

2. Sub involusio uteri

Data Subjektif :

- a. Ibu melahirkan anak ketiga dengan operasi *sectio caesarea* pada tanggal 17 Juni 2022 jam 07. 30 wita, setelah melahirkan 1 kali dan keguguran 1 kali
- b. Ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi *sectio caesarea*
- c. Sifat nyeri yang dirasakan menetap pada abdomen di atas simfisis dengan luka bekas operasi *sectio caesarea* melintang

Data Objektif

- a. Pengkajian tanggal 17 Juni 2022, jam 10.30 wita
- b. Tampak luka *post sectio caesarea* melintang dibalut menggunakan kasa steril pada abdomen

Analisa dan interpretasi data :

Insisi pada proses pembedahan *post sectio caesarea* mengakibatkan perubahan fisik pada ibu bersalin dengan proses *sectio caesarea* berbeda dengan ibu bersalin dengan proses pervaginam. Perbedaan ini terjadi pada involusi uterus menjadi lebih lama dibandingkan dengan ibu bersalin dengan proses pervaginam, selain itu nyeri di dominasi pada bagian abdomen yang telah dibedah serta gas yang terdapat pada usus halus (Jhonson dalam Utami, 2015:7)

3. Syok

Data subjektif

- a. Ibu melahirkan anak ketiga dengan operasi *sectio caesarea* pada tanggal 17 Juni 2022 jam 07. 30 wita, setelah melahirkan 1 kali dan keguguran 1 kali
- b. Ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi *sectio caesarea*

Data objektif

- a. Pengkajian tanggal 17 Juni 2022, jam 10.30 wita
- b. Tampak luka *post sectio caesarea* melintang dibalut menggunakan kasa steril pada abdomen

Analisa dan interpretasi data :

Syok ialah kondisi dimana tanda-tanda vital, nadi dan pernafasan mengalami peningkatan, tekanan darah menurun, oliguria, penderita gelisah, ekkstremitas dan muka dingin, serta warna kulit ke abu-abuan. Syok terjadi karena hemoragi yang terjadi pada 24 jam pertama pascabedah, sepsis, neurogenik dan kardiogenik (Nurjannah, dkk, 2020).

4. Infeksi saluran kemih

Data subjektif

- a. Ibu melahirkan anak ketiga dengan operasi *sectio caesarea* pada tanggal 17 Juni 2022 jam 07. 30 wita, setelah melahirkan 1 kali dan keguguran 1 kali

Data objektif

- a. Pengkajian tanggal 17 Juni 2022, jam 10.30 wita
- b. Terpasang kateter tetap, masih memakai popok dewasa
- c. Ekstremitas atas, terpasang infus *Dextrose*

Analisa dan interpretasi data :

Infeksi saluran kemih bisa terjadi pada pasien dengan *post sectio caesarea*, terutama pada ibu yang dikateter. Ibu mengalami demam dan merasakan nyeri saat berkemih, hasil pemeriksaan urine (disekresi melalui kateter) mengandung leukosit didalamnya. Hal ini disimpulkan setelah melihat adanya peningkatan leukosit esterase (Nurjannah, dkk, 2020).

5. Terbukanya luka operasi eviserasi

Data subjektif

- a. Ibu melahirkan anak ketiga dengan operasi *sectio caesarea* pada tanggal 17 Juni 2022 jam 07. 30 wita, setelah melahirkan 1 kali dan keguguran 1 kali
- b. Ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi *sectio caesarea*

Data objektif

- a. Pengkajian tanggal 17 Juni 2022, jam 10.30 wita

Nadi : 60-90x/menit

Suhu : 36,5°C – 37,5°C

Pernafasan : 16-24x/menit

3. Tingkatan keluhan nyeri berkurang
4. Tidak ada tanda-tanda infeksi, yaitu : demam, bekas luka jahitan tampak kemerahan, bengkak, terdapat pengeluaran cairan nanah atau darah, jahitan terbuka, adanya perdarahan yang tidak wajar dari jalan lahir.
5. Proses involusio uterus berlangsung normal yang ditandai dengan :
 - a. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras
 - b. Involusi uteri baik
 - c. Lochea rubra dan tidak berbau

C. Rencana tindakan asuhan kebidanan

1. Ucapkan selamat kepada ibu atas kelahiran bayinya

Rasional :

Untuk menciptakan dan menjalin baik hubungan dengan ibu, sebagai bentuk apresiasi juga untuk ibu

2. Observasi tanda-tanda vital setiap 2 – 4 jam

Rasional :

Tanda-tanda vital sebagai salah satu indikator untuk mengetahui keadaan ibu

3. Kaji tingkatan nyeri pada ibu

Rasional :

Untuk mengetahui tingkatan nyeri yang dirasakan ibu

4. Jelaskan kepada ibu penyebab nyeri

Rasional :

Dengan menjelaskan penyebab nyeri, agar ibu dapat mengerti dan beradaptasi dengan nyeri tersebut sehingga ibu sedikit tenang.

5. Beritahu kepada ibu cara mengurangi nyeri

- a. Nyeri ringan

Dengan teknik relaksasi nafas dalam

- b. Nyeri sedang

Dengan teknik rangsangan, mengompres air hangat

- c. Nyeri berat

Pemberian terapi farmakologi

Rasional :

Agar nyeri yang dirasakan ibu berkurang atau teratasi

6. Beritahu kepada ibu kandungan obat *durogesic patch* yang melekat pada dada yaitu sebagai analgetik yang dapat mengurangi rasa nyeri pasca *sectio caesarea*

Rasional :

Agar ibu mengetahui kandungan atau fungsi obat yang melekat pada dada

7. Anjurkan kepada ibu untuk menjaga obat *durogesic patch* (dapat dipakai hingga 72 jam), agar tetap bersih dan kering sampai hari ketiga

Rasional :

Agar kadar obat *durogesic patch* tidak berkurang dan rusak

8. Anjurkan kepada ibu melakukan relaksasi nafas dan ambulasi/mobilisasi dini

Rasional :

Dapat membantu mengurangi nyeri dan mencegah terjadinya tromosis dan tromboemboli

9. Jelaskan kepada ibu manfaat relaksasi nafas dan ambulasi/mobilisasi dini

Rasional :

Relaksasi nafas salah satu upaya untuk mengalihkan perhatian ibu terhadap nyeri yang dirasakan. Relaksasi juga dapat meningkatkan suplay O₂ yang masuk kedalam tubuh ibu sehingga dapat mengurangi nyeri yang timbul. Saat bergerak atau mobilisasi dini, otot-otot perut dan panggul segera kembali normal, otot-otot perut menjadi kuat dan bisa mengurangi rasa nyeri. Selain itu ibu dapat mendapatkan kekuatan, mempercepat proses penyembuhan, faal usus dan kandung kemih akan membaik jika bergerak karena merangsang peristaltik usus kembali normal. Kegiatan ini bisa membantu organ-organ tubuh cepat berkeja sebagaimana mestinya.

10. Anjurkan kepada ibu untuk makan makanan yang tinggi protein seperti buah (berry, stroberi, anggur dan jeruk), sayuran hijau (bayam), kacang-kacangan, ikan (gabus) atau daging

Rasional :

Dapat membantu proses penyembuhan luka

11. Anjurkan kepada ibu untuk minum air putih sedikit demi sedikit jika merasa sudah tidak mual pada 6 jam *post sectio caesarea*

Rasional :

Agar kebutuhan cairan ibu terpenuhi

12. Ajarkan untuk menyusui bayi dengan posisi *cradle* (setengah duduk) dan *side lying* (berbaring miring)

Rasional :

Dapat membuat ibu nyaman dan tidak terlalu memberikan tekanan pada luka bekas *section caesarea*

13. Anjurkan untuk tetap menyusui bayi, secara bergantian atau *on demand*. Ibu juga bisa mengkonsumsi kacang-kacangan, sayuran (katuk, selada, bayam, kelor, labu kuning), dan biji-bijian yang bisa menambah produksi ASI

Rasional :

Saat menyusu, hisapan bayi akan merangsang pengeluaran ASI. Makanan juga sebagai salah satu yang berperan untuk menambah produksi ASI.

14. Ajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara

Rasional :

Untuk merangsang produksi ASI

15. Berikan dukungan kepada ibu untuk semangat menyusui. Menjelaskan bahwa hari pertama sampai hari ketiga biasanya ASI memang masih kurang.

Kebutuhan makanan bayi juga belum terlalu banyak, sehingga tidak perlu

memberikan susu formula. Bayi menangis tidak selalu menandakan bahwa ia lapar, tetapi itu adalah bahasa tubuhnya karena mulai beradaptasi dengan dunia diluar rahim.

Rasional :

Agar ibu semangat menyusui dan tidak memberikan susu formula

16. Ajarkan kepada ibu do'a ketika menyusui yaitu *Alladzi kholaqonii fahuwa yahdiin. Walladzi huwa yuth'imunii wa yasqiin. Wa idzaa maridhtu fahuwa yasyfiin.* “(Yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku maka Dia-lah yang menunjukkan, dan Tuhanku. Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkan aku” (Q.S Asy-Syu'ara/26:78-80)

Rasional :

Segala tindakan yang selalu diawali dengan do'a akan bernilai ibadah

17. Observasi tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochea

Rasional :

- a. TFU atau tinggi fundus uteri ialah salah satu indikator untuk mengetahui bahwa proses involusio uteri berjalan dengan normal atau tidak. Normal TFU berkurang 1cm setiap hari, teraba bundar dan keras
- b. Kontraksi uterus untuk mengetahui apakah uterus berkontraksi uterus atau tidak. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik atau kurang maka dapat menyebabkan perdarahan dan memperlambat proses involusio uteri.

c. Involusi yang kurang baik menyebabkan terjadinya infeksi sehingga lochea mengalami perubahan warna, bau, banyaknya, serta memperpanjang pengeluaran lochea.

18. Jelaskan kepada ibu tentang penyebab keluarnya darah dari jalan lahir karena terjadinya involusio uteri atau proses kembalinya uterus ke keadaan seperti sebelum hamil

Rasional :

Agar ibu mengerti

19. Jelaskan kepada ibu pentingnya personal hygiene. Menjaga kebersihan diri terlebih di sekitar luka bekas operasi , mengganti pembalut setiap 2-4 jam atau jika pembalut sudah penuh dan ibu merasa tidak nyaman

Rasional :

Agar ibu merasa nyaman, dan terhindar dari infeksi

20. Berikan informasi kepada ibu tentang kapan ibu dapat mulai melakukan hubungan seksual, yaitu apabila sudah tidak ada lagi darah yang keluar dan jika dimasukkan 2 jari atau lebih ibu tidak merasakan sakit

Rasional

Agar ibu mengerti dan menghindari hubungan seksual sebelum selesai masa nifas

21. Observasi pemberian cairan infus *Dextrose* yang dicampur dengan *Oxytocin* 2 ampul

Rasional :

Untuk merangsang kontraksi agar tidak terjadi perdarahan.

22. Observasi pengeluaran urine pada urine bag

Rasional :

Mengetahui keseimbangan cairan dalam tubuh serta kandung kemih yang penuh dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan nyeri pada ibu

23. Berikan *Nazovel* 100 mg melalui rectum pada 6 jam nyeri setelah operasi *sectio caesarea*

Rasional :

Untuk mengatasi nyeri *post sectio*

24. Lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk pemberian terapi farmakologi

Rasional :

Agar bisa memberikan obat dan dosis sesuai dengan aturannya

25. Berikan dan jelaskan kepada ibu manfaat obat yang di resepkan oleh dokter

- a. *Paracetamol* : bantu kurangi demam, pusing dan nyeri
- b. *Lactamam* : bantu perlancar ASI
- c. *Ifalmin* : bantu percepat proses penyembuhan seteah operasi
- d. *Maxpofer* : bantu penuhi kebutuhan zat besi, B12, asam folat, mineral
- e. *Analtram* : bantu redakan nyeri *post sectio*

Rasional :

Agar ibu mengetahui manfaat obat yang diberikan

26. Beritahu kepada ibu jadwal mengkonsumsi obat yang telah diberikan, yaitu *paracetamol 3x1; lactamam 3x1; ifalmin 3x2; maxpofer 1x1; dan analtram 3x1*

Rasional :

Agar ibu mengerti kapan jadwal seharusnya minum obat

27. Berikan support kepada ibu untuk semangat menjalani tugas barunya sebagai seorang ibu dan tidak cemas terhadap kondisinya, nyeri dan luka akan segera membaik. Segala perubahan fisiologis adalah sesuatu yang wajar dan disyukuri, hal itu sebagai tanda atau kenang-kenangan saat mengandung buah hati

Rasional :

Agar ibu merasa tenang dan tidak terjadi kecemasan yang berujung membuat ibu lemah

28. Anjurkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang 1-2 jam dan tidur di malam hari 7-8 jam perhari dan menghindari aktivitas yang berat

Rasional :

Istirahat yang cukup bisa membantu proses pemulihan

29. Beritahu kepada ibu tentang perawatan bayi seperti memandikan, memperhatikan kebersihan, menjemur dan perawatan tali pusat bayi, serta menjaga kehangatan bayi

Rasional :

Agar kebersihan dan kehangatan bayi selalu terjaga

30. Beritahu kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi: bayi tidak mau menyusui, kejang, demam $>37,5^{\circ}\text{C}$, tali pusat bernanah dan bau, kulit kuning, biru atau pucat. Jika terjadi salah satu dari tanda bahaya, segera bawa bayi ke pusat pelayanan kesehatan terdekat

Rasional :

Agar tanda bahaya pada bayi bisa dihindari atau ditangani segera

31. Anjurkan kepada suami atau keluarga untuk membantu ibu atau selalu terlibat dalam merawat bayi

Rasional :

Agar ibu tidak kelelahan dan berujung stress

32. Anjurkan kepada ibu agar senantiasa berdo'a, berdzikir, bersyukur dan berprasangka baik kepada Allah SWT atas semua yang dialaminya.

Rasional :

Agar ibu merasa tenang dan selalu bersyukur

33. Anjurkan kepada ibu untuk mendengarkan murrotal Q.S Ar-Rahman/55

Rasional :

Dapat menenangkan pasien dan membantu mengurangi nyeri

34. Buat jadwal kunjungan masa nifas hingga minggu keenam

Rasional :

Untuk memantau perkembangan ibu dan membantu jika terdapat keluhan

LANGKAH VI IMPLEMENTASI

Tanggal 17 Juni 2022 Jam 10.40 wita

1. Mengucapkan selamat kepada ibu atas kelahiran bayinya dan menciptakan hubungan baik dengan ibu, juga sebagai apresiasi untuk ibu

Hasil : Telah dilakukan, Ibu merasa senang

2. Mengobservasi tanda-tanda vital 2 jam *post sectio caesarea*

Hasil : Tanda-tanda vital dalam batas normal

Tekanan darah : 120/70 mmHg

Nadi : 80x/menit

Suhu : 36,2°C

Pernafasan : 20x/menit

3. Mengkaji tingkatan nyeri pada ibu, ekspresi wajah tampak meringis

Hasil : Diukur menggunakan visual analogue, nyeri berada pada tingkat 3

4. Memberitahu ibu cara mengurangi nyeri ringan dengan teknik relaksasi nafas dalam

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menganjurkan kepada ibu untuk melakukan mobilisasi dini seperti menggerakkan tungkai bawah.

Hasil : Ibu mengerti, mulai menggerakkan tungkai bawahnya

6. Menjelaskan kepada ibu manfaat relaksasi nafas dan mobilisasi dini

Hasil : Ibu mengerti

7. Mengobservasi tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochea

Hasil : Tinggi fundus uteri 2 jadi dibawah pusat, kontraksi baik teraba bundar dan keras, pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau

8. Mengobservasi cairan infus *Dextrose* yang dicampur dengan *Oxytosin* 2 ampul yaitu 28 tetes/menit.

Hasil : Telah dilakukan

9. Mengoservasi pengeluaran urine pada urine bag

Hasil : Urine sebanyak ± 500 ml yang tertampung di urine bag

10. Memberikan support kepada ibu untuk semangat menjalani tugas barunya sebagai seorang ibu dan tidak cemas terhadap kondisinya, nyeri dan luka akan segera membaik

11. Menganjurkan kepada ibu agar senantiasa berdo'a, berdzikir, bersyukur dan berprasangka baik kepada Allah SWT atas semua yang dialaminya.

Hasil : Ibu mengerti, berusaha tenang dan berprasangka baik kepada Allah SWT

12. Menganjurkan ibu untuk mendengarkan murrotal Q.S Ar-Rahman/55, untuk menenangkan ibu dan membantu peralihan rasa nyeri

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

13. Membuat jadwal kunjungan nifas

Hasil : Telah dibuat

LANGKAH VII EVALUASI

Tanggal 17 Juni 2022 Jam 10.50 wita

1. Keadaan umum ibu baik

2. Tanda-tanda vital baik
3. Nyeri luka jahitan *post sectio caesarea* pada ibu nyeri sedang, diukur menggunakan visual analogue berada pada tingkat 3
4. Tidak terdapat tanda-tanda infeksi
5. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras. Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat.



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM
PADA NY “N” DENGAN *POST SECTIO CAESAREA*
DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR
TANGGAL 17 JUNI 2022**

No Register : 109xxx
Tanggal Masuk : 16 Juni 2022 Jam : 15.48 wita
Tanggal Operasi : 17 Juni 2022 Jam : 07.30 wita
Tanggal Pengkajian : 17 Juni 2022 Jam : 10.30 wita
Nama Pengkaji : Nurul Wana

Identitas Istri / Suami

Nama : Ny “N” / Tn”M”
Umur : 27 Tahun / 34 Tahun
Nikah/lamanya : 1x / ± 4 Tahun
Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / S1

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Sungguminasa

Data Subjektif (S)

1. Ibu melahirkan anak ketiga pada tanggal 17 Juni 2022 jam 07.30 wita setelah melahirkan 1 kali dan keguguran 1 kali
2. Ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi *sectio caesarea*
3. Sifat nyeri yang dirasakan menetap pada abdomen diatas simfisis dengan luka bekas operasi *sectio caesarea* melintang
4. Ibu mengeluh pusing saat membuka mata
5. Ibu merasa ingin mual jika diajak berbicara terlalu lama

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu cukup
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi wajah tampak meringis
4. Tampak *durogestic patch* bersih dan kering melekat pada dada
5. Tampak pengeluaran kolostrum
6. Tampak luka bekas operasi *sectio caesarea* melintang yang dibalut menggunakan kasa steril
7. Terpasang kateter tetap dan masih memakai popok dewasa
8. Pemeriksaan laboratorium 2 jam *post sectio caesarea* tanggal 17 Juni 2022
Hb: 10.0 gr/dl

Assesment (A)

Ny "N", P₂A₁ *Post sectio caesarea* 2 jam yang lalu


Planning (P)

Tanggal 17 Juni 2022

Jam 10.35 wita

1. Mengucapkan selamat kepada ibu atas kelahiran bayinya dan menciptakan hubungan baik dengan ibu, juga sebagai apresiasi untuk ibu
2. Mengobservasi keadaan umum ibu, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu, Tekanan darah 120/70 mmHg, Nadi 80x/menit, Suhu 36,2°C, Pernafasan 20x/menit.
3. Mengkaji tingkatan nyeri pada ibu, ekspresi wajah tampak meringis
Hasil : Diukur menggunakan visual analogue, nyeri berada pada tingkat 3
4. Memberitahu ibu cara mengurangi nyeri ringan dengan teknik relaksasi nafas dalam
Hasil : Ibu mengerti
5. Mengajarkan kepada ibu untuk melakukan mobilisasi dini seperti menggerakkan tungkai bawah
Hasil : Ibu menggerakkan tungkai bawahnya
6. Mengobservasi tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochea
Hasil : Tinggi fundus uteri 2 jadi dibawah pusat, kontraksi baik teraba bundar dan keras, pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau
7. Mengobservasi cairan infus *Dextrose* yang dicampur dengan 2 ampul *Oxytosin*.

8. Mengobservasi pengeluaran urine yaitu ± 500 ml urine yang tertampung dalam urine bag.
9. Menganjurkan ibu untuk selalu berdzikir, bersyukur dan berprasangka baik kepada Allah SWT atas semua yang dialaminya.
10. Menganjurkan ibu untuk mendengarkan murrotal Q.S Ar-Rahman/55, untuk menenangkan ibu dan membantu peralihan rasa nyeri



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM
PADA NY “N” DENGAN *POST SECTIO CAESAREA* 6 JAM
DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR
TANGGAL 17 JUNI 2022**

No Register : 109xxx
Tanggal Masuk : 16 Juni 2022 Jam : 15.48 wita
Tanggal Operasi : 17 Juni 2022 Jam : 07.30 wita
Tanggal Pengkajian : 17 Juni 2022 Jam : 02.30 wita
Nama Pengkaji : Nurul Wana

Identitas Istri / Suami

Nama : Ny “N” / Tn”M”
Umur : 27 Tahun / 34 Tahun
Nikah/lamanya : 1x / ± 4 Tahun
Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / S1

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Sungguminasa

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengeluh luka bekas operasi *sectio caesarea* masih terasa nyeri saat bergerak
2. Ibu merasa ingin mual jika terlalu lama berbicara terlalu lama
3. Ibu mengatakan ASInya sedikit

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi wajah tampak meringis saat bergerak
4. Tampak *durogestic patch* bersih dan kering melekat pada dada
5. Pengeluaran ASI masih sedikit
6. Tampak luka *post sectio caesarea* melintang dibalut menggunakan kasa steril pada abdomen.
7. Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat
8. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras
9. Pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau

Assesment (A)

Ny "N", P₂A₁ *post sectio caesarea* 6 jam, dengan nyeri pada tingkat 2

Planning (P)

Tanggal 17 Juni 2022 Jam: 02.35

1. Mengobservasi keadaan umum ibu, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu, Tekanan darah 117/72 mmHg, Nadi 80x/menit, Suhu 36,7°C, Pernafasan 20x/menit
2. Mengkaji tingkatan nyeri pada ibu, ekspresi wajah tampak meringis saat bergerak
Hasil : Diukur menggunakan visual analogue, nyeri berada pada tingkat 2
3. Menjelaskan kepada ibu tentang penyebab nyeri disebabkan terputusnya jaringan otot dan rangasangan otot abdomen yang berlebihan saat operasi. Dengan adanya luka ini maka merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbul rasa nyeri
Hasil : Ibu mengerti
4. Memberitahu kepada ibu cara mengurangi nyeri ringan dengan teknik relaksasi nafas dalam
Hasil : Ibu mengerti
5. Memberitahu kepada ibu kandungan obat *durogesic patch* yang melekat pada dada
Hasil : Ibu mengerti
6. Anjurkan kepada ibu untuk menjaga obat *durogesic patch* (dapat dipakai hingga 72 jam), agar tetap bersih dan kering hingga hari ketiga
Hasil : Ibu mengerti

7. Mengajarkan kepada ibu untuk melakukan mobilisasi dini dengan miring kanan dan miring kiri dan mulai belajar duduk di tempat tidur
Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya
8. Menjelaskan kepada ibu manfaat mobilisasi dini untuk mencegah terjadinya tromosis dan tromboemboli
Hasil : Ibu mengerti
9. Menganjurkan kepada ibu untuk minum air putih sedikit demi sedikit jika merasa tidak mual
Hasil : Ibu mengerti
10. Menganjurkan kepada ibu untuk makan makanan yang tinggi protein seperti buah (berry, stroberi, anggur dan jeruk), sayuran hijau (bayam), kacang-kacangan, ikan (gabus) atau daging karena sangat baik untuk membantu proses penyembuhan luka.
Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya
11. Mengajarkan untuk menyusui bayi dengan posisi *cradle* (setengah duduk) dan *side lying* (berbaring miring)
Hasil : Ibu mengerti
12. Menganjurkan untuk tetap menyusui bayinya, secara bergantian atau *on demand*.
Ibu juga bisa mengkonsumsi kacang-kacangan, sayuran (katuk, selada, bayam, kelor, labu kuning), dan biji-bijian yang bisa menambah produksi ASI
Hasil : Ibu mengerti

13. Memberikan dukungan kepada ibu untuk semangat menyusui. Menjelaskan bahwa hari pertama sampai hari ketiga biasanya ASI memang masih kurang. Kebutuhan makanan bayi juga belum terlalu banyak, sehingga tidak perlu memberikan susu formula. Bayi menangis tidak selalu menandakan bahwa ia lapar, tetapi itu adalah bahasa tubuhnya karena mulai beradaptasi dengan dunia diluar rahim

Hasil : Ibu mengerti

14. Menjelaskan kepada ibu tentang penyebab keluarnya darah dari jalan lahir karena terjadinya involusio uteri atau proses kembalinya uterus ke keadaan seperti sebelum hamil

Hasil : Ibu mengerti

15. Menjelaskan kepada ibu tentang pentingnya *personal hygiene*, seperti mengganti pembalut setiap 2-4 jam atau jika pembalut sudah penuh dan ibu merasa tidak nyaman

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

16. Mengobservasi pemberian cairan infus *Dextrose* yang dicampur dengan *Oxytocin* 2 ampul

Hasil : Telah dilakukan

17. Mengobservasi pengeluaran urine pada urine bag

Hasil : ± 150 ml

18. Memberikan *Nazovel* 100 mg melalui rectum untuk mengatasi pada 6 jam nyeri setelah operasi *sectio caesarea*

Hasil : Telah dilakukan

19. Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk pemberian terapi farmakologi

Hasil : Telah dilakukan

20. Memberikan dan menjelaskan kepada ibu manfaat obat yang di resepkan oleh dokter

Hasil : Telah dilakukan

21. Memberitahu kepada ibu jadwal untuk mengkonsumsi obat yang telah diberikan, yaitu *paracetamol* 3x1; *lactamam* 3x1; *ifalmin* 3x2; dan *maxpofer* 1x1

Hasil : Ibu mengerti

22. Memberikan support kepada ibu untuk semangat menjalani tugas barunya sebagai seorang ibu dan tidak cemas terhadap kondisinya, nyeri dan luka akan segera membaik

Hasil : Ibu mengerti dan merasa sediki tenang

23. Menganjurkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang 1-2 jam dan tidur di malam hari 7-8 jam perhari dan menghindari aktivitas yang berat


Hasil : Ibu mengerti

24. Menganjurkan ibu agar senantiasa berdo'a, berdzikir, bersyukur dan selalu berprasangka baik kepada Allah SWT atas semua yang dialaminya

Hasil : Ibu mengerti

25. Menganjurkan ibu untuk mendengarkan murrotal Q.S Ar-Rahman/55, untuk menenangkan ibu dan membantu peralihan rasa nyeri

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM
PADA NY “N” DENGAN *POST SECTIO CAESAREA* HARI KE I
DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR
TANGGAL 18 JUNI 2022**

No Register : 109xxx
Tanggal Masuk : 16 Juni 2022 Jam : 15.48 wita
Tanggal Operasi : 17 Juni 2022 Jam : 07.30 wita
Tanggal Pengkajian : 18 Juni 2022 Jam : 11.30 wita
Nama Pengkaji : Nurul Wana

Identitas Istri / Suami

Nama : Ny “N” / Tn”M”
Umur : 27 Tahun / 34 Tahun
Nikah/lamanya : 1x / ± 4 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : S1 / S1
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Sungguminasa

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengeluh masih merasakan nyeri saat ingin bangun dan berdiri
2. Ibu mengatakan infusnya dibuka tadi pagi jam 08.00 wita
3. Ibu mengatakan ASI masih sedikit, tapi tetap menyusui bayinya
4. Ibu mengatakan masih melekat obat *durogesic patch* pada bagian dada
5. Ibu mengatakan sudah mandi pagi dan membersihkan dirinya
6. Ibu sudah BAB tapi sedikit
7. Ibu mengatakan telah diberikan terapi obat *dulcolax* melalui anus
8. Ibu merawat bayinya dibantu oleh suami dan keluarga

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran ibu composmentis
3. Ekspresi tersenyum tetapi masih terlihat menahan nyeri
4. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah: 100/70 mmHg
 - b. Nadi : 80x/menit
 - c. Suhu : 36,8°C
 - d. Pernafasan : 20x/menit
5. Tampak *durogesic patch* bersih dan kering melekat pada dada
6. Pengeluaran ASI masih sedikit
7. Tinggi fundus uteri 3 jari dibawah pusat

8. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras
9. Pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau

Assesment (A)

Ny "N", P₂A₁ *Post Sectio Caesarea* Hari I (pertama)

Planning (P)

Tanggal 18 Juni 2022

Jam: 11.35 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami bahwa keadaan ibu dan bayinya baik
 Hasil : Ibu dan keluarga mengerti
2. Mengkaji tingkatan nyeri pada ibu, ekspresi wajah tersenyum tetapi masih terlihat menahan nyeri
 Hasil : Diukur menggunakan visual analogue, nyeri berada pada tingkat 1
3. Memberitahu kepada ibu jika nyerinya dirasakan, lakukan relaksasi nafas dalam
 Hasil : Ibu mengerti
4. Mengingatkan ibu untuk menjaga obat *durogesic patch* yang melekat pada dada (dapat dipakai hingga 72 jam), agar tetap bersih dan kering sampai hari ketiga
 Hasil : Ibu mengerti
5. Mengajarkan kepada ibu untuk melakukan mobilisasi dini dengan membiasakan berjalan sendiri
 Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Menganjurkan untuk makan makanan yang tinggi protein seperti buah (berry, stroberi, anggur dan jeruk), sayuran hijau (bayam), kacang-kacangan, ikan (gabus) atau daging untuk membantu penyembuhan luka

7. Mengapresiasi ibu untuk semangatnya menyusui meskipun ASInya masih sedikit

Hasil : Ibu merasa senang

8. Menganjurkan untuk tetap menyusui bayi, secara bergantian atau on demand. Ibu juga bisa mengkonsumsi kacang-kacangan, sayuran (katuk, selada, bayam, kelor, labu kuning), dan biji-bijian yang bisa menambah produksi ASI

9. Mengajarkan kepada ibu cara perawatan payudara yang bertujuan untuk merangsang produksi ASI

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

10. Memberikan dukungan kepada ibu untuk semangat menyusui. Menjelaskan bahwa hari pertama sampai hari ketiga biasanya ASI memang masih kurang. Kebutuhan makanan bayi juga belum terlalu banyak, sehingga tidak perlu memberikan susu formula atau makanan tambahan sebelum bayi berusia 6 bulan

Hasil : Ibu mengerti

11. Mengajarkan kepada ibu do'a ketika menyusui yaitu *Alladzi kholaqonii fahuwa yahdiin. Walladzi huwa yuth'imunii wa yasqiin. Wa idzaa maridhtu fahuwa yasyfiin*

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

12. Menjelaskan kepada ibu pentingnya personal hygiene. Menjaga kebersihan diri terlebih di sekitar luka bekas operasi , mengganti pembalut setiap 2-4 jam atau jika pembalut sudah penuh dan ibu merasa tidak nyaman

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

13. Mengingatkan kepada ibu jadwal untuk mengkonsumsi obat yang telah diberikan, yaitu *lactamam* 3x1; *ifalmin* 3x2; dan *analtram* 3x1

Hasil : Ibu mengerti

14. Menganjurkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang 1-2 jam dan tidur di malam hari 7-8 jam dan menghindari aktivitas yang berat

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

15. Memberitahu kepada ibu tentang perawatan bayi seperti memandikan, memperhatikan kebersihan, menjemur dan perawatan tali pusat bayi, serta menjaga kehangatan bayi

Hasil : Ibu mengerti

16. Memberitahu kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi: bayi tidak mau menyusu, kejang, demam $>37,5^{\circ}\text{C}$, tali pusat bernanah dan bau, kulit kuning, biru atau pucat. Jika terjadi salah satu dari tanda bahaya, segera bawa bayi ke pusat pelayanan kesehatan terdekat

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

17. Menganjurkan suami atau keluarga untuk membantu ibu atau selalu terlibat dalam merawat bayi agar ibu tidak kelelahan dan berujung stress

Hasil : Suami dan keluarga mengerti

18. Menganjurkan ibu agar senantiasa berdo'a, berdzikir, bersyukur dan selalu berprasangka baik kepada Allah SWT

Hasil : Ibu mengerti

19. Menganjurkan ibu untuk mendengarkan murrotal Q.S Ar-Rahman/55, untuk menenangkan ibu dan membantu peralihan rasa nyeri

Hasil : Ibu mengerti

20. Memberitahu kepada ibu bahwa kunjungan nifas selanjutnya dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022

Hasil : Ibu mengerti dan dengan senang hati untuk bisa bertemu dikunjungi selanjutnya

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM
PADA NY “N” DENGAN *POST SECTIO CAESAREA*
1 MINGGU POSTPARTUM DI RUMAH KLIEN
TANGGAL 24 JUNI 2022**

Tanggal Kunjungan : 24 Juni 2022 Jam : 16.30 wita

Tanggal Pengkajian : 24 Juni 2022 Jam : 16.35 wita

Identitas Istri / Suami

Nama : Ny “N” / Tn”M”
Umur : 27 Tahun / 34 Tahun
Nikah/lamanya : 1x / ± 4 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : S1 / S1
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Sungguminasa

Data Subjektif (S)

1. Ibu sudah tidak merasakan nyeri saat bergerak
2. Ibu telah melakukan kontrol ke klinik dan melepas perban tadi pagi tanggal 24 Juni 2022, jam 11.00 wita

3. Ibu mengatakan luka bekas *sectio caesarea* sudah kering dan tidak ada masalah
4. Ibu mengatakan sudah tidak mengonsumsi obat anti nyeri dari dokter
5. Ibu mengatakan ASInya sudah mulai lancar sejak hari ketiga setelah operasi
6. Ibu mengatakan mengonsumsi vitamin pelancar ASI
7. Ibu mengatakan tali pusat bayinya sudah kering dan terlepas
8. Ibu sudah bergerak dan berjalan sendiri, serta melakukan aktivitas ringan lainnya

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi wajah tampak bahagia
4. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 120/90 mmHg
 - b. Nadi : 86x/menit
 - c. Suhu : 36,6°C
 - d. Pernafasan : 22x/menit
5. Tinggi fundus uteri ibu yaitu pertengahan antara pusat dan symphysis
6. Luka bekas *sectio caesarea* tampak kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi
7. Pengeluaran lochea serosa dengan warna kuning kecoklatan dan tidak berbau

Assesment (A)

Ny "N", P₂A₁ *Post Sectio Caesarea* 1 Minggu Postpartum

Planning (P)

Tanggal: 24 Juni 2022 Jam:16.40 wita

1. Memberikan dukungan dan support kepada ibu agar tetap semangat menjalani tugas barunya sebagai seorang ibu. Segala perubahan fisiologis adalah sesuatu yang wajar dan di syukuri, hal itu sebagai tanda atau kenang-kenangan saat mengandung buah hati.

Hasil : Ibu merasa senang dan bersemangat

2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga bahwa keadaan ibu baik, tanda-tanda vital yaitu tekanan darah: 120/90 mmHg, nadi: 86x/menit, suhu: 36,6°C, pernafasan: 22x/menit.

Hasil : Ibu mengerti

3. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menyusui bayi, secara bergantian atau *on demand*. Ibu juga bisa mengkonsumsi kacang-kacangan, sayuran (katuk, selada, bayam, kelor, labu kuning), dan biji-bijian yang bisa menambah produksi ASI
4. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara yang bertujuan untuk merangsang produksi ASI

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Memberikan dukungan kepada ibu untuk semangat menyusui dan tidak memberikan susu formula atau makanan tambahan hingga bayi berusia 6 bulan

Hasil : Ibu mengerti

6. Meminta kepada ibu menyebutkan do'a ketika menyusui untuk memastikan bahwa ibu masih mengingatnya

Hasil : Ibu masih mengingat do'a ketika menyusui

7. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu menjaga *personal hygiene* terlebih di sekitar luka bekas operasi, mengganti pembalut setiap 2-4 jam atau jika pembalut sudah penuh dan ibu merasa tidak nyaman

Hasil : Ibu mengerti

8. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang 1-2 jam dan tidur di malam hari 7-8 jam perhari dan menghindari aktivitas yang berat

Hasil : Ibu mengerti

9. Mengingatkan kepada ibu untuk memperhatikan kebersihan dan menjaga kehangatan bayi

Hasil : Ibu mengerti

10. Memberitahu kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi: bayi tidak mau menyusu, kejang, demam $>37,5^{\circ}\text{C}$, tali pusat bernanah dan bau, kulit kuning, biru atau pucat. Jika terjadi salah satu dari tanda bahaya, segera bawa bayi ke pusat pelayanan kesehatan terdekat

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

11. Meganjurkan suami atau keluarga untuk membantu ibu atau selalu terlibat dalam merawat bayi agar ibu tidak kelelahan dan berujung stress

Hasil : Suami dan keluarga mengerti

12. Menganjurkan ibu agar senantiasa berdo'a, berdzikir, bersyukur dan selalu berprasangka baik kepada Allah SWT

Hasil : Ibu mengerti

13. Memberitahu kepada ibu bahwa kunjungan nifas selanjutnya dilakukan pada tanggal 02 Juli 2022

Hasil : Ibu mengerti dan dengan senang hati untuk bisa bertemu dikunjungi selanjutnya.



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM
PADA NY “N” DENGAN *POST SECTIO CAESAREA*
2 MINGGU POSTPARTUM DI RUMAH KLIEN
TANGGAL 02 JULI 2022**

Tanggal Kunjungan : 02 Juli 2022 Jam: 10.10 wita
Tanggal Pengkajian : 02 Juli 2022 Jam: 10.15 wita

Identitas Istri / Suami

Nama : Ny “N” / Tn”M”
Umur : 27 Tahun / 34 Tahun
Nikah/lamanya : 1x / ± 4 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : S1 / S1
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Sungguminasa

Data Subjektif (S)

1. Ibu sudah bisa merawat bayinya dan melakukan aktivitas fisik ringan
2. Ibu rutin menyusui bayinya, secara bergantian payudara kanan dan kiri
3. Ibu mengatakan rutin pumping, jika terasa penuh dan agar payudaranya tidak sakit

4. Ibu mengatakan darah yang keluar hanya bercak-bercak
5. Ibu mengatakan tidak ada keluhan selama memakai KB IUD
6. Ibu mengatakan selalu menjaga kebersihan dirinya dengan mengganti pembalut
7. Ibu mengatakan tidak ada masalah untuk BAK dan BAB

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi wajah tampak bahagia
4. Tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 120/80 mmHg
 - b. Nadi : 86x/menit
 - c. Suhu : 36,6°C
 - d. Pernafasan : 22x/menit
5. Tinggi fundus uteri tidak teraba
6. Luka bekas *sectio caesarea* tampak kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi
7. Pengeluaran lochea alba dengan warna putih dan tidak berbau

Assesment (A)

Ny "N", P₂A₁ *Post Sectio Caesarea* 2 Minggu Postpartum

Planning (P)

Tanggal: 02 Juli 2022 Jam: 10.20 wita

1. Memberikan support kepada ibu agar selalu dan tetap semangat menjalani tugas barunya sebagai seorang ibu

Hasil : Ibu merasa senang

2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga bahwa keadaan ibu baik, tanda-tanda vital yaitu Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 86x/menit, suhu 36,6°C , pernafasan 22x/menit

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti

3. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu menjaga *personal hygienenya*

Hasil : Ibu mengerti

4. Memberikan dukungan kepada ibu untuk semangat menyusui dan tidak memberikan susu formula atau makanan tambahan hingga bayi berusia 6 bulan

Hasil : Ibu mengerti

5. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi kacang-kacangan, sayuran (katuk, selada, bayam, kelor, labu kuning), dan biji-bijian yang bisa menambah produksi ASI

6. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang 1-2 jam dan tidur di malam hari 7-8 jam perhari dan menghindari aktivitas yang berat

7. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu memperhatikan kebersihan dan menjaga kehangatan bayi

Hasil : Ibu mengerti

8. Mengingatkan kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi: bayi tidak mau menyusu, kejang, demam $>37,5^{\circ}\text{C}$, tali pusat bernanah dan bau, kulit kuning, biru atau pucat. Jika terjadi salah satu dari tanda bahaya, segera bawa bayi ke pusat pelayanan kesehatan terdekat

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

9. Memberikan informasi kepada ibu tentang kapan bisa mulai melakukan hubungan seksual, yaitu apabila sudah tidak ada lagi darah yang keluar dan jika dimasukkan 2 jari atau lebih ibu tidak merasakan sakit

Hasil : Ibu mengerti

10. Menganjurkan kepada suami atau keluarga untuk membantu ibu atau selalu terlibat dalam merawat bayi agar ibu tidak kelelahan dan berujung stress

Hasil : Suami dan keluarga mengerti

11. Menganjurkan kepada ibu agar senantiasa berdo'a, berdzikir, bersyukur dan selalu berprasangka baik kepada Allah SWT

Hasil : Ibu mengerti

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM
PADA NY “N” DENGAN *POST SECTIO CAESAREA*
6 MINGGU POSTPARTUM DI RUMAH KLIEN
TANGGAL 29 JULI 2022**

Tanggal Kunjungan : 29 Juli 2022 Jam: 12.40 wita
Tanggal Pengkajian : 29 Juli 2022 Jam: 12.45 wita

Identitas Istri / Suami

Nama : Ny “N” / Tn ”M”
Umur : 27 Tahun / 34 Tahun
Nikah/lamanya : 1x / ± 4 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : S1 / S1
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Sungguminasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Data Subjektif (S)

1. Ibu telah kontrol ulang ke klinik untuk memeriksakan KB IUD tanggal 22 Juli 2022
2. Ibu sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tapi menghindari aktivitas yang berat

3. Ibu rutin menyusui bayinya, secara bergantian payudara kanan dan kiri
4. Ibu mengatakan rutin pumping, jika terasa penuh dan agar payudaranya tidak sakit
5. Ibu mengatakan tidak ada keluhan selama memakai KB

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi wajah tampak bahagia
4. Tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 100/80 mmHg
 - b. Nadi : 88x/menit
 - c. Suhu : 36,7°C
 - d. Pernafasan : 24x/menit
5. Luka bekas *sectio caesarea* tampak kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi

Assesment (A)

Ny "N", P₂A₁ *Post Sectio Caesarea* 6 Minggu Postpartum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Planning (P)

Tanggal: 29 Juli 2022 Jam: 12.50 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga, bahwa keadaan ibu baik

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti

2. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menyusui bayi, secara bergantian atau *on demand*. Ibu juga bisa mengkonsumsi kacang-kacangan, sayuran (katuk, selada, bayam, kelor, labu kuning), dan biji-bijian yang bisa menambah produksi ASI

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Memberikan dukungan kepada ibu selalu semangat menyusui, tidak memberikan susu formula atau makanan tambahan hingga bayi berusia 6 bulan

Hasil : Ibu mengerti

4. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Mengingatkan kepada ibu do'a ketika menyusui yaitu *Alladzi kholaqonii fahuwa yahdiin. Walladzi huwa yuth'imunii wa yasqiin. Wa idzaa maridhtu fahuwa yasyfiin*

Hasil : Ibu mengerti dan masih menghafalnya

6. Menganjurkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang 1-2 jam dan tidur di malam hari 7-8 jam perhari dan menghindari aktivitas yang berat


Hasil : Ibu mengerti

7. Menganjurkan kepada suami atau keluarga untuk membantu ibu atau selalu terlibat dalam merawat bayi agar ibu tidak kelelahan dan berujung stress

Hasil : Suami dan keluarga mengerti

8. Menganjurkan kepada ibu agar senantiasa berdo'a, berdzikir, bersyukur dan selalu berprasangka baik kepada Allah SWT

Hasil : Ibu mengerti



Tabel 3.1
Kunjungan Masa Nifas

Kunjungan	Tanggal	Waktu	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
I	17/06/2022 10.30 wita	2 jam <i>post sectio caesarea</i>	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nyeri pada luka bekas operasi <i>sectio caesarea</i> ▪ Sifat nyeri dirasakan menetap pada abdomen diatas simfisis dengan luka bekas <i>sectio caesarea</i> melintang ▪ Pusing saat membuka mata ▪ Ingin mual jika berbicara terlalu lama <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keadaan umum cukup ▪ Ekspresi wajah tampak meringis ▪ Tampak pengeluaran kolostrum ▪ Melekat obat <i>durogesicpatch</i> di dada ▪ Tampak luka bekas operasi <i>sectio caesarea</i> melintang yang dibalut menggunakan kasa steril ▪ Terpasang kateter tetap dan masih memakai popok dewasa ▪ Hb. 10.0 gr/dl 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengobservasi tanda-tanda vital 2. Mengkaji tingkatan nyeri pada ibu 3. Memberitahu cara mengurangi nyeri 4. Menganjurkan untuk melakukan mobilisasi dini dengan menggerakkan tungkai bawah 5. Mengobservasi tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochea 6. Mengobservasi pengeluaran urine 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu, TD:120/70 mmHg, N:80x/i, S:36,2°C, dan P:20x/i 2. Nyeri berada pada tingkat 3 3. Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras, pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau 4. Pengeluaran urine sebanyak ±500 ml
II	17/06/2022 02.30 wita	6 jam <i>post sectio caesarea</i>	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luka bekas operasi <i>sectio caesarea</i> masih terasa nyeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengobservasi tanda-tanda vital 2. Mengkaji tingkatan nyeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu,

			<p>saat bergerak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingin mual jika berbicara terlalu lama ▪ ASInya sedikit <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keadaan umum baik ▪ Ekspresi wajah tampak meringis saat bergerak ▪ Pengeluaran ASI masih sedikit ▪ Tampak luka bekas operasi <i>sectio caesarea</i> melintang yang dibalut menggunakan kasa steril ▪ Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat ▪ Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras ▪ Pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau 	<p>pada ibu</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memberitahu penyebab dan cara mengurangi nyeri 4. Memberitahu kandungan <i>obat durogesic</i> dan jaga agar tetap bersih dan kering hingga hari ketiga 5. Mengajarkan dan menjelaskan manfaat mobilisasi dini, serta tahapannya 6. Mengajarkan minum air putih sedikit jika tidak merasa mual 7. Mengajarkan untuk menyusui bayi dengan posisi <i>cradle</i> (setengah duduk) dan <i>side lying</i> (berbaring miring) 8. Mengajarkan tetap menyusui secara <i>on demand</i> dan mengonsumsi makanan penambah produksi ASI 9. Menjelaskan pentingnya menjaga personal hygiene dan istirahat yang cukup 10. Mengobservasi pemberian cairan <i>Dextrose + Oxytocin 2 ampul</i> 11. Mengobservasi pengeluaran urine 12. Memasukkan <i>Nazovel 100 mg</i> melalui rectum 13. Menjelaskan manfaat dan 	<p>TD:117/72 mmHg, N:80x/i, S:36,7°C, dan P:20x/i</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Nyeri berada pada tingkat 2 3. Ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan 4. Ibu sudah minum air putih sedikit 5. Pengeluaran urine sebanyak ±150 6. Tetesan cairan 28x/menit 7. Telah diberikan <i>Nazovel 100 mg</i>
--	--	--	--	---	---

				<p>jadwal untuk mengkonsumsi obat <i>paracetamol</i> 3x1, <i>lactamam</i> 3x1, <i>ifalmin</i> 3x2, dan <i>maxpofer</i> 1x1</p> <p>14. Anjurkan mendengarkan murrotal QS. Ar-Rahman/55</p>	
III	18/06/2022 11.30 wita	Hari I <i>post sectio caesarea</i>	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nyeri saat ingin bangun dan berdiri ▪ Infus sudah dibuka tadi pagi jam 08.00 wita ▪ ASI masih sedikit, tapi tetap menyusui bayinya ▪ Masih melekat <i>durogesic patch</i> pada dada ▪ Sudah mandi pagi dan BAB ▪ Telah diberikan terapi obat <i>dulcolax</i> melalui anus <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keadaan umum baik ▪ Ekspresi tersenyum, tetapi terlihat menahan nyeri ▪ Tanda-tanda vital TD:100/70 mmHg, N:80x/i, S:36,8°C, dan P:20x/i ▪ ASI masih sedikit ▪ Tinggi fundus uteri 3 jari dibawah pusat ▪ Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras ▪ Pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau 	<p>1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami bahwa keadaan baik</p> <p>2. Mengkaji tingkatan nyeri pada ibu</p> <p>3. Mengingatkan ibu untuk menjaga obat <i>durogesic patch</i> yang melekat pada dada</p> <p>4. Mengajarkan mobilisasi dini dengan membiasakan berjalan sendiri</p> <p>5. Menganjurkan makan makanan yang baik untuk membantu proses penyembuhan luka dan penambah produksi ASI</p> <p>6. Mengajarkan cara perawatan payudara</p> <p>7. Mengajarkan do'a ketika menyusui</p> <p>8. Menjelaskan pentingnya <i>personal hygiene</i></p> <p>9. Mengingatkan untuk mengkonsumsi <i>lactamam</i> 3x1, <i>ifalmin</i> 3x2 dan</p>	<p>1. Ibu dan suami mengerti dengan hasil pemeriksaan</p> <p>2. Nyeri berada pada tingkat 1</p> <p>3. Ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan</p> <p>4. Ibu mengetahui do'a menyusui dan cara perawatan payudara</p> <p>5. Suami dan keluarga bersedia terlibat dalam merawat bayi</p>

				<p><i>analtram 3x1</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Memberitahu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi 11. Menganjurkan suami dan keluarga untuk terlibat dalam merawat bayi 	
IV	24/06/2022 16.35 wita	1 Minggu postpartum	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak merasakan nyeri saat bergerak ▪ Telah melakukan kontrol dan lepas perban di klinik tanggal 24 juni 2022, pukul 11.00 wita ▪ Luka bekas <i>sectio caesarea</i> sudah kering dan tidak ada masalah ▪ ASI mulai lancar sejak hari ketiga ▪ Mengonsumsi vitamin pelancar ASI ▪ Tali pusat bayi sudah kering dan terlepas ▪ Bisa melakukan aktifitas ringan <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keadaan umum ibu baik ▪ Ekspresi tampak bahagia ▪ Tanda-tanda vital TD:120/90 mmHg, N:86x/i, S:36,6°C, dan P:22x/i ▪ Tinggi fundus uteri ibu pertengahan pusat dan simfisis ▪ Luka bekas <i>sectio caesarea</i> tampak kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan agar semangat menjalani tugasnya dan tidak cemas akan perubahan fisiologis 2. Menyampaikan hasil pemeriksaan 3. Menganjurkan tetap menyusui secara <i>on demand</i> dan mengonsumsi makanan yang bisa menambah produksi ASI. Dan tidak memberikan susu formula atau makanan tambahan pada bayi 4. Menganjurkan tetap melakukan perawatan payudara 5. Menagajarkan untuk menjaga <i>personal hygiene</i> dan istirahat yang cukup serta menghindari aktivitas berat 6. Mengingatkan untuk memperhatikan kebersihan dan menjaga kehangatan bayi 7. Memberitahu tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu merasa senang dan bersemangat 2. Ibu mengerti dengan hasil pemeriksaan 3. Ibu tetap menyusui secara <i>on demand</i> 4. Ibu istirahat yang cukup dan tidak melakukan aktivitas berat 5. Ibu mengetahui tanda-tanda bahaya pada bayi

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengeluaran lochea serosa dengan warna kuning kecoklatan 	tanda-tanda bahaya pada bayi	
V	02/07/2022 10.15 wita	2 Minggu postpartum	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisa merawat bayinya dan beraktivitas ringan ▪ Rutin menyusui bayinya secara <i>on demand</i> ▪ Rutin pumping, jika payudara terasa penuh agar tidak sakit ▪ Darah yang keluar hanya bercak-bercak ▪ Tidak ada keluhan selama memakai KB IUD ▪ BAK dan BAB tidak ada masalah <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keadaan umum ibu baik ▪ Tanda-tanda vital TD:120/90 mmHg, N:86x/i, S:36,6°C, dan P:22x/i ▪ Tinggi fundus uteri tidak teraba ▪ Luka bekas <i>sectio caesarea</i> tampak kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi ▪ Pengeluaran lochea alba dengan warna putih dan tidak berbau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil pemeriksaan 2. Mengingatkan selalu menjaga <i>personal hygiene</i>, dan istirahat yang cukup serta menghindari aktivitas berat 3. Memberikan dukungan menyusui dan tidak memberikan susu formula atau makanan tambahan hingga bayi berusia 6 bulan 4. Mengingatkan untuk memperhatikan kebersihan dan menjaga kehangatan bayi 5. Mengajukan istirahat yang cukup dan menghindari aktivitas yang berat 6. Memberikan informasi kapan bisa mulai melakukan hubungan seksual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengerti dengan hasil pemeriksaan 2. Ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan 3. Ibu istirahat yang cukup dan tidak melakukan aktivitas berat 4. Ibu mengetahui kapan bisa melakukan hubungan seksual
VI	29/07/2022	6 Minggu postpartum	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah kontrol ulang ke klinik untuk memeriksakan KB IUD tanggal 22 Juli 2022 ▪ Bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tapi menghindari aktivitas yang berat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil pemeriksaan 2. Memberikan dukungan kepada ibu selalu semangat menyusui, tidak memberikan susu formula atau makanan tambahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu dan keluarga mengerti dengan hasil pemeriksaan 2. Ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rutin menyusui bayinya, secara bergantian payudara kanan dan kiri ▪ Rutin pumping, jika terasa penuh dan agar payudaranya tidak sakit ▪ Tidak ada keluhan selama memakai KB <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keadaan umum ibu baik ▪ Tanda-tanda vital TD:100/80 mmHg, N:88x/i, S:36,7°C, dan P:24x/i ▪ Luka bekas <i>sectio caesarea</i> tampak kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi 	<p>hingga bayi berusia 6 bulan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara 4. Mengingatkan kepada ibu do'a ketika menyusui 5. Menganjurkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup dan menghindari aktivitas yang berat 6. Menganjurkan kepada ibu agar senantiasa berdo'a, berdzikir, bersyukur dan selalu berprasangka baik kepada Allah SWT 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ibu semangat ingin memberikan ASI Eksklusif 4. Ibu tetap melakukan perawatan payudara 5. Ibu masih menghafal do'a ketika menyusui 6. Ibu istirahat yang cukup dan tidak melakukan aktivitas berat
--	--	--	---	---

Sumber : Data Primer

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kesenjangan antara konsep kasus dan teori dasar pada implementasian asuhan kebidanan pada Ny ‘N” dengan Nyeri Luka Jahitan *Post Sectio Caesarea* di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar tanggal 17 Juni – 29 Juli 2022

Untuk memudahkan dan menguraikan kesenjangan antara teori dan studi kasus, maka penulis menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari 7 langkah varney dan soap sebagai berikut:

Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Pada langkah ini, kita harus mengumpulkan data atau semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi ibu. Untuk memperoleh data bisa kita lakukan dengan cara anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan, pemerikan penunjang (Tajmiati, Atik, dkk, 2016).

Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang penulis temukan pada kasus Ny “N” umur 27 tahun P₁A, *post sectio caesarea* 2 jam lalu di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar pada tanggal 29 Juni 2022 dengan riwayat *post sectio caesarea*. Ibu mengatakan mulai merasakan nyeri pada luka jahitan *sectio caesarea*, sifat nyeri yang dirasakan menetap pada abdomen di atas simfisis dengan luka bekas operasi

sectio caesarea memanjang kesamping, ibu merasa pusing ketika membuka mata dan ingin mual jika diajak berbicara terlalu lama.

Ibu mengatakan ini kehamilan ketiga dan satu kali keguguran. Ibu tidak pernah menderita penyakit jantung, hipertensi, asma, diabetes melitus dan penyakit serius lainnya. Ibu tidak pernah menderita penyakit hepatitis, TB, HIV/AIDS, atau penyakit menular lainnya. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit turunan keluarga. Ibu memiliki riwayat operasi *sectio caesarea* sebelumnya. Ibu tidak memiliki riwayat ketergantungan obat-obatan, alkohol, serta tidak ada riwayat alergi. Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB sebelumnya, tapi sekarang ibu memakai KB IUD/Spiral.

Akbar, 2014 dalam Anggiana, (2021:3) mengatakan bahwa sebagian besar pasien dengan *post sectio caesarea* mengalami intensitas nyeri dari ringan hingga berat, proses melahirkan dengan *sectio caesarea* mempunyai nyeri lebih tinggi sekitar 27,3% dibandingkan dengan proses melahirkan normal yang hanya sekitar 9%. Rasa nyeri meningkat pada hari pertama *post sectio caesarea*. Masadah, dkk (2010:67) Nyeri diuraikan menjadi empat. Nilai 0 bagi yang tidak nyeri, nilai 1-4 bagi nyeri ringan, nilai 5-7 bagi nyeri sedang, dan nilai 8-10 bagi yang nyeri hebat.

Berdasarkan data yang diambil dari RSIA Khadijah 1 Makassar, pada tahun 2017 ibu melahirkan normal sekitar 51% dan ibu *post sectio* sekitar 49% kasus, tahun 2018 ibu melahirkan normal sekitar 51% dan ibu *post sectio* sekitar 49% kasus, tahun 2019 ibu melahirkan normal sekitar 54% dan ibu *post sectio* sekitar

46% kasus, tahun 2020 ibu melahirkan normal sekitar 58% dan ibu *post sectio* sekitar 42% kasus, tahun 2021 ibu melahirkan normal sekitar 53% dan ibu *post sectio* sekitar 47% kasus.

Pada kunjungan pertama yang dilakukan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar didapatkan hasil pemeriksaan dengan keluhan nyeri pada luka bekas operasi *sectio caesarea*, nyeri dirasakan menetap pada abdomen diatas simfisis dengan luka bekas operasi *sectio caesarea* melintang, merasa pusing ketika membuka mata, ingin mual ketika diajak berbicara terlalu lama, keadaan umum ibu cukup, tampak ekspresi meringis ketika bergerak, tampak pengeluaran kolostrum, tampak luka bekas operasi *sectio caesarea* melintang yang dibalut menggunakan kasa steril, terpasang kateter tetap dan masih memakai popok dewasa, pemeriksaan laboratorium 2 jam *post sectio caesarea* tanggal 17 Juni 2022 Hb: 10.0 gr/dl. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan Darah 110/70 mmHg, Nadi 80x/menit, Suhu 36,2°C, Pernafasan 20x/menit. Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras. Pengeluaran lochea rubra tidak berbau.

Pada kunjungan kedua di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar didapatkan hasil pemeriksaan dengan keluhan nyeri pada luka bekas operasi *sectio caesarea* saat bergerak, merasa ingin mual jika terlalu lama berbicara, ibu mengatakan ASI nya masih sedikit. Keadaan umum ibu baik, tampak ekspresi meringis saat bergerak, Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah 117/72 mmHg, Nadi 80x/menit, Suhu 36,7°C dan Pernafasan 20x/menit. Tinggi fundus ueteri 2 jari

dibawah pusat, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras, pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau,

Pada kunjungan ketiga di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar didapatkan hasil pemeriksaan dengan keluhan masih merasakan nyeri saat ingin bangun dan berdiri, infusnya sudah dibuka 24 jam setelah *sectio caesarea*, ibu mengatakan ASInya masih sedikit tapi tetap menyusui bayinya, masih melekat obat *durogesic patch* pada bagian dada, ASI belum ada tapi ibu tetap berusaha menyusui bayi, sudah mandi pagi, membersihkan dirinya, sudah BAB dan telah diberikan obat *dulcolax*. Keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah 100/70 mmHg, Nadi 80x/menit. Suhu 36,8°C dan Pernafasan 20x/menit. Pengeluaran ASI masih sedikit, tinggi fundus uteri 3 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras, terdapat pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau. Tingkat nyeri di ukur menggunakan visual analogue berada pada tingkat 1, yaitu ibu sudah bisa tersenyum tetapi masih terlihat menahan nyeri.

Pada kunjungan keempat di rumah klien, ibu sudah tidak merasakan nyeri saat bergerak, ibu telah melakukan kontrol ulang dan melepas perban di klinik tanggal 22 juni 2022 jam 11.00 wita, luka bekas *sectio caesarea* sudah kering dan tidak ada masalah. ASI mulai lancar sejak hari ketiga setelah *sectio caesarea*. Ibu masih meminum vitamin pelancar ASI dan tidak mengkonsumsi obat anti nyeri. Tali pusat bayi sudah kering dan terlepas, ibu sudah bergerak dan berjalan sendiri, serta melakukan aktivitas ringan lainnya. Keadaan umum baik, ekspresi wajah tampak

bahagia, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah 120/90 mmHg, nadi 86x/menit, suhu 36,6°C dan pernafasan 22x/menit. Tinggi fundus uteri pertengahan antara pusat dan simfisis, pengeluaran lochea serosa dengan warna kuning kecoklatan dan tidak berbau.

Pada kunjungan kelima di rumah klien, ibu sudah tidak merasakan nyeri, sudah bisa merawat bayinya dan melakukan aktivitas fisik ringan, rutin menyusui bayinya secara bergantian payudara kanan dan kiri, rutin pumping, jika terasa penuh dan agar payudaranya tidak sakit, darah yang keluar hanya bercak-bercak, tidak ada keluhan selama memakai KB IUD, selalu menjaga kebersihan dirinya dengan mengganti pembalut, tidak ada masalah untuk BAK dan BAB. Keadaan umum ibu baik, ekspresi wajah tampak bahagia. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah 120/80 mmHg, Nadi 86x/menit, Suhu 36,6°C, dan Pernafasan 22x/menit. Tinggi fundus uteri tidak teraba, luka bekas *sectio caesarea* tampak kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi, pengeluaran lochea alba dengan warna putih dan tidak berbau.

Pada kunjungan keenam di rumah klien, ibu mengatakan telah kontrol ulang memeriksa KB IUD tanggal 22 Juli 2022, sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tapi menghindari aktivitas yang berat, rutin menyusui bayinya secara bergantian payudara kanan dan kiri, rutin pumping, jika terasa penuh dan agar payudaranya tidak sakit, dan tidak ada keluhan selama memakai KB. Keadaan umum ibu baik, ekspresi wajah tampak bahagia. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu

Tekanan darah 100/80 mmHg, Nadi 88x/menit, Suhu 36,7°C, dan Pernafasan 24x/menit, luka bekas *sectio caesarea* tampak kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi.

Berdasarkan hasil uraian yang dijelaskan, ada persamaan antara teori dan gejala dan keluhan pada kasus, penulis tidak menemukan hambatan karena saat pengumpulan data pasien, dokter, dan bidan yang ada di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar bersedia memberikan data atau informasi yang ada hubungannya dengan perawatan yang telah diberikan kepada ibu. Hal ini memudahkan peneliti dan mengumpulkan dan menyusun data.

Dalam konsep dasar yang telah dipaparkan, ditemukan pada studi kasus secara garis besar tidak ada kesenjangan.

Langkah II. Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual

Berdasarkan konsep dan teori dalam penegakkan suatu diagnosa/masalah kebidanan harus berdasarkan pada pendekatan asuhan kebidanan yang didukung dan di tunjang oleh beberapa data subjektif dan data objektif.

Diagnosa aktual yang diidentifikasi pada Ny "N" P₂A₁ dengan *post sectio caesarea* 2 jam postpartum.

Berdasarkan data yang diperoleh masalah aktual ialah ibu dengan nyeri luka pada bekas jahitan *post sectio caesarea* dimana penegakkan diagnosa diperoleh dari data subjektif dimana ibu mengeluh nyeri pada bekas luka jahitan operasinya, nyeri

semakin dirasakan ibu saat bergerak, tetapi ibu sudah bisa menggerakkan tungkai bawahnya. Diperoleh dari data objektif yaitu ekspresi ketika ibu bergerak tampak meringis, luka bekas operasi yang terbalut kasa steril pada perut, juga didapatkan dari hasil mengukur nyeri yang dirasakan dengan visual analogue ialah berada pada tingkat 3 yaitu nyeri sedang.

Pada kasus Ny “N” data yang diperoleh salah satu faktor adanya nyeri karena rangsangan pada ujung-ujung saraf di permukaan kulit. Juga terjadinya kerusakan jaringan secara aktual dan potensial. Intensitas dan kesimpulan tingkat nyeri begitu penting karena hal itu akan menjadi penentu jenis pengobatan yang akan diberikan, terutama pada pemberian terapi farmakologis.

Nyeri menurut *International Association for The Study of Pain (IASP)* ialah suatu pengalaman emosional dan sensorik yang berhubungan dengan kerusakan jaringan secara aktual dan potensial. Konsep lama menjelaskan bahwa proses nyeri hanya bergantung pada jakur nyeri saja dan intensitas nyeri yang timbul hanya dipengaruhi dengan besarnya stimulus yang didapatkan (Nurjannah, dkk, 2020)

Tindakan *post sectio caesarea* meninggalkan sayatan pada kulit abdomen yang menyebabkan terputusnya jaringan yang telah di insisi. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya zat kimia, kemudian dibawa oleh serabut delta A dan C yang mempunyai peran membawa transmisi nyeri dari medula spinalis menuju

thalamus. Otak akan mempersiapkan nyeri yang membuat pasien merasakan nyeri pada daerah insisi saat efek anestesi sudah hilang (Nadyah, 2013).

Berdasarkan data yang terkumpul dari pengkajian terdapat ada persamaan dalam diagnosa aktual yaitu ibu merasakan nyeri pada luka bekas jahitan *post sectio caesarae*. Hal penguat penegakkan diagnosa ibu merasakan nyeri yaitu ekspresi wajah ibu yang meringis dan adanya luka bekas jahitan *sectio caesarae* yang menjadi tanda akan adanya jaringan yang sebelumnya terikat menjadi putus. Berdasarkan data tersebut ditarik benang merah bahwa terdapat persamaan antara teori dan tidak ada kesenjangan dengan diagnosis aktual yang ditegakkan sehingga memudahkan perumusan tindakan selanjutnya.

Langkah III. Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial

Dalam menegakkan masalah potensial, bidan diharuskan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah potensial. Di langkah ini penulis mengidentifikasi diagnosa potensial atau masalah potensial.

Langkah ini bidan dituntut agar bisa mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial yang mungkin saja terjadi, tetapi juga menyiapkan tindakan untuk mengantisipasi atau menangani agar masalah potensial tidak terjadi (Tajmiati, Atik, dkk, 2016).

Masalah potensial yang mungkin terjadi pada kasus ibu nifas dengan nyeri luka jahitan *post sectio caesarea* ialah infeksi luka jahitan, sub involusio uteri, syok, infeksi saluran kemih, dan terbukanya luka operasi eviserasi.

Kulit merupakan bagian yang bisa menjaga tubuh dari kuman. Jaringan kulit adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kulit, kalau jaringan pada kulit rusak maka memungkinkan atau memberikan jalan untuk kuman bisa masuk ke dalam tubuh sehingga terjadi infeksi (Hidayat dalam Utami, 2015:7).

Insisi pada proses pembedahan *sectio caesarea* mengakibatkan perubahan fisik pada ibu bersalin dengan proses *sectio caesarea* berbeda dengan ibu bersalin dengan proses pervaginam. Perbedaan ini terjadi pada involusi uterus menjadi lebih lama dibandingkan dengan ibu bersalin dengan proses pervaginam, selain itu nyeri di dominasi pada bagian abdomen yang telah dibedah serta gas yang terdapat pada usus halus (Jhonson dalam Utami, 2015:7).

Syok ialah kondisi dimana tanda-tanda vital, nadi dan pernafasan mengalami peningkatan, tekanan darah menurun, oliguria, penderita gelisah, ekkstremitas dan muka dingin, serta warna kulit ke abu-abuan. Syok terjadi karena hemoragi yang terjadi pada 24 jam pertama pascabedah, sepsis, neurogenik dan kardiogenik (Nurjannah, dkk, 2020).

Infeksi saluran kemih bisa terjadi pada pasien dengan *post sectio caesarea*, terutama pada ibu yang dikateter. Ibu mengalami demam dan merasakan nyeri saat

berkemih, hasil pemeriksaan urine (disekresi melalui kateter) mengandung leukosit didalamnya. Hal ini disimpulkan setelah melihat adanya peningkatan leukosit esterase (Nurjannah, dkk, 2020).

Jahitan pada luka bekas *sectio caesarea* bisa terbuka karena beberapa faktor, diantaranya : luka dijahit tidak sempurna, distensi perut, batuk atau muntah keras, dan bisa berujung infeksi (Nurjannah, dkk, 2020).

Jika nyeri luka jahitan *post sectio caesarea* tidak ditangani dengan baik maka akan kemungkinan masalah potensial yang terjadi yaitu infeksi luka jahitan.

Langkah IV. Tindakan Segera/Kolaborasi/Rujukan

Adanya tindakan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk pemberian terapi farmakologis. Pada langkah ini bidan akan mengidentifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn atau dokter umum atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien (Tajmiati, dkk, 2016)

Tindakan ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera/kolaborasi/rujukan pada Ny "N" dengan *post sectio caesarea*.

Langkah V. Rencana Tindakan

Perencanaan

Pentalaksanaan awal yang dilakukan yaitu mengukur tingkat nyeri yang dirasakan ibu kemudian menyusun tindakan untuk menangani atau mengurangi kadar

nyeri yang dirasakan. Menganjurkan kepada ibu untuk relaksasi dan mobilisasi dini dimulai dengan menggerakkan tungkai bawahnya, menganjurkan ibu untuk makan makanan yang tinggi protein seperti buah (berry, stroberi, anggur dan jeruk), sayuran hijau (bayam), kacang-kacangan, ikan (gabus) atau daging untuk membantu penyembuhan luka, istirahat yang cukup, mengkonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter, dan mendengarkan murrotal QS. Ar-Rahman.

Pada kunjungan pertama yang diberikan pada Ny “N” di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar ialah ucapkan selamat kepada ibu atas kelahiran bayinya, ciptakan hubungan baik dengan ibu, juga sebagai apresiasi untuk ibu. Observasi tanda-tanda vital, kaji tingkatan nyeri ekspresi wajah tampak meringis, beritahu cara mengurangi nyeri ringan dengan teknik relaksasi, anjurkan mobilisasi dini seperti menggerakkan tungkai bawah, observasi tinggi fundus uteri dan kontraksi uterus, observasi cairan infus 28tetes/menit, observasi pengeluaran urine, anjurkan agar senantiasa berdo’a, berdzikir, bersyukur dan berprasangka baik kepada Allah SWT, serta anjurkan untuk mendengarkan murrotal Q.S Ar-Rahman/55.

Pemantauan harus tetap dilakukan pada Ny “N” untuk memastikan konseling dan terapi yang diberikan benar dan sesuai dengan anjuran dokter/bidan.

Pada kunjungan kedua di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar menyusun tindakan yang akan dilakukan pada Ny “N” yaitu observasi tanda-tanda vital, kaji tingkatan nyeri ekspresi wajah tampak meringis, jelaskan penyebab nyeri, beritahu

cara mengurangi nyeri ringan, beritahu kandungan dan anjurkan agar menjaga obat *durogesic patch* yang melekat pada dada agar tetap bersih dan kering, anjurkan mobilisasi dini, jelaskan manfaat mobilisasi dini, anjurkan minum air putih sedikit demi sedikit jika merasa tidak terlalu mual, anjurkan makan makanan tinggi protein yang bagus untuk membantu proses penyembuhan luka, ajarkan cara menyusui bayi dengan posisi *cradle* (setengah duduk dan *side lying* (berbaring miring), anjurkan tetap menyusui bayi secara bergantian atau *on demand*, berikan dukungan semangat menyusui dan tidak memberikan susu formula kepada bayi, jelaskan penyebab keluarnya darah dari jalan lahir, jelaskan pentingnya *personal hygiene*, observasi pemberian cairan infus *Dextrose* yang dicampur *Oxytocin* 2 ampul, observasi pengeluaran urine, berikan *Nazovel* 100 mg melalui rectum, lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk pemberian terapi farmakologi, jelaskan manfaat obat dan beritahu jadwal untuk mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter, berikan support untuk semangat menjalani tugas barunya, anjurkan istirahat yang cukup, anjurkan senantiasa berdo'a, berdzikir, bersyukur dan selalu berprasangka baik kepada Allah SWT, dan anjurkan untuk mendengarkan murrotal Q.S Ar-Rahman/55.

Pada kunjungan ketiga di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar menyusun tindakan sampaikan hasil pemeriksaan, kaji tingkatan nyeri, beritahu cara mengurangi nyeri, ingatkan untuk menjaga obat *durogesic patch* agar tetap bersih dan kering, anjurkan mobilisasi dini, anjurkan makan makanan tinggi protein yang

bisa membantu proses penyembuhan luka, apresiasi untuk tetap semangat menyusui, ajarkan perawatan payudara, berikan dukungan semangat menyusui, ajarkan do'a ketika menyusui, jelaskan pentingnya *personal hygiene*, ingatkan mengkonsumsi obat yang telah diberikan oleh dokter, anjurkan istirahat yang cukup dan menghindari aktivitas yang berat, beritahu cara perawatan pada bayi, beritahu tanda-tanda bahaya pada bayi, anjurkan suami atau keluarga membantu merawat bayi agar ibu tidak kelelahan dan berujung stress, anjurkan agar senantiasa berdo'a, berdzikir, bersyukur dan selalu mengingat Allah SWT, anjurkan untuk mendengarkan murrotal Q.S Ar-Rahman/55, dan beritahu kunjungan nifas selanjutnya.

Pada kunjungan keempat di rumah klien, menyusun tindakan yaitu dengan berikan dukungan dan support, sampaikan hasil pemeriksaan pada keluarga, anjurkan untuk tetap menyusui secara bergantian atau *on demand* dan mengkonsumsi makanan yang bisa menambah produksi ASI, anjurkan untuk tetap melakukan perawatan payudara, berikan dukungan menyusui dan tidak memberikan susu formula atau makanan tambahan hingga bayi berusia 6 bulan, minta menyebutkan do'a ketika menyusui, anjurkan untuk selalu menjaga *personal hygiene*, anjurkan istirahat yang cukup dan menghindari aktivitas yang berat, ingatkan memperhatikan kebersihan dan menjaga kehangatan bayi, beritahu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi, anjurkan suami atau keluarga untuk membantu merawat bayi agar ibu tidak kelelahan dan berujung stress, anjurkan agar senantiasa berdo'a. berdzikir, bersyukur dan selalu mengingat Allah SWT, beritahu kunjungan nifas selanjutnya.

Pada kunjungan kelima di rumah klien, menyusun tindakan yaitu dengan berikan support dan semangat menyusui, sampaikan hasil pemeriksaan, ingatkan untuk selalu menjaga *personal hygiene*, berikan dukungan semangat menyusui dan tidak memberikan susu formula atau makanan tambahan hingga bayi berusia 6 bulan, anjurkan mengkonsumsi makanan yang bisa menambah produksi ASI, anjurkan istirahat yang cukup dan menghindari aktivitas yang berat, ingatkan selalu menjaga kebersihan dan menjaga kehangatan bayi, beritahu tanda-tanda bahaya pada bayi, berikan informasi kapan bisa melakukan hubungan seksual, anjurkan suami atau keluarga untuk membantu merawat bayi agar ibu tidak kelelahan dan berujung stress, anjurkan agar senantiasa berdo'a. berdzikir, bersyukur dan selalu berprasangka baik kepada Allah SWT.

Pada kunjungan keenam di rumah klien, menyusun tindakan yaitu dengan sampaikan hasil pemeriksaan, anjurkan tetap menyusui secara *on demand* dan mengkonsumsi makanan yang bisa menambah produksi ASI, berikan dukungan semangat menyusui, tidak memberikan susu formula atau makanan tambahan hingga bayi berusia 6 bulan, anjurkan untuk tetap melakukan perawatan payudara, ingatkan kepada ibu do'a ketika menyusui, anjurkan untuk istirahat yang cukup dan menghindari aktivitas yang berat anjurkan suami atau keluarga membantu merawat bayi agar ibu tidak kelelahan dan berujung stress, dan anjurkan untuk selalu berdo'a, berdzikir, bersyukur dan selalu berprasangka baik kepada Allah SWT.

ERACS (*Enhanced Recovery After Caesarian Surgery*) merupakan suatu program yang mempercepat proses pemulihan setelah *sectio caesarea*. Beberapa pusat bersalin yang menggunakan ERAS memperlihatkan keunggulan yaitu mengurangi rawat inap di rumah sakit, menurunkan insiden terjadinya komplikasi, serta membantu pengembalian fungsional menjadi lebih cepat (Tika, dkk, 2022).

Dilihat dari data tersebut, tidak ada kesenjangan antara teori dengan tinjauan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus di lapangan.

Langkah VI. Implementasi

Pada langkah ini dilaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan luka jahitan *post sectio caesarea*.

Berdasarkan anamnesa yang dilakukan pada Ny “N” pada pemeriksaan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar diperoleh hasil pemeriksaan keadaan umum baik dengan tanda-tanda vital yaitu dalam batas normal Tekanan darah 120/70 mmHg, Nadi 80x/menit, Suhu 36,2°C, Pernafasan 20x/menit, ekspresi wajah tampak meringis diukur menggunakan visual analogue nyeri berada pada tingkat 3, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras dengan tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat dan pengeluaran lochea rubra, melakukan relaksasi dan mobilisasi dini dengan mengangkat bokong juga tungkai bagian bawah, tetesan cairan infus *Dextrose* 28x/menit, pengeluaran urine dalam *urine bag* yaitu ± 500 ml.

Pada kunjungan kedua di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar didapatkan hasil pemeriksaan keadaan umum baik dengan tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah 117/72 mmHg, Nadi 80x/menit, Suhu 36,7°C, Pernafasan 20x/menit, ekspresi wajah tampak meringis saat bergerak diukur menggunakan visual analogue nyeri berada pada tingkat 2, minum air putih sedikit karena sudah tidak terlalu mual, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar dengan tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat dan pengeluaran lochea rubra tidak berbau, *Nazovel* masuk melalui rectum untuk mengurangi nyeri, ibu bergerak miring kanan dan miring kiri juga mulai belajar duduk ditempat tidur, mengkonsumsi obat *paracteamol* 1, *lactamam* 1, dan *ifalmin* 1.

Pada kunjungan ketiga di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar ialah keadaan ibu dan bayi baik, ekspresi wajah tersenyum tetapi masih terlihat menahan nyeri diukur menggunakan visual analogue nyeri berada pada tingkat 1, ibu memakan buah jeruk, dilakukan perawatan payudara untuk merangsang produksi ASI, ibu memakan kacang goreng untuk menambah produksi ASI, membaca do'a ketika menyusui saat menyusui bayinya, ibu memakai pembalut baru, sudah bisa merawat bayi, terlihat bahagia menjalani hidup barunya sebagai seorang ibu, suami dan keluarga membantu dalam merawat bayi, mendengarkan Q.S Ar-Rahman/55 sesuai yang dianjurkan.

Pada kunjungan keempat di rumah klien keadaan ibu dan bayi baik, ibu terlihat semangat dalam merawat bayi, tetap melakukan perawatan payudara, ibu rutin mengkonsumsi kacang-kacangan untuk menambah produksi Asinya, ibu

menghafal do'a ketika menyusui, ibu suka mengkonsumsi buah jeruk dan ikan gabus, kebersihan diri dan bayi ibu terjaga, ibu mendapatkan istirahat yang cukup, ibu menyampaikan sejauh ini Alhamdulillah tidak ada tanda-tanda bahaya pada bayinya, suami dan keluarga membantu ibu dalam merawat bayinya, ibu selalu berdo'a dan berdzikir kepada Allah SWT.

Pada kunjungan kelima di rumah klien ibu terlihat semangat dalam merawat bayi dan percaya diri dengan kondisi tubuhnya yang berubah setelah melahirkan, kebersihan ibu dan bayi terjaga, ibu selalu menyusui bayinya secara *on demand* dan tidak pernah memberikan susu formula atau makanan tambahan, ibu masih mengkonsumsi kacang-kacangan, ibui tidak pernah mengerjakan aktivitas yang berat, suami dan keluarga membantu ibu dalam merawat bayinya, ibu selalu berdo'a dan berdzikir kepada Allah SWT.

Pada kunjungan keenam di rumah klien, hasil pemeriksaan baik, ibu tetap menyusui bayinya secara *on demand*, dan mengkonsumsi makanan yang bisa menambah produksi ASI, ibu tetap melakukan perawatan payudara, ibu selalu berdo'a, berdzikir, bersyukur dan berprasangka baik kepada Allah SWT.

Pada kasus Ny "N" dengan nyeri luka jahitan *post sectio caesarea*, ditegakkan diagnosa berdasarkan anamnesa, pemeriksaan fisik dan observasi. Perencanaan asuhan dan penatalaksanaan.

Langkah VII. Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan dan edukasi yang diberikan kepada ibu, pemenuhan kebutuhan sudah benar atau belum, apakah edukasi sudah jelas dan dimengerti. Perencanaan bisa dianggap efektif jika memang caranya benar dalam pemberian asuhan.

Pada langkah ini dilakukan evaluasi akan keefektifan dari asuhan yang telah diberikan, seperti pemenuhan kebutuhan terhadap bantuan apakah sudah tepat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang sudah diidentifikasi pada langkah sebelumnya di diagnosa dan masalah aktual/potensial. Perencanaan dinilai efektif atau berhasil jika dalam pemberian asuhan dilakukan dengan benar. Langkah-langkah dalam penatalaksanaan biasanya ialah hasil dari pengkajian yang memberikan penjelasan terkait proses pemikiran yang dapat mempengaruhi tindakan juga berorientasi terhadap proses klinis sebab langkag dalam penatalaksanaan tersebut berlangsung di klinik dan keberhasilan bergantung pada klien dan situasi pada klinik. (Tajmiati, dkk, 2016).

Setelah memberikan asuhan, hasil evaluasi yang didapatkan pada pelaksanaan pemberian asuhan 17 – 29 Juli 2022 pada Ny “N” ialah masa nifas yang berlangsung normal, dimana keadaan ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital berada dalam batas normal, tingkat nyeri yang dirasakan ibu berkurang setelah diberikan asuhan teknik relaksasi dan anjuran mobilisasi dini, terapi farmakologi, dan terapi murrotal Q.S Ar-Rahman. Tidak ada tanda-tanda infeksi

pada luka *post sectio caesarea* dan proses involusio uteri berjalan dengan normal ditandai dengan pengeluaran lochea yang sesuai dan tidak berbau. Tetap menyusui bayi dan tidak memberikan susu formula juga makanan tambahan hingga 6 bulan, membaca do'a ketika menyusui, istirahat yang cukup dan menghindari aktivitas berat, makan makanan yang bagus untuk produksi ASI dan penyembuhan luka, kebersihan ibu dan bayi terjaga dengan baik, dan senantiasa berdo'a, berdzikir, bersyukur dan selalu mengingat Allah SWT. Dengan demikian hasil asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny "N" berhasil dengan berkurang dan teratasi nyeri *post sectio caesarea*. Keluhan dan kebutuhan ibu teratasi, maka disimpulkan masa nifas berlangsung normal.

Kasus Ny "N" dilihat pada evaluasi terfokus yaitu penurunan tingkat nyeri yang dirasakan oleh ibu pasca *sectio caesarea* dengan pemberian asuhan teknik relaksasi dan anjuran mobilisasi dini, terapi farmakologi, terapi murrotal Q.S Ar-Rahman serta istirahat yang cukup membuat tingkatan nyeri *post sectio caesarea* yang dirasakan ibu berkurang dan teratasi.

Pendokumentasian

Pendokumentasian pada Ny "N" dimulai saat kunjungan pertama *post sectio caesarea* di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar pada tanggal 17 Juni 2022. Telah dikumpulkan data secara subjektif dan objektif, sesuai dengan data yang merujuk pada diganosa klien. Dari hasil diagnosa aktual dan potensial yang ditegakkan, dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk pemberian terapi

farmakologi baik itu secara oral, intravena, dan rectum. Intervensi yang telah disusun berdasarkan kebutuhan kondisi klien, kemudian di implementasikan sesuai urutannya.

Intervensi mulai disusun saat kunjungan pertama, kunjungan kedua, hingga kunjungan keenam. Dimana terbagi 3 kali kunjungan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar dan 3 kali kunjungan berikutnya di rumah klien. Intervensi yang diberikan dalam pencegahan terjadinya masalah potensial atau komplikasi ialah dengan memantau tanda-tanda vital, menangani nyeri yang dirasakan, menjaga kebersihan luka bekas operasi, kontraksi uterus serta pengeluaran lochea. Evaluasi dilakukan saat kunjungan pertama sampai kunjungan keenam, dengan menanyakan tingkatan nyeri, kondisi luka bekas *sectio caesarea*, dan pengeluaran lochea.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan asuhan kebidanan yang telah dilakukan dan pembahasan asuhan kebidanan ibu postpartum pada Ny “N” dengan luka jahitan *post sectio caesarea* di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar menggunakan metode 7 langkah Varney. Dimana awali dengan pengumpulan data awal hingga evaluasi, penulis bisa membuat kesimpulan

1. Pengkajian dilakukan dengan mengumpulkan semua data melalui anamnesa, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Data yang didapatkan pada data subjektif khususnya keluhan utama ialah ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi *sectio caesarea* hingga pemeriksaan terakhir ibu sudah tidak lagi merasakan nyeri. Data objektif yang didapatkan keadaan umum cukup, tampak ekspresi meringis, pengeluaran lochea rubra hingga pemeriksaan terakhir keadaan umum baik, ekspresi wajah tampak bahagia, tidak ada tanda-tanda infeksi luka jahitan dan pengeluaran lochea alba.
2. Identifikasi diagnosa / masalah aktual telah diimplementasikan dengan mengumpulkan data subjektif dan objektif sehingga ditegakkan diagnosa kebidanan pada Ny “N” dengan *post sectio caesarea*.

3. Identifikasi diagnosa / masalah potensial telah diimplementasikan pada Ny “N” dengan *post sectio caesarea* ialah infeksi luka jahitan, sub involusio uteri, syok, infeksi saluran kemih, dan terbukanya luka operasi eviserasi.
4. Tindakan segera / kolaborasi / rujukan telah diidentifikasi pada Ny “N” dengan *post sectio caesarea*, tidak ada data yang menunjang..
5. Rencana tindakan yang telah disusun pada Ny “N” dengan *post sectio caesarea* berdasarkan identifikasi diagnosa / masalah aktual dan potensial yang bisa terjadi.
6. Implementasi yang telah dilakukan pada Ny “N” dengan *post sectio caesarea* semua rencana tindakan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.
7. Evaluasi pada Ny “N” dengan *post sectio caesarea* dengan asuhan yang telah diimplementasikan berhasil, dilihat dari tingkatan nyeri berkurang, tidak ada tanda-tanda infeksi luka jahitan dan involusio uteri baik.

B. Saran

1. Bidan

Diharapkan dapat berperan dalam menurunkan angka kejadian *sectio caesarea* dengan memberikan dan memperhatikan keadaan ibu saat konseling antenatal care. Selain untuk mempersiapkan persalinan, juga memikirkan masalah yang mungkin akan terjadi. Menciptakan suasana konseling yang nyaman melalui komunikasi yang baik antara bidan, dokter maupun pasien.

2. Rumah sakit

Pelayanan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar sangat baik dan memuaskan. Tetapi disarankan untuk memperhatikan pasien setelah operasi sampai 2 jam postpartum. Kadar nyeri yang mungkin di artikan sebagai hal wajar pada pasien *post sectio caesarea* akan menjadi komplikasi jika tidak dipantau dengan baik.

3. Untuk Institusi

Penulis berharap hasil penelitian ini bisa menjadi sumber referensi atau jembatan untuk mahasiswa lain mengetahui lebih jauh tentang *post sectio caesarea*, tingkatan nyeri dan juga penanganannya.

4. Untuk pasien

Pasien/klien diharapkan bisa lebih mencari tahu tentang pentingnya ASI eksklusif, makanan yang baik dan makanan yang harus dihindari pada kasus *sectio caesarea*, perawatan diri, perawatan pada bayi, dan terkhusus perawatan luka *post sectio caesarea*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementrian Agama RI. 2019
- Anggiana, Novischa Dwi dan Innez Karunia Mustikarani. (2021). *Asuhan Keperawatan Pasien Post Partum Post Operasi Sectio Caesarea Hari Ke 0-3 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Nyaman : Nyeri*. Program Studi Keperawatan Program Diploma Tiga Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta.
- Astui, Eny & Herisa Dinarsi. (2022). *Analisis Porses Involusio Uterus Pada Ibu Post Partum Hari Ke Tiga Di Praktik Bidan Mandiri Lystiani Gresik*. Stikes William Booth Surabaya. 2022
- Bahren, Raehanul. (2018). *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*. Jakarta. Pustaka Imam Asy – Syafi'i.
- Dube, JV, dkk. (2013). *Effect of Planned Early Ambulation on Selected Postnatal Activity of Postcaesarea Patient*. Jurnal International : PDF.
- Ekasari, Setiyani. (2012). *Nyeri Akut Pada Ny.S dengan Post Sectio Caesarea atas Indikasi Fetal Distress di Ruang Anggrek Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas*. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwekerto.
- Fitrihadi, Dkk. (2018). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas Beserta Daftar Tilik*. Yogyakarta: Unisa.
- Hakim, M Saifuddin dan Sitti Aisyah Ismail. (2020). *Thibbun Nabawi Tinjauan Syari'at dan Medis*. Jakarta : Gema Insani
- Hamdani, M. (2012). *Pendidikan Agama Islam (Islam dalam Kebidanan)*. Jakarta : TIM.
- Hardjan, H. (2016). *Pengaruh Kecemasan pada Kehamilan Primipara Remaja*. Pontianak : Abrori Institute'
- Indriati. (2012). *Paduan Klinis Paling Komplit Kehamila, Persalinan & Perawatan Bayi*. Jakarta : Pelangi Indonesia.

- Kaharuddin, Andi Tihardimanto. (2012) *Sistem Reproduksi Wanita Fisiologi dan Integrasinya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*. Makassar : Alauddin University Press.
- Katmawanti, Septa, dkk. (2021). *Analisis Pengaruh Multifaktor Terhadap Pemberian ASI Eksklusif di Indonesia*. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi. 2021
- Mardhika, Amellia, dkk. (2021). "Asuhan Keperawatan Menyusui Tidak efektif Pada Ibu Post Sectio Caesarea : A Case Report" dalam *Jurnal Surya : Media Komunikasi dan Ilmu Kesehatan*, vol.13, no.02, 2021
- Mardiana & Emi Yunita. (2021). "Gambaran Kejadian Sub Involusi Uteri Pada Ibu Nifas Di POLINDES Bugih II Wilayah Kerja Puskesmas Kowel". *Jurnal SAKTI BIDADARI* vol.IV, no.11, Universitas Islam Madura. 2021
- Maritalia, Dewi. (2014). *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Cet.II. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Marni. (2012). *Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Masadah, dkk. (2020). "*Pengaruh Foot Massage Therapy terhadap Skala Nyeri Ibu Post Op Sectio Caesaria di Ruang Nifas RSUD Kota Mataram*" dalam *Jurnal Keperawatan Terpadu*, vol 2, no.1, Poltekkes Mataram Jurusan Keperawatan.
- Mawarni, Prisca Adhe. (2018). *Penerapan Mobilisasi Dini pada Ibu Post Sectio Caesarea dengan Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas di Bangsal Nusa Indah 2 RSUD Sleman*. Politeknik Kementrian Kesehatan Yogyakarta.
- Nadyah. (2013). *Kegawat Daruratan Neonatal, Anak, dan Maternal*. Cat. Pertama. Makassar : Alauddin University Press.
- Novianti, Rafida. (2013). *Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Care Kepada Ny "R" Dengan Post Sectio Ccaessarea Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018*
- Nurjannah, dkk. (2013). *Asuhan Kebidanan Postpartum di Lengkapi dengan Asuhan Kebidanan Post Sectio Caesarea*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Profil Kesehatan RSIA Khadijah 1 Makassar. (2022). *Angka Kejadian Persalinan Normal dan Persalinan dengan Sectio Caesarea*.
- Putri, Eliza Mutiara. (2019). *Pengaruh Pemberian Terapi Relaksasi Abdominal Breathing Terhadap Nyeri Post Sectio Caesarea Dengan Spinal Anastesi DI*

PKU Muhammadiyah Gamping. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, Jurusan Keperawatan.

- Rahmawati, Primarusi, dkk. (2017). “*Pengaruh Progressive Muscle Relaxation terhadap Kecemasan Ibu Pre Operasi Sectio Caesarea di Ruang Bersalin*” *NurseLine Journal* 2. No.2.
- Safitri, Sindi Resti. (2021). *Proses Asuhan Gizi Terstandar Pada Pasien Post Sectio Caesarea DI RSUD Panembahan Senopati*. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, Jurusan Gizi.
- Sihotang, Hetty Maria dan Hernita Yulianti. (2018). “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Penyembuhan Luka Post Sectio Caesarea*” dalam *Jurnal Care*, vol. 6, pekan baru : Akademi Kebidanan Sempena Negeri.
- Sulfianti, dkk. (2021). *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Sulistiyawati, Ari. (2009). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Tafsir Al-Qur’an Tematik. (2009). *Kesehatan dalam Perspektif Islam*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Tajmiati, Atik, dkk. (2016). *Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan : Konsep Kebidanan Dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*. Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan.
- Tika, Tiara Trias. Dkk. (2022). “*Metode ERACS sebagai Program Perioperatif Pasien Operasi Caesar*” dalam *Jurnal Medika Utama* vol 03 no 02.
- Utami, Sri.(2016). “*Efektivitas Aroma Terapi Bitter Orange Terhadap Nyeri Post Partum Sectio Caesarea*”. *Jurnal Of Public Health*, no.4.
- Utami, Sri. (2015). “*Perbedaan Tingkatan Nyeri pada Ibu Post Partum yang Mengalami Episiotomi dengan Ruptur Spontan di RSUD Panembahan Senopati Bantul*”.
- Utami, WS & Lidya Maryani. (2015). “*Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap Percepatan Proses Pemulihan Sectio Caesarea Pada Ibu Post Partum*”. *Jurnal Ilmu Keperawatan FIKES UNIBBA* vol.III, n0.02. Bandung.

- Viandika, Nurya dan Ratih Mega Septiasari. (2020). “*Pengaruh Continuty Of Care Terhadap Angka Kejadian Sectio Caesarea*” dalam *Journal for Quality in Woman’s Health* 3, no.1, malang : Stikes Widya Cipta Husada.
- Vianti, RA. (2015). *Comorbidity : Apakah Merupakan Faktor Resiko Infeksi Luka Operasi Pasca Seksio Sesarea*. Universitas Pekalongan.
- Widayanti, Wiwin. (2014). *Efektivitas Metode “SPEOS” (Stimulasi Pijat Endorphin, Oksitosin, dan Sugestif) Terhadap Pengeluaran pada Ibu Nifas*.
- Yusron, M. Agus. (2021). *Fikih Interaktif Seri 1 : Diskusi Seputar Fikih Klasik – Kontemporer*. Jakarta.
- Zahroh, Nuursafa Fitriaz. (2021). *Asuhan Keperawatan Pada Ibu Masa Nifas Ny. S Di Wilayah Kerja Puskesmas Playen II*. Poltekkes Yogyakarta.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar
(Sabtu, 18 Juni 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Lampiran 2 Dokumentasi Kunjungan Rumah
(Sabtu, 02 Juli 2022)



Lampiran 2 Dokumentasi Kunjungan Rumah
(Jum'at, 29 Juli 2022)



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

No.D.067/KEPK/FKIK/VI/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : NURUL WANA
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM PADA NY "X" DENGAN LUKA JAHITAN
 POST SECTIO CAESAREA DI RSIA KHADIJAH 1 MAKASSAR TAHUN 2022"**

**"MANAGEMENT OF POSTPARTUM MIDWIFERY CARE FOR MRS. "X" WITH POST SECTIO
 CAESAREA SUTURES AT KHADIJAH 1 HOSPITAL MAKASSAR IN 2022"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
This declaration of ethics applies during the period June 17, 2022 until June 17,2023

June 17, 2022

Professor and Chairperson,



Dr. D. Syarifah, Sp.A., M.Kes

M A K A S S A R

Lampiran 3 Keterangan Layak Etik
 (Jum'at, 17 Juni 2022)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No. 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 3349/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Direktur RSIA Siti Khadijah 1
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2137/Un.06-FKIK/PP.00.9/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: NURUL WANA	
Nomor Pokok	: 70400119024	
Program Studi	: Kebidanan	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)	
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang polong-Gowa PROVINSI SULAWESI SELATAN	

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM PADA NY 'X' DENGAN LUKA JAHITAN
 POST SECTIO CAESAREA DI RSIA KHADIJAH 1 MAKASSAR TAHUN 2022 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Juni s/d 17 Juli 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan Ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 17 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Peringkat,

Lampiran 4 Izin Penelitian PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 (Jum'at, 17 Juni 2022)



**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA)
"SITTI KHADIJAH 1"
MUHAMMADIYAH CABANG MAKASSAR**

Jl. R.A. KARTINI 15 - 17 TELP. (0411) 3624554, 3629243, 3627119, 3614661 FAX. 3627119
MAKASSAR SULAWESI SELATAN 90111 E-Mail : rsia.sitti.khadijah@gmail.com

Nomor: 488 /DiklatRS/IV.6.AUF/1443 /20 22

Lamp :

Hal : Pengambilan Data **Penelitian**
Kepada Yth,
Ka. Bidang/Ka. Bagian/Ka. Instalasi/Ka. Ruang
...PERAWATAN
di-

Makassar, 17 Juni 2022
17 Juni 2022 14:47 H
37 20 UM

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat, Mohon bantuannya untuk memberikan data / informasi yang diperlukan untuk penelitian kepada yang bersangkutan :

Nama : RUPA WANA
No. Telp. : 085 397 874
NIM : 3040019204
Program Studi : PERAWATAN
Institusi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Judul Penelitian : MANAJEMEN ASHARAT PERAWATAN POLIPARTUM PADA NY - X - DEMAM
LEGA DANITAH POST PARTO CAESAREA DI RSIA SITTI KHADIJAH 1
MAKASSAR TAHUN 2022
Tanggal Penelitian : 17 JUNI - 25 JUNI 2022

Demikian, kami sampaikan atas bantuannya diucapkan banyak TERIMA KASIH dengan iringan do'a Jazaakumullahu Khairat Jazaa.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.
Wasalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Diklat,

Hafid Maulana R.

Tembusan :
1. Arsip.

Lampiran 5 Izin Penelitian RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar
(Jum'at, 17 Juni 2022)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Nurul Wana
 Nim : 70400119024
 T.T.L : Makassar, 27 Februari 2001
 Suku : Bugis - Makassar
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Teluk Bayur, Makassar
 Nama Orang Tua :
 a. Ayah : Alm. Tabir Sulaeman
 b. Ibu : Rosmin Tabir

B. Riwayat Pendidikan

SD. Negeri Center Palleko Takalar : 2006-2007
 SD. Negeri Bertingkat Labuang Baji I : 2007-2008
 SD. Inpres Sambung Jawa III Makassar : 2008-2012
 SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara : 2012-2015
 SMA Negeri 6 Takalar : 2015-2018