

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK PARTISI LARUT
n-HEKSAN, TIDAK LARUT n-HEKSAN DAN EKSTRAK
METANOL DAUN SELEDRI (*Apium graveolens L.*)
TERHADAP BAKTERI *Propionibacterium acnes***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi

Pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

NURWAHIDAH

NIM : 70100115056

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurwahidah
NIM : 70100115056
Tempat/Tgl. Lahir : Apoang, 13 November 1996
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumahan Pacciningan Harapan Blok PA 9/9
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Partisi Larut n-Heksan,
Tidak Larut n-Heksan dan Ekstrak Metanol Daun Seledri
(*Apium graveolens L.*) Terhadap Bakteri
Propionibakterium acnes

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 28 Desember 2022

Penyusun



Nurwahidah




NIM: 70100115056

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "*Uji Aktivitas Antibakteri Partisi Ekstrak Larut N-Heksan, Tidak Larut N-Heksan dan Ekstrak Metanol Daun Seledri (Apium graveolens L.) Terhadap Bakteri Propionibacterium acnes*" yang disusun oleh Nurwahidah, NIM: 70100115056, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 28 Desember 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu kesehatan, Jurusan Farmasi.


Gowa, 28 Desember 2022 M
04 Jumadil Akhir 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	()
Sekretaris	: Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si	()
Munaqisy I	: Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si	()
Munaqisy II	: Dr. St. Nasriah, M.Sos.I	()
Pembimbing I	: Apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si	()
Pembimbing II	: Apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si	()

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar




Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 198007012006042002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum.Wr.Wb. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Partisi Larut n-Heksan, Tidak Larut n-Heksan dan Ekstrak Metanol Daun Seledri (*Apium graveolens L.*) Terhadap Bakteri *Propionibakterium acnes*”. Shalawat dan salam juga tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, keluarga, dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di bidang pendidikan Strata 1 (S1). Besar harapan penulis agar skripsi ini menjadi penunjang ilmu pengetahuan ke depannya dan bermanfaat bagi orang banyak.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, atas izin Allah dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagaimana mestinya. Terkhusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan dengan setulus hati kepada Ayahanda Syahbuddin, Ibunda Daliati dan Nenek saya Baharia yang tak henti-hentinya memberi do'a dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materi serta kesabaran, kegigihan dan pengorbanan yang diberikan dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini. Untuk saudara-saudaraku yang tersayang dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak

dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

Melalui kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih pula kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Prof Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I, Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II, Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si., selaku sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan juga
7. Apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., selaku pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya serta memberikan arahan

dalam membimbing penulis dan Apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya serta memberikan arahan dalam membimbing penulis.

8. Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini .
9. Dr. St. Nasriah, M.Sos.I., selaku penguji agama yang telah memberikan arahan dan tuntunan dalam mengoreksi kekurangan skripsi ini.
10. Seluruh dosen, staf, laboran dan keluarga besar Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar, yang telah ikhlas dalam membantu dan memberikan berbagai informasi yang penulis butuhkan demi terselesaikannya skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini mendapat ridha dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan memberi manfaat bagi masyarakat dan penikmat ilmu pengetahuan, khususnya kepada penulis sendiri. *Aamiin ya Rabbal Aalamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, 28 Desember 2022

Penulis



Nurwahidah

NIM: 70100115056

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	3
1. Definisi Operasional	3
2. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Uraian Tanaman	8
B. Uraian Mikroba Uji	14
C. Kulit.....	16
D. Jerawat.....	23
E. Antimikroba.....	29
F. Uji Antimikroba.....	30
G. Ekstraksi	32
H. Partisi	37
I. Tinjauan Islam Tentang Manfaat Tanaman Daun Seledri.....	39
BAB III METODE KERJA	46
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46


B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Alat dan Bahan	46
D. Prosedur Kerja	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian.....	51
B. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	62
KEPUSTAKAAN	63
LAMPIRAN	67
BIOGRAFI PENULIS	88



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori daya hambat bakteri menurut Davie Stout	32
Tabel 2. Hasil ekstraksi daun seledri (<i>Apium graveolens L.</i>).....	51
Tabel 3. Hasil partisi ekstrak daun seledri	51
Tabel 4. Hasil identifikasi golongan senyawa ekstrak metanol daun seledri.....	52
Tabel 5. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak metanol daun seledri	52
Tabel 6. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak larut N-Heksan.....	53
Tabel 7. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak tidak larut N-Heksan.....	54




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Seledri.....	8
Gambar 2. Morfologi Tanaman Seledri	11
Gambar 3. Bakteri Propionibacterium acnes	14
Gambar 4. Struktur Kulit.....	17
Gambar 5. Struktur Kulit epidermis.....	18
Gambar 6. Struktur Kulit dermis.....	19
Gambar 7. Struktur Kulit endodermis.....	20
Gambar 8. Komedo Tertutup	27
Gambar 9. Komedo Terbuka.....	27
Gambar 10. Papula.....	28
Gambar 11. Pustule	28
Gambar 12. Nodula	29
Gambar 13. Sampel Seledri (<i>Apium graveolens</i> L.)	76
Gambar 14. Ekstraksi sampel daun seledri (<i>Apium graveolens</i> L.).....	77
Gambar 15. Penimbangan ekstrak kental daun seledri	78
Gambar 16. Skrining Fitokimia.....	79
Gambar 17. Skrining Fitokimia.....	80
Gambar 18. Pengerjaan Partisi.....	81
Gambar 19. Penyiapan alat dan bahan untuk pengujian aktivitas antimikroba	82
Gambar 20. Penyiapan bahan untuk pengujian aktivitas antimikroba.....	83
Gambar 21. Pembuatan deret konsentrasi ekstrak	84
Gambar 22. Pengerjaan pengujian aktivitas antimikroba	85
Gambar 23. Hasil pengujian aktivitas daya hambat.....	86
Gambar 24. Hasil pengujian aktivitas daya hambat.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian.....	67
Lampiran 2. Skema Kerja Penyiapan Sampel.....	68
Lampiran 3. Skema Kerja Partisi Cair-Padat.....	69
Lampiran 4. Skema kerja Skrining Fitokimia.....	70
Lampiran 5. Skema Kerja Sterilisasi.....	71
Lampiran 6. Skema Kerja Pembuatan Medium.....	72
Lampiran 7. Skema Kerja Pengujian Aktivitas Antimikroba.....	73
Lampiran 8. Gambar Pengamatan.....	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Nurwahidah
NIM : 70100115056
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Partisi Larut n-Heksan, Tidak Larut n-Heksan dan Ekstrak Metanol Daun Seledri (*Apium graveolens L.*) Terhadap Bakteri *Propionibacterium acnes*

Tanaman seledri merupakan tanaman yang sering dikonsumsi sebagai lalapan ataupun penghias hidangan, dan juga dimanfaatkan sebagai obat. Daun seledri memiliki kandungan senyawa flavonoid, saponin dan tanin yang merupakan senyawa yang bersifat antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ekstrak partisi larut n-heksan, tidak larut n-heksan dan ekstrak metanol daun seledri (*Apium graveolens L.*) memiliki aktivitas terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*. Jenis penelitian ini adalah eksperimental kuantitatif dengan metode yang digunakan yaitu Ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol, partisi dengan menggunakan metode cair-padat, pengujian bakteri menggunakan metode difusi agar pada medium GNA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun seledri (*Apium graveolens L.*) mengandung senyawa flavonoid, saponin dan tanin. Pada uji aktivitas antibakteri pada masing-masing ekstrak dengan konsentrasi 25,5%; 22,5%; 17,5%; dan 12,5% diperoleh bahwa ekstrak metanol, ekstrak larut N-Heksan dan ekstrak tidak larut N-Heksan pada konsentrasi 25,5% memberikan efektivitas antibakteri paling besar terhadap pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acne*, dengan nilai diameter rata-rata: ekstrak metanol 21,93 mm kategori sangat kuat, ekstrak larut N-Heksan 11,76 mm kategori kuat, ekstrak tidak larut N-Heksan 10,16 mm kategori kuat.

Dalam Islam, Allah SWT memberikan petunjuk tentang berbagai macam tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat-obatan, salah satunya daun seledri yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri.

Kata kunci: Daun seledri (*Apium graveolens L.*), *Propionibacterium acnes*, antibakteri, partisi cair-padat

ABSTRACT

Name : Nurwahidah
Student Number : 70100115056
Title : Antibacterial Activity Test Partition of Soluble n-Hexane Extract, Insoluble n-Hexane and Celery Leaf (*Apium graveolens L.*) Methanol Extract Against *Propionibacterium acnes* Bacteria

Celery is a plant that is often consumed as fresh vegetables or to decorate dishes, and is also used as medicine. Celery leaf contain flavonoids, saponins and tannins which are compounds that are antibacterial. This study aims to determine whether n-hexane soluble partition extract, n-hexane insoluble and methanol extract of celery leaf (*Apium graveolens L.*) have activity against *Propionibacterium acnes* bacteria. This type of research is a quantitative experimental method used namely extraction by maceration method using methanol solvent, partitioning using the liquid-solid method, testing bacteria using the agar diffusion method on GNA medium.

The results showed that the methanol extract of celery leaf (*Apium graveolens L.*) contained flavonoids, saponins and tannins. In the antibacterial activity test on each extract with a concentration of 25.5%; 22.5%; 17.5%; and 12.5% it was found that methanol extract, N-Hexane soluble extract and N-Hexane insoluble extract at a concentration of 25.5% provided the greatest antibacterial effectiveness against the growth of *Propionibacterium acne* bacteria, with an average diameter value: methanol extract 21, 93 mm category is very strong, 11.76 mm N-Hexane soluble extract is strong category, 10.16 mm N-Hexane insoluble extract is strong category.

In Islam, Allah SWT gives instructions about various kinds of plants that can be used as medicines, one of which is celery leaf which can be used as an antibacterial.

Keywords : Celery leaf (*Apium graveolens L.*), *Propionibacterium acnes*, antibacterial, liquid-solid partition.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kulit merupakan organ terluas penyusun tubuh manusia yang terletak paling luar dan menutupi seluruh permukaan tubuh. Letak paling luar menyebabkan kulit yang pertama kali menerima rangsangan seperti rangsangan sentuhan, rasa sakit, maupun pengaruh buruk dari luar. Hal-hal tersebut menyebabkan kulit rentan terkena penyakit. Salah satu penyakit kulit yang paling sering diderita yaitu penyakit infeksi dan jerawat (Syamsul, 2015).

Jerawat atau *acne vulgaris* adalah reaksi dari penyumbatan pori-pori kulit disertai peradangan yang bermuara pada saluran kelenjar minyak kulit. Sekresi minyak kulit menjadi tersumbat, membesar dan akhirnya mengering menjadi *acne vulgaris* (Zahrah dkk. 2018). Jerawat yang muncul di bagian muka dapat mengakibatkan perubahan wajah, berupa bengkak, kemerahan, bernanah dan menimbulkan rasa sakit (Fitria, 2015). Munculnya jerawat tersebut akan menimbulkan kesan yang kurang menarik dalam penampilan dan mempengaruhi kecantikan seseorang. Prevalensi tertinggi penderita jerawat pada wanita yaitu umur 14 – 17 tahun mencapai 83 – 85 % dan pada pria umur 16 – 19 tahun mencapai 95 – 100 % (Rizqun, 2015).

Acne vulgaris (jerawat) di kawasan Asia Tenggara, terdapat 40-80%, kasus sedangkan di Indonesia menurut catatan studi dermatologi kosmetika Indonesia menunjukkan yaitu 60% penderita *acne vulgaris* pada tahun 2014, 80% pada tahun 2015 dan 90% pada tahun 2016. Prevelansi tertinggi yaitu pada umur 14-17 tahun, dimana pada wanita berkisar 83-85% dan pada pria yaitu pada umur 16-19 tahun berkisar 95- 100% (Afriyanti, 2015). *Propionibacterium acnes* dan *staphylococcus epidermis* adalah mikroba pembentuk nanah yang bertanggung

jawab untuk pengembangan berbagai bentuk, *acne vulgaris*. Meskipun *acne vulgaris* tidak mengancam kehidupan, namun dapat menyebabkan masalah serius dalam kondisi sosial dan psikologis penderita. Hasil penelitian Vilar (2015) yang menunjukkan bahwa dari 317 responden yang memiliki masalah jerawat, 48,6% diantaranya merasa stres, 19,4% takut untuk berfoto, 22% takut bertemu seseorang untuk pertama kali dan 8,5% takut untuk bertemu dengan teman.

Propionibacterium acnes merupakan salah satu bakteri penyebab jerawat yang memiliki peranan penting dalam patogenesis jerawat (Fitria, 2015). Bakteri *Propionibacterium acnes* ini menyebabkan terjadinya inflamasi pada minyak yang terkumpul di kulit.

Pengobatan jerawat biasanya dilakukan dengan pemberian antibiotik dan bahan-bahan kimia seperti sulfur, resorsinol, asam salisilat, benzoil peroksida, asam azelat, tetrasiklin, eritromisin dan klindamisin. Namun obat-obatan tersebut juga memiliki efek samping seperti resistensi terhadap antibiotik dan iritasi kulit. Oleh karena itu perlu dilakukan pencarian antibakteri dari bahan alam yang diketahui aman dibandingkan dengan obat-obat berbahan kimia (Hidayah, 2016).

Kondisi ini yang mendorong untuk dilakukan pengembangan penelitian antibakteri alami terhadap tumbuhan yang ada di Indonesia (*back to nature*), diantaranya adalah tanaman seledri.

Tanaman seledri (*Apium graveolens L.*) banyak tumbuh di Indonesia dan banyak digunakan sebagai penyedap makanan serta dapat digunakan sebagai obat peluruh keringat, penyembuh demam, rematik, sukar tidur dan pertumbuhan rambut (Rukmana, 1995), Tanaman ini juga telah digunakan sebagai antihipertensi. Di Indonesia, daun seledri dimanfaatkan sebagai pelengkap sayuran. Kandungan senyawa seledri adalah flavonoid, saponin, tanin, apiin, minyak atsiri, apigenin, kolin, vitamin A, B, C, zat pahit asparagin, diantara

kandungan yang dimiliki seledri, flavonoid, saponin, dan tanin merupakan senyawa yang bersifat antibakteri (Majidah dkk, 2014).

Sehubungan dengan adanya senyawa-senyawa tersebut dari daun seledri (*Apium graveolens L.*) yang mempunyai daya antibakteri dan dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit, maka hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan uji aktivitas ekstrak daun seledri (*Apium graveolens L.*) terhadap bakteri *Propionibacterium acne*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak partisi larut n-heksan, tidak larut n-heksan dan ekstrak metanol daun seledri (*Apium graveolens L.*) memiliki aktivitas terhadap bakteri *Propionibacterium acnes* ?
2. Berapa konsentrasi optimum ekstrak partisi larut n-heksan, tidak larut n-heksan dan ekstrak metanol daun seledri (*Apium graveolens L.*) yang dapat memberikan aktivitas terhadap bakteri *Propionibacterium acnes* ?
3. Apa saja golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak partisi larut n-heksan, tidak larut n-heksan dan ekstrak metanol daun seledri (*Apium graveolens L.*)?
4. Bagaimana tinjauan Islam tentang pemanfaatan daun seledri sebagai obat?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Antibakteri adalah zat berupa ekstrak daun seledri yang dapat menghambat atau bahkan mematikan bakteri (*Propionibacterium acnes*).
- b. Bakteri *Propionibacterium acnes* adalah bakteri gram positif yang bersifat patogen dimana menjadi pemicu tumbuhnya jerawat pada kulit wajah manusia dan digunakan sebagai bakteri uji pada penelitian ini.

- c. Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang memiliki bentuk yang lebar, tipis majemuk, lancip dan berwarna hijau tua.
- d. Ekstraksi adalah proses penarikan senyawa kimia/zat aktif yang ada pada daun seledri (*Apium graveolens L.*) dengan menggunakan pelarut yang metanol.
- e. Ekstrak daun seledri (*Apium graveolens L.*) adalah sediaan kental dan pekat yang didapatkan dari proses menarik senyawa kimia/zat aktif yang ada pada simplisia daun seledri dengan menggunakan pelarut methanol.
- f. Metanol adalah pelarut yang yang bersifat polar dan digunakan untuk menarik zat aktif yang terkandung dalam daun seledri (*Apium graveolens L.*)
- g. Senyawa kimia/ zat aktif adalah senyawa tertentu yang terdapat dalam tumbuhan dan hewan yang terbukti memberikan efek farmakologis pada tubuh manusia atau hewan dalam dosis tertentu.
- h. Uji aktivitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui dan menelusuri aktivitas dari ekstrak daun seledri sebagai antibakteri terhadap salah satu bakteri penyebab jerawat (*Propionibacterium acnes*).
- i. Partisi adalah proses pemisahan untuk memperoleh komponen zat terlarut dari campurannya dalam ekstrak dengan menggunakan pelarut yang sesuai.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mengkaji bagaimana ekstrak partisi larut n-heksan, tidak larut n-heksan dan ekstrak metanol daun seledri (*Apium graveolens L.*) sebagai antibakteri terhadap jerawat yang disebabkan oleh bakteri *Propionibacterium acnes*.

D. Kajian Pustaka

1. Dalam penelitian Azizah et al., 2020 tentang Uji aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak etanol daun seledri (*Apium graviolens L.*) dan madu hutan terhadap beberapa bakteri penyebab penyakit kulit. Hasil penelitian

menunjukkan daya hambat ekstrak pada konsentrasi 70%:30% pada masing-masing bakteri uji yaitu *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 sebesar 17 mm, *Streptococcus pyogenes* ATCC 19615 sebesar 18,6 mm, *Propionibacterium acnes* ATCC 11827 sebesar 17,9 mm, *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853 sebesar 18,6 mm, *Streptococcus β hemolyticus* ATCC 19615 sebesar 16,15 mm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun seledri dan madu hutan memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri infeksi kulit dalam kategori kuat.

2. Dalam penelitian Fitri et al., 2018 tentang Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol herba seledri (*apium graveolens L.*) terhadap bakteri *Propionibacterium acnes* secara in-vitro hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol herba seledri (*Apium graveolens L.*) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri penyebab jerawat yaitu *Propionibacterium acnes* dengan nilai Konsentarsi Hambat Minimum (KHM) 22,5%. Penentuan kesetaraan aktivitas antibakteri ekstrak etanol herba seledri terhadap klindamisin menunjukkan bahwa 1 gram ekstrak etanol herba seledri setara dengan 0,07 mg klindamisin.
3. Menurut hasil penelitian dari Clements et al., 2020 tentang Formulasi dan uji aktivitas antibakteri krim ekstrak etanol herba seledri (*Apium graveolens L.*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* yang menyimpulkan bahwa ekstrak etanol herba seledri dapat diformulasikan menjadi sediaan krim, memenuhi uji mutu sediaan organoleptik, daya, sebar, daya hambat dan stabilitas namun tidak memenuhi persyaratan untuk uji homogenitas dan uji pH serta mempunyai aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* pada sediaan berkonsentrasi 5% dan 15%.

4. Selain itu dalam penelitian Rosaini et al., 2019 tentang Formulasi, pengujian aktivitas antioksidan dan antibakteri sediaan masker gel *peel off* ekstrak etanol herba seledri (*Apium graveolens L.*) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa : Ekstrak etanol herba seledri (*Apium graveolens L.*) dapat diformulasi dalam sediaan masker gel *peel off*, Hasil evaluasi sifat fisik masker gel *peel off* ekstrak etanol herba seledri (*Apium graveolens L.*) meliputi uji organoleptis, uji pH, uji homogenitas, uji daya sebar, uji cyling test, uji waktu sediaan mengering dan uji iritasi memberikan hasil yang baik dan dapat digunakan sebagai bahan aktif masker anti jerawat dan juga Masker gel *peel off* ekstrak etanol etanol herba seledri (*Apium graveolens L.*) tidak ada menunjukkan aktivitas antioksidan (sangat lemah), sedangkan pada aktivitas antibakteri menunjukkan respon hambatan pertumbuhan yang sedang.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah ekstrak partisi larut N-Heksan, tidak larut N-Heksan dan ekstrak metanol daun seledri (*Apium graveolens L.*) memiliki aktivitas terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*.
- b. Untuk mengetahui berapa konsentrasi optimum ekstrak partisi larut N-Heksan, tidak larut N-Heksan dan ekstrak metanol daun seledri (*Apium graveolens L.*) yang dapat memberikan aktivitas terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*.
- c. Untuk mengetahui apa saja golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak partisi larut N-Heksan, tidak larut N-Heksan dan ekstrak metanol daun seledri (*Apium graveolens L.*)
- d. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Islam tentang pemanfaatan daun seledri sebagai obat?

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan menambah pemahaman ilmu pengetahuan tentang aktivitas antimikroba dari ekstrak partisi larut N-Heksan, tidak larut N-Heksan dan ekstrak metanol daun seledri (*Apium graveolens L.*) terhadap bakteri penyebab jerawat yang nantinya akan memberikan manfaat terhadap pembuatan obat baru.

b. Secara aplikatif

Secara aplikatif hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam usaha mendapatkan sumber obat baru yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan sebagai wujud pemanfaatan sumber daya alam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman



Gambar 1. Seledri (Dwinanda, 2018)

1. Klasifikasi tanaman

Menurut Fizal, 2018 klasifikasi seledri sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Sub Divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Sub kelas : Dialipetalae

Famili : Umbelliferae (Apiaceae)

Genus : *Apium*

Spesies : *Apium graveolens L.*

2. Nama Lokal

Nama lokal : Celery (Inggris), Celeri (Perancis), Seleri (Italia), Selinon, Parsley (Jerman), Han chin, qincai (Cina), celery (Inggris), Phak chee (Turki), Seledri (Indonesia), Sledri (Jawa), Saledri (Sunda), (Savitri, 2008).

3. Deskripsi Tanaman

Seledri (*Apium graveolens L.*) adalah sayuran daun dan tumbuhan obat yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Beberapa Negara termasuk

Jepang, Cina dan Korea mempergunakan bagian tangkai daun sebagai bahan makanan. Di Indonesia tumbuhan ini diperkenalkan oleh Penjajah Belanda dan digunakan daunnya untuk menyedapkan sup atau sebagai lalap. Penggunaan seledri paling lengkap adalah di Eropa: daun, tangkai daun, buah, dan umbinya semua dimanfaatkan (Savitri, 2008).

Seledri (*Apium graveolens* L.) dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun tinggi. Tumbuhan seledri dikategorikan sebagai sayuran, perkebunan seledri di Indonesia terdapat di Brastagi, Sumatera Utara dan di Jawa Barat tersebar di Pacet, Pengalengan dan Cipanas yang berhawa sejuk. Tumbuhan berbonggol dan memiliki batang basah bersusun ini, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dan diantaranya seledri yang umbinya dapat dimakan. Di Indonesia daun seledri dimanfaatkan untuk pelengkap sayuran (misalnya untuk sup). Bagi bangsa Romawi Kuno tumbuhan seledri digunakan sebagai karangan Bunga. Menurut ahli sejarah botani, daun seledri telah dimanfaatkan sebagai sayuran sejak abad XXII atau tahun 1640, dan diakui sebagai tumbuhan berkhasiat obat secara ilmiah baru pada tahun 1942. Pengembangbiakan tanaman seledri dapat digunakan 2 cara, yaitu melalui bijinya atau pemindahan anak rumpunnya (Savitri, 2008).

Seledri dipanen setelah berumur 6 minggu sejak ditanam. Tangkai daun yang agak tua dipotong 1 cm di atas pangkal daun. Daun muda dibiarkan tumbuh untuk dipanen kemudian. Tangkai daunnya yang berdaging dan berair dapat dimakan mentah sebagai lalap, sedangkan daunnya digunakan untuk penyedap sup. Jika seledri ditanam di daerah tropik, ukuran batangnya kurang besar sehingga seluruh bagian tanaman digunakan sebagai sayur. Seledri dapat diperbanyak dengan biji (Savitri, 2008).

4. Morfologi Tanaman Seledri

Tanaman seledri termasuk tanaman dikotil (berkeping dua) dan merupakan tanaman setahun atau dua tahun yang berbentuk rumput atau semak. Tanaman seledri tidak bercabang. Sistem perakaran seledri adalah serabut yang bewarna putih dengan banyak akar yang menyebar kesamping dan dangkal dengan radius sekitar 5 - 9 cm dari pangkal batang sehingga akar dapat menembus tanah sampai kedalaman 30 cm. Batang tanaman seledri sangat pendek sekitar 3 - 5 cm, sehingga seolah olah tidak kelihatan (Haryoto, 2009).


Daun tanaman seledri (*Apium graveolens*L.) merupakan daun majemuk yang berbentuk menjari, melekuk - lekuk dan tidak teratur dengan anak daun 3 - 7 helai, anak daun bertangkai yang panjangnya 1 - 2,7 cm, tangkai daun berwarna hijau keputih - putihan, helaian daun tipis, ujung daun runcing, tepi daun beringgit, panjang kira - kira 2 - 7,5 cm, lebar kira - kira 2 - 5 cm, pertulangan daun menyirip dan daun berwarna hijau muda sampai hijau tua. Seledri juga mempunyai daun yang beraroma harum spesifik (Juarni, 2017).

Batang seledri tidak berkayu, bersegi, beralur, beruas dan bercabang tegak dengan warna hijau pucat. Berbunga majemuk, berbentuk payung dengan tangkai 2 cm berjumlah 8-12, benang sari berjumlah 5, berlepasan, berseling dengan mahkota, ujung runcing, mahkota berbagi 5 dan bagian pangkal berlekatan berwarna putih. Buah kotak berbentuk kerucut dengan panjang 1-1,5 mm, berwarna hijau kekuningan. Berakar tunggang dengan warna putih kotor (Majidah, 2014).

Bunga seledri adalah bunga majemuk berbentuk payung berjumlah 8-12 buah kecil-kecil, yang terkumpul dalam bongkol bertangkai panjang berwarna putih kekuning-kuningan yang tumbuh di pucuk tanaman yang telah tua. Pada setiap ketiak daun dapat tumbuh sekitar 3-8 tangkai bunga, pada ujung tangkai bunga ini membentuk bulatan. Bunga berwarna hijau keputihan, memiliki tangkai

kelopak yang panjangnya 2,5 cm, mahkota berbagi lima. Bagian pangkal berdekatan berwarna putih. Bungan seledri kecil, berwarna putih kehijauan. Walaupun dapat membuah sendiri, menyerbukkan bunga sebagian besar dibantu oleh serangga penyerbuk (Hidayat, 2019).

Buah seledri berbentuk bulatan kecil hijau sebagai buah muda, setelah tua buah berubah warna menjadi coklat muda yang panjang berusuk dan keras. Seledri memiliki buah yang sangat kecil dengan ukuran 1 mm, berdaun buah ganda (skizokarp) yang membelah ketika matang menjadi dua merikarp, berbiji tunggal. Biji berbentuk oval dan sangat kecil, sekitar 2500 biji per gramnya. Tanaman seledri merupakan tanaman penghasil biji terbanyak (Hidayat, 2019). Morfologi tanaman seledri dapat dilihat pada Gambar 2 :



Gambar 2. Morfologi Tanaman Seledri: (a) Akar Seledri: (b) Batang Seledri: (c) Daun Seledri: (d) Bunga Seledri: (e) Biji Seledri (Andrayani, 2020)

Berdasarkan habitus pohonnya seledri dapat dibagi menjadi 3 golongan (Rukmana, 1995) :

a. Seledri daun (*Apium graveolens L. var secalinum Alef*)

Ciri khas seledri ini ialah terletak pada cara panennya, yaitu dicabut batangnya/ dipetik tangkai daunnya.

b. Seledri potongan (*Apium graveolens L. var sylvestre Alef*)

Jenis seledri ini biasa dipanen dengan cara memotong tanaman pada pangkal batangnya.

c. Seledri berumbi (*Apium graveolens L. var rapaceum Alef*)

Seledri ini biasa dipanen hanya daun daunnya saja. Ciri khas seledri berumbi ialah pada bagian pangkal batangnya membengkak merupakan umbi.

5. Syarat Tumbuh Tanaman Seledri

Tanaman seledri merupakan tanaman yang sangat tergantung pada lingkungan. Syarat tumbuh tanaman seledri sebagai berikut ;

a. Iklim

Seledri adalah tanaman setahun atau dua tahun yang berasal dari daerah subtropis. Untuk berkecambah, seledri memerlukan temperatur antara 9 – 20 °C, sedangkan untuk pertumbuhan selanjutnya diperlukan suhu udara 15 - 24 °C. Kelembaban optimum berkisar antara 80 - 90%. Lahan dengan penyinaran cahaya matahari yang cukup. Curah hujan optimum berkisar 60 - 100 mm/bulan karena seledri kurang tahan air hujan.

b. Media tanam

Tanah yang ideal adalah tanah yang subur, gembur, mengandung bahan organik, tata udara dan air baik. Andosol adalah jenis tanah yang sangat direkomendasikan untuk menanam seledri. Kemasaman tanah dengan pH antara 5,5 - 6,5, tidak kekurangan natrium, kalsium dan boron. Kekurangan natrium

menyebabkan tanaman kerdil, kekurangan kalsium menyebabkan kuncup dan pucuk mengering dan kekurangan boron menyebabkan batang dan tangkai daun belah-belah dan retak. Ketinggian tempat tanaman ini sangat baik jika dibudidayakan di dataran tinggi berudara sejuk dengan ketinggian 1.000 - 1.200 m dpl (Andrayani, 2020).

6. Kandungan Kimia dan Khasiat

Herba seledri mengandung flavonoid, saponin, tanin 1%, minyak atsiri 0,033 %, flavo- glukosida (apiin), apigenin, kolin, lipase, asparagine, zat pahit, vitamin (A,B dan C). setiap 100 gr herba seledri mengandung air sebanyak 93 ml, protein 0,9 gr, lemak 0,1 gr, karbohidrat 4 gr, serat 0,9 gr, kalsium 50 mg, besi 1 mg, fosfor 40 mg, yodium 150 mg, kalium 400 mg, magnesium 85 mg, vitamin A 130 IU, vitamin C 15 mg, riboflavin 0,05 mg, tiamin 0,03 dan nikotinamid 0,4 mg. Akar mengandung asparagine, manit, zat pati, lendir, minyak asiri, pentosan, glutamin dan tirosin. Biji mengandung apiin, minyak menguap, apigenin dan alkaloid. Apigenin berkhasiat hipotensif (Savitri, 2008).

Tanaman seledri mengandung flavonoid yang berkhasiat sebagai anti oksidan, apigenin yang berkhasiat sebagai hipotensif, lipase untuk mencerna lemak, dan kandungan mineralnya yang cukup tinggi seperti kalsium, magnesium dan fosfor dapat memperkuat masa tulang.²² Selain itu seledri juga mengandung saponin, tannin 1%, minyak atsiri 0.033%, vitamin (A, B, dan C), kolin, dan zat pahit. Akarnya mengandung asparagin, zat pati, minyak astiri dan tirosin. Sedangkan pada buah seledri mengandung apiin, atsiri, apigenin, dan alcohol (Dwinanda, 2018).

Secara tradisional tanaman seledri digunakan sebagai pemacu enzim pencernaan atau sebagai penambah nafsu makan, peluruhan air kencing, dan penurunan hipertensi. Selain itu juga digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada

reumatik dan gout, dan bisa digunakan sebagai anti kejang. Daun dan batang seledri juga digunakan sebagai sayur dan lalap untuk penyedap makanan (Dwinanda, 2018).

Seledri mengandung gizi cukup tinggi dan lengkap yaitu: setiap 100 gram daun seledri mengandung protein 0,9 gram, lemak 0,1 gram, karbohidrat 4 gram, serat 0,9 gram, kalsium 50 mg, besi 1 mg, fosfor 40 mg, iodium 150 mg, kalium 400 mg, magnesium 85 mg, vitamin A 130 IU, vitamin C 15 mg, riboflavin 0,05 mg, tiamin 0,03 mg, nikotinamid 0,4 mg, senyawa fenol, minyak atsiri, dan saponin. Selain kandungan gizinya cukup tinggi, seledri (*Apium graveolens L.*) juga mengandung zat glukosida, apiol, flavonoid, dan apiin. Zat-zat tersebut bermanfaat sebagai obat peluruh keringat, demam, darah tinggi, rematik dan sukar tidur (Kristiana, 2016)

B. Uraian Mikroba Uji

1. Klasifikasi

Propionibacterium acnes



Gambar 3. Bakteri *Propionibacterium acnes* (Syafitri, 2020)

Domain	: Bacteria
Filum	: Actinobacteria
Kelas	: Actinobacteridae
Ordo	: Actinomycetales
Familia	: Propionibacteriaceae

Genus : *Propionibacterium*

Spesies : *Propionibacterium acnes* (Syamsul, 2015)

2. Sifat dan Morfologi

Propionibacterium acnes adalah termasuk gram-positif berbentuk batang, tidak berspora, tangkai anaerob ditemukan dalam spesimen-spesimen klinis. *Propionibacterium acne* pada umumnya tumbuh sebagai anaerob obligat, bagaimanapun, beberapa strain/jenis adalah aerotoleran, tetapi tetap menunjukkan pertumbuhan lebih baik sebagai anaerob. Bakteri ini mempunyai kemampuan untuk menghasilkan asam propionat, sebagaimana ia mendapatkan namanya (Hidayah, 2016).

Bakteri ini berbentuk batang dengan panjang bervariasi antara 1-1,5 μm , sel tunggal, berpasangan atau rantai pendek dengan konfigurasi yang berbeda-beda, nonmotil, tidak membentuk spora, anaerob tetapi toleran terhadap O_2 , katalase positif, dan dapat menfermentasi glukosa menghasilkan asam propionate dan asetat dalam jumlah yang banyak (Tatang. 2014).

Propionibacterium juga dapat memfermentasi laktosa, sukrosa, fruktosa, galaktosa, dan beberapa pentose, tetapi kemampuan tersebut bergantung dari spesies. Suhu pertumbuhan bakteri ini pada 30-37°C dan beberapa spesies membentuk pigmen. Salah satu spesies dari *Propionibacterium* ini adalah *Propionibacterium acnes* (Tatang. 2014).

Tumbuh pada kondisi anaerob, terdapat pada wajah normal dan mikroflora hidung. Bakteri ini ditemukan pada hampir semua manusia normal. Bakteri yang dapat diisolasi dari permukaan kulit manusia ini tumbuh di kelenjar folikel pilosebacea, namun hanya 17% dari folikel kulit normal manusia yang ditempati oleh propionibakteria (Syamsul. 2015).

Biasanya bakteri *Propionibacterium acnes* ini terdapat pada folikel sebacea. Tidak hanya itu, *Propionibacterium acnes* juga dapat ditemukan pada jaringan manusia, paru-paru, dan jaringan prostat. Kulit merupakan habitat utama dari *Propionibacterium acnes*, namun dapat juga diisolasi dari rongga mulut, saluran pernafasan bagian atas, saluran telinga eksternal, konjungtiva, usus besar, uretra, dan vagina (Tatang. 2014).


Spesies *Propionibacterium acnes* adalah anggota flora normal yang terdapat pada kulit dan menyebabkan penyakit kulit ketika mereka menginfeksi kulit. Hasil metabolitnya termasuk asam propionat, di mana genusnya diturunkan. Pada metode pewarnaan gram, mereka sangat pleomorfik, berbentuk kurva batang atau titik dan terkadang berbentuk bulat. *Propionibacterium acnes* turut berperan dalam terbentuknya jerawat. Karena bagian dari flora normal pada kulit, terkadang *Propionibacterium acnes* mengkontaminasi darah ataupun kultur cairan cerebrospinal yang didapat dengan menembus kulit. Oleh karena itu, penting untuk membedakan kultur yang terkontaminasi dari yang positif dan mengindikasikan adanya infeksi (Armansyah, 2017).

Propionibacterium acnes termasuk bakteri gram positif, pleomorfik, dan bersifat anaerob aerotoleran. *Propionibacterium acnes* memiliki lebar 0,5-0,8 μm dan panjang 3-4 μm , bakteri ini berbentuk batang dengan ujung meruncing atau kokoid (bulat) (Tatang. 2014).

C. Kulit

Kulit merupakan selimut yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus menerus (keratinisasi dan pelepasan sel sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan

a. Epidermis



Gambar 5. Struktur Kulit epidermis (Setiadi, 2007)

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang mempunyai ketebalan bervariasi antara 50 μm - 1,5 mm, tersusun dari 15-25 sel. Epidermis terbentuk dari lima lapisan sel epitelial squamosa, diantaranya yang paling umum adalah keratinosit. Keratinosit adalah sel-sel yang bertanggung jawab untuk pembentukan keratin, protein struktural dari kulit, rambut dan kuku. Sel-sel ini diyakini terlibat dalam proses imun dengan pertama kali melepaskan immunoglobulin A dan kemudian interleukin-1, yang memicu pengaktifan sel-sel T (Isriani, 2013).


Epidermis tersusun atas beberapa lapis sel dengan ketebalan lebih kurang 0,1–0,3 mm. epidermis luar terbagi menjadi 2 lapisan utama: lapisan sel-sel tidak berinti yang bertanduk (stratum korneum atau lapisan tanduk) dan lapisan dalam atau malfighi. Lapisan malfighi terbagi menjadi 1) stratum granulosum, 2) lapisan sel basal, dan 3) stratum spinosum. Lapisan basal adalah bagian yang tidak berdiferensiasi, memperbaharui epidermis.

Lapisan paling luar yang terdiri atas lapisan epitel gepeng. Unsur utamanya adalah sel-sel tanduk (keratinosit) dan sel melanosit. Lapisan epidermis tumbuh terus karena lapisan sel induk yang berada dilapisan bawah bermitosis terus-menerus, sedangkan lapisan paling luar epidermis akan mengelupas dan

gugur. Epidermis dibina oleh sel-sel epidermis terutama serat-serat kalogen dan sedikit serat elastis (Harun, 2014).

Epidermis berfungsi sebagai penghalang terpenting dari hilangnya air, elektrolit, dan atau nutrien tubuh, serta menahan masuknya senyawa asing dari luar. Lapisan epidermis terdiri dari non-viable epidermis dan viable epidermis. Secara anatomi lapisan epidermis terdiri dari 5 lapisan utama yang susunannya lebih dikenal dengan istilah 'strata'. Tersusun dari luar ke dalam berturut-turut; non-viable epidermis yaitu stratum korneum dan viable epidermis yaitu stratum lusidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal (germinativum). Kurang lebih setengah dari keratinosit bergerak dari lapisan sel basal ke atas memulai semua lapisan-lapisan epidermis yang lain. Sambil bergerak melalui lapisan-lapisan, strukturnya berubah dan sel-sel mulai memipih, kehilangan inti, dan akhirnya kering (Isriani, 2013).

b. Dermis



Gambar 6. Struktur Kulit dermis (Setiadi, 2007)


Lapisan ini disebut juga korium, merupakan lapisan kulit yang terletak antara epidermis dan jaringan lemak subkutan. Tebal lapisan sekitar 1-4 mm, tergantung bagian tubuh. Dermis tersusun dari bahan mukopolisakarida. Pada dermis terdapat sel mast dan fibroblast. Sel mast memiliki situs reseptor untuk immunoglobulin E dan mengandung sejumlah senyawa penting, seperti zat yang

bereaksi lambat pada proses anafilaksis, prostaglandin E dan histamin. Fibroblast mensintesis komponen penunjang struktural dari kulit (yaitu: serat-serat elastik, kolagen, dan serat retikulum) (Isriani, 2013).

Dermis mengandung jaringan padat dari serabut protein, seperti kolagen, retikulum, dan elastin yang disimpan dalam kelenjar dasar amorf dari mukopolisakarida. Serat elastik diberi nama demikian karena serat inilah yang memberi sifat elastisitas pada kulit. Komponen utama dari serat ini adalah elastin, suatu protein amorf (Isriani, 2013).

Fungsi dermis ini terutama melindungi tubuh dari luka, menjadikan epidermis lebih fleksibel, penghalang terhadap infeksi dan sebagai organ penyimpan air. Dalam dermis terdapat kapiler darah, ujung-ujung saraf, pembuluh limfa, kelenjar keringat, folikel rambut, dan kelenjar sebacea (Isriani, 2013).

c. Endodermis (Hipodermis; Subkutis)



Gambar 7. Struktur Kulit endodermis (Setiadi, 2007)

Lapisan subkutis terdapat dibawah lapisan dermis yang terdiri dari jaringan ikat yang berisi banyak sel-sel adipose, sel lemak merupakan sel bulat, besar, dengan inti terdesak ke pinggir karena sitoplasma lemak yang bertambah. Sel-sel ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan yang lainnya oleh trabekula yang fibrosa. Fungsi utama lemak subkutis adalah untuk mengatur suhu.

Pada wanita umumnya lemak subkutis lebih besar dari pada pria dan pada anak-anak lebih besar dari pada dewasa (Setiadi, 2007).

Hipodermis adalah lapisan bawah kulit (*fasia superficialis*) yang terdiri atas jaringan pengikat longgar, komponennya serat longgar, elastic, dan sel lemak. Sel-sel lemak membentuk jaringan lemak pada lapisan adipose yang terdapat susunan lapisan subkutan untuk menentukan mobilitas kulit diatasnya, bila terdapat lobules lemak yang merata, hypodermis membentuk bantal lemak yang disebut *pannikulus adipose*. Pada daerah perut, lapisan ini dapat mencapai ketebalan 3 cm. sedangkan pada kelopak mata, penis, dan skortum, lapisan subkutan tidak mengandung lemak. Dalam lapisan hypodermis terdapat anyaman pembuluh arteri, pembuluh vena, dan anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit bawah dermis. Lapisan ini mempunyai ketebalan bervariasi dan mengikat kulit secara longgar terhadap jaringan di bawahnya (Harun, 2014).

2. Fungsi Biologik Kulit

Fungsi biologik kulit ada 5 fungsi yaitu (Hidayah, 2016):

a. Proteksi

Serabut elastis yang terdapat pada dermis serta jaringan lemak subkutan berfungsi mencegah trauma mekanik langsung terhadap interior tubuh. Lapisan tanduk dan mantel lemak kulit menjaga kadar air tubuh dengan cara mencegah masuknya air dari luar tubuh dan mencegah penguapan air, selain itu juga berfungsi sebagai barrier terhadap racun dari luar. Mantel asam kulit dapat mencegah pertumbuhan bakteri di kulit.

b. Termoregulasi

Kulit mengatur temperatur tubuh melalui mekanisme dilatasi dan konstriksi pembuluh kapiler dan melalui perspirasi, yang keduanya dipengaruhi saraf otonom. Pusat pengatur temperatur tubuh di hipotalamus. Pada saat

temperatur badan menurun terjadi vasokonstriksi, sedangkan pada saat temperatur badan meningkat terjadi vasodilatasi untuk meningkatkan pembuangan panas.

c. Persepsi sensoris

Kulit sangat sensitif terhadap rangsangan dari luar berupa tekanan, raba, suhu dan nyeri. Beberapa reseptor pada kulit untuk mendeteksi rangsangan dari luar diantaranya adalah Benda Meissner, Diskus Merckell dan Korpuskulum Golgi sebagai reseptor raba, Korpuskulum Panici sebagai reseptor tekanan, Korpuskulum Ruffini dan Benda Krauss sebagai reseptor suhu dan Nervus End Plate sebagai reseptor nyeri.

d. Absorbsi

Beberapa bahan dapat diabsorbsi kulit masuk ke dalam tubuh melalui dua jalur yaitu melalui epidermis dan melalui kelenjer sebacea dari folikel rambut. Bahan yang mudah larut dalam lemak lebih mudah diabsorbsi dibandingkan bahan yang larut air.

e. Fungsi lain

Kulit dapat menggambarkan status emosional seseorang dengan memerah ataupun memucat. Kulit dapat juga mensintesa vitamin D dengan bantuan sinar ultraviolet.

3. Penyakit dan Kelainan Pada Kulit

Penyakit dan kelainan pada kulit di antaranya adalah (Hidayah, 2016):

a. Jerawat

Jerawat merupakan penyakit kulit yang sudah dikenal secara luas dan sering timbul pada wajah, baik wajah para remaja maupun dewasa. Jerawat terjadi karena adanya peradangan yang disertai penyumbatan pada saluran kelenjar minyak dalam kulit.

b. Infeksi pada kulit

Infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur atau virus ini dapat berupa bisul, cacar air, kusta atau jamur. Umumnya infeksi di sela paha dan telapak kaki.

c. Penuaan dini pada kulit

Penyebabnya demam yang tinggi dan berkepanjangan atau terkena sinar matahari yang terlalu lama.

d. Noda-noda hitam

Kelainan kulit ini disebabkan oleh sinar ultra violet matahari yang memacu pembentukan pigmen warna kulit secara berlebihan. Akibatnya, timbul bercak atau noda hitam pada bagian-bagian kulit yang sering terkena sinar matahari.

D. Jerawat

1. Definisi Jerawat

Jerawat adalah suatu proses peradangan kronik kelenjar-kelenjar pilosebacea yang ditandai dengan adanya komedo, papul, pustul dan nodul. Penyebaran jerawat terdapat pada muka, dada, punggung yang mengandung kelenjar sebasues (Erni, 2018).

Jerawat merupakan peradangan yang disertai dengan penyumbatan saluran kelenjar minyak kulit dan rambut (saluran (pilosebacea). Apabila saluran pilosebacea tersumbat, maka minyak kulit (sebum) tidak dapat keluar dan mengumpul di dalam saluran, saluran menjadi membengkak sehingga terjadi komedo. Komedo merupakan permulaan terbentuknya jerawat, baik komedo terbuka (blackhead) atau komedo tertutup (whitehead) (Erni, 2018).

Acne vulgaris atau jerawat, selanjutnya disebut *acne*, adalah penyakit kulit obstruktif dan infl amatif kronik pada unit pilosebacea yang sering terjadi pada masa remaja. *Acne* sering menjadi tanda pertama pubertas dan dapat terjadi satu

tahun sebelum menarache atau haid pertama. Onset *acne* pada perempuan lebih awal daripada laki-laki karena masa pubertas perempuan umumnya lebih dulu daripada laki-laki. Prevalensi *acne* pada masa remaja cukup tinggi, yaitu berkisar antara 47- 90% selama masa remaja. Perempuan ras Afrika Amerika dan Hispanik memiliki prevalensi *acne* tinggi, yaitu 37% dan 32%, sedangkan perempuan ras Asia 30%, Kaukasia 24%, dan India 23%.⁴ Pada ras Asia, lesi inflamasi lebih sering dibandingkan lesi komedonal, yaitu 20% lesi inflamasi dan 10% lesi komedonal. Tetapi pada ras Kaukasia, *acne* komedonal lebih sering dibandingkan *acne* inflamasi, yaitu 14% *acne* komedonal, 10% *acne* inflamasi (Erni, 2018).

2. Etiologi

Penyebab utama *acne* belum diketahui dengan pasti, tetapi diduga pertumbuhan *acne vulgaris* disebabkan oleh berbagai faktor seperti herediter, endokrin (*androgen, pituitary sebotropic*), faktor makanan (diet), keaktifan dari kelenjar sebacea, faktor psikis / stres, iklim, infeksi bakteri (*Propionibacterium acnes*), kosmetika, dan bahan kimia yang lain (Alexander, 2015). Walaupun banyak literatur yang menyebutkan bahwa terjadinya *acne vulgaris* karena multifaktorial, namun faktor kebersihan tidak dapat dipisahkan pada kejadian *acne vulgaris* (Yeti, 2016).

3. Patogenesis

Patogenesis *acne* meliputi empat faktor, yaitu hiperproliferasi epidermis folikular sehingga terjadi sumbatan folikel, produksi sebum berlebihan, inflamasi, dan aktivitas *Propionibacterium acnes* (*P. acnes*). Androgen berperan penting pada patogenesis *acne* tersebut. *Acne* mulai terjadi saat adrenarke, yaitu saat kelenjar adrenal aktif menghasilkan dehidroepiandrosteron sulfat, prekursor testosterone (Yeti, 2016).

Penderita *acne* memiliki kadar androgen serum dan kadar sebum lebih tinggi dibandingkan dengan orang normal, meskipun kadar androgen serum penderita *acne* masih dalam batas normal. Androgen akan meningkatkan ukuran kelenjar sebacea dan merangsang produksi sebum, selain itu juga merangsang proliferasi keratinosit pada duktus seboglandularis dan akroinfundibulum. Hiperproliferasi epidermis folikular juga diduga akibat penurunan asam linoleat kulit dan peningkatan aktivitas interleukin 1 alfa. Epitel folikel rambut bagian atas, yaitu infundibulum, menjadi hiperkeratotik dan kohesi keratinosit bertambah, sehingga terjadi sumbatan pada muara folikel rambut, selanjutnya di dalam folikel rambut tersebut terjadi akumulasi keratin, sebum, dan bakteri, dan menyebabkan dilatasi folikel rambut bagian atas, membentuk mikrokomedo. Mikrokomedo yang berisi keratin, sebum, dan bakteri, akan membesar dan ruptur. Selanjutnya, isi mikrokomedo yang keluar akan menimbulkan respon inflamasi. Akan tetapi, terdapat bukti bahwa inflamasi dermis telah terjadi mendahului pembentukan komedo (Yeti, 2016).

4. Penyebab Terjadinya Jerawat

Faktor risiko dan penyebab *acne*, antara lain:

a. Sebum

Merupakan faktor utama penyebab timbulnya *acne*. Produksi sebum dipengaruhi oleh diet atau makanan tinggi lemak, karbohidrat, yodium, alkohol dan makanan pedas. Pemakaian kosmetik seperti krim muka, pelembab, sunscreen, minyak rambut juga berperan dalam meningkatkan produksi sebum.

b. Genetik

Faktor herediter yang sangat berpengaruh pada besar dan aktivitas kelenjar glandula sebacea. Apabila kedua orang tua mempunyai parut bekas *acne*, kemungkinan besar anaknya akan menderita *acne*.

c. Usia

Umumnya insiden terjadi pada sekitar umur 14 –17 tahun pada wanita, 16–19 tahun pada pria dan pada masa itu lesi yang predominan adalah komedo dan papul dan jarang terlihat lesi berat pada penderita.

d. Kebersihan wajah

Meningkatkan perilaku kebersihan diri dapat mengurangi kejadian *acne vulgaris* pada remaja (Purnamei, 2017).

e. Psikis

Pada beberapa penderita, stres dan gangguan emosi dapat menyebabkan eksaserbasi *acne*. Stres akan mengakibatkan teraktivasi HPA (Hipotalamus Pituitari Axis). Stresor fisiologis seperti rasa lapar, haus, aktivitas fisik ataupun trauma bersifat umum, mengancam homeostasis dan respon fisiologis yang akan terjadi (termasuk aktivasi HPA) merupakan suatu tindakan untuk mempertahankan atau mengembalikan homeostasis. Stresor psikologis tidak secara langsung mengacaukan homeostasis, ataupun individunya dan respon stres yang terjadi dapat dipelajari. Stresor psikologis menghasilkan perasaan emosional seperti gelisah, takut, marah, frustrasi, depresi, dan sebagainya, dimana timbulnya dan besarnya perasaan tersebut bergantung pada penilaian seseorang terhadap suatu keadaan. Kondisi stres tersebut selain dapat memicu timbulnya *acne vulgaris* juga dapat memperberat kondisi *acne vulgaris* yang sudah ada (Latifah dan Kurniawati, 2015).

5. Jenis-jenis jerawat

Jenis-jenis jerawat terbagi menjadi lima jenis, di antaranya:

a. Komedo tertutup (*white-head*)

Disebut juga komedo putih, kondisi ini terjadi karena pori-pori tersumbat oleh sel-sel kulit mati, keratin, minyak berlebih, dan bakteri. Namun, berbeda

dengan komedo terbuka, komedo putih timbul di bawah permukaan kulit. Inilah yang menyebabkannya disebut komedo tertutup dan warnanya tak berubah menjadi hitam seperti komedo terbuka.



Gambar 8. Komedo Tertutup (Fitratul, 2018)

b. Komedo terbuka (*black-head*)

Blackhead terjadi dikarenakan adanya sumbatan muara kelenjar sebum dan keringat (*apocrine*). Komedo jenis ini tumbuh dipermukaan kulit, dapat terkena udara sehingga warnanya menghitam dan terlihat jelas di kulit. Biasanya muncul di area hidung, dagu, dan pipi.



Gambar 9. Komedo Terbuka (Fitratul, 2018)

c. *Papula*

Jerawat jenis ini merupakan pori-pori yang mengalami iritasi cukup parah sehingga menyebabkan munculnya tonjolan kulit pink kemerahan dan tampak gatal. Biasanya pada *papula* tidak terdapat cairan di dalamnya.



Gambar 10. Papula (Fitratul, 2018)

d. *Pustule*

Merupakan kelanjutan dari papula namun dengan cairan nanah kekuningan di tengahnya. Pustula dapat terjadi ketika papula yang muncul di kulit tidak segera ditangani dan terlanjut terinfeksi kotoran serta debu, sehingga kondisinya makin parah. Nanah pada pustula awalnya berwarna kemerahan, kemudian berubah menjadi kekuningan dan menonjol di permukaan kulit.



Gambar 11. Pustule (Fitratul, 2018)

e. *Nodula/Kista*

Merupakan jerawat yang sudah meradang terlalu parah hingga menyebabkan munculnya tonjolan yang besar serta sangat terlihat di permukaan kulit dan menyebabkan rasa sakit apabila tersentuh. Hal ini terjadi karena peradangan pada pustula terus berlanjut sehingga beberapa unit *pilo-sebaseus* akan berubah menjadi kantong-kantong nanah. Dikenal sebagai bentuk jerawat yang paling parah, ia juga dikenal sebagai *nodular acne*. Bintik nodula adalah benjolan besar, keras dan nyeri yang terbentuk di bawah permukaan kulit. Rasa sakit yang terkait dengan jerawat nodula parah dan hanya perawatan dermatologis yang disarankan. Seiring peradangan menyebar, hal ini menyebabkan kerusakan

pada jaringan kulit yang mengganggu struktur dan produksi kolagen. Kehilangan kolagen dan fibrin menyebabkan kulit meresap, menciptakan bekas pada permukaan luar kulit (Fitratul M, 2018).



Gambar 12. Nodula (Fitratul, 2018)

E. Antimikroba

Mikroba adalah organisme yang berukuran mikroskopis yang di antara lain terdiri dari bakteri, fungi dan virus. Bakteri merupakan mikroba yang prokariotik yang rata-rata selnya berukuran 0,5-1 x 2-5 nm, berbentuk elips, bola, batang dan spiral. Senyawa antimikroba tersebut yang dapat digolongkan sebagai antibakteri atau antifungi (Hidayah, 2016).

1. Pengertian Antimikroba

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obatan yang digunakan untuk membunuh infeksi mikroba pada manusia termasuk diantaranya antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservatif. Antimikroba juga dikatakan sebagai obat pembasmi mikroba, khususnya mikroba yang merugikan manusia. Yang dimaksudkan dengan mikroba terbatas pada jasad renik yang tidak termasuk kelompok parasit. Antimikroba sendiri dapat bersifat sebagai *baktetiostatika* dan *bakteriosida* (Syamsul, 2015).

2. Sifat Antimikroba

- a. Bakteriostatik, yaitu menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme seperti menghentikan pertumbuhan fungi, sitostatika terhadap

kanker. Dalam keadaan seperti ini jumlah mikroorganisme menjadi stasioner, contoh sulfonamida, tetrasiklin, kloramfenikol, dan eritromisin.

- b. Bakteriosid, bersifat membunuh mikroorganisme. Dalam hal ini jumlah mikroorganisme akan berkurang bahkan habis, tidak dapat melakukan multifikasi atau berkembang biak, contohnya penisilin, sefalosporin, dan neomisin (Hidayah, 2016).

3. Prinsip Kerja Antimikroba

Suatu antimikroba memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana obatnya lebih toksik terhadap mikroorganismenya dibandingkan pada sel hospes. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme atau karena obat pada reaksi-reaksi biokimia yang penting dalam sel parasit lebih unggul dari pada pengaruhnya terhadap hospes. Disamping itu struktur sel mikroorganisme berbeda dengan struktur sel manusia (hospes, inang) (Irwan, 2017).

F. Uji Antimikroba

Terdapat bermacam-macam metode uji antimikroba yaitu :

1. Metode difusi

- a. Metode *disc diffusion* (tes Kirby dan Bauer)

Metode ini digunakan untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. Piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan media agar. Cara ini menggunakan kertas saring dengan bentuk dan ukuran tertentu, biasanya berbentuk bulat dengan diameter 0,7–1,0 cm, yang akan dicelup pada larutan sampel dan larutan pendamping. Kertas saring tersebut dikeringkan dan diletakkan diatas media agar yang telah ditanam mikroba uji. Setelah diinkubasi akan terlihat daerah hambatan yang terbentuk.

b. *E-test*

Digunakan untuk mengestimasi MIC (minimum inhibitory concentration) atau KHM (kadar hambat minimum), yaitu konsentrasi minimal suatu agen antimikroba untuk dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

c. *Ditch-plate technique*

Pada metode ini sampel uji berupa agen antimikroba yang diletakkan pada parit yang dibuat dengan cara memotong media Agar dalam cawan petri pada bagian tengah secara membujur dan mikroba uji digoreskan ke arah parit yang berisi agen antimikroba.

d. *Cup-plate technique*

Di mana dibuat sumur pada media Agar yang telah ditanami dengan mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi antimikroba yang akan diuji.

e. *Gradient-plate technique*

Pada metode ini konsentrasi agen antimikroba pada media Agar secara teoritis bervariasi dari 0 hingga maksimal. Media Agar dicairkan dan larutan uji ditambahkan. Campuran medium dituang ke dalam cawan petri dan diletakkan dalam posisi miring. Nutrisi kedua selanjutnya dituang di atasnya.

Plate diinkubasi selama 24 jam untuk memungkinkan agen antimikroba berdifusi dan permukaan media mengering. Mikroba uji digoreskan pada arah mulai dari konsentrasi tinggi ke rendah. Hasil diperhitungkan sebagai panjang total pertumbuhan mikroorganisme maksimum yang mungkin dibandingkan dengan panjang pertumbuhan hasil goresan. Yang perlu diperhatikan adalah hasil perbandingan yang didapat dari lingkungan padat dan cair, faktor difusi agen antimikroba dapat mempengaruhi keseluruhan hasil pada media padat.

2. Metode Dilusi

a. Metode Dilusi Cair

Metode ini mengukur MIC (minimum inhibitory concentration) atau kadar hambat minimum (KHM) dan MBC (minimum bactericidal concentration) atau kadar bunuh minimum (KBM). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan inkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah inkubasi ditetapkan sebagai KBM (Hidayah, 2016).

b. Metode Dilusi Padat

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan media padat (solid). Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji (Hidayah, 2016).

Diameter zona hambat yang terbentuk dapat digolongkan sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori daya hambat bakteri menurut Davie Stout (Fiana dkk, 2020)

Kategori Daya Hambat	Diameter Zona Hambat
Lemah	< 5 mm
Sedang	5-10 mm
Kuat	10-20 mm
Sangat Kuat	>20 mm

G. Ekstraksi

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian

tanaman dan eksudat tanaman, simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh bagian hewan atau zat yang dihasilkan hewan yang masih belum berupa zat kimia murni, sedangkan simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari bumi, baik telah diolah ataupun belum, tidak berupa zat kimia murni (POM, 1979).

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama (Mukhriani, 2014).

Ekstraksi yaitu salah satu teknik pemisahan kimia untuk memisahkan atau menarik satu atau lebih komponen atau senyawa-senyawa dari suatu sampel dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai. Pada ekstraksi ini prinsip pemisahan didasarkan pada kemampuan atau daya larut analit dalam pelarut tertentu. Dengan demikian pelarut yang digunakan harus mampu menarik komponen analit dari sampel secara maksimal (Erni, 2018).

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Ditjen POM, 2020).

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia

yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu (Ditjen POM, 2000).

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya (Mukhriani, 2014):

1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui
2. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme
3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara struktural.

Menurut Ditjen POM (2000), beberapa metode ekstraksi:

1. Cara Dingin

a. Maserasi

Maserasi berasal dari kata “*macerare*” artinya melunakkan. Maserasi merupakan proses penyarian yang sederhana dan banyak digunakan untuk menyari bahan obat yang berupa serbuk simplisia yang halus. Simplisia ini direndam dalam penyari sampai meresap dan melemahkan susunan sel sehingga zat-zatnya akan terlarut, serbuk simplisia yang akan disari ditempatkan pada wadah bejana bermulut besar, ditutup rapat kemudian diaduk berulang-ulang, sehingga memungkinkan pelarut masuk ke seluruh permukaan serbuk simplisia. Maserat adalah hasil penarikan simplisia dengan cara maserasi. Remaserasi merupakan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Ditjen POM, 2000). Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Keuntungan dari metode maserasi yaitu prosedur dan peralatannya sederhana (Insani, 2019).

b. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan sempurna (*Exhaustiva extraction*) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Prinsip perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat seperti berpori. Proses terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetasan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Ditjen POM, 2000).

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Insani, 2019).

2. Cara Panas

a. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Ditjen POM, 2000).

b. Soxhlet

Soxletasi adalah proses pengekstrasian menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat yang disebut soxhlet sehingga terjadi

ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Depkes RI, 2000).

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Ditjen POM, 2000). Caranya, serbuk bahan ditempatkan pada selongsong dengan pembungkus kertas saring, lalu ditempatkan pada alat soxklet yang telah dipasang labu dibawahnya. Tambahkan pelarut sebanyak 2 kali sirkulasi. Pasang pendingin balik, panaskan labu, ekstraksi berlangsung minimal 3 jam dengan interval sirkulasi kira-kira 15 menit (Insani, 2019).

c. Destilasi uap

Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Mukhriani, 2014).

d. Dekoksi

Dekoksi merupakan proses ekstraksi yang mirip dengan infusdasi, hanya saja infus yang dibuat membutuhkan waktu lebih lama (≥ 30 menit) dan suhu pelarut sama dengan titik didih air. Caranya, serbuk bahan ditambah air dengan rasio 1:10, panaskan dalam panci enamel atau panci stainless steel selama 30 menit. Bahan sesekali diaduk. Saring pada kondisi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas sehingga diperoleh volume yang diinginkan (Rahmiani, 2019).

e. Infusdasi

Infusdasi merupakan metode ekstraksi dengan pelarut air. Pada waktu proses infusdasi berlangsung, temperatur pelarut air harus mencapai suhu 90°C selama 15 menit. Rasio berat bahan dan air adalah 1 : 10, artinya jika berat bahan 100 gr maka volume air sebagai pelarut adalah 1000 ml. Cara yang biasa dilakukan adalah serbuk bahan dipanaskan dalam panci dengan air secukupnya selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai 90°C sambil sekali-sekali diaduk. Saring selagi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume yang diinginkan. Apabila bahan mengandung minyak atsiri, penyaringan dilakukan setelah dingin (Rahmiani, 2019).

H. Partisi

1. Definisi Partisi

Partisi adalah proses pemisahan untuk memperoleh komponen zat terlarut dari campurannya dalam padatan dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Dapat juga didefinisikan sebagai dispersi komponen kimia dari ekstrak yang telah dikeringkan dalam suatu pelarut yang sesuai berdasarkan kelarutan dari komponen kimia dan zat-zat yang tidak diinginkan seperti garam-garam tidak dapat larut. Operasi ekstraksi ini dapat dilakukan dengan mengaduk suspensi padatan didalam wadah dengan atau tanpa pemanasan (Insani, 2019).

Partisi merupakan tahap awal pemurnian ekstrak. Partisi menggunakan dua pelarut yang tidak bercampur yang ditambahkan ke dalam ekstrak. Partisi menggunakan dua pelarut tidak bercampur yang kepolarannya meningkat. Partisi biasanya melalui dua tahap yaitu n-heksan untuk menghasilkan senyawa non polar di lapisan organik, air untuk membuat fraksi agak polar dilapisan organik. Partisi dapat memberikan pemisahan yang sangat baik terutama untuk senyawa-senyawa yang memiliki kelarutan yang sangat berbeda (Insani, 2019).

2. Metode Partisi

a. Partisi cair padat

Partisi padat-cair (lactithing) adalah proses pemisahan untuk memperoleh komponen zat terlarut dari campurannya dalam padatan dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Jika suatu cairan ditambahkan ke dalam ekstrak yang telah dilarutkan dalam cairan lain yang tidak tercampur maka akan terbentuk 2 lapisan tersebut (biasanya disebut fase) dan setelah beberapa saat mencapai kesetimbangan konsentrasi dalam dua lapisan (Basir, 2014).

Beberapa fase organik mudah membentuk emulsi dengan fase air, khususnya jika terdapat partikel kecil atau terbentuk oleh pengendapan. Kelarutan senyawa tidak bermuatan dalam satu fase pada suhu tertentu tergantung pada kemiripan kepolarannya dengan fase cair, menggunakan prinsip "like dissolve like". Molekul bermuatan yang memiliki afinitas tinggi terhadap cairan dengan sejumlah besar ion bermuatan berlawanan dan juga dalam kasus ini menarik yang berlawanan misalnya senyawa asam akan lebih larut dalam fase air yang basa daripada yang netral atau asam. Ratio konsentrasi senyawa dalam kedua fase disebut koefisien partisi (K). Senyawa yang berbeda akan mempunyai koefisien partisi yang berbeda, sehingga jika satu senyawa sangat polar, koefisien partisi relatifnya ke fase polar lebih tinggi daripada senyawa nonpolar (Dirjen POM, 1986).

Kebanyakan prosedur ini dilakukan dengan terlebih dahulu menggerus matriks padat hingga diperoleh serbuk yang halus lalu dilanjutkan dengan ekstraksi pelarut, penyaringan, atau sentrifugasi untuk menghilangkan partikulat (Basir, 2014).

b. Partisi cair-cair

Ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan zat terlarut di dalam 2 macam zat pelarut yang tidak saling bercampur atau dengan kata lain perbandingan

konsentrasai zat terlarut dalam pelarut organik dan pelarut air. Ekstaraksi cair-cair biasa juga disebut sebagai metode corong pisah. Jika suatu cairan ditambahkan ke dalam ekstark yang telah dilarutkan dalam cairan lain yang tidak dapat bercampur dengan yang pertama, akan terbentuk dua lapisan. Satu komponen dari campuran akan memiliki kelarutan dalam kedua lapisan. Satu komponen dari campuran akan memiliki kelarutan dalam kedua lapisan tersebut (biasanya disebut fase) dan setelah beberapa waktu dicapai kesetimbangan konsentarsi dalam kedua lapisan. Waktu yang diperlukan untuk tercapainya kesetimbangan biasanya dipersingkat oleh pencampuran keduanya dalam corong pisah (Dirjen POM, 1986).

3. Tujuan Partisi

Partisi cair cair bertujuan untuk memisahkan analit yang dituju dari pengganggu dengan cara melakukan partisi sampel antar 2 pelarut yang tidak saling campur. Salah satu fasenya seringkali berupa air dan fase yang lain adalah pelarut organik. Senyawa-senyawa yang bersifat polar akan ditemukan didalam fase air, sementara senyawa-senyawa yang bersifat hidrofobik akan masuk pada pelarut organik, begitupula dengan ekstraksi padat cair akan tetapi sampel yang digunakan tidak larut air (Insani, 2019).

I. Tinjauan Islam Tentang Manfaat Tanaman Daun Seledri

Ajaran Islam diturunkan ke muka bumi untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, mengatur hubungan hamba dengan penciptanya, Allah Swt. dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling sempurna syariatnya.

Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia, demikian sabda Nabi Muhammad saw. Beragam cara yang digunakan masyarakat untuk berobat, dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan, karena selain

murah efek samping yang ditimbulkan juga sangat jarang. Oleh karena itu, para peneliti mulai bermunculan untuk melakukan penelitian pada tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat. Apalagi mengingat negara Indonesia kaya akan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat.

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mengkaji obat tradisional dan hasil-hasilnya yang mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan. Tumbuhan atau tanaman adalah makhluk Allah yang tersebar luas di bumi yang sangat bermanfaat bagi kepentingan manusia. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Asy-Syu'arā/26: 7 sebagai berikut.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik?” (Kementerian Agama RI, 2018).

Menurut Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah volume 10, ayat ini membuktikan melalui uraiannya-uraiannya keniscayaan keesaan Allah swt. Karena aneka tumbuhan yang terhampar dipersada bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keadaanya konstan. Itu semua tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada penciptanya yang Maha Esa lagi Maha kuasa. Di sisi lain tanah yang gersang melalui hujan yang diturunkan-Nya menghidupkan yang mati. Demikian juga manusia yang mati dan telah terkubur di bumi. Allah kuasa menghidupkan mereka kembali. Serupa dengan menghidupkan pepohonan yang tumbuh di tanah yang gersang itu.

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik.” Melihat ayat ini Allah swt, sudah menjelaskan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita umat manusia salah satunya dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka bumi untuk di gunakan sebagai mana mestinya, Al-Quran menjelaskan bahwa tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas muka bumi ini mempunyai kegunaan dan fungsi masing-masing agar manusia bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya.

Firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nahl/16: 10-11 adalah sebagai berikut.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Terjemahnya:

“Dialah, yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu. Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berfikir.” (Kementerian Agama RI, 2018).

Menurut Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah volume 6 ayat ke 10, ayat di atas mengingatkan manusia dengan tujuan agar mereka mensyukuri kenikmatan Allah dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya bahwa *Dia Yang Mahakuasa itulah, yang telah menurunkan dari arah langit, yakni awan air hujan untuk kamu* manfaatkan. *Sebagiannya menjadi minuman yang segar dan sebagian lainnya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang padanya, yakni di tempat tumbuhnya, kamu menggembalakan ternak kamu* sehingga binatang itu dapat makan dan pada gilirannya dapat menghasilkan untuk kamu susu, daging dan bulu.

Pada ayat ke 11, ayat ini menyebut beberapa yang paling bermanfaat atau populer dalam masyarakat Arab tempat dimana turunnya al-Qur'an dengan menyatakan bahwa *Dia*, yakni Allah swt, *menumbuhkan bagi kamu dengannya*, yakni dengan air hujan itu, *tanaman-tanaman*; dari yang paling cepat layu sampai dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan *zaitun*, salah satu pohon yang paling panjang usianya, demikian juga *kurma*, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik, dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga *anggur* yang dapat kamu jadikan makanan yang halal atau minuman yang haram. *Dan dari segala macam atau sebagian buah-buahan*, selain yang disebut itu. *Sesungguhnya pada yang demikian*, yakni pada curahan hujan dan akibat-akibatnya itu. *Benar-benar ada tanda* yang sangat jelas bahwa yang mengaturnya seperti itu adalah Maha Esa lagi Mahakuasa. Tanda itu berguna *bagi kaum yang memikirkan*. Betapa tidak, sumber airnya sama, tanah tempat tumbuhnya berdempet, tetapi ragam dan rasanya berbeda-beda.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah Swt. senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral. Di mana ketiganya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, mengandung suatu zat atau obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun, tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Swt. di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu.

Dari Jabir bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الظَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالُوا
 حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ
 سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami [Harun bin Ma’ruf] dan [Abu Ath Thahir] serta [Ahmad bin ‘Isa] mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahb]; Telah mengabarkan kepadaku [‘Amru] yaitu Ibnu Al Harits dari [‘Abdu Rabbih bin Sa’id] dari [Abu Az Zubair] dari [Jabir] dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah ‘azza wajalla” (HR. Muslim, Hadits no. 4084).

Hadits diatas telah diriwayatkan oleh beberapa orang rawi, yakni:

1. [Jabir] sebagai : Rawi pertama
2. [Abu Az Zubair] sebagai : Rawi kedua
3. [‘Abdu Rabbih bin Sa’id] sebagai : Rawi ketiga
4. [‘Amru] Ibnu Al Harits sebagai : Rawi keempat
5. [Ibnu Wahb] sebagai : Rawi kelima
6. [Harun bin Ma’ruf] dan [Abu Ath Thahir] serta : Rawi keenam
[Ahmad bin ‘Isa] sebagai
7. Imam muslim sebagai : Rawi ketujuh/ Rawi
terakhir

Dengan demikian, maka urutan-urutan sanad dari Hadits di atas sebagai berikut:

1. [Harun bin Ma’ruf] dan [Abu Ath Thahir] serta : Sanad pertama/Awal
[Ahmad bin ‘Isa] sebagai Sanad
2. [Ibnu Wahb] sebagai : Sanad kedua

3. ['Amru] Ibnu Al Harits sebagai : Sanad ketiga
4. ['Abdu Rabbih bin Sa'id] sebagai : Sanad keempat
5. [Abu Az Zubair] sebagai : Sanad kelima
6. [Jabir] sebagai : Sanad keenam/ Akhir
Sanad

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah subhānahu wata'āla ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah subhānahu wata'āla yang menyembuhkannya, akan tetapi Allah subhānahu wata'āla menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mempermudah penyembuhannya, kecuali bila seseorang itu sudah tiba ajalnya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, jenis, dan klasifikasi penyakit akan semakin banyak ditemukan dan penemuan obat baru juga akan semakin bertambah. Allah Swt. yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang menurunkan obatnya. Oleh karena itu, banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan terutama digunakan sebagai obat maka Rasulullah memerintahkan kita untuk berobat bila mengidap suatu penyakit.

Hadis di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit yang menimpa manusia maka Allah turunkan obatnya. Terkadang ada orang yang menemukan obatnya, ada juga yang belum menemukan obatnya. Oleh karena itu, seseorang harus bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha untuk mencari obat ketika sakit sedang menyimpannya.

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan melalui penelitian dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu, setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya (Qardhawi, 2002).

Dengan demikian, khususnya bagi orang – orang yang berkecimpung di bidang kesehatan hendaknya senantiasa terus menggali dan berbagi ilmu, salah satunya yaitu dengan cara melakukan penelitian agar diperoleh penemuan-penemuan obat baru, baik itu berasal dari tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesembuhan dari berbagai macam penyakit.



BAB III

METODE KERJA

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fitokimia dan Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan dilaksanakan pada Juli 2022 sampai selesai

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis kearah penelitian kuantitatif dengan metode ekperimental laboratorium.

C. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat setrifuge, autoklaf, cawan petri, enkas, inkubator, Laminar Air Flow (LAF), lemari pengering, oven, rotary evaporator, shaker, tabung sentrifuge dan timbangan analitik.

2. Bahan

Air suling, biakan murni bakteri *Propionibacterium acne*, DMSO, ekstrak kental daun seledri, FeCl₃, Glukosa PA, HCl, kertas cakram kosong, klindamisin, metanol, medium Glukosa Nutrien Agar (GNA), medium Nutrient Agar (NA), n-heksan.

D. Prosedur Kerja

1. Preparasi Sampel

a. Pengambilan sampel

Sampel berupa daun seledri yang diambil pada masa panennya yaitu 6 minggu sejak ditanam dan diambil di Kabupaten Polman, Sulawesi-Barat.

b. Pengolahan sampel

Sampel seledri yang telah diambil, dipisahkan antara batang dan daunnya, daunnya diambil dan dicuci dengan air kemudian daun diangin-anginkan di dalam ruangan yang terlindung dari cahaya matahari langsung, lalu diserbukkan.

2. Ekstraksi sampel

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi. Daun seledri yang telah kering ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan pelarut metanol hingga terendam seluruhnya. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 3 x 24 jam di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Filtrat metanol yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyaringnya dengan *rotary evaporator* pada suhu 50°C, kemudian ekstrak cair yang diperoleh dari rotavapor diuapkan sehingga dihasilkan ekstrak kental (ekstrak metanol) kemudian ditimbang ekstrak yang diperoleh.

3. Partisi

Partisi dilakukan dengan metode cair padat dengan cara ditimbang ekstrak metanol sebanyak 50 gram, dimasukkan ke dalam lumpang, dilarutkan dengan n-heksan 1000 mL dan digerus lalu disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Dipisahkan antara ekstrak larut n-heksan dengan ekstrak tidak larut n-heksan. Kemudian ekstrak yang tidak larut n-heksan dipartisi kembali sampai larutan berwarna bening. Setelah itu ekstrak larut n-heksan diuapkan menggunakan *rotary evaporator* pada suhu 50°C dan kemudian ekstrak diuapkan dengan cara diangin-anginkan hingga diperoleh ekstrak kental.

4. Skrining Fitokimia

a. Uji flavonoid

Ekstrak ditimbang sebanyak 0,5 gram ditambahkan dengan 2-3 mL air panas dan sedikit serbuk Mg ditambahkan kedalam ekstrak. Kemudian ditambahkan 4-5 tetes HCL pekat. Jika menunjukkan warna merah, kuning atau jingga maka ekstrak positif mengandung flavonoid.

b. Uji saponin

Ditimbang 0,5 gram ekstrak, lalu ditambahkan dengan air panas sebanyak 3 mL kemudian dikocok kuat-kuat. Jika terdapat busa busa didiamkan selama 10 menit. Kemudian ditambahkan 1-3 tetes HCl 1% jika busa tetap bertahan maka positif mengandung saponin.

c. Uji tanin

Ekstrak sebanyak 0,5 gram ditambahkan 3 ml air hangat. Ditetaskan dengan $FeCl_3$ 1%, jika terjadi perubahan warna kehijauan menjadi kehitaman maka positif mengandung tanin.

5. Sterilisasi

Dicuci alat-alat kaca (tabung reaksi, pipet tetes, pipet skala, gelas kimia, gelas ukur, erlenmeyer dan cawan petri) dengan detergen, dibersihkan dengan direndam air panas selama 15-30 menit, dicuci dengan pembilasan pertama HCl 0,1 %, dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka, setelah kering dibungkus dengan kertas. Tabung reaksi, gelas ukur gelas erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu $180^{\circ}C$ selama 3 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam autoklaf pada suhu $121^{\circ}C$ selama 15 menit. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

6. Pembuatan Medium

a. Nutrient Agar (NA)

Cara pembuatan:

Menimbang 0,28 gram medium NA dimasukkan ke erlenmeyer yang kemudian dilarutkan dengan aquadest sebanyak 10 ml, Kemudian dipanaskan hingga larut di atas penangas air. Setelah itu disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit. Lalu medium siap untuk digunakan.

b. Glukosa Nutrient Agar (GNA)

Cara pembuatan:

Menimbang 2,8 gram medium NA, dan glukosa PA sebanyak 0,5 gram dimasukkan ke Erlenmeyer yang kemudian dilarutkan dengan aquadest sebanyak 100 ml, Kemudian dipanaskan hingga larut di atas penangas air. Setelah itu disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit. Lalu medium siap untuk digunakan.

7. Pengujian Aktivitas Antimikroba

a. Peremajaan bakteri uji

Diambil *Propionibacterium acnes* yaitu bakteri penyebab jerawat satu ose dari biakan murni kemudian diinokulasi pada medium Nutrient agar miring, lalu diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam.

b. Pembuatan konsentrasi larutan uji

Dibuat larutan uji konsentrasi 12,5% , 17,5%, 22,5% dan 25,5%. Dibuat larutan stok 25,5% dengan cara menimbang ekstrak 12,75 gram dilarutkan dengan 5 mL DMSO, lalu ditambahkan aquadest 45 mL hingga volume 50 mL. Kemudian diambil 4,411 mL dari larutan stok untuk konsentrasi 22,5%, diambil 3,431 mL untuk konsentrasi 17,5%, dan diambil 2,450 mL untuk konsentrasi

12,5%. Kemudian masing-masing konsentrasi dicukupkan volumenya hingga 5 mL.

c. Pembuatan suspensi bakteri

Diambil bakteri *Propionibacterium acnes* menggunakan jarum ose steril setelah diinokulasi. Kemudian disuspensikan kedalam tabung reaksi yang berisi 10 mL NaCl 0,9% hingga diperoleh kekeruhan sama dengan standar kekeruhan larutan *Mc. Farland*.

d. Pengujian aktivitas daya hambat

Uji ini dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan medium GNA, 10 mL medium GNA dituang kedalam cawan petri dibiarkan memadat, kemudian diambil 20 μ L suspensi bakteri lalu dituang diatas medium GNA, lalu diratakan dengan spreader. Kemudian, *paper disk* yang telah dijenuhkan dengan sampel pada konsentrasi 12,5%, 17,5%, 22,5%, dan 25,5% dengan kontrol positif *Clindamycin* 0,1%, kontrol negative *DMSO* 0,1 %, diletakkan dalam cawan petri yang telah berisi medium dan suspensi mikroba. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37⁰ C, lalu diamati zona hambat yang terbentuk.

e. Pengukuran zona hambat

Pengukuran ini dilakukan menggunakan jangka sorong dan diukur jarak zona hambat dari kertas cakram ke zona hambat terluar. Penentuan zona hambat dilakukan dengan cara mengamati zona terang yang berada di zona terluar kertas cakram pada media agar.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Daun Seledri (*Apium graveolens L.*)

Setelah dilakukan ekstraksi daun seledri (*Apium graveolens L.*) sebanyak 650 gram dengan metode maserasi menggunakan cairan penyari metanol diperoleh ekstrak metanol kental. Maka diperoleh berat ekstrak seperti pada tabel :

Tabel 2. Hasil ekstraksi daun seledri (*Apium graveolens L.*)

Jenis Ekstrak	Berat Sampel	Berat Simplisia yang diekstraksi	Bobot Ekstrak	% Rendamen
Ekstrak kental	7,2 Kg	650 gram	125,758 gram	19,347 %

2. Hasil Partisi Ekstrak Daun Seledri (*Apium graveolens L.*)

Ekstrak metanol daun seledri yang diperoleh kemudian di pisahkan kembali dengan metode partisi cair padat, dengan menggunakan pelarut N-hexan.

Tabel 3. Hasil partisi ekstrak daun seledri (*Apium graveolens L.*)

No	Berat Ekstrak yang di Partisi	Jenis Pelarut	Jenis Ekstrak	Berat Ekstrak
	50 gram	N-heksan	Ekstrak Larut N-heksan	17,429 gram
			Ekstrak Tidak Larut N-heksan	32,526 gram

3. Hasil Uji Identifikasi Golongan Senyawa

Hasil ekstrak metanol daun seledri kemudian diuji golongan senyawa kimianya untuk mengetahui kandungan – kandungan senyawa yang ada didalam daun seledri.

Tabel 4. Hasil identifikasi golongan senyawa ekstrak larut N-Heksan, ekstra tidak larut N-Heksan dan ekstrak metanol daun seledri (*Apium graveolens L.*)

No.	Jenis Ekstrak	Flavonoid	Saponin	Tanin
1.	Metanol	Kuning (+)	Berbusa (+)	Kehitaman (+)
2.	Larut N-Heksan	-	-	-
3.	Tidak larut N-Heksan	Jingga (+)	Berbusa (+)	Kehitaman (+)

Keterangan: (+) Terdapat golongan senyawa tertentu

(-) Tidak terdapat golongan senyawa tertentu

4. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan menggunakan sampel ekstrak metanol daun seledri, ekstrak larut N-Heksan dan ekstrak tidak larut N-Heksan.

Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak metanol daun seledri, ekstrak larut N-Heksan dan ekstrak tidak larut N-Heksan dapat dilihat pada table berikut :

a. Ekstrak metanol daun seledri (*Apium graveolens L.*)

Tabel 5. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak metanol daun seledri (*Apium graveolens L.*)

No	Konsentrasi	Diameter zona hambat (MM)			Rata-rata	Keterangan
		Cawan petri 1	Cawan petri 2	Cawan petri 3		
1	25,5%	22,5	21,8	21,5	21,93	Sangat kuat
2	22,5%	19,2	20,1	13,7	17,66	Kuat

3	17,5%	17,7	11,5	13,2	14,13	Kuat
4	12,5%	15,2	8,3	10,4	11,3	Kuat
5	Kontrol positif	20,76			20,76	Sangat kuat
6	Kontrol negative	-			-	-

Keterangan : Sangat kuat : >20 mm
 Kuat : 10-20 mm
 (-) Tidak ada zona hambat

b. Ekstrak larut N-Heksan daun seledri (*Apium graveolens L.*)

Tabel 6. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak larut N-Heksan (*Apium graveolens L.*)

No	Konsentrasi	Diameter zona hambat (MM)			Rata-rata	Keterangan
		Cawan petri 1	Cawan petri 2	Cawan petri 3		
1	25,5%	10,8	10,3	14,2	11,76	Kuat
2	22,5%	10,2	10,7	12,5	11,13	Kuat
3	17,5%	8,5	12,1	10,7	10,43	Kuat
4	12,5%	8	8,4	10,2	8,86	Sedang
5	Kontrol positif	20,76			20,76	Sangat kuat
6	Kontrol negative	-			-	-

Keterangan : Sangat kuat : >20 mm
 Kuat : 10-20 mm
 Sedang : 5-10
 (-) Tidak ada zona hambat

c. Ekstrak tidak larut N-Heksan daun seledri (*Apium graveolens L.*)

Tabel 7. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak tidak larut N-Heksan (*Apium graveolens L.*)

No	Konsentrasi	Diameter zona hambat (MM)			Rata-rata	Keterangan
		Cawan petri 1	Cawan petri 2	Cawan petri 3		
1	25,5%	9,2	10,1	11,2	10,16	Kuat
2	22,5%	7,4	8,5	9,4	8,43	Sedang
3	17,5%	6,6	7	8,5	7,36	Sedang
4	12,5%	-	-	6,5	2,16	Lemah
5	Kontrol positif	20,76			20,76	Sangat kuat
6	Kontrol negative	-			-	-

Keterangan : Sangat kuat : >20 mm
 Kuat : 10-20 mm
 Sedang : 5-10
 Lemah : < 5 mm
 (-) Tidak ada zona hambat

B. Pembahasan

Obat tradisional yang biasa digunakan masyarakat sebagai bahan obat adalah daun seledri (*Apium graveolens L.*) yang digunakan sebagai peluruh keringat, penyembuh demam, rematik, sukar tidur dan pertumbuhan rambut, antihipertensi dan sebagainya.

Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan adanya daya hambat antibakteri ekstrak daun seledri (*Apium graveolens L.*) terhadap beberapa bakteri dan juga penggunaan daun seledri secara tradisional sebagai obat, maka dilakukan penelitian ini untuk membuktikan khasiat daun seledri (*Apium graveolens L.*) terhadap bakteri *Propionibacterium acne*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ekstrak metanol daun, ekstrak larut N-Heksan dan ekstrak tidak larut N-Heksan daun seledri untuk menghambat pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acne* penyebab jerawat. Tanaman seledri ini diperoleh dari Sulawesi barat. Tanaman seledri telah diambil kemudian di sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran dan memisahkan bagian-bagian yang tidak diperlukan yakni memisahkan daun dari batang seledri karena pada penelitian ini hanya menggunakan daun seledri. Kemudian dicuci bersih dengan air mengalir, pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah ataupun kotoran lainnya yang melekat pada daun seledri.

Setelah proses pencucian daun seledri kemudian dilakukan perajangan untuk mempermudah proses pengeringan dan dikeringkan dengan cara dianginkan di dalam ruangan yang terlindung dari paparan sinar matahari langsung hingga kadar air yang terkandung dalam sampel berkurang agar proses enzimatik dapat dihentikan karena dapat merusak zat aktif. Selain itu, dapat juga mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Daun seledri yang telah kering kemudian disortasi kering untuk memisahkan kotoran yang masih terdapat pada sampel daun seledri. Kemudian dibuat serbuk kasar untuk memperluas permukaan dengan cara di blender, sehingga pada saat proses ekstraksi kontak antara pelarut dengan sampel lebih efektif dan senyawa dapat terekstraksi dengan optimal.

Dilakukan proses ekstraksi dengan metode yang digunakan adalah maserasi karena maserasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan.. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan akan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan

konsentrasi antara larutan zat aktif dengan yang diluar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan diluar sel dan di dalam sel (Depkes RI, 1986).

Pelarut yang digunakan yaitu metanol karena metanol ialah pelarut semipolar yang dapat melarutkan senyawa yang bersifat polar ataupun nonpolar seperti fenolik, flavonoid, saponin dan lain-lain dan dapat menarik lebih banyak senyawa dari suatu tanaman (Khairunnisa, 2021). Sebanyak 650 gram simplisia daun seledri dimaserasi dengan metanol selama 3 X 24 jam. Proses maserasi hanya dilakukan sebanyak 1 kali dan kemudian dipekatkan dengan menggunakan *Vaccum Rotary Evaporator* dan diuapkan sehingga diperoleh ekstrak kental. Pada tabel 2. menunjukkan hasil ekstraksi pada daun seledri (*Apium graveolens L.*) dengan persen rendamen sebesar 19,347 %.

Setelah didapatkan ekstrak metanol daun seledri, selanjutnya dilakukan proses partisi dengan menggunakan pelarut N-Heksan. Senyawa dengan tingkat kepolaran yang rendah akan larut dalam N-Heksan (ekstrak N-Heksan) sedangkan yang memiliki tingkat kepolaran yang tinggi tidak larut dalam N-Heksan (ekstrak metanol). Partisi ini bertujuan untuk memisahkan komponen kimia berdasarkan kelarutan dan tingkat kepolarannya. Proses partisi dilakukan hingga larutan bening atau tidak berwarna, sehingga diperoleh hasil partisi yang larut N-Heksan dan tidak larut N-Heksan. Kemudian hasil partisi dipekatkan dengan menggunakan *Vaccum Rotary Evaporator* dan diuapkan sehingga diperoleh ekstrak larut N-Heksan sebanyak 17,429 gram dan ekstrak tidak larut N-Heksan sebanyak 32,526 gram yang bisa dilihat pada tabel 3. Hal ini menunjukkan bahwa daun seledri lebih banyak mengandung senyawa yang bersifat polar dibandingkan senyawa yang bersifat non polar.

Selanjutnya dilakukan uji identifikasi golongan senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak larut N-Heksan, tidak larut N-Heksan dan ekstrak metanol daun seledri. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4, ekstrak metanol dan ekstrak tidak larut N-Heksan daun seledri terbukti mengandung senyawa flavonoid, saponin dan tanin. Hasil yang diperoleh sama seperti pada penelitian sebelumnya yang menggunakan pelarut etanol yang dilakukan oleh Angga & Nofita (2020). Sedangkan pada ekstrak larut N-Heksan semua hasil yang didapatkan negatif yang berarti tidak terdapat golongan senyawa flavonoid, saponin ataupun tanin pada ekstrak larut N-Heksan.

Identifikasi golongan senyawa dilakukan untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak larut N-Heksan, tidak larut N-Heksan dan ekstrak metanol daun seledri sehingga dapat diketahui senyawa apa yang dapat berpotensi sebagai antibakteri, dan pada identifikasi ini dilakukan uji golongan flavonoid, saponin dan tanin. Dan pengujian golongan senyawa positif hanya terkandung pada ekstrak metanol dan ekstrak tidak larut N-Heksan daun seledri.

Prasetyo (2008) menyatakan bahwa saponin merupakan senyawa metabolit sekunder yang berfungsi sebagai antiseptik sehingga memiliki kemampuan antibakteri. Adanya zat antibakteri tersebut akan menghalangi pembentukan atau pengangkutan masing-masing komponen ke dinding sel yang mengakibatkan lemahnya struktur disertai dengan penghilangan dinding sel dan pelepasan isi sel yang akhirnya akan mematikan maupun menghambat pertumbuhan sel bakteri tersebut.

Pada uji aktivitas antibakteri metode yang digunakan adalah difusi cakram. Hasil daya uji antibakteri didasarkan pada pengukuran Diameter Daerah Hambat (DDH) atau zona bening yang terbentuk disekitarnya bakteri yang digunakan,

sebelumnya dilakukan peremajaan terlebih dahulu untuk meregenerasi bakteri agar yang diperoleh bakteri yang muda dan tidak terkontaminasi. Media agar yang digunakan untuk peremajaan bakteri adalah *Nutrient Agar* (NA) dan media pengujian adalah *Glukosa Nutrient Agar* (GNA).

Peremajaan bakteri dilakukan dengan menanam bakteri pada media agar miring yang kemudian diinkubasi selama 24 jam dalam incubator pada suhu 37°C. inkubasi dilakukan dengan tujuan untuk mengkondisikan lingkungan pada suhu optimum perkembangan bakteri sehingga bakteri dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pembuatan konsentrasi larutan uji dengan 4 konsentrasi yaitu 12,5%, 17,5%, 22,5%, dan 25,5%. Perbedaan konsentrasi dibuat untuk mengetahui tingkat efektivitas ekstrak menghambat pertumbuhan bakteri. Dimana dibuat terlebih dahulu larutan stok 25,5% dan kemudian diencerkan menjadi 12,5%, 17,5% dan 22,5% . Pembuatan larutan stok dengan menimbang 6,375 mg ekstrak kemudian dilarutkan dengan air steril 25 ml.

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi cakram yang dimana menggunakan paper disk dengan medium Glukosa Nutrient Agar (GNA), Metode ini dilakukan untuk mengetahui besarnya diameter hambatan yang terbentuk pada bakteri *Propionibacterium acne*, setelah masa inkubasi 24 jam, larutan ekstrak metanol daun seledri akan berdifusi ke medium agar untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang ditandai adanya zona hambat bening yang terdapat di sekeliling paper disk. Zona hambat yang terbentuk inilah yang kemudian akan diukur diameternya.

Diambil 10 mL medium GNA dituang kedalam cawan petri dibiarkan memadat. Dibuat suspensi bakteri dengan cara satu ose bakteri yang telah diremajakan dimasukkan kedalam tabung reaksi yang telah berisi 10 mL NaCl

0,9% hingga diperoleh kekeruhan sama dengan standar kekeruhan larutan *McFarland*, yang kemudian dituang kedalam cawan petri sebanyak 20 μ L, dan paper disk yang telah dijenuhkan dengan sampel pada konsentrasi 12,5; 17,5; 22,5; dan 25,5 % dengan control positif antibiotik clindamycin 0.1% dan kontrol negatif DMSO kemudian diletakkan dalam medium. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C, lalu diamati luas zona hambat/bening yang terbentuk.

Alasan penggunaan DMSO dalam melarutkan ekstrak dan sebagai kontrol negatif karena DMSO merupakan salah satu pelarut sampel yang dapat melarutkan hampir semua senyawa baik polar maupun non-polar. Selain itu, DMSO tidak memberikan daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri sehingga tidak mengganggu hasil pengamatan.

Alasan pemilihan bakteri *Propionibacterium acne* dalam penelitian ini karena bakteri *Propionibacterium acne* merupakan salah satu bakteri penyebab terjadinya jerawat, dimana *Propionibacterium acne* merupakan flora normal kulit terutama di bagian wajah, berperan pada patogenesis jerawat dengan menghasilkan lipase yang memecah asam lemak bebas dari lipid kulit. Asam lemak ini yang akan mengakibatkan inflamasi jaringan dan mendukung terjadinya jerawat (Antikan dkk, 2020).

Medium Glukosa Nutrient Agar (GNA) merupakan medium yang baik sebagai tempat tumbuhnya beberapa bakteri gram positif dan gram negatif yang dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi bagi pertumbuhan bakteri.

Hasil pengamatan menunjukkan adanya zona hambat terhadap *Propionibacterium acne*, dimana potensi aktivitas daya hambat itu terlihat pada semua konsentrasi dimana pada ekstrak metanol diperoleh rata-rata diameter zona hambat pada konsentrasi 25,5% sebesar 21,93 mm, pada 22,5% diperoleh 17,66 mm, pada 17,5% sebesar 14,3 mm dan 12,5% sebesar 11,3 mm.

Pada ekstrak partisi larut N-Heksan diperoleh rata-rata diameter zona hambat terhadap *Propionibacterium acne* pada konsentrasi 25,5% sebesar 11,76 mm, konsentrasi 22,5% diperoleh diameter 11,13 mm, 17,5% sebesar 10,43 mm, dan pada konsentrasi 12,5% diameter zona hambat 8,86 mm.

Selain itu pada ekstrak partisi tidak larut N-Heksan diperoleh rata-rata diameter zona hambat terhadap *Propionibacterium acne* yaitu pada konsentrasi 25,5% diameter zona hambat yang diperoleh 10,16 mm, pada konsentrasi 22,5% diperoleh diameter 8,43 mm, pada konsentrasi 17,5% diperoleh 7,36 mm, dan pada 12,5% diperoleh 2,16 mm.

Sedangkan untuk kontrol positif yaitu antibiotik klindamisin dengan diameter zona hambat terhadap bakteri *Propionibacterium acne* sebesar 20,76 mm yang menunjukkan zona hambat yang maksimal. Dan untuk kontrol negatif DMSO tidak menunjukkan adanya zona hambat disekitar *paper disk*.

Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan, dimana ekstrak metanol daun seledri memiliki aktivitas antibakteri terhadap *Propionibacterium acne* sebagai bakteri penyebab jerawat, aktivitas antibakteri terlihat pada konsentrasi 25,5% ekstrak metanol yang memiliki rata-rata diameter 21,93 mm yang berada pada range >20 mm yang artinya menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *Propionibacterium acne* dengan kategori Sangat Kuat sedangkan konsentrasi 22,5%; konsentrasi 17,5% dan konsentrasi 12,5% yang memiliki rata-rata diameter yang berada pada range 10-20 mm yang artinya menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *Propionibacterium acne* dengan kategori Kuat .

Pada ekstrak partisi larut N-Heksan pada konsentrasi 25,5%; 22,5%; 17,5% yang memiliki rata-rata diameter yang berada pada range 10-20 mm yang artinya menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *Propionibacterium acne*

dengan kategori kuat, dan untuk konsentrasi 12,5% memiliki rata-rata diameter yang berada pada range 5-10 mm yang berarti termasuk dalam kategori sedang.

Sedangkan pada ekstrak partisi tidak larut N-Heksan dengan konsentrasi 25,5% yang memiliki nilai rata-rata diameter yang berada pada range 10-20 mm yang artinya menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *Propionibacterium acne* dengan kategori kategori Kuat. Dan untuk konsentrasi 22,5% dan 17,5% yang berada pada range 5-10 mm yang berarti termasuk dalam kategori Sedang, sedangkan pada konsentrasi 12,5% memiliki nilai rata-rata diameter yang berada pada range < 5 termasuk dalam kategori lemah.

Hal ini menunjukkan bahwa dari 3 ekstrak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ekstrak metanol, ekstrak larut N-Heksan dan tidak larut N-Heksan daun seledri, ekstrak yang memiliki aktivitas antibakteri yang paling tinggi terdapat pada ekstrak metanol dengan konsentrasi 25,5%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ekstrak Metanol, ekstrak larut n-heksan dan ekstrak tidak larut n-heksan daun seledri (*Apium graveolens L.*) memiliki aktivitas sebagai agen antibakteri terhadap bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acne* yaitu dengan adanya zona bening yang terbentuk.
2. Ekstrak metanol, ekstrak larut N-Heksan dan ekstrak tidak larut N-Heksan daun seledri (*Apium graveolens L.*) pada konsentrasi 25,5% yang memberikan efektivitas antibakteri paling besar terhadap pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acne* dengan nilai diameter rata-rata: ekstrak metanol 21,93 mm kategori sangat kuat, ekstrak larut N-Heksan 11,76 mm kategori kuat, ekstrak tidak larut N-Heksan 10,16 mm kategori kuat.
3. Golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak metanol dan ekstrak tidak larut N-Heksan daun seledri (*Apium graveolens L.*) adalah flavonoid, saponin dan tanin. Sedangkan ekstrak larut N-Heksan diperoleh hasil negative tidak mengandung senyawa flavonoid, saponin ataupun tanin.
4. Dalam tinjauan Islam, Allah SWT memberikan petunjuk tentang berbagai macam tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat, salah satunya daun seledri yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap simplisia daun seledri dengan menggunakan jenis pelarut yang berbeda

KEPUSTAKAAN

- Andrayani, Resti. *Pengaruh Konsentrasi Larutan AB Mix Dan Macam Media Tanam Organik Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Seledri (Apium graveolens L.) SECARA HIDROPONIK*. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020
- Antika, Rindi Novitri, dkk. *Peningkatan Pemahaman Remaja Tentang Bakteri Ropionibacterium Acnes Bagi Kesehatan Kulit*. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 4 No. 3. 2020
- Arianti J, Reztu. *Formulasi Dan Uji Stabilitas Fisik Gel Anti Jerawat Dari Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Ambon Muda (Musa paradisiaca var. Sapientum) Dengan Berbagai Varian Basis*. Skripsi. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2017
- Armansyah. *Uji Aktivitas Antibakteri Hasil Fraksinasi Ekstrak Etanol 96% Daun Nangka (Artocarpus heterophyllus Lamk.) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat*. Skripsi. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2017
- Atun, Sri. *Metode Isolasi dan Identifikasi Struktur Senyawa Organik Bahan Alam*. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*. Volume 8 No.2, 2014
- Azizah, dkk. *Uji aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak etanol daun seledri (Apium graviolens L.) dan madu hutan terhadap beberapa bakteri penyebab penyakit kulit*. *Jurnal Penelitian Sains* 22 (1), 37-44. 2020
- Basir, Nasrawati. *Uji Antimitosis Ekstrak Etanol Larut Dan Tidak Larut N-Heksan Daun Katuk (Sauropus androgynus L. Merr) Berdasarkan Penghambatan Pembelahan Sel Telur Bulubabi (Tripneustus gratilla Linn.)*. Skripsi. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2014
- Clements, Dkk. *Formulasi Dan Uji Aktivitas Antibakteri Krim Ekstrak Etanol Herba Seledri (Apium Graveolens L.) Terhadap Bakteri Staphylococcus Aureus*. *Pharmacoon– Program Studi Farmasi, FMIPA, Universitas Sam Ratulangi*. Volume 9 no. 2. 2020
- Kementerian Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2018
- Ditjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Deprtemen Kesehatan RI. 1979


- Ditjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi VI*. Jakarta: Deprtemen Kesehatan RI. 2020
- Ditjen POM. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2000
- Dwinanda, Andina. *Pengaruh Jus Seledri (Apium graveolens L.) Terhadap Gambaran Mikroskopis Hepar Tikus (Rattus norvegicus) Yang Diinduksi Diet Hiperkolesterol*. Skripsi. Padang: Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. 2018
- Endarini, Lully Hanni. *Farmakognosi dan Fitokimia*. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2016
- Erni. *Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Rimpang Lengkuas Merah (Alpinia purpurata K. Schum) Terhadap Bakteri Propionibacterium acnes*. Skripsi. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2018
- Faizal, Nur Farah Aina Binti, Y. I. *Artikel Tinjauan: Studi Kimia Dan Aktivitas Farmakologi tanaman Seledri (Apium Graviolens L.)*. Farmaka, 16(2), 28–32. 2018
- Fitratul M, Syifa. *Performa Identifikasi Jenis Jerawat Menggunakan Gray Level CO-Occurrence Matrix (GLCM) Dan Support Vector Machine (SVM)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018
- Fitri, dkk. *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Herba Seledri (Apium Graveolens L.) terhadap Bakteri Propionibacterium Acnes Secara In-Vitro. Prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung*. Volume 4 no 2. 2018
- Fitria. *Aktivitas Antibaktrei Ektrak Etanol Daun Pepaya (Carica papaya) Terhadap Bakteri Propionibacterium acnes* [Karya Tulis Ilmiah], Kemetrian Kesehatan Republik Indonesi Politeknik Kesehatan Bandung : Bandung. 2015
- Harun, Desi Syifa Nurmillah. *Formulasi Uji Aktivitas Antibiotik Krim Anti-Aging Ekstrak 50% Kulit Buah Manggis (Garcinia magostana L.) dengan Metode DPPH (1,1-Diphenyl-2- Picril Hydrazil)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi. 2014
- Haryoto. *Bertanam Seledri Secara Hidroponik*. Kanisius. Yogyakarta. 48 hal. 2009
- Hidayah. D, Ninin. *Uji Aktivitas Akstrak Metanol Klika Anak Dara (Croton oblongus burm F.) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat*. Skripsi. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2016

- Hidayat, Rahmad. *Pengaruh Pemberian Pupul Organik Cair Urin Sapi Dan ZPT Hormonik Terhadap Pertumbuhan Serta Hasil Tanaman Seledri (Apium graveolens L.) Secara Hidroponik NFT*. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2019
- Insani, Fitra. *Karakterisasi Komponen Kimia Hasil Fraksi Ekstrak Etanol Daun Sembukan (Paederia Foetida L.) Dengan Menggunakan Spektroskopi Infra Red*. Skripsi. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2019
- Irwan, Ayu Setiawati. *Uji Aktivitas Antimikroba Hasil Fraksinasi Ekstrak Rimpang Jeringau (Acorus Calamus L.) Terhadap Bakteri Patogen*. Skripsi. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2017
- Isriany. *Formulasi Kosmetik : produk perawatan kulit dan rambut*. 2013
- Juarni. *Pengaruh Pupuk Cair Eceng Gondok (Eichornia crassipes) Terhadap Pertumbuhan Tanaman Seledri (Apium graveolens L.) Sebagai Penunjang Praktikum Fisiologi Tumbuhan*. Skripsi Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. 2017
- Julianto, Tatang Shabur. *Fitokimia Tinjauan Metabolit Sekunder dan Skrining Fitokimia*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2019
- Kristiana, W. *Pengaruh Pemberian Bokashi Sisa Media Jamur Tiram dan NPK Organik pada Tanaman Seledri (Apium graveolens L.)*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Islam Riau. Pekanbaru. 2016
- Majidah, dkk. *Daya Antibakteri Ekstrak Daun Seledri (Apium graveolens L.) Terhadap Pertumbuhan Streptococcus mutans*. Skripsi. Jember: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. 2014
- Mukhriani. *Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, Dan Identifikasi Senyawa Aktif*. Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar: Jurnal Kesehatan. Volume VII No 2. 2014
- Qardhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2002
- Rahmiani, Dini. *Penetapan Parameter Non Spesifik Ekstrak Batang Parang Romang (Boehmeria virgata (Forst) Guill.)*. Skripsi. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2019
- Rizqun Nisa A. *Acne vulgaris Pada Remaja. Vol 4*. Medical Faculty of Lampung University : Lampung. 2015


- Rosaini, dkk. *Formulasi, Pengujian Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Sediaan Masker Gel Peel Off Ekstrak Etanol Herba Seledri (Apium graveolens L.)*. Jurnal Farmasi Higea, 11 (2). 2019
- Rukmana, R, *Bertanaman Seledri*, Penerbit Kanisius. 1995
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2012
- Syafitri, Melda. *Identifikasi Bakteri Pada Jerawat (Acne) Pada Wajah*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perintis Padang. Padang. 2020
- Savitri, Evika Sandi. *Rahasia Tumbuhan Berkhasiat obat Perspektif Islam*. Malang: UIN- Malang Press. 2008
- Setiadi. *Anatomi dan Fisiologi Manusia. Cet.I*; Yogyakarta, Graha Ilmu. 2007
- Sudarsono, Pudjoanto A, Gunawan D, Wahyuono S, Donatus IA, Drajad M, et al. *Tumbuhan Obat, Hasil Penelitian, Sifat-sifat dan Penggunaan*, Yogyakarta: UGM. 1996.
- Syahsul, Muh. Akbar. *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum Sanctum L) Dalam Bentuk Sediaan Gel*. Skripsi. Makassar: Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Uinam. 2015
- Syamsul, Muh Akbar. *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum Sanctum L) Dalam Bentuk Sediaan Gel*. Skripsi. Makassar : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2015
- Tatang Sopandi, Wardah. *Mikrobiologi Pangan*. Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2014
- Wasiaatmadja, S.M., *Dalam : Djuanda, A. (eds). Ilmu Penyakit Dalam Dan Kelamin Edisi Kelima*. Jakarta : balai penerbit FK UI pp : 254 -260. 2007
- Wijayakusuma,Hembing. *Ramuan Lengkap Herbal Taklukkan Penyakit*. Jakarta : Pustaka Bunda. 2008
- Yeti, Rahma. *Analisis Konsep Diri Mahasiswa Keperawatan Yang Mengalami Acne Vulgaris Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2016
- Yusmaniar,. Wardiyah., Nida, Khairun. *Mikrobiologi dan Parasitologi*. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2017
- Zahrah, dkk. *Aktivitas Antibakteri Dan Perubahan Morfologi Dari Propionibacterium Acnes Setelah Pemberian Ekstrak Curcuma Xanthorrhiza*. Universitas Airlangga: Jurnal Biosains Pascasarjana, Vol. 20, No. 3. 2018

LAMPIRAN


Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian




Lampiran 2. Skema Kerja Penyiapan Sampel




Lampiran 3. Skema Kerja Partisi Cair-Padat




Lampiran 4. Skema kerja Skrining Fitokimia

Lampiran 5. Skema Kerja Sterilisasi




Lampiran 6. Skema Kerja Pembuatan Medium

a. Nutrient Agar (NA)




b. Glukosa Nutrient Agar (GNA)




Lampiran 7. Skema Kerja Pengujian Aktivitas Antimikroba


a. Peremajaan bakteri uji




b. Pembuatan konsentrasi larutan uji



c. Pembuatan suspensi bakteri




d. Pengujian aktivitas daya hambat



Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37⁰ C




Diamati zona hambat yang terbentuk menggunakan penggaris atau jangka sorong




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 8. Gambar Pengamatan




Gambar 13. Sampel Seledri (*Apium graveolens L.*)

Keterangan : a. Seledri (*Apium graveolens L.*), b. Sortasi basah daun seledri (*Apium graveolens L.*), c. Pengeringan sampel daun seledri, d. Penimbangan pertama sampel kering daun seledri, e. Penimbangan kedua sampel kering daun seledri.



Gambar 14. Ekstraksi sampel daun seledri (*Apium graveolens* L.)

Keterangan : a. Maserasi sampel daun seledri menggunakan pelarut metanol, b. Penyaringan sampel daun seledri, c. Proses penguapan filtrat menggunakan rotary evaporator, d. Hasil rotary evaporator di aupkan kembali, e. ekstrak kental daun seledri




Gambar 15. Penimbangan ekstrak kental daun seledri

Keterangan : a. Penimbangan gelas arloji

b. Penimbangan ekstrak pertama


c. Penimbangan ekstrak kedua

d. Penimbangan ekstrak ketiga



Gambar 16. Skrining Fitokimia


- Keterangan :
- a. Penimbangan ekstrak untuk uji fitokimia
 - b. Bahan yang digunakan untuk uji fitokimia (HCL Pekat, HCL 1%, serbuk Mg, dan FeCl_3)
 - c. Hasil uji tanin ekstrak metanol
 - d. Hasil uji flavonoid ekstrak metanol
 - e. Hasil uji saponin ekstrak metanol



Gambar 17. Skrining Fitokimia


- Keterangan :
- a. Hasil uji tanin ekstrak tidak larut N-Heksan
 - b. Hasil uji flavonoid ekstrak tidak larut N-Heksan
 - c. Hasil uji saponin ekstrak tidak larut N-Heksan
 - d. Hasil uji tanin ekstrak larut N-Heksan
 - e. Hasil uji flavonoid ekstrak larut N-Heksan
 - f. Hasil uji saponin ekstrak larut N-Heksan

MAKASSAR




Gambar 18. Pengerjaan Partisi

Keterangan : a. Penimbangan ekstrak untuk di partisi, b. Pelarut N-Heksan, c. Ekstrak digerus menggunakan lumpang, d. Larutan ekstrak dimasukkan ke dalam tabung centrifuge, e. Dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi, f. Diatur kecepatan alat 3000 rpm selama 10 menit, g. Penimbangan ekstrak tidak larut n-Heksan, h. Penimbangan ekstrak larut n-Heksan



Gambar 19. Penyiapan alat dan bahan untuk pengujian aktivitas antimikroba

Keterangan : a. Sterilisasi alat kaca menggunakan oven, b. Penimbangan nutrient agar, c. Glukosa PA , d. Paper disk blank, e. Larutan DMSO 0,1% dan clindamisin 0,1%, f. larutan DMSO, g. H_2SO_4 1%, h. Barium klorida $BaCl$ 1%



Gambar 20. Penyiapan bahan untuk pengujian aktivitas antimikroba


Keterangan : a. Larutan NaCl 0,9%

b. Larutan Mc Farland dan suspensi bakteri

c. Dipanaskan Nutrient Agar di atas penangas air

d. Kapsul clindamisin


e. Sterilisasi Aquadest dan nutrient agar di autoklaf



Gambar 21. Pembuatan deret konsentrasi ekstrak


- Keterangan :
- a. Penimbangan ekstrak untuk pembuatan larutan stok
 - b. Menghomogenkan larutan ekstrak menggunakan Shaker
 - c. Deret konsentrasi ekstrak metanol daun seledri
 - d. Deret konsentrasi ekstrak larut N-Heksan daun seledri
 - e. Deret konsentrasi ekstrak tidak larut N-Heksan daun seledri

M A K A S S A R




Gambar 22. Pengerjaan pengujian aktivitas antimikroba

- Keterangan :
- a. Peremajaan bakteri uji
 - b. Penuangan medium ke cawan petri menggunakan spoit
 - c. Penuangan suspensi bakteri di atas nutrient agar menggunakan pipet mikro
 - d. Diratakan suspensi bakteri menggunakan spreader
 - e. Deletakkan paper disk yang sudah dijenuhkan dengan larutan uji di atas medium



Gambar 23. Hasil pengujian aktivitas daya hambat

- Keterangan :
- a. Hasil uji daya hambat DMSO dan Klindamisin
 - b. Hasil uji daya hambat ekstrak metanol percobaan 1
 - c. Hasil uji daya hambat ekstrak metanol percobaan 2
 - d. Hasil uji daya hambat ekstrak metanol percobaan 3
 - e. Hasil uji daya hambat ekstrak larut n-Heksan percobaan 1
 - f. Hasil uji daya hambat ekstrak larut n-Heksan percobaan 2



Gambar 24. Hasil pengujian aktivitas daya hambat

- Keterangan :
- a. Hasil uji daya hambat ekstrak larut n-Heksan percobaan 3
 - b. Hasil uji daya hambat ekstrak tidak larut n-Heksan percobaan 1
 - c. Hasil uji daya hambat ekstrak tidak larut n-Heksan percobaan 2
 - d. Hasil uji daya hambat ekstrak tidak larut n-Heksan percobaan 3

ALAUDDIN
M A K A S S A R



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No. A.096/ KEPK/FKIK/XI/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : NURWAHIDAH
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK PARTISI LARUT n-HEKSAN, TIDAK LARUT n-HEKSAN DAN EKSTRAK METANOL DAUN SELEDRI (*Apium graveolens L.*) TERHADAP BAKTERI *Propionibacterium acnes*"


"ANTIBACTERIAL ACTIVITY TEST OF n-HEXAN SOLUTION PARTITION EXTRACTS, n-HEXANES Insoluble and Celery Leaf (*Apium graveolens L.*) METHANOL EXTRACT AGAINST *Propionibacterium acnes* BACTERIA"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 2 nov 2022 sampai dengan tanggal 2 Nov 2023

This declaration of ethics applies during the period November 2, 2022 until November 2, 2023

November 2, 2022
Professor and Chairperson,

DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

BIOGRAFI PENULIS



Nurwahidah dilahirkan di Apoang pada tanggal 13 November 1996. Bertempat tinggal di Apoang, Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis adalah anak pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Daliati dan Syahbuddin yang dibesarkan dari keluarga sederhana. Motto hidup penulis yaitu *“intelligence is not a measure of success, but by being smart we can reach success”* (Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi cerdas kita bisa menggapai kesuksesan).

Penulis mengawali pendidikan di TK Guppi Apoang selama 3 tahun, dan lanjut ke SDN 2 Apoang pada tahun 2003 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2009 melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Sendana, dan menyelesaikan pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan SMA di SMAN 2 Majene. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang diberi julukan “Kampus Peradaban” dengan memilih jurusan S1 Farmasi yang merupakan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di tahun 2015-selesainya skripsi ini dengan harapan membanggakan kedua orang tuanya sampai cita-cita mulianya terwujud.

“Alhamdulillah ‘ala kulli hal” adalah kalimat yang selalu terucap saat ini dan nanti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya terutama bagi penulisnya sendiri. Aamiin.