

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA DIARE DENGAN
DEHIDRASI RINGAN PADA AN "N" DI PUSKESMAS KO'MARA
KABUPATEN TAKALAR TANGGAL 20 JUNI - 20AGUSTUS
TAHUN 2022**



Karya Tulis Ilmiah

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya
Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh

RAHMATIA
NIM. 70400118070

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmatia
Nim : 70400118070
Tempat/tanggal lahir : Malolo 26 Juni 2000
Jurusan/prodi : D3 Kebidanan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Takalar
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Diare Dengan Dehidrasi Ringan Pada An "N" di Puskesmas Ko'mara Kabupaten Takalar Tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sepeuh hati bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar yang merupakan duplikat, plagiat seluruhnya atau sebagian orang lain, maka karya tulis ilmiah ini dan judul yang diperoleh darinya menjadi batal demi hukum.

Samata Gowa, 07 November 2022

Penyusun

Rahmatia
Nim. 70400118070

PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Rahmatia
Nim : 70400118070
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Diare Dengan Dehidrasi Ringan Pada An "N" di Puskesmas Ko'mara Kabupaten Takalar Tahun 2022

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata Gowa, 07 November 2022

Pembimbing I



Firdayanti, S. SIT, M.keb
Nip: 197511132006042001

Pembimbing II



dr. Darmawansyah, M. kes
Nip: 198502282011012000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH


Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Diare Dengan Dehidrasi Ringan Pada An "N" Di Puskesmas Ko'mara Kabupaten Takalar Tahun 2022.** Yang disusun oleh **Rahmatia Nim : 70400118070** Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Kamis 04 Oktober 2022**, bertepatan dengan **Tanggal 8 Rabiul Awal 1444 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 07 November 2022 M
08 Rabiul Awal 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes	(.....)
Sekretaris	: Zelna Yuni Andryani, S.ST., M. Keb	(.....)
Pembimbing I	: Firdayanti, S.SiT , M. Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Darmawansyih, M. Kes	(.....)
Penguji I	: Anieq Mumthi'ah Al kautzar, S.ST , M. Keb	(.....)
Penguji II	: Prof. Mukhtar Lutfi, M. Ag	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr.dr.Syatirah, Sp.A.,M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat bernilai ibadah di sisinya. Salam dan shalawat semoga terurshkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Diare Dengan Dehidrasi Ringan Pada AN ‘N’ di Puskesmas Komara Kabupaten Takalar Tahun 2022”. Karya ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan jurusan kebidanan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Uin Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis menyadari, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian. Oleh karena itu masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kesalahan yang ada. Maka dari itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih pada

1. Kepada orang tua dan saudara-saudara yang telah memberikan dukungan kepada saya baik dari segi materi maupun non materi, seperti piki, semangat, hiburan dan sebagainya dalam menyelesaikan tugas akhir karya tulis ilmiah ini.
2. Kepada bapak Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

3. Kepada ibu Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Kepada ibunda Firdayanti, S. SIT., M. Keb selaku ketua prodi kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5. Kepada ibunda Zelna Yuni Andryani, S.ST.,M. Keb selaku sekretaris prodi kebidnan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6. Kepada ibu Firdayanti, S.SIT., M. Keb selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan support arahan bagi penulis dalam memnyelesaikan karya tulis ilmiah ini
7. Kepada dr. Darmawansyih M. Kes selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu demi membantu, membimbing dan memberikan suppprt arahan bagu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
8. Kepada ibu Anieq Mumthi'ah Alkautzar S.ST., M.Keb selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini
9. Kepada Prof. Mukhtar Lutfi M. Ag selaku penguji agama yang senantiasa memberikan saya tambahan ilmu agama serta memberikan saya tambahan ilmu agama serta memberikan masukan dan saran yang bersifat islamiah pada karya tulis ilmiah ini sehingga penulis dapat mengetahui hubungan kasus yang penulis angkat dan kaitannya dengan islam.

10. Segenap dosen terkhususnya para dosen prodi kebidanan dan para staf akademik kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan bimbingan dan motivasi selama masa studi.
11. Kepada puskesmas dan petugas kesehatan puskesmas Ko'mara yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang di lakukan
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.
13. Kepada seluruh teman -temanku di kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan khususnya angkatan 2018

Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kesehatan.

Samata, 07 November 2022
Penyusun,

Rahmatia
NIM:70400118070

DAFTAR ISI


SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	11
C. Tujuan.....	12
D. Manfaat Penulisan.....	13
E. Metode Penulisan.....	14
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Konsep Dasar Pada Diare.....	16
1. Pengertian	16
2. Jenis-jenis Diare	18
3. Etiologi	22
4. Patofisiologi	26
5. Respon tubuh.....	29
6. Komplikasi	31
7. Penatalaksanaan	33
B. Proses Manajemen Asuhan kebidanan	36

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan	36
2. Tahapan dalam Asuhan Manajemen Asuhan Kebidanan.....	36
C. Pendokumentasian dalam Bentuk SOAP	42
D. Tinjauan Umum Penyakit pada Balita dengan Diare Menurut Pandangan Islam	45
BAB III STUDI KASUS	49
A. Manajemen Asuhan Kebidanan Balita Diare Dengan Dehidrasi Ringan di Puskesmas Ko'mara Kabupaten Takalar tanggal 20 Juni – 20 Agustus tahun 2022	49
i. Langkah I: Identifikasi Data Dasar	49
ii. Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual	53
iii. Langkah III: Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial	54
iv. Langkah IV: Perlunya Tindakan Segera Atau Kolaborasi	56
v. Langkah V: Rencana Tindakan	56
vi. Langkah VI: Implementasi Asuhan Kebidanan.....	59
vii. Langkah VII: Evaluasi Asuhan Kebidanan	60
B. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 21 Juni 2022	62
C. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 22 Juni 2022	66
D. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 28 Juni 2022	69
E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 05 Juli 2022	71
F. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Tanggal 25 Agustus 2022	73
BAB IV PEMBAHASAN.....	81
A. Langkah I. Identifikasi data dasar	81
B. Langkah II. Identifikasi diagnosa masalah aktual	84
C. Langkah III. Antisipasi diagnosa/masalah potensial	86
D. Langkah IV. Identifikasi Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi	88
E. Langkah V. Rencana Tindakan.....	89

F. Langkah VI. Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan	91
G. Langkah VII. Evaluasi Hasil Asuhan kebidanan	95
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

LAMPIRAN

PENDOKUMENTASIAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Dokumentasi saat dilakukan asuhan
- Lampiran II : Surat Permohonan Pengajuan Kode Etik
- Lampiran III : Surat Keterangan Layak Etik
- Lampiran IV : Surat permohonan izin Peneitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada
- Lampiran V : Permohonan Izin Penelitian Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Prov.Sul-Sel Cq. Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan
- Lampiran IV : Surat Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Bupati Takalar Kepada Puskesmas Ko'mara Kabupaten Takalar
- Lampiran VII : Surat Selesai Penelitian Dari Puskesmas Ko'mara Kabupaten Takalar
- Lampiran VIII: Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH TAHUN 2022

Rahmatia, 70400118070

Pembimbing I : Firdayanti, S.Si, T., M.Keb

Pembimbing II : dr. Darmawansyih M.Kes

Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Diare Dengan Dehidrasi Ringan Pada An "N" Di Puskesmas Ko'mara Kabupaten Takalar Tanggal 20 Juni - 20 Agustus Tahun 2022

Diare yaitu penyakit yang terjadi ketika terdapat perubahan konsistensi feses. Seseorang dikatakan menderita diare bila feses lebih berair dari biasanya, dan bila buang air besar lebih dari tiga kali, atau buang air besar yang berair tetapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam (Dinkes, 2016).

Hasil tindakan yang dilakukan pada nyonya "N" yaitu menganjurkan balita untuk istirahat yang cukup, jelaskan hal-hal yang dianggap penting pada ibu balita agar dapat mengetahui perkembangan kesehatan anak. Asuhan kebidanan yang diberikan berdasarkan 7 langkah varney pada anak P.A.R adalah beri oralit pada anak, jelaskan tanda bahaya umum, jelaskan pentingnya mengkonsumsi obat secara teratur sesuai dosis, anjurkan orang tua untuk menjaga personal hygiene anaknya, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup dan teratur, kompres anaknya, cuci bahan makanan mentah sebelum dimasak keadaan anak saat pulang setelah diberikan asuhan kebidanan selama 3 hari yaitu keadaan umum anak baik, kesadaran composmentis, mata tidak cekung, mukosa bibir lembab, perut tidak kembung, turgor kuli kembalinya cepat, TTV : S: 36,5°C, N: 87x/m, RR: 28x/m.

Kesimpulan dari hasil studi kasus asuhan kebidanan pada An "N" dengan kekurangan energi kronis di Puskesmas Ko'mara Kabupaten Takalar tanggal 20 Juni – 20 Agustus 2022 dengan hasil asuhan yang telah diberikan ditandai dengan semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan.

Kata Kunci : Diare Dehidrasi Ringan

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER, UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2022

Rahmatia, 70400118070

Supervisor I : Firdayanti, S.Si, T., M.Keb

Supervisor II : dr. Darmawansyih M.Kes

Management of Midwifery Care in Toddler Diarrhea with Mild Dehydration in An "N" at Ko'mara Health Center, Takalar Regency, 20 June -20 August 2022

Diarrhea is a common problem found throughout the world. In Indonesia in the 70s and 80s, the prevalence of diarrheal disease was around 200-400 per year. From this prevalence, 70-80% attacked children under five years of age (toddlers). This age group experience 2-3 episodes of diarrhea per year. It is estimated that child deaths due to diarrhea are around 200-250 thousand every year.

This scientific paper aims to implement diarrhea care management for toddlers in An "N" with mild dehydration at the Ko'mara health center in Takalar district using an approach to midwifery care management methods, namely 7 steps Varney and SOAP..

The results of the actions taken on An "N" are to encourage toddlers to get enough rest, explain things that are considered important to mothers of toddlers in order to know the development of children's health. Midwifery care provided based on the 7 steps of Varney for children P.A.R is giving ORS to children, explaining general danger signs, explaining the importance of taking medication regularly according to the dose, instructing parents to maintain their child's personal hygiene, eating nutritious food, taking adequate and regular rest. , compress the child, and wash raw food before cooking.

The conclusion from the results of the case study is that 7 steps of Varney and SOAP are used for the settlement process. The care showed that the mother gave milk so that the child's general condition was good, composmentis consciousness, the eyes were not sunken, the lip mucosa was moist, the stomach was not bloated, the skin turgor returned quickly and the TTV was within normal limits. carried out without any problems.

Keywords: Diarrhea in Toddlers with Mild Dehydration, Varney's 7 Steps



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diare adalah perubahan frekuensi dan konsistensi tinja. WHO pada tahun 1984 mendefinisikan diare sebagai berak cair tiga kali atau lebih dalam sehari semalam (24 jam). Para ibu mungkin mempunyai istilah tersendiri seperti lembek, cair, berdarah, berlendir, atau dengan muntah (muntaber). Penting untuk menanyakan kepada orangtua mengenai frekuensi dan konsistensi tinja anak yang dianggap sudah tidak normal lagi. Diare dibedakan menjadi dua waktu serangan (onset), yaitu diare akut (<2 minggu) dan diare kronik (>2 minggu) (Widoyono, 2011).

Diare merupakan salah satu penyakit yang berulang-ulang buang air besar yang sifatnya encer (cair). Bila seseorang dihindangi dan menderita penyakit ini ia akan sangat sering ke toilet untuk membuang hajat yang memang sifatnya cair dan tidak bisa ditahan-tahan. Diare merupakan suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi pada tinja, yang melembek atau mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari biasanya. Diare adalah buang air besar yang tidak normal atau bentuk tinja yang encer dengan frekuensi lebih banyak dari biasanya.

Neonatus dinyatakan diare bila frekuensi buang air besar sudah lebih dari 4 kali, sedangkan untuk bayi yang berumur lebih dari satu bulan dan anak bila frekuensinya lebih dari 3 kali Diare adalah penyakit yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi buang air besar lebih dari tiga kali sehari disertai

perubahan konsentrasi tinja menjadi lebih cair atau setengah padat dengan atau tanpa lendir atau darah Kemenkes RI (2014) (Kurniawati (2018).

Diare merupakan salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia. Penyakit diare salah satu penyebab kematian utama setelah penyakit infeksi saluran pernafasan, penyakit diare ini termasuk penyakit multifaktoral, dimana dapat muncul karena akibat tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang kurang serta akibat kebiasaan atau budaya masyarakat yang salah. Oleh karena itu keberhasilan menurunkan diare sangat tergantung dari sikap setiap anggota masyarakat, terutama membudayakan pemakaian oralit pada anak yang menderita diare (Maryunani, 2010).

Diare masih merupakan penyebab kematian bayi dan anak balita di negara berkembang termasuk Indonesia. Secara umum, anak di bawah umur 5 tahun mengalami diare setiap tahunnya dengan angka kematian mencapai 80%. Sebagian besar kematian disebabkan oleh dehidrasi. Diare pada anak, sebagian besar 85% adalah diare akut, 10% diare berlanjut dan 5% diare persisten. Diare akut umumnya merupakan penyakit self limited (Hegar, 2011).

Diare merupakan masalah umum ditemukan diseluruh dunia. Di Indonesia pada tahun 70 sampai 80-an, prevalensi penyakit diare sekitar 200-400 per tahun. Dari angka prevalensi tersebut, 70-80% menyerang anak dibawah usia lima tahun (balita). Golongan usia ini mengalami 2-3 episode diare per tahun. Diperkirakan kematian anak akibat diare sekitar 200-250 ribu setiap tahunnya.

Kasus diare masih merupakan penyebab kematian terbanyak pada anak-anak di dunia. Setiap tahunnya terjadi 4 milyar kasus diare dimana 88%

disebabkan oleh air yang tidak bersih dan setiap tahun 1,8 juta orang meninggal dunia karena penyakit diare, mayoritas adalah anak-anak dibawah usia 5 tahun Penyakit berbasis lingkungan masih mendominasi masalah kesehatan di Negara berkembang (Kartina, 2010).

Penyakit berbasis lingkungan bisa terjadi karena hubungan interaktif antara manusia dan perilakunya serta komponen lingkungan yang memiliki potensi penyakit. Penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang berbasis lingkungan. Diare adalah buang air besar dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair, dengan kandungan air pada tinja lebih banyak dari biasanya yaitu lebih dari 200 gram atau 200 ml/24 jam. Buang air besar encer tersebut dapat berisi atau tanpa disertai lendir dan darah. Diare bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering (biasanya tiga kali atau lebih) dalam satu hari (Kemenkes RI 2016).

Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Survei morbiditas oleh Depkes Indonesia terlihat kecenderungan insiden diare meningkat dari tahun 2000 sebesar 301/1000 penduduk dan tahun 2010 menjadi 411/1000 penduduk. Penyakit diare merupakan penyumbang utama ketiga angka kesakitan dan kematian anak diberbagai negara. Diperkirakan lebih dari 1,3 miliar serangan dan 3,2 juta kematian per tahun pada balita disebabkan karena balita terkena penyakit diare. Setiap anak biasanya mengalami serangan penyakit diare rata-rata 3,3 kali setiap tahun. Lebih kurang 80% kematian terjadi pada anak berusia kurang dari dua tahun (Arimbawa, 2016).

Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan tingginya angka kematian anak balita di Indonesia. Berdasarkan hasil survey demografi kesehatan Indonesia angka kematian anak lima tahun terakhir didapatkan sebagai berikut: angka kematian neonatum sebesar 15 per seribu kelahiran hidup, angka kematian bayi sebesar 24 per seribu kelahiran hidup, dan angka kematian balita sebesar 32 per seribu kelahiran hidup. Berdasarkan hasil survei, tingginya angka kematian anak balita rata-rata disebabkan sejumlah penyakit, seperti ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), panas tinggi hingga diare. Penanganan diare bagi balita jadi yang terparah. Sebab, dari 2.328 balita penderita diare, hanya 74 persen di antaranya yang telah mendapatkan pengobatan (Kemenkes RI, 2017).

Kejadian diare di negara berkembang antara 3,5-7 episode setiap anak pertahun dalam dua tahun pertama dan 2-5 episode pertahun dalam 5 tahun pertama kehidupan. Departemen kesehatan RI dalam surveinya tahun 2000 mendapatkan angka kesakitan diare sebesar 301/1000 penduduk, berarti meningkat dibanding survei tahun 1996 sebesar 280/1000 penduduk, diare masih merupakan penyebab kematian utama bayi dan balita. Hasil Surkesnas 2010 mendapatkan angka kematian bayi 9,4% dan kematian balita 13,2%. Beberapa faktor epidemiologis penting dipandang untuk mendekati pasien diare akut yang disebabkan oleh infeksi. Makanan atau minuman terkontaminasi, berpergian, penggunaan antibiotik, HIV positif atau AIDS, merupakan petunjuk penting dalam mengidentifikasi pasien beresiko tinggi untuk diare infeksi (Widoyono, 2011: 195).

Angka kematian diare di Indonesia masih sekitar 7,4% sedangkan angka kematian akibat diare persisten lebih tinggi 45%. Menurut survei kesehatan rumah tangga (SKRT 2004), angka kematian akibat diare 23 per 100.000 penduduk dan angka kematian akibat diare pada balita 75 per 100.000 balita. Insiden penyakit diare yang berkisar antara 200-374 dalam 1000 penduduk, dimana 60-70% diantaranya anak usia dibawah 5 tahun (Maryunani, 2010).

Di Indonesia diperkirakan ditemukan penderita diare sekitar 60 juta kejadian setiap tahunnya, sebagian besar (70-80%) dari penderita diare adalah anak dibawah umur 5 tahun. Anak-anak setiap tahunnya mengalami lebih dari satu kali kejadian diare. Sebagian dari penderita (1-2%) akan mengalami dehidrasi dan kalau tidak segera ditolong dapat meninggal (Suratmaja, 2011).

Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa angka kematian balita dan anak di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota Association South East Asia Nation (ASEAN) yakni 31/1.000 kelahiran, hanya lebih baik dibandingkan dengan Kamboja (97/1000) dan Laos (82/1000). Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lain, kita masih tertinggal. Singapura dan Malaysia memiliki Angka Kematian Balita (AKB) amat rendah, masing-masing 3 dan 7 per 1.000 kelahiran. Ini menunjukkan masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap masalah kesehatan yang dihadapi anak-anak (Lubis, 2010).

Diare telah menyebabkan kematian 25,5% anak usia satu tahun hingga empat tahun. Bahkan pada tahun 2008, diare merupakan penyumbang kematian bayi terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 31,4% dari total kematian bayi.

Penyebab kematian balita terbanyak adalah diare (25.2%). Sekitar 162.000 balita meninggal akibat diare setiap tahun atau sekitar 460 balita per hari. Jika dirata-rata, sebanyak 7,8 dari 1.000 balita meninggal karena diare setiap tahun. Sementara, dari hasil (SKRT) di Indonesia, diare merupakan penyebab kematian nomor dua pada balita, nomor tiga bagi pada bayi, dan nomor lima bagi semua umur. Setiap anak di Indonesia mengalami episode diare sebanyak 1,6-2 kali per tahun (Rikesdas, 2007).

Di Provinsi Sulawesi angka kesakitan diare tahun 2018 diperkirakan sebanyak 115.888 orang. Penderita diare yang mendapat pelayanan kesehatan di provinsi Sulawesi tahun 2018 sebanyak 68.142 orang atau (58,80%). Penderita diare pada balita yang mendapat pelayanan di sarana kesehatan tahun 2018 adalah 20.646 orang atau 37,87% dari perkiraan kasus diare pada balita sebanyak 54.518 balita. Kasus diare yang terjadi di Kabupaten Gianyar yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 5.526 kasus pada tahun 2018.

Penduduk Indonesia pada tahun 2012 telah melampaui 251 juta. Dan jumlah Balita tahun 2011 merupakan golongan penduduk terbanyak ketiga yaitu 23.512.851 juta (9,7%) dari jumlah penduduk. Jumlah kematian balita di Indonesia selama tahun 2011 mencapai 134 ribu, sebagai akibat dari kegagalan program kesehatan. Di Indonesia insiden diare masih cukup tinggi, yaitu sekitar 8% pada seluruh usia, dan insiden tertinggi terjadi pada kelompok usia balita yaitu sekitar 18,5% (Rikesdas, 2018). Di Indonesia, angka kejadian diare akut diperkirakan masih sekitar 60 juta setiap tahunnya dan angka kesakitan pada balita sekitar 200-400 kejadian dari 1000 penduduk setiap tahunnya dan 1- 5%

berkembang menjadi diare kronik. Jakarta Pusat memiliki presentase 9% dari angka keseluruhan penderita diare pada balita yaitu sekitar 22 ribu penderita diare (Kemenkes, 2016).

Kejadian diare dapat disebabkan karena faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor perilaku ibu sangat berperan dalam kejadian diare pada balita. Ibu adalah sosok yang paling dekat dengan balita. Jika balita terserang diare maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang tua terutama ibu akan menentukan perjalanan penyakitnya. Tindakan tersebut dipengaruhi berbagai hal, salah satunya adalah pengetahuan dan sikap penanganan kasus diare. Faktor langsung yang dapat menyebabkan diare adalah pengetahuan ibu, sikap ibu, riwayat pemberian ASI eksklusif, perilaku cuci tangan, dan hygiene sanitasi (IDAI, 2015).

Menurut Airani (2016) dan Kurniawati (2018) terdapat 2 faktor penyebab diare yang meliputi Faktor internal yaitu infeksi saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama pada diare pada anak. Dan Infeksi parenteral, yaitu infeksi di bagian tubuh lain di luar alat pencernaan seperti Otitis Media Acut (OMA), tonsilopringitic, broncopneumatic, ensefalitik, dan sebagainya. Keadaan ini terutama terdapat pada bayi dan anak berumur di bawah 2 tahun (Airani, 2016: 47) dalam Kurniawati (2018).

Penyebab diare dapat dikelompokkan menjadi: virus: *Rotavirus* (40-60%), *Adenovirus*; bakteri : *Escherichia coli* (20-30%), *Shigella* sp. (1-2%), *Vibrio cholerae*, dan lain-lain; parasit: *Entamoeba histolytica* (<1%), *Giardia lamblia*, *Cryptosporidium* (4-11%); keracunan makanan; malabsorpsi: karbohidrat, lemak, dan protein; alergi: makanan, susu sapi serta imunodefisiensi: AIDS (Widoyono,

2011: 195). Secara klinis penyebab diare dapat dikelompokkan dalam 6 golongan besar yaitu infeksi (disebabkan oleh bakteri, virus atau infestasi parasit), malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi dan sebab-sebab lainnya (Departemen Kesehatan RI, 2011).

Diare dapat menyebabkan penurunan gizi, oleh karena itu jika diare terjadi secara berulang kali menyebabkan penurunan berat badan. Pemberian nutrisi yang cukup saat anak diare sangat penting untuk mencegah terjadinya gangguan gizi pada anak. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri, virus atau parasit, malabsorpsi, alergi, keracunan, dan imunodefisiensi. Jika diare tidak ditangani dengan serius maka akan mengakibatkan dehidrasi dan malnutrisi (Rendi, 2014).

WHO menyatakan bahwa diare merupakan penyebab kematian balita nomor dua di dunia. Penyakit diare berkontribusi besar terhadap malnutrisi dan kematian anak. Diare dapat menyerang semua umur sehingga harus mendapat perhatian khusus karena jumlahnya yang masih tinggi. Berdasarkan data WHO tahun 2017, terdapat 1,7 juta kasus diare pada balita setiap tahun dan 525.000 (30,8%) diantaranya meninggal akibat diare.

Dampak dari penyakit diare ini dapat mempengaruhi terjadinya kematian, malnutrisi. Diare disebabkan oleh faktor cuaca, lingkungan, makanan. Perubahan iklim, kondisi lingkungan kotor dan kurang memperhatikan kebersihan makanan merupakan faktor utamanya. Penularan diare umumnya melalui 4F yaitu *food*, *fly*, *feces* dan *finger* (Ngastiyah, 2012). Pada balita dan anak, kejadian diare lebih berbahaya dibanding pada orang dewasa karena komposisi tubuh balita dan anak yang lebih banyak mengandung air dibanding dewasa. Jika terjadi diare,

balita dan anak lebih rentan mengalami dehidrasi yang dapat merujuk pada malnutrisi atau kematian (Nursalam, 2013).

Intervensi terbaik untuk diare adalah melakukan pencegahan. Orang tua memerlukan informasi tentang beberapa pencegahan seperti kebersihan pribadi, perlindungan, pasokan air yang bebas kontaminasi, serta adanya persiapan makanan yang bersih. Pencegahan diare meliputi kebersihan perineum, pembuangan popok kotor, cuci tangan yang tepat, serta melakukan isolasi terhadap orang yang terinfeksi juga dapat meminimalkan penularan infeksi diare (Hockenberry, 2016).

Pencegahan diare dapat dilakukan dengan pemberian vaksin yang dapat melindungi anak-anak dari beberapa penyakit terkait diare (Istiroha, 2016). Vaksin rotavirus diintegrasikan ke dalam program imunisasi nasional sejak tahun 2006 di Amerika Serikat, dan kemudian musim rotavirus tercatat lebih pendek, bersama dengan penurunan 46% tingkat rawat inap diare di antara anak-anak kurang dari 5 tahun (Kasem, 2017).

Anak usia *pre school* (4-6 tahun) berada dalam proses perkembangan, baik perkembangan nilai-nilai, fisik, kognitif, bahasa, maupun sosial dan emosional. Dalam usia *pre school* anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, mereka aktif, dinamis, antusias dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Periode ini adalah periode dimana anak sering bermain, hampir seluruh kegiatan pada usia *pre school* melibatkan permainan. Penyebaran penyakit infeksi dapat melalui tangan, kondisi tersebut akan berdampak terhadap tingginya kejadian infeksi pada anak khususnya infeksi yang menyebabkan

diare(Sukut, 2015).

Sampai saat ini penyakit diare juga sering disebut gastroenteritis, masih merupakan masalah masyarakat di Indonesia. Dari daftar urutan penyebab kunjungan pukesmas hampir termasuk dalam kelompok 3 penyebab kesakitan. Angka kesakitannya adalah sekitar 200-400 kejadian diare diantara 1000 penduduk setiap tahunnya(Suratmaja, 2010).

Kegiatan pencegahan penyakit diare yang benar dan efektif yang dapat dilakukan adalah kebersihan lingkungan. Mencucitangan sebelum makan dan setiap habisbermain, membiasakan anak defekasi toilet dan toilet harus bersih agar tidak ada lalat. Makanan harus selalu tertutup, air minum harus selalu di masak. Bila sedang berjangkit diare selain air harus bersih juga perlu di masak (Ngastiyah, 2012). Pencegahan diare yang efektif pada bayi yaitu dengan pemberian ASI eksklusif, menggunakan air bersih, mencuci tangan, membuang tinjayang baik dan benar, penyakit diare dapat di atasi dengan pemberian ASI secara benar, perilaku hidup bersih dan sehat, bersama- sama diberikan oralit secara bergantian (Suratmaja,2010).

Upaya pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat diare adalah peningkatan kualitas dan kuantitas tatalaksana penderita diare melalui pendekatan Managemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan pelembagaan pojok oralit, mengupayakan tatalaksana penderita diare di rumah tangga secara tepat dan benar, meningkatkan upaya pencegahan melalui Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), dan meningkatkan upaya kesehatan bersumber masyarakat, meningkatkan

sanitasi lingkungan serta peningkatan kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa diare (Depkes, 2011).

Pemutusan rantai penularan penyakit seperti diare sangat berhubungan dengan penyediaan fasilitas yang dapat menghalangi pencemaran sumber perantara oleh tinja serta menghalangi masuknya sumber perantara tersebut kedalam tubuh melalui mulut. Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun adalah perilaku amat penting bagi upaya mencegah diare. Kebiasaan mencuci tangan diterapkan setelah buang air besar, setelah menangani tinja anak, sebelum makan atau memberi makan anak dan sebelum menyiapkan makanan. Terutama yang berhubungan langsung dengan makanan anak seperti botol susu, cara menyimpan makanan serta tempat keluarga membuang tinja anak (Howard & Bartram, 2012).

Berdasarkan laporan data rekam medik puskesmas komara kecamatan polut kabupaten takalar tentang jumlah kasus diare pada balita pada tahun 2019 sebanyak 60 kasus dan pada tahun 2020 meningkat drastis sebanyak 65 kasus .dan pada tahun 2021 pada bulan januari sampai bulan november terdapat 72 kasus (Rekam Medik Puskesmas Komara Kecamatan Polut Kabupaten Takalar).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Manejemen Asuhan Kebidanan pada Balita dengan Diare Dehidrasi Ringan”.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini meliputi Bagaimana Asuhan Kebidanan pada Balita dengan Diare dehidrasi ringan tahun 2021 ?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mampu mendeskripsikan asuhan kebidanan pada anak dengan kasus Diare dehidrasi ringan.

2. Tujuan khusus

Adapun tujuan penulisan literature *review* asuhan pada kebidanan pada anak dengan kasus Diare dehidrasi ringan sebagai berikut:

- a. Didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai data subjektif dan data objektif dari tanda dan gejala pada balita dengan kasus Diare dehidrasi ringan
- b. Didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai diagnosis pada balita dengan kasus Diare dehidrasi ringan
- c. Didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai komplikasi yang bisa timbul pada balita dengan kasus Diare dehidrasi ringan
- d. Didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai kondisi emergensi yang dapat terjadi serta penanganan pada balita dengan kasus Diare dehidrasi ringan
- e. Didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai simpulan dari berbagai sumber tentang intervensi apa saja / penatalaksanaan yang tepat pada balita dengan kasus Diare dengan kekurangan energy kronis pada kasus diare dehidrasi ringan

- f. Didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan ke implementasi asuhan pada balita dengan kasus Diare dehidrasi ringan
- g. Didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber yang menjadi dasar evaluasi pada balita dengan kasus Diare dehidrasi ringan

D. Manfaat Penulisan

1. Pengembang Keilmuan

- a. Penulis Dapat menambah wawasan dan pengalaman nyata dalam memberikan asuhan kebidanan pada anak dengan diare dehidrasi ringan.
- b. Bagi Jurusan Kebidanan UIN Alauddin Makassar diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan oleh mahasiswa prodi D III Kebidanan untuk penelitian selanjutnya.

2. Institusi Pelayanan

- a. Institusi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi laporan kasus bagi pengembangan praktik kebidanan. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran untuk pengembangan ilmu dalam penelitian lebih lanjut dengan metode dan tempat yang berbeda untuk penerapan asuhan kebidanan pada anak dengan penyakit Diare dehidrasi ringan.

- b. Institusi Dinas Kesehatan Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam meningkatkan penerapan asuhan kebidanan pada anak dengan diare dehidrasi ringan.

E. Metode Penulisan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur, jurnal dan media internet yang berhubungan dengan Bagaimana asuhan kebidanan pada anak terhadap diare dehidrasi ringan.

F. Sistematika Penulisan


Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri dari bab I pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab II tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang konsep dasar diare, Jenis-jenis diare, factor terjadinya diare serta komplikasi terjadinya diare.

Kemudian pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan dalam memberikan asuhan kebidanan pada anak terhadap diare.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka. Bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Pada Diare

1. Pengertian

Diare pada dasarnya adalah frekuensi buang air besar yang lebih sering dari biasanya dengan konsistensi yang lebih encer. Diare merupakan gangguan buang air besar atau BAB ditandai dengan BAB lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi tinja cair, dapat disertai dengan darah dan atau lender (Risksdas, 2013).

Diare yaitu penyakit yang terjadi ketika terdapat perubahan konsistensi feses. Seseorang dikatakan menderita diare bila feses lebih berair dari biasanya, dan bila buang air besar lebih dari tiga kali, atau buang air besar yang berair tetapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam (Dinkes, 2016).

WHO (2009), mengatakan diare adalah suatu keadaan buang air besar (BAB) dengan konsistensi lembek hingga cair dan frekuensi lebih dari tiga kali sehari. Diare akut berlangsung selama 3-7 hari, sedangkan diare persisten terjadi selama ≥ 14 hari.

Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar, dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit, jumlah kasus diare seluruh Indonesia adalah sekitar 7 juta, dan paling banyak terjadi di provinsi Jawa Barat dengan 1,2 juta kasus. Diare juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling umum terjadi pada bayi dan anak-anak.

Di dunia diare merupakan masalah global yang menyebabkan kematian pada anak di bawah usia 5 tahun, sekitar 1,7 milyar kasus diare pada anak khususnya balita dan menyebabkan kematian sebanyak 760.000 balita di seluruh dunia yang tiap harinya kurang lebih sekitar 1.400 anak yang meninggal karena diare (WHO, 2013; Moraga, 2016). Di tahun 2016, diare sebagai penyebab kematian nomor 8, lebih dari 1,6 juta kematian. Lebih dari seperempat (26%) kematian diare pada anak usia sebelum 5 tahun, dan sekitar 37% kematian diare terjadi di Asia selatan dan Afrika (Moraga, 2016).

Biasanya diare hanya berlangsung beberapa hari (akut), namun pada sebagian kasus dapat memanjang hingga berminggu-minggu (kronis). Pada umumnya, diare tidak berbahaya jika tidak terjadi dehidrasi. Namun, jika disertai dehidrasi, penyakit ini bisa menjadi fatal, dan penderitanya perlu segera mendapat pertolongan medis.

Menurut Ayu Putri Ariani (2016) Diare Akut Adalah buang air besar dengan frekuensi yang meningkat dan konsistensi tinja yang lembek atau cair dan bersifat mendadak dan berlangsung kurang dari 2 minggu. Kelebihan Pada referensi terkait penjelasan sangat mudah dimengerti karena menggunakan bahasa yang dasar dan akan lebih mudah dimengerti oleh khalayak umum.

Oksriani Jufri Simampouw (2017) mengenai konsistensi tinja yang cair dan frekuensi yang lebih sering dari biasanya Diare merupakan suatu kondisi dimana individu mengalami buang air dengan frekuensi sebanyak 3 kali atau lebih dalam sehari dengan konsistensi tinja dalam bentuk cair. Referensi ini sejalan dengan Ayu Putri Ariani (2016)

Pengertian lain dari Kementerian kesehatan (2018) Diare adalah suatu kondisi dimana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering (biasanya tiga kali atau lebih) dalam satu hari. Diare terdiri dari 2 jenis yaitu diare akut dan diare persisten atau kronik. Ditunjukkan ketiga referensi ini memaparkan mengenai pengertian yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan Diare.

2. Jenis-Jenis Diare

Pedoman dari Laboratorium/ UPF Ilmu Kesehatan Anak, Universitas Airlangga dalam Nursalam (2008), diare dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Diare akut, yaitu diare yang terjadi mendadak dan berlangsung paling lama 3-5 hari.
- b. Diare berkepanjangan bila diare berlangsung lebih dari 7 hari. Diare kronik bila diare berlangsung lebih dari 14 hari.
- c. Diare kronik bukan suatu kesatuan penyakit, melainkan suatu sindrom yang penyebab dan patogenesisnya multikompleks. Mengingat banyaknya kemungkinan penyakit yang dapat mengakibatkan diare kronik dan banyaknya pemeriksaan yang harus dikerjakan maka dibuat tinjauan pustaka ini untuk dapat melakukan pemeriksaan lebih terarah.

Sedangkan menurut Wong (2008), diare dapat diklasifikasikan, sebagai berikut:

a. Diare akut

Merupakan penyebab utama keadaan sakit pada balita. Diare akut didefinisikan sebagai peningkatan atau perubahan frekuensi defekasi yang sering disebabkan oleh agens infeksius dalam traktus Gastroenteritis Infeksiosa (GI). Keadaan ini dapat menyertai infeksi saluran napas atau (ISPA) atau infeksi saluran kemih (ISK). Diare akut biasanya sembuh sendiri (lamanya sakit kurang dari 14 hari) dan akan mereda tanpa terapi yang spesifik jika dehidrasi tidak terjadi.

b. Diare kronis

Didefinisikan sebagai keadaan meningkatnya frekuensi defekasi dan kandungan air dalam feses dengan lamanya (durasi) sakit lebih dari 14 hari. Kerap kali diare kronis terjadi karena keadaan kronis seperti sindrom malabsorpsi, penyakit inflamasi usus, defisiensi kekebalan, alergi makanan, intoleransi laktosa atau diare nonspesifik yang kronis, atau sebagai akibat dari penatalaksanaan diare akut yang tidak memadai.

c. Diare intraktabel

Yaitu diare membandel pada bayi yang merupakan sindrom pada bayi dalam usia minggu pertama dan lebih lama dari 2 minggu tanpa ditemukannya mikroorganisme patogen sebagai penyebabnya dan bersifat resisten atau membandel terhadap terapi. Penyebabnya yang paling sering adalah diare infeksius akut yang tidak ditangani secara memadai.

d. Diare kronis nonspesifik

Diare ini juga dikenal dengan istilah kolon iritabel pada anak atau diare toddler, merupakan penyebab diare kronis yang sering dijumpai pada anak-anak yang berusia 6 hingga 54 minggu. Feses pada anak lembek dan sering disertai dengan partikel makanan yang tidak tercerna, dan lamanya diare lebih dari 2 minggu. Anakanak yang menderita diare kronis nonspesifik ini akan tumbuh secara normal dan tidak terdapat gejala malnutrisi, tidak ada darah dalam fesesnya serta tidak tampak infeksi enterik.

Tanda gejala Diare Akut dengan dehidrasi berat pada balita sangat khas, terlihat dari frekuensi, lama dan konsentrasi BAB. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitri Muji Rahayu (2017) yang mendapatkan hasil asuhan penelitian dimana Data subyektif pada keluhan utama pada responden I yaitu BAB cair 4 kali dalam sehari dan muntah 5 kali dalam sehari, anak rewel, serta panas malam hari dan keluhan responden ke II yaitu BAB cair lebih dari 4 kali sehari dan muntah diatas 5 kali perhari dan anak rewel. Pada data obyektif ditemukan tanda dehidrasi pada pemeriksaan fisik kasus I dan kasus II yaitu mata cekung, bibir kering, turgor kulit kembali lambat lebih dari 2 detik.

Menurut penelitian Widia Eka Susanti (2016) variabel dominan yang berhubungan dengan kejadian Diare pada balita adalah umur ibu, variabel pekerjaan ibu, pendapatan atau indeks kekayaan, kepadatan hunian dan jenis kelamin. Orang tua dengan pendapatan yang rendah menyanggupi kebutuhan nutrisi pada bayi seadanya sementara kepadatan hunian terlihat pada pembuangan limbah rumah tangga yang terlalu dekat dengan sumber air. Kelebihan dari

penelitian ini terlihat pada responden yang sangat besar dari variabel penilaian yang cukup.

Pengetahuan ibu bukan salah satu penyebab dari Diare akut pada balita (Silvia Rane dkk, 2017). Dengan teknik pengisian kuisisioner penulis dapat menilai 2 hal sekaligus yaitu Diare dengan pengetahuan, dan menilai tingkat pendidikan orang tua dari segi cara pengisian kuisisioner. Keterangan sampel yang dipaparkan cukup banyak, tetapi pada penggunaan metode penelitian tidak diuraikan alasan mengenai penggunaan metode penelitian.

Penelitian lain yang sama dengan hasil Silvia Rane, dkk adalah penelitian dari Novita Tri Wahyuni, dkk (2018) bahwa hal dominan penyebab diare akut adalah penggunaan botol susu, MP ASI secara dini dan kebiasaan cuci tangan. Pengetahuan ibu bukan merupakan salah satu penyebab, pemberian ASI eksklusif dan sumber air bersih yang digunakan. Kelebihan yang didapatkan adalah banyaknya sampel yang digunakan yaitu 3.292 sampel. Tetapi variabel bebas yang dinilai juga cukup banyak, jika sampel yang banyak dan fokus pada satu atau dua penilaian variabel bebas maka hasilnya juga akan maksimal.

Berbeda dengan Ika Choirin Nisa (2019), hasil yang didapatkan adalah semakin minim pengetahuan seorang ibu maka akan semakin besar dampak anak balitanya terkena diare akut. Menggunakan sebesar 420 sampel yang sesuai dengan metode penelitian untuk meneliti keadaan sosial.

Hal ini diungkapkan sama oleh Susi Hartati (2018), ada hubungan pengetahuan orang tua, cuci tangan dengan sabun BAB dengan kejadian diare

akut pada balita. Tetapi kelemahannya terdapat pada sampel yang terbilang sedikit yaitu 195 sampel yang digunakan untuk menilai 3 variabel bebas.

Dari keadaan lingkungan yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan bakteri, Perawati dkk (2018) mendapati kondisi air yang dikonsumsi Ketersediaan SPAL dan penggunaan jamban berpengaruh menimbulkan Diare akut pada balita. Penelitian survey analitik sangat sesuai untuk digunakan sehubungan dengan keadaan variabel penilaian yang bersifat *surveillance*. Kelemahan terletak pada langkah penanganan ataupun edukasi tidak diberikan tetapi harusnya bisa diberikan pada saat dilakukan survey.

3. Etiologi

Ngastiyah (2014), mengatakan diare dapat disebabkan oleh berbagai infeksi, selain penyebab lain seperti malabsorpsi. Diare sebenarnya merupakan salah satu gejala dari penyakit pada sistem gastrointestinal atau penyakit lain di luar saluran pencernaan. Tetapi sekarang lebih dikenal dengan “penyakit diare”, karena dengan sebutan penyakit diare akan mempercepat tindakan penanggulangannya. Penyakit diare terutama pada bayi perlu mendapatkan tindakan secepatnya karena dapat membawa bencana bisa terlambat. Faktor penyebab diare, antara lain :

a. Faktor Infeksi

- 1) Infeksi enteral; infeksi saluran pencernaan makanan yang merupakan penyebab utama diare pada anak. Meliputi infeksi enteral sebagai berikut :
 - a) Infeksi bakteri : *Vibrio*, *E.Coli*, *Salmonella*, *Shigella*,.

b) Infeksi virus: Enterovirus (virus ECHO, Coxsackie, Poliomyelitis) cacing (Ascaris, Trichuris, Oxyuris, Strongyloides); protozoa (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Trichomonas hominis); jamur (Candida albicans)

c) Infeksi parasit: cacing (Ascaris, Trichuris, Oxyuris, Strongyloides); protozoa (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Trichomonas hominis); jamur (Candida albicans)

2) Infeksi parenteral ialah infeksi di luar alat pencernaan makanan seperti: otitis media akut (OMA) , tonsilitis/ tonsilofaringitis, bronkopneumonia, ensefalitis, dan sebagainya. Keadaan ini terutama terdapat pada bayi dan anak berumur di bawah 2 tahun.

b. Faktor malabsorpsi

1) Malabsorpsi karbohidrat: disakarida (intoleransi laktosa, maltosa dan sukrosa); monosakarida (intoleransi glukosa, fruktosa, dan galaktosa). Pada bayi dan anak yang terpenting dan tersering (intoleransi laktosa).

2) Malabsorpsi lemak.

3) Malabsorpsi protein.

c. Faktor makanan, makanan basi, beracun, alergi terhadap makanan.

d. Faktor psikologis, rasa takut dan cemas (jarang, tetapi dapat terjadi pada anak yang lebih besar).

Selain kuman, ada beberapa perilaku yang dapat meningkatkan resiko terjadinya diare, yaitu :

- a) Tidak memberikan ASI secara penuh untuk 4-6 bulan pertama dari kehidupan.
- b) Menggunakan botol susu.
- c) Menyimpan makanan masak pada suhu kamar.
- d) Air minum tercemar dengan bakteri tinja.
- e) Tidak mencuci tangan sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja, atau sebelum menjajajah makanan. Menurut Wong (2008), penyebab infeksius dari diare akut yaitu :

1. Agens virus

- a. Rotavirus, masa inkubasi 1-3 hari. Anak akan mengalami demam (38°C atau lebih tinggi), nausea atau vomitus, nyeri abdomen, disertai infeksi saluran pernapasan atas dan diare dapat berlangsung lebih dari 1 minggu. Biasanya terjadi pada bayi usia 6-12 bulan, sedangkan pada anak terjadi di usia lebih dari 3 tahun.
- b. Mikroorganisme, masa inkubasi 1-3 hari. Anak akan demam, nafsu makan terganggu, malaise. Sumber infeksi bisa didapat dari air minum, air di tempat rekreasi (air kolam renang, dll), makanan. Dapat menjangkit segala usia dan dapat sembuh sendiri dalam waktu 2-3 hari.

2. Agens bakteri

- a. *Escherichia coli*, masa inkubasinya bervariasi bergantung pada strainnya. Biasanya anak akan mengalami distensi abdomen, demam, vomitus, BAB berupa cairan berwarna hijau dengan darah atau mukus bersifat menyembur. Dapat ditularkan antar individu, disebabkan karena daging yang kurang matang, pemberian ASI tidak eksklusif.
- b. Kelompok salmonella (nontifoid), masa inkubasi 6-72 jam untuk gastroenteritis. Gejalanya bervariasi, anak bisa mengalami mual atau vomitus, nyeri abdomen, demam, BAB kadang berdarah dan ada lendir, peristaltik hiperaktif, nyeri tekan ringan pada abdomen, sakit kepala, kejang. Dapat disebabkan oleh makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh binatang seperti kucing, burung, dan lainnya.

3. Keracunan makanan

- a. *Staphylococcus*, masa inkubasi 4-6 jam. Dapat menyebabkan kram yang hebat pada abdomen, syok. Disebabkan oleh makanan yang kurang matang atau makanan yang disimpan di lemari es seperti puding, mayones, makanan yang berlapis krim.
- b. *Clostridium perfringens*, masa inkubasi 8-24 jam. Dimana anak akan mengalami nyeri epigastrium yang bersifat kram dengan intensitas yang sedang hingga berat. Penularan bisa lewat produk makanan komersial yang paling sering adalah daging dan unggas.

- c. *Clostridium botulinum*, masa inkubasi 12-26 jam. Anak akan mengalami nausea, vomitus, mulut kering, dan disfagia. Ditularkan lewat makanan yang terkontaminasi.

4. Patofisiologi

Hidayat (2008), mengatakan proses terjadinya diare dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan faktor diantaranya:

- a. Faktor infeksi

- 1). Virus

Penyebab tersering diare pada balita adalah disebabkan infeksi *rotavirus*. Setelah terpapar dengan agen tertentu, virus akan masuk ke dalam tubuh bersama dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang kemudian melekat pada sel-sel mukosa usus, akibatnya sel mukosa usus menjadi rusak yang dapat menurunkan daerah permukaan usus. Sel-sel mukosa yang rusak akan digantikan oleh sel enterosit baru yang berbentuk kuboid atau sel *epitel* gepeng yang belum matang sehingga fungsi sel-sel ini masih belum bagus. Hal ini menyebabkan *vili-vili* usus halus mengalami *atrofi* dan tidak dapat menyerap cairan dan makanan dengan baik. Selanjutnya, terjadi perubahan kapasitas usus yang akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi usus dalam absorpsi cairan dan elektrolit. Atau juga dikatakan adanya toksin bakteri atau virus akan menyebabkan sistem transpor aktif dalam usus sehingga sel mukosa mengalami iritasi yang kemudian sekresi cairan dan elektrolit akan meningkat.

2). Bakteri

Bakteri pada keadaan tertentu menjadi invasif dan menyerbu ke dalam mukosa, terjadi perbanyakan diri sambil membentuk toksin. Enterotoksin ini dapat diresorpsi ke dalam darah dan menimbulkan gejala hebat seperti demam tinggi, nyeri kepala, dan kejang-kejang. Selain itu, mukosa usus yang telah dirusak mengakibatkan mencret berdarah berlendir. Penyebab utama pembentukan enterotoksin ialah bakteri *Shigella* sp, *E.coli*. diare ini bersifat self-limiting dalam waktu kurang lebih lima hari tanpa pengobatan, setelah sel-sel yang rusak diganti dengan sel-sel mukosa yang baru (Wijoyo, 2013).

b. Faktor malabsorpsi,

1). Gangguan osmotik

Cairan dan makanan yang tidak dapat diserap akan terkumpul di usus halus dan akan meningkatkan tekanan osmotik usus. Akibatnya akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat. Gangguan osmotik meningkat menyebabkan terjadinya pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Hal ini menyebabkan banyak cairan ditarik ke dalam lumen usus dan akan menyebabkan terjadinya *hiperperistaltik* usus. Cairan dan makanan yang tidak diserap tadi akan didorong keluar melalui anus dan terjadilah diare (Nursalam, 2008).

2). Gangguan sekresi

Akibat rangsangan tertentu (misalnya toksin) pada dinding usus akan terjadi peningkatan sekresi, air dan elektrolit ke dalam rongga usus dan

selanjutnya timbul diare karena terdapat peningkatan isi rongga usus (Nursalam, 2008).

3). Gangguan motilitas usus

Hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan sehingga timbul diare. Sebaliknya bila peristaltik usus menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan, selanjutnya timbul diare pula. Akibat dari diare yaitu kehilangan air dan elektrolit yang dapat menyebabkan cairan ekstraseluler secara tiba-tiba cepat hilang, terjadi ketidakseimbangan elektrolit yang mengakibatkan syok hipovolemik dan berakhir pada kematian jika tidak segera diobati (Nursalam, 2008).

c. Faktor makanan

Ini dapat terjadi apabila toksin yang ada tidak mampu diserap dengan baik. Sehingga terjadi peningkatan peristaltik usus yang mengakibatkan penurunan kesempatan untuk menyerap makanan yang kemudian menyebabkan diare (Hidayat, 2008). Diare akut berulang dapat menjurus ke malnutrisi energi protein, yang mengakibatkan usus halus mengalami perubahan yang disebabkan oleh PEM tersebut menjurus ke defisiensi enzim yang menyebabkan absorpsi yang tidak adekuat dan terjadilah diare berulang yang kronik. Anak dengan PEM terjadi perubahan respons imun, menyebabkan reaksi hipersensitivitas kulit terlambat, berkurangnya jumlah limfosit dan jumlah sel T yang beredar.

Setelah mengalami gastroenteritis yang berat anak mengalami malabsorpsi. Malabsorpsi juga terdapat pada anak yang mengalami malnutrisi, keadaan malnutrisi menyebabkan atrofi mukosa usus, faktor infeksi silang usus

yang berulang menyebabkan malabsorpsi, enteropati dengan kehilangan protein. Enteropati ini menyebabkan hilangnya albumin dan imunoglobulin yang mengakibatkan kwashiorkor dan infeksi jalan nafas yang berat (Suharyono, 2008).

d. Faktor psikologis

Faktor ini dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan peristaltik usus yang akhirnya mempengaruhi proses penyerapan makanan yang dapat menyebabkan diare. Proses penyerapan terganggu (Hidayat, 2008).

5. Respon Tubuh

1) Sistem Integumen

Anak yang mengalami diare dengan dehidrasi ringan hingga berat turgor kulit biasanya kembali sangat lambat. Karena tidak kuatnya kebutuhan cairan dan elektrolit pada jaringan tubuh anak sehingga kelembapan kulitpun menjadi berkurang.

2) Sistem Respirasi

Kehilangan air dan elektolit pada anak yang diare mengakibatkan gangguan keseimbangan asam basa menyebabkan pH turun karena akumulasi asam non-volatil. Terjadilah hiperventilasi yang akan menurunkan $p\text{CO}_2$ menyebabkan pernapasan jadi cepat, dan dalam (pernapasan kusmaul).

3) Sistem Pencernaan

Anak yang diare biasanya mengalami gangguan pada nutrisi, yang disebabkan oleh kerusakan mukosa usus dimana usus tidak dapat menyerap makanan. Anak akan tampak lesu, malas makan, dan letargi.

Nutrisi yang tidak dapat diserap mengakibatkan anak bisa mengalami gangguan gizi yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan berat badan dan menurunnya daya tahan tubuh sehingga proses penyembuhan akan lama.

4) Sistem Muskuloskeletal

Kekurangan kadar natrium dan kalium plasma pada anak yang diare dapat menyebabkan nyeri otot, kelemahan otot, kram dan detak jantung sangat lambat.

5) Sistem Sirkulasi

Akibat dari diare dapat terjadi gangguan pada sistem sirkulasi darah menyebabkan nadi melemah, tekanan darah rendah, kulit pucat, akral dingin yang mengakibatkan terjadinya syok hipovolemik.

6) Sistem Otak

Syok hipovolemik dapat menyebabkan aliran darah dan oksigen ke otak berkurang. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran dan bila tidak segera ditolong dapat mengakibatkan kematian.

7) Sistem Eliminasi

Warna tinja anak yang mengalami diare makin lama berubah kehijauan karena bercampur dengan empedu. Anus dan daerah sekitarnya akan lecet karena sering defekasi dan tinja yang makin asam sebagai akibat makin banyaknya asam laktat yang berasal dari laktosa yang tidak dapat diabsorpsi oleh usus selama diare.

6. Komplikasi

Menurut Suharyono dalam Nursalam (2008), komplikasi yang dapat terjadi dari diare akut maupun kronis, yaitu:

1). Kehilangan air dan elektrolit (terjadi dehidrasi)

Kondisi ini dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan asam basa (asidosis metabolik), karena:

- a. Adanya ketosis kelaparan dan metabolisme lemak yang tidak sempurna, sehingga benda keton tertimbun dalam tubuh.
- b. Terjadi penimbunan asam laktat karena adanya anoksia jaringan.
- c. Produk metabolisme yang bersifat asam meningkat karena tidak dapat dikeluarkan oleh ginjal (terjadi oliguri dan anuria).
- d. Pemindahan ion natrium dan cairan ekstraseluler ke dalam cairan intraseluler.

Secara klinis, bila pH turun oleh karena akumulasi beberapa asam non-volatil, maka akan terjadi hiperventilasi yang akan menurunkan $p\text{CO}_2$ menyebabkan pernafasan bersifat cepat, teratur, dan dalam (pernafasan kusmaul) (Suharyono, 2008).

2). Hipoglikemia

Hipoglikemia terjadi pada 2-3% dari anak-anak yang menderita diare dan lebih sering terjadi pada anak yang sebelumnya sudah menderita kekurangan kalori protein (KKP), karena :

- a. Penyimpanan persediaan glycogen dalam hati terganggu.

- b. Adanya gangguan absorpsi glukosa (walaupun jarang terjadi).

Gejala hypoglikemia akan muncul jika kadar glukosa darah menurun sampai 40% pada bayi dan 50% pada anak-anak. Hal tersebut dapat berupa lemas, apatis, peka rangsang, tremor, berkeringat, pucat, syok, kejang sampai koma.

3). Gangguan gizi

Sewaktu anak menderita diare, sering terjadi gangguan gizi sehingga terjadi penurunan berat badan. Hal ini disebabkan karena:

- a. Makanan sering dihentikan oleh orang tua karena takut diare atau muntahnya akan bertambah hebat, sehingga orang tua hanya sering memberikan air teh saja.
- b. Walaupun susu diteruskan, sering diberikan dengan pengenceran dalam waktu yang terlalu lama.
- c. Makanan diberikan sering tidak dapat dicerna dan diabsorpsi dengan baik karena adanya hiperperistaltik.

4). Gangguan Sirkulasi

Sebagai akibat diare dengan atau tanpa disertai muntah, maka dapat terjadi gangguan sirkulasi darah berupa renjatan atau syok hipovolemik. Akibat perfusi jaringan berkurang dan terjadinya hipoksia, asidosis bertambah berat sehingga dapat mengakibatkan perdarahan di dalam otak, kesadaran menurun, dan bila tidak segera ditolong maka penderita dapat meninggal.

5). Hiponatremia

Anak dengan diare yang hanya minum air putih atau cairan yang hanya mengandung sedikit garam, dapat terjadi hiponatremi ($\text{Na} < 130 \text{ mol/L}$). Hiponatremi sering terjadi pada anak dengan Shigellosis dan pada anak malnutrisi berat dengan oedema. Oralit aman dan efektif untuk terapi dari hampir semua anaka dengan hiponatremi. Bila tidak berhasil, koreksi Na dilakukan bersamaan dengan koreksi cairan rehidrasi yaitu: memakai Ringer Laktat atau Normal Saline (Juffrie, 2010).

7. Penatalaksanaan

a. Penatalaksanaan Medis

1. Dehidrasi sebagai prioritas utama pengobatan. Empat hal penting yang perlu diperhatikan
2. Jenis cairan
 - Oral : pedialyte atau oralit, Ricelyte
 - Parenteral : NaCl, Isotonic, infuse
3. Jumlah cairan yang diberikan sesuai dengan cairan yang dikeluarkan.
4. Jalan masuk atau cara pemberian.
 - a) Cairan per oral

Pada pasien dengan dehidrasi ringan dan sedang cairan diberikan per oral berupa cairan yang berisikan NaCl dan NaHCO_3 , KCL dan glukosa.

b) Cairan parenteral

Pada umumnya cairan Ringer Laktat (RL) selalu tersedia di fasilitas kesehatan dimana saja. Mengenai seberapa banyak cairan yang diberikan tergantung dari berat ringannya dehidrasi, yang diperhitungkan dengan kehilangan cairan sesuai dengan umur dan berat badannya.

5. Jadwal pemberian cairan. Diberikan 2 jam pertama, selanjutnya dilakukan penilaian kembali status hidrasi untuk menghitung kebutuhan cairan.

Untuk balita dibawah 1 tahun dan balita diatas 1 tahun dengan berat badan kurang dari 7 kg jenis makanan:

- (1) Susu (ASI atau susu formula yang mengandung laktosa rendah dan asam lemak tidak jenuh, misalnya LLM, Almiron atau sejenis lainnya).
- (2) Makanan setengah padat (bubur) atau makanan padat (nasi tim), bila anak tidak mau minum susu karena dirumah tidak biasa.
- (3) Susu khusus yang disesuaikan dengan kelainan yang ditemukan misalnya susu yang tidak mengandung laktosa atau asam lemak yang berantai sedang atau tidak jenuh (Ngastiyah, 2014).

b. Penatalaksanaan Kebidanan

- 1) Bila dehidrasi masih ringan

Berikan minum sebanyak-banyaknya, 1 gelas setiap kali setelah pasien defekasi. Cairan harus mengandung eletrolit, seperti oralit. Bila tidak ada oralit dapat diberikan larutan gula garam dengan 1 gelas air matang yang agak

dingindilarutkan dalam 1 sendok teh gula pasir dan 1 jumptu garam dapur. Jika anak terus muntah atau tidak mau minum sama sekali perlu diberikan melalui sonde. Bila pemberian cairan per oral tidak dapat dilakukan, dipasang infus dengan cairan Ringer Laktat (RL) atau cairan lain (atas persetujuan dokter). Yang penting diperhatikan adalah apakah tetesan berjalan lancar terutama pada jam-jam pertama karena diperlukan untuk segera mengatasi dehidrasi.

2) Pada dehidrasi berat

Selama 4 jam pertama tetesan lebih cepat. Untuk mengetahui kebutuhan sesuai dengan yang diperhitungkan, jumlah cairan yang masuk tubuh dapat dihitung dengan cara:

- a) Jumlah tetesan per menit dikalikan 60, dibagi 15/20 (sesuai set infus yang dipakai). Berikan tanda batas cairan pada botol infus waktu memantaunya.
- b) Perhatikan tanda vital : denyut nadi, pernapasan, suhu.
- c) Perhatikan frekuensi buang air besar anak apakah masih sering, encer atau sudah berubah konsistensinya.
- d) Berikan minum teh atau oralit 1-2 sendok jam untuk mencegah bibir dan selaput lendir mulut kering.
- e) Jika rehidrasi telah terjadi, infus dihentikan, pasien diberi makan lunak atau secara realimentasi.

B. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Proses manajemen ini terdiri dari 7 langkah berurutan dimana disetiap langkah disempurnakan secara periodik, proses ini dimulai dari pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Dengan adanya proses manajemen asuhan kebidanan ini maka mudah kita dapat mengenali dan mengidentifikasi masalah selanjutnya, merencanakan dan melaksanakan suatu asuhan yang aman dan efektif.

2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan terdiri dari beberapa langkah yang berurutan yang dimulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Langkah langkah tersebut membentuk kerangka yang lengkap yang bisa diaplikasikan dalam semua situasi. Akan tetapi, setiap langkah tersebut bisa dipecah-pecah ke dalam tugas-tugas tertentu dan semuanya bervariasi sesuai dengan kondisi klien.

Berikut langkah-langkah dalam proses penatalaksanaan menurut *Varnay*. Adapun tahapan manajemen asuhan kebidanan menurut langkah *Varney* adalah sebagai berikut:

a. Langkah I (Pengumpulan data dasar)

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien untuk

memperoleh hasil anamnesa dengan klien mengenai frekuensi BAB, Diare pada dasarnya adalah frekuensi buang air besar yang lebih sering dari biasanya dengan konsistensi yang lebih encer. Gangguan buang air besar atau BAB ditandai dengan BAB lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi tinja cair, dapat disertai dengan darah dan atau lender

Kedua, yaitu akan didapatkan data objektif dengan melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhannya seperti pemeriksaan tingkat derajat dehidrasi yang dilihat dari keadaan umum, mata, mulut, lidah, berat badan dan turgo kulit serta melakukan pemeriksaan laboratorium pada balita. Pemeriksaan laboratorium bertujuan untuk memeriksa keberadaan darah, gula, lemak, mikroorganisme penyebab infeksi, cairan empedu, dan sel darah putih, serta untuk mengukur tingkat keasaman pada sampel tinja.

b. Langkah II (Merumuskan diagnosa aktual)

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan, sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik.

Diagnosa diare dapat ditegakka apabila Anak yang mengalami diare akan mengalami kondisi berupa hilangnya sejumlah cairan dan elektrolit yang ada dalam tubuh karena muntah dan feses yang cair. Selain itu, anak yang mengalami diare juga akan mengalami dehidrasi, mulai dari dehidrasi ringan

hingga dehidrasi berat, bahkan sampai dapat terjadi kematian (Sudarmoko, 2017).

Dehidrasi ini yang sebenarnya patut lebih diperhatikan. Pada penyakit diare dehidrasi ringan merupakan kondisi dimana berat badan anak yang akan mengalami penurunan 0-5%. Dalam kondisi ini, umumnya kelopak mata masih normal, anak masih aktif, dan keinginan untuk minum masih normal karena rasa haus tidak meningkat. Namun demikian, frekuensi buang air kecil (BAK) menjadi lebih sering dan meningkat dari biasanya. Bahkan warna urinya lebih gelap dari biasanya (Sudarti, 2018).

c. Langkah III (Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial yang Membutuhkan Antisipasi Masalah Potensial)

Pada langkah ini kita mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial yang berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Langkah ini sangat penting dalam melakukan asuhan yang aman.

Anak yang mengalami diare akan mengalami kondisi berupa hilangnya sejumlah cairan dan elektrolit yang ada dalam tubuh karena muntah dan feses yang cair. Selain itu, anak yang mengalami diare juga akan mengalami

dehidrasi, mulai dari dehidrasi ringan hingga dehidrasi berat, bahkan sampai dapat terjadi kematian.

d. Penetapan kebutuhan/tindakan segera

Pada langkah ini Bidan dan dokter melakukan identifikasi yang memungkinkan terjadi untuk melakukan kolaborasi dan tindakan segera bersama tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi pasien

Kejadian diare jika tidak di atasi segera maka memungkinkan untuk terjadinya dehidrasi berat, penurunan tekanan darah, hipokalemia, hipoglikemia, intoleransi laktosa sekunder, kejang dan malnutrisi energi protein.

e. Intervensi/ Perencanaan tindakan asuhan kebidanan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya dan merupakan lanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diadaptasi. Setiap rencana asuhan harus disertai oleh klien dan bidan agar dapat melaksanakan dengan efektif.

Pada langkah ini tindakan yang dilakukan adalah anamnesa mengenai frekuensi BAB, observasi, penilaian keadaan umum, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan tanda-tanda vital (TTV). tambahkan makanan yang mengandung tinggi karbohidrat, kaji warna kulit anak, tingkat kesadaran dan membran mukosa dan ajarkan pasien atau keluarga pasien tujuan dan penggunaan setiap obat yang diprogramkan (misalnya, antiemetik atau anti diare), berikan

penyuluhan gizi, perlunya minum tablet zatbesi, makanan yang mengandung protein dan kaya vitamin C, akan tetapi pemberian vitamin C yang berlebihan dapat memicu terjadinya diare pada balita serta menjelaskan dan memotifasi ibu untuk menjaga personal hygiene anaknya. Dengan personal hygiene yang baik dapat mencegah bakteri, virus dan parasit penyebab diare.

f. Implementasi/ pelaksanaan asuhan

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan ataupun bekerja sama dengan kesehatan lain. Bidan harus melakukan implementasi yang efisien dan akan mengurangi waktu perawatan serta akan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan klien.

Pada langkah keenam ini rencana Asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah 5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian lagi oleh klien, atau anggota tim kesehatan yang lain. Jika bidan tidak melakukan sendiri ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. (Misalnya memastikan agar langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana).

Menganjurkan balita untuk istirahat yang cukup, jelaskan hal-hal yang dianggap penting pada ibu balita agar dapat mengetahui perkembangan kesehatan anak. Jelaskan penyebab terjadinya diare. Kemudian melakukan

evaluasi kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan.

Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter, untuk menangani klien yang mengalami komplikasi maka keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan biaya serta meningkatkan mutu dan asuhan klien.

g. Evaluasi

Mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan asuhan yang diberikan kepada klien. Pada tahap evaluasi ini bidan harus melakukan pengamatan dan observasi terhadap masalah yang dihadapi klien, apakah masalah diatasi seluruhnya, sebagian telah dipecahkan atau mungkin timbul masalah baru. Pada prinsipnya tahapan evaluasi adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan sejauh mana tercapainya rencana yang dilakukan.

Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaan . ada

kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedang sebagian belum efektif.

C. Pendokumentasian dalam Bentuk SOAP

Pendokumentasian yang benar adalah pendokumentasian mengenai asuhan yang telah dan akan dilakukan pada seorang pasien. Menurut *Varney*, didalamnya tersirat proses berfikir bidan yang sistematis dalam menghadapi seorang pasien sesuai langkah-langkah manajemen kebidanan maka didokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu :

1. Data Subjektif (S)

Data subjektif (S) merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut *Varney* langkah pertama (pengkajian data), terutama data yang diperoleh melalui *anamnesis*. Data Subjektif ini berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis. Berdasarkan teori data subjektif yang diperoleh pada balita terhadap diare akan merasakan sakit perut atau mencret dan dapat menyebabkan anemia berlebihan.

2. Data Objektif (O)

Data Objektif (O) merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut *Helen Varney* pertama (pengkajian data), terutama data yang diperoleh melalui hasil observasi yang jujur dari pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan diagnostik lain. Catatan medik dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimaksudkan dalam data objektif ini. Adapun data

objektif pada balita dengan diare akut yaitu, Tanda gejala Diare Akut dengan dehidrasi berat pada balita sangat khas, terlihat dari frekuensi, lama dan konsentrasi BAB.

3. Assessment (A)

Assessment (A), merupakan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif. Dalam pendokumentasian manajemen kebidanan, karena keadaan pasien yang setiap saat bisa mengalami perubahan, dan akan ditemukan informasi baru dalam data subjektif maupun data objektif, maka proses pengkajian data akan menjadi sangat dinamis. Hal ini juga menuntut bidan untuk sering melakukan analisis data yang dinamis tersebut dalam rangka mengikuti perkembangan pasien dan analisis yang tepat dan akurat mengikuti perkembangan data pasien akan menjamin cepat diketahuinya perubahan pada pasien, dapat terus diikuti dan diambil keputusan/tindakan yang tepat. *Assessment* merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah kedua, ketiga, dan keempat sehingga mencakup hal-hal berikut diagnosis/masalah kebidanan, diagnosis/masalah potensial serta perlunya mengidentifikasi kebutuhan tindakan segera untuk antisipasi diagnosis/masalah potensial dan kebutuhan tindakan segera harus diidentifikasi menurut kewenangan bidan, meliputi: tindakan mandiri, tindakan kolaborasi dan tindakan merujuk klien.

4. Planning (P)

Planning/perencanaan, adalah membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi

data. Rencana asuhan ini bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien secara optimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraannya. Rencana asuhan ini harus bidan mencapai kriteria tujuan yang ingin dicapai dalam batas waktu tertentu.

Tindakan yang akan dilaksanakan harus mampu membantu pasien mencapai kemajuan dan harus sesuai dengan hasil kolaborasi tenaga kesehatan lain, antara lain dokter. Meskipun secara istilah, P adalah planning/perencanaan saja, namun P dalam metode SOAP ini juga merupakan gambaran pendokumentasian implementasi dan evaluasi.

Dengan kata lain, P dalam SOAP meliputi pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah kelima, keenam, dan ketujuh. Pendokumentasian P dalam SOAP ini, adalah pelaksanaan asuhan sesuai rencana yang telah disusun sesuai dengan keadaan dan dalam rangka mengatasi masalah pasien.

Pelaksanaan tindakan harus disetujui oleh pasien, kecuali bila tindakan tidak dilaksanakan akan membahayakan keselamatan pasien. Sebanyak mungkin pasien harus dilibatkan dalam proses implementasi ini. Bila kondisi pasien berubah, analisis juga berubah, maka rencana asuhan maupun implementasinya pun kemungkinan besar akan ikut berubah atau harus disesuaikan.

Dalam planning ini juga harus mencantumkan evaluasi, yaitu tafsiran dari efek tindakan yang telah diambil untuk menilai efektifitas asuhan/hasil pelaksanaan tindakan. Evaluasi berisi analisis hasil yang telah dicapai dan

merupakan fokus ketepatan nilai tindakan/ asuhan. Jika kriteria tujuan tidak tercapai, proses evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan tindakan alternatif sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk mendokumentasikan proses evaluasi ini, diperlukan sebuah catatan perkembangan, dengan tetap mengacu pada SOAP.

Perencanaan tindakan yaitu beritahu ibu pada balita hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan berikan penyuluhan gizi, perlunya minum tablet zat besi, makanan yang mengandung protein dan kaya vitamin C, akan tetapi pemberian vitamin C yang berlebihan dapat memicu terjadinya diare pada balita.

Melaksanakan perencanaan yaitu menganjurkan balita untuk istirahat yang cukup, jelaskan hal-hal yang dianggap penting pada ibu balita agar dapat mengetahui perkembangan kesehatan anak serta merupakan tujuan utama pelayanan antenatal. Jelaskan penyebab terjadinya diare. Kemudian melakukan evaluasi kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai ke efektifan tindakan yang diberikan, bidan dapat menyimpulkan dengan melakukan pemeriksaan fisik serta laboratorium kembali.

D. Tinjauan Umum Penyakit Pada Bakita Dengan Diare Menurut Pandangan Islam

Islam adalah agama *rahmatan li al-'alamin*, agama yang membuat penganutnya terhindar dari marabahaya. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Islam dalam ajarannya mengandung nilai-nilai yang memerintahkan umatnya untuk terus beribadah kepada-Nya, kapan dan di manapun. Namun, dalam

menjaga agar dapat beribadah kepada-Nya dibutuhkan fisik dan jasmani yang kuat.

Oleh karena itu, persoalan kesehatan dan menjaga kesehatan adalah hal yang penting di dalam ajaran Islam. Terganggunya persoalan kesehatan membuat seseorang tidak dapat berbuat maksimal dalam menjalankan kewajiban dan tugas-tugas kemanusiaannya. Penyakit yang terkandung dalam tubuh seseorang dapat mempengaruhi organ syarat, pikiran dan perasaan. Maka dari itu penguatan tubuh sangat diperlukan dalam menunjang aktivitas keseharian seseorang. Sehingga mempelajari ilmu dan metode yang berkaitan dengan kesehatan dirasakan sangat perlu untuk membahasnya menurut pandangan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. serta mencontoh apa yang telah dipraktekkan pada masa Rasulullah saw. hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw.

حَدَّثَنَا قَالُوا عَيْسَى بْنُ وَأَحْمَدُ الطَّاهِرِ وَأَبُو مَعْرُوفٍ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا
عَنْ سَعِيدِ بْنِ رَبِيهِ عَبْدِ عَنْ رَبِّهِ الْحَا ابْنُ وَهُوَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي وَهَبُ ابْنُ
لِكُلِّ قَالَ أَنَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الزُّبَيْرِ أَبِي
دَاءٍ

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru, yaitu Ibnu al-Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

"Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR Muslim).

Hadis lain juga :

سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ أَحْمَدَ أَبُو حَدَّثَنَا الْمُتَنِّيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ رَبَاحِ أَبِي بْنِ عَطَاءٍ حَدَّثَنِي قَالَ حُسَيْنِ أَبِي بْنِ
لَهُ أَنْزَلَ إِلَّا دَاءَ اللَّهِ أَنْزَلَ مَا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ
شِفَاءً

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha`bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda:

Terjemahnya :

"Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR Bukhari).

Hadis lain juga menyebutkan :

Diriwayatkan dari musnad Imam Ahmad dari shahabat Usamah bin Suraik, bahwasanya Nabi bersabda:

يَا: فَقَالَ الْأَعْرَابُ، وَجَاءَتْ وَسَلَّم، عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عِنْدَ كُنْتُ
وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ فَإِنَّ تَدَاوَوْا، اللَّهُ، عِبَادَ يَا نَعَمْ: فَقَالَ أَنْتَدَاوَى؟ اللَّهُ، رَسُولَ
الْهَرَّ: قَالَ هُوَ؟ مَا: قَالُوا. وَاحِدٍ دَاءٍ غَيْرَ شِفَاءً لَهُ وَضَعِ إِلَّا دَاءً يَضَعُ لَمْ

Terjemahnya :

"Aku pernah berada di samping Rasulullah, Lalu datanglah serombongan Arab Badui. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?'"

Beliau menjawab, 'Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab, Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.' Mereka bertanya, 'Penyakit apa itu?' Beliau menjawab, 'Penyakittua.'" (HRAhmad).

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya yang berjudul *Ath-Thibb an-Nabawi*, hadits-hadits tersebut mengandung pengabsahan terhadap adanya sebab musabab dan sanggahan terhadap orang yang menolak kenyataan tersebut

Rasulullah SAW berkata untuk mebersihkan segala sesuatu karena Islam atas kebersihan,

النَّظَافَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ بَنِي تَعَالَى اللَّهُ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَا بِكُلِّ تَنْظَفُوا
نَظِيفٍ كُلِّ إِلَّا الْجَنَّةَ يَدْخُلُ وَلَنْ

Terjemahnya :

"Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih." (HR Ath-Thabrani).

Selain itu meningkatkan iman kepada Allah SWT dengan selalu menjaga kebersihan. Selain karena Allah menyukai kebersihan, umat Islam yang beribadah dalam keadaan kotor maka amalannya bisa menjadi tidak sempurna. Rasulullah bersabda:

الْإِيمَانُ شَطْرُ الطُّهُورِ

Terjemahnya :

"Bersuci (thaharah) itu setengah daripada iman." (HR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi).

BAB III

STUDI KASUS

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA DIARE DENGAN
DEHIDRASI RINGAN DI PUSKESMAS KO'MARA KABUPATEN
TAKALARTANGGAL 20 JUNI – 20 AGUSTUS
TAHUN 2022**

No. Register : 011XXX
Tanggal Masuk : 21 Juni 2022 Pukul : 11.05 wita
Tanggal Pengkajian : 21 Juni 2022 Pukul : 11.05 wita
Pengkaji : Rahmatia

Langkah I: Identifikasi Data Dasar

A. Identitas Anak

Nama Anak : An "N"
Umur : 3 tahun 3 bulan
Anak Ke : 2
Alamat : Takalar

B. Identitas Orang Tua

Nama : Ny "N" / Tn "H"
Umur : 37 tahun / 43 tahun
Nikah/lamanya : 1X /±20 tahun
Suku : Makassar / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Takalar

C. Riwayat Keluhan

1. Keluhan utama : Ibu mengatakan bayinya BAB kurang lebih 7 kali encer sejak tadi malam disertai demam.
2. Riwayat keluhan utama : ibu mengatakan bayi BAB sejak tanggal 20 Juni 2022

D. Riwayat Kesehatan

Imunisasi lengkap

- E. Riwayat Penyakit yang lalu Ibu mengatakan bayinya tidak pernah demam.
- F. Riwayat Penyakit sekarang Ibu mengatakan bayinya diare kurang lebih 7 kali encer dan demam sejak tanggal 20 Juni 2022.
- G. Riwayat Penyakit keluarga/menurun Ibu mengatakan keluarganya baik dari pihak ibu maupun pihak suami tidak mempunyai riwayat penyakit menular seperti TBC, Hepatitis, ataupun riwayat penyakit menurun seperti Jantung, Hipertensi, DM, Asma.

a. Riwayat Sosial

Lingkungan rumah Ibu mengatakan lingkungan rumah aman, rapi, bersih, dan nyaman.

b. Pola Kebiasaan Sehari-hari (Sebelum sakit dan selama sakit)

a. Nutrisi

1. Makanan yang disukai

Ibu mengatakan bayinya lebih menyukai makanan yang mengandung protein seperti telur dan ikan.

2. Makanan yang tidak disukai Ibu mengatakan bayinya tidak terlalu suka makanan yang lembek seperti bubur.

3. Pola makan yang digunakan Sebelum sakit

Ibu mengatakan bayinya hanya minum susu dan itu dilakukan sesering mungkin, kurang lebih 5-6 kali sehari, lamanya 15 – 20 menit, menghisap kuat.

Selama sakit Ibu mengatakan bayinya malas minum susu, kurang lebih 3-4 kali sehari, lamanya 10-15 menit, menghisapnya lemah.

b. Istirahat atau Tidur Sebelum sakit

Ibu mengatakan bayinya tidur siang setiap hari 4 kali paling lama 1,5 jam, dan tidur malam bayinya tidur setiap habis magrib, jam 21.00 / 22.00 bayinya terbangun menyusuk kemudian tidur lagi.

Selama sakit Ibu mengatakan bayinya tidur siang hanya 1 jam sehari, dan malam hari bayinya rewel dan sulit tidur.

c. Personal Hygiene Sebelum Sakit

Ibu mengatakan setiap paginya bayinya mandi jam 07.00 wita, dan setiap sore bayinya di waslap jam 17.00 wita. Selama sakit Ibu mengatakan pagi hari bayinya hanya waslap, dan sorenya tidak waslap.

d. Aktifitas Sebelum sakit

Ibu mengatakan bayinya sangat aktif bergerak dan tersenyum bila diajak bercanda.

Selama sakit Ibu mengatakan bayinya rewel tidak seperti biasanya.

e. Eliminasi

Sebelum sakit Ibu mengatakan bayinya BAK sebanyak 3-5 x sehari konsistensi warna kuning jernih dan bau khas urine sedangkan BAB \pm 1-2x

sehari, konsistensi warna kuning bau khas feces dan lembek

Selama sakit Ibu mengatakan bayinya BAK sebanyak 6-8 x sehari konsistensi warna kuning jernih dan bau khas urine sedangkan BAB 7x sehari, konsistensi encer warna kuning kehijauan bau khas feces.

D. PEMERIKSAAN FISIK

1. Status Generalis

- a. Keadaan umum : Lemah.
- b. Kesadaran : *Composmentis*.
- c. TTV : S : 39,6° C, N : 136 kali/menit, R : 35 kali/menit,
- d. BB/TB sekarang : 10,8 kg / 82 cm.
- e. BB/TB yang lalu : 12.1 kg / 82 cm

2. Pemeriksaan sistematis

- a. Kepala : Bersih, rambut hitam, tidak ada benjolan.
- b. Mata : Mata simetris, sedikit cekung, sklera putih, konjungtiva merah muda.
- c. Telinga : Bersih, tidak ada serumen, kanan dan kiri simetris.
- d. Hidung : Bersih, tidak ada secret, tidak ada benjolan.
- e. Mulut : Bibir warna pucat, tampak kering tidak adalabioskizis, dan labiopalatokizis, tidak ada stomatitis, dan lidah terlihat kering
- f. Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar thyroid.
- g. Dada : Simetris, tidak ada penarikan dinding dada ke dalam saat bernafas.
- h. Perut : Turgor pada perut jika dicubit kembalinya lambat, sedikit

kembung.

- i. Kulit : Turgor kulit bila dicubit kembalinya lambat
- j. Anus : Berlubang.
- i) Ekstremitas : Tidak oedem, kaki dan tangan simetris kanan dan kiri
Jari-jari tangan dan kaki lengkap, terpasang infus KA-EN 4B pada tangan kanan.

b. Pemeriksaan penunjang Hasil laboratorium darah

Tanggal 21 Juni 2022 Pukul 11.30 wita

Hasil	Angka Normal	
Hemoglobin	: 10,3 gr/%	12- 18 gr/%
Leukosit	: 13,500 mm ³	4000 - 10.000 mm ³
Eritrosit	: 3,74 mm ³	4.0 - 6.0 mm ³
Hematokrit	: 32,7 %	36 - 50 %
Trombosit /mm ³	: 399.000/mm ³	150.000 – 400.000

Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Dehidrasi ringan

Data Dasar :

DS : Ibu mengatakan bayinya BAB kurang lebih sebanyak 7 kali sejak tanggal 20 Juni 2022, konsistensi encer, disertai lendir, bayinya tampak kehausan, rewel, lemah, malas menyusu kurang lebih 3-4 kali sehari, lamanya 10-15 menit, serta badanya panas, berat badan sebelumnya 12,1 kg

DO :

- a) TTV N : 136 kali/menit S : 39,6° R : 35 kali/menit .

- b) Berat badan sekarang 10,8 kg.
- c) Mata sedikit cekung, dan bibir, lidah tampak kering.
- d) Turgor kulit bila dicubit kembalinya melambat, perut sedikit kembung.

Analisa dan Interpretasi Data

Diare adalah pengeluaran tinja yang tidak normal dan cair. Buangan air besar yang tidak normal dan bentuk tinja yang cair dengan frekuensi yang lebih banyak dari biasanya. Bayi dikatakan diare bila sudah lebih dari 3x buang air besar, sedangkan neonatus dikatakan diare bila sudah lebih dari 4x buang air besar. (Sudarti, 2018).

Diagnosa diare dapat ditegakkan apabila anak yang mengalami diare akan mengalami kondisi berupa hilangnya sejumlah cairan dan elektrolit yang ada dalam tubuh karena muntah dan feses yang cair. Selain itu, anak yang mengalami diare juga akan mengalami dehidrasi, mulai dari dehidrasi ringan hingga dehidrasi berat, bahkan sampai dapat terjadi kematian (Sudarmoko, 2017).

Dehidrasi inilah yang sebenarnya patut lebih diperhatikan. Pada penyakit diare dehidrasi ringan merupakan kondisi dimana berat badan anak yang akan mengalami penurunan 0-5%. Dalam kondisi ini, umumnya kelopak mata masih normal, anak masih aktif, dan keinginan untuk minum masih normal karena rasa haus tidak meningkat. Namun demikian, frekuensi buang air kecil (BAK) menjadi lebih sering dan meningkat dari biasanya. Bahkan warna urinnya lebih gelap dari biasanya (Sudarti, 2018).

Langkah III: Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial

- a. Dehidrasi sedang.
- b. Hipoglikemia

c. Kejang

DS : Ibu mengatakan bayinya BAB kurang lebih sebanyak 7 kali sejak tadi malam, konsistensi encer, disertai lendir, bayinya tampak kehausan, rewel, lemah

DO :

Keadaan umum : lemah.

Kesadaran : *Composmentis*.

TTV N : 136 kali/menit S : 39,6° R : 35 kali/menit .

Analisa dan Interpretasi Data

Dehidrasi merupakan ketidakseimbangan cairan tubuh dikarenakan pengeluaran cairan yang lebih besar daripada pemasukan cairan. Dehidrasi disebabkan kehilangan air dan elektrolit melalui feses. Kehilangan cairan dan elektrolit bertambah bila ada muntah dan demam. Dehidrasi merupakan keadaan yang berbahaya karena dapat menyebabkan penurunan volume darah (hipovolemia) sampai kematian bila tidak ditangani dengan tepat (Reski, 2019).

Dehidrasi sedang yaitu apabila terjadi penurunan berat badan 5 – 10% dengan tanda dan gejala yang sama seperti dehidrasi ringan (Sodikin, 2017).

Hypoglikemia terjadi pada 2-3% dari anak-anak yang menderita diare dan lebih sering terjadi pada anak yang sebelumnya sudah menderita kekurangan kalori protein (KKP), karena penyimpanan persediaan *glycogen* dalam hati terganggu dan adanya gangguan absorpsi glukosa (walaupun jarang terjadi).

Gejala hypoglikemia akan muncul jika kadar glukosa darah menurun sampai 40% pada bayi dan 50% pada anak-anak. Hal tersebut dapat berupa lemas, apatis, peka rangsang, tremor, berkeringat, pucat, syok, kejang sampai koma.

Kejang adalah gangguan aktivitas listrik di otak yang terjadi secara spontan. Kondisi ini umumnya ditandai dengan gerakan tubuh yang tidak dapat dikendalikan, bahkan bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Kejang bisa menjadi gejala penyakit otak atau kondisi lain yang memengaruhi otak (Ida, 2019).

Langkah IV: Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi

Pada kasus ini tidak membutuhkan tindakan segera jika keadaan umum bayi baik, tergo kulit baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal namun jika ditemukan keadaan anak lemah bahkan tidak sadarkan diri maka perlu dilakukan kolaborasi dengan keluarga pasien untuk memberikan dukungan psikologis, tenaga kesehatan lainnya seperti dokter anak atau melakukan rujukan karena jika tidak ditangani segera dapat menimbulkan komplikasi pada bayi.

Kejadian diare jika tidak di atasi segera maka memungkinkan untuk terjadinya dehidrasi berat, penurunan tekanan darah, hipokalemia, hipoglikemia, intoleransi laktosa sekunder, kejang dan malnutrisi energi protein.

Langkah V : Rencana tindakan asuhan

Tanggal 21 Juni 2022 Pukul : 11.35 wita

Tujuan :

1. keadaan umum bayi normal
2. Tidak ada tanda-tanda komplikasi atau tanda bahaya pada bayi
3. Tidak terjadi dehidrasi sedang

Kriteria :

- A. Keadaan umum ibu baik
 - B. Ekspresi wajah bayi tenang
 - C. Tanda-tanda vital dalam batas normal
1. Sampaikan menjelaskan hal-hal yang dianggap penting seperti penyebab diare yang dialami.
Rasional : Penyampaian dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kepada ibu sangat penting agar ibu dapat mengetahui perkembangan bayinya serta merupakan tujuan utama pemeriksaan yang berkualitas.
 2. Beri dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan orang tua dan keluarga dalam perawatan pasien.
Rasional: Dukungan psikologis dan keterlibatan orang tua atau keluarga merupakan salah metode dalam perawatan pasien sehingga dapat membantu dalam proses penyembuhan. Disamping itu agar ibu lebih optimis dalam menghadapi kehamilannya dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 3. Beri pendidikan kepada ibu mengenai dehidrasi dan cara mengatasi serta memantau komplikasi yang dapat terjadi..
Rasional: Dengan ibu mengetahui tentang dehidrasi maka ibu dapat mengerti dengan kondisi yang sekarang dialami anaknya dan cara mengatasi apabila ada tanda-tanda komplikasi.
 4. Sampaikan kepada ibu dan keluarga bahwa bayinya harus mendapatkan perawatan lebih lanjut di Puskesmas ko'mara Takalar
Rasional : agar ibu mendapat asuhan yang tepat sesuai dengan diagnosa yang dialami ibu.

5. Lakukan tindakan kolaborasi dengan dokter tentang pemberian obat
Rasional : untuk membantu proses pemulihan anak dengan pemberian obat yang aman untuk ibu dan janin. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan cairan ibu yang terkurus karena BAB.
6. Jelaskan mengenai *health education* pada ibu tentang:
 - a) Istirahat yang cukup
Rasional : Adanya peningkatan fungsi-fungsi fisiologis tubuh diperlukan istirahat yang cukup untuk memberikan relaksasi yang cukup pada otot serta mengurangi beban kerja jantung.
 - b) Anjurkan orangtua memberikan makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan protein yang tinggi. Minum air putih lebih banyak untuk memperbaiki peristaltic usus sehingga mencegah konstipasi dan dehidrasi
Rasional : dengan mengonsumsi makanan sedikit tapi sering bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anak untuk mencegah terjadinya dehidrasi berat.
 - c) Menjaga *personal hygiene*
Rasional : Menjaga *personal hygiene* sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi pada klien dan dapat memberikan rasa nyaman pada ibu.
7. Observasi frekuensi BAB dari pagi sampai sore hari tiap 3 jam
Rasional : Frekuensi jumlah cairan yang keluar saat BAB dapat menggambarkan reaksi terhadap perawatan dan pengobatan yang diberikan.
8. Observasi tanda-tanda vital tiap 3-4 jam

Rasional : Untuk menilai perkembangan sebagai indikator dalam membantu mengevaluasi tindakan selanjutnya.

9. Observasi pengeluaran urine tiap 3-4 jam.

Rasional : Untuk mengetahui dan menilai jumlah cairan yang keluar.

10. Anjurkan ibu untuk memberikan susu pada bayinya

Rasional : pemberian susu dapat membantu mencegah terjadinya dehidrasi berat pada bayi.

Langkah VI: Implementasi Asuhan Kebidanan

Tanggal 21 Juni 2022 Pukul : 11.40 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan hal-hal yang dianggap penting seperti penyebab diare yang dialami.
2. Hasil : telah disampaikan hasil pemeriksaan dan ibu mengerti dengan apa yang telah disampaikan.
3. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan orang tua dan keluarga dalam perawatan pasien.

Hasil: Ibu dan keluarga merasa tenang

4. Memberikan pendidikan kesehatan tentang dehidrasi dan cara mengatasi serta memantau komplikasi yang dapat terjadi..

Hasil : ibu mengetahui tentang dehidrasi dan cara mengatasi apabila ada tanda-tanda komplikasi.

5. Memberitahu ibu dan keluarga bahwa ibu harus dirawat inap/ opname di Puskesmas ko'mara Takalar

Hasi : ibu bersedia untuk dilakukan tindakan lebih lanjut pada bayinya

6. Melakukan tindakan kolaborasi dengan dokter tentang pemberian obat

Hasil : telah diberikan infus KA-EN 4B 20 tpm dan sanmol 3 x 0,6 ml.

7. Memberikan *health education* pada ibu tentang:

- a. Istirahat yang cukup
- b. Menganjurkan orangtua memberikan makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan protein yang tinggi. Meminum air putih lebih banyak untuk memperbaiki peristaltic usus sehingga mencegah konstipasi dan dehidrasi.
- c. Menjaga *personal hygiene*

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yangtelah disarankan oleh bidan dan dokter

8. Mengobservasi frekuensi BAB dari pagi sampai sore hari

Hasil : ibu bersedia melakukannya

9. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : telah dilakukan

10. Mengobservasi pengeluaran urine.

Hasil : telah dilakukan

11. Mengajarkan ibu untuk memberikan susu pada bayinya


Hasil :ibu bersedia melakukan apa yang telah di sampaikan

Langkah VII: Evaluasi Asuhan Kebidanan

Tanggal 21 Juni 2022 Pukul : 13.30 wita

- a) Keadaan umum : sedang, kesadaran: *Composmentis*
- b) BAB sebanyak 3 kali sejak pukul 11.00 wita – 13.30 wita konsistensi encer, warna kuning kehijauan.
- c) Terapi dari dokter sudah di berikan yaitu:
 - 1) Infus KA-EN 4B terpasang 20 tpm dan tetesannya lancar.

- 2) Sanmol 3 x 0,6 ml masuk pada pukul 13.00.
- d) Ibu bersedia memberikan susunya setiap 1 jam atau 2 jam sekali.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA
DEHIDRASI RINGAN DI PUSKESMAS KO'MARA KABUPATEN
TAKALAR TANGGAL 21 JUNI TAHUN 2022**

No. Register : 011XXX

Tanggal Masuk : 21 Juni 2022 Pukul : 11.05 wita

Tanggal Pengkajian : 21 Juni 2022 Pukul : 11.05 wita

Pengkaji : Rahmatia

Langkah I: Identifikasi Data Dasar

a. Identitas Anak

Nama Anak : An "N"

Umur : 3 tahun 3 bulan

Anak Ke : 2

Alamat : Takalar

b. Identitas Orang Tua

Nama : Ny "N" / Tn "H"

Umur : 37 tahun / 43 tahun

Nikah/lamanya : 1X /±20 tahun

Suku : Makassar / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMA

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Takalar

S : Data Subjektif

Ibu mengatakan bayinya BAB kurang lebih sebanyak 7 kali sejak tanggal 20 Juni 2022, konsistensi encer, disertai lendir, bayinya tampak kehausan, rewel, lemah, malas menyusu kurang lebih 3-4 kali sehari, lamanya 10-15 menit , serta badanya panas, berat badan sebelumnya 10,1 kg

O : Data Objektif

1. KU : Baik, kesadaran: *Composmentis*
2. TTV : N : 140 kali/menit, S : 39'6°C , R : 32 kali/menit.
3. Berat badan sekarang 10,8 kg
4. Mata sedikit cekung, dan Turgor kulit bila dicubit kembalinya lambat ,muka tidak pucat, mulut tampak lembab.
5. Injeksi taxegram 150 mg, injeksi neurotam 1cc, L-Bio ½ sachet, sudah masuk pukul 08.00 wita.

c. Pemeriksaan penunjang Hasil laboratorium darah

Tanggal 21 Juni 2022 Pukul 11.30 wita

Hasil	Angka Normal
Hemoglobin	: 10,3 gr/% 12- 18 gr/%
Leukosit	: 13,500 mm ³ 4000 - 10.000 mm ³
Eritrosit	: 3,74 mm ³ 4.0 - 6.0 mm ³
Hematokrit	: 32,7 % 36 - 50 %
Trombosit	: 399.000/mm ³ 150.000 – 400.000 /mm ³

A: Assesment :

By. N umur 3 tahun 3 bulan dengan diare dehidrasi ringan perawatan hari pertama

P: Planning

Tanggal 21 Juni 2022 Pukul: 11.30 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan hal-hal yang dianggap penting seperti penyebab diare yang dialami.

Hasil : telah disampaikan hasil pemeriksaan dan ibu mengerti dengan apa yang telah disampaikan.

2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan orang tua dan keluarga dalam perawatan pasien.

Hasil : Ibu dan keluarga merasa tenang

3. Memberikan pendidikan kesehatan tentang dehidrasi dan cara mengatasi serta memantau komplikasi yang dapat terjadi..

Hasil: ibu mengetahui tentang dehidrasi dan cara mengatasi apabila ada tanda-tanda komplikasi.

4. Memberitahu ibu dan keluarga bahwa ibu harus dirawat inap/ opname di Puskesmas ko'mara Takalar

Hasil : ibu bersedia untuk dilakukan tindakan lebih lanjut pada bayinya

5. Melakukan tindakan kolaborasi dengan dokter tentang pemberian obat

Hasil : telah diberikan infus KA-EN 4B 20 tpm dan sanmol 3 x 0,6 ml.

1. Memberikan *health education* pada ibu tentang:
 - a. Istirahat yang cukup
 - b. Menganjurkan orangtua memberikan makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan protein yang tinggi. Meminum air putih

lebih banyak untuk memperbaiki peristaltic usus sehingga mencegah konstipasi dan dehidrasi

c. Menjaga *personal hygiene*

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang telah disarankan oleh bidan dan dokter

2. Mengobservasi frekuensi BAB dari pagi sampai sore hari

Hasil : ibu bersedia melakukannya

3. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : telah dilakukan

4. Mengobservasi pengeluaran urine.

Hasil : telah dilakukan

5. Mengajarkan ibu untuk memberikan susu pada bayinya

Hasil :ibu bersedia melakukan apa yang telah di sampaikan

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA
DEHIDRASI RINGAN DI PUSKESMAS KO'MARA KABUPATEN
TAKALAR TANGGAL 22 JUNI TAHUN 2022**

No. Register : 011XXX

Tanggal Masuk : 21 Juni 2022

Pukul : 11.05 wita

Tanggal Pengkajian: 22 Juni 2022

Pukul : 09.35 wita

Pengkaji : Rahmatia

S: Data Subjektif

Ibu mengatakan bayinya BAB 2 kali sejak pukul 01.00 wita– 09.00 wita, konsistensi berampas warna kuning kehijauan, bayinya sudah tidak rewel, dan bayinya sudah mau minum susu 3 kali.

O: Data Objektif

1. KU : Baik, Kesadaran: *Composmentis*.
2. TTV : N : 125 kali/menit S : 36,8°C R : 34 kali/menit.
3. Mata tidak cekung, dan turgor kulit normal, muka tidak pucat, perut tidak kembung.
4. Injeksi taxegram 150 mg, injeksi neurotam 1cc, L-Bio ½ sachet, flagil 500 ml sudah masuk pukul 08.00 wita.

A: Assesment

By. N umur 3 tahun 3 bulan dengan diare dehidrasi ringan perawatan hari kedua

P: Planning

Tanggal 22 Juni 2022 Pukul : 09.35 wita

- A. Informasikan pada orang tua mengenai hasil pemeriksaan dan kondisi kesehatan anak saat ini

Hasil : Keadaan umum : baik, mata cekung, mukosa bibir lembab, perut tidak kembung, turgor kulit kembali tidak lebih dari 2 menit, TTV: S: 37,4°c N: 87x/menit, RR: 28x/menit.

- B. Menjelaskan kepada orang tua mengenai pentingnya menjaga personal hygiene anaknya.

Hasil : Ayah pasien mengatakan anaknya sebelum makan dan sesudah buang air besar telah mencuci tangan menggunakan sabun.

- C. Melanjutkan kolaborasi dengan Dokter

Hasil : Telah dilakukan

- D. Dokter visit terapi stop pasien boleh pulang dan diberi obat pulang yaitu:

- a. L-bio 2 x 0,5 sachet.
- b. Flagil 3 x $\frac{3}{4}$ sendok.
- c. Bioticol 3 x $\frac{3}{4}$ sendok teh.

- E. Memberikan penjelasan kepada ibu agar anaknya mendapatkan cukup makanan, dan cairan.

Hasil : Anaknya sebelum makan dan sesudah buang air besar telah mencuci tangan menggunakan sabun

F. Menyampaikan kepada orang tua bahwa anak istirahat yang cukup.

Hasil : Ayah pasien mengatakan anaknya tidur malam kurang lebih 7-8 jam.

G. Mengajurkan ibu untuk memberikan susu pada bayinya

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang telah di sampaikan

H. Memberi penjelasan pada ibu tentang pantangan makanan dan minuman yaitu pemberian makanan yang mengandung lemak atau serat, makanan yang mengandung kafein dan minuman yang sangat dingin atau panas

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan

I. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan pada buku register dan status pasien, segera setelah melakukan tindakan.

Hasil : telah dilakukan

J. Mengajurkan orang tua agar selalu berdoa dan selalu minta perlindungan Allah swt

Hasil : orang tua bayi bersedia melakukannya

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA
DEHIDRASI RINGAN DI PUSKESMAS KO'MARA KABUPATEN
TAKALAR TANGGAL 28 JUNI TAHUN 2022**

No. Register : 011XXX

Tanggal Masuk : 21 Juni 2022 Pukul : 11.05 wita

Tanggal Pengkajian : 28 Juni 2022 Pukul : 11.20 wita

Pengkaji : Rahmatia

S: Data Subjektif

Ibu mengatakan bayinya BAB 2 kali sejak Pukul 01.00 wita wita – 11.00 wita, konsistensi berampas warna kuning, bayinya sudah tidak rewel, dan bayinya sudah mau minum susu dan makan.

O : Data Objektif

- a. KU : Baik, Kesadaran: *Composmentis*.
- b. TTV : N : 120 kali/menit S : 36,6°C R : 32 kali/menit.
- c. Mata tidak cekung, dan turgor kulit normal, perut sudah tidak kembung, mulut lembab..

A : Assesment

By. M umur 3 tahun 3 bulan dengan riwayat diare dehidrasi ringan

P: Planning

Tanggal 28 Juni 2022 Pukul : 11.20 Wita

1. Mengkaji BAB sejak 24 jam yang lalu

Hasil : Bayi BAB 2 kali

2. Memberikan pendidikan kesehatan pada ibu tentang penyakit diare dan

menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan bayi lingkungan sekitarnya, agar bayi tidak mudah sakit.

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan

3. Memberikan *health education* pada ibu tentang:

- a. Istirahat yang cukup
- b. Menganjurkan orangtua memberikan makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan protein yang tinggi. Meminum air putih lebih banyak untuk memperbaiki peristaltic usus sehingga mencegah konstipasi dan dehidrasi
- c. Menjaga *personal hygiene*

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yangtelah disarankan oleh bidan dan dokter

4. Mengajurkan ibu untuk tetap memberikan nutrisi yang cukup untuk anaknya yaitu dengan gizi seimbang, nasi, sayur, buah, lauk dan susu

Hasil : ibu bersedia melakukannya

5. Mengingatkan kembali ibu untuk memantau anaknya agar istirahat yang cukup tidur malam kurang lebih 8 jam dan tidur siang kurang lebih 2 jam

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

6. Mengingatkan ibu untuk kontrol ulang pada tanggal 05 Juli 2022

Hasil : ibu sudah tahu jadwal control bayinya

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA
DEHIDRASI RINGAN DI PUSKESMAS KO'MARA KABUPATEN
TAKALAR TANGGAL 05 JULI TAHUN 2022**

No. Register : 011XXX
Tanggal Masuk : 21 Juni 2022 Pukul : 11.05 wita
Tanggal Pengkajian : 05 Juli 2022 Pukul : 10.00 wita
Pengkaji : Rahmatia

S: Data Subjektif

- a. Ibu mengatakan kondisi bayi sudah jauh lebih baik.
- b. Nafsu makan dan minum bayi sudah kembali seperti sebelum mengalami diare dengan dehidrasi.

O : Data Objektif

1. KU : Baik, Kesadaran: *Composmentis*.
2. TTV : N : 122 kali/menit S : 36,5°C R : 30 kali/menit.
3. Turgor kulit normal dan perut sudah tidak kembung.

A : Assesment

By. M umur 3 tahun 3 bulan dengan riwayat diare dehidrasi ringan

P: Planning

Tanggal 05 September 2022 Pukul : 10.00 Wita

1. Menjelaskan pada ibu mengenai kondisi bayinya bahwa kondisi bayinya sudah jauh lebih baik.

Hasil : ibu merasa senang dan tenang

2. Mengingatkan kembali kepada ibu mengenai pendidikan kesehatan tentang penyakit diare dan menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperhatikan kebersihan pada bayi terutama pada bagian tangan dan kaki.

Hasil : ibu mengerti

3. Menjelaskan kepada ibu mengenai gizi seimbang dan mengajurkan ibu untuk tetap memberikan nutrisi yang cukup untuk anaknya yaitu dengan gizi seimbang, nasi, sayur, buah, lauk dan susu

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

4. Memberikan nutrisi yang mengandung energi dan protein dan tinggi serat. Hasil : Nutrisi yang mengandung energi dan protein serta tinggi serat sudah di berikan yaitu nasi, sayur, tempe, dan ayam.

5. Mendokumentasikan hasil tindakan pada rekam medik pasien.

Hasil : Tindakan telah di dokumentasikan dalam rekam medik pasien dan mengingatkan kembali ibu untuk memantau anaknya agar istirahat yang cukup tidur malam kurang lebih 8 jam dan tidur siang kurang lebih 2 jam

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA
DEHIDRASI RINGAN DI PUSKESMAS KO'MARA KABUPATEN
TAKALAR TANGGAL 20 AGUSTUS TAHUN 2022**

No. Register : 011XXX
Tanggal Masuk : 21 Juni 2022 Pukul : 11.05 wita
Tanggal Pengkajian : 20 Agustus 2022 Pukul : 09.00 wita
Pengkaji : Rahmatia

S: Data Subjektif

- a. Ibu mengatakan anaknya BAB 1 kali sehari dengan konsistensi lunak di sertai ampas.
- b. Ibu mengatakan anaknya sudah tidak rewel dan aktif jika di ajak main

O : Data Objektif

- 1) Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TTV: suhu = 36,5°C, nadi = 100x/ menit, respirasi = 24x/ menit.
- 2) Muka tidak pucat, conjungtiva merah muda, sklera berwarna putih, mulut lembab dan perut tidak kembung serta turgor kulit normal.

A : Assesment

By. N umur 3 tahun 3 bulan dengan riwayat diare dehidrasi ringan

P: Planning

Tanggal 20 Agustus 2022 Pukul : 09.00 Wita

1. Memberikan pendidikan kesehatan tentang penyakit diare pada balita serta cara perawatan di rumah agar tumbuh kembang balita tidak terhambat dan memberikan pendidikan kebersihan perorangan dan lingkungan.

Hasil : Ibu sudah mengerti tentang penyakit diare pada balita serta cara perawatan di rumah dan kebersihan perorangan serta lingkungan.

2. Memotivasi untuk menjaga personal hygiene (kebersihan diri) baik orang tua maupun anaknya

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang telah dijelaskan.

3. Memberikan nutrisi yang mengandung energi dan protein dan tinggi serat.

Hasil : Nutrisi yang mengandung energi dan protein serta tinggi serat sudah diberikan yaitu nasi, sayur, tempe, dan ayam.

4. Menjelaskan cara menjaga kebersihan makanan bila membuat makanan untuk anak yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dibawah air mengalir sebelum dan sesudah memasak, mencuci bahan makanan sebelum dimasak dan mencuci tangan sebelum menyuapi anak makan, menutupi makanan yang sudah disajikan untuk anak. Mencuci tangan menggunakan sabun dibawah air mengalir sebelum dan setelah buang air besar maupun buang air kecil, sebelum dan sesudah beraktifitas/ bermain

Hasil ; ibu bersedia melakukan apa yang telah dijelaskan.

MATRIKS KUNJUNGAN BY “N” UMUR 3 TAHUN 3 BULAN DENGAN DEHIDRASI RINGAN**Identitas Bayi**

Nama Anak : An “ N”
Umur : 3 tahun 3 bulan
Anak Ke : 2
Alamat : Takalar

Identitas Orang Tua

Nama : Ny “N” / Tn “H”
Umur : 37 tahun / 43 tahun
Nikah/lamanya : 1X /±20 tahun
Suku : Makassar / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Takalar



MATRIKS SEBAGAI BERIKUT :

Kunjungan	Hari, Tanggal, jam dan Tempat	Keluhan	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
1	21 Juni 2022 pukul 11.05 wita di puskesmas ko'mara	Bayi tampak kehausan, rewel, lemah, malas minum susu	DS: Ibu mengatakan bayinya BAB kurang lebih sebanyak 7 kali sejak tanggal 20 Juni 2022. DO : 1. TTV : N : 140 kali/menit, S : 39'6°C , R : 32 kali/menit. 2. Mata sedikit cekung, mukatidak pucat, mulut tampak lembab 3. Pemeriksaan penunjang Hasil laboratorium darah Leukosit : 13,500 mm ³ 4000 - 10.000 mm ³	1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu 2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu. 3. Memberikan pendidikan kesehatan tentang dehidrasi 4. Melakukan tindakan kolaborasi dengan dokter tentang pemberian obat yaitu infus KA-EN 4B 20 tpm dan sanmol 3 x 0,6 ml. 5. Injeksi taxegram 150 mg, injeksi neurotam 1cc, L-Bio ½ sachet. 6. Mengobservasi frekuensi BAB dari pagi sampai sore hari	1) Keadaan Umum baik anak dan 2) Tindakan rehidrasi baik oral maupun parentral sudah dilakukan. 3) Orang tua pasien mengerti

Kunjungan	Hari, Tanggal, jam dan Tempat	Keluhan	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
2	22 Juni 2022, Pukul : 11. 20 wita di Puskesmas Ko'mara	Ibu mengatakan bayinya BAB 2 kali	<p>DS : Ibu mengatakan bayinya BAB 2 kali sejak pukul 01.00 WIB – 09.00wita.</p> <p>DO :</p> <p>b. TTV : N : 125 kali/menit S : 36,8°C R : 34 kali/menit.</p> <p>c. Mata tidak cekung, dan turgor kulit normal, muka tidak pucat, perut tidak kembung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasikan pada orang tua mengenai hasil pemeriksaan 2. Memberikan penjelasan agar anaknya mendapatkan cukup makanan, dan cairan. 3. Mengajarkan ibu untuk memberikan susu pada bayinya 4. Perberian infus KA-EN 4B 20 tpm dan sanmol 3 x 0,6 ml. 5. Injeksi taxegram 150 mg, injeksi neurotam 1cc, L-Bio ½ sachet, flagil 500 ml 6. Mengajarkan orang tua agar selalu berdoa dan selalu minta perlindungan Allah swt 	<ol style="list-style-type: none"> a. Bayi lebih sering minum susu dibandingkan hari sebelumnya b. Pada Hari kedua diare pada anak sudah berkurang yang pada hari sebelumnya

Kunjungan	Hari, Tanggal, jam dan Tempat	Keluhan	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
3	28 Juni 2022 2022, Pukul : 11. 20 wita di rumah klien	Ibu mengatakan bayinya BAB 2 kali	DS : 1. Ibu mengatakan kondisi bayinya sudah jauh lebih baik. DO : 1. TTV : N : 120 kali/menit S : 36,6°C R : 32 kali/menit.	1. Memberikan pendidikan kesehatan pada ibu tentang penyakit diare dan menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan bayi lingkungan sekitarnya, agar bayi tidak mudah sakit. 2. Memberikan <i>health education</i> pada ibu tentang: 3. Dokter visit terapi stop pasien boleh pulang dan di beri obat pulang yaitu L- bio 2 x 0,5 sachet, Flagil 3 x ¾ sendok, Bioticol 3 x ¾ sendok teh 4. Mengajarkan ibu untuk tetap memberikan nutrisi yang cukup untuk anaknya 5. Mengingatkan ibu untuk kontrol ulang pada tanggal 23 Agustus 2022.	1. Keadaan Umum : Baik, Kesadaran : Composmentis 2. Pada hari ini keadaan bayi “N” Semakin membaik

4.	05 Juli 2022 2022, Pukul : 10.00 wita di rumah klien	d. Ibu mengatakan kondisi bayi sudah jauh lebih baik.	DS : 1. Nafsu makan dan minum bayi sudah kembali seperti sebelum mengalami diare dengan dehidrasi ringan. DO : 2. TTV : N : 122 kali/menit S : 36,5°C R : 30 kali/menit.	1. Mengingatkan kembali kepada ibu mengenai pendidikan kesehatan tentang penyakit diare dan menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperhatikan kebersihan pada bayi terutama pada bagian tangan dan kaki. 2. Menjelaskan kepada ibu mengenai gizi seimbang dan mengajak ibu untuk tetap memberikan nutrisi yang cukup untuk anaknya 3. Memberikan nutrisi yang mengandung energi dan protein dan tinggi serat.	3. Pada hari ini keadaan bayi "N" semakin membaik
5.	20 Agustus 2022 2022, Pukul :09.00 wita di p rumah klien Ko'mara	Ibu mengatakan anakannya BAB 1 kali sehari dengan konsistensi lunak di sertai ampas	DS : f) Ibu mengatakan anaknya sudah tidak rewel dan aktif jika di ajak main	1. Memotivasi untuk menjaga personal hygiene (kebersihan diri) baik orang tau maupun anaknya. 2. Memberikan nutrisi yang mengandung energi dan protein dan tinggi serat.	4. Pada hari ini keadaan bayi "N" sudah membaik

			<p>DO :</p> <p>1. TTV : N : 100 kali/menit S : 36,5°C R : 24 kali/menit.</p>	<p>3. Menjelaskan cara menjaga kebersihan makanan bila membuat makanan untuk anak</p>	
--	--	--	--	---	--



BAB IV

PEMBAHASAN

Setelah dilakukan asuhan kebidanan pada Bayi.N umur 3 tahun 3 bulan dengan sakit diare dehidrasi puskesmas selama ± 2 bulan, maka penulis akan membahas tentang asuhan yang diberikan dibandingkan dengan teori, mulai dari pengkajian, interpretasi data, diagnosa potensial, antisipasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembahasan akan penulis uraikan sebagai berikut :

1) Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien, riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium. Pada langkah ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Pada langkah ini, bidan mengumpulkan data dasar awal secara lengkap (Manguji, 2012: 5)

Kegiatan pengumpulan data dimulai saat klien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan berlangsung. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat memberikan informasi paling akurat yang dapat diperoleh secepat mungkin dan upaya sekecil mungkin. Pasien adalah sumber informasi yang paling akurat dan ekonomis yang disebut dengan sumber data primer. Sumber data alternatif atau sumber data sekunder adalah data yang sudah ada, praktikan kesehatan lain dan anggota keluarga (Asri, 2010: 27-28).

Pada pengkajian pada pasien dengan diare dehidrasi ringan meliputi data subjektif yaitu keluhan pada waktu masuk yaitu bayi BAB sampai lebih dari 4 kali berbentuk encer ditandai bayi rewel, gelisah, tampak kehausan. Pola kebiasaan sehari-hari antara lain pola nutrisi, eliminasi, aktivitas, istirahat. Dari data obyektif meliputi keadaan umum, kesadaran, TTV, berat badan. Sedangkan pada pemeriksaan fisik diperiksa ubun-ubun besar, mata, mulut, bibir, perut, dan kulit, serta pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan feses.

Pada kasus ini telah dilakukan pengkajian sebagai berikut data subyektif yaitu: keluhan utama pada saat waktu masuk ibu mengatakan bayinya BAB kurang lebih 7 kali encer sejak tadi malam disertai lendir, dan demam. Kebiasaan sehari-hari ibu mengatakan bayi tidak mau menyusu saat sakit, BAB lebih banyak dari biasanya, bayi mengalami gangguan tidur sejak mengalami diare.

Data Obyektif diperoleh hasil keadaan umum lemah, kesadaran composmentis, berat badan 10,8 kilogram, mata sedikit cekung, bibir pucat, terlihat kering, lidah putih kering, perut kembung, turgor kulit bila dicubit kembalinya lambat. Pada pemeriksaan penunjang dilakukan pemeriksaan laboratorium darah dan feses, dengan hasil Hemoglobin : 10,3 gr/%, Leukosit : 13,500 mm³, Trombosit : 399.000/mm³, warna feses kuning, konsistensi encer, lendir positif, serta bakteri positif.

Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar, dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit, jumlah kasus diare seluruh

Indonesia adalah sekitar 7 juta, dan paling banyak terjadi di provinsi Jawa Barat dengan 1,2 juta kasus. Diare juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling umum terjadi pada bayi dan anak-anak.

Biasanya diare hanya berlangsung beberapa hari (akut), namun pada sebagian kasus dapat memanjang hingga berminggu-minggu (kronis). Pada umumnya, diare tidak berbahaya jika tidak terjadi dehidrasi. Namun, jika disertai dehidrasi, penyakit ini bisa menjadi fatal, dan penderitanya perlu segera mendapat pertolongan medis.

Dehidrasi merupakan ketidakseimbangan cairan tubuh dikarenakan pengeluaran cairan yang lebih besar daripada pemasukan cairan. Dehidrasi disebabkan kehilangan air dan elektrolit melalui feses. Kehilangan cairan dan elektrolit bertambah bila ada muntah dan demam. Dehidrasi merupakan keadaan yang berbahaya karena dapat menyebabkan penurunan volume darah (hipovolemia) sampai kematian bila tidak ditangani dengan tepat (Reski, 2019).

Dehidrasi sedang, yaitu apabila terjadi penurunan berat badan $>10\%$ dengan tanda dan gejala tidak sadar, mata cekung, tidak merasa haus, cubitan pada kulit akan kembali sangat lambat. Selain itu, dehidrasi berat juga terjadi syok hipovolemik yang akan menyebabkan penurunan volume darah sehingga tekanan darah dan oksigen menurun yang menyebabkan sianosis (Sodikin, 2017).

Pada langkah ini tidak terdapat kesenjangan antara pengkajian yang terdapat dalam teori dengan pengkajian yang dilakukan di lahan, akan tetapi ada perbedaan waktu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium feses pada kasus ini dilakukan pada hari kedua tidak hari pertama dikarenakan

pada hari kedua bayi BAB dengan bercampur lendir darah sehingga membuat dokter mengambil keputusan tersebut untuk mengetahui apakah terdapat bakteri ataupun telur cacing dalam fekesnya. Ini berguna untuk menentukan pemberian terapi yang sesuai bagi bayi.

2) *Langkah II: Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual*

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan semua data yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosa atau masalah. Diagnosis yang dirumuskan adalah diagnosis dalam lingkup praktik kebidanan yang tergolong pada nomenklatur standar diagnosis, sedangkan perihwal yang berkaitan dengan pengalaman klien ditemukan hasil pengkajian (Manguji, 2012: 5)

Pada langkah ini yang dilakukan adalah membuat diagnosa kebidanan, menentukan masalah dan kebutuhan. Diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang ditegakkan dalam lingkup praktek kebidanan. Dalam kasus ini diperoleh diagnosa kebidanan yaitu Bayi M umur 3 tahun 3 bulan dengan diare dehidrasi ringan. Dengan dasar bayi BAB kurang lebih 7 kali, encer, disertai lendir. Keadaan umum lemah, Kesadaran composmentis, penurunan berat badan yaitu 5-10% BB sebelumnya dari 12.1 kilogram menjadi 10.8 kilogram.

Pada bayi yang disertai diare dengan dehidrasi adalah BAB lebih dari 4 kali, konsistensi encer, ditandai dengan bayi rewel, gelisah dan tampak kehausan. Keadaan umum sedang/lemah, kesadaran composmentis, suhu meningkat, penurunan BB 5-10% dari BB sebelumnya, mulut dan bibir kering, bising usus meningkat, turgor kulit bila dicubit kembalinya lambat.

Masalah yang muncul pada sakit diare dengan dehidrasi ringan adalah kekurangan volume cairan, perubahan integritas kulit dan gangguan rasa nyaman (Nursalam). Masalah yang muncul dalam kasus ini adalah ibu mengatakan bayi merasa haus, rewel, gelisah, dan aktivitas berkurang.

Kebutuhan yang diberikan pada bayi N disesuaikan dengan masalah yaitu pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi.

Diare merupakan salah satu penyakit yang berulang-ulang buang air besar yang sifatnya encer (cair). Bila seseorang dihindangi dan menderita penyakit ini ia akan sangat sering ke toilet untuk membuang hajat yang memang sifatnya cair dan tidak bisa ditahan-tahan. Diare merupakan suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi pada tinja, yang melembek atau mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari biasanya. Diare adalah buang air besar yang tidak normal atau bentuk tinja yang encer dengan frekuensi lebih banyak dari biasanya.

Neonatus dinyatakan diare bila frekuensi buang air besar sudah lebih dari 4 kali, sedangkan untuk bayi yang berumur lebih dari satu bulan dan anak bila frekuensinya lebih dari 3 kali Diare adalah penyakit yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi buang air besar lebih dari tiga kali sehari disertai perubahan konsentrasi tinja menjadi lebih cair atau setengah padat dengan atau tanpa lendir atau darah Kemenkes RI (2014) (Kurniawati (2018).

Diare ini juga dikenal dengan istilah kolon iritabel pada anak atau diare toddler, merupakan penyebab diare kronis yang sering dijumpai pada anak-anak yang berusia 6 hingga 54 minggu. Feses pada anak lembek dan sering disertai dengan partikel makanan yang tidak tercerna, dan lamanya diare lebih dari 2 minggu. Anak-anak yang menderita diare kronis nonspesifik ini akan tumbuh secara normal dan tidak terdapat gejala malnutrisi, tidak ada darah dalam fesesnya

serta tidak tampak infeksi enteric.

Tanda gejala Diare Akut dengan dehidrasi berat pada balita sangat khas, terlihat dari frekuensi, lama dan konsentrasi BAB. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitri Muji Rahayu (2017) yang mendapatkan hasil asuhan penelitian dimana Data subyektif pada keluhan utama pada responden I yaitu BAB cair 4 kali dalam sehari dan muntah 5 kali dalam sehari, anak rewel, serta panas malam hari dan keluhan responden ke II yaitu BAB cair lebih dari 4 kali sehari dan muntah diatas 5 kali perhari dan anak rewel. Pada data obyektif ditemukan tanda dehidrasi pada pemeriksaan fisik kasus I dan kasus II yaitu mata cekung, bibir kering, turgor kulit kembali lambat lebih dari 2 detik.

Pada langkah ini penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dengan kasus yang terdapat dilahan.

3) *Langkah III: Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial*

Pada kasus bayi diare dehidrasi ringan potensial terjadi diare dehidrasi berat (Ngastiyah).

Diare dapat menyebabkan penurunan gizi, oleh karena itu jika diare terjadi secara berulang kali menyebabkan penurunan berat badan. Pemberian nutrisi yang cukup saat anak diare sangat penting untuk mencegah terjadinya gangguan gizi pada anak. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri, virus atau parasit, malabsorpsi, alergi, keracunan, dan imunodefisiensi. Jika diare tidak ditangani dengan serius maka akan mengakibatkan dehidrasi dan malnutrisi (Rendi, 2014).

WHO menyatakan bahwa diare merupakan penyebab kematian balita nomor dua di dunia. Penyakit diare berkontribusi besar terhadap malnutrisi dan kematian anak. Diare dapat menyerang semua umur sehingga harus mendapat

perhatian khusus karena jumlahnya yang masih tinggi. Berdasarkan data WHO tahun 2017, terdapat 1,7 juta kasus diare pada balita setiap tahun dan 525.000 (30,8%) diantaranya meninggal akibat diare.

Dampak dari penyakit diare ini dapat mempengaruhi terjadinya kematian, malnutrisi. Diare disebabkan oleh faktor cuaca, lingkungan, makanan. Perubahan iklim, kondisi lingkungan kotor dan kurang memperhatikan kebersihan makanan merupakan faktor utamanya. Penularan diare umumnya melalui 4F yaitu *food, fly, feces* dan *finger* (Ngastiyah, 2012). Pada balita dan anak, kejadian diare lebih berbahaya dibanding pada orang dewasa karena komposisi tubuh balita dan anak yang lebih banyak mengandung air dibanding dewasa. Jika terjadi diare, balita dan anak lebih rentan mengalami dehidrasi yang dapat merujuk pada malnutrisi atau kematian (Nursalam, 2013).

Dehidrasi merupakan ketidakseimbangan cairan tubuh dikarenakan pengeluaran cairan yang lebih besar daripada pemasukan cairan. Dehidrasi disebabkan kehilangan air dan elektrolit melalui feses. Kehilangan cairan dan elektrolit bertambah bila ada muntah dan demam. Dehidrasi merupakan keadaan yang berbahaya karena dapat menyebabkan penurunan volume darah (hipovolemia) sampai kematian bila tidak ditangani dengan tepat (Reski, 2019).

Kategori dehidrasi dibagi menjadi 3 berdasarkan keadaan umum, denyut nadi, kemampuan minum, kondisi mata dan turgor kulit. Kategori dehidrasi berat adalah terdapatnya tanda-tanda letargis atau anak tidak sadar, denyut nadi cepat dan kadang tak teraba, mata sangat cekung, anak tidak bisa minum atau malas minum serta cubitan kulit perut kembalinya sangat lambat. Dehidrasi ringan

terjadi apabila terdapat dua atau lebih dari tanda-tanda berikut yaitu anak menjadi gelisah dan rewel/marah, denyut nadi cepat dan lemah (120 – 140/menit), mata cekung, haus, minum dengan lahap, cubitan kulit perut kembalinya lambat. Dehidrasi ringan terjadi apabila terdapat dua dari tandatanda berikut yaitu mata cekung, anak menjadi cengeng dan gelisah, denyut nadi normal (≤ 120 /menit), merasa haus dan selalu ingin minum, cubitan kulit perut kembalinya lambat (Nurul, 2020).

Dehidrasi berat, yaitu apabila terjadi penurunan berat badan $> 10\%$ dengan tanda dan gejala tidak sadar, mata cekung, tidak merasa haus, cubitan pada kulit akan kembali sangat lambat. Selain itu, dehidrasi berat juga terjadi syok hipovolemik yang akan menyebabkan penurunan volume darah sehingga tekanan darah dan oksigen menurun yang menyebabkan sianosis (Sodikin, 2017).

Pada kasus ini diagnosa potensial tidak terjadi diare dengan dehidrasi berat, karena adanya antisipasi tindakan yang cepat dan tepat dari tenaga kesehatan, sehingga pada langkah ini tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dengan praktek.

4) Langkah IV: Identifikasi Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi

Menurut Ngastiyah, antisipasi yang diberikan pada bayi sakit diare dengan dehidrasi ringan yaitu kolaborasi dengan dokter spesialis anak, observasi vital sign, pemberian cairan (rehidrasi awal) dan pemberian cairan intravena.

Pada kondisi diare dengan dehidrasi ringan dan tidak terjadi komplikasi pada bayi yang harus dilakukan tindakan segera, maka tidak diperlukan tindakan emergency, namun jika terjadi dehidrasi berat, sepsis, malnutrisi dan

ketidakseimbangan elektrolit serta kulit di sekitar anus mengalami iritasi karena pH tinja yang asam maka perlu dilakukan tindakan segera dan kolaborasi dengan dokter anak.

Kejadian diare jika tidak di atasi segera maka memungkinkan untuk terjadinya dehidrasi berat, penurunan tekanan darah, hipokalemia, hipoglikemia, intoleransi laktosa sekunder, kejang dan malnutrisi energi protein.

Pada kasus ini tindakan antisipasi pada bayi N dengan diare dehidrasi ringan adalah kolaborasi dengan dokter spesialis anak berupa pemberian terapi dan infus KA-EN 4B sebagai pemberian cairan rehidrasi awal secara intravena dikarenakan bayi sama sekali tidak mau menyusu saat awal masuk rumah sakit, observasi vital sign dan pemberian cairan dan makanan sesuai rencana terapi A dan tablet Zinc.

Pada langkah ini penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dengan kasus yang ada dilahan.

5) Langkah V: Rencana Tindakan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh berdasarkan langkah sebelumnya. Semua perencanaan yang dibuatkan harus berdasarkan pertimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, teori *Up To Date*, perawatan berdasarkan bukti (*evidence based care*). Dalam menyusun rencana sebaiknya pasien dilibatkan karena pada akhirnya pengambilan keputusan dalam melaksanakan suatu rencana asuhan harus disetujui oleh pasien. Untuk menghindari perencanaan asuhan yang tidak terarah, maka dibuat terlebih dahulu pola pikir sebagai berikut. Tentukan tujuan tindakan tindakan yang akan dilakukan, meliputi sasaran dan target hasil yang akan dicapai. Tentukan rencana tindakan sesuai dengan masalah dan tujuan yang akan dicapai. Kaji ulang apakah

rencana asuhan sudah meliputi semua aspek kesehatan terhadap wanita (Jannah, 2012: 208-209).

Rencana asuhan kebidanan dengan diare dehidrasi adalah sebagai berikut: informasikan hasil pemeriksaan pada orang tua pasien, rasional: informasi yang diberikan dapat memberikan pemahaman bagi orang tua pasien, agar lebih kooperatif dalam asuhan yang diberikan. Jelaskan pada orang tua tentang tanda bahaya diare, rasional: penjelasan tentang tanda bahaya diare dapat membantu orang tua mengetahui keadaan patologis yang dapat mengancam jiwa. Lakukan rehidrasi pada anak baik oral maupun parenteral, rasional: untuk mengganti cairan tubuh yang hilang sehingga mempercepat proses penyembuhan. KIE pada orang tua tentang pendidikan kesehatan, rasional: untuk mencegah dan menghindari dari infeksi kuman. KIE pada orang tua tentang nutrisi dan beri oralit setiap kali anak mencret, rasional: nutrisi yang cukup dapat mempercepat proses penyembuhan serta oralit dapat membantu mengganti cairan yang hilang karena diare.

Pada bayi N sakit diare dengan dehidrasi ringan perencanaanya yaitu mengobservasi Keadaan Umum dan Vital Sign, observasi BAB, berkolaborasi dengan dokter untuk pemasangan infus KA-EN 4B 20 tpm, pemberian terapi yaitu injeksi taxegram 150 mg/12 jam, flagil 500 ml 3 x $\frac{3}{4}$ sendok, L-bio2 x $\frac{1}{2}$ schet, injeksi antrain 50 mg, sanmol 3 X 0,6 ml, injeksi neurotam 3 X 1cc/8 jam dan menganjurkan ibu untuk memberikan ASI.

Pada langkah ini bayi M tidak diberikan tablet zink untuk diare akan tetapi diberikan L-Bio yang berfungsi mengembalikan fungsi pencernaan selama diare. Bayi N tidak diberikan oralit tetapi dokter memilih untuk

memberikan infus KA-EN 4B dikarenakan antara cairan tersebut dengan oralit sama-sama mengandung NaCL, kalium, dan glukosa, dan dokter memilih memberikan cairan secara intravena melihat dari kondisi bayidiawal yang tidak mau menyusu dikhawatirkan nutrisi tidak dapat terpenuhi dan dapat memperburuk keadaan maka mengambil keputusan tersebut.

Untuk penurun panas dokter memberikan sanmol dan injeksi antrain, agar panas segera turun karena panas merupakan salah satu komplikasi diare yang harus segera ditangani, kemudian dokter juga memberikan neurotam sebagaiantisipasi jika terjadi syok yang bisa mengganggu sistem saraf. Sedangkan pemberian antibiotik dokter berikan karena feses bayi positif terdapat bakteri. Sehingga pada langkah ini penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dengan kasus yang terdapat di lahan, karena walaupun terdapat perbedaan dalam pemberian terapi pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama.

6) Langkah VI: Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang diuraikan pada langkah kelima di atas dilaksanakan secara efisien dan aman. Realisasi dari perencanaan dapat dilakukan oleh bidan, pasien, atau anggota keluarga lain. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab atas terlaksananya seluruh perencanaan (Jannah, Nurul, 2012: 209).

Pelaksanaan asuhan kebidanan yang dilakukan dengan diare dehidrasi adalah: pada ibu mengatakan anaknya buang air besar sebanyak 7 kali, disertai panas dan anaknya rewel. Pemeriksaan umum: keadaan umum lemah, kesadaran composmenis, suhu 38o C, nadi 115x/menit, pernapasan 35x/menit. Pemeriksaan

fisik: mata cekung, turgor kulit saat kulit bagian perut dicubit, pengembalian kulit seperti semula lambat, bising usus (+) meningkat, abdomen kembung. Pemeriksaan darah: Hb:13 gr%, Leukosit: 9600/mm³, Trombosit: 245000/mm³. Pemeriksaan feses: warna: kuning, bau: khas feses, konsistensi: cair, lendir: negatif, darah: negatif. Menginformasikan hasil pemeriksaan pada orang tua pasien yaitu: keadaan umum: lemah, kesadaran: composmentis, suhu: 38o C, nadi 115 x/menit, pernapasan: 35x/menit.

Melakukan rehidrasi pada anak baik oral maupun parentral yaitu: 1 saset oralit di larutkan dalam satu gelas air matang yang hangat diberikan pada anak setelah BAB, cotri 2 x 240 mg dalam sehari, zink 1 x 240 mg dalam sehari, domperidon 2 x 5 mg dalam sehari, paracetamol 3 x 250 mg dalam sehari, pemberian cairan infus RL dengan 12 tetes per menit. KIE pada ibu tentang nutrisi dan beri oralit setiap kali anak mencret, yaitu memberikan nutrisi yang mengandung cukup energi dan protein serta tinggi serat, misalnya nasi, bubur, telur, sayur bayam, buah, susu dan beri oralit pada anak sedikit demi sedikit setiap kali mencret.

Pada kunjungan ke 2, ibu mengatakan anaknya masih BAB cair sebanyak 3x, sudah tidak panas dan tidak muntah, napsu makan belum baik dan hanya ingin minum air. Keadaan umum: anak masih tampak lemah, kesadaran: composmentis. TTV: Suhu: 36,5°C, Nadi : 100x/mnt, Pernapasan : 30 x/mnt. Pemeriksaan Fisik: wajah: pucat, mata: conjungtiva merah muda, sclera putih, mata cekung, mulut: mukosa bibir kering, abdomen: kembung (+), bising usus (+) meningkat, kulit: kering, cubitan kulit kembali lambat. Ekstremitas: tidak ada oedema, anus: lecet

dan kemerahan. Memberikan terapi obat sesuai advis dokter: 1 saset oralit dilarutkan dalam satu gelas air matang yang hangat diberikan sedikit demi sedikit pada anak setiap kali BAB, cotri 2 x 240 mg dalam sehari, zinc 1 x 20 mg dalam sehari, domperidon 2 x 5 mg dalam sehari, paracetamol 3 x 250 mg dalam sehari. Memotivasi untuk menjaga kebersihan diri anak maupun orang tua: cuci tangan sebelum dan sesudah makan, cuci tangan sebelum dan sesudah buang air (BAK dan BAB), cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktifitas.

Pada kunjungan selanjutnya yaitu ibu mengatakan anaknya sudah tidak mencret lagi, tidak panas dan tidak muntah tidak lagi, tapi nafsu makan belum kembali normal seperti sebelum sakit dan minum air seperti biasa. Keadaan umum: baik, kesadaran: composmentis. TTV: Suhu: 36,5°C, Nadi: 90x/mnt, Pernapasan: 30 x/mnt. Pemeriksaan Fisik: wajah: tidak pucat, mata: conjungtiva merah muda, sclera putih, mata tidak cekung, mulut: mukosa bibir lembap, abdomen: kembung (-), bising usus (+), kulit: cubitan kulit cepat, ekstremitas: tidak oedema, anus: tidak lecet dan kemerahan.

Mempertahankan pola makan anak dan tetap memperhatikan makanan yang bergizi pada anak yaitu dengan tetap mengkonsumsi nasi, sayur, tahu, tempe dan daging, buah serta banyak mengkonsumsi air putih. Memberikan terapi obat sesuai advis dokter: 1 saset oralit dilarutkan dalam satu gelas air matang yang hangat diberikan sedikit demi sedikit pada anak setiap kali BAB, cotri 2 x 240 mg dalam sehari, zinc 1 x 20 mg dalam sehari, domperidon 2 x 5 mg dalam sehari, paracetamol 3 x 250 mg dalam sehari. Memotivasi pada ibu pertahankan pola istirahat anak dengan tidur siang 1-2 jam/hari dan tidur malam 7-8 jam/ hari.

Pada kasus ini adalah melakukan pencegahan. Orang tua memerlukan informasi tentang beberapa pencegahan seperti kebersihan pribadi, perlindungan, pasokan air yang bebas kontaminasi, serta adanya persiapan makanan yang bersih. Pencegahan diare meliputi kebersihan perineum, pembuangan popok kotor, cuci tangan yang tepat, serta melakukan isolasi terhadap orang yang terinfeksi juga dapat meminimalkan penularan infeksi diare (Hockenberry, 2016).

Pencegahan diare dapat dilakukan dengan pemberian vaksin yang dapat melindungi anak-anak dari beberapa penyakit terkait diare (Istiroha, 2016). Vaksin rotavirus diintegrasikan ke dalam program imunisasi nasional sejak tahun 2006 di Amerika Serikat, dan kemudian musim rotavirus tercatat lebih pendek, bersama dengan penurunan 46% tingkat rawat inap diare di antara anak-anak kurang dari 5 tahun (Kasem, 2017).

Anak usia *pre school* (4-6 tahun) berada dalam proses perkembangan, baik perkembangan nilai-nilai, fisik, kognitif, bahasa, maupun sosial dan emosional. Dalam usia *pre school* anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, mereka aktif, dinamis, antusias dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Periode ini adalah periode dimana anak sering bermain, hampir seluruh kegiatan pada usia *pre school* melibatkan permainan. Penyebaran penyakit infeksi dapat melalui tangan, kondisi tersebut akan berdampak terhadap tingginya kejadian infeksi pada anak khususnya infeksi yang menyebabkan diare (Sukut, 2015).

Pelaksanaan asuhan kebidanan pada bayi sakit diare dengan dehidrasi ringan ini disesuaikan dengan rencana tindakan. Pelaksanaan yang dilakukan

pada kasus bayi sakit diare dengan dehidrasi ringan sudah dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun penulis.

Pada langkah ini penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan praktek di lapangan.

7) Langkah VII: Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan dimana pada tahap ini ditemukan kemajuan atau keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien. Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan, pada tahap ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi. Menurut Depkes diharapkan setelah diberikan asuhan kebidanan pada bayi sakit diare dengan diare dehidrasi ringan, diharapkan keadaan umum baik, ubun-ubun dan mata tidak cekung, turgor kulit normal, mulut dan lidah tidak kering, tidak terjadi diare dehidrasi berat dan BAB menjadi normal.

Pada kunjungan yang dilakukan ibu mengatakan anaknya tidak mencret lagi, panas dan muntah tidak lagi dan napsu makan sudah kembali normal seperti sebelum sakit. Keadaan umum anak baik, kesadaran: composmentis, TTV: suhu: 37°C, nadi: 90 x/mnt, pernapasan: 30 x/mnt. Mata tidak cekung, mukosa bibir lembap, abdomen tidak kembung, cubitan kulit kembali ke keadaan semula cepat, anus tidak lecet dan tidak kemerahan. Menganjurkan ibu untuk memberi makan nasi pada anaknya 3 kali sehari di rumah dan jika beli makan di luar rumah, jaga agar tidak membeli makanan ditempat terbuka.

Memotivasi untuk menjaga personal hygiene (kebersihan diri) baik orang tua maupun anaknya: Menjaga kebersihan makanan bila membuat makanan untuk

anak yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dibawah air mengalir sebelum dan sesudah memasak, mencuci bahan makanan sebelum dimasak dan mencuci tangan sebelum menyuapi anak makan, menutupi makanan yang sudah disajikan untuk anak. Mencuci tangan menggunakan sabun dibawah air mengalir sebelum dan setelah buang air besar maupun buang air kecil, sebelum dan sesudah beraktifitas/ bermain. Memberitahu ibu untuk tetap memberikan obat zink pada anak sampai 10 hari, meskipun anak sudah sembuh, pasien sudah bisa pulang atas persetujuan dokter, kontrol ulang 4 hari, jam pulang 13:15 wita, anak dalam keadaan baik.

Pada kasus ini semua tindakan yang dilakukan berhasil dengan baik dan pasien sembuh dalam waktu 3 hari. Setelah dilakukan evaluasi didapatkan hasil bahwa bayinya sudah tidak rewel lagi, keadaan umum baik, muka tidak pucat, mulut lembab/ tidak kering, perut tidak kembung, turgor kulit normal dan BAB normal 2 kali sehari dengan konsistensi lunak disertai dengan ampas, bayi sudah mau menyusu seperti sebelum sakit sebanyak 5 – 6 kali sehari lamanya 15 – 20 menit menghisap kuat, sehingga langkah ini tidak terdapat kesenjangan antara teori dan praktek lapangan.

Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaan . ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedang sebagian belum efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi N dengan diare dehidrasi ringan selama empat hari dengan menerapkan manajemen varney dapat diambil kesimpulan :

- a. Pada pengkajian data diperoleh hasil data subyektif yaitu ibu mengatakan bayinya BAB kurang lebih 7 X sehari, encer dan disertai lendir, bayinya tampak kehausan, rewel, lemah, serta badanya panas. Sedangkan data obyektif keadaan umum lemah, kesadaran *Composmentis*, Nadi 136 kali/menit, Suhu 39,6°C, Respirasi 35 kali/menit, dan bibir tampak kering, turgor kulit bila dicubit kembalinya melambat, perut sedikit kembung.
- b. Pada langkah interpretasi data diperoleh diagnosa kebidanan yaitu bayi M umur 3 tahun 3 bulan dengan diare dehidrasi ringan. Masalah yang muncul yaitu bayi merasa haus, rewel, gelisah, dan aktivitas berkurang. Kebutuhan yang diberikan yaitu pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi.
- c. Diagnosa potensial pada bayi N dengan diare dehidrasi ringan yaitu dehidrasi berat tetapi tidak terjadi, karena antisipasi serta tindakan yang cepat dan tepat dari tenaga kesehatan.

- d. Antisipasi/ tindakan segera yang diberikan yaitu kolaborasi dengan dokter spesialis anak berupa pemberian infus KA-EN 4B, serta observasi vital sign.
- e. Perencanaan yang diberikan pada bayi N yaitu observasi Keadaan umum dan vital sign, observasi BAB, berkolaborasi dengan dokter untuk pemasangan infus KA-EN 4B, pemberian terapi yaitu Taxegram 150 mg/12 jam, L-bio 2 x ½ schet, flagil 500 ml 3 x ¾ sendok, injeksi neurotam 3 X 1cc/8 jam, injeksi antrain 50 mg, sanmol 3X 0,6 ml menganjurkan ibu untuk memberikan ASI.
- f. Pelaksanaan asuhan pada bayi N sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga diperoleh hasil yang maksimal.
- g. Setelah dilakukan asuhan kebidanan selama 3 hari, didapatkan hasil bahwa bayinya sudah tidak rewel lagi, keadaan umum baik, muka tidak pucat, mulut lembab/ tidak kering, perut tidak kembung, turgor kulit normal dan BAB normal 2 kali sehari dengan konsistensi lunak disertai dengan ampas.
- h. Hasil dari asuhan kebidanan pada bayi N dengan diare dehidrasi ringan tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus, baik pada langkah pengkajian, interpretasi data, diagnosa potensial, antisipasi/ tindakan segera, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyampaikan beberapa saran yang bermanfaat:

a. Bagi Ibu Dan Keluarga

Dapat menambah informasi tentang pentingnya kesehatan terutama pada bayi dengan diare sehingga dapat melakukan penanganan segera terhadap penyakit diare dengan dehidrasi ringan

b. Bagi Bidan/ Tenaga Kesehatan

Bidan atau tenaga kesehatan dapat segera mengidentifikasi tanda dan gejala penyakit diare dengan dehidrasi ringan sehingga dapat melakukan antisipasi/ tindakan segera, merencanakan asuhan kebidanan pada bayi dengan dehidrasi ringan agar tidak terjadi diare dehidrasi berat.

c. Bagi Institusi

1) Puskesmas

Disarankan agar Puskesmas dapat meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada bayi dengan diare dehidrasi ringan secara optimal melalui penanganan cepat, danteper.

2) Pendidikan

Hendaklah karya tulis ilmiah ini digunakan sebagai sumber bacaan atau referensi untuk menambah wawasan khususnya tentang bayi sakit dengan diare dehidrasi ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Adyanastri, Festy. 2012. Etiologi Dan Gambaran Klinis Diare Akut Di RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Karya Tulis Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro*. Diakses tanggal 7 Januari 2017 dari http://eprints.undip.ac.id/37538/1/Festy_G2A008082_Lap_kti.pdf
- Apranita, Lolita Sary, Khoidar Amirus. (2016). Hubungan Hygiene Ibu Dan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Puskesmas Kedondong Kabupaten Pesawaran 2015. *Jurnal Dunia Kesmas Volume 5. Nomor 1. Januari 2016*.
- Arly Febrianti.(2019). Hubungan Hubungan Faktor Sosial Ekonomi, Pengetahuan Ibu Tentang Lingkungan Sehat Dan Diare Dengan Kejadian Diare Pada Balita Usia 1-5 Tahun Di Puskesmas Pembina Palembang.(2019).
- Astuti, Wiwin, p.; Heriyatun.; Yudha, Hendri, T.; 2011. Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Sanitasi Makanan Dengan Kejadian Diare Pada Balita. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, Volume 7, No. 3. Diakses tanggal 6 Juni 2017 dari
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2011. *Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)*. Jakarta
- Dinas kesehatan. 2014. *Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat*. Diakses tanggal 11 Januari 2017 dari
- Futri, Dkk. Asuhan Kebidanan Pada Anak Batita Dengan Diare Dan Dehidrasi Sedang Di Puskesmas Mojoagung Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. *Jurnal Kesehatan 2020*
- http://sumbar.antaraneews.com/image/2009/09ori/20090908img_1646.jpg
- Hegar. 2011. *Kumpulan Tips Pediatric*. Jakarta. Ikatan dokter Indonesia.
- <http://digilib.stikesmuhgombang.ac.id/files/disk1/27/jtstikesmuhgo-gdl-wiwinpujia-1337-2-hal.151-8.pdf>
- Juffrie, M.; Soenarto, S.S.Y.; Oswari, H.; Arief, S.; Rosalina, I.; & Mulyani, N.S. 2010. *Buku Ajar Gastroenterologi-Hepatologi*. Jakarta: Badan Penerbit IDAI
- Kemenkes. 2016. *Profil kesehatan Indonesia tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Indonesia.
- Marlia, D. L.; Dwipoerwantoro, P. G. & Advani, Najib. 2015. Defisiensi Zinc sebagai Salah Satu Faktor Risiko Diare Akut menjadi Diare Melanjut.

Jurnal Sari Pediatri, Volume 16, No. 5. Dari <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/download/142/146> diakses tanggal 22 Januari 2017

- Maryuani, 2010. *Ilmu Kesehatan Anak Dalam Kebidanan*. Jakarta : Trans Info Media.
- Morgan Kathleen, 2008. *Rencana Asuhan Keperawatan Pediatrik*. Jakarta : EGC
- Ngastiyah. 2014. *Perawatan anak sakit edisi 2*. Jakarta : EGC
- Ngastiyah. 2012. *Perawatan Anak Sakit*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Nursalam, Susilaningrum, R.; & Utami, R. 2008. *Asuhan keperawatan bayi dan anak*. Jakarta : Salemba Medika
- Nursalam. 2013. *Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak*. Jogjakarta : Salemba Medika.
- Notoadmodjo, soekidjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rendi Aji. 2014. *Deteksi dan Cepat Obati 30 Penyakit Anak*. Yogyakarta : Media Presindo.
- <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/4074/2/bab%2021>
- Riskesdas. 2013. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Sudarmoko, Dwi. 2017. Mengenal, Mencegah, dan Mengobati Gangguan Kesehatan pada Balita. Yogyakarta Hal. 48-54
- Sudarti, 2018. *Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Yogyakarta: Muha Madika. Hal 77-81
- Sodikin, 2011. *Keperawatan Anak Gangguan Pencernaan*. Jakarta: EGC Hal 118-127
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sudaryat Suratmaja. 2011. *Gastroenteritis anak*. Denpasar : SMF Ilmu Kesehatan Anak.
- World Health Organization. 2009. *Diarrhea: Why Children Are Dying And What Can Be Done*. Switzerland. Diakses tanggal 11 Januari 2017 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44174/1/9789241598415_eng.pdf
- WHO. 2012. *The 10 leading causes of death in the world, 2000 and 2012*. Dari <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/> diakses tanggal 11 Januari 2017

World Health Organization. Determinants of Health. Geneva: World Health Organization; 2017. [https:// www.who.int/news-room/q-a-detail/determinantsof-health](https://www.who.int/news-room/q-a-detail/determinantsof-health)

WHO. 2013. *Guideline for The Management of Common Childhood Illnesses Second Edition*. Switzerland: World Health Organization.

Wong, D.L.; Eaton, M.H.; Wilson, D.; Winkelstein, M.L.;& Schwart, P. 2008. *Buku ajar keperawatan pediatrik edisi 6*. Jakarta : EGC

Yolanda, cindy, dkk. 2020. Faktor Resiko Diare Akut pada Balita di Kecamatan Ulee Kareng. *Jurnal Aceh Medika*, Vol.4, No. 1.



DOKUMENTASI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fdik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-1836 / Un.06/FKIK/PP.00.9/05/ 2022 Gowa, 17 Mei 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Pengajuan Kode Etik**

Kepada Yth :
Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rahmatia
N I M : 70400118070
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Samata Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Ahli Madya. Adapun judul karya tulis ilmiah :

“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Diare dan Dehidrasi Ringan di Puskesmas Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Kabupaten Takalar.”

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.
2. dr. Darmawansyih, M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin/persetujuan kode etik .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam



a.n. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Gemy Nastity Handayani

Tembusan :
-Dekan FKIK UINAM



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.066/KEPK/FKIK/VI/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : RAHMATIA
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title


**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA DENGAN DIARE DEHIDRASI
 RINGAN KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR TAHUN
 2022"**

**"MANAGEMENT OF MIDWIFERY CARE FOR TODDLERS WITH MILD DEHYDRATED
 DIARRHEA AT THE KOMARA PUBLIC HEALTH CENTER NORTH PODBANGKENG
 DISTRICT TAKALAR REGENCY IN 2022"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
This declaration of ethics applies during the period June 17, 2022 until June 17,2023

17, 2022
 and Chairperson,

 DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkk.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-229/ Un.06-FKIK/PP.00.9/06/ 2022 Gowa, 26 Juni 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rahmatia
N I M : 70400118070
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dehidrasi Ringan di Puskesmas Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2022."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Firdayanti, S.SiT.,M.Keb.
2. dr. Darmawansyah, M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Ko'mara terhitung mulai tanggal 20 Juni – 20 Juli 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.



Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **3917/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Takalar
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2529/UN.06/FKIK/PP,.00.9/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **RAHMATIA**
Nomor Pokok : **70400118070**
Program Studi : **Kebidanan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (D3)**
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA DENGAN DIARE DEHIDRASI RINGAN DI PUSKESMAS KO'MARA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Juni s/d 25 Juli 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 24 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
Nip : **19650606 199003 2 011**

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS KO'MARA**

Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar email: upt.puskesmasko'mara@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No : **498** / PKM-KM / TU / XI / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amin, S.Kep
NIP : 19770312 19960301 001
Pangkat / Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala UPT. Puskesmas Ko'mara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmatia
NIM : 7040011807

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul " Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dehidrasi Ringan Di Puskesmas Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar"

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ko'mara, 14 November 2022

Kepala,



Amin, S.Kep

NIP. 19770312 199603 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rahmatia, Lahir di Kab, Takalar Povinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 26 Juni 2000, anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Musalla dan Ibunda Maneng, yang berprofesi sebagai petani dan IRT. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun jenjang pendidikan yang pernah penulis lalui yaitu pada tahun 2005 ,penulis bersekolah di SDN No 54 Malolo Kabupaten Takalar dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Polongbangkeng utara Kabupaten Takalar pada tahun 2014 penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 11 Takalar Kabupaten Takalar dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan studinya pada tahun 2018 dengan mengambil jurusan D3 Kebidanan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

