

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPOUSE
PADA NY “B” DENGAN AKSEPTOR LAMA KB PIL
DI PUSKESMAS KASSI- KASSI KOTA MAKASSAR
TANGGAL 05 APRIL -02 JUNI 2022**



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Meraih Gelar
Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

OLEH:

RUSLIA HILMUHTAR

NIM: 70400118009

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

TAHUN 2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ruslia Hi.Muhtar
NIM : 70400118009
Tempat/Tgl.lahir : Doro/ 09 Oktober 1999
Jurusan/Fakultas : DIII Kebidanan/Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul :Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny
“B”Dengan Akseptor Lama Kb Pilpuskesmas Kassi-Kassi
Kota Makassar Tanggal 05 April- 02 Juni 2022”.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sepenuh hati bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar yang merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari ternyata merupakan duplikat, plagiat atau seluruhnya atau sebagian dibuat oleh orang lain, maka karya tulis ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2022

Penulis

RUSLIA HI.MUHTAR
NIM: 70400118009

s

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny. B Dengan Akseptor Lama KB Pil Di Puskesmas Kassi - Kassi Kota Makassar Tanggal 05 April - 02 Juni 2022" Yang disusun oleh **Ruslia Hi. Muhtar**: 70400118009, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 09 Agustus 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Sabtu, 05 November 2022

10 Rabiul Akhir 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.Si.T., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Firdayanti, S.Si.T., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed	(.....)
Penguji I	: Dr. dr. Nadyah, M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Nurkhalis A. Ghaffar, M.Hum	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Ruslia HI, Muhtar


Nim : 70400118009

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopouse Pada Ny.
B Dengan Akseptor Lama KB Pil Di Puskesmas Kassi –
Kassi Kota Makassar Tanggal 05 April – 02 Juni 2022

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Samata, 05 November 2022

Pembimbing I


Firdayanti, S.Si.T., M.Keb

NIP : 19751113 200604 2 001

Pembimbing II


dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed

NIP : 19870407 201503 2 003

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa meberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segalaaktivitas yang dikerjakan dan diusahakan bernilai ibadah di sisi-Nya. Salam dantaslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah MuhammadSaw. Nabi yang telah memberikan pencerahan dan petunjuk kebenaran kepadaseluruh manusia dimuka bumi terutama kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE PADA NY “B” DENGAN AKSEPTOR LAMA KB PILPUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR TANGGAL 05 APRIL- 02 JUNI 2022”**.

Karya Tulis Ilmiah ini di susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syaratuntuk meraih gelar Ahli Madya Kebidanan di Jurusan Kebidanan FakultasKedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun dari penyajiannya. Oleh karena itu saran, masukan dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan oleh penulis guna memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada dalam Karya Tulis Ilmiah ini. Oleh karena itu ucapan rasaterima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta, bapak Hi. Muhtar, ibu Rasina M. Ali, Muhammad Hasbi, Sunarti Hi. Muhtar yang telah menjadi orang kedua yang telah memberikan bantuan, motivasi mendukung dan memberi nasehat yang sangat berarti begitupula dengan keluargaku yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa mendoakan saya, memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
2. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D beserta seluruh stafnya.
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. dr. Syatirah, Sp.A, M. Kes beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa fakultas selama masa pendidikan.
4. Ibunda Firdayanti, S.ST., M. Keb selaku Ketua Prodi jurusan Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus pembimbing I yang telah membimbing penulis menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang telah menuntun, mengajar dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengajar dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Ibunda Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST., M. Keb selaku Sekretaris Prodi jurusan Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membimbing Karya Tulis Ilmiah dan telah menuntun, mendidik, mengajar dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam

membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

6. dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed . selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu kepada saya, memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Dr. dr. Nadyah, M. Kes. selaku Penguji I yang telah memberikan ilmu kepada saya, memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Dr. Nurkhalis A. Ghaffar, M.Hum selaku Penguji II yang telah senantiasa memberikan saya tambahan ilmu agama serta memberikan masukan, kritik, dan saran yang bersifat islamiah pada Karya Tulis Ilmiah ini sehingga penulis dapat mengetahui hubungan kasus yang penulis angkat dan kaitannya dengan islam.
9. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi
10. Ibunda Rahma Liwanty, S.Kom, staf sistem Informasi serta staf/pegawai Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang telah melayani penulis dalam pengurusan Karya Tulis Ilmiah ini
11. Gubernur Sulawesi Selatan / Badan Peneliti dan Pengembangan Daerah(Balitbanda) Provinsi Sulawesi Selatan.

12. Kepala Puskesmas Kassi-Kassi dan para stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.
13. Kepada sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga kaka serta adik-adik saya yang selalu menyemangati dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
14. Kepada semua teman-teman Kebidanan khususnya angkatan 2018 terutama kelas Kebidanan A yang telah memberikan dukungan, motivasi dan warna di bangku perkuliahan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah swt.

Akhirul Kalam, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya di bidang Kebidanan. Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan Karya Tulis Ilmiah serta Karya Tulis Ilmiah selanjutnya. Terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB IPEDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Ruang lingkup pembahasan.....	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
E. Metode penelitian	9
F. Sistematika penulis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Khusus Tentang Perimenopause	10
1. Pengertian Perimenopause.....	10
2. Fisiologi Perimenopause.....	13
3. Hormon yang berpengaruh dalam sistem reproduksi	14
4. Penyebab dan gangguan hormonal	16
5. Diagnosa perdarahan dalam perimenopause	18
6. Penyebab dan gangguan hormonal	19
7. Perubahan – perubahan yang terjadi pada perimenopause	22
8. Faktor – faktor yang memengaruhi perimenopause	33
9. Tanda dan gejala perimenopause.....	35
10. Upaya-upaya menghadapi perimenopause.....	37
11. Peran bidan dalam menghadapi perimenopause.....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Komunikasi Kontrasepsi PIL	45
1. Pengertian KB PIL.....	45
2. Etiologi.....	45
3. Keuntungan dan kekurangan alat kontrasepsi KB PIL.....	47
4. Syarat menggunakan pil kombinasi	48
5. Kontraindikasi PIL kombinasi	49
6. Waktu mulai menggunakan PIL KB.....	50

C. PROSES MANAJEMAN ASUHAN KEBIDANAN.....	52
1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan	52
2. Tahap dalam manajemen asuhan kebidanan.....	52
3. Pendokumentasian asuhan kebidanan (SOAP).....	60
BAB III STUDI KASUS	62
A. Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 7 Langkah Varney	62
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	71
BAB IV PEMBAHASAN.....	80
A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar.....	80
B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual.....	81
C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial.....	83
D. Langkah IV : Identifikasi Tindakan Segera/Kolaborasi	84
E. Langkah V : Rencana Asuhan.....	85
F. Langkah VI : Implementasi.....	86
G. Langkah VII : Evaluasi.....	87
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH TAHUN 2022

Ruslia Hi.Muhtar, 70400118009

Pembimbing I : Firdayanti

Pembimbing II : Jelita Inayah Sari

Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny”B” Dengan Akseptor Lama KB Pil Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tanggal 05 April – 02 Juni 2022

Pada dasarnya kaum wanita akan memasuki usia 50 tahun dan menjadi tua seringkali menjadi momok yang menakutkan. Perimenopause adalah dimulai dengan munculnya tanda-tanda dan gejala awal perubahan dari sistem tubuh ketika menstruasi mulai tidak teratur perimenopause bisa terjadi pada awal usia 30-an dan berakhir 1 tahun setelah siklus menstruasi berakhir rata-rata terjadi pada usia 47-51 tahun (Prawirohardjo, 2018). Keterkaitan perimenopause dengan program KB merupakan salah satu metode untuk mengurangi risiko ibu mengalami kehamilan di usia yang terlalu tua >35 tahun yang akan memberikan risiko tinggi pada ibu dan bayinya, terlalu sering melahirkan dan terlalu dekat jarak kehamilan.

Menurut World Health Organization (WHO) setiap tahunnya sekitar 25 juta wanita di seluruh dunia diperkirakan mengalami menopause (WHO, 2015). Sedangkan dari data Statistik kota Makassar, yaitu jumlah penduduk di kota Makassar pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa dimana jumlah penduduk perempuan sebanyak 667.995 jiwa dengan perempuan usia 45-54 sebanyak 60.095 jiwa (Wahid, 2016). Sehingga tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu perimenopause dengan akseptor lama KB pil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar sesuai dengan kebutuhan dan wewenang bidan, menggunakan metode manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang telah dilakukan pada Ny “B”, menunjukkan bahwa masa perimenopause ibu dengan KB pil berlangsung secara normal dan baik. Setelah dilakukan asuhan selama 58 hari dengan melakukan kunjungan rumah sebanyak 6 kali, diperoleh keadaan ibu normal, semua hasil pemeriksaan dalam batas normal, dan tidak ditemukannya masalah potensial.

Kesimpulan dari studi kasus dengan melakukan pengkajian berupa anamnesis dan pemantauan pada ibu perimenopause dengan KB pil di Puskesmas Kassi-Kassi tanggal 05 April – 02 Juni 2022, pengkajian yang dilakukan berlangsung secara normal dan telah dilakukan pendokumentasian terkait semua tindakan yang telah dilakukan dan informasi yang telah didapatkan dari klien yang telah dilaksanakan pada ibu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dengan kasus yang didapatkan.

Kata Kunci : Perimenopause, KB Pil, 7 Langkah Varney



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, YEAR 2022

Ruslia Hl.Muhtar, 70400118009

Supervisor I : Firdayanti

Supervisor II : Jelita Inayah Sari

Perimenopausal Midwifery Care Management for Mrs "B" with an Old Acceptor of Family Planning at Kassi-Kassi Health Center of Makassar from April 5th to June 2nd, 2022

Basically, the age of fifty is often considered to be a frightening period and specter for most women. Perimenopause begins at this period, and it occurs with various symptoms and early signs such as the irregularity of menstruation. Perimenopause can also occur in the early 30's. However, the average age is at the ages of between 47-51 years (Prawirohardjo, 2018). Perimenopause and family planning program have been linked as in some cases family planning is purposively given to a woman aged 35 years and above. This family planning may influence the occurrences of perimenopause.

According to the World Health Organization (WHO), about 25 million women worldwide are estimated to experience menopause every year (WHO, 2015). Meanwhile, the population statistic of Makassar showed that 1,339,374 people were recorded in which 667,995 are women, and approximately 60,095 of them were aged between 45-54 (Wahid, 2016). The major purpose of this study was to provide midwifery care management on a perimenopausal patient with an old acceptor pill at the Kassi-Kassi Public Health Center in Makassar. The study was conducted based on the 7-stage of Varney midwifery care management and SOAP documentation procedure.

The findings of this study indicated that the perimenopausal period of Mrs. "B" was considered to be good. After the patient was given treatments for 58 days with 6 home visits, it was apparent that her physical and psychological condition were normal without any potential problems. Besides, all her vital sign examinations were within normal limits.

This study concluded that based on the patient's health history and monitoring process, the condition of the patient was good despite the consumption of old acceptor pill of family planning. The treatments were given at Kassi'-kassi health center of Makassar from April 5th to June 2nd 2022. During the caring management, there were no complications found, it could be suggested that the results of this study were in line with previous research and theories.

Key Words: Perimenopause, Old Acceptor Pill, 7-Stage of Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kaum wanita akan memasuki usia 50 tahun dan menjadi tua seringkali menjadi momok yang menakutkan. Kekhawatiran ini berawal dari pemikiran bahwa dirinya akan menjadi tidak sehat, tidak bugar, dan tidak cantik lagi, kondisi tersebut memang tidak menyenangkan dan menyakitkan. Padahal, masa tua dan menopause merupakan salah satu tahap yang harus dijalani seorang wanita dalam kehidupannya seperti halnya tahap-tahap kehidupan yang lain yaitu masa anak-anak dan masa reproduksi namun munculnya rasa kekhawatiran yang berlebihan itu menyebabkan mereka sangat sulit menjalani masa ini (Kronenberg, 2016).

Perimenopause adalah dimulai dengan munculnya tanda-tanda dan gejala awal perubahan dari sistem tubuh ketika menstruasi mulai tidak teratur perimenopause bisa terjadi pada awal usia 30-an dan berakhir 1 tahun setelah siklus menstruasi berakhir rata-rata terjadi pada usia 47-51 tahun. (Prawirohardjo, 2018).

Menurut World Health Organization (WHO) setiap tahunnya sekitar 25 juta wanita di seluruh dunia diperkirakan mengalami menopause WHO juga mengatakan pada tahun 2010 sekitar 467 juta wanita berusia 50 tahun keatas menghabiskan hidupnya dalam keadaan pasca menopause dan 40% dari wanita pasca menopause tersebut tinggal di negara berkembang dengan usia rata-rata mengalami menopause pada usia 51

tahun WHO memperkirakan jumlah wanita 50 tahun ke atas diperkirakan akan meningkat dari 500 juta pada saat ini menjadi lebih dari 1 milyar pada tahun 2030 di asia (WHO,2015).

Menurut Depkes RI (2015) hingga saat ini wanita di Indonesia yang memasuki masa menopause sebanyak 7,4% dari populasi jumlah tersebut meningkat menjadi 11% pada tahun 2015 kemudian naik lagi sebesar 15% pada tahun 2016 meningkatnya jumlah tersebut sebagai akibat bertambahnya populasi penduduk usia lanjut dan tingginya usia harapan hidup di barengi membaiknya derajat kesehatan masyarakat jumlah dan proporsi penduduk perempuan yang berusia 50 tahun dan diperkirakan memasuki usia menopause dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan Di Jawa Timur tahun 2016 wanita yang telah mengalami menopause sebanyak 5 juta jiwa dan yang mengalami kecemasan sebanyak 18%(BKKBN, 2016).

Di Indonesia secara umum sebagian besar perempuan mulai memasuki masa menopause pada usia 49-52 tahun. mengacu hasil penelitian bahwa usia harapan hidup perempuan Indonesia bertambah menjadi rata-rata 69 tahun maka sekitar 20-30 tahun atau sepertiga lama hidupnya perempuan dalam keadaan menopause. Sindrom menopause dialami oleh hampir seluruh penduduk dunia, di Indonesia sekitar 10% wanita menjelang menopause mengalami syndrome menopause. Diperkirakan jumlah orang yang menderita kecemasan baik akut maupun

kronik mencapai 5% dari jumlah penduduk dengan perbandingan wanita dengan pria (Kulsum,2017).

Berdasarkan dari data Statistik Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010 jumlah penduduk wanita di Sulawesi Selatan adalah 5.460.161 jiwa dengan jumlah penduduk wanita pada kelompok usia 48-54 tahun dan telah diperkirakan telah memasuki usia menopause sebanyak 716.442 jiwa, dan pada tahun 2011 sebanyak 5.627.431 jiwa dengan jumlah penduduk wanita pada kelompok usia 48-54 tahun ada 854.137 jiwa (Wahid,2016).

Sedangkan dari data Statistik kota Makassar, yaitu jumlah penduduk di kota Makassar pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa dimana jumlah penduduk perempuan sebanyak 667.995 jiwa dengan perempuan usia 45-54 sebanyak 60.095 jiwa (Wahid,2016).

Menopause didefinisikan sebagai akhir masa reproduksi seorang wanita dan biasanya terjadi pada wanita berusia antara 45 dan 55 tahun dengan usia rata-rata 51 tahun. Berhentinya menstruasi disebabkan oleh berkurangnya sekresi hormon ovarium yang terjadi secara alami atau disebabkan oleh operasi, koterapi, atau radiasi. Menopause terjadi pada perempuan yang memasuki usia menjelang 50 tahun. Melalui usia tersebut bagian universal dan irreversibel dari keseluruhan proses penuaan yang melibatkan sistem reproduksi dimana siklus haid setiap bulannya mulai terganggu dan akhirnya menghilang sama sekali (Nurpatminingsih,2016).

Ketika seorang wanita telah memasuki tahapan menopause kadar estrogen dan progesteron berangsur turun sehingga ikut mempengaruhi hormon lainnya. Kondisi inilah yang sering mengakibatkan banyak wanita mengalami sejumlah gejala klinis dan psikologis yang mengganggu aktifitas sehari-hari serta menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas hidup dan rasa percaya diri (Lusiana,2014).

Menurut Salim 2015, Perimenopause merupakan masa peralihan antara sebelum menopause dan sesudah menopause. Perimenopause dimulai sejak haid mulai tidak teratur dan adanya keluhan-keluhan berkisar diantara umur 45 tahun sampai 55 tahun dengan masa perimenopause terdiri atas pramenopause (usia 45- 48 tahun), menopause (usia 49-51 tahun) dan postmenopause (usia 52- 55 tahun).

Pengetahuan wanita tentang menopause perlu diperhatikan karena akan dapat menumbuhkan efek positif pada penataan kondisi psikologis, kesiapan mental dan pengetahuan yang cukup akan memudahkan seseorang dalam mengontrol depresi, kecemasan, serta gangguan emosional salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman wanita tentang menopause adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan berupa konseling yang bertujuan memberikan informasi agar dapat memperoleh pemahaman diri yang lebih baik, mampu mengontrol diri dan dapat mengarahkan diri dalam pemecahan masalah dan memperbaiki tingkah laku di masa yang akan datang (Nurfajriah, 2017).

Keterkaitan perimenopause dengan program KB merupakan salah satu metode untuk mengurangi risiko ibu mengalami kehamilan di usia yang terlalu tua >35 tahun yang akan memberikan risiko tinggi pada ibu dan bayinya, terlalu sering melahirkan dan terlalu dekat jarak kehamilan.

Data yang diperoleh dari Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2020 dengan jumlah penduduk yang berusia 45-59 tahun adalah 1705 orang yang terdiri atas 825 laki-laki dan 880 perempuan. Kemudian pada tahun 2021 dari bulan Januari-September dengan jumlah penduduk yang berusia 45-59 tahun adalah 1750 orang yang terdiri atas 847 laki-laki dan 903 perempuan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah wanita perimenopause cukup banyak. Sedangkan data terkait penggunaan KB pil pada usia perimenopause dengan usia 45-59 tahun sebanyak 112 perempuan pada tahun 2021 dari bulan Januari-September.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan penulis tertarik mengambil kasus yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ibu Dengan Pemakaian Kontrasepsi Pil” karena dari hasil tinjauan jurnal, hasil penelitian dari berbagai sumber dan referensi lainnya.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup pembahasan karya tulis ilmiah ini meliputi “Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada NY “B” Dengan Akseptor Lama KB Pil Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tanggal 05 April -20 April 2022

C. Tujuan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini tujuan diharapkan adalah sebagai berikut:

2. Tujuan Khusus

- a. Dilakukannya pengkajian identifikasi data dasar pada NY “B” Perimenopause dengan akseptor lama KB pil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tanggal 05 April- 02 Juni 2022.
- b. Dirumuskannya diagnosa/masalah aktual yang terjadi pada NY “B” Perimenopause dengan akseptor lama KB pil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tanggal 05 April- 02 Juni Tahun 2022.
- c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial yang terjadi pada NY “B” Perimenopause dengan akseptor lama KB pil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tanggal 05 April- 02 Juni Tahun 2022
- d. Dilakukannya tindakan segera dan kolaborasi pada ibu NY “B” Perimenopause dengan akseptor lama KB pil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tanggal 05 April- 02 Juni 2022.
- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan pada

NY “B” Perimenopause dengan akseptor lama KB pil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tanggal 05 April - 02 Juni 2022.

- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan yang disusun pada NY “B” Perimenopause dengan akseptor lama KB pil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tanggal 05 April - 02 Juni 2022.
- g. Diketuainya hasil tindakan yang telah dilakukan pada NY “B” Perimenopause dengan akseptor lama KB pil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tanggal 05 April - 02 Juni 2022.
- h. Didokumentasikannya semua hasil temuan dan tindakan yang diberikan pada NY “B” dengan akseptor lama KB pil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tanggal 05 April - 02 Juni 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir pendidikan Program Diploma III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Manfaat bagi penulis

Dapat menambah sebuah wawasan dan pengalaman yang berharga dalam penerapan asuhan kebidanan perimenopause. Penulis ini juga merupakan sebuah pengalaman yang berharga karena meningkatkan

sebuah pengetahuan dan wawasan tentang manajemen asuhan kebidanan pada NY “B” Perimenopause dengan akseptor lama KB pil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tanggal 05 April - 02 Juni 2022.

3. Manfaat ilmiah

Diharapkan karya tulis ini menambah wawasan atau ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan khususnya pada NY “B” Perimenopause dengan akseptor lama KB pil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tanggal 05 April - 02 Juni 2022.

4. Manfaat bagi institusi

Sebagai bahan ilmiah dan acuan bagi institusi untuk penyusunan dalam menulis Karya Tulis Ilmiah selanjutnya.

5. Manfaat bagi puskesmas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi puskesmas dan sebagai masukan dari pihak puskesmas untuk meningkatkan mutu pelayanan pada NY “B” Perimenopause dengan akseptor lama KB pil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tanggal 05 April - 02 Juni 2022.

6. Manfaat bagi pasien

Agar pasien dapat mengetahui dan menambah sebuah pengetahuan tentang hal hal apa saja yang harus diketahui dalam menghadapi NY “B” Perimenopause dengan akseptor lama KB pil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tanggal 05 April - 02 Juni 2022.

E. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan beberapa penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan Perimenopause dengan akseptor lama KB pil.

2. Studi kasus

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi 7 langkah varney yang meliputi: Identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, melakukan tindakan segera dan kolaborasi, merencanakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi tindakan.

a. Anamnesa

Penulis melakukan tanya jawab dengan ibu, suami, keluarga maupun bidan guna mendapatkan data dan informasi-informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan fisik

Tujuan dilakukan pemeriksaan fisik adalah untuk menilai kesehatan fisik, adanya kelainan dan kenyamanan fisik ibu. Dilakukan secara sistematis meliputi inspeksi, palpasi serta auskultasi dan lain-lain.

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi ibu terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi dokumentasi

Penulis mempelajari status kesehatan ibu yang bersumber dari catatan dokter, bidan, dan perawat.

4. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan pasien, keluarga pasien, dosen pembimbing baik itu di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Khusus Tentang Perimenopause

1. Pengertian Perimenopause

Perimenopause adalah masa peralihan antara pramenopause dan pascamenopause terjadi sekitar 2 tahun sebelum dan sesudah menopause yang dialami wanita umur 45- 50 tahun, masa ini terjadi keluhan klimakterik yang timbul seperti hot flushes, kecemasan, kekeringan pada vagina, menstruasi tidak teratur serta perubahan hormon yang terjadi saat menopause (Wari,2017). Wanita perimenopause yang telah memasuki masa ini akan mengalami penurunan hormon-hormon tertentu terutama hormon yang berkaitan dengan reproduksi yaitu hormon estrogen dan progesteron akibatnya muncul berbagai keluhan yang seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari bahkan menurunkan kualitas hidupnya, baik keluhan fisik maupun psikologisnya. (Salim, 2015).

Hal ini merupakan keadaan alamiah yang dialami seorang wanita dalam kehidupannya yang menandai akhir dari masa reproduksi. Penurunan fungsi indung telur selama masa perimenopause berkaitan dengan penurunan estrogen dan progesteron serta hormon endrogen untuk sebagian wanita, menjadi tua seringkali menjadi hal yang menakutkan. Kekhawatiran ini mungkin berawal dari pemikiran bahwa dirinya akan tidak sehat, tidak bugar, dan tidak cantik lagi. Kondisi tersebut memang tidak menyenangkan

dan menyakitkan. Padahal, masa menopause merupakan salah satu fase yang harus di jalani seorang wanita dalam kehidupannya(Mandang, 2016).

Didalam Islam juga telah dijelaskan bahwa manusia mengalami tiga masa, yaitu masa bayi, masa muda dan masa tua/menopause, sehingga menopause juga harus dipahami sebagai ketentuan Allah swt, Firman Allah swt di dalam Q.S Al-Hajj /22: 5.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْعِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تَرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Terjemahannya :

“ Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendak sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi ataupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah” (Departemen Agama RI, 2010).

Ayat diatas menjelaskan tentang bukti kekuasaan Allah swt tentang proses penciptaan manusia. Dimana sesuai kehendak Allah swt untuk dilahirkan kurang lebih 9 bulan dari perut ibu sebagai bayi berangsur-berangsur dipelihara agar mencapai masa puncak kedewasaan dan kekuatan fisik, mental, dan pikun, diantaranya ada yang diwafatkan dan

adapula sampai berlanjut usianya sehingga dikembalikan sampai keumur yang rendah kualitasnya yakni usia lanjut dan menjadi pikun hingga akhirnya dia tidak memiliki daya dan tidak dapat mengetahui sesuatu apapun yang penting bagi kemaslahatan hidup yang dahulu telah ia ketahui.

Di dalam kitab tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, disebutkan bahwa ayat ini mengilustrasikan peristiwa kebangkitan manusia dari kematian. Akan hadirnya hari kebangkitan manusia yang harus diimani. Hal itu berhubungan erat dengan tujuan penciptaan manusia, yakni sebagai bukti kekuasaan dan kebesaran Allah swt.

Didalam kitab tafsir Al Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al Karim karya Tanthawi Jauhari, dijelaskan bahwa ayat ini memberikan kiasan bahwa manusia berasal dari tanah. Sebagaimana juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Unsur air pun menjadi penyebab tumbuhnya makhluk yang lainnya. Setelah hadirnya proses keajaiban manusia di dalam rahim seorang ibu, Tanthawi pun menegaskan terkait pentingnya ilmu al-Ajnah atau embriologi manusia (Firdaus,2021).

2. Fisiologi Perimenopause

Proses menjadi tua pada dasarnya dimulai ketika seorang wanita memasuki usia 40 tahun. Pada waktu lahir, seorang wanita memiliki jumlah folikel sebanyak ± 750.000 buah dan jumlah ini akan terus berkurang seiring berjalannya usia hingga akhirnya tinggal beberapa ribu buah saja ketika mengalami menopause. Semakin bertambah usia, khususnya ketika

memasuki masa perimenopau, folikel-folikel itu akan mengalami peningkatan resistensi terhadap rangsangan gonadotropin. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan folikel, ovulasi, dan pembentukan korpus luteum dalam siklus ovarium berhenti secara perlahan-lahan. Pada wanita usia 40 tahun diantaranya mengalami siklus haid yang anovulatorik (Suparni, 2016).

Resistensi folikel terhadap gonadotropin ini mengakibatkan penurunan produksi estrogen dan peningkatan kadar hormon gonadotropin, tingginya kadar gonadotropin ini disebabkan rendahnya estrogen sehingga tidak ada umpan balik negatif dalam poros hipotalamus dan hipofisis (Suparni, 2016).

Walaupun secara endokrinologi terjadi perubahan hormonal, namun tidak ada kriteria khusus pengukuran kadar hormon untuk menentukan fase awal atau akhir dari masa transisi menopause (Suparni, 2016).

3. Hormon Yang Berpengaruh Dalam Sistem Reproduksi Wanita

Hormon-hormon yang memiliki pengaruh dalam sistem reproduksi wanita meliputi :

a. Estrogen

Estrogen dihasilkan oleh ovarium. Estrogen menyebabkan proliferasi (Pertumbuhan) sel di jaringan labium, vagina, uterus, tuba fallopi, dan payudara. Pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita yaitu pembentukan payudara, lekuk tubuh, rambut kemaluan. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk

ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai untuk penetrasi sperma (Suparni, 2016).

Ada 3 jenis estrogen dalam tubuh yaitu estradiol, estron dan estriol. Tetapi yang paling penting untuk reproduksi adalah estradiol. Estradiol adalah estrogen terkuat, diproduksi oleh ovarium dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang payudara. Sedangkan estron merupakan estrogen yang lebih lemah, diproduksi oleh ovarium dan jaringan lemak. Estriol merupakan estrogen yang terlemah dari ketiga estrogen utama dan dibuat didalam tubuh dari estrogen-estrogen lain (Suparni, 2016).

b. Progesteron

Hormon ini dihasilkan oleh korpus luteum, pada wanita hamil dihasilkan oleh plasenta. Pembentukan dan sekresi progesteron dirangsang oleh *Luteinizing Hormone* (LH). Fungsinya menyiapkan dinding uterus agar dapat menerima hasil konsepsi. Kadar progesteron terus dipertahankan selama trimester awal kehamilan sampai plasenta dapat membentuk *Hormon Chorionic Gonadotropin* (HCG).

c. Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH)

Merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. GnRH akan merangsang pelepasan *Follicle Stimulation Hormone* (FSH) di hipofisis. Bila kadar estrogen tinggi maka estrogen akan memberikan umpan balik ke hipotalamus sehingga kadar GnRH akan menjadi rendah, begitu sebaliknya.

d. FSH dan LH

FSH dan LH dinamakan Gonadotropin hormon yang diproduksi oleh hipofisis anterior akibat rangsangan dari GnRH. FSH menyebabkan pematangan folikel, sedangkan LH menyebabkan folikel yang telah matang pecah dan ovum keluar. Kemudian folikel ini akan menjadi korpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh LH.

4. Penyebab dan Gangguan Hormonal

Setiap manusia punya hipotalamus sebagai pusat pengaturan fungsional hormon. Hipotalamus menghasilkan hormon *Gonadotropin Releasing Hormon* (GnRH) yang akan merangsang kelenjar hipofisis untuk menghasilkan *Follicle Stimulation Hormone* (FSH) dan *Luteining Hormone* (LH). Kedua hormon FSH dan LH ini yang akan mempersiapkan sel telur pada wanita. FSH dan LH akan meningkat secara bertahap setelah masa haid dan merangsang ovarium untuk menghasilkan beberapa *Follicle* (kantong telur) (Walyani, 2015).

Dari beberapa kantong telur tersebut hanya satu yang matang dan menghasilkan sel telur yang siap dibuahi. Sel telur dikeluarkan dari ovarium (disebut ovulasi) dan ditangkap oleh fibria (organ berbentuk seperti jari-jari tangan di ujung saluran telur) yang memasukkan sel telur ke ke tuba fallopi (saluran telur). Apabila sel telur dibuahi oleh spermatozoa maka akan terjadi kehamilan tetapi bila tidak, akan terjadi haid. Begitu seterusnya sampai mendekati masa klimakterium, dimana fungsi ovarium semakin menurun (Walyani, 2015).

Masa perimenopause atau sebelum haid terhenti, biasanya ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur. Perimenopause bisa terjadi selama beberapa bulan sampai beberapa tahun sebelum menopause. Pada masa ini sebenarnya telah terjadi aneka perubahan pada ovarium seperti sklerosis pembuluh darah, berkurangnya jumlah sel telur dan menurunnya pengeluaran hormon seks (Walyani, 2015).

Menurunnya fungsi ovarium menyebabkan berkurangnya kemampuan ovarium untuk menjawab rangsangan gonadotropin. Hal ini akan mengakibatkan interaksi antara hipotalamus-hipofisis terganggu. Pertama-pertama yang mengalami kegagalan adalah fungsi korpus luteum. Turunnya produksi steroid ovarium menyebabkan berkurangnya reaksi umpan balik negatif terhadap hipotalamus. Keadaan ini akan mengakibatkan peningkatan produksi dan sekresi FSH dan LH. Peningkatan kadar FSH merupakan petunjuk hormonal yang paling baik untuk mendiagnosis sindrom klimakterik (Walyani, 2015).

Secara endokrinologis, klimakterik ditandai oleh turunnya kadar estrogen dan meningkatnya pengeluaran gonadotropin. Pada wanita masa reproduksi estrogen yang dihasilkan 300-800 ng, pada masa pramenopause menurun menjadi 150-200 ng, dan pada masa pascamenopause menjadi 20-150 ng. Menurunnya kadar estrogen mengakibatkan gangguan keseimbangan hormonal yang dapat berupa gangguan neurovegetatif, gangguan psikis, gangguan somatik, metabolik, dan gangguan siklus haid (Walyani, 2015).

Diawal usia 40 tahun, hormon FSH akan sedikit meningkat. Peningkatan hormon FSH ini mengakibatkan respon folikel di ovarium juga meningkat. Maka, hormon estrogen pun meningkat awalnya. Estrogen yang dihasilkan oleh ovarium berguna untuk mempersiapkan kehamilan dengan mempertebal endometrium. Tetapi seiring berjalannya waktu memasuki masa perimenopause, ovarium semakin sedikit menghasilkan hormon estrogen. Mulai akhir usia 40 tahun, bakal sel telur yang di simpan dalam tubuh sejak janin itu akan berkurang. Otomatis, supply bakal telur untuk dimatangkan pun berkurang. Ketika hal ini terjadi, akan semakin sering periode anovulasi. Artinya, periode menstruasi pun menjadi tidak teratur dan semakin panjang. Ovarium dianggap gagal mematangkan sel telur. Hal ini mengakibatkan terjadinya feedback negatif ke hipotalamus, sehingga hormon gonadotropin pun diproduksi lebih banyak. Pada masa perimenopause hormon ini dapat meningkat hingga empat kali lipat lebih banyak dibandingkan usia produktif (Salim, 2015).

5. Diagnosa Perdarahan Dalam Perimenopause

Diagnosa perdarahan karena gangguan fungsi ovarium dalam klimakterium tidak boleh dibuat sebelum sebab-sebab organik lain (mioma, polip, karsinoma) disingkirkan. Seringkali pemeriksaan penunjang seperti USG, dan Dilatasi-Kuretase, diperlukan untuk menyingkirkan kemungkinan patologis.

Perhatian khusus perlu diberikan pada keadaan-keadaan tertentu seperti :

- a. Perdarahan yang memerlukan penggantian pembalut tiap jam, selama 24 jam
- b. Perdarahan berkepanjangan (lebih dari 2 minggu)
- c. Perdarahan yang terjadi setelah henti perdarahan selama 6 bulan (kecuali pada pengguna terapi hormon)
- d. Perempuan obese, menderita DM dan atau hipertensi, karena beresiko tinggi terjadinya kanker endometrium.

Perempuan dengan kelainan siklus pada saat klimakterium yang berupa oligomenorea atau hipomenorea tidak diperlukan terapi. Sebaliknya, perdarahan berlebih perlu mendapatkan perhatian sepenuhnya. Dengan kerokan perlu dipastikan bahwa perdarahan tidak berdasarkan kelainan organik (Anwar, 2014).

6. Penyebab dan Gangguan Hormonal

Setiap manusia punya hipotalamus sebagai pusat pengaturan fungsional hormon. Hipotalamus menghasilkan hormon *Gonadotropin Releasing Hormon (GnRH)* yang akan merangsang kelenjar hipofisis untuk menghasilkan *Follicle Stimulation Hormone (FSH)* dan *Luteining Hormone (LH)*. Kedua hormon FSH dan LH ini yang akan mempersiapkan sel telur pada wanita. FSH dan LH akan meningkat secara bertahap setelah masa haid dan merangsang ovarium untuk menghasilkan beberapa *Follicle* (kantong telur) (Walyani, 2015).

Dari beberapa kantong telur tersebut hanya satu yang matang dan menghasilkan sel telur yang siap dibuahi. Sel telur dikeluarkan dari ovarium

(disebut ovulasi) dan ditangkap oleh fibria (organ berbentuk seperti jari-jari tangan di ujung saluran telur) yang memasukkan sel telur ke ke tuba fallopi (saluran telur). Apabila sel telur dibuahi oleh spermatozoa maka akan terjadi kehamilan tetapi bila tidak, akan terjadi haid. Begitu seterusnya sampai mendekati masa klimakterium, dimana fungsi ovarium semakin menurun (Walyani, 2015).

Masa perimenopause atau sebelum haid terhenti, biasanya ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur. Perimenopause bisa terjadi selama beberapa bulan sampai beberapa tahun sebelum menopause. Pada masa ini sebenarnya telah terjadi aneka perubahan pada ovarium seperti sklerosis pembuluh darah, berkurangnya jumlah sel telur dan menurunnya pengeluaran hormon seks (Walyani, 2015).

Menurunnya fungsi ovarium menyebabkan berkurangnya kemampuan ovarium untuk menjawab rangsangan gonadotropin. Hal ini akan mengakibatkan interaksi antara hipotalamus-hipofisis terganggu. Pertama-pertama yang mengalami kegagalan adalah fungsi korpus luteum. Turunnya produksi steroid ovarium menyebabkan berkurangnya reaksi umpan balik negatif terhadap hipotalamus. Keadaan ini akan mengakibatkan peningkatan produksi dan sekresi FSH dan LH. Peningkatan kadar FSH merupakan petunjuk hormonal yang paling baik untuk mendiagnosis sindrom klimaterik (Walyani, 2015).

Secara endokrinologis, klimakterik ditandai oleh turunnya kadar estrogen dan meningkatnya pengeluaran gonadotropin. Pada wanita masa

reproduksi estrogen yang dihasilkan 300-800 ng, pada masa pramenopause menurun menjadi 150-200 ng, dan pada masa pascamenopause menjadi 20-150 ng. Menurunnya kadar estrogen mengakibatkan gangguan keseimbangan hormonal yang dapat berupa gangguan neurovegetatif, gangguan psikis, gangguan somatik, metabolik, dan gangguan siklus haid (Walyani, 2015).

Diawal usia 40 tahun, hormon FSH akan sedikit meningkat. Peningkatan hormon FSH ini mengakibatkan respon folikel di ovarium juga meningkat. Maka, hormon estrogen pun meningkat awalnya. Estrogen yang dihasilkan oleh ovarium berguna untuk mempersiapkan kehamilan dengan mempertebal endometrium. Tetapi seiring berjalannya waktu memasuki masa perimenopause, ovarium semakin sedikit menghasilkan hormon estrogen.

Mulai akhir usia 40 tahun, bakal sel telur yang di simpan dalam tubuh sejak janin itu akan berkurang. Otomatis, supply bakal telur untuk dimatangkan pun berkurang. Ketika hal ini terjadi, akan semakin sering periode anovulasi. Artinya, periode menstruasi pun menjadi tidak teratur dan semakin panjang. Ovarium dianggap gagal mematangkan sel telur. Hal ini mengakibatkan terjadinya feedback negatif ke hipotalamus, sehingga hormon gonadotropin pun diproduksi lebih banyak. Pada masa perimenopause hormon ini dapat meningkat hingga empat kali lipat lebih banyak dibandingkan usia produktif (Salim, 2015).

7. Perubahan-Perubahan Yang Terjadi Pada Perimenopause

Perubahan-perubahan yang terjadi pada perimenopause tidak hanya di akibatkan karena faktor hormonal saja, tetapi disertai dengan perubahan-perubahan yang terjadi akibat proses penuaan (aging process) (kemenkes RI, 2010).

a. perubahan organ reproduksi

saat berhentinya menstruasi mengakibatkan berbagai organ reproduksi akan mengalami perubahan karena sel telur tidak lagi di produksi, sehingga berpengaruh terhadap komposisi hormon dalam organ reproduksi. Adapun perubahan organ reproduksi pada wanita, antara lain:

1) Tuba Fallopi

Saluran tuba mengalami penipisan dan mengkerut, lipatan tuba menjadi lebih pendek, endosalpingo menipis mendatar dan silia menghilang.

2) Uterus (Rahim)

Saluran mengecil disebabkan karena atrofi endometrium juga disebabkan hilangnya cairan dan perubahan bentuk jaringan ikat interstisial.

3) Vagina

Terjadinya atrofi pada epitel vagina hingga hanya tinggal lapisan sel basal, vagina menjadi karing, dan hal ini yang menyebabkan rasa sakit ketika berhubungan seksual.

4) Serviks

Serviks (mulut rahim) mengkerut terselubung dinding vagina, saluran memendek dan menyempit.

5) Dasar Panggul

Kekuatan serta elastisitas dasar panggul berkurang karena atrofi dan lemahnya daya sokong.

6) Perenium dan Anus

Lemak subcutan menghilang, atrofi, dan otot sekitarnya menghilang sehingga menyebabkan tonus spinkter melemah dan menghilang.

7) Kelenjar Payudara

Puting susu mengecil, kurang erektile, pigmentasi berkurang, sehingga payudara menjadi mengendor dan mendatar. Disaat wanita memasuki menopause, turunya kadar estrogen ini akan menyebabkan bentuk payudara yang kurang menarik lagi.

8) Kandung Kencing

Aktivitas kendali spinkter dan destrussor menghilang sehingga menyebabkan sering kencing tanpa disadar (Mulyanti, 2015).

b. Perubahan Hormon

Terjadi penurunan hormon estrogen karena jumlah sel telur berkurang sampai habis dan fungsi ovarium berhenti. Pengaruh perubahan hormon ini menimbulkan gejala sebagai berikut :

1) Jangka Pendek

a) Keluhan Vasomotor

Seperti gejala panas (hot flushes) terasa panas diwajah, berkeringat, dan merasa terbakar, sering disertai dengan kecemasan (anxietas) atau kadang-kadang disertai rasa dingin. Gejala ini terjadi beberapa

bulan atau beberapa tahun (dalam 2 tahun) 70% perempuan mengalami gejala hot flushes ini. Hot flushes yang berat sering menimbulkan gangguan tidur. Gangguan tidur ini sering disertai dengan menurunnya semangat, perasaan riang, kehilangan tenaga, gangguan nafsu makan, meningkatnya keluhan somatik dan masalah psikis karena depresi.

b) Psikologik

Seperti perasaan takut, gelisah, mudah tersinggung, lekas marah, tidak konsentrasi, perubahan perilaku, depresi, gangguan libido.

c) Urogenital (Saluran kencing dan kemaluan)

Seperti nyeri senggama, vagina kering, keputihan/infeksi, perdarahan pasca senggama, infeksi saluran kemih, gatal pada vagina/vulva, iritasi, peranakan turun, nyeri berkemih, ngompol.

d) Kulit

Seperti kering/menipis, gatal-gatal, keriput, kuku rapuh, berwarna kuning

e) Rambut

Seperti menipis, tumbuh disekeliling bibir, hidung dan telinga, rambut mulai rontok (kepala, pubis dan ketiak)

f) Mata

Seperti infeksi, kesulitan menggunakan lensa kontak

g) Tulang

Seperti nyeri tulang/otot

h) Kolesterol

Seperti kolesterol tinggi, HDL turun (lemak yang melindungi jantung), LDL naik (lemak yang merugikan jantung).

2) Jangka Panjang

a) Osteoporosis

Hormon estrogen adalah hormon pada wanita yang tugasnya mengatur siklus menstruasi. Estrogen juga bekerja pada kelenjar paratiroid untuk mengatur keseimbangan kalsium tubuh. Kadar estrogen yang berkurang pada menopause menyebabkan seorang wanita mudah terkena osteoporosis, karena pembentukan osteoklas bertambah sehingga penghancuran tulang semakin banyak terjadi.

b) Penyakit jantung koroner

Hormon estrogen berperan untuk melindungi perempuan dari penyakit jantung koroner (PJK), oleh karenanya infark miokard akut terjadi pada usia yang lebih tua (Oemiati, 2015).

b. Perubahan Pola Menstruasi

Pola menstruasi menjadi jarang, jumlahnya sedikit, spotting dan kemudian berhenti. Pada beberapa perempuan pola menstruasi menjadi lebih sering dan lebih banyak, ini menggambarkan adanya produksi estrogen yang berlanjut dengan ovulasi/tanpa ovulasi, hal ini terjadi kemungkinan karena adanya penyakit organik, misalnya : hiperplasi, endometriosis atau ca endometrium. Hanya 10% perempuan yang mengalami amenorhea secara tiba-tiba. 70% mengalami

olygmenorea/hypermenorea, 18% menorhagia dan hypermenorea. Perdarahan yang terjadi setelah lebih dari satu tahun amenorhea kemungkinan adanya penyakit organik, perlu di cari penyebabnya (Kemenkes RI, 2010).

Siklus yang teratur terjadi akibat keseimbangan hormon yang tepat disertai ovulasi yang reguler. Pada perimenopause, terjadi perubahan level hormon yang mempengaruhi ovulasi. Jika ovulasi tidak terjadi, ovarium akan terus memproduksi estrogen, dengan akibat penebalan endometrium. Hal ini akan menyebabkan perdarahan ireguler ataupun spotting. Estrogen tanpa pengaruh progesteron ini akan memberi gambaran hiperplasia glandularis sistika (Anwar, 2014).

c. Perubahan Psikologi

Perubahan kejiwaan sangat tergantung dari pribadi masing-masing dan tergantung pada pandangan menghadapi menopause. Pada perempuan yang mendapatkan informasi yang baik dan yang memiliki kemampuan menyesuaikan dengan baik, perubahan psikologi ini sangat ringan bahkan tidak berarti, sehingga ketidakstabilan emosi sangat singkat. Namun pada sebagian kecil perempuan peristiwa tersebut dibebani oleh pikiran yang bukan-bukan, sehingga mengalami kecemasan yang berkepanjangan (Kemenkes RI, 2010).

Pemikiran bahwa menopause berarti akhir dari masa reproduksi, yang berarti berhentinya nafsu seksual dan fisik menimbulkan rasa takut dan cemas bagi perempuan. Walaupun sulit melihat hubungan langsung

antara estrogen dengan depresi, namun hasil penelitian Maryatul,dkk (2005) menunjukkan bahwa adanya peningkatan kejadian gejala depresi selama masa perimenopause dan adanya mekanisme efek steroid seks di otak dapat menyebabkan depresi. Sehingga kadar estrogen yang rendah dan faktor stresor psikososial merupakan faktor yang berperan untuk terjadinya depresi pada masa perimenopause. (Kemenkes RI, 2010).

Perubahan-perubahan psikologi yang terjadi pada perimenopause menuju menopause yaitu :

1) Jangka pendek

Seperti mudah tersinggung, Ingatan menurun, Sakit kepala, Insomnia, Mudah lelah, dan Gangguan seksual.

2) Jangka panjang

a) Perubahan Emosi

Perubahan emosi juga disebabkan karena faktor sosial sehingga perempuan merasa tidak dibutuhkan, tidak menarik, dan kurang percaya diri. Perubahan emosi disini tampak pada kelelahan mental, menjadi lekas marah, dan perubahan suasana hati yang begitu cepat. Biasanya perubahan yang terjadi tidak disadari oleh wanita tersebut. Maka diperlukan pendekatan khusus seperti obrolan ringan dengan sahabat atau siapa saja yang pernah mengalami hal yang sama sering kali dapat menjadi dukungan emosi terbaik.

b) Kecemasan

Banyak dari wanita yang mengalami menopause menjadi seorang yang mudah mengalami cemas. Kecemasan ini timbul sebagai akibat seringnya kekhawatiran yang menghantui dalam menghadapi situasi yang sebelumnya tidak pernah mereka khawatirkan.

Tanda-tanda psikologis yang sering dialami wanita menopause yaitu: Suasana hati yang menunjukkan ketidaktenangan psikis seperti gampang marah dan rasa tegang, Pikiran yang tidak menentu sebagai akibat kekhawatiran yang berkepanjangan sehingga mereka sulit untuk berkonsentrasi, Sangat sensitif dan merasa tidak berdaya, Selalu menghindari situasi-situasi yang menimbulkan kecemasan dan mereka selalu lari dari kenyataan, Perilaku gelisah seperti gugup, agitasi, dan kewaspadaan yang berlebihan, Depresi, mudah cemas, insomnia dan sakit kepala.

c) Stress

Respon-respon stress pada wanita menopause begitu beragam, sumber-sumber stres wanita menopause tidak bisa ditebak. Namun bila terlihat dari siklus suasana hati, misalnya reaksi marah dan sedih.

d) Depresi

Depresi adalah gangguan alam perasaan yang ditandai dengan kemurungan dan kesedihan. Wanita menopause yang

engalami depresi akan sering merasa sedih karena kehilangan kemampuan reproduksinya. Pada masa perimenopause, anak-anak yang sudah tumbuh dewasa cenderung sibuk dengan urusan masing-masing, saat itulah wanita menopause benar-benar merasa kehilangan perannya.

Bentuk-bentuk depresi dari wanita yang menopause terlihat dari: Hilangnya rasa percaya diri atas kemampuan organ reproduksinya, Kesedihan akibat ditinggalkan anak-anaknya atau suami yang meninggal, Sedih karena sudah menurun daya tariknya, Merasa tertekan karena seluruh aktivitasnya dan perannya sudah diambil alih, Sakit yang tidak sembuh-sembuh atau penyakit kronis, Faktor lingkungan seperti berhenti bekerja/pensiun, anak-anak meninggalkan rumah, kematian atau perceraian, dan usia tua (emptiness syndrome).

Wanita menopause terjadi perubahan suasana hati (Emosional) yang berlangsung drastis, merasa tertekan, terpuruk.

Gejala depresi diantaranya murung atau letih, sulit tidur pulas terutama menjelang dini hari, lelah terus-menerus, sulit membuat keputusan, rasa bersalah, rasa sedih dan dorongan untuk menangis, terkadang penderita depresi cenderung suka makan, minum, merokok, dan terkadang bisa pula kehilangan nafsu makan (Andira, 2010).

d. Perubahan Pola Hubungan Seksual

Terjadi penurunan aktifitas seksual pada menopause, tetapi sebagian pasangan masa tua menambah keinginan untuk melakukan aktifitas seksual. Jadi kesenangan dalam aktifitas ini sangat beragam alasan : perasaan feminim, tidak adanya ketegangan, meningkatnya kualitas tidur, tidak ada emosi, dapat menimbulkan perasaan keintiman, namun beberapa perempuan merasakan ketidaknyamanan, tidak enak, nyeri senggama, dan kekeringan (Kemenkes RI, 2010).

e. Perubahan-Perubahan Pada Alat Reproduksi

1) Urogenital

Alat genital perempuan dan saluran kemih bagian bawah sangat dipengaruhi oleh estrogen. Kekurangan estrogen dapat menimbulkan berbagai jenis keluhan, mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Banyak perempuan yang tidak mau berkonsultasi dengan dokter. Keluhan genital dapat berupa : iritasi, rasa panas, gatal, keputihan, nyeri, berkurang cairan vagina, dan vagina berkerut.

Keluhan pada saluran kemih berupa sering berkemih, tidak dapat menahan kencing, nyeri berkemih, sering berkemih malam, dan inkontinensia (Kemenkes RI, 2010).

2) Ovarium

Pada usia lebih 30 tahun ovarium mulai mengecil dan jumlah kista fungsional bertambah, yang mencapai puncaknya antara usia 40-45 tahun. Pada usia ini tidak jarang ditemukan hiperplasiastroma

ovarium, dan setelah menopause akan berkurang, dimana stroma ovarium menjadi fibrotik. Meskipun telah menghentikan fungsinya, ovarium masih tetap sebagai organ endokrin karena setelah menopause, sel-sel halus dan sel-sel stromanya masih dapat memproduksi testosteron androstendion dalam jumlah besar dan memproduksi estradiol dan progesteron dalam jumlah kecil. Pada perempuan yang dilakukan ooforektomi bilateral terjadi penghentian produksi androgen (Kemenkes RI, 2010).

Kista ovarium dijumpai pada 30% perempuan pasca menopause awal dan sebanyak 10% dijumpai pada pasca menopause. Pemberian TSH pada awal menopause dapat mengurangi timbulnya kista ovarium, sedangkan pemberian pada pasca menopause lanjut tidak memiliki pengaruh lagi (Kemenkes RI, 2010).

3) Uterus

Begitu memasuki usia pramenopause, panjang kavum uteri mulai berkurang. Pasca menopause terjadi involusi miometrium, yang bila terdapat miom uterus tersebut akan mengalami regresi. Hal ini disebabkan rendahnya estrogen dalam darah. Endometrium menjadi atropi dan ketebalannya kurang 5 mm. Dinding pembuluh darah menjadi tipis dan rapuh. Hal inilah yang menjelaskan mengapa kadang-kadang terjadi perdarahan pada perempuan menopause. Endometrium yang atropi masih memiliki reseptor

estrogen, sehingga pemberian TSH dapat menyebabkan penebalan endometrium (Kemenkes RI, 2010).

4) Serviks

Pada usia perimenopause, serviks juga mengalami proses involusi, serviks berkerut, serta epitelnya tipis dan mudah cedera. Kelenjar endoservikal juga atropi lendir serviks menjadi berkurang. Kekurangan estrogen tidak begitu berpengaruh terhadap epitel serviks dibandingkan terhadap epitel vagina, yang sangat rentan terhadap kekurangan estrogen. Pemberian TSH-1 dapat meningkatkan lendir serviks dan mulut rahim sedikit terbuka (Kemenkes RI, 2010).

5) Vulva

Involusi vulva terjadi karena usia tua, sedangkan atrofi hilangnya furgor, dan elastitas sangat dipengaruhi oleh estrogen. Pasca menopause, rambut pubis mulai berkurang, labia mayora dan klitoris mengecil, dan introitus vagina menjadi sempit dan kering. Kulit vulva menjadi atrofi, lemak subkutan berkurang, terjadi perubahan dalam pembentukan epitel dan korium, yang dewasa ini disebut sebagai distofi, atau dulu dikenal dengan 'Craurosis vulvae'. Pada distofi vulva selain terjadi atrofi, juga terjadi perubahan berupa hiperkeratosis (Kemenkes RI, 2010).

Pasien mengeluh gatal, nyeri dan sepertinya ada benda asing di vagina. Gatal yang kronis sulit di obati dan menyebabkan perasaan

tidak nyaman. Vulva mudah terkena infeksi (vulvitis) dan infeksi kronik dengan jamur (Kandidiasis) (Kemenkes RI, 2010).

6) Vagina

Pascamenopause terjadi involusi vagina dan vagina kehilangan rugae. Epitel vagina atrofi dan mudah cedera. Vaskularisasi dan aliran darah ke vagina berkurang sehingga lubrikasi berkurang yang mengakibatkan hubungan seks menjadi sakit. Atrofi vagina menimbulkan rasa panas, gatal, serta kering pada vagina. Pada ovariectomi bilateral, akibat penurunan estrogen yang begitu cepat, kelainan-kelainan yang muncul biasanya tidak begitu parah, pH vagina semakin meningkat, sehingga vagina mudah terinfeksi dengan trikomonas, kandida albicans, stafilokokus, dan streptokokus, serta bakteri coli atau gonokokus. Epitel vagina sangat sensitif bereaksi terhadap perubahan estrogen, maka pemberian estrogen dosis rendah saja telah dapat memiliki pengaruh terhadap epitel vagina. Pemberian obat jantung turunan digitalis, seperti digoxin (bukan digoksin) yang memiliki efek mirip estrogen dapat memberikan efek terhadap epitel vagina. Efek yang sama juga terlihat pada penggunaan fitoestrogen (Kemenkes RI, 2010).

8. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Perimenopause

a. Usia Saat Haid Pertama Kali (Menarche)

Berdasarkan ahli yang melakukan penelitian menemukan adanya hubungan antara usia pertama kali mendapat haid dengan usia seorang

wanita memasuki menopause. Kesimpulan dari penelitian-penelitian ini mengungkapkan, bahwa semakin muda seorang mengalami haid pertama kalinya, semakin tua atau lama ia memasuki masa menopause (Suparni, 2016).

b. Jumlah Anak

Meskipun belum ditemukan hubungan antara jumlah anak dan menopause, tetapi beberapa penelitian menemukan bahwa makin sering seorang wanita melahirkan maka semakin tua atau lama mereka memasuki menopause (Suparni, 2016).

c. Usia Melahirkan

Masih berhubungan dengan melahirkan anak, bahwa semakin tua seseorang melahirkan anak, semakin tua ia mulai memasuki menopause. Penelitian yang dilakukan *Beth Israel Deaconess Medical Center* ini *Boston* mengungkapkan bahwa wanita yang masih melahirkan di atas 40 tahun akan mengalami usia menopause yang lebih tua. Hal ini terjadi karena kehamilan dan persalinan akan memperlambat proses penuaan tubuh (Suparni, 2016).

d. Faktor Psikis

Perubahan-perubahan psikologis maupun fisik ini berhubungan dengan kadar estrogen, gejala yang menonjol adalah berkurangnya tenaga dan gairah, berkurangnya konsentrasi dan kemampuan akademik, timbulnya perubahan emosi seperti mudah tersinggung, susah tidur, rasa kekurangan, rasa kesunyian, ketakutan keganasan, tidak sadar lagi dll.

Perubahan psikis ini berbeda-beda tergantung dari kemampuan wanita untuk menyenangkan diri (Suparni, 2016).

e. Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi memengaruhi faktor fisik, kesehatan dan pendidikan. Apabila faktor-faktor diatas cukup baik, akan mengurangi beban fisiologis, psikologis. Kesehatan akan faktor klimakterium sebagai faktor fisiologis (Suparni, 2016).

f. Budaya Dan Lingkungan

Pengaruh budaya dan lingkungan sudah dibuktikan sangat memengaruhi wanita untuk dapat atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan fase klimakterium dini (Suparni, 2016).

g. Penggunaan Obat-Obat KB

Karena obat-obat KB menekan fungsi hormon dari indung telur, kelihatannya wanita yang menggunakan pil KB lebih lama baru memasuki umur menopause (Mandang, 2016).

9. Tanda dan Gejala Perimenopause

Penurunan fungsiovarium dapat berlangsung cepat pada sebagian wanita dan lebih lambat pada yang lainnya. Sebagian wanita menghasilkan estrogen endogen yang cukup sehingga tetap tanpa gejala, sedangkan yang lain memperlihatkan beragam gejala selama perimenopause. Gejala-gejala tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

(Purwoastuti, 2015).

a. Gangguan neurovegetatif (vasomotorik-hipersimpatokotoni)

- 1) Gejala kepanasan (hot flushes)
- 2) Keringat malam yang banyak
- 3) Rasa kedinginan
- 4) Sakit kepala
- 5) Besing dalam telinga
- 6) Tekanan darah yang goyah
- 7) Berdebar-debar
- 8) Susah bernafas
- 9) Jari-jari atrofi
- 10) Gangguan usus (meteorismus)

b. Gangguan psikis

- 1) Mudah tersinggung
- 2) Depresi
- 3) Lekas lelah
- 4) Kurang bersemangat
- 5) Insomnia (sulit tidur)

c. Gangguan organik

- 1) Infark miokard (gangguan sirkulasi)
- 2) Atero-sklerosis (hiperkolesterolemia)
- 3) Osteoporosis
- 4) Gangguan kemih (dysuria)
- 5) Nyerienggama (dyspareunia)

- 6) Kulitmenipis
- 7) Gangguankardiovaskuler.

10. Upaya-upaya Menghadapi Perimenopause

a. Pola Makan Yang Tepat

Kehilangan estrogen pada wanita perimenopause menimbulkan berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung dan osteoporosis. Karena itu pengaturan asupan gizi sangat berpengaruh untuk mempertahankan kondisi tubuh yang maksimal. (Lubis, 2016).

Berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi (AKG) dari kementerian kesehatan RI, kebutuhan kalori untuk perempuan usia 31-51 tahun adalah 2150 kkal. Pada wanita perimenopause, perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi antara lain :

1) Kalsium

Berfungsi untuk menguatkan tulang dan gigi yang dapat di peroleh dari bayam, jeruk, pepaya.

2) Mineral

Berfungsi untuk mencegah anemia dan pengeroposan tulang yang dapat diperoleh dari makanan kol, pepaya, sayuran hijau dan telur.

3) Fitoestrogen

Berfungsi untuk mengurangi keluhan-keluhan yang disebabkan karena kekurangan hormon estrogen dalam tubuh seperti pepaya dan kacang kedelai.

4) Air dan serat

Air sangat penting untuk mengeluarkan isi pembakaran energi tubuh seperti minum air minimal 2 liter/hari. Sedangkan serat dianjurkan untuk memperlancar buang air besar yang di dapatkan dari apel, wortel, brokoli, dan kacang merah.

5) Protein

Dianjurkan unrtuk memenuhi kebbutuhan protein nabati dan hewanidengan perbandingan 3:1. Hindari konsumsi protein berlebihan karena akan memberatkan fungsi hati dan ginjal yang di dapatkan dari telur, susu dan brokoli.

6) Lemak

Kebutuhan lemak lebih sedikit, konsumsi lemak dibatasi jangan berlebih dari seperempat kebutuhan energi karena dapat menyebabkan kolesterol.

7) Karbohidrat

Dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat karena mengandung vitamin, mineral dan serat yaitu : ubi jalar, roti, dan nasi.

Pada saat tubuh menjadi tua, umumnya seseorang akan memiliki atau mengalami keluhan atau gangguan, oleh karena itu penting mengurangi atau tidak mengkonsumsi bahan-bahan yang tidak baik bagi penyakit atau tubuh di masa tua sehingga penyakit atau menurunkan kondisi kesehatannya.

b. Terapi Sulih Hormon (TSH)

Terapi sulih hormon atau HRT (Hormon Replacement Therapy) merupakan pilihan untuk mengurangi keluhan-keluhan yang timbul pada wanita yang mengalami perimenopause. Atas dasar bahwa keluhan-keluhan tersebut terutama disebabkan oleh kekurangan hormon estrogen, maka pengobatan pilihan utama adalah pemberian substitusi estrogen dengan ketentuan tidak menderita tumor yang tergantung estrogen (estrogen dependent), misalnya mioma uterus (Lubis, 2016).

Pengobatan dapat dilakukan dengan cara pemberian estrogen saja, terutama estrogen lemah seperti estriol, selama 21 hari berturut-turut disusul dengan masa istirahat selama 7 hari selama masa istirahat itu perlu diperhatikan apakah keluhan-keluhan telah hilang atau menetap. Jika keluhannya hilang, maka pengobatan dapat dihentikan, tetapi jika tidak berubah, maka pengobatan dilanjutkan. Namun demikian, mengingat bahwa estrogen juga dapat memengaruhi payudara dan mungkin dapat menimbulkan keganasan. Maka sangat dianjurkan untuk selalu menggabungkan pengobatan estrogen itu dengan progesteron. Pemberian estrogen beberapa tahun ternyata dapat menurunkan kejadian patah tulang sebesar 50-60%, dan mencegah terjadinya penyakit jantung koroner sebesar 40-50%. Atas dasar ini dianjurkan untuk memberikan

estrogen sejak masa perimenopause. Estrogen dapat diberikan 8-10 tahun, bahkan bila perlu bisa sampai 30-40 tahun (Lubis, 2016).

c. Aktivitas fisik yang cukup

Aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan-keluhan yang terjadi pada wanita perimenopause. Selain itu juga dapat menolong untuk mengurangi ketidaknyamanan yang disebabkan oleh perimenopause. Latihan dan olahraga pada masa ini dapat memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dan kekuatan otot. Apabila olahraga dilakukan dengan teratur terbukti dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran.

Manfaat olahraga antara lain :

- 1) Melancarkan aliran darah, sehingga badan terasa segar
- 2) Meningkatkan kualitas tidur
- 3) Meningkatkan daya tahan tubuh
- 4) Memperkuat dan melenturkan otot dan sendi
- 5) Menjaga keseimbangan gerak
- 6) Pengaturan kadar gula darah menjadi lebih baik
- 7) Memberi rasa santai
- 8) Menimbulkan rasa senang
- 9) Meningkatkan hubungan dengan orang lain
- 10) Memperlambat proses penuaan

Prinsip latihan atau olahraga pada perimenopause antara lain :

- 1) Intensitas sedang dilakukan 3 kali seminggu secara teratur
- 2) Dipilih olahraga yang tidak mudah menimbulkan cedera
- 3) Menghindari olahraga yang bertanding
- 4) Memilih olahraga yang disenangi dan bervariasi
- 5) Olahraga sebaiknya dilakukan 2 jam setelah selesai makan, sebelum olahraga dianjurkan minum 2 gelas air untuk menghindari dehidrasi

Jenis aktifitas fisik atau olahraga yang baik bagi perimenopause yaitu :

- 1) Melakukan pekerjaan rumah
- 2) Berjalan-jalan
- 3) Jogging atau olahraga lari dengan kecepatan sedang dan bukan untuk perlombaan
- 4) Berenang
- 5) Senam aerobik ringan

d. Penanganan psikologi

- 1) mencari tahu gejala-gejala menopause dan sebagaimana mengatasinya ataupun meminimalkan perubahan yang dia rasakan melalui konseling yang dia lakukan dengan dokter yang dia kunjungi ataupun kepada teman-teman yang sudah mengalami hal yang sama dengan dirinya

- 2) mengkomunikasikan dengan orang terdekat misalnya mertua yang sudah terlebih dahulu mengalaminya dengan meminta saran apa yang harus di lakukan dengan masa menopause yang di hadapi
- 3) Mengkomunikasikan dengan suami tentang menopause dan menyampaikan hasil yang diberitahukan oleh dokter atau tenaga kesehatan tentang efek dari menopause
- 4) Tidak mengubah kebiasaan yang selama ini sudah dlakukan, misalnya penampilan sehari-sehari dan kinerja dikantor
- 5) Support dari keluarga terutama suami dan orang-orang terdekat sangat penting bagi ibu yang mengalami menopause untuk membantu ibu menjalani masa tersebut agar ibu tidak mengalami cemas, bersedih hati, khawatir, stress bahkan depresi ketika mengalami masa menopause. Serta memperbanyak mendekati diri kepada Allah swt dengan beribadah (dirikan shalat 5 waktu, sholat sunnah), dzikir, berbuat kebajikan dimuka bumi. Seperti dalam firman Allah swt berikut ini :

وَلَنبَلِّغَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالنَّمْرِتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya :

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar” (QS. Al-Baqarah: 155).

Dalam hal ini Allah swt telah berfirman setiap manusia yang hidup akan diberikan cobaan berupa rasa takut/cemas, dalam menghadapi menopause, seorang wanita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah swt dan banyak melakukan hal-hal yang positive. Dengan hal ini manusia akan lebih mendapatkan ketenangan batin dan lahiriah.

e.Kebersihan

Untuk menghindari terjadinya infeksi vagina, saluran kencing dan kulit maka kebersihan diri harus dijaga. Terutama kebersihan kulit, vulva dan vagina. Hindarkan penggunaan sabun yang mengeringkan kulit.

f.Pendidikan dan Konsultasi

- 1) Perubahan-perubahan yang terjadi
- 2) Kebutuhan yang diperlukan pada perimenopause
- 3) Tanda-tanda bahaya yang mungkin terjadi pada pra dan pasca menopause
- 4) Makanan yang dibutuhkan
- 5) Aktifitas dan olahraga yang harus dilakukan
- 6) Penggunaan hormon dan suplemen

Beberapa perempuan perimenopause membutuhkan bantuan tenaga kesehatan, sehingga konsultasi dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Konsultasi ini dilakukan pada saat pelayanan di sarana kesehatan, juga di rumah saat pelayanan rumah/pembinaan keluarga (Kemenkes RI, 2010).

Pendidikan dan konsultasi ini juga diberikan dalam rangka memberikan dukungan psikologi, sehingga perempuan mendapatkan ketenangan dan support dalam menghadapi perubahan dan masalahnya (Kemenkes RI, 2010).

Dalam rangka membantu mengatasi masalah pola dan aktifitas seksual, maka perempuan dan pasangannya perlu mendapatkan pendidikan dan konsultasi tentang hubungan seksual (Kemenkes RI, 2010).

11. Peran Bidan Dalam Menghadapi Perimenopause

Sebagai tenaga kesehatan bidan memiliki tanggung jawab untuk memberikan asuhan pada perimenopause dan harus dapat melakukan peran secara maksimal sehingga wanita perimenopause dapat melalui masa menopausenya dengan menyenangkan. Adapun peran yang dapat dilakukan bidan di antaranya :

- a. Memberikan asuhan kebidanan kepada wanita perimenopause yang sesuai dengan keluhan yang dialaminya
- b. Secara berkala memberikan penyuluhan ataupun komunikasi edukasi dan informasi (KIE) sesuai dengan kebutuhan wanita perimenopause
- c. Memberikan forum bagi wanita perimenopause yang memiliki kegiatan fisik maupun spriritual (Suparni & Astutik, 2016).

B. TINJAUAN KHUSUS TENTANG KONTRASEPSI PIL

1. PENGERTIAN

Pil KB adalah merupakan salah satu kontrasepsi hormonal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang ditambahkan ke dalam tubuh seorang wanita dengan cara diminum (pil) tujuan dari konsumsi pil KB adalah untuk mencegah, menghambat dan menjarangkan terjadinya kehamilan yang memang tidak diinginkan. Untuk itu kepatuhan mengkonsumsi pil KB secara teratur sesuai petunjuk tenaga kesehatan harus dilakukan. Kontrasepsi hormonal menduduki peringkat pertama pada penggunaan kontrasepsi di Indonesia dimana 47,54% KB suntik, 29,58% pil, 11,07% IUD, 10,46% implant, 3,52% MOW, 3,15 kondom dan hanya 0,69% MOP (Depkes RI, 2014).

Syariat Islam tidak melarang seseorang untuk melakukan KB jika dilakukan berdasarkan motivasi-motivasi dengan syarat-syarat yang sesuai syariat seperti : *daf' ul haraj* (menolak kesempitan), *ad-dharar yuzaal* (bahaya harus dihilangkan). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang masalah penggunaan alat kontrasepsi menurut Islam tidak dapat dipisahkan antara niat/motivasi, metode penggunaan, alat dan resiko, sehingga bila komponen tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam, maka pemakaian alat kontrasepsi tersebut menjadi haram. Misalnya, masalah niat, meski alat yang digunakan halal namun karena motivasinya dilarang dalam Islam seperti karena takut miskin, karier dan sebagainya, maka hukumnya menjadi haram.

Menimbang bahwa tuntutan dari pembatasan keturunan dari pencegahan kehamilan merupakan kategori tuntutan yang mengarah pada upaya pengelabuhan terhadap kaum muslimin secara umum dan umat Islam di Arab secara khusus sehingga mereka memiliki kekuatan untuk menjajah negeri (Islam) dan penduduknya. Disamping tindakan tersebut merupakan suatu kebiasaan yang berlalu ada ummat jahiliah dan merupakan bentuk dari berburu sangka kepada Allah swt. Sekaligus melemahkan yang seharusnya kuat dengan tumbuh dan berkembang generasi baru. Maka majelis menetapkan bahwa tidak diperbolehkan mencegah kehamilan dengan alasan takut tertimpa kemiskinan sebab dalam ayat Al-qur'an banyak penjelasan Allah swt. Tentang pentingnya keluarga berkualitas.

Allah berfirman dalam Q.S surat Al-Isra' /17 : 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar” (Q.S surat Al-Isra' /17 : 31).

Pandangan Majelis Ulama Indonesia juga menjelaskan bahwa ajaran agama Islam membenarkan keluarga berencana karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Hal ini berdasarkan pada ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

Allah berfirman dalam Q.s Surat An- Nisa' /4:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahanya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang anak-anak yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Q.S surat An- Nisa’/4:9).

Hendaklah orang-orang memberikan nasehat kepada pemilik harta yang tidak membagikan hartanya kepada orang lain yang menyebabkan anak-anaknya terbingkalai, hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka akan meninggal dibelakang mereka, yakni setelah kematian mereka. Anak-anak yang lemah karena masih kecil atau tidak memiliki harta yang mereka khawatir lemah itu. Apakah jika keadaan serupa mereka alami, mereka akan menerima nasehat-nasehat seperti yang mereka berikan itu, tentu saja tidak karena itu hendaklah mereka takut kepada Allah atau keadaan anak-anak mereka di masa depan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan mengidahkan semua perintah-nya dan menjauhi larangannya dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat (Shihab, 2002).

2. ETIOLOGI

Kontrasepsi oral juga dapat digunakan untuk mencegah hal-hal seperti kehamilan ektopik, kanker ovarium kanker endometrium, penyakit radang panmggul, kelainan pada payudara yang sifatnya jinak, dismenorrhoe, dan jerawat. Cara kerja kontrasepsi oral adalah menahan

ovulasi, mencegah implantasi, lendir serviks mengental sehingga sperma sulit lewat, dan transportasi telur terganggu karena pergerakan tuba (Jitowiyono & Rouf, 2019).

Mekanisme utama pil kombinasi untuk mencegah terjadinya kehamilan adalah dengan menghambat keluarnya sel telur (ovum) dari indung telur (ovarium). Hormon yang digunakan untuk pil kombinasi adalah estrogen dan progesteron (Nurjasmie,dkk, 2016).

3. KEUNTUNGAN DAN KEKURANGAN ALAT KONTRASEPSI KB PIL

Adapun keuntungan dari penggunaan pil kombinasi :

- a. Memiliki efektifitas yang tinggi (hampir menyerupai efektifitas tubektomi), bila digunakan setiap hari.
- b. Resiko terhadap kesehatan sangat kecil.
- c. Tidak mengganggu hubungan seksual.
- d. Siklus haid menjadi teratur, banyaknya darah haid berkurang (mencegah anemia), tidak terjadi nyeri haid.
- e. Dapat digunakan jangka panjang selama perempuan masih ingin menggunakannya untuk mencegah kehamilan.
- f. Dapat digunakan sejak usia remaja hingga menopause.
- g. Mudah dihentikan setiap saat.
- h. Kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan.
- i. Dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat.

- j. Membantu mencegah kanker ovarium, kanker endometrium, kista ovarium, penyakit radang panggul, kelainan jinak pada payudara, kelainan jinak pada payudara, dimenore.

Adapun kekurangan dari penggunaan pil kombinasi :

- a. Mahal dan membosankan karena harus menggunakannya setiap hari.
- b. Mual, terutama pada 3 bulan pertama.
- c. Perdarahan bercak atau perdarahan terutama 3 bulan pertama.
- d. Nyeri payudara.
- e. Berat badan naik sedikit, tetapi pada perempuan tertentu kenaikan berat badan justru memiliki dampak positif.
- f. Berhenti haid (amenorea). Jarang pada pil kombinasi.
- g. Tidak boleh diberikan pada perempuan menyusui (mengurangi ASI).
- h. Pada sebagian kecil perempuan dapat menimbulkan depresi, dan perubahan suasana hati, sehingga keinginan untuk melakukan hubungan seks berkurang.
- i. Dapat meningkatkan tekanan darah dan retensi cairan, sehingga resiko stroke, dan gangguan pembekuan darah pada vena dalam sedikit meningkat. Pada perempuan usia > 35 tahun dan merokok perlu hati-hati (Jitowiyono & Rouf, 2019).

4. SYARAT MENGGUNAKAN PIL KOMBINASI

Seorang klien harus memenuhi persyaratan berikut agar bisa menggunakan pil kombinasi sebagai alat kontrasepsi.

- a. Gemuk atau kurus.
- b. Berada pada usia reproduksi.
- c. Setelah melahirkan dan tidak menyusui.
- d. Pasca keguguran.
- e. Telah memiliki anak ataupun sudah memiliki anak.
- f. Memerlukan metode kontrasepsi dengan efektivitas yang tinggi.
- g. Menderita anemia karena haid yang berlebihan.
- h. Saat haid mengalami nyeri yang hebat.
- i. Tidak memiliki siklus haid yang teratur.
- j. Pernah mengalami kehamilan ektopik.
- k. Perempuan yang mengalami kelainan payudara jinak.
- l. Setelah melahirkan enam bulan dan tidak memberi ASI eksklusif dan semua jenis kontrasepsi yang dianjurkan tidak cocok baginya.
- m. Menderita kencing manis tanpa komplikasi pada ginjal, pembuluh darah, saraf, dan mata.

5. KONTRAINDIKASI PIL KOMBINASI

- a. Hamil atau dicurigai hamil.
- b. Menyusui eksklusif.
- c. Perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya.
- d. Penyakit hati akut (hepatitis).
- e. Usia > 35 tahun.
- f. Riwayat penyakit jantung, stroke, atau TD > 180/110 mmHg.

- g. Riwayat gangguan faktor pembekuan darah atau kencing manis > 20 tahun.
- h. Kanker payudara atau dicurigai kanker payudara.
- i. Migrain atau gejala neorologik fokal (epilepsi/riwayat epilepsi).
- j. Tidak dapat menggunakan pil secara teratur setiap hari.

6. WAKTU MULAI MENGGUNAKAN PIL KOMBINASI

- a. Setiap saat selagi haid, untuk menyakinkan kalau perempuan tersebut tidak hamil.
- b. Hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid.
- c. Boleh menggunakan pada hari ke-8, tetapi perlu menggunakan metode kontrasepsi yang lain (kondom) mulai hari ke-8, sampai hari ke-14 atau tidak melakukan hubungan seksual sampai anda telah menghabiskan paket pil tersebut.
- d. Setelah melahirkan
 - 1) Setelah 6 bulan pemberian ASI eksklusif.
 - 2) Setelah 3 bulan dan tidak menyusui.
 - 3) Pasca keguguran (segera atau dalam waktu 7 hari).
- e. Bila berhenti menggunakan kontrasepsi injeksi, dan ingin menggantikan dengan pil kombinasi, pil dapat segera diberikan tanpa perlu menunggu haid.

C. PROSES MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Menurut Masruroh (2015) Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk pikiran, tindakan, berdasarkan teori-teori ilmiah, penemuan-pememuan, keterampilan dalam rangkain atau tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang terfokus pada kliean.

Proses asuhan kebidanan yang telah dilakukan harus dicatat secara benar, singkat, jelas dan logis dalam suatu metode pendokumentasian yang dapat mengomunikasikan kepada orang lain mengenai asuhan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan pada seorang klien, yang didalamnya tersirat proses berpikir yang sistematis dalam menghadapi seorang klien sesuai dengan langkah-langkah dalam proses manajemen asuhan kebidanan(Yulifah & Sirachmindar,2014).

2. Tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan

a. Langkah 1 : Identifikasi Data Dasar

Pada langkah I, peneliti akan melakukan pengkajian dalam mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap. Pada langkah ini bidan mengumpulkan semua informasi akurat dan lengkap dari beberapa sumber yang berkaitan dengan kondisi klien dengan cara wawancara dengan klien, suami, keluarga dan dari catatan/pasien untuk memperoleh data

subjektif. Sementara itu, untuk data objektif dilakukan melalui observasi dan pemeriksaan (Yulifah & Surachmindari, 2014).

Data subjektif menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data melalui anamnesa. Saat melakukan anamnesis, ibu akan menyatakan bahwa usianya antara 45-55 tahun, Dan biasanya ibu sudah tidak bekerja lagi. Dalam menjalani aktivitas, bisa saja ibu akan mengalami berkurangnya tenaga dan gairah, konsentrasi dan kemampuan akademik mulai berkurang, mudah tersinggung, susah tidur, mengeluh terasa panas dan berkeringat pada malam hari, muncul rasa sakit pada saat berhubungan seksual, nyeri pada sendi, sakit kepala, sembelit, sering lupa dan perubahan mood yang terjadi secara tiba-tiba.

Selain itu, perlu juga ditanyakan tentang riwayat menstruasinya sejak usia berapa, sebab semakin muda seseorang mengalami haid pertama kalinya, semakin tua atau semakin lama pula ia akan memasuki masa menopause. Ibu juga akan menyatakan terjadi perubahan pada siklus haid ada yang periodenya lebih singkat atau lebih lama, volume yang banyak atau sedikit dan kurun wanita antar dua siklus.

Tak lupa pula ditanyakan tentang riwayat KB, jenis KB yang digunakan dan lamanya menjadi akseptor, serta efek samping apa yang pernah dialami oleh ibu. Bagi ibu yang memiliki anak, ditanyakan berapa kali hamil, apakah persalinannya normal atau tidak,

anak terakhir sudah berusia berapa karena semakin tua seseorang melahirkan anak, semakin tua ia mulai memasuki usia perimenopause.

Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi, budaya dan lingkungan mestinya sudah terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut akan mempengaruhi wanita dalam menyesuaikan diri dengan keluhan-keluhan pada masa perimenopause.

Data objektif menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium, dan test diagnostik yang dirumuskan dalam data fokus. Pada perimenopause data objektif dengan melakukan pemeriksaan fisik yang sesuai dengan kebutuhan. Bisa saja didapatkan hasil pemeriksaan tekanan darah yang goyah (tidak stabil) dan penambahan berat badan. Pada pemeriksaan fisik head to toe, didapatkan rambut rontok, dan beruban, kulit makin keriput, mengendornya otot sekitar dagu, lengan dan perut, payudara mulai kendur, dan pada test diagnostik, saluran uretra mengering, menipis dan kurang elastis.

b. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah ini, peneliti melakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah aktual berdasarkan intervensi yang benar atas data yang telah di dapat. Data dasar yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah spesifik. Masalah dan diagnosis

keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosis tetapi sungguh membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan pengarahannya. Masalah juga sering menyertai diagnosis (Yulifah & Surachmindari, 2014).

Pada kasus perimenopause dengan pemakain alat kontrasepsi KB pil dapat ditegakkan diagnosis dengan adanya hasil anamnesis dari pasien seperti ibu mengatakan ingin menggunakan alat kontrasepsi sederhana yang tidak mengganggu perubahan haidnya, serta ibu mengatakan sejak kapan ibu mulai menggunakan alat kontrasepsi tersebut, keluhan ibu yang dirasakan sejak menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Serta dilakukannya pemeriksaan keadaan umum ibu baik, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik tidak didapatkan kelainan.

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosa Dan Masalah Potensial

Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial lainnya berdasarkan diagnosa/masalah yang sudah ada yaitu suatu bentuk antisipasi. Pencegahan apabila perlu menunggu dengan waspada dan persiapan untuk suatu suatu pengakhiran apapun. Pada langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, sangat diharapkan oleh bidan jika masalah

potensial benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman (Yulifah & Surachmindari, 2014).

Pada akseptor KB pil, hal-hal yang perlu diantisipasi seperti:

- 1) Mual
- 2) Nyeri pada payudara
- 3) Perdarahan di luar masa haid
- 4) Kenaikan berat badah
- 5) Terjadinya pengumpakan darah
- 6) Kanker payudara
- 7) Kanker serviks

Mual dan muntah disebabkan karena komponen estrogen yang terdapat pada pil dapat menstimulasi reseptor dopamin *Chemoreceptor Trigger Zone (CTZ)* yang merupakan sumber stimulus pusat muntah yang terletak di medula otak (Hariadini, 2017).

Perdarahan terjadi diluar menstruasi yang disebabkan rangsangan hormonal mempengaruhi kerja *hipotalamus ovarium* sehingga pola haid berubah. Perubahannya lama dan banyaknya perdarahan: *hipomenore* dan *menoragia* serta *hipomenore*. Kelainan siklus haid contohnya : *polimenore*, *oligomenore* dan *amenore*. Perdarahan diluar haid yaitu *metrorargia* (Ningtiyasari, 2017).

Kenaikan berat badan terjadi karena pada penggunaan sediaan oral kontrasepsi, terutama dalam jangka panjang, memang berdampak pada peningkatan berat badan. Hormon yang terkandung

dalam kontrasepsi hormonal dapat merangsang pusat pengendali nafsu makan di hipotalamus yang menyebabkan akseptor makan lebih banyak daripada biasanya (Setiawati, 2020).

Terjadinya kanker payudara disebabkan karena ketidakseimbangan hormon progesteron dan estrogen yang notabene digunakan untuk bahan alat KB hormonal. Ada dua teori yang membahas tentang cara estrogen dan progesteron menyebabkan kanker payudara. Yang pertama, resiko mutasi sel oleh peningkatan estrogen dan progesteron juga meningkat. Teori yang kedua, estrogen dan progesteron merangsang pertumbuhan sel-sel punca kanker payudara (Setiawati, 2020).

Kontrasepsi jenis oral menyebabkan wanita sensitif terhadap HPV yang dapat menyebabkan adanya peradangan pada genitalia sehingga beresiko untuk terjadi kanker serviks. Penggunaan alat kontrasepsi hormonal yang lama dapat mengacaukan keseimbangan hormonal estrogen dalam tubuh sehingga mengakibatkan perubahan sel yang normal menjadi tidak normal (Mulyandari, 2020).

Sehingga hal tersebut dapat dilakukan antisipasi terjadinya komplikasi atau efek samping dari penggunaan KB PIL.

d. Langkah IV : Tindakan Segera/Kolaborasi/Rujukan

Pada langkah ini, bidan menetapkan kebutuhan tindakan segera, melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. Setelah itu mengidentifikasi perlunya

tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien (Yulifah&Surachmindari,2014). Pada kasus perimenopause dengan akseptor KB pil tidak diperlukan adanya tindakan segera, kolaborasi atau rujukan.

e. Langkah V : Rencana Asuhan Kebidanan

Membuat suatu rencana asuhan kebidanan yang menyeluruh mencakup setiap hal yang berkaitan dengan semua aspek asuhan. Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu bidan dan klien agar terdapat dilaksanakan dengan efektif karena klien juga akan melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena itu, bidan adalah merumuskan rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan rencana asuhan bidan bersama klien kemudian membuat kesepakatan bersama sebelum melaksanakannya (Yulifah & Surachmindari, 2014). Rencana tindakan yang dapat dilakukan pada akseptor KB pil kombinasi adalah :

Berikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan berikan perhatian sepenuhnya pada klien agar terjadi hubungan emosional yang baik. Jelaskan kepada klien hasil pemeriksaan agar ibu mengetahui keadaannya. Berikan pertanyaan tentang jenis kontrasepsi apa yang diinginkan untuk mengetahui kontrasepsi yang diinginkan klien. Lakukan konseling kepada ibu tentang KB pil kombinasi (definisi, cara kerja, indikasi dan kontraindikasi, keuntungan dan

kekurangan, syarat menggunakan pil kombinasi, waktu mulai menggunakan pil kombinasi dan efek samping, tindakan yang dilakukan apabila klien lupa mengonsumsi KB Pil) untuk menambah pengetahuan klien tentang alat kontrasepsi yang akan digunakan.

Memberikan ibu HE (Health Education) tentang pemenuhan nutrisi dan cairan, istirahat/tidur dan personal hygiene untuk memenuhi kebutuhan dasar ibu dan setidaknya dapat mengurangi efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan. Jelaskan kepada ibu untuk datang kembali mengontrol keadaannya pada waktu 1 minggu sebelum pil habis agar kita dapat mengetahui perubahan yang terjadi atau efek samping yang dialami oleh pasien.

f. Langkah VI : implementasi asuhan kebidanan

Pada langkah ini bidan melaksanakan perencanaan asuhan menyeluruh, bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau anggota tenaga kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya dan memastikan langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana (Yulifah & Surachmindari, 2014).

Melaksanakan perencanaan asuhan pada ibu perimenopause dengan penggunaan alat kontrasepsi KB pil kombinasi yaitu dengan memberikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan memberikan perhatian sepenuhnya pada klien pada saat pertemuan pertama selanjutnya memberikan pertanyaan tentang pengalaman KB,

kesehatan reproduksi, tujuan, kepentingan, harapan, keadaan kesehatan kehidupan keluarganya, jenis kontrasepsi apa yang diinginkan. Setelah mengetahui beberapa hal tersebut selanjutnya yaitu menjelaskan tentang KB pil (definisi, cara kerja, indikasi dan kontraindikasi, keuntungan dan kekurangan, syarat menggunakan pil kombinasi, waktu mulai menggunakan pil kombinasi dan efek samping).

Menjelaskan kepada ibu cara penggunaan alat kontrasepsi KB pil kombinasi sesuai dengan standar pemberian, menjelaskan kepada ibu tindakan yang akan dilakukan apabila ibu lupa untuk minum KB pil, menjelaskan atau menganjurkan ibu untuk datang melakukan kontrol kembali pada waktu 1 minggu sebelum pil habis.

g. Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah ini merupakan suatu evaluasi dari rencana asuhan yang meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa telah terpenuhi. Rencana tersebut efektif dapat dianggap efektif jika memang benar-benar efektif dalam pelaksanaannya dan dianggap tidak efektif jika memang tidak efektif. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedang sebagian tidak (Yulifah & Surachmindari, 2014).

Beberapa hal yang di evaluasi yaitu apakah ibu sudah mengerti dengan penyuluhan dan konseling yang telah diberikan,

apakah ibu sudah melakukan apa yang telah dianjurkan dan telah diajarkan, bagaimana keadaan umum ibu, mengaji perubahan psikologis ibu dan mengukur tanda-tanda vital ibu untuk memantau keadaan ibu.

Asuhan yang diberikan dapat dikatakan efektif apabila dapat mengurangi efek samping dari pengguna KB PIL seperti perubahan berat badan, mengalami gangguan siklus haid yaitu berhenti haid (amenorea), nyeri pada payudara, terjadinya pengumpukan darah, kanker payudara dan kanker serviks yang dapat dideteksi secara dini sehingga bidan atau tenaga kesehatan lainnya dapat memberikan tindakan segera untuk menangani masalah tersebut.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Metode 4 langkah pendokumentasian yang disebut SOAP ini dijadikan sebagai proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan yang dipakai untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan klien dalam rekaman medis sebagai catatan perkembangan kemajuan.

Metode 4 langkah pendokumentasian SOAP yaitu:

a. Subjektif (S)

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh dari apa yang dikatakan, disampaikan dan dikeluhkan oleh klien melalui anamnesis dengan klien.

b. Objektif (O)

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh melalui inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi dan dari hasil pemeriksaan penunjang.

c. Assesment (A)

Merupakan ringkasan dari langkah II, III dan IV dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana dibuat kesimpulan berdasarkan dari data subjektif dan objektif sebagai hasil pengambilan keputusan klinis terhadap klien.

d. Planning (P)

Merupakan ringkasan dari langkah V, VI dan VII dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana planning ini dilakukan berdasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi terhadap keputusan klien yang diambil dalam rangka mengatasi masalah klien dan memenuhi kebutuhan klien. SOAP ini dilakukan pada asuhan akseptor KB pada tahap berikutnya, dan atakunjungan berikutnya yang dilakukan setiap bulan selama 4 kali kunjungan untuk memantau perkembangan klien. kunjungan rumah dilakukan untuk asuhan yang lebih efektif.

BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE

PADA NY “B” DENGAN AKSEPTOR LAMA KB PIL

DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR

TANGGAL 05 APRIL-20 APRIL 2022

No. Registrasi : xxx
Tanggal Kunjungan : 5 april 2022 Pukul 10 : 15 Wita
Tanggal Pengkajian : 5 april 2022 Pukul 10 : 15 Wita
Nama Pengkaji : Ruslia Hi.muhtar

A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar

1. Data Subjektif

a. Identitas Ibu / Suami

Nama : Ny “B” / Tn “M”
Umur : 48 tahun / 55 tahun
Nikah/Lamanya : 1× / 10 ± tahun
Suku : Bugis /Bugis
Agama :Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan :IRT / Wiraswasta
Alamat : Jln Hertasning VII

b. Keadaan ibu sekarang

1) Ibu ingin mengatur jarak kehamilannya

- 2) Ibu mengatakan memiliki dua orang anak
- 3) Usia anak terakhir ± 6 tahun
- 4) Ibu ingin melanjutkan menggunakan KB PIL
- 5) Ibu menjadi akseptor KB PIL selama ± 1 tahun

c. Riwayat Haid

Menarceh umur 13 tahun, siklus haid teratur 28-30hari, lamanya 6-7 hari dan ibu merasakan nyeri perut pada saathaid tetapi masih bisa melakukan pekerjaan rumah seperti biasanya.

d. Riwayat kehamilan, Persalinan dan Nifas yang lalu

Tabel 1
Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

Anak Ke	Tahun Lahir	JK	BB	UK	Tempat Bersalin	Penolong	Nifas
1	2000	L	3000 gr	Atrem	Puskesmas	Bidan	Normal
2	2015	L	2800 gr	Aterm	Puskesmas	Bidan	Normal

e. Riwayat KB

Ibu mengatakan pernah menjadi akseptor KB UID selama ± 3 tahun

f. Riwayat Kesehatan yang lalu

- 1) Ibu mengatakan tidak pernah memiliki riwayat penyakit turunan dan menahun antara lain penyakit hipertensi, diabetes melitus(DM), asma, jantung dan penyakit serius lainnya.
- 2) Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit IMS seperti gonore, sifilis dan HIV/AIDS
- 3) Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat alergi

g. Riwayat Kesehatan Keluarga

Anggota keluarga tidak ada yang memiliki riwayat penyakit serius misalnya hipertensi, kanker, DM, asma atau penyakit jantung serta penyakit menular seksual.

h. Pola Kebiasaan Sehari-hari

1) Nutrisi

- a) Makan 3× dalam sehari dengan nafsu makan yang baik
- b) Pola makanana berupa nasi, sayur dan lauk
- c) Minum 7-8 gelas/hari

2) Eliminasi

- a) BAB 1-2 × sehari
- b) BAK 3-4 × sehari
- c) Tidak ada keluhan apapun saat BAB dan BAK

3) Personal Hygiene

- a) Mandi 2 × sehari
- b) Sikat gigi 2 × sehari
- c) Cuci rambut 2-3 × sehari
- d) Ganti baju 2 × sehari

4) Istirahat

- a) Tidur siang ± 1 jam sehari
- b) Tidur malam ± 8 jam sehari

5) Aktivitas

Selaku ibu rumah tangga aktivitas ibu sehari-hari yaitu masak, mencuci, menyapu, mengepel serta mengurus suami dan anak-anaknya, dll.

i. Riwayat Psikologi, Ekonomi serta Spiritual

- 1) Ibu, suami serta keluarga memiliki hubungan yang baik.
- 2) Pengambilan keputusan di keluarga yaitu suami.
- 3) Pemenuhan kebutuhan keluarga ditanggung suami.
- 4) Ibu telah mendiskusikan dengan suami dan keluarga tentang kelanjutan menggunakan KB PIL
- 5) Ibu, suami serta keluarga menjalankan ibadah dengan taat.

2. Data objektif

a. Pemeriksaan Umum

- 1) Keadaan umum ibu baik
- 2) Kesadaran : Composmentis
- 3) Berat badan : 52 kg
- 4) Tinggi badan : 150 cm

b. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

- 1) Tekanan Darah : 110/70 mmHg
- 2) Nadi : 74 ×/menit
- 3) Suhu : 36,5 °C
- 4) Pernafasan : 20 ×/menit

c. Pemeriksaan Fisik

- 1) Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
- 2) Payudara : simetris, puting susu menonjol dan tidak terabamassa ataupun nyeri tekan
- 3) Abdomen : tidak ditemukan luka bekas operasi, tidak terabamassa serta nyeri tekan
- 4) Ekstremitas bawah : simetris, tidak ditemukan varices ataupunodema

d. Pemeriksaan Penunjang

- 1) Plano test : Negatif
- 2) Hb : 12,5 gram/dl

B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Diagnosa Aktual : Akseptor Lama KB PIL

1. Data Subjektif

- a. Ibu ingin melanjutkan menggunakan KB PIL
- b. Ibu ingin menjarangkan kehamilannya
- c. Ibu menjadi akseptor KB PIL selama \pm 1 tahun

2. Data objektif

a. Pemeriksaan Umum

- 1) Keadaan umum ibu baik
- 2) Kesadaran : Composmentis
- 3) Berat badan : 52 kg
- 4) Tinggi badan : 150 cm

b. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

- 1) Tekanan Darah : 110/70 mmHg
- 2) Nadi : 74 ×/menit
- 3) Suhu : 36,5°C
- 4) Pernafasan : 20 ×/menit

c. Hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan

d. Pemeriksaan penunjang

- 1) Plano test : Negatif
- 2) Hb : 12,5 gram/dl

Analisis dan interpretasi data :

Menurut Hidayati (2017:103) Keluarga Berencana merupakan suatu strategi yang dibuat pemerintah dengan maksud untuk menumbuhkan kepedulian serta keikutsertaan masyarakat lewat pendewasaan umur perkawinan, mengatur kehamilan, membina ketahanan keluarga, meningkatkan kemakmuran keluarga kecil, bahagia serta sejahtera.

Kontraindikasi penggunaan KB Pil yaitu, hamil atau dicurigai hamil, menyusui eksklusif, perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya, penyakit hati akut (hepatitis), usia > 35 tahun, riwayat penyakit jantung, stroke, atau td > 180/110 mmhg, riwayat gangguan faktor pembekuan darah atau kencing manis > 20 tahun, kanker payudara atau dicurigai kanker payudara, migrain atau gejala neurologik fokal (epilepsi/riwayat epilepsi), tidak dapat menggunakan pil secara teratur setiap hari.

D. Langkah III. Identifikasi Dignosa atau Masalah Potensial

Diagnosa Potensial : Nyeri pada payudara, perdarahan di luar masa haid, terjadinya pengumpakan darah, kanker payudara, kanker serviks

Analisis dan interpretasi data :

Pada akseptor kb pil, hal-hal yang perlu diantisipasi seperti:mual, nyeri pada payudara, perdarahan di luar masa haid, kenaikan berat badan, terjadinya pengumpakan darah, kanker payudara, kanker serviks.

Sehingga hal tersebut dapat dilakukan antisipasi terjadinya komplikasi atau efek samping dari penggunaan KB PIL (Yulifah & Surachmindari, 2014).

D. Langkah IV. Antisipasi Masalah dan Tindakan Segera/Kolaborasi

Tidak ditemukan data yang dapat menunjang dilakukannya tindakan

E. Langkah V. Rencana Asuhan

Tanggal 5 April 2022 , pukul 10:20 WITA

1. Tujuan : diharapkan setelahdilakukan asuhan kebidanan keluarga berencana tidak terjadi komplikasi
2. Kriteria
 - a. Keadaan umum ibu baik
 - b. Kesadaran composmentis
3. Intervensi
 - a. Berikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan berikan perhatianse penuhnya pada klien

Rasional: agar terjadi hubungan emosional yang baik

b. Berikan pertanyaan tentang jenis kontrasepsi apa yang diinginkan

Rasional : untuk mengetahui kontrasepsi yang diinginkan klien

c. Jelaskan tentang KB PIL (pengertian, mekanisme kerja, indikasi serta kontraindikasi, kelebihan dan kekurangan, efek samping serta komplikasi KB PIL).

Rasional: guna menambah informasi klien mengenai alat kontrasepsi yang selanjutnya akan klien gunakan.

d. Jelaskan kepada klien hasil pemeriksaan.

Rasional: untuk mengetahui keadaan klien

F. Langkah VI. Implementasi

Tanggal 5 April 2022 , pukul 10:25 WITA

1. Memberikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan memberikan perhatian sepenuhnya pada klien pada saat pertemuan pertama

Hasil : sapa dan salam telah diberikan, terciptanya hubungan emosional yang baik

2. Menjelaskan tentang KB PIL (definisi, cara kerja, indikasi dan kontraindikasi, keuntungan dan kekurangan, efek samping KB PIL).

Pil KB adalah merupakan salah satu kontrasepsi hormonal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang ditambahkan ke dalam tubuh seorang wanita dengan cara diminum (pil) tujuan dari konsumsi pil KB adalah untuk mencegah, menghambat dan menjarangkan terjadinya kehamilan yang memang tidak diinginkan.

Hasil : ibu mengerti dan paham dengan penjelasan yang telah diberikan

4. Melakukan *informed consent* sebagai bukti bahwa ibu setuju dengantindakan yang akan dilakukan.

Hasil ; ibu dan suami bersedia untuk bertanda tangan

5. Menjelaskan kepada klien hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal tekanan darah : 110/70 mmHg, nadi: 74 x/menit, suhu: 36,5 °C, pernafasan : 20x/menit, hasil pemeriksaan fisik tidak ada kontraindikasi hasil pemeriksaan penunjang plano test negatif

Hasil : ibu mengerti dengan apa yang telah disampaikan

Langkah VII. Evaluasi

Tanggal 5 April 2022

1. Dari anamnesa sampai pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang tidak ditemukannya kontraindikasi
2. Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal tekanan darah : 110/70 mmHg, nadi: 74 x/menit, suhu: 36,5 °C, pernafasan : 20 x/menit

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE

PADA NY “B” DENGAN AKSEPTOR LAMA KB PIL

DI PUSKESMASKASSI-KASSI KOTA MAKASSAR

TANGGAL 05 APRIL2022

No. Registrasi :xxx
Tanggal Kunjungan :05April2022 Pukul 10:15 WITA
Tanggal Pengkajian :05 April 2022 Pukul 10: 15 WITA
Nama Pengkaji : Ruslia Hi. Muhtar

Identifikasi Data Ibu/Suami

Nama : Ny “B” / Tn “M”
Umur : 48 tahun / 55 tahun
Nikah/Lamanya :1× / ± 10tahun
Suku : Bugis / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat :Jln Hertasning VII

Data Subjektif (S)

- 1) Ibu ingin mengatur jarak kehamilannya
- 2) Ibu mengatakan memiliki dua orang anak
- 3) Usia anak terakhir ± 6 tahun
- 4) Ibu ingin melanjutkan menggunakan KB PIL
- 5) Ibu menjadi akseptor KB PIL selama ± 1 tahun

Data Objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. Berat badan : 52 kg
- d. Tinggi badan : 150 cm
- e. Lila: 25cm

2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

- a. Tekanan Darah : 110/70 mmHg
- b. Nadi : 74 ×/menit
- c. Suhu : 36,5°C
- d. Pernafasan : 20 ×/menit

3. Pemeriksaan Fisik

- a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
- b. Payudara : simetris, puting susu menonjol dan tidak adateraba massa dan nyeri tekan
- c. Abdomen : tidak terdapat luka bekas oprasi, tidak ada terabamassa serta nyeri tekan
- d. Ekstremitas bawah : simetris, tidak ada varices dan tidak ada odema

4. Pemeriksaan Penunjang

- a. Plano Test : Negatif
- b. Hb : 12,5 gram/dl

Assesment (A)

Ny "B" PII A0 dengan akseptor lama KB PIL

Planning (P)

Tanggal 05 April 2022, pukul 10:20 WITA

1. Memberikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan memberikan perhatian sepenuhnya pada klien pada saat pertemuan pertama

Hasil : sapa dan salam telah diberikan, terciptanya hubungan emosional yang baik

2. Menjelaskan tentang KB PIL (definisi, cara kerja, indikasi dan kontraindikasi, keuntungan dan kekurangan, efek samping KB PIL). Pil KB adalah merupakan salah satu kontrasepsi hormonal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang ditambahkan ke dalam tubuh seorang wanita dengan cara diminum (pil) tujuan dari konsumsi pil KB adalah untuk mencegah, menghambat dan menjarangkan terjadinya kehamilan yang memang tidak diinginkan.

Hasil : ibu mengerti dan paham dengan penjelasan yang telah diberikan

3. Menjelaskan kepada klien hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal tekanan darah : 110/70 mmHg, nadi: 74 x/menit, suhu: 36,5 °C, pernafasan : 20x/menit, hasil pemeriksaan fisik tidak ada kontraindikasi hasil pemeriksaan penunjang plano test negatif .

Hasil: ibu mengerti

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE
PADA NY "B" DENGAN AKSEPTOR LAMA KB PIL
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR

TANGGAL 12 APRIL 2022

No. Registrasi :xxx
Tanggal Kunjungan : 12 April 2022 Pukul 13:10 WITA
Tanggal Pengkajian :12April2022 Pukul 13:10 WITA
Nama Pengkaji : Ruslia Hi. Muhtar

Identifikasi Data Ibu/Suami

Nama : Ny "B" / Tn "M"
Umur : 48 tahun / 55tahun
Nikah/Lamanya : 1x / ± 10tahun
Suku : Bugis / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jlm Hertasning VII

Data Subjektif (S)

1.Ibu mengatakan tidak memiliki keluhan setelah meminum KB PIL untuk saat ini

Data Objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum
 - a. Keadaan umum ibu baik

b. Kesadaran : Composmentis

c. Berat badan : 53 kg

d. Tinggi badan : 150 cm

e. Lila : 25cm

2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

a. Tekanan Darah : 120/80 mmHg

b. Nadi : 80 ×/menit

c. Suhu : 36,5°C

d. Pernafasan : 20 ×/menit

3. Pemeriksaan Fisik

a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus

b. Payudara : simetris, puting susu menonjol dan tidak terabamassa ataupun nyeri tekan

c. Abdomen : tidak ditemukan luka bekas operasi, tidak terabamassa ataupun nyeri tekan

Assesment (A)

Ny "B" hari ke 7 dengan akseptor lama KB PIL

Planning (P)

Tanggal 12 April 2022, pukul 13:15 WITA

1. Memberitahu kepada ibu hasil dari pemeriksaan.

Hasil : ibu mengerti

2. Memberikan *health education* kepada ibu perihal personal hygiene, polaistirahat serta nutrisi

a. Personal Hygiene

Menganjurkan ibu untuk mandi 2× dalam sehari, menjaga kebersihan tubuh, mengganti pakaian terutama pakaian dalamnya apabila sudah dirasa kotor atau basah, menjaga kebersihan daerah genitalia untuk memberi rasa nyaman kepada ibu.

b. Pola istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidursiang ± 2 jam/hari dan tidur malam ± 8 jam/hari guna menghindari stress atau cemas berlebihan.

c. Nutrisi

Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur-mayur, ikan, susu serta buah.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Meminta izin kepada ibu untuk dilakukannya kunjungan rumah.

Hasil : ibu tidak keberatan jika dilakukan kunjungan rumah

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE

PADA NY "B" DENGAN AKSEPTOR LAMA KB PIL

DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR

TANGGAL 20 APRIL 2022

No. Registrasi :xxx
Tanggal Kunjungan :20 April 2022Pukul 11:05 WITA
Tanggal Pengkajian :20 April 2021 Pukul 11:0 5WITA
Tempat :Rumah Ny "B"
Nama Pengkaji :Ruslia Hi. Muhtar

Identifikasi Data Ibu/Suami

Nama : Ny "B" / Tn "M"
Umur : 48 tahun / 55 tahun
Nikah/Lamanya :1x / ± 10
Suku : Bugis / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Jln Hertasing VII

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan merasa berat badannya sedikit meningkat selama menggunakan Kb PIL.

Data objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum
 - a. Keadaan umum ibu baik
 - b. Kesadaran : Composmentis

- c. Berat badan : 55 kg
- d. Tinggi badan : 150 cm
- e. lila: 25cm

2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

- a. Tekanan Darah : 120/80 mmHg
- b. Nadi : 82 ×/menit
- c. Suhu : 36,5°C
- d. Pernafasan : 22 ×/menit

3. Pemeriksaan fisik

- a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
- b. Payudara : simetris, puting susu menonjol serta tidak terabamassa ataupun nyeri tekan
- c. Abdomen : tidak ada luka bekas oprasi, tidak teraba massa ataupun nyeri tekan

Assesment (A)

Ny "B" hari ke 14 dengan akseptor lama KB PIL

Planning (P)

Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 11:10 WITA

1. Memberitahu kepada ibu hasil dari pemeriksaan.

Hasil : ibu mengerti

2. Memberikan *Health Education* kepada ibu perihal personal hygiene, polaistirahat serta nutrisi

a. Personal Hygiene

Menganjurkan ibu untuk mandi 2× dalam sehari, menjaga kebersihan tubuh, mengganti pakaian terutama pakaian dalamnya apabila sudah dirasa kotor atau basah, menjaga kebersihan daerah genitalia untuk memberi rasa nyaman kepada ibu.

b. Pola istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidursiang ± 1jam/hari dan tidur malam ± 8 jam/hari guna menghindari stress atau cemas berlebihan.

d. Nutrisi

Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur-mayur, ikan, susu serta buah.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Menganjurkan kepada ibu untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat dari rumahnya jika merasakan adanya perubahan yang tidak biasa ia rasakan

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE

PADA NY "B" DENGAN AKSEPTOR LAMA KB PIL

DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR

TANGGAL 04 MEI 2022

No. Registrasi : xxx
Tanggal Kunjungan : 04 Mei 2022 Pukul 11:55 WITA
Tanggal Pengkajian : 04 Mei 2021 Pukul 11:55 WITA
Tempat : Rumah Ny "B"
Nama Pengkaji : Ruslia Hi. Muhtar

Identifikasi Data Ibu/Suami

Nama : Ny "B" / Tn "M"
Umur : 48 tahun / 55 tahun
Nikah/Lamanya : 1x / ± 10
Suku : Bugis / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jln Hertasing VII

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan rajin melakukan olahraga.
2. Ibu mengatakan rutin mengonsumsi makanan yang bergizi dan diet rendah karbohidrat.

Data objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. Berat badan : 54 kg
- d. Tinggi badan : 150 cm
- e. Lila: 25 cm

2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

- a. Tekanan Darah : 120/70 mmHg
- b. Nadi : 84 ×/menit
- c. Suhu : 36,6 °C
- d. Pernafasan : 24 ×/menit

3. Pemeriksaan fisik

- a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
- b. Payudara : simetris, puting susu menonjol serta tidak terabamassa ataupun nyeri tekan
- c. Abdomen : tidak ada luka bekas oprasi, tidak teraba massa ataupun nyeri tekan

Assesment (A)

Ny "B" hari ke 28 dengan akseptor lama KB PIL

Planning (P)

Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 11:56 WITA

1. Memberitahu kepada ibu hasil dari pemeriksaan.

Hasil : ibu mengerti

2. Memberikan *Health Education* kepada ibu perihal personal hygiene, pola istirahat serta nutrisi

a. Personal Hygiene

Menganjurkan ibu untuk mandi 2× dalam sehari, menjaga kebersihan tubuh, mengganti pakaian terutama pakaian dalamnya apabila sudah dirasa kotor atau basah, menjaga kebersihan daerah genitalia untuk memberi rasa nyaman kepada ibu.

b. Pola istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang ± 1jam/hari dan tidur malam ± 8 jam/hari guna menghindari stress atau cemas berlebihan.

e. Nutrisi

Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur-mayur, ikan, susu serta buah.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Melakukan pengukuran berat badan pada Ibu

Hasil: berat badan Ibu 54 kg.

4. Menjelaskan pada Ibu berat badan normal dan bahaya dari obesitas.

Hasil: ibu mengerti.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE

PADA NY “B” DENGAN AKSEPTOR LAMA KB PIL

DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR

TANGGAL 18 MEI 2022

No. Registrasi : xxx
Tanggal Kunjungan : 18 Mei 2022 Pukul 09.35 WITA
Tanggal Pengkajian : 18 Mei 2021 Pukul 09.35 WITA
Tempat : Rumah Ny “B”
Nama Pengkaji : Ruslia Hi. Muhtar

Identifikasi Data Ibu/Suami

Nama : Ny “B” / Tn “M”
Umur : 48 tahun / 55 tahun
Nikah/Lamanya : 1x / ± 10
Suku : Bugis / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jln Hertasing VII

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan rajin melakukan olahraga.
2. Ibu mengatakan rutin mengonsumsi makanan yang bergizi dan diet rendah karbohidrat.
3. Ibu mengatakan tidak memiliki keluhan terkait penggunaan Kb Pil.

Data objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. Berat badan : 53 kg
- d. Tinggi badan : 150 cm

2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

- a. Tekanan Darah : 120/90 mmHg
- b. Nadi : 80 ×/menit
- c. Suhu : 36,5°C
- d. Pernafasan : 20 ×/menit

3. Pemeriksaan fisik

- a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
- b. Payudara : simetris, puting susu menonjol serta tidak terabamassa ataupun nyeri tekan
- c. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, tidak teraba massa ataupun nyeri tekan

Assesment (A)

Ny "B" hari ke 43 dengan akseptor lama KB PIL

Planning (P)

Tanggal 18 Mei 2022, Pukul 09:35 WITA

1. Memberitahu kepada ibu hasil dari pemeriksaan.

Hasil : ibu mengerti

2. Memberikan *Health Education* kepada ibu perihal personal hygiene, pola istirahat serta nutrisi

a. Personal Hygiene

Menganjurkan ibu untuk mandi 2× dalam sehari, menjaga kebersihan tubuh, mengganti pakaian terutama pakaian dalamnya apabila sudah dirasa kotor atau basah, menjaga kebersihan daerah genetalia untuk memberi rasa nyaman kepada ibu.

b. Pola istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang ± 1jam/hari dan tidur malam ± 8 jam/hari guna menghindari stress atau cemas berlebihan.

f. Nutrisi

Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur-mayur, ikan, susu serta buah.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. melakukan pengukuran berat badan

Hasil: berat badan 53 kg.

4. menganjurkan ibu untuk menjaga pola hidupnya agar berat badannya dalam batas normal

Hasil: ibu mengerti

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE

PADA NY "B" DENGAN AKSEPTOR LAMA KB PIL

DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR

TANGGAL 02 JUNI 2022

No. Registrasi : xxx
Tanggal Kunjungan : 02 Juni 2022 Pukul 10:05 WITA
Tanggal Pengkajian : 02 Juni 2022 Pukul 10:05 WITA
Tempat : Rumah Ny "B"
Nama Pengkaji : Ruslia Hi. Muhtar

Identifikasi Data Ibu/Suami

Nama : Ny "B" / Tn "M"
Umur : 48 tahun / 55 tahun
Nikah/Lamanya : 1x / ± 10
Suku : Bugis / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jln Hertasning VII

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan rajin melakukan olahraga.
2. Ibu mengatakan rutin mengonsumsi makanan yang bergizi dan diet rendah karbohidrat.
3. Ibu mengatakan istirahat yang cukup dan menjaga pola hidupnya.

Data objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. Berat badan :50 kg
- d. Tinggi badan : 150 cm
- e. lila: 50 kg

2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

- a. Tekanan Darah : 120/80 mmHg
- b. Nadi : 86 ×/menit
- c. Suhu : 36,6°C
- d. Pernafasan : 26 ×/menit

3. Pemeriksaan fisik

- a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
- b. Payudara : simetris, puting susu menonjol serta tidak terabamassa
ataupun nyeri tekan
- c. Abdomen : tidak ada luka bekas oprasi, tidak teraba massaataupun nyeri
tekan

Assesment (A)

Ny "B" hari ke 58 dengan akseptor lama KB PIL

Planning (P)

Tanggal 02 Juni 2022, Pukul 10:06 WITA

1. Memberitahu kepada ibu hasil dari pemeriksaan.

Hasil : ibu mengerti

2. Memberikan *Health Education* kepada ibu perihal personal hygiene, pola istirahat serta nutrisi

a. Personal Hygiene

Menganjurkan ibu untuk mandi 2× dalam sehari, menjaga kebersihan tubuh, mengganti pakaian terutama pakaian dalamnya apabila sudah dirasa kotor atau basah, menjaga kebersihan daerah genetalia untuk memberi rasa nyaman kepada ibu.

b. Pola istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang ± 1jam/hari dan tidur malam ± 8 jam/hari guna menghindari stres atau cemas berlebihan.

g. Nutrisi

Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur-mayur, ikan, susu serta buah.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. melakukan pengukuran berat badan kepada ibu

Hasil: berat badan dalam batas normal 50 kg

4. menjelaskan pada ibu bahwa berat badannya sudah batas normal dan menganjurkan untuk mempertahankan berat badannya.

Hasil: ibu merasa senang dan ibu mengerti

5. Menganjurkan kepada ibu untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat dari rumahnya jika merasakan adanya perubahan yang tidak biasa ia rasakan

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

MATRIKS KUNJUNGAN PERIMENOPOUSEPADA NY “B” DENGAN AKSEPTOR LAMA KB PIL

Identitas Klien

No Register : XXX
 Nama : Ny “B” / Tn “M”
 Umur : 48 tahun / 55 tahun
 Nikah/Lamanya : 1x / ± 10
 Suku : Bugis / Bugis
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SMA / SMA
 Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
 Alamat : JlnHertasning VII

Kunjungan	Hari, Tanggal, Jam dan Tempat	Masa Kunjungan	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
1	05 April 2022, Pukul: 10.15 WITA di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar	Hari Pertama	DS: 1. Ibu ingin mengatur jarak kehamilannya 2. Ibu mengatakan memiliki dua orang anak 3. Usia anak terakhir ± 6 tahun 4. Ibu ingin melanjutkan menggunakan KB PIL	1. Memberikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan memberikan perhatian sepenuhnya pada klien pada saat pertemuan pertama 2. Menjelaskan tentang KB PIL (definisi, cara kerja, indikasi dan kontraindikasi, keuntungan dan	1. Ibu memahami semua penjelasan yang diberikan mulai dari kondisinya, beserta informasi-informasi terkait dengan alat kontrasepsi yang sedang digunakan. 2. Hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum baik, kesadaran

		<p>5. Ibu menjadi akseptor KB PIL selama \pm 1 tahun</p> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan umum: baik b. Kesadaran : Composmentis c. Berat badan : 52 kg d. Tinggi badan : 150 cm e. Lila: 25 cm 2. Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> a. TD : 110/70 mmHg b. Nadi : 74 x/menit c. Suhu : 36,5 °C d. Pernafasan : 20 x/menit 3. Pemeriksaan Fisik <ol style="list-style-type: none"> a. Mata : konjungtiva merah muda, sclera tidak ikterus b. Payudara : simetris, puting susu menonjol dan tidak ada teraba massa dan nyeri tekan c. Abdomen : tidak terdapat luka bekas operasi, tidak ada teraba massa dan nyeri tekan d. Ekstremitas bawah : simetris, tidak ada varises dan tidak ada edema 	<p>kekurangan, efek samping KB (PIL). Pil KB adalah merupakan salah satu kontrasepsi hormonal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang ditambahkan ke dalam tubuh seorang wanita dengan cara diminum (pil) tujuan dari konsumsi pil KB adalah untuk mencegah, menghambat dan menjarangkan terjadinya kehamilan yang memang tidak diinginkan.</p> <p>3. Menjelaskan kepada klien hasil pemeriksaan yaitu semua pemeriksaan dalam batas normal dan tidak ada kelainan.</p>	<p>composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal tekanan darah : 110/70 mmHg, nadi: 74 x/menit, suhu: 36,5 °C, pernafasan : 20x/menit, hasil pemeriksaan fisik tidak ada kontraindikasi hasil pemeriksaan penunjang plano test negatif</p> <p>3. Ibu bersedia melakukan anjuran yang telah dianjurkan oleh bidan seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, menjaga <i>personal hygiene</i>, istirahat yang cukup dll</p>
--	--	---	---	---

			4. Pemeriksaan Penunjang a. Plano Test : Negatif b. Hb : 12,5 gram/dl		
2	12 April 2022, Pukul: 13.10 di Rumah Pasien	Hari Ke-7 WITA	<p>DS:</p> <p>1. Ibu mengatakan tidak memiliki keluhan setelah meminum KB PIL untuk saat ini</p> <p>DO:</p> <p>1. Pemeriksaan Umum a. Keadaan umum: baik b. Kesadaran : Compos mentis c. Berat badan : 53 kg d. Tinggi badan : 150 cm e. Lila: 25 cm</p> <p>2. Pemeriksaan TTV a. TD : 120/80 mmHg b. Nadi : 80 x/menit c. Suhu : 36,5 °C d. Pernafasan : 20 x/menit</p> <p>3. Pemeriksaan Fisik a. Mata : konjungtiva merah muda, sclera tidak ikterus b. Payudara : simetris, puting susumenonjol dan tidak teraba massa ataupun nyeri tekan c. Abdomen : tidak ditemukan luka bekas operasi, tidak teraba massa ataupun</p>	<p>1. Memberitahu kepada ibu hasil dari pemeriksaan.</p> <p>2. Memberikan <i>health education</i> kepada ibu perihal personal hygiene, pola istirahat serta nutrisi a. Personal Hygiene Menganjurkan ibu untuk mandi 2x dalam sehari, menjaga kebersihan tubuh, menganti pakai antiseptik pada kait dalam nya apabila sudah dirasakan kotor atau basah, menjaga kebersihan daerah genitali untuk memberi rasa nyaman kepada ibu. b. Pola istirahat Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidurnya \pm 2 jam/hari dan tidurnya malam \pm 8 jam/hari guna menghindari stress atau cemas berlebihan. c. Nutrisi Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur-mayur, ikan, susu serta buah.</p> <p>3. Meminta izin kepada ibu untuk dilakukan kunjungan rumah.</p>	<p>1. Ibu memahami semua penjelasan yang diberikan mulai dari kondisinya, beserta informasi-informasi terkait dengan alat kontrasepsi yang sedang digunakan.</p> <p>2. Ibu memahami dan bersedia melakukan anjuran yang telah diberikan.</p> <p>3. Hasil pemeriksaan dalam batas normal dan tidak ada kelainan.</p> <p>4. Ibu tidak keberatan jika dilak</p> <p>5. Ukur kunjungan rumah</p>

			nyeritekan			
3	20 April 2022, Pukul: 11.05 diRumahPasien	Pukul: WITA	Hari Ke-14	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibumengatakanmerasaberatbadannyasedikitmeningkatselamamenggunakan Kb PIL. <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> PemeriksaanUmum <ol style="list-style-type: none"> Keadaanumumibubai Kesadaran :Composmentis Beratbadan : 55 kg Tinggibadan : 150 cm Lila: 25 cm PemeriksaanTTV <ol style="list-style-type: none"> TD : 120/80 mmHg Nadi : 82 ×/menit Suhu : 36,5 °C Pernafasan : 22 ×/menit Pemeriksaanfisik <ol style="list-style-type: none"> Mata : konjungtivamerahmuda, scleratakterus Payudara : simetris, puttingsusumenonjolsertatidakterabamassaataupunnyeritekan Abdomen : tidakadalukabekasoperasi, tidakterabamassaataupunnyeritekan 	<ol style="list-style-type: none"> Memberitahukepadaibuhasil daripemeriksaan. Memberikan <i>Health Education</i> kepadaibu perihal personal hygiene, polaiistirahatsertanutrisi <ol style="list-style-type: none"> Personal Hygiene Menganjurkanibuuntukmandi 2×dalamsehari,menjagakebersihantubuh, mengantipakaianterutamapakaian dalamnyaapabilasudahdirasakotoraubasah, menjagakebersihandaerahgenetaliauntukmemberi rasa nyamankepadaibu. Polaistirahat Menganjurkanibuuntukistirahat yang cukup dengantidursiang± 1jam/haridantidurmalam±8 jam/harigunamenghindari stress ataucemasberlebihan. Nutrisi Menganjurkanibuuntukmengonsumsi simakananbergizisePERTISAYUR-mayur,ikan, sususertabuah. 	<ol style="list-style-type: none"> Ibumemahamanbersediamelakukananuran yang telahdiberikan. Hasil pemeriksaan dalambatas normal dantidakadakelainan.

				3. Menganjurkan kepada ibu untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat dari rumah jika merasakan adanya perubahan yang tidak biasa ia rasakan	
4	04 Mei 2022 Pukul: 11:55 WITA di Rumah Pasien	hari ke-28	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu mengatakan rajin melakukan olahraga. Ibu mengatakan rutin mengonsumsi makanan yang bergizi dan diet rendah karbohidrat. <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Umum <ol style="list-style-type: none"> Keadaan umum ibu baik Kesadaran : Compos mentis Berat badan : 54 kg Tinggi badan : 150 cm Lila: 25 cm Pemeriksaan Tanda-tanda Vital <ol style="list-style-type: none"> Tekanan Darah : 120/70 mmHg Nadi : 84 x/menit Suhu : 36,6 °C Pernafasan : 24 x/menit Pemeriksaan fisik <ol style="list-style-type: none"> Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus Payudara : simetris, puting susu menonjol serta tidak teraba massa ataupun nyeri tekan 	<ol style="list-style-type: none"> Memberitahu kepada ibu hasil dari pemeriksaan. Memberikan <i>Health Education</i> kepada ibu perihal personal hygiene, pola istirahat serta nutrisi <ol style="list-style-type: none"> Personal Hygiene Menganjurkan ibu untuk mandi 2x dalam sehari, menjaga kebersihan tubuh, mengganti pakaian terutama pakaian dalamnya apabila sudah dirasa kotor atau basah, menjaga kebersihan daerah genitalia untuk memberi rasa nyaman kepada ibu. Pola istirahat Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang ± 1 jam/hari dan tidur malam ± 8 jam/hari guna menghindari stress atau cemas berlebihan. Nutrisi Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan 	<ol style="list-style-type: none"> Ibu memahami dan bersedia melakukan anjuran yang telah diberikan. Hasil pemeriksaan dalam batas normal dan tidak ada kelainan

			<p>c. Abdomen : tidak ada luka bekas oprasi, tidak teraba massaataupun nyeri tekan</p>	<p>bergizi seperti sayur-mayur, ikan, susu serta buah.</p> <p>3. Melakukan pengukuran berat badan pada Ibu</p> <p>4. Menjelaskan pada Ibu berat badan normal dan bahaya dari obesitas.</p>	
5	18 Mei 2022 Pukul:09.35 WITA di RumahPasien	hari ke-43	<p>DS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan rajin melakukan olahraga. 2. Ibu mengatakan rutin mengonsumsi makanan yang bergizi dan diet rendah karbohidrat. 3. ibu mengatakan tidak memiliki keluhan terkait penggunaan Kb Pil. <p>DO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan umum ibu baik b. Kesadaran : Composmentis c. Berat badan : 53 kg d. Tinggi badan : 150 cm 2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital <ol style="list-style-type: none"> a. Tekanan Darah : 120/90 mmHg b. Nadi : 80 ×/menit c. Suhu : 36,5°C 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu kepada ibu hasil dari pemeriksaan. 2. Memberikan <i>Health Education</i> kepada ibu perihal personal hygiene, pola istirahat serta nutrisi <ol style="list-style-type: none"> a. Personal Hygine Menganjurkan ibu untuk mandi 2× dalam sehari, menjaga kebersihan tubuh, mengganti pakaian terutama pakaian dalamnya apabila sudah dirasa kotor atau basah, menjaga kebersihan daerah genetalia untuk memberi rasa nyaman kepada ibu. b. Pola istirahat Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang ± 1jam/hari dan tidur malam ± 8 jam/hari guna menghindari stress atau 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ibu memahami dan bersedia melakukan anjuran yang telah diberikan. 4. Hasil pemeriksaan dalam batas normal dan tidak ada kelainan.

			<p>d. Pernafasan : 20 x/menit</p> <p>3. Pemeriksaan fisik</p> <p>a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus</p> <p>b. Payudara : simetris, puting susu menonjol serta tidak terabamassa ataupun nyeri tekan</p> <p>c. Abdomen : tidak ada luka bekas oprasi, tidak teraba massaataupun nyeri tekan</p>	<p>cemas berlebihan.</p> <p>c. Nutrisi</p> <p>Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur-mayur, ikan, susu serta buah.</p> <p>3. melakukan pengukuran berat badan</p> <p>4. menganjurkan ibu untuk menjaga pola hidupnya agar berat badannya dalam batas normal.</p>	
6	02 Juni 2022 Pukul 10:05 WITA di RumahPasien	hari ke-58	<p>DS</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu mengatakan rajin melakukan olahraga. Ibu mengatakan rutin mengonsumsi makanan yang bergizi dan diet rendah karbohidrat. ibu mengatakan istirahat yang cukup dan menjaga pola hidupnya. <p>DO</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Umum <ol style="list-style-type: none"> Keadaan umum ibu baik Kesadaran : Composmentis Berat badan :50 kg Tinggi badan : 150 cm lila: 50 kg Pemeriksaan Tanda-tanda 	<ol style="list-style-type: none"> Memberitahu kepada ibu hasil dari pemeriksaan. Memberikan <i>Health Education</i> kepada ibu perihal personal hygiene, pola istirahat serta nutrisi <ol style="list-style-type: none"> Personal Hygiene <p>Menganjurkan ibu untuk mandi 2x dalam sehari, menjaga kebersihan tubuh, mengganti pakaian terutama pakaian dalamnya apabila sudah dirasa kotor atau basah, menjaga kebersihan daerah genetalia untuk memberi rasa nyaman kepada ibu.</p> Pola istirahat <p>Menganjurkan ibu untuk</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Ibumemahamidanbersediamelakukananjanran yang telahdiberikan. Hasil pemeriksaan dalambatas normal dantidakaadakelainan.

			<p>Vital</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tekanan Darah : 120/80 mmHg b. Nadi : 86 ×/menit c. Suhu : 36,6°C d. Pernafasan : 26 ×/menit <p>3. Pemeriksaan fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus b. Payudara : simetris, puting susu menonjol serta tidak terabamassa ataupun nyeri tekan c. Abdomen : tidak ada luka bekas oprasi, tidak teraba massaataupun nyeri tekan 	<p>istirahat yang cukup dengan tidur siang ± 1jam/hari dan tidur malam ± 8 jam/hari guna menghindari stress atau cemas berlebihan.</p> <p>c. Nutrisi</p> <p>Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi maknan bergizi seperti sayur-mayur, ikan, susu serta buah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. melakukan pengukuran berat badan kepada ibu 6. menjelaskan pada ibu bahwa berat badannya sudah batas normal dan menganjurkan untuk mempertahankan berat badannta. 7. Menganjurkan kepada ibu untuk dating ke fasilitas kesehatan terdekat dari rumahnya jika merasakan adanya perubahan yang tidak biasa ia rasakan 	
--	--	--	---	--	--

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang kesenjangan antara teori dan hasil tinjauan kasus pada pelaksanaan Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause pada Ny "B" dengan akseptor lama KB PIL yang telah dilaksanakan di Puskesmas Kassi-Kassi tanggal 05 April- 20 April 2022. Penulis akan menguraikan 7 langkah Varney dan SOAP dalam penerapan asuhan kebidanan secara teoritis yang dimulai dari identifikasi data dasar, merumuskan diagnosa/masalah aktual dan potensial, tindakan segera/kolaborasi, perencanaan, implementasi, serta evaluasi asuhan kebidanan yang terjadi pada Ny "B".

A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Teori menjelaskan bahwa identifikasi data dasar merupakan tahap awal dari proses manajemen asuhan kebidanan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai akseptor sebagai evaluasi keadaan secara menyeluruh, lengkap dan terfokus yakni dengan mempertanyakan riwayat kesehatan yang dialami oleh akseptor mencakup fisik, psikososial serta spiritual. Informasi dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung terhadap klien ataupun keluarganya dan sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik yang dimulai dari kepala sampai ke kaki dan pemeriksaan penunjang/laboratorium.

Pil KB adalah merupakan salah satu kontrasepsi hormonal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang ditambahkan ke dalam tubuh seorang wanita dengan cara diminum (pil) tujuan dari konsumsi pil KB adalah untuk mencegah, menghambat dan menjarangkan terjadinya kehamilan

yang memang tidak diinginkan. Untuk itu kepatuhan mengkonsumsi pil KB secara teratur sesuai petunjuk tenaga kesehatan harus dilakukan (Depkes RI, 2014).

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan yang dilakukan pada Ny“B” Data awal yang dikumpulkan mulai dari data subjektif antara lain identitas ibu/suami, keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu, riwayat KB, riwayat kesehatan dan pola kebiasaan sehari-hari seperti nutrisi, eliminasi, pola istirahat, *personalhygiene*, aktivitas dan data psikososial, ekonomi dan spiritua.

Data subjektif yang bisa didapatkan dengan menanyakan identitas klien yaitu nama Ny “B” umur 48 tahun seorang ibu rumah tangga dengan pendidikan terakhir SMA, ibu datang ke Puskesmas Kassi-Kassi untuk melanjutkan menggunakan KB PIL dan untuk menjarangkan kehamilannya. Ibu memiliki 2 orang anak dengan jenis kelamin 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, anak terakhir ibu berumur ±6 tahun Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit yang menurun serta menahun, tidak ada riwayat penyakit menular seksual.

Data objektif diperoleh dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh petugas kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan pada Ny “B” yaitu keadaan umum ibu baik, kesadaran compos mentis, berat badan sekarang 52 kg, tinggi badan 150 cm, pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 74 x/menit, suhu 36,5 °C, dan pernapasan 20 x/menit. Pemeriksaan fisik pada mata konjungtiva merah muda,

skleratidak ikterus. Dada simetris, puting susu menonjol, tidak teraba benjolan,radang dan luka pada payudara, tidak terdapat nyeri tekan. Perut tidakditemukan luka bekas oprasi, tidak ada benjolan dan nyeri tekan.Genetaliatidak ada *varices*, tidak ada pengeluaran darah yang tidak diketahuipenyebabnya, tidak ditemukan keputihan yang abnormal.Ekstremitas bawahsimetris, tidak ditemukan *varices* dan tidak ada odema.Dan padapemeriksaan penunjang didapatkan tes kehamilan negatif dan Hb 11,5gram/dl.

Mampu disimpulkan bahwa pada kasus Ny “B” data yang berhasildikumpulkan dari hasil pengkajian yaitu ibu ingin melanjutkan menggunakan KB PIL dan untuk menjarangkan kehamilannya.TTV dalam batas normal dansehingga dengan ini Ny “B” dapat melanjutkan penggunaan KB PII. Dengan demikian apa yang dijelaskanpada konsep dasar yang ditemukan pada studi kasus secara garis besar tidakditemukan kesenjangan yang terjadi antara teori dan studi kasus

Terdapat keterkaitan positif yang bermakna antara dukungan suamidengan keikutsertaan KB.Dukungan suamiberperan dalam meningkatkan keutuhan hubungan suami dan istri, dukunganini mengacu pada suatu dukungan pendampingan yang dimanfaatkan dalamhal mencari solusi, memberikan rasa aman dan harga dirimenjadi meningkat.

B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Didalam langkah ini data diinterpretasikan menjadi sebuah diagnose kebidanan serta masalah, sehingga keduanya digunakan karena beberapamasalah tidak bisa diselesaikan seperti halnya diagnosa namun membutuhkanpenanganan yang dicurahkan dalam rencana asuhan terhadap klien.Manajemen kebidanan yang berdasar kepada pendekatan asuhan kebidananserta didukungataupun ditunjang dari beberapa data baik dari data subjektifyang diperoleh dari hasil pengkajian.

Berdasarkan data anamnesa yang didapatkan dari Ny “B” mengatakanberkeinginan untuk melanjutkanmenggunakan KB PIL.dengan tujuanuntuk mengatur jarak kehamilannya. Berdasarkan data objektif diperoleh keadaan umum ibu baik,kesadaran composmentis, tanda tanda vital dalam batas normal yaitu tekanandarah110/70 mmHg, nadi 74 ×/menit, suhu 36,5 °C, dan pernapasan 20×/menit.pemeriksaan laboratorium normal tidakada kelainan yaitu plano test negatif dan Hb: 11,5 gram/dl.

Pada tinjauan pustaka dengan studi kasus, pada Ny “B” secara garisbesar tampak ada persamaan dalam diagnosa aktual yaitu Ny “B” inginmengatur jarak kehamilannya dengan menggunakan KB PIL. Keadaan umum ibu baik,kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik danlaboratorium normal sehingga diagnose dapat ditegakkan yaitu Ny “B”dengan calon akseptor lama KB PIL. Sesuai dengan paparan pada tinjaun pustakadengan studi kasus nampak tidak ditemukan kesenjangan antara teori denganstudi kasus.

C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Langkah inidibutuhkan antisipasi apabila memungkinkan tindakan pencegahan, sambil memperhatikan kondisi klien, bidan diharap mampu bersiap siaga apabiladiagnosa/masalah potensial tersebut benar terjadi yaitu, ibu ingin mengatur jarak kehamilannya, ibu mengatakan memiliki dua orang anak, usia anak terakhir 6 tahun, ibu ingin melanjutkan menggunakan kb pil, ibu menjadi akseptor kb pil selama \pm 1 tahun.

Umumnya keluhan setelah menggunakan KB PIL yaitu, terlalu mahal dan membosankan karena harus menggunakannya setiap hari, Mual, terutama pada 3 bulan pertama, Perdarahan bercak atau perdarahan terutama 3 bulan pertama, Nyeri payudara, Berat badan naik sedikit, tetapi pada perempuan tertentu kenaikan berat badan justru memiliki dampak positif, Berhenti haid (amenorea). Jarang pada pil kombinasi, Tidak boleh diberikan pada perempuan menyusui (mengurangi ASI).

Pada sebagian kecil perempuan dapat menimbulkan depresi, dan perubahan suasana hati, sehingga keinginan untuk melakukan hubungan seks berkurang, Dapat meningkatkan tekanan darah dan retensi cairan, sehingga resiko struk, dan gangguan pembekuan darah pada vena dalam sedikit meningkat. Pada perempuan usia $>$ 35 tahun dan merokok perlu hati-hati (Jitowiyono & Rouf, 2019).

Pada tinjauan pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada kasusNy "B" nampak ada persamaan dan tidak ditemukan adanya kesenjanganantara masalah potensial teori dengan data yang diperoleh.

D. Langkah IV : Identifikasi Tindakan Segera/Kolaborasi

Apabila terjadi efek samping ataupun keluhan yang mengancam pada ibu maka perlunya tindakan segera atau tindakan kolaborasi bersama tenaga kesehatan yang ahli berdasarkan kondisi ibu. Tidak ditemukan data untuk menjadi indikasi harus dilakukannya tindakan segera yang dimana perlunya menyelamatkan jiwa ibu atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih profesional.

Berdasarkan pada kasus yang terjadi pada Ny "B" ibu mengatakan sempat mengalami kenaikan berat badan setelah menggunakan KB PIL

Dengan demikian penerapan tinjauan pustaka pada studi kasus Ny "B" nampak adanya keterkaitan yakni tidak diperlukannya kolaborasi, apabila tidak ditemukan efek samping yang mengancam, maka dari itu apa yang dipaparkan pada tinjauan pustaka serta studi kasus tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus.

E. Langkah V : Rencana Asuhan

Pada manajemen asuhan kebidanan suatu asuhan direncanakan secara menyeluruh ditetapkan dari langkah sebelumnya dan lanjutan asuhan diagnosa ataupun masalah yang sudah diidentifikasi atau dikerjakan meliputi indikasi yang muncul sesuai keadaan klien, segala rencana yang akan dilakukan perlu persetujuan dari klien serta harus berlandaskan rasional yang pastinya relevan serta dibenarkan.

Pada kasus Ny "B" ingin melanjutkan menggunakan KB PIL serta direncanakan asuhan kebidanan sesuai diagnosa masalah aktual

sertadiagnosa masalah potensial tidak terjadi. Menurut Saifuddin (2010) rencanaasuhan yang dapat dilakukan yakni dilakukan pendekatan kepada klien sertasuami ataupun keluarga, memberikan kesempatan untuk klien mengutarakan masalah yang dihadapi, penjelasan mengenai KB PIL (pengertian, mekanismekerja, kelebihan serta kekurangan, yang bisa menggunakan dan yang tidakbisa menggunakan dan efek dar KB PIL), sehingga dapat tercapai kriteria seperti BB=45-50 kg, TB=150 cm,TD= 90/60-120/90 mmhg, suhu= 36,5-37,5°C

Pada tinjauan pustaka dan data yang diperoleh pada kasus Ny “B” tidak terdapat kesenjangan, oleh karena itu penerapan rencana asuhan dapat dilakukan tanpa ada hambatan.

F. Langkah VI : Implementasi

Implementasi bisa seluruhnya dilakukan oleh bidan atau sebagiannyadilakukan oleh ibu ataupun bekerja sama tim dengan petugas kesehatanlainnya sejalan dengan tindakan yang sudah direncanakan. Disaatdilakukannya pendekatan keibu, suami serta keluarga yang maksud sertatujuannya mengenai konseling KB. Respon ibu beserta suami menerimadengan bahagia maksud serta tujuan yang akan diberikan, tidak ada kontraindikasi yangditemukan pada saat pemeriksaan fisiki maupun pemeriksaan penunjang,keadaan fisik ibu yang menunjang untuk dilakukannya proses pemasangan.Proses pemasangan yang sudah direncanakan bisa dikerjakan sesuai denganrencana dengan tahapan tindakan asuhan kebidanan.

1. Pemantauan pertama Ny “B” dengan akseptor baru KB PIL tanggal 5 April 2022.

Pada kunjungan pertama ibu mengatakan ingin mengatur jarak kehamilannya, ibu mengatakan memiliki dua orang anak, usia anak terakhir 6 tahun, ibu ingin melanjutkan menggunakan KB PIL, ibu menjadi akseptor KB PIL selama \pm 1 tahun.

Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda - tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan fisik terfokus abdomen tidak ada luka bekas operasi, tidak ada teraba massa dan nyeri tekan dan tidak terdapat varices.

2. kunjungan kedua yaitu pada hari ke 7 pada Ny “B” dengan akseptor lama KB PIL tanggal 12 April 2022.

Kunjungan yang kedua yaitu di hari ke 7 saat kunjungan rumah ibu mengatakan Ibu mengatakan tidak memiliki keluhan setelah minum KB PIL untuk saat ini. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda - tanda vital dalam batas normal

Memberikan *health education* kepada ibu tentang personal hygiene (terutama pakaian dalam apabila terasa kotor atau basah, menjaga kebersihan daerah genitalia), pola istirahat dan nutrisi.

3. Pemantauan ketiga yaitu hari ke 14 hari Ny “B” dengan akseptor KB PIL tanggal 20 April 2022

Pada kunjungan ketiga Ibu mengatakan tidak memiliki keluhan setelah minum KB PIL untuk saat ini. Memberikan

healtheducation kepada ibu. Menganjurkan ibu untuk segera datang ke pusat pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat keluhan.

Ditahapan pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny "B" dari tinjauan pustaka penulis menemukan beberapa efek samping pada saat kunjungan serta melaksanakan tindakan asuhan kebidanan sesuai dengan perencanaan. Sehingga pada tahapan ini penulis tidak dijumpai hambatan serta tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

G. Langkah VII : Evaluasi

Evaluasi yaitu langkah terakhir dari proses manajemen asuhan kebidanan merupakan proses dinilainya tingkat berhasilannya asuhan yang diberikan kepada klien dengan pedoman yaitu tujuan dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya., riwayat kesehatan, keadaan umum dan fisik serta TTV dalam batas normal.

Dari kasus tersebut penulis menemukan tidak adanya kesenjangan teori berdasarkan tinjauan pustaka. Sebelum mengerjakan suatu tindakan perlu persetujuan dari klien atau pihak keluarganya. Klien akan segera ke pusat layanan kesehatan terdekat jika terjadi keluhan.

Berdasarkan studi kasus Ny "B" akseptor lama KB PIL tidak dijumpai penyimpangan. Oleh sebab itu bila dilakukan perbandingan antar tinjauan pustaka dengan studi kasus tidak dijumpai ada kesenjangan.

BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori dan tinjauan pustaka serta hasil pengkajian manajemen asuhan kebidanan keluarga berencana pada Ny”B” akseptor lama KB

PIL di Puskesmas kassi- kassii tanggal 05 April 2022 s/d 20 April 2022, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus Manajemen Asuhan Kebidana Keluarga Berencana Pada Ny B“ Dengan Akseptor lama KB PIL.

1. Pengumpulan data dasar dilakukan dengan melakukan anamnesis pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pada Ny”B”. data subjektif yang diperoleh ibu ingin menggunakan KB PIL sedangkan data objektif pada pemeriksaan fisik dan penunjang tidak ditemukan kontraindikasi penggunaan KB PIL
2. Telah dilaksanakan perumusan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosa atau masalah aktual pada Ny “B” yaitu akseptor lama KB PIL.
3. Telah dilaksanakan perumusan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosa atau masalah potensial pada Ny “B” dengan akseptor lama KB PIL di Kassi-Kassi
4. Telah dilaksanakan identifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi pada Ny “B” dengan akseptor lama KB PIL di Puskesmas Kassi-Kassi.

5. Menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “B” dengan akseptor lama KB PIL di Puskesmas Kass-Kassiberdasarkan diagnosa masalah aktual dan masalah potensial.
6. Telah dilaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “B” dengan akseptor lama KB PIL di Puskesmas Kassi-Kassi dengan hasil semua tindakan dapat dilakukan secara menyeluruh tanpa adanya hambatan.
7. Telah dilakukan evaluasi hasil asuhan kebidanan pada Ny “B” dengan akseptor lama KB PIL di Puskesmas Kassi-Kassi dengan hasil ibu telah menjadi akseptor KB PIL, pernah merasakan keluhan akan tetapi telah teratasi dengan dilakukannya asuhan dan pada asuhan kebidanan terakhir ibu sudah tidak memiliki keluhan apapun.
8. Telah dilakukan pendokumentasian seluruh hasil yang ditemukan serta tindakan asuhan pada Ny “B” dengan akseptor lama KB PIL di Puskesmas Kassi-Kassi dalam bentuk SOAP.

B. Saran

1. Bagi klien
 - a. Alangkah lebih baiknya ibu menjaga kebersihan tubuh khususnya area genitalia dan pakaiannya terutama pada pakaian dalam.
 - b. Ibu mestinya mampu mengetahui dengan jelas serta mengerti dengan efek yang mungkin terjadi dari penggunaan metode kontrasepsi yang dipilih.

c. Sebaiknya ibu datang ke pusat layanan kesehatan terdekat apabila ibu merasakan keluhan dan ingin melepas atau mengganti ke alat kontrasepsi lain.

2. Bagi pelaksana pelayanan kesehatan

- a. Sebagai seorang bidan layaknya mampu memberi pelayanan secara menyeluruh untuk setiap klien dengan tidak membeda-bedakannya.
- b. Dalam pemberian konseling untuk akseptor KB bidan mestinya lebih bisa mengarahkan ke cara kerja serta efek yang mungkin dialami dari penggunaan alat kontrasepsi.
- c. Bidan patutnya mampu memupuk kemampuan terlebih ke penerapan pada kasus yang terjadi pada keluarga berencana, pelayanan kontrasepsi serta penanggulangan efek samping secara dini.

3. Bagi institusi

Guna mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan perlu dilakukan penerapan manajemen kebidanan dalam memecahkan masalah bias ditingkatkan serta dikembangkan hal ini karena proses tersebut sangat bermanfaat guna membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Mochamad & Ali Baziad, dkk. 2014. *"Ilmu Kandungan Edisi Ketiga"*. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
Departemen Agama Republik Indonesia, 2010.
- Firdaus, Muhammad Yoga. 2021. Tafsir Surah Al-Hajj Ayat 5 Penciptaan Manusia. Kanal Tafsir Mencerahkan. <https://tanwir.id/tafsir-surat-al-hajj-ayat-5-penciptaan-manusia/>.
- Hariadini, A. L. dkk. 2017. *Gambaran Kejadian Efek Samping Dan Angka Kunjungan Ulang Akseptor Kontrasepsi Oral Kepada Tenaga Kesehatan (Studi Pendahuluan guna Pembuatan Alat Bantu Konseling Berupa Aplikasi Komputer "Sukses Ber-KB di Apotek Kota Malang)*. *Pharmaceutical Journal Of Indonesia* 3(1): 17-23.
- Jitowiyono, S & Abdul Rouf M. 2018. *"Keluarga Berencana Dalam Perspektif Bidan"*. PT PUSTAKA BARU: Yogyakarta.
- Katarian, T & Denny Perbrianti, *"Hubungan Antara Pengetahuan Askeptor KB Pil Dengan Kepatuhan Mini Pil KB Di Bidan Praktik Swasta Titin Widyaningsih Pontianak Tahun 2020"*, Akademik Kebidanan Pasca bahakti pontianak, Vol.10 No.1. Tahun 2020.
- KEMENKES RI/NO.229/MENKES/SK/II/2010. *"Pedoman Asuhan Kebidanan Masa Perimenopause"*.
- KEMENKES RI/NO.229/MENKES/SK/II/2010. *Pedoman Asuhan Kebidanan Masa Perimenopause*.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2010.
- Kronenberg, F. *"Menopausal hot flashes: a review of physiology and biosociocultural perspective on methods of assessment"*, *The Journal of nutrition*, Vol 12 No.1. 2016.
- Kulsum, Umami & Atun Wigati. 2017. *"Kecemasan Wanita Pada Masa Menopause Berdasarkan Tingkat Ekonomi"*, *Indonesia Jurnal Kebidanan*, vol.1 No.2. 2017.
- Lubis, Namora Lumongga. 2016. *"Psikologi Kespro Wanita & Perkembangan Reproduksi Ditinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologi"*. Kencana Prenada Media Group.
- Lusiana, Novita, *"Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kecemasan Wanita dalam Menghadapi Menopause di Puskesmas Melur Pekanbaru Tahun 2014"*, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol.2 No.5. 2014.
- Mandang, Jenny, Freike Lumi, Naomy M. Tando dan Iyam Manueke. 2016. *Kesehatan Reproduksi Dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)*. Penerbit IN MEDIA.
- Masruroh. 2015. *"Organisasi Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Kebidanan"*. Nuha Medika.
- Mulyandari, Meta. dkk. 2020. *Hubungan Lama Penggunaan Alat Kontrasepsi Oral (Pil KB) Dan Intrauterine Device (IUD) Terhadap Resiko Kanker Serviks Di Puskesmas Ngoresan Surakarta*. *Jurnal Keperawatan Malang*, Vol.5 No.2.

- Ningtiyasari, Nunik. 2017. *Hubungan Kontrasepsi Hormonal Dengan Perubahan Pola Haid Pada Akseptor KB Hormonal Di BPM Yayuk Wahyu Kabupaten Tulungagung*.
- Nurfajriah, Suci, "Pengaruh Konseling Menopause Oleh Bidan Konselor Terhadap Pengetahuan Tentang Menopause", INDONESIA MIDWIFERY JOURNAL, Vol.1 No.1. 2017.
- Nurpatiningsih, Susanti, "Hubungan Antara Kesepian Menopause Dengan Kecemasan Menghadapi Menopause pada ibu PKK Di Desa Gentan Kecamatan Bendosari kabupaten sukoharjo". 2016.
- Oemiati, Ratih dan Rustika. 2015. "Faktor Resiko Penyakit Jantung Koroner (PJK) Pada Perempuan". Buletin Penelitian Sistem Kesehatan.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2018." *Ilmu Kebidanan*". PT BINA PUSTAKA SARWONO PRAWIROHARDJO: Jakarta. Kronenberg, F. (2016). Menopausal hot flashes: a review of physiology and biosociocultural perspective on methods of assessment. The Journal of nutrition, 140(7), 1380S-1385S. <https://doi.org/10.3945/jn.109.120840>
- Salim, Rosa Amanda. 2015. "Complicated Perimenopause". PT Gramedis.
- Suparni, Ita Eko, &Reni Yudi Astutik. 2016. "Menopause Masalah Dan Penanganannya". CV Budi Utama.
- Wahid,Nabila . 2016. "Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Dengan Kejadian Menopause Pada Ibu Di Pueskesmas Lau Maros". Jurnal Kebidanan Vokasional, Vol.1 No.1.
- Walyani, Elisabeth & Endang Purwoastuti. 2015. "Ilmu Obstetri & Ginekologi Sosial Untuk Kebidanan". Pustaka Baru Press.
- WHO (Wold Health Organization) 2015.
- Yulifah, R & Surachmindari. 2014. "Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan". Salemba Medika.
- Setiawati, M.C.N. 2020. *Efek Samping Pil KB Pada Akseptor Di Kelurahan Manyaran Kota Semarang*. Cendekia Jurnal Of Pharmacy, Vol.4 No.2

DOKUMENTASI STUDI KASUS

Dokumentasi Hari pertama Di Rumah Pasien



Dokumentasi Hari Kedua Di Rumah Pasien



Dokumentasi Hari Ketiga Di Rumah Pasien



Dokumentasi Hari Keempat Di Rumah Pasien



Dokumentasi Hari Kelima Di Rumah Pasien



Dokumentasi Hari keenam Di Rumah Pasien





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

ALAUDDIN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 83 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Palong Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: iain-alauddin.ac.id

Nomor : B-1107 / Un.05-FKIK/PP.00.9/03/ 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian** Gowa, 7 Maret 2022

Kepada Yth
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ruslia Hl. Muhtar
N I M : 70400118009
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny"X" Dengan Akseptor lama KB PII di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.
2. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Puskesmas Kassi-Kassi terhitung mulai tanggal 22 Maret – 22 Mei 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan tenmakasih.

Wassalam
Dekan

Syatirah

Tembusan
-Rektor UIN Alauddin Makassar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
 Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
 Email : kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 09 Maret 2022

K e p a d a
 Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA MAKASSAR
 Di -
 MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
 Nomor : 070/ 365 -II/BKBP/III/2022

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 27694/S.01/PTSP/2022, Tanggal 08 Maret 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

- Nama** : RUSLIA HI. MUHTAR
NIM / Jurusan : 70400118009 / Kebidanan
Pekerjaan : Mahasiswa (D3) UIN Alauddin
Tanggal pelaksanaan : 22 Maret s/d 22 Mei 2022.
Jenis Penelitian : Karya Tulis Ilmiah
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa
Judul : "MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPOUSE PADA NY "X" DENGAN AKSEPTOR LAMA KB PIL DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR"

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.



a.n. WALIKOTA MAKASSAR
 KEPALA BADAN KESBANGPOL.
 u.b.
 SEKERTARIS.

DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si
 Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
 NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar.
5. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar.
6. Mahasiswa yang bersangkutan.
7. Arsip.



63-17 Maret 2022

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710

MAKASSAR

Nomor : 440/PSDK/III/2022
Lamp :
Perihal : Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Kassi Kassi

Di-
Tempat

Sehubungan Surat dari Badan kesatuan bangsa dan Kesatuan Politik No : 070/-II-BKBP/2022,tanggal 11 Maret 2022 ,maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Ruslia HI. Muhtar
NIM : 70400118009
Jurusan : D3 Kebidanan
Institusi : UIN Alauddin Makassar
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenapouse pada NyX dengan akseptor lamaKB pil di puskesmas Kassi Kassi kota makassar

Akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah puskesmas yang saudara pimpin pada tanggal 22 Maret 2022 s/d 22 Mei 2022

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

*Yth: ke only Ie
y di kasi Kassi
18 14/3/22*

Makassar, 14 Maret 2022
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar



Dr. Nurjaidah Sirajuddin
Pangkat : Pembina
NIP : 19730112 2006042012

*Yth. ke SD Manin/Gordham -46
y di kanti Aperlumpang 18/3-22*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KASSI KASSI
Jalan Tamalate I No. 43 Makassar Kode Pos: 90222
Telp. (0411) 863356, E-mail: puskesmaskassikassi@gmail.com



SURAT KETERANGAN

No: 234 /PKM-KS/445/VI/2022

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 440/70/PSDK/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Penelitian, pejabat yang bertanda tangan dibawah ini :

Menerangkan bahwa :

Nama : **RUSLIA HI. MUHTAR**
NIM/JURUSAN : 70400118009 / D III Kebidanan
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Makassar

Benar telah melakukan *Penelitian* di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar, pada tanggal 22 Maret s/d 22 Mei 2022 dalam rangka penyusunan *Karya Tulis Ilmiah* dengan judul "*Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause pada Ny "X" dengan Akseptor Lama KB Pil di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar Tahun 2021*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 08 Juni 2022

Plt. Kepala Puskesmas Kassi Kassi



dr.H. Tasmin, M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19620701 198901 1 002



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.056/KEPK/FKIK/III/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama :RUSLIA HILMUHTAR
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPOUSE PADA NY"X" DENGAN
AKSEPTOR LAMA KB PIL DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR"**

**"MANAGEMENT OF PERIMENOPAUSAL MIDWIFERY CARE FOR MRS "X" WITH OLD
ACCEPTORS OF KB PILLS AT THE KASSI-KASSI PUBLIC HEALTH CENTER, MAKASSAR CITY"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfilment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
This declaration of ethics applies during the period March 1, 2022 until March 1,2023

March 1, 2022
Professor and Chairperson,

Dr. Syahrul, Sp.A., M.Kes



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 27694/S.01/PTSP/2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1107/Un.06-FKIK/PP.00.9/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RUSLIA HI. MUHTAR**
Nomor Pokok : 70400118009
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPOUSE PADA NY "X" DENGAN AKSEPTOR LAMA
KB PIL DI PUSKESMAS KASSI- KASSI KOTA MAKASSAR "**
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 Maret s/d 22 Mei 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 08 Maret 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth.
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringat.

SIMAP PTSP 08-03-2022



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulseprov.go.id> Email : ptsp@sulseprov.go.id
Makassar 90231



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama: Ruslia Hi. Muhtar

Nim: 70400118009

Tempat/Tanggal Lahir: Doro, 09 Oktober 1999

Suku: Makian

Agama: Islam

Alamat: Perumahan Griya Mulky Samata Residence Blok B No 3

Nama Orang Tua

Ayah: Hi. Muhtar

Ibu: Rasina M. Ali

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006 -200-12 SD Negeri Doro
2. Tahun 2012-2015 SMP Muhammadiyah 1 kota Ternate
3. Tahun 2015-2018 SMA Negeri 10 Kota Ternate
4. Tahun 2018-2022 UIN Alauddin Makassar