

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK METANOL, EKSTRAK
LARUT n-HEKSAN dan EKSTRAK TIDAK LARUT n-HEKSAN KULIT
BUAH SEMANGKA KUNING (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. &
Nakai) TERHADAP *Propionibacterium acnes***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi

Pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

RUSMAN MUTAHIR

NIM : 70100115079

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSMAN MUTAHIR
NIM : 70100115079
Tempat/Tgl. Lahir : Lalepo, 09 November 1997
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Romang Polong
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Metanol, Ekstrak Larut N-Heksan Dan Ekstrak Tidak Larut N-Heksan Kulit Buah Semangka Kuning (*Citrullus Lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai) Terhadap *Propionibacterium acnes*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, November 2022

Penulis,







Rusman Mutahir
NIM: 70100115079

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Metanol, Ekstrak n-Heksan dan Ekstrak Tidak Larut n-Heksan Kulit Buah Semangka Kuning (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai) Terhadap Propionibacterium acne*" yang disusun oleh **Rusman Mutahir**, NIM: 70100115079, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 November 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 14 November 2022 M
19 Rabi'ul-Akhir 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	()
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha., S.Farm., M.Si	()
Munaqisy I	: apt. Isriany Ismail., S.Si., M.Si	()
Munaqisy II	: Prof. Dr. Hj. Muliaty Amin., M.Ag	()
Pembimbing I	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si	()
Pembimbing II	: apt. Muh Rusdi, S.Si., M.Si	()

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum.Wr.Wb. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Metanol, Ekstrak Larut N-Heksan dan Ekstrak Tidak Larut N-Heksan Kulit Buah Semangka Kuning (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai) Terhadap *Propionibacterium acnes*”. Shalawat dan salam juga tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, keluarga, dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di bidang pendidikan Sarjana (S1). Besar harapan penulis agar skripsi ini menjadi penunjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan ke depannya dan semoga dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, atas izin Allah dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagaimana mestinya. Terkhusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan dengan setulus hati kepada Ayahanda Rusdi, Ibunda A. Nurjanna yang tak henti-hentinya memberi do'a dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materi serta kesabaran, kegigihan dan pengorbanan yang diberikan dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini. Untuk saudara-saudaraku yang tersayang dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut

satu persatu, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan bimbingan serta arahnya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada semua pihak.

Melalui kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih pula kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Bapak Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

10. Ibu apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
11. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si., selaku sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
12. Ibu apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya serta memberikan arahan dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi ini
13. Bapak apt. Muh Rusdi, S.Si., M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya serta memberikan arahan dalam membimbing penulis dalam penyelesaian karya tulis ini.
14. Ibu apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., selaku penguji kompetensi yang telah memberikan arahan dan tuntutan dalam mengoreksi kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.
15. Ibu Prof. Dr. Hj. Muliaty Amin, M.Ag., selaku penguji agama yang telah memberikan arahan dan tuntunan dalam mengoreksi kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.
16. Seluruh dosen, staf, laboran dan keluarga besar Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar, yang telah ikhlas dalam membantu dan memberikan berbagai informasi serta arahan yang penulis butuhkan demi terselesaikannya skripsi ini.
17. Teman-teman Farmasi Angkatan 2015 (pulv15) yang tak henti-hentinya membantu dan memotivasi penulis dalam proses perkuliahan serta dalam proses penyusunan skripsi ini.
18. Adik-adik di Farmasi UIN Alauddin, serta semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu, terima kasih atas perhatian dan bantuan

yang diberikan pada penulis selama ini proses perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini mendapat ridha dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan memberi manfaat bagi masyarakat dan penikmat ilmu pengetahuan, khususnya kepada penulis sendiri. *Aamiin ya Rabbal Aalamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, November 2022

Penulis

Rusman Mutahir

NIM: 70100115079



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	9
A. Uraian Tanaman	9
B. Uraian Mikroba Uji	15
C. Kulit.....	16
D. Jerawat.....	21
E. Antibiotik.....	27
F. Uji antimikroba.....	28
G. Ekstraksi	30
H. Tinjauan Islam tentang Tumbuhan	35
BAB III	41
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41

B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Alat dan Bahan	41
D. Prosedur Kerja	42
BAB IV	48
A. Hasil Penelitian.....	48
B. Pembahasan	53
BAB V.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja	62
Lampiran 2. Gambar penelitian.....	65
Lampiran 3. Hasil Uji Determinasi Tanaman	71
Lampiran 4. Klasifikasi Tanaman Semangka Kuning	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori daya hambat bakteri menurut davis stout.....	30
Tabel 2. Hasil Ekstraksi Simplisia Kulit Buah Semangka Kuning Dengan Metode Maserasi	48
Tabel 3. Hasil Partisi Ekstrak Kulit Buah Semangka Kuning	49
Tabel 4. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Ekstrak Metanol Kulit Buah Semangka Kuning.....	49
Tabel 5. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak metanol kulit buah Semangka Kuning.....	50
Tabel 6. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Dengan Ekstrak larut N-Heksan	51
Tabel 7. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Dengan Ekstrak Tidak Larut N-Heksan	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Buah Semangka dan bagian-bagiannya.....	12
Gambar 2. Struktur Kulit	18
Gambar 3. Tanaman Semangka	65
Gambar 4. Buah Semangka Kuning.....	65
Gambar 5. Sampel Kulit Buah Semangka Kuning.....	66
Gambar 6. Sampel Kulit Buah Semangka Kuning Yang telah di Parut.....	66
Gambar 7. Proses Pengeringan Sampel	66
Gambar 8. Ekstrak Kental	66
Gambar 9. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Ekstrak Metanol Kulit Buah Semangka Kuning	67
Gambar 10. Hasil Pengujian Daya Hambat Ekstrak Metanol.....	68
Gambar 11. Hasil Pengujian Daya Hambat Ekstrak Larut N-Heksan	69
Gambar 12. Hasil Pengujian Daya Hambat ekstrak tidak larut N-Heksan	70

ABSTRAK

NAMA : RUSMAN MUTAHIR
NIM : 70100115079
JUDUL : UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK METANOL, EKSTRAK LARUT N-HEKSAN DAN EKSTRAK TIDAK LARUT N-HEKSAN KULIT BUAH SEMANGKA KUNING (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai) TERHADAP *Propionibacterium acnes*

Kulit buah semangka kuning merupakan suatu bagian dari buah semangka kuning yang dilaporkan memiliki kandungan senyawa alkaloid, saponin dan terpenoid yang berpotensi sebagai penghambat terhadap pertumbuhan bakteri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji potensi ekstrak kulit buah semangka kuning (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai) sebagai antibakteri yang dapat menghambat aktivitas bakteri *Propionibacterium acnes*. Metode difusi kertas cakram digunakan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak metanol, ekstrak larut n-heksan dan tidak larut n-heksan kulit buah semangka kuning. Antibiotik klindamisin sebagai kontrol positif dan DMSO digunakan sebagai control negatif. Digunakan 4 konsentrasi untuk masing-masing ekstrak yaitu 250, 500, 750, dan 1000 ppm. Kulit buah semangka kuning menunjukkan adanya aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Propionibacterium acne* pada konsentrasi optimum yang digunakan yaitu pada ekstrak metanol pada konsentrasi 250 ppm dengan kategori daya hambat Kuat, untuk ekstrak larut n-heksan konsentrasi optimum berada pada konsentrasi 500 ppm, dengan kategori daya hambat kuat. Sedangkan pada ekstrak tidak larut n-heksan konsentrasi optimum ialah pada konsentrasi 250 ppm, dengan kategori daya hambat kuat.

Kata kunci : Kulit buah, *Citrullus lanatus*, *Propionibacterium acne*, antibakteri.

ABSTRACT

Name : RUSMAN MUTAHIR

Student number : 70100115079

Title : **ANTIBACTERIAL ACTIVITY TEST OF HEXAN EXTRACT, N-HEXAN SOLUTION EXTRACT AND N-HEXAN INSOLUBLE EXTRACT ON THE SKIN OF YELLOW WATERMELON (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai) on *Propionibacterium acnes***

Yellow watermelon rind is a part of the yellow watermelon fruit which is reported to contain alkaloids, sponins and terpenoids which have the potential to be inhibitors of bacterial growth. The purpose of this study was to test the potential of yellow watermelon rind extract (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai) as an antibacterial that can inhibit the activity of *Propionibacterium acnes* bacteria. Disc paper diffusion method was used to determine the antibacterial activity of methanol extract, soluble n-hexane extract and insoluble n-hexane yellow watermelon rind. Antibiotic clindamycin as a positive control and DMSO was used as a comparison of antibacterial activity. 4 concentrations were used for each extract, namely 250, 500, 750, and 1000 ppm. Yellow watermelon peel shows antibacterial activity against *propionibacterium acne* bacteria at the optimum concentration used, namely in methanol extract at a concentration of 250 ppm with a strong inhibitory power category, for n-hexane soluble extracts the optimum concentration is at a concentration of 500 ppm, with a strong inhibitory power category. While in the insoluble extract n-hexane the optimum concentration is at a concentration of 250 ppm, with the category of strong inhibitory power.

Keywords: *Yellow watermelon skin, Citrullus lanatus, Propionibacterium acne, antibacterial.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kulit pada tubuh manusia memiliki banyak fungsi, mulai dari pelindung otot, pengontrol suhu tubuh, hingga menjadi indikator pertama timbulnya suatu penyakit pada tubuh, diantaranya jerawat.

Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang kulit manusia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nissa/ 4 : 56

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا
لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (النساء : ٥٦)

Terjemahnya :

Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana (Al-Qur'an dan Terjemahannya).

Ayat ini menjelaskan kekuasaan Tuhan kepada hambanya yang ingkar dan masuk neraka dan merasakan azab Allah "kulit mereka hangus dan di ganti lagi yang baru untuk kemudian terbakar lagi". Ayat ini memberi isyarat sel kulit manusia cepat tumbuh kembali. Mekanisme inilah yang menimbulkan rasa nyeri neuropatik, hingga menjadi azab yang pedih.

Islam adalah agama yang Allah datangkan untuk mengatur segala urusan dalam kehidupan umat manusia agar tertata rapi dan indah. Islam sangat menyukai keindahan dan kecantikan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud yang kemudian

diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya :

Sesungguhnya Allah Maha Indah dan Mencintai Keindahan (HR. Muslim dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anh).
 Sehingga untuk memperoleh kecantikan atau keindahan wajah

perlu dilakukan perawatan pada wajah kita. Wajah yang berjerawat merupakan salah satu penyakit yang memerlukan perawatan atau pengobatan.

Jerawat didefinisikan sebagai peradangan kronik dari folikel polisebasea yang disebabkan oleh beberapa faktor dengan gambaran klinis yang khas. Jerawat di sebabkan karena adanya pori-pori kulit yang tersumbat sehingga menimbulkan bruntusan (bintik merah) dan abses (kantong nanah) yang meradang sehingga terjadi infeksi pada kulit. Jerawat juga sering terjadi pada kulit wajah, leher dan punggung. Baik perempuan ataupun laki-laki (Susanto & Made, 2013).

Aktivitas kelenjar minyak yang berlebihan dan diperburuk oleh infeksi bakteri salah satunya bakteri *Propionibacterium acnes* merupakan penyebab dari jerawat. (Suryana et al., 2017).

Propionibacterium acnes berperan pada patogenesis jerawat hingga menghasilkan lipase yang memecah asam lemak bebas dari lipid kulit. Kemudian Asam lemak ini mengakibatkan inflamasi ke jaringan ketika berhubungan dengan sistem imun sehingga mendukung terjadinya jerawat. *Propionibacterium. acnes* termasuk bakteri dengan perumbuhan yang relatif lambat. (Azifitria et al., 2010)

Pengobatan jerawat dilakukan dengan cara memperbaiki abnormalitas folikel sehingga menurunkan produksi minyak yang berlebih, menurunkan jumlah koloni *Propionibacterium acnes* dan juga menurunkan inflamasi pada kulit. Populasi bakteri *Propionibacterium acnes* juga dapat diturunkan dengan memberikan antibiotik seperti eritromisin, klindamisin, dan benzoil peroksida (Azrifitria 2010).

Tingginya penggunaan antibiotik menjadi salah satu pemicu terbesar munculnya resistensi. Resistensi bakteri terhadap antibakteri merupakan salah satu masalah global baik negara maju maupun negara berkembang (Pelczar dan Chan, 2012).

Hal tersebut mendorong penemuan sumber obat-obatan antibakteri dari bahan alam hingga dapat berperan sebagai antibakteri yang lebih aman dan relatif lebih murah.

Menurut hasil penelitian Sekar Mahendra, et al., (2014) buah semangka kuning mengandung senyawa alkaloid, karbohidrat, protein, steroid, glikosida, flavonoid, tannin dan triterpenoid. Menurut Okafor, et al., (2015), kulit buah semangka mengandung senyawa alkaloid, fenol, saponin, flavonoid, triterpenoid dan steroid. Senyawa-senyawa tersebut memiliki potensi sebagai penghambat terhadap pertumbuhan bakteri, khususnya *Propionibacterium acnes*.

Dengan demikian hal tersebut yang menjadi pertimbangan oleh peneliti untuk melakukan penelitian mengenai aktivitas ekstrak metanol kulit buah semangka kuning terhadap bakteri penyebab jerawat (*Propionibacterium acnes*), sebagai salah satu penemuan baru terhadap obat jerawat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak metanol, ekstrak larut n-heksan dan ekstrak tidak larut n-heksan kulit buah semangka kuning (*Citrullus lanatus*(Thunb.) Matsum. & Nakai) memiliki aktivitas terhadap bakteri *Propionibacterium acnes* ?
2. Berapa konsentrasi optimum ekstrak metanol, ekstrak larut n-heksan dan ekstrak tidak larut n-heksan kulit buah semangka kuning (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai) yang dapat memberikan aktivitas penghambatan terhadap bakteri *Propionibacterium acnes* ?
3. Apa saja golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak metanol kulit buah semangka kuning (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai) ?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Uji aktivitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui dan menelusuri aktivitas dari ekstrak semangka kuning sebagai antibakteri terhadap salah satu bakteri penyebab jerawat (*Propionibacterium acnes*).
- b. Antibakteri adalah zat berupa ekstrak kulit dari semangka kuning yang dapat menghambat atau bahkan mematikan bakteri (*Propionibacterium acnes*).
- c. Ekstraksi adalah proses penarikan senyawa kimia/zat aktif yang ada pada kulit semangka kuning (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai) dengan menggunakan pelarut yang metanol.
- d. Ekstrak kulit semangka kuning (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai) adalah sediaan kental dan pekat yang didapatkan dari proses menarik senyawa kimia/zat aktif yang ada

pada simplisia kulit semangka kuning dengan menggunakan pelarut metanol.

- e. Metanol adalah pelarut yang bersifat polar dan digunakan untuk menarik zat aktif yang terkandung dalam kulit semangka kuning (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai).
- f. Bakteri *Propionibacterium acnes* adalah bakteri gram positif yang bersifat patogen dimana menjadi pemicu tumbuhnya jerawat pada kulit wajah manusia dan digunakan sebagai bakteri uji pada penelitian ini.
- g. Kulit buah merupakan bagian selain dari daging berwarna kuning pada buah semangka dimana ditandai dengan warna putih hingga kebagian kulit terluar dengan warna hijau tua dan bercorak khas.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mengkaji bagaimana ekstrak metanol, ekstrak larut n-heksan dan ekstrak tidak larut n-heksan kulit buah semangka kuning (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai) sebagai antibakteri terhadap jerawat yang disebabkan oleh bakteri *Propionibacterium acnes*.

D. Kajian Pustaka

1. Dalam penelitian Harith et al., (2017) tentang *Strudies Phytochemical Constituents And Antimicrobial Properties Of Citrullus Lanatus Peels*. diperoleh hasil bahwa ekstrak metanol kulih buah semangka memiliki aktivitas antimikroba pada mikroba *Staphylococcus epidermidis* dimana penghambatan tertinggi terjadi pada konsentrasi 20 mg/mL dengan kategori zona hambat kuat (≥ 10 mm), dan untuk penghambatan pada bakteri *Trichophyton. Mentagrophytes* diperoleh penghambatan

tertinggi pada konsentrasi 80-100 mg/mL dengan kategori zona hambat kuat (≥ 10 mm).

2. Menurut hasil penelitian dari Syakri et al., 2019 Tentang “Pengujian Aktivitas Antibakteri Ekstral Etanol Kulit Buah Semangka Merah (*Citrullus Lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai) Terhadap Bakteri *Propionibacterium acnes* yang menyimpulkan bahwa ekstrak etanol 96% kulit semangka merah (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum & Nakai memiliki aktivitas sebagai agen antibakteri terhadap bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acne*. Dengan konsentrasi optimum ekstrak etanol 96% kulit semangka merah (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum & Nakai yang dapat memberikan aktivitas antibakteri terhadap *Propionibacterium acne* ialah pada konsentrasi 1000 ppm dengan rata-rata diameter zona hambat 0,5 mm.
3. Selain itu dalam penelitian David Neglo et. al., 2021 Tentang *Comparative Antioxidant And Antimicrobial Activities Of The Peels, Rind, Pulp And Seeds Of Waterelon (Citrullus lanatus) fruit* menyatakan bahwa diantara berbagai bagian buah semangka, kulit memiliki aktivitas antioksidan dan antimikroba tertinggi sedangkan daging buahnya paling sedikit. Kulit dan biji semangka tidak hanya kuat dalam efek antioksidan dan antimikrobanya, tetapi juga memiliki tingkat senyawa fenolik yang cukup besar dibandingkan dengan bagian lain. Dimana dalam penelitian tersebut diperoleh hasil yaitu zona hambat dari ekstrak metanol berbagai bagian buah semangka terhadap berbagai strain mikroorganisme, yaitu pada bagian kulit (500 mg/ml) yaitu terdapat penghambatan pada bakteri *Staphylococcus Albus*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas Fluorescens*, *Bacillus Subtilis*,

Micrococcus Luteus, Listeria Innocua, Klebsiella Oxytoca, Salmonella Enterica, Shigella Sonnei, Streptococcus Thermophiles.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah ekstrak metanol, ekstrak larut n-heksan dan ekstrak tidak larut n-heksan kulit buah semangka kuning (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai) memiliki aktivitas terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*.
- b. Untuk mengetahui berapa konsentrasi optimum ekstrak metanol, ekstrak larut n-heksan dan ekstrak tidak larut n-heksan kulit buah semangka kuning (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai) yang dapat memberikan aktivitas terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*.
- c. Untuk mengetahui apa saja golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak metanol kulit buah semangka kuning (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai).

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan menambah pemahaman ilmu pengetahuan tentang aktivitas antimikroba dari ekstrak metanol limbah kulit semangka kuning (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai) terhadap bakteri penyebab jerawat yang nantinya akan memberikan manfaat terhadap pembuatan obat baru.

b. Secara aplikatif

Secara aplikatif hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam usaha mendapatkan sumber obat baru yang

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan sebagai wujud pemanfaatan sumber daya alam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman

Flora atau segala tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam suatu daerah atau di suatu masa, yang mana merupakan sebutan untuk seluruh jenis tanaman dan tumbuhan. Sebagai padanan dari kata flora, dalam al-Qur'an di gunakan kata "nabaats" dan "haarts" yang berarti tumbuhan dan tanaman. Saat ini berbagai macam nama tumbuhan yang kita ketahui, nama tumbuh-tumbuhan tersebut sebenarnya telah Allah subhānahu wata'āla. ajarkan kepada manusia, dan manusia pertama yang diajarkan oleh Allah subhānahu wata'āla, tentang nama-nama tumbuhan adalah Nabiullah Adam as.

Dengan demikian pula dalam Al-Qur'an banyak di sebutkan tentang berbagai potensi tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia di muka bumi ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *Q.S. Al-An'am/ 6:*

99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ
 مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ
 وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ
 لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah dan perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada

yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” (Departemen Agama RI, 2010: 140).

Ayat ini merupakan bukti kemahakuasaan Allah subhānahu wata’āla. Ayat ini mengarahkan manusia agar memandang sekelilingnya supaya dia dapat sampai pada kesimpulan bahwa Allah subhānahu wata’āla. Maha Esa dan kehadiran hari kiamat adalah keniscayaan.

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa Allah menciptakan aneka macam tumbuhan yang merupakan bahan pangan dan kebutuhan manusia dan binatang. Selain itu Allah juga mengingatkan agar manusia selalu mensyukuri dan memanfaatkannya dengan baik (Shihab, 2002: 542).

Pada ayat ini mengurai kumpulan hal-hal yang disebut sebelumnya, bermula dengan menegaskan bahwa *Dan Dia* juga bukan selain-Nya yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu Kami, yakni Allah subhānahu wata’āla, mengeluarkan yakni menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni akibat turunnya air itu, segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan darinya, yakni dari tumbuh-tumbuhan itu, tanaman yang menghijau, butir yang saling bertumpuk, yakni banyak, padahal sebelumnya ia hanya satu biji atau benih. (Shihab, 2002: 573-574).

Bagian akhir ayat ini disebutkan: perhatikanlah buahnya di waktu (pohonnya) berbuah, dan kematangannya. Perintah ini mendorong perkembangan Ilmu Tumbuh-tumbuhan (Botani) yang sampai saat ini mengandalkan metode pengamatan bentuk luar seluruh organnya dalam semua fase perkembangannya (Shihab, 2002, 3: 575).

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّفْطِينٍ (الصَّحْفَت : ١٤٦)

Terjemahnya:

“Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu”
(Al-Qur’an dan Terjemahan).

Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa’id Ibnu Jubair, Wahb Ibnu Tawus, As-Saddi, Qatadah, Ad-Dahhak, Ata Al-Khurrasani, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa pohon tersebut adalah pohon labu.

Hasyim telah meriwayatkan dari Al-Qasim Ibnu Abu Ayyub, dari Sa’id Ibnu Jubair, bahwa setiap pohon yang tidak memiliki batang dinamakan yaqtin (labu).

Menurut riwayat lain yang bersumber darinya, setiap pohon yang dikonsumsi dalam sekali tanam dinamakan yaqtin.


Sebagian diantara mereka menyebutkan beberapa keistimewaan dari buah labu ini antara lain cepat pertumbuhannya. Rindang pohonnya, besar dan lembut buahnya. Buah labu tidak pernah dihinggapi oleh lalat, buahnya terasa enak dan dapat dimakan baik dalam keadaan mentah maupun dimasak, berkulitnya. Telah disebutkan pula dalam hadis bahwa Rasulullah Saw menyukai buah labu dan mencari-carinya di pinggir-pinggir piring (bila sedang makan).

1. Klasifikasi tanaman

Menurut Deshmukh, 2015 klasifikasi semangka sebagai berikut :

Regnum	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Violales

Famili : Cucurbitaceae
 Genus : *Citrullus*
 Spesies : (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai)



Gambar 1. Buah Semangka dan bagian-bagiannya

2. Nama daerah

Nama daerah: semangka, semongko (Jawa), ghuleng-ghuleng (Kangean), kalamboja (Nias), tamuja, karamujo, ramujo, samaka (Lampung), Bandike lorong (Batulappa), semangka (Sunda, Madura, Bali). Mandike, karamboja, kalambosa, kamandriki (Sumatera), mendikai, semangka, pateka, (Maluku), (Hariana, 2009).

3. Morfologi tanaman semangka

Semangka bersifat menjalar, batangnya kecil, dan panjangnya dapat mencapai 5 m. Batang tanaman ini ditumbuhi bulu-bulu halus yang panjang, tajam dan berwarna putih. Tanaman semangka mempunyai bunga jantan, bunga betina, dan hermaprodit yang letaknya terpisah, namun masih dalam satu pohon. Jumlah bunga jantan biasanya lebih banyak daripada bunga lainnya. Buahnya berbentuk bulat sampai oval. Kulit buahnya berwarna hijau atau

kuning, blurik putih atau hijau. Daging buahnya lunak, berair dan rasanya manis. Warna daging buah merah atau kuning (Syukur, 2009).

Semangka kuning memiliki karakter diantaranya yaitu diameter batang ≥ 6 mm, warna batang hijau muda, permukaan batang berbulu pendek (≤ 3 mm), bentuk batang persegi empat, panjang daun ≥ 15 cm, lebar daun ≥ 6 cm, pangkal daun runcing, tepi daun bagian pangkal terbagi menjari, tepi daun bagian tangan sampai ujung terbagi menyirip, warna permukaan bawah daun hijau pucat, warna kelopak bunga hijau muda, warna mahkota bunga kuning ceah, diameter mahkota bunga ≥ 25 mm, panjang mahkota bunga ≥ 12 mm dan diameter buah vertical ≤ 20 cm. bentuk buah pendek, daging buah berwarna kuning (Kusumastuti et al. 2017).

Berdasarkan klasifikasi warna kulit buah dibedakan menjadi tiga macam warna yakni hijau muda, hijau tua dan kuning; baik yang polos maupun bergaris-garis. Buah semangka yang berkulit tebal lebih tahan dalam penyimpanan dan pengangkutan dibandingkan dengan buah berkulit tipis. Daging buah semangka dibedakan menjadi empat macam warna, yaitu merah muda, merah tua, putih dan kuning. Ukuran buah biasanya dinyatakan berdasarkan berat (bobot) yang digolongkan menjadi tiga macam, yaitu buah besar (diatas 4 kg), buah sedang (2-4 kg) dan buah kecil (kurang dari 2 kg). Umur buah sampai siap dipanen tergantung pada varietasnya, tetapi umumnya pada kisaran 80-90 hari setelah tanam benih atau 65-75 hari setelah pindah tanam, bahkan ada pula yang pada kisaran 95-100 hari setelah tanam benih; terutama varietas-varietas yang berumur panjang (Rukmana, 1994).

Ukuran buah sangat beragam dan umumnya tergantung varietas, misalnya new dragon (5 kg), sugar baby (3 kg). Banyak

varietas unggul dibudidayakan oleh petani Indonesia, namun umumnya benih semangka masih import dari luar seperti Jepang, Taiwan dan sebagian kecil dari Eropa. Varietas semangka yang ada seperti yamato (berkulit hijau), suika (berkulit hijau kekuningan), new dragon (berkulit hijau blirik), sugar baby (berkulit hijau tua hingga kehitaman) (Barus, 2008).

4. Kandungan kimia

Daging buah semangka rendah kalori dan mengandung air sebanyak 93,4%, protein 0,5%, karbohidrat 5,3%, lemak 0,1%, serat 0,2%, abu 0,5 dan vitamin. Daging buah semangka mengandung asam amino sitrullin ($C_6H_{13}N_3O_3$), asam amino asetat, asam malat, asam fosfat, arginin, betain, likopen ($C_{40}H_{56}$), karoten, bromin, natrium, kalium, silvit, lisin, fruktosa, dekstroza, dan sukrosa. Sitrulin dan arginin berperan dalam pembentukan urea di hati dari amonia dan CO_2 sehingga keluarnya urin meningkat. Kandungan kaliumnya cukup tinggi yang dapat membantu kerja jantung dan menormalkan tekanan darah (Dalimartha, 2003).

Kulit buah semangka juga kaya akan vitamin, mineral, enzim, dan klorofil. Vitamin-vitamin yang terdapat pada kulit buah semangka meliputi vitamin A, vitamin B2, vitamin B6, vitamin E, dan vitamin C. Semangka kaya kandungan kimia seperti sitrullin dan arginine. Kedua zat kimia tersebut berfungsi meningkatkan produksi urea di hati sehingga meningkatkan aliran dari urine. Bijinya mengandung sitrullin, vitamin B12, enzim urease, dan senyawa aktif kukurbositrin (Hariana, 2006).

Menurut Oseni dan Okoye (2013), mesokarp buah semangka mengandung saponin, antrakinon, flavonoid, terpenoid dan alkaloid.

Menurut Okafor, et al., (2015), kulit buah semangka mengandung senyawa alkaloid, fenol, saponin, flavonoid, triterpenoid dan steroid. Kulit buah semangka juga memiliki beberapa senyawa aktif sebagai antibakteri di antaranya alkaloid, fenol, saponin, dan terpenoid (Odewunmi et al., 2015).

Menurut sekar mahendra (2014) buah semangka kuning mengandung senyawa alkaloid, karbohidrat, protein, steroid, glikosida, flavonoid, tannin dan triterpenoid. kulit buah semangka kuning mengandung terpenoid dan saponin.

B. Uraian Mikroba Uji

1. Klasifikasi

Propionibacterium acnes

Domain : Bacteria

Phylum : Firmicutes

Class : Actinobacteria

Ordo : Actinomycetes

Family : Propionibacteriaceae

Genus : Propionibacterium

Spesies : *Propionibacterium acnes* (Garrity, 2004)

2. Sifat dan morfologi

Genus *Propionibacterium* ini termasuk bakteri gram positif, berbentuk batang dengan panjang bervariasi antara 1-1,5 μm , sel tunggal, berpasangan atau rantai pendek dengan konfigurasi yang berbeda-beda, nonmotil, tidak membentuk spora, anaerob tetapi toleran terhadap O_2 , katalase positif, dan dapat menfermentasi glukosa menghasilkan asam propionate dan asetat dalam jumlah yang banyak (Tatang, 2014).

Propionibacterium juga dapat memfermentasi laktosa, sukrosa, fruktosa, galaktosa, dan beberapa pentose, tetapi kemampuan tersebut bergantung dari spesies. Suhu pertumbuhan bakteri ini pada 30-37°C dan beberapa spesies membentuk pigmen. Salah satu spesies dari *propionibacterium* ini adalah *Propionibacterium acnes* (Tatang, 2014).

Propionibacterium acnes merupakan, merupakan bakteri flora normal pada kulit, biasanya bakteri ini terdapat pada folikel sebacea. Tidak hanya itu, *Propionibacterium acnes* juga dapat ditemukan pada jaringan manusia, paru-paru, dan jaringan prostat. Kulit merupakan habitat utama dari *Propionibacterium acnes*, namun dapat juga diisolasi dari rongga mulut, saluran pernafasan bagian atas, saluran telinga eksternal, konjungtiva, usus besar, uretra, dan vagina (Tatang, 2014).

Propionibacterium acnes termasuk bakteri gram positif, pleomorfik, dan bersifat anaerob aerotoleran. *Propionibacterium acnes* memiliki lebar 0,5-0,8 μm dan panjang 3-4 μm , bakteri ini berbentuk batang dengan ujung meruncing atau kokoid (bulat) (Tatang, 2014)

C. Kulit

Lapisan atau jaringan yang menutupi seluruh tubuh dan melindungi tubuh dari bahaya yang datang dari luar disebut kulit. Kulit yaitu bagian

tubuh yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memperindah kecantikan, serta kulit dapat membantu menemukan penyakit yang diderita oleh pasien. Kulit disebut integument atau kutis yang tumbuh dari dua macam jaringan yaitu jaringan epitel yang menumbuhkan lapisan epidermis dan jaringan pengikat (penunjang) yang menumbuhkan lapisan dermis (kulit dalam), kulit mempunyai susunan saraf yang teranyam secara halus berguna untuk merasakan sentuhan atau sebagai alat raba dan merupakan indicator untuk memperoleh kesan umum dengan melihat perubahan pada kulit. (Syaifuddin, 2009).

1. Fungsi Biologik Kulit

Fungsi biologik kulit menurut Mitsui, T. (1997), ada 5 fungsi yaitu:

a. Proteksi

Serabut elastis yang terdapat pada dermis serta jaringan lemak subkutan berfungsi mencegah trauma mekanik langsung terhadap interior tubuh. Lapisan tanduk dan mantel lemak kulit menjaga kadar air tubuh dengan cara mencegah masuknya air dari luar tubuh dan mencegah penguapan air, selain itu juga berfungsi sebagai barrier terhadap racun dari luar. Mantel asam kulit dapat mencegah pertumbuhan bakteri di kulit.

b. Termoregulasi

Kulit mengatur temperatur tubuh melalui mekanisme dilatasi dan konstriksi pembuluh kapiler dan melalui perspirasi, yang keduanya dipengaruhi saraf otonom. Pusat pengatur temperatur tubuh di hipotalamus. Pada saat temperatur badan menurun terjadi vasokonstriksi, sedangkan pada saat temperatur badan meningkat terjadi vasodilatasi untuk meningkatkan pembuangan panas.

c. Persepsi sensoris

Kulit sangat sensitif terhadap rangsangan dari luar berupa tekanan, raba, suhu dan nyeri. Beberapa reseptor pada kulit untuk mendeteksi rangsangan dari luar diantaranya adalah Benda Meissner, Diskus Merckell dan Korpuskulum Golgi sebagai reseptor raba, Korpuskulum Panici sebagai reseptor tekanan, Korpuskulum Ruffini dan Benda Krauss sebagai reseptor suhu dan Nervus End Plate sebagai reseptor nyeri.


d. Absorpsi

Beberapa bahan dapat diabsorpsi kulit masuk ke dalam tubuh melalui dua jalur yaitu melalui epidermis dan melalui kelenjer sebacea dari folikel rambut. Bahan yang mudah larut dalam lemak lebih mudah diabsorpsi dibandingkan bahan yang larut air.

e. Fungsi Lain

Kulit dapat menggambarkan status emosional seseorang dengan memerah ataupun memucat. Kulit dapat juga mensintesa vitamin D dengan bantuan sinar ultraviolet.

2. Lapisan Kulit



Gambar 2. Struktur Kulit (Setiadi, 2007 : 24-25)

Kulit manusia tersusun atas 3 lapisan utama, dari luar ke dalam yakni epidermis (non-viable dan viable epidermis), dermis, dan endodermis. Ketiga lapisan tersebut berbeda dari segi anatomi, morfologi, senyawa penyusun, sifat dan fungsinya (Isriany, 2013).

a. Epidermis

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang mempunyai ketebalan bervariasi antara 50 μm - 1,5 mm, tersusun dari 15-25 sel. Epidermis terbentuk dari lima lapisan sel epitelial squamosa, diantaranya yang paling umum adalah keratinosit. Keratinosit adalah sel-sel yang bertanggung jawab untuk pembentukan keratin, protein struktural dari kulit, rambut dan kuku. Sel-sel ini diyakini terlibat dalam proses imun dengan pertama kali melepaskan immunoglobulin A dan kemudian interleukin-1, yang memicu pengaktifan sel-sel T (Isriani, 2013).

Lapisan paling luar yang terdiri atas lapisan epitel gepeng. Unsur utamanya adalah sel-sel tanduk (keratinosit) dan sel melanosit. Lapisan epidermis tumbuh terus karena lapisan sel induk yang berada dilapisan bawah bermitosis terus-menerus, sedangkan lapisan paling luar epidermis akan mengelupas dan gugur. Epidermis dibina oleh sel-sel epidermis terutama serat-serat kalogen dan sedikit serat elastis (Harun, 2014).

Epidermis berfungsi sebagai penghalang terpenting dari hilangnya air, elektrolit, dan atau nutrisi tubuh, serta menahan masuknya senyawa asing dari luar. Lapisan epidermis terdiri dari non-viable epidermis dan viable epidermis. Secara anatomi lapisan epidermis terdiri dari 5 lapisan utama yang susunannya lebih dikenal dengan istilah 'strata'. Tersusun dari luar ke dalam berturut-turut; non-viable epidermis yaitu stratum korneum dan viable epidermis yaitu stratum lusidum, stratum granulosum, stratum

spinosum, dan stratum basal (germinativum). Kurang lebih setengah dari keratinosit bergerak dari lapisan sel basal ke atas memulai semua lapisan-lapisan epidermis yang lain. Sambil bergerak melalui lapisan-lapisan, strukturnya berubah dan sel-sel mulai memipih, kehilangan inti, dan akhirnya kering (Isriani, 2013).

b. Dermis

Lapisan ini disebut juga korium, merupakan lapisan kulit yang terletak antara epidermis dan jaringan lemak subkutan. Tebal lapisan sekitar 1-4 mm, tergantung bagian tubuh. Dermis tersusun dari bahan mukopolisakarida. Pada dermis terdapat sel mast dan fibroblast. Sel mast memiliki situs reseptor untuk immunoglobulin E dan mengandung sejumlah senyawa penting, seperti zat yang bereaksi lambat pada proses anafilaksis, prostaglandin E dan histamin. Fibroblast mensintesis komponen penunjang struktural dari kulit (yaitu: serat-serat elastik, kolagen, dan serat retikulum) (Isriani, 2013).

Dermis mengandung jaringan padat dari serabut protein, seperti kolagen, retikulum, dan elastin yang disimpan dalam kelenjar dasar amorf dari mukopolisakarida. Serat elastik diberi nama demikian karena serat inilah yang memberi sifat elastisitas pada kulit. Komponen utama dari serat ini adalah elastin, suatu protein amorf (Isriani, 2013).

Di dalam dermis terdapat adneksa-adneksa (kelenjar) kulit seperti folikel rambut, papilla rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar sebacea, otot penegak rambut, ujung pembuluh darah dan ujung syaraf, juga sebagian serabut lemak yang terdapat pada lapisan lemak bawah kulit (sub kutis atau hipodermis) (Tranggono, 2007: 13)

Fungsi dermis ini terutama melindungi tubuh dari luka, menjadikan epidermis lebih fleksibel, penghalang terhadap infeksi dan sebagai organ penyimpan air. Dalam dermis terdapat kapiler darah, ujung-ujung saraf, pembuluh limfa, kelenjar keringat, folikel rambut, dan kelenjar sebacea (Isriani, 2013).

c. Endodermis (Hipodermis; Subkutan)

Hipodermis adalah lapisan bawah kulit (*fasia superficialis*) yang terdiri atas jaringan pengikat longgar, komponennya serat longgar, elastic, dan sel lemak. Sel-sel lemak membentuk jaringan lemak pada lapisan adipose yang terdapat susunan lapisan subkutan untuk menentukan mobilitas kulit di atasnya, bila terdapat lobules lemak yang merata, hypodermis membentuk bantal lemak yang disebut *pannikulus adipose*. Pada daerah perut, lapisan ini dapat mencapai ketebalan 3 cm. sedangkan pada kelopak mata, penis, dan skortum, lapisan subkutan tidak mengandung lemak. Dalam lapisan hypodermis terdapat anyaman pembuluh arteri, pembuluh vena, dan anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit bawah dermis. Lapisan ini mempunyai ketebalan bervariasi dan mengikat kulit secara longgar terhadap jaringan di bawahnya (syarifuddin, 2009).

D. Jerawat

Jerawat (*acne*) adalah kondisi abnormal kulit akibat gangguan produksi kelenjar minyak (subaceous gland) sehingga menyebabkan produksi minyak berlebih. Kondisi ini memicu terjadinya penyumbatan saluran folikel rambut dan pori-pori kulit (Mumpuni: 2010).

Jerawat (*acne vulgaris*) merupakan penyakit kulit peradangan kronik folikel polisebasea dengan gambaran klinis berupa komedo, papul,

dan nodul pada daerah wajah, bahu, leher, dada punggung bagian atas (Alexander, 2015).

Jerawat adalah penyakit kulit yang biasa terjadi pada usia remaja. Penyakit ini terbatas pada folikel polisebasea, kepala dan badan bagian atas karena kelenjar sebacea di wilayah ini sangat aktif. Apabila folikel polisebasea tersumbat, maka sebum tidak dapat keluar dan terkumpul di dalam folikel sehingga folikel membengkak, dan terjadilah komedo yang merupakan bentuk permulaan dari jerawat. Faktor utama yang terlibat dalam pembentukan jerawat adalah peningkatan produksi sebum, peluruhan keratinosit, pertumbuhan bakteri dan inflamasi. Bakteri yang terlibat dalam perkembangan jerawat antara lain *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus* dan *Staphylococcus epidermidis* (Azrifitria et al, 2010).

Acne merupakan inflamasi yang paling sering terjadi pada kelenjar pilosebaceous yang dikarakteristikan dengan produksi berlebihan sebum dan keberadaan komedo, papul, pustul, dan kista (Rycroft et al. 2010). Inflamasi kronis 10 *acne vulgaris* berpengaruh pada daerah seborrheic, terutama pada dada (15%), wajah (99%), dan punggung (60%). Lesi yang muncul ditandai dengan keberadaan komedo, erupsi papular, erupsi pustular, kista purulen, dan skar (Bergler-Czop et al.2013;Layton 2010).

Pada kulit yang semula dalam kondisi normal, sering kali terjadi penumpukan kotoran dan sel kulit mati karena kurangnya perawatan dan pemeliharaan, khususnya pada kulit yang memiliki tingkat reproduksi minyak yang tinggi. Akibatnya saluran kantung rambut (folikel) menjadi tersumbat menghasilkan komedo. Sel kulit mati dan kotoran yang menumpuk tersebut, kemudian terkena bakteri *acne*, maka timbulah jerawat. Jerawat yang tidak diobati akan mengalami pembengkakan

(membesar dan berwarna kemerahan) disebut papul. Bila peradangan semakin parah, sel darah putih mulai naik ke permukaan kulit dalam bentuk nanah (pus), jerawat tersebut disebut pustule (Mitsui, 1997).

Menurut Adhi Djuanda (2007) menyatakan bahwa *acne vulgaris* adalah penyakit peradangan menahun folikel pilosebacea yang umumnya terjadi pada masa remaja dan dapat sembuh sendiri. Karena hampir setiap orang pernah menderita penyakit ini, maka sering dianggap sebagai kelainan kulit yang timbul secara fisiologis. Kligman mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sama sekali tidak pernah menderita penyakit ini. Penyakit ini memang jarang terdapat pada waktu lahir, namun ada kasus yang terjadi pada masa bayi. Namun baru pada masa remajalah *acne vulgaris* menjadi salah satu masalah. Umumnya terjadi sekitar umur 14-17 tahun pada wanita, 16-19 tahun pada pria dan pada masa itu lesi yang predominan adalah komedo dan papul dan jarang terlihat lesi meradang. Tempat predileksi *acne vulgaris* adalah di muka, bahu, dada bagian atas, dan punggung bagian atas. Lokasi kulit lain, misalnya leher, lengan atas gejalanya salah satunya adalah terdapat komedo.

Jerawat paling banyak terjadi pada bagian wajah, tetapi dapat terjadi pada punggung, dada dan bahu. Di badan, jerawat cenderung terkonsentrasi dekat garis tengah tubuh. Penyakit ini ditandai oleh lesi yang bervariasi, yaitu komedo, dapat berupa komedo terbuka (*blackhead comedones*) yang terjadi akibat oksidasi melanin, atau komedo tertutup (*whitehead comedones*). Lesi inflamasi berupa papul, pustule, hingga nodus dan kista. *Scar* atau jaringan parut dapat menjadi komplikasi *acne* noninflamasi maupun *acne* inflamasi (Movita, 2013).

1. Penyebab terjadinya jerawat

Menurut Kusantati dkk (2008), beberapa faktor penyebab timbulnya masalah- masalah kelainan kulit pada kelenjar palit atau jerawat yaitu:

a. Genetik

Mereka yang orang tuanya berjerawat selagi muda, maka anaknya akan lebih mudah terkena jerawat dibandingkan mereka yang tidak memiliki genetik berjerawat.

b. Umur dan jenis kelamin

Pada umumnya jerawat muncul pada usia pubertas dan remaja (usia 13-19 tahun).

c. Makanan

Secara ilmiah dapat dibuktikan bahwa mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat meningkatkan kadar insulin dalam darah, dimana hal tersebut memicu produksi hormon androgen yang membuat kulit jadi berminyak. Dan kadar minyak yang tinggi dalam kulit merupakan pemicu paling besar terhadap timbulnya jerawat.

d. Gangguan pencernaan makanan

Tidak teraturnya pembuangan kotoran dapat mempengaruhi timbulnya jerawat.

e. Alergi terhadap makanan

Alergi terhadap zat protein, karbohidrat dan lemak dapat menjadikan timbulnya jerawat yang parah.

f. Bakteri

Kemungkinan pada penyebab terjadinya jerawat dalam bersumber dari bakteri pathogen yang dapat menjadi penyebab munculnya

jerawat, diantaranya adalah *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus* dan *Staphylococcus epidermidis*.

g. Mekanis

Kebiasaan memegang atau memencet jerawat menyebabkan jerawat lebih parah, karena luka yang terjadi memungkinkan infeksi dan menyebabkan penyebaran infeksi keseluruh tubuh.

h. Iklim

Iklim yang lembab dan panas dapat menyebabkan kelenjar palit bekerja lebih giat dan dapat memperburuk keadaan jerawat.

2. Tahap terbentuknya jerawat

Menurut Kusantati (2008) tahap terjadinya jerawat, yaitu:

- a) Pada kulit yang semula dalam kondisi normal, sering kali terjadi penumpukan kotoran dan sel kulit mati karena kurangnya perawatan dan pemeliharaan.
- b) Sel kulit mati dan kotoran menumpuk tersebut kemudian terkena bakteri *acne*, maka timbullah jerawat.
- c) Dalam waktu tertentu, jerawat yang tidak terobati akan mengalami pembengkakan (*papula*).
- d) Bila peradangan semakin parah, sel darah putih mulai naik ke permukaan kulit dalam bentuk nanah (*pus*), jerawat tersebut disebut *pastules*.
- e) Bila jerawat mengandung nanah, lemak dan cairan- cairan lain berarti jerawat sudah berada pada kondisi terparah (*cyst*).
- f) Bila *cyst* tidak terawat, maka jaringan kolagen akan mengalami kerusakan sampai pada lapisan dermis, sehingga kulit menjadi bopeng (*scar*).

3. Jenis-jenis jerawat

Jenis-jenis jerawat terbagi menjadi lima jenis, diantaranya:

a. Komedo tertutup (*white-head*)

Komedo tertutup adalah jerawat yang bentuknya seperti tonjolan yang berwarna putih kekuningan. Komedo tertutup merupakan kelainan berupa bintil kecil dengan lubang kecil atau tanpa lubang karena sebum yang biasanya disertai bakteri menumpuk di folikel kulit dan tidak bisa keluar. Komedo tertutup lebih mudah diraba dari pada dilihat. Komedo ini berupa papula yang sangat kecil dengan titik atau penonjolan ditengah, paling banyak terdapat di dahi dan pipi (Graham-brown and Burns, 2005).

b. Komedo terbuka (*black-head*)

Menurut Prianto (2014) Komedo terbuka disebabkan oleh pelebaran dari folikel rambut yang disebabkan oleh sel keratin yang menumpuk disertai minyak dari kelenjar sebum. Warna hitam yang terlihat disebabkan pigmen yang terdapat dalam sel kulit mati tersebut bercampur sejumlah kotoran yang terdapat disekitar lubang atas folikel rambut (pori- pori kulit wajah).

c. *Papula*

Papula adalah jerawat yang berbintik kecil berwarna merah (Graham-brown, 2005). *Papula* terjadi ketika dinding folikel rambut mengalami kerusakan atau pecah sehingga sel darah putih keluar dan terjadi inflamasi di lapisan dalam kulit. *Papula* berbentuk benjolan-benjolan lunak kemerahaan di kulit tanpa memiliki kepala.

d. *Pustule*

Pustule adalah benjolan meradang berisi nanah. *Pustule* terjadi beberapa hari kemudian ketika sel darah putih keluar ke permukaan kulit. *Pustule* berbentuk benjolan merah dengan titik putih atau kuning di tengahnya yang mengandung sel darah putih.

Jenis jerawat yang akan diberi perlakuan yaitu jenis jerawat *pustule* karena jenis ini mengalami pertumbuhan bakteri sangat banyak hingga bernanah. Selain itu, proses penyembuhannya lebih dapat diamati dari pada jenis jerawat lain.

e. *Nodula/Kista*

Semakin bertambahnya peradangan dan semakin bertambah dalamnya peradangan, maka makin bertambah besar jerawat yang dapat dilihat dan diraba yang berakibat pada terbentuknya *nodul/kista* yang sangat dalam (Graham-brown, 2005). *Nodula/Kista* adalah benjolan keras dan besar di bawah kulit. Bila folikel pecah di dasarnya maka terjadi benjolan radang yang besar yang sakit bila disentuh. *Nodula/Kista* biasanya terjadi akibat rangsang peradangan oleh fragmen rambut yang berlangsung lama.

E. Antibiotik

Pada awalnya istilah yang digunakan adalah antibiotis, yang berarti substansi yang dapat menghambat pertumbuhan organisme hidup yang lain, dan berasal dari mikroorganisme. Namun pada perkembangannya, antibiotis ini disebut sebagai antibiotik dan istilah ini tidak hanya terbatas untuk substansi yang berasal dari mikroorganisme, melainkan semua substansi yang diketahui memiliki kemampuan untuk menghalangi pertumbuhan organisme lain khususnya mikroorganisme. Dalam penemuan dan perkembangan antibiotik selanjutnya, dibedakan antara

antibiotic terhadap sel prokariotik (bakteri) dan antibiotik terhadap sel eukariotik (fungi, protozoa, cacing) (Sylvia, 2008).

Aplikasi antibiotik tidak hanya terbatas untuk kemoterapi. Beberapa aplikasi antibiotik lainnya adalah antibiotik antitumor (agen sitostatik), antibiotik untuk patologi tanaman, antibiotik sebagai bahan tambahan makanan, antibiotik dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan (Sylvia, 2008).

Antibiotik diklasifikasikan menjadi bakteriostatik dan bakterisidal. Obat-obat bakteriostatik menghambat pertumbuhan dan replikasi bakteri pada kadar tertentu dalam serum pasien sehingga penyebaran infeksi terhambat, dengan demikian sistem imun tubuh dapat menyerang, memusnahkan, dan mengeliminasi bakteri pathogen. Jika obat dieliminasi sebelum sistem imun membunuh bakteri, bakteri dapat terus hidup dan memulai siklus infeksi sekunder. Obat-obat bakterisidal membunuh bakteri pada kadar tertentu dalam serum pasien dan karena aksi antibiotik bakterisidal lebih cepat, obat ini merupakan obat pasien yang menderita infeksi serius (Maksum, 2014).

F. Uji antimikroba

1. Metode difusi

a. *Metode disc diffusion* (tes Kirby & Baurer)

Merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan aktivitas agen mikroba dengan cara meletakkan piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan media agar (Sylvia, 2008).

b. *Ditch-plate technique*

Pada metode ini sampel uji berupa agen antimikroba yang diletakkan pada parit yang dibuat dengan cara memotong media agar dalam cawan petri pada bagian tengah secara membujur dan mikroba uji (maksimum 6 macam) digoreskan ke arah parit yang berisi agen antimikroba (Sylvia, 2008).

c. *Cup-plate technique*

Metode ini serupa dengan metode disc diffusion, dimana dibuat sumur pada media agar yang telah ditanami dengan mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi agen antimikroba yang akan diuji (Sylvia, 2008).

2. Metode dilusi

a) Metode dilusi cair (*broth dilution*)

Metode ini mengukur MIC (*minimum inhibitory concentration* atau kadar hambat minimum, KHM) dan MBC (*minimum bactericidal concentration* atau kadar bunuh minimum, KBM). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan diinkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah diinkubasi ditetapkan sebagai KBM (Sylvia, 2008). \

b) Metode dilusi padat (*solid dilution test*)

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan media padat (solid). Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji (Sylvia, 2008).

Diameter zona hambat yang terbentuk dapat digolongkan sebagai berikut (Cut, 2009):

Tabel 1. Kategori daya hambat bakteri menurut Davis stout (1971)

Diameter zona hambat	Respon hambat pertumbuhan
< 5 mm	Lemah
5-10 mm	Sedang
10-20 mm	Kuat
>20 mm	Sangat kuat

G. Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dari massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Ditjen POM, 2000).

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman, simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh bagian hewan atau zat yang dihasilkan hewan yang masih belum berupa zat kimia murni, sedangkan

simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari bumi, baik telah diolah ataupun belum, tidak berupa zat kimia murni (POM, 1979).

Ekstraksi (penyarian) adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang disari, mengandung zat aktif yang dapat larut dan zat yang tidak larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain (Harborne, J.B., 1987: 7).

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 1995: 7).

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus menjadi serbuk (Ditjen POM, 1979:9).

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu (Ditjen POM, 2000).

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya (Sarker SD, dkk., 2006):

1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui
2. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme

3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara struktural.

Menurut Ditjen POM (2000), beberapa metode ekstraksi:

- a. Cara Dingin

- 1) Maserasi

Maserasi berasal dari kata “*macerare*” artinya melunakkan. Maserasi merupakan proses penyarian yang sederhana dan banyak digunakan untuk menyari bahan obat yang berupa serbuk simplisia yang halus. Simplisia ini direndam dalam penyari sampai meresap dan melemahkan susunan sel sehingga zat-zatnya akan terlarut, serbuk simplisia yang akan disari ditempatkan pada wadah bejana bermulut besar, ditutup rapat kemudian diaduk berulang-ulang, sehingga memungkinkan pelarut masuk ke seluruh permukaan serbuk simplisia (Ansel, 1989). Maserat adalah hasil penarikan simplisia dengan cara maserasi (Syamsuni, 2006). Remaserasi merupakan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Ditjen POM, 2000). Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Keuntungan dari metode maserasi yaitu prosedur dan peralatannya sederhana (Agoes, 2007).

- 2) Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan sempurna (*Exhaustiva extraction*) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Prinsip perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat seperti berpori. Proses terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetasan/penampungan

ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Ditjen POM, 2000).

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Agoes, 2007).

b. Cara Panas

1) Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Ditjen POM, 2000).

Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Kerugian dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Seidel, 2006).

2) Soxhlet

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin

balik (Ditjen POM, 2000). Caranya, serbuk bahan ditempatkan pada selongsong dengan pembungkus kertas saring, lalu ditempatkan pada alat soxklet yang telah dipasang labu dibawahnya. Tambahkan pelarut sebanyak 2 kali sirkulasi. Pasang pendingin balik, panaskan labu, ekstraksi berlangsung minimal 3 jam dengan interval sirkulasi kira-kira 15 menit (Atun, 2014).

Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang kontinu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih (Seidel, 2006).

3) Destilasi uap

Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Seidel, 2006).

4) Dekoksi

Dekok adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur 90°C selama 30 menit. 5. Sokletasi Sokletasi adalah metode ekstraksi untuk bahan yang tahan pemanasan dengan cara meletakkan bahan yang akan diekstraksi dalam sebuah kantung ekstraksi (kertas kering) didalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinu (Voight, 1995; 570).

Dekoksi merupakan proses ekstraksi yang mirip dengan infusasi, hanya saja infus yang dibuat membutuhkan waktu lebih lama (≥ 30 menit)

dan suhu pelarut sama dengan titik didih air. Caranya, serbuk bahan ditambah air dengan rasio 1:10, panaskan dalam panci enamel atau panci stainless steel selama 30 menit. Bahan sesekali diaduk. Saring pada kondisi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas sehingga diperoleh volume yang diinginkan (Atun, 2014).

5) Infusa

Infusa merupakan metode ekstraksi dengan pelarut air. Pada waktu proses infusdasi berlangsung, temperatur pelarut air harus mencapai suhu 90°C selama 15 menit. Rasio berat bahan dan air adalah 1 : 10, artinya jika berat bahan 100 gr maka volume air sebagai pelarut adalah 1000 ml. Cara yang biasa dilakukan adalah serbuk bahan dipanaskan dalam panci dengan air secukupnya selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai 90°C sambil sekali-sekali diaduk. Saring selagi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume yang diinginkan. Apabila bahan mengandung minyak atsiri, penyaringan dilakukan setelah dingin (Atun, 2014).

H. Tinjauan Islam tentang Tumbuhan

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan, dimana segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah SWT memiliki fungsi sehingga di hamparkan di muka bumi ini. Salah satu fungsinya adalah sebagai bahan dalam proses pengobatan suatu penyakit. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.

Hingga saat ini bahan alam khususnya tumbuhan telah banyak diteliti oleh para ahli untuk dikembangkan menjadi suatu bahan obat, mengingat

bahwa negara Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah dalam pengobatan yang biasa dikenal dengan obat tradisional.

Aisyah -*radhiallahu 'anha*- berkata:

" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْبَطِيخَ بِالرُّطْبِ فَيَقُولُ: نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا
بِبَرْدِ هَذَا، وَبَرْدَ هَذَا بِحَرِّ هَذَا "

Artinya:

"Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah makan semangka dengan kurma segar. Kemudian beliau bersabda: "Kita menghilangkan panas ini dengan dinginnya ini, dan dingin ini dengan panas ini." [HR. Abu Daud 3822 dan Ar-Tirmidzi 1843]

Hadist diatas menjelaskan bahwasanya buah semangka merupakan salah satu buah yang dapat dikonsumsi selain untuk menyegarkan yang dapat memberi manfaat yang banyak bagi tubuh.

Pengobatan dengan mencari saripati tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dan berkembang di sekitar kita sebagai bentuk upaya pencarian fungsi dan pendayagunaan dari tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah SWT. Hingga saat ini sudah banyak pengobatan herbal dan pencarian tumbuh-tumbuhan sebagai bahan utama dalam pembuatan obat-obatan. Namun dalam pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan obat, kita tetap memperhatikan kehalalan dari bahan obat tersebut. Dikarenakan sesuatu yang baik belum tentu halal namun sesuatu yang halal dapat dipastikan merupakan sesuatu yang baik.

Seperti dalam Firman Allah dalam Q.S. *Al-Baqarah/22* : 168

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ٢٢)

Terjemahnya:

(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. karena itu janganlah kamu mengadakan tanding-tandingan bagi Allah, pada hal kamu mengetahui (Al-Qur'an dan terjemahannya).

Ayat diatas menjelaskan bahwa bumi disiapkan Allah untuk semua manusia dan di bumi ini telah ditumbuhkan berbagai jenis tumbuhan. Didalam alqur'an juga disebutkan beberapa nama buah yang memiliki keutamaan dan bermanfaat bagi seluruh tubuh kita. Misalnya buah anggur, kurma, delima, zaitun, buah tiin, buah pisang dan lain-lain.

Tafsiran-tafsiran ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai manusia sangat penting untuk memperhatikan alam yang ada, khususnya tumbuh-tumbuhan. Dengan memperhatikan tumbuh-tumbuhan, maka dapat dipahami tanda-tanda kekuasaan Allah subhānahu wata'āla. Kemudian harus disadari bahwa tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah subhānahu wata'āla tentunya memiliki banyak manfaat bagi manusia, sehingga selain mengamati secara sederhana, hendaknya dilakukan pengembangan terhadap pengamatan-pengamatan dari tumbuh-tumbuhan. Salah satunya dengan meneliti manfaat tumbuh-tumbuhan dalam meningkatkan kesehatan manusia, sehingga hal itu menimbulkan rasa syukur dan semakin yakin akan tanda-tanda kekuasaan Allah subhānahu wata'āla.

Penyakit merupakan suatu musibah dan ujian yang ditetapkan oleh Allah SWT atas hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya musibah itu bermanfaat

bagi manusia, dan Allah menjadikan sakit yang menimpa mereka sebagai penghapus dosa dan kesalahan mereka.

Selain itu, Allah subhānahu wata'āla juga berfirman dalam QS Asy-Syu'arā'/26: 80.

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿الشعراء : ٨٠﴾

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku”.

Berdasarkan kitab Tafsir al-Mishbah (2002), dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut, kegiatan yang menjadikan aku sakit, maka hanya Dia pula Yang menyembuhkan aku sehingga kesehatanku kembali pulih (Shihab, 2002, 9: 256).

Perlu dicatat juga bahwa penyembuhan, bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Hal ini banyak dijelaskan dalam berbagai hadits Nabi Muhammad *shallallāhu 'alaihi wasallam* yang memerintahkan untuk berobat (Shihab, 2002, 9: 259).

Ayat tersebut di atas menjelaskan kepada kita untuk terus berusaha dan yang menentukan hasilnya adalah Allah subhānahu wata'āla. Seperti halnya dalam dunia kesehatan, jika kita diserang oleh suatu penyakit, maka dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu dengan menggunakan obat tradisional maupun obat sintetik karena berobat merupakan salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesembuhan.

Allah subhānahu wata'āla. menciptakan tumbuhan dan menumbuhkannya di bumi tak lain untuk kebaikan bagi manusia karena banyak tumbuhan yang memberikan banyak manfaat bagi manusia. Untuk itu pentingnya ilmu pengetahuan dalam hal ini. Sehingga pengolahan dan pemanfaatan tanaman termasuk Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana*

L.Wiild) ini dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan tuntutan Islam.

Terkait dengan istilah di atas, secara umum dapat ditemukan dalilnya pada hadist Nabi yang berbicara tentang penyakit dan obat, sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami arun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; telah mengabarkan kepadaku 'Amru, yaitu Ibnu al-Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Beliau bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

”Setiap penyakit ada obatnya, Apabila didapat obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka penyakit itu akan hilang dengan seizin Allah azza wa jalla” (HR. Muslim, hadis no. 4084).

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah subhānahu wata'āla ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah subhānahu wata'āla yang menyembuhkannya, akan tetapi Allah subhānahu wata'āla menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mempermudah penyembuhannya.

Bersumber dari beberapa ayat dan hadist diatas dapat kita ketahui bersama bahwa Allah subhānahu wata'āla telah memperlihatkan kekuasaannya sebagai pencipta Alam dan seluruh isinya sehingga bagaimanapun kecerdasan manusia melakukan pengobatan dan rekayasa genetik belum mampu melewati ketentuan-ketentuan Sang Pencipta, sebab Allah subhānahu wata'āla yang mengetahui manusia dan apa yang ada di langit dan di bumi secara mendetail, sehingga dengan ayat dan hadist ini

sebagai seorang hamba yang mempelajari ilmu pengobatan agar senantiasa bersyukur dan tidak mengkufurinya serta mengharap ridho-Nya semoga apa yang telah diusahakan oleh manusia mampu menjadi obat yang dapat menyembuhkan manusia dengan izin dan kekuasaan Sang Pencipta sebab segala sesuatunya apa yang ada akan kembali kepada-Nya.



BAB III

METODE KERJA

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia dan Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan direncanakan pada Juni 2022 – Agustus 2022.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis kearah penelitian kuantitatif dengan metode ekperimental laboratorium.

C. Alat dan Bahan

1. Alat yang digunakan

Alat setrifuge, aluminium foil, autoklaf, batang pengaduk, beaker gelas 250 ml, cawan porselin, cawan petri, corong, Erlenmeyer 250 ml, gelas ukur 10 ml dan 100 ml, hanskon, inkubator, jangka sorong, kapas, kertas saring, kompor gas, labu tentukur 10 ml dan 5 ml, lampu spiritus, Laminar Air Flow (LAF), lemari pengering, lumpang alu, mangkuk, ose bulat, oven, pinset, spoit 10 ml, pipet mikro 1000 mikro liter, rotary evaporator, tabung reaksi, tabung sentrifuge 15 ml, timbangan analitik, toples kaca 4L dan vial.

2. Bahan yang digunakan

Air suling, asam asetat anhidrat, biakan murni bakteri *Propionibacterium acne*, clindamycin, dimetil sulfoksida (DMSO), metanol, etanol 70%, FeCl₃, Glukosa, H₂SO₄, HCl, medium Nutrien Agar (NA), NaCl 0,9%, N- heksan, pereaksi Dragendorff, pereaksi Mayer dan pita logam Mg.

D. Prosedur Kerja

1. Preparasi Sampel

a. Pengambilan sampel

Sampel berupa kulit semangka kuning diambil di Kabupaten Maros, Sulawesi-Selatan.

b. Pengolahan sampel

Sampel buah semangka kuning yang telah diambil, dibelah dan diambil bagian kulitnya, di cuci dengan air lalu diiris tipis kemudian dikeringkan di lemari pengering kurang lebih 5 hari.

2. Ekstraksi sampel

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi. Sampel kulit semangka kuning yang telah kering ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan pelarut metanol hingga terendam seluruhnya. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 3 x 24 jam di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Filtrat metanol yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyaringnya dengan rotary evaporator pada suhu 50°C sampai diperoleh ekstrak metanol kental. Selanjutnya dilakukan uji bebas metanol

dengan cara menimbang ekstrak yang dipanaskan dan ekstrak yang telah didinginkan, jika berat ekstrak tersebut sama maka dinyatakan ekstrak tersebut telah bebas dari metanol (Endarini, 2016).

3. Partisi

Sebanyak 36 gram ekstrak metanol kulit buah semangka kuning dimasukkan ke dalam lumpang kemudian dilarutkan dengan pelarut N-heksan 2430 ml secara perlahan-lahan. Kemudian ekstrak digerus lalu bagian yang larut n-heksan dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge, selanjutnya dimasukkan kedalam alat sentrifuge dan di sentrifuge selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian ekstrak yang larut n-heksan dipisahkan, diambil bagian endapan pada tabung sentrifuge. kemudian dilakukan kembali proses partisi dengan menggunakan pelarut etanol 70%. Ekstrak digerus lalu bagian yang larut etanol 70% dimasukkan kedalam tabung sentrifuge, selanjutnya dimasukkan kedalam alat sentrifuge dan di sentrifuge selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian ekstrak yang larut etanol 70% dipisahkan, diambil bagian endapan pada tabung kemudian dilakukan kembali proses partisi hingga diperoleh larutan bening atau tidak berwarna. Setelah itu diuapkan ekstrak larut n-heksan dan ekstrak larut etanol 70% dengan cara diangin-anginkan hingga diperoleh ekstrak kental (Endarini, 2016).

4. Identifikasi Golongan Kimia

a. Uji alkaloid

Ekstrak ditimbang 0,5 gram, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, dilarutkan dalam HCl, kemudia ditambahkan 2-3 tetes pereaksi

Dragendorff (larutan potassium bismuth iodide), jika terdapat endapan merah maka positif adanya alkaloid. Kemudian ditambahkan dengan 2-3 tetes pereaksi Mayer (larutan potassium merkuri iodida) menghasilkan endapan kuning maka positif mengandung senyawa alkaloid (Julianto, 2019).

b. Uji Flavanoid

ekstrak ditimbang sebanyak 0,5 gram ditambahkan dengan etanol 70%, kemudian ditambahkan 5-6 tetes HCl pekat dan ditambahkan 3-4 pita logam Mg jika membentuk warna merah menunjukkan adanya flavonoid dan pembentukan warna orange menandakan adanya senyawa flavon (Endarini, 2016).

c. Uji Saponin

Ditimbang 0,5 gram ekstrak, lalu ditambahkan dengan air hangat sampai semua bagian ekstrak terendam kemudian dikocok kuat-kuat. Jika terdapat busa busa didiamkan selama 10 menit. Kemudian ditambahkan 1-3 tetes HCl 1% jika busa tetap bertahan maka positif mengandung saponin (Julianto, 2019).

d. Uji Tanin

Ekstrak sebanyak 0,5 gram ditambahkan 3 ml air hangat. Ditetaskan dengan FeCl_3 1%, jika berwarna biru tinta positif (Endarini, 2016).

e. Uji fenol

Sebanyak 0,5 gram ekstrak ditimbang dan dilarutkan dengan air hangat sebanyak 3 ml kemudian ditetesi dengan FeCl_3 2-3 tetes jika hasil positif ditunjukkan dengan warna biru atau hijau (Julianto, 2019).

f. Uji terpenoid

Sebanyak 0,5 gram ekstrak ditimbang dan dilarutkan dalam 1 ml n-heksana, kemudian ditambah dengan 0,5 ml asam asetat anhidrat. Campuran tersebut ditetesi dengan 2 ml H₂SO₄ pekat melalui dinding tabung. Adanya senyawa golongan terpenoid akan di tandai dengan tumbuhnya warna merah (Endarini, 2016).

5. Sterilisasi

Dicuci alat-alat kaca dengan detergen, dibersihkan dengan direndam air panas selama 15, dicuci dengan pembilasan pertama HCl 0,1 %, dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka, setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi, gelas ukur gelas, Erlenmeyer dan labu tentukur terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180⁰C selama 2 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121⁰C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar (Yusmaniar.2017).

6. Pembuatan medium

a. Medium Glukosa Nutrient Agar (GNA), komposisi :

Glukosa	10 gram
Ekstrak daging	5 gram
Pepton	10 gram
Nacl	2,5 gram
Agar	15 gram
Air suling ad	1000 ml

Cara pembuatan :

Dibuat dengan menimbang 5,6 gram medium Nutrien Agar dan 1 gram glukosa. Lalu di larutkan dengan aquadest sebanyak 200 ml, setelah di larutkan disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 20 menit.

7. Pengujian aktivitas antimikroba

a. Peremajaan bakteri uji

Diambil *Propionibacterium acnes* yaitu bakteri penyebab jerawat satu ose dari biakan murni kemudian diinokulasi pada medium Natrium Agar miring, lalu diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam (Yusmaniar, 2017).

b. Pembuatan suspensi bakteri

Bakteri yang telah di inkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C, kemudian di ambil dengan menggunakan ose dan di suspensikan kedalam tabung reaksi yang berisi 10 ml NaCl fisiologi 0,9% lalu di kocok hingga homogen dan dilihat tingkat kekeruhannya yang menandai bahwa terdapat pertumbuhan bakteri yang di mana tingkat kekeruhannya di setarakan dengan Mc. Farland.

c. Pembuatan konsentrasi larutan uji

Ditimbang sebanyak 10 mg ekstrak kemudian di larutkan dalam 10 ml air suling dan di dapatkan larutan stok 1.000 ppm. Kemudian diencerkan sebanyak 250 ppm, 500 ppm, dan 750 .ppm lalu masing- masing dimasukkan ke dalam labu tentukur.

d. Pengujian aktivitas daya hambat

Uji ini dilakukan dengan metode difusi cakram dengan menginjeksikan medium GNA ke dalam cawan petri yang telah

disterilkan, kemudian medium GNA yang telah dingin atau memadat di tanami bakteri dengan cara memasukan suspensi bakteri *Propionibacterium acne* kedalam cawan petri, lalu diratakan di permukaan medium dengan menggunakan spreader, kemudian *paper disk* yang telah dijenuhkan dengan sampel pada konsentrasi 250, 500, 750, dan 1.000 ppm dengan kontrol positif Clindamicin, kontrol negative *DMSO*, diletakkan diatas medium yang telah di tanami bakteri uji. Kemudian diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37⁰ C, lalu diamati zona hambat yang terbentuk (Yusmaniar, 2017).

e. Pengukuran zona hambat

Pengukuran ini dilakukan menggunakan jangka sorong dengan satuan induk cm dan satuan nonius dalam mm, dengan cara mengukur luas zona hambat pada diameter zona bening disekitar *paper disk* (Yusmaniar., 2017).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil ekstraksi kulit buah semangka kuning

Penelitian yang dilakukan menggunakan kulit buah semangka kuning yang kemudian dikeringkan, diperoleh simplisia kulit buah semangka sebanyak 500 gram. Sebanyak 500 gram simplisia kulit buah semangka di ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi menggunakan larutan penyari Metanol sebanyak 6 Liter, diperoleh ekstrak kental sebanyak 50.06 gram.

Tabel 2. Hasil Ekstraksi Simplisia Kulit Buah Semangka Kuning Dengan Metode Maserasi

Berat simplisia kering yang diekstraksi	Jenis ekstrak	Berat ekstrak	% rendamen
500 gram	Ekstrak kental Metanol	50.06 gram	10,01%

2. Hasil Partisi Ekstrak Kulit Buah Semangka Kuning

Ekstrak metanol kulit buah semangka kuning yang diperoleh kemudian dipisahkan kembali dengan metode partisi cair padat, dengan menggunakan pelarut N-heksan dan Etanol 70%.

Tabel 3. Hasil Partisi Ekstrak Kulit Buah Semangka Kuning

No	Berat ekstrak yang di partisi	Jenis pelarut	Jenis ekstrak	Berat ekstrak	% Rendamen
1	36,35 gram	N-heksan	Ekstrak larut N-heksan	8,4 gram	23,10%
2	26,25 gram	Etanol 70%	Ekstrak tidak larut N-Heksan	13,3 gram	50,66%

3. Hasil Uji Identifikasi Golongan Senyawa

Hasil ekstrak metanol kulit buah semangka kuning kemudian diuji golongan senyawa kimianya untuk mengetahui kandungan – kandungan senyawa yang ada didalam kulit buah semangka kuning.

Tabel 4. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Ekstrak Metanol Kulit Buah Semangka Kuning

No.	Golongan Senyawa	Hasil
1	Alkaloid	+
2	Flavonoid	-
3	Saponin	+
4	Fenol	-
5	Tanin	-
6	Terpenoid	+

Keterangan : (+) Terdapat golongan senyawa tertentu

(-) Tidak terdapat golongan senyawa tertentu

4. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan menggunakan sampel ekstrak metanol kulit buah semangka kuning, ekstrak larut N-Heksan dan ekstrak tidak larut N-Heksan.

Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak metanol kulit buah semangka kuning, ekstrak larut N-Heksan dan ekstrak tidak larut N-Heksan dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Ekstrak metanol kulit buah semangka kuning

Tabel 5. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak metanol kulit buah semangka kuning

No	Konsentrasi (ppm)	Diameter zona hambat (mm)			Rata-rata	Kategori	Literatur
		Replikasi					
		1	2	3			
1	1.000	15,64	15,9	15,5	15,68	Kuat	Davis stout (1971)
2	750	14,14	15,5	14,02	14,55	Kuat	Davis stout (1971)
3	500	13,68	13,14	14,38	13,73	Kuat	Davis stout (1971)
4	250	12,36	9,72	11,76	11,28	Kuat	Davis stout (1971)
5	Kontrol positif (Clindamycin)	20,76			20,76	Sangat kuat	Davis stout (1971)
6	Kontrol negatif (DMSO)	-			-	-	-

b. Ekstrak Larut N-Heksan

Tabel 6. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Dengan Ekstrak larut N-Heksan

No	Konsentrasi (Ppm)	Diameter zona hambat (mm)				Kategori	Literatur
		Replikasi			Rata-rata		
		1	2	3			
1	1.000	13,62	12,8	14	13,47	Kuat	Davis stout (1971)
2	750	11,7	11,78	12,76	12,08	Kuat	Davis stout (1971)
3	500	9,22	10,9	10,34	10,15	Kuat	Davis stout (1971)
4	250	9,04	9,92	8,54	9,16	Sedang	Davis stout (1971)
5	Kontrol positif (Clindamycin)	20,76			20,76	Sangat kuat	Davis stout (1971)
6	Kontrol negatif (DMSO)	-			-	-	-

c. Ekstrak Tidak Larut N-Heksan

Tabel 7. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Dengan Ekstrak Tidak Larut N-Heksan

No	Konsentrasi (Ppm)	Diameter zona hambat (mm)				kategori	Literatur
		Replikasi			Rata-rata		
		1	2	3			
1	1.000	17,2	17,92	16,1	17,07	Kuat	Davis stout (1971)
2	750	16,14	16,34	15,88	16,12	Kuat	Davis stout (1971)
3	500	14,88	15,98	12,58	14,48	Kuat	Davis stout (1971)
4	250	12,3	12	11,62	11,97	Kuat	Davis stout (1971)
5	Kontrol positif (Clindamycin)	20,76			20,76	Sangat kuat	Davis stout (1971)
6	Kontrol negatif (DMSO)	-			-	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada zona hambat

B. Pembahasan

Jerawat adalah suatu keadaan dimana pori-pori kulit tersumbat sehingga timbul bruntusan (bintik merah) dan abses (kantong nanah) yang meradang dan terinfeksi pada kulit. Jerawat sering terjadi pada kulit wajah, leher dan punggung. Baik laki-laki maupun perempuan (Susanto & Made, 2013). Jerawat dapat disebabkan oleh aktivitas kelenjar minyak yang berlebihan dan diperburuk oleh infeksi bakteri. Bakteri penyebab jerawat terdiri dari *Propionibacterium acnes* (Suryana et al., 2017).

Dalam penelitian ini digunakan sampel kulit buah semangka kuning karena berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa semangka kuning memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pengujian dengan menggunakan salah satu bagian dari buah semangka kuning yaitu bagian kulit buah semangka kuning untuk dilakukan pengujian daya hambat pada bakteri *Propionibacterium acnes*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ekstrak metanol kulit buah semangka kuning. Penggunaan metanol sebagai pelarut karena metanol termasuk dalam pelarut polar, dimana senyawa yang ingin di Tarik yaitu senyawa alkaloid dan saponin yang juga termasuk senyawa polar. Serta ekstrak larut N-Heksan dan ekstrak tidak larut N-Heksan. Penggunaan pelarut n-heksan pada partisi agar senyawa yang bersifat non polar dalam ekstrak methanol akan terdistribusi, karena pelarut n-heksan merupakan pelarut non polar dimana n-heksan merupakan pelarut yang baik jika digunakan untuk megekstrak senyawa yang sifatnya non polar. Buah semangka kuning ini diperoleh dari kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kemudian dipisahkan bagian buah berwarna kuning dan kulit buah berwarna putih, setelah itu dipotong dan diparut hingga menjadi bagian yang kecil dan tipis, dikeringkan

dalam lemari pengering dilaboratorium Fitokimia, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Identifikasi golongan senyawa dilakukan untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak metanol kulit buah semangka kuning sehingga dapat diketahui senyawa apa yang dapat berpotensi sebagai antibakteri, dan pada identifikasi ini dilakukan uji golongan Fenol, alkaloid, saponin, tannin, terpenoid dan flavonoid. Namun yang positif terkandung pada ekstrak kulit buah semangka ini hanya pada golongan senyawa alkaloid, saponin dan terpenoid. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Okafor, et.al (2015) kulit buah semangka mengandung senyawa alkaloid, fenol, saponin, flavonoid, triterpenoid dan steroid.

Pada uji aktivitas antibakteri metode yang digunakan adalah difusi cakram. Hasil daya uji antibakteri didasarkan pada pengukuran Diameter Daerah Hambat (DDH) atau zona bening yang terbentuk disekitar bakteri yang digunakan, sebelumnya dilakukan peremajaan terlebih dahulu untuk meregenerasi bakteri agar yang yang diperoleh bakteri yang muda dan tidak terkontaminasi.

Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan, dimana ekstrak metanol kulit buah semangka kuning memiliki aktivitas antibakteri terhadap *Propionibacterium acne* sebagai bakteri penyebab jerawat, aktivitas antibakteri terlihat pada semua konsentrasi ekstrak metanol yang berada pada range 10-20 mm. Berdasarkan kategori daya hambat antibakteri menurut (Davits Scout: 1971) ekstrak methanol kulit buah semangka kuning termasuk dalam kategori penghambatan kuat dimana ekstrak methanol kulit buah semangka kuning masuk dalam range 10-20mm.

Pada ekstrak partisi larut N-Heksan pada konsentrasi 1000 ppm, 750 ppm, 500 ppm berada pada range 10-20 mm yang dimana berdasarkan kategori daya hambat antibakteri menurut (Davits Scout: 1971) ekstrak partisi larut N-Heksan termasuk dalam kategori penghambatan kuat dimana ekstrak partisi larut N-Heksan dengan konsentrasi 1000 ppm, 750 ppm, dan 500 ppm masuk dalam range 10-20mm, dan untuk konsentrasi 250 ppm memiliki rata-rata diameter yang berada pada range 5-10 mm yang berarti termasuk dalam kategori penghambatan sedang dimana ekstrak partisi larut N-Heksan dengan konsentrasi 250 masuk dalam range 10-20mm (Davits Scout: 1971).

Sedangkan pada ekstrak partisi tidak larut N-Heksan dengan konsentrasi yang sama memiliki nilai rata-rata tertinggi dibandingkan ekstrak lainnya. Pada ekstrak partisi tidak larut N-Heksan untuk semua konsentrasi berada pada range 10-20 mm. Berdasarkan kategori daya hambat antibakteri menurut (Davits Scout: 1971) ekstrak partisi tidak larut N-Heksan termasuk dalam kategori penghambatan kuat dimana ekstrak partisi tidak larut N-Heksan masuk dalam range 10-20mm.

Sedangkan untuk kontrol positif yaitu antibiotik clindamisin dengan diameter zona hambat 20,76 mm yang menunjukkan zona hambat yang maksimal. Dan untuk kontrol negatif DMSO tidak menunjukkan adanya zona hambat disekitar *paper disk*. Berdasarkan kategori daya hambat antibakteri menurut (Davits Scout: 1971) kontrol positif clindamycin termasuk dalam kategori sangat kuat dimana control positif masuk dalam range >20mm.

Berdasarkan hasil zona hambat yang diperoleh dalam penelitian hal ini sejalan dengan hasil identifikasi golongan senyawa, dimana senyawa-senyawa yang dikandung dalam ekstrak kulit buah semangka kuning memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Menurut Robinson dalam Pradana (2013)

menyebutkan alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri, dimana mekanisme penghambatan bakteri oleh senyawa ini dengan mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut.

Selain itu, menurut Prasetyo (2008) menyatakan bahwa saponin merupakan senyawa metabolik sekunder yang berfungsi sebagai antiseptic sehingga memiliki kemampuan antibakteri. Adanya zat antibakteri tersebut akan menghalangi pembentukan atau pengangkutan masing-masing komponen ke dinding sel yang mengakibatkan lemahnya struktur disertai dengan penghilangan dinding sel dan pelepasan isi sel yang akhirnya akan mematikan maupun menghambat pertumbuhan sel bakteri tersebut.

Serta menurut Retnowati (2011) mekanisme kerja senyawa terpenoid sebagai zat antibakteri dengan melibatkan kerusakan membran oleh senyawa lipofilik. Terpenoid dapat bereaksi dengan porin (protein transmembran) pada membrane luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan polimer yang kuat dan merusak porin, mengurangi permeabilitas dinding sel bakteri sehingga sel bakteri kekurangan nutrisi, pertumbuhan bakteri terhambat atau mati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ekstrak Metanol, ekstrak larut n-heksan dan ekstrak tidak larut n-heksan kulit buah semangka kuning (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum & Nakai) memiliki aktivitas terhadap bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acne*.
2. Konsentrasi optimum ekstrak metanol kulit buah semangka kuning (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum & Nakai) yang dapat memberikan aktivitas antibakteri terhadap *Propionibacterium acne* ialah pada konsentrasi 250 ppm dengan kategori daya hambat kuat, untuk ekstrak larut n-heksan konsentrasi optimum berada pada konsentrasi 500 ppm, dengan kategori daya hambat kuat. Sedangkan pada ekstrak tidak larut n-heksan konsentrasi optimum ialah pada konsentrasi 250 ppm, dengan kategori daya hambat kuat.
3. Golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak metanol kulit buah semangka kuning (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum & Nakai) adalah alkaloid, saponin dan terpenoid.

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap simplisia kulit buah semangka kuning dengan menggunakan jenis pelarut yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Djuanda. *Ilmu penyakit kulit dan kelamin, edisi kelima*. Balai penerbit FKUI: Jakarta. 2007
- Agoes, G. *Teknologi Bahan Alam*. Bandung: ITB Press, 2007.
- Ansel, H.C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi, Edisi IV*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1989
- Atun, Sri. *Metode Isolasi dan Identifikasi Struktur Senyawa Organik Bahan Alam*. Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur. Volume 8 No.2, 2014.
- Azrifitria, Syaikhul aziz dan Chairul. *Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanolik Daun dan Umbi Crinum asiaticum L. Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat*. Majalah Farmasi Indonesia; Jakarta. 2010
- Barus, A. dan Syukri. *Agroteknologi tanaman buah-buahan*. USU-Press: Medan. 2008
- Cut Xiaodong Pan, dkk. *The Acid, Bile Tolerance and Antimicrobial Property of Lactobacillus acidophilus NIT*. Jurnal Zhejiang University, Hangzhou, China, 2009
- Dalimartha, S. *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia jilid 3*. Puspa Swara: Jakarta. 2003
- Davis, W. W. dan T. R. Stout. *Disc Plate Methods Of Microbiological Antibiotic Assay*. Microbiology 22: 659-665. 1971
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit JART, 2010.
- Deshmukh, C.D., Jain, A. & Tambe, M.S., . *Phytochemical and Pharmacological Profile of Citrullus lanatus (THUNB)*. *Biolife an International Quarterly Journal of Biology & Life Sciences*, 3(2), pp.483-88. 2015
- Ditjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Deprtemen Kesehatan RI. 1979.
- Ditjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Deprtemen Kesehatan RI. 1995.

- Ditjen POM. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2000.
- Endarini, Lully Hanni. *Farmakognosi dan Fitokimia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016
- Garrity, G.M, Bell. J. A, and Lilburn. *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey's Manual of Systematic Bacteriology*, 2th Edition, United States of America, Spinger, New York Berlin Handelberg. 2004
- Gritter, R.J Bobbit J.M dan Swharting, A.E. *Pengantar Kromatografi Edisi II*. Penerbit ITB : Jakarta, 1991
- Harborne. *Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*, diterjemahkan oleh Kosasih Padmawinata & Iwang Soediro. Terbitan kedua. Bandung: Penerbit ITB. 1987.
- Hariana, arif. *Tumbuhan obat dan khasiatnya*. Penebar swadaya: Jakarta. 2006
- Hariana arif. *Tanaman obat dan Khasiatnya seri 3 edisi 1*. Penebar swadaya: Jakarta. 2009
- Harith, S.S., Mazlun, M.H., Mydin, M.M., Nawawi, L., Saat, R., *Strudies Phytochemical Constituents And Antimicrobial Properties Of Citrullus Lanatus Peels*. Malaysian Journal Of Analytical Sciences. Malaysia. 2017
- Hostettman, K.M. *Cara Kromatografi Preparatif : Penggunaan pada Isolasi Senyawa Alam*; terjemahan Kosasih Padmawinata. Penerbit ITB : Bandung, 1995
- Isriany. *Formulasi Kosmetik : produk perawatan kulit dan rambut*. 2013.
- Julianto, Tatang Shabur. *Fitokimia Tinjauan Metabolit Sekunder dan Skrining Fitokimia*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2019
- Kusantati, Herni, dkk. *Tata Kecantikan Kulit*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. 2008.
- Kusumastuti, D.U., Sukarsa., Widodo, Pudji., *Keanekaragaman Kultivar Semangka (Citrullus lanatus (THUNB) Matsum. & Nakai) di Sentra Semangka Nusawungu Cilacap*. Scripta Biologica. Purwokerto. 2017

- Layton, A.M. Disorder of sebaceous gland. Dalam : *Brunts, T, Breathnach. S, cox. N, Griffith. S. C (eds). Rook's textbook of Dermatology 8 edition.* Blackwell publishing Ltd PP. UK. 2010
- Maksum Radji M. Biomed, Apt, *Antibakteri dan Kemoterapi.* Jakarta : Buku Kedokteran EGC. 2014
- Mitsui, T. *New Cosmetic Science.* Edisi Kesatu. Elsevier Science B.V. Amsterdam. 1997
- Neglo, David., Okraku Tettey, Clement., Ken Essuman, Edward., Korley Kortei, Nii., Agyemang Boakye, Adjoa., Hunkpe, Gaston., Amarth, Flora., Kwashile, Pius., Sayanika Devi, Waikhom., *Comparative Antioksidant And Antimicrobial Activities Of The Peels, Rind, And Seed Of Watermelon (Citrullus lanatus) Fruit.* Journal elsevies scientific African. Afrika . 2021
- Odewunmi, N.A., Umoren, S.A., Gasem, Z.M., Ganiyu, S.A. . *L-citrulline: An Active Corrison Inhibitor Component Of Watermelon Rind Extract For Mild Steel In Hcl Medium.* Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 51:15-46. 2015.
- Oseni, O. A., & Okoye, V. I. *Studies of phytochemical and antioxidant properties of the fruit of watermelon (Citrullus lanatus (thumb)). J Pharm biomed. Sci, 27(27), 508-514.* 2013
- Okafor, C. D, Ifezulike, C. K, Agulefo, G., dan Ogbodo, S. O. *Quantitative and Qualitative analysis of the ethanolic extract of water melon peels. International journal of development research.* vol. 5, Issue 06, pp. 4686-4688. 2015
- Pelczar, Michael J dan Chan, E. C. S. (2008). *Dasar-Dasar Mikrobiologi Jilid I.* Jakarta: UI Press
- Rycroft, RJG, Robertson, SJ, & Wakelin, SH 2010, *A colour handbook of dermatology 2.* Manson publishing: London. 2010
- Rijayanti, R.P. *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Manga Bacang (Moringa foetida, L) Terhadap Staphylococcus aureus Secara In Vitro.* Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura. 2014
- Rubiyanto, Dwiarso. *Teknik Dasar Kromatografi.* Deepublish : Yogyakarta, 2016.

- Rukmana, R. *Bertanam semangka (Citrullus lanatus)*. Kansius: Yogyakarta. 1994
- Sarker SD, Latif Z, & Gray AI. *Natural Products Isolation, 2nd Edition*. New Jersey: Humana Press Inc. 2006.
- Sastroamidjojo Hardjono. *Analisis Kromatografi*. Penerbit ITB : Bandung, 1985
- Seidel, V. *Initial and Bulk Extraction*. In Sarker SD, Latif Z, & Gray AI, editors. *Natural Products Isolation 2nd Edition*. New Jersey: Humana Press, 2006.
- Setiadi. *Anatomi dan Fisiologi Manusia*. Cet.I; Yogyakarta, Graha Ilmu. 2007
- Sekar, Mahendra., Sutharesan, Nandakogulnair., Amani mashi, Danial., Shaiful, Muhammad., Hisham., Shazni, Muhammad., Wei Meng, Kang., Istiazzui, Muhammad., Syafiq Abdullah, Mohd. *Comparative evaluation antimicrobial properties red and yellow watermelon seeds*. Malaysia. International journal of current pharmaceutical research. 2014
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 10. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sylvia T. Pratiwi. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta : Erlangga, 2008.
- Suryana, S., Yen Yen Ade Nuraeni, dan Tina Rostinawati. *Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol dari Lima Tanaman terhadap Bakteri*. 2017
- Susanto, R, C. & G A Made Ari M.. *Penyakit Kulit Dan Kelamin*. Yogyakarta : Nuha Medika. 2013
- Syakri, Syamsuri., Muh. Ikhlas., & Nurlina. *Pengujian Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Kulit Buah Semangka Merah (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai) Terhadap Bakteri Propionibakterium acnes*. Makassar: Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan. 2019
- Syamsuni, H. *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2006.
- Tatang Sopandi, Wardah. *Mikrobiologi Pangan*. Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2014.
- Yusmaniar., Wardiyah., Nida, Khairun. *Mikrobiologi dan Parasitologi*. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2017


LAMPIRAN**Lampiran 1. Skema Kerja**

1. Alur penyiapan sampel




Skema kerja penyiapan sampel

2. Alur esktraksi dan skrining fitokimia



Skema kerja ekstraksi dan skrining fitokimia

3. Alur uji aktivitas antimikroba



Skema kerja uji aktivitas antimikroba

Lampiran 2. Gambar penelitian



Gambar 3. Tanaman Semangka



Gambar 4. Buah Semangka Kuning



Gambar 5. Sampel Kulit Buah Semangka Kuning




Gambar 6. Sampel Kulit Buah Semangka Kuning Yang telah di Parut



Gambar 7. Proses Pengeringan Sampel




Gambar 8. Ekstrak Kental



Gambar 9. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Ekstrak Metanol Kulit Buah Semangka Kuning

Keterangan : (a) positif (+) terdapat golongan senyawa saponin; (b) positif (+) terdapat golongan senyawa alkaloid; (c) negatif (-) tidak terdapat golongan senyawa flavonoid; (d) negatif (-) tidak terdapat golongan senyawa fenol; (e) positif (+) terdapat golongan senyawa terpenoid; (f) negatif (-) tidak terdapat golongan senyawa tannin.



Gambar 10. Hasil Pengujian Daya Hambat Ekstrak Metanol

Ket: (1) Replikasi pengujian daya hambat ekstrak metanol

(2) Replikasi 1

(3) Replikasi 2

(4) Replikasi 3

(a) hasil zona hambat konsentrasi 250 ppm


(b) hasil zona hambat konsentrasi 500 ppm

(c) hasil zona hambat konsentrasi 750 ppm


(d) hasil zona hambat konsentrasi 1000 ppm




(1)



(2)



(3)



(4)

Gambar 11. Hasil Pengujian Daya Hambat Ekstrak Larut N-Heksan

Ket: (1) Replikasi pengujian daya hambat ekstrak larut N-Heksan

(2) Replikasi 1

(3) Replikasi 2


(4) Replikasi 3

(a) hasil zona hambat konsentrasi 250 ppm

(b) hasil zona hambat konsentrasi 500 ppm

(c) hasil zona hambat konsentrasi 750 ppm

(d) hasil zona hambat konsentrasi 1000 ppm



Gambar 12. Hasil Pengujian Daya Hambat ekstrak tidak larut N-Heksan

Ket: (1) Replikasi pengujian daya hambat ekstrak tidak larut N-Heksan

(2) Replikasi 1

(3) Replikasi 2

(4) Replikasi 3

(a) hasil zona hambat konsentrasi 250 ppm

(b) hasil zona hambat konsentrasi 500 ppm

(c) hasil zona hambat konsentrasi 750 ppm

(d) hasil zona hambat konsentrasi 1000 ppm

Lampiran 3. Hasil Uji Determinasi Tanaman



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
LABORATORIUM BIOLOGI

Alamat : Kampus Parangtambung Jl. Dg. Tata Raya
Tlp. (0411) 840610 Fax. (0411) 841504 Makassar 90224
Laman : <http://bio.fmipa.unm.ac.id>

No : 005/SKAP/LAB.BIOLOGI/V/2022
Lamp :
Hal : Hasil Determinasi/Identifikasi Tumbuhan

Makassar, 27 September 2022

Kepada Yth.
Rusman Mutahir (NIM: 70100115079)
Program Studi Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil determinasi/identifikasi tumbuhan yang saudara kirimkan ke laboratorium Botani Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Makassar, sebagai berikut:

No	No. Koleksi	Species	Familia
1	01	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai. var. <i>Baby Black</i>	Cucurbitaceae

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Laboratorium Biologi
FMIPA UNM,

Prof. Oslan Jumadi, S.Si, M.Phil, Ph.D.
NIP. 19701016 199702 1 001

M A K A S S A R

Lampiran 4. Klasifikasi Tanaman Semangka Kuning



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
LABORATORIUM BIOLOGI

Alamat : Kampus Parangtambung Jl. Dg. Tata Raya
Tlp. (0411) 840610 Fax. (0411) 841504 Makassar 90224
Laman : <http://bio.fmipa.unm.ac.id>

Deskripsi *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai. var. *Baby Black*

Herba annual yang menjalar, trikoma agak rapat, dengan sulur spiral untuk membelit. Batang lunak, persegi. Daun majemuk bangun jantung, duduk berseling, tekstur agak kasar, tulang daun palmatus. Bunga jantan, bunga betina, dan hermaprodit letaknya terpisah, dalam satu individu, axillar, aktinomorfi; sepal 5; petal 5, bebas. Buah pepo, bulat sampai memanjang, kulit buah tebal berdaging dan licin. Biji pipih, tanpa endosperm.

Klasifikasi *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai var. *Baby Black*

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Dilleniidae
Ordo	: Violales
Familia	: Cucurbitaceae
Genus	: Citrullus
Species	: <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai. var. <i>Baby Black</i>

Referensi:

1. Jones, S.B. Jr. & A.E. Luchsinger, 1987. *Plant Systematics* (second ed.) McGraw-Hill Book Company, New York.
2. Steenis, van C.G.G.J, S. Bloembergen, dan P.J. Eyma, 2008. *Flora: Untuk Sekolah di Indonesia* (Cetakan ke 12). Penerbit: PT Pradnya Paramita, Jakarta.
3. Tjitrosoepomo, G. 1989. *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
4. <http://plantamor.com/species/info/citrullus/lanatus#gsc.tab=0>

RIWAYAT HIDUP PENULIS



RUSMAN MUTAHIR, dilahirkan di Lalepo pada tanggal 9 november 1997. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan RUSDI dan A. NURJANNA. Saat ini penulis tinggal di salah satu daerah di Kabupaten GOWA, yaitu di kelurahan Romang Polong.

Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar di MI No. 58 Lalepo. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Pasaka. Lalu menutup Pendidikan Sekolah Menengahnya di SMAN 2 Sinjai.

Setelah menyelesaikan pendidikan wajibnya, penulis melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke sebuah Universitas dimana Universitas yang di tempati yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan mengambil konsentrasi FARMASI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR