

UJI ANTIINFLAMASI MINYAK KUDA (*Equus caballus*)

TERHADAP MENCIT (*Mus musculus*)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**SARMILA
NIM: 70100116101**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sarmila
NIM : 70100116101
Tempat/tgl. Lahir : Jeneponto, 05 Mei 1998
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Toa Daeng Tiga
Judul : Uji Antiinflamasi Minyak Kuda (*Equus caballus*)
terhadap Mencit (*Mus musculus*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Juli 2022

Peneliti,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SARMILA
NIM: 70100116101
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Uji Antiinflamasi Minyak Kuda (Equus caballus) Terhadap Mencit (Mus musculus)*” yang disusun oleh Sarmila, NIM: 70100116101, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 25 Agustus 2022
27 Muharram 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim

Segala Puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan banyak rahmat, hidayah dan kesehatan kepada peneliti, sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW., yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan teknologi dan pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Uji Antiinlamasi Minyak Kuda (*Equus Caballus*) terhadap Mencit (*Mus musculus*)” ini salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Peneliti menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti telah melewati banyak hambatan dan kesulitan. Namun atas bantuan dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak sehingga membuat peneliti merasa termotivasi dan kembali bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tersayang, Ibunda, Ayahanda, Suamiku, Saudara kandung, dan Mertua yang telah mengingatkan dan terus memberi dukungan baik moril dan materi yang tak henti-hentinya. Beserta keluarga besar terima kasih atas doa-doa yang telah diberikan semoga Allah SWT. senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada.

Melalui kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., PhD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardani, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

11. Apt. Syamsuri Syakri, S. Farm., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini
12. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si., selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
13. Apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc dan apt. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc selaku penguji kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini
14. Dr. H. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag., selaku Penguji Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Apt. Muhammad Subhan A. Sibadu, S.Farm., M.Si yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
16. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi, atas ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.
17. Kepada teman-teman DI60XIN Farmasi 2016 yang selalu menyemangati dan mendoakan selama ini
18. Kepada teman-teman seperjuanganku, Durrotun Nasihah, Hariratul Jannah, Jasmin, Nurrahimah yang telah banyak membantu baik moril maupun material.

Peneliti menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan peneliti sekiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Gowa, Juli 2022

Peneliti

SARMILA
NIM. 70100116101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	xi
ABSTACT (BAHASA INGGRIS)	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Peneliti	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Uraian Sampel Kuda.....	8
B. Kulit	10
C. Luka	13
D. Inflamasi	16
E. Antiinflamasi.....	18
F. Uraian Hewan Coba	20
F. Tinjauan Islam dalam Pemanfaatan Hewan	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Tempat dan Waktu	27
C. Pendekatan Penelitian	27
D. Sampel	27
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Prosedur Kerja.....	28
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian.....	33
B. Pembahasan.....	35
BAB V PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karakteristik Mencit	20
Tabel 2. Hasil Ekstraksi Lemak Kuda.....	33
Tabel 3. Hasil Pengukuran Penurunan Volume Udema telapak kaki mencit	33
Tabel 4. Hasil Pengukuran rata-rata persentase udema mencit.....	34
Tabel 5. Hasil Pengukuran rata-rata persentase inhibisi mencit	34
Tabel 5. Hasil Uji Statistik <i>Tukey HSD</i>	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kuda (<i>Equus caballus</i>).....	8
Gambar 2. Mencit (<i>Mus musculus</i>).....	20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ethical Clearance	48
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian	49
Lampiran 3. Skema Kerja Pembuatan Minyak Kuda.....	50
Lampiran 4. Skema Kerja Uji Antiinflamasi	51
Lampiran 5. Perhitungan Dosis	53
Lampiran 6. Dokumentasi	55
Lampiran 7. Hasil Olah Data SPSS.....	58
Lampiran 8. Tabel Hasil Pengukuran Data.....	65



ABSTRAK

Nama : Sarmila
Nim : 70100116101
Judul : Uji Antiinflamasi Minyak Kuda (*Equus caballus*) Terhadap Mencit (*Mus musculus*)

Telah dilakukan penelitian dengan judul uji antiinflamasi minyak kuda (*Equus caballus*) terhadap mencit (*Mus musculus*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas antiinflamasi minyak kuda dan jumlah dosis yang efektif terhadap antiinflamasi pada mencit jantan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimental laboratorium. Tahapan penelitian ini dari penyiapan hewan uji, sampel, larutan uji dan larutan pembanding, pemberian secara oral dan induksi karagenan 1% (subplantar), lalu dilakukan pengamatan udema pada kaki mencit setiap 1 jam selama 6 jam. Hasil yang diperoleh ekstrak minyak kuda dari dua metode mempunyai efek antiinflamasi pada dosis 40 mg/kgBB, 50 mg/kgBB, 60 mg/kgBB, dan sampel pembanding 60 mg/kgBB. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekstrak minyak kuda dengan dosis 50 mg/kgBB dan sampel pembanding memberikan efek antiinflamasi paling baik dibandingkan dengan kontrol positif terhadap mencit jantan. Hasil uji ANOVA menunjukkan persentase udema seluruh kelompok dari jam ke 1 hingga jam ke 6 berbeda secara signifikan ($p \leq 0.05$).

Kata Kunci : Antiinflamasi, mencit jantan, minyak kuda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Name : Sarmila
Nim : 70100116101
Title : Anti-Inflammatory agent of Horse Oil (*Equus caballus*) in Mice
(*Mus musculus*)

Research has been carried out with the title of anti-inflammatory test of horse oil (*Equus caballus*) on mice (*Mus musculus*). This study aims to determine the anti-inflammatory effectiveness of horse oil and the number of effective doses for anti-inflammatory in male mice. This study uses a type of laboratory experimental research. The stages of this research were the preparation of test animals, samples, test solutions and comparison solutions, oral administration and induction of 1% (subplantar) carrageenan, then observed for edema in the feet of mice every 1 hour for 6 hours. The results obtained that horse oil extract from two methods had an anti-inflammatory effect at doses of 40 mg/kgBW, 50 mg/kgBW, 60 mg/kgBW, and the comparison sample was 60 mg/kgBW. The conclusion of this study was that horse oil extract at a dose of 50 mg/kgBW and the comparison sample gave the best anti-inflammatory effect compared to positive controls on male mice. The results of the ANOVA test showed that the percentage of edema in all groups from the 1st hour to the 6th hour was significantly different ($p \leq 0.05$).

Keywords: Anti-inflammatory, male mice, horse oil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu hal sangat penting bagi manusia karena dengan kesehatan manusia mampu melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menurut *World Health Organization (WHO)* kesehatan diartikan sebagai kondisi yang optimal atau sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta hal lainnya yang tidak hanya terbatas pada penyakit atau kelemahan (Elina & Sri Sumiati, 2016). Jadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan adalah kondisi sejahtera atau baik pada badan, jiwa dan sosial seseorang.

Menjaga kesehatan atau kondisi fisik, mental dan sosial menjadi catatan penting bagi manusia agar aktivitas mereka tidak terganggu dan berjalan secara normal. Hal demikian bisa terwujud jika manusia menerapkan perilaku hidup sehat seperti mengatur makanan dan pola makan, menjaga kesehatan pribadi, mengatur istirahat dan berolahraga teratur karena jika tidak, maka kondisi fisik, mental dan sosial akan terganggu, melemah atau sakit (Suharjana, 2012). Jika seseorang sakit atau kesehatan terganggu maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti menerapkan perilaku hidup sehat dan mengonsumsi atau menggunakan obat.

Penggunaan obat jika kondisi fisik, mental dan sosial seseorang sakit adalah sesuatu hal yang sudah sangat lumrah saat ini baik obat sintesis maupun obat tradisional. Pada dasarnya obat sintesis maupun obat tradisional memiliki fungsi atau tujuan yang sama yakni mengobati, namun jika dilihat obat sintesis memungkinkan dapat memberikan efek samping yang lebih besar dan harga obat sintesis jauh lebih mahal dibandingkan dengan obat tradisional (Widowati, dkk, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun obat sintesis diketahui dapat memberikan efek samping yang lebih besar dan harganya yang relatif mahal, namun penggunaan obat sintesis masih tetap lebih banyak dibandingkan obat tradisional di kalangan masyarakat. Hasil penelitian Rasmi Zakiah dkk, misalnya menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yang menggunakan obat tradisional hanya 53,9% dan selebihnya masih tetap pada obat sintesis (Rasmi Zakiah, dkk., 2018).

Rendahnya penggunaan obat tradisional dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah rendahnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat tentang obat tradisional tersebut (Rimadani, dkk., 2018). Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang obat tradisional sehingga penggunaan obat tradisional bisa berkembang. Selain itu Pengetahuan tentang obat tradisional ini juga penting agar masyarakat menggunakan obat tradisional secara tepat seperti cara penggunaan, dosis dan konsentrasi karena jika tidak, hal tersebut hanya akan berbahaya (Katno, 2005).

Inflamasi merupakan suatu proses protektif normal terhadap trauma fisik atau zat-zat mikrobiologik yang bisa menyebabkan terjadinya luka jaringan (Mycek, 2001: 280). Inflamasi merupakan proses yang sangat kompleks yang mengikut sertakan aktivitas banyak tipe sel dan mediator P tersebut menimbulkan tanda inflamasi, berupa kemerahan, pembengkakan, panas, nyeri dan hilangnya fungsi (Subagyo, 2004)

Antiinflamasi adalah sebutan untuk agen/obat yang bekerja melawan atau menekan proses peradangan (Dorlan, 2002: 68). Antiinflamasi nonsteroid 3 menghambat siklooksigenase yang mengubah asam arakidonat menjadi PGG₂ dan PGH₂ (Nogrady, 1992: 412).

Menurut Lukman, dkk., (2007), Daging kuda tersusun dari jaringan ikat, epitelial, jaringan-jaringan saraf, pembuluh darah dan lemak. Kandungan lemak sekitar 2.5 %, Komposisi lemak pada daging umumnya berbentuk trigliserida, sedikit fosfolipid, asam lemak bebas, dan sterol. Fosfolipid mempunyai peranan penting sebagai karier asam lemak dalam darah dan memudahkan terjadinya transpor aktif molekul-molekul dan ion-ion melewati sel membran (Piliang dan Djojosoebagio, 1996).

Asam lemak utama yang terdapat dalam daging kuda adalah asam oleat, asam palmitat, asam linoleat, asam palmitoleat, asam α -linolenat dan asam arakidonat. Selain mengandung asam linolenat, minyak kuda juga mengandung asam α -linolenat yang merupakan asam lemak omega-3 yang biasa dijumpai di dalam chia seed, kacang walnut, dan minyak sayuran, kandungan ini merupakan antiinflamasi yang bagus. Asam palmitat menyumbang sekitar 76.6% dari total asam lemak jenuh (SFA), asam oleat menyumbang 73.3% dan asam palmitoleat menyumbang 22.0% dari total asam lemak tak jenuh tunggal (MUFAs). Pada daging kuda juga tinggi akan kandungan PUFA yaitu dengan perbandingan asam lemak tak jenuh ganda (PUFA): asam lemak jenuh (SFA) adalah 0.29 : 10.2 dari total asam lemak tak jenuh rantai ganda (PUFA) didominasi oleh asam linoleat menyumbang sebesar 64.4%, asam α -linolenat 4 menyumbang 26.3% dan asam arakidonat hanya menyumbang sekitar 6% (Badiani, et al. 1997).

Pada umumnya, masyarakat di daerah Jeneponto telah menggunakan beberapa tanaman ataupun hewan secara tradisional yang digunakan pada beberapa pengobatan penyembuhan luka dan peradangan. Masyarakat Jeneponto umumnya mempercayai penggunaan minyak kuda dengan pengobatan terhadap luka dan peradangan pada beberapa bagian tubuh.

Dalam konteks Islam, Allah SWT. memang mengisyaratkan tentang penggunaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati baik itu hewan, tumbuhan dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman hayati tersebut diciptakan oleh Allah SWT. bukan hanya sebagai tanda kekuasaannya namun agar manusia bisa memanfaatkannya termasuk pemanfaatan sebagai obat (Abdul M., 2015). Hal tersebut tercermin dalam firman Allah dalam QS. Yunus/10:6 sebagai berikut.

إِنَّ فِي آخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۖ

Terjemahnya:

Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa.

Di Indonesia, penggunaan obat tradisional dari keanekaragaman hayati baik hewan atau tumbuhan masih banyak digunakan masyarakat. Salah satu realitas penggunaan obat dari keanekaragaman hayati adalah penggunaan minyak kuda di masyarakat Jeneponto. Berdasarkan pengalaman dan realitas yang didapatkan di lapangan, pada umumnya masyarakat Jeneponto menggunakan minyak kuda untuk mengobati luka dan peradangan. Meskipun masyarakat pada umumnya tidak mengetahui kandungan, dosis dan sebagainya penggunaan minyak kuda tersebut, akan tetapi penggunaannya masih eksis di masyarakat hingga saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penting untuk mengetahui efektivitas antiinflamasi atau peradangan dari minyak kuda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji efek atau anti inflamasi pemberian minyak kuda pada mencit.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah atau pertanyaan penelitian berdasarkan uraian masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efek pemberian minyak kuda terhadap antiinflamasi pada mencit jantan?
2. Berapa pemberian dosis efektif minyak kuda terhadap antiinflamasi pada mencit jantan?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan agar peneliti memiliki kejelasan dan pedoman dalam melakukan penelitian serta pembaca tidak keliru yaitu sebagai berikut:

- a. Minyak kuda yaitu minyak atau lemak yang berupa Asam Amino Esensial terutama Leucine yang berasal dari hewan kuda.
- b. Inflamasi merupakan suatu proses atau mekanisme yang ada pada tubuh dalam rangka melawan sesuatu yang asing yang masuk ke tubuh manusia.
- c. Luka adalah kehilangan atau kerusakan jaringan tubuh yang disebabkan oleh benda tumpul atau tajam, perubahan suhu, bahan kimia, dll.
- d. Peradangan merupakan mekanisme pertahanan tubuh sebagai respon jaringan terhadap cedera dan faktor eksternal lainnya. Pada penelitian ini dilakukan pengujian antiinflamasi atau peradangan dengan edema pada kaki mencit jantan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah laboratorium murni yang meliputi penggunaan bahan berupa minyak kuda sebagai uji antiinflamasi yang diujikan pada hewan uji coba yaitu mencit jantan.

D. Kajian Pustaka

Secara umum kajian atau penelitian-penelitian obat tradisional yang berkembang baik itu dari tumbuhan maupun hewan sudah banyak dilakukan oleh kalangan akademisi. Terkait dengan penelitian ini, ada beberapa literatur yang dapat

dijadikan sebagai rujukan yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fadlina Chany Saputri meneliti tentang Uji Aktivitas Antiinflamasi Minyak Atsiri Daun Kemangi (*Ocimum Americanum* L) Pada Tikus Putih Jantan Yang Diinduksi Karagenan pada tahun 2016. Hasil dari penelitian fadlina Chany Saputri menunjukkan bahwa adanya penghambatan inflamasi pada konsentrasi 44,83% pada dosis 160 mg/200 g BB.

Kedua, hasil penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dini Amalia yang meneliti tentang Uji Aktivitas Antiinflamsi Ekstrak Daun Pare (*Momordica charantia* L.) Terhadap Mencit (*Mus musculus*) pada tahun 2016. Penelitian dari Dini menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun pare memberikan efek antiinflamasi. Efek antiinflamasi yang menunjukkan efek yang paling besar adalah ekstrak etanol daun pare yang memiliki konsentrasi 6%.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatuz Zuhroh tentang Uji Efek Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Sirih (*Piper betle* L.) dan Pengaruhnya Terhadap Jumlah Leuokosit Pada Tikus Jantan yang Diinduksi Karagenan pada tahun 2018. Hasil penelitian Fadhilatuz menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun sirih memiliki efek antiinflamasi dan dapat menutunkan volume edema kaki tikus jantan pada dosis 100 mg/kgBB.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ledy Laila Palestin tentang Uji Aktivitas Antiinflamasi Minyak Ikan pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar (*Rattus Norvegicus* L) yang Diinduksi Karagenan pada tahun 2020. Hasil

penelitian Ledy menunjukkan bahwa minyak ikan salmon mempunyai aktivitas antiinflamasi pada sampel tikus jantan.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, letak persamaannya adalah tujuan dari penelitian yang berusaha menguji efektivitas antiinflamasi ataupun penyembuhan dari sampel terhadap hewan uji coba. Sedangkan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang menjadi kajian pustaka di atas adalah sampel. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah minyak kuda.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk:

- a. Mengetahui efektivitas antiinflamasi minyak kuda terhadap mencit jantan.
- b. Mengetahui jumlah pemberian dosis efektif minyak kuda terhadap antiinflamasi pada mencit jantan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian obat-obat tradisional yang digunakan masyarakat Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan informasi bagi masyarakat tentang efektivitas antiinflamasi pada minyak kuda.
- c. Secara akademis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan atau meraih gelar Sarjana Farmasi (S.Farm) pada prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Uraian Sampel Kuda



Gambar 1. Kuda (*Equus caballus*)

1. Klasifikasi

Dalam ilmu Zoologi, kuda memiliki klasifikasi sebagai berikut:

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Class	: Mamalia
Sub Class	: Theria
Ordo	: Perissodactyla
Genus	: Equus
Spesies	: <i>Equus caballus</i> (Radiopetra, 1997).

2. Deskripsi

Kuda merupakan salah satu spesies modern mamalia yang berasal dari genus *Equus*. Di Indonesia, kuda merupakan salah satu hewan mamalia yang sangat akrab di tengah masyarakat dan mudah dijumpai di setiap daerah. Jika dilihat dari segi fisik, kuda yang ada di Indonesia memiliki ukuran dan kondisi yang berbeda karena dipengaruhi oleh keadaan geografis. Namun, ukuran kuda yang ada di Indonesia rata-rata bertinggi badan 1,13 m. Berdasarkan data,

Indonesia memiliki spesies kuda lokal yaitu kuda Makassar, Gorontalo, Minahasa, Sumbawa dan beberapa daerah lainnya (Soehardjono, 1990).

Berdasarkan ukuran tinggi, berat dan kegunaannya maka secara umum kuda dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yakni Pertama yaitu kuda ringan (*light horses*) yakni kuda yang memiliki tulang kecil, berkaki tipis, memiliki berat 450-600 kg, tinggi 146-173 cm yang biasanya kuda ini digunakan untuk pacu, tunggang dan membantu dalam hal beternak. Kedua yaitu jenis kuda berat (*heavy horses*) yang memiliki ciri tulang belulang besar, kaki tebal dan kuat, beratsekitar 700 kg dan tinggi 147-157 cm. Kuda ini biasanya digunakan untuk menarik beban, tunggang dan membantu pekerjaan berat. Ketiga yaitu kuda poni atau keledai yang memiliki berat 400 kg dan tinggi dibawah 147 cm (Maswarni dan Nofiar Rachman, 2014).

Fisiologi kuda terbagi menjadi tiga bagian yakni sistem pernapasan, sistem reproduksi dan sistem pencernaan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem pernapasan

Sistem pernapasan kuda terdiri dari hidung, rongga hidung, kerongkongan, laring, trakea, saluran udara, dan paru-paru. Ketika udara memasuki paru-paru, darah memisahkan oksigen, jaringan mengambil sebagian oksigen dari darah dan menyerap karbon dioksida dari sel, kemudian darah mengubah karbon dioksida menjadi oksigen.

b. Sistem reproduksi

Sistem reproduksi pada kuda pada kuda betina dimulai dari vulva yang kemudian dibawah ke rektum. Pada sisi bibir vulva disebut klitoris. Setelah vulva disebut vagina yang melebar hingga ke pelvis dan pangkal pelvis yang dimana merupakan pintu menuju uterus.

c. Sistem pencernaan

Sistem pencernaan yang dimiliki kuda meliputi organ-organ yang dimilikinya seperti mulut, esophagus, lambung, usus halus, usus besar, sekum, kolon besar, kolon kecil, rectum dan anus (Maswarni dan Nofiar Rachman, 2014).

B. Kulit

Kulit merupakan salah satu organ ekskresi yang berada pada lapisan terluar pada permukaan tubuh (Sri Handayani, 2021). Kulit atau yang disebut juga dengan integumen dipahami juga sebagai organ luar terbesar pada tubuh sebagai proteksi terhadap lingkungan luar tubuh (I Made Sukma W., 2018). Jadi, kulit merupakan salah satu organ penting pada manusia yang berada di lapisan terluar sebagai proteksi atau pelindung tubuh terhadap sesuatu di lingkungan luar tubuh.

Secara anatomi, kulit terdiri atas tiga lapisan yaitu lapisan epidermis, dermis dan hypodermis yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Lapisan Epidermis

Lapisan Epidermis merupakan lapisan terluar dan pertama pada kulit. Lapisan epidermis ini terdiri atas jaringan epithelial dan lapisan ini sangat tipis, tidak memiliki pembuluh darah, mampu meregenerasi sel setiap 4-6 minggu, nutrisi berasal dari difusi kapiler lapisan papilaris dari bagian dermis. Lapisan ini memiliki fungsi melindungi kulit dari kerusakan fisik, bahan kimia dan biologis, perlindungan dari sinar matahari, mencegah kehilangan cairan transepidermal, sintesis vitamin D dan sitokin, memberikan warna kulit, pengenalan antigen. Lapisan epidermis sendiri terdiri atas lima lapisan yaitu:

- a. Lapisan Korneum yaitu lapisan paling tebal dari epidermis karena lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 75%. Lapisan ini terdiri atas sel mati yang terbungkus protein padat yaitu protein keratin (sel *cornifed*).
- b. Lapisan Lusidium yaitu lapisan yang hanya ada pada beberapa area kulit

seperti kulit telapak tangan dan kaki. Lapisan ini tipis dan transparan.

- c. Lapisan Granulosum adalah lapisan yang menjadi tempat berlangsungnya proses penebalan membran plasma sel. Lapisan ini terdiri atas lapisan glikolipid yang membantu memperlambat kehilangan air pada lapisan epidermis.
- d. Lapisan Spinosum adalah lapisan pertahanan tubuh karena lapisan ini mengandung sel Langerhans dan keratinosit.
- e. Lapisan Basale atau Germinativum yaitu lapisan paling terdalam dari lapisan epidermis yang sering terjadi proses mitosis. Pada lapisan ini juga sebagai tempat menghasilkan melanin dan keratinosit (I Made Sukma W., 2018)

2. Lapisan Dermis

Lapisan dermis merupakan lapisan kedua dari kulit yang tersusun dari jaringan konektif. Lapisan ini termasuk lapisan yang paling tebal karena terdiri dari banyak sel. Lapisan dermis ini dibagi menjadi dua lapisan yaitu lapisan papilaris dan retikularis. Lapisan Papilaris adalah lapisan yang disusun oleh jaringan *loose connective* yang memiliki reseptor sentuhan, nyeri dan kapiler. Sedangkan lapisan Retikularis adalah lapisan yang berisi pembuluh darah, folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak dan saraf. Lapisan dermis memiliki fungsi sebagai pendukung struktur kulit, kekuatan mekanikal dan melindungi otot dan sebagainya, memberikan nutrisi ke lapisan epidermis, respons inflamasi jika terjadi cedera, menahan kekeuatan gesera saat tubuh dipindahkan (I Made Sukma W., 2018).

Lapisan Dermis terdiri atas beberapa jaringan yaitu:

- a. Pembuluh kapiler berfungsi menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit.
- b. Kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat.

- c. Kelenjar minyak berfungsi menghasilkan keringat agar kulit dan rambut tidak kering.
- d. Pembuluh darah memiliki fungsi mengearkan dari ke seluruh sel atau jaringan.
- e. Ujung-ujung saraf berfungsi sebagai perasa, peraba dan sebagainya.
- f. Kantong rambut yang memiliki fungsi sebagai tempat akar, batang dankelenjar minyak rambut (Sri Handayani, 2021).

3. Lapisan Hipodermis

Lapisan Hipodermis adalah lapisan terakhir pada kulit yang di dalamnya terdiri dari pembuluh limfatik dan pembuluh darah besar yang berfungsi memberikan nutrisi pada kulit. Selain itu, lapisan ini sebagai tempat penyimpanan lemak dan jaringan adipose. Lapisan Hipodermis memiliki fungsi melekatkan pada struktur dibawahnya, pengatur suhu tubuh, mengendalikan bentuk tubuh, dan peredam stimuli mekanikal (I Made Sukma W., 2018).

Kulit memiliki peranan penting pada tubuh karena fungsinya yang sangat banyak dan sangat dibutuhkan. Di antara fungsi kulit yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi proteksi

Kulit memiliki banyak sel yang memiliki fungsi pelindung misalnya sel makrofag akan memakan bakteri atau jaringan mati sebagai mekanisme pertahanan tubuh. Selain itu, ada juga sel langerhan sebagai pengatur reaksi alergi dan masih banyak lagi sel maupun lapisan pada kulit yang fungsinya sebagai pelindung atau proteksi.

b. Pengaturan suhu

Kulit memiliki fungsi mengatur suhu tubuh dengan cara dilatasi atau konstriksi pembuluh darah kulit.

c. Sensasi

Pada lapisan dermis kulit terdapat banyak badan sel atau reseptor sensasi. Sensasi ini disebarkan oleh ujung saraf bebas untuk sensasi sentuhan, tekanan, tegangan, nyeri, sentuhan dan suhu.

d. Ekskresi

Salah satu peran kulit adalah sebagai tempat ekskresi atau membuang sisa hasil metabolisme tubuh berupa keringat.

e. Metabolisme

Ketika kulit terpapar sinar matahari, maka akan mengaktifkan metabolisme kalsium dan fosfat sebagai unsur dalam pembentukan tulang.

f. Komunikasi

Sentuhan kulit menjadi salah satu bentuk komunikasi kepada orang lain sehingga orang lain bisa merasakan sesuatu seperti nyaman dan lainnya. (I Made Sukma W., 2018).

C. Luka

Luka merupakan suatu kerusakan yang terjadi pada kulit yang biasanya disebabkan oleh adanya sumber panas, hasil tindakan medis maupun perubahan kondisi fisiologis pada kulit (Handi Purnama, dkk., 2017). Dalam pengertian yang lain, luka juga diartikan sebagai rusak atau hilangnya jaringan yang ada pada tubuh yang disebabkan oleh berbagai hal seperti trauma benda tajam, paparan bahan kimia, gigitan hewan dan sebagainya (Sjamsuhidajat R& Wim De Jong, 2011).

Pada dasarnya, berdasarkan waktu dan proses penyembuhannya luka dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu luka akut dan luka kronis. Luka akut merupakan luka yang proses penyembuhannya cepat dan jaringan kulit dapat kembali lagi secara normal. Luka akut ini biasanya disebabkan oleh adanya kontak antara kulit dengan benda atau permukaan yang keras, tajam maupun tumpul, luka bekas

operasi maupun hal lainnya. Sedangkan luka kronis adalah jenis luka yang proses penyembuhannya membutuhkan waktu lama dan biasanya struktur kulit susah kembali normal dan bahkan jenis luka ini dapat menyebabkan kecacatan. Jenis luka ini biasanya dipengaruhi oleh kegagalan pemulihan karena kondisi pada fisiologis seperti diabetes melitus dan kanker, infeksi yang terus menerus dan kurang maupun rendahnya tindakan pengobatan yang diberikan (Handi Purnama, dkk., 2017).

Adanya luka pada tubuh makhluk hidup akan menyebabkan gangguan dan hilangnya fungsi dan struktur anatomi pada tubuh. Oleh karena itu, jika terdapat luka pada tubuh harus diberi penanganan agar proses penyembuhan bisa segera terjadi. Ada beberapa tahapan dalam proses penyembuhan luka yaitu sebagai berikut:

1. Inflamasi yaitu suatu proses yang mencakup hemostasis, pelepasan histamine dan mediator lain dari sel yang rusak dan migrasi sel darah putih ke tempat yang rusak tersebut.
2. Deskruktif yaitu tahapan pembersihan jaringan yang mati dan mengalami devitalisasi oleh leukosit polimorfonukler dan makrofag.
3. Proliferatif yaitu proses pada saat pembuluh darah baru dan jaringan ikat memperkuatnya kemudian menginfiltrasi luka.
4. Maturasi yaitu tahapan yang mencakup proses re-epitalisasi, kontraksiluka dan reorganisasi jaringan ikat (Moya J. Marison, 2004).

Tahapan atau proses penyembuhan luka pada makhluk hidup berbeda-beda karena terdapat klasifikasi atau tipe dalam penyembuhan pada luka. Dengan kata lain terdapat beberapa klasifikasi atau tipe dimana kulit dan jaringan kulit yang luka atau mengalami cedera memperbaiki diri dan melakukan penyembuhan. Tipe penyembuhan tersebut seperti penjelasan di bawah ini:

- a. Tipe primer yaitu tipe yang dalam penyembuhan luka dibantu dengan suatu alat ataupun bahan.
- b. Tipe sekunder adalah penyembuhan luka tanpa adanya bantuan alat atau bahan tertentu namun dilakukan suatu proses yakni menumbuhkan jaringan baru dari dasar luka sampai luka tertutup.
- c. Tipe tersier adalah tipe penyembuhan luka yang disebut juga dengan tipe penyembuhan luka primer yang terlambat atau penyembuhan luka yang dilakukan dengan menghilangkan benda atau infeksi yang ada dan terjadi pada tipe penyembuhan luka primer (I Made Sukma W., 2018).
- d. Penanganan luka yang baik dan tepat sangat penting dilakukan, oleh karena itu perlunya pemahaman masyarakat dalam menangani luka dan mengantisipasi hal-hal yang dapat memperlambat penyembuhan luka.

Ada beberapa faktor yang dapat memperlambat proses penyembuhan luka, yang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1). Pertama, faktor yang memperlambat penyembuhan luka adalah faktor yang dipengaruhi oleh faktor lokal yang berbahaya pada tempat luka, seperti hipoksia, dehidrasi, eksudat yang berlebihan, penurunan suhu, jaringan netral, pengerasan kulit yang berlebihan, adanya benda asing dan trauma yang berlebihan.
- 2). Kedua, faktor yang memperlambat penyembuhan luka dikarenakan faktor patofisiologi umum yang meliputi kurang tersedianya substansi dalam penyembuhan luka seperti oksigen, asam amino, vitamin dan mineral.
- 3). Ketiga, yaitu pengaruh fisiologis dari proses penuaan normal.
- 4). Keempat, adalah faktor psikososial karena perilaku positif sangat berperandalam penyembuhan luka.

- 5). Kelima, yaitu pengaruh yang merugikan dari terapi lain seperti obat-obatsitotoksik, radioterapi, dan terapi steroid.
- 6). Keenam, faktor yang memperlambat penyembuhan luka adalah penatalaksanaan luka yang tidak tepat (Moya J. Marison, 2004).

D. Inflamasi

Inflamasi merupakan respon perlindungan normal terhadap cedera jaringan yang disebabkan trauma fisik, bahan kimia berbahaya atau agen mikrobiologi. Inflamasi adalah usaha tubuh untuk menginaktif atau menghancurkan organisme penginvasi, menghilangkan iritan dan persiapan tahapan untuk perbaikan jaringan, bila penyembuhan telah sempurna proses inflamasi biasanya. Selain itu, proses inflamasi juga membantu memicu terjadinya proses yang memulihkan, memperbaiki dan mengganti jaringan yang rusak. Jadi inflamasi adalah sebuah proses perlindungan terhadap bahan atau agen yang merugikan penyebab cedera dan konsekuensi cedera tersebut (Champe dan Richaech, 2013).

Mekanisme inflamasi adalah reaksi setempat dari jaringan atau sel terhadap suatu rangsang atau cedera. Setiap ada cedera, terjadi rangsangan untuk dilepaskannya zat kimia tertentu yang akan menstimulasi terjadinya perubahan jaringan pada reaksi radang tersebut, diantaranya histamin, serotonin, bradikinin, leukotrin dan prostaglandin. Perubahan permeabilitas yang terjadi menyebabkan cairan keluar dari pembuluh darah dan berkumpul dalam jaringan. Bradikinin bereaksi lokal menimbulkan rasa sakit, vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas kapiler. Sebagai penyebab radang, prostaglandin berpotensi kuat setelah bergabung dengan mediator lainnya (Mansjoer, 1999)

Inflamasi juga terlibat dalam patogenesis penyakit aterosklerosis, obesitas dan diabetes, beberapa jenis kanker, stroke, asma bronkial, radang sendi dan demensia. Proses ini menyebabkan tanda-tanda utama inflamasi akut yakni rubor

(kemerahan), kalor (panas), tumor (pembengkakan), dan dolor (nyeri) (Porth, 2015).

Ada beberapa tanda-tanda inflamasi yaitu sebagai berikut:

1. Rubor (kemerahan)

Pada proses inflamasi tanda atau tahap yang pertama adalah rubor (kemerahan) ini. Hal ini disebabkan oleh darah berkumpul ke daerah yang cedera sehingga arteriol mengalami dilatasi sehingga darah yang mengalir ke dalam mikrosirkulasi lokal lebih banyak. Proses inilah yang menyebabkan terjadinya kemerahan.

2. Kalor (panas)

Proses inflamasi yang ditandai kemerahan juga akan terjadi panas. Hal ini mungkin disebabkan oleh darah mengalir lebih banyak ke permukaan daerah yang cedera dibandingkan daerah yang lain sehingga pada daerah peradangan kulit mengalami penambahan pengumpulan darah. Selain itu, panas pada proses inflamasi bisa terjadi karena pusat pengatur suhu tubuh pada hipotalamus terganggu akibat pirogen.

3. Edema (pembengkakan)

Tanda lainnya dari proses inflamasi adalah pembengkakan. Pembengkakan ini terjadi karena cairan sel berpindah dari aliran darah ke jaringan interstisial di tempat yang terkena cedera.

4. Dolor (nyeri)

Nyeri adalah tanda proses inflamasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, bisa disebabkan oleh pelepasan mediator kimia tertentu. Kedua, nyeri terjadi karena jaringan yang meradang terjadi pembengkakan sehingga meningkatkan tekanan lokal yang menimbulkan nyeri.

5. Perubahan fungsi

Bagian atau daerah yang meradang seharusnya memiliki fungsi yang abnormal. Hal tersebut disebabkan oleh penumpukan cairan pada tempat cedera jaringan dan juga disebabkan karena rasa nyeri yang disertai sirkulasi yang abnormal (Kee dan Hayes, 1996).

Inflamasi diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronik. Inflamasi akut merupakan proses inflamasi yang tergolong singkat karena tidak membutuhkan waktu lama dalam prosesnya yang ditandai dengan eksudasi cairan dan edema serta imigrasi pada leuosit terutama neutrofil. Sedangkan inflamasi kronik adalah proses yang membutuhkan waktu lama yang ditandai dengan adanya limfosit, fibrosis dan yang lainnya (Richard N & Vinay K, 2008).

Secara teoretis, dalam inflamasi dikenal juga istilah antiinflamasi. Antiinflamasi merupakan sebuah agen atau obat yang mampu menekan proses terjadinya peradangan pada luka. Dalam menekan peradangan, terdapat tiga mekanisme yaitu penghambatan enzim siklooksigenase, melibatkan penghambatan fungsi imun dan mengantagonis efek kimia yang dilepaskan oleh sel-sel imun.

E. *Antiinflamasi*

Antiinflamasi adalah sebutan untuk agen atau obat dengan bekerja melawan atau menekan proses pembengkakan (Dorland, 2002:68).

Golongan obat inflamasi yaitu golongan obat yang memiliki mekanisme kerja umum berupa penghambatan sintesis prostaglandin penghambatan enzim siklooksigenase. Enzim siklooksigenase merupakan enzim yang akan bertanggungjawab terhadap biosintesis prostaglandin. Terdapat dua kelompok obat antiinflamasi berdasarkan mekanismenya yaitu: obat antiinflamasi golongan

steroid yang bekerja dengan cara menghambat pelepasan prostaglandin dari sel-sel sumbernya, dan obat antiinflamasi golongan nonsteroid bekerja melalui mekanisme yang lain seperti inhibisi siklooksigenase yang berperan penting pada biosintesis prostaglandin. Adapun tujuan dari pengobatan antiinflamasi yaitu: meringankan rasa nyeri yang merupakan gejala awal dan kedua memperlambat dan membatasi rusaknya jaringan (Katzung, 2001).

Pada penggunaan obat antiinflamasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu non steroid dan kortikosteroid. Obat antiinflamasi non steroid mempunyai efek analgetik dengan dosis rendah dan efek antiinflamasi dengan dosis yang besar. (Proyanto, 2009:21).

Untuk mengatasi inflamasi dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan antiinflamasi golongan steroid maupun golongan Antiinflamasi Non Steroid (AINS). Keduanya memiliki efek samping yang merugikan, golongan steroid dapat menyebabkan penurunan imunitas terhadap infeksi, osteoporosis, atrofi otot dan jaringan lemak, meningkatkan tekanan intraokular. Sedangkan golongan AINS menyebabkan tukak lambung hingga pendarahan, gangguan ginjal dan anemia (Atiek *et al.*, 2011).

Natrium diklofenak merupakan golongan obat antiinflamasi non steroid (Wibowo, 2001). Mekanisme obat antiinflamasi non steroid pada umumnya menghambat biosintesa prostaglandin terutama pada perubahan asam arakidonat menjadi PGG₂, obat golongan ini juga mempunyai aktifitas analgetik, antipiretik dan hamper semua menyebabkan efek samping gangguan saluran cerna berupa tukak lambung (Ganiswara, 1995).

Natrium diklofenak adalah obat OAINS golongan asam karboksilat kelas asam asetat derivat asam fenil asetat (Wilmana, 2003). Obat ini mempunyai dosis sekali pakai 25 mg atau 50 mg, dengan aturan pakai sampai tiga kali sehari

(Martindale 28th ed., 1982; AHFS Drug Information, 1997). Natrium diklofenak memiliki waktu paruh yang pendek, antara satu sampai dua jam (Martindale 28th ed., 1982). Walaupun waktu paruhnya singkat, diklofenak diakumulasi di cairan synovial yang menjelaskan efek terapi di sendi jauh lebih panjang dari waktu paruh obat tersebut (Wilmana, 2007: 230-246).

Mekanisme kerja obat natrium diklofenak yaitu apabila membran sel mengalami kerusakan terhadap suatu rangsangan kimiawi, fisik, atau mekanis, maka dalam hal ini enzim *fosfolipase* diaktifkan untuk mengubah fosfolipida menjadi asam arakidonat. Asam lemak poli tak jenuh untuk sebagian akan diubah oleh enzim *cyclo-oksigenase* menjadi endoperoksida dan seterusnya menjadi prostaglandin. *Cyclo-oksigenase* terdiri dari dua *iso-enzim*, yaitu COX-1 (*tromboxan* dan *protacyclin*) dan COX-2 (*prostaglandin*). Penghambatan dari COX-2 yang nantinya akan memberikan efek antiradang dari obat NSAID^s, NSAID yang ideal hanya menghambat COX-2 (peradangan) dan tidak COX-1 (perlindungan mukosa lambung) (Tjay dan Rahardja, 2002: 303).

F. Uraian Hewan Uji Coba



Gambar 2. Mencit (*Mus musculus*)

1. Klasifikasi Mencit

Kingdom	: Animalia
Filium	: Chordata
Kelas	: Mamalia
Ordo	: Rudentia

Sub Ordo	: Odontocetia
Familia	: Muridae
Genus	: Mus
Spesies	: <i>Mus musculus</i> (Arrington, 1972).

2. Karakteristik Mencit

Mencit atau *Mus musculus* adalah hewan yang termasuk pada family Muridae merupakan salah satu hewan mamalia yang tergolong hewan polisetrus atau hewan yang siklus reproduksinya dapat berulang-ulang. Siklus pada mencit dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu cahaya, suhu, status nutrisi dan hubungan sosial.

Pertumbuhan mencit tergolong relatif cepat, apalagi pada waktu mencit masih muda sejak terjadinya pembuahan hingga lahir menjadi dewasa. Jika dilihat dari jenis kelamin, pertumbuhan kelamin pada mencit jantan lebih tinggi dibandingkan mencit betina dikarenakan mencit betina konsumsi ransumnya digunakan dalam dewasa kelami (Yuningsih, dkk., 2018).

Sifat biologis atau karakteristik pada mencit yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Mencit

Berat badan	Jantan: 20-40 gram Betina: 18-35 gram
Lama/Harapan hidup	1-3 tahun
Temperatur	36,5° C
Kebutuhan makanan	4-5 gram/hari
Kebutuhan air	<i>Ad libitium</i>
Tipe siklus estrus	Poliestrus
Lama siklus estrus	4-5 hari
Estrus	9-20 jam

Masa Pubertas	28-49 hari
Mekanisme ovulasi	Spontan
Jumlah anak	4-8 ekor
Lama kebuntingan	19-20 Ari

G. Tinjauan Islam dalam Pemanfaatan Hewan

Islam merupakan agama yang ajarannya sangat kompleks dan lengkap yang memberikan petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Seluruh aspek-aspek kehidupan manusia baik aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya dijelaskan dan diatur dalam ajaran Islam yang tertuang pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an maupun hadis.

Kesehatan merupakan salah satu ajaran yang ditekankan dalam ajaran Islam, karena tubuh yang sehat maka manusia akan bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari mereka baik itu bekerja maupun beribada kepada Allah SWT. secara lancar. Meskipun dalam Al-Qur'an kata menjaga kesehatan tidak eksplisit disebutkan, akan tetapi makna dari beberapa ayat Al-Qur'an mengandung penjelasan akan pentingnya menjaga kesehatan. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut salah satunya adalah QS. Al-Baqarah/2:222 sebagai berikut:

..... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۲۲۲

Terjemahnya:

“...Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri”.

Ayat di atas mengandung makna pentingnya menjaga kesehatan dalam Islam. Meskipun kalimat atau kata menjaga kesehatan tidak disebutkan namun Allah SWT. mengisyaratkan bahwa syarat seorang hamba jika ingin dicintai-Nya adalah seorang hamba mampu membersihkan dirinya. Makna dari kata “membersihkan diri” pada ayat di atas adalah bersih badan, pakaian, dan

lingkungan (Andi Muflih, 2013). Jadi dapat disimpulkan menjaga kebersihan adalah salah satu bagian dari ajaran agama Islam.

Sakit merupakan suatu hal yang pasti akan dirasakan oleh setiap manusia, meskipun telah menjaga kebersihan agar terhindar dari sakit. Dalam konsep Islam, sakit atau penyakit merupakan pemberian dari Allah SWT. sebagai bentuk peringatan, ujian, penghapus dosa dan sebagainya. Namun jika seseorang sakit, maka seorang muslim harus sabar dan berikhtiar sambil tetap meyakini bahwa Allah SWT yang memberi penyakit dan menyembuhkan penyakit seseorang. Hal tersebut seperti pada ayat Al-Qur'an Qs. Asy-Syu'ara`/26:80 di bawah ini:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ٨٠

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”.

Ikhtiar ketika seseorang sakit dengan melakukan pengobatan juga merupakan suatu hal yang diajarkan dalam Islam. Nabi Muhammad saw. sebagai suri teladan bagi seorang muslim juga melakukan ikhtiar pengobatan ketika beliau sakit. Ada beberapa metode yang Nabi Muhammad wariskan dalam metode pengobatan yaitu:

1. Melalui doa-doa atau pengobatan dengan wahyu ilahi sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Menggunakan obat-obatan tradisional baik dari tanaman maupun hewan.
3. Kombinasi dari kedua metode di atas (Haris M., 2020).

Penggunaan obat-obatan tradisional yang berasal dari tanaman maupun hewan merupakan metode pengobatan yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad

SAW. Dewasa ini penggunaan obat tradisional dari tanaman maupun hewan masih banyak digunakan oleh masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. Namun sebagai muslim harus memahami bahwa segala sesuatu yang dikonsumsi baik itu makanan, minuman termasuk obat-obatan harus halal hukumnya berdasarkan ajaran Islam.

Obat-obat tradisional yang berasal dari hewan tentunya harus hewan yang tidak diharamkan oleh Allah SWT. karena ada beberapa hewan yang diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi yaitu sebagai berikut:

- a. Hewan babi.
- b. Hewan yang bertaring dan digunakan untuk menyerang mangsa dan beberapa hewan peliharaan seperti singa, serigala, macan, kucing dan anjing.
- c. Binatang yang disembelih yang tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah.
- d. Jallalah yaitu binatang yang memakan kotoran. Namun jika binatang tersebut dijauhkan oleh kotoran dalam waktu yang lama dan diberi makanan yang suci maka akan menjadi baik dan bisa dikonsumsi (Siti S. dan Yuli K, 2005).

Pernyataan di atas sesuai dengan firman Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah/2:173 berikut ini:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah”.

Di sisi yang lain hewan-hewan yang diharamkan di atas, Allah SWT. memberikan pengecualian pada kondisi tertentu dan kondisi terdesak maka hewan yang sebelumnya diharamkan menjadi boleh untuk dimakan. Hal tersebut sesuai

firman Allah SWT. dalam QS. di Al-An'am/6:119 bawah ini:

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُعْتَدِينَ ۱۱۹

Terjemahnya:

“Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”.

Terkait dengan adanya pengecualian terhadap bolehnya mengkonsumsi atau memakan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dalam keadaan darurat, ada beberapa syarat atau batasan kondisi darurat tersebut antara lain:

- 1) Kondisi darurat tersebut memang ada atau nyata serta tidak dibuat-buat, spekulatif dan sebagainya.
- 2) Tidak adanya jalan atau cara lain selain menggunakan sesuatu yang diharamkan tersebut dan jika tidak menggunakannya akan menimbulkan bahaya.
- 3) Harus memenuhi uzur diperbolehkannya melakukan sesuatu yang diharamkan tersebut.
- 4) Tidak menyalahi prinsip dasar Islam.
- 5) Melakukan sesuatu yang haram hanya pada batasan untuk bertahan saja.
- 6) Bertanya kepada ahli agama dan sebagainya yang memiliki ilmu dan dapat dipercaya (Nur Asia H, 2020).

Sebagai hamba dengan anugerah akal pikiran yang sempurna dari-Nya, sudah seharusnya kita untuk terus belajar dan mencari tahu hal-hal baru dari tabir-tabir

yang sebelumnya tidak pernah diketahui agar bisa bermanfaat, dan mengembangkannya demi pemanfaatan positif terhadap umat manusia. Sebab segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT. memiliki manfaat, termasuk hewan. Untuk pemanfaatan hewan tersebut, diperlukan ilmu dan pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen. Salah satunya dalam pemanfaatannya sebagai obat.

Firman Allah SWT. dalam surah An-Nahl/16:8

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٨


Terjemahannya:

“dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat ini menyebutkan salah satu hewan yang paling banyak dimiliki manusia dan paling banyak manfaatnya yaitu Allah SWT. menciptakan kuda, bagal (hewan yang lahir dari kuda dan keledai) dan keledai. Itu semua diciptakan Allah SWT. agar kamu menungganginya dan Allah SWT. menjadikannya sebagai perhiasan dimuka bumi ini. Siapa yang memandang kuda-kuda yang tangguh dan kuat atau hewan lain, maka hatinya akan berdecak kagum karena keindahannya. Dan bukan hanya alat transportasi dan perhiasan tetapi Allah SWT. menciptakan aneka ciptaanNya apa yang kamu tidak mengetahuinya sekarang tetapi kelak akan kamu ketahui dan gunakan jika kamu mau berpikir dan Allah SWT. menciptakan juga apa yang kamu tidak akan mengetahuinya sama sekali hingga ciptaan itu kamu lihat dan ketahui (Hamka, 224).

Ayat ini menyebutkan fungsi ketiga binatang tersebut dalam tunggangan dan hiasan tanpa menyebutnya sebagai alat pengangkut sebagaimana halnya binatang ternak. Ini bukan berarti bahwa ketiga hewan tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengangkut. Ayat ini menguraikan nikmat-nikmat Allah SWT.

yang dirasakan langsung manfaatnya. Selain dapat sebagai alat transportasi, hewan ini dapat dimanfaatkan kulit, daging hingga susunya (Astawan, 2005). Tidak hanya itu bagian dari lemak kuda juga dapat diolah menjadi minyak yang dapat dimanfaatkan sebagai obat penyembuh.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorium.

B. *Tempat dan Waktu Penelitian*

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan laboratorium Biofarmasi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Juni 2022

C. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimental yang berusaha untuk mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya dengan kondisi yang ketat dan terkontrol.

D. *Sampel*

Adapun sampel pada penelitian ini adalah minyak kuda. Sampel yang digunakan berasal dari lemak kuda yang diperoleh dari masyarakat Desa Kampala Kabupaten Jeneponto.

E. *Instrumen Penelitian*

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa instrumen atau alat maupun bahan yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Alat

Alat digunakan yaitu alat refluks, aplikasi SPSS versi 26., batang pengaduk, cawan porselin, erlenmeyer, dot minuman, gelas ukur (*pyrex*), gelas

kimia, *hot plate*, labu alas bulat, kamera, kandang mencit, labu tentukur, masker, penangas, pipet tetes, pletismometer modifikasi air raksa, sarung tangan, timbangan analitik, timbangan hewan, spoit, sonde oral, spidol, spatula, wadah bening, wajan, vial .

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan adalah aluminium foil, aquadest, hewan uji yang digunakan yaitu mencit jantan, minyak kuda dengan dosis 40 mg/kgBB, 50 mg/kgBB, 60 mg/kgBB, karagenin 1%, tablet natrium diklofenak, CMC 0,5%, etanol 70%, n-heksan 500 ml, pakan mencit, sekam.

F. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mendapatkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah minyak kuda. Sampel yang akan digunakan yaitu lemak kuda dari Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto.

Ada dua cara yang akan digunakan pada pengolahan lemak kuda sebagai berikut:

a. Metode Tradisional

Lemak kuda sebanyak 200 gram di ambil dari kuda yang sudah disembelih, kemudian dicuci pada air mengalir sampai bersih. Lemak kuda tersebut disimpan diatas wajan tanpa tambahan bahan lainnya, dipanaskan dengan api kecil sampai lemak tersebut melebur dan mengeluarkan atau menghasilkan minyak.

b. Metode Refluks

Lemak kuda yang diperoleh dipotong dadu, lalu ditimbang sebanyak 200 gram dan dimasukkan kedalam labu alas bulat pada alat refluks. Setelah sampel lemak kuda tersebut dimasukkan kedalam labu alas bulat ditambahkan cairan n-heksan sebanyak 500 ml. Kemudian alat refluks yang sudah dirangkai lalu digunakan untuk memulai penyarian dengan metode refluks terus menerus sampai 3-4 jam dengan suhu 60 derajat. Hasil refluks di ditampung dalam wadah bening, setelah itu ekstrak n-heksan yang diperoleh kemudian diuapkan di alat penangas hingga diperoleh minyak lemak kuda murni.

2. Penyiapan Hewan Uji Coba

Hewan uji coba yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan sebanyak 18 ekor, berat badan 20-30 gram, umur 2-3 bulan. Kondisi hewan sehat. Sebelum melakukan perlakuan terhadap hewan uji coba tersebut, maka mencit yang akan digunakan diaklimatisasi dengan lingkungan tempat penelitian selama 1 minggu. Hal ini dilakukan agar mencit dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Selama proses aklimatisasi, mencit akan diberi makan dan minum sambil dilakukan pengamatan rutin terhadap kondisi mencit tersebut, sehingga mencit yang akan digunakan dalam kondisi yang sehat.

3. Penyiapan Bahan Uji

a. Pembuatan Larutan Koloidal Na-CMC 0,5%.

Sebanyak 0,5 gram Na-CMC dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam gelas kimia 100 ml yang berisi 50 ml aquadest (70°C) sambil diaduk dengan batang pengaduk hingga terbentuk larutan koloidal, lalu volumenya dicukupkan dengan aquadest hingga 100 ml.

b. Pembuatan Suspensi Karagenin 1%

Karagenin 1% diperoleh dengan mensuspensikan 1 gram karagenin dalam

dalam aquadest 50 ml sampai 100 ml dalam gelas kimia.

c. Pembuatan Suspensi Natrium Diklofenak

Sebanyak 10 tablet Natrium Diklofenak (setiap tablet mengandung natrium diklofenak 25 mg) ditimbang, kemudian dihitung bobot total lalu digerus. Natrium diklofenak ditimbang kemudian disuspensikan dengan dalam larutan Na-CMC 0,5% sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga homogen kemudian dimasukkan ke dalam labu tentu ukur 100 ml kemudian volumenya dicukupkan sampai 100 ml.

4. Penetapan Dosis Minyak Kuda

Setelah hewan uji coba dan sampel sudah siap maka selanjutnya adalah melakukan penetapan dosis minyak kuda yang akan digunakan untuk menguji antiinflamasi terhadap hewan uji coba. Adapun dosis atau konsentrasi seperti ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelompok 1: Na-CMC 0,5% (Kontrol negatif)
- b. Kelompok 2: Diberi Natrium Diklofenak dosis 25 mg/70kgBB dalam larutan Na-CMC 0,5% (Kontrol Positif)
- c. Kelompok 3: Diberi minyak kuda 60 mg/kgBB dalam larutan Na-CMC 0,5% (Kontrol Pemanding)
- d. Kelompok 4: Diberi minyak kuda dosis 40 mg/kgBB dalam larutan Na-CMC 0,5% (Dosis I)
- e. Kelompok 5: Diberi minyak kuda dosis 50 mg/kgBB dalam larutan Na-CMC 0,5% (Dosis II)
- f. Kelompok 6: Diberi minyak kuda dosis 60 mg/kgBB dalam larutan Na-CMC 0,5% (Dosis III)

*Setiap perlakuan pada mencit diinduksi karagenin 1% sebanyak 0,1 ml

5. Uji antiinflamasi

Setelah proses persiapan di atas selesai maka proses selanjutnya adalah pengujian antiinflamasi minyak kuda tersebut terhadap hewan uji coba mencit.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Mencit dipuasakan ± 18 jam sebelum pengujian dilakukan. Akan tetapi mencit masih tetap diberikan air minum.
- b. Mencit kemudian ditimbang dan diberi kode tertentu.
- c. Kaki setiap mencit akan diberi tanda sebatas mata kaki agar perlakuan pada kaki mencit selalu sama.
- d. Sebelum perlakuan, volume kaki mencit akan diukur dan dinyatakan sebagai volume kaki dasar (V_0).
- e. Pada mencit kontrol negatif akan diberikan larutan Na-CMC 0,5%, sedangkan pada kontrol positif diberi natrium diklofenak dosis 25 mg/70kgBB, untuk kontrol pembanding diberi minyak kuda metode tradisional dan tiga kelompok mencit lainnya diberikan dosis sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
- f. Setelah itu, semua mencit akan disuntikkan suspensi karagenin 1% pada telapak kaki sebanyak 0,1 ml. Proses ini akan dilakukan secara subplantar. Namun sebelum proses penyuntikan dimulai, maka telapak kaki setiap mencit akan dibersihkan dengan etanol 70%.
- g. Setelah 1 jam kemudian, volume kaki mencit kemudian akan diukur kembali menggunakan alat pletismometer setiap 1 jam selama 6 jam dan dinyatakan sebagai volume kaki akhir (V_t).
- h. Setelah itu akan dihitung persen udem dan persen inhibisi dengan menggunakan cara sebagai berikut:

$$\% \text{ uдем} = \frac{V_t - V_o}{V_o} \times 100$$

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{a - b}{a} \times 100$$

Keterangan:

- V_t : Volume akhir telapak kaki mencit pada waktu t
 V_o : Volume awal telapak kaki mencit sebelum perlakuan apapun.
 a : % uдем pada kontrol negatif
 b : % uдем pada kontrol positif

G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisa data yang diperoleh diolah secara statistik dengan menggunakan program SPSS. Data yang diperoleh dilakukan *kolmogorov-smirnov* untuk melihat normalitas data dan uji *Levene* untuk melihat homogenitas data. Data yang terdistribusi normal dan homogen diuji menggunakan analisis varians (ANOVA) satu arah dengan taraf kepercayaan 95% untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan antar kelompok.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstraksi Lemak Kuda

Tabel 2. Hasil Ekstraksi Lemak Kuda

No	Sampel	Berat Sampel	Berat Ekstrak	Volume n-Heksan	Lama Refluks
1	Lemak kuda	200 gram	50,13 gram	1 liter	3-4 jam

2. Data Pengukuran Volume Udem

Tabel 3. Penurunan volume udem telapak kaki mencit yang diberi perlakuan

Perlakuan	Hewan Uji	Pengukuran Volume Udem (ml)							
		Awal	Induksi karagenan	Jam ke-1	Jam ke-2	Jam ke-3	Jam ke-4	Jam ke-5	Jam ke-6
Na-CMC	1	0.2	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37
	2	0.22	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
	3	0.2	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37
Rata-Rata dan SD		0.21	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
		0.012	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.012
Natrium Diklofenak	1	0.2	0.37	0.38	0.36	0.34	0.31	0.28	0.25
	2	0.24	0.36	0.38	0.35	0.33	0.3	0.28	0.26
	3	0.21	0.36	0.37	0.35	0.34	0.32	0.3	0.28
Rata-Rata dan SD		0.22	0.36	0.38	0.35	0.34	0.31	0.29	0.26
		0.021	0.006	0.006	0.006	0.006	0.010	0.012	0.015
Minyak Kuda 40 mg	1	0.2	0.37	0.39	0.38	0.36	0.34	0.3	0.27
	2	0.2	0.35	0.37	0.35	0.33	0.32	0.29	0.27
	3	0.2	0.35	0.36	0.35	0.32	0.3	0.29	0.28
Rata-Rata dan SD		0.20	0.36	0.37	0.36	0.34	0.32	0.29	0.27
		0.000	0.012	0.015	0.017	0.021	0.020	0.006	0.006
Minyak Kuda 50 mg	1	0.24	0.37	0.38	0.36	0.34	0.31	0.28	0.27
	2	0.2	0.34	0.36	0.35	0.32	0.3	0.28	0.26
	3	0.22	0.38	0.39	0.37	0.34	0.3	0.27	0.26
Rata-Rata dan SD		0.22	0.36	0.38	0.36	0.33	0.30	0.28	0.26
		0.020	0.021	0.015	0.010	0.012	0.006	0.006	0.006
Minyak Kuda 60 mg	1	0.2	0.36	0.38	0.36	0.32	0.3	0.28	0.25
	2	0.21	0.36	0.37	0.34	0.31	0.28	0.26	0.25

	3	0.2	0.33	0.37	0.36	0.34	0.3	0.27	0.24
Rata-Rata dan SD		0.20	0.35	0.37	0.35	0.32	0.29	0.27	0.25
		0.006	0.017	0.006	0.012	0.015	0.012	0.010	0.006
Kontrol Pembeding 60 mg	1	0.24	0.38	0.39	0.37	0.36	0.32	0.29	0.28
	2	0.2	0.33	0.35	0.34	0.31	0.29	0.28	0.26
	3	0.2	0.33	0.34	0.31	0.3	0.27	0.25	0.24
Rata-rata dan SD		0.21	0.35	0.36	0.34	0.32	0.29	0.27	0.26
		0.023	0.029	0.026	0.030	0.032	0.025	0.021	0.020

Tabel 4. Hasil pengukuran rata-rata persentase udemata telapak kaki mencit selama 6 jam

Kelompok	Rata-rata Persen (%) Udemata dan SD Jam ke-						Nilai P<0.05
	1	2	3	4	5	6	
KN (Na-CMC 0.5%)	87.42	85.76	85.76	85.76	85.76	82.42	0.000
	9.142	7.35	7.35	7.35	7.35	4.463	
KP(Na-diklofenak 7,13 mg/kgBB)	74.84	63.89	56.47	42.54	33.17	22.22	
	15.878	17.664	16.918	15.63	14.369	12.73	
Dosis 1 (40 mg/kgBB)	86.67	80	68.33	60	46.67	36.67	
	7.64	8.66	10.41	10	2.89	2.89	
Dosis 2 (50 mg/kgBB)	71.87	64.39	52.07	38.51	26.46	20.23	
	11.8	12.92	9.42	10.58	12.11	8.93	
Dosis 3 (60 mg/kgBB)	83.73	73.97	59.2	44.44	32.93	21.35	
	6.99	10.45	11.22	9.62	8.3	3.2	
Pembeding (60 mg/kgBB)	69.17	59.72	51.67	37.78	28.61	22.22	
	6.29	8.91	2.89	6.31	10.08	6.94	

Tabel 5. Hasil Pengukuran rata-rata persentase inhibisi radang setiap jam

Kelompok	Rata-Rata Persentase (%) Inhibisi Udema Jam ke-					
	1	2	3	4	5	6
KP(Na-diklofenak 7,13 mg/kgBB)	14.39	25.5	34.15	50.39	61.32	70.61
Dosis 1 (40 mg/kgBB)	0.85	6.71	20.32	30.03	45.58	55.5
Dosis 2 (50 mg/kgBB)	17.78	24.91	39.28	55.09	69.14	75.45
Dosis 3 (60 mg/kg BB)	4.22	13.74	30.97	48.18	61.6	74.09
Pembanding (60 mg/kgBB)	20.87	30.36	39.75	55.94	66.63	73.04

Tabel 6. Hasil Uji Statistik *Tukey HSD*

Pembanding	Kelompok	Rata-Rata	Nilai P<0.05
Na-CMC 0.5%	Natrium Diklofenak	27.09*	0.000
	Minyak Kuda 40 mg/kgBB	17.87*	0.016
	Minyak Kuda 50 mg/kgBB	35.34*	0.000
	Minyak Kuda 60 mg/kgBB	28.32*	0.000
	Sampel Pembanding	36.07*	0.000
Natrium Diklofenak	Minyak Kuda 40 mg/kgBB	9.22	0.640
	Minyak Kuda 50 mg/kgBB	8.24	0.741
	Minyak Kuda 60 mg/kgBB	1.23	1.000
	Sampel Pembanding	8.97	0.666

B. Pembahasan

Pada penelitian ini menggunakan sampel lemak kuda (*Equus caballus*), dimana lemak kuda ini diekstraksi menggunakan metode refluks dengan penyari n-heksan. Alasan digunakan n-heksan karena n-heksan merupakan pelarut yang paling mudah dalam mengangkat minyak yang terkandung dalam lemak dan mudah menguap, sehingga memudahkan dalam proses refluks, n-heksan juga

bersifat nonpolar sehingga dapat melarutkan lemak karena memiliki polaritas yang sama. Pelarut ini memiliki titik didih antara 65–70. Proses ekstraksi yang digunakan adalah metode refluks karena pada metode ini memberikan hasil ekstrak yang lebih tinggi dan pada proses pemanasan diduga dapat memperbaiki kelarutan ekstrak. Pada penelitian ini, sebanyak 200 gram sampel lemak kuda dimasukkan dalam labu alas bulat kemudian ditambahkan cairan penyari n-heksan sebanyak 500 ml lalu dipasang labu alas bulat pada refluks yang telah dihubungkan dengan kondensor kemudian dipanaskan sampel selama 3-4 jam, terakhir ekstrak yang diperoleh ditampung dalam wadah bening lalu diuapkan pada alat penangas.

Pada penelitian ini dilakukan uji antiinflamasi minyak kuda terhadap mencit. Pengujian antiinflamasi dilakukan dengan menggunakan metode induksi karagenan. Metode ini termasuk metode yang digunakan dalam pengujian antiinflamasi akut yang telah banyak digunakan, memiliki keuntungan yaitu pengerjaan yang mudah, tidak menyebabkan kerusakan jaringan, bersifat *irreversible* dalam kurung waktu 24 jam, tidak bersifat antigenik dan tidak menimbulkan efek sistemik. (Nile, *et al.*, 2013).

Udem adalah salah satu gejala adanya inflamasi. Inflamasi merupakan bagian dari mekanisme pertahanan tubuh atau suatu proses system kekebalan tubuh mengenali dan menghilangkan senyawa asing yang berbahaya seperti patogen, sel yang rusak, senyawa beracun atau iradiasi dan memulai proses penyembuhan (Da Silva *et al.*, 2019). Inflamasi dapat dikategorikan menjadi dua sifat yaitu akut dan kronis, ditandai dengan timbulnya kemerahan, pembengkakan, rasa nyeri yang mengganggu dan hilangnya fungsi dari jaringan. (Zhang *et al.*, 2019).

Gejala-gejala terjadinya respons peradangan yaitu kemerahan (rubor), Panas (kalor), Rasa sakit (dolor), Pembengkakan (tumor) dan Perubahan fungsi (functio laesa). kemerahan biasanya merupakan hal pertama yang terlihat di daerah yang mengalami peradangan, panas terjadi bersamaan dengan kemerahan dari reaksi peradangan. Panas merupakan sifat reaksi peradangan yang hanya terjadi pada permukaan tubuh yakni kulit. Daerah peradangan pada kulit menjadi lebih panas dari sekelilingnya, sebab darah dengan suhu 37°C yang disalurkan tubuh ke permukaan daerah yang terkena radang lebih banyak disalurkan daripada ke daerah normal. Gangguan fungsi merupakan konsekuensi dari suatu proses radang. Gerakan yang terjadi pada daerah radang, baik yang dilakukan secara sadar ataupun secara reflek akan mengalami hambatan oleh rasa sakit, pembengkakan yang hebat secara fisik mengakibatkan berkurangnya gerak jaringan. Pada waktu reaksi peradangan mulai timbul maka arteri yang mensuplai darah ke daerah tersebut melebar, dengan demikian lebih banyak darah mengalir kedalam mikrosirkulasi lokal. Pembuluh-pembuluh darah yang sebelumnya kosong dan sebagian saja yang meregang dengan cepat dan terisi penuh oleh darah. Panas (kolor), terjadi bersamaan dengan kemerahan dari reaksi peradangan. Rasa sakit (dolor) terjadi karena pelepasan mediator-mediator inflamasi yaitu histamin, kinin, dan prostaglandin. Pembengkakan atau tumor terjadi karena adanya peningkatan permeabilitas dinding kapiler serta pengiriman cairan serta sel-sel dari sirkulasi daerah ke jaringan yang cedera. Pada peradangan, dinding kapiler tersebut menjadi lebih permeabel dan lebih mudah dilalui oleh leukosit dan protein terutama albumin, yang diikuti oleh molekul yang lebih besar sehingga plasma jaringan mengandung lebih banyak protein daripada biasanya yang kemudian meninggalkan kapiler dan masuk kedalam jaringan sehingga menyebabkan jaringan menjadi bengkak (Rizky dan Sry Rezeky, 2020)

Karagenan merupakan hidrokolid yang diperoleh dari ekstraksi beberapa spesies dari kelas *Rhodophyceae* (rumput laut merah) dengan air atau larutan alkali. Beberapa kandungan utama dari karagenan yaitu kalium, natrium, kalsium, magnesium, ammonium ester sulfat galaktosa dan kopolimer 3,6-anhidrogallaktosa. Karagenan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu karagenan kappa, iota dan lambda. Bentuk fisik karagenan berupa serbuk kasar berwarna kuning-coklat hingga tidak berbau dan berasahambar . (Necas dan Bartosikova, 2013).

Karagenan sebagai penginduksi udem merupakan turunan polisakarida yang diekstraksi dari rumput laut family *Euchema*, *Chondrus*, dan *Gigartina*. Karagenan sebagai senyawa iritan menginduksi terjadinya cedera sel melalui pelepasan mediator yang mengawali proses terjadinya inflamasi. Pada saat terjadi pelepasan mediator inflamasi terjadi udem maksimal dan bertahan beberapa jam. Mediator yang dimaksud adalah histamin, serotonin dan bradikinin. (Necas dan Bartosikova, 2013).

Gejala utama inflamasi langsung terlihat seketika saat penyuntikan karagenan dilakukan. Gejala tersebut antara lain edema, hyperalgesia dan erythema. Edema yang disebabkan oleh induksi karagenan dapat bertahan selama 5 jam kemudian berangsur-angsur berkurang dalam waktu 24 jam. Penggunaan karagenan sebagai penginduksi memiliki beberapa keuntungan,yaitu tidak meninggalkan bekas, tidak menimbulkan kerusakan jaringan dan memberikan respon yang lebih peka terhadap obat antiinflamasi dibanding senyawa iritan lainnya (Fehrenbacher *et al.*, 2012).

Karagenan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karagenan jenis kappa dengan konsentrasi 1% dan volume penyuntikan 0,1 ml.

Inflamasi pada sendi biasanya diobati dengan obat antiinflamasi nonsteroid (AINS). Salah satu contoh golongan obat AINS yang banyak digunakan dalam

pengobatan antiinflamasi adalah natrium diklofenak. Obat ini mempunyai daya untuk menghambat enzim siklooksigenase. Natrium diklofenak mempunyai efek yang cepat dalam menghilangkan inflamasi (peradangan) tetapi juga mempunyai resiko efek samping yang berbahaya, antara lain menimbulkan gangguan pada saluran cerna, sistem sirkulasi tubuh, saluran pernafasan, proses metabolik, dan hipersensitivitas (Fridiana,2012).

Penelitian ini menggunakan natrium diklofenak sebagai kontrol positif. Natrium diklofenak merupakan antiinflamasi nonsteroid dari derivat fenil asetat yang mempunyai efek farmakologi menghambat sintesis prostaglandin. Natrium diklofenak dipilih karena metabolitnya dapat mencapai konsentrasi yang cukup tinggi pada peradangan (Zahara dan Saputri, 2013).

Penelitian ini menggunakan sampel dengan dua metode yaitu, sampel minyak kuda dengan metode tradisional yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jeneponto dan sampel minyak kuda dengan metode refluks.

Pada penelitian ini, pengujian antiinflamasi dilakukan dengan menggunakan mencit (*Mus musculus*) jantan sebagai hewan uji karena mencit jantan kondisi biologisnya stabil bila dibandingkan dengan mencit betina yang kondisi biologisnya dipengaruhi oleh masa siklusnya (estrus). (Yasinta *et al.*, 2017). Pengujian antiinflamasi pada mencit berdasarkan metode *Rat hind paw edema*, yaitu pembengkakan radang buatan pada telapak kaki kiri mencit yang diinduksi karagenan.

Sebelum dilakukan perlakuan, masing-masing mencit dipuasakan kurang lebih 18 jam. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengaruh makanan terhadap kandungan bahan berkhasiat pada sampel minyak kuda yang dapat mempengaruhi efek antiinflamasi. Kemudian ditimbang berat badan hewan uji, untuk mengetahui volume pemberian obat yang sesuai. Sebelum kaki hewan uji di

ukur, diberi tanda terlebih dahulu pada batas mata kaki untuk memudahkan pengukuran volume pada kaki dan agar setiap kali pemasukan kaki ke dalam raksa selalu sama. Lalu diukur volume kaki kiri mencit dengan menggunakan pletismometer modifikasi raksa, untuk mengetahui volume awal kaki mencit. Prinsip dari pletismometer pengukuran berdasarkan hukum Archimedes, yang menyatakan bahwa apabila benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka akan menimbulkan gaya atau tekanan ke atas (Necas, 2013). Kemudian diberi perlakuan sesuai dengan dosis yang telah ditentukan yaitu ekstrak minyak kuda dosis 40 mg/kgBB, 50 mg/kgBB, 60 mg/kgBB, sampel pembanding, kontrol positif dan kontrol negatif sesuai kelompok perlakuannya. Setelah itu, tiap kelompok perlakuan diinduksi karagenan dengan cara disuntikkan secara subplantar dengan volume 0,1 ml. Beberapa saat setelah diinduksi karagenan, volume kaki mencit diukur sebagai volume kaki induksi, dan selanjutnya diukur setiap 1 jam selama 6 jam.

Pada tabel 3. merupakan data pertama yang didapatkan dari pengujian ini yaitu hasil pengukuran volume edema telapak kaki mencit baik sebelum diinduksi dan setelah diinduksi karagenan. Pengukuran volume edema kaki mencit dilakukan selama 6 jam untuk melihat kenaikan volume telapak kaki mencit setelah diinduksi karagenan. Pada tabel 3. dapat dilihat adanya peningkatan volume edema yang berbeda-beda pada setiap kelompok. Peningkatan volume edema kaki mencit pada kontrol negatif berbeda dengan kelompok uji yang lain. Kelompok kontrol negatif merupakan kelompok yang hanya diberikan Na-CMC 0,5% yang diberikan secara peroral. Volume edema kelompok kontrol negatif mengalami peningkatan dari jam ke-1 sampai jam ke-5, dan mengalami penurunan pada jam ke-6. Hal tersebut dapat disebabkan karena tidak ada efek penghambatan radang yang dihasilkan oleh Na-CMC 0,5%. Hal ini karena Na-

CMC hanya sebagai pelarut media obat sehingga tidak ada rangsangan berupa obat untuk mengurangi edema sehingga edema akan terus meningkat dan proses penghilangan mediator-mediator inflamasi dalam tubuh mencit hanya terjadi secara ilmiah.

Sementara pada kelompok kontrol positif dan uji dosis 40 mg/kgBB, 50 mg/kgBB, 60 mg/kgBB dan sampel pembanding mengalami peningkatan volume edema hanya pada jam ke-1, dan mengalami penurunan volume edem dari jam ke-2 setelah induksi sampai jam ke-6.

Dari data volume edema dapat dihitung nilai persentase edema. Nilai dari persentase akan menghasilkan besarnya edema yang terbentuk pada telapak kaki mencit yang diinduksi karagenan. Nilai persentase edema dapat dihitung dengan rumus : $(V_t - V_0) / V_0 \times 100$, dimana V_t adalah volume edema yang diukur selama 6 jam (setiap jam) setelah diinduksi karagenan, dan V_0 adalah volume awal kaki mencit sebelum diinduksi karagenan (Sweathy *et al.*, 2010).

Dari tabel 4. dapat dilihat bahwa kelompok kontrol negatif memiliki persentase edema terbesar dibandingkan dengan kelompok uji lainnya. Pada kontrol negatif edema terbentuk maksimal dari jam ke-1 sampai dengan jam ke-5. Hal ini menunjukkan bahwa karagenan 1% dengan volume penyuntikan 0,1 ml merupakan agen penginduksi radang yang baik dan dapat menimbulkan peradangan yang signifikan atau berbeda.

Berdasarkan uji statistik ANOVA ($p < 0.05$) dilanjutkan dengan uji *Tukey HSD* didapatkan bahwa kelompok ekstrak minyak kuda dengan dosis 40 mg/kgBB, 50 mg/kgBB, 60 mg/kgBB, sampel pembanding dan kelompok natrium diklofenak berbeda signifikan dengan kelompok kontrol negatif Na-CMC 0.5% dengan nilai ($p < 0.05$). Kelompok perlakuan ekstrak minyak kuda dengan dosis 40 mg/kgBB, 50 mg/kgBB, 60 mg/kgBB, dan sampel pembanding tidak berbeda

signifikan dengan suspensi natrium diklofenak ($p < 0.05$).

Dalam pengujian antiinflamasi besarnya nilai penghambatan edema yang dihasilkan oleh senyawa uji disebut sebagai persen inhibisi edema atau radang. Persentase inhibisi radang dapat dihitung menggunakan rumus: $(a-b)/a \times 100$, dimana a merupakan rata-rata persentase edem atau radang kelompok kontrol negatif dan b merupakan rata-rata persentase edema atau radang kelompok uji (Kalabharathi *et al.*, 2011).

Berdasarkan hasil perhitungan persentase inhibisi radang yaitu dapat dilihat pada tabel 4. Kelompok uji yang memiliki persen inhibisi terbesar adalah uji dosis 2 (50 mg/kgBB) yaitu sebesar 75,45% pada jam ke-6, uji dosis 3 sebesar 74,09%, kontrol pembanding sebesar 73,04% dan kontrol positif sebesar 70,61%. Daya hambat edema dosis 2 (50 mg/kgBB) dari jam ke-2 sampai jam ke-5 hampir sama dengan kontrol positif. Dibandingkan dengan dosis 2 (50 mg/kgBB), dosis uji 1 (40 mg/kgBB) memiliki persen inhibisi radang paling kecil yaitu sebesar 0,85% pada jam ke-1 dan jam ke-2 sebesar 6,71%. Selanjutnya pada kontrol pembanding mampu menghambat edema sebesar 73,04% pada jam ke-6 dan 66.63% pada jam ke-5.

Berdasarkan data persen inhibisi radang, besarnya kemampuan ekstrak minyak kuda dalam menghambat edem bergantung pada dosis. Artinya, dosis yang berbeda akan menghasilkan efek antiinflamasi yang berbeda. Dari data persen inhibisi edema, dapat ditarik kesimpulan bahwa dosis 50 mg/kgBB merupakan dosis uji yang efektif atau memiliki kemampuan menghambat edema yang paling tinggi pada jam ke-3 dan jam ke-4, tidak jauh berbeda dengan dosis ekstrak pembanding dan kontrol positif.

Berdasarkan uji statistik ANOVA didapatkan nilai yang signifikan yaitu $p = 0.000$ ($p < 0.05$), hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang bermakna,

kemudian dilanjutkan uji beda rata-rata *Tukey HSD*, pada table 6 menunjukkan suspensi natrium diklofenak, ekstrak minyak kuda dosis 40 mg/kgBB, 50 mg/kgBB, 60 mg/kgBB, dan sampel pembanding menunjukkan perbedaan signifikan pada kontrol negatif yaitu Na-CMC 0.5% dengan nilai ($p < 0.05$). Pada kontrol positif dengan kelompok uji dan sampel pembanding tidak berbeda signifikan ($p > 0.05$) yaitu pada dosis 40 mg/kgBB nilai $p = 0.640$, dosis 50 mg/kgBB nilai $p = 0.741$, dosis 60 mg/kgBB nilai $p = 1.000$, sampel pembanding nilai $p = 0.666$. Hal ini menunjukkan bahwa, pada kandungan minyak kuda terkandung senyawa yang mempunyai efek antiinflamasi, kandungan itu adalah omega 3. Omega 3 merupakan asam lemak tak jenuh (*Polyunsaturated Fatty Acids*). Kandungan utama yang terkandung pada omega 3 yaitu α -linolenat, (ALA), asam eikosapentaenoat (EPA), dan asam docosahexaenoic (DHA) (Baker *et al.*, 2016). Omega tiga terkenal dengan kandungan antiinflamasi (Gammone *et al.*, 2019). suplementasi omega 3 juga ditunjukkan untuk mengurangi nyeri (Black *et al.*, 2018). Omega 3 mempengaruhi respons imun, sebagian dengan memengaruhi sekresi sitokin dengan menurunkan sekresi TNF- α (Morin *et al.*, 2017). Mekanisme kerja omega 3 dalam proses inflamasi yaitu selama proses inflamasi akut, kejadian interaksi seluler dan molekuler secara efisien meminimalkan cedera atau infeksi yang akan terjadi. Proses ini berkontribusi pada pemulihan homeostatis jaringan dan resolusi peradangan akut. Namun peradangan akut yang tidak terkontrol dapat menjadi kronis dan berkontribusi terhadap berbagai penyakit radang kronis (Zhou, Hong and Huang, 2016). Mekanisme yang memungkinkan asam lemak omega 3 meningkatkan miogenesis. Salah satu jalur melibatkan *Peroxisome proliferator-activated receptor* (PPAR), Dimana merupakan kelompok reseptor yang memiliki karakteristik untuk mencegah gangguan metabolisme, mendorong adaptasi pada otot rangka (Deng *et al.*,

2016).

Tahap akhir dari penelitian ini adalah analisa data secara statistik. Adapun data yang dianalisa secara statistik adalah data persentase udema (Umar *et al.* 2012). Langkah pertama dilakukan pengujian *kolmogorov-smirnov* untuk melihat normalitas data, dan uji *levene* untuk melihat homogenitas data. Dari data pengujian tersebut disimpulkan bahwa data persentase udema terdistribusi normal dan terdistribusi secara homogen. Langkah selanjutnya adalah pengujian data menggunakan ANOVA. Syarat uji ANOVA adalah data harus terdistribusi normal dan homogen. Hasil uji ANOVA menunjukkan persentase udema seluruh kelompok dari jam ke-1 hingga jam ke-6 berbeda secara signifikan ($p \leq 0.05$).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ekstrak minyak kuda dari dua metode mempunyai efek antiinflamasi pada dosis 40 mg/kgBB, 50 mg/kgBB, 60 mg/kgBB, dan sampel pembanding 60 mg/kgBB terhadap mencit jantan.
2. Ekstrak minyak kuda dengan dosis 50 mg/kgBB dan sampel pembanding memberikan efek antiinflamasi paling baik dibandingkan dengan kontrol positif.

B.saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait efek yang lain dari minyak kuda.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut uji antiinflamasi dengan menggunakan variasi dosis yang berbeda.
3. Perlu dilakukan pengujian secara *in-vitro*

DAFTAR PUSTAKA

- Arrington. *Inroductory Laboratory Animal: The Breeding Care and Management of Experimental Animal Science*. New York: The Interstate Printers and Publishing, 1972.
- Anwar K, Santoso BH, C. N. 2013. Penghambatan Radang Infusa Daun Dadap Ayam (*Erythrina veriegale L.*) pada mencit jantan yang diinduksi karagenin. Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung., pp. 45–52.
- Champe PC, R. A. 2008. Farmakologi Ulasan Bergambar. Jakarta : EGC.
- Da Silva, D. M., Langer, H., & Graf, T. (2019). *Inflammatory and molecular pathways in heart failure-ischemia, HFpEF and transthyretin cardiac amyloidosis*. *International Journal of Molecular Sciences*, 20(9). <https://doi.org/10.3390/ijms20092322>
- Ditjen POM. Farmakope Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta :Departemen Kesehatan RI. 1979.
- Ditjen POM. Farmakope Indonesia. Edisi IV. Jakarta : Departemen Kesehatan RI. 1995.
- Dorland, W.A.N. Kamus Kedokteran Dorland Edisi 29. Jakarta: EGC. 2002.
- Eliana dan Sri Sumiati. Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.
- Eva Meltyza, dkk. 2014. Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Srikaya (*Annonasquamosa L*) Pada Mencit Putih Jantan (*Mus Musculus*) Yang Diinduksi Karagenin.
- Fehrenbacher, J. C., Vasko, M. R., & Duarte, D. B. (2012). *Models of inflammation: Carrageenan- or unit 5.4 complete freund's adjuvant (CFA)-induced edema and hypersensitivity in the rat*. *Current Protocols in Pharmacology*, <https://doi.org/10.1002/0471141755.ph0504s56>
- Fitzgerald, Garret A. And Carlo Patrono. The Coxib, Selective Inhibitors of Cyclooxygenase-2. N Engl J Med. 2001.
- Fridiana. Uji Antiinflamasi Ekstrak Umbi Rumput Teki Pada Kaki Tikus Galur Wistar Jantan yang Diinduksi Karagen. Skripsi. Universitas Jember (2012).
- Gunawan Sulistia Gan., Farmakologi dan Terapi. Edisi 5. Jakarta: Bagian Farmakologi FK UI. 2007. hal. 210-229
- Handayani, Sri. Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Harborne, J.B. Metode Fitokimia. Bandung : ITB.1987.
- Katno. *Tingkat Manfaat, Keamanan dan Efektivitas Tanaman Obat dan Obat Tradisional*. Karanganyar: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan RI, 2005.
- Katzung, B. G., dan Trevor, A. J., Buku Bantu Farmakologi. Diterjemahkan oleh Staf Pengajar, Laboratorium Farmakologi, Fakultas Kedokteran Cetakan I, Penerbit Buku Kedokteran Universitas Sriwijaya, EGC, Jakarta.2004. Hal 227.

- Katzung, B. G., Basic and clinical pharmacology, diterjemahkan oleh bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Edisi 8, Buku 3. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2001. hal. 449-462, 637.
- Katzung, B.G. Farmakologi dasar dan klinik. Buku II Edisi VIII. Jakarta : Salemba Medika, 2002. Hal 537-539.
- Katzung, B.G. Farmakologi Dasar dan Klinik Edisi VIII. Alih Bahasa: Dripta Sjabana dkk. 1998.
- Kee dan Hayes. Farmakologi Pendekatan Proses Keperawatan. Terj. Peter Anugrah, Jakarta: EGC, 1996.
- Lands, W.E. Mechanisms of Action of Antiinflammatory Drugs, *Advances in Drug Research*. 1985. hal 114, 148-163.
- Ledy L.P. Uji Aktivitas Antiinflamasi Minyak Ikan pada Tikus (*Rattus Novergicus L*) pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar yang Diinduksi Karagenan. *Jurnal Sains Farmasi*. 2020.
- M., Yuningsih, dkk. "Profile of Growth and Percentage of Organ Weight Internal Mice (*Mus musculus L.*) Male Giving Moringa Leaf Extract (*Moringa olifera Lamk.*). *Biotropikal Sains* 15, no. 1 (2018).
- Mansjoer, S. Mekanisme Kerja Obat Antiradang. Jakarta : Media Farmasi Indonesia. 1999.
- Marison, Moya J. Manajemen Luka. Jakarta: EGC, 2004.
- Maswarni dan Nofiar Rachman. *Kuda: Manajemen Pemeliharaan dan Pengembalian*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2014.
- Morris, C.J. *Carrageenan-Induced Paw Edema in the Rat and Mouse. Methods Mol Biol*. 2003. 225:115-21.
- Muflih, Andi. "Pengobatan dalam Islam", *Thesis*. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2013.
- Mustaqim, Abdul. "Etika Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dalam Perspektif Al-Qur'an". *Hermeneutik* 9, no. 2 (2015).
- Mycek, Mary J. Farmakologi Ulasan Bergambar. Jakarta: Widya Medika. 2001.
- N., Richard dan Vinay K. Buku Saku Dasar Patologis Penyakit. Jakarta: EGC, 2008.
- N., Haris Munandar. Farmasi dalam Perspektif Islam. Medan Manhaji, 2020.
- Necas, J., & Bartosikova, L. (2013). *Carrageenan: A review. Veterinarni Medicina*, 58(4), 187– 205. <https://doi.org/10.17221/6758-VETMED>
- Necas, J., Bartosikova, L. (2013). *Carrageenan: a review*, Faculty of Medicine and Dentistry. Palacky University. Olomouc. Czech Republic: *Veterinarni Medicina*. 58 (4): 187-205.
- Ngatijan. Metode Laboratorium dalam Toksikologi. Petunjuk Laboratorium, PAU Bioteknologi. Yogyakarta : UGM. 1991. hal. 13
- Nogrady, T. Kimia Medicinal: Pendekatan Secara Biokimia. Bandung. ITB. 1992.
- P., Rimadani dkk., "Tingkat Pengetahuan dan Penggunaan Obat Tradisional di Masyarakat: Studi Pendahuluan Pada Masyarakat di desa Hegarmanah, Jatinagor, Sumedang", *Dhamakarya* 7, no. 2 (2018).

- Pamudji G. Petunjuk Praktikum Farmakologi. Surakarta : Bagian Farmakologi Universitas Setia Budi. 2003. hal 29.
- Price, A. dan Wilson, L. Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-prose Penyakit. Edisi 4. Cetakan Pertama. Jakarta Penebit Buku Kedokteran EGC. 1995. hal 35-50.
- Priyanto. Farmakoterapi dan Terminologi Medis. Leskonfi: Depok. 2009.
- Purnama, Handi., dkk. "Review Sistematis, Penyembuhan dan Perawatan Luka",.
- R, Sjamsuhidajat dan Wim De Jong, Buku Ajar Ilmu Bedah. Jakarta: EGC, 2011.
- Radiopetra. *Zoologi*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Rizky, K. P., dan Sry, R. 2020. Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Srikaya (*Annonasquamosa L*) Pada Mencit Putih Jantan (*Mus Musculus*) Yang Diinduksi Karagenin. *Indonesia Jurnal*.
- Rowe, R.C., Paul, J.S., and Marian, E.Q. Handbook of Pharmaceutical Excipients. London: Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. 2009. hal. 1198.
- Siswanto, A., & Nurulita, N. A. (2005). Daya antiinflamasi daun mahkota dewa (*phaleria macrocarpa(scheff.) Boerl*) pada tikus putih jantan. *PHARMACY*, 3(1)
- Smith dan Mangkoewidjojo. Pemeliharaan, Pembiakan dan Penggunaan Hewan Percobaan pada Daerah Tropis, Universitas Indonesia, Jakarta. 1988. hal 18
- Soehardjono. *Kuda*. Jakarta: Yayasan Pamulang Equistian Centre, 1990.
- Subagyo, R. L. Pemilihan NSAID Untuk Berbagai Situasi Klinik. [online]. <http://www.pabmi.Com> [8 Januari 2016]. 2004.
- Sugiyanto. Petunjuk Farmakologi. Adisi IV. Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.1995. hal 19
- Suharjana. "KebiasaanPerilaku Hidup Sehat dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter". *Pendidikan Karakter* 2, no. 2 (2012).
- Sulaekhah, Siti dan Yuli K. "Halal dan Haram Makanan dalam Islam". *Suhuf* 18, no. 1 (2005).
- Tjay, T. H., dan Raharja.,Obat – Obat Penting. Khasiat, penggunaan dan efek–efek sampingnya, edisi V, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. 2002. hal 303-314.
- Vogel, H. G., Drug Discovery dan Evaluation : Pharmacological Assays, 2nd Edition. New York : Springer. 2002. hal 669-691, 725, 751-761.
- W., I Made Sukma. Perawatan Luka dengan Pendekatan Multidisiplin.
- Wibowo. Somekto & Abdul Gofur.; Farmakoterapi dan Neurologi. Yogyakarta: Salemba Medika. 2001.
- Widowati, dkk. "Motivasi Belajar dan Sumber-Sumber Informasi Tentang Kesehatan". *Gizi Klinik Indonesia* 4, no. 2 (2007).
- Wilmana, P.F., dan Sulistia G.G. Analgesik-Antipiretik Analgesik AntiInflamasi non steroid dan Obat Pirai. Dalam: Sulistia G.G. Farmakologi dan Terapi. Edisi 5. Jakarta : Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas

- Indonesia. 2007. Hal. 230-246, 500-506.
- Winter, C.A., Risley, E.A., dan Nuss, G.W., Carrageenin - induced Udem in Hind Paw of the Rat as an Assay for Antiinflammatory Drugs. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1962. hal 111. 544-7.
- Yasinta, Hatuti, Joni dan Sri. 2017. Efektivitas Anthiperurisemia Ekstrak Etanol Daun Seledri (EDDS) Pada Tikus Putih Induksi Kalium Oksonat. J Trop Pharm. Chem. Vol 4. No.1.
- Zahara, R., Saputri, F.C. 2013. Uji Aktivitas Antiinflamasi Minyak Atsiri Daun Kemangi (*Ocimum americanum L.*) Pada Tikus Jantan Yang Dinduksi Krageenan. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Zakiah, Rasmi, dkk. "Hubungan Pengetahuan Keluarga dengan Penggunaan Obat Tradisional di desa Nunggalrejo Kecamatan Pungur Kabupaten Lampung Tengah". *JK Unila* 2, no. 1 (2018).
- Zuhroh, Fadhilatuz. "Uji Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Sirih (*Piper betle L.*) dan Pengaruhnya Terhadap Jumlah Leukosit Pada Tikus Jantan Yang Diinduksi Karagenan". *Skripsi*. Medan: Univ. Sumatera Utara, 2018

Lampiran 1: Surat *ethical clearance*



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No: A.077/KEPK/FKIK/II/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Pencili utama : SARMILA
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"UI ANTIINFLAMASI MINYAK KUDA (EQUUS CABALLUS) TERHADAP MENCIT (MUS MUSCULUS)"

"TEST ANTI-INFLAMMATORY OF HORSE OIL (EQUUS CABALLUS) AGAINST MICE (MUS MUSCULUS)"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

This declaration of ethics applies during the period February 11, 2022 until February 11, 2023

February 11, 2022


Dr. Sytirah, Sp.A., M.Kes

ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 2: Surat Rekomendasi Penelitian



Sungguminasa, 9 Mei 2022

Nomor : 503/376/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2022
 Lamp :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Laboratorium Fisiologi Anatomi
 Manusia Fakultas Kedokteran Dan Ilmu
 Kesehatan Universitas Islam Negeri
 Alauddin Makassar
 di-

Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 390/S.01/PTSP/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **SARMILA**
 Tempat/Tanggal Lahir : **Buntulu / 15 Mei 1997**
 Nomor Pokok : **70100116101**
 Jenis Kelamin : **Perempuan**
 Program Studi : **Farmasi**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
 Alamat : **Toa Daeng Tiga Lr Alamanda**

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**UJI ANTHINFLAMASI MINYAK KUDA (EQUUS CABALLUS) TERHADAP MENCIT (MUS MUSCULUS)**"

Selama : 28 April 2022 s/d 28 Mei 2022
 Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 a.n. BUPATI GOWA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Siscantik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Siscantik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE/BSSN.



M A K A S S A R



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 9 Mei 2022

Nomor : 503/376/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2022
Lamp :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

KepadaYth.

Kepala Laboratorium Biologi Farmasi
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

di- **Tempat**

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 390/S.DI/PTSP/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **SARMILA**
Tempat/Tanggal Lahir : **Bartulu / 15 Mei 1997**
Nomor Pokok : **70100116101**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Program Studi : **Farmasi**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Toa Daeng Tiga Lr Alamanda**

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"UJI ANTINFLAMASI MINYAK KUDA (EQUUS CABALLUS) TERHADAP MENCIT (MUS MUSCULUS)"**

Selama : **28 April 2022 s/d 28 Mei 2022**
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan ;
3. Menaatii semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperutnya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H.JINDRA SETIAWAN ABBAS,S.Spd,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19721026 199303 1 003

- Tembusan Yth:
1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
 2. Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar di Makassar
 3. Yang bersangkutan;
 4. Peninggal

3 / 3


Dokumen ini diterbitkan secara Sicantik Cloud berdasarkan data dari Pindocan, terintegrasi dalam sistem Sicantik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pindocan.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS HASANUDDIN			
LEMBAR DISPOSISI			
RAHASIA	PENTING	SEGERA	BIASA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No.Agenda	: 54		
Tanggal	: 5/27/2022		
Tanggal/Nomor	: 5/24/2022/ B-2004/UN.06/FKIK/PP.00.09/05/2022		
Perihal	: Izin Penelitian di Lab. Biofarmasi a/n Sarmila		
Asal Surat	: Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Alauddin Mks		
INSTRUKSI/ INFORMASI <i>mohon di bantu proses</i> <i>atm f</i>		Diteruskan Kepada :	
		1. Ke. Lab. Biofarmasi	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
Paraf KTU	:		
Tanggal	:		
Catatan	:		

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar

Lampiran 3: Skema Kerja Pembuatan Minyak Kuda (Metode Refluk)



Lampiran 4: Skema Kerja Uji antiinflamasi

Lampiran 5: Perhitungan Dosis

A. Perhitungan Natrium diklofenak yang Disuspensikan

- Tiap tablet natrium diklofenak mengandung 25 mg
- Dosis natrium diklofenak untuk manusia = 25-50 mg
- Dosis untuk mencit 20 g

$$25 \times 0,0026 = 0,065 \text{ mg}$$

Dosis yang digunakan adalah $0,065 \times 1000 : 20 = 3,25 \text{ mg/kgBB}$

- Berat bahan aktif natrium diklofenak adalah
- $25 \text{ mg/tab} \times 10 \text{ tab} = 250 \text{ mg}$.
- Maka serbuk natrium diklofenak yang digunakan adalah

- $\frac{3,25 \text{ mg}}{250} \times 1650 \text{ mg} = 21,45 \text{ mg}$

- Pembuatan suspensi natrium diklofenak

Ditimbang serbuk tablet natrium diklofenak sebanyak 21,45mg kemudian dilarutkan dengan 10 ml Na-CMC 0,5 %.

- Volume pemberian suspensi natrium diklofenak pada mencit adalah (berat badan mencit = 26 g mencit 1 dan 3)

- $\frac{26 \text{ mg}}{20 \text{ mg}} \times 0,065 = 0,0845$

- $\frac{0,0845}{3,25} \times 10 \text{ ml} = 0,26 \text{ ml}$

(berat badan mencit= 25 g mencit 2)

- $\frac{25 \text{ mg}}{20 \text{ mg}} \times 0,065 = 0,0812$

- $\frac{0,0812}{3,25} \times 10 \text{ ml} = 0,25 \text{ m}$

B. Perhitungan Dosis Ekstrak Ekstrak Minyak Kuda

Dosis ekstrak yang digunakan dalam penelitian adalah 40 mg/kgBB, 50 mg/kgBB, dan 60 mg/kgBB.

1. Dosis ekstrak minyak kuda 40 mg/kgBB (berat mencit 26 g mencit 1)

$$\text{Dosis } 40 \text{ mg/kgBB} = \frac{40 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} \times 26 \text{ g} = 1,04 \text{ mg/26 g atau } 40 \text{ mg/kgBB}$$

$$\text{Konsentrasi} = \frac{40 \text{ mg}}{10 \text{ ml}} = 4 \text{ mg/ml}$$

$$\text{VAO} = \frac{40 \text{ mg} \times 0,026 \text{ kg}}{4 \text{ mg/ml}} = 0,26 \text{ ml}$$

2. Dosis ekstrak minyak kuda 50 mg/kgBB (berat mencit 25 g mencit 3)

$$\text{Dosis } 50 \text{ mg/kgBB} = \frac{50 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} \times 25 \text{ g} = 1,25 \text{ mg/25 g atau } 50 \text{ mg/kgBB}$$

$$\text{Konsentrasi} = \frac{50 \text{ mg}}{10 \text{ ml}} = 5 \text{ mg/ml}$$

$$\text{VAO} = \frac{50 \text{ mg} \times 0,025 \text{ kg}}{5 \text{ mg/ml}} = 0,25 \text{ ml}$$

3. Dosis ekstrak minyak kuda 60 mg/kgBB (berat mencit 24 g mencit 1)

$$\text{Dosis } 60 \text{ mg/kgBB} = \frac{60 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} \times 24 \text{ g} = 1,44 \text{ mg/24 g atau } 60 \text{ mg/kgBB}$$

$$\text{Konsentrasi} = \frac{60 \text{ mg}}{10 \text{ ml}} = 6 \text{ mg/ml}$$

$$\text{VAO} = \frac{60 \text{ mg} \times 0,024 \text{ kg}}{6 \text{ mg/ml}} = 0,24 \text{ m}$$






4. Dosis ekstrak minyak kuda (pembanding 60 mg/kgBB bb mencit 28 g mencit 1)





$$\text{Dosis } 60 \text{ mg/kgBB} = \frac{60 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} \times 28 \text{ g} = 1,68 \text{ mg/28 g atau } 60 \text{ mg/kgBB}$$







$$\text{Konsentrasi} = \frac{60 \text{ mg}}{10 \text{ ml}} = 6 \text{ mg/ml}$$

$$\text{VAO} = \frac{60 \text{ mg} \times 0,028 \text{ kg}}{6 \text{ mg/ml}} = 0,28 \text{ ml}$$

Lampiran 6: Dokumentasi

No	Gambar	Keterangan
1.		Penyiapan Hewan Uji coba
2.		Lemak Kuda di cuci Bersih
3.		Pengolahan Lemak kuda menjadi minyak secara tradisional
4.		Lemak Kuda ditimbang
5.		Proses pengolahan ekstraksi Sampel lemak Kuda menggunakan reluks menjadi minyak

6.	 <p style="text-align: center;">a b c</p>	<p>a. penimbangan Natrium diklofenak b. Penimbangan CMC c. penimbangan karagenin</p>
7.	 <p style="text-align: center;">a b</p>	<p>a. Larutan Uji b. Bahan-bahan</p>
8.		<p>Penimbangan dan Mencit di bagi kelompok</p>
9.		<p>Pletismometer modifikasi air raksa</p>

10.	 <p style="text-align: center;">a</p>  <p style="text-align: center;">b</p>	<p>a. Mencit diberi larutan uji secara oral</p> <p>b. Mencit setelah diberi larutan uji</p>
11.	 <p style="text-align: center;">c</p>  <p style="text-align: center;">d</p>  <p style="text-align: center;">e</p> 	<p>c. Mencit sebelum diinduksi karagenan</p> <p>d. Mencit setelah induksi karagenan</p> <p>e. Kaki mencit diukur pada alat pletismometer raksa</p>

Lampiran 7: Hasil Olah Data SPSS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		130
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	14.67474227
Most Extreme Differences	Absolute	0.056
	Positive	0.041
	Negative	-0.056
Test Statistic		0.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Case Processing Summary							
	KELOMPOK	Cases					
		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
HASIL INFLAMASI	CMC 0.5%	36	100.0%	0	0.0%	36	100.0%
	NATRIUM DIKLOFENAK	22	100.0%	0	0.0%	22	100.0%
	MINYAK KUDA 40 MG	18	100.0%	0	0.0%	18	100.0%
	MINYAK KUDA 50 MG	18	100.0%	0	0.0%	18	100.0%
	MINYAK KUDA 60 MG	18	100.0%	0	0.0%	18	100.0%
	PEMBANDING 60 MG	18	100.0%	0	0.0%	18	100.0%

Descriptives					
	KELOMPOK		Statistic	Std. Error	
HASIL INFLAMASI	CMC 0.5%	Mean	80.9333	1.39675	
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	78.0978	
			Upper Bound	83.7689	
		5% Trimmed Mean	81.2366		
		Median	80.0000		
		Variance	70.233		
		Std. Deviation	8.38052		
		Minimum	63.63		
		Maximum	95.00		
		Range	31.37		
		Interquartile Range	12.73		
		Skewness	-0.445	0.393	
		Kurtosis	-0.558	0.768	
	NATRIUM DIKLOFENAK	Mean	53.8345	5.13137	
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	43.1633	
			Upper Bound	64.5058	
		5% Trimmed Mean	54.0588		
		Median	55.0000		
		Variance	579.281		
		Std. Deviation	24.06826		
		Minimum	8.33		
		Maximum	95.00		
		Range	86.67		
		Interquartile Range	35.09		
		Skewness	-0.090	0.491	
		Kurtosis	-0.780	0.953	
	MINYAK KUDA 40 MG	Mean	63.0556	4.52189	

		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	53.515 2			
			Upper Bound	72.595 9			
		5% Trimmed Mean			62.839 5		
		Median			62.500 0		
		Variance			368.05 6		
		Std. Deviation			19.184 77		
		Minimum			35.00		
		Maximum			95.00		
		Range			60.00		
		Interquartile Range			35.00		
		Skewness			0.033	0.536	
		Kurtosis			-1.261	1.038	
		MINYAK KUDA 50 MG	Mean			45.586 7	5.082 01
			95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	34.864 6		
				Upper Bound	56.308 8		
5% Trimmed Mean			45.513 0				
Median			45.830 0				
Variance			464.88 2				
Std. Deviation			21.561 13				
Minimum			12.50				
Maximum			80.00				
Range			67.50				
Interquartile Range			34.50				
Skewness			0.088	0.536			
Kurtosis			-1.141	1.038			
MINYAK KUDA 60 MG	Mean			52.603 9	5.603 76		
	95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	40.781 0			
		Upper Bound	64.426 8				

M A K A S S A R

		5% Trimmed Mean	52.391 0		
		Median	50.000 0		
		Variance	565.23 8		
		Std. Deviation	23.774 73		
		Minimum	19.04		
		Maximum	90.00		
		Range	70.96		
		Interquartile Range	45.90		
		Skewness	0.073	0.536	
		Kurtosis	-1.376	1.038	
	PEMBANDING 60 MG	Mean	44.860 0	4.311 53	
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	35.763 5	
			Upper Bound	53.956 5	
			5% Trimmed Mean	44.752 2	
			Median	47.500 0	
			Variance	334.60 8	
			Std. Deviation	18.292 29	
			Minimum	16.66	
			Maximum	75.00	
			Range	58.34	
			Interquartile Range	28.13	
			Skewness	0.026	0.536
			Kurtosis	-1.119	1.038

Descriptives

HASILINFLAMASI								
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
NA-CMC 0.5%	36	80.9333	8.38052	1.39675	78.0978	83.7689	63.63	95.00
NATRIUM DIKLOFENAK	22	53.8345	24.06826	5.13137	43.1633	64.5058	8.33	95.00
MINYAK KUDA 40 MG	18	63.0556	19.18477	4.52189	53.5152	72.5959	35.00	95.00
MINYAK KUDA 50 MG	18	45.5867	21.56113	5.08201	34.8646	56.3088	12.50	80.00
MINYAK KUDA 60 MG	18	52.6039	23.77473	5.60376	40.7810	64.4268	19.04	90.00
PEMBANDING 60 MG	18	44.8600	18.29229	4.31153	35.7635	53.9565	16.66	75.00
Total	130	60.0605	23.24617	2.03882	56.0267	64.0944	8.33	95.00

Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
HASILINFLAMASI	Based on Mean	7.888	5	124	0.000
	Based on Median	7.466	5	124	0.000
	Based on Median and with adjusted df	7.466	5	95.122	0.000
	Based on trimmed mean	7.798	5	124	0.000

ANOVA						
HASILINFLAMASI						
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
Between Groups	25629.214	5	5125.843	14.419	0.000	
Within Groups	44080.390	124	355.487			
Total	69709.604	129				
Multiple Comparisons						
Dependent Variable: HASILINFLAMASI						
Tukey HSD						
(I) KELOMPOK	(J) KELOMPOK	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
CMC 0.5%	NATRIUM DIKLOFENAK	27.09879*	5.10227	0.000	12.3288	41.8687
	MINYAK KUDA 40 MG	17.87778*	5.44279	0.016	2.1221	33.6335
	MINYAK KUDA 50 MG	35.34667*	5.44279	0.000	19.5910	51.1023
	MINYAK KUDA 60 MG	28.32944*	5.44279	0.000	12.5738	44.0851
	PEMBANDING 60 MG	36.07333*	5.44279	0.000	20.3177	51.8290
NATRIUM DIKLOFENAK	NA-CMC 0.5%	-27.09879*	5.10227	0.000	-41.8687	-12.3288
	MINYAK KUDA 40 MG	-9.22101	5.99231	0.640	-26.5674	8.1254
	MINYAK KUDA 50 MG	8.24788	5.99231	0.741	-9.0986	25.5943
	MINYAK KUDA 60 MG	1.23066	5.99231	1.000	-16.1158	18.5771
	PEMBANDING 60 MG	8.97455	5.99231	0.666	-8.3719	26.3210
MINYAK KUDA 40 MG	NA-CMC 0.5%	-17.87778*	5.44279	0.016	-33.6335	-2.1221
	NATRIUM DIKLOFENAK	9.22101	5.99231	0.640	-8.1254	26.5674
	MINYAK KUDA 50 MG	17.46889	6.28479	0.068	-0.7242	35.6620

	MINYAK KUDA 60 MG	10.45167	6.28479	0.559	-7.7414	28.6448
	PEMBANDING 60 MG	18.19556*	6.28479	0.050	0.0025	36.3886
MINYAK KUDA 50 MG	NA-CMC 0.5%	- 35.34667*	5.44279	0.000	- 51.1023	-19.5910
	NATRIUM DIKLOFENAK	-8.24788	5.99231	0.741	- 25.5943	9.0986
	MINYAK KUDA 40 MG	-17.46889	6.28479	0.068	- 35.6620	0.7242
	MINYAK KUDA 60 MG	-7.01722	6.28479	0.874	- 25.2103	11.1759
	PEMBANDING 60 MG	0.72667	6.28479	1.000	- 17.4664	18.9198
MINYAK KUDA 60 MG	NA-CMC 0.5%	- 28.32944*	5.44279	0.000	- 44.0851	-12.5738
	NATRIUM DIKLOFENAK	-1.23066	5.99231	1.000	- 18.5771	16.1158
	MINYAK KUDA 40 MG	-10.45167	6.28479	0.559	- 28.6448	7.7414
	MINYAK KUDA 50 MG	7.01722	6.28479	0.874	- 11.1759	25.2103
	PEMBANDING 60 MG	7.74389	6.28479	0.820	- 10.4492	25.9370
PEMBANDI NG 60 MG	NA-CMC 0.5%	- 36.07333*	5.44279	0.000	- 51.8290	-20.3177
	NATRIUM DIKLOFENAK	-8.97455	5.99231	0.666	- 26.3210	8.3719
	MINYAK KUDA 40 MG	- 18.19556*	6.28479	0.050	- 36.3886	-0.0025
	MINYAK KUDA 50 MG	-0.72667	6.28479	1.000	- 18.9198	17.4664
	MINYAK KUDA 60 MG	-7.74389	6.28479	0.820	- 25.9370	10.4492
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.						

Lampiran 8. Tabel data pengukuran uedema kaki mencit

KELOMPOK	Hewan uji	PERSENTASE UDEMA JAM KE-					
		JAM 1	JAM 2	JAM 3	JAM 4	JAM 5	JAM 6
Na-CMC	1	95	90	90	90	90	85
	2	77.27	77.27	77.27	77.27	77.27	77.27
	3	90	90	90	90	90	85
Rata-rata dan SD		87.42	85.76	85.76	85.76	85.76	82.42
		9.142	7.350	7.350	7.350	7.350	4.463
Natrium Diklofenak	1	90	80	70	55	40	25
	2	58.33	45	37.5	25	16.66	8.33
	3	76.19	66.66	61.9	47.61	42.85	33.33
Rata-rata dan SD		74.84	63.89	56.47	42.54	33.17	22.22
		15.878	17.664	16.918	15.630	14.369	12.730
Minyak Kuda 40 mg	1	95	90	80	70	50	35
	2	85	75	65	60	45	35
	3	80	75	60	50	45	40
Rata-rata dan SD		86.67	80.00	68.33	60.00	46.67	36.67
		7.638	8.660	10.408	10.000	2.887	2.887
Minyak Kuda 50 mg	1	58.33	50	41.66	29.16	16.66	12.5
	2	80	75	60	50	40	30
	3	77.27	68.18	54.54	36.36	22.72	18.18
Rata-rata dan SD		71.87	64.39	52.07	38.51	26.46	20.23
		11.802	12.923	9.417	10.585	12.111	8.928
Minyak Kuda 60 mg	1	90	80	60	50	40	25
	2	76.19	61.9	47.61	33.33	23.8	19.04
	3	85	80	70	50	35	20
Rata-rata dan SD		83.73	73.97	59.20	44.44	32.93	21.35
		6.992	10.450	11.216	9.624	8.295	3.200
Kontrol Pembeding 60 mg	1	62.5	54.16	50	33.33	20.83	16.66
	2	75	70	55	45	40	30
	3	70	55	50	35	25	20
Rata-rata dan SD		69.17	59.72	51.67	37.78	28.61	22.22
Rata-rata dan SD		6.292	8.913	2.887	6.311	10.082	6.942

Perlakuan	Hewan uji	Pengukuran Volume Udem (ml)								
		Awal	Induksi	Jam ke-1	Jam ke-2	Jam ke-3	Jam ke-4	Jam ke-5	Jam ke-6	Penurunan Udem (ml) Vt-V6
Na-CMC	1	0.2	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.02
	2	0.22	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.00
	3	0.2	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.01
Rata-Rata dan SD		0.21	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.01
		0.012	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.012	0.010
Natrium Diklofenak	1	0.2	0.37	0.38	0.36	0.34	0.31	0.28	0.25	0.13
	2	0.24	0.36	0.38	0.35	0.33	0.3	0.28	0.26	0.12
	3	0.21	0.36	0.37	0.35	0.34	0.32	0.3	0.28	0.09
Rata-Rata dan SD		0.22	0.36	0.38	0.35	0.34	0.31	0.29	0.26	0.11
		0.021	0.006	0.006	0.006	0.006	0.010	0.012	0.015	0.021
Minyak Kuda 40 mg	1	0.2	0.37	0.39	0.38	0.36	0.34	0.3	0.27	0.12
	2	0.2	0.35	0.37	0.35	0.33	0.32	0.29	0.27	0.10
	3	0.2	0.35	0.36	0.35	0.32	0.3	0.29	0.28	0.08
Rata-Rata dan SD		0.20	0.36	0.37	0.36	0.34	0.32	0.29	0.27	0.10
		0.000	0.012	0.015	0.017	0.021	0.020	0.006	0.006	0.020
Minyak Kuda 50 mg	1	0.24	0.37	0.38	0.36	0.34	0.31	0.28	0.27	0.11
	2	0.2	0.34	0.36	0.35	0.32	0.3	0.28	0.26	0.10
	3	0.22	0.38	0.39	0.37	0.34	0.3	0.27	0.26	0.13
Rata-Rata dan SD		0.22	0.36	0.38	0.36	0.33	0.30	0.28	0.26	0.11
		0.020	0.021	0.015	0.010	0.012	0.006	0.006	0.006	0.015
Minyak Kuda 60 mg	1	0.2	0.36	0.38	0.36	0.32	0.3	0.28	0.25	0.13
	2	0.21	0.36	0.37	0.34	0.31	0.28	0.26	0.25	0.12
	3	0.2	0.33	0.37	0.36	0.34	0.3	0.27	0.24	0.13
Rata-Rata dan SD		0.20	0.35	0.37	0.35	0.32	0.29	0.27	0.25	0.13
		0.006	0.017	0.006	0.012	0.015	0.012	0.010	0.006	0.006
Kontrol Pembeding 60 mg	1	0.24	0.38	0.39	0.37	0.36	0.32	0.29	0.28	0.11
	2	0.2	0.33	0.35	0.34	0.31	0.29	0.28	0.26	0.09
	3	0.2	0.33	0.34	0.31	0.3	0.27	0.25	0.24	0.10
Rata-rata dan SD		0.21	0.35	0.36	0.34	0.32	0.29	0.27	0.26	0.10
		0.023	0.029	0.026	0.030	0.032	0.025	0.021	0.020	0.010

Kelompok	Rata-rata persen (%) udema dan SD jam ke-					
	1	2	3	4	5	6
KN (Na-CMC 0.5%)	87.42	85.76	85.76	85.76	85.76	82.42
	9.142	7.35	7.35	7.35	7.35	4.463
KP(Na-diklofenak 7,13 mg/kgBB)	74.84	63.89	56.47	42.54	33.17	22.22
	15.878	17.664	16.918	15.63	14.369	12.73
Dosis 1 (40 mg/kgBB)	86.67	80	68.33	60	46.67	36.67
	7.64	8.66	10.41	10	2.89	2.89
Dosis 2 (50 mg/kgBB)	71.87	64.39	52.07	38.51	26.46	20.23
	11.8	12.92	9.42	10.58	12.11	8.93
Dosis 3 (60 mg/kg BB)	83.73	73.97	59.2	44.44	32.93	21.35
	6.99	10.45	11.22	9.62	8.3	3.2
Pembanding (60 mg/kgBB)	69.17	59.72	51.67	37.78	28.61	22.22
	6.29	8.91	2.89	6.31	10.08	6.94

No	Sampel	Berat sampel	Berat ekstrak	volume N-heksan	Lama refluks
1	Lemak kuda	200 gram	50 gram	1 liter	3-4 jam

Kelompok	Rata-rata persentase (%) inhibisi udema jam ke-					
	1	2	3	4	5	6
KP(Na-diklofenak 7,13 mg/kgBB)	14.39	25.5	34.15	50.39	61.32	70.61
Dosis 1 (40 mg/kgBB)	0.85	6.71	20.32	30.03	45.58	55.5
Dosis 2 (50 mg/kgBB)	17.78	24.91	39.28	55.09	69.14	75.45
Dosis 3 (60 mg/kg BB)	4.22	13.74	30.97	48.18	61.6	74.09
Pembanding (60mg/kgBB)	20.87	30.36	39.75	55.94	66.63	73.04

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sarmila akrab dipanggil Mila atau dento. Dilahirkan dan dibesarkan di Jeneponto, pada tanggal 05 Mei 1998. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Tahang dan Ibu Basaria. Peneliti telah menikah di tahun 2019 dan memiliki buah hati ditahun 2021. Nama suami Zulkifli dan nama anak Muhammad Rafardhan Athalla, merupakan salah satu *support system* terbesar peneliti. Peneliti memulai pendidikan sejak Taman Kanak-kanak (TK) selama 1 tahun, kemudian melanjutkan sekolah dasar di SD Inpres Sepeka No. 197, kemudian setelah selesai 6 tahun masuk Sekolah Menengah Pertama di MTs Mannilingi Bulu-Bulu tahun 2010-2013, Kemudian tahun 2013 masuk sekolah menengah atas di MA Mannilingi Bulu-Bulu 3 tahun. Tahun 2016 setelah lulus MA, ikut test masuk perguruan tinggi jalur ujian Mandiri di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan berhasil lulus pada jurusan Farmasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Itu merupakan suatu kesyukuran yang diberikan Allah SWT. kepada peneliti, semoga dari sini kesuksesan akan diraih kelak. Aamiin