

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA PENYAKIT
DIARE PADA BALITA DI KECAMATAN SIOMPU BARAT
KABUPATEN BUTON SELATAN**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar



Oleh :

**SINJAI
NIM : 70200118073**

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinjai
Nim : 70200118073
Tempat/Tanggal Lahir : Mbanua/26 Juli 1999
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Dusun Lajilo, Desa Mbanua, Kec. Siompu Barat, Kab. Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Penyakit Diare Pada Balita Di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Samata-Gowa, 31 Agustus 2022

Penyusun

Sinjai
Nim: 70200118073

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Penyakit Diare Pada Balita Di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan” yang disusun oleh Sinjai, NIM: 70200118073, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 31 Agustus 2022 bertepatan dengan 4 Safar 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 31 Agustus 2022 M
4 Safar 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dian Rezki Wijaya, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. M Dahlan, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi Susilawati S.Si, M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Munawir Amansyah, SKM., M.Kes	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat, hidayah, dan kuasa-Nyalah sehingga skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Penyakit Diare Pada Balita Di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan” dapat terselesaikan. Tak lupa pula shalawat serta salam tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam yang telah berhasil membawa peradaban umat manusia ke zaman yang penuh dengan dengan hamparan ilmu pengetahuan. Penulis skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. Wahyudin, M.Hum, Wakil Rektor III Bapak Prof Dr. Darussalam, M. Ag., Wakil Rektor IV Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS., Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.

3. Bapak Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat.
4. Ibu Dr. Andi Susilawati, S.Si., M.Kes sebagai Pembimbing I dan bapak Munawir Amansyah, SKM., M.Kes sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan dan perbaikan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dian Rezki Wijaya, SKM., M.Kes dan Bapak Prof. Dr. H. M Dahlan, M. Ag sebagai penguji yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini .
6. Para Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan khususnya Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu, nasihat dan semangatnya bagi penulis.
7. Pengelola Seminar Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang membantu dalam administrasi persuratan dan kelengkapan berkas seminar.
8. Para staf akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi persuratan.
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan beserta jajarannya yang bersedia memberikan informasi yang mendukung dalam penyusunan penelitian

10. Kepala Puskesmas Siompu Barat beserta jajarannya Khususnya KIA yang bersedia memberikan informasi maupun data yang mendukung dalam penyusunan penelitian
11. Orang Tua tercinta, almahrum Ayahanda La Gua dan Ibunda Wa Liana serta saudaraku Sandriwal, Figun, Reza dan waliku selama ini Ayahanda La Gande dan Ibunda Wa Rense serta keluarga besar yang telah mencurahkan kasih sayang, selalu memberikan nasehat, dukungan baik segi moril maupun material serta doa yang dipanjatkan tiada henti-hentinya demi kebaikan penulis di dunia dan akhirat.
12. Teman-teman tercinta Angkatan 2018 Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar khususnya Kesehatan Lingkungan 2018, sebagai teman seperjuangan dan selalu ada bahu-membahu menyemangati, saling membantu serta mendo'akan dalam penyelesaian skripsi ini
13. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini bisa dirampungkan, semoga kebaikan dan kemurahan hati semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, Aamiin.

Gowa, 31 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Hipotesis.....	4
D. Definisi Operasional.....	5
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	16
G. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Penyakit Diare.....	19
1. Definisi Penyakit Diare	19
2. Etiologi Penyakit Diare	19
3. Klasifikasi Penyakit Diare.....	23
4. Gejala dan Tanda Penyakit Diare.....	24
5. Cara Penularan dan Faktor Resiko	26
6. Manifestasi Klinis Penyakit Diare	29
7. Penanganan Penyakit Diare.....	30

8. Pencegahan Penyakit Diare.....	32
B. Tinjauan Balita	34
1. Defnisi Balita	34
2. Karakteristik Perkembangan Balita.....	34
C. Tinjauan Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Penyakit Diare pada Balita.....	35
1. Kualitas Air Bersih.....	36
2. Fasilitas Jamban Sehat	38
3. Saluran Pembuangan Air Limbah	41
4. Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun	42
5. Pemberian ASI	43
6. Pengetahuan Ibu	43
D. Kerangka Teori.....	44
E. Kerangka Konsep	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Rancangan Penelitian	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Populasi dan Sampel Penelitian	47
1. Populasi.....	47
2. Sampel.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data	50
1. Data Primer	50
2. Data Sekunder	50
E. Instrumen Penelitian.....	51
F. Teknik Pengolahan Data	51
G. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55

A. Hasil Penelitian	55
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
2. Hasil Analisis Univariat	57
3. Hasil Analisis Bivariat	61
B. Pembahasan.....	67
1. Hubungan Kualitas Air Bersih dengan Kejadian Penyakit Diare pada Bali.....	67
2. Hubungan Fasilitas Jamban Sehat dengan Kejadian Penyakit Diare pada Balita.....	69
3. Hubungan Saluran Pembuangan Air Limbah dengan Kejadian Penyakit Diare pada Balita.....	71
4. Hubungan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun dengan Kejadian Penyakit Diare pada Balita.....	72
5. Hubungan Pemberian ASI dengan Kejadian Penyakit Diare pada Balita	74
6. Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Kejadian Penyakit Diare pada Balita.....	76
C. Keterbatasan dan Kekuatan.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Sintesa.....	9
Tabel 3.1	Jumlah Sampel Masing-Masing Desa.....	4
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Siompu Barat	55
Tabel 4.2	Distribusi Responden Berdasarkan Usia di Kecamatan Siompu Barat.....	56
Tabel 4.3	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kecamatan Siompu Barat.....	56
Tabel 4.4	Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Siompu Barat.....	57
Tabel 4.5	Distribusi Balita Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Siompu Barat.....	58
Tabel 4.6	Distribusi Balita Berdasarkan Usia di Kecamatan Siompu Barat.....	58
Tabel 4.7	Distribusi Responden Berdasarkan Kejadian di Kecamatan Siompu Barat.....	59
Tabel 4.8	Analisis Hubungan Kualitas Air Bersih dengan Kejadian Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat	59
Tabel 4.9	Analisis Hubungan Fasilitas Jamban Sehat dengan Kejadian Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat	60
Tabel 4.10	Analisis Hubungan Saluran Pembuangan Air dengan Kejadian Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat.....	61
Tabel 4.11	Analisis Hubungan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun dengan Kejadian Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat.....	62
Tabel 4.12	Analisis Hubungan Pemberian ASI dengan Kejadian Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat	63
Tabel 4.13	Analisis Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Kejadian Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Teori.....	44
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kecamatan Siompu Barat	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Formulir Persetujuan Mengikuti Penelitian Setelah Mendapatkan penjelasan
Lampiran 2	Kuesioner Penelitian
Lampiran 3	Master Tabel
Lampiran 4	Output SPSS
Lampiran 5	Permohonan Kode Etik
Lampiran 6	Keterangan Layak Etik
Lampiran 7	Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 8	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
Lampiran 9	Dokumentasi Penelitian



ABSTRAK

Nama : Sinjai
Nim : 70200118073
Judul :Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Penyakit Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

Diare merupakan penyakit balita yang umum dan salah satu penyebab utama kematian pada balita secara global. Sebagai penyakit lingkungan, diare merupakan keadaan dimana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair lebih dari tiga kali yang penyebab klinis paling banyak ditemukan di lapangan disebabkan oleh infeksi dan keracunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kejadian penyakit diare pada balita (kualitas air bersih, fasilitas jamban sehat, saluran pembuangan air limbah, perilaku cuci tangan pakai sabun, pemberian ASI dan pengetahuan ibu).

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik desain *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang mempunyai balita dibawah lima tahun pada priode 2021 di Kecamatan Siompu Barat yang namanya terdaftar dalam buku register Puskesmas Siompu Barat berjumlah 235 ballita. Sampel dalam penelitian ini yaitu 56 ibu di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.

Analisis hubungan menggunakan uji *Chi Square* dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukan tidak ada hubungan yang signifikan (kualitas air bersih, fasilitas jamban sehat, saluran pembuangan air limbah, perilaku cuci tangan pakai sabun, pemberian ASI dan pengetahuan ibu) dengan kejadian penyakit diare pada balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.

Kata Kunci: Balita, Diare, Kualitas Air Bersih, Pemberian ASI, Siompu Barat
Daftar pustaka ()

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit menular masih mendominasi masalah kesehatan global yang hampir sering terjadi di seluruh negara berkembang. Penyakit menular dikatakan masalah kesehatan dunia karena menyebabkan angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi dalam kurung waktu yang cukup singkat. Salah satu penyakit menular adalah penyakit diare. Diare merupakan penyakit yang berbasis lingkungan yang diperkirakan 5 miliar kasus diare yang terjadi di dunia setiap tahunnya (Khan et al., 2019)

Kejadian penyakit diare di negara berkembang diperkirakan mencapai 2,5 miliar kasus pertahun pada balita dan lebih dari setengahnya berada di Afrika dan Asia Selatan dimana anak-anak di bawah lima tahun (balita) rata-rata kejadian diare tiga kali pertahun (Ridawati & Nugroho, 2020). Diare lebih cenderung menyerang balita dikarenakan kekebalan tubuh balita masih lemah dan rentan terhadap penyebaran virus penyebab diare sehingga balita akan lebih cepat jatuh sakit (Pahmi, 2019).

Di Indonesia penyakit diare merupakan pembunuh nomor dua pada balita setelah Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) (Ridawati & Nugroho, 2020). Bersumber pada data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit diare di Indonesia berdasarkan karakteristik tercatat sebanyak 18.225 atau 9% anak dengan kejadian diare kelompok umur < 1 tahun, 73.188 atau 11,5% anak dengan diare kelompok umur 1-4 tahun, 182,338 atau 6,2% anak dengan

diare kelompok umur 5-14 tahun, dan sebanyak 165.664 atau 6,7% anak dengan diare kelompok umur 15-24 tahun. Meskipun prevalensi penyakit diare menurun pada tahun 2013 menjadi 12,3% namun pada tahun 2018, diare tetap menjadi penyakit menular bagi bayi di Indonesia (Kemenkes RI, 2019).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 period prevalence penyakit diare di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 7,3% dengan kejadian diare pada balita sekitar 5%. Jumlah kasus kejadian diare yang ditangani pada tahun 2018 sebanyak 47,92% dan jumlah prevalensi pada kelompok balita sebesar 31,62%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 39.913 kasus atau 53,72% dari perkiraan kasus. Selanjutnya jumlah kasus penyakit diare di Kabupaten Buton Selatan sebanyak 28,64% dengan jumlah prevalensi pada kelompok balita sebesar 11,6% (Dinkes Sultra, 2019).

Di Indonesia masalah diare sering terjadi dalam bentuk Kejadian Luar Biasa (KLB). Menurut data Di provinsi Sultra 2018 pada tahun 2013 di Indonesia jumlah penderita KLB diare pada balita terjadi 8 kasus KLB yang tersebar di 6 Provinsi, 8 Kabupaten dengan jumlah penderita sebesar 646 kasus dengan jumlah kematian 7 orang. Selanjutnya pada tahun 2014 terjadi 6 kasus KLB diare dengan jumlah penderita 2.549 yang tersebar di 5 Provinsi, 6 Kabupaten atau Kota dengan jumlah kematian 29 orang, salah satu Provinsi yang mengalami KLB adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 1,14%.

Angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit diare masih cukup tinggi. Beberapa survey di Indonesia menunjukkan angka mortalitas yang disebabkan oleh penyakit diare untuk semua kelompok umur adalah sekitar 120-360 per 1000 penduduk atau sekitar 12-36%, dan untuk kelompok balita menderita satu dan dua kali episode pada setiap tahunnya, 76% kematian karena kejadian diare terjadi pada bayi dan balita terutama 2 tahun pertama usia bayi (Hijriani et al., 2020).

Menurut Kemenkes RI tahun 2017 tingginya angka kematian anak pada balita rata-rata disebabkan sejumlah penyakit seperti Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), panas tinggi serta diare. Penanganan penyakit diare terhadap balita jadi yang terparah. Karena, dari 2.328 balita yang menderita diare, hanya 74% diantaranya yang telah mendapatkan pengobatan (Mustika Dewi, Meilya Farika Indah, 2020).

Tingginya kejadian penyakit diare terutama pada balita menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut data yang diperoleh dari Puskesmas Siompu Barat selama tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa penyakit diare termasuk dalam 10 penyakit terbanyak, dimana angka kejadian diare pada balita tahun 2017 sebanyak 108 kasus diare pada balita dari 436 kasus diare. Pada tahun 2018, angka kejadian diare pada balita sebanyak 134 kasus dari 593 kasus diare. Pada tahun 2019 angka kejadian diare pada balita sebanyak 187 kasus dari total 667 kasus diare. pada tahun 2020 angka kejadian diare pada balita 205 kasus dari 700 kasus. Prevalensi kejadian diare tersebut akan terus meningkat setiap tahun jika tidak ditangani dengan baik. Jumlah balita di

Kecamatan Siompu Barat tahun 2021 sebanyak 235 balita (Puskesmas Siobar, 2021).

Beberapa penelitian telah melakukan penelitian mengenai kasus diare pada balita di provinsi Sulawesi Tenggara (Fadmi et al., 2020), (Azis et al., 2021) namun belum pernah dilakukan penelitian mengenai penyakit diare pada balita di wilayah Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan. Karenanya, diperlukan upaya-upaya yang optimal agar angka kejadian penyakit diare terutama pada balita dapat berkurang. Pencegahan penyakit diare dapat dilakukan dengan cara mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya penyakit diare pada balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya penyakit diare pada balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.

C. Hipotesis

1. Ada hubungan antara kualitas air bersih dengan kejadian penyakit diare pada balita
2. Ada hubungan antara fasilitas jamban sehat dengan kejadian penyakit diare pada balita
3. Ada hubungan antara saluran pembuangan air limbah dengan kejadian penyakit diare pada balita

4. Ada hubungan antara perilaku cuci tangan dengan kejadian diare pada balita
5. Ada hubungan antara pemberian ASI dengan kejadian penyakit diare pada balita
6. Ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian penyakit diare pada balita

D. Definisi Operasional

1. Kualitas air bersih yaitu kondisi air yang digunakan untuk memasak, minum, mandi dan mencuci yang biasa digunakan oleh keluarga.

Kriteria Objektif :

- a. Memenuhi syarat

Jika dilihat dari segi konstruksi dinding sumur, lantai kedap air, bersih, terpelihara, saluran dan pembuangan air limbah dan jarak dari sumber pencemaran minimal 10 meter (PP No 122 tahun 2015)

- b. Tidak memenuhi syarat

Jika tidak sesuai dengan persyaratan di atas

2. Fasilitas jamban sehat yaitu tersedianya jamban yang digunakan oleh keluarga untuk buang kotoran/tinja yang memenuhi syarat.

Kriteria Objektif :

- a. Memenuhi syarat

Jika jamban leher angsa, jarak penampungan tinja minimal 10 meter dari sumber air bersih dan tertutup (Permenkes No 3 tahun 2014)

- b. Tidak memenuhi syarat

Jika tidak sesuai dengan persyaratan diatas

3. Saluran Pembuangan air limbah yaitu kondisi terhadap air limbah rumah tangga, yang meliputi cara membuangnya dan sarananya.

Kriteria Objektif :

- a. Memenuhi syarat

Jika air limbah dialirkan melalui saluran pembuangan, kedap air, tidak tercemar, tidak menimbulkan bau dan tertutup serta jarak dengan sumber air minimal 10 meter (SNI 2398:2017)

- b. Tidak memenuhi syarat

Jika tidak sesuai dengan persyaratan diatas

4. Perilaku cuci tangan pakai sabun yaitu upaya yang dilakukan individu untuk menghindari kontak dengan penyebab penyakit diare

Kriteria Objektif :

- a. CTPS

Jika mencuci tangan setelah membersihkan anak setelah buang air besar, sebelum menyuapi balita, sebelum memberikan makan balita, menggunakan sabun dan air mengalir (Permenkes No 3 tahun 2014)

- b. Tidak CTPS

Jika tidak sesuai dengan persyaratan diatas

5. Pemberian ASI yaitu upaya yang dilakukan oleh seorang ibu untuk memberikan ASI dari umur 0-6 bulan hanya diberikan ASI saja tanpa dicampur minuman tambahan

a. Baik

Jika pemberian ASI diberikan secara total sampai umur 0-6 bulan tanpa di campur dengan susu formula (Peraturan Pemerintah No. 33)

b. Kurang baik

Jika tidak diberikan sama sekali dan diganti dengan susu formula atau minuman lain

6. Pengetahuan ibu yaitu segala sesuatu yang diketahui oleh ibu tentang kejadian penyakit diare

Kriteria Objektif :

a. Baik

Jika mengetahui apa itu penyakit diare, gejala, tanda-tanda, tindakan pencegahan diare serta larutan oralit (Kemenkes, 2011)

b. Kurang baik

Jika tidak mengetahui sama sekali persyaratan diatas

7. Kejadian diare merupakan buang air besar dengan tinja lembek bahkan sampai setengah cair/cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam 24 jam dalam waktu 3 bulan terakhir

Kriteria Objektif :

a. Menderita

Jika buang air besar lebih dari 3 kali dalam 24 jam, bentuk konsistensi tinja lembek atau cair (WHO, 2017)

b. Tidak menderita

Jika frekuensi buang air besar seperti biasa (normal) dan konsistensi tinja tidak lembek atau cair.



E. Kajian Pustaka

Tabel 1.1
Tabel Sintesa

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan
1.	Analysis of Environmental Factor with Chronic Diarrhea in Toddlers in Jambi City in 2019/Eko Mirsiyanto, Rico J. Sitorus, Misnaniarti/2020	http://ijsoc.goaacademica.com	Penyediaan air bersih, kepemilikan jamban, pembuangan air limbah.	Desain <i>case-control</i> dengan pendekatan retrospektif dengan menggunakan instrumen wawancara dengan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini ibu balita atau masyarakat, dan pengasuh balita yang menderita diare di kota Jambi dengan jumlah sampel 135 responden	Bahwa air bersih, kepemilikan jamban, dan sistem pembuangan air limbah memiliki hubungan yang signifikan dengan penyakit diare pada balita di Kota Jambi tahun 2019.	Jurnal Internasional
2.	Diarrheal morbidity and predisposing factors among children	http://doi.org/10.1186/s41182-020-00253-4	Karakteristik sosial demografi orang tua balita Faktor lingkungan seperti	Sebuah studi <i>cross-sectional</i> berbasis	Diare ibu, cuci tangan setelah kontak dengan	Jurnal internasional

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan
	under 5 years of age in rural East Ethiopia/Ephrem Tefera Solomon, Sirak Robele Gari, Hermut Kloos, Bezatu Mengistie/2020		sumber air minum, ketersediaan air harian dari keran umum, penggunaan gayung untuk mengambil air dari wadah	masyarakat dengan 1180 responden dengan menggunakan instrumen kuesioner terstruktur	kotoran anak, penggunaan gayung untuk mengambil air dari wadah dan keberadaan fasilitas pembuangan sampah merupakan faktor predisposisi diare yang signifikan.	
3.	Factors associated with childhood diarrheal in Ethiopia; a multilevel analysis/Setegn Muche Fenta dan Teshager Zerihun Nigussie/ 2021	https://doi.org/10.1186/s13690-021-00566-8	Faktor tingkat individu (usia, jenis kelamin anak, tingkat anemia, anak kembar, vaksinasi anak, pendidikan, pekerjaan, tingkat pendidikan) Faktor tingkat komunitas (tempat tinggal, wilayah, penggunaan fasilitas toilet dan sumber air minum)	Menggunakan survei demografi dan kesehatan Ethiopia data tahun 2016 sebanyak 10.641 anak usia 0-59 bulan	Semua variabel yang diteliti berhubungan dengan tingginya kejadian diare pada balita.	Jurnal internasional
4.	Associated factors of ethnic mothers' knowledge, attitude,	http://www.medpharmers.vn/	Tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pengetahuan ibu dalam pencegahan diare	Studi potong lintang dilakukan pada	Hasil penelitian didapatkan bahwa variabel	Jurnal internasional

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan
	practice about diarrhea disease in children under 5-year old in Daklak province/Kim-Quyen Thi Nguyen dan Diep-Tuan Tran/2019			153 ibu etnis dari anak yang dirawat karena diare dengan metode wawancara menggunakan kuesioner	(faktor pengetahuan ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, serta faktor lingkungan) terbukti sebagai faktor risiko kejadian penyakit diare	
5.	Analysis of Factors Associated with the Incidence of Diarrhea in Toddlers in the Working Area of Puuwatu Health Center, Kendari in 2019/Nani Yuniar, Ruslan Majid, Siti Rabbani Karimuna, Putri Inggit Garnasi, Linda Ayu Rizka Putri, Indra Hafizah, Suwanti/2020	https://doi.org/10.5455/jabes.v1i1.2019.d29	Sarana air bersih, jamban domestik, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan air limbah.	Kuantitatif dengan pendekatan studi <i>cross sectional</i>	Tidak ada hubungan yang signifikan antara sumber air bersih, fasilitas MCK rumah tangga, pengelolaan saluran air limbah, perilaku ibu, pengetahuan ibu, dengan kejadian diare pada balita	Jurnal internasional

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan
6.	Hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada balita/Yazika Rimbawatu, Andre Surahman/2019	https://scholar.archive.org/work/fevd2d5x3rg3xgb75tnfb3i3m4/access/wayback/http://jurnal.stikes-aisyiyah-palembang.ac.id/index.php/JAM/article/download/219/198	Kualitas fisik air, kepemilikan jamban dan jenis lantai rumah	Menggunakan <i>cross sectional</i> dengan pemilihan sampel <i>simple random sampling</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kualitas fisik air ($p=0,000$), kepemilikan jamban ($p=0,000$), jenis lantai rumah ($p=0,004$) dengan kejadian diare pada balita	Jurnal internasional
7.	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada balita di Puskesmas Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019/Mega Limoy, Katarina Lit/2019)	http://jurnal.akpb-pontianak.ac.id/index.php/123akpb/article/view/83/77	Umur ibu, status pekerjaan ibu, pengetahuan ibu, status ASI, status gizi dan sarana air bersih dan jamban	Pendekatan deskriptif korelasi dengan <i>cross sectional</i> untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian diare pada balita	Terdapat hubungan yang signifikan dari faktor yang berhubungan dengan kejadian diare adalah status pekerjaan ibu dan pengetahuan ibu sedangkan faktor-faktor yang tidak mempengaruhi hubungan yang	Jurnal nasional

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan
					signifikan antara lain umur ibu, pendidikan ibu, umur balita, status ASI, status gizi balita, sarana air bersih dan jamban	
8.	Analisis aspek lingkungan dan perilaku terhadap kejadian diare pada balita di Tanah Sareal/Dewi Annisa Qisti, Elwa Nanda Eka Putri, Hafifah Fitriani, Salsa Putri Irayani, Syavira Anastakim Zulian Pitaloka/2021	https://www.google.com/url?sa=T&source=Web&Rct=J&url=https://stpmataram.e-journal.id/JIP/article/download/956/749&ved=2ahukewjcpr6lw9_0ahup7hmbhstpckaqfnoecbmqaq&usg=AOvVaw1gdnqqt_Hgskkenkltg_XO	Aspek lingkungan meliputi rumah sehat dan sumber air, aspek kepemilikan jamban dan kualitas sumber air bersih dan jamban sehat	Deskriptif dengan desain penelitian <i>cross-sectional</i>	Terdapat hubungan yang signifikan antara aspek lingkungan terutama pada jamban dengan kejadian diare pada balita dikarenakan masyarakat Tanah Sareal memiliki jamban kurang baik dan mempunyai yang lebih besar tertular penyakit sedangkan pada	Jurnal nasional

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan
					aspek sumber air, rumah sehat dan kualitas air tidak ada hubungan yang signifikan dengan kejadian penyakit diare pada balita	
9.	Analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian diare balita di Kelurahan Karyajaya Kota Palembang/Rizcita Prilia Melvani, Hilda Zulkifli, Muhammad Faizal/2019	http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/kesmas/article/view/4052/2068	Pendidikan ibu, ASI eksklusif, higiene sanitasi makanan dan minuman	Menggunakan metode kuantitatif, dengan rancangan desain studi <i>cross sectional</i>	Menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan ibu, ASI eksklusif, higiene sanitasi makanan dan minuman terhadap kejadian diare pada balita	Jurnal nasional
10.	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada balita di Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru/Alfianur, Toni Zyandera, Tria Monja Mandira, Ritta	http://openjurnal.masda.ac.id/index.php/edumasda	Karakteristik (umur, pendidikan, pekerjaan) pengetahuan ibu, kebiasaan cuci tangan, p embuang sampah,	Studi kuanti dengan rancangan <i>case control study</i> Dengan pendekatan, pengamatan dan analisa data	Terdapat hubungan antara pengetahuan ibu, kebiasaan mencuci tangan, pembuangan sampah dengan kejadian diare	Jurnal nasional

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan
	Farma, Nurwulan Adi Ismaya, 2021			diwaktu yang sama.	pada balita	



Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas faktor risiko mengenai penyakit diare terutama pada balita seperti penelitian (Mirsiyanto & Sitorus, 2020), (Solomon et al., 2020) dan (Fenta & Nigussie, 2021). Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada hal-hal sebagai berikut :

1. Perbedaan pada jenis variabel yang akan diteliti, dimana variabel dalam penelitian ini yaitu kualitas air bersih, fasilitas jamban sehat, saluran pembuangan air limbah, perilaku cuci tangan pakai sabun, pemberian ASI dan pengetahuan ibu.
2. Terdapat perbedaan pada desain penelitian, dimana desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif analitik dengan pendekatan *cross sectional*.
3. Terdapat perbedaan pada lokasi dan waktu penelitian, dimana lokasi ini dilakukan di wilayah Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2022

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab tingginya kejadian diare pada balita di wilayah Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini Adalah :

- a. Untuk mengetahui hubungan faktor kualitas air bersih terhadap kejadian penyakit diare pada balita
- b. Untuk mengetahui hubungan faktor fasilitas jamban sehat terhadap kejadian penyakit diare pada balita
- c. Untuk mengetahui hubungan faktor saluran pembuangan air limbah terhadap kejadian penyakit diare pada balita
- d. Untuk mengetahui hubungan faktor perilaku cuci tangan pakai sabun terhadap kejadian penyakit diare pada balita
- e. Untuk mengetahui hubungan faktor pemberian ASI terhadap kejadian penyakit diare pada balita
- f. Untuk mengetahui hubungan faktor pengetahuan ibu terhadap kejadian penyakit diare pada balita

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan dan pedoman bagi tenaga kesehatan, masyarakat umum dan juga memberika sumbangsi ilmiah dalam memperkaya khazanah keilmuan serta sebagai bahan penelitian selanjutnya dan untuk dokumentasi ilmiah untuk mencegah tingginya penyakit diare pada balita.

a. Bagi masyarakat

Sebagai sumber informasi dan bacaan dan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejadian diare pada balita.

b. Bagi Puskesmas

Sebagai sumber masukan untuk acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka peningkatan kesehatan balita dan juga dapat digunakan sebagai membuat langkah selanjutnya dalam upaya menekan atau menurunkan angka kejadian penyakit diare pada balita.

c. Bagi Institusi

Sebagai sumber bacaan dan referensi bagi perpustakaan di instansi pendidikan mengenai penyakit diare pada balita.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penyakit Diare

1. Definisi Penyakit Diare

Penyakit diare menurut *World Health Organization* (WHO) merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi feses yang lebih lembek hingga mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar dari biasanya yaitu tiga kali atau lebih dalam sehari dan bahkan biasanya disertai dengan darah atau lendir (Shafira et al., 2021). Sementara untuk kelompok bayi dan anak-anak, penyakit diare didefinisikan sebagai pengeluaran feses yang lebih dari 10 g/kg/hari sedangkan rata-rata pengeluaran feses normal bayi sebesar 5-10 g/kg/hari (Kemenkes RI, 2011).

2. Etiologi Penyakit Diare

Menurut (Maryunani, 2010) penyebab penyakit diare dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya :

a. Faktor infeksi

- 1) Infeksi internal yaitu infeksi yang terjadi pada saluran pencernaan dan merupakan penyebab utama kejadian diare pada anak. Rotavirus merupakan penyebab utama infeksi 70-80.
- 2) sementara bakteri dan parasit ditemukan 10-20% pada anak.
- 3) Infeksi parenteral yaitu infeksi yang terjadi diluar saluran pencernaan makanan seperti otitis media akut (OMA), bronkopneumonia, tonsilitis. Keadaan ini sering terjadi pada bayi dan anak terutama yang berusia dibawah dua tahun.

b. Faktor malabsorpsi (gangguan absorpsi)

Faktor malabsorpsi dibedakan menjadi tiga yaitu malabsorpsi karbohidrat yang sering terjadi pada bayi dan anak adalah intoleransi laktosa. Malabsorpsi lemak terjadi jika dalam makanan ditemukan lemak yang disebut *trigliserida* yang dibantu dengan kelenjar lipase (jika tidak ada kontribusi dari lipase maka akan terjadi kerusakan mukosa usus, diare dapat terjadi karena tidak terserap dengan baik). Lipase bertujuan untuk mengubah lemak menjadi micelles yang siap diabsorpsi usus dan yang terakhir yaitu malabsorpsi protein

c. Faktor makanan dan minuman

Makanan yang dapat menyebabkan kejadian diare adalah makanan yang tercemar, basi, beracun, terlalu banyak mengandung lemak, mentah (sayuran), dan kurang matang. Menurut penelitian yang dilakukan (Siregar & Batubara, 2018) air bersih yang digunakan untuk mencuci peralatan makan dan minum, mencuci bahan makanan, mandi dan minum berisiko terkontaminasi bakteri patogen jika perilaku mencucinya kurang baik.

- 1) sementara bakteri dan parasit ditemukan 10-20% pada anak.
- 2) Infeksi parenteral yaitu infeksi yang terjadi diluar saluran pencernaan makanan seperti otitis media akut (OMA), bronkopneumonia, tonsilitis. Keadaan ini sering terjadi pada bayi dan anak terutama yang berusia dibawah dua tahun.

d. Faktor malabsorpsi (gangguan absorpsi)

Faktor malabsorpsi dibedakan menjadi tiga yaitu malabsorpsi karbohidrat yang sering terjadi pada bayi dan anak adalah intoleransi laktosa. Malabsorpsi lemak terjadi jika dalam makanan ditemukan lemak yang disebut *trigliserida* yang dibantu dengan kelenjar lipase (jika tidak ada kontribusi dari lipase maka akan terjadi kerusakan mukosa usus, diare dapat terjadi karena tidak terserap dengan baik). Lipase bertujuan untuk mengubah lemak menjadi micelles yang siap diabsorpsi usus dan yang terakhir yaitu malabsorpsi protein

e. Faktor makanan dan minuman

Makanan yang dapat menyebabkan kejadian diare adalah makanan yang tercemar, basi, beracun, terlalu banyak mengandung lemak, mentah (sayuran), dan kurang matang. Menurut penelitian yang dilakukan (Siregar & Batubara, 2018) air bersih yang digunakan untuk mencuci peralatan makan dan minum, mencuci bahan makanan, mandi dan minum berisiko terkontaminasi bakteri patogen jika perilaku mencucinya kurang baik.

f. Faktor Psikologis

Seperti rasa takut, cemas serta tegang, apabila terjadi pada kelompok anak dapat menyebabkan kejadian diare kronis. Namun jarang sekali terjadi pada kelompok balita, umumnya terjadi pada kelompok anak yang lebih besar.

Sedangkan penyebab kejadian diare yang ditinjau dari faktor *host* (penjamu), *agent* dan faktor *environment* (lingkungan), dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Host* (penjamu)

Host merupakan insiden diare paling banyak pada kelompok balita, dikarenakan daya tahan tubuh yang sangat lemah sistem pencernaan dalam hal ini adalah lambung yang tidak dapat menghancurkan makanan dengan baik dan sehingga kuman tidak dapat dimusnahkan dan betah di dalam lambung, sehingga hal itu dengan mudah membuat kuman untuk menginfeksi saluran pencernaan. Jadi jika terjadi demikian, maka akan memicu berbagai macam penyakit tanpa terkecuali diare.

b. *Agent*

Agent merupakan penyebab terjadinya penyakit diare, dimana jelas disebabkan oleh faktor infeksi oleh kuman, malabsorpsi dan faktor makanan atau minuman. Faktor yang paling dominan dalam kejadian penyakit diare terhadap kelompok balita yaitu infeksi kuman *e.coli*, *salmonella*, *vibrio cholera* (kolera).

c. *Environment* (lingkungan)

Penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang berbasis lingkungan, dua faktor lingkungan yang paling mendominasi yaitu tempat air bersih dan pembuangan feses. Kedua faktor tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain kemudian selanjutnya berinteraksi dengan perilaku manusia. Apabila faktor perilaku manusia tidak baik karena terinfeksi kuman diare serta berinteraksi dengan perilaku manusia yang tidak baik (sehat) pula yang melalui perantara makanan dan minuman, maka kemungkinan besar dapat menimbulkan penyakit diare. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyakit diare maka perlu untuk

menjaga kebersihan lingkungan. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ
الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظَّفُوا أَفْنَيْتَكُمْ {رواه اترمذي}

Artinya : “Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu” (Sunan At-Tirmidzi : 2799)

Dari hadis di atas adapun hikmah yang dapat dipetik, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar senantiasa menjaga kebersihan mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar karena sesungguhnya Allah menyukai hal tersebut. Namun dalam kehidupan seperti saat ini belum bisa menerapkan teori-teori kebersihan untuk menjaga kesehatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan heran apabila dalam kehidupan yang penuh kemajuan sekarang ini begitu banyak macam penyakit yang muncul dan menyerang manusia terutama pada balita yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah sehingga rentan terjangkit penyakit.

3. Klasifikasi Penyakit Diare

Penyakit diare diklasifikasikan berdasarkan lama waktu serangan terdiri dari :

a. Diare akut

Merupakan buang air besar dengan frekuensi meningkat dan sifatnya mendadak datangnya dan berlangsung dalam waktu kurang dari 2 minggu tanpa

diselang-seling. Berdasarkan banyaknya elektrolit dari tubuh penderita, tingkat penyakit diare dibedakan dalam empat kategori, yaitu :

- 1) Diare tanpa dehidrasi
- 2) Diare dengan dehidrasi ringan 3%-5%
- 3) Diare dengan dehidrasi sedang 5%-10%
- 4) Diare dengan dehidrasi berat 10%-15%

b. Diare persisten

Diare persisten merupakan diare yang terjadi 15-30 hari. Diare ini kelanjutan dari diare akut atau peralihan (diare akut dan kronik)

c. Diare kronik

Merupakan diare yang kejadiannya dinamakan hilang-timbul, atau kadang berlangsung lama dengan penyebab non-infeksi, seperti penyakit sensitif terhadap gluten atau gangguan metabolisme tubuh yang menurun. Lama diare kronik lebih dari 2 minggu dan bersifat menahun atau persisten. Diare kronik bukanlah penyakit kesatuan, melainkan suatu sindrom yang penyebab dan patogenesisnya multikompleks.

4. Gejala dan Tanda Penyakit Diare

Beberapa gejala dan tanda penyakit diare antara lain :

a. Gejala Umum

- 1) Tinja cair atau lembek dan sering ada gejala khusus
- 2) Muntah, biasanya menyertai diare pada gastroenteritis
- 3) Demam, dapat mendahului atau tidak mendahului gejala diare

- 4) Gejala dehidrasi, yaitu mata cekung, ketegangan kulit menurun, apatis, bahkan gelisa

b. Gejala spesifik

- 1) *Vibrio cholerae* yaitu diare hebat, warna tinja seperti cucian beras dan bahkan berbau amis
- 2) *Disentriiform* yaitu tinja berlendir dan berdarah

Sedangkan diare yang berkepanjangan dapat menyebabkan :

a. Kekurangan cairan (dehidrasi)

Dikatakan dehidrasi tergantung dari persentase cairan tubuh yang hilang.

Dehidrasi akibat diare dibedakan menjadi tiga yaitu:

1) Tanpa dehidrasi

biasanya anak merasa normal, tidak rewel, masih bisa bermain seperti biasa. Umumnya karena diarenya tidak berat, anak masih mau makan dan minum seperti biasa.

2) Dehidrasi ringan atau sedang

menyebabkan anak rewel atau gelisah, mata sedikit cekung, turgor kulit masih kembali dengan cepat jika dicubit.

3) Dehidrasi berat

Seperti anak apatis (kesadaran berkabut), mata cekung, pada cubitan kulit turgor kembali lambat, napas cepat, serta anak kelihatan lemah.

b. Gangguan sirkulasi

Pada diare akut, kehilangan cairan dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Jika kehilangan cairan ini lebih dari 10% berat badan, pasien

dapat mengalami syok dan presyok yang disebabkan oleh *hipokalemia* atau kekurangan volume darah

c. Gangguan asam-basa (asidosis)

Hal ini terjadi akibat kehilangan *bikarbonat* (cairan elektrolit) dari dalam tubuh. Sebagai kompensasinya tubuh akan bernapas cepat untuk membantu meningkatkan Ph arteri.

d. Kadar gula darah rendah (hipoglikemia)

Hipoglikemia sering dialami pada anak yang sebelumnya mengalami kekurangan gizi. Hipoglikemia dapat menyebabkan koma. Penyebab hipoglikemia belum diketahui pasti, namun kemungkinan cairan ekstraseluler menjadi hipotonik dan air masuk ke dalam cairan intraseluler sehingga terjadi edema otak yang mengakibatkan koma.

e. Gangguan gizi

Gangguan ini terjadi karena kurangnya asupan makanan dan pengeluaran tinja yang berlebihan (tidak seimbang). Hal ini justru akan berakibat fatal bila pemberian makanan dihentikan atau memang sebelumnya penderita sudah mengalami kekurangan gizi (malnutrisi).

5. Cara Penularan dan Faktor Resiko

Menurut Widoyono (2010) kejadian penyakit diare didominasi 75% disebabkan oleh infeksi kuman seperti virus dan bakteri. Penularan penyakit diare melalui jalur orofekal terjadi dengan mekanisme berikut ini

- a. Melalui air yang merupakan tempat penularan pertama. Penyakit diare dapat terjadi apabila seseorang menggunakan air minum yang sudah

terkontaminasi (tercemar), baik tercemar dari sumbernya, tercemar selama perjalanan air sampai ke rumah-rumah, atau bahkan tercemar pada saat disimpan di rumah. Pencemaran air di rumah jika terjadi bila tempat penyimpanan tidak tertutup atau apabila tangan yang tercemar menyentuh air pada saat mengambil air dari tempat penyimpanannya.

- b. Melalui tinja yang terinfeksi. Tinja yang sudah terinfeksi mengandung virus atau bakteri dalam jumlah besar. Jika tinja tersebut dihirup oleh binatang (serangga) dan kemudian binatang tersebut hinggap di makanan, maka secara langsung makanan itu dapat menularkan diare kepada orang yang memakannya.

Dua Faktor resiko yang memungkinkan terjadinya penyakit diare yaitu faktor perilaku dan faktor lingkungan.

Faktor perilaku antara lain :

- a. Pada usia 4 bulan bayi tidak diberi lagi ASI eksklusif lagi. Hal ini dapat meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas karena penyakit diare, hal ini disebabkan karena ASI banyak mengandung zat-zat kekebalan terhadap infeksi. Adapun dalil Al-quran yang menjelaskan tentang pemberian ASI terdapat dalam QS. Al-Baqarah/ 2:233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 ارِّضَاعَهُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

مِنْهُمَا وَتَشَاوِرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْ
لَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرِفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {٢٣٣}

Terjemahannya :“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah/ 2:233).

Menurut tasfir Al-Wasith dalam ayat tersebut menjelaskan, bahwa dan menjadi kewajiban para ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi ibu yang berniat menyempurnakan proses penyusuan, dan menjadi kewajiban para ayah untuk menjamin kebutuhan pangan dan sandang wanita-wanita menyusui yang telah diceraikan dengan cara-cara yang patut sesuai syariat dan kebiasaan setempat. ini berarti bahwa al-quran sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun bila ayah dan ibu menyusui ingin menyapih anak sebelum genap dua tahun, dengan ridha dan persetujuan keduanya untuk kemaslahatan anak, maka tidak ada dosa atas keduanya, di mana maslahat umum menghendaki hal tersebut (Az-Zuhaili, 2012).

- b. Memberikan susu formula dalam botol kepada bayi. Pemakaian botol akan mudah meningkatkan resiko pencemaran kuman, dan susu akan mudah

terkontaminasi oleh kuman dari botol dan kuman akan cepat berkembang bila susu lambat dikonsumsi (segera diminum)

- c. Menyimpan makanan pada tempat yang tidak higienis. Kondisi tersebut akan menyebabkan makanan mengalami kontak dengan peralatan makan yang merupakan media yang sangat baik bagi perkembangan mikroba
- d. Tidak menerapkan kebiasaan mencuci tangan baik pada saat memasak, makan, atau bahkan sesudah buang air besar (BAB) kondisi tersebut memungkinkan kontaminasi langsung

Faktor lingkungan antara lain :

- a. Ketersediaan sumber air bersih yang masih kurang memadai sehingga menyebabkan kurangnya ketersediaan mandi cuci kakus (MCK)
- b. Kebersihan lingkungan dan pribadi yang masih buruk (tidak sehat)

6. Manifestasi Klinis Penyakit Diare

Awalnya bayi maupun anak menjadi cengeng, gelisah, biasanya suhu badan akan meningkat, berkurangnya nafsu makan atau tidak ada, mual, muntah, nyeri perut dan pada akhirnya terjadi diare. Feses cair dan biasanya mengandung darah bahkan berlendir. Warna feses semakin lama berubah menjadi kehijau-hijauan karena bercampur dengan cairan empedu. Meningkatnya asam laktat membuat anus dan daerah sekitarnya menjadi lecet yang disebabkan oleh fermentasi laktosa yang tidak dapat diabsorpsi usus besar. Kejadian muntah dapat terjadi sebelum atau sesudah diare dan dapat dipengaruhi oleh lambung yang turut meradang atau bahkan karena gangguan metabolik asidosis dan elektrolit. Menurut (Maryunani, 2010) bila telah banyak kekurangan cairan dan elektrolit

maka dapat menyebabkan dehidrasi, berat badan menurun, bentuk ubun-ubun besar cekung pada bayi, tonus dan turgor kulit berkurang, selaput lendir pada mulut dan bibir tampak kering, sesak napas, kejang-kejang bahkan menurunnya kesadaran.

7. Penanganan Penyakit Diare

Menurut (Kemenkes RI, 2011) prinsip penanganan penyakit diare pada kelompok balita yaitu LINTAS DIARE (lima langkah tuntaskan diare) yang direkomendasikan oleh *World Health Organization* (WHO). Adapun Program LINTAS DIARE yakni :

a. Pemberian Oralit

Oralit merupakan cairan terbaik bagi penderita diare untuk mengganti dehidrasi. Namun bila tidak tersedia oralit maka bisa diganti dengan air tajin, kuah sayur, ataupun air matang.

b. Pemberian zinc selama 10 hari berturut-turut

Zinc (seng) sangat baik dan aman dalam mencegah penyakit diare. Penelitian membuktikan bahwa suplemen zinc (seng) dapat menurunkan angka kejadian diare akut dan persisten. Hal ini dibuktikan selama pemberian zinc mampu mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi BAB, menurunkan volume feses

c. Selalu memberi ASI dan makanan

ASI merupakan makanan terbaik bayi yang mempunyai manfaat pencegahan secara imunologik dengan adanya antibodi dan zat-zat lain yang ada dalam kandungannya. ASI turut memberikan kontribusi dalam

pencegahan kejadian penyakit diare pada kelompok bayi yang baru lahir. Pemberian ASI eksklusif mempunyai daya lindung pertahanan empat kali lebih besar terhadap kejadian penyakit diare daripada pemberian susu formula.

d. Pemberian Antibiotik hanya atas indikasi

Antibiotik diberikan hanya pada saat terjadi indikasi contohnya pada kejadian diare berdarah dan korelasi sebab pemberian antibiotik yang tidak tepat akan mempengaruhi waktu lamanya kejadian diare karena mengganggu flora usus dan juga akan mempercepat resistensi kuman terhadap antibiotik dan sehingga menambah resistensi kuman.

e. Pemberian nasehat pada orang tua/pengasuh

Adapun nasehat yang diberikan yaitu bagaimana cara memberikan pengobatan diare di rumah, pemberian makan dan segera konsultasi ke petugas kesehatan/puskesmas setempat bila terdapat gejala dan tanda bahaya seperti demam, feses berdarah, muntah berulang, perilaku konsumsi makanan dan minum sedikit, dehidrasi dan kejadian diare yang sering.

8. Pencegahan Penyakit Diare

Kegiatan pencegahan kejadian penyakit diare yang baik dan benar yang dapat dilakukan adalah menerapkan perilaku dan lingkungan sehat.

a. Akses air minum

Dengan memastikan akses air minum yang akan digunakan (konsumsi) oleh keluarga bebas dari pencemaran limbah rumah tangga, kotoran

manusia, kotoran hewan, dan, tempat penyimpanan air minum yang tertutup, serta memastikan penggunaan rebus untuk minum dan ketersediaan air yang cukup.

b. Sanitasi yang baik

Penggunaan jamban yang tidak sehat dan pembuangan tinja yang tidak aman sangat berkontribusi dalam penyebaran agen penyakit diare.

c. Mencuci tangan menggunakan sabun

Semua agen penyebab penyakit diare dapat ditularkan melalui tangan yang telah terkontaminasi tinja. Mencuci tangan pakai sabun merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko terjadinya diare

d. Pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan

Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif jauh lebih kecil kemungkinannya terjangkit penyakit diare atau meninggal dibandingkan dengan bayi yang tidak sama sekali mendapatkan ASI eksklusif. Hampir setengah dari episode penyakit diare dapat dicegah dengan meningkatkan pemberian ASI di negara berpendapatan rendah dan menengah.

e. Kebersihan pribadi dan makan enak

Pemberian makanan tambahan (PMT) pada bayi dilakukan setelah usia enam bulan. Pemberian makanan yang baik meliputi makanan makanan yang bergizi, pola makan, dan kebersihan dalam menyiapkan makanan. Karena nutrisi yang baik mendukung sistem kekebalan yang kuat dan memberikan perlindungan dari penyakit.

f. Promosi kesehatan mengenai infeksi penyebar

Edukasi kesehatan yang disampaikan meliputi pencegahan infeksi di rumah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

g. Vaksinasi Rotavirus

Rotavirus merupakan penyebab paling umum dari penyakit diare berat anak pada balita dan Infeksi rotavirus dapat dicegah dengan imunisasi rotavirus.

h. Suplementasi vitamin A

Dosis tinggi suplementasi vitamin A dapat membantu menjaga daya tahan tubuh dan dapat menurunkan kasus diare hingga 15%.

B. Tinjauan Balita

1. Definisi Balita

Menurut (Maryunani, 2010) balita merupakan semua anak termasuk bayi yang baru lahir, yang usianya 0 sampai tepat menjelang 5 tahun (4 tahun, 11 bulan, 29 hari). Namun pada umumnya ditulis dengan notasi 0-4 tahun. Menurut (Soekirman, 2006), kelompok balita dibagi menjadi dua yaitu kelompok balita dengan usia 1-3 tahun dan kelompok balita dengan usia 3-5 tahun.

2. Karakteristik Perkembangan Balita

Menurut Sigmund Freud tingkat perkembangan seseorang terbagi kedalam beberapa fase, diantaranya :

a. Fase oral

Fase ini terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Psikoseksual pada fase ini adalah organ mulut. Jika seorang bayi yang baru lahir mulut adalah alat yang

paling memberikan kenikmatan. Pada masa ini juga anak memiliki keinginan mencoba semua yang ada disekitarnya dan kemudian dimasukan ke dalam organ mulutnya. Sehingga dengan perilaku tersebut dapat dengan mudah terjadi penyebaran kuman akibat diare yang melalui mulut.

b. Fase anal

Fase ini terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun. Berawal dari fase ini anak akan mendapatkan pengalaman pertama mengenai pengaturan impuls-impulsnya dari luar.

c. Fase falik

Fase ini terjadi pada usia 3 sampai 5 tahun. Pada fase ini terjadi peningkatan perkembangan seksual dan rasa agresi dan juga alat-alat kelamin anak mulai mengalami perkembangan hati nurani, dimana anak belajar mengenal standar moral.

Adapun dalil Al-quran yang menjelaskan tentang tumbuh kembang balita sampai dewasa atau tua terdapat dalam QS. Al-Ghafir/ 40:67

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ
وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahannya: “Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian ditumbuhkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. (kami perbuatan demikian) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti”(Qs. Al-Ghafir/ 40:67)

Berdasarkan tafsir Al-Wasith ayat di atas menjelaskan bahwa, tuhan menciptakan seorang manusia melalui tahap mulai dari bayi atau balita sampai kita dewasa, tetapi diantara sebagian manusia diwafatkan sebelum dewasa atau tua (Az-Zuhaili, 2012). Penyebab utama kematian anak sebelum dewasa adalah faktor kesehatan atau adanya penyakit seperti kasus diare pada anak balita yang banyak terjadi pada saat sekarang ini (Hijriani et al., 2020).

C. Tinjauan Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Penyakit Diare pada Balita

Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit diare pada kelompok balita yakni :

1. Kualitas Air Bersih

Yaitu air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan dan air bersih yang dapat diminum (konsumsi) apabila dimasak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai syarat-syarat dan pengawasan air minum KEPMENKES RI No.907/MENKES/SK/VI/2002 menyatakan bahwa air minum harus memenuhi persyaratan kesehatan kualitas air minum. Berdasarkan hasil keputusan tersebut yang dimaksud dengan jenis air minum yaitu :

- a. PDAM yaitu air yang dialirkan melalui pipa untuk kepentingan rumah tangga
- b. Air yang dialirkan melalui tangki air
- c. Air kemasan

- d. Air yang dimanfaatkan untuk untuk bahan pengolahan makanan dan minuman

Air yang disajikan untuk masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan air minum beberapa persyaratannya yakni :

- a. Persyaratan kuantitatif

Yaitu jumlah air bersih yang diperlukan oleh setiap rumah tangga sangat beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator, diantaranya yaitu sumber air bersih yang ada, perilaku masyarakat, harga langganan air, dan PDAM misalnya dalam aspek pengelolaan air.

- b. Persyaratan kualitatif

Sesuai dengan PERMENKES No.416/MENKES/PER/IX/1990, air bersih atau air minum yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi harus memenuhi persyaratan fisik, kimiawi, bakteriologis dan radioaktivitas. Syarat fisik air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga harus jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tawar (tidak berasa).

Penelitian dari (Mirsiyanto & Sitorus, 2020), mengatakan bahwa kualitas air bersih sangat berhubungan dengan penyebab kejadian penyakit diare bahkan penyediaan air bersih yang buruk dapat menyebabkan diare kronis pada balita di Kota Jambi dengan nilai ($p=0,013$)

Adapun dalil al-quran yang menjelaskan tentang air bersih yaitu QS. Al-Furqaan/ 25:48

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنْ أَلْسَمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Terjemahannya : “Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih”(QS. Al-Furqaan/ 25:48).

Menurut tasfir Al-Wasith dalam ayat tersebut menjelaskan, bahwa dan dialah Allah yang memerintahkan para malaikatnya untuk meniupkan angin menggiring awan dari berbagai penjuru, sebagai pembawa kabar gembira bagi segenap manusia sebelum kedatangan rahmatnya berupa hujan sebagai kasih sayang kepada makhluknya, dan kami turunkan dari langit yang sudah dipenuhi uap air, air yang sangat bersih, yang bisa dipergunakan untuk berbagai macam keperluan hidup (Az-Zuhaili, 2012).

2. Fasilitas Jamban Sehat

Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa upaya dalam penggunaan jamban mempunyai efek yang sangat besar dalam menurunkan risiko terhadap kejadian penyakit diare. Menurut (Kemenkes RI, 2011), jika keluarga tidak memiliki jamban maka harus membuat jamban dan keluarga harus buang air besar (BAB) di jamban tersebut. Kemenkes telah menetapkan tujuh syarat dalam membangun jamban sehat yakni :

- a. Tidak mencemari air
- b. Tidak mencemari tanah permukaan
- c. Bebas dari serangga
- d. Tidak menimbulkan bau dan bahkan nyaman digunakan
- e. Harus aman digunakan oleh pemakainya
- f. Mudah dalam dibersihkan dan tidak menimbulkan gangguan bagi pemakainya

- g. Tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan

Selain syarat pembuatan jamban ada juga macam-macam tempat jamban, diantaranya :

- a. *Pit Latrine* (jamban cemplung)

Jamban ini sering ditemui di daerah pedesaan. Jamban cemplung dibuat dengan jalan membuat lubang ke dalam tanah dengan diameter sekitar 80 – 120 cm dengan kedalaman 2,5 hingga 8 meter. Jenis jamban ini tidak boleh terlalu dalam dikarenakan akan mengotori air dalam tanah dibawahnya. Adapun jarak dari sumber air minum kurang lebih 15 meter.

- b. *Water Latrine* (jamban air)

Jamban air terdiri dari bak yang kedap air, yang di dalam diisi air sebagai tempat pembuangan feses dan proses pembusukannya pun sama seperti pembusukan tinja di dalam air kali.

- c. *Angsa Latrine* (jamban leher angsa)

Bentuk jamban ini seperti leher angsa sehingga akan terus terisi air. Air ini berfungsi sebagai sumbat agar bau busuk dari kakus tidak tercium. Ketika dipakai tinjanya tertampung sebentar dan jika sudah disiram air baru akan masuk ke bagian yang menurun untuk masuk ke wadah penyimpanannya.

- d. *Bored Hole Latrine* (jamban bor)

Bentuk jamban ini sama dengan jamban cemplung hanya saja ukurannya sedikit lebih kecil karena untuk penggunaan yang tidak lama. Contohnya seperti untuk perkampungan sementara. Kekurangan dari jamban ini adalah jika air

permukaan mengalami penguapan maka mudah terjadi pengotoran tanah permukaan.

e. *Bucket Latrine* (jamban keranjang)

Tipe jamban seperti ini biasanya mengeluarkan bau. Dalam jamban ini feses ditampung dalam wadah (ember) atau benda lain dan selanjutnya dibuang ke tempat lain, contohnya seperti bagi penderita yang tidak dapat meninggalkan tempat tidur. Bentuk jamban ini biasanya menarik perhatian lalat yang jumlah besar, namun tidak di lokasi jambannya, tetapi di sepanjang perjalanan ke tempat pembuangan.

f. *Trench Latrine* (jamban parit)

Jamban parit dibuatkan lubang untuk defaecatie dalam tanah sekitar kedalamannya 30 sampai 40 cm sedangkan tanah galiannya digunakan untuk menutup lubang tersebut. Penggunaan jamban ini sering mengakibatkan pelanggaran standar dasar sanitasi, terutama seperti yang berhubungan dengan preventif pencemaran tanah, pemberantasan lalat serta pencegahan pencapaian feses oleh hewan.

g. *Overhung Latrine* (jamban empang/gantung)

Bentuk jamban seperti ini semacam rumah-rumahan yang dibuat di atas kolam, selokan, kali, rawa dan lain-lain sehingga dengan demikian mengotori air permukaan sehingga vektor penyakit yang terdapat didalamnya dapat tersebar kemana-mana melalui air, sehingga menimbulkan wabah.

h. *Chemical Toilet* (jamban kimia)

Dalam jamban ini feses ditampung dalam suatu benda yang berisi caustic soda sehingga dihancurkan sekaligus didesinfeksi. Namun biasanya dipergunakan dalam kendaraan umum misalnya kereta api, tetapi dapat pula digunakan dalam rumah.

Tujuan pembuangan tinja yang sesuai dengan syarat kesehatan adalah untuk menampung dan mengisolasi tinja sedemikian rupa sehingga kontak langsung atau tidak langsung antara tinja dengan manusia dapat dicegah. Penelitian dari (Nguyen & Tran, 2019), mengatakan bahwa terdapat hubungan antara fasilitas jamban sehat dengan kejadian diare pada anak dengan nilai ($p=0,000$).

3. Saluran Pembuangan Air Limbah

Air buangan atau limbah yang bersumber dari rumah tangga merupakan air limbah yang berasal dari air limbah kamar mandi, kegiatan dapur, jamban dapur, mencuci pakaian, mencuci peralatan rumah tangga dan sebagainya yang secara kuantitatif terdiri dari zat organik berupa zat padat atau zat cair. Sehingga dapat disimpulkan air limbah juga beresiko menimbulkan penyakit jika tidak dikelola dengan baik dengan sistem pembuangan air limbah rumah tangga yang memenuhi syarat kesehatan.

Air limbah rumah tangga harus dikelola sedemikian baik agar tidak menimbulkan sumber penularan penyakit. Sarana pembuangan air limbah (SPAL) yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan bau yang tidak sedap, mengganggu estetika dan dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk

serta tikus sehingga kondisi seperti ini berpotensi menularkan penyakit. Penelitian dari (Prabaswara, 2021) mengatakan bahwa adanya hubungan antara ketersediaan saluran pembuangan air limbah dengan kejadian diare pada anak dengan nilai ($p\text{-value}=0,001$).

4. Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun

Penyakit diare yaitu salah satu penyakit yang kejadiannya (penularan) berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Perilaku cuci tangan pakai sabun (CPTS) adalah perilaku yang sangat penting dalam penularan penyakit diare, sebab tangan merupakan media yang sangat berperang penting dalam penyebaran penyakit melalui *faecal oral*. Kuman yang disebabkan diare bisa didapatkan dimana saja pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari dan kuman tersebut dapat menempel di tangan kita. Oleh sebab itu sebelum makan sebaiknya mencuci tangan dulu.

Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan perorangan yang penting dalam penularan virus (kuman) diare yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan sabun terutama sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan atau menyuapi anak, setelah buang air besar (BAB), dan sebelum membersihkan peralatan makan balita. Penelitian dari (Mahendra et al., 2021) mengatakan bahwa perilaku mencuci tangan merupakan salah satu faktor resiko dalam kejadian penyakit diare.

5. Pemberian Asi

Air susu ibu (ASI) merupakan makanan terbaik bagi bayi. Pemberian ASI sudah cukup untuk melindungi perkembangan hingga umur 6 bulan. ASI bersifat (

steril (bersih), berbeda dengan sumber susu lain seperti susu kemasan (formula) atau cairan lain yang sebelumnya sudah disiapkan yang sifatnya dapat terkontaminasi dalam botol yang kotor. ASI mempunyai khasiat pencegahan secara imunologik dengan adanya antibodi dan zat-zat yang terkandung didalamnya yang bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh yang nantinya akan melindungi anak dari berbagai infeksi seperti bakteri, virus, parasit, serta jamur. ASI memberikan kontribusi dalam perlindungan terhadap kejadian penyakit diare. Pemberian ASI yang secara penuh mempunyai daya pertahanan 4 kali lebih besar terhadap kejadian diare daripada pemberian ASI yang dibarengi dengan susu botol.

Penelitian dari (Melvani et al., 2019) mengatakan bahwa adanya hubungan antara perilaku pemberian ASI dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan Karyajaya Kota Palembang dengan nilai ($p=0,009$).

6. Pengetahuan Ibu


Pengetahuan menurut KBBI, dapat diartikan sebagai segala macam hal yang diketahui, kepintaran. Kekurangan pengetahuan ibu mengenai pencegahan diare pada balita sangat beresiko. Karena pengetahuan yang baik merupakan sebuah faktor yang akan mendorong ibu untuk selalu mempertahankan kebiasaan kesehatan yang baik. Hal diatas didukung dengan pernyataan Notoatmodjo (2010) yang menyatakan bahwa pengetahuan atau kognitif adalah sesuatu yang sangat penting dalam terbentuknya tindakan dan perilaku seseorang. Jika perubahan kebiasaan di dasari dengan pengetahuan dan perilaku positif maka akan membuat

perilaku tersebut bertahan lebih lama dibandingkan dengan kebiasaan yang tidak didasari dengan pengetahuan.

Penelitian dari (Mirza Muhammad Ahsan Baig et al., 2022) mengatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian penyakit diare pada balita.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan isi seluruh teori yang akan dibahas oleh peneliti. Jika dilihat dari paparan teori diatas, bahwa kejadian penyakit diare merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan, sangat berkaitan dengan sumber penyakit, media transmisi, serta alur interaksi antara manusia (individu) serta dengan lingkungan yang memiliki besar potensi bahaya gangguan kesehatan. Kerangka teori pada penelitian ini digambarkan pada tabel berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Teori

Sumber : Modifikasi dari berbagai referensi Kerangka Teori


H.L Blum dalam Buku Notoatmodjo (2010), (Arbobi, 2018),

(Hidayat, 2017), (Purba, 2012)

E. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan bagan yang digunakan dalam menggambarkan antara konsep yang ada dalam suatu teori dan mengabstraksi unsur yang ada dalam fenomena yang akan diteliti yang berisi variabel-variabel. Kerangka konsep pada penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kualitas air bersih, fasilitas jamban sehat, saluran pembuangan air limbah, perilaku mencuci tangan pakai sabun, pemberian ASI dan pengetahuan ibu sedangkan variabel dependen pada penelitian ini yaitu kejadian penyakit diare.

Faktor resiko diare pada balita



Keterangan:



: Variabel *Indenpendent*



: Variabel *Dependent*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif dengan jenis analitik dengan menggunakan pendekatan penelitian *cross sectional* yaitu melakukan pengambilan data sekaligus terhadap variabel bebas kualitas air bersih, fasilitas jamban sehat, saluran pembuangan air limbah, perilaku cuci tangan pakai sabun, pemberian ASI serta pengetahuan ibu dan variabel terikat yaitu kejadian penyakit diare pada balita pada saat yang sama (*point time approach*).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan karena penyakit diare di wilayah tersebut sangat tinggi setiap tahunnya berdasarkan data 10 penyakit terbanyak terutama pada kelompok balita. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Mei tahun 2022.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang mempunyai balita dibawah lima tahun pada periode 2021 di Kecamatan Siompu Barat yang namanya terdaftar dalam buku register Puskesmas Siompu Barat yang berjumlah 235 balita.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki balita dibawah lima tahun di

wilayah Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan pada periode 2021 berdasarkan buku register Puskesmas Siompu Barat.

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus *lame show* sebagai berikut :

$$n = \frac{Z^2 p (1 - p) N}{d^2 (N - 1) + Z^2 p (1 - p)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel Keseluruhan

N = Jumlah Popuasi

d = sampling eror (5%)

p = estimator proporsi populasi (0,05) (Purba, 2012)

Z = *Confidence coeficient* = 1,96

Sehingga didapatkan :

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,05 (1 - 0,05) 235}{0,05^2 (235 - 1) + 1,96^2 0,05 (1 - 0,05)}$$

$$n = \frac{3,842 \cdot 0,05 (1 - 0,05) 235}{0,0025 (234) + 3,842 \cdot 0,05 (1 - 0,05)}$$

$$n = \frac{42,886}{0,585 + 0,182}$$

$$n = \frac{42,886}{0,767}$$

$$n = 55,91 = 56 \text{ responden}$$

Berdasarkan hasil perhitungan sampel di atas, maka ditetapkan jumlah sampel sebanyak 56 responden. Selanjutnya, penarikan sampel menggunakan teknik proporsional Random Sampling yakni teknik sampling yang memperhatikan proporsi kelompok-kelompok dalam populasi yang diambil secara acak sehingga akan menghasilkan sampel yang proporsional dari masing-masing kelompok dengan menggunakan rumus

$$N = \frac{n_i}{N_i} n$$

$$N = \frac{\text{jumlah balita desa}}{\text{jumlah balita Puskesmas}} \times \text{jumlah sampel}$$

Keterangan :

n_i = jumlah sampel menurut startum

N_i = jumlah populasi menurut startum

n = jumlah sampel seluruhnya

N = jumlah populasi seluruhnya

Tabel 3.1
Jumlah Sampel Masing-Masing Desa

No	Desa	Populasi	Sampel
1	Lalole	27	6
2	Molona	28	7
3	Katampe	42	10
4	Mbanua	32	8
5	Lamaninggara	24	6
6	Kamoali	33	8
7	Watuampara	26	6
8	Mokobeau	26	5
	Toatal	235	56

Setelah didapatkan jumlah setiap desa, kemudian teknik pengambilan sampel pada setiap desa dilakukan secara simpel random sampling.

D. Teknik pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil data yang langsung diambil dari responden melalui wawancara menggunakan instrumen kuesioner terhadap ibu yang memiliki balita dibawah 5 tahun yang bersedia di wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini sebelum dan dikumpulkan penelitian terlebih dahulu melakukan studi pendahuluan ke Puskesmas Siompu Barat. Studi pendahuluan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang data pemilihan tenaga persalinan dari buku registrasi, hal tersebut dilakukan dengan tujuan semata-mata agar data yang telah diperoleh valid.

Dalam melakukan penelitian ada prosedur penelitian yang harus dilakukan oleh penelitian yaitu:

1. Setelah proposal mendapat persetujuan dari pembimbing, peneliti kemudian akan meminta surat pengantar izin penelitian kepada Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat untuk melakukan penelitian kemudian menyerahkan surat izin tersebut ke dekan fakultas Kedokteran dan ilmu kesehatan, setelah mendapat izin dari dekan fakultas surat izin meneliti kemudian ditujukan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Buton Selatan, kemudian balasan dari pihak Kesbangpol di tujukan ke Kecamatan siompu barat dan Puskesmas Siompu Barat.
2. Mengadakan pendekatan kepada calon responden :

- a. Menjelaskan tujuan, manfaat dan latar belakang penelitian
- b. Menjelaskan tujuan menandatangani lembar persetujuan
- c. Meminta responden menandatangani lembar persetujuan
- d. Membagikan lembar kuesioner dan menjelaskan tata cara pengisian
- e. Memberikan waktu untuk mengisi kuesioner yaitu 15 menit
- f. Mengingatkan responden bahwa semua pertanyaan yang ada telah terisi semua.
- g. Setelah terisi. Kuesioner dikumpulkan oleh peneliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner ini bertujuan untuk mengukur variabel kualitas air bersih, fasilitas jamban sehat, saluran pembuangan air limbah, perilaku cuci tangan pakai, pemberian ASI, dan pengetahuan ibu.

F. Teknik Pengolahan

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan hasil data dari setiap variabel penelitian yang kemudian akan dianalisis. Adapun tahap-tahap pengolahan data yaitu :

1. Tahap pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu tahap memeriksa kembali hasil jawaban yang ada atau data yang telah diperoleh yang dilakukan pada tahap ini yaitu menjumlahkan dan melakukan perbaikan, karena apabila ada kekurangan maka segera mungkin dilengkapi.

2. Tahap mengkode data (*coding*)

Yaitu tahap memberikan kode dalam bentuk angka dalam mengelompokkan data dari jawaban menurut kategori masing-masing responden sehingga memudahkan dalam pengelompokkan data.

3. Tahap penilaian (*scoring*)

Yaitu tahap pemberian nilai atau angka pada hasil jawaban yang tersedia pada lembar kuesioner.

4. Tahap proses data (*processing*)

Yaitu tahap memproses data untuk dapat dianalisis. Tahap ini dilakukan dengan cara memasukan data hasil kuesioner penelitian ke dalam master tabel kemudian dianalisis menggunakan SPSS untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

5. Tahap membersihkan data (*cleaning*)

Yaitu tahap pengecekan kembali data jika ada kemungkinan kesalahan kode yang telah dimasukan dan dilakukan perbaikan jika terdapat kesalahan dalam pemasukan data.

6. Tahap *tabulating*

Yaitu tahap pengelompokkan data sedemikian rupa agar dapat dengan mudah dalam menjumlah, disusun dan dirapikan untuk disajikan dan dianalisis.

G. Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh makna yang bermanfaat bagi pemecahan masalah dalam penelitian, yang dapat diolah dengan teknik-teknik tersebut. Adapun analisis data dilakukan dengan cara :

1. Analisis univariat

Analisis univariat merupakan analisis yang bertujuan untuk menjelaskan setiap variabel independen & dependen dalam bentuk distribusi frekuensi dengan menggunakan persentase atau proporsi.

$$F = x/n \times 100\%$$

Keterangan : F = Frekuensi

X = Jumlah yang didapat

n = Jumlah Sampel

Analisis univariat dalam penelitian ini meliputi usia ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, usia balita jenis kelamin balita dan kejadian diare.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat yaitu analisis yang digunakan untuk melihat adakah hubungan antara faktor kejadian penyakit diare (Variabel Independen) terhadap kejadian penyakit diare pada balita (Variabel Dependen). Untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel tersebut maka dilakukan uji *chi-square*.

Analisis bivariat di dalam penelitian ini meliputi variabel kualitas air bersih, fasilitas jamban sehat, saluran pembuangan air limbah, perilaku cuci tangan pakai sabun, pemberian ASI, pengetahuan ibu dengan kejadian penyakit diare pada balita.

Hasil uji statistik *Chi Square* pada penelitian ini akan diinterpretasikan :

1. Jika nilai $P < 0,05$ artinya ada hubungan dengan kejadian penyakit diare di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.

2. Jika nilai $P > 0,05$ artinya tidak ada hubungan dengan kejadian penyakit diare pada balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.



[illegible]

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan. Wilayah Kecamatan Siompu Barat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah Kecamatan Siompu Barat secara keseluruhan berada pada daratan pulau Siompu dengan luas sekitar 11,56 Km² yang terdiri dari 8 desa dan 31 dusun. Adapun batas wilayah Kecamatan Siompu Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Kadatua
- 2) Sebelah Selatan : Laut Flores
- 3) Sebelah Timur : Kecamatan Siompu
- 4) Sebelah Barat : Laut Flores

55

b. Kondisi Demografis

Wilayah Kecamatan Siompu Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.392 yang terdiri dari 5.260 laki-laki dan 5.132 perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga di kecamatan Siompu Barat sebanyak 3.136 kepala keluarga.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Siompu Barat

Desa	Jumlah Penduduk		Total	KK	Luas Wilayah (km ²)
	Lk	Pr			
Lalole	647	553	1200	334	0,54
Molona	813	828	1641	473	1,31
Mbanua	704	739	1443	405	2,28
Watuampara	648	575	1223	551	0,36
Katampe	597	582	1179	267	0,98
Lamaniggara	748	741	1489	477	2,17
Kamoali	666	665	1331	338	1,77
Mokobea	437	449	886	281	2,15
Jumlah	5,260	5,132	10,392	3,136	11,56

Sumber Data : Data Primer, 2021

c. Mata Pencarian

Wilayah Kecamatan Siompu Barat merupakan wilayah dengan mata pencarian yang beraneka ragam yaitu sebagai pegawai negeri, wiraswasta, pedagang, buruh harian, nelayan dan petani.

d. Trasportasi

Sarana transportasi yang tersedia sudah cukup memadai sehingga masyarakat yang akan mengakses pelayanan kesehatan di puskesmas Siompu Barat hanya memerlukan waktu sekitar 30-45 menit dengan jarak terjauh 2 km².

2. Hasil Analisis Univariat

a. Usia Ibu

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Usia
di Kecamatan Siompu Barat

No	Usia Ibu (Tahun)	N	%
1	20-22	4	7,2
2	23-25	10	17,8
3	26-28	16	28,6
4	29-31	11	19,7
5	32-34	6	10,8
6	35-37	9	16,1
Total		56	100,0

Sumber Data : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa dari 56 responden diperoleh kelompok usia terbanyak yaitu pada usia 26-28 tahun sebanyak 16

responden (28,6%) dan kelompok usia paling sedikit yaitu pada usia 20-22 tahun sebanyak 4 responden (7,2%).

b. Jenis Pekerjaan ibu

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan
di Kecamatan Siompu Barat

No	Jenis Pekerjaan	N	%
1	Tidak bekerja/IRT	44	78,6
2	PNS	5	8,9
3	Wiraswasta	7	12,5
Total		56	100,0

Sumber Data : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa dari 56 responden diperoleh jenis pekerjaan ibu terbanyak yaitu tidak bekerja/ibu rumah tangga sebanyak 44 responden (78,6%) dan jenis pekerjaan ibu paling sedikit yaitu PNS/pegawai negeri sipil sebanyak 5 responden (8,9%).

c. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Siompu Barat

No	Tingkat Pendidikan	N	%
1	Tidak sekolah/tidak tamat SD	1	1,8
2	Tamat SD/ sederajat	4	7,1
3	Tamat SMP/ sederajat	8	14,3
4	Tamat SMA/ sederajat	27	48,2
5	Tamat perguruan tinggi	16	28,6
Total		56	100,0

Sumber Data : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa dari 56 responden diperoleh tingkat pendidikan terbanyak yaitu tamat SMA/ sederajat sebanyak 27 responden (48,2%) dan tingkat pendidikan paling sedikit yaitu tidak sekolah/tidak tamat SD sebanyak 1 responden (1,8%).

d. Jenis Kelamin Balita

Tabel 4.5
Distribusi Balita Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kecamatan Siompu Barat

No	Jenis Kelamin Balita	N	%
1	Laki-Laki	24	42,9
2	Perempuan	32	57,1
Total		56	100,0

Sumber Data : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa dari 56 responden diperoleh kelompok jenis kelamin balita terbanyak yaitu pada perempuan sebanyak 32 balita (57,1%) dan kelompok jenis kelamin balita paling sedikit yaitu pada laki-laki sebanyak 24 balita (42,9%).

e. Usia Balita

Tabel 4.6
Distribusi Balita Berdasarkan Usia
di Kecamatan Siompu Barat

No	Usia Balita (Bulan)	N	%
1	11-14	13	23,3
2	15-18	7	12,6
3	19-22	12	21,5
4	23-26	18	32,1
5	27-29	6	10,8
Total		56	100,0

Sumber Data : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa dari 56 balita diperoleh kelompok usia balita terbanyak yaitu pada usia 23-26 bulan sebanyak 18 balita (32,1%) dan kelompok usia balita paling sedikit yaitu pada usia 27-29 bulan sebanyak 6 balita (10,8%).

f. Kejadian Diare

Tabel 4.7
Distribusi Responden Berdasarkan kejadian diare
di Kecamatan Siompu Barat

No	Kejadian Diare	N	%
1	Tidak diare	11	19,3
2	Diare	45	78,9
Total		56	100,0

Sumber Data : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa dari 56 responden jumlah yang mengalami kejadian diare sebanyak 45 responden (78,9%) dan jumlah responden yang tidak mengalami diare sebanyak 11 responden (19,3%).

3. Hasil Analisis Bivariat

a. Hubungan Kualitas Air Bersih dengan Kejadian

Tabel 4.8
Analisis Hubungan Kualitas Air Bersih dengan Kejadian Diare
pada Balita di Kecamatan Siompu Barat
Kabupaten Buton Selatan

Kualitas Air Bersih	Kejadian Diare				Total		P Value
	Ya		Tidak				
	n	%	n	%	N	%	
Tidak memenuhi syarat	35	79,5	9	20,5	44	100	1,000
Memenuhi syarat	10	83,3	2	16,7	12	100	
Total	45	162,8	11	37,2	56	100	

Sumber Data : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.8, menunjukkan bahwa dari sejumlah sampel yang memiliki kualitas air bersih tidak memenuhi syarat berjumlah 44 orang, terdapat 35 orang (79,5%) yang mengalami kejadian diare dan 9 orang (20,5%) yang tidak mengalami kejadian diare, sedangkan dari sejumlah sampel yang memiliki sumber air bersih yang memenuhi syarat berjumlah 12 orang, terdapat 10 orang (83,3%) yang mengalami kejadian diare dan 2 orang (16,7%) yang tidak mengalami kejadian diare. Berdasarkan Hasil analisis *Chi Square* diperoleh nilai *P value* sebesar 1,000. Dikarenakan nilai $P > 0,05$, artinya tidak ada hubungan kualitas air bersih dengan kejadian penyakit diare pada balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.

b. Hubungan Fasilitas Jamban Sehat dengan Kejadian Diare

Tabel 4.9
Analisis Hubungan Fasilitas Jamban Sehat dengan Kejadian Diare
pada Balita di Kecamatan Siompu Barat
Kabupaten Buton Selatan

Fasilitas Jamban Sehat	Kejadian Diare				Total		P Value
	Ya		Tidak				
	n	%	n	%	N	%	
Tidak memenuhi syarat	18	85,7	3	14,3	21	100	0,508
Memenuhi syarat	27	77,1	8	22,9	35	100	
Total	45	162,8	11	37,2	56	100	

Sumber Data : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.9, menunjukkan bahwa dari sejumlah sampel yang memiliki fasilitas jamban sehat yang tidak memenuhi syarat berjumlah 21 orang, terdapat 18 orang (85,7%) yang mengalami kejadian diare dan 3 orang (14,3%)

yang tidak mengalami kejadian diare, sedangkan dari sejumlah sampel yang fasilitas jamban sehat yang memenuhi syarat berjumlah 35 orang, terdapat 27 orang (77,1%) yang mengalami diare dan 8 orang (22,9%) yang tidak mengalami kejadian diare. Berdasarkan Hasil analisis *Chi Square* diperoleh nilai *P value* sebesar 0,508. Dikarenakan nilai $P > 0,05$, artinya tidak ada hubungan antara fasilitas jamban sehat dengan kejadian penyakit diare pada balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.

c. Hubungan Saluran Pembuangan Air Limbah dengan Kejadian Diare

Tabel 4.10
Analisis Hubungan Saluran Pembuangan Air Limbah dengan Kejadian Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

Saluran Pembuangan Air Limbah	Kejadian Diare				Total		P Value
	Ya		Tidak				
	n	%	n	%	N	%	
Tidak memenuhi syarat	32	82,1	7	17,9	39	100	0,719
Memenuhi syarat	13	76,5	4	23,5	17	100	
Total	45	162,8	11	37,2	56	100	

Sumber Data : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan bahwa dari sejumlah sampel yang memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak memenuhi syarat berjumlah 39 orang, terdapat 32 orang (82,1%) yang mengalami kejadian diare dan 7 orang (17,9%) yang tidak mengalami kejadian diare, sedangkan dari sejumlah sampel yang memiliki saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat berjumlah 17 orang, terdapat 13 orang (76,5%) yang mengalami diare dan 4 orang (23,5%)

yang tidak mengalami kejadian diare. Berdasarkan Hasil analisis *Chi Square* diperoleh nilai *P value* sebesar 0,719. Dikarenakan nilai $P > 0,05$, artinya tidak ada hubungan antara saluran pembuangan air limbah dengan kejadian penyakit diare pada balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.

d. Hubungan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun dengan Kejadian Diare

Tabel 4.11
Analisis Hubungan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun dengan Kejadian Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

Perilaku Cuci Tangan Pakai sabun	Kejadian Diare				Total		P Value
	Ya		Tidak				
	n	%	n	%	N	%	
Tidak CTPS	17	81,0	4	19,0	21	100	1,000
CTPS	28	80,0	7	20,0	35	100	
Total	45	162,8	11	37,2	56	100	

Sumber Data : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.11, menunjukkan bahwa dari sejumlah sampel yang tidak memiliki perilaku cuci tangan pakai sabun berjumlah 21 orang, terdapat 17 orang (81,0%) yang mengalami kejadian diare dan 4 orang (19,0%) yang tidak mengalami kejadian diare, sedangkan dari sejumlah sampel yang memiliki perilaku cuci tangan pakai sabun berjumlah 35 orang, terdapat 28 orang (80,0%) yang mengalami diare dan 7 orang (20,0%) yang tidak mengalami kejadian diare. Berdasarkan Hasil analisis *Chi Square* diperoleh nilai *P value* sebesar 1,000. Dikarenakan nilai $P > 0,05$, artinya tidak ada hubungan antara perilaku cuci

tangan pakai sabun dengan kejadian penyakit diare pada balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.

e. Hubungan Pemberian ASI dengan Kejadian Diare

Tabel 4.12
Analisis Hubungan Pemberian ASI dengan Kejadian Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

Pemberian ASI	Kejadian Diare				Total		P Value
	Ya		Tidak				
	n	%	N	%	N	%	
Kurang Baik	31	79,5	8	20,5	39	100	1,000
Baik	14	83,4	3	17,6	17	100	
Total	45	162,8	11	37,2	56	100	

Sumber Data : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.12, menunjukkan bahwa dari sejumlah sampel yang memiliki pemberian ASI kurang baik berjumlah 39 orang, terdapat 31 orang (79,5%) yang mengalami kejadian diare dan 8 orang (20,5%) yang tidak mengalami kejadian diare, sedangkan dari sejumlah sampel yang memiliki Pemberian ASI baik berjumlah 17 orang, terdapat 14 orang (82,4%) yang mengalami diare dan 3 orang (17,6%) yang tidak mengalami kejadian diare. Berdasarkan Hasil analisis *Chi Square* diperoleh nilai *P value* sebesar 1,000. Dikarenakan nilai $P > 0,05$, artinya tidak ada hubungan antara pemberian ASI dengan kejadian penyakit diare pada balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.

f. Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Kejadian Diare

Tabel 4.13
Analisis Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Kejadian Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

Pengetahuan Ibu	Kejadian Diare				Total		P Value
	Ya		Tidak				
	n	%	n	%	N	%	
Kurang Baik	16	80,0	4	20,0	20	100	1,000
Baik	29	80,6	7	19,4	36	100	
Total	45	162,8	11	37,2	56	100	

Sumber Data : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.13, menunjukkan bahwa dari sejumlah sampel yang memiliki pengetahuan kurang baik berjumlah 20 orang, terdapat 16 orang (80,0%) yang mengalami kejadian diare dan 4 orang (20,0%) yang tidak mengalami kejadian diare, sedangkan dari sejumlah sampel yang memiliki pengetahuan baik berjumlah 36 orang, terdapat 29 orang (80,6%) yang mengalami diare dan 7 orang (19,4%) yang tidak mengalami kejadian diare. Berdasarkan Hasil analisis *Chi Square* diperoleh nilai *P value* sebesar 1,000. Dikarenakan nilai $P > 0,05$, artinya tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian penyakit diare pada balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.

B. Pembahasan

1. Hubungan Kualitas Air Bersih dengan Kejadian Penyakit Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kualitas air bersih dengan kejadian penyakit diare pada balita. Menurut asumsi peneliti hal

tersebut disebabkan karena sumber air bersih yang digunakan responden dalam hal ini air dari sumur gali sudah memenuhi syarat di antaranya jarak antara sumur gali dengan tempat pencemaran (*septic tank*) >10 meter, permukaan sumur yang tertutup serta air sebelum dikonsumsi dimasak terlebih dahulu sampai mendidih.

Air adalah salah satu bahan pokok yang wajib dibutuhkan oleh setiap manusia di sepanjang waktu. Air sangat mempunyai hubungan yang erat dengan kesehatan. Sehingga apabila air yang akan dikonsumsi tidak diperhatikan maka dapat berdampak pada kesehatan manusia dan akhirnya menimbulkan penyakit. Penggunaan air yang tercemar tentunya akan berdampak negatif terhadap penggunaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga untuk menghasilkan air yang baik, yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, saat ini menjadi barang yang mahal disebabkan oleh sudah banyak tercemar berbagai macam limbah dari kegiatan manusia, baik itu dari limbah industri maupun kegiatan lainnya (Azis et al., 2021).

Setiap sarana sanitasi sumber air bersih masing-masing mempunyai persyaratan yang ada, adapun salah satu syarat utama yang harus diperhatikan yaitu jarak antara sumber air bersih dengan lingkungan tempat pembuangan tinja (*septic tank*) yang tidak boleh kurang dari 10 meter. Hal ini bertujuan agar sumber air bersih yang digunakan tidak tercemar oleh kotoran tinja yang mengandung banyak bakteri dan cacing yang dapat menyebabkan kejadian penyakit diare (Haerani, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Limoy M dan Lit K, 2019) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas air bersih dengan kejadian penyakit diare pada balita dengan nilai $P = 0,98$ ($> 0,05$) dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tisnawati, Sonia Komala Dewi, Zolla Amely Ilda, Metri Lidya, 2022) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas air bersih dengan kejadian diare pada balita dikarenakan air yang dimanfaatkan responden sudah memenuhi syarat-syarat air bersih. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andriansyah, 2022) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kualitas air bersih dengan kejadian diare pada balita dengan nilai $P = 0,01$ ($< 0,05$).

Adapun dalil Al-quran yang menjelaskan tentang kualitas air bersih terdapat dalam QS. Al-Furqan/ 25:49

لْنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا كَاشِرٌ

Terjemahannya : “Agar (dengan air itu) kami menghidupkan negeri yang mati (tandus) dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak (QS. Al-Furqan/ 25:49)”

Menurut tasfir Al-Wasith dalam ayat tersebut menjelaskan, bahwa dialah Allah yang menurunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari mahluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak (Az-Zuhaili, 2012).

2. Hubungan Fasilitas Jamban Sehat dengan Kejadian Penyakit Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara fasilitas jamban sehat dengan kejadian penyakit diare pada balita. Menurut asumsi peneliti hal tersebut disebabkan karena jamban yang digunakan responden sudah memenuhi syarat di antaranya sudah menggunakan jenis leher angsa, jarak dengan sumber air bersih >10 meter, memiliki *septic tank* yang tertutup, serta kondisi jamban yang bersih.

Jamban merupakan sebuah ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan feses ataupun urin manusia yang terdiri atas tempat duduk maupun tempat jongkok dengan leher angkasa ataupun tidak (cemplung) yang dilengkapi dengan sebuah unit penampung feses dan air untuk membersihkannya. Penggunaan jamban mempunyai dampak kontribusi yang cukup besar bagi penurunan risiko dalam penularan penyakit. Sebuah jamban dikatakan jamban baik apabila mempunyai lubang penampungan atau yang biasa dikenal dengan *septic tank* (Malikhatin & Yovita, 2017).

Dikatakan jamban sehat jika tidak terjangkau oleh vektor binatang, jamban aman digunakan serta dibersihkan, jamban tidak mudah menimbulkan bau, jarak jamban dengan sumber air bersih lebih dari 10 meter serta jamban yang memiliki *septic tank*. Adapun persyaratan antara jarak lingkungan tempat penampungan akhir tinja (*septic tank*) dengan sumber air bersih dibuat dengan tujuan untuk mencegah pencemaran sumber air bersih masyarakat, terutama masyarakat yang sumber air bersihnya berupa sumur. Oleh karena itu jamban ataupun *septic tank* tidak diperkenankan ditempatkan lebih rendah namun

minimal sama tinggi dengan sumber air bersih yaitu lebih dari 10 meter untuk mencegah terjadinya pencemaran air oleh bakteri yang melalui aliran air limbah (M et al., 2021).

Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Yantu et al., 2021) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara fasilitas jamban sehat dengan kejadian penyakit diare pada balita. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andalia Roza, Nurhafizah, 2022) yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara fasilitas jamban sehat dengan kejadian diare pada balita hal tersebut disebabkan karena jenis jamban yang dimiliki responden yaitu leher angsa. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Akbar, 2017) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara fasilitas jamban sehat dengan kejadian penyakit diare pada balita.

3. Hubungan Saluran Pembuangan Air Limbah dengan Kejadian Penyakit Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara saluran pembuangan air limbah dengan kejadian penyakit diare pada balita. Menurut asumsi peneliti hal tersebut disebabkan karena sebagian saluran pembuangan air limbah yang dimiliki responden tidak memenuhi syarat yaitu seperti tidak tertutup sehingga menimbulkan bau tak sedap sehingga kondisi tersebut menarik perhatian vektor dan berpeluang menularkan penyakit.

Air limbah yang bersumber dari rumah tangga merupakan air limbah yang berasal dari air limbah yang berasal dari limbah kamar mandi, kegiatan dapur, jamban, dapur, mencuci pakaian, mencuci peralatan rumah tangga dan

sebagainya, yang secara kuantitatif terdiri dari zat organik berupa zat padat maupun zat cair. Bahan berbahaya yang terkandung didalamnya sehingga disimpulkan bahwa air limbah juga berisiko menimbulkan penyakit jika tidak dikelola dengan baik dengan sistem pembuangan air limbah rumah tangga yang memenuhi syarat kesehatan (Mirsiyanto & Sitorus, 2020).

Sarana pembuangan air limbah yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan bau, mengganggu estetika dan dapat menimbulkan tempat berkembang biaknya nyamuk dan tikus, sehingga kondisi ini berpeluang menularkan penyakit. Saluran pembuangan air limbah menjadi tempat berkembang biaknya kuman penyakit dan menjadi media penularan penyakit utama diare kronis pada balita. Oleh karena itu, untuk mencegah mengurangi pencemaran air limbah ke lingkungan yang pada gilirannya berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit diare, sangat penting untuk pengelolaan air limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga dengan baik, sehingga air limbah yang dihasilkan tersebut tidak berpotensi untuk mencemari lingkungan (Mirsiyanto & Sitorus, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Umiati, 2021) yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara saluran pembuangan air limbah dengan kejadian penyakit diare pada balita. penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani et al., 2021) dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara saluran pembuangan air limbah dengan kejadian diare pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pakuan Baru Kota Jambi. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

(Pertiwi, 2019) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara saluran pembuangan air limbah dengan kejadian penyakit diare pada balita dengan nilai $P = 0,000 (< 0,05)$.

4. Hubungan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun dengan Kejadian Penyakit Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara perilaku cuci tangan pakai sabun dengan kejadian penyakit diare pada balita. Menurut asumsi peneliti hal ini disebabkan oleh sebagian besar responden dalam penelitian ini mengaku jarang mencuci tangan setelah buang air besar menggunakan sabun dan juga pakai air mengalir.

Mencuci tangan pakai sabun bisa menghilangkan ataupun mengurangi mikroorganisme patogen pada tangan yang tidak dapat ditemukan secara langsung. Namun pada dasarnya pada saat keadaan darurat biasanya sumber air bersih kita tidak dapat identifikasi bebas dari kontaminasi sehingga berpotensi terjadinya perpindahan bakteri. Cuci tangan merupakan sebuah hal yang mudah dilakukan dalam memberikan sumbangsi dalam peningkatan status kesehatan masyarakat akan tetapi masih banyak masyarakat yang menyepelehkannya (Fitriani et al., 2021).

Yang menyebabkan salah satu penyebab perilaku cuci tangan yang tidak baik yaitu faktor pengetahuan. Minimnya pengetahuan ibu balita tentang cara mencuci tangan yang baik dan juga benar bisa disebabkan oleh kurangnya mendapatkan informasi seperti sosialisasi secara berkala dari staf kesehatan puskesmas setempat atau bisa pula dari kurangnya kesadaran diri ibu balita dalam mengikuti sosialisasi (Trisiyani et al., 2021).

Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Maidartati dan Anggraeni, 2017) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan mencuci tangan pakai sabun dengan kejadian penyakit diare pada balita dengan nilai $P = 0,65$ ($> 0,05$) dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suliswati, Ruwiah, 2022) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara perilaku cuci tangan pakai sabun dengan kejadian penyakit diare pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Benua Kabupaten Konawe Selatan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Radhika, 2020) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan mencuci tangan pakai sabun dengan kejadian penyakit diare pada balita dengan nilai $P = 0,05$ ($< 0,05$). Perilaku cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Akan tetapi fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang belum menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-harinya (Haerani, 2021).

5. Hubungan Pemberian ASI dengan Kejadian Penyakit Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pemberian ASI dengan kejadian penyakit diare pada balita. Menurut asumsi peneliti hal ini disebabkan karena sebagian besar responden menyusui dan tidak dicampur dengan susu formula sampai umur balita lebih dari 12 bulan sehingga balita memiliki kekebalan tubuh yang kuat dan tidak gampang sakit.

ASI (air susu ibu) adalah sumber energi dan nutrisi sangat penting bagi balita yang juga berperang penting dalam melindungi balita dari penyakit diare. ASI juga merupakan salah satu makanan yang ideal untuk balita, yang aman, steril

serta banyak mengandung antibodi yang bertujuan membantu melindungi anak dari berbagai macam penyakit. Idealnya pemberian ASI yaitu untuk enam bulan pertama kehidupan balita (Trisiyani et al., 2021).

Dari beberapa penelitian terlebih dahulu mengatakan bahwa ASI sebegini diberikan seawal mungkin tanpa terjadwal, hal tersebut akan menjamin bahwa balita akan memperoleh segala kebaikan yang berasal dari kolostrum. Kolostrum merupakan air susu ibu yang dihasilkan pada hari kesatu sampai hari kelima atau hari ketujuh, ciri-ciri ASI kolostrum berwarna jernih, dan agak kekuning-kuningan dimana cairan ini mengandung banyak zat putih telur atau biasa dikenal dengan protein yang tinggi akan kadar dan zat anti kekebalan dan kolostrum juga sangat sesuai dengan kondisi balita sehari-hari (Haerani, 2021).

Pola pemberian ASI yaitu kebiasaan ibu menyusui berdasarkan pada banyaknya seorang ibu menyusui anaknya. Kegiatan menyusui adalah suatu proses alamiah yang sangat dibutuhkan oleh seorang balita karena air susu ibu adalah cairan hidup yang banyak mengandung zat protektif guna meningkatkan kekebalan tubuh yang akan melindungi balita dari berbagai macam infeksi bakteri, virus, parasit, hingga jamur sehingga balita yang disusui oleh ibunya secara penuh tanpa di campur dengan susu formula selama enam bulan sangat sehat dan jarang sakit ketimbang dengan balita yang tidak mendapatkan sama sekali ASI (Melvani et al., 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Kurniawati et al., 2021) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pemberian ASI dengan kejadian penyakit diare pada balita dengan nilai $P = 0,14 (< 0,05)$ dan penelitian

ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ni Putu Windi Diamawati, 2021) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pemberian ASI dengan kejadian penyakit diare pada balita hal ini disebabkan tingkat pendidikan ibu yang lanjut sehingga diperkirakan lebih mudah dalam menerima dan mengerti apa yang disampaikan oleh pihak puskesmas setempat. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari (Watulingas et al., 2022) yang mengatakan bahwa ada hubungan antara pemberian ASI dengan kejadian penyakit diare pada balita dimana $P = 0,001 (< 0,05)$.

6. Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Kejadian Penyakit Diare pada alita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian penyakit diare pada balita. Menurut asumsi peneliti hal ini disebabkan oleh sebagian besar responden mengaku kurang mendapatkan informasi dari petugas kesehatan setempat mengenai fakto-faktor yang mempegaruhi terjadinya penyakit diare pada balita.

Pengetahuan yaitu hasil dari tahu, dan hal ini terjadi setelah orang tersebut melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan sendiri terjadi melalui proses panca indera pendengaran, penciuman, rasa serta raba. Adapun sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui dari mata dan juga telinga (Fadmi et al., 2020).

Pembentukan suatu perilaku dimulai dari pengetahuan atau informasi yang baru didapatkan. Individu harus terlebih dahulu mengetahui manfaat ataupun keuntungan pengetahuan atau informasi yang dia dapatkan sebelum menerapkannya dalam berperilaku. Penyakit diare membutuhkan penanganan

yang cepat sehingga pengetahuan ibu dalam hal ini sangat dibutuhkan. Kejadian penyakit diare yang menyerang balita perlu dipahami tanda dan awal gejalanya. Orang tua terutama ibu harus teliti melihat perubahan fisik maupun psikis yang dialami oleh balita (Agus Iryanto et al., 2021).

pengetahuan yang telah dipahami oleh seorang ibu secara mendalam dapat menimbulkan keyakinan dari dalam dirinya untuk berperilaku yang sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Sehingga tindakan tersebut merupakan salah satu tahap aplikatif dari pengetahuan memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian penyakit diare pada balita (Utami et al., 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Heryanto et al., 2022) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan kejadian penyakit diare pada balita dimana nilai $P = 0,56 (> 0,05)$. penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmanita et al., 2022) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian penyakit diare pada balita hal ini dikarenakan responden selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh pihak puskesmas terdekat terkait penyakit diare seperti pencegahannya. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dolstad et al., 2021) yang mengatakan bahwa ada yang hubungan signifikan antara pengetahuan ibu dengan kejadian penyakit diare pada balita dimana nilai $P = 0,00 (< 0,05)$.

Adapun dalil Al-quran yang menjelaskan tentang pengetahuan terdapat dalam QS. Al-Mujadalah/ 58:11

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Terjemahannya : “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (QS. Al-Mujadalah/ 58:11)”

Menurut tasfir Al-Wasith dalam ayat tersebut menjelaskan, bahwa Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di dunia dan pahala di akhirat. Maka barangsiapa yang beriman dan memiliki ilmu maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan keimanannya itu dan mengangkat derajatnya dengan ilmu pula dan salah satu dari itu adalah Allah mengangkat derajat mereka dalam majelis-majelis (Az-Zuhaili, 2012).

C. Keterbatasan dan Kekuatan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti sudah melakukan sesuai prosedur ilmiah namun masih menghadapi beberapa keterbatasan sehingga dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Dimana keterbatasan tersebut diantaranya metode dalam pengambilan data primer di penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dikarenakan ada kemungkinan responden yang menjawab tidak jujur dengan keadaan sebenarnya di lapangan ketika dilakukan wawancara, namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan mewawancarai responden dengan secara terpisah sehingga bias dalam kesamaan jawaban dapat diminimalisir serta keterbatasan selanjutnya adalah jarak rumah responden yang berjauhan.

Adapun kekuatan dalam penelitian ini diantaranya menggunakan ukuran sampel yang besar dengan perwakilan di seluruh masing-masing desa sehingga dapat meningkatkan keterwakilannya. Kekuatan selanjutnya dari segi demografi yaitu tinggi jiwa partisipasi responden dalam penelitian ini sehingga mudah

ditemui dan merupakan penelitian pertama dan belum adanya penelitian lain yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya penyakit diare pada balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya penyakit diare pada balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak ada hubungan antara kualitas air bersih dengan kejadian penyakit diare pada balita ($P = 1,000$) di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan
2. Tidak ada hubungan antara fasilitas jamban sehat dengan kejadian penyakit diare pada balita ($P = 0,508$) di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan
3. Tidak ada hubungan antara saluran pembuangan air limbah dengan kejadian penyakit diare pada balita ($P = 0,719$) di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan
4. Tidak ada hubungan antara perilaku cuci tangan pakai sabun dengan kejadian penyakit diare pada balita ($P = 1,000$) di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan
5. Tidak ada hubungan antara pemberian ASI dengan kejadian penyakit diare pada balita ($P = 1,000$) di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

6. Tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian penyakit diare pada balita ($P=1,000$) di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya penyakit diare pada balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut :

1. Puskesmas Siompu Barat

Petugas kesehatan diharapkan lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terutama ibu mengenai upaya pencegahan penyakit diare maupun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit diare pada balita.

2. Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan Siompu Barat

- a. Kepada para ibu agar sebaiknya lebih mengindahkan dan melaksanakan saran dan nasehat yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan mengenai pencegahan penyakit diare pada balita
- b. Kepada para ibu dapat menjaga kebersihan lingkungan sebagai pencegahan penyakit diare pada balita sesuai dalam al-Quran.

3. Peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya, disarankan agar meneliti lebih lanjut faktor lainnya yang dapat menyebabkan faktor risiko terjadinya penyakit diare pada balita seperti :

- a. Pola asuh hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haerani, 2021) yang menyatakan bahwa ada hubunganyang signifikan antara pola asuh dengan kejadian penyakit diare pada balita.
- b. Status gizi hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Haerani, 2021) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian penyakit diare pada balita.
- c. Pengelolaan sampah hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Siregar & Batubara, 2018) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengelolaan sampah dengan kejadian penyakit diare pada balita.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Iryanto, A., Joko, T., & Raharjo, M. (2021). Literature Review : Risk Factors For The Incidence of Diarrhea in Children Under Five in Indonesia. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 11(1), 1–7. <https://doi.org/10.47718/jkl.v10i2.1166>
- Akbar, H. (2017). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Diare pada Anak Balita di Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(3), 78–83.
- Andalia Roza, Nurhafizah, P. W. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Diare Pada Toddler Di Puskesmas Kampar Kecamatan Kamparkabupaten Kampar. 06(01).
- Andriansyah, A. M. Z. Fatah. (2022). Jurnal Ilmiah Permas : Jurnal Ilmiah Stikes Kedal. Analisis Ekologi: Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Diare Pada Balita, 12 nomor 3(juli), 491–50.
- Arbobi, M. (2018). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada balita di Wilayah kerja Puskesmas Tempunak Tahun 2018. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Az-Zuhaili. (2012). *Tasfir Al-Wasith* (ke-2). Pustaka Gema Insani.
- Azis, W. A., Hudayah, N., & Ardi. (2021). Hubungan Sanitasi Dasar Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Medika Hutama*, 02(03), 834–848.
- Dinkes Sultra. (2019). *Profil Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara Tahun 2018*.
- Dolstad, H. A., Franke, M. F., Vissieres, K., Jerome, J. G., Ternier, R., & Ivers, L. C. (2021). Factors associated with diarrheal disease among children aged 1–5 years in a cholera epidemic in rural haiti. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 15(10), 1–16. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009726>
- Fadmi, F. R., Mauliyana, A., & Zatyani, Muthia, M. (2020). Factors Related To The Event Of Diarrhea In Children In The Coastal Area Of Lapulu Village Abeli District Kendari City Fitri Rachmillah Fadmi, Andi Mauliyana, Zatyani Muthia Man. *MIRACLE Journal OfPublic Health*, 3(2), 197–205. <https://journal.fikes-umw.ac.id/index.php/mjph/article/view/178>
- Fenta, S. M., & Nigussie, T. Z. (2021). Factors associated with childhood diarrheal in Ethiopia; a multilevel analysis. *Archives of Public Health*, 79(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s13690-021-00566-8>
- Fitriani, N., Darmawan, A., & Puspasari, A. (2021). Analisis Faktor Risiko

Terjadinya Diare Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Pakuan Baru Kota Jambi. *Medical Dedication (Medic): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat FKIK UNJA*, 4(1), 154–164. <https://doi.org/10.22437/medicaldedication.v4i1.13472>

Haerani. (2021). Ners journal awal bros. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Diare Pada Balita Di Desa Tallambalao Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. 0–3.

Heryanto, E., Sarwoko, S., & Meliyanti, F. (2022). Faktor Risiko Kejadian Diare pada Balita di UPTD Puskesmas Sukaraya Kabupaten OKU Tahun 2021. *Indonesian Journal of Health and Medical*, 2(1), 10–21.

Hidayat, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Puskesmas Karang Asam (p. 92).

Hijriani, H., Agustini, A., & Karnila, A. (2020). Pengetahuan ; Kejadian. 1 *Jurnal Health Sains Vol. 1, No. 5, November 2020*, 1(5), 1–7.

Kemenkes RI. (2011). Situasi Diare di Indoensia. *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*.

Kemenkes RI. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*.

Khan, G., Akter, N., & Uddin, D. (2019). Influence Of Socio-Demographic Factors On The Diarrheal Disease Management Approaches Taken By Two Distinct Communities Of 2(2), 78–86.

Kurniawati, D. P., Arini, S. Y., Awwalina, I., & Pramesti, N. A. (2021). Poor Basic Sanitation Impact on Diarrhea Cases in Toddlers. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 13(1), 41. <https://doi.org/10.20473/jkl.v13i1.2021.41-47>

Limoy M dan Lit K. (2019). Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Puskesmas Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019. *Jurnal Kebidanan*, 9(2), 385–393.

M, R. T., Kurniawati, E., & Suroso. (2021). Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Anak Balita di Kelurahan Legok. *Core Journal - Community Research of Epidemiology*, 1(2). <https://doi.org/10.24252/corejournal.v>

Mahendra, I., Diyanah, K. C., Hadi, M. I., Saputro, S. A., & Sari, S. A. R. (2021). Mapping of Diarrhea in Toddlers with Open Defecation Free (ODF) Status in Tuban Regency. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 13(2), 113. <https://doi.org/10.20473/jkl.v13i2.2021.113-120>

- Maidartati dan Anggraeni, R. D. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita (Studi Kasus: Puskesmas Babakansari). *Jurnal Keperawatan*, V(2), 110–111.
- Malikhatin, S., & Yovita, L. H. (2017). Quality of Plague Surveillance System in Pasuruan Regency Year 2014 Based on Surveillance Attributes. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, Volume 5 N(April), 60–74. <https://doi.org/10.20473/jbe.v5i1>.
- Maryunani, A. (2010). *Ilmu Kesehatan Anak Dalam Kebidanan*.
- Melvani, R. P., Zulkifli, H., & Faizal, M. (2019). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Balita Di Kelurahan Karyajaya Kota Palembang. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 4(1), 57. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v4i1.4052>
- Mirsiyanto, E., & Sitorus, R. J. (2020). Analysis of Environmental Factors with Chronic Diarrhea in Toddlers in Jambi City in (Vol. 2, Issue 4, pp. 300–310).
- Mirza Muhammad Ahsan Baig, Saman Zahid, Samina Batool, Akasha Islam, Saman Jamal, & Taiba Aslam. (2022). Efficacy and safety of non-specific anti-diarrheal agents in the management of acute diarrhea in children. *The Professional Medical Journal*, 29(04), 506–510. <https://doi.org/10.29309/tpmj/2022.29.04.6759>
- Mustika Dewi, Meilya Farika Indah, N. I. I. (2020). Hubungan faktor lingkungan dengan kejadian diare pada anak balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut 2020. *Kesehatan Masyarakat*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id>
- Nguyen, K.-Q. T., & Tran, D. T. (2019). Associated factors of ethnic mothers' knowledge, attitude, practice about diarrhea disease in children under 5-year old in Daklak province. *MedPharmRes*, 3(2), 19–24. <https://doi.org/10.32895/ump.mpr.3.2.4>
- Ni Putu Windi Diamawati, S. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Desa Petunasugi Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong. 1–10.
- Pahmi, L. (2019). Household Risk Factors For Diarrhoea Disease In Children Under Five Years Old In Indonesia 10(March), 50–58.
- Pertiwi, T. S. (2019). Penggunaan Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Sebaran Kejadian Diare Pada Balita Ditinjau Dari Faktor Lingkungan Rumah Keluarga di Kota Kendari. *Indonesian of Health Information Management Journal*, 7(1), 8–15.

- Prabaswara, D. (2021). Faktor Lingkungan Yang Berhubungan Dengan Diare Pada Anak Balita Di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019. *Ruwa Jurai: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 15(2), 101. <https://doi.org/10.26630/rj.v15i2.2788>
- Purba, E. M. (2012). Poliklinik Universitas Sumatera Utara. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Anak Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2012, 1(3), 82–91.
- Puskesmas Siobar. (2021). *Profil Puskesmas Siompu Barat Tahun 2021*.
- Radhika, A. (2020). Hubungan Tindakan Cuci Tangan Pakai Sabun Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Rw Xi Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. *Medical Technology and Public Health Journal*, 4(1), 16–24. <https://doi.org/10.33086/mtphj.v4i1.773>
- Rahmaniu, Y., Dangnga, M. S., & Madjid, H. A. (2022). Wilayah Kerja Puskesmas Lapaddekota Parepare Mother ' s Knowledge Relationship With Diarrhea for Children in the Working Area of Puskesmas Lapadde Parepare City. 5(2).
- Ridawati, I. D., & Nugroho, B. (2020). Relationship between Mothers' Attitudes with Diarrhea Prevention in Toddlers. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9(2), 998–1005. <https://doi.org/10.30994/sjik.v9i2.392>
- Shafira, A., Husin, U. A., & Hadiati, D. E. (2021). Gambaran Faktor Risiko Diare pada Balita (0 - 59 Bulan) di Wilayah Kerja Puskesmas Bojongsoang pada Tahun 2019. *Jurnal Integrasi Kesehatan & Sains*, 3(2), 136–141. <https://doi.org/10.29313/jiks.v3i2.7275>
- Siregar, S., & Batubara, N. S. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi kejadian penyakit diare di Desa Hutanopan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018. *Kesehatan Ilmiah Indonesia*, 4(2), 26–34.
- Solomon, E. T., Gari, S. R., Kloos, H., & Mengistie, B. (2020). Diarrheal morbidity and predisposing factors among children under 5 years of age in rural East Ethiopia. 4.
- Suliswati, Ruwiah, F. M. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Benua Kabupaten Konawe Selatan. *Kesehatan Masyarakat*, 1, 11–20.
- Tisnawati, Sonia Komala Dewi, Zolla Amely Ilda, Metri Lidya, D. N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Anak Di Puskesmas Andalas Kota Padang. *Jurnal Ensiklopediaku*, 4(3),

304–312.


Trisiyani, G., Syukri, M., Halim, R., & Islam, F. (2021). Faktor Risiko Kejadian Diare pada Anak Usia 6-24 bulan di Kota Jambi. *Jurnal Sehat Mandiri*, 16(2), 158–169. <https://doi.org/10.33761/jsm.v16i2.424>

Umiati, U. (2021). the Relationship Between Environmental Sanitation With the Event of Diarrhea in Toddlers. *Jurnal EduHealth*, 12(1), 1–8. <https://doi.org/10.54209/jurnaleduhealth.v12i1.19>

Utami, T., Kadang, Y., Justitia, A. K., & Justitia, A. K. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Diare pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Birobuli Kota Palu. *An Idea Health Journal*, 02(01), 35–40.

Watulingas, D. Y., Agustina, N., & Masyarakat, K. (2022). Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin Tahun 2021 Analysis Of Factors Related To The Event Of Diarrhea In Toddlers In The Work Area Of The Pekauman Public Health Center , Banjarmasin City In 2021. 9(1), 108–112.

Yantu, S. S., Warouw, F., & Umboh, J. M. L. (2021). Hubungan Antara Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga dengan Kejadian Diare Pada Balita di Desa Waleure. *Jurnal KESMAS*, 10(6), 24–30.



lah mendapat kejelasan dari pene
pengaruhi Tingginya Penyakit I
Kabupaten Buton Selatan. Maka d
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
an menyatakan bersedia ikut se
ALAUDDIN
MAKASSAR

Nama Responden (Inisial):

Umur

Pekerjaan

Alamat

Dengan ini menyatakan telah mendapat kejelasan dari peneliti tentang penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Penyakit Diare pada Balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan. Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gowa, Maret 2022

Responden

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right)$$

Lampiran 2

KUESIONER
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA PENYAKIT
DIARE PADA BALITA DI KECAMATAN SIOMPU BARAT
KABUPATEN BUTON SELATAN

No	Pertanyaan	Jawaban	Nilai
I	IDENTITAS RESPONDEN (IBU BALITA)		
	No. Responden		
	Nama responden		
	Umur		
	Alamat		
	Tingkat pendidikan responden	1. Tidak sekolah/tidak tamat SD 2. Tamat SD/ sederajat 3. Tamat SMP/ sederajat 4. Tamat SMA/ sederajat 5. Tamat Perguruan Tinggi	
	Pekerjaan Responden	1. Tidak bekerja/ibu rumah tangga 2. PNS 3. Wiraswasta	
II	IDENTITAS BALITA		
	Nama balita		
	Umur (bulan)		
	Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	
III	KEJADIAN DIARE		
1	Apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini ?	1. Tidak 2. Ya	
IV	1.kualitas Air Bersih		
2	Dari manakah ibu memperoleh air untuk keperluan memasak ?	1. Bukan sumur gali 2. Sumur gali	
3	Apakah air yang dikonsumsi berasa, berwarna, berbau ?	1. Tidak 2. Ya	
4	Berapa meterkah jarak sumber pencemar dengan sumber air minum?	1. ≤ 10 meter 2. ≥ 10 meter	
5	Apakah air yang dikonsumsi selalu dimasak hingga mendidih terlebih dahulu ?	1. Tidak 2. Ya	
	2.Fasilitas Jamban Sehat		
6	Apakah dirumah ibu tersedia jamban	1. Tidak 2. Ya	
7	Jenis jamban yang dipergunakan	1. Cemplung 2. Leher angsa	
8	Apakah ibu dan balita menggunakan jamban jika buang	1. Tidak 2. Ya	

	air besar ?		
9	Apakah jamban yang digunakan memiliki septic tank ?	1. Tidak 2. Ya	
10	Berapa meter kah jarak septic tank dengan sumber air bersih?	1 $\leq$ 10 meter 2 $\geq$ 10 meter	
11	Bagaimana keadaan jamban yang dimiliki ? (kondisi kebersihan)	1. Kotor 2. Bersih	
12	Bagaimana keadaan jamban yang ibu miliki ?	1. Terbuka 2. Tertutup	
3.Saluran Pembuangan Air Limbah			
13	Apakah rumah ibu memiliki saluran air limbah?	1. Tidak 2. Ya	
14	Apakah saluran air limbah tersebut tertutup ?	1. Tidak 2. Ya	
15	Berapa meterkah jarak saluran air limbah dengan sumber air bersih?	1 $\leq$ 10 meter 2 $\geq$ 10 meter	
16	Apakah saluran air limbah ibu berbau?	1. Tidak 2. Ya	
17	Apakah aliran air pada saluran limbah berjalan lancar ?	1. Tidak 2. Ya	
4.Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun			
18	Apakah ibu mencuci tangan sebelum menyuapai balita ?	1. Tidak 2. Ya	
19	Apakah ibu mencuci tangan setelah membersihkan anak setelah buang air besar ?	1. Tidak 2. Ya	
20	Apakah ibu mencuci tangan sebelum menyiapkan makan balita ?	1. Tidak 2. Ya	
21	Apakah ibu menggunakan sabun dalam mencuci tangan	1. Tidak 2. Ya	
22	Apakah ibu menggunakan air mengalir dalam mencuci tangan ?	1. Tidak 2. Ya	
5.Pemberian ASI			
23	Apakah sampai umur 6 bulan, ibu hanya memberikan ASI kepada balita tanpa dicampur dengan susu formula ?	1. Tidak 2. Ya	
6.Pengetahuan Ibu			
24	Diare adalah buang air besar dengan frekuensi lebih dari 3 kali sehari ?	1. Salah 2. Benar	
25	Muntah merupakan salah satu gejala dan tanda kejadian diare ?	1. Salah 2. Benar	
26	Demam merupakan salah satu gejala dan tanda kejadian diare ?	1. Salah 2. Benar	
27	Apakah ibu mengetahui penyebab penyakit diare ?	1. Salah 2. Benar	
28	Penyakit diare terjadi akibat mencuci tangan sebelum makan?	1. Salah 2. Benar	

29	Pemberian ASI sampai umur 0-6 bulan dapat menyebabkan penyakit diare ?	1. Salah 2. Benar	
30	Pertolongan pertama yang diberikan kepada penderita diare adalah memberikan larutan gula garam atau oralit ?	1. Salah 2. Benar	
31	Akibat diare jika tidak diobati akan menimbulkan dehidrasi sehingga mengakibatkan kematian pada balita ?	1. Salah 2. Benar	
32	menjaga kebersihan lingkungan dapat mencegah kejadian penyakit diare ?	1. Salah 2. Benar	
33	Kurangnya perilaku cuci tangan dapat menyebabkan terjadinya diare ?	1. Salah 2. Benar	



Lampiran 3

Master Tabel

Inisial Responden	Usia Responden	Tingkat Pendidikan	Jenis Pkerjaan	Usia Balita (Bulan)	Jenis Kelamin Balita
R1	30	4	1	23	1
R2	31	5	1	24	2
R3	29	5	2	20	1
R4	28	4	1	11	2
R5	27	4	1	14	2
R6	27	4	1	16	2
R7	29	5	2	19	1
R8	24	4	1	25	2
R9	24	5	1	12	1
R10	25	4	1	23	2
R11	26	4	1	27	2
R12	36	5	2	26	1
R13	34	5	2	25	2
R14	35	5	2	24	1
R15	34	3	1	23	1
R16	32	2	1	21	1
R17	30	2	3	20	1
R18	33	1	1	18	2
R19	29	5	1	17	1
R20	35	3	1	16	2
R21	28	4	1	15	2
R22	22	4	1	14	2
R23	23	3	1	23	2
R24	25	3	1	28	2
R25	37	2	1	12	2
R27	36	2	1	13	1
R28	27	5	1	13	2

R29	26	4	1	23	1
R30	29	4	3	11	2
R31	31	5	1	14	2
R32	36	4	1	16	1
R33	24	4	1	19	1
R34	30	4	1	17	2
R35	27	4	1	20	1
R36	24	4	1	27	1
R37	27	5	1	21	2
R38	20	3	1	24	2
R39	21	3	1	25	2
R40	35	5	3	22	2
R41	25	3	1	28	2
R42	25	4	3	26	2
R43	33	4	3	25	2
R44	36	4	3	23	1
R45	37	4	1	29	2
R46	29	5	1	20	1
R49	22	4	1	19	1
R50	28	4	1	21	2
R51	27	4	1	27	1
R52	27	5	2	25	2
R53	26	4	1	22	2
R54	32	4	1	24	2
R55	29	5	1	26	1
R56	27	3	1	12	1

AI	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	E4	E5	F1	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1
2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2
2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2
1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2
2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2
2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2
2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2
2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1
2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2
2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2

2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2
2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1
2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2



Keterangan Tabel

Tingkat Pendidikan : (1) Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD; (2) Tamat SD/Sederajat; (3) Tamat SMP/Sederajat; (4) Tamat SMA/Sederajat; (5) Tamat Perguruan Tinggi

Jenis Pekerjaan : (1) Tidak Bekerja/Ibu Rumah Tangga; (2) Wiraswasta; (3) PNS

Jenis Kelamin Balita : (1) Laki-Laki; (2) Perempuan

A1 (Kejadian Diare) : (1) Tidak; (2) Ya

B1-B4 (Kualitas Air Bersih) : (1) Bukan Sumur Gali; (2) Sumur Gali; (1) Tidak; (2) Ya; (1) ≤ 10 meter; (2) ≥ 10 meter; (1) Tidak;

(2) Ya

C1-C7 (fasilitas Jamban Sehat) : (1) Tidak; (2) Ya; (1) Cemplung; (2) Leher angsa; (1) Tidak; (2) Ya; (1) ≤ 10 meter; (2) ≥ 10 meter; (1) Kotor; (2) Bersih; (1) Terbuka; (2) Tertutup

D1-D5 (Saluran Pembuangan Air Limbah) : (1) Tidak; (2) Ya; (1) Tidak; (2) Ya; (1) ≤ 10 meter; (2) ≥ 10 meter; (1) Tidak; (2) Ya; (1) Tidak; (2) Ya

E1-E5 (Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun) : (1) Tidak; (2) Ya; (1) Tidak; (2) Ya; (1) Tidak; (2) Ya; (1) Tidak; (2) Ya; (1) Tidak; (2) Ya

F1 (Pemberian ASI) : (1) Tidak; (2) Ya;

G1-G10 (Pengetahuan Ibu) : (1) Salah; (2) Benar

Lampiran 4

Output SPSS

jenis_pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak bekerja/IRT	44	78.6	78.6	78.6
	PNS	5	8.9	8.9	87.5
	wiraswasta	7	12.5	12.5	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

umur_responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-22 tahun	4	7.1	7.1	7.1
	23-25 tahun	8	14.3	14.3	21.4
	26-28 tahun	18	32.1	32.1	53.6
	29-31 tahun	11	19.6	19.6	73.2
	32=34 tahun	6	10.7	10.7	83.9
	35-37 tahun	9	16.1	16.1	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

tingkat_Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	1	1.8	1.8	1.8
	Tamat SD/Sederajat	4	7.1	7.1	8.9
	Tamat SMP/Sederajat	8	14.3	14.3	23.2
	Tamat SMA/Sederajat	27	48.2	48.2	71.4
	Tamat Perguruan Tinggi	16	28.6	28.6	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

umur_balita

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	11-14 bulan	13	23.2	23.2	23.2
	15-18 bulan	5	8.9	8.9	32.1
	19-22 bulan	13	23.2	23.2	55.4
	23-26 bulan	19	33.9	33.9	89.3
	27-29 bulan	6	10.7	10.7	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

jenis_kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	24	42.9	42.9	42.9
	perempuan	32	57.1	57.1	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak	11	19.6	19.6	19.6
	ya	45	80.4	80.4	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

kategori_B * apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini
Crosstabulation

			apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini		
			tidak	ya	Total
kategori_B	tidak memenuhi syarat	Count	2	10	12
		% within kategori_B	16.7%	83.3%	100.0%
		% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	18.2%	22.2%	21.4%
		% of Total	3.6%	17.9%	21.4%
		Count	9	35	44
	memenuhi syarat	% within kategori_B	20.5%	79.5%	100.0%
		% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	81.8%	77.8%	78.6%
		% of Total	16.1%	62.5%	78.6%
		Count	11	45	56
		% within kategori_B	19.6%	80.4%	100.0%
Total	% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	19.6%	80.4%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.086 ^a	1	.770		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.088	1	.766		
Fisher's Exact Test				1.000	.566
Linear-by-Linear Association	.084	1	.772		
N of Valid Cases	56				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,36.

b. Computed only for a 2x2 table

kategori_C * apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini
Crosstabulation

			apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini		
			tidak	ya	Total
kategori_C	tidak memenuhi syarat	Count	8	27	35
		% within kategori_C	22.9%	77.1%	100.0%
		% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	72.7%	60.0%	62.5%
	memenuhi syarat	% of Total	14.3%	48.2%	62.5%
		Count	3	18	21
		% within kategori_C	14.3%	85.7%	100.0%
Total		% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	27.3%	40.0%	37.5%
		% of Total	5.4%	32.1%	37.5%
		Count	11	45	56
		% within kategori_C	19.6%	80.4%	100.0%
		% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	19.6%	80.4%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.611 ^a	1	.434		
Continuity Correction ^b	.189	1	.664		
Likelihood Ratio	.633	1	.426		
Fisher's Exact Test				.508	.338
Linear-by-Linear Association	.600	1	.439		
N of Valid Cases	56				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,13.

b. Computed only for a 2x2 table

kategori_D * apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini
Crosstabulation

		apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini		Total
		tidak	ya	
kategori_D	tidak memenuhi syarat	Count	4	13
		% within kategori_D	23.5%	76.5%
		% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	36.4%	28.9%
		% of Total	7.1%	23.2%
	memenuhi syarat	Count	7	32
		% within kategori_D	17.9%	82.1%
Total		% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	63.6%	71.1%
		% of Total	12.5%	57.1%
		Count	11	45
		% within kategori_D	19.6%	80.4%
		% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	100.0%	100.0%
		% of Total	19.6%	80.4%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.234 ^a	1	.629		
Continuity Correction ^b	.014	1	.906		
Likelihood Ratio	.228	1	.633		
Fisher's Exact Test				.719	.442
Linear-by-Linear Association	.229	1	.632		
N of Valid Cases	56				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,34.
b. Computed only for a 2x2 table

kategori_E * apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini
Crosstabulation

		apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini		Total
		tidak	ya	
kategori_E	tidak CTPS	Count	7	28
		% within kategori_E	20.0%	80.0%
		% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	63.6%	62.2%
		% of Total	12.5%	50.0%
	CTPS	Count	4	17
		% within kategori_E	19.0%	81.0%
Total		% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	36.4%	37.8%
		% of Total	7.1%	30.4%
		Count	11	45
		% within kategori_E	19.6%	80.4%
		% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	100.0%	100.0%
		% of Total	19.6%	80.4%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.008 ^a	1	.931		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.008	1	.931		
Fisher's Exact Test				1.000	.609
Linear-by-Linear Association	.007	1	.931		
N of Valid Cases	56				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,13.
b. Computed only for a 2x2 table

kategori_F * apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini
Crosstabulation

			apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini		
			tidak	ya	Total
kategori_F	kurang baik	Count	3	14	17
		% within kategori_F	17.6%	82.4%	100.0%
		% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	27.3%	31.1%	30.4%
		% of Total	5.4%	25.0%	30.4%
	baik	Count	8	31	39
		% within kategori_F	20.5%	79.5%	100.0%
		% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	72.7%	68.9%	69.6%
		% of Total	14.3%	55.4%	69.6%
		Total	Count	11	45
	% within kategori_F	19.6%	80.4%	100.0%	
	% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	19.6%	80.4%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.062 ^a	1	.804		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.063	1	.802		
Fisher's Exact Test				1.000	.558
Linear-by-Linear Association	.060	1	.806		
N of Valid Cases	56				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,34.
b. Computed only for a 2x2 table

Kategori_G * apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini
Crosstabulation

		apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini		Total
Kategori_G		tidak	ya	
kurang baik	Count	7	29	36
	% within Kategori_G	19.4%	80.6%	100.0%
	% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	63.6%	64.4%	64.3%
	% of Total	12.5%	51.8%	64.3%
	Count	4	16	20
	% within Kategori_G	20.0%	80.0%	100.0%
	% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	36.4%	35.6%	35.7%
baik	% of Total	7.1%	28.6%	35.7%
	Count	11	45	56
	% within Kategori_G	19.6%	80.4%	100.0%
	% within apakah anak ibu pernah mengalami diare 3 bulan terakhir ini	100.0%	100.0%	100.0%
Total	% of Total	19.6%	80.4%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.003 ^a	1	.960		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.003	1	.960		
Fisher's Exact Test				1.000	.610
Linear-by-Linear Association	.002	1	.960		
N of Valid Cases	56				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,93.
b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 5

Permohonan Kode Etik



Nomor : B- /FKIK/PP.00.9/03/2022
Lamp :
Hal : Permohonan *ethical clearance*

Gowa, 7 Maret 2022

Kepada Yth.

Ketua Komisi Etik

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

di-

Samata

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan persetujuan *ethical clearance* kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Sirjai
NIM : 70200118073
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Penyakit Diare pada Balita di Kecamatan Siempu Barat Kabupaten Buton Selatan
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes
2. Munawir Amansyah, SKM, M.Kes

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
Ketua Prodi

Abd. Malik HR. Iqbal, SKM, M.Kes
NIP. 19880826 201503 1 004

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Anip



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6

Keterangan Layak Etik Penelitian

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

B.220/KEPK/FKIK/III/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by :

Penceli utama : Sinjai
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul
Title

**"Faktor-faktor Yang memengaruhi tingginya penyakit diare pada balita di kecamatan
siompu barat kabupaten buton selatan selatan"**

"Factors that influence the high incidence of diarrhoea in toddlers in the western village of buton district"


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2016, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Hebat dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2016 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023.

This declaration of ethics applies during the period March 14th, 2022 until March 14th, 2023.

March 14th, 2022
Professor and Chairperson,


DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M Kes



Lampiran 7

Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan H.M. Yassin Limpo No. 36, Rimang Polong-Gowa (0411) 541879 Fax (0411) 8221400 Gowa
Website: www.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-1723 / Un.06/FKIK/PP.00.9/03/ 2022
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Gowa, 18 Maret 2022

Kepada Yth :
Kantor Kabupaten Buton Selatan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sinjai
NIM : 70200148073
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Penyakit Diare Pada Balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Andi Susilawati, S.Si., M.Kes.
2. Munawir Amansyah, SKM., M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan mulai tanggal 1 April – 17 April 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak dimohonkan terimakasih.

Wassalam
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 


Syahrah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar





PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kompleks Perkantoran Bumi Abdi Praja Masiri, Telp/ Fax : Email :, Batauga

Batauga, 04 April 2022

Nomor : 070/070
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Camat Siompu Barat
Di-

Tempat

Dasar : Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Nomor : B/292/Un.06/FKIK/PP.00.P/03/2022, Tanggal 18 Maret 2022, Perihal Izin penelitian.

Setelah meneliti surat dan proposal kegiatan yang dilampirkan, pada prinsipnya "Menyetujui dan Memberikan" Izin Penelitian sebagaimana ketentuan yang berlaku, kepada:

Nama : SINJAI
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswi
Alamat : Dusun Mbanua, Desa Mbanua, Kec. Siompu Barat, Kab. Buton Selatan
Nomor KTP : 7404266707990001
NPM : 70200118073
Untuk : Melaksanakan Penelitian Dengan Judul "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Penyakit Diare Pada Balita di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan*"
Waktu : April s.d Mei 2022
Lokasi Penelitian : Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Nomor kontak : 0822 3371 8241

Kepada yang bersangkutan berkewajiban:

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan kegiatan semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian tetap memperhatikan protokol COVID-19.
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian agar menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan penelitian 1 (Satu) exemplar Kepada Bupati Buton Selatan Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Buton Selatan.

Demikian Izin Penelitian untuk menjadi bahan selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buton Selatan,



LA MAI MINU, S.Pd., MM

Wibina Utama Muda, IV

NIP. 19671231 198901 1 010

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan di Batauga;
2. Kepala Puskesmas Siompu Barat di Molana;
3. Dekan FKIK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Gowa;
4. Arsip.

Lampiran 8

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS SIOMPU BARAT <i>Jln. Wa Ode Nur no. 5 Molona KodePos: (0402)</i> <i>Email: pkmsiobur@gmail.com tlp/fax: (0402)</i>	
---	--	---

Nomor : 445/
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wa Ode Sumarni, A.Md.Kep
NIP : 19840202 201001 2 011
Jabatan : Kepala UPTD, Puskesmas Siompu Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:


Nama : Sinjai
NIM : 70200118073
Sekolah/Jurusan : Universitas Islam Negeri Alauddin

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian pada bulan april – mei 2022 dengan judul : "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA PENYAKIT DIARE PADA BALITA DI KECAMATAN SIOMPU BARAT KABUPATEN BUTON SELATAN".

Dengan surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siompu Barat, 9 juni 2022
Kepala UPTD Puskesmas Siompu Barat


WA ODE SUMARNI Amd.Kep
NIP : 19840202 201001 2 011

Lampiran 9

DOKUMENTASI PENELITIAN

Proses Wawancara





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



RIWAYAT HIDUP



Sinjai lahir dan tumbuh besar di Kabupaten Buton Selatan yang merupakan daerah kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Perjalanan Pendidikan dimulai pada tahun 2006 di SDN 2 Lamaninggara, Kemudian melanjutkan ke jenjang menengah pertama di MTS Negeri 2 Buton Selatan lalu ke jenjang menengah atas di MA Swasta Siompu Barat. Tahun 2018 merupakan langkah awal bagi penulis untuk melanjutkan perjuangan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi jurusan Kesehatan Masyarakat konsentrasi Kesehatan Lingkungan angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR