MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY "A" BERSALIN DENGAN KETUBAN PECAH DINI DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR TANGGAL 29 JUNI 2022

Karya Tulis Ilmiah

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan

Jurusan Kebidanan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

SITTI AISYAH

NIM: 70400118053

PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TAHUN 2022

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sitti Aisyah

Nim : 70400118053

Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 08 Mei 2000

Jurusan/Fakultas : D3 Kebidanan/Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-gowa, November 2022

Penulis

SITTI AISYAH

NIM : 70400118053

PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Sitti Aisyah

Nim : 70400118053

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny "A" Dengan Ketuban Pecah Dini di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar Tahun 2022

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Samata, 30 September 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb	**Dr.dr.Hj.Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes**
NIP: 19870924 201903 2 012	**NIP : 19810621 200604 0 005**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul **"Manajemen Asuhan kebidanan Pada Ny "A" Dengan Ketuban Pecah Dini di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar Tahun 2022"** Yang disusun oleh **Sitti Aisyah Nim: 70400118053**, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 05 Oktober 2022**, bertepatan dengan **Tanggal 1 Rabi'ul-Awal 1444 H,** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Mahdya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 05 Oktober 2022
1 Rabi'ul-Awal 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: **Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.**	(.....)
Sekretaris	: **Firdayanti, S.SiT., M.Keb.**	(.....)
Pembimbing I	: **Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb.**	(.....)
Pembimbing II	: **Dr.dr.Hj.Dewi Setiawati, Sp.OG.,M.Kes.**	(.....)
Penguji I	: **dr. Andi Tihardimanto K, Sp.JP., M.Kes.**	(.....)
Penguji II	: **Prof.Sitti Aisyah Kara, Ph.D**	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat berniat ibadah disisi-Nya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menggelarkan permadani keislaman bagi umat manusia di muka bumi terutama bagi penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **"Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny "A" dengan Persalinan Ketuban Pecah Dini di RSIASitti Khadijah 1 Makassar Tahun 2022"**. Karya ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian. Oleh karena itu masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Kasih sayang dan penghormatan yang tak terkira kepada kedua orang tua saya ibunda Sahria dan ayahanda Syarifuddin yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, bimbingan dan pelajaran hidup yang begitu besar untuk saya. Dan juga kepada sahabat tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama masa studi.

Penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A, M.Kes beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa fakultas selama pendidikan
3. Ibunda Firdayanti, S.Si.T, M.Kebselaku ketua ProdiKebidanan yang telah meluangkan waktu demi membimbing saya selama menjalani studi di prodi kebidanan Uin Alauddin Makassar.
4. Ibu Ferawati Taherong, S.ST, M.Keb selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu demi membantu, membimbing, serta memberikan support arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
5. IbundaDr.dr.Hj.Dewi Setiawati, Sp.OG, M.Kes selaku pembimbing II yang telahmeluangkan waktu demi membantu, membimbing, serta memberikan support arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
6. Bapak dr.A.Tihardimanto K, SP.JP, M.Kes. selaku penguji I yang senantiasamemberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini
7. Ibu Prof.Sitti Aisyah Kara, Ph.D selaku penguji agama yang senantiasa

memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini

8. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah meberikan ilmu pengetahuan,

   wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi

9. Direktur dan petugas kesehatan RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang dilakukan.

10. Kepada semua teman-teman kebidanan khususnya angkatan 2018 serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal baik di sisi Allah swt.

Akhir kata penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan konstribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kesehatan.

Samata-Gowa, 10 Juli 2022

Penulis

SITTI AISYAH

NIM : 70400118053

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH i

PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH ii

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

LAMPIRAN xi

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang masalah..... 11

B. Ruang Lingkup Pembahasan 15

C. Tujuan Penulisan..... 16

D. Manfaat Penulisan 17

E. Metode Penulisan..... 17

F. Sistematika Penulisan..... 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21

A. Tinjauan Umum Persalinan 21

1. Pengertian Persalinan..... 21

2. Jenis-Jenis Persalinan 26

3. Sebab-Sebab Persalinan 26

4. Tanda-Tanda Dalam Persalinan 28

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persalinan 30

6. Tahap-Tahap Persalinan 31

B. Tinjauan Khusus Tentang Ketuban Pecah Dini (KPD) 33

1. Fisiologi Air Ketuban 33

2. Pengertian KPD 34

3. Klasifikasi KPD 35

4. Etiologi KPD 36

5. Mekanisme Pecahnya Selaput Ketuban 38

6. Tanda Dan Gejala KPD 40

7. Diagnosis KPD 42

8.Pemeriksaan Penunjang KPD 43

9. Prognosis/Komplikasi KPD 45

10. Penatalaksanaan KPD 46

C. Tinjauan Umum Persalinan Menurut Pandangan Islam 49

D. Teori Manajemen Kebidanan 53

BAB III STUDI KASUS 55

ASKEB INC 55

A. Kala I 55

B. Kala II 78

C. Kala III 91

D. Kala IV 100

SOAP INC 109

A. Kala I 109

B. Kala II 120

C. Kala III 127

D. Kala IV 130

SOAP BAYI 134

SOAP PNC 141

MATRIKS KUNJUNGAN 169

BAB IV PEMBAHASAN 188

Langkah I Identifikasi Data Dasar 188

Langkah II Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual 191

Langkah III Identifikasi Diagnose/ Masalah Potensial 192

Langkah IV Tindakan Segera/Kolaborasi 1

Langkah V Rencana Tindakan 1

Langkah VI Tindakan Asuhan Kebidanan 194

Langkah VII Evaluasi Asuhan Kebidanan 195

BAB V PENUTUP..... 197

A. Kesimpulan..... 197

B. Saran-saran 198

DAFTAR PUSTAKA..... 200

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Partograf

Lampiran II : Surat permohonan pengajuan kode etik kepada komite etik penelitian kesehatan FKIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Lampiran III : Surat keterangan layak etik dari komite etik penelitian kesehatan FKIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Lampiran IV : Surat permohonan izin penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan kepada RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar

Lampiran V : Surat penelitian dari RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, JULI 2022

SITTI AISYAH, 70400118053

Pembimbing I : Ferawati Taherong

Pembimbing II : Dewi Setiawati

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny "A" Dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar Tanggal 29 Juni 2022

Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan pecahnya ketuban sebelum inpartu.Penyebab KPD erat kaitannya dengan hipermotilitas rahim, selaput ketuban tipis, infeksi, multipara, usia ibu, letak janin dan riwayat KPD sebelumnya.Hal ini bisa menyebabkan komplikasi berupa infeksi maternal maupun neonatal, hipoksia atau kompresi tali pusat, sindrom deformitas janin, infeksi dalam persalinan, nifas, partus lama, perdarahan post partum dan meningkatnya kasus bedah *Caesar*.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny "A" dengan Persalinan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar tahun 2022 sesuai dengan 7 langkah varney dan SOAP. Yaitu langkah I pengkajian data dasar, langkah II diagnosa masalah aktual, langkah III diagnosa masalah potensial, langkah IV tindakan segera/kolaborasi, langkah V menyusun rencana asuhan yang menyeluruh, langkah VI implementasi, langkah VII evaluasi.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny"A" dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) yakni dilakukannya pengumpulan data serta keluhan dan riwayat keluhan ibu, berdasarkan data dan pemeriksaan yang dilakukan maka dirumuskan masalah actual yakni KPD, masalah actual dapat diatasi dan tidak ditemukan potensial masalah, kolaborasai dengan dokter untuk pemasangan infus Ringer Laktat per IV 28 tetes per menit,pemasangan cytotec pervaginam 1/8 tablet dan pemberian injeksi cefotaxime 1 gr/IV, rencana asuhan dilakukan berdasarkan masalah actual, Kala I sampai IV berlangsung baik, keadaan ibu dan bayinya baik, dan tidak ditemukannya kendala atau penyulit selama persalinan.

Kesimpulan dari studi kasus yakni tidak ditemukannya kendala dalam menangani masalah dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) dan telah dilakukan pengkajian pendokumentasian dalam bentuk 7 langkah varney dan SOAP.

Kata kunci: Ketuban Pecah Dini (KPD), 7 langkah varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER, JULY 2022

SITTI AISYAH, 70400118053

Supervisor I : Ferawati Taherong

Supervisor II : Dewi Setiawati

Midwifery Care Management for Mrs "A" with the Case of Premature Rupture of Membranes at the Hospital of Sitti Khadijah 1 of Makassar, June 29th, 2022.

Premature rupture of membranes (PROM) is the rupture of gestational membranes prior to the onset of labor. The major causes of PROM are uterine hypermotility, thin membranes, infection, multiparity, maternal age, fetal position and any previous history of PROM. This issue may cause complications in the forms of maternal and neonatal infections, hypoxia or compression of the umbilical cord, fetal deformity syndrome, infection in labor, puerperium, prolonged labor, postpartum hemorrhage and increased cases of cesarean section.

The major purpose of this research was to carry out Midwifery Care Management for Mrs. "A" with Premature Rupture at the hosptial of Sitti Khadijah 1 of Makassar. This research was conducted in 2022 according to the 7-steage of Varney management approach and SOAP documentation procedure. The research was conducted using several steps namely the assessment of basic data, the diagnosis on the actual problems, the diagnosis on potential problems, immediate action/collaboration, the arrangement of a comprehensive care plan, the implementation, and the evaluation.

The findings of this research indicated that the initial treatment to Mrs "A" with a premature rupture of membranes was done by collecting historical condition and health status of the patient. Based on the data, the actual problems were identified before treatments were given. Subsequently, the health workers collaborated in order to find solutions for the occurring issues. It was apparent that there were no obstacles found during the treatments. There were various installations administered to the patient such as Ringer Lactate IV infusion with 28 drops per minute, vaginal insertion of 1/8 tablet of cytotec, and 1 gr/IV injection of efotaxime. Moreover, from stage I to stage IV, the general conditions of both the mother and baby were good.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ketuban pecah dini (KPD) adalah keadaan pecahnya kantong ketuban sebelum persalinan. Hal ini dapat terjadi pada akhir kehamilan maupun pertengahan kehamilan jauh sebelum waktu melahirkan. KPD preterm yaitu KPD yang terjadi sebelum kehamilan 37 minggu, KPD yang memanjang yaitu KPD yang terjadi lebih dari 37 minggu sebelum adanya tanda-tanda persalinan (Sarwono, 2012:677).

Ada 2 macam kemungkinan ketuban pecah dini yaitu *premature rupture of membrane* dan *preterm rupture of membrane*. Gejalanya sama yaitu keluaranya cairan dan tidak ada keluhan sakit. KPD dapat terjadi setelah ibu hamil mengalami trauma, mulut Rahim yang lemah sehingga tidak mampu menahan kehamilan, ketegangan Rahim yang berlebihan,kelainan letak janin seperti sungsang atau melintang, atau kelainan bawaan dari selaput ketuban. Bisa juga karena infeksi yang kemudian menimbulkan proses biomekanik pada selaput ketuban sehingga memudahkan ketuban pecah. KPD mengakibatkan terjadinya *oligohidramnion*, kondisi dimana cairan ketuban tinggal sedikit yang mengakibatkan tali pusat tertekan oleh bagian tubuh janin sehingga aliran darah dari ibu ke janin berkurang sehingga menimbulkan hipoksia atau ganggua pertukaran O2 hingga *fetal distress* dan berlanjut ke asfiksia pada bayi baru lahir (Panjaitan dkk, 2020:4).

Penyebab KPD belum diketahui secara pasti tetapi ada hubungannya dengan hipermotilitas Rahim, selaput ketuban tipis, infeksi, multipara, usia ibu, letak janin, dan riwayat ketuban pecah dini sebelumnya. Dampak terjadinya KPD dapat menyebabkan infeksi maternal maupun neonatal, hipoksia atau kompresi tali pusat, sindrom deformitas janin, meningkatnya kelahiran dengan *sectio caesarea* atau gagalnya prsalinan normal dan meningkatnya morbiditas dan mortalitas maternal da perinatal. Komplikasi KPD yang paling sering terjadi pada ibu bersalin yaitu infeksi dalam persalinan, infeksi masa nifas, partus lama, perdarahan postpartum, meningkatkan kasus bedah *Caesar*, dan meningkatkan morbiditas dan mortalitas maternal (Wahyuni dkk, 2020:26).

Paritas adalah jumlah kehamilan yang menghasilkan janin yang mampu hidup diluar rahim (28 minggu). Wanita yang telah melahirkan beberapa kali maka akan lebih berisiko tinggi mengalami KPD pada kehamilan berikutnya. KPD banyak terjadi pada multipara. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Sudarto dan Tunut yang menyatakan bahwa factor yang mempengaruhi kejadian KPD adalah paritas kehamilan yang terlalu sering dapat memengaruhi embryogenesis, selaput ketuban lebih tipis hingga mudah pecah sebelum waktunya dan semakin banyak paritas semakin mudah terjadi infeksi amnion karena rusaknya struktur servik pada persalinan sebelumnya (Wahyuni dkk, 2020:27).

Komplikasi ketuban pecah dini yang paling sering terjadi pada ibu bersalin yaitu infeksi dalam persalinan, infeksi masa nifas, partus lama, perdarahan post partum, meningkatkan kasus bedah caesar, dan meningkatkan

morbiditas dan mortalitas maternal. Sedangkan komplikasi yang paling sering terjadi pada janin yaitu prematuritas, penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia, sindrom deformitas janin, dan meningkatkan morbiditas dan mortalitas perinatal (Rahayu dkk, 2017).

Kondisi ini merupakan komplikasi 2-4% dengan semua persalinan tunggal dan 7-20% pada kehamilan kembar serta berhubungan dengan > 60% persalinan prematur. Penyebab ketuban pecah dini (KPD) adalah multi faktor dan faktor risiko yang berhubungan dengan ini adalah infeksi intra amniotik, abrupsi plasenta dan prosedur invasif uterin (*amniocentesis*, *cardosentesis*, *choriotic villus sampling* and *cervikal carelage*) (Legawati dan Riyanti, 2018).

Risiko kecacatan dan kematian janin juga tinggi pada kejadian KPD praterem, dan hipoplasia paru yang merupakan komplikasi fatal yang terjadi (Yang, 2004). WHO memperkirakan 585000 perempuan meninggal setiap harinya akibat komplikasi dan proses persalinan. WHO juga melaporkan, sekitar 80% kematian maternal merupakkan akibat meningkatnya komplikasi selama kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Sisanya 20% merupakan penyebab tidak langsung seperti anemia, malaria, hepatitis, sakit jantung, dan diabetes.

Status kesehatan suatu Negara dikatakan baik apabila Angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) rendah. Hal ini juga bisa menilai derajat kesehatan masyarakatnya. AKI merupakan jumlah kematian ibu selama hamil, bersalin dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalina dan masa nifas atau pengelolaannya tetai bukaan karena sebab lain seperti kecelakaan,

dan lain-lain setiap 100.000 kelahiran hiduo. Sedangkan AKB atau Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun (kemenkes RI 2017:104-125).

World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa AKI secara global sebesar 220/100.000 kelahiran hidup, sedangkan di indonesia AKI sebesar 210/100.000 kelahiran hidup. AKB 2010 secara global sebesar 40/1.000 kelahiran hidup, sedangkan di indonesia sebesar 27/1.000 kelahiran hidup.Kejadian KPD diseluruh dunia berkisar antara 5-10% dari semua kelahiran. Sementara di Indonesia insiden KPD 4,5% dari seluruh kehamilan. KPD preterm terjadi 1% dari seluruh kehamilan dan 70% kasus KPD terjadi pada kehamilan aterm. Hampir semua KPD pada kehamilan preterm akana lahir sebelum aterm atau persalinan akan terjadi dalam satu minggu setelah selaput ketubanpecah. 70 % kasus KPD juga terjadi pada kehamilan cukup bulan. KPD berhubungan dengan penyebab kejadian prematurittas dengan kejadian 30-40%, prematuritas penyebab morbiditas dan mortalitas perinatal sekitar 85 % (Sudarto &Tunut, 2016; Maharrani & Nugrahini, 2017; Rohmawati & Fibriana, 2018).

Menurut Kemenkes RI (2020),infeksi merupakan urutan ke tiga penyebab kematian ibu terbanyak yaitu 207 kasus pada tahun 2019. Sedangkan untuk kematian neonates, dari 29.322 kematian balita, 69% (20.244 kematian) diantaranya terjadi pada masa neonates dimana 80%-nya terjadi pada enam hari pertama kehidupan. Salah satu penyebab ibu hamil berisiko mengalami infeksi adalah karena mengalami ketuban pecah sebelum fase persalinan pada

kehamilan preterm yang lebih dikenal dengan istilah *Preterm Premature Rupture Of Membranes* (PPROM) atau KPD Preterm (Duff,2003).

Di Sulawesi Selatan jumlah AKI yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2020 sebanyak 133 kasus dan mengalami penurunan sebanyak 11 kasus dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2019 mencapai 144 kasus. Terdiri dari kematian ibu hamil 31 orang (22%), kematian ibu bersalin 36 orang (25%), kematian ibu nifas 77 orang (53%). Pada tahun 2018 jumlah kasus AKB di Sulawesi Selatan sebanyak 1.037 kasus, menurun menjadi 916 kasus di tahun 2019 dan sampai dengan penghujung tahun 2020 jumlah kasus AKB kembali menurun menjadi 791 kasus. (Profil Kesehatan Sul-Sel, 2020:50-55)

Angka kematian ibu di Kota Makassar menunjukkan penurunan dari 20,33/100.000 KH ditahun 2014 menjadi 19,85/100.000 KH di tahun 2015, dimana terjadi 5 kematian ibu dari jumlah 25.181 kelahiran hidup di kota Makassar.

Berdasarkan data rekam medik RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar, pada tahun 2019 angka kejadian KPD diruangan bersalin sebanyak 44 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 52 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 66 kasus KPD pada ibu bersalin.

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengambil studi kasus dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSIA Sitti Khadija 1 Makassar” pada tahun 2022.

B. Ruang lingkup

Ruang lingkup penulisan adalah pendekatan manajemen asuhan kebidanan intranatal care dengan kasus Ketuban Pecah Dini (KPD).

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

   Melakukan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan KPD sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

   a. Dilakukannya pengumpulan data terhadap ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar
   b. Diidentifikasinya diagnosis/masalah actual terhadap ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar
   c. Diidentifikasinya diagnosis/masalah potensial pada ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar
   d. Dilakukannya tindakan kolaborasi/emergency pada ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar
   e. Disusunnya rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar
   f. Dilaksanakannya asuhan kebidanan sesuai rencana tindakan pada ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar

g. Dievaluasinya asuhan kebidanan yang telah dyiberikan pada ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar

h. Dilakukannya pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada ibu bersalin di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar

D. *Manfaat Penulisan*

1. Instansi

   Sebagai sumber informasi dan menambah pengetahuan sebagai instansi terkait dalam menigkatkan kualitas pelayanan.

2. Institusi

   Sebagai bahan pembelajara dan sumber pengetahuan untuk penulis selanjutnya dan juga sebagai sumber informasi bagi rekan-rekan Mahasiswa Kebidanan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan penerapan Asuhan Kebidanan Persalinan dengan KPD.

3. Penulis

   Menambah pengetahuan dan wawasan tentang kasus KPD, dan merupakan pengalaman yang dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan dalam penerapan manajemen asuhan persalinan dengan KPD.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Metode pustaka

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungnan dengan intranatal care khususnya pada asuhan persalinan dengan KPD.

2. Studi kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi data yang akurat, penulis menggunakan teknik :

a. Anamnesa

Penulisa menggunakan teknik tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan keluarga dan bidan yang memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampe kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi

1) Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata. Inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
2) Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabahan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.

3) Perkusi, adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.

4) Auskultasi, merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengatur tekanan darah sedangkan lenek digunakan untuk mendengar denyut jantng janin (DJJ).

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial dilakukan meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dalam serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas, kesehatan dan lingkungan

3. Studi dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan bidan, perawat, petugas laboratorium, dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi konstribusi dan penyelesaian proposal ini.

4. Diskusi

Penulis melakukan Tanya jawab dengan klien dengan keluarga klien ,dosen pembimbing baik dilahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu : pada bab 1 yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Pada bab II terdiri dari tinjauan teori, akan menguraikan tinjauan umum tenang asuhan kebidanan dan persalinan, tinjauan khusus tenttang KPD, tinjauan umum KPD menurut islam, proses manajemen asuhan kebidanan, serta pendokumentasian asuhan kebidanan dalam bentuk SOAP.

Pada bab III yaitu pada kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnose atau masalah actual, identifikasi diagnose atau masalah potensial, tindakan segara atau kolaborasi, rencana tindakan atau intervensi, implementasi dan evaaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuahn kebidan serta praktek yang dilaksanakan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar dalam memberikan asuhan kebidanan intranatal dengan KPD.

Pada bab V yaitu penutup akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semuan temuan serta pengatahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literature ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Persalinan

1. Pengertian persalinan

Definisi persalinan normal menurut *WHO* adalah persalinan yang dimulai secara spontan, beresiko rendah pada awal persalinan dan tetap demikian selama persalinan. Bayi dilahirkan spontan dengan presentase belakang keapala pada usia kehamilan antara 37 minggu hingga 42 minggu lengkap. Setelah persalinan ibu maupun bayi berada dalam kondisi sehat (Mutmainnah, 2017).

Persalinan normal adalah suatu proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 minggu) tanpa disertai adanya penyulit. Persalinan dimulai (inpartu) sejak uterus berkontraksi mengakibatkan perubahan serviks (Rosyati, 2017).

Persalinan adalah proses dimana janin dan ketuban didorong keluar melalui jalan lahir. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa persalinan (*labor*) adalah rangkaian peristiwa mulai dari kontraksi teratur sampai dikeluarkannya pruduk konsepsi (janin, plasenta, ketuban, dan cairan ketuban) dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri (Utami dan Fitriahadi, 2019).

Menurut Varney (2007), persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar dengan berbagai rangkaian yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi persalinan sejati, diakhiri dengan kelahiran plasenta (walyani, 2015).

Menurut (Manuaba, 1998 ; Wiknjosastro dkk, 2005), persalinan normal adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) yang telah cukup bulan dan dapat hidup diluar uterus melalui vagina secara spontan (Yulizawati dkk, 2019).

Persalinan normal adalah anugerah bagi perempuan dari Allah swt yang telah terekam didalam al-qur’an melalui pengalaman Siti Maryam ibu Nabi Isa as yang tercantum dalam surat Maryam ayat 22-26 :

۞فَحَمَلَتۡهُ فَٱنتَبَذَتۡ بِهِۦ مَكَانٗا قَصِيّٗا ٢٢ فَأَجَآءَهَا ٱلۡمَخَاضُ إِلَىٰ جِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ
قَالَتۡ يَٰلَيۡتَنِي مِتُّ قَبۡلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسۡيٗا مَّنسِيّٗا ٢٣ فَنَادَىٰهَا مِن تَحۡتِهَآ أَلَّا
تَحۡزَنِي قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِيّٗا ٢٤ وَهُزِّيٓ إِلَيۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ تُسَٰقِطۡ
عَلَيۡكِ رُطَبٗا جَنِيّٗا ٢٥ فَكُلِي وَٱشۡرَبِي وَقَرِّي عَيۡنٗاۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدٗا
فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمَٰنِ صَوۡمٗا فَلَنۡ أُكَلِّمَ ٱلۡيَوۡمَ إِنسِيّٗا ٢٦

Terjemahannya :

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh, Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan", Maka Jibril menyerunya dari tempat

yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini"

Dari penafsiran yang penulis kaji pada surat Maryam ayat 22-26, dapat disimpulkan beberapa hal yang terkandung bahwa kehamilan Maryam (ayat 22), setelah malaikat jibril meniupkan ruh ke dalam Rahim Maryam, maka Maryam mengandung kemudian mengasingkan diri ke tempat yang jauh untuk menghindari dirinya dari berbagai cemoohan dan kejadian yang tak diinginkan dari kaumnya. Quraish Shihab membenarkan pendapat para ahli tafsir bahwa tempat yang dipilih Maryam adalah Betlehem. Mengenai lamanya masa kehamilan Maryam, mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa Maryam mengandung Isa as. Sama seperti halnya yang dialami oleh para wanita pada umumnya. Posisi terbaik ketika melahirkan (ayat 23), para ahli tafsir tidak berbeda pendapat, ketika Maryam mulai merasakan rasa sakit kontraksi disebabkan oleh desakan janin yang akan keluar, maka Maryam menyandarkan tubuhnya yang lemah pada pangkal pohon kurma. Rasa yang begitu hebat membuatnya nyaris putus asa. Keadaan dirinya yang sendiri jauh dari keluarga tanpa seorangpun didekatnya. Maryam pun mengeluarkan seluruh keluh kesahnya. Keputus asaannya karena rasa sakit yang terus datang silih berganti. Wanita yang akan melahirkan membutuhkan support (ayat 24), mayoritas ulama tafsir mengatakan yang

menyeru kepada Maryam adalah malaikat jibril. Dia (Jibril) datang kepada Maryam yang sedang sedih untuk menghibur dan menenangkan rasa kekhawatirannya, serta memberitahu kepada Maryam bahwa Allah swt. Telah mengalirkan sebuah anak sungai untuknya. Makanan terbaik yang dianjurkan menjelang dan pascapersalinan serta isyarat untuk berusaha dalam mencari rezeki (ayat 25). Makan dan minum yang bergizi serta bersenang hatilah (ayat 26), para mufassir berpendapat bahwa Allah memerintahkan Maryam untuk makan buah kurma dan minum dari aliran air yang telah disediakan oleh Allah swt. guna memulihkan kembali tenaganya. Karena wanita setelah melahirkan akan merasa sangat letih. Kemudian Allah juga memerintah Maryam untuk bersenang hati dengan kelahiran anaknya (Shihab, 2002).

Kata al-makhadh berasal dari kata al-makhdh yaitu gerakan yang sangat keras. Desakan janin untuk keluar melalui Rahim mengakibatkan pergerakan anak dalam perut, dan mengakibatkan kontraksi sehingga menimbulkan rasa sakit. Dari sini kata tersebut dipahami dalam arti sakit yang mendahului kelahiran anak (Shihab M. Quraish, 2002).

Engagement adalah peristiwa ketika diameter biparietal melewati pintu atas panggul dengan sutura sagitalis melintang didalam jalan lahir dan sedikit fleksi. Penurunan kepala terjadi bersamaan dengan mekanisme lainnya. Kekuatan yang mendukung antara lain, tekanan cairan amnion, tekanan langsung fundus pada bokong janin dan kontraksi otot abdomen (Kuswanti dkk, 2014).

Berdasarkan uraian diatas tentang persalinan dalam pandangan islam dan teori kesehatan dapat disimpulkan bahwa, penurunan kepala janin menelusuri jalan lahir (rongga panggul) mengakibatkan rasa sakit yang dirasakan oleh ibu. Rasa sakit tersebut diakibatkan karena adanya tekanan cairan amnion, tekanan fundus uteri pada bokong janin dan kontraksi otot abdomen.

a. Tujuan asuhan persalinan

Salah satu hal penting dalam persalinan adalah asuhan intrapatum yang bertujuan untuk meningkatkan jalan lahir yang aman bagi ibu dan bayi, meminimalkan resiko pada ibu dan bayi dan meningkatkan hasil kesehatan yang baik dan pengalaman yang positif.

Tujuan dari asuhan persalinan normal adalah sebagai berikut :

1) Memberi dukungan baik secara fisik maupun emosional kepada ibu dan keluarganya selama persalinan dan kelahiran.
2) Melakukan pengkajian, membuat diagnosa, mencegah, menangani komplikasi-komplikasi dengan cara pemantauan ketat dan deteksi dini selama persalinan dan kelahiran.
3) Melakukan rujukan pada kasus-kasus yang tidak bisa ditangani sendiri untuk mendapatkan asuhan spesialis jika perlu.
4) Memberikan asuhan yang adekuat kepada ibu, dengan intervensi minimal sesuai dengan tahap persalinannya.
5) Memperkecil resiko infeksi dengan melaksanakan pencegahan infeksi yang aman.

6) Selalu memberitahukan kepada ibu dan keluarganya mengenai kemajuan, adanya penyulit maupun intervensi yang akan dilakukan dalam persalinan.
7) Memberikan asuhan yang tepat untuk bayi segera setelah lahir.
8) Membantu ibu dengan pemberian ASI dini (Endang Buda & Megawati Fajrin, 2017).

2. Jenis-jenis persalian

a. Persalinan spontan

Yaitu persalina yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri, melalui jalan lahir ibu tersebut.

b. Persalinan buatan

Bila persalinan dibantu dengan tenaga dari luar misalnya *ekstraksi forceps*, atau dilakukan *sectio caesaria.*

c. Persalina anjuran

Persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian pitocin atau prostaglandin (Ari Kurniarum, 2016).

3. Sebab-sebab terjadinya persalinan menurut (Mutmainnah dkk : 2017)

a. Teori Penurunan Hormon

Hormon progesteron merupakan hormon yang mengakibatkan relaksasi pada otot-otot rahim, sedangkan hormon estrogen meningkatkan kerentanan otot rahim. Selama kehamilan, terdapat keseimbangan antara progesteron dan estrogen didalam darah.

Progesteron menghambat kontraksi selama kehamilan sehingga mencegah ekspulsi fetus. Sebaliknya estrogen mempunyai kecenderungan meningkatkan derajat kontraktilitas uterus. Baik estrogen maupun progesteron disekresikan dalam jumlah yang secara progresif makin bertambah selama kehamilan. Namun saat kehamilan mulai masuk usia 7 bulan dan seterusnya, sekresi estrogen terus meningkat sedangkan sekresi progesteron tetap konstan atau mungkin sedikit menurun sehingga terjadi kontraksi brakton hicks saat akhir kehamilan yang selanjutnya bertindak sebagai kontraksi persalinan.

b. Teori Oksitosin

Menjelang persalinan terjadi peningkatan reseptor oksitosin dalam otot rahim sehingga mudah terangsang saat disuntikkan oksitosin dan menimbulkan kontraksi, diduga bahwa oksitosin dapat menimbulkan pembentukan prostaglandin dan persalinan dapat berlangsung.

c. Teori Prostaglandin

Prostaglandin yang dihasilkan oleh deciduas salah satu sebab permulaan persalinan. Hal ini juga disokong dengan adanya kadar prostaglandin yang tinggi baik dalam air ketuban maupun darah perifer ibu hamil sebelum melahirkan atau selama persalinan.

d. Teori Plsenta Menjadi Tua

Plasenta yang menjadi tua seiring bertambahnya usia kehamilan menyebabkan kadar estrogen dan progesteron turun. Hal

ini juga mengakibatkan kejang pada pembuluh darah sehingga akan menimbulkan kontraksi.

e. Teori Distensi Rahim

Seperti halnya kandung kemih yang bila dindingnya meregang karena isinya, demikian pula dengan rahim. Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan maka otot-otot rahim akan semakin meregang. Rahim yang membesar dan meregang menyebabkan iskemi otot-otot rahim sehingga mengganggu sirkulasi utero plasenter kemudian timbullah kontraksi.

f. Teori Iritasi Mekanik

Dibelakang serviks terletak ganglion servikale (Fleksus Franker Hauser). Bila ganglion ini digeser dan ditekan, misalnya oleh kepala janin maka akan timbul kontraksi.

g. Teori Pengaruh Janin

Hypofise dan kelenjar suprorenal janin juga memegang peranan dalam terjadinya persalinan janin anancepalus kehamilan lebih lama dari biasanya.

4. Tanda-tanda persalinan

Yang merupakan tanda pasti persalinan adalah :

a. Timbulnya kontraksi uterus

Biasa juga disebut dengan his persalinan yaitu his pembukaan yang mempunyai sifat sebagai berikut :

1) Nyeri melingkar dari punggung memancar keperut bagian depan.

2) Pinggang terasa sakit dan menjalar kedepan.
3) Sifatnya teratur, herval makin lama makin pendek dan kekuatannya makin besar.
4) Mempunyai pengaruh pada pendataran dan atau pembukaan cervix.
5) Makin beraktifitas ibu akan menambah kekuatan kontraksi.

   Kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan pada serviks (frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit). Kontraksi yang terjadi dapat menyebabkan pendataran, penipisan dan pembukaan serviks.

b. Penipisan dan pembukaan serviks

   Penipisan dan pembukaan serviks ditandai dengan adanya pengeluaran lendir dan darah sebagai tanda pemula.

c. Bloody show (lendir disertai darah dari jalan lahir)

   Dengan pendataran dan pembukaan, lendir dari canalis cervicalis keluar disertai dengan sedikit darah. Perdarahan yang sedikit ini disebabkan karena lepasnya selaput janin pada bagian bawah segemen bawah rahim hingga beberapa capillair darah terputus.

d. Prematur Rupture of Membrane

   Adalah keluarnya cairan banyak dari jalan lahir. Hal ini terjadi akibat ketuban pecah atau selaput janin robek. Ketuban biasanya pecah kalau pembukaan lengkap atau hampir lengkap dan dalam hal ini keluarnya cairan merupakan tanda yang lambat sekali. Tetapi

kadang-kadang ketuban pecah pada pembukaan kecil, malahan kadang-kadang selaput janin robek sebelum persalinan. Walaupun demikian persalinan diharapkan akan mulai dalam 24 jam setelah air ketuban keluar (Kurniarum, 2017).

5. Faktor-faktor terjadinya persalinan

Ada 6 faktor yang mempengaruhi persalinan yaitu :

a. Power

Adalah tenaga atau kekuatan yang membantu mendorong keluarnya janin. Kekuatan tersebut teridir dari his, kontraksi otot rahim, kontraksi diafragma dan aksi dari ligamen dengan kerja sama yang baik dan sempurna.

b. His

Adalah kontraksi uterus yang timbul karena bekerjanya otot-otot polos rahim.His yang baik memiliki sifat yaitu kontraksi simetris, fundus dominan, terkoordinasi dan relaksasi.

c. Passenger (faktor janin)

Pada faktor passenger, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yakni ukuran kepala janin, presentasi, letak, sikap dan posisi janin.

d. Passage (jalan lahir)

Jalan lahir terdiri dari panggul ibu, yakni bagian tulang yangpadat,; dasar panggul, vagina, dan introitus (lubang vagina luar) serta bagian-bagian lunak dari panggul (otot-otot, jaringan dan ligamen-ligamen).

e. Psikologi ibu

Keadaan psikologi ibu memiliki pengaruh pada persalinan. Ibu yang yang mendapat dukungan daris suami dan keluarga serta didampingi dalam proses persalinannya cenderung akan merasa aman dan nyaman.

f. Faktor posisi ibu

Posisi tegak membuat rasa letih ibu hilang, memberi rasa nyaman dan memperbaiki sirkulasi. Posisi tegak meliputi posisi berjalan, jongkok, berdiri, duduk (Utami & Fitriahadi, 2019).

g. Faktor penolong

Kompetensi yang dimiliki penolong sangat bermanfaat untuk memperlancar persalinan dengan mencegah kematian neonatal (Asrinah dkk, 2010)

6. Tahap-tahap persalinan

Tahap persalinan terbagi atas 4 tahap yaitu :

a. Kala I (Fase pembukaan)

Persalinan kala I adalah kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan nol sampai pembukaan lengkap. Pada permulaan his kala pembukaan berlangsung tidak begitu kuat sehingga ibu masih bisa berjalan-jalan. Klinis dinyatakan mulai terjadi partus jika timbul his dan ibu mengeluarkan lendir yangbersemu darah (bloody show).

Proses ini berlangsung kurang lebih 18-24 jam yang terbagi menjadi

2 fase :

1) Fase laten

Berlangsung 8 jam dari pembukaan 0 cm sampai pembukaan 3 cm.

2) Fase aktif

Berlangsung 7 jam dari pembukaan serviks 3 cmsampai pembukaan 10 m.

Fase aktif terbagi menjadi 3 yaitu :

a. Fase akselerasi, dimana dalam waktu 2 jam pembukaan 3 menjadi 4 cm.

b. Fase dilatasi maksimal, dimana dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat dari pembukaan 4 cm menjadi 9 cm.

c. Fase deselerasi, dimana pembukaan menjadi lambat kembali. Dalam waktu 2 jam pembukaan 9 cm menjadi 10 cm.

a. Kala II (Pengeluaran)

Dimulai dari pembukaan lengkap (10cm) sampai bayi lahir. Proses ini berlangsung 1 jam pada primigravida dan 1 jam padamultigravida. Pada kala ini his menjadi lebih kuat dan cepat kuranglebih 2-3 menit sekali(Utami & Fitriahadi, 2019).

b. Kala III (Pelepasan Uri)

Dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uteri agak diatas pusat. Beberapamenit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya.

c. Kala IV (Observasi)

Dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam petama post partum.

Observasi yang harus dilakukan pada kala IV adalah :

1) Tingkat kesadaran ibu

2) Pemeriksaan tanda-tanda vital : Tekanan darah, nadi,pernapasan, suhu.

3) Kontraksi uterus

4) Terjadinya perdarahan

5) Perdarahan dianggap masih normal jika jumlahnya tidak melebihi 500 cc

B. Tinjauan Khusus Tentang KPD

1. Fisiologi Air Ketuban

Air ketuban adalah cairan jernih agak kekuningan yang menyelimuti janin didalam rahim selama kehamilan. Ketuban atau cairan amnion adalah cairan yang memenuhi rahim yang diproduksi oleh sel-sel trofoblas. Cairan ini merupakan sumber makanan janin dalam kandungan. Sejak berusia 12 minggu janin mulai minum air ketuban dan mengeluarkannya melalui air seni. Cairan itu berada dalam kantung yang disebut kantung ketuban yang terdiri dari jaringan tipis kurang dari 1 milimeter (Esty, 2010)

Selaput ketuban yang mengelilingi ruang amnion terdiri dari amnion dan korion, yang merupakan lapisan menempel yang terdiri dari beberapa jenis sel, termasuk sel epitel, mesenkim dan trofoblas yang menyatu pada matriks kolagen. Lapisan ini menahan cairan amnion, mensekresi subtansi

baik ke cairan amnion maupun menuju uterus, dan melindungi janin terhadap infeksi yang asendens dari sistem reproduksi (Parry & Straus,1998).

Dinding kantung ketuban tidak berisi pembuluh darah sehingga tidak ada perdarahan ketika pecah. Ketika usia kehamilan semakin tua, dinding ketuban semakin tipis namun masih cukup kuat menahan tekanan yang semakin besar dari janin sampai saat waktu persalinan. Bahkan ada dinding ketuban yang harus dipecahkan oleh dokter atau bidan bila saat persalinan ketuban belum pecah (Esty, 2010).

2. Pengertian Ketuban Pecah Dini (KPD)

Ketuban pecah dini (KPD) didefinisikan sebagai pecahnya ketuban sebelum waktunya melahirkan. Hal ini dapat terjadi pada akhir kehamilan maupun jauh sebelum waktunya melahirkan. KPD preterm adalah KPD sebelum usia kehamilan 37 minggu. KPD yang memanjang adalah KPD yang terjadi lebih dari 12 jam sebelum waktunya melahirkan. Ketuban pecah dini adalah pecahnya selaput ketuban sebelum ada tanda-tanda persalinan (Arif Mansjoer, 2001 : 310).

KPD merupakan komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan kurang bulan, dan mempunyai konstribusi yang besar pada angka kematian perinatal pada bayi yang kurang bulan. Pengelolaan KPD pada kehamilan kurang dari 30 minggu sangat komplek, bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya prematuritas dan RDS.

Ketuban pecah dini (KPD) atau premature rupturen of the membrane (PROM) merupakan salah satu alasan utama untuk dilakukan bedah caesar. Pada saat selaput ketuban pecah (atau lebih akurat bocor), tidak ada informasi yang berguna yang dapat ditemukan dalam buku kecuali bahwa anda harus langsung pergi ke rumah sakit. Meskipun tidak ada tanda-tanda infeksi baik dalam ibu atau bayi, seringkali dokter mengatakan kepada klien bahwa bayinya dapat mati jika ibu tidak menyetujui operasi.

Ada bermacam-macam batasan tentang premature rupture of the membrane

(PROM), yakni :

1) Ada teori yang menghitung berapa jam sebelum inpartu.
   misalnya 2 atau 4 atau 6 jam sebelum inpartu.
2) Ada juga yang menyatakan dalam ukuran pembukaan serviks/leher rahim pada kala I, misalnya ketuban yang pecah sebelum pembukaan serviks 3 cm atau 5 cm, dan sebagainya.
3) Prinsipnya adalah ketuban yang pecah “sebelum waktunya”(Norma & Dwi, 2013).Normalnya selaput ketuban pecah pada akhir kala I atau awal kala II persalinan. Dapat juga ketuban belum pecah sampai saat mengedan, sehingga kadang perlu dipecahkan (amniotomi).

3. Klasifikasi

Menurut pogi tahun 2014, KPD diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu KPD preterm dan KPD aterm.

a. KPD preterm

Ketuban pecah dini preterm adalah pecahnya ketuban yang terbukti dengan vaginal pooling, tes nitrazin, dan tes fern pada usia kehamilan <37 minggu sebelum onset persalinan. KPD preterm adalah pecahnya ketuban saat umur kehamilan ibu di antara 24 minggu sampai kurang dari 34 minggu, sedangkan KPD preterm saat usia kehamilan ibu antara 34 minggu sampai kurang dari 37 minggu.

b. KPD aterm

Ketuban pecah dini aterm adalah pecahnya ketubansebelum waktunya yang terbukti dengan vaginal pooling, tes nitrazin dan tes fern pada usia kehamilan ≥ 37 minggu.

4. Etiologi

Penyebabnya belum diketahui dan tidak dapat ditentukan secara pasti, kemungkinan yang menjadi faktor predisposisi adalah :

a. Infeksi yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban atauinfeksi pada cairan ketuban.
b. Tekanan intrauterine yang meninggi atau meningkat secaraberlebihan (overdistensi uterus) misalnya trauma, hidramnion, gemelli.
c. Trauma yang didapat misalnya hubungan seksual, pemeriksaan dalam, maupun amnosintesis menyebabkan terjadinya KPD karena biasanya disertai infeksi.

Islam telah mengatur dan mengajarkan bagaimana melakukan hubungan seksual dengan baik. Menurut Ali Yusuf as-Subki dalam

sebuah hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhori dari Abdullah bin Amru bin al-Ash ia berkata :

> "Rasulullah saw, bersabda: 'Wahai Abdullah apakah kau tidak menceritakan kepadamu bahwa engkau puasa siang hari dan ibadah malam hari.' Aku berkata: 'Iya, ya Rasulullah.'Nabi berkata: 'janganlah kamu lakukan, berpuasalah dan berbukalah, beribadahlah dan tidurlah. Karena tubuhmu memiliki hak, bagi matamu memiliki hak, dan bagi istrimu memiliki hak".

Prinsipnya dalam melakukan hubungan seksual suami istri memiliki hak yang sama

Allah swt. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 223:

نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمۡۚ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢٢٣

Terjemahannya:

> "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya.Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman". (QS. Al-Baqarah:223).

Pergaulan suami istri termasuk dalam hal-hal pemenuhan kebutuhan seksual. Menggauli istri dengan ma'ruf dapat mencakup sikap menghargai, menghormati, perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' [4]:19:

...ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ ...

Terjemahannya:

… Dan pergaulilah mereka dengan cara yang Ma'ruf. (QS. An-Nisa:19).

Pergaulan yang dimaksud secara khusus adalah pergaulan suami istri yang berkenan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan Ma'ruf yang mengandung arti secara baik. Sekalipun bebas melakukan hubungan seksual dengan istri, tetapi ada saat-saat dimana dilarang melakukannya. (Khotimah K, 2013)

d. Kelainan letak, misalnya sungsang, sehingga tidak ada bagian terendah yang menutupi bagian atas panggul (PAP) yang dapat menghalangi tekanan terhadap membran bagian bawah.
e. Keadaan sosial ekonomi

   Faktor lain :

f. Faktor golongan darah, akibat golongan darah ibu dan anak yang tidak sesuai dapat menimbulkan kelemahan bawaan termasuk kelemahan jaringan kuliat ketuban
g. faktor disproporsi antar kepala janin dan panggul ibu
h. Faktor multi graviditas, merokok dan perdarahan antepartum
i. Defisiensi gizi dari tembaga atau asam askorbat

5. Faktor risiko terjadinya ketuban pecah dini

Menurut (Mellisa, 2021) faktor risiko terjadinya ketuban pecah dini diantaranya :

a. Usia

Usia memiliki dampak signifikan pada gambaran histologi reproduksi manusia. Usia 20-35 tahun merupakan usia reproduksi normal ketika organ reproduksi sudah berfungsi secara optimal. Organ reproduksi wanita pada usia <20 tahun belum terlalu siap untuk hamil sehingga berisiko memengaruhi pembentukan selaput ketuban yang abnormal. Embryogenesis akan dipengaruhi ketika organ reproduksi mengalami penurunan fungsi pada usia >35 tahun. Hal ini dapat menyebabkan ketuban lebih tipis dan mudah pecah sebelum waktunya.

b. Paritas

Paritas merupakan banyaknya kelahiran hidup seorang wanita. Primipara adalah wanita yang telah melahirkan satu kali dan mencapai batas visabilitas baik janinnya hidup maupun mati saat dilahirkan. Multipara adalah wanita yang telah mengalami dua atau lebih kehamilan dan telah mencapaibatas visabilitas. Paritas tidak melihat apakah janin tersebut hidup atau mati ataupun janini tunggal atau kembar. Peningkatan paritas menyebabkan kerusakan pada serviks selama pelahiran bayi sebelumnya sehingga mengakibatkan kerusakan pada selaput ketuban.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah proses belajara sehingga terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih baik, dewasa, dan matang pada individu, kelompok dan masyarakat. Pendidikan yang tinggi membuata seseorang cenderung dapat memahami informasi dengan baik. Ibu dengan pendidikan tinggi cenderung mencari informasi mengenai kehamilan. Informasi tersebut membuat ibu menjadi lebih waspada akan faktor yang dapat memengaruhi proses kehamilan maupun melahirkan. Selain itu, ibu dapat mencegah factor risiko yang dapat membahayakan kehamilannya termasuk ketuban pecah dini.

d. Korioamnionitis

Korioamnionitis adalah keadaan ketika korion, amnion, dan cairan ketuban terinfeksi bakteri. Infeksi *klamidiagenitourinaria*pada usia gestasi 24 minggu berkaitan dengan kejadian ketuban pecah dini. Herpes simpleks dan infeksi saluran kemih merupakan infeksi yang sering terjadi pada ibu hamil. Riwayat infeksi saluran kemih merupakan predictor obstetric dan ginekologi dari ketuban pecah dini.

Dalam penelitiannya, (Aprillia, 2018) menyatakan bahwa factor risiko kejadian ketuban pecah dini yaitu :

a. Riawayat KPD sebelumnya

Wanita yang mengalami KPD pada kehamilan sebelumnya akan berisiko mengalami kembali pada kehamilan berikutnya. Hal ini

disebabkan karena menurunnya kandungan kolagen yang mengakibatkan membrane mudah rapuh sehingga memicu terjadinya ketuban pecah dini.

b. Kehamilan Ganda

Ibu yang mengalami kehamilan ganda berisiko mengalami ketuban pecah dini. Hal ini disebabkan oleh peningkatan massa plasenta dan produksi hormone yang dapat memungkinkan ketegangan rahim yang meningkat sewaktu-waktu dan dapat mengakibatkan ketuban pecah secara tiba-tiba.

6. Faktor risiko terjadinya KPD menurut (Sulastri & Enawati, 2013):

a. Persalinan letak sungsang

Sesuai dengan teori Maria (2007) yang menyatakan bahwa kehamilan akhir, janin tumbuh dengan cepat dan jumlah air ketuban relatif berkurang. Karena bokong dan kedua tungkai yang terlipat lebih besar dari pada kepala, maka bokong dipaksa untuk menempati ruangan yang lebih luas di fundus, sedangkan kepala berada dalam ruangan yang lebih kecil disegmen bawah uterus. Letak sungsang dapat memungkinkan ketegangan rahim meningkat sehingga membuat selaput ketuban pecah sebelum waktunya.

b. Preeklampsi

Manuaba (2007) menyatakan bahwa akibat preeklampsi yang utama adalah vasokontraksi arterial yang menyebabkan kenaikan tekanan darah dan menurunnya pasokan darah yang efektif pada banyak organ serta jaringan tubuh, termasuk plasenta. Plasenta dapat mengalami infark

sehingga membatasi jumlah oksigen dan nutrient yang tersedia bagi bayi. Retardasi pertumbuhan intrauteri dapat terjadi dan keadaan hipoksia dapat membuat janin tidak mampu untuk menahan stress persalinan yang normal yang dapat menyebabkan ketuban pecah dini.

c. Anemia

Pengaruh anemia terhadap kehamilan adalah KPD. Hal ini sejalan dengan teori dari Allen (2001) yang menyatakan bahwa anemia dapat menyebabkan hipoksia dan defisiensi besi sehingga dapat meningkatkan konsentrasi norepinefrin serum yang dapat menginduksi stress ibu dan janin, yang merangsang *sintesis corticotropin releasing hormone* (CRH). Konsentrasi CRH merupakan peningkatan factor risiko utama persalinan dengan ketuban pecah dini.

d. Hidramnion

Maria (2007) menyatakan bahwa hidramnion terjadi bila produksi air ketuban bertambah, bila pengaliran air ketuban terganggu, atau keduanya. Dicurigai air ketuban dibentuk dari sel-sel amnion. Ditambah oleh air seni janin dan cairan otak pada anense falus. Air ketuban yang dibentuk, secara rutin dikeluarkan dan diganti dengan yang baru. Salah satu cara pengeluaran ialaha ditelan oleh janin, diabsorpsi oleh usus kemudian dialirkan ke plasenta untuk akhirnya masuk peredaran darah ibu. Ekskresi air ketuban akan terganggu bila janin tidak bisa menelan seperti pada atresia esophagus atau tumor-tumor plasenta. Hidramnion dapat

memungkinkan ketegangan rahim meningkat, sehingga membuat selaput ketuban pecah sebelum waktunya.

7. Tanda dan gejala

Tanda yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina. Aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak, dengan ciri pucat dan bergaris warna darah. Cairan ini tidak berhenti atau kering karena terus diproduksi sampai kelahiran (Norma & Dwi, 2013).

Tanda dan gejala :

a. Keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina
b. Aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak, mungkin cairan tersebut masih merembes atau menetes dengan ciri pucat dan bergaris, warna darah.
c. Cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena terus diproduksi sampai kelahiran.
d. Demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut jantung janin bertambah cepat

8. Diagnosis

Menegakkan diagnosa KPD sangatlah penting untuk menghindari intervensi seperti melahirkan bayi terlalu awal atau melakukan sectio yang sebetulnya tidak ada indikasinya. Oleh karena itu dibutuhkan diagnosa yang cepat dan tepat.

Diagnosa KPD ditegakkan dengan cara :

a. Anamnesa

Penderita merasa basah pada vagina atau mengeluarkan cairan yang banyak secaratiba-tiba dari jalan lahir. Cairan berbau khas, perlu juga diperhatikan warnanya. Pada saat cairan keluar, his belum teratur atau belum ada dan belum ada pengeluaran lendir dan darah.

b. Inspeksi

Pengamatan dengan mata biasa akan tampak keluarnya cairan dari vagina, bila ketuban baru pecah dan jumlah air ketuban masih banyak, pmemriksaan akan lebih jelas.

c. Pemeriksaan dengan speculum

Pemeriksaan dengan spekulum pada KPD akan tampak keluar cairan dari orifisium uteri eksternum (OUE), kalau belum juga tampak keluar, fundus uteri ditekan, penderita diminta batuk, mengejan atau mengadakan manuvover valsava, atau bagian terendah digoyangkan, akan tampak keluar cairan dari ostium uteri dann terkumpul pda fornik anterior.

d. Pemeriksaan dalam

Pemeriksaan dalam didapat cairan didalam vagina dan selaput ketuban sudah tidak ada lagi. Mengenai pemariksaan dalam vagina dengan tocher perlu dipertimbangkan, pada kehamilan yang kurang bulan yang belum dalam persalinan tidakperlu diadakan pemeriksaan dalam. Karena pada waktu pemeiksaan dalam, jari pemeriksa akan mengakumulasi segmen bawah rahim dengan flora vagina yang

normal. Mikroorganisme tersebut bisa dengan cepat menjadi patogen. Pemeriksaan dalam vagina hanya dillakukan kalau KPD yang sudah dalam persalinan atau yang dilakukan innduksi persalinan dan dibatasi sedikit mungkin.

e. Pemeriksaan penunjang

1) Pemeriksaan laboratorium

a) Cairan yang keluar dari vagina perlu diperiksa : warna, konsentrasi, bau dan pH nya.

b) Cairan yang keluar dari vagina ini ada kemungkinan air ketuban, urine atau secret vagina.

c) Sekret vagina ibu hamil pH: 4-5, dengaan kertas nitrazin tidk berubah warna, tetap kuning.

d) Tes lakmus (tes nitrazin), jika kertas lakmus merah berubah menjadi biru menunjukkan adanya air ketuban (alkalis): pH aiir ketuban 7-7,5 darah dan infeksi vagina dapat menghasilkan tes yang positif palsu.

e) Mikroskopik (tes pakis), dengan meneteskan air ketubanpada gelas objek dan dibiarkan kering. Pemeriksan mikroskopik menunjukkan gambaran daun pakis.

2) Pemeriksaan ultrasonografi

a) Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk melihat jumlah cairan ketuban dalam kavum uteri.

b) Pada kasus KPD terlihat jumlah cairann ketuban yang sedikit. Namun sering terjadi kesalahan pada penderita oligohidramnion.

9. Komplikasi

a. Komplikasi paling sering terjadi pada KPD sebelum usia kehamilan37 minggu adalahsindrom distress pernapasan (RDS = Respiratory Distress Syndrome), yang terjadi pada 10-40% bayi baru lahir.

b. Resiko infeksi meningkat pada kejadian KPD.

c. Semua ibu hamil dengan KPD prematur sebaiknya dievaluasi untukKemungkinan terjadinya korioamnionitis (radang pada korion dan amnion).

d. Kejadian porlaps atau keluarnya tali pusat dapat terjadi pada KPD

e. Risiko kecacatan dan kematian janin meningkatpada KPD preterm

f. Hipoplasia paru merupakan komplikasi fatal yang terjadi pada KPDPreterm. Kejadiannya hampir mencapai 100% pada usia kehamilan kurang dari23 minggu.

10. Penatalaksanaan

Adapun penatalaksanaan ketuban pecah dini, diantaranya :

a. Tatalaksana Umum

1) Berikan eritmisin 4x500 mg selama 10 hari.

2) Rujuk ke fasilitas yang memadai.

Tatalaksana khusus

b. Di Rumah Sakit rujukan, tatalaksana sesuai dengan usiakehamilan

1) ≥34 minggu. Lakukan induksi persalinan denganoksitosin bila tidak ada kontraindikasi.

2) 24-34 minggu

a) Bilaterdapat amnionitis, abrupsio plasenta, dan kematianjanin, lakukan persalinan segera.

b) Berikan deksametason 6 mg IM tiap 12 jam selama 48 jam atau betametason 12 mg IM tiap 24 jam selama 48 jam.

c) Lakukan pemeriksaan serial untuk menilai kondisi ibu dan janin.Bayi dilahirkan di usia kehamilan 34 minggu, ataudi usia kehamilan32-33 minggu, biladapat dilakukan pemeriksaan 33 kematangan paru dan hasil menunjukkan bahwa paru sudah matang (komunikasikan dan sesuaikan dengan fasilitas perawatan bayi preterm).

3) <24 minggu

a) Pertimbangan dilakukan dengan melihat resiko ibu dan janin.

b) Lakukan konseling pada pasien. Terminasi kehamilan mungkinmenjadi pilihan.

c) Jika terjadi infeksi (korioamnionitis), lakukan tatalaksanakorioamnionitis.

Berikut ini penatalaksanaan korioamnionitis, yaitu :

(1) Tatalaksana Umum

(2) Rujuk pasien ke rumah sakit.

(3) Beri antibiotika kombinasi : ampisilin 2 g IV tiap 6 jamditambah gentamisin 5 mg/kgBB IV setiap 24 jam

(4) Terminasi kehamilan. Nilai serviks untuk menentukancara persalinan :Jika seviks matang : lakukan induksi persalinan denganoksitosin dan Jika seerviks belum matang : matangkandengan prostaglandin dan infus oksitosin atau lakukanseksio caesarea.

(5) Jika persalinan dilakukan pervaginam, hentikan antibiotika setelah persalinan. Jika persalinan dilakukan dengan seksio caesarea, lanjutkan antibiotika dan tambahkan metronidazole 500 mg IV tiap 8 jam sampai bebas demam selama 48 jam.

b) Tatalaksana Khusus

(1) Jika terdapat metritis (demam, cairan vagina berbau, berikan antibiotika.

(2) Jika bayi mengalami sepsis, lakukan pemeriksaan kultur darah dan beri antibiotika yang sesuai selama 7-10ari.

Adapun penanganan yang dapat dilakukan adalah :

(a) Konservatif

Rawat di rumah sakit, berikan antibiotic (ampisilin

4x500 mg atau eritromisin bila tidak tahan ampisilin dan

metronidazole 2x500 mg selama 7 hari). Jika umur kehamilan <32-34 minggu, dirawat selama air ketuban masihkeluar, atau sampai air ketuban tidak lagi keluar.Jika usia kehamilan 32–37 minggu, belum inpartu, tidak ada infeksi, tesbusa negatif berikan deksametason.Observasi tanda-tanda infeksi dan kesejahteraan janin.Jika usia kehamilan 32–37 minggu, sudah inpartu, tidak ada infeksi,berikan tokolitik (salbutamol), deksametason, dan induksi sesudah 24 jam.Jika usia kehamilan 32–37 minggu,ada infeksi, beri antibiotik dan lakukaninduksi, niali tanda-tanda infeksi (suhu, leokosit, tanda-tanda infeksiintrauterine).Pada usia kehamilan 32–37 minggu, berikan steroid untuk memacukematangan paru janin, dan bila memungkinkan periksa kadar lesitin danspingomielin tiap minggu. Dosis betametason 12 mg sehari dosis tunggalselama 2 hari, deksametason I.M 5 mg setiap 6 jam sebanyak 4 kali.

(b) Aktif

Kehamilan >37 minggu, induksi dengan oksitosin. Bila gagal seksiosesarea. Dapat pula diberikan

misoprostsol 25 ug–50 ug intravaginal tiap 6 jammaksimal 4 kali. Apabila ada tanda-tanda infeksi berikan antibiotik dosis tinggidan persalinan diakhiri. Bila skor pelvik <5, lakukan pematangan serviks,kemudian induksi. Jika tidak berhasil, akhiri persalinan dengan seksio caesarea.Apabila skor pelvik >5, induksi persalinan.

C. Teori manajemen kebidanan berdasarkan kasus persalinan dengan KPD

Manajemen asuhan kebidanan terdiri dari 7 langkah asuhan kebidanan yang diawali dari pengumpulan data dan diakhiri dengan evaluasi. Adapun langkah-langkah varney asuhan kebidanan yaitu :

a. Langkah I : pengumpulan data dasar

Pada langkah ini kita mengumpulkan data atau semua informasi yang akurat da lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Pengumpulan data dilakukan dengan cara anamnesa, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan da tanda-tanda vital, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan penunjang. Pada kasus KPD, data yang diperlukan untuk dikumpulkan yaitu data subjektif terdiri dari alas an ibu masuk rumahsakit. Riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan persalinan dan nifas yang lalu, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat social dan ekonomi, psikososial, spiritual,riwayat kb, serta riwayat kebutuhan dasar ibu. Selain itu data objektif yang meliputi pemeriksaan

umum ibu, pemeriksaan fisik (head to toe), pemeriksaan dalam dan pemeriksaan inspekulo. Terakhir yaitu pemeriksaan penunjang yang sangat membantu dalam menegakkan diagnosis yaitu pemeriksaan laboratorium uji kertas nitrazin atau kertas lakmus yang akan berubah warna menjadi biru gelap jika pelepasan yang keluar adalah cairan amnion, kemudian pemeriksaan ultrasonografi (USG) untuk melihat jumlah cairan yang ada didalam cavum uteri dan pemeriksaan darah untuk melihattanda-tanda infeksi yang terjadi pada ibu.

b. Langkah II : interpretasi data dasar

Pada langkah ini kita akan melakukan identifikasi terhadap diagnose atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat atas data-data yang telah dikaji dan dikumpulkan pada langkah pengumpulan data dasar. Data dasar yang telah dikumpulkan di interpretasikan agar dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik. Ruumusan diagnose dan masalah keduanya dapat digunakan karena masalah yang terjadi pada pasien dapat didefinisikan seperti diagnose tapi tidak membutuhkan penanganan. Masalah juga sering menyertai diagnose.

c. Langkah III : mengidentifiksi diagnose atau masalah potensial

Pada langkah ini kita akan mengidentifikasi masalah potensial atau diagnose potensial berdasarkan diagnose/masalah yang sudah di identifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dapat dilakukan pencegahan. Pada langkah ini kita dituntut untuk mampu mengidentifikasi masalah potensial tidak hanya merumuskan masalah

potensial yang dapat terjadi tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi penanganan agar masalah atau diagnose potensial tidak terjadi.

d. Langkah IV : mengidentifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi

Pada langkaah ini kita mengidentifikasi perlunya tindakann segera atau kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn aatau dokter umum atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien atau pasien. Kita dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah/kebutuhan klien yang dihadapi pasien. Setelah kita merumuskan tindakan untuk mengantisipasi diagnose atau masalah potensial pada langkah sebelumnya, kita juga merumuskan tindakan segera atau emergency untuk segera ditangani serta menentukan tindakan segera yang mampu dilakukan secara mandiri,kolaborasi atau bersifat rujukan. Pada kasus persalinan dengan KPD, tindakan antisipasiatau tindakan segera yang harus dilakukan adalah memberikan infus cairan larutan garam fisiologis, larutan glukosa 5-10%, induksi uterotonika dan pemberian antibiotic.

e. Langkah V : intervensi atau rencana tindakan asuhan

Perencanaan merupakan rencanan asuhan menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen untuk masalah atau diagnosis yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini informasi data tidak dilengkapi. Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosis kebidanan dan masalah potensial yang akan terjadi.

Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. Semua perencanaan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan yang meliputi pengetahuan, teori yang terbaru, evidence based care,serta divalidasi dengan asumsi mengenai apa yang diinginkan dan apa perencanaan sebaiknya pasien dilibatkan, karena pada akhirnya pengambilan keputusan untuk suatu rencana asuhan harus disetujui oleh pasien.

f. Langkah VI : pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan rencana asuhan menyeluruh dan dilakukan dengan efisien dan aman. Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah sebelumnya dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini dapat dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Dalam situasi ketika bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami komplikasi, keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagiklien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu serta menghemat biaya dan meningkatkan mutu asuhan klien. Pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

g. Langkah VII (Evaluasi)

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang telahkita berikan kepada pasien. Kita mengacu kepada beberapa pertimbangan yaitu tujuan asuhan kebidanan efektifitas tindakan untuk mengatasi masalah dan hasil asuhan. Hasil yang diharapkan dari manajemen kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD adalah dapat dilakukan partus secara spontan,komplikasi akibat tindakan medic dapat diatasi serta ibu dan janin dalam keadaan baik dan sehat. Evaluasi dilakukan secara siklus dan dengan mengkaji ulang aspek asuhan yang tidak efektif untuk mengetahui factor mana yang menguntungkan atau menghambat keberhasilan asuhan yang diberikan.

D. Asuhan Kebidanan Dalam Bentuk Soap

1. S : Subjektif

   Data dari pasien didapat dari anamnesa yang merupakan langkah 1 varney

   a. Anamnesa

      Ibu mengatakan adanya pengeluaran air pervaginam, air yang keluar sedikit demi sedikit hingga sarung basah. Ibu belum merasa adanya sakit perut tembus belakang dan belum merasa mules.

   b. Riwayat menstruasi

   c. Riwayat kehamilan sekarang

2. O : Objektif

   Hasil pemeriksaan diagnostic dan pendukung lain untuk mendukung asuhan

   a. Keadaan umum ibu

b. Kesadaran ibu

c. Pemeriksaan head to toe

d. Pemeriksaan dalam

e. Pemeriksaan penunjang, dilakukan pemeriksaan kertas lakmus yang akan berubah menjadi biru

3. A : Assesment

Kesimpulan apa yang dibuat dari data subjektif dan ojektif tersebut merupakan langkah II, III, IV varney

4. P : Planning (Penatalaksanaan)

Menggambarkan pelaksanaan dari tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment langkah V, IV, VII varney

BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY"A" GESTASI 39-40 MINGGU DENGAN KETUBAN PECAH DINI (KPD) DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR TANGGAL 29 JUNI 2022

KALA I

Nomor register	: 106xxx	
Tanggal masuk rumah sakit	: 29juni 2022	jam : 10.10 wita
Tanggal pengkajian	: 29juni 2022	jam : 10.10 wita
Tanggal partus	: 29juni 2022	jam : 16.55 wita
Nama pengkaji	: Sitti Aisyah	

A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas isteri/suami

Nama	: Ny A / Tn R
Umur	: 19 Th / 28 Th
Nikah / Lamanya	: 1 Kali/ ±2 Tahun
Suku	: Makassar/ Makassar
Agama	: Islam/ Islam
Pendidikan	: Smp/ Smp
Pekerjaan	: Irt/ Swasta
Alamat	: Jl. Sunu

2. Anamnesa (data subjektif)

a. Riwayat kehamilan yang sekarang

1. Ibu mengatakan ini kehamilan yang pertama dan tidak pernah keguguran
2. Hari pertama haid terakhir tanggal 25 September 2021
3. Hari tafsiran persalinan tanggal 01 Juli 2022
4. Gestasi 39 minggu 5 hari
5. Menurut ibu usia kehamilannya ± 9 bulan
6. Ibu megatakan pergerakan janinnya kuat dirasakan pada bagian perut sebelah kanan
7. Ibu memeriksakan kehamilannya 7 kali di Puskesmas

   Trimester I : 2 kali

   Trimester II : 2 kali

   Trimester III : 2 kali
8. Ibu mendapatkan suntikan imunisasi tetanus toxoid (TT) sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 1 Februari 2022
9. Keluhan – Keluhan

   Trimester I : tidak ada keluhan

   Trimester II : tidak ada keluhan

   Trimester III : sering kencing dan nyeri perut bagian bawah

b. Keluhan utama

Ibu adalah rujukan dari puskesmas Ujung pandang Baru dengan keluhan ada keluar cairan berwarna jernih

c. Riwayat keluhan utama

Ibu masuk dengan keluhan ada keluar cairan berwarna jernih pada tanggal 29 juni 2022 (±3jam sebelum sampai ke rumah sakit) satu sarung basah akibat cairan yang keluar, ibu tidak merasakan mules atau nyeri perut tembus belakang. Riwayat pemeriksaan di puskesmas yaitu his /kontraksi tidak ada, pembukaan 1 cm, dan riwayat pemeriksaan kertas lakmus di puskesmas positif yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru yang menandakan air ketuban.

d. Riwayat menstruasi

1) Menarche : 14 tahun

2)Siklus : 28-30 hari

3) Lamanya : 5-7 hari

4) Banyaknya : 2-3 kali ganti pembalut setiap hari

5) Teratur/tidak teratur : Teratur

6) Sifat darah : Encer

7) Disminore : Tidak ada

e. Riwayat Perkawinan

Ibu menikah 1 kali dengan Tn “R” pada tahun 2020, saat Ny “A” berusia 17 tahun dan tuan Tn “R” berusia 26 tahun.

h. Riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu

1) Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes mellitus, asma, dan hipertensi.

2) Tidak ada riwayat penyakit menular: tuberculosis, malaria, hipertensi, dan

penyakit menular seksual.

3) Tidak ada riwayat alergi makanan maupun obat-obatan.

4) Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah di opname di rumah sakit maupun di puskesmas.

i. Riwayat penyakit keluarga

Di dalam keluarga tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes militus, asma, dan penyakit keturunan lainnya.

j. Riwayat sosial ekonomi, psikososial dan spiritual

1) Yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga adalah suami.

2) Hubungan ibu dan suami, keluarga maupun tetangga baik.

3) Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami.

4) Ibu rajin beribadah dan berdoa untuk kelancaran persalinannya.

k. Riwayat kb

Ibu tidak pernah menjadi akseptor kb sebelumnya.

l. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1) Riwayat nutrisi

Kebiasaan:

a) Pola makan : nasi, sayur, lauk

b) Frekuensi : 3 kali sehari

c) Kebutuhan minum : 6-8 gelas per hari

Selama inpartu:

a) Ibu makan, tetap hanya sedikit dan lebih banyak minum

2) Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan:

a) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau omniak.

b) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning.

Selama inpartu :

a) BAK : ibu BAK di tempat tidur karena telah terpasang popok.

b) BAB : ibu belum BAB (ibu terakhir BAB jam 06.00 WITA).

3) Personal Hygine

Kebiasaan :

a) Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabunmandi.

b) Sikat gigi : 2 kali sehari (setelah makan dan sebelum tidur) denganmenggunakan pasta gigi.

c) Keramas : 3 kali seminggu menggunakan shampoo

d) Ganti pakaian : 2 kali sehari

Selama inpartu :

a) Ibu belum mandi dan sikat gigi

4) Kebutuhan istirahat dan tidur

Kebiasaan:

a) Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

Selama inpartu:

a) Ibu tidak pernah tidur

3. Pemeriksaan Fisik (Data Objektif)

a. Pemeriksaan Umum

1) Keadaan umum ibu baik

2) Kesadaran Composmentis

3) Hari tafsiran persalinan tanggal 01 Juli 2022

4) Usia gestasi 39 minggu 5 hari

5) Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 120/80 mmHg

Suhu :36,8°C

Nadi : 80x/i

Pernapasan : 20x/i

6) Tinggi badan : 154 cm

7) Berat badan sebelum hamil : 45 kg

8) Berat badan sekarang : 56 kg

9) Lingkar lengan atas (lila) : 23 cm

b. Pemeriksaan Fisik (*Headto Toe*)

1) Kepala

Inspeksi : kepala bersih, tidak ada ketombe, rambut hitam dan lurus

Palpasi : tidak ada massa, tidak mudah rontok, dan tidak ada nyeri tekan

2) Wajah

Inspeksi : tidak pucat, tidak ada oedema pada wajah, ekspresi wajah tampak meringis setiap kali bergerak.

3) Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, kelopak mata tidak bengkak, konjungtiva merah muda, sklera putih (tidak ikterus)

4) Hidung

Inspeksi : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran secret.

Palpasi : tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak tampak adanya polip.

5) Mulut dan gigi

Inspeksi : bersih, bibir merah muda dan tidak pecah-pecah, tidak ada caries, tidak ada gigi yang tanggal, tidak ada stomatitis dan gusi tidak berdarah.

6) Telinga

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen dan peradangan.

Palpasi : tidak ada benjolan, tdak ada nyeri tekan.

7) Leher

Inspeksi : tidak ada kelainan

Palpasi : tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tyroid, kelenjar limfe dan vena jugularis.

8) Payudara

Inspeksi : payudara simetriks kiri dan kanan, putting susu menonjol, tampak hyperpigmentasi areola mammae.

Palpasi : tidak teraba adanya massa, kolostrum ada saat di pencet, tidak ada nyeri tekan.

9) Abdomen

Inspeksi : Nampak pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, nampak striae livide dan linea nigra, tidak ada bekas luka operasi.

Palpasi :Leopold I : 2 jrbpx, 30cm, bokong

Leopold II : Puka

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP 5/5

Lingkar perut : 98 cm

Tafsiran berat janin : 98x30 = 2.940 gram

Denyut jantung janin : denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132 Kali per menit.

His : 1x10 menit durasi 5-10 detik

10) Genetalia

Inspeksi : tidak ada kelainan, tidak ada *varices*, Nampak pelepasan lendir bercampur dengan air ketuban.

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada oedema, dan tidak ada nyeri tekan.

11) Anus

Inspeksi : tidak ada hemoroid

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan

12) Ekstrimitas atas dan bawah

Inspeksi : pergerakan aktif, tidak ada varices

Palpasi : tidak ada oedema

c. Pemeriksaan Dalam

Vaginal toucher (VT) tanggal: jam: 10.10 WITA

1) Vulva Dan Vagina : Normal

2) Portio : Tebal

3) Pembukaan : 1 cm

4) Air Ketuban` : Jernih

5) Presentase : Ubun-Ubun Kecil Lintang

6) Penurunan : Hodge I

7) Penumbungan : Tdak Ada

8) Molase : Tidak Ada

9) Kesan Panggul : Normal

10) Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban

d. Pemeriksaan *valsava*

Tanggal 18 juli 2018, jam10.15 WITA

Hasil pemeriksaan terdapat pengeluaran air ketuban dengan merembes.

e. Pemeriksaan laboratorium (sampel darah)

a) WBC : 9.4 x 103 /µL

b) RBC : 4.43 x 106 µL

c) HGB : 11.09 g/dl

d) HCT : 34,7%

e) MCV : 78.3fL

f) MCH : 24.8 pg

g) MCHC : 31.7g/dl

h) Hbsag : Negatif (-)

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

GIP0A0, gestasi 39 minggu 5 hari, intrauterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I fase aktif dengan KPD

1. **GIP0A0**

Dasar Data subjektif : Ibu mengatakan ini adalah kehamilan yang pertama

dan belum pernah keguguran

Data objektif : Nampak linea nigra, striae livide,

pada saat palpasi terababagian-bagianjanin yaitu

Leopold I : 2 jrbpx, 30cm, bokong

Leopold II : Puka

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP 5/5

Lingkar perut : 98 cm

Tafsiran berat janin : 98x30 = 2.940 gram

Denyut jantung janin : denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas,

kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu denganfrekuensi 132 Kali per menit.

Analisa dan interpretasi data :

Pada pemeriksaan kulitperut, tampakadanya linea nigra dan striaelivide yangmenandakankehamilan pertama, terdapatdenyut jantungjanin dan teraba bagian-bagian janin padasaat palpasi merupakan salahsatu tandapasti kehamilan(prawirohardjo,2014:179).

2. Gestasi 39 minggu 5 hari

Dasar Data subjektif : hari pertama haid terakhir tanggal 25 September 2021

Data objektif : palpasi abdomen

Leopold I : 2 jrbpx, 30cm, bokong

Leopold II : Puka

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP 5/5

Lingkar perut : 98 cm

Tafsiran berat janin : 98x30 = 2.940 gram

Denyut jantung janin : denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas,

kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan

frekuensi 132 Kali per menit.

Dan hari tafsiran

persalinan tanggal 01 Juli 2022 berdasarkan

rumus Neegle.

Analisa dan interpretasi data :

Dari hasil pemeriksaan dilihat denganmenggunakan rumus Neegle, mulai dariharipertama haid terakhir tanggal 25 September 2022 sampai tanggal pengkajian,maka umur kehamilan ..minggu,,hari(prawirohardjo, 2014:279).

3. Intrauterine

Dasar Data subjektif : ibu merasakan janinnya bergerak dengan kuat dan ibu tidak penah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilannya.

Data objektif : ibu tidakmerasakan nyeri ketika di palpasi, TFU sesuaiumur kehamilan, pada palpasi leopold teraba bagian-bagian kecil pada janin.

Analisis dan interpretasi data :

Pembesaran perut sesuai usia kehamilan,janin dapat diraba saat palpasi serta tidakada nyeri perut yang hebat dan tidak adanyeri tekan, hal ni menandakan kehamilanibu intrauterin (prawirohardjo,2010).

4. Tunggal

Dasar

Data subjektif : ibu mengatakan pergerakan janin lebih sering di sebelah kiri perut ibu

Data objektif : palpasi abdomen

Leopold I : 2 Jrbpx, 30 cm, bokong

Leopold II : PUKA

Leopold III : Kepala

LeopoldIV : BDP 5/5

DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran bawah bawa perut ibu dengan frekuensi 132 kali permenit.

Analisis interpretasi data :

Pembesaran perut sesuai usia kehamilan dan pergerakan janin hanya pada satu tempat dan auskultasi DJJ terdengar pada kuadran kanan bawah perut ibu. Ini menandakan kehamilan tunggal (Manuaba,2008).

5. Hidup

Dasar

Data subjektif : Ibu merasakan pergerakan janinnya 12 kalidalam sehari

Data subjektif : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132 kali permenit.

Analisis dan interpretasi data :

Adanya gerakan janin dan DJJ, merupakan tanda bahwa janin hidup, janin dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, selain itu tanda hidup juga dapat dilhat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (prawirohardjo, 2014: 285).

6. Keadaan ibu dan janin baik

Dasar

Data subjektif : Tidak ada keluhan-keluhan lain dan kecemasan yang dirasakan ibu selama kehamilan, ibu merasakan pergerakanjanin kuat dan biasanya bergerak 12 kali dalam sehari.

Data objektif : Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, DJJ terdengar jelas, kuatdan teratur pada kuaran kanan perut bawah ibu denganfrekuensi 132 kali per menit dan pemeriksaan *head to toe* kongjungtiva merah muda, wajah dan tungkai tidakoedema, hemoglobin 11,2 gr/dl menandakan ibu tidakanemi.

Analisis dan interpretasi data :

Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal dan DJJ yang teratur dan berada dalam batas normal yang menandakan keadaan ibu dan janin baik, kongjungtiva merah muda hemoglobin normal.(Pantiawati dan Saryono, 2010:122).

7. Inpartu kala I fase laten dengan KPD

Dasar

Data subjektif : Ibu mengatakan adanya pengeluaran air hingga satu sarung basah.

Data objektif : Pengeluaran air pervaginam yang berwarna jernih, ada*verniks*

caseosa dan berbau amis, belum ada kontraksi. Selain itu, adapun hasil pemeriksaan lainnya, antara lain:

a. Hasil pemeriksaan dalam jam: 10.10 wita

1) Vulva Dan Vagina : Normal
2) Portio : Tebal
3) Pembukaan : 1 cm
4) Ketuban : Jernih
5) Presentasi : -
6) Penurunan : Hodge 1
7) Molase : Tidak Ada
8) Penumbungan : Tidak Ada
9) Kesan Panggul : Normal
10) Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban

b. Hasil pemeriksaan tes *valsava* yaitu terdapat pengeluaran air ketuban dengan merembes.

Analisa dan interpretasi data :

a. Adanya pengeluaran air pervaginam, jernih, dan terdapat verniks caseosadengan bau amis yang menandakan telah terjadi pelepasan air ketuban (Fadhlun,2011:114).
b. Pemeriksaan tes valsava membuktikan bahwa terdapat pengeluaran air ketuban (Fadhlun, 2011: 114).

c. KPD adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya, dimana padaprimipara pembukaan serviks kurang 3 cm, dan pada multipara kurang dari 5 cm (Sepduwiana,2011:144).
d. Dilatasi servik 1-3 cm merupakan fase laten (Aisyah dan Oktarina, 2012:2).

C. LANGKAH : III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAHPOTENSIAL

Masalah potensial yang akan terjadi yaitu:

1. Pada ibu, yaitu komplikasi yang bisa disebabkan KPD pada ibu yaitu*intrapartal* dalam persalinan, infeksi puerparalis/masa nifas, partus lama, pendarahan post partum, meningkatkan tindakan operatif obstetric (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal.
2. Pada janin, yaitu prematuritas (sindrom distress pernafasan, hipotermia,masalah pemberian makan pada neonatal, perdarahan intraventikuler, gangguan otak, dan resiko cerebral palsy, anemia, skor APGAR rendah, *ensefelopati*,*cerebral palsy*, perdarahan intracranial,gagal ginjal, *distress* pernafasan). Dan oligohidromnion (sindrom defornits janin, hipolapsia paru, deformitas ekstrimitas dan pertumbuhan janin terhembat), morbiditas dan mortalitas perinatal.

Data subjektif : ibu mengatakan terdapat pengeluaran air pervaginam hingga satu sarung basah.

Data onjektif : tampak pengeluaran air dari pervaginam, warna jernih, ada verniks caseosa dan bau amis.

Analisa dan interpretasi data :

a. KPD menyebabkan hubungan langsung antara luar dan ruang rahim, sehingga memudahkan terjadinya infeksi pada jalan lahir (Nugroho,2011:2).

b. KPD memberi pengaruh/ komplikasi kepada ibu dan janin yaitu pada ibupotensial terjadinya infeksi intraparta/dalam persalinan, infeksi puerpalis/masa nifas, dry labour/partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan operatif obstetric(khususnya SC), morbiditas dan mortalitas (Marni dkk, 2016:105-106).

Masalah potensial yang akan terjadi pada janin yaitu prematuritas (sindrom distress pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan pada neonatal, perdarahan intraventikuler, gangguan otak, dan resiko cerebral palsy, anemia, skor APGAR rendah, ensefelopati,cerebral palsy, perdarahan intracranial,gagal ginjal, distress pernafasan). Dan oligohidromnion (sindrom defornits janin, hipolapsia paru, deformitas ekstrimitas dan pertumbuhan janin terhembat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marni dkk,2016:105- 106).

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

KOLABORASI

Kolaborasi dengan dokter:

1. Pemasangan infus RL 28 tetes per menit

Rasional : membantu mengganti cairan ibu yang hilang selama proses persalinan

2. Pemasangan Misoprostol 1/8 tab pervaginam

   Rasional : untuk pematangan serviks dan membantu kotraksi uterus.

3. Injeksi Cefotaxime 1 gr/IV

   Rasional : mencegah resiko terjadinya infeksi

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Masalah aktual : KPD
2. Masalah potensial :Potensial terjadi kepada ibu yaitu potensialterjadinyainfeksi intraparta/dalam persalinan, infeksi puerpalis/masa nifas, dry labour/partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan operatif *obstetric*(khususnya SC), morbiditas dan mortalitas. Masalah potensial terjadi pada janin yaitu prematuritas (sindrom *distress* pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan pada neonatal, perdarahan intraventikuler, gangguan otak, dan resiko *cerebral palsy*, anemia, skor APGAR rendah, ensefelopati,perdarahan *intracranial*,gagal ginjal, distress pernafasan), dan *oligohidromnion* (*sindrom defornits* janin, hipolapsia paru, deformitas ekstrimitas dan

pertumbuhan janin terhembat), morbiditas dan mortalitas perinatal.

3. Tujuan :

a. Persalinan dapat berlangsung normal, keadaan ibu dan janin baik.

b. Mencegah terjadinya masalah potensial.

4. Kriteria :

a. Kala Iprimipara tidak lebih dari18 jam.

b. DJJ dalam batas normal (120-160 kali per menit).

c. Tanda-tanda vital dalam batas normal

1) Tekanan darah

a) Systole 100-120 mmHg

b) Diastole 60-90 mmHg

2) Suhu normal 36,5oC-37,5oC

3) Nadi normal 60-100x/menit

d. Keadaan ibu dan janin baik.

5. Rencana tindakan

a. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga

Rasional : agar ibu dan keluarga memahami tentang keadaan ibumemberidukungan yang dapat mengurangi kecemasan dan siap menghadapi persalinan.

b. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam(kecuali nadi setiap 30 meit)

Rasional : observasi tanda-tanda vital memantau keadaan ibu sepertimemantau terjadinya demam yang merupakan tanda-tanda

terjadinya infeksi pada ibu sehingga mempermudah melakukan tindakan.

c. Observasi DJJ setiap 30 menit

Rasional : Saat ada kontraksi , DJJ bisa berubah sesaat hingga apabilaada perubahan dapat diketahui dengan cepat dan dapat bertindak secara cepat dan tepat.

d. Observasi vaginal toucher (VT) kontrol tiap 2jam/4jam, atau jika ada indikasi

Rasional : Untuk memantau kemajuan persalinan

e. Observasi His setiap 30 menit

Rasional : Karena kekuatan kontraksi uterus dapat berubah setiap saatsehingga mempengaruhi penurunan kepala.

f. Ajarkan teknik relaksasi dan pengaturan napas pada saat kontraksi, menganjurkan ibu menarik napas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut seperti sedang meniup-niup selama timbul kontraksi.

Rasional : Untuk mengurangi rasa sakit akibat kontraksi.

g. Anjurkan pengosongan kandung kemih sesering mungkin

Rasional :

1) Kandung kemih yang penuh dapat mempengaruhikontraksi, mencegah penekanan pada vena cafa inferior oleh uterus yang membesar.

2) Menghalangi penurunan kepala bayi dan memberi perasaan tidak nyaman pada ibu.

h. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatalkasanaan pemberian infus RL 28 tetes per menit, misoprostol 1/8 tab pervaginam dan antibiotik cefotaxime 1 gram/IV sesuai intruksi dokter.

   Rasional : pemberian infus membantu untuk mengganti cairan ibu yanghilang selama proses persalinan, pemasangan Misoprostol dapat membantu pematangan serviks/ dilatasi seviks serta pemberian antibiotic dapat mencegah terjadinya infeksi.

i. Memberi intake minum dan makan pada ibu

   Rasional : Agar ibu memiliki tenaga pada saat meneran.

j. Menganjurkan ibu untuk selalu berdoa untuk kelancaran persalinan dan juga untuk kesehatan dan keselamatan ibu dan janin.

   Rasional : Agar ibu senantiasa berserah diri dan bertawakkal kepada sangpencipta.

k. Dokumentasikan hasil pemantauan kala I dalam partograf

   Rasional : Merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanandan memudahkan pengambilan keputusan klinik.

F. LANGKAH VI : PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 29 Juni 2022 Pukul 10.10 WITA

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga
2. Mengobservasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit), DJJ dan His tiap 1 jam pada kala 1 fase laten dan tiap 30 menit pada kala 1 fase aktif, kecuali jika ada indikasi dilakukan tiap 30 menit.

Waktu	Nadi	Suhu	Tekanan Darah	Djj	His
11.10	84x/i	36,8°C	120/80 mmHg	132x/i	1x10 menit durasi 10-15 detik
12.10	82x/i		120/80 mmHg	138x/i	2x10 menit durasi 15-20 detik
13.10	78x/i	36,7°C	120/80 mmHg	135x/i	2x10 menit durasi 20-25 detik

Sumber Data : sekunder

3. Mengobservasi vaginal toucher (VT)

   Tanggal 29 Juli 2022, jam 13.10 WITA

   a. Vulva Dan Vagina : Normal

   b. Portio : Tipis

   c. Pembukaan : 5 Cm

   d. Ketuban : Jernih (Merembes)

   e. Presentasi : Ubun-Ubun Kecil Kanan Lintang

   f. Penurunan : Hodge II

   g. Molase : Tidak Ada

   h. Penumbungan : Tidak Ada

   i. Kesan Panggul : Normal

   j. Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban

4. Melanjutkan pemantauan tanda-tanda vital setiap 4 jam(kecuali ada nadi setiap 30 menit), DJJ dan His

Waktu	Nadi	Suhu	Tekanan Darah	Djj	His
13.40	80x/i	36,8°C	120/80 mmHg	130x/i	3x10 menit durasi 20-25 detik
14.10	80x/i			130x/i	4x10 menit durasi 25-30 detik

14.40	78x/i			132x/i	4x10 menit durasi 30-35 detik
15.10	80x/i			138x/i	4x10 menit durasi 30-35 detik
15.40	82x/i			138x/i	4x10 menit durasi 35-40 detik
16.10	84x/i			138x/i	5x10 menit durasi 40-45 detik
16.40	80x/i	36,8°C	120/80 mmHg	139x/i	5x10 menit durasi 50-55 detik

Sumber Data : Sekunder

5. Mengobservasi vaginal toucher (VT) kontrol

   Tanggal 29 Juni 2022, jam 16.40 WITA

   a. Vulva Dan Vagina : Normal

   b. Porti : Melesap

   c. Pembukaan : 10 Cm(Lengkap)

   d. Ketuban : Jernih (Merembes)

   e. Presentasi : Ubun-Ubun Depan

   f. Penurunan : Hodge IV

   g. Molase : Tidak Ada

   h. Penumbungan : Tidak Ada

   i. Kesan Panggul : Normal

   j. Pelepasan : Lendir,Darah Dan Air Ketuban

6. Mengajarkan kepada ibu teknik relaksasi yaitu menarik napas melalui hidung danhembuskan melalui mulut seperti sedang menip-niup.

7. Menganjurkan kepada ibu ntuk mengosongkan kandung kemih sesering mungkin

8. Memberi makan dan minum jika tidak ada his

Sesuai dengan firman Allah swt, dalam qur'an surah Maryam ayat 25-26 :

وَهُزِّيٓ إِلَيۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ تُسَٰقِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبٗا جَنِيّٗا ٢٥ فَكُلِي وَٱشۡرَبِي وَقَرِّي
عَيۡنٗاۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدٗا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمَٰنِ صَوۡمٗا فَلَنۡ أُكَلِّمَ
ٱلۡيَوۡمَ إِنسِيّٗا ٢٦

Terjemahnya :

Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini"

9. Menganjurkan kepada ibu dan keluarga untuk berdoa untuk kelancaran

persalinan dan kesehatan untuk ibu dan bayinya

11. Mencatat dalam partograf.

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 29 Juni 2022 jam: 16.40 WITA

1. Keadaan ibu dan janin baik yang di tandai dengan:

a. Tanda-tanda vital dalam batas normal

1) Tekanan darah : 120/80 mmHg

2) Suhu : 36,7°C(axilla)

3) Nadi : 80 kali per menit

4) Pernapasan : 20 kali per menit

b. DJJ 132kali per menit terdengar jelas, kuat dan teratur

2. Kala 1 fase aktif berlangsung ditandai dengan:

a. His yang adekuat 5x10 kali dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik

b. Pembukaan lengkap (10 cm) ± 6 jam setelah vaginal toucher (VT) pertama dan penurunan kepala hodge IV

c. Tidak ada tanda-tanda infeksi

d. Mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan

KALA II

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data subjektif : Sakitnya bertambah kuat dan tembus belakang, bu merasa ingin

BAB, adanya dorongan kuat ntuk meeran serta adanya tekanan

pada anus.

Data objektif : Perineum menonjol, vulva dan vagina membuka, kontraksiuterus

baik 5 kali dalam 10 menit durasi 50-55 detik, penurunankepala 0/5, pembukaan 10 cm (lengkap), 71 penurunan hodge IVdan pelepasan lendir, darah dan air ketuban.

Hasil pemeriksaandalam, jam 16.40 WITA

1. Vulva Dan Vagina : Normal
2. Portio : Melesap
3. Pembukaan : 10 Cm(Lengkap)
4. Ketuban : Jernih (Merembes)

5. Presentasi : Ubun-Ubun Depan

6. Penurunan : Hodge IV

7. Molase : Tidak Ada

8. Penumbungan :Tdak Ada

9. Kesan Panggul : Normal

10. Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban

B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : Perlangsungan kala II

Masalah aktual : Nyeri akibat kontraksi

Data subjektif : Ada penekanan pada anus, ada dorongan kuat untuk meneran,sakitnya sering dan bertambah sakit.

Data objektif : Perineum menonjol, vulva dan vagina membuka, kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik, penurunan kepala hodge 0/5, pembukaan 10 cm (lengkap), penurunan hodge IV dan pelepasan lendir, darah dan air ketuban.

Analisa dan intepretasi data :

Nyeri merupakan hal yang fisiologis yang di rasakan ibu akibat adanya kontraksi yang justru akan mempercepat prosespersalinan, tekana hebat pada dasar panggul dan bagian terendah janin, akan mempermudah penurunan kepala, kontraksi yang timbul disertai ibu mengedan yang berlangsung secara refleksi, tekanan hebat pada dasarpanggul dan bagian terendah janin, akan

mempermudah penurunan kepala, kontraksi yang timbul disertai ibu mengedan yang berlangsung secara refleksi (kuswanti dan melina, 2014:13).

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data penunjang.

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

Tidak ada data penunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

Diagnosa : Perlangsungan Kala II

Masalah Aktual : Tidak Ada Indiksi

Masalah Potensial : Tidak Ada Data Penunjang

Tujuan : 1. Kala II berlangsung normal

2. Bayi lahir normal tanpa ada penyulit

Kriteria : 1. Kala II berlangsung ±15 menit tanpa ada penyulit

2. Bayi lahir spontan, segera menangis, bernafas tanpa ada kesulitan dan bergerak denga aktif.

Rencana tindakan

Tanggal29 Juni 2022, Pukul16.40 WITA

1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala II(dorongan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).

   Rasional : untuk mengetahui apakah sudah dapat dilakukan pimpinan meneran

2. Memeriksabak partus

   Rasional : untuk mengetahui kelengkapan alat persalinan

3. Memakai celemek

   Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir

   Rasional : mencegah dari infeksi

5. Menggunakan handscoon steril pada satu tangan untuk melakukan pemeriksaan dalam

   Rasional : mencegah terjadinya infeksi

6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang menggunakan sarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kedalam bak partus set

   Rasional : mempersiapkan alat dalam keadaan siap pakai

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah di basahi oleh air disenfeksi tingkat tinggi dengan gerakan vulva ke perineum

   Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah lengkap

   Rasional : untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan

9. Mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan dalam larutan klorin 0,5% dan membuka secara terbalik dan merendam sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%

   Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

10. Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin (DJJ) dalam batas normal (120 – 160 per menit).

    Rasional : untuk mengetahui keadaan janin.

11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.

    Rasional : agar ibu tidak khwatir dengan keadaan bayinya dan mempersiapkan diri dalam proses persalinan

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman.

    Rasional : dapat membantu memperlancar proses persalinan

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.

    Rasional : memperlancar proses berlangsungnya persalinan

14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

    Rasional : untuk mempercepat penurunan kepala

15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.

    Rasional : untuk mengeringkan tubuh bayi

16. Meletakan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu atau gunakan underpad.

    Rasional : sebagai alas untuk menyokong perineum

17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan

    Rasional : mempersiapkan alat dalam keadaan siap pakai

18. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada kedua tangan.

    Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, kita melakukan perasat stenan (perasat untuk melindungi perineum dengan satu tangan, di bawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang agar posisi tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan bagina).

    Rasional : dengan menyokong yang baik, akan mengurangi trauma dan mecegah terjadinya rupture perineum.

20. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin

    Rasional : membersihkan jalan nafas dari air ketuban dan lilitan tali pusat yang dapat menyebabkan asfiksia dan kematian janin

21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

    Rasional : menghilankan torsi pada leher akibat putaran paksi luar

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara bipariental dan menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

    Rasional : membantu mengeluarkan bayi agar tidak terjadi robekan perineum

23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

    Rasional : membantu mengeluarkan bayi secara keseluruhan dan mencegah agar bayi tidak jatuh.

24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung kearah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)

    Rasional : membantu mengeluarkan bayi secara keseluruhan dan mencegah agar bayi tidak jatuh

25. Melakukan penilaian sepintas :

    a. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?

       Rasional : untuk mengetahui apakah bayi ada penyulit atau tidak

    b. Apakah bayi bergerak aktif ?

       Rasional : untuk mengetahui apakah bayi ada penyulit atau tidak

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/ kain yang kering. Membiarkan bayi di atas perut ibu.

    Rasional : mencegah agar bayi tidak mengalami hipotermi

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 29 Juni 2022, Pukul 16.40 WITA

1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua (dorangan kuat untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).

   Hasil : Telah dilakukan

2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkanampul oksitosin dan memasukan alat suntik sekali pakai 3 ml ke dalam wadah partus set.

   Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pertolongan persalinan yaitu:

   a. Partus set

      Partus set terdiri atas 2 klem kocher, ½ kocher, 1½ handscoon steril, kateter nelaton, penjepit tali pusat, kasaa steril, spoit 3 cc dan gunting tali pusat.

   b. Hecting set

      Hecting set terdiri atas nelvuder, catgut, jarum, pinset anatomi, pinset sirurgi, dan gunting benang

   c. Obat dan bahan

Obat dan bahan terdiri atas cairan infus, oksitosin, lidokain, salep mata, vitamin K, hepatitis B dan betadin.

d. Diluar partus set

Adapun yang harus disiapkan diluar partus set yaitu air desinfeksi tingkat tinggi dan kapas desinfeksi tingkat tinggi, larutan klorin 0,5%, tempat sampah, delee, lenek, perlak, handuk kering, tensimeter, stetoskop dan termometer.

e. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri terdiri dari topi, masker, kacamata, celemek, handscoon, alas kaki tertutup/ sepatu boot

Hasil : Alat dan bahan lengkap

3. Memakai celemek plastik.

Hasil : celemek terpasang

4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Hasil : perhiasan telah dilepas dan tangan sudah bersih

5. Menggunakan sarung tangan steril pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.

Hasil : sarung tangan telah terpasang

6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus set.

Hasil : spoit telah diisi dengan oksitosin

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi

oleh air matang desinfeksi tingkat tinggi dengan gerakan vulva keperineum.

Hasil : vulva dan perineum terlah dibersihkan

8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.

   a. Vulva Dan Vagina : Normal

   b. Portio : Melesap

   c. Pembukaan : 10 cm(Lengkap)

   d. Ketuban : Jernih (Merembes)

   e. Presentasi : Ubun-Ubun Depan

   f. Penurunan : Hodge IV

   g. Molase : Tidak Ada

   h. Penumbungan : Tidak Ada

   i. Kesan Panggul : Normal

   j. Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban

9. Mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.

   Hasil : sarung tangan dilepas secara terbalik dan direndan dalam clorin 0,5%

10. Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin (DJJ) dalam batas normal (120 – 160 x/menit).

    Hasil : Djj 134 x/menit

11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.

    Hasil : Ibu mengerti dan bersedia meneran jika ada his
12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman).

    Hasil : keluarga bersedia
13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.

    Hasil : Pimpinan meneran dilakukan saat ada dorongan
14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

    Hasil : ibu bersedia
15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.

    Hasil : handuk bersih telah diletakkan diatas perut ibu
16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu atau gunakan underpad.

    Hasil : kain bersih telah terpasang dibawah bokong ibu
17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan.

Hasil : alat dan bahan lengkap

18. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan.

    Hasil : sarung tangan telah terpasang

19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Setelah itu kita melakukan perasat stenan (perasat untuk melindungi perineum dengan satu tangan, dibawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum).

    Hasil : Kepala telah lahir

20. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin.7u Hasil : terlaksana

    Hasil : tidak terjadi lilitan tali pusat

21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

    Hasil : kepala bayi telah melakukan putaran paksi luar

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental, menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di

bawah arkus pubis dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

Hasil : kedua bahu telah lahir

23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

    Hasil : lengan dan badan telah lahir

24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung kearah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin).

    Hasil : seluruh badan telah lahir

25. Melakukan penilaian selintas :

    a. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?

    b. Apakah bayi bergerak aktif ?

    Hasil : bayi lahir spontan tanggal 29 Juni 2022, pukul 16.55 WITA, segera menangis, bergerak aktif, pernapasan normal dan APGAR score 8/10

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/ kain yang kering serta membiarkan bayi di atas perut ibu.

    Hasil : ibu telah diselimuti dengan handuk bersih dan kering, serta bayi telah berada diatas perut ibu

G. LANGKAH VII : EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 29 Juni 2022, Jam: 16.55 WITA

1. Kala II berlangsung normal tanpa ada penyulit
2. Bayi lahir spontan tanggal 29 Juni 2022, jam 16.55 WITA, menangis kuat dan bernapas tanpa ada bantuan, bayi bergerak aktif, dan APGAR score 8/10.
3. Perdarahan ± 150cc
4. Terjadi rupture tingkat II

KALA III

A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data subjektif : Ibu lelah setelah melahirkan dan merasakan nyeri perut bagian bawah.

Data objektif : Bayi lahir spontan pada tanggal 29 Juni 2022, jam: 16.55 WITA. kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar),tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan tali pusat nampak di depan vulva.

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Perlangsungan kala III

Data subjektif : Ibu nyeri perut bagian bawah, ibu senang dengan kelahiran bayinya.

Data objektif : Bayi lahir spontan tanggal 29 Juni 2022, jam: 16.55 WITA, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), tinggi fundus 84 uteri setinggi pusat, dan tali pusat masih tampak di depan vulva.

Analisa dan interpretasi data :

Setelah bayi lahir uterus berkontraksi yang menyebabkan penciutan permukaan kovum uteri dan tampak placenta, akibatnya plasenta akan terlepas dari tempat tertanamnya. pada waktu kala III, volume uterus berkurang, dapat teraba tinggi fundus uteri setinggi pusat, pada saat kontraksi maka akan memperkecil permukaan uteri sehingga akan terasa sakit dan teraba keras dan bundar (kuswanti dan melina, 2014: 7).

C. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA /MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data penunjang

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

Tidak ada data penunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Tujuan : Kala III berlangsung normal, plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap, kontraksi uterus baik (teraba keas dan bundar), keadaan ibu dan janin baik.
2. Kriteria : Lamanya kala III tidak lebih dari 30 menit, plasenta (selaput dan kotiledon) lahir lengkap,kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar). Serta keadaan ibu dan janin baik.

Rencana tindakan

Tanggal 29 Juni 2022,jam 16.55 WITA

1) Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi dalam uterus

   Rasional : untuk memastikan kehamilan tunggal atau ganda

2) Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi

   Rasional : mempercepat lahirnya placenta

3) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit secara intramuskuler (IM) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

   Rasional : penyuntikan oksitosin membantu kontraksi uterus yang membantu keluarnya placenta

4) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

   Rasional : untuk memudahkan memotong tali pusat

5) Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.

   Rasional : agar bayi dapat dipisahkan dari plasenta

6) Menjepit tali pusat menggunakan penepit tali pusat.

   Rasional : agar darah tidak keluar dari pusat bayi

7) Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi.

   Rasional : agar ibu dan bayi tidak hipotermi dan bisa melakukan kontak

kulit

8) Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva

Rasional : agar dapat memudahkan proses peregangan tali pusat terkendali

9) Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi dan tangan lain meregangkan tali pusat.

Rasional : memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya

10) Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati kearah dorsokrainal. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

Rasional : dorso kranial memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya.

11) Melakukan peregangan dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).

Rasional : memudahkan plasenta keluar sesuai dengan kurva jalan lahir sehingga tampak pada vulva

12) Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta

dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah jarum jam untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput plasenta.

Rasional : mencegah robekan dan mencegah tertinggalnya selaput ketuban yang dapat menyebabkan perdarahan

13) Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras).

Rasional : agar kontraksi baik dan mencegah perdarahan

14) Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukkan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Rasional : adanya sisa plasenta dan selaput ketuban yang tertinggal dapat menyebabkan perdarahan

15) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

Rasional : penjahitan laserasi dapat mencegah terjadinya perdarahan

16) Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

Rasional : kontraksi uterus yang baik dapat mencegah perdarahan akibat atonia uteri

17) Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu

paling sedikit 1 jam.

Rasional : untuk menjalin ikatan batin antara ibu dan bayi

18) Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri salep mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg secara intramuskuler (IM) di paha kiri anterolateral.

Rasional : agar bayi mendapat perlindungan dini terhadap komplikasi yang akan terjadi

19) Setelah satu jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral.

Rasional : mengurangi resiko bayi terkena penyakit hepatitis

E. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 29 Juni 2022, jam: 16.55 WITA

1. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam

   Uterus

   Hasil : Bayi tunggal

2. Memberitahu ibu bahwa akan disuntikkan oksitosin agar uterus berkontraksi baik

   Hasil : ibu bersedia disuntik

3. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosinn 10 unit (IM) di 1/3 lateral paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

Hasil : oksitosin telah disuntikkan di 1/3 lateral paha ibu

4. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah (ibu) dan jepit kembali tali pusat 2 cm distal dari kem pertama.

   Hasil : tali pusat telah dijepit

5. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.

   Hasil : tali pusat telah dipotong

6. Mengikat tali pusat dengan benang steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya.

   Hasil : tali pusat telah dijepit

7. Menyelimuti ibu dan bayi degan kain hangat dan memasang topi pada kepala bayi.

   Hasil : bayi telah diselimuti dengan kain hangat dan topi telah terpasang dikepala

8. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva

   Hasil : klem telah dipindahkan

9. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat.

   Hasil : satu tangan telah berada diatas perut ibu dan tangan lainnya meregangkan tali pusat

10. Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati kearah dorso krainal. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

    Hasil : dorsocranial telah dilakukan

11. Melakukan peregangan dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).

    Hasil : plasenta telah terlepas dari implantasinya

12. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

    Hasil : plasenta dan selaput ketuban telah lahir

13. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

    Hasil : kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar

14. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.

    Hasil : plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 29 Juni 2022, pukul 17.00 WITA

15. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

    Hasil : terjadi rupture tingkat II dan telah dijahit luar dan dalam sebanyak 6 jahitan secara jelujur

16. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

    Hasil : Kontraksi uterus baik

17. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.

    Hasil : IMD telah dilakukan

18. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri salep mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg intramaskuler di paha kiri anterolateral.

    Hasil : Berat bayi lahir 2.800 gram, panjang bayi 49 cm, lingkar kepala 33 cm, lingkar dada 34 cm, lingkar perut 32 cm, APGAR score 8/10 dan telah disuntik vit k (IM) di paha kiri anterolateral

19. Setelah satu jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis di paha kanan anterolateral

Hasil : hepatitis B telah disuntikkan di paha kanan

F. LANGKAH VII : EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Evaluasi tanggal 29 Juni 2022 jam 17.00 WITA

1. Kala III berlangsung ±5 menit
2. Kotiledon dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 29 Juni 2022,jam : 17.00 WITA
3. Tinggi undus uteri setinggi pusat
4. Perdarahan kala III ± 200cc
5. Kontraksi uterus baik(teraba keras dan bundar)
6. Keadaan ibu dan janin baik

KALA IV

A. LANGKAH I IDENTIFIKAS DATA DASAR

Data subjektif : ibu merasa lelah setelah persalinannya dan ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah.

Data objektif : kala III berlangsung ±5 menit, plasenta lahir lengkap tanggal 29 Juni 2022,jam 17.00 WITA, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus teraba keras danbundar),perdarahan ± 200 cc dan kandung kemih kosong.

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Perlangsungan kala IV

Data subjektif : ibu merasa lelah dengan persalinannya.

Data objektif : kala III berlangsung ±5 menit, plasenta lahir lengkaptanggal 29 Juni 2022, jam 17.00 WITA, tinggi

fundus uteri setinggipusat, kontraksi uterus baik, (teraba keras dan bundar),perdarahan ± 200 cc dan kadung kemih kosong.

Analisa interpretasi data :

Setelah plasenta lahir lengkap, maka menunjukkan telah masuk ke kala pengawasan/ kala observasi post partum, kelelahan disebabkan oleh penggunaan energy dan cairan yang banyak saat persalinan (Kuswanti dan Melina 2014:8).

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data yang menunjang

D. IANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

Tidak ada data yang menunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Tujuan : kala IV berlangsung dengan tidak terjadi perdarahan yang berlebihan, kesadaran composmentis, dan tanda-tanda vital dalam batas normal
2. Kriteria : tidak terjadi perdarahan, kontraksi uterus baik(teraba keras dan bundar), kandung kemih kosong, dan tanda-tanda vital dalam batas normal.

Rencana tindakan

Tanggal 29 Juni 2022, jam 17.00 WITA

1. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan

   pervaginam.

   Rasional : kontraksi uterus yang baik dapat mencegah perdarahan

   akibat atonia uteri

2. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling

   sedikit 1 jam.

   Rasional : untuk menjalin ikatan batin antara ibu dan bayi

3. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri salep mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg intramaskuler di paha kiri anterolateral.

   Rasional : agar bayi mendapat perlindungan dini terhadap komplikasiyang akan terjadi

4. Setelah satu jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis di paha kanan anterolateral

   Rasional : mengurangi resiko bayi terkena penyakit hepatitis

5. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.

   Rasional : mencegah terjadinya perdarah pervaginam

6. Mengajarkan kepada ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi

   Rasional : agar kontrksi uterus baik (teraba keras dan bundar)

7. Evaluasi dan estimasi jumlah perdarahan setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinan.

   Rasional : mengetahui jumlah darah yang keluar

8. Memeriksa tanda-tanda vital ibu, tinggi fundus uteri, kontraksi dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan.

   Rasional : tanda-tanda vital yang normal dan kandung kemih yang kosong menandakan kala IV berlangsung normal

9. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bayi bernapas dengan baik

   Rasional : agar bayi dalam keadaan nyaman dan baik

10. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.

    Rasional : larutan klorin 0,5% dapat membunuh bakteri yang dapat mengakibatkan infeksi

11. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi dalam tempat sampah yang sesuai

    Rasional : mencegah terjadinya infeksi

12. Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi (DTT), membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.

    Rasional : agar ibu terhindar dari kuman

13. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin makan dan minum

    Rasional : dengan makan dan minum akan memberikan tenaga ibu yang telah terkuras selama proses persalinannya

14. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.

    Rasional : untuk membunuh kuman

15. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%

    Rasional : mencegah infeksi silang dan sebagai tindakan desinfeksi infeksi

16. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

    Rasional : dekontaminasi agar tidak terkontaminasi dengan bakteri

17. Melengkapi partograf

    Rasional : sebagai catatan pemantauan persalinan

F. LANGKAH VII PELAKSANAAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 29 Juni 2022, jam 17.00 WITA

1. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

   Hasil : Kontraksi uterus baik

2. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling

   sedikit 1 jam.

Hasil : IMD telah dilakukan

3. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri salep mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg intramaskuler di paha kiri anterolateral.

   Hasil : Berat bayi lahir 2.800 gram, panjang bayi 49 cm, lingkar kepala 33 cm, lingkar dada 34 cm, lingkar perut 32 cm, APGAR score 8/10 dan telah disuntik vit k (IM) di paha kiri anterolateral

4. Setelah satu jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis di paha kanan anterolateral

   Hasil : hepatitis B telah disuntikkan di paha kanan

5. Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan mencegah perdarahan pervaginam

   Hasil : kontraksi uterus baik

6. Mengajarkan ibu dan keluarga cara masase uterus dan menilai kontraksi.

   Hasil : ibu dan keluarga mengerti

7. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan 30 menit pada jam kedua pasca persalinan.

   Hasil :

Waktu	Jumlah Perdarahan
17.15	50 cc
17.30	40 cc

17.45	30 cc
18.00	30 cc
18.30	30 cc
19.00	20 cc
Total	200 cc

Sumber data : sekunder

8. Memeriksa tanda-tanda vital ibu (kecuali pernapasan), tinggi fundus uteri, kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua pasca persalinan

Hasil :

Jam	Waktu	Tekanan Darah	Nadi	Suhu	TFU	Kontraksi	Kandung Kemih
1	17.15	120/80 mmHg	80x/i	36,8°C	Setinggi pusat	Baik	Kosong
	17.30		80x/i		Setinggi pusat	Baik	Kosong
	17.45		80x/i		Setinggi pusat	Baik	Kosong
	18.00		79x/i		Setinggi pusat	Baik	Kosong
2	18.30	120/80 mmHg	82x/i	36,8°C	Setinggi pusat	Baik	Kosong
	19.00		80x/i		Setinggi pusat	Baik	Kosong

Sumber data : sekunder

9. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik.

Hasil : bayi bernapas normal yaitu 50 kali/menit

10. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (selama 10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.

    Hasil : alat sudah didekontaminasi

11. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.

    Hasil : bahan yang terkontaminasi telah dibuang

12. Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi. Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.

    Hasil : ibu dalam keadaan bersih

13. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum.

    Hasil : Ibu merasa nyaman dan telah makan serta minum

14. Dekontaminasikan tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.

    Hasil : tempat bersalin telah didekontaminasi

15. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5 %.

    Hasil : sarung tangan telah direndam dalam larutan clorin 0,5 %

16. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

    Hasil : kedua tangan telah bersih

17. Melengkapi partograf

Hasil : partograf lengkap

G. LANGLAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 29 Juni 2022,jam 19.10 WITA

1. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
2. Jumlah perdarahan ± 200 cc
3. Kandung kemih kosong
4. Tanda-tanda vital dalam batas normal

   Tekanan darah :120/80mmHg

   Suhu :36,8°C

   Nadi : 80x/menit

   Pernapasan :20x/menit
5. Ibu telah makan dan minum
6. Keadaan ibu dan janin baik

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NY"A" GESTASI 39-40 MINGGU DENGAN KETUBAN PECAH DINI (KPD) DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR TANGGAL 29 JUNI 2022

Nomor register : 106xxx

Tanggal masuk rumah sakit : 29juni 2022 jam : 10.10 wita

Tanggal pengkajian : 29juni 2022 jam : 10.10 wita

Tanggal partus : 29juni 2022 jam : 16.55 wita

Nama pengkaji : Sitti Aisyah

Identitas isteri/suami

Nama : Ny A / Tn R

Umur : 19 Th / 28 Th

Nikah / Lamanya : 1 Kali/ ±2 Tahun

Suku : Makassar/ Makassar

Agama : Islam/ Islam

Pendidikan : Smp/ Smp

Pekerjaan : Irt/ Swasta

Alamat : Jl. Sunu

KALA I

Anamnesa

DATA SUBJEKTIF (S)

a. Ibu masuk dengan keluhan adanya pengeluaran air pervaginam

b. Riwayat Keluhan Utama

Air yang keluar sedikit demi sedikit dan bertambah banyak hingga sarung basah, berwarna jernih dan tidak berbau. Ibu adalah rujukan dari puskesmas Ujungpandang Baru dengan keluhan ada keluar cairan berwarna jernih pada tanggal 29 Juni 2022 (±3jam sebelum sampai ke rumah sakit) satu sarung basah akibat cairan yang keluar, ibu tidak merasakan mules atau nyeri perut tembus belakang. Riwayat pemeriksaan di puskesmas yaitu his /kontraksi tidak ada, pembukaan 1 cm, dan riwayat pemeriksaan kertas lakmus di puskesmas positif yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru yang menandakan air ketuban.

c. Riwayat Menstruasi

1. Menarche : 14 tahun
2. Siklus : 28-30 hari
3. Lamanya : 5-7 hari
4. Banyaknya : 2-3 kali ganti pembalut seiap hari
5. Teratur/tidak : teratur
6. Sifat darah : encer
7. Disminore : tidak ada

d. Riwayat Perkawinan

Ibu menikah 1x secara sah dengan Tn R pada tahun 2021 saat Ny A berusia 17 tahun dan Tn S berusia 26 tahun.

e. Riwayat kehamilan yang sekarang

1) Hari pertama haid terakhir tanggal 25 September 2021
2) Hari tafsiran persalinan tanggal 01 Juli 2022
3) Umur kehamila 39 minggu 5 hari
4) Menurut ibu kehamilannya ± 9 bulan
5) Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dirasakan pada perut sebelah kiri dan dirasakan sampai sekarang.
6) Ibu memeriksakan kehamilannya 7 kali di puskesmas

   Trimester I : 2 kali

   Trimester II : 2 kali

   Trimester III :3 kali
7) Ibu telah mendapatkan suntikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) sebanyak 1 kali pada tanggal 01 februari 2022
8) Keluhan-keluhan

   Trimester I : mual dan muntah berlebihan

   Trimester II : tidak ada keluhan

   Trimester III :sering kencing dan nyeri perut bagian bawah
9) Penyuluhan Ibu tidak pernah mendapat penyuluhan apapun

h. Riwayat keluhan sekarang dan yang lalu

1) Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes mellitus, asma dan hipertensi
2) Tidak ada riwayat penyakit menular, tuberculosis, malaria, dan penyakit menular seksual
3) Tidak ada riwayat alergi makanan maupun obat-obatan

4) Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah diopname di rumah sakit dan di puskesmas.

i. Riwayat Penyakit Keluarga

Didalam keluarga tidak ada riwayat penyakt jantung, hipertensi, diabetes mellitus, asma dan penyakit serius lainnya.

j. Riwayat Sosial, Ekonomi,Psikososial Dan Spiritual

1) Yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah suami
2) Hubungan ibu dengan suami, keuarga maupun tetangga baik
3) Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami
4) Bu rajn beribadah dan berdoa untuk kelancaran persalinannya

k. Riwayat KB

Ibu tidak pernah menjadi akseptor kb sebelumnya

l. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi

1) Kebutuhan nutrisi Kebiasaan

a) Pola makan : Nasi, sayur dan lauk

b) Rekuensi : 3 kali sehari

c) Kebutuhan nutrisi : 6-8 gelas per hari

Selama inpartu :

Ibu makan, tetapi hanya sedikit demi sedikit dan lebih banyak minum.

2) Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan:

a) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau amniak

b) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning.

Selama inpartu :

a) BAK : ibu BAK di tempat tidur karena telah terpasang popok

b) BAB : ibu belum BAB

3) Personal hygine Kebiasaan :

a) Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabunmandi

b) Sikat gigi : 2 kali sehari (setelah makan dan sebelum tidur) denganmenggunakan pasta gigi.

c) Keramas : 3 kali seminggu menggunakan shampo

d) Ganti pakaian : 2 kali sehari

Selama inpartu :

a) Ibu belum mandi dan sikat gigi

4) Kebutuhan istirahat dan tidur

Kebiasaan:

a). Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

Selama inpartu:

a). Ibu tidak pernah tidur

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Hari tafsiran persalinan tanggal 01 Juli 2022

4. Usia gestasi kehamilan 39 minggu 5 hari
5. Tanda-tanda vital

   Tekanan darah : 120/80mmHg

   Suhu :36,8°C

   Nadi : 80 x/i

   Pernapasan : 20x/i
6. Tinggi badan : 154 cm
7. Berat badan sebelum hamil : 45 kg
8. Berat badan sekarang : 56 kg
9. Lingkar lengan atas (LILA): 23 cm
10. Pemeriksaan fisik (head to toe
    a. Kepala : bersih, tidak ada ketombe, tidak rontok, rambut hitam dan lurus, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan
    b. Wajah : tidak pucat, tidak ada chloasma gravidarum, tidak oedema, tidak ada nyeri tekan
    c. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah mudah, schlera putih, kelopak mata tidak bengkak
    d. Hidung : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak pengeluaran secret, tidak oedema, tidak ada nyeri tekan, tidak ada polip
    e. Mulut dan gigi : bersih, bibir merah muda dan tidak pecah-pecah, tidak ada caries, tidak ada karang gigi, tidak ada stomatitis, gusi tidak berdarah, dan tidak ada gigi yang tanggal

f. Telinga : simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran serumen, tidak ada peradangan, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan

g. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, kelenjar limfe dan vena jugularis

h. Payudara : payudara simetris kiri dan kanan, putting susu bersih dan menonjol, tampak hiperpigmentasi pada areola, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, terdapat pengeluaran kolostrum jika putting susu dipencet

i. Abdomen : Leopold I : 2 jrbpx, 30 cm, bokong

Leopold II : PUKA

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP 5/5

LP : 98 cm

TBJ : 2.940 gram

DJJ : 130x/i

His :1x10 menit durasi 5-10 detik

j. Ekstremitas atas : jari lengkap, pergerakan aktif, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan

k. Ekstremitas bawah : tidak ada varises, pergerakan aktif, tidak ada benjolan, tidak oedema

l. Genitalia dan anus : tidak ada varises, nampak pengeluaran lendir dan air ketuban, tidak ada oedema, tidak ada hemorrhoid

11. Pemeriksaan dalam *Vaginal toucher* (VT)

tanggal 29 Juni 2022, jam: 10.10 WITA

a. Vulva Dan Vagina : Normal

b. Portio : Tebal

c. Pembukaan : 1 cm

d. Ketuban : Jernih (Merembes)

e. Presentase : -

f. Penurunan : Hodge I

g. Molase : Tidak Ada

h. Penumbungan : Tidak Ada

i. Kesan Panggul : Normal

j. Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban

12. Pemeriksaan tes *valsava*

Tanggal 29 Juni 2022, jam: 10.15 WITA

Hasil pemeriksaan tes valsava yaitu terdapat pengeluaran air ketuban merembes

13. Pemeriksaan penunjang Pemeriksaan laboratorium (sampel darah)

1) WBC : 9.4x103 /µL

2) RBC : 4.43x106 /µL

3) HGB : 11.02g/dl

4) HCT : 34,7%

5) MCV : 7.83fL

6) MCH : 32.7pg

7) MCHC : 31.7 g/dl

8) HbsAG : negatif (-)

ASSESMENT (A)

Diagnosa : GIP0A0 gestasi 39 minggu 5 hari, intrauterine, tunggal, hidup,keadaan ibu dan janin bak, inpartu kala I fase laten dengan KPD

Masalah aktual : KPD

Masalah potensial : Potensial terjadi kepada ibu yaitu potensial terjadinya infeksi intraparta/dalam persalinan, infeksi puerpalis/masa nifas, dry labour/partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan operatif obstetric(khususnya SC), morbiditas dan mortalitas. Masalah potensial terjadi pada janin yaitu prematuritas (sindrom distress pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan pada neonatal, perdarahan intraventikuler, gangguan otak, dan resiko cerebral palsy, anemia, skor APGAR rendah, ensefelopati,cerebral palsy, perdarahan intracranial,gagal ginjal, distress pernafasan). Dan oligohidromnion (sindrom defornits janin, hipolapsia paru, deformitas ekstrimitas dan pertumbuhan janin terhembat), morbiditas dan mortalitas perinatal.

PLANNING (P)

Tanggal 29 Juni 2022, jam 10.20 WITA

1. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga

Hasil : ibu telah mengetahui kedaannya sekarang.

2. Mengobservasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi 30 menit), denyut jantung janin (DJJ) dan his tiap 1 jam pada kala I fase laten dan tiap 30 menit pada kala I fase aktif, kecuali jika ada indikasi, maka dilakukan 30 menit.

Waktu	Nadi	Suhu	Tekanan darah	DJJ	His
11.10	84x/i	36,8℃	120/80 mmHg	132x/i	1x10 menit durasi 10-15 detik
12.10	82x/i		120/80 mmHg	138x/i	2x10 menit durasi 15-20 detik
13.10	78x/i	36,7℃	120/80 mmHg	135x/i	2x10 menit durasi 20-25 detik

Sumber Data : Sekunder

3. Melakukan *vaginal toucher* (VT) kontrol jam: 13.10 WITA

Hasil: a. Vulva Dan Vagina : Normal

b. Portio : Tipis

c. Pembukaan : 5 cm

d. Ketuban : Jernih(Merembes)

e. Presentase : Ubun-Ubun Kecil Kanan Lintang

f. Penurunan : Hodge II

g. Molase : Tidak Ada

h. Penumbungan : Tidak Ada

i. Kesan Panggul : Normal

j. Pelepasan : Lendir,Darah Dan Air Ketuban

4. Melanjutkan pemantauan tanda-tanda vital setiap 4 jam (keuali nadi setiap 30 menit), denyut jantung janin(djj) dan his.

Waktu	Nadi	Suhu	Tekanan darah	DJJ	His
13.40	80x/i	36,8℃	120/80 mmHg	130x/i	3x10 menit durasi 20-25 detik
14.10	80x/i			130x/i	4x10 menit durasi 25-30 detik
14.40	78x/i			132x/i	4x10 menit durasi 30-35 detik
15.10	80x/i			138x/i	4x10 menit durasi 30-35 detik
15.40	82x/i			138x/i	4x10 menit durasi 35-40 detik
16.10	84x/i			138x/i	5x10 menit durasi 40-45 detik
16.40	80x/i	36,8℃	120/80 mmHg	139x/i	5x10 menit durasi 50-55 detik

Sumber Data : Sekunder

5. Mengobservasi *vaginal toucher* (VT)

   kontrol, jam 16.40 WITA

   a. Vulva Dan Vagina : Normal

   b. Portio : Melesap

   c. Pembukaan : 10 Cm(Lengkap)

   d. Ketuban : Jernih (Merembes)

   e. Presentase : Ubun-Ubun Depan

   f. Penurunan : Hodge IV

   g. Molase : Tidak Ada

   h. Penumbungan : Tidak Ada

   i. Kesan Panggul : Normal

   j. Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban

6. Mengajarkan teknik relaksasi dan pengaturan napas pada saat kontraksi, ibu

menarik napas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama timbul kontraksi

Hasil : ibu telah melakukannya

7. menganjurkan pengosongan kandung kemih sesering mungkin Hasil : kandung kemih telah kosong
8. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatalaksanaan pemberian infuse RL 28 tetes per menit, misoprostol 1/8 tab pervaginam dan antibiotic cefotaxime 1gr/ IV sesuai intruksi dokter

   Hasil : infuse RL telah dipasang pada jam 10.25 WITA, misoprostol 1/8 tab

   telah berada didalam vagina ibu pada jam 10.30 WITA, dan injeksi cefotaxime telah diberikan pada jam 10.35 WITA
9. Memberi makan dan minum jika tidak ada his

   Hasil : ibu telah diberi makan dan minum disela-sela his
10. Menganjurkan kepada ibu untuk senantiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti

    Hasil : ibu selalu beristighfar saat ibu mrasakan sakit akibat kontraksi
11. Mencatat dalam partograf

    Hasil : partograf telah dilengkapi

KALA II

DATA SUBJEKTIF (S)

1. akitnya bertambah kuat dan tembus belakang
2. Ibu merasa ingin buang air besar

3. Adanya dorongan kuat untuk meneran
4. Adanya tekanan pada anus

DATA OBJEKTIF (O)

1. Perineum menonjol
2. Vulva dan vagina membuka
3. His 5x dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik
4. Pembukaan 10cm (lengkap)
5. Penurunan kepala hodge IV (0/5)
6. Pelepasan lendir, darah dan air ketuban

ASSESMENT (A)

Perlangsungan kala II

PLANNING (P)

Tanggal 29 Juni 2022, jam: 16.40 WITA

1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua (dorangan kuat untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).

   Hasil : tanda dan gejala kala II telah dirasakan
2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan 1 ampul oksitosin dan memasukan alat suntik sekali pakai 3 ml ke dalam wadah partus set.

   Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pertolongan persalinan yaitu:

   a. Partus set

Partus set terdiri atas 2 klem kocher, ½ kocher, 1½ handscoon steril, kateter nelaton, penjepit tali pusat, kasaa steril, spoit 3 cc dan gunting tali pusat.

b. Hecting set

Hecting set terdiri atas nelvuder, catgut, jarum, pinset anatomi, pinset sirurgi, dan gunting benang.

c. Obat dan bahan

Obat dan bahan terdiri atas cairan infus, oksitosin, lidokain, salep mata, vitamin k hepatitis B dan betadin.

d. Diluar partus set

Adapun yang harus disiapkan diluar partus set yaitu air desinfeksi tingkat tingkat tinggi dan kapas desinfeksi tingkat tinggi, larutan klorin 0,5%, tempat sampah, delee, lenek, perlak, handuk kering, tensimeter, stetoskop dan termometer.

e. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri terdiri dari topi, masker, kacamata, celemek, handscoon, alas kaki tertutup/ sepatu boot .

3. Memakai celemek plastik

   Hasil : celemek telah dipakai

4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

   Hasil : perhiasan telah disimpan dan tangan telah bersih

5. Menggunakan sarung tangan steril pada tangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.

   Hasil : sarung tangan telah dipakai pada tangan kanan

6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus set.

   Hasil : oksitosin 1 ampul telah berada didalam wadah partus set

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air matang desinfeksi tingkat tinggi, dengan gerakan vulva ke perineum. Hasil : vulva dan perineum telah bersih

8. Melakukan pemeriksaan dalamdan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudahpecah.

   Pemeriksaan dalam jam : 16.40 WITA

   a. Vulva Dan Vagina : Normal
   b. Portio : Melesap
   c. Pembukaan : 10 Cm(Lenkap)
   d. Ketuban : Jernih(Merembes)
   e. Presentasi : Ubun-Ubun Kecil Depan
   f. Penrunan : Hodge IV
   g. Molase : Tidak Ada
   h. Penumbungan : Tidak Ada
   i. Kesan Panggul : Normal
   j. Pelepasan : Lendir,Darah Dan Air Ketuban

9. Mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.

   Hasil : sarung tangan telah direndam dalam larutan klorin 0,5 % secara terbalik

10. Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin dalam batas normal (120 – 160 kali per menit).

    Hasil : denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132 kali per menit.

11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.

    Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman).

    Hasil : ibu dalam posisi setengan duduk

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.

    Hasil : telah dilakukan pimpinan meneran

14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

    Hasil : ibu tetap dalam posisi setengah duduk karena sakitnya yang bertambah sering

15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.

    Hasil : handuk bersih telah diletakkan diatas perut ibu

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu atau gunakan underpad.

    Hasil : underpad telah terpasang dibawah bokong ibu

17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan

    Hasil : alat telah lengkap

18. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan.

    Hasil : sarung tangan telah dipakai pada kedua tangan

19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Setelah itu kita melakukan perasat stenan (perasat untuk melindungi perineum dengan satu 118 tangan, dibawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala

tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum).

Hasil : kepala telah lahir

20. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin

    Hasil : tidak terjadi lilitan tali pusat

21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

    Hasil : kepala bayi telah melakukan putaran paksi luar

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental, menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala kearah bawah dan distal hingga bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

    Hasil : kedua bahu telah lahir

23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

    Hasil : lengan dan badan telah lahir

24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung kearah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)

    Hasil : seluruh badan telah lahir

25. Melakukan penilaian selintas :

    a. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?

    b. Apakah bayi bergerak aktif ?

    Hasil : bayi lahir spontan tanggal 29 Juni 2022, jam : 16.55 WITA, dengan segera menangis dan bernapas tanpa bantuan, bergerak dengan aktif dan APGAR score 8/10.

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/ kain yang kering serta membiarkan bayi di atas perut ibu. Hasil : ibu telah diselimuti dengan handuk brsih dan kering, serta telah berada diatas perut ibu

KALA III

DATA SUBJEKTIF (S)

a. Ibu lelah setelah melahirkan

b. Ibu merasakan nyeri perut bagian bawah

DATA OBJEKTIF (O)

a. Bayi lahir spontan tanggal 29 Juni 2022, jam: 16.55 WITA

b. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar

c. Tinggi fundus uteri setinggi pusat

d. Perdarahan 300 ± cc

e. Kala II berlangsung selama ±15 menit tanpa ada penyulit serta tali pusat masih Nampak di vulva.

ASSESMENT (A)

Perlangsungan kala III

PLANNING (P)

Tanggal 29 Juni 2022, jam: 17.00 WITA

27. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.

    Hasil : bayi tunggal

28. Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

    Hasil : ibu bersedia untuk disuntik

29. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit (IM) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

    Hasil : oksitosin telah disuntikkan di 1/3 paha atas bagian distal lateral

30. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

    Hasil : tali pusat telah dijepit

31. Memotong dan mengikat tali pusat (dengan satu tangan mengangkat tali pusat yang telah dijepit, kemudian melakukan pengguntingan talu pusat sambil melindungi perut bayi diantara 2 klem

    Hasil : tali pusat telah dipotong

32. Mengikat tali pusat dengan benang desinfeksi tingkat tinggi atau steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya

dengan simpul kunci pada sisi lainnya atau menjepit tali pusat dengan penjepit tali pusat

Hasil : tali pusat telah dijepit

33. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi.

    Hasil : bayi telah diselimuti dengan kain hangat dan topi telah terpasang di kepala

34. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva

    Hasil : klem telah dipindahkan

35. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat.

    Hasil : satu tangan telah berada diatas perut ibu dan tangan lainnya meregangkan tali pusat

36. Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati kearah dorso krainal. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur. Hasil : dorso kranial telah dilakukan

37. Melakukan peregangan dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).

    Hasil : plasenta telah terlepas dari tempat implantasinya

38. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hatihati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

    Hasil : plasenta dan selaput ketuban telah lahir

39. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

    Hasil : kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar

40. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.

    Hasil : Plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 18 Juli 2018, jam 17.00 WITA

41. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

    Hasil : terjadi ruptur tingkat II dan telah dijahit luar dan dalam sebanyak 6 jahitan secara jelujur

42. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

    Hasil : uterus berkontraksi baik (teraba keras dan bundar)

KALA IV

DATA SUBJEKTIF (S)

a. Ibu lelah setelah selesai persalinannya

b. Ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah

DATA OBJEKTIF (O)

a. Ibu tampak lelah setelah menjalani persalinannya

b. Plasenta lahir lengkap pada tanggal 29 Juni 2022, jam: 17.00 WITA

c. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)

d. Tinggi fundus uteri setinggi pusat

e. Perdarahan ± 200 cc

f. kandung kemih kosong

ASSESMENT (A)

Perlangsungan kala IV dengan keadaan ibu kelelahan

PLANNING (P)

Tanggal 29 Juni 2022, jam: 17.10 WITA

43. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah terjadinya perdarahan pervaginam

    Hasil : kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)

44. Mengajarkan ibu/ keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.

    Hasil : ibu telah melakukannyah kehilangan darah, setiap 15 menit selam 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam ke 2 pasca persalinan

    Hasil:

Waktu	Perdarahan
17.15	± 50 cc

17.30	± 40 cc
17.45	± 30 cc
18.00	± 30 cc
18.30	± 30 cc
19.00	± 20 cc
Total	± 200 cc

Sumber Data : sekunder

45. Memeriksa tanda-tanda vital ibu (kecuali pernapasan), tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan 30 menit pada 2 jam pasca persalinan

    Hasil :

Jam	Waktu (WITA)	TD (mmHg)	N (x/i)	S(°C)	TFU	Kontraksi	Kandung kemih
1	17.15	120/80	80	36,8°C	STP	Baik	Kosong
	17.30	120/80	80		STP	Baik	Kosong
	17.45	120/80	80		STP	Baik	Kosong
	18.00	120/80	80		STP	Baik	Kosong
2	18.30	120/80	80	36,8°C	STP	Baik	Kosong
	19.00	120/80	80		STP	Baik	Kosong

    Suas dengan normal yaitu 50 kali per menit

46. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi. Hasil : alat sudah dilarutkan dalam larutan klorin 0,5 %, telah dicuci dan telah bersih

47. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.

    Hasil : Sampah yang terkontaminasi telah dibuang ketempat sampah.

48. Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi. Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai memakai pakaian bersih dan kering.

    Hasil : ibu telah dalam keadaan bersih

49. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum.

    Hasil : ibu telah nyaman dan telah makan dan minum

50. Dekontaminasikan tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.

    Hasil : tempat bersalin telah di dekontaminasikan

51. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5.

    Hasil : sarung tangan telah dicelupkan di didalam larutan klorin 0,5 % dalam keadaan terbalik

52. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

    Hasil : kedua tangan telah bersih

53. Melengkapi partograf

    Hasil : partograf telah diisi

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANANBAYI BARU LAHIRPADA NY"A" DENGAN BCB/PBK/SMK DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR TANGGAL 29 JUNI 2022

No. Register	: 106xxx		
Tanggal lahir	: 29 Juni 2022	jam	: 16.55 WITA
Tanggal pengkajian	: 29 Juni 2022	jam	: 17.00 WITA
Nama pengkaji	: Sitti Aisyah		

IDENTITAS BAYI

Nama	: Bayi Ny "A"
Tempat/Tanggal Lahir	: RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar, 29 Juni 2022
Umur	: 0 Hari
Anak Ke	: 1 (Pertama)
Jenis Kelamin	: Laki-Laki

IDENTITAS ORANG TUA

Nama	: Ny A / Tn R
Umur	: 19 Th / 28 Th
Nikah / Lamanya	: 1 Kali/ ±2 Tahun
Suku	: Makassar/ Makassar
Agama	: Islam/ Islam
Pendidikan	: Smp/ Smp
Pekerjaan	: Irt/ Swasta
Alamat	: Jl. Sunu

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu melahirkan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar pada tanggal 29 Juni 2022, jam: 16.55 WITA
2. Hari pertama haid terakhir ibu tanggal 25 September 2021
3. Usia kehamilan pada saat melahirkan ±9 bulan
4. Ibu pertama kali menyusui bayinya sejak dilahirkan yaitu IMD yang di bantu oleh Bidan
5. Persalinan spontan/tanpa alat dan tidak ada penyulit
6. Ini merupakan anak pertama

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi baik
2. Gestasi kehamilan pada saat melahirkan yaitu 39 minggu 5 hari
3. Penilaian sepintas segera menangis, bernafas dengan baik, kulit kemerahan segera setelah lahir
4. Penilaian Apgar Score

Penilaian	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Menit 1	Menit 5
Apperence (warna kulit)	Pucat	Badan merah, ekstremitas biru	Seluruh badan kemerahan	2	2
Pulse (denyut jantung)	Tidak ada	<100	>100	2	2
Grimace (refleks)	Tidak ada	Sedikit gerakan	Batuk dan bersin	1	2
Activity (tonus otot)	Tidak ada	Ekstremitas dalam sedikit fleks	Gerakan aktif	1	2
Respiration	Tidak	Lemah	Menangis	2	2

(pernapasan)	ada	teratur	kuat		
Nilai				8	10

Sumber Data : Sekunder

5. Pemeriksaan Antropometri

   Berat badan : 2800 gram

   Panjang badan : 49 cm

   Ligkar kepala : 33 cm

   Lingkar dada :34 cm

   Lingkar perut : 32 cm

   Lila : 11 cm

6. Pemeriksaan tanda-tanda vital

   HR : 140x/i

   Pernapasan : 44x/i

   Suhu : 36,9℃

7. Pemeriksaan fisik

   a. Kulit : warna kulit kemerahan dan tidak ikterus

   b. Kepala : distrubusi rambut di puncak kepala, tidak ada massa

   c. Wajah : mata segaris dengan telinga, hidung di garis telinga, mulut garis tengah wajah dan simetris.

   d. Telinga : posisi telinga berada di garis lurus dengan mata, kulit tidak kendor, pembentukan tulang rawan terbentuk dengan baik dan kokoh.

   e. Hidung : posisi di garis telinga, bernafas melalui hidng,

   f. Mulut : bentuk dan ukuran proporsional dengan wajah, bibir

berwarna merah muda dan lembab, palatum utuh, lidah di garis tengah, refleks menghisap serta refleks roothing ada

g. Leher : simetris, tyroid di garis tengah, tidak ada pembesaran pada vena jugularis

h. Dada : gerakan dinding dada simetris, frekuensi napas 43x/I, suara nafas jernih, frekuensi jantung 142x/i

i. Payudara : jarak antara puting pada garis sejajar tanpa ada putting tambahan

j. Abdomen : abdomen bundar dan simetris, tampak tali pusat yang dijepit dengan penjepit tali pusat, abdomen lunak, tidak ada massa dan bising usus ada.

k. Genetalia : testis sudah turun, testis terbungkus scrotum, terdapat 1 penis dan terdapat lubang penis

l. Anus : tampak lubang anus

m. Ekstrimitas : simetris, jari kaki dan jari tangan lengkap.

n. Pemeriksaan usia gestasi dengan skala Ballard

a. Maturnitas fisik

1) Kulit : 3

2) Lanugo : 4

3) Garis telapak kaki : 5

4) Payudara : 3

5) Mata/kaki :4

6) Genetalia :3

b. Maturnitas neura muscular

1) Postur : 4

2) Jendela pergelangan tangan : 3

3) Gerakan tangan membalik : 3

4) Sudut puplitea : 4

5) Tumit ke telinga : 4

Total score : Maturnitas fisik + Neuro Muskuler : 22+18 = 40 Usia Maturnitas : 40 minggu

8. Pemeriksaan refleks

a. Refleks Morro (+) : ada respon saat di kejutka

b. Refleks Roothing (+) : ada respon mencari putting

c. Refleks Suching (+) : ada respon ingin menghisap

d. Refleks Grafs/Plantar : ada respon ingin menggenggam

e. Refleks Plantar (+) : ada respon ketika bagian bawah disentuh

f. Refleks Babinsky (+) : ada respon ketika disentuh, menarik kedalam

9. Eliminasi

BAB : mekonium

BAK : positif

ASSESMENT (A)

Bayi Ny “A” dengan BCB/SMK/SPT, segera menangis

PLANNING (P)

Tanggal 29 Juni 2022 jam :17.00 WITA

1. Menjelaskan kepada ibu bahwa keadaan bayi dalam keadaan baik

   Hasil : ibu mengerti

2. Mengeringkan bayi dan mengganti sarung basah dengan sarung yang kering

   Hasil : tindakan telah dilakukan

3. Membedong bayi dengan kain bersih dan kering agar bayi tidak kedinginan

   Hasil : bayi telah dibedong

4. Menganjurkan ibu untuk memberikan Asi ekslusif pada bayinya selama 6 bulan dan tidak memberikan makanan tambahan selain ASI.

   Hasil : ibu bersedia melakukannya

5. Menjelaskan tentang manfaat Asi yaitu

   a. Asi kaya akan zat penting yang dibutuhkan oleh bayi seperti DHA,AA,omega 6, laktosa, protein, laktobasilus, vitamin A, colostrum,lemak yang semuanya dalam takaran dan komposisi yang pas untuk bayi

   b. Asi memberikan kekebalan tubuh yang optimal pada bayi

   c. Asi tidak basi, dan selalu higienis serta segar

   d. Sebagai saran mendekatkan ibu dan bayi

   Hasil : ibu mengerti

6. Mengajakan kepada ibu cara perawatan tali pusat

   a. Membersihkan dengan kasa steril yang dibasahi air matang dimulai daripangkal tali pusat sampai ujung, setelah itu keringkan tali pusat dan

biarkanterbuka, dan tidak boleh dberi salep, bedak, minyak dan betadin

b. Usahakan popok atau celana bayi tidak mengenai tali pusat agar tali pusat cepat kering dan tidak iritasi

Hasil : ibu mengerti

7. Mejelaskan kepada ibu dan keluarga tentang tanda bahaya bayi baru lahir

a. Pernapasan 60x/i

b. Suhu tubuh bayi 37,5℃

c. Bayi biru,pucat, dan memar

d. Rewel dan muntah

e. Tali pusat merah, bengkak, serta keluar cairan busuk bernanah

f. Tidak BAB selama 3 hari, tinja merah

g. Tidak BAK dalam 24 jam

h. Kejang dan menigil

Hasil : ibu dan keluarga mengerti

8. Meminta izin kepada ibu untuk memberikan salep mata, vit K di 1/3 lateral paha kiri bayi secara IM(90o)

Hasil : ibu memberi izin dan bayi telah diberikan salep mata dan vit K

9. Setelah 1 jam pemerian vit K beritahu ibu bahwa bayinya akan di imunisasi Hbo di 1/3 lateral paha kanan bayi secara IM(90o)

Hasil : ibu bersedia dan bayi telah mendapat imunisasi

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE HARI PERTAMA PADA NY"A" DENGAN NYERI ABDOMEN DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR TANGGAL 29 JUNI 2022

No register	: 106xxx		
Tanggal masuk	: 29 Juni 2022	jam	: 16.55 WITA
Tanggal partus	: 29 Juni 2022	jam	: 19.00 WITA
Tanggal pengkajian	: 29 Juni 2022	jam	: 19.00 WITA
Nama pengkaji	: Sitti Aisyah		

IDENTITAS ISTERI/SUAMI

Nama	: Ny A / Tn R
Umur	: 19 Th / 28 Th
Nikah / Lamanya	: 1 Kali/ ±2 Tahun
Suku	: Makassar/ Makassar
Agama	: Islam/ Islam
Pendidikan	: Smp/ Smp
Pekerjaan	: Irt/ Swasta
Alamat	: Jl. Sunu

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengeluh nyeri Abdomen setelah melahirkan sejak 3 jam yang lalu
2. Ibu melahirkan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar, tanggal 29 Juni 2022 jam: 16.55WITA
3. Hari pertama haid terakhir tanggal 25 September 2021
4. Ibu mengatakan ini kehamilan yang ke pertama dan tidak pernah keguguran
5. Ibu pertama kali menyusui bayinya saat IMD yang di bantu oleh Bidan

6. Ibu belum BAB dan sudah BAK
7. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, DM, jantung dan penyakit serius lainnya.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan TTV

Tekanan darah	: 120/80 mmHg
Suhu	: 36,8°C
Nadi	: 82x/I
Pernapasan	: 22x/i

4. Pemeriksaan fisik

a. Wajah : tidak pucat, tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan

b. Mata : simetris, sclera putih dan kongjungtiva merah muda

c. Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar tyroid dan limfe

d. Payudara : simetris, putting susu menonjol, hyperpigmentasi areola mammae, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, ada pengeluaran asi saatputting di pencet

e. Abdomen : tidak ada bekas operasi, tinggi fundus uteri 1 jari d bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, kandung kemih ibu kosong

f. Genetalia : tampak jahitan perineum, tampak pengeluaran darah ±100

cc, ibu masih memakai popok, tidak ada oedema, tidak ada varisces,tidak ada tanda-tanda infeksi

g. Anus : tidak ada hemoroid

h. Ekstrimitas : terpasang infus di tangan sebelah kiri ibu, tidak ada oedema, tidak ada varices, tidak ada nyeri tekan.

ASSESMENT (A)

Ny "A" PIA0 postpartum hari pertama dengan nyeri abdomen

PLANNING (P)

Tanggal : 29 Juni 2022, jam : 19.10 WITA

1. Menjelaskan kepada ibu penyebab nyeri abdomen, yaitu pada saat hamil rahim membesar sesuai ukuran janin yang dikandung, saat bayi lahir maka perlahan-lahan rahim akan menyusut dan mengecil hingga sebesar buah pir kecil. Proses kembalinya kebentuk semula dari rahim ini, maka disertai dengan rasa kram di perut yang di sebut dengan kontraksi, uterus segera mengecil dan pembuluh darah yang terbuka saat placenta terlepas akan segera menutup kembali sehingga tidak terjadi perdarahan. Nyeri perut seperti ini akan semakin terasa saat menyusui, ibu tidak perlu cemas karena adanya rangsangan hisapan bayi maka keluarlah hormone oksitosin yang membantu kontraksi uterus, menggunakan gurita yang nyaman, lakukan relaksasi napas bila nyeri atau kram muncul.

   Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan oleh bidan

2. Menganjurkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus yaitu dengan meletakkan satu tangan diatas perut ibu, lalu tekan dan putar

secara terus menerus searah jarum jam sampai perut ibu teraba keras dan bundar

Hasil : ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

3. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi dini agar memperlancar pengeluaran lochia, mengurangi infeksi, mempercepat involusi uteri serta memperlancar peredaran darah

   Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

4. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin agar produksi asi lancar dan bayi mendapatkan asupan nutrisi, maka bayi harus disuse selama 6 bulan tanpa makanan tambahan.

   Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

5. Memberikan konseling tentang

   a. Nutrisi Gizi yang dibutuhkan ibu yaitu makanan sehat dan seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, kalsium seperti yang terkandung dalam nasi, daging, ikan, telur, tempe, tahu, buah-buahan, kacang-kacangan dan banyak mengkomsumsi air putih utnuk memperbanyak produksi Asi

   b. Personal hygine Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan diriseperti mandi, mengggosok gigi minimal 2kali sehari, mengganti celana dalam tiap kali lembab atau basah dan rajin mengganti pembalut

   c. Istirahat Menganjurkan ibu untuk istirahat cukup yaitu tidur siang 2 jam,dan malam 6-8 jam

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Menjelaskan kepada ibu tentang kontrasepsi
   a. Kondom merupakan selubung tipis dari karet yang berguna sebagai sarung penis yang sedang ereksi selama berhubungan dan menghalangi sperma masuk ke vagina yang membantu mencegah kehamilan, adapun kekurangannya yaitu dapat bocor yang dapat menyebabkan fungsi tidak efektif
   b. Implant yaitu alat kontrasepsi berbentuk batal batang kecil yang dipasang dilengan atas yang berungsi untuk menvegah kehamilan dan aman bagi ibu yang menyusui, adapun kekurangannya menstruasi tidak teratur, tidak dapat digunakan bagi penderita DM, dan osteoporosis, dapat memicu iritasi,serta rasa tidak nyaman di area lengan yang dipasang
   c. IUD/alat kontrasepsi dalam Rahim adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam Rahim untuk menunda kehamilan dan menjaga jarak kehamilan dan menjamin perlindungan jangka panjang serta aman bagi ibu yang menyusui, adapun kekurangannya yaitu aliran menstruasi, bercak berulang, kemungkinan mengalami sakit punggung.
   d. Suntik 3 bulan merupakan langkah pencegahan kehamilan dengan menyuntikkan hrmon progesterone pada bokong ibu atau pada lengan atas ibu setiap 3 bulan sekali, adapun kekurangannya penggunaan jangka panjang menurunkan kepadatan tulang.
   e. Pil KB merupakan langkah pencegahan kehamilan dengan

mengkomsumsi rutin pil Kb, adapun kekurangannya dapat menyebabkan bercak diantara menstruasi, mual,muntah, sakit kepala dan tidak cocok bagi wanita yang pelupa

Hasil : ibu mengerti dan belum menentukan kontrasepsi yang diinginkan

dan ingin berdiskusi terlebih dahulu bersama suaminya.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE HARI KEDUA PADA NY"A" DENGAN KELUHAN ADA RASA MULES DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR TANGGAL 30 JUNI 2022

Nomor register	: 106xxx	
Tanggal masuk	: 29 Juni 2022	jam : 10.10 WITA
Tanggal partus	: 29 Juni 2022	jam : 16.45 WITA
Tanggal pengkajian	: 30 Juni 2022	jam : 07.30 WITA
Nama pengkaji	: Sitti aisyah	

IDENTITAS ISTERI/SUAMI

Nama	: Ny A / Tn R
Umur	: 19 Th / 28 Th
Nikah / Lamanya	: 1 Kali/ ±2 Tahun
Suku	: Makassar/ Makassar
Agama	: Islam/ Islam
Pendidikan	: Smp/ Smp
Pekerjaan	: Irt/ Swasta
Alamat	: Jl. Sunu

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu melahirkan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar, tanggal 29 Juni 2022 jam: 16.55WITA
2. Ibu belum BAB dan sudah BAK
3. Ibu mengatakan perutnya masih mules-mules
4. Ibu mengatakan ASI nya sudah lancar
5. Ibu mengeluh bdan terasa berat atau lelah dan merasa pusing namun tidak

mengganggu aktivitas

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan TTV
   a. TD : 120/80 mmHg
   b. N : 80x/menit
   c. S : 36,8 °C
   d. P : 20x/menit
4. Pemeriksaan fisik
   a. Wajah : tidak pucat, tidak ada cloasma, tidak oedema, dan tidak ada nyeri tekan
   b. Mata : simetris, sclera putih, konjungtiva merah muda
   c. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, limfe, dan vena Jugularis
   d. Payudara : simetris, hyperpigmentasi pada areola mammae, putting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, dan tampak pengeluaran ASI
   e. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU 2 jrbpst, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik, uterus teraba keras dan bundar
   f. Genitalia : terdapat jahitan perineum, tampak pengeluaran lochea rubra, ibu memakai pembalut, dan tidak terdapat tanda

tanda infeksi

ASSESSMENT (A)

P1A0, Postpartum hari kedua

PLANNING (P)

Tanggal 30 Juni 2022, Jam 07.30 WITA

1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan ibu baik-baik saja

   Hasil : ibu mengerti
2. Memberitahu ibu penyebab keluhan yang dirasakan adalah hal fisiologis pada ibu masa nifas. Rasa mules diakibatkan dari kontraksi uterus untuk mencegah perdarahan. Selain itu, selama masa nifas juga terjadi peningkatan suhu tubuh, sedikit pusing dan lemas yang diakibatkan karena kelelahan.

   Hasil : ibu mengerti
3. Mengajarkan ibu dan keluarga cara masase uterus yaitu dengan meletakkan satu tangan diatas perut ibu, lalu tekan dan putar searah jarum jam sampai perut ibu teraba keras dan bundar.

   Hasil : ibu dan keluarga mengerti serta bersedia melakukannya
4. Menganjurkan ibu banyak minum 8gelas/hari untuk membantu memperbanyak produksi ASI da menganjurkan ibu mengonsumsi makan bergizi seperti buah, kacang-kacangan, tempe, telur, daging dan sayuran hijau.

   Hasil : ibu mngerti

5. Memberikan ibu informasi tentang ASI eksklusif yaitu
   a. Memberikan ASI selama 6 bulan tanpa makanan tambahan
   b. Sumber kekebalan tubuh bagi bayi untuk mencegah bibit-bibit penyakit
   c. Untuk mencegah alergi pada bayi

   Hasil : ibu mengerti

6. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup yaitu minimal 8 jam/hari. Istrihat yang cukup dapat menambah energy ibu selama menyusui.

   Hasil : ibu bersedia melakukannya

7. Mengajarkan ibu cara perawatan payudara yaitu
   a. Pertama, usapkan baby oil atau minyak kelapa pada kedua telapak tangan
   b. Tempelkan kedua telapak tangan pada kedua payudara ibu
   c. Urut payudara kearah atas, kesamping lalu kebawah dan lepaskan tangan dari payudara. Gerakan ini dilakukan terus menerus sebanyak 20 kali.
   d. Setelah itu bersihkan payudara dari bekas minyak
   e. Anjurkan ibu menggunakan bra yang menyangga payudara

   Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

8. Memberitahu ibu tanda bahaya masa nifas yaitu
   a. Perdarahan postpartum
   b. Lochea berbau busuk

c. Sub-involusio uterus

d. Nyeri pada perut yang berlebihan

e. Pusing dan lemas berlebihan

f. Demam

g. Penyulit dalam menyusui

h. Infeksi pada luka perineum

Hasil : ibu mengerti

9. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya yaitu dengan mengganti celana dalam atau pembalut jika penuh, gunakan air bersih tiap kali BAB/BAK untuk mencegah infeksi

   Hasil : ibu bersedia melakukannnya

10. Mengajarkan ibu senam nifas yaitu sikap tubuh terlentang, kedua kaki lurus kedepan, angkat kedua tangan lurus ke atas sampai kedua telapak tangan bertemu, turunkan perlahan sampai kedua tangan terbuka lebar hingga sejajar dengan bahu, lakukan gerakan dengan mantap sehingga terasa otot sekitar tangan dan bahu terasa kencang.

    Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

11. Meanganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa melaksanakan berdoa dan melakukan shalat lima waktu

    Hasil : Ibu dan keluarga mengerti serta bersedia melakukannya

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CAREHARI KE TIGA PADA NY"A" DENGAN PERAWATAN TALI PUSATDI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR TANGGAL 01 JANUARI 2022

Nomor register	: 106xxx	
Tanggal masuk	: 29 Juni 2022	jam : 10.10 WITA
Tanggal partus	: 29 Juni 2022	jam : 16.45 WITA
Tanggal pengkajian	: 01 Juni 2022	jam : 08.30 WITA
Nama pengkaji	: Sitti aisyah	

IDENTITAS ISTERI/SUAMI

Nama	: Ny A / Tn R
Umur	: 19 Th / 28 Th
Nikah / Lamanya	: 1 Kali/ ±2 Tahun
Suku	: Makassar/ Makassar
Agama	: Islam/ Islam
Pendidikan	: Smp/ Smp
Pekerjaan	: Irt/ Swasta
Alamat	: Jl. Sunu

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan melahirkan 2 hari yang lalu tanggal 29 Juni 2022 jam 16.55 WITA
2. Ibu mengatakan BAB 1 kali sehari dan BAK 4-5 kali sehari
3. ASI sudah lancar

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan TTV
   a. TD : 120/80 mmHg
   b. N : 80 x/menit
   c. S : 36,8℃
   d. P : 20x/menit
4. Pemeriksaan fisik
   a. Wajah : tidak pucat, tidak ada cloasma, tidak oedema, dan tidak ada nyeri tekan
   b. Mata : simetris, sclera putih, konjungtiva merah muda
   c. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, limfe, dan vena Jugularis
   d. Payudara : simetris, hyperpigmentasi pada areola mammae, putting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, tampak pengeluaran ASI
   e. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU 3 jrbpst, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik, uterus teraba keras dan bundar
   f. Genitalia : terdapat jahitan perineum, tampak pengeluaran lochea rubra, ibu memakai pembalut, dan tidak terdapat tanda tanda infeksi

ASSESSMENT (A)

P1A1 postpartum hari ke tiga

PLANNING (P)

Tanggal 01 Juli 2022, Jam 08. 30 WITA

1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan ibu baik-baik saja

   Hasil : ibu mengerti

2. Memberikan konseling kepada ibu tentang perawatan tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari, yakni :

   a. Tali pusat dibersihkan menggunakan kasa steril. Tidak diperbolehkan membersihkan tali pusat menggunakan alcohol atau cairan lain yang dapat mengiritasi tali pusat. Tidak boleh memberikan salep, cream dan sebagainya untuk menghindari terjadinya infeksi. Jika selesai membersihkan tali pusat, maka tali pusat ditutup kembali menggunakan kasa steril.

   b. Jangan membiarkan bayi bersentuhan dengan benda dingin, dan tetap menjaga lingkungan sekitar bayi tetap hangat

   c. Mengganti popok bayi tiap kali basah (setelah BAB/BAK)

   Hasil : ibu sudah mengerti

3. Memberikan HE (health education) pada Ibu tentang

   a. Menjaga personal hygiene yaitu dengan mengganti celana dalam atau pembalut jika penuh, gunakan air bersih tiap kali BAB/BAK untuk mencegah infeksi

b. Istirahat yang cukup. Jika durasi tidur kurang dari waktu ideal, hal ini akan menyebabkan proses pembaharuan sel-sel tersebut akan berjalan secara tidak maksimal dan akan mengganggu proses pembuatan hemoglobin sehingga jumlah hemoglobin yang diproduksi tidak akan mencukupi kebutuhan tubuh
c. Mengonsumsi makanan yang bergizi. Kebutuhan kalori, protein dapat diperoleh dari telur, tahu, tempe, ikan dan susu. Zat besi yang diperlukan setiap hari dapat diperoleh dari daging, hati, telur dan 129 kedelai Kebutuhan asam folat (vitamin B) dan vitamin C dapat diperoleh dari misalnya jus jeruk, brokoli, dan juga roti.
d. Tablet fe yang berisi 60 mg besi dan 250 mg asam folat (1x1) dan vitamin C (1x1), tablet fe penting dalam pemenuhan zat besi dan cara mengkonsumsi yang benar juga akan mempengaruhi proses penyerapan zat besi.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE PADA NY"A" DENGAN KELUHAN LECET PADA PUTING PAYUDARA DI RUMAH IBU TANGGAL 08 JULI 2022

KUNJUNGAN NIFAS KE I

Tempat : Rumah Ny "A"

Tanggal : 08 Juli 2022

Jam : 16.10 WITA

IDENTITAS ISTERI/SUAMI

Nama : Ny A / Tn R

Umur : 19 Th / 28 Th

Nikah / Lamanya : 1 Kali/ ±2 Tahun

Suku : Makassar/ Makassar

Agama : Islam/ Islam

Pendidikan : Smp/ Smp

Pekerjaan : Irt/ Swasta

Alamat : Jl. Sunu

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu melahirkan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar, tanggal 29 Juni 2022 jam: 16.55WITA
2. Ibu mengatakan lecet pada puting payudara sebelah kanan
3. Ibu mengatakan ASI nya sudah lancar

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran composmentis

3. Pemeriksaan TTV

   e. TD : 120/80 mmHg

   f. N : 80x/menit

   g. S : 36,8 °C

   h. P : 20x/menit

4. Pemeriksaan fisik

   g. Wajah : tidak pucat, tidak ada cloasma, tidak oedema, dan tidak ada nyeri tekan

   h. Mata : simetris, sclera putih, konjungtiva merah muda

   i. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, limfe, dan vena Jugularis

   j. Payudara : simetris, hyperpigmentasi pada areola mammae, putting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, tampak pengeluaran ASI, tampak lecet pada puting payudara sebelah kanan

   k. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU pertengahan pusat simpisis, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik, uterus teraba keras
   dan bundar

   l. Genitalia : terdapat jahitan perineum, tampak pengeluaran lochea sanguilenta, ibu memakai pembalut, dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi

ASSESSMENT (A)

P1A0, minggu pertama postpartum

PLANNING (P)

Tanggal 08 Juli 2022, jam 16.10 WITA

1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan ibu baik-baik saja

   Hasil : ibu mengerti
2. Memberitahu ibu bahwa lecet pada puting payudara bisa disebabkan karena kesalahan pada teknik menyusui, bayi tidak menyusui sampai areola tertutup oleh mulut bayi. Bila bayi hanya menyusui pada putting susu maka bayi akan mendapatkan ASI sedikit, karena gusi bayi tidak menekan pada sinus latiferus, sedangkan pada ibunya akan merasa nyeri atau lecet pada putting payudara.

   Hasil : ibu mengerti
3. Mengajarkan ibu cara dan posisi menyusui yang benar
   a. Cuci tangan dengan air bersih yang mengalir
   b. Perah sedikit ASI dan oleskan ke puting dan areola disekitarnya. Manfaatnya adalah sebagai desinfektan dan menjaga kelembaban putting susu.
   c. Ibu duduk senyaman mungkin, kaki tidak boleh menggantung.
   d. Posisikan bayi. Bayi dipegang dengan satu lengann. Kepala bayi diletakkan dekat lengkungan siku ibu, bokong bayi ditahan dengan telapak tangan.

e. Perut bayi menempel ke tubuh ibu

f. Mulut bayi berada di depan puting susu ibu

g. Telinga dan lengan berada pada satu garis lurus

h. Tangan kanan memegang payudara sambil merangsang mulut bayi dengan puting payudara ibu. Jika mulut bayi sudah membuka maka dengan cepat memasukkan puting ke dalam mulut bayi sampai sebagian besar areola terutama bagian bawah masuk kedalam mulut bayi.

Hasil : ibu dan keluarga mengerti serta bersedia melakukannya

4. Memberitahukan pada ibu bahwa putting susu yang lecet dapat di istirahatkan 1 x 24 jam dan biasanya akan sembuh sendiri dalam 2 x 24 jam. Olesi puting dengan ASI akhir (*hind milk*), daan tidak memberikan salep, cream atau obat-obatan lain.

   Hasil : ibu mengerti

5. Memberitahukan ibu untuk tetap mengeluarkan ASI menggunakan tangan untuk tetap mempertahankan kelancaran pembentukan ASI

   Hasil : ibu mengerti

6. Memberitahukan kepada ibu untuk menyusui bayinya secara bergantian antara payudara kana dan kiri untuk menghindari bendungan ASI

   Hasil : ibu mengerti

7. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya setiap 4 jam atau setiap kali bayinya merasa lapar.

   Hasil : ibu bersedia

8. Menganjurkan ibu banyak minum 8gelas/hari untuk membantu memperbanyak produksi ASI da menganjurkan ibu mengonsumsi makan bergizi seperti buah, kacang-kacangan, tempe, telur, daging dan sayuran hijau.

   Hasil : ibu mngerti

9. Memberikan ibu informasi tentang ASI eksklusif yaitu
   d. Memberikan ASI selama 6 bulan tanpa makanan tambahan
   e. Sumber kekebalan tubuh bagi bayi untuk mencegah bibit-bibit penyakit
   f. Untuk mencegah alergi pada bayi

   Hasil : ibu mengerti

10. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup yaitu minimal 8 jam/hari. Istrihat yang cukup dapat menambah energy ibu selama menyusui.

    Hasil : ibu bersedia melakukannya

11. Mengajarkan ibu cara perawatan payudara yaitu
    a. Pertama, usapkan baby oil atau minyak kelapa pada kedua telapak tangan
    b. Tempelkan kedua telapak tangan pada kedua payudara ibu
    c. Urut payudara kearah atas, kesamping lalu kebawah dan kedepan lalu lepaskan tangan secara perlahan dari payudara. Gerakan ini dilakukan terus menerus sebanyak 20 kali.
    d. Setelah itu bersihkan payudara dari bekas minyak
    e. Anjurkan ibu menggunakan bra yang menyangga payudara

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

12. Memberitahu ibu tanda bahaya masa nifas yaitu
    a. Perdarahan postpartum
    b. Lochea berbau busuk
    c. Sub-involusio uterus
    d. Nyeri pada perut yang berlebihan
    e. Pusing dan lemas berlebihan
    f. Demam
    g. Penyulit dalam menyusui
    h. Infeksi pada luka perineum

    Hasil : ibu mengerti
13. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya yaitu dengan mengganti celana dalam atau pembalut jika penuh, gunakan air bersih tiap kali BAB/BAK untuk mencegah infeksi

    Hasil : ibu bersedia melakukannnya.
14. Mengajarkan ibu senam nifas yaitu sikap tubuh terlentang, kedua kaki lurus kedepan, angkat kedua tangan lurus ke atas sampai kedua telapak tangan bertemu, turunkan perlahan sampai kedua tangan terbuka lebar hingga sejajar dengan bahu, lakukan gerakan dengan mantap sehingga terasa otot sekitar tangan dan bahu terasa kencang.

    Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya
15. Meanganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa melaksanakan berdoa dan melakukan shalat lima waktu

    Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CAREMINGGU KETIGA PADA NY"A"DI RUMAH IBU TANGGAL 23 JULI 2022

KUNJUNGAN NIFAS KE II

Tempat : Rumah Ny "A"

Tanggal : 23 Juli 2022

Jam : 15.30 WITA

IDENTITAS ISTERI/SUAMI

Nama : Ny A / Tn R

Umur : 19 Th / 28 Th

Nikah / Lamanya : 1 Kali/ ±2 Tahun

Suku : Makassar/ Makassar

Agama : Islam/ Islam

Pendidikan : Smp/ Smp

Pekerjaan : Irt/ Swasta

Alamat : Jl. Sunu

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan melahirkan tanggal 29 Juni 2022 jam 16.45 WITA
2. Ibu mengatakan BAB 1 kali sehari dan BAK 4-5 kali sehari
3. Ibu mengatakan lecet pada puting payudara sudah sembuh
4. ASI sudah lancar
5. Ibu mengkonsumsi tablet Fe

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan TTV
   a. TD : 110/70 mmHg
   b. N : 80 x/menit
   c. S : 36,6 ℃
   d. P : 20x/menit
4. Pemeriksaan fisik
   a. Wajah : tidak pucat, tidak ada cloasma, tidak oedema, dan tidak ada nyeri tekan
   b. Mata : simetris, sclera putih, konjungtiva merah muda
   c. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, limfe, dan vena Jugularis
   d. Payudara : simetris, hyperpigmentasi pada areola mammae, putting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, tampak pengeluaran ASI
   e. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU tidak teraba diatas simpisis, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik, uterus teraba keras
      dan bundar
   f. Genitalia : terdapat jahitan perineum, tampak pengeluaran lochea alba, ibu memakai pembalut, dan tidak terdapat tanda

tanda infeksi

ASSESSMENT (A)

P1A1 3 minggu postpartum

PLANNING (P)

Tanggal 23 Juni 2022, Jam 15.30 WITA

1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan ibu baik-baik saja

   Hasil : ibu mengerti

2. Memberikan konseling kepada ibu tentang perawatan tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari, yakni :

   Tali pusat dibersihkan menggunakan kasa steril. Tidak diperbolehkan membersihkan tali pusat menggunakan alcohol atau cairan lain yang dapat mengiritasi tali pusat. Tidak boleh memberikan salep, cream dan sebagainya untuk menghindari terjadinya infeksi. Jika selesai membersihkan tali pusat, maka tali pusat ditutup kembali menggunakan kasa steril.

3. Jangan membiarkan bayi bersentuhan dengan benda dingin, dan tetap menjaga lingkungan sekitar bayi tetap hangat

4. Mengganti popok bayi tiap kali basah (setelah BAB/BAK)

Hasil : ibu sudah mengerti

5. Memberikan HE (health education) pada Ibu tentang
    a. Menjaga personal hygiene yaitu dengan mengganti celana dalam atau pembalut jika penuh, gunakan air bersih tiap kali BAB/BAK untuk mencegah infeksi
    b. Istirahat yang cukup. Jika durasi tidur kurang dari waktu ideal, hal ini akan menyebabkan proses pembaharuan sel-sel tersebut akan berjalan secara tidak maksimal dan akan mengganggu proses pembuatan hemoglobin sehingga jumlah hemoglobin yang diproduksi tidak akan mencukupi kebutuhan tubuh
    c. Mengonsumsi makanan yang bergizi. Kebutuhan kalori, protein dapat diperoleh dari telur, tahu, tempe, ikan dan susu. Zat besi yang diperlukan setiap hari dapat diperoleh dari daging, hati, telur dan 129 kedelai Kebutuhan asam folat (vitamin B) dan vitamin C dapat diperoleh dari misalnya jus jeruk, brokoli, dan juga roti.
    d. Tablet fe yang berisi 60 mg besi dan 250 mg asam folat (1x1) dan vitamin C (1x1), tablet fe penting dalam pemenuhan zat besi dan cara mengkonsumsi yang benar juga akan mempengaruhi proses penyerapan zat besi.

    Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan
6. Memberikan ibu informasi tentang ASI eksklusif yaitu
    a. Memberikan ASI selama 6 bulan tanpa makanan tambahan
    b. Sumber kekebalan tubuh bagi bayi untuk mencegah bibit-bibit penyakit

c. Untuk mencegah alergi pada bayi

Hasil : ibu mengerti

7. Mengajarkan ibu cara perawatan payudara yaitu
    a. Pertama, usapkan baby oil atau minyak kelapa pada kedua telapak tangan
    b. Tempelkan kedua telapak tangan pada kedua payudara ibu
    c. Urut payudara kearah atas, kesamping lalu kebawah dan kedepan lalu lepaskan tangan secara perlahan dari payudara. Gerakan ini dilakukan terus menerus sebanyak 20 kali.
    d. Setelah itu bersihkan payudara dari bekas minyak
    e. Anjurkan ibu menggunakan bra yang menyangga payudara

    Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

8. Memberitahu ibu tanda bahaya masa nifas yaitu
    a. Perdarahan postpartum
    b. Lochea berbau busuk
    c. Sub-involusio uterus
    d. Nyeri pada perut yang berlebihan
    e. Pusing dan lemas berlebihan
    f. Demam
    g. Penyulit dalam menyusui
    h. Infeksi pada luka perineum

    Hasil : ibu mengerti

9. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya yaitu dengan mengganti celana dalam atau pembalut jika penuh, gunakan air bersih tiap kali BAB/BAK untuk mencegah infeksi

   Hasil : ibu bersedia melakukannnya.

10. Mengajarkan ibu senam nifas yaitu sikap tubuh terlentang, kedua kaki lurus kedepan, angkat kedua tangan lurus ke atas sampai kedua telapak tangan bertemu, turunkan perlahan sampai kedua tangan terbuka lebar hingga sejajar dengan bahu, lakukan gerakan dengan mantap sehingga terasa otot sekitar tangan dan bahu terasa kencang.

    Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

11. Meanganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa melaksanakan berdoa dan melakukan shalat lima waktu

    Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

Kunjungan	Hari, Tanggal dan Jam	Tempat	Keluhan	Hasil Pemeriksaan
1	Rabu, 29 Juni 2022 Pukul 10 : 10 WITA	RSIA Sitti Khadijah I Makassar	f. Ibu masuk dengan keluhan adanya pengeluaran air pervaginam g. Riwayat Keluhan Utama Air yang keluar sedikit demi sedikit dan bertambah banyak hingga sarung basah, berwarna jernih dan tidak berbau. Ibu adalah rujukan dari puskesmas Ujungpandang Baru dengan keluhan ada keluar cairan berwarna jernih pada tanggal 29 Juni 2022 (±3jam sebelum sampai ke rumah sakit) satu sarung basah akibat cairan yang keluar, ibu tidak merasakan mules atau nyeri perut tembus belakang. Riwayat pemeriksaan di puskesmas yaitu his /kontraksi tidak ada, pembukaan 1 cm, dan riwayat pemeriksaan kertas lakmus di puskesmas positif yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru yang menandakan air ketuban. h. Riwayat Menstruasi 12. Menarche: 14 tahun 13. Siklus : 28-30 hari 14. Lamanya : 5-7 hari 15. Banyaknya : 2-3 kali ganti pembalut seiap hari 16. Teratur/tidak : teratur 17. Sifat darah : encer	12. Keadaan umum ibu baik 13. Kesadaran composmentis 14. Hari tafsiran persalinan tanggal 01 Juli 2022 15. Usia gestasi kehamilan 39 minggu 5 hari 16. Tanda-tanda vital Tekanan darah : 120/80mmHg Suhu :36,8°C Nadi : 80 x/i Pernapasan : 20x/i 17. Tinggi badan : 154 cm 18. Berat badan sebelum hamil : 45 kg 19. Berat badan sekarang : 56 kg 20. Lingkar lengan atas (LILA): 23 cm 21. Pemeriksaan fisik (*head to toe*) m. Kepala : bersih, tidak ada ketombe, tidak rontok, rambut hitam dan lurus, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan n. Wajah : tidak pucat, tidak ada chloasma gravidarum, tidak oedema, tidak ada nyeri tekan o. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah mudah, schlera putih, kelopak mata tidak bengkak p. Hidung : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak pengeluaran secret, tidak

			18. Disminore : tidak ada i. Riwayat Perkawinan Ibu menikah 1x secara sah dengan Tn R pada tahun 2021 saat Ny A berusia 17 tahun dan Tn S berusia 26 tahun. j. Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu Tidak ada data yang menunjang k. Riwayat nifas yang lalu l. Tidak ada data yang menunjang m. Riwayat kehamilan yang sekarang 10) Hari pertama haid terakhir tanggal 25 September 2021 11) Hari tafsiran persalinan tanggal 01 Juli 2022 12) Umur kehamila 39 minggu 5 hari 13) Menurut ibu kehamilannya ± 9 bulan 14) Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dirasakan pada perut sebelah kiri dan dirasakan sampai sekarang. 15) Ibu memeriksakan kehamilannya 7 kali di puskesmas Trimester I : 2 kali Trimester II : 2 kali Trimester III :3 kali 16) Ibu telah mendapatkan suntikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) sebanyak 1 kali pada tanggal 01 februari 2022 17) Keluhan-keluhan Trimester I : mual dan muntah berlebihan	oedema, tidak ada nyeri tekan, tidak ada polip q. Mulut dan gigi : bersih, bibir merah muda dan tidak pecah-pecah, tidak ada caries, tidak ada karang gigi, tidak ada stomatitis, gusi tidak berdarah, dan tidak ada gigi yang tanggal r. Telinga : simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran serumen, tidak ada peradangan, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan s. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, kelenjar limfe dan vena jugularis t. Payudara : payudara simetris kiri dan kanan, putting susu bersih dan menonjol, tampak hiperpigmentasi pada areola, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, terdapat pengeluaran kolostrum jika putting susu dipencet u. Abdomen : Leopold I : 2 jrbpx, 30 cm, bokong Leopold II : PUKA Leopold III : kepala Leopold IV : BDP 5/5 LP : 98 cm TBJ : 2.940 gram DJJ : 130x/i His :1x10 menit durasi 5-10 detik

			Trimester II : tidak ada keluhan Trimester III :sering kencing dan nyeri perut bagian bawah 18) Penyuluhan Ibu tidak pernah mendapat penyuluhan apapun h. Riwayat keluhan sekarang dan yang lalu 1) Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes mellitus, asma dan hipertensi 2) Tidak ada riwayat penyakit menular, tuberculosis, malaria, dan penyakitmenular seksual 3) Tidak ada riwayat alergi makanan maupun obat-obatan 4) Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah diopname di rumahsakit dan di puskesmas. i. Riwayat Penyakit Keluarga Didalam keluarga tidak ada riwayat penyakt jantung, hipertensi, diabetesmellitus, asma dan penyakit serius lainnya. j. Riwayat Sosial, Ekonomi,Psikososial Dan Spiritual 1) Yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah suami 2) Hubungan ibu dengan suami, keuarga maupun tetangga baik	v. Ekstremitas atas : jari lengkap, pergerakan aktif, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan w. Ekstremitas bawah : tidak ada varises, pergerakan aktif, tidak ada benjolan, tidak oedema x. Genitalia dan anus : tidak ada varises, nampak pengeluaran lendir dan air ketuban, tidak ada oedema, tidak ada hemoroid 22. Pemeriksaan dalam *Vaginal toucher* (VT) tanggal 29 Juni 2022, jam: 10.10 WITA a. Vulva Dan Vagina : Normal b. Portio : Tebal c. Pembukaan : 1 cm d. Ketuban : Jernih (Merembes) e. Presentase : - f. Penurunan : Hodge I g. Molase : Tidak Ada h. Penumbungan : Tidak Ada i. Kesan Panggul : Normal j. Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban 12. Pemeriksaan tes *valsava* Tanggal 29 Juni 2022, jam: 10.15 WITA Hasil pemeriksaan tes valsava yaitu terdapat pengeluaran air ketuban merembes 13. Pemeriksaan penunjang Pemeriksaan laboratorium (sampel darah)

			3) Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami 4) Bu rajn beribadah dan berdoa untuk kelancaran persalinannya k. Riwayat KB Ibu tidak pernah menjadi akseptor kb sebelumnya l. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi 1) Kebutuhan nutrisi Kebiasaan a) Pola makan : Nasi, sayur dan lauk b) Rekuensi : 3 kali sehari c) Kebutuhan nutrisi : 6-8 gelas per hari Selama inpartu : Ibu makan, tetapi hanya sedikit demi sedikit dan lebihbanyak minum. 2) Kebutuhan Eliminasi Kebiasaan: a) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau amniak b) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning. Selama inpartu : a) BAK : ibu BAK di tempat tidur karena telah terpasang popok b) BAB : ibu belum BAB	1) WBC : 9.4x103 /µL 2) RBC : 4.43x106 /µL 3) HGB : 11.02g/dl 4) HCT : 34,7% 5) MCV : 7.83fL 6) MCH : 32.7pg 7) MCHC : 31.7 g/dl 8) HbsAG : negatif (-) **KALA II** 7. Perineum menonjol 8. Vulva dan vagina membuka 9. His 5x dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik 10. Pembukaan 10cm (lengkap) 11. Penurunan kepala hodge IV (0/5) 12. Pelepasan lendir, darah dan air ketuban **KALA III** a. Bayi lahir spontan tanggal 29 Juni 2022, jam: 16.55 WITA b. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar c. Tinggi fundus uteri setinggi pusat d. Perdarahan 300 ± cc e. Kala II berlangsung selama ±15 menit tanpa ada penyulit serta tali pusatmasih Nampak di vulva. **KALA IV** a. Ibu tampak lelah setelah menjalani persalinannya b. Plasenta lahir lengkap pada tanggal 29 Juni

			3) Personal hygine Kebiasaan : a) Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi b) Sikat gigi : 2 kali sehari (setelah makan dan sebelum tidur) denganmenggunakan pasta gigi. c) Keramas : 3 kali seminggu menggunakan shampo d) Ganti pakaian : 2 kali sehari Selama inpartu : a) Ibu belum mandi dan sikat gigi 4) Kebutuhan istirahat dan tidur Kebiasaan: a). Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam Selama inpartu: a). Ibu tidak pernah tidur **KALA II** 5. Sakitnya bertambah kuat dan tembus belakang 6. Ibu merasa ingin buang air besar	2022, jam: 17.00 WITA c. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) d. Tinggi fundus uteri setinggi pusat e. Perdarahan ± 200 cc f. kandung kemih kosong

			7. Adanya dorongan kuat untuk meneran 8. Adanya tekanan pada anus **KALA III** 1. Ibu lelah setelah melahirkan 2. Ibu merasakan nyeri perut bagian bawah **KALA IV** 1.Ibu lelah setelah selesai persalinannya 2. Ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah	
2	Kamis, 30 Juni 2022 Pukul 08:30 WITA	RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar	1. Ibu melahirkan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar, tanggal 29 Juni 2022 jam: 16.55WITA 2. Ibu belum BAB dan sudah BAK 3. Ibu mengatakan perutnya masih mules-mules 4. Ibu mengatakan ASI nya sudah lancar 5. Ibu mengeluh badan terasa berat atau lelah dan merasa pusing namun tidak mengganggu aktivitas	1. Keadaan umum baik 2. Kesadaran composmentis 3. Pemeriksaan TTV a. TD : 120/80 mmHg b. N : 80x/menit c. S : 36,8 ℃ d. P : 20x/menit 4. Pemeriksaan fisik m. Wajah : tidak pucat, tidak ada cloasma, tidak oedema, dan tidak ada nyeri tekan n. Mata : simetris, sclera putih, konjungtiva merah muda o. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, limfe, dan vena jugularis p. Payudara : simetris, hyperpigmentasi pada areola mammae, putting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan,dan tampak pengeluaran ASI

				q. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU 2 jrbpst, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik, uterus teraba kerasdan bundar r. Genitalia : terdapat jahitan perineum, tampak pengeluaran lochea rubra, ibu memakai pembalut, dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi
3	Jumat, 01 Juli 2022 Pukul 08:30 WITA	RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar	4. Ibu mengatakan melahirkan 2 hari yang lalu tanggal 29 Juni 2022 jam 16.45 WITA 5. Ibu mengatakan BAB 1 kali sehari dan BAK 4-5 kali sehari 6. ASI sudah lancar	5. Keadaan umum baik 6. Kesadaran komposmentis 7. Pemeriksaan TTV e. TD : 120/80 mmHg f. N : 80 x/menit g. S : 36,8°C h. P : 20x/menit 8. Pemeriksaan fisik g. Wajah : tidak pucat, tidak ada cloasma, tidak oedema, dan tidakada nyeri tekan h. Mata : simetris, sclera putih, konjungtiva merah muda i. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, limfe, dan vena jugularis j. Payudara : simetris, hyperpigmentasi pada areola mammae, putting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, tampak pengeluaran ASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

				k. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU 3 jrbpst, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik, uterus teraba kerasdan bundar l. Genitalia : terdapat jahitan perineum, tampak pengeluaran lochea rubra, ibu memakai pembalut, dan tidak terdapat tandatanda infeksi
4	Jumat, 08 Juli 2022 Pukul16:10 WITA	Rumah Ibu	1. Ibu melahirkan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar, tanggal 29 Juni 2022 Pukul 16.55WITA 2. Ibu mengatakan lecet pada puting payudara sebelah kanan 3. Ibu mengatakan ASI nya sudah lancar	1. Keadaan umum baik 2. Kesadaran komposmentis 3. Pemeriksaan TTV i. TD : 120/80 mmHg j. N : 80 x/menit k. S : 36,8°C l. P : 20x/menit 4. Pemeriksaan fisik a. Wajah : tidak pucat, tidak ada cloasma, tidak oedema, dan tidak ada nyeri tekan b. Mata : simetris, sclera putih, konjungtiva merah muda c. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, limfe, dan vena jugularis d. Payudara : simetris, hyperpigmentasi pada areola mammae, putting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, tampak pengeluaran ASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

				e. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU pertengahan pusat-simpisis, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik, uterus teraba kerasdan bundar f. Genitalia : terdapat jahitan perineum, tampak pengeluaran lochea sanguilenta, ibu memakai pembalut, dan tidak terdapat tandatanda infeksi
5	Sabtu, 23 Juli 2022 Pukul 15 : 30 WITA	Rumah Ibu	6. Ibu mengatakan melahirkan tanggal 29 Juni 2022 jam 16.45 WITA 7. Ibu mengatakan BAB 1 kali sehari dan BAK 4-5 kali sehari 8. Ibu mengatakan lecet pada puting payudara sudah sembuh 9. ASI sudah lancar 10. Ibu mengkonsumsi tablet Fe	1. Keadaan umum baik 2. Kesadaran komposmentis 3. Pemeriksaan TTV a. TD : 120/80 mmHg b. N : 80 x/menit c. S : 36,8℃ d. P : 20x/menit 4. Pemeriksaan fisik a. Wajah : tidak pucat, tidak ada cloasma, tidak oedema, dan tidak ada nyeri tekan b. Mata : simetris, sclera putih, konjungtiva merah muda c. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, limfe, dan vena jugularis d. Payudara : simetris, hyperpigmentasi pada areola mammae, putting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, tampak pengeluaran ASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

				e. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU tidak teraba diatas simpisis, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik, uterus teraba keras dan bundar f. Genitalia : terdapat jahitan perineum, tampak pengeluaran lochea alba, ibu memakai pembalut, dan tidak terdapat tanda tanda infeksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesenjangan yang terjadi antara tinjauan pustaska dan studi kasus dalam penerapan proses asuhan kebidanan intranatal pada Ny "A" dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar tanggal 29 Juni 2022. Pembahasan ini disusun berdasarkan teori dari asuhan yang nyata dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari tujuh langkah.

Dalam pembahasan ini akan diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan tujuh langka varney yakni, pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan

A. Langkah I Identifikasi Data Dasar

Dalam pengkajian yang dimulai dari pengumpulan data berupa anamn esa serta data-data yang dapat ditemukan saat melakukan anamnesa yang dapat mendukung terjadinya kasus tersebut. Setelah dilakukan anamnesa, dilakukan pemeriksaan fisik berupa inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Selain pemeriksaan fisik, juga dilakukan pemeriksaan dalam untuk memantau kemajuan persalinan, khususnya untuk memastikan pecahnya selaput ketuban dan juga dengan pemeriksaan *tes valsava*.

Tes valsava dilakukan dengan cara melakukan ekspirasi paksa dengan menutup mulut dan hidung yang akan menambah tekanan pada telinga dan

tekanan pada bagian fundus, sehingga jika terjadi KPD, maka air ketuban akan keluar (Fadlun, 2011 : 114).Kemudian pemeriksaan laboratorium.

Dalam tahapan pengkajian, penulis tidak mendapat hambatan. Hal ini karena respon kooperatif ibu yang dapat menerima kehadiran penulis saat pengumpulan data sampai tindakan yang diberikan. Ibu menunjukkan sikap terbuka dan menerima anjuran serta saran yang diberikan oleh penulis maupun tenaga medis lainnya dalam memberikan asuhan kebidanan.

Pada kasus Ny A didapatkan riwayat keluhan masuk rumah sakit ibu dirujuk oleh bidan dari Puskesmas berupa terdapat pengeluaran air ketuban dari jalan lahir pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 10.10 wita, dengan kontraksi 1x10 menit durasi 5-10 detik. Ibu. Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 1 cm, air ketuban merembes dan berwarna jernih. Selain itu, data yang didapatkan dari seorang bidan yang merujuk yaitu riwayat pemeriksaan tes lakmus di Puskesmas yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru, yang menandakan pelepasan air yang keluar yaitu air ketuban ibu mengatakan ini kehamilannya yang pertama dan tidak pernah mengalami keguguran. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhir ibu 25 September 2021 dan usia kehamilan sekaran yaitu ± 9 bulan, ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak 7 kali di Puskesmas Ujungpandang Baru dan telah mendapat suntikan TT 1 kali pada tanggal 01 februari 2022. Ibu tidak pernah menderita penyakit asma, DM, jantung, hipertensi dan jantung. Serta ibu tidak memiliki penyakit menular dan menurun.

Tindakan yang dilakukan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar yakni pengumpulan data subjektif yang terdiri dari alasan utama ibu masuk Rumah

sakit, riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu, riwayat nifas yang lalu, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat kebutuhan dasar ibu. Sementara itu, dilakukan pula pengumpulan data objektif yang terdiri dari pemeriksaan umum ibu, pemeriksaan fisik (head to toe), pemeriksaan dalam dan pemeriksaan tes valsava. Terakhir yaitu pemeriksaan penunjang pemeriksaan laboratorium (sampel darah).

Meskipun terdapat perbedaan antara riwayat tindakan yang dilakukan di puskesmas dengan tindakan yang dilakukan di rumah sakit, yaitu pemeriksaan tes lakmus yang dilakukan di Puskesmas dan pada umumnya pemeriksaan kertas lakmus di Rumah sakit tidak dilakukan pada kasus KPD. Meskipun demikian, riwayat tindakan yang telah dilakukan di Puskesmas yang berbeda dengan tindakan yang dilakukan di Rumah sakit, hal tersebut dapat saling membantu untuk pengumpulan data dalam menegakkan diagnosis.

KPD merupakan pecahnya ketuban sebelum inpartu yaitu bila pembukaan serviks pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm (Sepduwiana, 2011 : 144). Ibu primipara yang melahirkan berbeda dengan multipara atau ibu yang pernah melahirkan sebelumnya. Umumnya kecepatan pembukaan ibu primipara 1 cm/jam dan kecepatan pembukaan ibu multipara yaitu 2 cm/jam, atau tergantung elastistas kulit ibu (Wahyuningsih, 2022:9). Pada langkah pertama, penulis tidak mendapatkan kesenjangan antara teori dan kasus yang terjadi dilapangan.

B. Langkah II Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual

Dalam menegakkan suatu diagnosa kebidanan, didukung dan ditunjang oleh beberapa data, dan dilakukan identifikasi yang benar tehadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan, diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, seperti diagnosis, tetapi sungguh membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan pengarahan.

Pada kasus Ny “A”, telah dilakukan pengumpulan data subjektif yaitu Ny “A” mengatakan adanya pengeluaran air dari jalan lahir sedikit demi sedikit hingga sarung basah., data objektif di dapaatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, dari hasil pemeriksaan dalam jam 10.10 WITA di dapatkan vulva dan vagina normal, portio tebal, pembukaan 1 cm, ketuban pecah, presentasi uuk kanan lintang, penurunan hodge 1 molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir, darah dan air ketuban. , maupun data penunjang yaitu pemeriksaan tes lakmus. sehingga berdasarkan data yang didapatkan, maka penulis menyimpulkan bahwa diagnosa atau masalah aktual yang dirumuskan yaitu KPD. Oleh karena itu tidak terdapat kesenjangan antara teori dan data yang diperoleh.

C. Langkah III Antisipasi Diagnosa/ Masalah Potensial

Pada perumusan diagnosa/ masalah potensial akan dibahas tentang kemungkinan terjadi hal yang lebih fatal apabila apa yang menjadi masalah aktual tidak segera ditangani. Pada tinjauan pustaka, masalah potensial yang dapat terjadi yaitu infeksi intrapartal/ dalam persalinan, infeksi puerperalis/ masa nifas, dry labour/ partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan operatif obstetric (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal. Sedangkan pada janin yaitu prematuritas (respiratory distress syndrome, hypothermia, neonatal feeding problem, retinopathy of premturit, intraventricular hemorrhage, necroticing enterecolitis, brain disorder (and risk of cerebral palsy, hyperbilirubinemia, anemia, sepsis), prolaps funiculli/ penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder (kompresi tali pusat, prolaps uteri, dry labour/partus lama, APGAR score rendah, ensefalopaty, cerebral palsy, perdarahan intracranial, renal failure, respiratory distress), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marmi dkk, 2016 : 105-106).

Pada kasus ini, penulis tidak menemukan tanda-tanda infeksi atau komplikasi yang mungkin akan terjadi pada ibu maupun janin karena penanganan ibu bersalin atas indikasi KPD dengan tindakan pemasangan infus, pemberian obat uterotonika dan pemberian obat antibiotic telah sesuai dengan teori, sehingga tidak ada diagnosa potensial terjadi dan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

D. Langkah IV Identifikasi Perlunya Tindakan Segera/ Kolaborasi

Beberapa data yang memberikan indikasi adanya tindakan segera yang harus dilakukan guna untuk menyelamatkan klien. Tindakan tersebut berupa kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih professional (dokter obgyn). Pada tinjauan pustaka, tindakan segera/kolaborasi pada KPD adalah mengkolaborasikan dengan dokter untuk pemasangan infus, pemberian uterotonika dan pemberian antibiotik.

Pada studi Ny "A" tindakan segera yang dilakukan adalah kolaborasi dengan dokter dalam menangani persalinan dengan KPD yaitu pemasangan infus RL 28 tetes per menit pada jam 10.20 WITA, pemasangan misoprostol 1/8 tab pervaginam pada jam 10.25 WITA, pemberian antibiotic cefotaxime 1 gr/IV pada jam 10.30 WITA, dilakukan pemeriksaan dalam jam 10.10 WITA yang di dapatkan pembukaan 1 cm, ketuban pecah, presentase uuk kanan lintang penurunan hodge I pelepasan lendir, darah dan air ketuban. Dilanjutkan pemantauan DJJ,nadi his tiap 1 jam pada jam 10.10 WITA hingga 13.10 WITA. Dilanjutkan VT II pada jam 13.10 WITA di dapatkan pembukaan 5 cm ketuban pecah presentase uuk kanan lintang penrunan hodge II pelepasan lendir, darah dan air ketuban. Pemantauan DJJ, nadi, his tiap 30 menit pada 13.10 WITA hinggan 16.40 WITA. Dilakukan VT III pada jam 16.40 WITA di dapatkan pembukaan 10 cm (lengkap), ketuban pecah, presentase uuk depan, penurunan hodge IV, pelepasan lendir, darah dan air ketuban. Persalinan berlangsung normal.

Dalam kasus ini tidak ada perbedaan yang ditemukan antara teori dan tindakan yang diberikan pada Ny “A” yang tetap mengacu pada tindakan sesuai kebutuhan klien.

E. Langkah V Rencana Tindakan

Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosis kebidanan dan masalah potensial yang akan terjadi. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut, menganjurkan ibu untuk berdoa dan berdzikir untuk kelancaran persalinannya dengan membaca firman Allah swt QS surah An-Nahl/16:78

وَٱللَّهُ أَخۡرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٧٨

Terjemahnya :

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengtahui sesuatupun, dan dia memberimu pendengaran, pengliatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur (Kementrian Agama RI, 2014:275)

Pada studi kasus Ny “A”, penulis merencanakan tindakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/ masalah aktual dan masalah potensial yang akan terjadi, rencana tersebut yaitu pemasangan infus RL 28 tetes per menit, pemasangan misoprostol 1/8 tab pervaginam, pemberian antibiotik cefotaxime 1 gr/ IV dan memantau keadaan ibu dan janin sampai persalinan berlangsung normal. Dalam rencana tindakan asuhan kebidanan pada kasus Ny “A”, tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus yang ada dilapangan.

F. Langkah VI pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan

Semua rencana telah dilaksanakan seluruhnya dengan menyesuaikan kondisi, keadaan dan kebutuhan ibu, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022 di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar yaitu Pada studi Ny "A" kolaborasi dengan dokter dalam menangani persalinan dengan KPD yaitu pemasangan infus RL 28 tetes per menit pada jam 10.20 WITA, pemasangan misoprostol 1/8 tab pervaginam pada jam 10.25 WITA, pemberian antibiotic cefotaxime 1 gr/IV pada jam 10. 30 WITA. Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan, penulis tidak menemukan hambatan, karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien dan keluarga serta dukungan, bimbingan dan asuhan dari pembimbing dilahan praktek.

G. Langkah VII evaluasi hasil asuhan kebidanan

Adapun evaluasi yang dimaksudkan untuk memperoleh atau memberi nilai terhadap intervensi yang dilakukan berdasarkan tujuan kriteria yang diberikan kepada Ny "A" di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar tanggal 29 Juni 2022 yaitu pada kala 1 berlangsung tidak lebih dari 6 jam, keadaan ibu dan janin baik, dan tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu dan bayi.

Selanjutnya yaitu kala II juga berlangsung normal tanpa ada penyulit, bayi lahir spontan tanggal 29 Juni 2022, jam 16.55 wita, menangis kuat, bernapas tanpa bantuan serta bergerak aktif. Pada kala III, tidak ada penyulit dan berlangsung normal, berlangsung ± 5 menit, kotiledon dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 18 juli 2018 jam 17.00 wita, TFU setinggi pusat, perdarahan ± 200 cc, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), serta keadaan ibu dan bayi baik.

Terakhir yaitu kala IV atau kala pengawasan, pada kala IV kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), jumlah perdarahan ± 200 cc, kandung kemih kosong dan keadaan ibu dan bayi baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari kala I sampai dengan kala IV, semuanya berlangsung normal, tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu maupun janin. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung di lahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan pada Ny "A" dengan ketuban pecah dini (KPD) di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar tanggal 29 Juni 2022, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa pengertian tentang KPD, jika dilihat dari pembukaan serviks, maka KPD diartikan sebagai pecahnya ketuban sebelum inpartu yaitu bila pembukaan serviks pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm (Sepduwiana, 2011 : 144). Sedangkan jika dilihat dari kapan pecahnya ketuban, maka KPD dapat diartikan sebagai pecahnya ketuban sebelum ada tanda-tanda persalinan dan ditunggu satu jam belum dimulainya tanda persalinan (Aisyah dan Oktarina, 2012 : 1).
2. Setelah dilakukan pengkajian pada tanggal 29 Juni 2022, maka ditemukan bahwa tidak ada penyulit bagi ibu maupun janin dan keadaan ibu dan janin baik yang dilihat bahwa tanda-tanda vital dalam batas normal, tekanan darah: 110/80 mmHg, nadi: 83x/ menit, pernapasan: 24x/ menit, S: 36,7OC, denyut jantung janin dengan frekuensi 132x/ menit. Ibu melahirkan pada tanggal 18 juli 2018 pukul 16.55 wita dengan berat bayi lahir 3400 gram, panjang bayi lahir 49 cm, lingkar kepala 33 cm, lingkar dada 34 cm, lingkar perut 32 cm.

3. Pada pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny “A” mulai dari pengkajian sampai tahap akhir tidak ditemukan adanya hambatan karena adanya kerjasama antara klien dan petugas kesehatan sehingga semua tindakan dapat terlaksana dengan baik.
4. Pendokumentasian sangat penting dilaksanakan pada setiap tahap dari proses manajemen kebidanan.

B. SARAN

1. Bagi klien
   a. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkomsumsi makanan yang bergizi dan seimbang.
   b. Menganjurkan ibu untuk banyak istirahat
   c. Menganjurkan agar ibu menjaga kebersihan diri termasuk kebersihan genetalia
   d. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya sesering mungkin
2. Bagi bidan

   Bidan sebagai tenaga kesehatan diharapkan mampu memeberikan pelayanan yang sesuai sehingga dapat membantu menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB)

3. Bagi institusi

Untuk mendapatkan hasil manajemen asuhan asuhan kebidanan yang baik perlu menyediakan tenaga bidan yang professional untuk menunjang pelaksanaan tugas serta untuk meningkatkan keterampilan bidan.

DAFTAR PUSTAKA

Aprillia N.2017.”*Factor risiko ibu bersalin yang mengalami ketuban pecah dini di RSUD Bangkinang”*.Jurnal Kesehatan Masyarakat.Vol.2.No.1

Achadiat dan Chrisdiono M, *Prosedur Tetap Obstetri dan Ginekologi*, Jakarta : EGC 2004

Anggraeni dkk.2020. “*Hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan APGAR score neonates*”. Umi medical jurnal.Vol.5 No.2

Alim & Safitri.2015. “*Faktor yang mempengaruhi ketuban pecah dini pada ibu hamil trimester III di rumah sakit batuan lawang”*. Jurnal Hesti Wira Sakti.Vol.4 No.1

Aziza.2013. “*Hubungan antara ketuban pecah dini dengan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir*”. Jurnal eduhealth. Vol.3 No.2

Barokah & Agustina.2021.”*Faktor internal kejadian ketuban pecah dini di kabupaten kalonprogo*”.Jurnal kesehatan.Vol.4 No.2

Hidayati A.2020.”*Persalinan Perspektif Mufassir dan Ilmu Kebidanan* (Kajian Surat Maryam Ayat 22-26)”.

Ikram dkk.2014.”*Jumlah paritas dan anemia sebagai factor predictor kejadian ketuban pecah dini*”.

Icesmi dkk, *Keperawatan maternitas*, Yogyakarta :Nuha Medika 2017

Indrayani & Djami. *Asuhan persalinan pada bayi baru lahir*, Jakarta : CV. Trans Info Media 2013

Khusnul K.2013*.”Hubungan Suami Istri Perspektif Gender dan Hukum Islam”*.Jurnal Ahkam,Vol. XIII, No.2

Khadija dkk.2016.”*Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Dr.H.Moch Hisari Saleh Banjarmasin*”.Jurnal Dinamika Kesehatan.Vol.7 No.1

Kemenkes RI.2016.Profil Kesehatan Indonesia.Jakarta:*Departemen Republik Indonesia RI*.Survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI).Kementrian kesehatan republic Indonesia.

Liu & David, Manual Plasenta, Jakarta : EGC 2013

Maharrani & Nugrahini.2017.”*Hubungan usia, paritas dengan ketuban pecah dini di puskesmas Jagir Surabaya*”.Vol.8 No.2

Mutmainnah dkk, *Asuhan Persalinan Normal dan Bayi Baru Lahir*, Yogyakarta : CV. Andi Offset 2017

Norunts dkk, *Obstetri dan Ginekologi*, Jakarta :Erlangga 2007

Nugroho & Taufan, *Buku Ajar Obstetri untuk mahasiswa kebidanan*, Yogyakarta :Nuha Medika 2014

Nugroho & Taufan, *Buku Ajar Obstetri untuk kebidanan dan keperawatan*, Yogyakarta :Nuha Medika 2010

Norma & Dwi, *Asuhan kebidanan patologi*, Yogyakarta :Nuha Medika 2013

Nurkhayati & Hasanah.2020. ”*Gambaran factor penyebab ketuban pecah pada ibu bersalin”*.Jurnal ilmiah kebidanan.Vol.7.No.1

Panjaitan& Tarigan.2018.”*Hubungan karakteristik ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di rumah sakit marfia foriska*”.Jurnal bidan komunitas.Vol.1 No.1

Priantia dkk.2016.”*Faktor umur dan paritas ibu berisiko terjadinya ketuban pecah sebelum waktunya pada ibu bersalin*”.Vol.3 No.1

Rahayu & Sari.2017.”*Studi deskriptif penyebab kejadian ketuban pecah dini pada ibu bersalin*.Vol.5 No.2

Fitriana.2017.”*Ketuban pecah dini dirumah sakit umum daerah ungaran*”.Vol.2 No.1

Ratnawati A, *keperawatan Maternitas*, Yogyakarta :Pustaka Book Press 2016

Sepduwina.2013.”*Faktor terjadinya ketuban pecah dini pada ibu bersalin di rumah sakit umum daerah rokan hulu*. Jurnal maternity and neonatal.Vol.1 No.3

Suhaimi.2012.”*Protein P3 sebagai factor risiko terjadinya ketuban pecah dini*”.Vol.2 No.2

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah Volume 8.Jakarta: Lentera Hati.2002.

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah Volume 11.Jakarta: Lentera Hati.2002

Sulastri, Enawati S.2013.”*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketuban Pecah Dini Di RS PKU Muhammadiyah Surakarta*”.

Wahyuningsih.2019.”*Hubungan ketuban pecah dini dan section caesarea dengan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir*”.

WHO.2005.*The worl health report:attending to 136 million birth, everyyears*.Genewa:WHO.

Wahyuni dkk.2020.”*Faktor penyebab terjadinya ketuban pecah dini pada ibu bersalin di rumah sakit umum daerah Sumbawa*”.Jurnal kesehtan.Vol.3 No.2

Wiradharma dkk.2015.”*Risiko asfiksia pada ketuban pecah dini di RSUD Sanglah*”.Vil.5 No.2

Sukarnidkk, *Kehamilan Persalinan dan Nifas*, Yogyakarta :Nuha Medika 2013

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus II : JL. Sultan Alauddin No.36 Samata – Gowa Telp. 824835 Fax. 424836

PARTOGRAF

No. Register
No. Puskesmas
Ketuban pecah Sejak jam 07.00 WITA

Nama Ibu : NY. ARDHILA
Tanggal : 29/6/00
Umur : 19 THN
Jam : 10.10 WITA
mulas sejak jam 08.00 WITA
G. 1 P. 0 A. 0
Alamat : JL. SUNU



CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal : 29/6/22
2. Nama bidan : .....
3. Tempat Persalinan :
   ☐ Rumah Ibu ☐ Puskesmas
   ☐ Polindes ☐ Rumah Sakit
   ☐ Klinik Swasta ☐ Lainnya : .....
4. Alamat tempat persalinan :
5. Catatan : ☐ rujuk, kala : I / II / III / IV
6. Alasan merujuk: .....
7. Tempat rujukan: .....
8. Pendamping pada saat merujuk :
   ☐ Bidan ☐ Teman
   ☐ Suami ☐ Dukun
   ☐ Keluarga ☐ Tidak ada

KALA I

9. Partogram melewati garis waspada : Y / T
10. Masalah lain, sebutkan : .....
11. Penatalaksanaan masalah Tsb : .....
12. Hasilnya : .....

KALA II

13. Episiotomi :
    ☑ Ya, indikasi .....
    ☐ Tidak
14. Pendamping pada saat persalinan
    ☑ Suami ☐ Teman ☐ Tidak ada
    ☐ Keluarga ☐ Dukun
15. Gawat Janin :
    ☐ Ya, tindakan yang dilakukan
    a. .....
    b. .....
    c. .....
    ☑ Tidak
16. Distosia bahu :
    ☑ Ya, tindakan yang dilakukan
    a. .....
    b. .....
    c. .....
    ☐ Tidak
17. Masalah lain, sebutkan :
18. Penatalaksanaan masalah tersebut : .....
19. Hasilnya : .....

KALA III

20. Lama kala III : 7.5 menit
21. Pemberian Oksitosin 10 U im ?
    ☑ Ya, waktu : 1 menit sesudah persalinan
    ☐ Tidak, alasan .....
22. Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
    ☐ Ya, alasan .....
    ☑ Tidak
23. Penegangan tali pusat terkendali ?
    ☑ Ya,
    ☐ Tidak, alasan .....
24. Masase fundus uteri ?
    ☑ Ya.
    ☐ Tidak, alasan .....
25. Plasenta lahir lengkap (*intact*) Ya / Tidak
    Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
    a. .....
    b. .....
26. Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya / Tidak
    ☐ Ya, tindakan :
    a. .....
    b. .....
    c. .....
27. Laserasi :
    ☑ Ya, dimana .....
    ☐ Tidak.
28. Jika laserasi perineum, derajat : 1 / 2 / 3 / 4
    Tindakan :
    ☑ Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
    ☐ Tidak dijahit, alasan .....
29. Atoni uteri :
    ☐ Ya, tindakan
    a. .....
    b. .....
    c. .....
    ☑ Tidak
30. Jumlah perdarahan : ± 300 ml
31. Masalah lain, sebutkan .....
32. Penatalaksanaan masalah tersebut : .....
33. Hasilnya : .....

BAYI BARU LAHIR :

34. Berat badan 3000 gram
35. Panjang 49 cm
36. Jenis kelamin L / P
37. Penilaian bayi baru lahir : baik / ada penyulit
38. Bayi lahir :
    ☑ Normal, tindakan :
    ☑ mengeringkan
    ☑ menghangatkan
    ☑ rangsang taktil
    ☑ bungkus bayi dan tempatkan di sisi Ibu
    ☐ Asphksia ringan/pucat/biru/lemas/,tindakan :
    ☐ mengeringkan ☐ bebaskan jalan napas
    ☐ rangsang taktil ☐ menghangatkan
    ☐ bungkus bayi dan tempatkan di sisi Ibu
    ☐ lain - lain sebutkan .....
    ☐ Cacat bawaan, sebutkan :
    ☐ Hipotermi, tindakan :
    a. .....
    b. .....
    c. .....
39. Pemberian ASI
    ☑ Ya, waktu : 1 jam setelah bayi lahir
    ☐ Tidak, alasan .....
40. Masalah lain,sebutkan : .....
    Hasilnya : .....

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi		Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1	17.15	120/80 mmHg	80x/i	36,8°C	8jp	Baik	kosong	± 50cc
	17.30		80x/i		8jp	Baik	kosong	± 40cc
	17.45		80x/i		8jp	Baik	kosong	± 30cc
	18.00		79x/i		8jp	Baik	kosong	± 30cc
2	18.30	120/80 mmHg	80x/i	36,8°C	8jp	Baik	kosong	± 30cc
	19.00		80x/i		8jp	Baik	kosong	± 30cc

Masalah kala IV : .....
Penatalaksanaan masalah tersebut : .....
Hasilnya : .....

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-6221400 Gowa
Website: fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-2209/ Un.06/FKIK/PP.00.9/06/ 2022 Gowa, 6 Juni 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Pengajuan Kode Etik**

Kepada Yth :
Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama	:	Sitti Aisyah
N I M	:	70400118053
Fakultas/Jurusan	:	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	Sinjai

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Ahli Madya. Adapun judul karya tulis ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny"X" Bersalin Dengan Ketuban Pecah Dini di RSIA Sitti Khadijah I Makassar Tahun 2022."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin/persetujuan kode etik .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Gemy Nastity Handayany

Tembusan :
-Dekan FKIK UINAM

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.072/KEPK/FKIK/VII/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama :SITTI AISYAH
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU BERSALIN DENGAN KETUBAN PECAH DINI DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR TAHUN 2022"

"MANAGEMENT OF MIDWIFERY CARE FOR MATERNITY WITH PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES AT RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR IN 2022"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Concent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
This declaration of ethics applies during the period July 18, 2022 until July 18,2023

Makassar, 18 Juli 2022
Professor and Chairperson,

DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **3752/S.01/PTSP/2022**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Direktur RSIA Sitti Khadijah 1
Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : b-2508/un.06/fkik/pp.00.9/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: **SITTI AISYAH**
Nomor Pokok	: 70400118053
Program Studi	: Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa

dpmptsp PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU BERSALIN DENGAN KETUBAN PECAH DINI DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***24 Juni s/d 25 Juli 2022***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 22 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA)
"SITTI KHADIJAH 1"
MUHAMMADIYAH CABANG MAKASSAR
JL. R.A. KARTINI 15 - 17 TELP. (0411) 3624554, 3629245, 3627119, 3614661 FAX. 3627119
MAKASSAR SULAWESI SELATAN 90111 E-Mail : rsia.sitti.khadijah@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 707 /DiklatRS//IV.6.AU/F/1493 /2022
Lamp :
Hal : Pengambilan Data / Penelitian

Makassar, 29 Dzulqadah 1493 H
29 Juni 2022M

Kepada Yth,
Ka. Bidang/Ka. Bagian/Ka. Instalasi/Ka. Ruang
Bersalin, Rekam Medis
di-
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat, Mohon bantuannya untuk memberikan data / informasi yang diperlukan untuk penelitian kepada yang bersangkutan :

Nama	: Sitti Aisyah
No. Telp	: 08820225585 17
NIM	: 70900118053
Program Studi	: D3 Kebidanan
Institusi	: UIN Alauddin Makassar
Judul Penelitian	: Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin Dengan Ketuban Pecah Dini Di RSIA Sitti Khadijah I Makassar Tahun 2022
Tanggal Penelitian	: 30 Juni - 13 Juli 2022

Demikian, kami sampaikan atas bantuannya diucapkan banyak TERIMA KASIH dengan iringan do'a Jazaakumullahu Khairat Jazaa.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.
Wasalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Diklat,

Tetyah Nabila R

Tembusan :
1. Arsip.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama	: Sitti Aisyah
Nim	: 70400118053
Tempat/Tanggal Lahir	: Sinjai, 08 Mei 2000
Suku	: Bugis
Agama	: Islam
Alamat	: Sinjai
Nama Orang Tua	
Ayah	: Syarifuddin
Ibu	: Sahria

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006 – 2012 SDN 213 Sabbang
2. Tahun 2012 – 2015 SMPN 2 Sinjai Tengah
3. Tahun 2015 – 2018 UPT SMAN 3 Sinjai
4. Tahun 2018 – 2022 UIN Alauddin Makassar