

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI “S” DENGAN  
ASFIKSIA SEDANG DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR  
TANGGAL 17 JANUARI – 14 FEBRUARI 2022  
TAHUN 2022**



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli  
Madya Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin**

**OLEH:**

**TENRI ANGKA**

**NIM: 70400118013**

**JURUSAN KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tenri Angka

NIM :70400118013

Tempat,Tgl Lahir : Labojo, 29 Maret 2000

Jurusan/Prodi : Kebidanan

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Diploma

Alamat : Jl. Tamangapa Raya

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi “S” dengan  
Asfiksia Sedang di Labuang Baji Makassar Tahun 2022.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya tulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, 07 Juli 2022

Penyusun

Tenri Angka


## HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Tenri Angka  
Nim : 70400118013  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi "S" dengan Asfiksia Sedang di Labuang Baji Makassar Tahun 2022.


Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam Seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 07 Juli 2022

Pembimbing I

  
Ferwati Taherong, S.ST, M.Keb  
NIP : 19870924 201903 2 012

Pembimbing II

  
Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP : 19800701 200604 2 002

## PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi "S" dengan Asfiksia Sedang di Labuang Baji Makassar Tahun 2022" di susun oleh Tenri Angka, NIM : 70400118013. Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 07 Juli 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 07 Juli 2022  
8 Zulhijah 1443 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si (.....)  
Sekretaris : Firdayanti, S.Si,T, M.Keb (.....)  
Pembimbing I : Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb (.....)  
Pembimbing II: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes (.....)  
Penguji I : dr. Jelita Inayasari, M.Biomed (.....)  
Penguji II : Dr. Sabir Maidin, M.Ag (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

  
Dr.dr.Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan syukur kepada Allah swt yang telah memberikan hidayah, rahmat dan karunia-Nya dan juga kesempatan melakukan penelitian yang insya Allah bernilai ibadah dan amal jariyah, kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi “S” dengan Asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2022”**. Untuk memenuhi tugas akhir pada program studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw, semoga kita senantiasa selalu memperbanyak shalawat kepada beliau agar kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Allahumma Aamiin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya tercinta, atas limpahan kasih sayang, pengorbanan, support dan doanya yang tulus dan ikhlas. Serta keluarga besarku tercinta yang menjadi alasan saya untuk segera menyelesaikan pendidikan, juga yang telah mendoakan tulus dan ikhlas, memahami dan memberi support.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai sampai pada penyusunan tugas akhir ini, sangat sulit bagi saya untuk

menyelesaikannya. Oleh karena, itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis, M. A. Ph.D.
2. Ibunda Ferawati Taherong, S.ST, M. Keb selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya membantu saya, membimbing dan memberikan dorongan dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
3. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A, M.Kes. juga selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan membantu saya untuk membuka wawasan selama proses penyelesaian tugas akhir Karya Tulis Ilmiah ini.
4. dr. Jelita Inayasari, M.Biomed selaku penguji I yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, kritik, saran dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Dr. Sabir Maidin, M.Ag penguji II yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, kritik, saran dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Seluruh jajaran dosen Jurusan Kebidanan yang telah membantu, motivasi dan membekali berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Ibunda Rahma Liwanty, S.Kom, staf sistem Informasi serta staf/pegawai Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam

Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang telah melayani penulis dalam pengurusan Karya Tulis Ilmiah ini.

8. Kepada kedua Orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu mensupport dan memberikan semangat pada saya.
9. Untuk teman-teman kuliah saya yang selalu mendorong saya untuk cepat-cepat segera menyelesaikan tugas akhir.

Akhir kata, saya berharap kepada semua pihak yang ikut membantu dan mendoakan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, semoga Allah swt melimpahkan pahala dan memberikan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

Samata, 07 Juli 2022



Penulis

TENRI ANGKA  
NIM: 70400118013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan Penulisan .....	6
D. Manfaat Penulisan .....	7
E. Metode Penulisan .....	8
F. Sistematika Penulis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Bayi baru lahir .....	12
1. Pengertian .....	12
2. Ciri-ciri bayi baru lahir normal .....	12
3. Perubahan perubahan pada Bayi Baru Lahir .....	13
4. Penilaian APGAR SCORE Bayi Baru Lahir .....	17
5. Penilaian Bayi Baru Lahir .....	19
6. Refleks-refleks Fisiologi Bayi baru lahir .....	22

7. Cara memotong tali pusat .....	23
8. Inisiasi Menyusui Dini Pada Bayi Baru Lahir .....	24
9. Bounding attachment Bayi Baru Lahir .....	25
10. Rawat Gabung .....	25
B. Tinjauan Umum tentang Asfiksia .....	27
1. Pengertian .....	27
2. Klasifikasi dan Tanda Gejala Asfiksia .....	28
C. Tinjauan Umum Asfiksia Berat .....	29
1. Pengertian asfiksia.....	29
2. Tanda dan gejala asfiksia.....	29
3. Etiologi .....	30
4. Patofisiologi .....	31
5. Manifestasi Klinik .....	32
<b>BAB III STUDI KASUS .....</b>	<b>59</b>
A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar .....	59
B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual .....	65
C. Langkah III : Mengidentifikasi Diagnosa Atau Masalah Potensial .....	67
D. Langkah IV : Tindakan Segera/Emergency Dan Kolaborasi .....	67
E. Langkah V : Intervensi .....	69
F. Langkah VI : Implementasi .....	72
G. Langkah VII : Evaluasi .....	74
<b>MATRIKS KUNJUNGAN .....</b>	<b>96</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>101</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Langkah awal.....	36
<b>Gambar 2.2</b> Rangsangan taktil .....	37
<b>Gambar 2.3</b> Ventilasi Tekanan Positif .....	38
<b>Gambar 2.4</b> Melakukan Kompresi Dada .....	40
<b>Gambar 2.5</b> Algoritma Resusitasi Asfiksia .....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran III : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
- Lampiran IV : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari RSUD Labuang Baji Makassar



## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH, FEBRUARI 2022  
TENRI ANGKA, 70400118013

**Pembimbing I : Ferawati Taherong**

**Pembimbing II : Syatirah**

### **“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi “S” dengan Asfiksia Sedang di Labuang Baji Makassar Tgl 17 Januari – 14 Februari Tahun 2022”**

Asfiksia neonatal merupakan kegagalan bernafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa setelah lahir yang ditandai dengan PaO<sub>2</sub> yang rendah (hipoksemia), PaCO<sub>2</sub> meningkat dan asidosis.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan asuhan kebidanan Bayi baru lahir pada bayi “S” dengan asfiksia sedang di RS Labuang Baji Makassar Tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan dan wewenang Bidan dan dengan menggunakan pendekatan Manajemen Asuhan kebidanan 7 langkah varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Hasil dari studi kasus yang telah dilakukan pada bayi “S” asfiksia sedang yakni tidak ditemukan kendala dalam menangani masalah asfiksia. Setelah dilakukan asuhan dan pengkajian selama empat pekan diperoleh keadaan bayi baik tanpa komplikasi.

Kesimpulan dari studi kasus dengan melakukan pengkajian berupa anamnesis dan pemantauan pada tanggal 17 Januari – 14 Februari 2022. Dalam penatalaksanaan asfiksia dilakukan dengan optimalisasi langkah awal resusitasi yaitu bayi dikeringkan, dan dihangatkan, posisi bayi diatur sedikit ekstensi, lalu dilakukan pengisapan lendir dihidung dan di mulut bayi menggunakan delee, dilakukan rangsangan taktil, dilakukan sampai bayi dengan kondisi membaik dan dilakukan pemantauan selama 4 minggu tanpa adanya komplikasi.

**Kata Kunci : Bayi baru lahir dengan Asfiksia**

## ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT  
UTN ALAUDDIN MAKASSAR  
SCIENTIFIC PAPER, FEBRUARY 2022

TENRI ANGKA, 70400118013

Supervisor I : Ferawati Taherong

Supervisor II : Syatirah

**“Midwifery Care Management on the Newborn Infant of Mrs “S” with the Case of Moderate Asphyxia in Labuang Baji Hospital of Makassar, January 17<sup>th</sup> –February 14<sup>th</sup>, 2022”**

Neonatal asphyxia is the inability of a newborn infant to establish and sustain adequate and spontaneous respiration. This medical condition is resulting from deprivation of oxygen in a newborn infant characterized by the low PaO<sub>2</sub> (hypoxemia) and the increase of hypercarbia PaCO<sub>2</sub> in the blood.

The major purpose of this research was to investigate and conduct midwifery care management on a newborn infant with the case of moderate asphyxia in Labuang Baji hospital. The study was conducted based on midwifery procedure, 7-stages of Varney midwifery care management, and SOAP documentation procedure.

The findings of this study indicated that there were no particular problems found during the treatment given to the newborn infant of Mrs “S” with the case of moderate asphyxia. The treatment was given for approximately 4 weeks, and the infant’s condition seemed to recover and was considered to be healthier.

Based on the analysis and monitoring process conducted from January 17<sup>th</sup> to February 14<sup>th</sup>, it revealed that there were various treatments given to patient with the case of moderate asphyxia. The baby was dried and warmed, and the position of the baby was adjusted to a slight extension. Eventually, a mucus suction and a tactile stimulation were carried out until the baby’s condition improved.

Key Words: A newborn infant with Asphyxia



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang*

Secara global 2,5 juta anak meninggal dunia pada tahun 2017. Sekitar satu juta bayi baru lahir mati (75%) dalam 24 jam pertama, dan kematian terjadi pada minggu pertama kehidupan. Sekitar 7000 kematian bayi setiap harinya yaitu sebesar 47% dari seluruh kematian anak dibawah usia 5 tahun. Salah satu penyebab kematian neonatus pada tahun 2016 yaitu karena kelahiran prematur, terkait dengan komplikasi persalinan (asfiksia atau kurangnya pernapasan saat lahir), infeksi, dan cacat bawaan (Tasew et al., 2018).

Dari seluruh kematian bayi, sebanyak 47% meninggal pada masa neonatal dan setiap 5 menit terdapat satu neonatus yang meninggal. Penyebab kematian neonatal di Indonesia pertama adalah berat badan lahir rendah 29% dan penyebab kematian kedua adalah asfiksia sebanyak 27% (pengamanan, eunikea., wantania, john j., & wagey, 2016).

Faktor-faktor yang menyebabkan asfiksia diantaranya faktor umur ibu, faktor tali pusat, dan faktor bayi. Adanya hipoksia dan iskemia jaringan menyebabkan perubahan fungsional dan biokimia pada janin. Faktor ini yang berperan pada kejadian asfiksia. Sebagai kasus asfiksia pada bayi baru lahir merupakan kelanjutan dari asfiksia intrauterin, karena itu diagnosa dini pada penderita asfiksia mempunyai arti penting dalam

merencanakan resusitasi yang akan dilakukan (Novisye Katiandagho1, 2015).

Upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir yang diakibatkan Asfiksia salah satunya dengan cara melakukan suatu pelatihan keterampilan resusitasi kepada para tenaga kesehatan agar lebih terampil dalam melakukan resusitasi dan menganjurkan kepada masyarakat ataupun ibu khususnya agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dan keterampilan (Prihandani, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian (Sari, 2016) dalam penelitiannya tahun 2014-2016 didapatkan 31 bayi yang mengalami asfiksia didapatkan hasil faktor penyebab kejadian asfiksia pada bayi baru lahir berdasarkan faktor ibu yaitu mayoritas terjadi pada usia ibu 20-35 tahun sebanyak 16 (51,6%), paritas 10 (32,3%), umur kehamilan 18 (58,1%) dan berdasarkan faktor dari bayi yaitu mayoritas terjadi pada berat lahir bayi >2500 gram sebanyak 12 (38,7%), dan jenis persalinan yang mengalami asfiksia pada persalinan normal sebanyak 10 (32,3%) (Wiradharma et al., 2016)

Data dari Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2015 jumlah angka kematian bayi 11,7 per 1.000 angka kelahiran. Angka kejadian asfiksia di Sulawesi selatan cukup tinggi berdasarkan data dari kejadian asfiksia neonatorum pada tahun 2015 sebanyak 392 kasus. Sedangkan pada tahun 2016 yaitu terdapat 212 kasus asfiksia neonatorum (Data sekunder dinkes provinsi Sulawesi selatan, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Siti Rahma dan Mahdina Armah yang berjudul Analisis faktor risiko kejadian Asfiksia pada bayi baru lahir di RSUD Syekh Yusuf Gowa dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2013 menunjukkan hasil penelitian dari 104 kasus pasien asfiksia, faktor risiko berdasarkan umur ibu (20-35 tahun) sebanyak 65,39%, berdasarkan usia kehamilan (<37 minggu dan >42 minggu) sebanyak 55,76%, berdasarkan persalinan lama (<18 jam untuk multipara dan >24 jam primipara) sebanyak 58,60% dan berdasarkan jenis persalinan (persalinan dengan tindakan) sebanyak 56,73%. Kesimpulan umur ibu, usia kehamilan, lama persalinan dan jenis persalinan tidak memiliki hubungan yang signifikan pada kasus asfiksia neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo.

Berdasarkan studi pendahuluan di ruang bersalin dan neonatus RSUD Labuang Baji pada tahun 2018 jumlah bayi lahir 820 bayi, bayi yang meninggal sebanyak 135 kasus dan kejadian BBLR sebanyak 7 kasus, kejadian asfiksia 82 bayi (10%) dan asfiksia yang disebabkan oleh BBLR sebanyak 7 kasus. Pada tahun 2019 jumlah bayi baru lahir 180 bayi, bayi yang meninggal 42 kasus, kejadian BBLR sebanyak 16 kasus, kejadian asfiksia sekitar 42 (23,3%) dan kejadian asfiksia yang disebabkan oleh BBLR sebanyak 16 kasus. Pada tahun 2020, jumlah bayi lahir 520, bayi yang meninggal 51 kasus dan kejadian BBLR sebanyak 62 kasus, kejadian asfiksia sekitar 54 bayi dan kejadian asfiksia yang disebabkan oleh BBLR

sebanyak 50 kasus. Hal ini membuktikan bahwa masih tingginya angka kejadian asfiksia (Rekam medik RSUD Labuang Baji Makassar, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Leni Murniati, Ferawati Taherong Dan Syatirah dengan judul Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Asfiksia dari penelitian disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan pada bayi baru lahir dengan asfiksia ialah dilakukannya pemberian asuhan sesuai dengan evidence based yaitu dengan membersihkannya jalan napas, rangsangan refleks pernapasan, serta mempertahankan suhu tubuh. Kesimpulan dari kasus ini yaitu didapatkannya evidence based pada bayi baru lahir dengan asfiksia bahwa pentingnya menilai Apgar atau kondisi bayi yang dilahirkan mengalami asfiksia serta melakukan tindakan segera yaitu resusitasi yang dimana sebagai bantuan hidup dasar untuk mengembalikan pernapasan secara normal (Murniati & Ferawati Taherong, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Riska, Anieq Mumthia alkautsar dan Andi Siti Rahma yang berjudul Asuhan kebidanan Intranatal Pada Ny “N” dengan persalinan postterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa 17 juli 2018. Hasil studi kasus yang dilakukan pada Ny “N” dengan persalinan postterm, ditemukan hambatan yakni pada bayi dengan Asfiksia sedang dan telah dilakukan penanganan sesuai kasus dan telah dilakukan pengkajian, pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny “N” dengan hasil tidak ditemukannya kesenjangan teori dan kasus (eka riska, anieq mumthiah al kausar, 2018).

Asfiksia dapat menyebabkan kerusakan organ berat dan berakibat fatal pada bayi baru lahir. Redistribusi sirkulasi yang ditemukan pada pasien hipoksia telah memberikan gambaran yang jelas mengapa terjadi disfungsi berbagai organ tubuh pada bayi asfiksia. Gangguan fungsi berbagai organ pada bayi asfiksia tergantung pada lamanya asfiksia terjadi dan kecepatan penanganan, berdasarkan hasil penelitian lanjut Riskesdas, asfiksia merupakan penyebab kematian kedua pada bayi setelah infeksi (Novitasari, 2015).

Bidan dalam pelayanan kebidanan mempunyai peranan penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak dan sebagai ujung tombak pemberi asuhan kebidanan. Oleh karena itu, bidan harus mempunyai pendekatan manajemen agar dapat mengorganisasikan semua unsur-unsur yang terlibat dalam pelayanannya dengan baik dalam rangka masalah kesehatan pada bayi di rumah sakit Labuang Baji Makassar.

Dari data-data diatas tampak jelas asfiksia masih merupakan salah satu masalah kesehatan pada bayi di RS Labuang Baji penanganan holistik masih dibutuhkan dengan melalui kolaborasi berbagai profesi sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir di RSUD Labuang Baji Makassar.

## **B. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah meliputi Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji.

## **C. Tujuan penulisan**

### 1. Tujuan Umum

Dapat melaksanakan Manajemen Asuhan kebidanan Pada Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia di RS Labuang Baji.

### 2. Tujuan khusus

a. Melaksanakan pengkajian dan analisis data Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji.

b. Merumuskan diagnosa/masalah aktual Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia, di RSUD Labuang Baji.

c. Dapat mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji.

d. Menetapkan rencana tindakan Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji.

e. Melaksanakan tindakan Asuhan yang disusun Pada Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji.

f. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan pada Bayi Baru lahir dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji.

- g. Mendokumentasikan semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun Manfaat penulisan pada kasus tersebut diatas adalah:

##### **1. Manfaat institusi**

Sebagai bahan bagi peneliti berikutnya di bidang kesehatan, dalam proses peningkatkan dan pengembangan ilmu pengetahuan terkhususnya asuhan pada bayi baru lahir dengan asfiksia sedang dan masukan bagi institusi terkhususnya jurusan DIII Kebidanan dalam proses penerapan asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan asfiksia sedang.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis pada kasus ini adalah untuk mengembangkan ilmu kebidanan terkait pada asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan masalah asfiksia.

##### **3. Manfaat Praktis**

Adapun sebagai salah satu sumber informasi bagi penuntut kebijakan dan pelaksanaan program di RS Labuang Baji Makassar dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan penanganan yang tepat pada bayi baru lahir dengan asfiksia.

##### **4. Bagi Instansi Pengambilan Kasus**

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak Rumah Sakit diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak Rumah Sakit mengenai Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia sedang, sehingga dapat melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan pada Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia sedang.

#### **5. Manfaat Ilmiah**

Sebagai bahan acuan/pedoman bagi institusi jurusan Kebidanan untuk penulisan Proposal Karya Tulis Ilmiah selanjutnya.

#### **6. Manfaat Bagi Penulis**

Sebagai pengalaman yang berharga yang dapat meningkatkan dan menambah wawasan dan keterampilan dalam penerapan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan Asfiksia Sedang.

#### **E. Metode Penulisan**

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu;

##### **1. Studi Keputusan**

Penulis mempelajari buku-buku, literature dan media internet yang berhubungan dengan Bayi Baru Lahir khususnya bayi dengan Asfiksia.

##### **2. Studi Kasus**

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi: identifikasi data dasa, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan emergency/kolaborasi.

Rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Dalam pengumpulan data, pengkajian ini menggunakan teknik antara lain:

a. Anamnesa

Penulis menggunakan Tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan Bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala hingga kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi.

- 1). Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
- 2). Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan dan rabaaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3). Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.
- 4). Auskultasi merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengatur tekanan darah sedangkan lennec digunakan untuk mendengar denyut jantung bayi (DJB).

### **3. Studi Dokumentasi**

Membaca dan mempelajari status kesehatan yang berhubungan dengan keadaan klien yang bersumber dari catatan perawatan maupun dari sumber lain yang menunjang yaitu laboratorium.

### **4. Diskusi**

Diskusi dengan tenaga kesehatan yaitu bidan atau dokter yang menangani langsung klien tersebut dan dosen pembimbing proposal karya tulis ilmiah.

#### **F. Sistematis penulisan**

Adapun sistematis yang digunakan untuk proposal karya tulis ilmiah ini terdiri dari:

Pada Bab 1 yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematis penulisan.

Pada bab II, membahas tentang tinjauan umum asfiksia (pengertian bayi baru lahir, ciri-ciri, perubahan-perubahan, penilaian APGAR SCORE, refleks-refleks fisiologis, inisiasi menyusui dini, bounding attachment, rawat gabung, pengertian asfiksia, karakteristik, gejala dan tanda, etiologi penyebab, patofisiologi, manifestasi klinis diagnosis, penilaian, persiapan resusitasi, penatalaksanaan, pandangan islam tentang bayi baru lahir dan yang terakhir membahas tentang proses manajemen asuhan kebidanan (pengertian manajemen asuhan kebidanan dan proses manajemen asuhan kebidanan).

Pada BAB III, membahas tentang langkah I pengkajian dan analisa data dasar, langkah II merumuskan diagnose/masalah aktual, langkah IIIantisipasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV tindakan segera dan kolaborasi, langkah V rencana tindakan asuhan kebidanan, langkah VI pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan dan langkah VII evaluasi asuhan kebidanan.

Pada BAB IV, menjelaskan maka hasil penelitian. Pembahasan membahas kesenjangan antara teori dan hasil penelitian serta menjawab tujuan penelitian. Teori yang dikemukakan bahwa teori (jurnal dan text book) yang sudah termuat dalam BAB II.

PADA BAB V, bab terakhir ini terdiri atas kesimpulan yang disusun untuk menjawab tujuan penelitian kasus asfiksia dan saran sebagai implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir**

##### **1. Pengertian bayi baru lahir**

Bayi Baru Lahir (Neonatus) adalah bayi yang baru lahir mengalami proses kelahiran berusia 0-28 hari, BBL memerlukan penyesuaian fisiologi berupa maturase, adaptasi (menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan (ekstrauterin) dan toleransi bagi BBL untuk dapat hidup dengan baik (marmi k, 2015).

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang baru lahir pada usia kehamilan genap 38 - 42 minggu, dengan presentasi belakang kepala atau letak sungsang yang melewati vagina tanpa memakai alat (Tando, 2016)

Bayi Baru Lahir Normal adalah bayi yang lahir cukup bulan, 38 - 42 minggu dengan berat badan sekitar 2500 - 3000 gram dan panjang 48 -52 cm (jenny js sondakh, 2017).

##### **2. Ciri-ciri bayi baru lahir normal**

- a. Lahir aterm antara 38 - 42 minggu.
- b. Berat badan 2500 - 4000 gram.
- c. Panjang lahir 48 - 52 cm.
- d. Lingkar dada 30 - 38cm.
- e. Lingkar kepala 33 - 35cm.
- f. Lingkar lengan 11 - 12 cm.

- g. Frekuensi denyut jantung 120 - 160 kali permenit.
- h. Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan yang cukup.
- i. Rambut lanugo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah sempurna.
- j. Kuku agak panjang dan lemas.
- k. Nilai APGAR >7, gerakan aktif, bayi langsung menangis kuat.
- l. Genetalia pada laki-laki kematangan ditandai dengan testis yang berada pada skrotum dan penis yang berlubang sedangkan genetalia pada perempuan kematangan ditandai dengan vagina dan uterus yang berlubang labia mayora menutupi labia minora.
- m. Refleks rooting (mencari puting susu) terbentuk dengan baik.
- n. Refleks sucking sudah terbentuk dengan baik.
- o. Refleks grasping sudah baik.
- p. Eliminasi baik.
- q. Urin dan mekonium keluar dalam 24 jam pertama (Sioto, 2013)

### **3. Perubahan perubahan pada Bayi Baru Lahir**

- a. Perubahan metabolisme karbohidrat

Dalam waktu 2 jam setelah lahir akan terjadi penurunan kadar gula darah, untuk menambah energi pada jam jam pertama setelah lahir diambil dari hasil metabolisme asam lemak, bila karena sesuatu hal misalnya bayi mengalami hipotermi, metabolisme asam lemak tidak dapat memenuhi kebutuhan pada neonatus maka

kemungkinan besar bayi akan menderita hipoglikemia, misal pada bayi BBLR, bayi dari ibu yang menderita DM dan lain-lainnya (Sari, 2014: 240).

b. Perubahan suhu tubuh

ketika bayi baru lahir berada pada suhu lingkungan yang lebih rendah dari suhu di dalam Rahim ibu. Apabila bayi dibiarkan dalam suhu 25°C, Sedangkan produksi panas yang dihasilkan tubuh bayi hanya 1/10 nya. Keadaan ini menyebabkan penurunan suhu tubuh sebanyak dalam waktu 15 menit akibat suhu yang rendah metabolisme jaringan meningkat dan kebutuhan oksigen pun meningkat (Kusuma Wardani et al., 2019).

1). Perubahan pernapasan

Selama dalam uterus, janin mendapatkan O<sub>2</sub> dari pertukaran gas melalui plasenta. Setelah lahir pertukaran gas harus melalui paru-paru bayi.

Rangsangan untuk gerakan pernapasan pertama ialah:

- (1). Tekanan mekanik.
- (2). Penurunan O<sub>2</sub> dan kenaikan CO<sub>2</sub> merangsang kemoreseptor yang terletak di sinus karotis.
- (3). Rangsangan dingin di daerah muka dapat merangsang permukaan gerakan napas (Sari, 2014:241).

2). Perubahan struktur

Dengan berkembangnya paru-paru mengakibatkan tekanan O<sub>2</sub> meningkat tekanan CO<sub>2</sub> menurun. Hal ini mengakibatkan turunnya resistensi pembuluh darah paru-paru sebagian sehingga aliran darah ke pembuluh darah tersebut meningkat. Hal ini menyebabkan darah dari arteri pulmonalis mengalir ke paru-paru dan duktus arteriosus menutup. Dan menciutnya arteri dan vena umbilikalिस kemudian tali pusat dipotong sehingga aliran darah dari plasenta melalui vena cava inferior dan foramen ovale antirium kiri terhenti sirkulasi darah bayi sekarang berubah menjadi seperti semula (afroh, f. judah, 2012).

Dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan tentang rahasia dibalik penciptaan bayi baik dalam kandungan maupun luar kandungan yaitu sebagai berikut: Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Mukminun Ayat: 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾  
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا  
الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَدَشْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ  
بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

“Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian, kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti

mati. Kemudian sungguh kamu akan di bangkitkan (dari kuburmu) pada hari kiamat”. (Kementrian Agama Ri, 2014).

Dalam teori ilmu kebidanan proses penciptaan manusia dimulai dengan fertilisasi ovum oleh sperma yang dimana dalam beberapa jam setelah ovulasi fertilisasi akan terjadi di ampula tuba. Berkat kekuasaan Allah swt maka terjadi konsepsi dan di lanjutkan dengan proses perkembangan konseptus, dimana perkembangan konseptus terjadi sangat cepat yaitu zigot mengalami pembelahan menjadi morula (terdiri atas 16 sel blastomer), kemudian menjadi blastokis (terdapat cairan ditengah) yang mencapai uterus, dan kemudian sel-sel mengelompok, berkembang menjadi embrio (sampai minggu ke-7). Namun konseptus bisa saja sempurna pembentukannya dan bisa saja tidak sempurna, kebesaran dan penciptaan Allah swt lah yang memungkinkan diferensiasi jaringan yang mengagumkan yang membuat organ terbentuk secara sempurna. Setelah minggu ke -10 hasil konsepsi disebut Janin. (Prawihardjo, 2018 : 157).

Al-A'masy telah meriwayatkan dari Al-Minhal Ibnu Amr, dari Abu Yahya, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Yakni dari saripati air Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna Min sulalatin, artinya dari air mani anak adam. Ibnu Jarir mengatakan, sesungguhnya manusia pertama dinamakan Adam karena ia diciptakan dari tanah liat. Qatadah mengatakan bahwa Adam diciptakan dari tanah liat. Dan Allah swt berfirman dalam Qs. An-nahl ayat: 78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿٨٧﴾

Terjemahnya:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2016:78).

Berdasarkan dari penjelasan ayat diatas, ayat tersebut sebagai pemaparan contoh sederhana dalam kehidupan manusia yang tidak dapat terjangkau oleh manusia.

Wahai manusia, hanya Allah yang menciptakan kalian dengan menciptakan bapak kalian Adam AS dari tanah, kemudian menciptakan kalian dari sperma (mani) lalu segumpal darah (darah yang mengental), dan mengeluarkan kalian sebagai anak (At-Thiflu digunakan untuk menamai satu anak atau lebih), yaitu setiap kalian keluar sebagai seorang anak. Kemudian kalian mencapai tahap yang pertumbuhan yang kuat, yaitu tahap penyempurnaan kekuatan dan akal dari umur 30 sampai 40 tahun. Lalu kalian mencapai umur tua di masa tua (umur setelah 60 tahun). Di antara kalian ada yang mati sebelum dua tahapan itu atau salah satu darinya. Allah melakukan yang demikian itu supaya kalian bisa mencapai batas waktu, yaitu waktu kematian dan supaya kalian berangan-angan dan berpikir tentang bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Tuhan dalam hal itu (Tafsir al-Wajiz).

#### **4. Penilaian APGAR SCORE Bayi Baru Lahir**

Penilaian keadaan umum bayi dinilai 1 menit setelah bayi lahir dengan penggunaan nilai APGAR. Penilaian ini perlu untuk menilai apakah bayi menderita asfiksia atau tidak. Adapun penilaian meliputi.

**Tabel 2.1**

## Penilaian APGAR SCORE Pada Bayi Baru Lahir

Keterangan		0	1	2
A	<i>Appearance</i> (Warna kulit)	Seluruh tubuh biru/pucat	Tubuh kemerahan, ekstremitas biru	Seluruh tubuh kemerahan
P	<i>Pulse</i> (detak jantung)	Tidak ada	<100x/menit	>100x/menit
G	<i>Grimace</i> (refleks)	Tidak bereaksi	Gerakan sedikit	Reaksi melawan
A	<i>Activity</i> (Tonus otot)	Lumpuh	Ekstremitas fleksi sedikit	Gerakan aktif
R	<i>Respiration</i> (usaha bernapas)	Tidak ada	Lambat	Menangis kuat

Sumber: (Sondakh, 2016: 32).

Nilai Apgar:

7-10 = bayi normal.

4-6 = asfiksia sedang-ringan.

0-3 = bayi menderita asfiksia berat.

Bila nilai APGAR dalam 2 menit tidak mencapai 7, maka harus dilakukan tindakan resusitasi lebih lanjut karena jika bayi menderita lebih dari 5 menit kemungkinan terjadi gejala-gejala neurologik lanjut kemungkinan hari akan lebih besar, maka penilaian APGAR selain dilakukan pada menit pertama juga dilakukan pada menit ke 5 setelah bayi lahir (Lestari & Putri, 2019).

## 5. Penilaian Bayi Baru Lahir

### a. Kepala

1) Ubun-ubun. Ukuran bervariasi dan standar. Ubun-ubun merupakan titik lembek pada bagian atas kepala bayi ditempat tulang tengkorak yang belum sepenuhnya bertemu.

2) Sutura, molase, perubahan bentuk kepala janin (molding/molase)

0 : sutura terpisah

1 : sutura (pertemuan dua tulang tengkorak) yang tepat/bersesuaian.

2 : sutura tumpang tindih dan tidak dapat diperbaiki

3 : sutura tumpang tindih dan tidak dapat diperbaiki.

3) Penonjolan atau daerah cekung. Periksa adanya kelainan baik karena trauma persalinan (kaput suksedaneum, cephalohematom) atau adanya cacat kongenital (hidrosefalus).

4) Ukuran lingkar kepala untuk mengukur ukuran frontal oksipital kepala bayi.

### b. Telinga

Untuk memeriksa telinga bayi, tatap wajah bayi.

Bayangkan sebuah garis melintasi kedua matanya, normalnya beberapa bagian telinga harus berada diatas garis ini.

### c. Mata

Lihat kedua mata bayi, perhatikan apakah kedua matanya tampak normal dan apakah bergerak bersama, lakukan pemeriksaan dengan melakukan penyinaran pada pupil bayi, normalnya, jika disinari pupil akan mengecil.

d. Hidung dan mulut

Yang pertama kita lihat apakah bayi dapat bernapas dengan mudah melalui hidung atau ada hambatan, kemudian lakukan pemeriksaan pada bibir dan langit-langit, reflex isap, dinilai dengan mengamati pada saat bayi menyusu atau dengan cara menekan sedikit pipi bayi untuk membuka mulut bayi kemudian masukkan jari tangan anda untuk merasakan isapan bayi. Perhatikan adanya kelainan kongenital seperti labiopalatoskizis.

e. Leher

Periksa leher apakah ada pembengkakan atau benjolan, pastikan untuk melihat tiroid (gumpalan di depan tenggorokan bengkak). Hal ini merupakan masalah pada bayi baru lahir.

f. Dada

Pada daerah yang diperiksa adalah bentuk dada, puting, bunyi napas, bunyi jantung, (dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop).

g. Bahu, lengan dan tangan

Yang dilakukan adalah melihat gerakan bayi apakah aktif atau tidak, kemudian menghitung jumlah jari bayi.

#### h. Perut

Pada perut yang perlu dilakukan pemeriksaan, yaitu bentuk perut bayi, lingkaran perut, penonjolan sekitar tali pusat, kemudian pada saat bayi menangis, perdarahan pada tali pusat, dinding perut lembek (pada saat bayi tidak menangis) dan benjolan yang terdapat pada perut bayi.

#### i. Alat kelamin

Hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Bayi laki-laki, normalnya ada dua testis dalam skrotum. Kemudian pada ujung penis terdapat lubang.
- 2) Bayi perempuan, normalnya labia mayora menutupi labia minora, pada vagina terdapat lubang dan mempunyai klitoris.

#### j. Pinggul, tungkai dan kaki

Untuk memeriksa pinggul, pegang tungkai kaki bayi. Tekan pangkal paha dengan lembut ke sisi luar, dengarkan dan rasakan adakah bunyi “klik” ketika anda menggerakkan kakinya. Jika mendengar bunyi “klik” segera laporkan ke dokter anak untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, lakukan gerakan dengan lembut setiap kaki naik dan turun, kembali dengarkan dan rasakan suara ‘klik’ ketika anda menggerakannya. Pada pemeriksaan pinggul dan kaki yang perlu diperiksa adalah gerakan, bentuk simetris, dan panjang kedua kaki harus sama, serta jumlah jari.

k. Punggung dan anus

Pada bagian ini yang diperiksa adalah pembengkakan ataupun ada cekungan pada punggung bayi dengan cara membalikkan badan bayi dan melihat punggungnya, kemudian jari anda menuruni punggung bayi untuk merasakan benjolan pada tulang punggungnya. Pada anus diperiksa lubangnya apakah telah mengeluarkan mekonium/cairan.

l. Kulit

Pada kulit yang perlu diperhatikan verniks (cairan keputih-putihan, keabu-abuan, kekuning-kuningan, berminyak, dan berlendir yang berfungsi melindungi kulit bayi agar tidak tenggelam oleh air ketuban selama ia berada didalam Rahim), warna, pembengkakan atau bercak hitam, dan tanda lahir (ai yeyeh rukiah & lia yulianti, 2013).

**6. Refleks - refleks fisiologi bayi baru lahir**

Refleks adalah suatu gerakan yang terjadi secara otomatis dan spontan tanpa disadari pada bayi normal, dibawah ini akan dijelaskan beberapa penampilan dan perilaku bayi, secara spontan karena adanya rangsangan atau bukan.

- a. Tonic neck refleks, yaitu gerakan spontan otot kuduk pada bayi normal, bila ditengkurapkan akan secara spontan memiringkan kepalanya.

- b. Rooting refleks, yaitu biasanya jarinya menyentuh daerah sekitar mulut bayi maka ia akan membuka mulutnya dan memiringkan kepalanya ke arah datangnya jari.
- c. Grasping refleks, refleks yang timbul diluar kemauan, kesadaran bayi, contoh bila bayi diangkat atau renggut secara kasar dari gendongan kemudian seolah-olah bayi melakukan gerakan yang mengangkat tubuhnya pada orang yang mendepaknya.
- d. Startle reflek, reaksi emosional berupa hentakan dan gerakan seperti mengejang pada lengan dan tangan sering diikuti dengan tangis.
- e. Refleks rooting, yaitu bayi menoleh ke arah sentuhan di pipinya atau dekat mulut, berusaha untuk mengisap.
- f. Refleks menghisap (sucking), yaitu areola puting susu tertekan gusi bayi, lidah, dan langit-langit sehingga sinus laktiferus tertekan dan mengeluarkan ASI.
- g. Refleks menelan (swallowing), dimana ASI di mulut bayi mendesak otot di daerah mulut dan faring sehingga mengaktifkan refleks menelan dan mendorong ASI ke daerah lambung (Rukiyah dkk, 2013).

## **7. Cara memotong tali pusat**

Setelah bayi lahir dan kondisi ibu baik dan stabil maka dilakukan pengikatan tali pusat. Yang pertama dilakukan adalah mencelupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan kedalam klorin 0,5%

untuk membersihkan dari darah dan secret lainnya. Kemudian bilas dengan air DTT, lalu keringkan dengan handuk bersih dan dinding perut bayi (pusat). Gunakan benang atau klem plastik DTT/steril. Kunci ikatan tali pusat dengan simpul mati atau kuncikan penjepit plastik tali pusat. Lingkaran benang disekeliling punting tali pusat dan ikat untuk kedua kalinya dengan simpul mati bagian berlawanan. Lepaskan klem penjepit tali pusat dan letakkan dalam klorin 0,5%. Kemudian selimuti bayi kembali dengan menggunakan kain yang bersih dan kering (isemi sukarni k dan wahyu p, 2013).

#### **8. Inisiasi Menyusui Dini Pada Bayi Baru Lahir**

Inisiasi menyusui dini (IMD) adalah tahapan paling penting untuk dilakukan ibu dan bayi setelah persalinan. IMD adalah proses pemberian ASI sesegera mungkin pada si kecil dalam 30-60 menit setelah kelahirannya. IMD dapat memudahkan proses menyusui untuk kedepannya, terutama pada saat ingin memberikan ASI eksklusif.

Keuntungan pemberian ASI dini yaitu:

- a. Membuat ibu dan bayi jadi lebih rileks.
- b. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi.
- c. Mengatur suhu tubuh dan detak jantung bayi.
- d. Melancarkan proses menyusui eksklusif.
- e. Merangsang kontraksi uterus.
- f. Merangsang produksi ASI (Iailiyana, 2012).

## 9. Bounding attachment Bayi Baru Lahir

Bounding merupakan suatu langkah awal untuk mengungkapkan perasaan efektif (kasih sayang) oleh ibu kepada bayinya segera setelah lahir. Attachment merupakan interaksi antara ibu dan bayi secara spesifik sepanjang waktu. Jadi, bounding attachment adalah kontak awal antara ibu dan bayi setelah kelahiran, untuk memberikan kasih sayang yang merupakan dasar interaksi antara keduanya secara terus-menerus. Dengan kasih sayang yang diberikan terhadap bayinya maka akan terbentuk ikatan batin orang tua dan bayinya (Rahardjo, 2012).

## 10. Rawat Gabung

Satu cara perawatan di mana ibu dan bayi yang baru dilahirkan tidak dipisahkan, melainkan disatukan dalam satu ruangan, kamar atau tempat bersama sama selama 24 jam penuh dalam sehari.

Tujuan:

- a. Agar ibu dapat menyusui bayinya sedini mungkin, kapan saja dibutuhkan.
- b. Agar ibu dapat melihat dan memahami cara perawatan bayi yang benar seperti yang dilakukan oleh petugas.
- c. Agar ibu mempunyai pengalaman dan keterampilan dalam merawat bayinya.

- d. Suami dan keluarga dapat dilibatkan secara aktif untuk mendukung dan membantu ibu dalam menyusui dan merawat bayinya secara baik dan benar.
- e. Ibu dan bayi mendapatkan kehangata emosional.

Saran dan syarat:

- a. Bayi lahir spontan.
- b. Bila lahir dengan tindakan dilakukan setelah bayi cukup sehat.
- c. Bayi yang lahir dengan seksio sesarea dengan anestesi umum dilakukan setelah bayi dan ibu sadar penuh.
- d. Bayi tidak asfiksia setelah 5 menit pertama (nilai APGAR minimal 7).
- e. Umur kelahiran 37 minggu atau lebih.
- f. Berat lahir 2000 – 2500 gram atau lebih.
- g. Tidak terdapat tanda – tanda infeksi intrapartum.
- h. Bayi dan ibu sehat.

Sedangkan bayi yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan rawat gabung:

- a. Bayi sangat prematur.
- b. Berat kurang dari 2000 – 2500 gram.
- c. Bayi dengan sepsis.
- d. Bayi dengan gangguan napas.
- e. Bayi dengan bawaan cacat berat.
- f. Ibu dengan infeksi berat.

## 11. Pandangan Islam Pada Bayi Baru Lahir

Proses penciptaan manusia dan kelahirannya dijelaskan dalam RS al-Hajj/16:5

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ  
ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُوَفِّقُ وَمِنْكُمْ مَّن يَرُدُّ  
إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَنَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا  
عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَزَتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu; dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada dewasa, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua (pikun), sehingga kamu melihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah di bumi itu menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (pertumbuhan) yang indah” (Kementerian Agama RI, 2019:332).

Ayat diatas menjelaskan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik.

Proses penciptaan manusia diuraikan mulai unsur pertamanya, proses perkembangan dan pertumbuhannya di dalam rahim, sehingga menjadi makhluk yang sempurna dan sampai lahir menjadi seorang anak manusia.

Kata al-insan di maksud adalah jenis manusia. Sulalah min thin / saripati dari tanah merupakan tanah yang menjadi bahan penciptaan Adam. Saripati dari tanah itu menurutnya adalah apa yang diproduksi oleh alat pencernaan dari bahan

makanan yang kemudian menjadi darah, yang kemudian berproses hingga akhirnya menjadi sperma ketika berhubungan seks. Nah, inilah yang dimaksud saripati tanah karena ia berasal dari makanan manusia, baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah.

Kata nutfah dalam bahasa arab berarti setetes yang dapat membasahi. Ada juga yang memahami kata itu dalam arti hasil pertemuan sperma dan ovum. Penggunaan kata ini menyangkut proses kejadian manusia sejalan dengan penemuan ilmiah yang menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria mengandung sekitar dua ratus juta benih manusia, sedang yang berhasil bertemu dengan indung telur wanita hanya satu saja.

Kata „alaqah terambil dari kata „alaq dalam kamus-kamus bahasa, kata itu diartikan dengan segumpal darah yang membeku. Dahulu, diartikan dengan kata tersebut, tetapi setelah kemajuan ilmu pengetahuan serta maraknya penelitian, para embriolog enggan menafsirkannya dalam arti tersebut. Mereka lebih cenderung memahaminya dalam arti sesuatu yang bergantung atau berdempet di dinding rahim. Menurut mereka, setelah terjadi pembuahan (nutfah yang berada dalam rahim itu), terjadi proses di mana hasil pembuahan itu menghasilkan zat baru, kemudian terbelah menjadi dua lalu dua menjadi empat, empat menjadi delapan, demikian seterusnya berkelipatan dua dan dalam proses itu, ia bergerak menuju ke dinding rahim dan akhirnya bergantung.

Kata kausana terambil dari kata kasa yang berarti membungkus. Daging diibaratkan pakaian yang membungkus tulang. setelah diketahui bahwa sel-sel daging berbeda dengan sel-sel tulang, dan juga setelah terbukti bahwa sel-sel

tulang tercipta sebelum sel-sel daging, dan bahwa tidak terdeteksi adanya satu daging sebelum terlihat sel-sel tulang, persis seperti yang diinformasikan ayat di atas: lalu Kami ciptakan mudhghah itu tulang belulang, lalu Kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Mahasuci Allah Yang Maha Mengetahui yang umum dan yang terperinci (Sihab, 2009:337-338)

## **B. Tinjauan Umum Tentang Asfiksia**

### **1. Pengertian Asfiksia**

Asfiksia adalah suatu keadaan bayi baru lahir yang tidak bernafas secara spontan dan teratur. Asfiksia dapat juga diartikan sebagai depresi yang dialami bayi pada saat dilahirkan dengan menunjukkan gejala tonus otot yang menurun mengalami kesulitan mempertahankan pernapasan yang wajar. Kondisi ini menyebabkan kurangnya pengambilan oksigen dan pengeluaran CO<sub>2</sub> (Dewi, dkk, 2010).

Denyut jantung janin normal 120 sampai 160 kali permenit. Terjadinya gawat janin menimbulkan perubahan denyut jantung janin. Adanya mekonium dalam air ketuban atau pengeluaran mekonium pada letak kepala menunjukkan gawat janin (lumsden, h dan holmes, 2012).

Pentingnya penyuluhan kepada ibu hamil mengenai faktor risiko kematian perinatal agar ibu hamil lebih berhati-hati memperhatikan asupan gizi dan menjaga kesehatannya selama kehamilan agar kejadian BBLR, komplikasi persalinan, lahir premature, dan asfiksia neonatorum dapat dikurangi, sehingga mengurangi faktor risiko kematian perinatal.

### **2. Klasifikasi dan Tanda Gejala Asfiksia**

Klasifikasi asfiksia berdasarkan nilai APGAR:

a. Asfiksia Ringan (nilai APGAR 7-10)

Pada asfiksia ringan, tanda dan gejala yang sering muncul adalah sebagai berikut:

- 1) Takipnea dengan nafas lebih dari 60 x/menit.
- 2) Bayi tampak sianosis.
- 3) Adanya retraksi sela iga.
- 4) Bayi merintih.
- 5) Adanya pernafasan cuping hidung.
- 6) Bayi kurang aktivitas.
- 7) Auskultasi diperoleh hasil *ronchi rales*, dan *wheezing* positif.

b. Asfiksia Sedang (nilai APGAR 4-6)

Pada asfiksia sedang, tanda dan gejala yang muncul adalah sebagai berikut:

- 1) Frekuensi jantung menurun menjadi 60-80 x/menit.
- 2) Usaha nafas lambat.
- 3) Tonus otot biasanya dalam keadaan baik.
- 4) Bayi masih bisa bereaksi terhadap rangsangan yang diberikan.
- 5) Bayi tampak sianosis.
- 6) Tidak terjadi kekurangan oksigen yang bermakna selama proses Persalinan.

c. Asfiksia Berat (nilai APGAR 0-3)

Pada asfiksia berat, tanda dan gejala yang muncul adalah sebagai berikut:

- 1) Frekuensi jantung kecil, yaitu  $< 40$  x/menit.
- 2) Tidak ada usaha nafas.
- 3) Tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada.
- 4) Bayi tidak dapat memberikan reaksi jika diberikan rangsangan.
- 5) Bayi tampak pucat bahkan sampai berwarna kelabu.
- 6) Terjadi kekurangan oksigen yang berlanjut sebelum atau sesudah Persalinan.

### ***C. Tinjauan Umum Asfiksia Berat***

#### **1. Pengertian asfiksia**

Asfiksia neonatal merupakan kegagalan bernafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa setelah lahir yang ditandai dengan keadaan  $\text{PaO}_2$  di dalam darah rendah (hipoksemia), hiperkarbia  $\text{PaCO}_2$  meningkat dan asidosis.

#### **2. Tanda dan gejala asfiksia**

Sebelum lahir

- a. Denyut jantung janin normal antara 120-160 x/menit, terjadinya gawat janin menimbulkan perubahan denyut jantung janin.
- b. Pengeluaran mekonium pada letak kepala menunjukkan gawat janin.

Setelah lahir

- a. Bayi tidak bernapas atau napas megap-megap.
- b. Denyut jantung kurang dari 100x/menit.
- c. Kulit sianosis, pucat, tonus otot menurun.
- d. Tidak ada respon terhadap refleks rangsangan.

### **3. Etiologi / Penyebab Asfiksia**

#### **a. Faktor antepartum**

- 1). Umur >35 tahun.
- 2). Ibu dengan diabetes.
- 3). Hipertensi dengan kehamilan.
- 4). Anemia.
- 5). Infeksi pada ibu.
- 6). Ketuban pecah sebelum waktunya (KPD).
- 7). Kehamilan ganda.

#### **b. faktor intrapartum**

- 1). Faktor secarea.
- 2). Sungsang atau kelainan letak.
- 3). Persalinan kurang bulan.
- 4). Persalinan lama.
- 5). Cairan amnion bercampur meconium.
- 6). Prolaps tali pusat, lilitan tali pusat, simpul tali pusat, tekanan pada tali pusat, ketuban telah pecah, kehamilan lewat waktu.
- 7). Abruption plasenta.
- 8). Plasenta previa.
- 9). Gangguan his pada ibu.

### **4. Patofisiologi Asfiksia**

Tahap awal asfiksia ditandai dengan periode pernapasan cepat, bunyi jantung dan tekanan darah yang meningkat, kemudian diikuti oleh

apnea primer. Asfiksia akan menyebabkan redistribusi aliran darah ke jantung, otak dan adrenal agar kebutuhan oksigen dan substrat terhadap organ-organ vital tersebut terpenuhi. Mekanisme terjadinya redistribusi tersebut melalui hipoksia dan meningkatnya CO<sub>2</sub>, bertambahnya aktivitas simpatis dan kemoreseptor, bersama-sama dengan pelepasan vasopressin arginine. Hipoksia juga merangsang kemoreseptor, melalui regulasi nervus vagus, akan menyebabkan bradikardia. Jika hipoksia berlanjut akan terjadi penurunan Ph dan asidosis metabolik (Vivian dkk, 2011).

Jika asfiksia sangat berat akan terjadi gangguan autoregulasi aliran darah ke otak dan jantung sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah dan curah jantung. Selama asfiksia berat aliran darah yang ke otak lebih banyak ke batang otak dari pada ke serebrum. Akibat pengiriman oksigen yang berkurang ke otak, maka akan terjadi *focus injury* di daerah aliran kolateral cortex (*parasagittal watershed area*). Akibat redistribusi darah ke otak dan jantung, ginjal akan mengalami *ischemic injury* pada tubulus ginjal yang proksimal, jika proses berlanjut akan terjadi nekrosis epitel tubulus (Vivian dkk, 2011).

## **5. Manifestasi Klinik**

Asfiksia merupakan akibat hipoksia janin yang menimbulkan tanda-tanda klinis pada janin atau bayi berikut ini:

- a. Djj lebih dari 100 kali permenit atau kurang dari 100 kali per menit tidak teratur.

- b. Mekonium dalam air ketuban pada janin letak kepala tonus otot buruk karena kekurangan oksigen pada otak, otot, dan organ lain.
- c. Depresi pernapasan karena otak kekurangan oksigen.
- d. Bradikardi (penurunan frekuensi jantung) karena kekurangan oksigen pada otot – otot jantung atau sel – sel otak.
- e. Tekanan darah rendah karena kekurangan oksigen pada otot jantung, kehilangan darah atau kekurangan aliran darah yang kembali ke plasenta sebelum dan selama proses persalinan.
- f. Takipneu (pernapasan cepat) karena kegagalan absorpsi di dalam darah.
- g. Pucat.
- h. Penurunan terhadap spinkters (Lyndon, 2014).

### **1. Diagnosa Asfiksia**

#### Anamnesis

Anamnesis diarahkan untuk mencari faktor risiko terhadap terjadinya asfiksia neonatorum.

- a. Gangguan/kesulitan waktu lahir.
- b. Cara dilahirkan.
- c. Ada tidaknya bernapas dan menangis segera setelah dilahirkan (Ghai, 2012).

#### Pemeriksaan fisik

- a. Denyut jantung kurang dari 100 kali permenit.
- b. Bayi tidak bernapas atau menangis.

- c. BBLR (berat badan lahir rendah).
- d. Adanya cairan ketuban ibu bercampur dengan mekonium atau sisa mekonium pada tubuh bayi.
- e. Tonus otot menurun (Vivian dkk, 2011).

Pemeriksaan penunjang (Laboratorium)

Analisa gas darah: asidosis metabolik/respiratorik,  $PO_2$  menurun  
elektrolit: hipokalsemia ( $< 7$  mg/dl), glukosa (dekstrostiks): hipoglikemia  
(kurang bulan  $<20$  mg/dl, cukup bulan  $<30$  mg/dl). Radiologi: foto toraks,  
USG kepala, dan CT scan kepala. (Vivian dkk, 2011).

## **2. Penilaian Asfiksia pada Bayi Baru Lahir**

Bisa jadi bayi tidak mengalami gejala asfiksia neonatorum dengan segera. Terdengarnya denyut jantung janin yang terlalu tinggi atau rendah dapat menjadi indikator sebelum persalinan, baca: denyut jantung janin normal, apabila hal ini segera terjadi, maka bayi akan mengalami gejala asfiksia segera setelah lahir sebagai berikut:

- a. Kulit tampak pucat atau kebiruan (sianosis).
- b. Kesulitan bernapas, yang dapat menyebabkan seperti napas cuping hidung atau pernapasan perut atau sama sekali tidak bernapas.
- c. Detak jantung yang lambat.
- d. Otot lemah.
- e. Tidak ada reaksi jika diberi rangsangan.
- f. Kekurangan oksigen berlanjut sebelum atau sesudah persalinan.

(Karen Richardson Gill, 2018).

### 3. Persiapan resusitasi pada Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia

#### a. Persiapan keluarga.

Sebelum melakukan pertolongan persalinan, terlebih dahulu bicarakan pada keluarga mengenai kemungkinan – kemungkinan yang dapat terjadi pada ibu dan bayinya (Tando, 2013).

#### b. Persiapan tempat

Persiapan tempat yaitu meliputi ruang bersalin dan tempat resusitasi. Gunakan ruangan yang hangat dan terang. Tempat resusitasi hendaknya rata, keras, bersih, dan kering. kondisi rata diperlukan untuk mengatur posisi kepala bayi. Tempat resusitasi sebaiknya didekat sumber pemanas.

#### c. Persiapan alat resusitasi

1) Perlengkapan penghisap: balon penghisap (*bulb syringe*), penghisap mekanik dan tabung, kateter penghisap, pipa lambung.

2) Peralatan balon dan sungkup : balon resusitasi neonatus yang dapat memberikan oksigen 90%-100% dengan volume balon resusitasi 250ml, sungkup ukuran bayi cukup bulan dan bayi kurang bulan (dianjurkan memiliki bantalan pada pinggirnya), sumber oksigen dengan pengatur aliran (ukuran sampai 10 L/m) dan tabung.

3) Peralatan intubasi: laringoskop, selang endotrakeal (*endotracheal tube*) dan stilet (bila tersedia) yang cocok dengan pipa endotrakeal yang ada (Tando 2013:149).

#### d. Persiapan tenaga kesehatan

- 1) Lepas semua perhiasan pada tangan: jam tangan, cincin.
- 2) Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian lap dengan kain bersih dan kering.
- 3) Memakai alat pelindung diri (APD): sepatu booth, celemek, handscoon, kaca mata (sudarti dan fauziah. a, 2013)


e. Persiapan obat-obatan

- 1) Epinefrin 1 : 10.000 (0,1 mg/ml) – 3 ml atau ampul 10 ml.
- 2) Kristaloid insotonik (NaCl 0,9% atau ringer laktat) untuk menambah volume – 100 atau 250 ml.
- 3) Natrium bikarbonat 4,2% (5 mEq/10 ml) – ampul 10 ml.
- 4) Naloxone hidroklorida 0,4 mg/ml atau 1,0 mg/ml.
- 5) Dextrose 10% 250 ml. (Tando 2013:150).

**4. Penatalaksanaan Asfiksia**

a. Langkah awal resusitasi


Gambar 2.1 : Langkah awal



(Sumber: Sudarti & Afroh, 2013:74)

- 1) Memberikan kehangatan bayi diletakkan di bawah alat pemancar panas (*radiant warmer*) untuk melakukan pertolongan.
- 2) Memposisikan bayi dengan sedikit menengadahkan kepalanya, kepala bayi sedikit ekstensi atau menjanggal bahu bayi menggunakan kain.
- 3) Membersihkan jalan nafas sesuai keperluan
- 4) Mengeringkan bayi, merangsang pernapasan dan meletakkan pada posisi yang benar, mengisap sekret, dan mengeringkan akan memberikan rangsangan yang cukup baik pada bayi untuk memulai pernapasan. Bila setelah posisi yang benar, pengisapan sekret dan pengeringan, bayi belum bernapas adekuat, maka rangsangan taktil dapat dilakukan dengan menepuk atau menyentil telapak kaki, atau dengan menggosok punggung, tubuh atau ekstremitas bayi.

Gambar 2.2 rangsangan taktil




(Sumber: Sudarti & Afroh,2013:74)

- 5) Letakkan kembali bayi pada posisi yang benar, kemudian nilai: usaha nafas, frekuensi jantung dan warna kulit.

b. Ventilasi tekanan positif

Gambar 2.3: kecepatan melakukan ventilasi



(Sumber: Sudarti & Afroh,2013:78).

Pengertian: tindakan memasukan sejumlah udara ke dalam paru dengan tekanan positif, membuka alveoli untuk bernafas secara spontan dan teratur.

- 1) Bila bayi tidak menangis atau megap-megap, warna kulit bayi biru atau pucat, denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, lakukan langkah resusitasi dengan melakukan ventilasi tekanan positif.
- 2) Sebelumnya periksa dan pastikan bahwa alat resusitasi (balon resusitasi dan sungkup muka) telah tersedia dan berfungsi dengan baik.
- 3) Cuci tangan dan gunakan sarung tangan sebelum memegang memeriksa bayi.

- 4) Selimuti bayi dengan kain kering dan hangat, kecuali muka dan dada bagian atas, kemudian letakan dengan alas yang hangat.
- 5) Periksa ulang posisi bayi dan pastikan kepala telah dalam posisi setengah tengadah (sedikit ekstensi).
- 6) Tekan balon resusitasi dengan dua jari atau dengan seluruh jari tangan (bergantung pada ukuran balon resusitasi).
- 7) Lakukan pengujian pertautan dengan melakukan ventilasi sebanyak dua kali dan periksa gerakan dinding dada.
- 8) Bila pertautan baik (tidak bocor) dan dinding dada mengembang, melakukan ventilasi dengan menggunakan oksigen (bila tidak tersedia oksigen gunakan udarah ruangan).
- 9) Pertahankan kecepatan ventilasi sekitar 40 kali per60 detik dengan tekanan yang tepat sambil melihat gerakan dada (naik turun) selama ventilasi.
- 10) Bila dinding dada naik turun dengan baik berarti ventilasi berjalan secara adekuat.
- 11) Bila dinding dada tidak naik, periksa ulang dan betulkan posisi bayi, atau terjadi kebocoran jika tekanan ventilasi kurang.
- 12) Lakukan ventilasi selama 2x30 detik atau 60 detik, kemudian lakukan penilaian upaya bernafas spontan dan warna kulit.


Ventilasi dengan balon dan sungkup dalam waktu yang cukup lama (beberapa menit) dan bila perut bayi kelihatan membuncit, maka harus dilakukan pemasangan pipa lambung dan

pertahankan selama ventilasi karena udarah dariorofaring dapat masuk ke dalam esofagus dan lambung yang kemudian menyebabkan:

- a) Lambung yang terisi udarah akan membesar dan menekan diafragma sehingga menghalangi paru-paru untuk berkembang
- b) Dalam lambung dapat menyebabkan terjadi aspirasi
- c) Udarah dalam lambung dapat masuk ke usus dan menyebabkan diafragma tertekan.

c. Kompresi dada

Gambar 2.4: melakukan kompresi dada



(Sumber: Sudarti & Afroh,2013:79)

Cara kompresi dada:

- 1) Menekan dada antara sternum vertebra
- 2) Membantu jantung memompa darah
- 3) Perlu 2 orang: 1 melakukan VTP dan 1 orang melakukan kompresi
- 4) Harus terkoordinasi
- 5) Tempat penekanan: 1/3 distal sternum
- 6) Kedalaman: 1/3 diameter antero-posterior

7) Teknik ibu jari dan dua jari serta teknik ibu jari lebih di sukai

8) Perbandingan: 3 kompresi-1 ventilasi





#### ***D. Wewenang Bidan***

Bidan dalam menyelenggarakan praktiknya berlandaskan pada peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor hk.02.02/menkes/149/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan.

#### **PASAL 11**

Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a berwenang yaitu:

1. Memberikan imunisasi dalam rangka menjalankan tugas pemerintah.
2. Bimbingan senam hamil.
3. Episiotomi.
4. Penjahitan luka episiotomi.
5. Kompresi bimanual dalam rangka kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan.
6. Pencegahan anemia.
7. Inisiasi menyusui dini dan promosi susu ibu eksklusif.
8. Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia.
9. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk.
10. Pemberian minum dengan sonde/pipet (Tresnawati, 2013).

#### ***E. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan***

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan–penemuan, keterampilan dalam

rangkaian/tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang berfokus pada klien Tahap dalam Manajemen Asuhan Kebidanan.

## 2. Tahapan Manajemen Kebidanan

Manajemen asuhan kebidanan menurut varney (7 langkah), meliputi:

### a. Langkah I: Pengumpulan data dasar

Langkah ini dilakukan dengan melakukan pengkajian melalui proses pengumpulan data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan pasien secara lengkap seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan, peninjauan catatan terbaru atau catatan sebelumnya, data laboratorium dan membandingkannya dengan hasil studi. Semua data dikumpulkan dari sumber yang berhubungan dengan kondisi pasien. Pengumpulan data dimulai pada saat pasien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan kebidanan berlangsung. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, baik sumber primer (pasien) maupun sumber sekunder (anggota keluarga atau tenaga kesehatan lain). Teknik pengumpulan data ada 3 yaitu observasi (melalui panca indera), wawancara (Tanya jawab), dan pemeriksaan (memakai instrument). Data diskasifikasikan menjadi dua, yaitu data subjektif dan data objektif.

Bidan mengumpulkan data dasar dengan lengkap, bila klien mengalami komplikasi yang perlu dikonsultasikan pada dokter dalam manajemen kolaborasi, bidan akan melakukan konsultasi. Pada keadaan tertentu bisa terjadi langkah pertama overlap dengan langkah

ke-5 dan 6 (atau menjadi bagian dari langkah- langkah tersebut), karena data yang diperlukan diambil dari hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan diagnostik lainnya. Kadang – kadang bidan perlu memulai manajemen dari langkah 4 untuk mendapatkan data dasar awal yang perlu disampaikan kepada dokter.

Pada kasus asfiksia, data yang perlu untuk dikumpulkan yaitu, sesuai buku saku pelayanan kesehatan neonatal esensial mengatakan data subjektif yang terdiri dari, usia kehamilan ibu apakah cukup bulan atau kurang bulan, selain itu diperlukan data tentang riwayat pemeriksaan dalam apakah ketuban sudah pecah atau belum, apakah ketuban bercampur mekonium atau tidak.

Pada data objektif pun termasuk kedalam asuhan kebidanan pada bayi dengan asfiksia yang terdiri dari pemeriksaan umum bayi, pemeriksaan tanda-tanda vital bayi, apakah bayi segera menangis setelah lahir, apakah bayi bernapas secara spontan atau menggap-mengap, apakah tonus otot bayi baik atau bayi bergerak aktif. Apabila bayi mengalami asfiksia maka pernapasan bayi menggap-mengap, tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada, dan bayi tidak bergerak aktif.

b. Langkah II: Identifikasi data dasar

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi data secara benar terhadap diagnosa atau masalah kebutuhan pasien. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditentukan masalah

atau diagnosa spesifik. Kata masalah dan diagnosa keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa, namun membutuhkan penanganan yang dituangkan kedalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Selain itu, sudah terpikirkan perencanaan yang dibutuhkan terhadap masalah. Sebagai contoh masalah yang disertai diagnosa seperti diagnosa kemungkinan perempuan hamil tersebut masuk trimester III, masalah yang kemungkinan akan muncul adalah takut tidak termasuk kedalam kategori “diagnosa nomenklatur” tetapi tetap akan menciptakan sesuatu masalah yang membutuhkan pengkajian lebih lanjut dan memerlukan suatu perencanaan untuk mengurangi rasa takut.

Pada kasus asfiksia, jika telah mendapatkan data subjektif dari anamnesis riwayat kehamilan dan persalinannya. Sedangkan data objektif didapatkan keadaan umum bayi buruk, bayi belum bias bernapas dengan spontan, dan otot lemas bahkan hampir tidak ada. Maka bias ditegakkan diagnose actual sebagaimana bayi baru lahir dengan asfiksia.

c. Langkah III: Identifikasi diagnosa atau masalah potensial

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan diagnosa potensial yang lain berdasarkan beberapa masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi yang cukup dan apabila memungkinkan dilakukan proses pencegahan atau dalam kondisi tertentu pasien membutuhkan tindakan

segera. Contoh diagnosa kebidanan: kehamilan normal, abortus, dll. Pada langkah ini penting sekali untuk melakukan asuhan yang aman. Misal pada persalinan dengan bayi yang besar, bidan juga sebaiknya mengantisipasi dan bersiap-siap terhadap kemungkinan terjadinya *dystocia bahu* sehingga perlu disiapkan kebutuhan untuk resusitasi.

Langkah ketiga ini, bidan dituntut untuk mampu mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah potensial yang akan terjadi, tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi agar masalah atau diagnosa potensial tidak terjadi. Dengan demikian, kaji ulang diagnosis atau masalah potensial yang diidentifikasi sudah tepat. Pada kasus asfiksia, diagnosa potensial yang mungkin terjadi adalah kematian pada bayi dan infeksi pada tali pusat.

d. Langkah IV: Identifikasi tindakan segera atau kolaborasi

Tahap ini dilakukan oleh Bidan dengan melakukan identifikasi dan menetapkan beberapa kebutuhan setelah diagnosa dan masalah ditegakkan. Kegiatan bidan pada tahap ini adalah konsultasi, kolaborasi, dan melakukan rujukan. Beberapa data menunjukkan situasi emergency dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu dan bayi, dan beberapa sementara menunggu instruksi dokter, mungkin juga akan memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang tepat.

Pada kasus asfiksia, tindakan antisipasi atau tindakan segera yang harus dilakukan yaitu melakukan resusitasi pada bayi baru lahir agar bayi dapat bernapas secara spontan.

e. Langkah V: Rencana asuhan kebidanan

Setelah beberapa kebutuhan pasien ditetapkan, diperlukan perencanaan menyeluruh terhadap masalah dan diagnosa yang ada. Dalam proses perencanaan asuhan secara menyeluruh juga dilakukan identifikasi beberapa data yang tidak lengkap agar pelaksanaan secara menyeluruh dapat teratasi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang berkaitan, tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap perempuan tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu bidan dan klien agar dapat dilaksanakan asuhan kebidanan secara efektif, karena pada akhirnya perempuan itulah yang akan melaksanakan rencana itu atau tidak. Semua asuhan yang dikembangkan secara menyeluruh harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori up to date serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan atau tidak akan dilakukan oleh klien.

Rencana yang dilakukan untuk bayi Asfiksia adalah:

- 1) Melakukan pemotongan tali pusat segera setelah lahir.
- 2) Mencegah kehilangan panas, termasuk menyiapkan tempat yang kering dan hangat untuk melakukan pertolongan.

- 3) Memposisikan bayi dengan baik (kepala bayi setengah tengadah/sedikit ekstensi atau menjanggal bahu bayi dengan kain).
- 4) Membersihkan jalan napas dengan kain bersih dan kering.
- 5) Bungkus bayi dengan selimut bersih dan kering.
- 6) Lakukan teknik rangsangan taktil dengan menepuk punggung dan kaki bayi.
- 7) Letakkan kembali bayi dengan posisi yang baik dan benar, kemudian nilai: usaha napas, frekuensi denyut jantung dan warna kulit.
- 8) Lakukan ventilasi dengan tekanan positif (VTP) dengan menggunakan ambu bag sebanyak 20 kali dalam 30 detik sampai bayi dapat bernapas spontan dan frekuensi jantung  $>100$  kali/menit.
- 9) Hentikan ventilasi dan nilai kembali napas tiap 30 detik.
- 10) Jika tindakan ventilasi tekanan positif berhasil, berikan ventilasi dan berikan asuhan pasca resusitasi.
- 11) Melakukan perawatan tali pusat.
- 12) Memberikan salep mata.
- 13) Injeksi vitamin K.
- 14) Melakukan pemeriksaan fisik.
- 15) Berikan imunisasi Hepatitis B, kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K.

16) Jika bayi tidak bernapas spontan sudah 2 menit resusitasi, siapkan rujukan, nilai denyut jantung.

17) Observasi TTV tiap 15 menit.

f. Langkah VI: Implementasi asuhan kebidanan

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari semua rencana sebelumnya, baik terhadap masalah pasien maupun diagnosa yang ditegakkan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh bidan secara mandiri maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. Bidan bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh.

Pelaksanaan asuhan kebidanan pada bayi dengan asfiksia sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat seperti:

1) Melakukan pemotongan tali pusat bayi segera setelah lahir.

Rasional: dengan memotong tali pusat akan memutuskan hubungan bayi dengan ibu dan membantu proses pernapasan dan sirkulasi.

2) Mencegah kehilangan panas, termasuk menyiapkan tempat yang kering dan hangat untuk melakukan pertolongan.

Rasional: suhu intrauterin dan ekstrauterin sangat berbeda dimana saat bayi lahir penyesuaian suhu diluar kandungan sangat memerlukan pengawasan agar tidak terjadi kehilangan panas.

- 3) Memposisikan bayi dengan baik (kepala bayi setengah tengadah/sedikit ekstensi atau menjanggal bahu bayi dengan kain)

Rasional: untuk membuka jalan napas bayi.

- 4) Bersihkan jalan napas dengan alat penghisap yang tersedia seperti deele.

Rasional: untuk memperlancar proses respirasi sehingga bayi dapat bernapas secara teratur tanpa kesulitan.

- 5) Bungkus bayi dengan selimut bersih dan kering.

Rasional: untuk mencegah kehilangan panas bayi.

- 6) Lakukan rangsangan taktil dengan menepuk punggung dan kaki.

Rasional: untuk merangsang agar bayi dapat bernapas secara spontan.

- 7) Letakkan kembali bayi pada posisi yang benar, kemudian nilai: usaha napas, frekuensi denyut jantung dan warna kulit.

Rasional: untuk mengetahui kondisi bayi untuk menentukan apakah tindakan resusitasi diperlukan.

- 8) Lakukan ventilasi dengan tekanan positif (VTP) dengan menggunakan ambu bag sebanyak 20 kali dalam 30 detik sampai bayi dapat bernapas spontan dan frekuensi jantung >100 kali/menit.

Rasional: tindakan memasukkan sejumlah udara kedalam paru dengan tekanan positif, membuka alveoli untuk bernapas secara spontan dan teratur.

9) Hentikan ventilasi dan nilai kembali napas tiap 30 detik.

Rasional: untuk menilai pernapasan setelah tindakan ventilasi tekanan positif.

10) Jika tindakan ventilasi tekanan positif berhasil, hentikan ventilasi dan berikan asuhan pasca resusitasi.

Rasional: agar bayi dapat segera diberikan asuhan

11) Melakukan perawatan tali pusat.

Rasional: untuk menghindari adanya tanda-tanda infeksi pada bayi.

12) Injeksi vitamin K 0,5 cc.

Rasional: untuk mencegah terjadinya perdarahan pada otak.

13) Memberikan salep mata.

Rasional: untuk mencegah infeksi pada mata bayi baru lahir.

14) Melakukan pemeriksaan fisik.

Rasional: untuk mendeteksi dini kelainan fisik pada bayi.

15) Berikan imunisasi hepatitis B 0,5 ml intramuscular di paha kanan interior, kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1.

Rasional: hepatitis B untuk memberi kekebalan tubuh pada bayi.

16) Jika bayi tidak bernapas secara spontan setelah 2 menit resusitasi, siapkan rujukan, nilai denyut jantung.

Rasional: agar bayi segera mendapat pertolongan dengan cepat dan tepat.

17) Observasi TTV tiap 15 menit.

Rasional: mengukur TTV bayi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keadaan umum bayi sehingga dapat dilakukan tindakan segera saat tanda-tanda vitalnya terdeteksi diluar batas normal.

g. Langkah VII: Evaluasi

Merupakan tahap terakhir dalam manajemen kebidanan, yaitu dengan melakukan evaluasi dari perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan oleh bidan. Evaluasi sebagian dari pelayanan secara komprehensif dan selalu berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien. Evaluasi efektif dari asuhan yang telah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah telah terpenuhi sesuai dengan apa yang diidentifikasi dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut bisa dianggap efektif jika memang efektif pelaksanaannya, ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedang sebagian belum efektif.

Pada langkah ini evaluasi pada asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan asfiksia diantaranya, keadaan umum bayi baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada kendala dan tidak ada komplikasi pada saat setelah bayi lahir dan tetap memantau tanda-tanda vital pada bayi.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Format SOAP pada umumnya digunakan untuk pengkajian awal pasien

a. S : Data Subjektif (Langkah I)

Pendokumentasian ini hanya menggambarkan data pasien melalui anamnesa. Tanda dan gejala subjektif yang diperoleh dari hasil wawancara dari pasien. Suami, atau keluarga (identitas umum, keluhan, riwayat menarche, riwayat kehamilan, riwayat perkawinan, riwayat KB, riwayat persalinan, penyakit, riwayat penyakit menurun, riwayat kesehatan keluarga, riwayat psikososial, dan pola hidup).

Ini berhubungan dengan sudut pandang pasien. Ekspresi pasien tentang kekhawatiran dan keluhannya dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosis. Pada orang yang bisu, dibagian data belakang “S” diberi tanda “O” atau “X” ini menandakan orang bisu. Data subjektif menguatkan diagnosa yang akan dibuat.

b. O : Data Objektif (Langkah I)

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan fisik klien, hasil lab, dan tes diagnostik yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung assessment. Pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Data ini memberikan bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosa. Data fisiologis, hasil observasi yang jujur, informasi kajian teknologi (hasil laboratorium, sinar X, rekaman CTG, dan lain-lain) dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Apa yang diobservasi oleh bidan akan menjadi komponen yang berarti dari diagnosa yang akan ditegakkan.

Pada kasus asfiksia pemeriksaan yang perlu dilakukan ialah selain itu, data objektif pun termasuk kedalam asuhan kebidanan pada bayi dengan asfiksia yang terdiri dari pemeriksaan umum bayi, pemeriksaan tanda-tanda vital bayi, apakah bayi segera menangis setelah lahir, apakah bayi bernapas dengan spontan atau mega-megap setelah lahir, apakah tonus otot bayi baik atau bergerak aktif, apabila bayi mengalami asfiksia maka pernapasan bayi megap-megap, tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada, dan bayi tidak bergerak aktif.s

c. A: Assessment (Langkah II, III,dan IV)

Diagnosa atau masalah yang ditegakkan berdasarkan informasi subjektif dan objektif yang dikumpulkan atau yang disimpulkan. Keadaan pasien terus berubah selalu ada informasi baru bagi subjektif maupun objektif, dan sering diungkapkan secara terpisah-pisah, maka proses pengkajian adalah suatu proses yang dinamik. Sering menganalisa adalah suatu yang penting dalam mengikuti perkembangan pasien dan menjamin suatu perubahan baru dan cepat diketahui dan dapat diikuti sehingga dapat diambil tindakan yang tepat.

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi data subjektif dan objektif suatu identifikasi diagnosa masalah danantisipasi masalah lain/diagnosa potensial.

Pada kasus asfiksia langkah ini kita sudah bias menegakkan diagnosa bahwa benar pasien menderita asfiksia pada bayi baru lahir

berdasarkan dari data subjektif dan objektif yang di dapatkan. Setelah menegakkan diagnosa asfiksia pada bayi baru lahir kita perlu mengantisipasi terjadinya infeksi tali pusat atau kematian pada bayi.

d. P: Planning/Perencanaan (Langkah V, VI, dan VII)

Menggambarkan pendokumentasian dari perencanaan dan evaluasi berdasarkan assessment. Untuk perencanaan, implementasi dan evaluasi dimasukkan dalam “P”. Pada tahap terakhir ini melakukan kunjungan ulang dan mengkaji serta menanyakan keadaan umum bayi pada ibunya, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi dan mengantisipasi adanya infeksi pada tali pusat.

Pada pasien dengan kasus asfiksia yang ditangani di rumah sakit dan dibolehkan untuk pulang maka tetap akan dilakukan rencana untuk melakukan kunjungan rumah terhadap pasien. Rencana asuhan yang akan dilakukan yakni mengkaji keadaan umum dan keadaan bayi, pemeriksaan tanda-tanda vital bayi, memberikan konseling pada ibu tentang perawatan tali pusat, untuk menyusui anaknya secara on demand, tetap menjaga personal hygiene pada bayi agar tidak terjadi infeksi, dan pemantauan berat badan bayi.

**BAB III**  
**STUDI KASUS**

**MANAJEMEN ASUHAN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU  
LAHIR DENGAN ASFIKZIA DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR  
TANGGAL 17 JANUARI 2022**

No. register : 09XXX

Tanggal Bersalin : Senin 17 Januari 2022 Jam 09.10 WITA

Tanggal Pengkajian : Senin 17 Januari 2022 Jam 09.10 WITA

Nama Pengkaji : Tenri Angka

**A. LANGKAH I: IDENTIFIKASI DATA DASAR**

**1. Identitas**

a. Bayi

Nama : Bayi Ny "S"

Umur : 0 Hari

Tempat tanggal lahir : Makassar, Senin 17 Januari 2022 Jam 09.10  
WITA

Jenis kelamin : Perempuan

Anak ke : I (Pertama)

b. Orangtua

Nama : Ny "S" / Tn "N"

Umur : 24 Tahun / 25 Tahun

Nikah/lamanya : 1 X / +1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : SMA / SMA  
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta  
Alamat : Kompleks “B”

## 2. Data Biologis

### a. Riwayat Prenatal

- 1) Ini adalah anak pertama.
- 2) HPHT : 11 April 2021
- 3) HTP : 18 Januari 2022
- 4) Masa gestasi 40 minggu 1 hari.
- 5) Tidak memiliki riwayat penyakit DM, Asma, Hipertensi, Jantung dan penyakit lainnya.
- 6) Tidak pernah mengalami sakit kepala atau nyeri perut yang hebat saat kehamilan.
- 7) Tidak memiliki penyakit menurun.
- 8) Tidak pernah melakukan pengobatan ke dukun, tidak merokok, atau minum jamu.
- 9) Selama hamil ibu makan 3-4 kali sehari dengan menu Nasi, ikan, sayur yang berbagai macam dan minum susu.

### b. Riwayat Intranatal

- 1) Bayi lahir pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 09.10 wita, dengan keadaan asfiksia sedang dikarenakan partus macet.
- 2) Bayi lahir dengan penilaian

- a) Tidak segerah menangis dan tidak bernapas spontan serta melakukan usaha napas megap-megap.
- b) Denyut Jantung lemah dan tidak teratur yaitu 88 kali/menit.
- c) Warna Kulit seluruh tubuh berwarna putih pucat

### **3. Data psikologis, Sosial, dan Ekonomi**

Ibu dan keluarga cemas dengan keadaan bayi, hubungan antara ibu dan suami serta keluarga baik, ibu menggunakan BPJS untuk membayar biaya perawatan di Rumah sakit.

### **4. Data Spiritual**

Ibu dan keluarga senantiasa berdoa kepada Allah swt agar bayinya sehat wal'afiat, ibu dan suami serta keluarga senantiasa sholat 5 waktu.

### **5. Pemeriksaan Umum**

- a. Keadaan umum bayi kurang baik, bayi melakukan usaha napas dengan megap-megap
- b. Tanda-tanda vital bayi
  - 1) Frekuensi jantung : 88x/menit
  - 2) Pernapasan : belum bernapas secara teratur dan masih melakukan usaha, pernapasan megap-megap (Normalnya 40-6-x/menit)
  - 3) Suhu : 36,5°C (normal 36,5°C-37,5°C).
- c. Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi
  - 1) Kepala
    - Ubun-ubun normal, tidak ada molase, dan tidak ada benjolan. tidak ada kelainan kongenital.

2) Telinga

Simetris kanan dan kiri, daun telinga tampak normal, lunak dan mudah kembali ke bentuk semula saat ditebuk.

3) Mata

Konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus, tidak ada secret.

4) Hidung Dan Mulut

Bentuk hidung normal, bibir bayi tidak mengalami sumbing/kelainan.

5) Leher

Tidak terdapat pembengkakan kelenjar tyroid, dan vena jugularis, tidak terdapat lipatan kulit pada lipatan kulit yang berlebihan dibelakang leher yang menunjukkan adanya kemungkinan trisomi 21.

6) Dada dan perut

Simetris kanan dan kiri, tidak ada benjolan pada dada, serta tali pusat masih basah dan dijepit dengan penjepit tali pusat.

7) Bahu, lengan dan tangan

Kedua lengan sama panjang, ekstremitas belum bergerak aktif, jumlah jari lengkap.

8) Genitalia dan anus

Labia mayora menutupi labia minora, lubang uretra terpisah dengan lubang vagina.

9) Tungkai dan kaki

Tungkai kaki belum bergerak bebas, jumlah jari lengkap.

10) Punggung

Tidak ada benjolan pada punggung bayi.

11) Kulit

Seluruh tubuh berwarna putih, terdapat sedikit verniks.

12) Dilakukan penilaian APGAR Score segera setelah bayi lahir yaitu pada

Pukul 09.10 Wita dan 5 menit setelah lahir yaitu pukul 09.15 Wita.

**Tabel 2.2** Penilaian ABGAR Score

Klinis	Score			Menit	
	0	1	2	1	5
<i>Appearance</i>	Seluruh tubuh biru atau putih	Badan merah ekstremitas biru	Seluruh tubuh kemerahan	0	1
Pulse	Tidak ada	<100 kali permenit	>100 kali permenit	1	1
<i>Grimace</i>	Tidak ada	Perubahan mimik (menyeringai)	Bersin/menangis	1	2
<i>Activity</i> (Tonus Otot)	Tidak ada	Ekstremitas sedikit fleksi	Gerak aktif/ekstremitas fleksi	1	1
<i>Respiratory</i> (pernapasan)	Tidak ada	Lemah/tidak teratur	Menangis kuat/keras	1	1
Score				4	6

**B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL**

**Diagnosa aktual :** BCB, SMK, dan bayi dengan keadaan asfiksia sedang.

1. BCB/SMK/Asfiksia sedang

Data Dasar :

DS : Ibu mengatakan HPHT 11 April 2021

DO : BBL : 3600 gram

PBL : 50cm.

Analisa dan interpretasi data

- a. Dari hasil pengkajian yaitu HPHT 11 April 2021 sampai bayi lahir di tanggal 17 Januari 2022 yang artinya bayi lahir pada usia kehamilan 40 minggu 1 hari dan termasuk dalam kategori bayi cukup bulan (BCB).
- b. Bayi Ny "S" lahir dengan berat badan 3600 gram. Berdasarkan kurva perkembangan dan pertumbuhan bayi janin intrauterine dari Battaglia dan Lubcheco, berat badan bayi Ny "S" sesuai dengan masa kehamilan (SMK).

## 2. Asfiksia

Data Dasar :

DS : Bidan mengatakan bayinya lahir tidak segera menangis.

DO : a. Pada saat lahir bayi tidak segera menangis.

- b. Bayi lahir dengan partus macet.
- c. Frekuensi jantung 88 kali/menit.
- d. Seluruh tubuh bayi putih pucat.
- e. Tonus otot lemah.
- f. pernapasan megap-megap.

Analisa dan Interpretasi data dasar :

- a. Salah satu faktor ibu yang menyebabkan Asfiksia adalah pada proses persalinan kala II terjadi partus macet (distosia). Distosia bahu

menyebabkan terjadinya persalinan yang terhambat sehingga bayi lama untuk keluar, kondisi ini dapat membuat bayi mengalami kehilangan O<sub>2</sub> dan mengalami hipoksia serta tali pusat terjepit yang menyebabkan sehingga terjadinya gangguan pertukaran gas atau pengangkutan oksigen dalam darah yang menimbulkan asfiksia ditandai oleh periode apneu.

- b. Pada bayi dengan asfiksia sedang ditandai dengan bayi tidak segera menangis, tidak bernafas atau napas megap-megap, denyut jantung kurang dari 100 kali permenit dan seluruh tubuh berwarna putih.

### **C. LANGKAH III : ANTISIPASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL**

**Diagnosa potensial** : Potensial dapat terjadi asfiksia berat, kejang bahkan kematian.

DO : a. Bayi lahir tidak segera menangis.

- b. Bayi bernafas megap-megap.

Analisa dan interpretasi data

- a. Bayi yang mengalami asfiksia sedang dapat berlanjut menjadi asfiksia berat apabila tidak diberikan penanganan yang cepat dan tepat.
- b. Bayi yang mengalami asfiksia bila kekurangan oksigen yang berlangsung secara terus menerus maka akan terjadi kegagalan fungsi miokardium dan kegagalan fungsi curah jantung, sehingga penurunan tekanan darah yang mengakibatkan aliran darah ke seluruh tubuh jadi berkurang dan akibat dari

kekurangan perfusi darah oksigenasi jaringan yang akan menimbulkan kerusakan jaringan otak, kerusakan organ tubuh lain, kejang, atau bahkan kematian.

#### **D. LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/EMERGENCY DAN KOLABORASI**

Tanggal 17 Januari 2022, Pukul 09:10 Wita

1. Menilai usaha napas, warna kulit, dan frekuensi denyut jantung.  
Rasional: untuk mengetahui kondisi bayi dan untuk menentukan apakah tindakan resusitasi diperlukan atau tidak.
2. Mencegah kehilangan panas termasuk menyiapkan tempat yang kering dan hangat untuk melakukan pertolongan.  
Rasional: suhu intrauterine dan ekstrauterine sangat berbeda dimana pada saat bayi lahir penyesuaian suhu diluar kandungan sangat memerlukan pengawasan agar tidak terjadi kehilangan panas pada tubuh bayi.
3. Memposisikan bayi dengan baik (kepala bayi sedikit ekstensi dengan mengganjal bahu bayi dengan kain).  
Rasional: untuk membuka jalan napas bayi agar cairan tidak masuk ke dalam paru-paru sehingga bayi dapat segera bernapas spontan.
4. Bersihkan jalan nafas dengan alat penghisap lendir menggunakan Delee.  
Rasional: agar bayi dapat bernapas secara spontan tanpa gangguan.
5. Keringkan tubuh bayi dengan menggunakan kain kering, bersih, dan hangat, setelah itu gunakan kain yang baru sambil melakukan rangsangan taktil.

Rasional: melakukan rangsangan taktil, bayi dapat segera menangis karena rangsangan taktil dapat merangsang pernapasan dan meningkatkan aspirasi O<sub>2</sub>.

6. Jika bayi telah bernapas secara spontan dan frekuensi jantung sudah normal tetapi masih biru maka dilakukan pemberian oksigen 1 liter/menit lewat nasal kanul.

Rasional: oksigen diberikan untuk memperbaiki keadaan umum bayi dan mencegah asidosis yang berkelanjutan. Hal ini dapat dihentikan setelah warna kulit bayi sudah normal yaitu kemerah-merahan.

#### **E. LANGKAH V : PERENCANAAN**

Tanggal 17 Januari 2022, Pukul 10:10 Wita

##### **Tujuan :**

1. Asfiksia pada bayi baru lahir dapat teratasi dengan cepat
2. Bayi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dari intrauterine ke lingkungan ektrauterin.

##### **Kriteria :**

1. Keadaan umum bayi baik
2. Bayi bernapas secara spontan dan tanpa kesulitan, segera menangis
3. Gerakan aktif
4. Bayi tidak sianosis
5. Tanda-tanda vital dalam batas normal ;
  - a. Frekuensi jantung : 120-160 kali/menit

b. Pernapasan : 40-60 kali/menit

c. Suhu : 36,5-37,5°c

6. Refleksi hisap dan menelan baik.

Intervensi tanggal 17 Januari 2022, Pukul 09:10 Wita

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak kulit dengan bayi dan juga menggunakan sarung tangan saat memegang bayi.

Rasional: untuk mencegah terjadinya infeksi.

2. Memotong tali pusat bayi segera setelah lahir

Rasional: dengan memotong tali pusat akan memutuskan hubungan bayi dengan ibu dan membantu proses pernapasan dan sirkulasi.

3. Mencegah kehilangan panas, yaitu menyiapkan tempat yang kering dan hangat untuk melakukan pertolongan

Rasional: suhu intrauterine dan ektrauterine sangat berbeda dimana pada saat bayi lahir penyesuaian suhu diluar kandungan sangat memerlukan pengawasan agar tidak terjadi kehilangan panas tubuh.

4. Memposisikan bayi dengan baik (kepala bayi sedikit ekstensi atau mengganjal bahu bayi dengan kain.

Rasional: untuk membuka jalan napas bayi

5. Bersihkan jalan napas dengan alat penghisap yang tersedia seperti Deele.

Rasional: untuk memperlancar proses respirasi sehingga bayi dapat bernafas secara teratur tanpa kesulitan.

6. Bungkus bayi dengan selimut bersih dan kering

Rasional: untuk mencegah kehilangan panas pada bayi

7. Lakukan rangsangan taktil dengan menepuk punggung dan telapak kaki bayi

Rasional: untuk merangsang agar bayi dapat bernapas secara spontan

8. Letakkan kembali bayi pada posisi yang benar, kemudian menilai: usaha napas, frekuensi denyut jantung dan warna kulit.

Rasional: untuk memastikan bayi sudah lebih membaik atau tidak.

9. Jika rangsangan taktil telah berhasil, maka tidak perlu melakukan ventilasi dan segera berikan asuhan pada bayi lahir.

Rasional: bayi segera diberikan asuhan

10. Melakukan perawatan tali pusat

Rasional: untuk menghindari adanya tanda-tanda infeksi pada bayi

11. Melakukan Injeksi vitamin K 0,5 cc.

Rasional: untuk mencegah terjadinya perdarahan

12. Pemberian salep mata

Rasional: untuk mencegah terjadinya infeksi

13. Melakukan pemeriksaan fisik

Rasional: untuk mendeteksi dini kelainan fisik pada bayi

14. Berikan imunisasi Hepatitis bayi B 0,5 ml intramuskuler, di paha sebelah kanan anterolateral, kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1.

Rasional: hepatitis B untuk memberi kekebalan pada tubuh bayi

15. Observasi TTV bayi tiap 15 menit

Rasional: merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keadaan umum bayi sehingga dapat dilakukan tindakan segera saat tandatanda vitalnya terdeteksi diluar batas normal.

## **F. LANGKAH VI: PENATALAKSANAAN**

Tanggal 17 Januari 2022, Jam 09:10 Wita

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi dan menggunakan sarung tangan saat memegang bayi.

Hasil: tangan telah bersih dan telah menggunakan sarung tangan

2. Potong tali pusat bayi segera setelah lahir.

Hasil: tali pusat telah dipotong

3. Menilai usaha napas, warna kulit, dan frekuensi denyut jantung

Hasil: bayi belum bernapas secara spontan, warna kulit merah ekstremitas biru, dan frekuensi jantung 88 kali/menit.

4. Membungkus bayi dengan selimut yang kering dan bersih.

Hasil: bayi telah di bedong

5. Mengatur posisi bayi dengan benar (kepala sedikit ekstensi atau dapat meletakkan kain di bawah bahu bayi.

Hasil: posisi bayi telah diatur.

6. Membersihkan jalan nafas dari lendir dengan menggunakan Deele.

Hasil: jalan napas telah dibersihkan

7. Mengeringkan bayi dan melakukan rangsangan taktil.

Hasil: telah dilakukan

8. Mengobservasi pemberian O<sub>2</sub> sebanyak 1 liter/menit dengan menggunakan nasal kanul.

Hasil: telah dilakukan

9. Melakukan perawatan tali pusat

Hasil: tali pusat tampak basah

10. Menginjeksi vitamin K 0,5 cc

Hasil: terlaksana

11. Memberikan salep mata

Hasil: telah diberikan salep pada kedua mata

12. Mengobservasi TTV

Hasil : dilakukan

13. Mengobservasi tanda-tanda infeksi pada tali pusat bayi yaitu tali pusat merah, bengkak, ada pengeluaran nanah/darah.

Hasil: tidak tanda-tanda infeksi

## **G. LANGKAH VII: EVALUASI**

Tanggal 17 Januari 2022, Pukul 10:10 Wita

Diagnosa : bayi dengan asfiksia Sedang

Masalah potensial : terjadinya kematian

1. Bayi sudah dapat beradaptasi dengan lingkungan ektrauterin dengan suhu 36,7°C dan metabolisme lancar (bayi sudah BAB dan BAK)
2. Asfiksia sudah teratasi dengan dilakukannya rangsangan taktil, yang ditandai dengan:
  - a. Bayi bernapas secara spontan dengan frekuensi 48 kali/menit.

b. Frekuensi jantung 128 kali/menit.

c. Suhu 36,7°C

d. Bayi memperlihatkan sedikit gerakan.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN  
PADA BAYI “S” DENGAN ASFIKZIA SEDANG  
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR  
TANGGAL 17 JANUARI 2022**

No. register : 09XXX  
Tanggal Bersalin : Senin 17 Januari 2022 Jam 09.10 WITA  
Tanggal Pengkajian : Senin 17 Januari 2022 Jam 09.10 WITA  
Nama : Tenri Angka

**A. LANGKAH I: IDENTIFIKASI DATA DASAR**

1. Identitas

a. Bayi

Nama : Bayi Ny “S”  
Umur : 0 Hari  
Tempat tanggal lahir : Makassar, Senin 17 Januari 2022 Jam 09.10 WITA  
Jenis kelamin : Perempuan  
Anak ke : I (Pertama)

b. Orangtua

Nama : Ny “S” / Tn “N”  
Umur : 24 Tahun / 25 Tahun  
Nikah/lamanya : 1 X / +1 tahun  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Kompleks "B"

#### **DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ini adalah anak yang pertama.
2. HPHT 11 April 2021.
3. Tidak pernah merasa nyeri perut dan kepala yang hebat selama hamil.
4. Tidak memiliki riwayat penyakit DM, Hipertensi, Jantung, Asma dan penyakit lainnya.
5. Tidak memiliki riwayat penyakit keturunan.
6. Tidak ada riwayat ke dukun, merokok, atau minum jamu.

#### **DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum bayi kurang baik dan belum bisa bernapas secara spontan dan teratur.
2. Berat badan lahir yaitu 3600 gram
3. Panjang badan lahir yaitu 50 cm
4. Tanda-tanda Vital
  - a. Frekuensi jantung 88 kali/menit (normal 120-160 kali/menit).
  - b. Pernapasan belum bernapas secara spontan dan teratur serta masih
  - c. Suhu : 36,5°C (normal 36,5°C-37,5°C).
5. Pemeriksaan Fisik (Head to toe)
  - a. Kepala

Ubun-ubun normal, tidak ada molase, rambut tampak tebal dan berwarna hitam.

b. Telinga

Simetris kanan dan kiri, daun telinga tampak normal, lunak dan mudah kembali ke bentuk semula saat ditebuk.

c. Mata

Konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus.

d. Hidung Dan Mulut

Bentuk hidung normal, bibir bayi tidak mengalami sumbing/kelainan.

e. Leher

Tidak terdapat pembengkakan kelenjar tyroid, dan vena jugularis, tidak terdapat lipatan kulit pada lipatan kulit yang berlebihan dibelakang leher yang menunjukkan adanya kemungkinan trisomi 21.

f. Dada

Puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris.

g. Bahu, lengan dan tangan

Kedua lengan sama panjang, ekstremitas belum bergerak aktif, jumlah jari lengkap.

h. Abdomen

Abdomen tampak bulat dan belum ada pergerakan.

i. Genitalia dan anus

Labia mayora menutupi labia minora, lubang uretra terpisah dengan lubang vagina.

j. Tungkai dan kaki

Tungkai kaki belum bergerak bebas, jumlah jari lengkap.

k. Punggung

Tidak ada benjolan pada punggung bayi

l. Kulit

Warna kulit putih pucat, terdapat sedikit verniks.

6. Penilaian neurologis

a. Refleks moro: (-)

b. Refleks hisap: (-)

c. Refleks rooting: (-)

**ASSESSMENT (A)**

Melakukan tindakan segera dan kolaborasi dengan petugas kesehatan lainnya.

**PLANNING (P)**

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak kulit dengan bayi dan menggunakan sarung tangan saat memegang bayi.

Hasil: telah cuci tangan

2. Potong tali pusat bayi segera setelah lahir.

Hasil: tali pusat telah dipotong

3. Menilai usaha napas, warna kulit, dan frekuensi denyut jantung.

Hasil: bayi belum bernapas dengan spontan warna kulit merah ekstremitas biru dan frekuensi jantung 88 kali/menit.

4. Membungkus bayi dengan selimut bersih dan kering.

Hasil: bayi telah diselimuti.

5. Mengatur posisi bayi yaitu dengan posisi kepala sedikit ekstensi atau dapat meletakkan handuk kain/kain di bawah bahu bayi.

Hasil: posisi bayi telah diatur.

6. Membersihkan jalan nafas dari lendir dengan menggunakan Deele.

Hasil: jalan napas telah dibersihkan.

7. Mengeringkan bayi dan melakukan rangsangan taktil.

Hasil: telah dilakukan.

8. Mengobservasi pemberian O<sub>2</sub> sebanyak 1 liter/menit menggunakan nasal kanul.

Hasil: telah dilakukan.

9. Melakukan perawatan tali pusat

Hasil: tali pusat tampak masih basah.

10. Menginjeksi vitamin K 0,5 cc.

Hasil: telah dilakukan

11. Memberikan salep mata pada kedua mata

Hasil: telah diberikan salep mata

12. Mengobservasi TTV tiap 15 menit

Hasil : telah dilakukan

13. Mengobservasi tanda-tanda infeksi pada tali pusat bayi yaitu tali pusat bengkak, merah, dan pengeluaran nanah/darah

Hasil: tidak ada tanda-tanda infeksi.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA  
BAYI “S” DENGAN ASFIKZIA PERAWATAN HARI KE II  
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR  
TANGGAL 18 JANUARI 2022**

No. Register : 09XXX  
Tanggal bersalin : Senin 17 Januari 2022 Pukul 09.10 Wita  
Tanggal pengkajian : Senin 18 Januari 2022 Pukul 10.15 Wita  
Nama Pengkaji : Tenri Angka

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ini adalah anak pertama tidak pernah mengalami keguguran.
2. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit turunan.
3. Ibu mengatakan saat bayi lahir tidak segera menangis, dan pada saat sekarang bayi bayi sudah bisa menangis.
4. Ibu memberikan ASI eksklusif pada bayinya

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum bayi sudah lebih membaik dan aktif.
2. Tonus otot baik
3. Tali pusat masih tampak basah dan tidak ada tanda-tanda infeksi
4. Refleks isap dan moro baik
5. Tanda-tanda Vital
  - a. Frekuensi jantung: 140 x/menit
  - b. Pernapasan 52 x/menit

- c. Suhu: 36,7°C
- 6. Pemantauan berat badan bayi
  - a. BBL : 3600 gram
  - b. BBS : 3600 gram

#### **ASSESSMENT (A)**

Bayi Ny “S” dengan bayi cukup bulan (BCB)/sesuai masa kehamilan (SMK)

#### **PLANNING (P)**

Tanggal 18 januari 2022 pukul 10.15 wita

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak kulit dengan bayi dan menggunakan sarung tangan.  
Hasil: tangan telah bersih dan telah memakai sarung tangan
2. Penilaian usaha nafas, frekuensi denyut jantung dan warna kulit bayi.  
Hasil: pernapasan bayi 52x/menit , frekuensi jantung 140x/menit, dan seluruh badan kemerahan
3. Melakukan perawatan tali pusat dengan memberikan cairan betadine pada ujung tali pusat  
Hasil: telah dilakukan perawatan tali pusat
4. Membersihkan bayi dengan washlap  
Hasil: bayi telah dibersihkan
5. Menganjurkan ibu untuk mengganti pakaian/popok bayi setiap basah

Hasil: ibu bersedia menggantian pakaian/popok bayinya setiap lembab atau basah

6. Mengajarkan ibu untuk memberikan ASI pada bayinya secara on demand

Hasil: Ibu bersedia untuk memberikan ASI pada bayinya secara on demand

7. Mengingatkan ibu untuk tetap menjaga pola makan dan mengonsumsi

makanan dengan gizi seimbang

Hasil: ibu bersedia mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang

8. Mengajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar

Hasil: ibu sudah mengerti cara menyusui yang baik dan benar



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI “S”  
DENGAN ASFIKZIA PERAWATAN HARI KE III  
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR  
TANGGAL 19 JANUARI 2022**

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu merasa senang dengan kelahiran buah hati pertamanya dengan jenis kelamin perempuan
2. Ibu mengatakan bayinya sering menangis dengan kuat
3. Ibu mengatakan ASI keluar dengan lancar
4. Ibu mengatakan memberikan ASI eksklusif pada bayinya

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Bayi sudah mulai menyusu, refleks hisap baik
2. Tanda-tanda Vital:
  - a. Frekuensi jantung 144x/menit.
  - b. Pernafasan 52x/menit.
  - c. Suhu 36,6°C
3. Tonus otot baik.
4. Gerakan tangan dan reflek genggam baik.

**ASSESSMENT (A)**

Bayi Ny “S” umur 3 hari, keadaan umum bayi baik.

## PLANNING (P)

Tanggal 19 Januari 2022 Pukul 09.30 wita

1. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI pada bayinya setiap saat.

Hasil : Ibu bersedia untuk memberikan bayinya asi setiap saat

2. Menganjurkan ibu untuk menjaga suhu tubuh bayinya dengan cara bayi tetap terbungkus, agar bayi tetap dalam suhu normal.

Hasil : Ibu selalu menjaga suhu tubuh bayinya dengan cara dibedong

3. Observasi keadaan umum bayi

Hasil : a. keadaan bayi baik

b. Tanda-tanda Vital:

- 1) Frekuensi jantung 144 x/menit.
- 2) Pernafasan 52 x/menit.
- 3) Suhu 36,6 °C.

4. Mengajarkan ibu cara membersihkan bayi menggunakan waslap.

Hasil : ibu sudah mengerti

5. Kembali mengingatkan ibu agar tetap mengonsumsi makanan-makanan yang seimbang dan bergizi

Hasil : ibu tetap menjaga asupan nutrisinya

6. Memberi tahu ibu tanda bahaya pada bayi baru lahir

- a. Bayi malas menyusu atau tidak mau menyusu
- b. Suhu bayi  $<36,5$  atau  $>37,5$  c
- c. Tali pusat kemerahan, bernanah dan berbau
- d. Bayi diare dan muntah terus menerus

- e. Bayi tidak kencing selama 24 jam
- f. Bayi tidak BAB selama 3 hari
- g. Kejang
- h. Warna kulit sianosis atau kuning

Hasil : ibu mengerti dan melapor segera jika ditemukan salah satu tanda tersebut.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI “S”  
DENGAN ASFIKSIA DI RUMAH (SAMATA GOWA)  
TANGGAL 24 JANUARI 2022**

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Bayi sudah bisa dirawat di rumah dan merasa bisa merawat bayinya di rumah
2. Ibu merasa senang dengan keadaan bayinya sekarang
3. ASI ibu lancar dan selalu memberikan bayi ASI secara on demand.

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan bayi saat ini sudah baik.
2. Tonus otot sudah membaik.
3. Tali pusat sudah tampak kering.
4. Tanda-tanda Vital :
  - a. Frekuensi jantung : 140 x/menit.
  - b. Pernafasan : 54 x/menit.
  - c. Suhu : 36,8°C

**ASSESSMENT (A)**

Bayi “S” umur 7 hari.

**PLANNING (P)**

Tanggal 24 Januari 2022 Jam 10.30 WITA

1. Memberitahukan pada ibu dan keluarga tentang perkembangan dan kondisi bayi saat ini.

Hasil: ibu dan keluarga telah diberitahu tentang kondisi bayi.

2. Observasi keadaan umum bayi.

Hasil: a. keadaan umum bayi baik.

b. Tanda-tanda vital

a) Frekuensi jantung : 140 kali/menit.

b) Pernafasan : 54 kali/menit.

c) Suhu : 36,7°C

3. Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi

Hasil: BB 3800 gram

4. Anjurkan ibu memberikan ASI secara on demand dan sesuai dengan kebutuhan bayinya.

Hasil: ibu bersedia melakukannya.

5. Menganjurkan ibu untuk selalu mencuci tangan sebelum melakukan kontak kulit dengan bayinya

Hasil: ibu bersedia

6. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga personal hygiene seperti mengganti popok bayi ketika BAK/BAB, lembab dan basah.

Hasil: ibu bersedia selalu menjaga personal hygiene

7. Mengajukan ibu untuk menjaga pola makan dan memenuhi kebutuhan gizinya

Hasil: ibu bersedia menjaga pola makannya.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI “S”  
DENGAN ASFIKZIA SEDANG DI RUMAH (SAMATA GOWA)  
TANGGAL 1 FEBRUARI 2022**

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Bayi lahir tidak segera menangis dan saat ini bayi sudah bisa menangis.
2. Bayi sudah dalam kondisi sangat membaik.
3. Bayi selalu diberi ASI secara on demand.

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum bayi baik
2. Tonus otot sudah baik.
3. Tali pusat sudah pupus.
4. Tanda-tanda Vital :
  - a. Frekuensi jantung : 144 x/menit.
  - b. Pernafasan : 52 x/menit.
  - c. Suhu : 36,8°C.

**ASSESSMENT (A)**

Bayi “S” umur 15 hari.

**PLANNING (P)**

Tanggal 1 Januari 2022 Jam 09.30 WITA

1. Beritahukan pada ibu serta keluarga bahwa saat ini kondisi bayi dalam keadaan sehat.

Hasil: keadaan umum bayi saat ini baik.

2. Observasi tanda-tanda vital

Hasil :

a. Frekuensi jantung : 144 x/menit.

b. Suhu : 36,8°C

c. Pernapasan : 52 x/menit

3. Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi

Hasil: BBS 4000 gram

4. Mengingatkan kembali pada ibu untuk selalu mencuci tangan sebelum melakukan kontak kulit dengan bayinya.

Hasil: ibu bersedia selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayinya.

5. Menjaga personal hygiene bayi dengan cara selalu mengganti popok bayi setiap bayi sudah BAK/BAB atau popok dalam keadaan lembab/basah.

Hasil: ibu bersedia menjaga personal hygiene.

6. Memberikan ASI pada bayi sesuai dengan kebutuhannya.

Hasil: bayi telah diberikan ASI.

7. Menganjurkan ibu untuk menjaga pola makan dan memakan makanan yang bergizi dan seimbang.

Hasil: ibu bersedia menjaga pola makan dan makan makanan yang bergizi.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI “S”  
DENGAN ASFIKZIA SEDANG DI RUMAH (SAMATA GOWA)  
TANGGAL 14 FEBRUARI 2022**

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan pada saat bayi lahir bayi tidak segera menangis dan saat ini bayi sudah bisa menangis.
2. Ibu mengatakan bayinya kuat menyusu secara bergantian payudara kanan/kiri.
3. Ibu mengatakan ASInya sangat lancar

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum bayi sangat baik.
2. Tali pusat telah puput
3. Tonus otot baik.
4. Bayi terlihat aktif bergerak.
5. Tanda-tanda Vital:
  - a. Frekuensi jantung : 144 kali/menit
  - b. Suhu : 36,7°C
  - c. Pernapasan : 50 kali/menit.

**ASSESSMENT (A)**

Bayi “S” umur 28 Hari

## PLANNING (P)

Tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.00 wita

1. Mencuci tangan sebelum dengan sabun serta menggunakan air mengalir sebelum menyentuh bayi

Hasil: cuci tangan telah dilakukan

2. Observasi keadaan umum bayi

Hasil:

a. keadaan umum bayi baik.

b. Tanda-tanda Vital

- 1) Frekuensi jantung : 144 kali/menit
- 2) Suhu : 36,7°C
- 3) Pernafasan : 50 kali/menit.

3. Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi

Hasil: BBS : 4400 gram

4. Mengingatkan kembali pada ibu untuk menjaga personal hygiene bayi yaitu dengan cara mengganti popok bayi setelah BAK/BAB atau popok dalam keadaan lembab/basah.

Hasil: ibu bersedia menjaga personal hygiene bayinya.

5. Mengajukan pada ibu memberikan ASI pada bayinya secara on demand.

Hasil: ibu mengerti

6. Menganjurkan ibu untuk membawa bayinya ke pusat pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemberian imunisasi BCG dan Polio I yang diberikan pada bayi berusia dibawah 2 bulan

Hasil: ibu bersedia

7. Menganjurkan pada ibu untuk memberikan ASI pada bayinya sampai usia 2 tahun.

Hasil: ibu bersedia memberikan ASI pada bayinya sampai usia 2 tahun.



Tabel. Matriks Kunjungan Bayi Ny “S” Dengan Asfiksia sedang

(Tanggal 17 Januari 2022 S/D 14 Februari 2022)

kunjungan	Hari, Tanggal dan Jam	Tempat	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
1	17 Januari 2022 Pukul 09.10 wita	RSUD Labuang Baji Makassar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadaan umum bayi kurang baik dan belum bisa bernapas secara spontan dan teratur.</li> <li>2. Berat badan lahir yaitu 3600 gram</li> <li>3. Panjang badan lahir yaitu 50 cm</li> <li>4. Tanda-tanda Vital                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Frekuensi jantung 88 kali/menit</li> <li>b. Pernapasan belum bernapas secara spontan dan teratur serta masih</li> <li>c. Suhu 36,5°C</li> </ol> </li> <li>5. Pemeriksaan Fisik (Head to toe)                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Ubun-ubun normal, tidak ada molase, rambut tampak tebal dan berwarna hitam.</li> <li>b. Telinga Simetris kanan dan kiri, daun telinga tampak normal, lunak dan mudah kembali kebentuk semula saat ditekek.</li> <li>c. Mata Konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus.</li> <li>d. Hidung Dan Mulut Bentuk hidung normal, bibir bayi tidak mengalami sumbing/kelainan.</li> <li>e. Leher Tidak terdapat pembengkakan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak kulit dengan bayi dan menggunakan sarung tangan saat memegang bayi.</li> <li>2. Potong tali pusat bayi segera setelah lahir.</li> <li>3. Menilai usaha napas, warna kulit, dan frekuensi denyut jantung.</li> <li>4. Membungkus bayi dengan selimut bersih dan kering.</li> <li>5. Mengatur posisi bayi yaitu dengan posisi kepala sedikit ekstensi atau dapat meletakkan handuk kain/kain di bawah bahu bayi.</li> <li>6. Membersihkan jalan nafas dari lendir dengan menggunakan Deele.</li> <li>7. Mengeringkan bayi dan melakukan rangsangan taktil.</li> <li>8. Mengobservasi pemberian O2 sebanyak 1 liter/menit menggunakan nasal kanul.</li> <li>9. Melakukan perawatan tali pusat</li> <li>10. Menginjeksi vitamin K 0,5 cc.</li> <li>11. Memberikan salep mata pada kedua mata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah cuci tangan</li> <li>2. Tali pusat telah dipotong.</li> <li>3. Bayi belum bernapas dengan spontan, seluruh tubuh berwarna putih dan frekuensi jantung 88 kali/menit.</li> <li>4. Bayi telah diselimuti.</li> <li>5. posisi bayi telah diatur.</li> <li>6. Jalan napas telah dibersihkan menggunakan deele.</li> <li>7. Mengeringkan bayi dan melakukan rangsangan taktil telah dilakukan.</li> <li>8. Telah dilakukan pemberian O2 sebanyak 1 liter/menit menggunakan nasal kanul.</li> <li>9. Tali pusat masih tampak basah.</li> <li>10. Telah dilakukan penyuntikan Vitamin K</li> <li>11. Telah diberikan salep mata pada kedua mata.</li> <li>12. Observasi Tiap 15 menit</li> </ol>

			<p>kelenjar tyroid, dan vena jugularis, tidak terdapat lipatan kulit pada lipatan kulit yang berlebihan dibelakang leher yang menunjukkan adanya kemungkinan trisomi 21.</p> <p>f. Dada Puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris.</p> <p>g. Bahu, lengan dan tangan Kedua lengan sama panjang, ekstremitas belum bergerak aktif, jumlah jari lengkap.</p> <p>h. Abdomen Abdomen tampak bulat dan belum ada pergerakan.</p> <p>i. Genitalia dan anus Labia mayora menutupi labia minora, lubang uretra terpisah dengan lubang vagina.</p> <p>j. Tungkai dan kaki Tungkai kaki belum bergerak bebas, jumlah jari lengkap.</p> <p>k. Punggung Tidak ada benjolan pada punggung bayi</p> <p>l. Kulit Warna kulit putih pucat, terdapat sedikit verniks.</p> <p>6. Penilaian neurologis Refleks moro: (-), Refleks hisap: (-), Refleks rooting: (-)</p>	<p>12. Mengobservasi TTV tiap 15 menit</p> <p>13. Mengobservasi tanda-tanda infeksi pada tali pusat bayi yaitu tali pusat bengkak, merah, dan pengeluaran nanah/darah</p>	
--	--	--	---	---	--

2	18 Januari 2022 Jam 10.15 Wita	RSUD Labuang Baji Makassar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadaan umum bayi sudah lebih membaik dan aktif.</li> <li>2. Tonus otot baik</li> <li>3. Tali pusat masih tampak basah dan tidak ada tanda-tanda infeksi</li> <li>4. Refleks isap dan moro baik</li> <li>5. Tanda-tanda Vital <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Frekuensi jantung: 140 x/menit</li> <li>b. Pernapasan 52 x/menit</li> <li>c. Suhu: 36,7°C</li> </ol> </li> <li>6. Pemantauan berat badan bayi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BBL : 3600 gram</li> <li>b. BBS : 3600 gram</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak kulit dengan bayi dan menggunakan sarung tangan.</li> <li>2. Penilaian usaha nafas, frekuensi denyut jantung dan warna kulit bayi.</li> <li>3. Melakukan perawatan tali pusat dengan memberikan cairan betadine pada ujung tali pusat</li> <li>4. Membersihkan bayi dengan washlap</li> <li>5. Menganjurkan ibu untuk mengganti pakaian/popok bayi setiap basah</li> <li>6. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI pada bayinya secara on demand</li> <li>7. Mengingatkan ibu untuk tetap menjaga pola makan dan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang</li> <li>8. Mengajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar cara menyusui yang baik dan benar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan tangan steril dan menggunakan sarung tangan saat ingin melakukan kontak kulit dengan bayi.</li> <li>2. Pernapasan bayi 52 x/menit , frekuensi jantung 140 x/menit, dan seluruh badan kemerahan.</li> <li>3. Telah dilakukan perawatan tali pusat</li> <li>4. Bayi bersih.</li> <li>5. Ibu bersedia menggantikan pakaian/popok bayinya setiap lembab atau basah</li> <li>6. Ibu bersedia menggantikan pakaian/popok bayinya setiap lembab atau basah</li> <li>7. Ibu bersedia mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang</li> <li>8. Ibu sudah mengerti cara menyusui yang baik dan benar.</li> </ol>
---	---	-------------------------------------	--	---	---

3	19 Januari 2022 Jam 09.30 Wita	RSUD Labuang Baji Makassar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bayi sudah mulai menyusu, refleks hisap baik</li> <li>2. Tanda-tanda Vital: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Frekuensi jantung 144x/menit.</li> <li>b. Pernafasan 52x/menit.</li> <li>c. Suhu 36,6°C</li> </ol> </li> <li>3. Tonus otot baik.</li> <li>4. Gerakan tangan dan reflek genggam baik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI pada bayinya setiap saat.</li> <li>2. Menganjurkan ibu untuk menjaga suhu tubuh bayinya dengan cara bayi tetap terbungkus, agar bayi tetap dalam suhu normal.</li> <li>3. Observasi keadaan umum bayi</li> <li>4. Mengajarkan ibu cara membersihkan bayi menggunakan waslap.</li> <li>5. Kembali mengingatkan ibu agar tetap mengonsumsi makanan-makanan yang seimbang dan bergizi</li> <li>6. Memberi tahu ibu tanda bahaya pada bayi baru lahir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu bersedia untuk tetap memberikan ASI pada bayinya</li> <li>2. Ibu selalu menjaga suhu tubuh bayinya dengan cara membedong</li> <li>3. Keadaan bayi baik</li> <li>4. Ibu bersedia tetap menjaga asupan nutrisinya</li> <li>5. ibu mengerti cara perawatan payudara</li> <li>6. ibu mengerti cara perawatan payudara</li> </ol>
---	---	-------------------------------------	---	--	--

4	24 Januari 2022 Jam 10.30 Wita	Rumah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadaan bayi saat ini sudah baik.</li> <li>2. Tonus otot sudah membaik.</li> <li>3. Tali pusat sudah tampak kering.</li> <li>4. Tanda-tanda Vital : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Frekuensi jantung : 140 x/menit.</li> <li>b. Pernafasan : 54 x/menit.</li> <li>c. Suhu : 36,8°C</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberitahukan pada ibu dan keluarga tentang perkembangan dan kondisi bayi saat ini.</li> <li>2. Observasi keadaan umum bayi.</li> <li>3. Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi</li> <li>4. Anjurkan ibu memberikan ASI secara on demand dan sesuai dengan kebutuhan bayinya.</li> <li>5. Menganjurkan ibu untuk selalu mencuci tangan sebelum melakukan kontak kulit dengan bayinya</li> <li>6. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga personal hygiene seperti mengganti popok bayi ketika BAK/BAB, lembab dan basah.</li> <li>7. Menganjurkan ibu untuk menjaga pola makan dan memenuhi kebutuhan gizinya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu dan keluarga telah diberitahu tentang kondisi bayi</li> <li>2. keadaan umum bayi baik.</li> <li>3. BBL : 3600 gram BBS : 3800 gram</li> <li>4. Ibu bersedia memberikan Asi secara on demand .</li> <li>5. Ibu bersedia untuk selalu menjaga personal hygiene seperti mengganti popok bayi setiap lembab dan basah</li> <li>6. Ibu bersedia menjaga pola makannya.</li> </ol>
---	--	-------	--	---	--

5	1 Januari 2022 Jam 09.30 Wita	Rumah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadaan umum bayi baik</li> <li>2. Tonus otot sudah baik.</li> <li>3. Tali pusat sudah pupus.</li> <li>4. Tanda-tanda Vital: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Frekuensi jantung 144 x/menit.</li> <li>b. Pernafasan 52 x/menit.</li> <li>c. Suhu 36,8°C.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beritahukan pada ibu serta keluarga bahwa saat ini kondisi bayi dalam keadaan sehat.</li> <li>2. Observasi tanda-tanda vital</li> <li>3. Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi</li> <li>4. Mengingatkan kembali pada ibu untuk selalu mencuci tangan sebelum melakukan kontak kulit dengan bayinya.</li> <li>5. Menjaga personal hygiene bayi dengan cara selalu mengganti popok bayi setiap bayi sudah BAK/BAB atau popok dalam keadaan lembab/basah.</li> <li>6. Memberikan ASI pada bayi sesuai dengan kebutuhannya.</li> <li>7. Menganjurkan ibu untuk menjaga pola makan dan memakan makanan yang bergizi dan seimbang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadaan umum bayi saat ini baik</li> <li>2. BBL : 3600 gram BBS : 4000 gram</li> <li>3. Ibu bersedia selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayinya.</li> <li>4. Ibu bersedia menjaga personal hygiene</li> <li>5. Bayi telah diberikan ASI.</li> <li>6. Ibu bersedia menjaga pola makan dan makan makanan yang bergizi</li> <li>7. Ibu bersedia membawa anaknya untuk imunisasi pada usia 1 bulan.</li> </ol>
---	---	-------	--	--	---

6	14 Februari 2022 Jam 10.00 wita	Rumah	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu mengatakan pada saat bayi lahir bayi tidak segera menangis dan saat ini bayi sudah bisa menangis.</li> <li>2. Ibu mengatakan bayinya kuat menyusu secara bergantian payudara kanan/kiri.</li> <li>3. Ibu mengatakan ASInya sangat lancar</li> </ol> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Keadaan umum bayi sangat baik.</li> <li>7. Tali pusat telah puput</li> <li>8. Tonus otot baik.</li> <li>9. Bayi terlihat aktif bergerak.</li> <li>10. Tanda-tanda Vital: <ol style="list-style-type: none"> <li>d. Frekuensi jantung : 144 kali/menit</li> <li>e. Suhu : 36,7°C</li> <li>f. Pernapasan : 50 kali/menit.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Mencuci tangan sebelum dengan sabun serta menggunakan air mengalir sebelum menyentuh bayi</li> <li>9. Observasi keadaan umum bayi</li> <li>10. Mengingatkan kembali pada ibu untuk menjaga personal hygiene bayi yaitu dengan cara mengganti popok bayi setelah BAK/BAB atau popok dalam keadaan lembab/basah.</li> <li>11. Mengajukan pada ibu memberikan ASI pada bayinya secara on demand.</li> <li>12. Mengajukan ibu untuk membawa bayinya ke pusat pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemberian imunisasi BCG dan Polio I yang diberikan pada bayi berusia dibawah 2 bulan</li> <li>13. Mengajukan pada ibu untuk memberikan ASI pada bayinya sampai usia 2 tahun.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu dan keluarga sudah diberitahukan tentang kondisi bayi dan merasa senang.</li> <li>2. keadaan umum bayi baik.</li> <li>3. BBL : 3600 gram BBS : 4400 gram</li> <li>4. Ibu bersedia menjaga personal hygiene bayinya.</li> <li>5. Ibu bersedia untuk memberikan bayinya asi secara on demand</li> <li>6. Mengajukan ibu untuk membawa bayinya ke pusat pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemberian imunisasi BCG dan Polio I yang diberikan pada bayi berusia dibawah 2 bulan</li> <li>7. Ibu bersedia memberikan Asi pada bayinya sampai usia 2 tahun.</li> </ol>
---	---	-------	--	--	--

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan membandingkan tentang kejadian antara teori dan dengan hasil studi kasus yang telah dilakukan di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2022 yaitu kurang lebih satu bulan yaitu dimulai tanggal 11 Januari sampai tanggal 11 Februari pada bayi Ny “S” dengan asfiksia sedang.

Pada studi kasus ini kunjungan dilakukan sebanyak 6 kali kunjungan yaitu, kunjungan di rumah sakit sebanyak 3 kali dan kunjungan di rumah pasien sebanyak 3 kali. Kunjungan di rumah sakit mulai bayi lahir yaitu tanggal 17 Januari sampai tanggal 19 Januari. Kunjungan rumah pertama pada tanggal 24 Januari, kunjungan kedua 1 Februari dan kunjungan ketiga yaitu di tanggal 24 Februari.

Pada kunjungan pertama, kedua dan ketiga selama di rumah sakit Labuang Baji Makassar dilakukan di ruangan perinatology yang dilakukan dengan bantuan bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya dengan menggunakan peralatan rumah sakit, kemudian pada kunjungan di rumah pasien dilakukan sendiri dan menggunakan alat sendiri.

Pada bab ini penulis akan membahas berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan 7 langkah varney yaitu: mengumpulkan data dasar, merumuskan diagnosa atau masalah aktual, merumuskan masalah atau diagnosa potensial, melakukan tindakan segera/emergensi dan kolaborasi, merencanakan

tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

### **Langkah I : Pengumpulan data dasar**

Pada tahap pengkajian awal dengan kumpulan data dengan melalui anamnesa yang mencakup identitas bayi dan ibu, data biologis/fisiologis, riwayat kehamilan, persalinan yang sekarang dan pemeriksaan fisik yang berpedoman pada format kajian yang tersedia, tapi tidak menutup kemungkinan untuk penambahan data-data yang lain jika dibutuhkan.

Data tersebut diperoleh dari berbagai macam sumber, yaitu sumber yang dapat memberikan informasi yang paling tepat dan akurat dan juga yang diperoleh secepat mungkin dan usaha dari keluarga pasien, dokter, bidan, catatan dokter serta bidan, dan tenaga kesehatan lainnya tanpa ada gangguan dan hambatan, karena baik keluarga maupun tenaga medis di lahan praktek akan bersedia untuk menyampaikan informasi atau data data yang berhubungan dengan perawatan pasien sehingga dapat mempermudah dalam mengumpulkan data.

Pada kala I data subjektif yang didapatkan ibu mengeluh nyeri perut tembus ke belakang yang bersifat hilang timbul sejak pukul 03.00 WITA, tanggal 17 Januari 2022 serta pengeluaran lendir dan darah sejak pukul 03.25 WITA, tanggal 17 Januari 2022. Ibu mengatakan ini kehamilan yang pertama dan tidak pernah keguguran, ibu mengatakan usia kehamilannya  $\pm$  9 bulan, HPHT 11 April 2021, HTP 18 Januari 2022, pergerakan janin kuat di sebelah kanan sejak memasuki usia kehamilan  $\pm$  6 bulan sampai sekarang, ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak

8 kali di PMB Samata Gowa, ibu mengalami mual muntah pada trimester pertama.

Bayi lahir dengan presentasi belakang kepala pada tanggal 17 januari 2022, dan berdasarkan hasil dari HPHT sampai dengan tanggal lahir bayi maka didapatkan usia kehamilan ibu pada saat bersalin yaitu 40 minggu 1 hari. Bayi lahir pada pukul 09.10 wita dengan jenis kelamin perempuan, berat badan 3600 gram, panjang badan 50 cm, APGAR score 4/6. Pada pengkajian didapatkan pada bayi Ny “S” di menit pertama didapatkan seluruh badan berwarna putih pucat, pernapasan tidak teratur, kemudian pada menit ke-5 ditemukan denyut jantung mulai membaik, bayi sedikit menangis, badan sedikit merah ekstremitas biru dan bayi sedikit pergerakan.

Adapun tanda dan gejala yang didapat pada kasus bayi Ny “S” yang mengalami asfiksia sedang adalah seluruh badan putih pucat, sedikit gerakan, frekuensi jantung 88x/menit dan pernapasan tidak teratur. Tanda gejala tersebut yang ditemukan pada bayi Ny “S” menunjukkan bayi mengalami asfiksia sedang yaitu tidak bernapas atau napas megap-megap, tangisan lemah atau merintih, warna kulit pucat atau biru, tonus otot lemah, serta denyut jantung lambat (kurang dari 100x/menit) (Jenny.J.S.Sondakh,2016: 177).

Selama kehamilan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah sehingga pasokan oksigen ke bayi berkurang. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir adalah faktor ibu yang diantaranya preeklamsia dan eklamsia, perdarahan abnormal, partus macet,

demam saat persalinan, infeksi berat, perdarahan abnormal, partus macet, kehamilan postmatur 42 minggu dan juga ketuban pecah dini (KPD) (Dwiender Octa,dkk,2014: 16). Faktor tali pusat yaitu lilitan tali pusat, simpul tali pusat, tali pusat pendek. Faktor bayi prematur (sebelum 37 minggu kehamilan), kelainan kongenital, persalinan dengan tindakan dan air ketuban yang bercampur dengan mekonium.

Kasus pada bayi Ny “S” yang mengalami asfiksia sedang disebabkan oleh faktor ibu yaitu partus macet di kala II (distosia). Kondisi inilah yang menyebabkan bayi terhambat untuk keluar sehingga bayi mengalami kehilangan O<sub>2</sub> yang berujung pada hipoksia.

Asfiksia neonatorum adalah keadaan bayi yang pada saat lahir tidak dapat bernapas spontan serta teratur segera setelah lahir. Keadaan ini biasanya disertai dengan keadaan hipoksia, asfiksia akan bertambah buruk apabila penanganan bayi tidak dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga perawatan dilaksanakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengatasi lanjut yang mungkin timbul, asfiksia dapat terjadi selama kehamilan atau persalinan (Nurarif & Hardhi, 2016).

Pada kasus bayi Ny “S” data yang diperoleh menunjukkan bahwa persamaan gejala yang terdapat dalam tinjauan pustaka dengan kasus sehingga tidak menemukan adanya kesenjangan.

## Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Data dasar telah dikumpulkan, kemudian diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnose atau masalah spesifik.

Dalam teori masa gestasi sangat penting untuk menentukan apakah kehamilan cukup bulan atau lebih bulan. Masa gestasi dibagi menjadi bayi kurang bulan yaitu kurang dari 37 minggu, bayi cukup bulan yaitu 37-42 minggu, bayi kelebihan bulan yaitu usia kehamilan lebih dari 42 minggu. Untuk mengetahui cukup bulan atau tidak yaitu dikaji dari HPHT ibu dihitung sampai lahirnya bayi. Kemudian bayi dikatakan sesuai masa kehamilan (SMK) apabila berat badan bayi dengan usia kehamilan ibunya sesuai.

Pada kasus ini bayi lahir secara normal dengan gestasi 40 minggu 1 hari yaitu BCB, SMK dengan asfiksia sedang.

Dari hasil analisa dan interpretasi data yang diperoleh dari data yang pertama maka diagnosa atau masalah aktual pada bayi "S" adalah bayi dengan Asfiksia sedang, karena dilihat dari penilaian apgar score bayi yaitu 4/6. Yaitu pada menit pertama seluruh tubuh berwarna putih pucat, denyut jantung >100 kali/menit, tidak bernafas spontan, tonus otot lemah. Kemudian pada menit ke-5 ditemukan denyut jantung mulai membaik, seluruh tubuh merah dan ekstremitas biru, masih sedikit gerakan dan bayi sudah menangis. Pada kasus bayi Ny "S" tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus.

### **Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial**

Pada peninjauan pustaka manajemen kebidanan yaitu identifikasi adanya masalah potensial, melakukan antisipasi jika memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati pasien dan diharapkan dapat pula bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar terjadi berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah diidentifikasi (Purwoastuti, 2015:156/).

Identifikasi adanya masalah potensial yang kemungkinan terjadi pada bayi “S” berdasarkan pengumpulan data, pengamatan yang akurat dan observasi serta evaluasi yang didapat bahwa bila Asfiksia sedang jika tidak ditangani segera maka dapat mengakibatkan terjadinya asfiksia berat.

Sedangkan pada studi kasus ini didapat data yang mendukung yaitu partus macet, yang berakibat pernapasan bayi lambat, dan seluruh badab berwarna putih pucat, sehingga penulis mendiagnosa/masalah potensial terjadi Asfiksia berat yang mengarahkan tidak adanya kesengajaan antara tinjauan pustaka dan studi kasus.

### **Langkah IV Tindakan segera/kolaborasi**

Dalam teori, tindakan segera dan kolaborasi dilakukan berdasarkan indikasi yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat demi keselamatan pasien. Dalam kasus ini, tindakan segera yang dilakukan bidan bersama tim kesehatan lainnya adalah membersihkan saluran napas dan rangsangan taktil untuk merangsang bayi bernapas secara spontan.

Tujuan rangsangan taktil adalah intervensi tepat waktu untuk mengembalikan efek-efek asfiksia hingga mencegah kerusakan otak dan organ yang akibatnya akan ditanggung sepanjang hidup, sebelum bidan memutuskan untuk melakukan resusitasi, perlu adanya identifikasi dari kondisi bayi yang didasarkan pada beberapa hal seperti trauma, asfiksia janin, medikal interval, malformasi, sepsis, dan syok.

Kemungkinan adanya faktor-faktor ini, maka bidan seharusnya melakukan persiapan yang maksimal terhadap kelahiran bayi antara lain tempat yang kondusif untuk melakukan tindakan, dan peralatan yang siap pakai. Jika hasil pemeriksaan sejak proses kehamilan sampai dengan persalinan bidan memprediksi kondisi janin baik, namun ternyata saat persalinan memerlukan resusitasi, maka lakukan secepat mungkin untuk menyelamatkan bayi.

Asfiksia sedang membutuhkan tindakan segera, pada kasus bayi Ny "S" yang ditandai dengan seluruh tubuh berwarna putih pucat, denyut jantung 88x/menit, meringis, gerakan sedikit, dan pernapasan tidak teratur. Sehingga tindakan yang dilakukan adalah menyiapkan tempat yang hangat dan kering untuk melakukan pertolongan, memposisikan bayi dengan kepala bayi sedikit ekstensi atau mengganjal bahu bayi dengan kain, dilakukan pembersihan jalan napas dengan alat penghisap seperti Deele, keringkan tubuh bayi dengan kain bersih, setelah itu gunakan kain yang kering untuk melakukan rangsangan taktil, letakkan kembali bayi pada posisi yang benar, karena bayi mengalami sianosis maka dilakukan pemberian oksigen 1 liter/menit lewat nasal kanul.

Selain itu, menganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap berdoa kepada Allah swt dan banyak berdzikir. Ini juga dapat membantu ibu agar tidak terlalu cemas dalam menghadapi cobaan. Prosedur resusitasi yang dilakukan sesuai dengan yang dijelaskan dalam tinjauan pustaka dengan demikian tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus.

### **Langkah V Rencana Asuhan Kebidanan**

Penatalaksanaan asfiksia sedang berdasarkan teori yang ada, maka intervensi yang diberikan adalah menyampaikan hasil pemeriksaan serta memberitahu ibu dan keluarga bahwa harus dilakukan tindakan segera secara cepat dan tepat untuk menyelamatkan bayi agar tidak terjadi komplikasi yang berbahaya pada bayi.

Kemudian lakukan pencegahan kehilangan panas, termasuk menyiapkan tempat yang hangat dan kering untuk melakukan pertolongan, memposisikan bayi dengan kepala bayi sedikit ekstensi atau mengganjal bahu bayi dengan kain, dilakukan pembersihan jalan napas dengan alat penghisap seperti Deele, keringkan tubuh bayi dengan kain bersih, setelah itu gunakan kain yang kering untuk melakukan rangsangan taktil, letakkan kembali bayi pada posisi yang benar, kemudian nilai usaha napas, frekuensi denyut jantung dan warna kulit, penghisap yang digunakan harus telah didesinfeksi tingkat tinggi (DTT).

Jika tindakan diatas telah dilakukan dan bayi memberikan reaksi yang bagus maka lakukan kembali rangsangan taktil. Apabila bayi baru lahir tidak mulai bernapas memadai berikan rangsangan taktil secara singkat. Pastikan posisi bayi diletakkan dalam posisi yang benar dan jalan nafasnya telah bersih. Rangsangan

taktil harus dilakukan secara hati-hati dan lembut seperti dengan lembut gosok punggung, tubuh, kaki atau tangan (ekstremitas) satu atau dua kali. Kemudian dengan lembut, tepuk atau sentil telapak kaki bayi (satu atau dua kali).

Proses penghisapan lendir, pengeringan, dan merangsang bayi tidak berlangsung lebih dari 30-60 detik dari sejak lahir hingga proses tersebut selesai. Pada studi kasus By “S” dengan asfiksia sedang, direncanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial yaitu beritahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada bayinya agar ibu mengetahui kondisi bayinya saat ini, observasi tanda-tanda vital bayi seperti denyut jantung, pernapasan, suhu, dan warna kulit bayi. Dengan dilakukannya pemantauan tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tindakan yang telah dilakukan.

Pada langkah ini penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan kasus yang didapatkan. Dimana rencana asuhan yang teori memiliki kesamaan dengan kasus yang didapatkan.

#### **Langkah VI Pelaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan**

Langkah ini merupakan rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Apabila bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana). Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan petugas kesehatan lainnya dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang

mengalami komplikasi, bidan juga bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan meningkatkan waktu dan meningkatkan mutu asuhan (Asri dan Clervo, 2012:31).

Saat pelaksanaan asuhan kebidanan pada bayi Ny “S” tindakan yang telah direncanakan seluruhnya telah direncanakan seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik. Dalam pelaksanaan tindakan dan asuhan kebidanan penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena seluruh tindakan yang dilakukan sudah berorientasi pada kebutuhan klien. Dalam melakukan asuhan, senantiasa berdoa kepada Allah, karena atas izin-Nya bayi dapat terselamatkan. Berikut adalah implementasi yang dilakukan pada Ny “S” dengan kasus Asfiksia Sedang saat dirawat di RSUD Labuang Baji, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah pasien.

Bayi Ny “S” dirawat selama 3 hari yaitu mulai tanggal 17-19 Januari 2022. Pada hari pertama bayi mengalami asfiksia sedang yang ditandai dengan tubuh berwarna putih pucat, denyut jantung 88x/menit, meringis, gerakan sedikit, dan pernapasan tidak teratur.

Maka asuhan yang diberikan yaitu, menyampaikan kepada ibu dan keluarga bahwa bayinya harus ditangani segera. Setelah itu, melakukan kolaborasi dengan petugas kesehatan lainnya untuk melakukan tindakan yaitu menyiapkan tempat yang hangat dan kering untuk melakukan pertolongan, memosisikan bayi dengan kepala bayi sedikit ekstensi atau mengganjal bahu bayi dengan kain, dilakukan pembersihan jalan napas dengan alat penghisap seperti Deele, keringkan tubuh

bayi dengan kain bersih, setelah itu gunakan kain yang kering untuk melakukan rangsangan taktil, letakkan kembali bayi pada posisi yang benar, karena bayi mengalami sianosis maka dilakukan pemberian oksigen 1 liter/menit lewat nasal kanul, melakukan perawatan tali pusat, menginjeksi vitamin K 0,5 cc, memberikan salep mata dan mengobservasi TTV tiap 15 menit.

Pada hari kedua yaitu tanggal 18 Januari 2022, bayi sudah membaik, hasil TTV frekuensi jantung 140x/menit, pernapasan 52x/ menit, suhu 36,9°c, BB: 3600 gram, oksigen telah dilepaskan karena sianosis sudah hilang pada jam 10:15 wita.

Selain itu, memberi tahu ibu dan keluarga bahwa bayinya sudah membaik, menganjurkan ibu untuk memberi ASI kepada bayinya.

Kemudian, pada hari ketiga yaitu pada tanggal 19 Januari 2022 bayi sudah dibolehkan pulang karena keadaannya sudah sangat membaik, TTV (frekuensi jantung 144x/menit, pernapasan 52x/menit, dan suhu 36,6°c) dan BB: 3600 gram, menganjurkan ibu untuk selalu memberi ASI kepada bayinya setiap bayi membutuhkannya, memberitahu ibu untuk selalu cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi, mengganti pakaian bayi setiap BAB/BAK atau lembab atau basah, dan menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan diri dan bayinya.

Setelah bayi pulang dari RS, asuhan dilanjutkan dengan melakukan kunjungan rumah sebanyak 3 kali, pada kunjungan pertama tanggal 24 Januari 2022, bayi sudah sangat membaik, TTV (denyut jantung 140x/menit, pernapasan 54x/menit, suhu 36,7°c), dan BB: 3800 gram. Asuhan yang diberikan yaitu: memberitahu ibu

agar memberi ASI pada bayinya yaitu ASI Eksklusif secara ondemand, menjaga kebersihan diri dan bayinya, menjaga kehangatan bayi, serta menganjurkan ibu untuk makan-makanan bergizi seperti sayur-sayuran dan buah buahan.

Kunjungan rumah kedua dilakukan pada tanggal 1 Februari 2022, keadaan bayi baik, TTV normal (HR: 144x/menit, pernapasan: 52x/menit, dan suhu 36,8°c) BB: 4000 gram, asuhan yang diberikan : memberitahu ibu bahwa bayinya baik-baik saja, menganjurkan ibu menjaga kebersihan diri dan bayinya, menganjurkan ibu untuk memberi ASI sesuai dengan kebutuhan bayi, dan menganjurkan ibu untuk membawa bayinya untuk imunisasi pada usia 1 bulan.

Kunjungan rumah ketiga (terakhir) dilakukan pada tanggal 14 februari 2022, Keadaan bayi baik, TTV normal (HR : 144 x/menit, pernapasan 50 x/menit, dan suhu 36,7°c) BB: 4400gram, asuhan yang diberikan : Mengingatkan kembali pada ibu untuk menjaga personal hygiene bayi yaitu dengan cara mengganti popok bayi setelah, BAK/BAB atau popok dalam keadaan lembab/basah, menganjurkan pada ibu memberikan ASI pada bayinya secara on demand, menganjurkan pada ibu untuk memberikan ASI pada bayinya sampai usia 2 tahun, dan menganjurkan pada ibu untuk membawa bayinya ke pusat pelayanan terdekat sebelum usia 2 tahun untuk dilakukan imunisasi BCG dan polio 1.

### **Langkah VII Evaluasi**

Evaluasi merupakan langkah terakhir dari proses manajemen asuhan kebidanan. Mengevaluasi pencapaian dengan kriteria yang diidentifikasi, dan memutuskan bahwa apakah tujuan telah tercapai atau belum tercapai.

Pada kasus bayi Ny “S” dengan asfiksia sedang evaluasi yang berhasil dilakukan sebelum dan sesudah meliputi: keadaan umum bayi mulai membaik, kesadaran komposmentis, bayi sudah menangis, tanda-tanda vital dalam batas normal seperti suhu bayi sudah normal, pernapasan bayi mulai teratur, tonus otot sudah membaik, refleks moro dan refleks hisap baik, dan tidak ada tanda-tanda infeksi seperti pada tali pusat kemerahan, panas, bengkak, nyeri, dan mengeluarkan nanah yang berbau busuk. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa proses manajemen kebidanan yang diterapkan pada bayi Ny “S” dengan diagnosa bayi lahir dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar sudah berhasil, Bayi sudah dalam keadaan baik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah mempelajari teori dan bertindak langsung di lahan yaitu melalui studi kasus tentang asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji Makassar, maka penulis menyimpulkan dan saran sebagai berikut :

#### **A. KESIMPULAN**

1. Telah dilakukan pengumpulan data dasar pada bayi Ny “S” dengan asfiksia dan subjektif di RSUD Labuang Baji Makassar pada tahun 2022. Dilaksanakan dengan mengumpulkan data subjektif dan objektif yang didapatkan dari hasil bahwa bayi tidak segera menangis pada saat lahir dan juga dilakukan pemeriksaan secara objektif terhadap bayi Ny “S” yaitu keadaan umum bayinya asfiksia sedang ditandai dengan pada menit pertama bayi tidak segera bernapas spontan, tonus otot lemah, serta kulit kemerahan dan ekstremitas biru.
2. Mendiagnosa terjadinya asfiksia neonatus dapat diamati pada proses persalinan dan pada saat penilaian bayi baru lahir ada tiga yaitu berdasarkan warna kulit, frekuensi jantung dan pernapasan. Tindakan yang dilakukan pada bayi asfiksia adalah dengan resusitasi.
3. Telah dilakukan perumusan diagnosa/masalah potensial bayi Ny “S” dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2022 dan dengan hasil potensial terjadinya asfiksia berat pada bayi sehingga perlunya

penanganan yang tepat dan cepat. Telah diidentifikasi perlunya suatu tindakan segera dan kolaborasi pada bayi Ny “S” dengan kejadian asfiksia di RSUD Labuang Baji Makassar pada tahun 2022 yaitu dengan hasil manajemen kebidanan dengan metode pendekatan pemecahan masalah yang dilakukan oleh Bidan, dalam proses pemecahan masalah dalam memberikan pelayanan asuhan kebidanan.

5. Dilakukan penerapan rencana tindakan asuhan kebidanan pada bayi Ny “S” dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2022, hasil merencanakan asuhan yaitu berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial yaitu bayi dikeringkan, dan dihangatkan, posisi bayi diatur sedikit ekstensi, lalu melakukan pengisapan lendir di hidung dan di mulut bayi menggunakan delee, dilakukan rangsangan taktil, dilakukan sampai bayi dengan kondisi membaik.
6. Telah dilakukan tindakan asuhan yang telah direncana pada bayi “S” dengan asfiksia di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2022 dan hasil semua tindakan telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa hambatan apapun.
7. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan pada bayi “S” dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2022 dengan hasil yaitu asuhan yang telah diberikan berhasil ditandai dengan bayi yang mulai menangis, pernapasan sudah mulai normal dan sudah ada reaksi apabila bayi diberikan rangsangan.

8. Pada bayi Ny “S” telah diberikan asuhan secara komprehensif dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2022.
9. Peneliti tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus nyata di lahan praktek.
10. Dokumentasi sangat penting pada setiap manajemen asuhan kebidanan karena merupakan salah satu bentuk laporan pertanggung jawaban Bidan terhadap tindakan asuhan kebidanan yang telah diberikan kepada klien dan dapat dijadikan sebagai bukti apabila terjadi gugatan oleh klien ataupun keluarganya.

## **B. SARAN**

### **1. Bagi tenaga kesehatan**

- a. Prognosis bayi asfiksia buruk dan juga seringkali berakhir berujung pada kematian. Meskipun demikian, sebagai tenaga kesehatan kita senantiasa dituntut untuk tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan bayi dengan dilakukannya tindakan asuhan secara profesional dan menyerahkan kepada Allah swt karena hidup dan matinya seseorang hanyalah Allah swt yang maha mengetahui.
- b. Tenaga kesehatan khususnya profesi Bidan hendaknya selalu membina hubungan yang baik antara klien dan keluarganya, sehingga dapat tercapainya tujuan yang diinginkan.

- c. Tenaga kesehatan khususnya Bidan sebaiknya selalu memperbaharui wawasan serta pengetahuan serta menerapkan asuhan terbaru untuk mengoptimalkan upaya penurunan AKI & AKB.

## 2. Bagi institusi

- a. Membekali mahasiswa dengan keterampilan yang cukup sebelum turun di lapangan khususnya dalam hal resusitasi karena keterampilan ini merupakan bantuan dasar kehidupan yang wajib dimiliki bagi setiap tenaga kesehatan.
- b. Menambah bahan bacaan di perpustakaan yang berhubungan dengan perkembangan terbaru ilmu kebidanan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga dapat memperluas wawasan mahasiswa kebidanan UIN Alauddin Makassar.

## 3. Bagi RSUD Labuang Baji Makassar

- a. Mensosialisasikan penerapan APN terbaru dalam pemberian pelayanannya.
- b. Sebaiknya pihak rumah sakit senantiasa memeriksa kelengkapan dan kelayakan alat agar selalu kondisi siap pakai.
- c. Diadakannya sosialisasi atau pelatihan bagi tenaga kesehatan mengenai penatalaksanaan resusitasi secara uptodate.

## 4. Bagi pemerintah

- a. Sering mengadakan pelatihan demi meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para tenaga kesehatan.
- b. Menyediakan fasilitas penentu kebijakan khususnya dalam pelayanan kesehatan yang merata yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afroh, f. judah, M. dan sudarti. (2012). *teori pengukuran nyeri dan nyeri persalinan*. nuha medika.
- Ai yeyeh rukiah & lia yulianti. (2013). *asuhan neonatus bayi dan anak balita*. trans info media.
- Eka riska, anieq mumthiah al kausar, andi siti rahma. (2018). *asuhan kebidanan intranatal pada Ny "N" dengan persalinan pstterm di RSUD syekh yusuf gowa 17 juli 2018*.
- Indah, Firdayanti, & Nadyah. (2019). Jurnal midwifery. *Akademi Bidan*, 1(2), 68–78.
- Isemi sukarni k dan wahyu p. (2013). *buku ajar keperawatan maternitas*. nuha medika.
- Jenny js sondakh, tararini ika pipitcahyani. (2017). *mutu pelayanan kesehatan dan kebidanan*. salemba medika.
- Kusuma Wardani, P., Comalasari, I., Medica Bakti Nusantara Pringsewu, A., Menyusu Dini Suhu Tubuh Bayi Baru Lahir Hipotermia, I., Inisiasi Menyusu Dini Terhadap Perubahan Suhu Tubuh pada Bayi Baru Lahir Indah Comalasari, P., Puspita, L., & Pringsewu, N. (2019). Pengaruh Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Terhadap Perubahan Suhu Tubuh pada Bayi Baru Lahir. *Wellness and Healthy Magazine*, 1(1), 71. <http://wellness.journalpress.id/index.php/wellness/>
- Lailiyana. (2012). *Buku ajar asuhan kebidanan persalinan*. EGC.
- Lestari, R. D., & Putri, N. N. B. K. A. (2019). Analisis faktor Penyebab Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir di RS Aura Syifa Kabupaten Kediri. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 6(2), 251–262. <https://doi.org/10.26699/jnk.v6i2.art.p251-262>
- Lumsden, h dan holmes, D. (2012). *asuhan kebidanan pada bayi yang baru lahir (rianayati kusmini,penerjemah)*. pustaka pelajar.
- Lyndon, lockhart anita dan saputra. (2014). *asuhan kebidanan fisiologis dan patologis*. binarupa aksara.

- Marmi k, R. (2015). *asuhan neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah*. pustaka pelajar.
- Murniati, L., & Ferawati Taherong, S. (2021). Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia. *Jurnal Midwifery*, 3(1), 32–41. <https://doi.org/10.24252/jmw.v3i1.21028>
- Novisye Katiandagho1, K. (2015). Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Liun kendage Tahuna. *Ilmiah Bidan, Volume 3*,(2), 1–11.
- Novitasari, R. (2015). *hubungan antara preeklamsia terhadap kejadian asfiksia neonatorium di rsud kanjuruhan kepanjen malang periode januari-desember 2013*.
- Pengamanan, eunikea., wantania, john j., & wagey, freddy w. (2016). *karakteristik kehamilan dengan luaran asfiksia saat lahir di rsup prof. Dr. d kandou manado periode januari-desember 2014*.
- Prihandani, O. R. (2020). *Pelatihan resusitasi bayi baru lahir sebagai upaya peningkatan kompetensi kegawatdaruratan tenaga kesehatan*. 3, 603–608.
- Sioto, rohan dan. (2013). *buku ajar kesehatan reproduksi*. nuha medika.
- Sudarti dan fauziah. a. (2013). *asuhan kebidanan neonatus resiko tinggi dan kegawatan*. nuha medika.
- Tando, naomy marie. (2013). *asuhan kebidanan neonatus bayi dan anak balita*. ECG.
- Tasew, H., Zemicheal, M., Teklay, G., Mariye, T., & Ayele, E. (2018). Risk factors of birth asphyxia among newborns in public hospitals of Central Zone, Tigray, Ethiopia 2018. *BMC Research Notes*, 11(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s13104-018-3611-3>
- Tresnawati, F. (2013). *asuhan kebidanan*. pt prestasi pustaka raya.
- Wiradharma, W., I Md, K., & I Wyn, D. A. (2016). Risiko Asfiksia pada Ketuban Pecah Dini di RSUP Sanglah. *Sari Pediatri*, 14(5), 316. <https://doi.org/10.14238/sp14.5.2013.316-9>



Kunjungan kedua pada tanggal 01 Februari 2022 dirumah klien

Kompleks B



Kunjungan ketiga pada tanggal 14 Februari 2022 dirumah klien

Kompleks B



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa  
Website: fak.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-66 / Un.06-FKIK/PP.00.9/01/ 2022 Gowa, 2 Januari 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel**  
**Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan**  
Di  
Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Tenri Angka  
N I M : 70400118013  
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Tamangapa


Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis ilmiah :

**"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji Makassar."**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb.  
2. Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di RSUD Labuang Baji Makassar terhitung mulai tanggal 10 Januari s/d 8 Februari 2022 .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam  
Dekan.   
Syatirah

Tembusan :  
-Rektor UIN Alauddin Makassar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 25352/S.01/PTSP/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Direktur RSUD Labuang Baji Makassar

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-66/Un.06-FKIK/PP.00.9/01/2022 tanggal 07 Januari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **TENRI ANGKA**  
Nomor Pokok : 70400118013  
Program Studi : Kebidanan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR DENGAN ASFIKIA DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Januari s/d 11 Februari 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 11 Januari 2022.

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. Peringkat



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: [rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id](mailto:rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id)

MAKASSAR

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/ 016 /B.02/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD HARDI, S.STP

Jabatan : Kabag Pendidikan dan Penelitian

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tenri Angka

Nomor Pokok : 70400118013

Institusi : Kebidanan

Alamat : JL. H. M Yasin Limpo No. 36 Romang Polong Gowa

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Dengan Judul " **MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR DENGAN ASFIKSIA** "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Makassar, Maret 2021

An. Wadir Umum, SDM Dan Diklat  
Kabag Pendidikan dan Penelitian

  
H. MUHAMMAD HARDI, S.STP  
NIP. 19830830 200212 1 001



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION*  
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.047/KEPK/FKIK/I/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : TENRI ANGKA  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*


**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR DENGAN ASFIKIA DI RSUD  
LABUANG BAJI MAKASSAR"**

**"MANAGEMENT OF MIDWIFERY CARE FOR NEWBORNS WITH ASPHYXIA AT THE LABUANG  
BAJI HOSPITAL MAKASSAR"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023  
*This declaration of ethics applies during the period January 5., 2022 until January 5,2023*

January 5, 2022  
Professor and Chairperson,  
  
DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes  


## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas peneliti

Nama : Tenri Angka  
Nim : 70400118013  
Tempat, Tanggal Lahir : Labojo, 29 Maret 2000  
Suku : Kajang  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Pantama, Kec.Kajang, Kab. Bulukumba  
Alamat Domisili : Samata

### B. Identitas Orang Tua

Ayah : Ambo Adi  
Ibu : Nisma

### C. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 106 Labojo : 2006-2012  
SMPN 19 Bulukumba : 2012-2015  
SMAN 5 Bulukumba : 2015-2018  
UIN Alauddin Makassar : 2018-2022