

**UJI AKTIVITAS ANTIKOLESTEROL EKSTRAK ETANOL BATANG
PARANG ROMANG (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) SECARA *In-Vitro***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi
(S.Farm) pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

A.WIKA AMALIA FADHILAH

NIM. 70100118047

JURUSAN FARMASI

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.Wika Amalia Fadhilah
NIM : 70100118047
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang/14 Agustus 2000
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. H. A. Arsyad (Ex. Jl. Lombok)
Judul : Uji Aktivitas Antikolesterol Ekstrak Etanol Batang Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) secara *In-Vitro*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Romangpolong, 27 Februari 2023

Penyusun



A. Wika Amalia Fadhilah

NIM : 70100118047

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Uji Aktivitas Antikolesterol Ekstrak Etanol Batang Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) secara *In-Vitro*" yang disusun oleh A.Wika Amalia Fadhillah, NIM : 70100118047, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari **Senin, 27 Februari 2023** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Romangpolong, **27 Februari 2023**
06 Sya'ban 1444

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah Sp. A., M. Kes.

(.....)

Sekretaris : Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M. Si

(.....)

Pembimbing I : Apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si

(.....)

Pembimbing II : Apt. Khaerani, M.Farm., Klin

(.....)

Penguji I : Apt. Indah, S.Si., M.Si

(.....)

Penguji II : Dra. Audah Mannan, M.Ag

(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Syatirah Sp. A., M. Kes.

NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Segala puji bagi Allah *subhanahu wata'ala* atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga semua kebaikan menjadi sempurna. Shalawat dan salam kepada Nabi dan Rasul Allah, Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Hasnawati dan Ayahanda A.Darman yang senantiasa memberi doa, dukungan, nasehat dan arahan, serta bentuk kasih sayang lainnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, Kepada keluarga yang juga senantiasa memberi dukungan, penulis ucapkan banyak terimakasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya. Tidak lupa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Ibu Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., selaku pembimbing pertama yang senantiasa memberi bimbingan, dukungan, arahan, dan motivasi hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Apt. Khaerani Mukhtar S.Farm., M.Farm., Klin., selaku pembimbing kedua yang juga senantiasa memberi bimbingan, masukan. arahan dan motivasi hingga selesainya skripsi ini
6. Bapak Apt. Muh. Ikhlas Arsul, S.Farm., M.Si., selaku pembimbing akademik yang banyak membantu dan memberi arahan dalam proses penelitian.
7. Ibu Apt. Indah. S.Si., M.Si., selaku penguji kompetensi dan Bapak Nurhidayat M. Said. S.Ag., M.Ag., selaku penguji agama.
8. Guru-guru yang telah mengajarkan ilmu agama, ilmu yang menjadi bekal dan penguat dalam menjalani masa-masa penyusunan tugas akhir ini.
9. Semua teman-teman dan sahabat yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik berupa doa, nasehat, motivasi, dan bantuan lainnya.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah memberi sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini. Hanya Allah-lah sebaik-baik pemberi balasan.

Semoga karya tulis ilmiah ini bisa bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan semua pihak. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu segala bentuk kritik, saran dan nasehat yang membangun sangat penulis harapkan untuk kebaikan penelitian yang akan datang.

Samata-Gowa, 27 Februari 2023



Waf.
A.Wika Amalia Fadhilah
NIM: 70100118047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Uraian Sampel	8
B. Pengantar Fitokimia.....	9
C. Pengantar Farmakologi.....	16
D. Spektrofotometri Ultra Violet – Visible (UV-Vis).....	30
E. Integrasi Keislaman	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Sampel	36


D. Variabel Penelitian	36
E. Alat dan Bahan	37
F. Tahap Penelitian	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian.....	40
B. Pembahasan	41
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Lipoprotein Dan Kandungan Lipid	21
Tabel 2. Kadar Kolesterol Total.....	27
Tabel 3. Hasil Ekstraksi Batang Parang Romang	40
Tabel 4. Hasil Uji Skrinning Fitokimia Batang Parang Romang.....	40
Tabel 5. Hasil Uji Aktivitas Antikolesterol Batang Parang Romang (Boehmeria Virgata (Forst.) Guill) Secara In-Vitro.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Spektrofotometer UV-Vis Jenis Single-Beam	31
Gambar 2. Skema Kerja Spektrofotometer UV-Vis Jenis Double-Beam	31
Gambar 3. Reaksi Identifikasi Flavonoid.....	43
Gambar 4. Reaksi Identifikasi Alkaloid.....	44
Gambar 5. Reaksi Identifikasi Steroid/Terpenoid.....	44
Gambar 6. Ikatan Kimia Antara Flavonoid Dan Kolesterol	47



ABSTRAK

Nama : A.Wika Amalia Fadhilah
NIM : 70100118047
Judul : Uji Aktivitas Antikolesterol Ekstrak Etanol Batang Parang Romang (*Boehmeria Virgata* (Forst.) Guill) Secara *In-Vitro*

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia, dengan angka kematian 32% pada tahun 2019 berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization; WHO). Manusia dengan hiperkolesterolemia memiliki risiko tiga kali lipat lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular dibandingkan dengan individu yang sehat. Parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) adalah tumbuhan yang banyak tumbuh di pegunungan Sulawesi Selatan seperti Enrekang, Maros, Gowa, Malino, Maros, dan Sinjai. Uji penapisan fitokimia terhadap batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) menunjukkan bahwa batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) mengandung flavonoid, alkaloid, dan terpenoid. Menurut teori, senyawa yang secara signifikan dapat menurunkan kadar kolesterol adalah flavonoid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antikolesterol ekstrak etanol batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) dengan konsentrasi 25, 50, 75, dan 100 ppm yang diuji secara *in-vitro*. Penelitian menggunakan metode *Lieberman-Burchard* yang secara spesifik dapat mengidentifikasi kolesterol yang merupakan golongan steroid. Asetat anhidrat dan asam sulfat digunakan sebagai pereaksi. Penambahan asetat anhidrat berfungsi untuk memastikan media bebas air dan membentuk turunan asetil dari steroid. Sedangkan penambahan asam sulfat pekat berfungsi untuk menghasilkan warna hijau pada senyawa steroid, termasuk kolesterol. Warna yang terbentuk kemudian diukur menggunakan *Spektrofotometer UV-Vis* pada panjang gelombang 668 nm dengan *operating time* 15 menit untuk mendapatkan nilai absorbansi. Nilai absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat terkandung dalam larutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) mampu menurunkan kadar kolestrerol secara *in-vitro* pada setiap konsentrasi larutan, dengan masing-masing persen penurunan sebesar 31,25%, 31,25%, 37,50%, dan 37,50%.

Kata Kunci: Batang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill), Anti-kolesterol, *In-Vitro*

ABSTRACT

Name : A.Wika Amalia Fadhilah
NIM : 70100118047
Title : *In-Vitro* Test of Anti-cholesterol Activity of Parang Romang
(*Boehmeria Virgata* (Forst.) Guill) Stem Ethanol Extract

Cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide, with a mortality rate of 32% in 2019 based on World Health Organization (WHO) data. Humans with hypercholesterolemia have a threefold higher risk of developing cardiovascular disease compared to healthy individuals. Parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) is a plant that grows in the mountainous regions of southern Sulawesi such as Enrekang, Maros, Gowa, Malino, Maros, and Sinjai. Phytochemical screening of parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) stem shows that parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) stem contains flavonoid, alkaloid, and terpenoid. According to theory, substances that can significantly lower cholesterol are flavonoids. This study aimed to determine the anti-cholesterol activity of parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) stem ethanol extract with a concentration series of 25, 50, 75 and 100 ppm tested *in-vitro*. The study used the Lieberman-Burchard method which specifically identified cholesterol as a steroid group. Acetic anhydrous and sulfuric acid are used as reagents. The addition of acetic anhydrous serves to ensure a water-free medium and forms an acetyl derivative of the steroid. While the addition of concentrated sulfuric acid serves to produce a green color in steroid compounds, including cholesterol. The color formed then measured using a UV-Vis Spectrophotometer at a wavelength of 668 nm with an operating time of 15 minutes to obtain the absorbance value. The absorbance value is directly proportional to the concentration of the substance contained in the solution. The results showed that the ethanol extract of parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) stem was able to reduce cholesterol levels *in-vitro* at each solution concentration, with each percent reduction of 31.25%, 31.25%, 37,50%, and 37,50%.

Keywords: (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) stem, Anti-cholesterol, *In-Vitro*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hiperkolesterolemia merupakan keadaan saat kadar kolesterol di dalam darah mengalami peningkatan di atas ambang batasnya. Hiperkolesterolemia merupakan faktor risiko terbesar terjadinya penyakit kardiovaskular, sindrom metabolik, dan diabetes melitus tipe 2 (Jiang, et al., 2020). Berdasarkan data terbaru yang diterbitkan oleh WHO, penyakit kardiovaskular adalah sebab utama kematian dengan jumlah 32% di seluruh dunia pada tahun 2019 (World Health Organization, 2021). Dibandingkan dengan individu yang sehat, manusia dengan hiperkolesterolemia mempunyai peluang hingga 3x lipat lebih besar mengalami penyakit kardiovaskular (Jiang, et al., 2020).

Hiperkolesterolemia dapat diatasi dengan penerapan pola hidup sehat; mengurangi jumlah kalori yang bersumber dari lemak jenuh dan lemak trans makanan, penurunan berat badan jika obesitas, olahraga, menghindari atau berhenti merokok, dan mengkonsumsi obat-obat hipolipidemia (Dipiro, et al., 2020). Selain itu, penggunaan bahan yang berasal dari alam, khususnya yang telah terbukti memiliki efek penurun kolesterol juga dapat menjadi terapi hiperkolesterolemia.

Penggunaan bahan yang berasal dari alam (produk alami) kini banyak digunakan sebagai terapi pengobatan berbagai macam penyakit dan telah digunakan selama ribuan tahun oleh mayoritas penduduk dunia. Sekitar 85% dari populasi dunia menggunakan produk alami sebagai terapi lini pertama.

Selain sebagai pengobatan yang digunakan secara langsung, produk alami juga merupakan sumber utama penemuan obat, dengan 25-80% obat sintesis berasal dari produk alami (Arsul, Insanu, & Fidranny, 2021).

Di Indonesia, masyarakat juga banyak menggunakan obat-obat konvensional untuk pengobatan, termasuk dari tumbuhan. Data tahun 2010 Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa obat herbal digunakan sebagai bentuk pengobatan oleh 59,12% penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas. Penggunaan medis tradisional pada populasi antara usia 55 dan 64 sebanyak 67,69% (Mochammad & Meiyanti, 2021).

Allah *subhanahu wata'ala* dengan kekuasaan-Nya telah menciptakan bumi juga apa yang ada di dalamnya, juga dengan kesempurnaan-Nya, Dia menciptakan di dalamnya beragam tanaman sebagai tanda dari banyaknya tanda kekuasaan-Nya. Allah *ta'ala* berfirman dalam Surah Asy-Syu'ara (26) ayat 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahannya: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik?” (Kemenag, 2022) AL AUDDIN MAKASSAR

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman seraya mengingatkan untuk tafakkur (merenung) melihat beragam tanaman yang Allah ciptakan, yang indah secara pandangan dan mengandung banyak manfaat (As-Sa'di, 2018). Ayat ini secara khusus merupakan peringatan bagi orang-orang kafir, yaitu apakah

mereka tetap enggan beriman setelah memerhatikan bumi dimana Allah tumbuhkan padanya beragam jenis tumbuhan yang bermanfaat lagi indah dipandang, yang tiada yang kuasa dalam penumbuhannya kecuali Allah (Basyir, Haidar, Muslim, & Ismai'il, 2016). Pada ayat tersebut dapat difahami bahwa tumbuhan yang diciptakan Allah memiliki manfaat yang banyak yang dapat digunakan oleh manusia, Hal ini juga dibuktikan melalui penelitian yang telah banyak dilakukan sekarang. Namun, masih terdapat juga tumbuh-tumbuhan di sekitar kita yang belum diketahui manfaatnya.

Tumbuhan dari genus *Boehmeria* ini ialah salah satu tumbuhan yang berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai pengobatan alternatif dan saat ini mulai banyak diteliti. Ada 459 spesies dalam genus *Boehmeria*, 2 diantaranya tersebar luas endemik, yaitu *Boehmeria virgata* dan *Boehmeria depauperata*. Spesies *Boehmeria virgata* adalah yang paling populer dari keduanya (Arsul, Insanu, & Fidranny, 2021). *Boehmeria virgata* juga disebut sebagai parang romang banyak dijumpai di daerah pegunungan Sulawesi Selatan, seperti Enrekang, Maros, Gowa, Malino, Maros, dan Sinjai.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait tumbuhan *parang romang*. Penelitian oleh (Rusdi, Mukhriarni, & Paramitha, 2018) terhadap mencit menunjukkan bahwa parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) pada bagian akar memiliki efek hipokolesterolemik. Penelitian oleh (Rusdi, Arsul, & Kartikasari, 2021) menunjukkan bahwa ekstrak etanol batang (*Boehmeria Virgata* (Forst.) Guill) memiliki kandungan senyawa terpenoid juga alkaloid. Penelitian oleh (Rusdi, Hasan, Ardillah, & Evianti, 2018) mengungkapkan

bahwa senyawa flavonoid terdapat pada ekstrak etanol batang (*Boehmeria Virgata* (Forst.) Guill).

Penelitian *in-vitro* yang dilakukan oleh (Olivera, Ricardo, Almeida, & Costa, 2007) menunjukkan bahwa melalui penghambatan enzim *reduktase HMG-CoA*, flavonoid dapat menurunkan kolesterol total. (Zulviana, Rahman, & Supriadi, 2017) menyatakan bahwa alkaloid merupakan senyawa yang dapat membuat kadar kolesterol di dalam darah menjadi turun. Riset oleh (Warditiani, et al.) menunjukkan bahwa terpenoid menurunkan nilai kolesterol total, juga nilai trigliserida, serta nilai LDL, dan terdapat peningkatan pada level HDL.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian pada bagian batang tumbuhan parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) terhadap aktivitasnya dalam menurunkan kadar kolesterol yang diuji secara *in-vitro*.

B. Rumusan Masalah

Apakah ekstrak etanol batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) memiliki aktivitas sebagai penurun kadar kolesterol secara *in-vitro*?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Uji aktivitas

Uji aktivitas adalah uji untuk mengukur seberapa besar kemampuan aktivitas suatu bahan atau sampel yang akan diuji.

b. Ekstrak

Ekstrak merupakan hasil ekstraksi substansi aktif dari simplisia yang berupa nabati atau hewani dengan pelarut tertentu yang sesuai

c. Parang romang

Parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) adalah tumbuhan dari suku Urticaceae yang banyak tumbuh di daerah pegunungan Sulawesi Selatan dan secara empiris banyak digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan untuk pengobatan, khususnya sebagai terapi antitumor.

d. Kolesterol

Kolesterol adalah produksi lemak alami oleh tubuh yang memiliki peran dalam mensintesis banyak zat penting; sel bagian membran, , vitamin D, hormon kelamin, serta asam empedu. Kolesterol diproduksi dengan jumlah yang tepat di dalam tubuh, namun jumlahnya dapat meningkat salah satunya disebabkan karena konsumsi berlebihan dari lemak hewani

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah uji aktivitas penurun kolesterol.

D. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lukman, Wahyuddin, Subehan, & Manggau, 2014) diketahui bahwa tumbuhan parang romang dengan konsentrasi 7.813, 15.625, 31.25, 62.5, 125.0, 250 dan 500 µg/mL memiliki efek sitotoksik terhadap sel kanker HeLa dan berpotensi dikembangkan sebagai agen antikanker. Penelitian yang dilakukan oleh (Rusdi, Mukhriani, & Ramadhani, 2018) menunjukkan bahwa ekstrak akar parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) memiliki aktivitas sebagai antituberkulosis pada konsentrasi minimum 250 ppm.
2. Penelitian oleh (Rusdi, Mukhriani, & Paramitha, 2018) terhadap mencit diketahui bahwa parang romang (*Boehmeria Virgata* (Forst.) Guill) bagian akar memiliki efek hipokolesterolemik.
3. Penelitian oleh (Rusdi, Jannah, Noer, & Bariun, 2017) menunjukkan bahwa ekstrak etanol parang romang bagian batang dengan dosis 50, 100, 150 dan 200 mg/kg BB, mampu menurunkan level gula darah.
4. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rusdi, Arsul, & Kartikasari, 2021) diketahui bahwa ekstrak etanol parang romang (*Boehmeria Virgata* (Forst.) Guill) bagian batang yang dipartisi dengan cara ekstraksi padat-cair dengan pelarut n-Hexan dengan konsentrasi 25, 50, 75, 100 µg/mL memiliki kandungan senyawa terpenoid dan alkaloid. Dan berdasarkan penelitian (Rusdi, Hasan, Ardillah, & Evianti, 2018) diketahui bahwa batang *parang romang* memiliki kandungan senyawa flavonoid.

5. Penelitian *in-vitro* yang dilakukan oleh (Olivera, Ricardo, Almeida, & Costa, 2007) menunjukkan bahwa flavonoid mampu menurunkan level kolesterol melalui penghambatan enzim HMG-CoA reduktase. Selain itu, flavonoid menurunkan kadar kolesterol melalui peningkatan produksi apo A1 sehingga kadar HDL meningkat (Ruel, et al., 2006). Alkaloid mampu menurunkan kolesterol melalui penghambatan enzim lipase yang terdapat di pankreas dimana proses tersebut akan mengakibatkan terjadinya sekresi lemak yang dikeluarkan melalui feses (Lajuck & 2012., 2012). Penelitian oleh (Warditiani, et al.) terhadap tikus menunjukkan bahwa daun katuk yang telah difraksi dengan dosis 50 dan 100 mg/kgBB dapat menurunkan level kolesterol total, juga nilai trigliserida, serta nilai LDL, dan meningkatkan level HDL.

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui aktivitas penurun kadar kolesterol dari ekstrak etanol batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) secara *in-vitro*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bersifat ilmiah mengenai tanaman parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) yang memiliki peluang dijadikan sebagai obat, khususnya dalam menurunkan kolesterol, sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Sampel

1. Klasifikasi Tanaman (Waluyo, 2005)

Kerajaan	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub Divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Sub Kelas	: Monochlamydeae
Bangsa	: Urticales
Suku	: Urticaceae
Marga	: <i>Boehmeria</i>
Jenis	: <i>Boehmeria virgata</i>

2. Morfologi

Tinggi tumbuhan 0,5-8 m. Daun berwarna hijau dengan bentuk ellips (memiliki bagian terlebar di bagian tengah) atau ellips/oval, bentuknya meruncing hingga puncak daun, memiliki sisi yang bergerigi dari pangkal hingga puncak daun dengan panjang gigi 0,2–1,5 mm membulat/keluar; jumlah lebih dari 25. Diameter batang 1,5-2 mm, pada bagian pangkal lebih tebal dan kuat, Bunga tumbuh berkelompok pada ujung batang atau ranting. (Wilmot-Dear & Friis, 2013)

3. Kandungan Kimia

Batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, dan terpenoid (Rusdi, Hasan, Ardillah, & Evianti, 2018) (Rusdi, Arsul, & Kartikasari, 2021).

4. Kegunaan

Tanaman parang romang (*Boehmeria virgata*) berefek terhadap sel kanker sehingga dapat dikembangkan sebagai obat (Lukman, Wahyuddin, Subehan, & Manggau, 2014). Batang parang romang berpengaruh pada penurunan glikemik (Rusdi, Asrul, & Kartikasari, 2021) sehingga berpotensi dikembangkan sebagai obat penurun gula darah. Akar parang romang memiliki aktivitas penurun kolestererol di dalam darah (Rusdi, Mukhriani, & Paramitha, 2018).

B. Pengantar Fitokimia

1. Ekstraksi

Ekstraksi adalah suatu proses untuk memisahkan senyawa aktif dari jaringan tumbuhan atau hewan dengan menggunakan bantuan pelarut tertentu yang sesuai. Pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Secara umum, ekstraksi terjadi melalui 3 tahap :

- Penambahan pelarut ke sampel untuk dikontakkan
- Zat terlarut terpisah dari sampel dan akan larut bersama pelarut membentuk fase ekstrak

- Fase ekstrak (yang mengandung senyawa tertentu) terpisah dari sampel dan membentuk fase yang berbeda (Wilson, Cooke, Poole, & Adlard, 2000)

2. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk mendapatkan komponen senyawa kimia yang ada pada bahan alam tersebut. Secara umum, tujuan tersebut terbagi menjadi 5:

- Untuk mendapatkan zat aktif yang belum diketahui
- Untuk mengambil zat aktif yang telah diketahui
- Untuk mendapatkan senyawa dengan struktur sejenis
- Untuk mengambil metabolit sekunder yang ada pada bagian bahan alam tersebut
- Untuk mengidentifikasi semua metabolit sekunder (Endarini, 2016)

3. Pelarut

Penggunaan jenis pelarut dalam proses ekstraksi adalah yang bisa menarik substansi yang dikehendaki tanpa mengikutkan material yang lain. Pelarut harus merupakan cairan yang baik untuk kandungan substansi aktif atau yang memiliki khasiat, sehingga substansi tersebut dapat terpisahkan dari bahan dan substansi lain yang terkandung, hingga kandungan dalam ekstrak hanyalah sebagian besar senyawa kandungan yang dikehendaki. Maka cairan pelarut yang digunakan adalah cairan yang membuat mayoritas metabolit sekunder didalamnya dapat larut (Septianingsih, 2008).

Pada proses ekstraksi, terdapat 3 jenis pelarut yang dapat digunakan dengan tingkat kepolaran yang berbeda, yaitu pelarut nonpolar (contohnya n-heksan), pelarut semipolar (contohnya etil-asetat), dan pelarut polar (contohnya etanol/metanol) (Hidayah, Hisan, Solikin, Irawati, & Mustikaningtyas, 2016). Terkadang air digunakan jika diperlukan. Pemilihan pelarut tersebut dilakukan berdasarkan polaritas senyawa yang akan disari (Hanani, 2014).

Pelarut jenis etanol paling sering dipakai dalam laboratorium karena kemampuan melarutkan cukup tinggi dan memiliki sifat inert sehingga komponen yang lain tidak bereaksi. n-Heksana adalah jenis pelarut yang cocok dalam ekstraksi tumbuh-tumbuhan untuk mengangkat minyak di dalamnya juga memudahkan jika digunakan pada metode refluks karena sifatnya mudah menguap. Etil asetat jenis pelarut dengan titik didih 77°C dapat memudahkan proses pemisahan minyak dari pelarut dalam proses destilasi (Susanti, Ardiana, P, & G, 2012)

Etanol jenis pelarut dengan sifat polar yang berbentuk cairan, gampang menguap meski pada suhu yang rendah, jernih, tidak berwarna, titik didih pada 78°C , dan gampang terbakar (Kemenkes RI, 2020). Pelarut alkohol seperti etanol adalah diantara jenis pelarut yang banyak digunakan untuk mengambil substansi secara total (Hanani, 2014). Etanol dapat menyari senyawa kimia lebih banyak dibanding dengan metanol dan air (Riwanti, Izazih, & Amaliyah, 2020). Etanol memiliki sifat inert, tidak beracun, stabil secara fisika dan kimia, memiliki absorbansi yang baik, bisa digabung

dengan air pada semua jenis perbandingan, serta kapang dan mikroba susah untuk tumbuh pada etanol dengan konsentrasi melebihi 20%. Banyak zat aktif tumbuhan merupakan senyawa organik kompleks yang lebih mudah larut pada etanol dibanding air (Sulistiyani, 2011). Etanol yang optimal dalam mengambil substansi kimia adalah jenis etanol dengan konsentrasi 70% (Voight, 1995).

4. Metode Ekstraksi

Penentuan jenis ekstraksi bergantung pada beberapa hal seperti sifat fisiknya, sifat kimianya, dan juga jenis substansi yang akan diambil. Selain itu, jenis pelarut yang akan dipakai serta ketersediaan alat juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode ekstraksi. Ada beberapa cara dalam ekstraksi yang biasanya dipakai. Metode tersebut diantaranya maserasi, destilasi, refluks, gelombang mikro (*microwave assisted extraction, MAE*), perkolasi, infusa, soxhletasi, ekstraksi gas superkritis (*supercritical gas extraction, SGE*), dekok, lawan arah (*countercurrent*) dan ultrasonik, (Hanani, 2014).

Maserasi merupakan cara ekstraksi dengan proses perendaman sampel dengan pelarut di suhu kamar sehingga kerusakan pada substansi kimia dapat diminimalkan. Perkolasi dilakukan dengan mengalirkan pelarut pada sampel sampai seluruh senyawa tersari dengan sempurna, oleh karena itu pelarut dengan jumlah banyak dibutuhkan dalam cara ini. Refluks adalah cara ekstraksi panas, yakni proses dilakukan pada titik didih pelarut yang dipakai dengan masa tertentu. Soxhletasi juga merupakan metode ekstraksi

panas dengan menggunakan pelarut organik pada suhu didihnya. Metode ini menggunakan alat yang disebut soxhlet. Infusa merupakan metode ekstraksi yang dilakukan pada suhu 96 hingga 98°C menggunakan pelarut air selama 15 sampai 20 menit. Metode ini baik digunakan pada sampel yang bersifat lunak seperti daun dan bunga. Dekok merupakan metode yang sama dengan infusa namun dilakukan selama 30 menit dan hingga suhunya $\pm 100^{\circ}\text{C}$. Destilasi atau penyulingan adalah cara ekstraksi dengan menguapkan sampel yang telah dilarutkan pada pelarut air. Senyawa kemudian akan disari selama proses penguapan berlangsung. Lawan arah (*counter current*) ialah jenis cara yang sama dengan metode perkolasi namun sampel atau simplisia bergerak berlawanan arah dengan pelarut. Frekuensi 20 sampai 2000 kHz digunakan pada jenis cara ini. Metode gelombang mikro (MAE) dilakukan dengan gelombang mikro 2450 MHz. Dan metode ekstraksi gas superkritik (SGE) merupakan metode dengan penggunaan CO_2 bertekanan tinggi, biasanya digunakan dalam menyari minyak atsiri atau zat lain yang gampang menguap atau tidak labil dengan suhu (Hanani, 2014).

Maserasi ialah cara penyarian sederhana dan umumnya sering dipakai. Proses penyariannya dengan cara: dalam tempat tertutup sampel kering dari simplisia disimpan hingga terjadi kontak antara simplisia dengan pelarut pada suhu sekitar $25\text{-}26^{\circ}\text{C}$ selama paling sedikit 3 hari dengan dilakukan pengadukan secara berulang. Hasil perendaman kemudian disaring, bagian ampas lalu dipress untuk didapatkan bagian cairnya. Bagian cair tersebut kemudian dijernihkan lagi dengan cara disaring atau dilakukan dekantasi.

Metode ini cocok untuk tanaman yang tidak tahan panas (Endarini, 2016) (Julianto, 2019).

5. Senyawa Metabolit Sekunder

Senyawa bioaktif adalah zat yang diproduksi dalam proses biosintetik lain yang tidak diperlukan untuk perkembangan tanaman, tetapi tetap merupakan zat yang dihasilkan (Julianto, 2019). Metabolit sekunder datang dalam berbagai bentuk, seperti flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan tanin (Hanani, 2014).

a. Flavonoid

Flavon adalah zat alami yang biasanya berbentuk ikatan oksigen heteroatom dan memiliki dua struktur cincin yang dihubungkan oleh 3 atom C dalam kerangka satu. Flavonoid dapat terurai dalam larutan basa karena memiliki pH asam ringan. Biasanya, bibit mengandung flavonoid sebagai glikosida, yang melekat pada karbohidrat dan membuatnya mudah untuk dilarutkan jika menggunakan pelarut etil asetat, etanol, metanol, dan butanol. Beberapa isoflavon tampaknya memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol darah (Hanani, 2014). Flavonoid adalah zat yang cepat teroksidasi pada suhu ekstrem tetapi tidak tahan api (Rompas, Edy, & Yudistira, 2012).

b. Alkaloid

Alkaloid merupakan senyawa yang pada strukturnya memiliki unsur nitrogen (N) sifatnya basa. Sebagian besar zat alkaloid adalah kristal putih, namun beberapa, seperti nikotin, juga dapat berupa cairan atau

berwarna kuning (berberine dan serpentine). Alkaloid yang terdapat ditanaman biasanya simbolnya garam (ikatannya pada asa organic) dan hancur pada larutan, contohnya air juga etanol (Hanani, 2014). Alkaloid memiliki sifat tidak tahan panas (Lantah, L, & A, 2017).

c. Terpenoid

Terpenoid berasal dari kata "*terpen*", dalam bahasa Jerman "*terpentin*" dan dalam bahasa Inggris "*turpentine*". Istilah ini diberikan oleh seorang yang bernama Kekule untuk penamaan kelompok hidrokarbon $C_{10}H_{16}$ yang dulu diistilahkan "*terebene*". Sebagai ilmuwan telah berkembang, istilah "*terpen*" sekarang digunakan untuk merujuk pada senyawa yang formulanya mengandung unit sintetik C_5H_8 . Pengumpulan terpenoid melayani berbagai tujuan. Karoten memberi warna pada aktivitas fotosintesis, kelas kimia dan zat absisin mengontrol kehidupan tanaman, dan minyak lavender berbasis monoterpen dan seskuiterpen memberikan kontribusi pada aroma berbeda dari spesies tanaman yang berbeda. Terpenoid terdiri dari beberapa jenis, terdapat monoterpen dan seskuiterpen yang bersifat nonpolar sehingga dapat dilarutkan menggunakan pelarut polar, kelompok terpen dan steroid dapat larut dalam pelarut eter, serta kelompok diterpen dan triterpen yang bersifat polar (Hanani, 2014)

d. Saponin

Nama pabrik saponaria vaccaria, yang mengandung tanin dan dapat digunakan untuk membuat sabun, dari sinilah asal kata "saponin". Saponin dapat dikatabolisme untuk membuat glikosida dan larut dalam air tetapi tidak dapat didamaikan dalam ruang hampa. Tumbuhan mengandung tanin dalam bentuk glikosida, yaitu gula sederhana yang terikat pada glukokortikoid atau glikosida triterpenoid (Hanani, 2014).

C. Pengantar Farmakologi

1. Lipid

a. Pengertian Lipid

Lipid memainkan peran penting dalam struktur membran sel. Molekul organik yang dikenal sebagai lemak dapat dilarutkan dalam pelarut yang bersifat organik namun tidak dapat dilarutkan dengan air. Strukturnya terdiri dari gliserol, 2 asam lemak pada ekor (hidrofobik), dan gugus fosfat pada bagian kepala (hidrofilik). Dengan demikian, lipid bersifat amfipatik. Berbeda dengan komponen yang tidak larut dalam air, yang berhadapan dengan dirinya sendiri, fraksi yang larut menghadap ke luar. Susunan ini membantu memantau molekul mana yang dapat masuk dan keluar sel. Misalnya, molekul nonpolar dan molekul polar kecil, seperti oksigen dan air, dapat dengan mudah berdifusi masuk dan keluar sel. Molekul besar yang polar, misalnya glukosa, tidak dapat lewat dengan bebas sehingga membutuhkan bantuan protein transport (Ahmed, Shah, & Ahmed, 2022)

b. Fungsi Lipid

Lipid memiliki banyak fungsi biologis utama, seperti bertindak sebagai komponen struktural membran sel, berfungsi sebagai sumber penyimpanan energi dan berpartisipasi dalam jalur pensinyalan (Fahy, Cotter, Sud, & Subramaniam, 2022). Secara rinci fungsi lipid (lemak) dalam tubuh yakni:

- Elemen menyusun membran sel
- Melindungi badan dari suhu rendah
- Perannya melarutkan vit A, E, K, dan D
- Komponen pembentuk vitamin dan hormon dalam tubuh
- Berfungsi bantalan lemak
- Bagian yang menghasilkan energi besar (Santika, 2016)

c. Pembagian Lipid

1) Kolesterol

Molekul lipofilik yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah kolesterol. Sel bergantung pada kolesterol dalam berbagai cara untuk fungsi yang sehat. Kolesterol adalah bagian penting dari permukaan membran sel yang mempengaruhi flowabilitas permukaan membran dan organisasi strukturalnya. Di dalam produksi vitamin D, kadar hormon steroid; *androgen adrenal*, *aldosteron*, *kortisol*, dan hormon seks, kolesterol bertindak sebagai sinyal kimia (misalnya, testosteron, estrogen, dan progesteron). Garam empedu yang digunakan dalam proses pencernaan untuk

membantu penyerapan nutrisi obesitas yang tidak sehat A, D, E, dan K juga mengandung kolesterol (Huff, Boyd, & Jialal, 2022).

2) Trigliserida

Salah satu lipid yang beredar dalam darah adalah triasilgliserol. Gliserin dan lemak makanan diubah menjadi kadar trigliserida melalui rangsangan insulin atau kkal yang melimpah. Trigliserida, yang terbentuk saat terlalu banyak kalori yang dicerna, kemudian disimpan sebagai lemak di bawah kulit (Santi, Wiadnya, & Dewi, 2019)

3) Fosfolipid

Fosfolipid adalah molekul unik dan serbaguna. Fosfolipid pada tubuh terbentuk secara alami dan merupakan substansi utama dalam sel bagian membran, dimana fosfolipid tugasnya urgent pada struktural juga berfungsinya membran biologis. Fosfolipid adalah senyawa lipid bilayer yang ampifilik; terdiri dari kelompok kepala hidrofilik dan ekor lipofilik/hidrofobik (Drescher & van, 2020).

2. Lipoprotein

Lipid merupakan senyawa yang tidak larut di air, sehingga untuk proses transportasinya, lipid membutuhkan protein. Lipid yang bersirkulasi di dalam darah dengan bantuan protein disebut dengan lipoprotein. Lipoprotein mengandung lipid (kolesterol, trigliserida, fosfolipid) dan protein atau apoprotein. Masing-masing lipoprotein mengandung lipid dan protein

dalam jumlah yang berbeda, dan hal ini berkaitan dengan fungsinya masing-masing (Dipiro, et al., 2020).

Lipoprotein dalam plasma terdiri dari lima jenis: (Lee, J, & Siddiqui, 2021)

a. Kilomikron

Kilomikron adalah lipoprotein yang mengandung lebih banyak lipid daripada protein. Lebih spesifik, kandungan lipid yang dominan pada kilomikron adalah trigliserida, sehingga kilomikron berperan dalam distribusi trigliserida ke jaringan yang membutuhkan. Dalam proses distribusi tersebut, ketika mereka mencapai hati, sisa ion klorida terhubung ke transporter Glukosa.

Pada usus halus, lemak dicerna dan diemulsi menjadi misel. Kolesterol juga diserap. Asam lemak, kolesterol, dan protein atau apoprotein dikemas dan membentuk kilomikron. Hal inilah yang menjadi sebab kilomikron biasanya tidak ada di dalam plasma selama keadaan berpuasa (Dipiro, et al., 2020).

b. Lipoprotein densitas sangat kurang (VLDL, *Very Low-Density Lipoprotein*)

VLDL adalah lipoprotein yang mengandung lebih banyak lipid daripada protein. Sama halnya dengan kilomikron, kandungan lipid yang dominan pada VLDL adalah trigliserida, sehingga VLDL juga berperan dalam distribusi trigliserida ke jaringan yang membutuhkan energi atau penyimpanan (Dipiro, et al., 2020).

c. Lipoprotein densitas sedang (IDL, *Intermidate-Density Lipoprotein*)

IDL yakni merupakan lipoprotein begitu kaya akan kolesterol. IDL terbentuk ketika trigliserida dikeluarkan dari VLDL oleh otot dan jaringan adiposa (Ahmed, Shah, & Ahmed, 2022).

d. Lipoprotein densitas kurang (LDL, *Low-Density Lipoprotein*)

LDL yakni lipoprotein yang banyak mengandung kolesterolnya, oleh karena itu LDL berfungsi dalam distribusi kolesterol ke jaringan tubuh. Tubuh membutuhkan kolesterol untuk transportasi lemak yang diserap dalam makanan dan dikirim ke jaringan. Untuk memproduksi insulin dan menjaga keutuhan membran sel, sel membutuhkan kolesterol. LDL kembali ke hati dalam waktu seminggu setelah mendistribusikan kolesterol ke jaringan. Setelah pengikatannya ke Lysosomal, LDL diproses ulang untuk membuat lipoprotein densitas rendah baru atau dikeluarkan dari tubuh ke dalam empedu. Tubuh kemudian akan mengeluarkan kolesterol ekstra ke dalam empedu untuk menjaga kadar kolesterol tetap terkendali. Oleh karena itu, LDL yang dikenal banyak orang dengan kolesterol “jahat” sebenarnya belum tentu "jahat", jika jumlahnya berlebihan, hal ini yang baru akan menimbulkan masalah dan menyebabkan LDL menjadi koelsterol “jahat”. (Dipiro, et al., 2020).

e. Lipoprotein densitas tinggi (HDL, *High-Density Lipoprotein*)

HDL yakni lipoprotein kandungannya lebih banyak protein dibanding lipid. Oleh karena itu, HDL bertugas dalam mengambil sisa-sisa atau kelebihan kolesterol kemudian mengembalikannya ke hati.

HDL yang membawa kelebihan kolesterol tersebut kemudian akan berikatan dengan reseptor penerima (scavenger) di hati dan kira-kira tergantung jumlah kolesterol yang dibutuhkan, kemudian akan diproses ulang atau dikeluarkan dari tubuh (Dipiro, et al., 2020).

Tabel 1. Jenis lipoprotein dan kandungan lipid (Aman, et al., 2019)

Jenis Lipoprotein	Kandungan Lipid (%)		
	Trigliserida	Kolesterol	Fosfolipid
Kilomikron	80-95	2-7	3-9
VLDL	55-80	5-15	10-20
IDL	20-50	20-40	15-25
LDL	5-15	40-50	20-25
HDL	5-10	15-25	20-30

3. Metabolisme dan Transpor Lipid

Dua jalur yang terlibat dalam proses transfer asam lemak dalam darah: (1) jalur eksternal untuk transit trigliserida dan kolesterol yang diserap dari kolesterol jenuh di dinding usus, dan (2) jalur intrinsik dimana kolesterol dan trigliserida memasuki cairan dari hati serta struktur jaringan non-usus lainnya (Cox & García-Palmieri, 1990).

a. Jalur eksogen

Tingkat penyerapan kolesterol dan trigliserida dari makanan nabati memulai jalur eksternal. Pada akhirnya, triasilgliserol ditransfer ke sel otot dan adiposa sementara kolesterol ditransfer ke hati. Penyerapan,

kadar trigliserida, dan lipid diesterifikasi ulang dalam sel epitel usus di mana mereka bergabung dengan berbagai lapisan ganda fosfolipid yang mengandung kolesterol, berbagai kelas, dan lipoprotein untuk membuat partikel lipid seperti kilomikron.

Kilomikron disimpan ke dalam aliran darah usus, berjalan melalui sistem saluran toraks ke sistem darah, dan kemudian menempel pada endotelium di otot rangka dan jaringan adiposa. Interaksi kilomikron dengan lipolisis pada pengikatan diduga ini menghasilkan hidrogenasi pusat triasilgliserol dan pelepasan lemak bebas. Begitu berada di dalam sel endotel kapiler, asam lemak tersebut kemudian diangkut ke jaringan adiposa dan sel otot rangka, di mana keduanya disimpan atau dibakar.

Setelah inti trigliserida dihilangkan, partikel kilomikron yang tersisa akan terbentuk. Ini dibedakan dengan adanya apoprotein B, CIII, dan E dan merupakan ester serum yang meningkat. Dengan berinteraksi dengan reseptor yang ditemukan di bagian luar hati, sisa makanan ini dikeluarkan dari aliran darah. Sisa-sisa yang terikat kemudian diangkut oleh endositik ke permukaan bagian dalam sel-sel hati, di mana mereka dikatabolisme secara lisosom. Melalui prosedur ini, kolesterol dibebaskan dan diubah menjadi asam empedu untuk diekskresikan ke dalam empedu atau dimasukkan ke dalam lipoprotein yang dibuat di hati (VLDL).

Ion klorida, yang dapat memiliki tekstur halus, ditemukan dalam darah selama 1 sampai 5 jam setelah tertelan dalam keadaan fisiologis

normal. Setelah puasa 12 jam, mereka biasanya dikeluarkan dari aliran darah (Cox & García-Palmieri, 1990)

b. Jalur endogen

Trigliserida intrinsik yang diproduksi oleh hati disimpan ke dalam aliran darah di pusat partikel lipoprotein densitas rendah (VLDL), di mana trigliserida digunakan sebagai permukaan untuk sintesis trigliserida secara terus-menerus menggunakan lemak bebas dan karbohidrat. VLDL diproduksi dan disekresikan oleh sel dengan cara yang menyerupai ion klorida, kecuali bahwa apoprotein B yang berbeda (B-100 bukan B-48) bersama dengan apoprotein C dan E mengintervensi sekresinya.

Lipoprotein konsentrasi tinggi (IDL), yang merupakan partikel VLDL residual yang lebih kecil yang kaya akan kilomikron, diproduksi sebagai hasil dari peluang partikel VLDL untuk bersosialisasi dengan lipoprotein lipase di kapiler jaringan, yang menghidrolisis trigliserida inti dan melepaskan asam lemak bebas. Karena pengikatan sel hati yang kuat, kira-kira setengah dari sisa partikel ini dihilangkan dari aliran darah dalam waktu 2 sampai 6 jam. Limbah residu diubah dengan menghilangkan trigliserida akhir, menggantinya dengan ester kolesterol, dan menghilangkan semua apoprotein selain apoprotein B. Partikel VLDL residu diubah menjadi partikulat lipoprotein tereduksi (LDL) kaya kolesterol sebagai konsekuensi dari proses ini. Meskipun hanya menyusun sekitar 7% dari total kolesterol, partikel akhir ini pasti

mengandung sekitar 75% kadar kolesterol dalam sampel plasma. Tugas utama mereka adalah mengantarkan kolesterol ke jaringan yang memiliki tempat pengikatan LDL, seperti nefron, testis, sistem muskuloskeletal, limfosit, dan kelenjar adrenal. Awal yang tepat dianggap digunakan oleh jumlah kolesterol yang dikeluarkan dari LDL untuk mengatur metabolisme kolesterol dalam sel: (1) Kadar kolesterol LDL yang lebih tinggi menghambat produksi protease reduktase HMG-CoA, yang mengontrol pembentukan kolesterol subseluler. Peningkatan kolesterol LDL berpotensi meningkatkan jumlah kolesterol yang disimpan sel dengan mengaktifkan enzim tambahan, dan (3) kadar kolesterol yang lebih tinggi di dalam sel menghambat formulasi reseptor LDL melalui mekanisme umpan balik negatif.

Terdapat juga jalur yang disebut jalur sel pemulung/penerima. Jalur ini terdiri dari sel-sel dalam sistem retikuloendotelial yang melalui proses fagositosis, membuang kelebihan konsentrasi lipoprotein dalam plasma (Cox & García-Palmieri, 1990).

4. Kolesterol

a. Monografi Kolesterol

Nama : Kolesterol

Sinonim : Cholesterin, Cholesterolum

Rumus Kimia : $C_{27}H_{46}O$

BM : 386,67

Pemerian : Serbuk yang tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak stabil bila terkena cahaya.

Kelarutan : Diklorometana, asetonitril, dan minyak sayur dilarutkan. Secara praktis inert secara biologis dalam cairan, laju disolusinya meningkat dengan suhu udara dalam etanol, eter, n-heksana, dan metanol.

Titik Leleh : 147 - 150°C

Titik Didih : 360°C

Penyimpanan : Tempat ditutup keras juga jauh dari sinar

b. Pengertian kolesterol

Hati adalah situs utama biosintesis kolesterol tubuh, terhitung 80% dari asalnya, sedangkan sumber makanan menyumbang 20% sisanya. (Utama & Indasah, 2021). Ada banyak fungsi yang dimainkan kolesterol dalam mendukung sel sehat di dalam tubuh. Misalnya, dinding sel mengandung sejumlah besar kolesterol. Ini ada hubungannya dengan kelancaran membran dan konfigurasi sistemik. Perumusan vitamin D, hormon seks, dan hormon steroid; *androgen adrenal*, *aldosteron*, *kortisol*, semuanya menggunakan kolesterol sebagai sinyal kimiawi (misalnya testosteron, estrogen, dan progesteron). Garam empedu yang digunakan dalam metabolisme untuk membantu penyerapan nutrisi obesitas yang tidak sehat A, D, E, dan K juga mengandung kolesterol (Huff, Boyd, & Jialal, 2022).

Tubuh membutuhkan lemak sebagai nutrisi selain kebutuhan terhadap zat lain; protein, mineral karbohidrat, dan vitamin. Kolesterol adalah bahan kimia lemak. Lemak adalah sumber bahan bakar dan memiliki banyak kalori. Jumlah kolesterol yang benar adalah putih alami yang dihasilkan oleh tubuh, namun ada variabel nutrisi seperti lemak hewani, telur, dan makanan ringan yang dapat menyebabkan jumlahnya meningkat. Kondisi yang disebut aterosklerosis, yang dihasilkan dari penumpukan kelebihan kolesterol di dinding arteri, menyebabkan arteri menyempit atau mengeras. Penyakit jantung dan stroke adalah kondisi yang mendahului kejadiannya (Utama & Indasah, 2021).

c. Biosintesis kolesterol

Ada 5 fase dalam jalur biosintetik kolesterol: (1) Mevalonat terbuat dari asetil-KoA. (2) Dengan menghilangkan CO, mevalonat menciptakan unit isoprenoide. (3) Eugenol dibuat dengan kondensasi enam komponen isopentenil. (4) Siklisasi squalene menghasilkan lanosterol, steroid induk. (5) Kolesterol dibuat oleh lanosterol (Murray, Granner, & Rodwell, 2002).

d. Kadar Kolesterol

Tabel 2. Kadar Kolesterol Total (Dipiro, et al., 2020)

Kadar	Kategori
≤ 200 mg/dL	Diinginkan
200-239 mg/dL	Batas Kadar Tinggi
≥ 240 mg/dL	Tinggi

Kadar kolesterol pada orang dewasa yang mendekati 300 mg/dL memiliki resiko lebih dari 2x terkena serangan jantung (Utama & Indasah, 2021).

e. Hiperkolesterolemia dan Aterosklerosis

Kolesterol memiliki banyak peran terhadap fungsi sel, sementara itu, kolesterol juga dapat membahayakan tubuh jika kadarnya melebihi batas normal. Kadar kolesterol yang melebihi batas normal disebut dengan hiperkolesterolemia. Sedangkan hiperlipidemia merupakan meningkatnya level kolesterol entah meningkatnya jumlah trigliserida maupun tidak.

Salah satu faktor risiko utama untuk perkembangan lesi aterosklerotik adalah hiperkolesterolemia (kolesterol LDL tinggi). Orang yang menderita akan mengalami stroke jika keadaannya memburuk. Peningkatan konsentrasi lipoprotein densitas rendah (LDL) dalam darah adalah penyebab utama meningkatnya kemungkinan berkembangnya kelainan aterosklerotik. Selain itu, studi epidemiologi

telah menunjukkan korelasi antara risiko yang lebih rendah dan kadar lipoprotein densitas tinggi (HDL) darah yang lebih tinggi, tetapi studi obat terapi untuk meningkatkan kolesterol HDL tidak berpengaruh. Untuk alasan ini, menurunkan kadar LDL adalah tujuan utama perawatan pasien.

Cedera jaringan adalah langkah pertama dalam perkembangan atheromatous. Jumlah partikel LDL yang dapat masuk ke dinding arteri meningkat akibat glomerulosklerosis, yang menyebabkan disfungsi sel endotel. Struktur membran sel di intima kemudian dapat menjebak lipoprotein, terutama LDL, menyebabkan lipoprotein menumpuk di dinding pembuluh darah. Sel-sel busa terbentuk sebagai hasil dari modifikasi LDL dan serapan survivin monosit. Sel-sel dari otot polos mulai pindah ke abses karena lebih banyak lipid menumpuk di dalam endotelium vaskular. Ujungnya, penanda yang baru dibuat dikelilingi oleh sel-sel otot polos ini untuk membuat peringatan serat, yang melindungi hematoma dan menjaga agar pusat lipid tidak terungkap ke pembuluh darah perifer. Plak aterosklerotik dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, yang mengurangi aliran darah ke ekstremitas dan menyebabkan iskemia, atau, lebih sering, karena diskontinuitas lipid dan banyaknya fagosit (prasasti yang rentan), dapat menyebabkan pembekuan darah, yang secara efektif dapat memblokir sirkulasi darah. terjadi pada angina pectoris dan infark miokard akut) (Huff, Boyd, & Jialal, 2022).

f. Penyebab Kolesterol Tinggi

Kadar lipoprotein, terutama kolesterol LDL, akan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya usia. Pria memiliki kadar kolesterol lebih tinggi dibanding wanita pada keadaan normal, namun pasca menua jumlahnya mengalami peningkatan pada perempuan.

Penyebab lainnya menjadikan jumlahnya besar, yaitu:

- 1) Genetik atau riwayat keluarga dengan hiperlipidemia
- 2) Kelebihan berat badan atau obesitas
- 3) Konsumsi makanan tinggi lemak
- 4) Jarang melaksanakan olahraga
- 5) Konsumsi alkohol
- 6) Rokok
- 7) DM belum dikontrol bagus
- 8) Kelenjar tiroid tidak aktif (Utama & Indasah, 2021)

g. Pengukuran Kadar Kolesterol

Bahan kolesterol pola ujian dapat dipastikan dengan menggunakan berbagai teknik pengukuran, mulai dari yang sederhana hingga yang canggih. Kolesterol direspons oleh reaktan Lieberman-Burchard dalam satu teknik, yaitu teknik fotometer, yang kemudian ditemukan secara kolorimetri oleh spektrofotometer.

Reaksi Lieberman-Burchard adalah dasar penentuan kolesterol secara fotometri. Asam sitrat amonium dan asam sulfat akan merespons


dengan obat kolesterol dalam diklorometana untuk menghasilkan warna tertentu untuk senyawa tunggal.

D. Spektrofotometri Ultra Violet – Visible (UV-Vis)

Salah satu alat yang digunakan dalam pengujian laboratorium adalah spektrometer, yang dapat mengidentifikasi zat berdasarkan serapannya (Irawan, 2019). Spesimen dapat diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis dalam bentuk asap, hidrokarbon, atau obat. Rentang spektral daerah uv jauh adalah, sedangkan rentang spektral ultraviolet dekat adalah 200–400 nm. Dasar spektrofotometri UV-Vis adalah interaksi bahan organik dengan radiasi sinar UV dan lampu (Suhartati, 2012).

Partikel bermuatan ikatan dan lubang elektron dalam molekul organik adalah yang paling cepat merespons cahaya. Ketika cahaya menumbuk elektron-elektron tersebut, maka akan menyebabkan aktivasinya, yang ditangkap dalam bentuk rentang spektral dan disuarakan sebagai bilangan gelombang dan koefisien serapan (Suhartati, 2012). Konsentrasi zat terlarut dari dalam menentukan koefisien penyerapan cahaya yang diserap (Sastrohamidjojo, 2007).


Spektrometer soliter dan ganda adalah dua varietas utama. Dalam penilaian kuantitatif, soliter digunakan untuk mengukur koefisien penyerapan pada panjang gelombang tertentu. Soliter adalah perangkat sederhana dan murah. Tinggi gelombangnya pada instrument 190-210 nm untuk gelombang rendah juga 800-1000 nm untuk gelombang tinggi.



Gambar 1. Diagram Spektrofotometer UV-Vis Jenis Single-Beam

Pola difraksi, pantulan berbentuk V, akan menyebabkan perangkat sinar ganda menghasilkan dua sinar. Sinar pertama dan kedua akan melintasi sampel sebelum mencapai kosong. Frekuensi sinar ganda adalah 190–750 nm.

Cahaya terang warna-warni untuk sinar UV adalah bola lampu dinitrogen, sedangkan asal daerah tampak adalah lampu titanium. Sebuah vial dengan berbagai ukuran kaca atau batu alam berfungsi sebagai sel sampel. Tugas detektor adalah mengumpulkan cahaya yang dipancarkan spesimen dan mengubahnya menjadi muatan listrik (Suhartati, 2012).



Gambar 2. Skema Kerja Spektrofotometer UV-Vis Jenis Double-Beam

Spektrometer UV-Vis perlu disesuaikan sebelum digunakan. Presisi spektral, presisi fotometer, kerapatan piksel, kebocoran cairan pendingin halus, konsistensi garis dasar awal, garis dasar baru rata, dan presisi sensor semuanya termasuk dalam instrumentasi (Irawan, 2019)

E. Integrasi Keislaman

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman di dalam Al-Quran surah Ali-Imran (3) :
190

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِ الْأَلْبَابِ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.”
(Kemenag, 2019)

Pada ayat ini, Allah *Ta'ala* berfirman “*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi*”, yaitu pada semua hal yang mencakup dalam penciptaan keduanya berupa tinggi dan luasnya langit, kerendahan dan padatnya bumi, Dan tanda kuasa-Nya pada apa yang Dia cipta pada keduanya (langit dan bumi) yang indra manusia dapat menjangkaunya, baik berupa komet, daratan bintang-bintang, pepohonan, binatang-binatang, lautan, tumbuh-tumbuhan, pegunungan, barang tambang, buah-buahan, beragam warna, makanan dan jenis bebabtuan “*dan silih bergantinya malam dan siang*”. Semuanya merupakan ketetapan Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu

Allah berfirman bahwa dalam semua itu “*terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal*”, yaitu mereka yang mempunyai akal yang sempurna lagi bersih, yang mengetahui hakikat banyak hal secara jelas dan nyata (Abdullah & Ghoffar, 2019). Allah *Ta'ala* juga berfirman di dalam Surah Yusuf (12) : 105-106

وَكَايِنٌ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

Terjemahannya:

“Berapa banyak tanda-tanda (kebesaran Allah) di langit dan di bumi yang mereka lalui, tetapi mereka berpaling darinya” (Kemenag, 2019)

Pada dua ayat tersebut, terdapat dorongan kepada manusia untuk senantiasa berfikir dan tadabbur (merenungi) terhadap segala yang telah Allah ciptakan di langit maupun di bumi. Di ayat lain, pada surah Thaha (20) : 53 Allah *Ta'ala* berfirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahannya:

“(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan.” (Kemenag, 2019)

Maka diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan di bumi tumbuh-tumbuhan yang memiliki manfaat bagi manusia. Dengan melihat secara langsung melalui indra, manusia yang berakal dapat mengambil hikmah yang besar dan merenungi kekuasaan Allah *Ta'ala* atas hal tersebut, bagaimana mereka melihat tumbuh-tumbuhan tersebut yang awalnya berasal dari biji, kemudian tumbuh membesar lalu menghasilkan sesuatu untuk mereka manfaatkan, ini semua tentu menjadi pelajaran dan bahan tadabbur bagi manusia jika mereka ingin berfikir.

Penelitian lebih lanjut terhadap kandungan dan manfaat yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan, akan memberi manfaat bagi manusia secara umum dalam bidang penelitian dan kesehatan, dan yang paling utama dari hal tersebut adalah kita dapat mengambil banyak sekali hikmah dari apa yang Allah telah ciptakan, dan merenungi akan kekuasaan Allah atas hal tersebut sehingga bertambahlah keimanan kita kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*. Dari hasil penelitian, kita dapat mengetahui bahwa dalam satu bagian dari 1 jenis tumbuhan saja, memiliki banyak sekali senyawa kompleks di dalamnya, dan jika diteliti

senyawa tersebut memiliki banyak sekali manfaat bagi makhluk hidup. Maha Kuasa Allah atas segalanya.

Dorongan atas penelitian ini juga dilandasi dari firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam Al-Quran Surah Al-Maidah (5) : 32

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahannya:

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia” (Kemenag, 2019)

Oleh karena itu, penelitian ini sebagai salah satu usaha yang dilakukan dalam rangka mendukung kesehatan manusia dan memelihara kehidupannya, sehingga diharapkan termasuk dalam makna firman Allah *Ta'ala* pada ayat di atas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian laboratorium yang bersifat eksperimental dengan menggunakan instrumen Spektrofotometer-UV Vis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Laboratorium Kimia Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022 – Januari 2023

C. Sampel

Sampel pada penelitian ini yaitu batang tanaman parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) yang tumbuh di Malino.

D. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas

Variabel bebas pada penelitian ini adalah ekstrak etanol batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill).

2. Variabel terikat

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kadar kolesterol.

E. Alat dan Bahan

1. Alat

Gelas kimia (pyrex®), blender, gelas ukur (pyrex®), cawan porselin, toples, aluminium foil, kanula, batang pengaduk, lemari pengering, rotary evaporator (Heidolph®), pipet volume, tabung reaksi, kuvet, sentrifuge, timbangan analitik, spektrofotometer UV-Vis

2. Bahan

Aquadest, etanol 70%, batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill), pereaksi mayer, pereaksi dragendroff, serbuk logam Mg, bubuk kolesterol, kloroform, asetat anhidrat, asam sulfat terkonsentrasi.

F. Tahap Penelitian

1. Pengambilan Sampel

Sampel batang *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) berasal dari kota Malino

2. Pengolahan Sampel

Sampel berupa batang parang romang dilakukan pembersihan dengan air, lalu dikeringkan menggunakan lemari pengering. Sampel yang kering kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender lalu sampel kemudian ditutup rapat dalam wadah yang kering.

3. Ekstraksi Sampel

Cara maserasi digunakan dalam penelitian ini. Sampel batang parang romang yang telah dikeringkan dan dihaluskan dimasukkan kedalam tempat yang akan digunakan untuk maserasi. Pelarut etanol dengan konsentrasi

70% lalu dimasukkan sampai sampel seluruhnya terendam. Wadah yang digunakan dalam proses maserasi kemudian ditutup dan disimpan selama 3 hari dengan dilakukan pengadukan pada waktu tertentu. Hasil maserasi kemudian dilakukan penyaringan agar ampas dan filtrat dapat terpisah. Ampas kemudian disari ulang menggunakan menggunakan etanol 70%. Proses penyarian terus dilakukan hingga diperoleh filtrat jernih. Filtrat jernih lalu diproses di Rotary Evaporator agar menguap sehingga terpisah antara ekstrak simplisia dan pelarutnya. Ekstrak yang didapatkan kemudian ditimbang menggunakan neraca analitik.

4. Uji Kualitatif

a. Identifikasi Alkaloid

Ekstrak kental sebanyak 15 mg ditambahkan dengan 6 ml HCL 1% lalu diaduk di atas water bath selama 5 menit kemudian disaring. Hasil filtrat ditambahkan dengan pereaksi Dragendorff (Potasium Bismut Iodida) sebanyak 1 ml. Endapan merah jingga menunjukkan adanya senyawa alkaloid.

b. Identifikasi Flavonoid

Serbuk simplisia batang parang romang sebanyak 10 g dididihkan selama 5 menit kemudian masih dalam keadaan panas larutan disaring. Hasil penyaringan kemudian direaksikan dengan serbuk Magnesium (Mg) sebanyak 0,1 g, juga Asam Klorida (HCl) sebanyak 1 ml, dan Amil Alkohol sebanyak 2 ml. Hasil akhir warna merah/kuning/jingga menunjukkan adanya senyawa flavonoid.

c. Identifikasi Terpenoid

Identifikasi steroid dilakukan menggunakan uji Salkovski. Sebanyak 100 mg ekstrak sampel dikocok dengan 2 ml kloroform diikuti dengan penambahan 2 ml asam sulfat (H_2SO_4) yang dituang melalui sisi tabung. Warna antar muka coklat kemerahan menunjukkan adanya senyawa terpenoid.

5. Pembuatan Larutan Baku Kolesterol

Larutan induk kolesterol dibuat dengan konsentrasi 200 ppm yaitu dengan cara 100 mg bubuk kolesterol dilarutkan dalam 50 ml kloroform.

6. Penentuan Aktivitas Antikolesterol Ekstrak Etanol Batang Parang Romang

Larutan stok ekstrak etanol batang parang romang konsentrasi 100 ppm dibuat dengan melarutkan 5 mg ekstrak kental dalam 50 ml kloroform lalu dibuat 4 seri konsentrasi dari larutan induk 100 ppm dengan cara masing-masing diambil 0,5; 1; 1,5; dan 2 ml lalu dicukupkan volumenya masing-masing dengan kloroform hingga 2 ml. Sehingga konsentrasi masing-masing larutan sebesar 25, 50, 75, dan 100 ppm, Larutan lalu ditambahkan dengan 2 ml larutan baku kolesterol konsentrasi 200 ppm dalam kloroform. Larutan kemudian direaksikan dengan 2 ml asam asetat anhidrat dan 0,1 ml asam sulfat pekat. Larutan didiamkan selama operating time yaitu 15 menit di tempat gelap hingga terbentuk perubahan warna menjadi hijau. Hasil warna yang diperoleh kemudian dibaca dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum yaitu 668 nm.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstraksi Sampel Batang Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst.)

Guill)

Tabel 3. Hasil Ekstraksi Batang Parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill)

Sampel	Berat (%)	
	Ekstrak	Rendamen
230 g	5,601 g	2,435%

2. Hasil Uji Skrinning Fitokimia

Tabel 4. Hasil Uji Skrinning Fitokimia Batang Parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill)

Jenis Uji	Pereaksi	Hasil	Keterangan
Alkaloid	6 ml HCL 1% + 1 ml reagan Dragendorff (Potasium bismut iodida)	Jingga	Positif
Flavonoid	0,1 g serbuk Mg + 1 ml HCl + 2 ml Amil alkohol	Warna Kuning	Positif
Terpenoid	2 ml Kloroform + 2 ml H ₂ SO ₄	Warna antar muka coklat kemerahan	Positif

3. Hasil Uji Penurunan Kadar Kolesterol Ekstrak Etanol Batang Parang

Romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) secara *In-Vitro*

Tabel 5. Hasil Uji Aktivitas Antikolesterol Batang Parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) secara *In-Vitro*

Konsentrasi Sampel	Rata-rata Absorbansi Sampel	Absorbansi Baku (200 ppm)	(%) Penurunan
25 ppm	0,044	0,064	31,25%
50 ppm	0,044		31,25%
75 ppm	0,040		37,50%
100 ppm	0,040		37,50%

Perhitungan persentase penurunan kadar kolesterol:

$$A = \frac{C-B}{C} \times 100\%$$

Keterangan:

A = % Penurunan kolesterol

B = Absorbansi kolesterol baku + sampel

C = Absorbansi kolesterol baku

(Rahman, B, Ghosh, Pant, & G, 2014)

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya aktivitas antikolesterol dari ekstrak etanol batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) yang diuji secara *in-vitro*. Batang parang romang mengandung senyawa kimia diantaranya alkaloid, flavonoid, dan terpenoid. Menurut teori,


senyawa yang signifikan dapat menurunkan kolesterol adalah flavonoid. Metode ekstraksi yang digunakan adalah maserasi. Maserasi adalah metode ekstraksi cara dingin, dilakukan dengan merendam sampel dalam pelarut pada suhu kamar sehingga dapat meminimalisasi kerusakan atau degradasi metabolit. Metode ini digunakan karena senyawa kimia yang diinginkan pada batang parang romang, yaitu alkaloid dan flavonoid tidak tahan terhadap panas (Lantah, L, & A, 2017). (Rompas, Edy, & Yudistira, 2012).

Proses ekstraksi dilakukan dengan cara sampel kering simplisia disimpan dalam wadah tertutup dan dibiarkan mengalami kontak dengan etanol 70% sebagai pelarut pada suhu kamar selama minimal 3 hari disertai dengan pengadukan secara berulang. Hasil perendaman kemudian disaring, bagian ampas lalu dipress untuk didapatkan bagian cairnya. Bagian cair tersebut kemudian dijernihkan lagi dengan cara disaring atau dilakukan dekantasi (Hanani, 2014).

Etanol 70% digunakan sebagai pelarut karena dapat menyari secara total (Hanani, 2014). Etanol dapat menyari senyawa kimia lebih banyak dibanding dengan metanol dan air (Riwanti, Izazih, & Amaliyah, 2020). Etanol memiliki sifat inert, tidak beracun, stabil secara fisika dan kimia, memiliki absorbansi yang baik, dapat bercampur dengan air dengan segala perbandingan, serta kapang dan mikroba sulit tumbuh pada etanol dengan konsentrasi di atas 20%. Banyak zat aktif tumbuhan merupakan senyawa organik kompleks yang lebih mudah larut pada etanol dibanding air (Sulistiyani, 2011). Etanol yang dapat menghasilkan senyawa aktif yang optimal adalah etanol dengan konsentrasi 70%

(Voight, 1995). Larutan hasil ekstraksi kemudian diuapkan menggunakan *rotary vacuum evaporator* pada suhu 50°C sehingga didapatkan ekstrak kenral dan memperoleh rendamen ekstrak seperti pada tabel 2.


Dilakukan skrining fitokimia untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung pada tanaman sampel sehingga dapat diketahui apakah batang parang romang memiliki potensi sebagai antikolesterol. Pengujian pertama dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa flavonoid. Beberapa isoflavon menunjukkan aktivitas dalam menurunkan kadar kolesterol di dalam darah (Hanani, 2014). Pengujian senyawa flavonoid dilakukan dengan cara 10 gram serbuk simplisia dididihkan selama 5 menit lalu disaring dalam keadaan panas, hasil filtrat kemudian ditambahkan dengan 0,1 gram serbuk Magnesium (Mg), 1 ml Asam Sulfat (HCl) dan 2 ml Amil alcohol. Hasil yang terbentuk menunjukkan warna kuning. Warna merah/kuning/jingga yang terbentuk menunjukkan positif adanya flavonoid (Departemen Kesehatan RI, 1989).



Gambar 3. Reaksi Identifikasi Flavonoid

(Parbuntari, Prestica, Gunawan, Nurman, & Adella, 2018)


Identifikasi senyawa alkaloid dilakukan dengan uji Dragendorff. Larutan ekstrak batang parang romang direaksikan dengan reagen Dragendorff (Potasium bismuth iodide) sebanyak 1 ml. Hasil pengujian menunjukkan warna jingga. Pembentukan warna jingga kemerahan menandakan adanya alkaloid (Iqbal, Kamariah, Linda, & Lim, 2015).



Gambar 4. Reaksi Identifikasi Alkaloid

(Parbuntari, Prestica, Gunawan, Nurman, & Adella, 2018)

Identifikasi terhadap senyawa terpenoid/steroid dilakukan menggunakan uji Salkowski. Pengujian dilakukan dengan cara 100 mg ekstrak kental dikocok dengan 2 ml kloroform pada tabung reaksi lalu diikuti dengan penambahan 2 ml H₂SO₄ terkonsentrasi pada sisi tabung. Warna yang terbentuk pada pengujian adalah cokelat. Warna antarmuka cokelat kemerahan menunjukkan adanya terpenoid (Iqbal, Kamariah, Linda, & Lim, 2015).



Gambar 5. Reaksi Identifikasi Steroid/Terpenoid

(Parbuntari, Prestica, Gunawan, Nurman, & Adella, 2018)


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Lieberman-Burchard*. Metode *Lieberman-Burchard* adalah metode yang secara spesifik dapat mengidentifikasi kolesterol yang merupakan senyawa golongan steroid (Lindawati & Ningsih, 2020). Pada metode ini, digunakan pereaksi asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Penambahan asetat anhidrat berfungsi untuk memastikan media bebas air dan membentuk turunan asetil dari steroid. Sedangkan penambahan asam sulfat pekat berfungsi untuk menghasilkan warna hijau pada senyawa steroid, termasuk kolesterol (Ilyas, Rahmawati, & Widiastuti, 2020). Warna yang terbentuk kemudian diukur menggunakan *Spektrofotometer UV-Vis* untuk mendapatkan nilai absorbansi. Nilai absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat terkandung dalam larutan.

Larutan baku kolesterol dengan konsentrasi 200 ppm didapatkan dengan melarutkan 10 mg serbuk kolesterol murni dalam 50 ml kloroform karena kolesterol mudah larut dalam kloroform. Larutan kemudian direaksikan dengan 2 ml asetat anhidrat dan beberapa tetes asam sulfat pekat. Selama proses pengerjaan, kolesterol dibungkus dengan aluminium foil untuk menghindarkan dari cahaya karena kolesterol bersifat tidak stabil terhadap cahaya. Selanjutnya, larutan baku kolesterol yang telah direaksikan didiamkan selama operating time, atau waktu pengukuran yang stabil, yaitu 15 menit (Ilyas, Rahmawati, & Widiastuti, 2020) kemudian dilakukan pengukuran di *Spektrofotometer UV-Vis* pada panjang gelombang 668 nm (Anggraini & Ali, 2017). Hasil pengujian larutan baku dapat dilihat pada tabel 4, dimana absorbansi larutan baku kolesterol konsentrasi 200 ppm adalah 0,064.

Pengujian pada sampel ekstrak etanol batang parang romang dilakukan pada deret konsentrasi 25, 50, 75 dan 100 ppm dengan mengambil masing-masing 0,5, 1, 1,5 dan 2 ml dari larutan stok kemudian dicukupkan dengan kloroform hingga 2 ml. Dipilih konsentrasi sampel yang cukup rendah, untuk melihat apakah pada konsentrasi yang rendah, sampel tetap dapat memberi pengaruh terhadap hasil uji, dan dibuat deret dengan selisih 25 untuk melihat perbedaan hasil uji pada tiap konsentrasi. Masing-masing larutan uji kemudian ditambahkan 2 ml larutan baku kolesterol 200 ppm lalu direaksikan dengan 2 ml asetat anhidrat dan beberapa tetes asam sulfat pekat dan didiamkan selama *operating time*, yaitu 15 menit. Setelah waktu *operating time*, larutan kemudian diuji pada *Spektrofotometer UV-Vis* pada panjang gelombang 668 nm (Anggraini & Ali, 2017). Hasil absorbansi masing-masing larutan uji dan % penurunan kolesterol dapat dilihat pada tabel 4.

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa ekstrak etanol 25 dan 50 ppm dapat menurunkan kolesterol sebesar 31,25%, sedangkan ekstrak etanol 75 dan 100 ppm dapat menurunkan kolesterol sebesar 37,50%. Dapat dilihat bahwa konsentrasi sampel 25 ppm dan 50 ppm menunjukkan hasil absorbansi yang sama sehingga % penurunan kadar kolesterol juga tetap. Demikian pula antara konsentrasi sampel 75 ppm dan 100 ppm, keduanya juga menunjukkan absorbansi yang sama sehingga % penurunan kadar kolesterol juga tetap. Perbedaan hasil absorbansi terjadi ketika selisih konsentrasi adalah 50, yaitu antara 25 ppm dengan 75 ppm, dan 50 ppm dengan 100 ppm.

Penelitian secara *in-vitro* menggunakan spektrofotometer UV-Vis ini akan mengukur kolesterol bebas, bukan kolesterol yang terikat oleh flavonoid. Gugus keton pada flavonoid akan bereaksi dengan gugus hidroksil pada kolesterol membentuk hemiasetal. Gugus karbonil pada flavonoid akan bereaksi dengan gugus hidroksil pada kolesterol membentuk ikatan hidrogen (Moelok, 2006). Senyawa yang tidak terikat oleh flavonoid disebut dengan kolesterol bebas yang selanjutnya akan bereaksi dengan asetat anhidrat dan asam sulfat (Apriana, et al., 2022).



Gambar 6. Ikatan Kimia Antara Flavonoid Dan Kolesterol
(Moelok, 2006)

Pada asalnya, flavonoid dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah melalui penghambatan enzim HMG-CoA reduktase (Olivera, Ricardo, Almeida, & Costa, 2007). Dalam kajian pustaka oleh (Prameswari, Lestari, & Rusdi, 2021) terkait 'Metode Uji Aktivitas Hipolipidemik Secara In Vitro', dijelaskan bahwa kekurangan dari metode ini adalah hasil yang muncul tidak

spesifik, yaitu tidak menunjukkan salah satu metabolisme dari ekstrak. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dilakukan pengujian lebih lanjut menggunakan metode lain terhadap aktivitas antikolesterol batang parang romang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa ekstrak etanol batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) memiliki aktivitas antikolesterol secara *in-vitro*, dimana konsentrasi 75 dan 100 ppm menunjukkan % penurunan kadar kolesterol yang paling besar, yaitu 37,50%, sedangkan konsentrasi 25 ppm dan 50 ppm hanya dapat menurunkan kolesterol sebesar 31,25%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan untuk:

1. Dilakukan penelitian uji aktivitas antikolesterol batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) secara *in-vitro* dengan menggunakan media sel (adiposit 3T3-L1, Caco-2, HepG2, dan HuH7), atau menggunakan enzim (kolesterol esterase, pankreas lipase, dan HMG-CoA reduktase).
2. Dilakukan penelitian uji aktivitas antikolesterol batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) secara *in-vivo*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Abdullah, & Ghoffar, M. A. (2019). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Ima Syafi'i.
- Ahmed, S., Shah, P., & Ahmed, O. (2022). *Biochemistry, Lipids*. STAT Pearls.
- AlBaihaqi, A., & Levita, J. (2021). EFFICACY AND SAFETY OF HERBAL MEDICINES IN ASIA. *Jurnal Ilmiah Farmako Bahari*, 171.
- Aman, A. M., Soewondo, P., Soelistijo, S. A., Arsana, P. M., Wismandari, Zufry, H., & Rosandi, R. (2019). *Pedoman Pengelolaan Dislipidemia di Indonesia*. PB PERKENI.
- Anggraini, D. I., & Ali, M. M. (2017). Uji Aktivitas Antikolesterol Ekstrak Etanol Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten) Steenis) SECARA IN VITRO. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 4.
- Apriana, M., S, T. R., Huda, M. C., Kamal, Z. M., R, K., Allahuddin, S. R., . . . Fera, A. (2022). Pengobatan Penyakit Kolesterol dengan Menggunakan Ekstrak Herbal di Indonesia - A Review. *Jurnal Buana Farma: Jurnal Ilmiah Farmasi*, Vol. 2, No. 2, 19-32.
- Arrington, L. (1972). *Introduction to Laboratory Animal Science: The Breeding, Care and Management of Experimental Animals*. Danville (US): The Interstate Printers and Publishers Inc.
- Arsul, M. I., Insanu, M., & Fidranny, I. (2021). Phytochemistry and Pharmacological Activities of Boehmeria Genus: An Update Review. *Review Article; A Multifaceted Journal in the field of Natural Products and Pharmacognosy*, 1533.
- Artha, C., Mustika, A., & Sulistyawati, S. W. (2017). Pengaruh Ekstrak Daun Singawalang terhadap Kadar LDL Tikus Putih Jantan Hiperkolesterolemia. *eJKI Vol. 5, No. 2*, 106.
- As-Sa'di, A. N. (2018). *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Indonesia: Darul Haq.
- Basyir, H., Haidar, H., Muslim, M., & Ismai'il, A. A. (2016). *at-Tafsir al-Muyassar*. Jakarta: Darul Haq.
- Cox, R. A., & García-Palmieri, R. M. (1990). *Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations*. 3rd edition. Boston: Butterworths.
- Departemen Kesehatan RI. (1989). *Materia Media Indonesia Jilid V*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Dipiro, J. T., Yee, G. C., L, P. M., Haines, S. T., D, N. T., & Ellingrod, V. (2020). *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach Eleventh Edition*. McGraw Hill.
- Drescher, S., & van, H. P. (2020). Review The Phospholipid Research Center: Current Research in Phospholipids and Their Use in Drug Delivery The Phospholipid Research Center: Current Research in Phospholipids and Their Use in Drug Delivery . *MDPI Journal Pharmaceutics*.
- Endarini, L. H. (2016). *Farmakognosi dan Fitokimia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Erni, Mu'nisa, A., & Arsal, A. F. (2014). Pengaruh Pemberian Minyak Mandar yang Ditambahkan Bubuk Daun Sukun (*Arthocarpus altilis*) terhadap Kadar

- Kolesterol Mencit (*Mus musculus*). *Jurnal Bionature*, Volume 15, Nomor 2, 95.
- Fahy, E., Cotter, D., Sud, M., & Subramaniam, S. (2022). Lipid classification, structures and tools. *National Institut of Health Public Access. Biochim Biophys Acta*, 1.
- Hanani, E. (2014). *Analisi Fitokimia*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Hariadini, A. L., Sidharta, B., Ebtavanny, T. G., & Minanga, E. P. (2020). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Ketepatan Penggunaan Obat Simvastatin pada Pasien Hiperkolesterolemia di Apotek Kota Malang. *Pharmaceutical Journal of Indonesia*, 91-96.
- Hidayah, N., Hisan, A. K., Solikin, A., Irawati, & Mustikaningtyas, D. (2016). Uji Efektivitas Ekstrak *Sargassum muticum* Sebagai Alternatif Obat Bisul Akibat Aktivitas *Staphylococcus aureus*. *Journal of Creativity Students 1 (1)*, 2.
- Huff, T., Boyd, B., & Jialal, I. (2022). *Physiology, Cholesterol*. STAT Pearls. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470561/>
- Ilyas, N. A., Rahmawati, & Widiastuti, H. (2020). Uji Aktivitas Antikolesterol Ekstrak Etanol Daun Gedi (*Abelmoschus Manihot* (L.) Medik) Secara In Vitro. *Jurnal Kesehatan Vol. 3*, 62.
- Iqbal, E., Kamariah, A. S., Linda, B. L., & Lim. (2015). Phytochemical screening, total phenolics and antioxidant activities of bark and leaf extracts of *Goniothalamus velutinus* (Airy Shaw) from Brunei Darussalam. *Journal of King Saud University - Science*, 226.
- Irawan, A. (2019). Kalibrasi Spektrofotometer sebagai Penjamin Mutu Hasil Pengukuran dalam Kegiatan Penelitian dan Pengujian. *Indonesian Journal of Laboratory*, 1-9.
- Jiang, J., Caie, W., Chengcheng, Z., Jianxin, Z., Leilei, Y., Hao, Z., . . . Qixiao, Z. (2020). Effects of probiotic supplementation on cardiovascular risk factors in hypercholesterolemia: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trial. *Journal of Functional Foods* 74, 1.
- Julianto, T. S. (2019). *Fitokimia, Tinjauan Metabolit Sekunder dan Skrining Fitokimia*. Universitas Islam Indonesia.
- Kartika, A. A., Siregar, H. C., & Fuah, A. M. (2013). STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA TERNAK TIKUS (*Rattus norvegicus*) DAN MENCIT (*Mus musculus*) DI FAKULTAS PETERNAKAN IPB. *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, 148.
- Katzung. (2002). *Farmakologi Dasar dan Klinik Buku 2, Edisi 8*. Jakarta: Salemba Medica.
- Kemenag. (2022). *quran.kemenag*. Retrieved from surah 26 asy-syuara': <https://quran.kemenag.go.id/sura/26>
- Kemenkes RI. (2020). *Farmakope Indonesia Edisi VI*. Jakarta.
- Lajuck, P. [, & 2012. (2012). *Ekstrak daun salam (I) lebih efektif menurunkan kadar kolesterol total dan LDL dibandingkan statin pada penderita dislipidemia*. Denpasar: Udayana.

- Lantah, P. L., L, A. D., & A, R. R. (2017). Kandungan Fitokimia dan Kandungan Antikoksidan Ekstrak Metanol Rumput Laut *Kappaphycus alvarezii*. *Jurnal Media Teknologi Hasil Perikanan*, 5, 3.
- Lee, H.-J., Kim, A.-R., & Lee, J.-J. (2014). Effects of Ramie Leaf Extract on Blood Glucose and Lipid Metabolism in db/db Mice. *Journal Korean Soc Appl Biol Chem*, 639.
- Lee, Y., J, W., & Siddiqui. (2021). *Cholesterol Levels*. STAT Pearls.
- Lim. (2009). *Farmakologi Kardiovaskuler*. Jakarta: PT Sofmedia.
- Lindawati, N. Y., & Ningsih, D. W. (2020). Aktivitas Antikolesterol Ekstrak Etanol Buah Kiwi Hijau (*Actinidia deliciosa*). *Jurnal Ilmiah Manuntung*, 6(2), 183-191.
- Lukman, M., Wahyuddin, E., Subehan, & Manggau, M. A. (2014). Cytotoxic effect of four Makassarese medicinal plants on human cervical cell lines and its selectivity. *J. Chem. Pharm. Res.*, 854.
- Mochammad, A. R., & Meiyanti. (2021). Pemanfaatan Obat Tradisional di Indonesia; Distribusi dan Faktor Demografis yang Berpengaruh. *Jurnal Biomedika dan Kesehatan Vo.4 No.3*, 131.
- Moelok, F. A. (2006). Herbal and traditional national perspectives and policies in indonesia. *Jurnal Bahan Alam Indonesia*.
- Murray, R. K., Granner, D. K., & Rodwel, V. W. (2002). *Biokimia Harper*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Olivera, T., Ricardo, K., Almeida, M., & Costa, M. (2007). Hypolipidemic Effect of Flavonoids and Cholestyramine in Rats Tania. *Latin American Journal of Pharmacy*, 10.
- Pagana, K. D., Pagana, T. J., & Pagana, T. N. (2015). *Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference*. Elsevier.
- Paramitha, A. T. (2017). *Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Akar Parang Romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) terhadap Penurunan Kolesterol pada Mencit (Mus musculus)*. Makassar: Repository UIN Alauddin Makassar.
- Parbuntari, H., Prestica, Y., Gunawan, R., Nurman, M. N., & Adella, F. (2018). Preliminary Phytochemical Screening (Qualitative Analysis) of Cacao Leaves (*Theobroma Cacao L.*). *Eksakta Vol.19*, 42.
- Prameswari, I., Lestari, F., & Rusdi, B. (2021). Kajian Pustaka Metode Uji Aktivitas Hipolipidemik secara In Vitro. *Jurnal Farmasi*, 231.
- Rahman, H., B, V., Ghosh, S., Pant, G., & G, S. (2014). In vitro studies on antioxidant, hypolipidemic and cytotoxic potential of *Parmelia perlata*. *Americal Journal of Life Sciences*, 8.
- Rejeki, P. S., Putri, E. A., & Prasetya, R. E. (2018). *Ovariectomi pada Tikus dan Mencit*. Surabaya: Ariangga University Press.
- Riwanti, P., Izazih, F., & Amaliyah. (2020). Etanol merupakan pelarut yang dapat menyari lebih banyak senyawa kimia lebih banyak dibanding metanol dan air. *Journal of Pharmaceutical Care Anwar Medika*, 84.
- Rompas, R. A., Edy, H. J., & Yudistira, A. (2012). Isolasi dan Identifikasi Flavonoid dalam Daun Lamun (*Syringodium osetifolium*). *Pharmacon*, 61.
- Ruel, G., Pomerleau, S., Couture, P., Lemieux, S., Lamarche, B., & Couillard, C. (2006). Favourable impact of low-calorie cranberry juice consumption on


- plasma HDL-cholesterol concentrations in men. *Journal of Nutrition Volume 96*, 357-364.
- Rusdi, M., Arsul, M. I., & Kartikasari, N. P. (2021). Antituberculosis Activity of Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) Stem Extract. *Ad-Dawaa' Journal of Pharmaceutical Sciences*, 30.
- Rusdi, M., Hasan, T., Ardillah, & Evianti. (2018). Perbandingan Metode Ekstraksi terhadap Kadar Flavonoid Total dan Aktivitas Antioksidan Batang *Boehmeria virgata*. *ad-Dawaa' Jour.Pharm.Sci. Vol. 1 No. 1*, 17.
- Rusdi, M., Jannah, J., Noer, S. F., & Bariun, H. (2017). Uji Efek Hipoglikemik Ekstrak Etanol Batang Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) terhadap Mencit (*Mus musculus*) JANTAN. *JF FIK UINAM Vol.5 No.1*.
- Rusdi, M., Mukhriani, & Paramitha, A. T. (2018). Uji Penurunan Kolesterol pada Mencit (*Mus musculus*) Secara In-Vivo Menggunakan Ekstrak Etanol Akar Parang Romang. *JF FIK UINAM Vol.6 No.1*.
- Rusdi, M., Mukhriani, & Ramadhani, R. (2018). Aktivitas Ekstrak Etanol Akar Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) Terhadap Pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*. *JF FIK UINAM Vol.6 No.2*, 113.
- Saidin, M. (1999/2000). Kandungan Kolesterol dalam Berbagai Bahan Makanan Hewani. *Buletin Penelitian Kesehatan 27 (2)*, 224-230.
- Santi, N. L., Wiadnya, I. B., & Dewi, L. B. (2019). Analisis Kadar Trigliserida pada Pelari Berdasarkan Jenis Lari yang dilakukan. *Jurnal Analis Medika Bio Sains*.
- Santika, I. G. (2016). Pengukuran Tingkat Kadar Lemak Tubuh melalui Jogging Selama 30 Menit Mahasiswa Putra Semester IV FPOK IKIP PGRI Bali Tahun 2016. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi Volume 1*, 89-98.
- Sartika, R. A. (2008). Pengaruh Asam Lemak Jenuh, Tidak Jenuh dan Asam Lemak Trans terhadap Kesehatan . *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 2, No. 4*.
- Schuler, L. (2006). *Model animals and quantitative genetics*. Bogor (ID): Fakultas Peternakan IPB.
- Septianingsih, E. (2008). *Efek Penyembuhan Luka Bakar Ekstrak Etanol 70% Daun Pepaya (Carica papaya L.) dalam Sediaan Gel pada Kulit Punggung Kelinci New Zaeland*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suhartati, T. (2012). *Dasar-dasar Spektrofotometri UV-Vis dan Spektrofotometri Massa untuk Penentuan Struktur Senyawa Organik*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Sulistiyani, N. (2011). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Batang Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* serta Skrining Fitokimia. 40.
- Susanti, A. D., Ardiana, D., P, G. G., & G, Y. B. (2012). Polaritas Pelarut Sebagai Pertimbangan dalam Pemilihan Pelarut untuk Ekstraksi Minyak Bekatul dari Bekatul Varietas Ketan (*Oriza sativa glatinosa*). *Simposium Nasional RAPI XI FT UMS*, 10.
- Sutejo, I. R., Nurqistan, H. D., Rasyada, I., Nyoman, Y. N., Yuniar, A., & Ramadhani, R. (2016). Kandungan Fitoestrogen Ekstrak Etanolik Akar

- Rami (*Boehmeria nivea*) Menurunkan Kadar Kolesterol Tikus yang yang Diovariaktomi. *NurseLine Journal Vol.1 No.1*.
- Suzuki, H., Nunome, M., Kinoshita, G., Aplin, K., Vogel, P., Kryukov, A., . . . Moriwaki, K. (2013). Evolutionary and dispersal history of Eurasian house mice *Mus musculus* clarified by more extensive geographic sampling of mitochondrial DNA. *Heredity*.
- Tanu. (2012). *Farmakologi dan Terapi*. Jakarta: FK UI.
- Utama, R. D., & Indasah. (2021). *Kolesterol dan Penanganannya*. Kediri: Strada Press.
- Voight. (1995). *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Waluyo, E. (2005). *Hasil Identifikasi/Determinasi Tumbuhan*. Bogor: Pusat Penelitian.
- Wardihan, Rusdi, M., Alam, G., Lukman, & Manggau, M. A. (2013). Selective Cytotoxicity Evaluation in Anticancer Drug Screening of *Boehmeria virgata* (Forst) Guill Leaves to Several Human Cell Lines: HeLa, WiDr, T47D and Vero. *Dhaka Univ. J. Pharm. Sci. 12(2)*: 87-90, 90.
- Warditiani, N. K., Indrani, A. A., Sari, N. A., Swasti, I. A., Dewi, N. P., K, W. I., & Wirasuta, I. M. (n.d.). Pengaruh Pemberian Fraksi Terpenoid Daun Katuk (*Sauropus androgynus* (L.) MERR) terhadap Profil Lipid Tikus Putih (*Rattus novergicus* L.) Jantan Galur Wistar yang diinduksi Pakan Kaya Lemak. *Jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana*, 70.
- Wilmot-Dear, C. M., & Friis, I. (2013). The old World species of *Boehmeria* (Urticaceae, tribus Boehmerieae). A taxonomic revision. *Research Article Blumea – Volume 58 / 2*, 147.
- Wilson, I. D., Cooke, M., Poole, C. F., & Adlard, E. R. (2000). *Encyclopedia of Separation Science*. Academic Press.
- World Health Organization. (2021). *Cardiovascular Diseases (CVDs)*. Retrieved from [https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))
- Zulviana, E., Rahman, N., & Supriadi. (2017). Pengaruh Pemberian Ekstrak Buah Kelor (*Moringa oleifera*) Terhadap Penurunan Kolesterol pada Darah Hewan Mencit (*Mus musculus*). *Jurnal Akademika Kimia Volume 6, No. 1*, 15.


LAMPIRAN

Skema Kerja


A. Proses Ekstraksi Sampel



B. Skrinning Fitokimia



C. Pengukuran Aktivitas Antikolesterol secara *In-Vitro*



D. Gambar

1) Tumbuhan Parang Romang



Tumbuhan lengkap



Daun



Batang yang sudah dibersihkan

2) Proses Ekstraksi Batang Parang Romang



Proses pengeringan di lemari pengering



Proses maserasi



Hasil filtrat



Proses Evaporasi




Ekstrak (kental) etanol batang parang romang

3) Skinning Fitokimia

- Alkaloid




- Flavonoid




- Terpenoid




4) Pengujian Aktivitas Antikolesterol Secara *In-Vitro*




Sampel + Asetat Anhidrat + Asam Sulfat




Absorbansi sampel




Absorbansi sampel 25 ppm



Absorbansi sampel 50 ppm



Absorbansi sampel 75 ppm



Absorbansi sampel 100 ppm

