


FORMULASI SEDIAAN TRANSDERMAL

(sistem vesikel dan *patch*)



Isriany Ismail, S.Si.,M.Si.,Apt



ISRIANY ISMAIL

FORMULASI SEDIAAN
TRANSDERMAL
(Sistem Vesikel dan *Patch*)

ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

**FORMULASI SEDIAAN TRANSDERMAL
(Sistem Vesikel dan Patch)**

Penulis:
ISRIANY ISMAIL

Editor:
SURYA NINGSI

Cetakan: I 2012
x - 192 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978 602 237 304 9

Alauddin University Press
Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa

SAMBUTAN REKTOR

*Tidakkah engkau malu pergi ke laut, sementara pulang hanya membawa sekendi air, padahal di dalam laut terdapat begitu banyak mutiara yang terpendam... demikian nasihat puitis Jalauddin Rumi dalam buku *The Sufi Book of Life*.*

Syair inspiratif ini memberikan dorongan bagi siapa saja yang mengabdikan dirinya di dunia pendidikan apalagi di perguruan tinggi untuk menghasilkan dan melahirkan karya-karya akademik yang dapat memberikan pencerahan kepada siapapun. Sebuah ironi, jika orang-orang yang bergelut di dunia perguruan tinggi, ternyata hanya membawa sekendi "air" pengetahuan untuk mengobati dahaga masyarakat, padahal begitu banyak mutiara yang terpendam di dalamnya yang dapat memberi "sinar" kehidupan. Atas dasar inilah, ikhtiar untuk menjadikan kampus UIN Alauddin sebagai kampus peradaban harus terus digulirkan, sebab hanya kampus yang menjadikan orientasi "Peradaban" sebagai basis aktivitas dan tradisi keilmuannya yang akan mampu membawa semangat perubahan di tengah masyarakat menuju masyarakat madani.

Kampus peradaban yang dicita-citakan hanya bisa terwujud jika pengembangan kultur dan *mindset* akademik lebih relevan dengan suasana dan wadah yang bernama universitas Islam. Sebaliknya, jika orientasi peradaban hanya sebatas jargon dan simbol, maka status "universitas" dan "Islam" akan menjadi beban bagi kita maupun masyarakat. Di satu sisi, UIN akan menjadi universitas pinggiran, sementara di sisi lain, karakter keislaman menjadi hilang. Karena itu,

diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk mengawal UIN Alauddin mencapai visi dan misinya untuk menjadi *world class university* yang berperadaban.

Untuk mencapai visi itu, maka program GSB (Gerakan Seribu Buku) ini menjadi salah satu langkah strategis memacu sivitas akademika untuk tidak sekadar meneguk "air" pengetahuan di perguruan tinggi, tetapi dapat membawa ribuan bahkan jutaan kendi "air dan mutiara" pengetahuan ke tengah masyarakat. Orang bijak berkata "*Buku adalah pengusung peradaban, tanpa buku sejarah menjadi sunyi, ilmu pengetahuan menjadi mati, dan kehidupan bisa kehilangan arti.*"

Oleh karena itu, saya sangat bersyukur kepada Allah swt, atas terselenggaranya program GSB ini, baik tahun I maupun tahun II. Program GSB telah membuktikan kepada publik bahwa UIN Alauddin memiliki kekuatan dan potensi yang cukup besar untuk mewujudkan dan menghantarkan kampus ini menuju kampus peradaban melalui maha karya para civitas akademika. Melalui program GSB ini, potensi sumber daya UIN Alauddin akan terus digali, diapresiasi dan dihargai sehingga melahirkan kreasi, ide dan prestasi.

Selaku Rektor, saya senantiasa berharap agar *tagline* "Peradaban" yang selama ini digulirkan harus menjadi visi dan misi bersama yang tertanam dalam sebuah bingkai kesadaran kolektif bagi seluruh sivitas akademik untuk mewujudkan UIN Alauddin sebagai universitas yang kompetitif dan berkarakter. Untuk itu, tiga agenda besar; *pencerdasan, pencerahan* dan *prestasi* harus menjadi fokus perhatian utama bagi sivitas akademika UIN Alauddin. Ketiga agenda ini dirancang sebagai sebuah strategi untuk menjadikan UIN Alauddin lebih terbuka, dan menjadi pusat kepeloporan

pengembangan nilai dan akhlak serta keunggulan akademik-intelektual yang dipadukan dengan pengembangan teknologi untuk membangun sebuah masyarakat yang berperadaban.

Akhirnya, perkenankan saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya dalam menghasilkan karya akademik ini. Semoga gagasan yang dituangkan di dalam buku ini mampu menjadi "air" penyejuk dan pengobat dahaga bagi masyarakat yang haus akan pencerahan, dan dapat menjadi "mutiara" yang memberikan cahaya bagi peradaban.

Samata, 1 Nopember 2012
Rektor

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, MS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala puji bagi Allah swt, atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku ini dapat terselesaikan. Salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Saat ini ilmu farmasi berkembang sangat pesat, termasuk bidang teknologi sediaan, khususnya mengenai sistem penghantaran obat (*Drugs Delivery System*). Desain sediaan dalam system penghantaran obat telah berkembang di banyak negara, dan menjadi fokus penelitian teknologi sediaan farmasi hampir tiga dekade terakhir mengingat banyaknya kelebihan yang ditawarkan oleh sistem ini terutama dari segi efisiensi, efikasi molekul obat. Beberapa sediaan diantaranya telah dijual di pasaran.

Buku ini disusun untuk memperkenalkan kepada mahasiswa farmasi khususnya di wilayah timur Indonesia tentang keberadaan teknologi ini dan membantunya dalam melakukan penelitian terkait sistem penghantaran obat. Buku ini membahas tentang sistem penghantaran obat transdermal yang merupakan salah satu sistem penghantaran obat yang saat ini banyak dibahas untuk dikembangkan dalam aplikasinya. Sistem penghantaran obat transdermal yang dibahas dalam buku ini untuk sementara adalah jenis vesikel (liposom, niosom, etosom, dan transferosom) dan *patch*. Pembahasan menyangkut struktur kulit sebagai barrier, bagaimana mengurangi sifat barrier untuk meningkatkan penetrasi obat, susunan sistem penghantar obat, karakterisasi, evaluasi, dan sifat

permeasinya, serta perkembangan sistem penghantaran obat transdermal.

Dibalik keinginan penulis dalam menyiapkan buku yang membantu dalam memperoleh bacaan tentang sistem penghantaran obat transdermal, penulis menyadari pula bahwa buku ini masih belum lengkap dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membantu kesempurnaan buku ini. Semoga dalam penerbitan berikutnya penulis dapat menyajikan buku teknologi farmasi dengan isi yang lebih lengkap dan lebih variatif.

Makassar, September 2012

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	1
II. KULIT	9
A. Anatomi dan Fisiologi Kulit Manusia	9
B. Absorpsi Perkulatan	18
C. Difusi Molekul dan Hukum Fick	23
III PRINSIP FORMULASI SEDIAAN TRANSDERMAL	31
A. Penetrasi Senyawa Obat Melalui Kulit	32
B. Peningkat Penetrasi (<i>penetration enhancer</i>) ..	40
Jenis Bahan Peningkat Penetrasi	44
Pemilihan Jenis Bahan Peningkat Penetrasi	64
C. Pertimbangan Formulasi Sediaan Transdermal	66
IV SISTEM PENGHANTARAN OBAT TRANSDERMAL (<i>Transdermal Drug Delivery System</i>)	71
A. <i>Vesicle Drugs Delivery System</i>	72
Formasi dan Sifat Asam Lemak	74
Jenis-jenis vesikel	77
Liposom	77
Niosom	90
Ethosom	93

Transferosom	99
B. Pembuatan Vesikel dan Optimasi	
Formula	107
Pembuatan liposome	107
Pembuatan niosom	115
Pembuatan <i>Ethosome</i>	117
Pembuatan Transferosom	120
C. Karakteristik vesikel	124
D. Stabilitas Vesikel	127
E. Mekanisme Penghantaran obat	130
Mekanisme Penetrasi Liposom dan	
<i>Niosom</i>	130
Mekanisme Penetrasi <i>Ethosome</i>	131
Mekanisme Penetrasi Perkutan	
Transferosom	132
F. <i>Pacth</i>	134
Komponen penyusun <i>Patch</i>	134
Tipe <i>Patch</i> Transdermal	142
Metode Pembuatan <i>Patch</i>	148
Evaluasi <i>Patch</i>	152
Mekanisme Pelepasan Obat	158
V PERKEMBANGAN SEDIAAN	
TRANSDERMAL	159
A. Pertimbangan Pemilihan Senyawa Obat	159
B. Kemajuan dalam Formulasi Sediaan	
Transdermal	163
PUSTAKA	179
BIODATA PENULIS	191

I

PENDAHULUAN

Penelitian dalam bidang farmasi saat ini difokuskan pada upaya untuk meningkatkan efektifitas molekul fungsional yang digunakan dalam pengobatan, melalui peningkatan disolusi untuk sediaan oral dan peningkatan permeabilitas pada membran *lipid bilayer*, yang secara keseluruhan mengarah kepada perbaikan bioavailabilitas dari bahan aktif dengan efek samping dan toksisitas sistemik seminimal mungkin.

Senyawa obat digolongkan ke dalam tiga kelas menurut sistem klasifikasi biofarmaseutik (*Biopharmaceutics Classification System; BCS*), yaitu (Anonim, 2000:4):

- Kelas I : senyawa obat dengan kelarutan tinggi dan permeabilitas yang tinggi
- Kelas II : senyawa obat dengan kelarutan rendah dan permeabilitas yang tinggi
- Kelas III : senyawa obat dengan kelarutan tinggi dan permeabilitas yang rendah

Masing-masing senyawa obat dengan kelas biofarmaseutik tersebut memiliki masalah dalam

beberapa rute pemberiannya. Senyawa obat yang tergolong dalam BCS kelas 2 dan 3 selalu menjadi fokus dalam pertimbangan formulasi bentuk sediaan dan pemilihan rute pemberian. Senyawa obat dalam kelas tersebut menimbulkan masalah dalam pemberian oral.

Bioavailabilitas menjadi salah satu parameter efektifitas dan efisiensi penggunaan obat. Bioavailabilitas ditentukan oleh kemampuan obat terabsorpsi hingga sirkulasi sistemik. Tahapan paling lambat dalam proses absorpsi obat (*rate limiting step*) menjadi penentu dalam kecepatan absorpsi senyawa obat melintasi membran saluran cerna menuju sirkulasi sistemik. Jika senyawa obat mudah larut tetapi permeabilitasnya rendah, maka permeabilitas menjadi tahap penentu kecepatan absorpsi, sebaliknya jika kelarutan yang rendah, maka tahap pelarutan yang menentukan kecepatan absorpsi. Oleh karena itu, tahap ini menjadi perhatian utama dalam merancang sediaan farmasi untuk meningkatkan kecepatan absorpsi obat.

Absorpsi obat berkaitan dengan bioavailabilitas dan kecepatan timbulnya efek terapi. Untuk memperbaiki kelemahan ini, maka diperlukan suatu sistem pembawa yang cocok yang menjamin molekul fungsional dapat mencapai sisi target untuk dapat menimbulkan efek yang optimal tanpa dipengaruhi oleh kelarutan dan permeabilitas senyawa obatnya (Blazek, et al, 2001, Mahdi, dkk, 2004, Gupta, et.al, 2007). Suatu pendekatan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengembangkan suatu sistem penghantaran obat (*Drugs delivery System; DDS*).

Lebih dari tiga dekade terakhir, terjadi kemajuan yang signifikan terhadap teknologi penghantaran obat (*drugs delivery*). Senyawa obat yang dahulu diformulasi

secara konvensional dengan banyak kelemahan dari segi farmakokinetik dan biofarmasi, saat ini telah diformulasi dengan teknologi DDS. Obat yang dirancang dengan suatu sistem penghantar dapat diberikan pada semua rute pemberian dan merubah farmakokinetik senyawa obat dari sediaan konvensional. Kenyamanan juga ditawarkan dengan penggunaan teknologi ini, dengan berkembangnya sistem penghantaran obat melalui kulit, yang dikenal dengan istilah *Transdermal Drugs Delivery System*.

Transdermal Drugs Delivery System penerapannya telah dipertimbangkan selama lebih dari 2 atau 3 dekade karena kelebihannya, antara lain lebih aman dan nyaman. Dibanding bentuk sediaan konvensional, senyawa obat yang dirancang dalam sistem penghantaran transdermal akan terhindar dari *first pass hepatic metabolism*, dapat diprediksi dan durasi aktifitasnya dapat dipertahankan lebih lama, meminimalkan efek samping yang tidak diinginkan, meningkatkan keterpakaian senyawa obat dengan waktu paruh singkat, meningkatkan respon fisiologi dan farmakologi, terhindar dari kadar obat yang fluktuatif, dan lebih penting lagi, meningkatkan kenyamanan pasien dalam penggunaannya (Walve, J.R, 2011)

Sistem penghantaran obat transdermal dapat diformulasi dengan menggunakan vesikel (liposom, niosom, ethosom, transferosom, dan lain-lain), atau memformulasi senyawa obat dalam bentuk sediaan konvensional (gel atau emulsi) dengan tambahan peningkat penetrasi (*penetration enhancer*), teknologi matriks *patch*, atau teknologi *Self Emulsifying Drugs Delivery System* (SEDDS).

Sejak awal dilaporkan, bentuk vesikel dikembangkan sebagai suatu kemajuan dalam penghantaran obat. Secara umum dipertimbangkan karena tidak toksik, *biodegradable* dan *non-immunogenic*. Gabungan obat dengan liposom merubah farmakokinetiknya dan toksisitas sistemiknya lebih rendah dengan meningkatkan stabilitas obat, meningkatkan efek terapeutik, memperpanjang waktu sirkulasi dan menaikkan *uptake* dari obat-obat yang terserap ke dalam sisi target; lebih lanjut, obat dicegah dari peruraian lebih awal dan atau diinaktivasi hingga permulaan pada sisi target (Kozubek, et.al, 2000, Manusroi, et.al, 2003). Demikian pula dengan formulasi sediaan dengan menggunakan peningkat penetrasi, *patch* dan penerapan teknologi SEDDS telah dilaporkan dapat memperbaiki segala kelemahan senyawa obat terkait *Biopharmaceutis Classification System*.

Gambaran Bentuk Sediaan Topikal Konvensional

Pada awalnya, sediaan farmasi dan kosmetik yang diaplikasikan pada kulit hanya ditujukan untuk pengobatan topical, seperti untuk infeksi ringan, gatal-gatal, luka bakar, ruam popok, sengatan dan gigitan serangga, kutu air, mata ikan, penebalan kulit, kutil, ketombe, jerawat, psoriasis, eksim, serta sebagai pelembab, pelindung, dan pelembut kulit. Sediaan topical dirancang dalam beberapa bentuk sesuai tujuan penggunaan dan estetikanya.

Salep

Salep (*unguentum*) adalah sediaan setengah padat untuk pemakaian luar. Salep dapat mengandung obat atau tidak. Salep yang tidak mengandung obat disebut sebagai dasar (*basis*) salep.

Dasar salep terdiri atas 4 kelompok besar, yaitu:

1. **Dasar salep hidrokarbon;** merupakan dasar salep berlemak dan bebas air, atau jika diperlukan, air dapat digunakan dalam jumlah yang sangat kecil. Basis ini terutama digunakan untuk efek emolien (pelembut). Dasar salep ini dapat bertahan pada kulit dalam waktu yang lama dan tidak memungkinkan hilangnya kelembaban kulit. Basis ini tidak mengering dan dapat mempertahankan keberadaan obat di kulit dalam waktu lama.

Bahan yang dapat digunakan dalam membuat basis ini adalah vaselin (putih dan kuning), paraffin, minyak mineral, dan lain-lain.

2. **Dasar salep absorpsi;** merupakan dasar salep yang dapat menyerap air, terdiri atas dua tipe yaitu (a) dasar salep yang memungkinkan pencampuran air dan minyak, misalnya petrolatum hidrofilik dan adeps lanae; (b) dasar salep yang telah menjadi emulsi air minyak seperti lanolin dan cold krim. Dasar salep ini juga berefek emolien, tetapi daya lekatnya tidak sekuat dasar salep berlemak, bersifat tidak mudah dicuci dengan air.

Bahan yang dapat digunakan yaitu:

Petrolatum hidrofilik: kolesterol, alkohol stearat, malam putih, dan vaselin putih. Bahan ini dapat mengabsorpsi air dan membentuk emulsi air dalam minyak

Lanolin anhidrat (adeps lanae); dapat menyerap air hingga 25%, basis ini tidak dapat larut dalam air tetapi dapat menyerap air dan membentuk emulsi air dalam minyak.

Lanolin; merupakan basis yang telah mengandung air sebanyak 25%.

Cold krim; merupakan emulsi air dalam minyak, terbuat dari cetil alkohol, paraffin padat, paraffin cair, natrium borat dan air suling. Krim ini bersifat mendinginkan dan berefek emolien.

3. **Dasar salep yang dapat dibersihkan dengan air;** basis ini merupakan emulsi minyak dalam air yang dapat dihilangkan dari kulit dan pakaian dengan menggunakan air. Basis ini dapat diencerkan dengan air atau larutan berair. Basis ini dapat mengabsorpsi air yang keluar dari sel pada kondisi dermatologi, dan memungkinkan absorpsi obat di kulit yang lebih baik.

4. **Dasar salep larut air;** basis ini mengandung bahan yang hanya larut dalam air, tidak mengandung bahan berlemak. Penambahan air akan memengaruhi konsistensi basis ini, sehingga tidak memungkinkan untuk menambah larutan berair, tetapi dapat ditambahkan bahan padat.

Bahan yang dapat digunakan adalah bahan yang mengembang dalam air dan membentuk mucilage seperti NaCMC, Carbomer, HPMC, PEG, dan lain-lain.

Pengembangan sediaan salep berikutnya populer dengan bentuk sediaan di bawah ini:

a. Krim

Krim adalah sediaan setengah padat yang merupakan emulsi air dalam minyak (a/m) atau minyak dalam air (m/a). Sediaan ini paling banyak digunakan karena lebih lembut dan mudah disebar pada kulit, serta lebih menyenangkan dalam penggunaannya. Krim dibentuk dari campuran fase minyak dan fase air dengan menggunakan

emulgator. Senyawa obat yang akan digunakan dicampur pada fase yang sesuai dengan sifat bahan obat.

b. Pasta

Pasta adalah sediaan setengah padat yang mengandung bahan padat terdispersi dalam konsentrasi yang tinggi (lebih dari 40%), sehingga konsistensi pasta menjadikannya lebih kaku. Sediaan ini memungkinkan untuk melekat dan menyerap cairan serosal pada empat pemakaian.

c. Gel

Gel adalah sistem setengah padat yang dibentuk dari sedikitnya dua konstituen yang membentuk massa seperti matriks pagar yang rapat dan memerangkap cairan. Jika matrik yang saling melekat kaya akan cairan, maka produk ini seringkali disebut *jelly*.

Gel mempunyai kekakuan yang disebabkan oleh jaringan yang saling menganyam dari fase terdispers yang mengurung medium pendispersinya (air). Perubahan suhu dapat menyebabkan gel kembali ke bentuk cairnya. Beberapa gel menjadi encer setelah pengocokan dan segera menjadi setengah padat atau padat kembali setelah dibiarkan beberapa waktu (tikotropi) (Ansel, 1989).

Bentuk-bentuk sediaan di atas tetap menjadi dasar (basis) dalam sistem penghantaran obat transdermal dengan penambahan bahan obat yang telah dimodifikasi dalam suatu sistem penghantar seperti yang akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

II

KULIT


A. Anatomi dan Fisiologi Kulit Manusia

Kulit merupakan organ terbesar dari tubuh, bobotnya lebih dari 10% dari total bobot tubuh. Rata-rata kulit manusia dewasa mempunyai luas permukaan sebesar 1,5-2 m², dengan berat sekitar 3 kg. Kulit berperan sebagai lapisan pelindung tubuh terhadap pengaruh dari luar, baik pengaruh fisik maupun kimia (Grassi, Mario, et.al., 2007). Meskipun kulit relatif impermeabel terhadap senyawa-senyawa kimia, namun dalam keadaan tertentu kulit dapat ditembus oleh senyawa obat atau bahan berbahaya yang dapat menimbulkan efek terapeutik atau efek toksik yang bersifat lokal atau sistemik. Kulit juga merupakan sawar (*barrier*) fisiologik yang penting karena mampu menahan penembusan bahan gas, cair, maupun padat, baik yang berasal dari lingkungan luar tubuh maupun komponen yang dihasilkan oleh mikroorganisme (Walters, K.A. 2002).

Kulit manusia tersusun atas 3 lapisan utama, dari luar ke dalam yakni epidermis (*non-viable* epidermis dan *viable* epidermis), dermis, dan endodermis. Ketiga

lapisan tersebut berbeda dari segi anatomi, morfologi, senyawa penyusunnya, sifat, dan fungsi.

Lapisan terluar merupakan turunan dari ectoderm yang disebut epidermis. Epidermis terhubung dengan dermis oleh taut dermo-epidermic (*dermo-epidermic junction*). Di bawah dermis terdapat lapisan hypodermis (endodermis). Setiap lapisan dilalui oleh ujung-ujung saraf dan pembuluh darah. Pembuluh darah perifer yang melintasi kulit mengalirkan darah sebanyak 0,3 mL/jam/cm³. Total luas area pembuluh darah intrakutan yang tersedia untuk pelintasan langsung obat ke sirkulasi sistemik sejumlah 100%-200% dari area kulit. Pada kulit tersebar adneksa kulit berupa folikel rambut dan kelenjar.



Gambar 2.1. Penampang melintang kulit (Walters, K.A, 2002)

Epidermis (Walters, K.A. 2002; Grassi, Mario, et.al. 2007)

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang mempunyai ketebalan bervariasi dari 50 μ m-1,5mm, tersusun dari 15-25 sel. Epidermis berfungsi sebagai

penghalang terpenting dari hilangnya air, elektrolit, dan atau nutrisi tubuh, serta menahan masuknya senyawa asing dari luar. Lapisan epidermis terdiri dari *non-viable* epidermis dan *viable* epidermis. Secara anatomi, lapisan epidermis terdiri dari 5 lapisan utama yang susunannya lebih dikenal dengan istilah 'strata' tersusun dari luar ke dalam berturut-turut; *non-viable* epidermis yaitu stratum korneum dan *viable* epidermis yaitu stratum lusidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal (germinativum).

a. Stratum korneum (lapisan tanduk; *horny layer*)

Stratum korneum merupakan lapisan terluar dari epidermis dan menjadi penghalang utama terhadap kehilangan senyawa endogen serta menjadi penghalang tubuh terhadap pengaruh lingkungan seperti senyawa kimia, mikroba, pelarut, radiasi, elektrik, dan termal. Lapisan ini memiliki ketebalan 10-20 μm yakni berkisar 1%-10% dari total lapisan kulit, serta berkontribusi lebih dari 80% terhadap tahanan permeabilitas kulit. Kemampuan ini cukup tinggi untuk menjaga kehilangan air transkutaneus. Estimasi efisiensi *barrier* terhadap kehilangan air adalah sebesar 0,5 $\mu\text{L}/\text{cm}^2/\text{hari}$, atau setara dengan 250 mL/hari pada kondisi normal.

Stratum korneum tersusun atas sel kulit mati dan kering, oleh karena itu disebut sebagai *non viable* epidermis yang hanya mengandung air kurang dari 15% dan tersusun atas sedikitnya selusin lapisan sel-sel mati yang gepeng (korneosit). Sel-sel ini tersusun rapat dan saling tumpang tindih. Tiap selnya berdiameter sekitar 40 μm dengan ketebalan 0,5 μm . Sel-sel penyusun stratum korneum merupakan sel yang kehilangan inti dan sitoplasmanya dipenuhi oleh filamen skleroprotein

yang disebut keratin. Keratin mengandung 6 polipeptida berberat molekul 40.000-70.000. Sel-sel ini adalah tahap akhir dari proses diferensiasi sel epidermis yang dimulai pada stratum basal. Setelah keratinisasi berakhir, maka sel-sel hanya terdiri atas protein amorf dan fibrilar, serta membran plasma yang menebal, selanjutnya disebut sel tanduk. Enzim hidrolitik lisosom berperan dalam menghilangkan organel sitoplasma (Junqueira, *et al* 1998)

Stratum korneum mengandung protein keratin yang tidak larut (~ 70%) dan lipid (~ 20%). Komponen inilah yang memegang peranan penting dalam mengontrol absorpsi percutan senyawa eksogen termasuk senyawa obat. Selain itu, proses deskuamasi (pengelupasan sel) pada sel-sel stratum korneum yang berlangsung setiap 2-3 minggu mampu menghilangkan senyawa-senyawa terlarut yang teradsorpsi di stratum korneum.

Zat-zat interselular berasal dari granula lamellar yang terdapat di antara sel-sel stratum korneum dan membentuk komponen lipid interselular kompleks yang berperan sebagai sawar (*barrier*) stratum korneum yang akan mencegah penetrasi zat asing dari lingkungan serta kehilangan cairan tubuh. Ekstraksi lipid epidermal dengan suatu pelarut organik serta interaksi dengan beberapa senyawa kimia, dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan fungsi sawar epidermis (Reviere, 2006).

Di bawah stratum korneum tersusun berturut-turut *viable* epidermis yaitu stratum granulosum, stratum spinosum dan stratum germinativum, yang terdiri dari sel-sel hidup dan tersusun longgar.

b. Stratum lucidum (lapisan bening; *clear layer*)

Stratum lucidum terdapat tepat di bawah stratum korneum. Lapisan ini tampak jelas pada kulit tebal dan tidak berambut pada telapak tangan dan kaki. Terdiri dari selapis sel eosinofilik, sangat gepeng atau tipis. Tampak sebagai barisan jernih yang homogen, terdiri atas beberapa lapisan keratin padat, terjalin erat, dan tanpa organel nukleus. Sitoplasma berisi eleidin yaitu protein mirip keratin namun afinitasnya berbeda dan fosfolipid yang terikat pada proteinnya mungkin berperan dalam absorpsi percutan karena berfungsi pula sebagai sawar (Reviere, 2006:3).

c. Stratum granulosum (Lapisan berbutir; *Granular Layer*)

Stratum granulosum tersusun atas tiga sampai lima lapis sel dengan banyak granular berlamella yang mengandung *keratohyalin*, bagian ini berperan dalam pembentukan keratin. Jumlah dan ukuran granula tersebut terus bertambah, bergerak menuju membran sel, dan melepaskan isi lipidnya dengan cara eksositosis ke celah antara stratum korneum dan stratum granulosum. Akibatnya terbentuk sejenis lapisan pada membran sel stratum korneum. Semua sel di atas lapisan ini mati karena letaknya yang sangat jauh dari sumber nutrisi sehingga kebutuhan nutrisi sel tidak dipenuhi.

d. Stratum spinosum (*Spinous* atau *Prickle Layer*)

Sel-sel ini terhubung dengan sel stratum spinosum yang berdekatan dan dengan sel stratum basale bawahnya oleh desmosomes. Karakteristik lapisan ini adalah banyaknya filamen yang menonjol dan membedakan morfologi lapisan ini dengan sel


epidermis lainnya. Di lapisan paling atas terdapat organel yang berikatan dengan membran, dikenal sebagai butiran pipih badan Odland. Namun badan Odland paling banyak terdapat di dalam stratum granulosum.

e. Stratum basal (*germinativum*)

Lapisan ini terdiri atas selapis sel kuboid atau silindris basofilis yang bertumpu pada lamina basal (membran dasar). Sel-sel melekat satu sama lain dan dengan lapisan di atasnya (stratum spinosum) yang dilekatkan oleh desmosom, serta melekat dengan lapisan di bawahnya (lamina basale) yang dilekatkan oleh hemidesmosom.

Sel-sel ini merupakan asal usul dari sel-sel penyusun epidermis. Sel ini berada pada lapisan dasar antara dermis dan sel epidermis yang hidup (aktif). Pada lapisan ini terdapat melanosit, sel Langerhans, sel Merkel, dan sel keratinik.

Sel keratinik terdiri atas 2 tipe utama, yaitu pertama sel dengan fungsinya sebagai stem sel yang aktif membelah dan menghasilkan sel-sel baru, kemudian yang kedua adalah sel yang menghubungkan epidermis dengan membran dasar (membran yang memisahkan epidermis dengan dermis). Membran ini tebalnya 50-70nm dan mengandung 2 dua lapisan yaitu lamina densa dan lamina lucida, terdiri dari protein utama, seperti kolagen tipe IV, laminin, nidogen, dan fibronectin. Kolagen tipe IV ini yang berperan dalam memelihara stabilitas mekanik membran dasar.



Dermis (Walters, K.A.2002; Grassi, Mario, et.al. 2007)

Lapisan ini disebut juga korium, merupakan lapisan kulit yang terletak antara epidermis dan jaringan lemak subkutan. Tebal lapisan sekitar 1-4 mm, tergantung bagian tubuh. Dermis ini mengandung jaringan padat dari serabut protein, seperti kolagen, retikulum, dan elastin yang disimpan dalam kelenjar dasar amorf dari mukopolisakarida.

Fungsi dermis ini terutama melindungi tubuh dari luka, menjadikan epidermis lebih fleksibel, penghalang terhadap infeksi dan sebagai organ penyimpan air. Dalam dermis terdapat kapiler darah, ujung-ujung saraf, pembuluh limfa, kelenjar keringat, folikel rambut, dan kelenjar sebacea.

Beberapa kelenjar yang terdapat di kulit yaitu kelenjar keringat yang ditemukan diseluruh permukaan

tubuh dan mensekresikan suatu larutan encer garam dan beberapa komponen lain (95% keringat berupa air) tertanam pada lapisan ini. Keringat mempunyai pH 4,5-5,5. Kelenjar sebacea terdapat pada bagian leher tiap folikel. Kelenjar ini mensekresikan material minyak dengan komposisi: trigliserida 57,5%; ester-ester lilin 26%; squalene 12%; ester-ester kolesterol 3%; kolesterol 1,5%. Sebum ini menyebabkan terbentuknya lapisan tipis diskontinyu senyawa lipofil pada beberapa permukaan kulit, karenanya kelenjar sebum ini dapat menjadi rute absorpsi obat untuk obat-obat yang larut lemak (Maurice, Jean V and Daniel, Losif, 2005).

Endodermis (Hipodermis; subkutan)


Hipodermis adalah lapisan terdalam dari kulit, tebalnya 0,5-2 cm tergantung pada umur, ras dan daerah tubuh, merupakan kelanjutan dari dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak, penghubung antara dermis dengan jaringan lain di bawahnya seperti otot. Hipodermis kaya akan jaringan penghubung yang mengandung beberapa serat elastik. Pada beberapa bagian tubuh tertentu terdapat otot polos. Lapisan ini yang melindungi organ sebelah dalam tubuh dari benturan mekanik (Walters, K.A. 2002,Grassi, Mario, et.al. 2007).

Berdasarkan sifat sel-sel penyusun kulit, maka secara fisiologi, fungsi kulit adalah:

1. Merupakan barrier lingkungan yang menghalangi masuknya stimulus dari lingkungan seperti senyawa kimia, mikroba, pelarut, radiasi, elektrik, dan termal.
2. Sawar kulit juga mencegah penguapan air yang berlebih dari dalam tubuh, serta mencegah kehilangan elektrolit dan senyawa biokimia lainnya.

3. Proses deskuamasi akan akan menghilangkan senyawa dan zat terlarut, termasuk hasil-hasil katabolisme yang teradsorpsi pada stratum korneum. Dengan kata lain kulit mampu mengontrol penumpukan senyawa dan partikel pada kulit.
4. Kelenjar keringat mengontrol suhu tubuh dan mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme.
5. Kelenjar minyak dalam folikel rambut mengeluarkan minyak yang dapat melumasi dan melindungi rambut.
6. Proses diferensiasi sel-sel epidermis dapat menjamin keberadaan stratum korneum serta fungsi yang melekat padanya.
7. Menghasilkan melanin yang member warna kulit serta melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari.
8. Menghasilkan sistem pertahanan tubuh melalui sel langerhans dan sel lainnya.
9. Pembuluh darah membawa nutrisi dan mengangkut produk metabolisme, fungsi immune, pengaturan suhu tubuh, dan tekanan darah.
10. Saraf mengendalikan tekanan, nyeri, dan suhu.
11. Sistem limfa mengatur pengeluaran sisa metabolisme, tekanan jaringan dan fungsi immune.
12. Melindungi tubuh dari benturan mekanik.

Bagian-bagian kulit yang memperlihatkan fungsi-fungsi di atas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



B. Absorpsi Perkulatan

Absorpsi perkulatan dapat didefinisikan sebagai absorpsi senyawa ke dalam stratum korneum (lapisan tanduk) dan selanjutnya menembus lapisan di bawahnya dan akhirnya masuk ke dalam sirkulasi darah. Penetrasi perkulatan merupakan gabungan fenomena penembusan suatu senyawa dari lingkungan luar ke bagian kulit sebelah dalam dan fenomena

penyerapan dari struktur kulit ke dalam peredaran darah atau getah bening. Istilah 'perkutan' menunjukkan bahwa proses penembusan terjadi pada lapisan epidermis dan penyerapan terjadi pada lapisan epidermis yang berbeda.

Kulit relatif impermeabel untuk sebagian besar senyawa, oleh karena itu perlu banyak pertimbangan dalam pemberian obat-obatan melalui kulit untuk efek sistemik. Prasyarat untuk absorpsi obat transdermal adalah bahwa obat dapat melintasi lapisan-lapisan dari epidermis dan masuk ke dermis, sehingga obat dapat mencapai pembuluh darah kapiler. Pengujian absorpsi perkutan secara *in vitro* menunjukkan bahwa stratum korneum merupakan sawar utama untuk banyak senyawa, bersifat impermeabel terhadap molekul-molekul hidrophilik, tetapi sangat permeabel untuk molekul lipofilik. Hal ini dikarenakan sel-sel penyusun stratum korneum yang terdiri dari lemak dan protein keratin serta susunannya yang padat (Maurice, Jean V and Daniel, Losif, 2005).

Absorpsi perkutan dari bahan obat dari preparat dermatologi seperti sediaan cair, gel, salep, krim, atau pasta tidak hanya tergantung pada sifat kimia dan fisika dari bahan obat, tetapi juga pada sifatnya setelah dimasukkan ke dalam pembawa farmasetika (setelah diformulasi), dan juga kondisi kulit. Walaupun pembawa farmasetika tidak dapat lebih jauh menembus kulit, atau membawa bahan obat melalui kulit, tetapi pembawa diharapkan tidak memengaruhi kadar dan tingkat penembusan obat pada kulit, tidak memengaruhi laju, dan derajat penetrasi zat obat. Derajat serta laju penetrasi obat biasanya dipengaruhi oleh variasi dan konsentrasi pembawa, serta adanya kombinasi obat.

Oleh karena itu, untuk menilai kemampuan absorpsi perkutan dan efektivitas terapeutik, tiap kombinasi obat dan pembawa harus diuji secara terpisah (Ansel, 2005).

Untuk pengobatan setempat sering tidak diperlukan penembusan zat aktif ke dalam struktur kulit yang lebih dalam; hal tersebut penting dilakukan jika diperlukan konsentrasi dalam jaringan setempat (daerah pemakaian) yang cukup tinggi agar segera diperoleh efek yang dikehendaki. Sebaliknya penyerapan oleh pembuluh darah diusahakan agar seminimal mungkin sehingga terjadinya efek sistemik dapat dihindari.


Pada penggunaan sediaan topikal untuk efek setempat, masuknya senyawa obat hingga lapisan epidermis yang lebih dalam hingga ke sirkulasi sistemik mungkin tidak dapat dihindari, tetapi karena formulasi sediaan yang tidak memungkinkan penetrasi perkutan yang lebih baik, maka jumlah obat yang sampai ke bagian tersebut tidak dapat terakumulasi hingga kadar yang mampu menimbulkan efek. Akan tetapi pada pemakaian topikal sediaan untuk efek sistemik, zat aktif harus masuk ke dalam peredaran darah dan selanjutnya dibawa ke jaringan yang kadang-kadang terletak jauh dari tempat pemakaian dan pada konsentrasi tertentu dapat menimbulkan efek farmakologik.

Penetrasi obat melewati kulit dapat terjadi dengan dua cara (Walters, K.A. 2002):

1. **Rute transepidermal**, yaitu difusi obat menembus stratum korneum. Terdiri dari rute *trans-seluler* dan rute *intra-seluler*. Rute *trans-seluler* merupakan jalur terpendek dimana bahan obat melewati membran lipid maupun korneosit, tetapi rute ini memiliki resistansi yang besar terhadap penetrasi. Rute yang

lebih umum adalah melalui rute inter-seluler. Bahan obat melintasi membran lipid antara korneosit

2. Rute transfolikular (*trans-appendageal*), yaitu difusi obat melewati pori kelenjar keringat dan sebum. Rute yaitu melalui kelenjar dan folikel rambut memiliki kontribusi yang kecil terhadap penetrasi perkutan.



Gambar 2.4.

Rute absorpsi perkutan (Walters,K.A,2002)

Faktor-faktor yang memengaruhi absorpsi perkutan adalah (Ansel, 2005):

- a. Obat yang diformulasi dalam pembawa tertentu harus dapat melekat dan menyatu pada permukaan kulit dalam konsentrasi yang cukup.
- b. Konsentrasi obat merupakan faktor yang penting. Jumlah obat yang diabsorpsi secara perkutan per-unit luas permukaan tempat absorpsi setiap periode waktu, akan bertambah sebanding dengan bertambahnya konsentrasi obat dalam suatu pembawa.
- c. Semakin luas area pemakaian obat, maka semakin banyak obat diserap dengan cara absorpsi perkutan.
- d. Bahan obat harus mempunyai affinitas yang lebih besar pada kulit daripada terhadap pembawanya, agar obat dapat meninggalkan pembawa menuju kulit.
- e. Derajat kelarutan bahan obat baik dalam minyak dan air (koefisien partisi) dipandang penting untuk memperkirakan efektivitas absorpsi perkutan.
- f. Absorpsi obat dapat ditingkatkan jika pembawa yang digunakan dapat dengan mudah menyebar di permukaan kulit, setelah bercampur dengan cairan berlemak di kulit, dan membawa obat kontak dengan jaringan sel untuk diabsorpsi.
- g. Pembawa yang meningkatkan jumlah uap air yang dapat ditahan kulit umumnya cenderung baik bagi absorpsi obat, karena kandungan air ini akan menyebabkan terjadinya hidrasi pada kulit.
- h. Hidrasi kulit merupakan fakta yang paling penting dalam absorpsi perkutan. Hidrasi stratum korneum meningkatkan derajat lintasan dari semua obat yang berpenetrasi di kulit.

- i. Hidrasi kulit dipengaruhi oleh pembawa berlemak, serta kemampuan kulit menyerap uap air dari lingkungan.
- j. Penggunaan sediaan farmasi pada kulit dengan cara menggosokkan atau mengoleskan, akan meningkatkan jumlah obat yang diabsorpsi.
- k. Ketebalan lapisan tanduk (stratum korneum) memengaruhi kemampuan dan kecepatan absorpsi percutan senyawa obat. Stratum korneum yang lebih tipis atau yang terbuka karena luka, akan memudahkan senyawa berpenetrasi melintasi kulit.
- l. Lama kontak obat pada kulit akan meningkatkan jumlah kumulatif obat yang terabsorpsi.

C. Difusi Molekul dan Hukum Fick (Dirhamsah, S; Amlalo).

Transport molekul melintasi membran, termasuk kulit mengikuti proses difusi pasif. Pergerakan molekul dalam suatu sistem terisolasi adalah tidak terarah; molekul dikatakan mengikuti gerak acak dan tidak pada salah satu arah kekuatan tertentu. Awalnya, ini mungkin tampak anomali saat mempertimbangkan proses difusi. Jika dua cairan dipisahkan oleh suatu membran hingga menjadi dua bagian, sebutlah sisi A dan B, yang keduanya diisi air, kemudian pada sisi cairan A ditambahkan senyawa dalam bentuk padatan yang akan terlarut, maka molekul padatan tersebut akan larut pada sisi tersebut dan akan melintasi membran menuju sisi B, sementara molekul air yang terdapat pada sisi B juga akan berpindah menuju sisi A. Perpindahan ini mengacu kepada pergerakan molekul menuju gradient konsentrasi yang lebih rendah secara acak dan peristiwa

ini berlangsung terus hingga kedua sisi larutan homogen.

Sejumlah model matematika telah digunakan untuk menggambarkan kinetika absorpsi perkutan. Secara umum, sebagian besar model menggunakan dasar difusi atau persamaan kompartemen yang di adopsi dari penerapan yang kompleks. Pengetahuan tentang prinsip matematika transport membran sangat esensial memahami bagaimana fungsi sawar membran memengaruhinya dan sifat yang bagaimana yang harus dipilih untuk dikembangkan.

Model Fickian

a. Hukum difusi Fick Pertama

Dalam transport, aliran atau fluks (J_i , dalam cm^2s^{-1}) sebanding dengan kecepatan molekul berpindah (v dalam cm s^{-1}) dan konsentrasi (C_i dalam mol cm^{-3}), mengikuti rumus:


$$J_i = C_i \cdot v \dots\dots\dots (2.1)$$

Prinsip dasar termodinamika ireversibel adalah bahwa aliran, pada setiap titik dalam sistem secara proporsional tergantung pada potensial gradient. Sehingga J_i dapat ditunjukkan dengan persamaan (2.2) dimana $\partial\mu_i/\partial x_i$ adalah gradient dan L_i adalah konstanta proporsionaliti.

$$J_i = - L_i (\partial\mu_i/\partial x_i) \dots\dots\dots (2.2)$$

Jika suhu dan tekanan konstan, senyawa berdifusi dari konsentrasi yang tinggi ke

konsentrasi yang lebih rendah. Konsentrasi senyawa yang berdifusi bervariasi secara linear sebesar C_0 di X_0 menjadi C_x di X . Secara termodinamika, faktor pendorong terjadinya difusi adalah adanya perbedaan konsentrasi.




Gambar 3.1. Difusi dalam keadaan mantap

Peristiwa ini analog dengan aliran muatan listrik dimana terjadinya aliran muatan karena perbedaan potensial. Oleh karena itu maka persamaan (2.2) dapat diasumsikan seperti persamaan (2.3), dimana D_i adalah koefisien difusi dan $\partial C/\partial x$ adalah variasi konsentrasi dalam keadaan mantap, dimana C_0 dan C_x bernilai konstan.

$$J_x = - D (\partial C/\partial x) \dots\dots\dots(2.3)$$

Persamaan ini disebut Hukum Fick Pertama yang secara formal menyatakan bahwa fluksi senyawa yang berdifusi sebanding dengan gradient konsentrasi.

- b. Hukum Difusi Fick Kedua
 Hukum difusi Fick kedua ini berhubungan dengan kecepatan perubahan konsentrasi sepanjang waktu pemberian. Peristiwa yang lebih umum terjadi adalah peristiwa transien, dimana konsentrasi berubah terhadap waktu. C_x merupakan fungsi waktu yang juga berarti bahwa fluksi senyawa juga merupakan fungsi waktu. Pada $t=0$, maka konsentrasi di x adalah $C_{x0}=0$; pada $t=t_1$ difusi telah terjadi dan konsentrasi di x meningkat menjadi C_{x1} ; pada $t=t_2$ konsentrasi di x meningkat menjadi C_{x2} , dan seterusnya.



Gambar 3.2. Difusi dalam keadaan transien

Perubahan konsentrasi adalah selisih antara fluksi yang masuk di X_a dan fluksi yang keluar di x , adalah $J_{x_a} - J_x$. Selisih yang terjadi setiap saat merupakan laju perubahan konsentrasi, C_x . Sementara fluksi yang keluar di x adalah

$$J_x = J_{x0} + \left\{ \frac{\partial J}{\partial x} \right\} \Delta x \dots \dots \dots (2.4)$$

Oleh karena itu maka:

$$\frac{dC_x}{dt} = - \frac{\partial J}{\partial x} \Delta x = \frac{d}{dx} \left[D \frac{dC_x}{dx} \right] \dots \dots \dots (2.5)$$

$$\frac{dC_x}{dt} = - \frac{\partial J}{\partial x} \Delta x = \frac{d}{dx} \left[D \frac{dC_x}{dx} \right] \dots \dots \dots (2.5)$$

Dihitung berdasarkan persamaan (2.5), jika D tidak tergantung pada konsentrasi, maka yang berdifusi di x:

$$\frac{dC_x}{dt} = D \frac{d^2 C_x}{dx^2} \dots \dots \dots (2.6)$$

Persamaan ini disebut Hukum difusi Fick Ke-dua yang menyatakan bahwa laju perubahan konsentrasi sebanding dengan turunan kedua (Laplacian) konsentrasi.

Persamaan ini digunakan untuk menghitung aliran senyawa dari sisi konsentrasi tinggi (sisi donor), dimana $C=C_0$ dan $x=h$ pada setiap interval waktu. Massa kumulatif senyawa Q yang melintas pada unit area membran dalam suatu waktu t ditunjukkan oleh persamaan (2.6), dimana C_0 adalah konsentrasi difusan yang melintas pada $t=0$ t_0 dan h adalah ketebalan membran.

$$Q = C_0 h \left[\frac{Dt}{h^2} - \frac{1}{6} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \exp\left(\frac{-Dn^2\pi^2 t}{h^2}\right) \right]$$

..... (2.6)

Ketika $t \rightarrow \infty$, maka eksponensial akan menjadi nol dan hukum difusi Fick kedua menjadi:

$$Q = \frac{DC_0}{h} \left[t - \frac{h^2}{6D} \right] \dots\dots\dots(2.7)$$

Persamaan ini dapat diaplikasikan untuk membuat hubungan massa kumulatif terhadap waktu difusi dengan diikuti inisial non-linear *lag time*. Berdasarkan persamaan 2.7, maka lag time dapat dihitung dengan persamaan:

$$t_{lag} = \frac{h^2}{6D} \dots\dots\dots(2.8)$$

Jika persamaan 2.7 dideferensialkan terhadap waktu, maka hukum difusi Fick menggambarkan fluks J pada keadaan mantap (*steady state*)

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = J = \frac{DC_0}{h} \dots\dots\dots(2.9)$$

Karena C_o (konsentrasi di bagian luar membran) sulit diukur, maka nilai C_o diganti dengan konsentrasi dalam pembawa C_v bersama koefisien partisi K , sehingga persamaannya menjadi:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = J = \frac{DKC_v}{h} \dots\dots\dots(2.10)$$

Dari persamaan di atas, tergambar bahwa terdapat beberapa variable yang berperan dalam kecepatan difusi adalah D, K, C_v dan h .

Koefisien permeabilitas P didefinisikan sebagai $P = KD/h$, sehingga persamaan 2.10 dapat disederhanakan menjadi :

$$J = PC_v \dots\dots\dots(2.11)$$

Persamaan ini menjadi dasar dan sering digunakan dalam penilaian permeabilitas membran. Persamaan ini berdasarkan prinsip bahwa konsentrasi donor adalah tetap dan difusi berlangsung pada kondisi mantap (*steady state*).

III

PRINSIP FORMULASI SEDIAAN TRANSDERMAL

Beberapa senyawa obat mempunyai efek samping yang tidak dapat dihilangkan dari beberapa bentuk sediaannya; beberapa diantaranya memiliki kelemahan sehubungan dengan interaksi yang terjadi pada partikelnya di rute pemberiannya. Suatu kemajuan dari sisi pengembangan formulasi terkait pengurangan masalah obat karena bentuk sediaan konvensional, salah satunya adalah dengan dikembangkannya sistem penghantaran obat secara transdermal.

Rute pemberian obat secara oral telah digunakan selama bertahun-tahun, misalnya tablet dan kapsul. Demikian pula halnya dengan sediaan injeksi, telah digunakan selama lebih dari 130 tahun, pengembangannya hanya terbatas pada pemahaman dan perkembangan metode sterilisasinya yang menjadi lebih baik. Penggunaan sediaan topikal juga telah berlangsung sejak lama, tetapi lebih dominan digunakan untuk penanganan penyakit kulit lokal. Penggunaan obat lokal

(untuk efek pengobatan setempat) lebih memfokuskan keberadaan dan permeasi obat pada lapisan kulit sebelah luar saja, dan berharap obat hanya sedikit atau tidak terakumulasi pada sirkulasi sistemik. (dds,vasant)

Sistem penghantaran obat transdermal, sengaja dan secara khusus didesain untuk mencapai sirkulasi sistemik dan memberi kadar obat yang cukup untuk menghasilkan efek terapi. Sediaan ini telah digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1950. Menurut *Williams* dan *Barry*, rute pemberian obat secara transdermal merupakan suatu alternatif untuk menghindari variabilitas ketersediaan hayati obat pada penggunaan peroral, menghindari kontak langsung obat dengan mukosa lambung sehingga mengurangi efek samping obat tertentu, juga untuk memperoleh konsentrasi obat terlokalisir pada tempat kerjanya (Hendrati, 2009: 4).

A. Penetrasi Senyawa Obat Melintasi Kulit

Kulit telah menjadi rute penting dalam penghantaran obat untuk aksi topikal, regional dan sistemik selama lebih dari 3 dekade. Kulit memiliki penghalang fisika dan biokimia yang mencegah kehilangan air dari tubuh dan menghalangi masuknya senyawa kimia toksik serta agen penginfeksi, sehingga kondisi homeostasis dapat terjaga. Meskipun demikian, dengan melihat senyawa penyusun sel-sel kulit, khususnya stratum korneum, maka upaya untuk menjadikannya salah satu rute pemberian obat alternatif bagi beberapa senyawa obat dengan kelemahan pada rute pemberian lainnya masih terus diteliti dan dikembangkan.

Adneksa kulit seperti rambut yang tumbuh dari folikel rambut, kelenjar sebacea, tingginya vaskularisasi

dermis yang mendukung kelenjar keringat apokrin dan ektrin melintasi pori ke dalam epidermis, semakin memperluas permukaan kulit sebagai tempat penyerapan obat.

Stratum korneum yang merupakan lapisan terluar dari kulit tersusun atas keratin (protein yang tidak larut air) dan lipid, telah dipertimbangkan sebagai struktur penentu kecepatan penetrasi senyawa obat melintasi kulit. Pada bagian inilah proses penetrasi berlangsung sangat lambat, sehingga dinyatakan sebagai *rate-limiting step* penetrasi percutan senyawa obat.

Dermis mengandung banyak pembuluh darah. Obat yang dapat menembus epidermis dan sampai pembuluh darah dalam lapisan dermis akan dapat berefek sistemik (Ansel dkk, 1995). Absorpsi obat melewati kulit dengan mekanisme difusi pasif yaitu obat akan bergerak dari daerah yang berkadar tinggi menuju ke daerah yang berkadar rendah (Martodiharjo, 2000).

Pada pemakaian obat secara topikal, obat berdifusi dalam pembawanya dan kontak dengan permukaan kulit (stratum korneum dan sebum) serta selanjutnya dapat menembus epidermis. Dalam pelintasannya di kulit, obat harus terpartisi ke dalam stratum korneum dan berdifusi melintasi sawar yang impermeabel. Selanjutnya molekul akan berinteraksi dengan banyak sisi potensial pengikatan (*potential binding sites*) yang berfungsi sebagai penampung senyawa obat untuk beberapa hari atau beberapa minggu.

Obat bebas akan banyak berada pada antarmuka antara stratum korneum dan lapisan epidermis di bawahnya, dimana obat akan terpartisi ke dalam jaringan yang kaya akan air. Masalah potensial yang

dapat ditemui adalah ketika obat atau *pro-drug* dirancang untuk berpartisipasi dari pembawanya ke stratum korneum, kemudian senyawa tersebut sulit meninggalkan stratum korneum untuk masuk lebih dalam ke epidermis. Untuk obat-obat larut lipid, kecepatan pembersihan dari jaringan yang ditinggalkan untuk selanjutnya berdifusi melintasi stratum korneum menjadi tahapan penentu kecepatan penetrasi.

Senyawa yang bersifat lipofilik, akan lebih mudah melintasi lapisan ini, mengingat sel ini mengandung lipid interseluler sebesar 5-30% dari total volume jaringan tersebut. Meskipun demikian, masalah berikutnya bagi senyawa ini adalah kemampuannya melewati lapisan di bawahnya yang mengandung lebih banyak air. Sebaliknya bagi senyawa yang bersifat hidrofilik, diperlukan suatu pembawa dengan komponen yang mampu menghantarkan senyawa ini melintasi stratum korneum.

Struktur epidermis yang unik, yakni tersusun atas 5 lapisan dengan bentuk, struktur sel penyusun, sifat dan fisiologinya, menyebabkan mekanisme pelintasan senyawa obat melewati lapisan-lapisan tersebut juga berbeda. Gabungan sifat pada lapisan transisi dan sifat fisika serta kekuatan fisiologisnya mengarahkan kulit sebagai komponen yang ideal dalam pengaturan absorpsi dan retensi senyawa. Sifat ini dapat mengarah kepada perancangan sediaan untuk aksi diperpanjang (*pro-long action*).

Absorpsi dan retensi senyawa pada kulit tergantung pada banyak faktor, antara lain pH, bobot molekul, ukuran molekul, kekuatan ikatan, koefisien partisi, jumlah folikel rambut dan kelenjar, hidrasi kulit, kelarutan, elektrolit, polaritas, dan khususnya sifat

hidrofilik dan lipofilik dari molekul obat, serta sifat dan struktur pembawanya.

Setelah obat mampu berpenetrasi hingga ke lapisan dermis, maka obat dan metabolit yang dihasilkan akan menuju ke kapiler darah, berpartisi melalui dinding pembuluh darah, selanjutnya masuk ke darah. Sejumlah kecil obat setelah melewati dermis juga akan masuk ke jaringan lemak di lapisan sub kutan serta menjadi depo di jaringan otot. Dalam pertimbangan teoritis, obat-obat yang tidak sampai ke darah jumlahnya tidak signifikan, dibanding jumlah obat yang masuk ke darah seperti yang diharapkan.

Penggunaan obat di kulit dapat ditujukan untuk mengobati kelainan dermatologis (*topical delivery*), pengobatan jaringan lebih dalam seperti otot dan vena (*regional delivery*) dan lebih jauh penetrasi obat ke sirkulasi sistemik (*transdermal delivery*) (Grassi, Mario, et.al. 2007).

1. *Topical delivery*

Sasaran dalam penghantaran topikal adalah merancang penampung obat (*drug reservoir*) di kulit. Penetrasi molekul aktif ke lapisan kulit yang lebih dalam atau hingga ke sistem sirkulasi tidak diperlukan. Penghantaran obat ini ditujukan untuk penggunaan secara langsung di kulit pada kerusakan lapisan kutan (ct. akne) atau pada manifestasi kutan akibat penyakit (ct. psoriasis), dengan maksud untuk membatasi efek farmakologi atau efek lain pada permukaan kulit atau pada kulit. Absorpsi regional dan sistemik mungkin tidak dapat dihindari, tetapi karena kadar tidak mencukupi, maka pada daerah tersebut tidak terjadi efek. Formulasi semi padat dan jenisnya mendominasi

sistem untuk penghantaran topikal (Walters, K.A. 2002, Grassi, Mario, et.al. 2007).


2. *Regional delivery*

Penggunaan obat di kulit untuk mengobati penyakit atau mengurangi gejala di jaringan yang lebih dalam di bawah tempat pemberian. Sasarannya adalah efek atau aksi farmakologis pada otot, vaskular, persambungan, dan lainnya yang terletak di bawah atau di sekitar tempat pemberian. Aksinya lebih sedikit di bawah pemberian sistemik. Aktivitas ini memerlukan absorpsi perkutan dan penumpukan obat. Sampainya substansi ke sirkulasi sistemik mungkin terjadi, meskipun tidak disukai, hal ini tidak dapat dihentikan. Meskipun demikian, konsentrasi di bagian regional lebih tinggi daripada yang mencapai sirkulasi sistemik pada total tubuh yang sama terpapar obat. Memfokuskan obat pada jaringan yang dikehendaki sulit untuk dibuktikan dengan tegas. Hal ini menjadi pertimbangan untuk validitas dari terapi regional. Formulasi yang digunakan untuk tujuan ini antara lain adalah ointment, krim, *adhesive patch*, dan plester (Grassi, Mario, et.al.2007, Walters, K.A., 2002).

3. *Sistemic delivery (Transdermal delivery)*

Penghantaran transdermal merupakan pemberian obat di kulit untuk pengobatan penyakit sistemik melalui penetrasi obat ke sirkulasi sistemik dan ditujukan pada pencapaian kadar aktif sistemik dari obat. Meskipun bentuk sediaan ointment diterapkan pada jenis terapi ini, (ct. nitrogliserin ointment), *adhesive sistem* dengan ukuran yang tepat dapat digunakan. Disini, absorpsi perkutan dengan akumulasi obat sistemik yang cukup besar sangat mutlak diperlukan. Idealnya tidak ada akumulasi obat secara lokal tetapi hal

tersebut tidak bisa dihindari. Obat dipaksa untuk melintas dengan kecepatan difusi yang relatif kecil dari luas area tertentu dari *patch*, sehingga berpotensi besar terjadinya iritasi atau sensitasi akibat bertahannya konsentrasi obat pada jaringan di bawah *patch* (Walters, K.A. 2002, Grassi, Mario, et.al. 2007).



Gambar 3.1. Perjalanan obat melintasi kulit (Walters, K.A. 2002)

Dalam prakteknya, penghantaran zat terlarut melintasi kulit berhubungan dengan beberapa kesulitan seperti:

- a. Absorpsi perkutan bervariasi tergantung pada daerah kulit yang diberikan, kerusakan kulit, umur dan perbedaan spesies.
- b. Efek metabolisme lintas pertama kulit (*skin's first-pass metabolism*)
- c. Kapasitas *reservoir* di kulit
- d. Iritasi dan toksisitas lain yang disebabkan oleh produk topikal
- e. Kondisi kulit termasuk pergantian kulit dan metabolisme
- f. Penjelasan yang tidak cukup terhadap kriteria bioequivalen
- g. Tidak lengkapnya pemahaman terhadap teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi atau memperlambat absorpsi perkutan

Peningkatan penetrasi senyawa obat melalui *barrier* epitel dapat dilakukan dengan cara (Touitou, *et al*, 2007):

1. Meningkatkan fluiditas membran sel.
2. Mengekstraksi lapisan lipid bagian luar dan dalam.
3. Memodifikasi struktur lipid, seperti melarutkan dengan membentuk misel.
4. Mengubah protein seluler.
5. Meningkatkan aktifitas termodinamik obat (difusi pasif).
6. Memodifikasi penghalang enzimatis, khususnya peptida dan protein obat.
7. Mengubah aliran tegangan permukaan mucin
8. Meningkatkan hidrasi stratum korneum

Optimasi absorpsi perkutan dapat dilakukan dengan dua strategi utama, yaitu :

Strategi pertama

Pembawa atau sejenisnya digunakan dalam memaksimalkan partisi obat ke dalam kulit tanpa secara signifikan efektif terhadap sifat fisika-kimia stratum korneum, sehingga obat tidak terlalu lama tertahan pada stratum korneum, melainkan hanya melintasinya. Jadi pembawa dirancang untuk segera melepaskan obat dengan mengoptimasi potensial absorpsinya. Hal ini dapat terjadi jika pembawa mampu meningkatkan hidrasi stratum korneum.

Strategi kedua

Penetrasi obat ditingkatkan dengan penambahan bahan peningkat penetrasi (*penetration enhancers*) dalam formulanya. Peningkat penetrasi adalah senyawa kimia yang dapat masuk ke kulit dan selanjutnya memudahkan penetrasi obat. Dengan kata lain, senyawa ini membuka jalur bagi masuknya senyawa obat ke kulit

Dalam mengatasi masalah *barrier* kulit, strategi kedua tersebut dikembangkan melalui pendekatan kimia dan fisika. Beberapa bentuk metode pendekatan kimia antara lain adalah:

- a. Seleksi obat yang digunakan
- b. Menggunakan sistem vesikel dan partikel (formulasi koloidal seperti liposom, niosom, ethosom, transferosom, mikroemulsi, dan sistem supersaturasi)

- c. Penggunaan peningkat penetrasi (sulfoksida, alkohol, poliol, alkana, asam lemak, ester, amina dan amida, terpen, surfaktan)
- d. Penggunaan pro-drugs,
- e. Menggunakan sistem *eutectic*
- f. Penggunaan senyawa kompleks

Sedangkan pendekatan fisika dapat dilakukan dengan metode :

- a. *Iontophoresis* (phonophoresis dan sonophoresis)
- b. Magnetophoresis,
- c. Electroporation
- d. Radiasi laser dan panjang gelombang fotomekanikal
- e. Frekuensi radio
- f. Thermophoresis
- g. *Microneedles injection*
- h. *Skin puncture and perforation*
- i. Pengencangan kulit
- j. Abrasi kulit

Dari kedua strategi tersebut, penggunaan peningkat penetrasi kimia merupakan teknik yang lebih mudah dan populer. Kombinasi kedua metode kimia dan fisika juga telah memperlihatkan peningkatan permeasi beberapa senyawa obat melintasi kulit.


B. Peningkat Penetrasi (*penetration enhancer*)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu strategi dalam upaya meningkatkan kemampuan senyawa obat melintasi kulit adalah dengan menambahkan senyawa kimia dalam formulasinya yang dapat menyiapkan jalur pelintasan obat di kulit, serta membentuk suatu sistem penghantar dari senyawa yang dapat melintasi kulit, dimana sistem penghantar tersebut dapat membawa sejumlah senyawa obat.

Pelintasan obat melalui kulit berlangsung melalui stratum korneum dan *appendageal*.

a. Proses pelintasan obat melalui kulit mengikuti mekanisme berikut:


- 1) Partisi
Obat dalam pelarut atau pembawanya, setelah diaplikasikan pada permukaan stratum korneum, akan terpartisi ke dalam *lipid bilayer* interseleuler dan korneosit
- 2) Permeasi; obat pada *lipid bilayer* interseleuler selanjutnya akan mengalami permeasi ke korneosit (sel stratum korneum)
- 3) Difusi; obat pada *lipid bilayer* interseleuler berdifusi ke segala arah dalam *lipid bilayer* interseleuler.



Gambar 3.4. Mekanisme pelintasan obat melalui stratum korneum

b. Proses pelintasan obat melalui *appendageal* mengikuti mekanisme berikut:

Kemampuan obat melintasi kulit melalui *appendageal* tergantung pada ukuran molekul obat. Hanya senyawa obat yang berukuran $< 5\mu\text{m}$ yang mampu melewati celah folikel rambut hingga mencapai *bulb* dimana terdapat banyak kapiler darah, senyawa berukuran lebih besar tertahan di permukaan. Selain itu, senyawa obat yang memiliki ukuran molekul $< 3\mu\text{m}$ bahkan mampu berpermeasi hingga ke bagian medula pada batang rambut.



Gambar 3.5. Mekanisme pelintasan obat melalui folikel rambut

Pemilihan senyawa yang mampu meningkatkan penetrasi senyawa obat melintasi kulit didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- a. Senyawa peningkat penetrasi yang digunakan bersifat inert secara farmakologi; sifat ini mutlak diperlukan untuk pemilihan suatu pembawa dalam formulasi sediaan farmasi. Jika pembawa juga memberi efek farmakologi, maka kemungkinan efek kombinasi dan interaksi obat dapat terjadi.
- b. Tidak terjadi interaksi senyawa peningkat penetrasi dengan reseptor pada kulit dan atau di seluruh tubuh.
- c. Senyawa peningkat penetrasi yang digunakan tidak bersifat toksik, tidak mengiritasi dan tidak menyebabkan alergi.
- d. Onset dan durasi peningkatan aktivitas dapat diprediksi dan dikontrol
- e. Kulit segera dapat memperlihatkan perbaikan ke kondisi normal ketika sediaan telah dihilangkan dari kulit.
- f. Kemampuannya dalam meningkatkan penetrasi senyawa obat tidak berakibat terhadap perubahan yang signifikan terhadap kehilangan cairan tubuh, elektrolit, dan material endogen.
- g. senyawa yang digunakan harus kompatibel dengan kisaran jumlah obat yang luas dan bahan tambahan farmaseutik, dan dalam kondisi tertentu harus dapat bersesuaian dengan pelarut obat.
- h. Jika sediaan transdermal dirancang dalam bentuk sediaan konvensional, maka sediaan harus dapat disebar (dioleskan) dengan mudah dan merata dan nyaman pada kulit.
- i. Bahan peningkat penetrasi yang digunakan harus dapat diformulasi dalam bentuk krim, salep, gel, lotion, suspensi, aerosol, plester obat, dan jenis penghantar lainnya.

- j. Bahan peningkat penetrasi seharusnya berbau lemah, tidak berasa, tidak berwarna, dan relatif murah.

Jenis Bahan Peningkat Penetrasi

Sejumlah besar senyawa telah dilaporkan dapat meningkatkan penetrasi obat melintasi kulit. Secara garis besar, beberapa peneliti menggolongkan jenis senyawa peningkat penetrasi menjadi 3 golongan, yaitu:

- a. Golongan senyawa asam lemak sederhana, surfaktan dengan struktur polarnya, alkohol dan keton terpen;
- b. Senyawa yang berfungsi sebagai pelarut dan memiliki ikatan hidrogen (ct. dimetilsulfoksida, dimetilacetamid dan dimetilformamid);
- c. Senyawa dari golongan hidrokarbon terpen.

Hanya sedikit dari golongan senyawa pada yang memiliki sifat yang ideal dalam menghantarkan obat melintasi kulit menuju sirkulasi sistemik berkaitan dengan takaran penggunaannya. Dalam beberapa kasus, *enhancer* (bahan peningkat penetrasi) yang digunakan untuk mendapatkan *flux* yang efektif terapeutik adalah pada penggunaan konsentrasi sangat tinggi (contohnya dimetilsulfoksida > 60%), *enhancer* yang demikian menyebabkan kerusakan pada lapisan *stratum korneum*, sehingga terjadi reaksi iritasi dan beberapa efek samping lainnya.

Pada awalnya, penggunaan senyawa dengan bobot molekul besar (seperti protein dan peptida) dinyatakan tidak efektif sebagai peningkat penetrasi, tetapi pada perkembangannya, senyawa tersebut dipertimbangkan penggunaannya sebagai bahan peningkat penetrasi yang tidak toksik dan dipromosikan bahwa penggunaan senyawa dengan bobot molekul besar ini dapat meningkat.

Interaksi bahan-bahan peningkat penetrasi dengan kulit, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Peningkatan permeabilitas oleh air

Hidrasi pada kulit normal merupakan cara alami dalam membantu penetrasi molekul dan merupakan faktor penting dalam kecepatan senyawa melintasi perkutan. Hidrasi kulit dilaporkan efektif untuk meningkatkan proses penetrasi perkutan.

Pada saat hidrasi, stratum korneum akan mengembang secara kontinyu dengan masuknya air dan kemampuan absorpsinya menjadi 10 kali lebih besar dibandingkan dalam kondisi kulit kering. Air akan terikat pada keratin interselular dan peningkatan permeabilitas terjadi dengan cepat hingga kemudian menurun saat difusi mencapai keadaan lunak.

Tabel 3.1. Tipe senyawa peningkat penetrasi berdasarkan struktur kimia dan gugus fungsionalnya (Songkro, 2009).

Type	Example
Water	Water
Sufoxides and similar compounds	dimethylsulfoxide, dimethylacetamide, dimethylformamide
Pyrrolidones	2-pyrrolidone, N-methyl-2-pyrrolidone, 1-lauryl-2-pyrrolidone
Alkohols	ethanol, 1-octanol, 1-hexanol, 1-decanol, lauryl alkohol, linolenyl alkohol
Glycols	propylene glycol,

	butane-1,2-diol, polyethylene glycol 400
Urea and derivatives	urea, 1-dodecylurea, 1-dodecyl-3- methylurea, 1- dodecyl-3- methylthiourea
Azone and derivatives	Azone (laurocapram; 1- dodecylazacyclohept an-2-one), 1-alkyl- or 1- alkenylazacycloalkan ones
Enzymes	Acid phosphatase, calonase, papain
Iminosulfuranes	<i>S, S</i> -dimethyl- <i>N</i> -(5- nitro-2-pyridyl) iminosulfurane, <i>S, S</i> - dimethyl- <i>N</i> -(4- bromobenzoyl) iminosulfurane
Cyclodextrins	2-hydroxypropyl- β - cyclodextrin, methylated- β - cyclodextrin
Fatty acid esters	cetyl lactate, butylacetate, isopropyl myristate
Fatty acids	alkanoic acids, oleic acid, lauric acid, capric acid
Surfactants	sorbitan monopalmitate, sorbitan trioleate,

	cetyl trimethyl ammonium bromide, sodium lauryl sulfate
Terpenes	limonene, nerolidol, farnesol, carvone, menthone
Monoolein	monoolein
Oxazolidinones	4-decyloxazolidin-2-one, 3-acetyl-4-decyloxazolidin-2-one


b. Pembawa dan interaksinya dengan kulit



Pembawa dan komponen lain dapat berinteraksi dengan lipid stratum koeneum untuk meningkatkan permeabilitas kulit. Peningkatan permeabilitas kulit akibat interaksi pembawa dengan lipid stratum korneum berlangsung berdasarkan mekanisme berikut ini :

- 1) Merusak struktur *lipid bilayer* pada interselular
- 2) Berinteraksi dengan protein interselular pada stratum korneum
- 3) Peningkatan partisi obat, *co-enhancer*, atau *cosolvent* ke dalam stratum korneum
- 4) Merusak selubung korneosit dengan menggunakan *caustic agent* seperti fenol 7% dan hidrokarbon.
- 5) Efek pada protein penghubung seperti desmosom, yang terlibat dalam peristiwa kohesi squamae
- 6) Perubahan partisi antara komponen stratum korneum dan lipid dalam jalur difusi

Ilustrasi tentang mekanisme pembawa dan komponennya pada kulit, ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Mekanisme aksi bahan peningkat penetrasi pada *lipid bilayer* stratum korneum (Walters, K.A. 2002)

Pelarut/ Pembawa	efek	
Lipoidal kolesterol, fosfolipid Azone	Masuknya molekul pelarut pada bagian ekor (lipid) menyebabkan fluidisasi karena hilangnya struktur lipid	
Pelarut polar	Masuknya molekul polar ke dalam bagian polar (<i>head group</i>) menyebabkan fluidisasi kerana hilangnya pengepakan struktur.	
Pelarut organik	Pelarutan dan ekstraksi lipid dari bilayer	

	menyebabkan hilang dan rusaknya rangkaian struktur lipid bilayer	
Air DMSO	Formasi air berkumpul di sekeliling <i>polar head group</i> dan memfasilitasi jalur polar atau menyiapkan kanal melintasi <i>lipid bilayer</i>	
Liposom	Memfasilitasi transport melalui pergerakan struktur liposom dalam daerah ekor (lipid) pada <i>lipid bilayer</i>	

Beberapa metode telah digunakan untuk menilai efek *enhancer* terhadap permeabilitas membran. Flux yang rendah atau permeabilitas yang konstan dari suatu pembawa yang digunakan tidak selalu menyiratkan bahwa telah terjadi peningkatan penetrasi melintasi

kulit (tabel...). Rasio fluks melintasi kulit dan membran inert dari pembawa yang diberikan tidak tergantung dari aktivitas solute di dalam pembawa; dan didefinisikan sebagai rasio koefisien permeabilitas melalui kulit dan membran

c. Interaksi Obat dengan kulit

Saat ini, interaksi obat dengan kulit telah diukur dari kelarutan obat dalam stratum korneum dan kemampuan difusi obat dalam lipid stratum korneum. Interaksi ini menarik jika ditinjau dari dua sudut pandang substansivitas dan korosivitasnya.

Substansivitas adalah pengukuran ikatan solute pada sisi ikatan (*binding site*) di stratum korneum, yang menunjukkan resistensi terhadap pencucian atau penghilangan. Resistensi ini menyebabkan obat dapat bertahan lebih lama di stratum korneum dan jika afinitasnya terhadap sel-sel di bawah stratum korneum lebih tinggi, maka obat akan meninggalkan stratum korneum menuju sel epidermis berikutnya.

Korosivitas senyawa berimplikasi terhadap kerusakan stratum korneum. Kerusakan ini akan menghilangkan fungsi *barrier* stratum korneum sehingga obat dapat berpenetrasi ke lapisan kulit yang lebih dalam.

Tabel 3.3. Efek pembawa pada struktur stratum korneum

Pelarut/ pembawa	Efek	
Air dan bahan lain yang dapat meningkatkan hidrasi	Meningkatkan lokalisasi air dan pengembangan bagian keratin interseluler dari korneosit, membentuk jalur polar	
Caustic solvens Asam-asam Fenol-fenol	Merusak tautan desmosom dan memisahkan korneosit (meninggalkan stratum korneum), sekaligus merusak susunan keratin interselular	

Beberapa jenis bahan peningkat penetrasi akan dijelaskan pada buku ini satu per satu, dengan mempertimbangkan bahwa *enhancer* ini sering digunakan, memiliki toksisitas yang rendah, dan dipertimbangkan penggunaannya dalam sistem penghantaran obat transdermal (*Transdermal Drugs Delivery Sistem*).

a. Asam lemak

Asam lemak mengandung rantai hidrokarbon alifatik dan inti karboksilat. Asam lemak berbeda-beda

tergantung panjang rantai hidrokarbonnya, jenuh atau tidak jenuh, jumlah, posisi, dan konfigurasi ikatan rangkapnya serta adanya cabang dan substituenya.

Asam lemak rantai panjang secara luas sangat potensial digunakan sebagai peningkat penetrasi. Berbagai studi tentang asam lemak difokuskan pada asam oleat, suatu asam lemak tak jenuh tunggal (*mono unsaturated*). Aktifitas peningkatan penetrasi yang ditunjukkannya tergantung pada kosolven yang digunakan, misalnya propilen glikol yang biasanya memberi efek sinergis.

Efek peningkat penetrasi asam lemak tergantung pada beberapa faktor, yaitu sifat fisika-kimia alami *permeant*, pembawa yang digunakan untuk menghantarkan *permeant*, jenis asam lemak, konsentrasi, serta struktur kimia asam lemak. Asam lemak meningkatkan penetrasi percutan *permeant* dengan merusak struktur *lipid bilayer (tail-lipid group)* interseluler pada stratum korneum yang diamati dengan spektroskop infra merah.

Asam lemak berpotensi menyebabkan iritasi kulit, maka perlu dibatasi penggunaannya. Kekuatan dalam megiritasi tergantung pada konsentrasi asam lemak yang digunakan. Telah dilaporkan (Loftsson et.al., 1987 dan Fang et.al., 2003) bahwa penggunaan asal oleat 5% dalam propilen glikol selama 6 jam, menyebabkan iritasi minor pada 6 sukarelawan (manusia) dan pada konsentrasi 20% asam oleat dalam propilen glikol telah menyebabkan iritasi berat. Penelitian yang dilakukan oleh Touitou et.al (2008) menyatakan bahwa penggunaan asam oleat 10% dalam larutan etanol berefek pada morfologi sel Langerhans epidermis dan menyebabkan penurunan densitas se-sel tersebut.

Seperti diketahui bahwa sel Langerhans berperan dalam pembentukan antigen pada kulit. Oleh karena itu dalam memformulasi sediaan transdermal dengan peningkat penetrasi asam lemak diperlukan kontrol konsentrasi serta kosolven yang digunakan.

b. Surfaktan

Surfaktan digunakan secara luas dalam formulasi sediaan farmasi, kosmetik, *toiletries*, dan makanan. Penggunaannya sebagai peningkat kelarutan, detergen, agen pembasah, adhesive, emulgator, dan pensuspensi. Umumnya surfaktan terdiri dari alkil lipofilik atau rantai aryl bersama dengan bagian hidrofiliknya (*hydrophilic head group*).

Surfaktan dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori berdasarkan keberadaan muatan pada bagian hidrofiliknya, yaitu surfaktan anionik, kationik, nonionik dan amfoter.

- 1) Surfaktan anionik; bagian hidrofiliknya bermuatan negatif seperti karboksil (RCOO^-), sulfonat (RSO_3^-) atau fosfat (ROPO_3^-).
- 2) Surfaktan kationik; bagian hidrofiliknya bermuatan positif contohnya ammonium kuartener (R_4N^+) dan R-nya dapat berupa gugus yang sama atau berbeda.
- 3) Surfaktan nonionik; bagian hidrofiliknya tidak bermuatan. Surfaktan dari golongan ini yang digunakan sebagai bahan peningkat penetrasi difokuskan hanya pada lima jenis surfaktan, yaitu polisorbat, sorbitan ester, polioksietilen alkil eter, polioksietilen alkilfenol, dan poloxamer.

- 4) Amfoter; molekulnya mengandung kedua jenis muatan (positif dan negatif) contohnya $RN^+(CH_3)_2CH_2CH_2SO_3^-$

Tabel 3.4. Jenis Surfaktan nonionik yang sering digunakan sebagai enhancer (Songkro, 2009)

Grup	Nama kimia	Nama dagang
Polisorbat	Polyoxyethylen(20) monolaurat	sorbitan Tween 20
	Polyoxyethylen(20) monopalmitat	sorbitan Tween 40
	Polyoxyethylen(20) monostearat	sorbitan Tween 60
	Polyoxyethylen(20) monooleat	sorbitan Tween 80
Sorbitan ester	Sorbitan monolaurat	Span 20
	Sorbitan monopalmitat	Span 40
	Sorbitan monostearat	Span 60
	Sorbitan monooleat	Span 80
Polyoxyethylen Alkyl eter	Polyoxyethylen (4)lauryl eter	Brij 30
	Polyoxyethylen (23) lauryl eter	Brij 35
	Polyoxyethylen (2) cetyl eter	Brij 52
	Polyoxyethylen (10) cetyl eter	Brij 56
	Polyoxyethylen (2)stearyl eter	Brij 72
	Polyoxyethylen (20) oleyl eter	Brij 98
	Polyoxyethylen (6) cetyl eter	Texafor A 6
Polyoxyethylen	Polyoxyethylen (10) octyl phenol	Triton X-100
Alkil fenol	Polyoxyethylen (10) nonyl phenol	Rewopal HV 10

Poloxamer	Polyoxyethylen (140) polyoxypropylene (26-31)	Pluronic F68
	Polyoxyethylen (15) polyoxypropylene(26-31)	Pluronic L62
	Polyoxyethylen (25) polyoxypropylene (26-31)	Pluronic L64

Sebagai peningkat penetrasi kulit, surfaktan bekerja secara langsung pada sifat *barrier* kulit dan bekerja tidak langsung pada aktivitas termodinamika *permeant* sehingga meningkatkan kekuatan difusi *permeant* ke dalam kulit. Monomer dari surfaktan dapat berpenetrasi dan berinteraksi dengan kulit dan memodifikasi sifat *barrier*-nya, sehingga memudahkan penetrasi *permeant* ke dalam kulit, di sisi lain, misel yang mempunyai kapasitas pelarutan yang kuat akan menurunkan aktifitas termodinamika *permeant* dalam pembawanya, sehingga meningkatkan kecepatan transport *permeant*.

Penggunaan surfaktan nonionik konsentrasi 5% dapat meningkatkan fluks obat, tetapi dapat menyebabkan kerusakan kulit, sehingga konsentrasi ini dinyatakan sebagai konsentrasi tertinggi untuk penggunaannya sebagai peningkat penetrasi.

Surfaktan ionik (kationik dan anionik) menunjukkan kemampuannya sebagai peningkat penetrasi yang lebih tinggi dibandingkan surfaktan nonionik, tetapi menimbulkan kerusakan sel yang lebih tinggi dibanding surfaktan nonionik.


Efek sinergis penggunaan kombinasi surfaktan anionik (natrium laurilsarkosinat) dan surfaktan nonionik (sorbitan monolaurat) telah dilaporkan dapat meningkatkan fluks obat transdermal dibandingkan

penggunaan tunggal dan penggunaan kombinasi ini dapat mengurangi efek iritasi pada kulit (karande et.al.,2004).

Kemampuan surfaktan sebagai peningkat penetrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu grup fungsionalnya, panjang rantai karbonnya, tingkatan dan posisi tidak jenuhnya, sifat fisika kimia *permeant*, pembawa, dan penggunaan surfaktan tunggal atau kombinasi.

Surfaktan meningkatkan permeasi *permeant* pada kulit melalui mekanisme pengikatan pada protein stratum korneum. Pengikatan ini menyebabkan sifat *barrier* stratum korneum menurun. Surfaktan anionik bekerja dengan merusak matriks lipid interseluler, sehingga menyebabkan kehilangan lipid interseluler dan menjadikannya jalur pelintasan *permeant*. Disamping itu *enhancer* ini juga meningkatkan hidrasi jaringan akibat terpaparnya sisi ikatan airnya (*water-binding site*).

Beberapa masalah yang ditemui dari penggunaan surfaktan (anionik dan kationik) sebagai peningkat penetrasi adalah terjadinya iritasi kulit dan pengembangan stratum korneum.




Gambar 3.6. Mekanisme pembukaan jalur pelintasan oleh *enhancer*


c. Terpen

Terpen adalah senyawa alami yang tersusun atas hidrokarbon dan memiliki derivat yang teroksidasi seperti alkohol, aldehyd, keton, oksida-oksida, dan ester. Terpen sering dijumpai sebagai kandungan minyak esensial pada tanaman. Terpen tersusun dari unit-unit isoprene (C_5H_8) terorientasi dari kepala sampai ekor, membentuk rantai lurus atau cincin. Kategori terpen didasarkan pada jumlah unit isoprene-nya. Sebagai contoh, terpen yang tersusun dari dua unit isoprene diklasifikasikan sebagai monoterpen (C_{10}), terpen dengan tiga unit isoprene diklasifikasikan sebagai sesquiterpen (C_{15}). Disamping itu, terdapat jenis terpen dengan substitusi cincin isoprene pada strukturnya (ct.


asiklik, monosiklik, disiklik, dan seterusnya), atau disubsidi oleh grup kimia lain (ct. alkohol, aldehid, keton, dan lainnya)



A.



B.



C.

Gambar 3.7. Struktur kimia beberapa peningkat penetrasi kimia.(A).monosiklik terpen: menthae (kiri),menthone (tengah),dan menthol (kanan); (B) monoolein (atas) asam oleat (bawah): (C) 4-decycloxazolidin-2-one (Songkro et.al, 2010)

Senyawa terpen dipertimbangkan sebagai bahan peningkat penetrasi karena memiliki kemampuan yang tinggi dalam meningkatkan penetrasi perkutan dengan efek iritasi kulit yang rendah, toksisitas sistemik yang

rendah, serta meningkatkan permeasi obat pada konsentrasi penggunaan yang rendah (1-5%). Sebagai peningkat penetrasi, terpen dapat digunakan sendiri (tunggal) atau dikombinasi dengan propilen glikol atau alkohol. Pemilihan kosolven sangat berpengaruh terhadap aktifitas peningkatan penetrasi senyawa terpen. Efek sinergi ditunjukkan pada kombinasi terpen dengan propilen glikol atau alkohol.

Penggunaan senyawa terpen sebagai peningkat penetrasi mampu meningkatkan absorpsi perkutan obat-obat hidrofilik dan lipofilik. Struktur kimia terpen dan sifat fisika kimia obat merupakan hal yang penting dalam aktivitas terpen sebagai peningkat penetrasi. Kandungan oksigen pada senyawa terpen polar (ct. carvacrol, mentol) potensial untuk obat-obat hidrofilik (ct. propranolol hidroklorida), dibanding senyawa terpen lipofilik (limonene, p-mentnen). Senyawa hidrokarbon monoterpen digunakan untuk meningkatkan absorpsi perkutan obat-obat lipofilik.

Sebagai peningkat penetrasi, senyawa terpen bekerja dengan merusak *lipid bilayer* interselular (diamati dengan difraksi sinar X). Senyawa terpen juga menyiapkan jalur pelintasan senyawa polar pada stratum korneum untuk penetrasi ion-ion dan obat yang bersifat polar (pengukuran konduktivitas listrik kulit). Melalui pengamatan *paramagnetic electron resonansi*, terlihat bahwa senyawa terpen melarutkan lipid stratum korneum dan memutuskan ikatan hydrogen pada persambungan antarmuka polar di stratum korneum.

Mekanisme aksi senyawa terpen dalam meningkatkan penetrasi perkutan tergantung dari sifat *permeant*-nya (hidrofilik atau lipofilik). Pada kasus permeasi senyawa hidrofilik 5-fluorourasil, *enhancer*

berfungsi dengan meningkatkan difusi obat di stratum korneum (William, Barry, 1991). Untuk permeant yang bersifat lipofilik seperti estradiol, enhancer beraksi dengan mereduksi sifat barrier stratum korneum dan meningkatkan partisi obat ke dalam stratum korneum. Dari aksi yang diperlihatkan oleh senyawa terpen ini, maka dapat dinyatakan bahwa senyawa ini sangat potensial sebagai *enhancer*.

Hampir semua senyawa terpen dinyatakan aman berdasarkan *Food and Drug Administration* (FDA) US. Hal ini telah diuji berdasarkan *Draize scoring method* yang menunjukkan bahwa sifat iritasi senyawa terpen sangat lemah dibandingkan azone pada konsentrasi yang sama pada ointment, tidak menyebabkan eritema pada semua konsentrasi yang diujikan.

d. Polimer-polimer

Polimer adalah molekul besar yang mengandung gabungan molekul kecil. Unit yang terkecil disebut monomer. Polimer banyak digunakan dalam aplikasi farmaseutik, misalnya dalam mengontrol kecepatan penghantaran obat. Pada dasarnya polimer diklasifikasikan menjadi dua tipe yaitu polimer alam dan polimer sintetik. Karena bobot molekul polimer umumnya besar, maka sebagian besar polimer tertahan pada stratum korneum dan tidak signifikan yang berhasil menembus stratum korneum. Oleh karena itu efek samping berupa reaksi inflamasi dan iritasi terbatas. Karena keamanannya, maka beberapa variasi polimer telah disintesis dan diuji kemampuannya sebagai peningkat penetrasi. Jenis polimer tersebut antara lain benzalkonium klorida dan heksadesilpiridinium bromide tipe polimer, polietilen glikol/

polidimetilsiloksan (PEG/PDMS) blok kopolimer dengan kationik pada grup akhirnya, β -glukopiranosil diakhiri dengan gugus oligodimetilsiloksan (Glc-ODMS). Polimer-polimer ini telah dibuktikan mampu meningkatkan penetrasi percutan beberapa obat.

Aktifitas peningkatan penetrasi percutan dari polimer tergantung pada beberapa faktor, antara lain adalah bobot molekul polimer, panjang rantai, tipe monomer, dan sifat alami permeant. Peningkatan bobot molekul polimer menyebabkan penurunan aktivitas penetrasi percutan.

Polimer meningkatkan penetrasi percutan melalui interaksi polimer dengan lipid dan keratin dalam stratum korneum. Polimer juga dapat meningkatkan koefisien partisi obat ke dalam stratum korneum. Dalam kasus dendrimers, perubahan dalam spektrum FTIR telah menunjukkan interaksi antara dendrimers dan kepala kutub polar Seramida kulit dan asam lemak bebas.

Uji Potensi iritasi kulit polimer linear telah diuji dengan menggunakan tes Draize pada kelinci dan iritasi kulit tidak teramati. Dendrimer juga tidak menyebabkan iritasi kulit.

Tabel 3.5. Polimer alam dan sintetik (Songkro, 2009)

Polimer	
Alam	Sintetik
Casein	Polyetilen glikol
Gelatin	Polylactic acid
Dextran	Polianhidrida
Amilum	Polikarbonat
Kolagen	Polilakton
Natrium Alginat	Poliester

Selulosa	Poliesteramid
Kitin	Poliuretan
Karet alam	Polivinil alkohol
Gom arab	Polipropilen

e. Monoolein

Monoolein adalah sebuah monoglyserida, dengan struktur mirip dengan asam oleat. Monoolein, adalah sebuah biodegradabel lipid polar, tidak larut dalam air tetapi molekulnya bersifat *self-associate*. Monoolein mampu membentuk fasa bicontinuous kubik kristal cair yang dapat digunakan sebagai sistem penghantar obat. Meski secara tradisional digunakan sebagai pengemulsi dan bahan tambahan makanan, tetapi senyawa ini telah mendapat perhatian besar selama satu dasawarsa terakhir sebagai peningkat penetrasi kulit. Pada awalnya, penggunaan utamanya pada sediaan topical dibanding sebagai penghantar obat transdermal.

Monoolein telah dilaporkan dapat meningkatkan penetrasi perkutan beberapa senyawa obat. Monoolein dapat berfungsi sebagai enhancer dengan mengganggu *lipid bilayer* di stratum korneum, meningkatkan fluiditas lipid di stratum korneum. Selain itu, itu dapat menghapus seramida kulit dan melarutkan senyawa lipophilik di dalam kulit.

Meskipun monoolein tidak toksik, tetapi iritasi kulit dapat terjadi karena penggunaan *monoolein-base liquid cristal*. Penggunaan fase kristal cair monoolein dan air untuk penghantaran topical cyclosporine dapat menginduksi iritasi kulit pada mencit yang telah dicukur bulunya setelah terpapar selama 3 hari (Lopes et.al, 2006).

f. Oxazolidindion

Oxazolidindion adalah kelas senyawa yang mengandung 2-oxazolidon sebagai bagian dari strukturnya. Lebih dari satu dekade, beberapa oxazolidindion telah disintesis dan dipatenkan sebagai senyawa peningkat penetrasi. Oxazolidindion adalah senyawa dengan bobot molekul besar dan mempunyai struktur yang mirip spingosin dan seramid kulit (senyawa alam yang ditemukan di bawah lapisan kulit). Oxazolidindion dapat melokalisasi permeant di lapisan kulit dan meningkatkan permeasi sistemik. Senyawa ini tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga sangat menarik digunakan dalam sediaan kosmetik dan produk-produk perawatan.

Beberapa jenis senyawa oxazolidindion yang sering digunakan adalah 4-decyloxazolidin-2-one (DermacSR-38). Senyawa ini telah dilaporkan dapat meningkatkan retensi beberapa senyawa pada bagian tertentu di kulit.

Mekanisme aksi mekanisme kerja dari oksazolidinon mungkin melibatkan interaksi dengan lipid stratum korneum. Telah dilaporkan bahwa 4-decyloxazolidin-2-one dapat mengalirkan *lipid bilayer* di stratum korneum, dengan demikian meningkatkan penetrasi berbagai bahan aktif di kulit. Sebagai *enhancer* 4-decyloxazolidin-2-one tidak menyebabkan iritasi kulit pada manusia.

Pemilihan Jenis Bahan Peningkat Penetrasi.

Sistem penghantaran melalui kulit dapat diformulasi untuk menghantarkan senyawa aktif ke permukaan kulit untuk aksi lokal; ke stratum korneum; ke appendageal kulit; ke sel-epidermis aktif (*viable epidermis*) dan dermis; atau ke pembuluh darah di dermis

untuk efek sistemik. Jika kita mempertimbangkan sisi target obat/formulasi, maka dapat disarankan bahwa tidak semua jenis produk kulit memerlukan penggunaan bahan kimia peningkat penetrasi. Dalam kasus obat-obatan dengan target permukaan kulit tertentu, seperti *sunscreens* dan pestisida, *retardants* lebih baik dibanding *enhancer*, formula tersebut hanya dimaksudkan untuk permukaan kulit. Tidak seperti senyawa peningkat penetrasi kulit, fungsi *retardants* adalah untuk mempertahankan bahan-bahan aktif di permukaan kulit dan mencegah bahan aktif menembus ke dalam stratum korneum dan ke lapisan kulit yang lebih dalam.

Penggunaan sediaan pada stratum korneum (ct. pelembab), dan pengobatan kelainan *appendageal* kulit (ct. sediaan anti acne), maka peningkat penetrasi tidak diperlukan. Berbeda dengan sediaan yang ditujukan untuk penanganan viable epidermis dermis dan penghantaran sistemik melalui absorpsi perkutan, maka untuk mencapai efek terapeutiknya, maka sediaan harus diformulasi dengan penambahan bahan peningkat penetrasi.

Pemilihan bahan peningkat penetrasi selayaknya harus ditentukan berdasarkan penelitian, untuk mendapatkan *enhancer* yang baik, yakni dengan membandingkan sifat fisika kimia *enhancer* dengan *permeant*; mengamati sifat kelarutan *enhancer* pada kulit; sifat fisika kimia dan hubungannya dengan potensinya sebagai *enhancer*; melalui studi tentang hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas (HKSA), dan lain-lain.

Tabel 3.6. Jenis bahan peningkat penetrasi

Jenis	Contoh
Air	Air
Sulfoksida dan senyawa sejenis	dimethylsulfoxide, dimethylacetamide, dimethylformamide
Pirolidon	2-pyrrolidone, N-methyl-2-pyrrolidone, 1-lauryl-2-pyrrolidone
Alkohol	ethanol, 1-octanol, 1-hexanol, 1-decanol, lauryl alkohol, linolenyl alkohol
Glikol	propylene glycol, butane-1,2-diol, polyethylene glycol 400
Urea dan turunannya	urea, 1-dodecylurea, 1-dodecyl-3-methylurea, 1-dodecyl-3-methylthiourea
Azon dan turunannya	Azone (laurocapram; 1-dodecylazacycloheptan-2-one), 1-alkyl-or 1-alkenylazacycloalkanones
Enzym	Acid phosphatase, calonase, papain
Iminosulfuran	S, S-dimethyl-N-(5-nitro-2-pyridyl) iminosulfurane, S, S-dimethyl-N-(4-bromobenzoyl) iminosulfurane
Siklodekstrin	2-hydroxypropyl- α -cyclodextrin, methylated- α -cyclodextrin
Ester asam lemak	cetyl lactate, butylacetate, isopropyl myristate
Asam lemak	alkanoic acids, oleic acid, lauric acid, capric acid
Surfaktan	sorbitan monopalmitate, sorbitan trioleate, cetyl trimethyl ammonium bromide, sodium lauryl sulfate
Terpen	limonene, nerolidol, farnesol, carvone, menthone

Polimer	β -D -glucopyranosyl-terminated oligodimethylsiloxanes, 1-alkyl-3- β -D -glucopyranosyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxanes
Monoolein	Monoolein
Oksazolidinon	4-decyloxazolidin-2-one, 3-acetyl-4-decyloxazolidin-2-one

C. Pertimbangan Formulasi Sediaan Transdermal

Penghantaran obat melintasi kulit menuju sirkulasi sistemik telah menyediakan rute pemberian obat untuk berbagai indikasi klinik. Rute pemberian obat ini membawa kemajuan dari bentuk sediaan dan rute pemberian obat yang lazim digunakan sebelumnya dengan berbagai kelebihan yang ditawarkannya, baik dari sisi efektivitas dan efisiensi penggunaan obat, juga dari sisi kenyamanan bagi pasien.

Singh dan Kumar mengemukakan bahwa, sistem penghantar transdermal merupakan pemberian terapeutik melalui kulit untuk menghasilkan efek sistemik. Pemberian obat secara transdermal memberikan beberapa keuntungan dibandingkan dengan tablet, kapsul, dan injeksi. Metha (2004), juga mengungkapkan, transdermal bukan hanya meningkatkan kepatuhan para pasien tetapi juga keseragaman konsentrasi obat dalam plasma selama pemakaian (Hendrati, 2009).

Dari karakteristiknya, kulit menjadi populer sebagai sisi yang potensial untuk penghantaran obat tujuan sistemik (*systemic drug delivery*), karena: (Ranade, Vasant V and Hollinger, Manfred, 2004, Walters, K.A. 2002, Shargel, Leon, 2005)

- a. Terhindar dari masalah lambung kosong, efek pH, dan deaktivasi oleh enzim sehubungan dengan lintasan di gastrointestinal. Beberapa fenomena yang memengaruhi absorpsi melalui gastrointestinal untuk sediaan oral dapat dihindari, seperti terurainya obat dalam lingkungan asam lambung, obat-obat contohnya yang tergolong dalam AINS dapat menyebabkan perdarahan dan iritasi pada gastrointestinal, serta hambatan absorpsi akibat tercampurnya obat dan makanan dalam lambung.
- b. Terhindar dari metabolisme lintas pertama di hati. Tidak terjadinya lintas pertama di hepar (*first pass hepatic metabolism*), meminimalkan metabolisme lintas pertama seperti untuk sediaan oral, dimana hal ini yang menyebabkan rendahnya bioavailabilitas obat oral.
- c. Senyawa dengan indeks terapi yang sempit dapat digunakan dengan lebih mudah.
- d. Keluhan pasien karena frekuensi penggunaan obat-obat dengan waktu paruh yang singkat dan trauma akibat pemberian parenteral dapat dihindari.
- e. Secara teori, tidak ada masalah dengan waktu penghantaran seperti yang mungkin terjadi pada jalur gastrointestinal, dimana dalam keadaan tunak penghantar obat dapat dipertimbangkan dengan kadar plasma yang konstan
- f. Resiko over dosis dan efek samping ketika obat masuk ke sirkulasi dapat dihentikan karena pengobatan dapat dimulai dan diakhiri kapan saja melalui penggunaan plester (*patch*), memungkinkan pengontrolan input, misalnya dengan penghentian hantaran melalui penghilangan alat/sediaannya dari permukaan kulit.

- g. Merupakan sistem penghantar yang mampu melepaskan obat secara perlahan sehingga mampu memelihara kadar tunak dalam plasma untuk obat-obat dengan waktu paruh singkat, mengontrol input kinetik dan mengurangi efek samping sistemik.
- h. Mengurangi jadwal penggunaan obat menjadi sekali sehari, bahkan sekali seminggu
- i. Berpotensi dalam meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengobatan
- j. Menyenangkan bagi pasien, dari segi fleksibilitas penggunaan obat, kemudahan untuk mengurangi dan mengubah dosis, serta kemudahan pengaturan dosis sesuai kebutuhan pasien.
- k. Sediaan transdermal dapat digunakan pada pasien yang tidak kooperatif, dan dapat dibantu oleh orang lain dalam pemberiannya.

Sifat *barrier* dari lapisan subkutan menyebabkan tidak efektifnya penetrasi molekul ionik dan senyawa yang sangat polar. Penetrasi molekul lipofilik mudah menembus *barrier* tersebut, akan tetapi penetrasinya dicegah oleh bagian hidrofilik dari kulit (epidermis dan dermis). Molekul kecil ampifilik dengan titik lebur yang rendah dan kelarutannya baik dalam minyak (komponen stratum korneum) dan air (epidermis dan dermis) memiliki kesempatan untuk melintasi kulit. Molekul besar seperti peptida dan protein sangat sulit untuk dihantarkan, oleh karena itu jumlah produk transdermalnya di pasaran sangat terbatas (Grassi, Mario, et.al, 2007).

Absorpsi transdermal suatu zat ke dalam stratum korneum merupakan proses kompleks dari rancangan formulasi sediaan transdermal. Namun

sediaan transdermal memiliki keterbatasan yang disebabkan efektivitas fungsi sawar kulit. Molekul yang polar dan besar tidak dapat berpenetrasi dengan baik ke dalam stratum korneum. Hal lain yang patut diperhitungkan adalah sifat fisika kimia obat meliputi bobot molekul, kelarutannya dalam air, dan titik leleh, pH, dan koefisien partisi (Gibson, 2004:215).

Bagaimanapun, kontrol penghantaran zat terlarut melintasi kulit menjadi hal yang menarik, lebih lanjut, berkembang teknologi untuk mendukungnya, seperti peningkatan penetrasi kimia (*chemical penetration enhancement*), penggunaan kekeuatan tanpa tergantung gradient konsentrasi (ct. *iontophoresis, phonophoresis, sonophoresis, electrophoresis, microneedle, jet injector*, dan lain-lain), *microinvasive delivery, vesicular carriers* (ct. liposom, niosom, ethosom, transferosomes), *electrically assisted enhancement*, dan sebagainya (Walters, K.A. 2002; Grassi, Mario, et.al, 2007).

Mengingat banyaknya bahan obat yang diperuntukkan bagi penggunaan topikal, regional atau bahkan transdermal, maka perlu diimplementasikan suatu metoda yang dapat meningkatkan ketercampuran dengan molekul penyusun subkutan.

Inovasi penghantaran obat ini memiliki keunggulan dibandingkan jalur panghantaran obat yang lain, di antaranya (Gaur, dkk, 2009:18):

- a. Meminimalisasi ketidakteraturan absorpsi dibandingkan dengan jalur oral yang dipengaruhi oleh pH, makanan, kecepatan pengosongan lambung, waktu transit usus, dan lain-lain.

- b. Obat terhindar dari *first passed effect*.
- c. Terhindar dari degradasi oleh saluran gastrointestinal
- d. Jika terjadi efek samping yang tidak diinginkan (misal reaksi alergi, dan lain-lain) pemakaian dapat dengan mudah dihentikan.
- e. Absorpsi obat relatif konstan dan kontinyu
- f. Input obat ke sirkulasi sistemik terkontrol serta dapat menghindari lonjakan obat sistemik
- g. Relatif mudah digunakan dan dapat didesain sebagai sediaan lepas terkontrol yang digunakan dalam waktu relatif lama (misalnya dalam bentuk *transdermal patch* atau semacam plester) sehingga dapat meningkatkan *patient compliance*.

Disamping kelebihan yang ditawarkan oleh sediaan transdermal, beberapa kelemahan yang patut diperhatikan adalah:

- a. Waktu kontak sediaan yang lama pada permukaan kulit berpotensi menyebabkan iritasi
- b. Reaksi eritema, gatal dan udem lokal dapat terjadi akibat obat atau bahan adesif ataupun komponen dalam formula sediaan.

IV

SISTEM PENGHANTARAN OBAT TRANSDERMAL (*Transdermal Drugs Delivery Sistem*)

Penghantaran obat (*drug delivery*), yang mempertimbangkan pembawa, rute, dan target, telah berkembang menjadi sebuah strategi proses atau perangkat yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas agen terapeutik melalui pelepasan terkendali. Hal ini dapat melibatkan peningkatan bioavailabilitas, meningkatkan indeks terapi, atau meningkatkan penerimaan atau kepatuhan pasien. Penghantaran obat, atau pelepasan terkendali, telah ditetapkan oleh Flynn sebagai penggunaan cara apapun yang mungkin, baik itu kimia, fisiokimia, atau mekanis, untuk mengatur kecepatan akses obat ke kompartemen sentral tubuh, atau dalam beberapa kasus, langsung ke jaringan.

Dapat disimpulkan bahwa beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam merancang sistem

penghantaran obat transdermal (Patel, 2005; Morrow *et al*, 2007) adalah:

- a. Interaksi obat dan pembawa
 - 1) Pemilihan obat yang tepat.
 - 2) Penyesuaian sifat kimia.
 - 3) Pasangan ion dan kompleks koaservasi.
 - 4) Sistem eutektikum.
- b. Modifikasi stratum korneum
 - 1) Hidrasi.
 - 2) Peningkat penetrasi kimia.
- c. Menghilangkan stratum korneum
 - 1) Menggunakan *microneedle*.
 - 2) Abrasi stratum korneum.
 - 3) Sistem pembawa *folicular*.
- d. Bantuan metode elektrik
 - 1) *Ultrasound (phonophoresis, sonophoresis)*.
 - 2) *Iontophoresis*.
 - 3) *Electroporation*.
 - 4) *Magnetophoresis*.
 - 5) Gelombang fotomekanik.
- e. Gelembung dan partikel
 - 1) Liposom.
 - 2) Niosom.
 - 3) Transferosom.
 - 4) *Ethosome*.

Dalam buku ini akan dijelaskan tentang sistem penghantaran obat dengan formula vesikel dan *patch*.

A. *Vesicle Drugs Delivery Sistem*

Kesulitan utama dalam mendesain obat untuk penggunaan transdermal adalah kemampuan penetrasinya melalui kulit. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk meningkatkan

penetrasi obat pada kulit, maka perlu dirancang bentuk sediaan yang menerapkan teknologi sistem penghantaran obat transdermal (*Transdermal Drugs Delivery Sistem*). Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penetrasi percutan suatu *permeant*, antara lain adalah dengan memformulasinya dengan suatu senyawa kimia peningkat penetrasi, menggunakan sistem *supersaturated*, gelembung (*vesicles*), *iontophoresis*, *electrophoresis*, *phonophoresis*, *mikroneedles*, *jet injector* dan lain-lain.


Banyak senyawa aktif terbatas kelarutannya dalam air, sehingga diperlukan suatu sistem penghantar yang cocok untuk obat-obat hidrofilik dan ampifilik. Suatu pendekatan untuk mengatasi masalah ini salah satunya adalah penggunaan gelembung berbasis lemak sebagai pembawa obat (Blazek, et al, 2001).

Beberapa tahun yang lalu, sistem gelembung (vesikel) telah dipromosikan sebagai sistem penghantaran obat yang terkendali dan terkontrol. Teknologi ini menjadi populer karena kelebihan yang ditawarkannya, antara lain karena toksisitasnya yang rendah, *biodegradable*, mampu mengenkapsulasi senyawa obat yang bersifat hidrofilik, lipofilik dan ampifilik, mampu melepaskan obat secara perlahan, mampu menghantarkan obat pada sisi target di organ atau jaringan, serta kemampuannya memperbaiki farmakokinetik obat dari bentuk sediaan dan rute pemberian yang lain.

Vesikel merupakan partikel koloid berbentuk gelembung yang berisi air pada bagian tengahnya (*core*) dan terbungkus oleh lapisan *lipid bilayer*. Sistem penghantar ini terbentuk dari molekul ampifilik (fosfolipid/surfaktan, dengan atau tanpa kolesterol)

yang membentuk *bilayer*. Obat-obat hidrofilik akan terserap pada bagian *core*, sedangkan obat yang bersifat lipofilik akan tersebar pada bagian lipid pada struktur *lipid bilayer*-nya (Cristina, *et al*, 2010:128).

Komposisi vesikel yang mirip penyusun stratum korneum dan membran sel membuatnya mampu berpenetrasi di kulit, melalui kedua jalur penetrasi percutan. Oleh karena itu, maka sistem ini dapat dijadikan sebagai pembawa obat untuk mengantarkan obat yang terserap didalamnya melewati kulit. Karena struktur gelembungnya, maka sistem penghantar ini juga dapat dijadikan sebagai depot untuk pelepasan terkendali dari bahan aktif. Formulasi sistem penghantaran obat vesikel dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu vesikel dengan struktur yang kaku seperti liposom dan niosom serta vesikel dengan struktur yang elastis seperti transferosom dan ethosom (Cristina, *et al*, 2010:129).




Gambar 4.1. Susunan vesikel

Formasi dan Sifat Asam Lemak

Afinitas vesikel terhadap berbagai jaringan dapat dimodifikasi melalui sintesis vesikel yang mengandung fosfolipid dengan berbagai konfigurasi rantai asam

lemak. Vesikel dibentuk dari asam lemak rantai pendek (< 14 atom C), hingga asam lemak rantai panjang (>14 atom C), dengan atau tanpa sabun. Vesikel konvensional (liposom) dibentuk dari fosfolipid (fosfatidilkolin), oleh karena itu sifatnya sangat berbeda dengan vesikel yang dibentuk dari asam lemak yang terdiri dari rantai ampifilik tunggal dengan bagian polar (*acidic head group*) yang lemah. Dalam pembentukan vesikel, molekul asam lemak akan memosisikan diri dan membentuk *lipid bilayer*, selanjutnya *lipid bilayer* tersebut akan melekuik dan secara spontan membentuk gelembung dengan kehadiran air (akan dijelaskan lebih detail pada bagian pembuatan vesikel).




Gambar 4.2. Formasi *lipid bilayer*

Vesikel asam lemak stabil secara termodinamika di atas temperatur transisi peleburan rantai campuran asam lemak/sabun dengan kisaran pH intermediat yang relatif sempit. Jika pH terlalu tinggi, maka transformasi vesikel ke dalam kisel dapat terjadi. Sebaliknya jika pH terlalu rendah, maka terbentuk tetesan-tetesan minyak. Ada daerah pH yang membantu eksistensi vesikel bilayer dan misel serta vesikel bilayer dan tetes minyak. Peningkatan stabilitas vesikel untuk pH yang lebih alkali

(hingga pH 11) dapat dicapai dengan menambahkan ke campuran asam lemak/sabun suatu alkohol lemak (ct. dodekanol ditambahkan ke dalam asam dodekanoat/dodekanoat; nonanol di tambahkan ke asam nonanoit/nonanoat). Sementara peningkatan stabilitas vesikel pada pH yang sangat asam dapat dilakukan melalui penambahan ke campuran asam lemak/sabun suatu surfaktan bermuatan negatif dengan pKb tinggi seperti sodium dodecylbenzenesulfonate (SDBS, pKb~15 atau lebih tinggi; dengan pKa~-1 atau lebih rendah dari asam yang sesuai).

Vesikel asam lemak sering dibuat dengan menggunakan konsentrasi buffer yang tinggi. Tipe ion buffer yang digunakan penting diperhatikan untuk menjamin stabilitas vesikel akibat interaksi vesikel dan buffer. Stabilitas vesikel asam lemak juga dapat ditingkatkan dengan menanamkan kolesterol pada membran bilayer. Kolesterol dapat terdisposisi pada bagian lemak (*tail region lipid bilayer*) dan mengepak vesikel untuk membuatnya lebih kaku dan mencegah kebocoran senyawa obat yang terserap.

Di bawah temperatur transisi peleburan rantai campuran asam lemak/sabun, akan terbentuk endapan atau terjadi kristalisasi. Pada keadaan ini, disperse vesikel yang stabil tidak dapat dibentuk. Selain itu, kehadiran sejumlah besar kation divalent seperti ion Ca dan Mg akan mengarah pada kristalisasi agregat-agregat asam lemak.



Gambar 4.3. Bentuk-bentuk agregat asam lemak

Jenis-Jenis Vesikel

Dalam perkembangannya, vesikel tidak hanya dibentuk dari asam lemak alami, tetapi dapat dibentuk dari jenis lipid lainnya seperti surfaktan dengan atau tanpa kolesterol dan peningkat penetrasi kimia lainnya. Masing-masing akan membentuk vesikel dengan sifat yang berbeda dan mekanisme penetrasi yang berbeda pula. Berikut dijelaskan perbedaan masing-masing vesikel.

Liposom

Liposom atau gelembung lemak adalah partikel koloid yang dapat dibuat dari turunan molekul fosfolipid baik dari sumber alam maupun sintetik (Mahdi, dkk, 2004; Gregoriadis, Gregory 2007; Ranade, Vasant V and Hollinger, Manfred; 2004). Pada awal perkembangannya, liposom dibuat dari beberapa golongan lemak yang identik dengan membran biologik

atau campuran lemak yang sesuai dengan penyusun lemak interseluler stratum korneum (Kozubek, et.al, 2000; Walters, K.A. 2002). Lemak kulit biasanya tersusun dari ceramid, kolesterol, kolesterol sulfat dan asam lemak.

Liposom dapat membawa obat-obat hidrofilik melalui enkapsulasi ke dalam ruang fase air atau obat-obat hidrofobik melalui interkalasi ke dalam bagian hidrofobik dari struktur lemak lapis ganda (Manusroi, et al. 2003). Liposom telah dicoba untuk mengangkut beberapa senyawa aktif fisiologis seperti vaksin, antimikroba, anti tumor, antiviral, hemoglobin sebagai pembawa oksigen, serta radiolabel, yang berdasarkan jenis fosfolipidnya mampu ditujukan ke jaringan yang dikehendaki (sel target) (Gregoriadis, Gregory, 2007, Ranade, Vasant V and Hollinger, Manfred, 2004).

Liposom secara luas didefinisikan sebagai lemak lapis ganda (*lipid bilayer*) yang mengelilingi ruang berair. Berdasarkan penyusunnya, liposom dibedakan atas dua tipe, yaitu :


a. Liposom konvensional

- 1) Dibuat dari lipid netral dan anionik alami yang memiliki interaksi nonspesifik dengan lingkungannya
- 2) Relatif tidak stabil, kapasitas pengangkutannya rendah dan cenderung mengalami kebocoran dalam penyerapan senyawa
- 3) Penambahan kolesterol dapat meningkatkan stabilitas plasmanya

b. Liposom Non-Konvensional

- 1) Ukurannya kecil ($\leq 100\text{nm}$), permukaannya dimodifikasi untuk mengurangi efek negatif liposom konvensional

- 2) Dimodifikasi untuk mengurangi muatan negatif, menurunkan fluiditas dan menyebabkan halangan sterik untuk menghindari fagositosis
- 3) Sifatnya diperbaiki dengan memasukkan kolesterol pada *lipid bilayernya*
- 4) Liposom dipolimerisasi agar lebih stabil dan kebocoran lebih sedikit
- 5) Penambahan polietilen glikol akan mencegah pengambilan oleh sel fagosit mononuklear.
- 6) Target spesifik ligan, seperti antibodi, immunoglobulin, lektin, dan oligosakarida ditambahkan pada permukaan liposom untuk aktif pada sisi spesifik di tubuh.
- 7) Liposom dibuat dengan lipid kationik dan fusogenik yang digunakan dalam terapi gen untuk menghantarkan DNS ke dalam sel target.
- 8) Liposom sangat reaktif, mudah mengalami fase transisi dalam situasi tertentu karena sensitif terhadap pH, ion, panas, dan cahaya. Misalnya pada pH sensitif, liposom dapat berada pada fase transisi dalam kondisi asam yang menyebabkan peningkatan fluiditas membran dan kehilangan material yang telah terenkapsulasi sebelumnya (terjadi kebocoran vesikel).



Gambar 4.4. Klasifikasi liposom

Berdasarkan bentuk dan ukurannya, liposom dibedakan atas (Kozubek, et.al, 2000; Blazek et al, 2001):

a. *Small Unilamellar Vesicles (SUV)*

Merupakan vesikel yang dibentuk oleh satu lapis lemak lapis ganda (*mono lipid bilayer*), diameternya berkisar 25–50 nm (beberapa mengatakan hingga 100 nm). Vesikel ini dapat menyerap lebih banyak obat-obat hidrofilik karena ruang fase air yang sangat besar.

SUV disiapkan dengan metode *Probe Sonicator*, menggunakan logam yang dicelup pada suspensi liposom dan akan menggetarkan dispersi. Getaran ini akan menyebabkan aggregate akan memisah menjadi ukuran yang lebih kecil. Namun logam kemungkinan akan mengontaminasi dispersi liposom itu sendiri. Proses sonikasi juga harus dilakukan diatas temperatur transisi lipid yang digunakan. Bila dipanaskan di bawah temperatur tersebut akan menyebabkan agregasi antar vesikel dan terjadi kerusakan pada lipid lapis gandanya.

b. *Large Unilamellar Vesicles* (LUVs)

Merupakan kelompok paling heterogen dari jenis gelembung, sama dengan SUV, dikelilingi oleh satu lapis lemak lapis ganda, diameternya berkisar 100 nm hingga mikron (*Giant Vesicles*). Diameter LUV yang lebih besar dari 1000 nm, disebut *Giant Unilamellar Vesicles* (GUV).

Vesikel LUV dibentuk dari emulsi fosfolipid dalam dapar dengan kehadiran pelarut organik, yang kemudian diikuti dengan penguapan pelarut organik tersebut di bawah tekanan vakum (*Reverse Phase Evaporation method*). Liposom LUV yang dihasilkan dengan cara ini disebut REV (*Reverse Evaporation Vesicle*). Vesikel ini mempunyai ruang inti (*core*) yang lebih besar sehingga volume fasa air yang dapat mengisinya juga lebih besar dibanding SUV.

Liposom unilamellar dapat digunakan untuk menyerap obat-obat larut air ke dalam ruang dalam molekul cairan.

c. *Multilamellar Vesicles* (MLV)

Mengandung beberapa (hingga 14) lapis lemak lapis ganda, (tersusun seperti bawang merah), dipisahkan satu dengan lainnya oleh lapisan larut air.

Liposom multilamellar dapat digunakan untuk mengangkut obat-obat hidrofobik (*core region*) atau obat lipofilik yang terpartisi ke dalam fase lemak di *lipid bilayer*nya.

Liposom MLV merupakan bentuk awal liposom. Penyiapan MLV dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dengan peralatan laboratorium yang biasa. Dengan menggunakan alat rotari evaporator vakum, lipid akan terdeposit dari pelarut organiknya dalam bentuk lapis tipis (formasi *lipid bilayer*) pada permukaan dinding labu pada pencampuran dan penguapan di atas



temperatur transisi lipidnya. Sejumlah larutan dapar yang ditambahkan akan menghidrasi lapisan lipid dan pembentukan gelembung segera terjadi. Untuk meningkatkan ukuran *MLV* yang reproduibel perlu dipertahankan waktu hidrasi dan pengocokan. Faktor yang paling penting dalam preparasi *MLV* adalah waktu, proses hidrasi, ketebalan lipid lapis tipis, konsentrasi, komposisi lipid, dan volume dapar.

Untuk memperkecil dan menyeragamkan ukuran liposom dapat dilakukan dengan pengocokan suspensi liposom dengan vortex, sonikasi atau ekstrusi melalui membran filter polikarbonat. Teknik ekstrusi yang paling baik untuk menyeragamkan distribusi ukuran liposom.

Liposom multilamellar dapat digunakan untuk obat-obat hidrofobik atau lipofilik yang terpartisi ke dalam fase lemak.

d. Multi Vesikular Vesikel (*Multivesicular Vesicles (MVV)*)

Vesikel kompleks ini terbentuk ketika satu atau lebih vesikel kecil terserap dalam vesikel yang besar saat pelekukan *lipid bilayer* terjadi.



Gambar 4.5. Struktur vesikel (Gregoriadis, Gregory, 2007)

Penggunaan obat-obat dermatologi dalam bentuk liposom dapat meningkatkan konsentrasi obat di epidermis dan dermis serta meningkatkan biodisposisi dalam plasma dan sisi terjauh jika dibandingkan dengan formulasi konvensional (ointment) (Walters, K.A. 2002). Stabilitas obat dalam liposom lebih terjaga, karena obat tidak lagi kontak dengan cairan dari organ yang dilaluinya yang dapat menyebabkan degradasi dan penurunan aktivitas bahan obat (Yoshioka, Sumie, et.al. 2002).

Sejak awal dilaporkan, liposom dikembangkan sebagai kemajuan penghantaran obat. Secara umum

dipertimbangkan karena tidak toksik, *biodegradable* dan *non-immunogenic*. Obat dalam liposom mengalami perubahan farmakokinetiknya dan toksisitas sistemiknya menjadi lebih rendah, disamping itu obat dicegah dari degradasi dini dan atau inaktivasi setelah terpapar pada target (Kozubek, et.al, 2000).

Penggunaan liposom atau struktur gelembung secara umum sebagai penghantar beberapa jenis senyawa aktif tergantung kelarutan senyawa tersebut dalam air. Jika senyawa larut air, maka ukuran dan volume kompartemen cairan pada gelembung sangat penting. Sedangkan, senyawa hidrofobik akan bergabung pada lapisan lemak (amfifilik) dari susunan pembungkus gelembung. Untuk kasus ini, ukuran dari kompartemen cairan tidak penting, tergantung pemilihan tipe SUV atau MLV yang diarahkan pada efektifitas penyerapan senyawa aktif dan penghantarannya ke jaringan target. Sifat pengisian dan interaksi senyawa aktif dalam gelembung yang terbentuk akan menentukan efektifitas penyerapan, yakni jumlah senyawa yang dapat " diserap " ke dalam gelembung tunggal. Di lain pihak, harus diperhatikan komposisi molekul yang digunakan untuk membentuk struktur gelembung dari sisi awal penggunaan hingga interaksi dengan komponen di tubuh (ct. Permukaan pengisian, serum protein, lipoprotein, sistem fagosit hingga target sel) (Mahdi, dkk, 2004; Manusroi, et al, 2003).

Beberapa metode yang digunakan dalam pembuatan liposom kosong, diantaranya dengan menggunakan teknik koaservasi, injeksi pelarut, *freeze drying* dari larutan monofase, metode ekstrusi, dan *medical nebulizer*. Sedangkan penyerapan obat/bahan ke

dalam liposom menggunakan teknik difusi akibat gradien pH, ion, reaksi *coupling* peptida pada permukaan liposom (Gregoriadis, Gregory, 2007, Ranade, Vasant V and Hollinger, Manfred, 2004).

Bahan utama yang dibutuhkan dalam pembuatan liposom adalah fosfolipid dengan atau tanpa kolesterol.

a. Fosfolipid

Fosfolipid merupakan komponen yang umum terdapat dalam membran yang digunakan untuk membentuk liposom. Fosfolipid berbentuk pipa yang memiliki dua rantai asil yang bersambung dengan kepala yang polar dan berperan dalam mengikat air pada proses hidrasi.


Fosfolipid dapat diklasifikasikan menjadi (Vijay, *et al*, 2010):

- 1) Fosfolipid netral, contoh spingomalin, fosfatidiletanolamin, fosfatidilkolin.
- 2) Fosfolipid negatif, contoh fosfatidil dipalmitat, asam dipalmitat fosfatidil, fosfatidilkolin distearat, diolet fosfatidilkolin.
- 3) Fosfolipid positif, contoh 1,2 diheksadesil N, N-dimetil-N-trimetil amin metil etanolamin

Fosfolipid adalah suatu senyawa amfifilik yang mempunyai struktur dasar gliserol, terdiri dari bagian kepala yang polar (gugus fosfat) dan bagian hidrofobik (satu atau dua molekul asam lemak). Senyawa ini bermuatan netral sampai sedikit negatif. Fosfatidilkolin adalah salah satu fosfolipid yang paling banyak digunakan dalam sistem liposom, berasal dari telur atau kedelai dan sekarang tersedia dalam bentuk sintetisnya sehingga komposisi asam lemak dari fosfatidilkolin ini dapat diketahui dengan jelas (Abdassah, 2004).

Fosfolipid secara spontan membentuk struktur yang tertutup ketika terhidrasi dalam air. Fosfolipid memiliki sifat amfipatik (hidrofilik dan lipofilik) dan karenanya, sifat termodinamik dan *self-assembly*nya akan mengarahkan bagian hidrofobik membentuk gelembung bilayer saat terjadi hidrasi. Aksi *self assembly* dari fosfolipid pada lembaran bilayer menyebabkan turunya interaksi yang kurang baik antara pelarut dan rantai panjang hidrokarbon asam lemak sehingga diperoleh energi yang rendah dan stabilitas yang hampir maksimum dengan pembentukan gelembung.

Lebih lanjut untuk memperoleh keadaan yang sempurna, lembaran bilayer mulai melipat atau melekok ke bawah dengan sendirinya membentuk gelembung yang tertutup dimana bagian air berada pada inti. Fenomena ini dapat dipahami secara kuantitatif dengan mempertimbangkan teori *critical micelle concentration* (CMC) dari fosfatidilkolin dalam air (Vijay, et al, 2010).




Gambar 4.6. Tahapan pembentukan vesikel

Dekomposisi lipid dapat terjadi pada lipid lapis ganda, salah satunya akibat reaksi oksidasi dan

hidrolisis. Reaksi oksidasi dapat terjadi pada rantai asam lemak tidak jenuh dari molekul fosfolipid, sehingga harus diperhatikan kondisi inert pada saat pembuatan dan penyimpanan liposom. Pada proses pembuatan dan penyimpanan liposom, kondisi ruangan harus selalu dialiri gas nitrogen atau argon di atasnya dan atau ditambahkan senyawa anti oksidan seperti alfa tokoferol ke dalam formulanya. Seleksi fosfolipid dapat dilakukan untuk meminimalisasi proses oksidasi (Abdassah, 2004).

b. Kolesterol



Gambar 4.7. Rumus Struktur Kolesterol (Rowe, Raymond C, et.al.,2006)

Kolesterol ($C_{27}H_{46}O$) dengan Bobot Molekul 386.67 merupakan serbuk putih kekuningan, digunakan sebagai emulgator dan emolien dalam teknologi formulasi sediaan farmasi topikal dan kosmetik. Kolesterol dapat larut dalam kloroform, etanol, eter, benzen, tidak larut dalam air, dan sukar larut dalam metanol. Kolesterol aman digunakan karena tidak toksik dan tidak menimbulkan iritasi. Dalam pembuatan vesikel pada sistem penghantaran obat, kolesterol berguna untuk mencegah kebocoran vesikel dengan mengepak barisan pada lipid lapis gandanya (Gregoriadis, Gregory, 2007).

Kolesterol sering ditambahkan ke dalam komposisi liposom, terakomodasi diantara molekul fosfolipid pada membran lipid lapis ganda liposom dengan perbandingan 1:1. Pengepakan barisan molekul fosfolipid pada lipid lapis ganda liposom oleh kolesterol, menyebabkan bahan obat terserap tidak mudah berpenetrasi ke permukaan liposom (Gregoriadis, *et al*, 1984).

Keuntungan dari Liposom (Verma, *et al*, 2010):

- 1) Liposom bersifat *biocompatible*, *biodegradable*, tidak beracun, fleksibel dan nonimmunogenik untuk penggunaan sistemik dan non sistemik.
- 2) Liposom meningkatkan efektivitas dan indeks terapi obat
- 3) Liposom memiliki kemampuan untuk melindungi obat yang dienkapsulasi dari lingkungan eksternal dan bertindak sebagai depot *sustained release* (misalnya untuk obat propranolol, Cyclosporin).
- 4) Liposom dapat dibuat dalam bentuk suspensi, sebagai aerosol, atau dalam bentuk setengah padat seperti gel, krim dan lotion.
- 5) Liposom dapat diberikan melalui mata, paru-paru, hidung, oral, intramuskular, subkutan, topical/transdermal, dan intravena.
- 6) Liposom memiliki sisi lipofilik dan hidrofilik dalam satu sistem dan oleh karena itu cocok untuk penghantaran obat-obat hidrofobik, amfifilik dan hidrofilik.
- 7) Liposom dapat membungkus tidak hanya molekul kecil tetapi juga makromolekul seperti superoksida dismutase, hemoglobin, erythropoietin, interleukin-2 dan interferon-g.

- 8) Liposom mengurangi toksisitas dan meningkatkan stabilitas obat yang terperangkap melalui enkapsulasi (misalnya Amfoterisin B, Taxol).
- 9) Liposom membantu mengurangi paparan jaringan yang sensitif terhadap obat beracun.
- 10) Mengubah farmakokinetik dan farmakodinamik obat (mengurangi eliminasi, meningkatkan waktu sirkulasi).

Kelemahan liposom (Verma, *et al*, 2010):

- 1) Tingginya biaya produksi
- 2) Kebocoran dan fusi obat molekul dari enkapsulasi
- 3) Kadang-kadang fosfolipid mengalami oksidasi dan hidrolisis
- 4) Diutamakan untuk obat-obat dengan waktu paruh yang pendek
- 5) Kelarutan yang rendah
- 6) Kurang stabil

Berbagai formulasi liposom telah diperbaiki dibandingkan dengan dispersi liposom konvensional dalam hal stabilitas fisik saat pembuatan. Keadaan vakum dan atau gas nitrogen masih diperlukan selama proses pembuatan dan penyimpanan untuk mencegah oksidasi fosfolipid. Untuk menghindari kesulitan teknik berhubungan dengan persyaratan kondisi inert, maka diperlukan alternatif pemakaian fosfolipid. Salah satu alternatif yang diajukan dalam pembuatan vesikel seperti liposom adalah dengan hidrasi campuran kolesterol dan surfaktan nonionik, yang disebut 'niosom' (Mahdi, dkk, 2004, Manusroi, et al. 2003).

Niosom



Niosom adalah sistem penghantar yang serupa dengan liposom, akan tetapi digunakan surfaktan non ionik sebagai pengganti fosfolipid (Walters, K.A. 2002, Blazek, et al, 2001). Niosom memiliki kemampuan menembus kulit dan telah diteliti sebagai pembawa obat dengan berbagai rute pemberian seperti intramuskular (IM), subkutan (SK), intravena (IV), okular, dan transdermal. Niosom memiliki struktur surfaktan multilamellar sehingga paling cocok untuk obat lipofilik dan ampifilik (Walters, K.A. 2002, Blazek, et al, 2001). Salah satu tujuan dalam pengembangan *delivery sistem* adalah kontrol pelepasan obat dari sistem pembawa, yang selanjutnya terjadi kontrol pengambilan di tubuh. Sifat ini dilaporkan juga dimiliki oleh niosom.

Niosom dapat dibuat dari beberapa jenis surfaktan nonionik, seperti poligliserol alkil eter, glukosil dialkil eter, crown eter, dan polioxietilen alkil eter, dan ester. Niosom dapat dibuat dengan menggunakan variasi perbandingan molar dari surfaktan dan kolesterol. Komposisi, ukuran, jumlah bilayer dari vesikel dapat memengaruhi pelepasan. Ini menunjukkan bahwa parameter ini penting pada proses pembuatan dan pemanfaatan vesikel dalam penggunaan farmaseutik (Arora, Rajnish and Jain, C.P. 2007).

Manusroi, et.al (2003) telah melakukan karakterisasi niosom yang dibentuk dari beberapa jenis surfaktan nonionik dan kolesterol. Karakterisasi niosom tersebut dilakukan menggunakan formasi X-cross di bawah sinar mikroskop polarisasi untuk mengamati kemampuan niosom menyerap senyawa larut air. Derajat kekakuan membran vesikel juga diukur untuk mengetahui perbandingan kolesterol dengan surfaktan

yang digunakan. Beliau menyatakan bahwa efisiensi penyerapan dan mikroviskositas membran vesikel tergantung pada panjang rantai alkil dari surfaktan nonionik dan jumlah kolesterol yang digunakan. Surfaktan nonionik dari rantai stearil (C_{18}) menunjukkan efisiensi penyerapan tertinggi dibandingkan vesikel yang dibentuk dari surfaktan nonionik rantai lauril (C_{12}). Niosom yang dibuat menggunakan Tween 61 dengan rantai alkil yang panjang dan sifat hidrofilitas yang tinggi dengan kombinasi kolesterol pada perbandingan 1:1, memberikan efisiensi penyerapan tertinggi untuk senyawa-senyawa larut air.

Tabel 4.1. Struktur surfaktan nonionik dan kemampuannya membentuk vesikel (Manusroi, et.al, 2003)

Names and chemical structures of surfactants	HLB ^a	T _c ^{**} (°C)	Vesicle [*] formation without cholesterol	Minimum [*] amount of cholesterol for vesicle formation (mol%)
Sorbitan monostearate (Span 60) 	4.7	45	yes	-
Polyoxyethylene 2 stearylether (Brij 72) 	4.0	40	yes	-
Polyoxyethylene sorbitan monostearate (Tween 61) 	9.6	40.6	no	10
Glyceryl monostearate (GMS) 	3.8	> 65	yes	-
Polyoxyethylene 4 laurylether (Brij 30) 	9.7	< 10	no	30
Diglyceryl monolaurate (DGL) 	6.7	34	no	10
Tetraglyceryl monolaurate (TGL) 	10.0	40	no	30

*formasi vesikel diamati melalui formasi silang maltose di bawah sinar polarisasi

^aHLB berdasarkan data *supplier*

^{**}temperatur fase transisi diukur terhadap sampel anhidrat

Ethosom

Ethosome merupakan modifikasi dari liposom yang dibuat dengan konsentrasi etanol yang tinggi. *Ethosome* secara umum terbentuk dari fosfolipid, etanol, dan air. Kombinasi hidroalkohol atau hydro/alkohol/glykolik fosfolipid dengan konsentrasi alkohol atau kombinasinya relatif tinggi menjadi keunikan dalam struktur etosom ini. Secara khas, etosom dapat dibentuk dari beberapa jenis fosfolipid dengan struktur kimia yang berbeda seperti fosfatidilkolin, fosfatidilkolin terhidrogenase, asam fosfotidic, fosfatidil serin, fosfatidil etanolamin, fosfatidil gliserol (Kumar, *et al*, 2010).

Ethosome adalah sistem gelembung yang menarik dan inovatif dalam teknologi farmasi dan penghantaran obat dalam tahun belakangan ini, yang menarik dalam pembawa ini adalah kemampuannya untuk berpenetrasi sempurna melalui kulit manusia. *Ethosome* dapat berpenetrasi melalui kulit dan meningkatkan penghantaran obat sampai pada kulit terdalam hingga mencapai sirkulasi sistemik (Kumar R, *et al*, 2010).

Ethosome merupakan vesikel bersifat lembut dan lunak, sehingga sesuai untuk meningkatkan penghantaran zat aktif melalui celah yang terbentuk pada modifikasi lipid interseluler stratum korneum. Karakteristik fisika kimia etosom telah memperlihatkan bahwa gelembung pembawa ini dapat membawa bahan aktif lebih efektif melalui stratum korneum sampai ke lapisan paling dalam kulit dibandingkan dengan liposom. Aspek inilah yang sangat penting dalam desain pembawa yang digunakan dalam penghantaran obat transdermal (Dave, *et al*, 2010; Maurya, *et al*, 2011).

Ethosome telah digunakan dalam formulasi sediaan farmasi, bioteknologi, kosmetik dan makanan. Gelembung lembut ini menghadirkan pembawa baru dalam meningkatkan penghantaran melalui kulit. Ukuran dari gelembung *ethosome* dapat diatur mulai dari 10 nanometer sampai mikron (Tiwari, *et al*, 2010).

Keuntungan *Ethosome*

Ethosome telah menawarkan berbagai keuntungan dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan obat, antara lain adalah (Singh, *et al*, 2010; Wahid, *et al*, 2011; Tiwari, *et al*, 2010):

- 1) Ethosom dapat meningkatkan permeasi obat melalui kulit untuk tujuan transdermal dan dermal.
- 2) Ethosom dapat mengangkut dan menghantarkan senyawa dengan bobot molekul besar (peptide dan molekul protein).
- 3) Komposisi ethosom aman dan komponen-komponen ini lazim digunakan dalam formulasi sediaan farmasi dan kosmetik.
- 4) Teknologi ini dapat meningkatkan kepatuhan pasien
- 5) Ethosom dapat diformulasi kembali dalam bentuk sediaan semisolid (gel atau krim).
- 6) Relatif sederhana dalam pembuatan karena tidak membutuhkan teknik yang khusus.
- 7) Dapat digunakan dalam farmasi dan kosmetik

Bahan pembentuk *ethosome*

Ethosome utamanya terdiri dari fosfatidilkolin, hidroalkohol, glikol dengan konsentrasi yang tinggi, dan air. Fosfatidilkolin yang digunakan dapat berupa fosfatidilkolin kedelai, fosfatidilkolin terhidrogenase, fosfatidil kolin dari telur, dipalmitat fosfatidil kolin.

Sedangkan alkohol dapat digunakan ethanol, isopropil alkohol, propilen glikol dan transkutel (Pirvu, *et al*, 2010:132).

1) Fosfolipid

Fosfolipid merupakan molekul ampifilik dan merupakan komponen terbesar yang menyusun membran sel. Mereka dapat menggabungkan diri dan membentuk beberapa struktur, termasuk misel dan liposom. Fosfatidilkolin memiliki kelarutan yang rendah dalam air.

Beberapa formulasi farmasi yang menggunakan fosfolipid untuk membentuk beberapa tipe liposom, termasuk *unilamellar* (satu membran bilayer yang mengelilingi bagian air), *multilamellar* (dua atau lebih membran kosentris, masing-masing mengelilingi bagian air).

Lipid lapis ganda terbentuk karena sifat termodinamika fosfolipid, terjadi transisi struktur lipid lapis ganda dari fasa gel (padat) menjadi fasa kristal cair karena pengaruh perubahan temperatur. Hal ini berkaitan erat dengan penggunaan liposom sebagai penghantar obat dalam proses preparasi dan pemilihan jenis fosfolipid. Sifat termodinamika yang harus diperhatikan pada fosfolipid adalah fasa transisi dan interaksi molekular dari fosfolipid (Abdassah, 2004:2).

Dalam hal ini, maka pemilihan metode pembuatan ethosom juga sangat diperhatikan. Temperatur yang digunakan dalam pembuatan ethosom adalah 30°C dan 40°C tergantung dari suhu transisi fosfolipid yang digunakan untuk membentuk gelembung dengan penyerapan obat yang optimal.

2) Etanol
Etanol digunakan dalam pengembangan sistem penghantaran obat secara transdermal sebagai peningkat penetrasi. Etanol juga telah digunakan dalam pengembangan sediaan transdermal sebagai kosurfaktan (Rowe, *et al*, 2009:17).

Perbedaan mendasar pada liposom dan ethosom terletak pada komposisinya. Efek sinergik dari kombinasi etanol dengan konsentrasi yang tinggi 20-50% dalam gelembung membentuk ethosom telah disarankan sebagai alasan utama untuk kemampuan yang lebih baik dalam permeasi kulit. Konsentrasi etanol yang tinggi 20-50% dalam formulasi ethosomal mengganggu aturan *lipid bilayer* kulit. Oleh karena itu, ketika terintegrasi ke dalam gelembung membran, ini akan memberikan kekuatan terhadap gelembung untuk berpenetrasi ke stratum korneum. Sejauh ini dalam kaitannya dengan konsentrasi etanol yang tinggi, membran lipid ethosomal telah dikemas lebih renggang dibanding dengan gelembung konvensional tetapi memiliki stabilitas yang sama. Inilah yang membuat strukturnya lebih lembut dan lunak yang memberikan kebebasan yang lebih dan stabil pada membran, yang mana akan menyelip masuk melalui lipid stratum korneum yang diintegrasikan (Kumar, *et al*, 2010:112).

a. Dalam Anitha, *et al* (2011), Etanol diketahui bahan kimia peningkat penetrasi dapat mengurangi penghalang dari stratum korneum. Sebagai bahan pelarut, etanol dapat digunakan untuk meningkatkan kelarutan obat. Etanol akan hilang dari formula sehingga menjadi sistem yang tersaturasi yang akan memengaruhi obat terus menerus melewati membran, penambahan etanol

akan mengubah sifat kelarutan stratum korneum. Etanol telah diujikan sebagai peningkat penetrasi pada levonogesterol, hidrokortison dan 5-florouracil pada kulit binatang (Williams AC, 2003) dan estradiol pada kulit manusia secara *in vivo* (Friend D, 1988), mereka menyelidiki pengaruh etanol pada kulit dan menyimpulkan bahwa dengan konsentrasi etanol yang tinggi dapat mendehidrasi kulit.

- b. Konsentrasi etanol yang tinggi menyebabkan ukuran partikel menurun, ketebalan membran berkurang karena adanya interaksi dengan rantai hidrokarbon (Maurya, *et al*, 2011:36; Girhepunje *et al*, 2010:363). Etanol menurunkan tegangan permukaan dengan merubah muatan total dari sistem menjadi lebih stabil sehingga ukuran partikel menjadi kecil, ukuran partikel bertambah dengan pengurangan konsentrasi etanol (Dave, *et al*, 2010:82). Efisiensi penyerapan dari *ethosome* tergantung dari konsentrasi etanol, konsentrasi etanol yang tinggi sebanding penyerapan obat (Dave, *et al*, 2010:82), tetapi perlu dipertimbangkan resiko iritasi pada penggunaan etanol konsentrasi tinggi.

Karakterisasi *ethosome*

Karakterisasi etosom sama dengan vesikel lainnya, terutama pada bentuk, ukuran dan distribusi ukuran partikel serta efisiensi penyerapan obat (*Drug entrapment efficiency*). Berikut ini beberapa jenis karakter yang diamati pada etosom yang dihasilkan serta metoda yang digunakan (Wahid, *et al*, 2011; Kumar R, *et al*, 2010; Girhepunje, *et al*, 2010):

- 1) *Surface morphology*: *Transmission Electron Microscope* (TEM) dan *Scanning Electron Microscope* (SEM) dapat

- digunakan untuk mengetahui bentuk *vesicle* dan morfologi permukaannya. TEM dapat menggunakan asam *phosfotungistic* sebagai kontrol negatif.
- 2) Ukuran dan distribusi ukuran: dapat diketahui dengan metode *Dinamic Light Scattering* (DLS), menggunakan sistem pendeteksian secara komputerisasi.
 - 3) Efisiensi penyerapan (*Percent Drug Entrapment; PDE*): Kemampuan *ethosom* dalam menyerap obat ke bagian hidrofilik dan lipofilik dapat diukur dengan menggunakan teknik ultrasentrifugasi dan spektrofotometri.
 - 4) Suhu transisi: Suhu transisi dari sistem vesikular lipid dapat ditentukan dengan metode *Differential Scanning Calorimetry* (DSC).
 - 5) Aktifitas tegangan antar muka: Dapat diukur di dalam larutan berair dengan tensinometer de Nuoy.
 - 6) Turbiditas: Diukur dengan nephelometer.
 - 7) Interaksi antara *vesicle* dengan kulit: Dapat diuji dengan transmisi mikroskopi elektron atau *Confocal Laser Scanning Microscope* (CSLM) atau fluoresensi mikroskop atau *hematoxylin staining* (eosin). Untuk fluoresensi mikroskop, *ethosom* harus difluoresensikan misalnya dengan rhodamin
 - 8) Penentuan derajat deformabilitas atau elastisitas: elastisitas membran *vesicles ethosom* dapat ditentukan dengan metode ekstruksi. Formula *ethosom* diekstruksi melewati membran filter (diameter pori 50 nm) menggunakan filter dari *stainless steel*, dengan tekanan 2,5 bar.

- 9) Zeta potensial: Zeta potensial dapat diukur dengan zeto meter atau dengan metode *Dinamic Light Scattering* (DLS).
- 10) Interaksi fosfolipid - etanol: Dapat diukur dengan ^{31}P NMR atau dengan *Differential Scanning Calorimeter* (DSC)
- 11) Kadar obat: Diukur dengan metode *High Performance Liquid Chromatographic* (HPLC) atau spektrofotometri UV-VIS
- 12) Stabilitas: *Dinamic Light Scattering* atau *Transmission Electron Microscope* dapat digunakan untuk mengetahui stabilitas ethosom
- 13) Penetrasi dan penyebaran: Kedalaman penetrasi dari ethosom dapat ditentukan dengan *Confocal Laser Scanning Microscope* (CLSM)
- 14) Penyebaran pada kulit (*in vitro*): Karakteristik penyebaran secara *in vitro* dari formula ethosom dapat dilakukan dengan menggunakan sel difusi Franz atau dengan metode dialisis menggunakan kantong difusi atau dengan menggunakan membran biologi seperti epidermis manusia, kulit abdomen mencit, kulit abdomen tikus, kulit kelinci, dan sebagainya.

Transferosom

Transferosom diperkenalkan sebagai sistem penghantar obat transdermal (*Transdermal Drugs Delivery Sistem*) yang efektif menghantar berbagai jenis obat yang memiliki berat molekul rendah maupun tinggi. Transferosom dapat menembus lapisan korneum secara utuh (tidak pecah atau melepaskan lapisannya) dan spontan pada dua rute yang berbeda dalam lipid intraseluler. Transferosom ini mengatasi sulitnya obat

berpenetrasi di kulit dengan cara memperkecil gelembungnya untuk melewati intraselular stratum korneum (Walve, 2011).

Transferosom merupakan vesikel yang tersusun dari fosfolipid sebagai bahan utama dan surfaktan (10-25%) serta 3-10% alkohol (etanol atau metanol). Telah dibuktikan keberadaan vesikel ini pada korneosit stratum korneum melalui pengamatan dengan menggunakan mikroskop electron fluoresensi 30. Untuk membuat vesikel tetap mengembang, maka vesikel dalam menembus stratum korneum harus mengikuti gradien hidrasi lokal dan menembus ke dalam lapisan kulit yang terhidrasi yakni epidermis dan dermis (Dinesh, dkk., 2009).

Vesikel transferosom lebih elastis dibandingkan dengan vesikel standar (liposom), dan sangat sesuai berpenetrasi di kulit. Setiap vesikel pembawa, mengatasi barrier kulit secara spontan untuk mendeposit obat ke dalam jaringan yang lebih dalam. Sediaan diambil dari permukaan stratum korneum yang kering menuju daerah yang kaya air di bawah kulit. Selanjutnya pembawa menghindari mikrovaskular lokal untuk menyimpan obat sebagai depo pada berbagai kedalaman atau di bawah kulit, dimana bahan aktif secara perlahan-lahan dilepaskan ke jaringan yang ditargetkan. Kedalaman dan luasnya pengendapan obat terutama dikendalikan oleh komposisi pembawa dan dosis transferosom digunakan per luas satuan, bukan jumlah total obat atau konsentrasi yang digunakan. Transferosome melindungi obat yang diencapsulasi dari degradasi metabolik. Vesikel bertindak sebagai depot, serta melepaskan kandungannya (obat) secara perlahan-lahan dan berkesinambungan.

Komponen Transferosom

Transferosom terdiri dari fosfolipid seperti *phosphatidyl cholin* yang membentuk *lipid bilayer* dalam lingkungan air dan membentuk gelembung tertutup. *Lipid bilayer* yang terbentuk bersifat lembut, dan untuk meningkatkan dan untuk meningkatkan fleksibilitas dan permeabilitasnya, ke dalamnya ditambahkan komponen surfaktan yang biokompatibel atau sebuah obat yang bersifat ampifilik. Komponen yang ditambahkan kemudian ini disebut aktivator tepi. Suatu aktivator tepi selalu mengandung surfaktan rantai tunggal yang menyebabkan destabilisasi *lipid bilayer*, sehingga terjadi peningkatan fluidity dan elastisitasnya (Kulkarni, et al., 2011).

Fleksibilitas membran transferosom dapat diubah dengan mencampur surfaktan yang sesuai dalam perbandingan yang tepat, hingga menghasilkan fleksibilitas dan permeabilitas yang optimal. Bentuk vesikel transferosom dapat beradaptasi dengan mudah dan cepat pada lingkungan yang sempit, dengan menyesuaikan konsentrasi lokal dari masing-masing komponen *lipid bilayer* setempat dari setiap komponen bilayer. Fleksibilitas ini juga meminimalkan risiko pecahnya vesikel di kulit dan memungkinkan transferosom untuk mengikuti gradien air alami melintasi epidermis, ketika digunakan pada kondisi tanpa hambatan.

Bahan-bahan yang dapat digunakan dalam penyiapan transferosom beserta fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Bahan-bahan yang digunakan dalam penyiapan transferosom (S. Padey, et.al., 2009)

Kelas	Contoh	Kegunaan
Fosfolipid	Soya phosphatidyl cholin Dipalmitoyl phosphatidyl cholin Distearoyl phosphatidyl cholin	Komponen pembentuk vesikel
Surfaktan	Natrium kolat Natrium deoksikolat Tween 80 Span 80	Pembentuk fleksibilitas
Alkohol	Etanol	Pelarut
Dye	Rodamin 123 Rodamin DHPE Fluoresein DHPE Nile Red	Untuk studi CLSM
Pembuffer	Dapar fosfat pH 7,4	Medium penghidrasi

Kelebihan Transferosom

Kelebihan dari transferosom (Kumar, et.al., 2011; Kulkarni, et.al, 2011) :

- a. Transferosom memiliki infrastruktur yang terdiri dari gugus hidrofobik dan hidrofilik dan dapat mengangkut molekul obat dengan berbagai kelarutan.
- b. Transferosom dapat mengalami penyempitan (dari 5 sampai 10 kali lebih kecil dari diameter normalnya) tanpa kehilangan ukuran, sehingga memperlihatkan kemampuan dalam menghantarkan obat melintasi kulit yang paling baik.

- c. Digunakan sebagai penghantar obat untuk efek sistemik serta topical, serta dapat mempertahankan kadar obat yang dibawanya hingga lapisan yang lebih dalam di kulit.
- d. Dapat membawa obat dengan berat molekul yang rendah serta tinggi misalnya analgesik, anestetik, kortikosteroid, hormon, antikanker, insulin, protein *gapjunction*, dan albumin.
- e. Kadar obat yang terserap mendekati 90% (lipofilik).
- f. Biokompatibel dan biodegradable karena tersusun dari fosfolipid.
- g. Dapat beraksi sebagai depot dan melepaskan obat yang dikandungnya secara perlahan dan berkesinambungan.
- h. Dapat melindungi obat yang dibungkusnya dari degradasi akibat lingkungan atmosfer.
- i. Mudah diperbanyak karena prosedurnya sederhana.

Seperti layaknya liposom, transferosom memiliki kekurangan, antara lain adalah :

- a. Tidak stabil dan mengalami degradasi oksidatif.
- b. Formulasinya tergolong berbiaya mahal
- c. Kemurnian fosfolipid dapat berpengaruh terhadap transferosom yang terbentuk.

Karakterisasi Transferosom

Visualisasi transferosom dapat dilakukan dengan menggunakan *Transmission Electron Micrograph* (TEM) dan dengan *Scanning Electron Micrograph* (SEM). Ukuran partikel dan distribusi ukuran dapat ditentukan dengan

Dynamic Light Scattering Method (DLS) dan spektroskopi korelasi foton (PCS). Efisiensi penyerapan obat dalam transferosom dapat diukur dengan metode HPLC atau metode spektrofotometri UV-VIS. Stabilitas vesikel dapat ditentukan dengan menilai ukuran dan struktur dari vesikel dari waktu ke waktu. Pelepasan obat *in vitro* dapat diukur dengan menggunakan sel difusi atau metode dialisis (Cristina, *et al*, 2010).

Perbandingan antara transferosom dengan vesikel lainnya

Pada awalnya transfersom tampak berhubungan dengan vesikel *lipid bilayer*, misalnya liposom. Namun dalam hal fungsional, transfersom berbeda jauh dari liposom yang biasa digunakan. Transferosom jauh lebih fleksibel dan mudah beradaptasi. Fleksibilitasnya yang sangat tinggi memudahkan vesikel ini melalui pori-pori yang jauh lebih kecil dari diameter mereka sendiri. Hal ini disebabkan karena membran transfersom mampu menggabungkan dua komponen amphiphilik dan lipofilik (fosfolipid ditambah surfaktan) (Chapman, *et al.*, 1998).

Deformabilitas agregat yang tinggi memungkinkan transfersom untuk menembus kulit secara langsung. Kecenderungan ini didukung oleh permukaan hidrofilitas transfersom yang tinggi akan mencari konsentrasi air yang lebih tinggi yang ada di sekitarnya (masuk ke bagian stratum korneum yang terhidrasi). Berbeda dengan bahan lain, konsentrasi surfaktan yang lebih tinggi dalam campuran misel yang mereka miliki tidak meningkatkan efektivitas transportasi bahan ke dalam kulit dikarenakan campuran misel yang lain jauh kurang sensitif terhadap

gradien aktivitas air transepidermal dibandingkan dengan transferosom (Chapman, *et al.*, 1998: 282). Adanya kekuatan pendorong untuk berpenetrasi ke dalam kulit "gradien transdermal" ini disebabkan juga karena perbedaan kandungan air antara permukaan kulit dehidrasi (sekitar 20% air) dan epidermis berair (hampir 100%) (Dinesh, *et.al.*, 2009).

Vesikel ini bersifat ultradeformabel dan sangat hidrofilik yang selalu berusaha untuk menghindari dehidrasi dalam proses transportasi. Misalnya jika vesikel transferosom diletakkan pada permukaan biologis yang terbuka, vesikel ini cenderung untuk menembus penghalang dan bermigrasi ke dalam stratum yang kaya akan air (Walve, 2011).

Tabel 4.3. Perbandingan transferosom dengan vesikel lainnya (Kumar, Ravi, *et.al.*, 2012)

Jenis vesikel	Kelebihan	Kekurangan
Liposom	Vesikel fosfolipid, biokompatibel dan biodegradabel	Kemampuan penetrasi perkutan lebih rendah, Stabilitas lebih rendah
Proliposom	Vesikel fosfolipid, lebih stabil dibanding liposom	Kemampuan penetrasi perkutan lebih rendah karena terbentuk agregat

Niosom	Vesikel surfaktan nonionik, stabilitas sangat baik	Kemampuan penetrasi percutan lebih rendah dan penanganan mudah
Proniosom	Dapat diubah menjadi niosom kapan saja, stabil	Tidak banyak yang dapat mencapai lapisan kulit yang lebih dalam
Transferosom Protransferosom	Lebih stabil, penetrasi percutan dan deformability tinggi, biokompatibel dan biodegradabel, dapat untuk senyawa berbobot molekul rendah ataupun tinggi, serta senyawa hidrofilik dan lipofilik, dapat membawa obat lebih banyak ke lapisan kulit yang lebih dalam	Tidak ada, untuk beberapa sifat kelemahannya terbatas.

Transferosom berbeda dengan campuran misel. Pertama; ukuran transferosom biasanya lebih besar dibanding misel lemak standar. Kedua dan yang lebih penting; setiap vesikel transferosom berisi inti yang diisi air sedangkan misel lain hanyalah sebuah tetesan lemak sederhana. Sehingga transferosom dapat membawa air

dan lemak dibandingkan dengan misel yang hanya dapat menggabungkan zat lipoidal (Gompper, *et.al.* 1995).

B. Pembuatan Vesikel dan Optimasi Formula

Secara umum semua vesikel dibuat dengan prinsip yang sama, yaitu melibatkan lipid, pelarut organik, air dan pembentukan *lipid bilayer*, serta pemasukan obat ke dalam vesikel. Sejumlah prosedur telah dikembangkan untuk pembuatan vesikel, tetapi hanya beberapa yang dapat diterapkan untuk penyerapan dalam jumlah besar senyawa obat larut air. Kapasitas penyerapan obat tergantung pada sifat obat, fosfolipid dan bahan tambahan lainnya.

Pembuatan liposom

a. *Coaservation Technique*

Dalam koaservasi sederhana ini, yang terpenting adalah bahwa pelarut-pelarut lipid yang digunakan seperti methanol, etanol, 1-propanol, dan 2-propanol dapat bercampur sempurna dengan air atau larutan garam yang tidak melarutkan lipid. Sehingga ketika ditambahkan air ke alkohol berberat molekul rendah yang mengandung fosfolipid tersebut, pemisahan fase terjadi dalam sistem (terbentuk suspensi dengan batas yang jelas) pada konsentrasi yang digunakan.

Teknik pembuatan ini disebut juga teknik pemisahan fase (*phase separation*) dalam pembuatan vesikel mengikuti cara ini, terlebih dahulu disiapkan larutan fosfolipid dalam alkohol dengan konsentrasi antara 0,1% hingga 50% (w/v). Kemudian setelah campuran fosfolipid-alkohol homogen, maka ke dalamnya ditambahkan air tetes demi tetes, sehingga


terbentuk formasi tetesan koaservasi di bawah pengadukan pada suhu tetap 20°C.

Campuran homogenkan selama 5 menit dengan pengadukan dan 1 jam tanpa pengadukan pada suhu 20°C. Prosedur ini diulangi hingga seluruh air telah ditambahkan, perubahan fase diamati. Perubahan yang tampak adalah dihasilkannya perubahan dari larutan jernih menjadi sangat keruh. Bentuk koaservasi kemudian diamati dengan mikroskop pada suhu ruang.

Selanjutnya disiapkan tabung dialysis yang telah dibersihkan dengan air suling. Sebanyak 30 mL bentuk koaservasi yang optimum di pipet ke dalam tabung dialysis dan ditempatkan dalam 900 mL air suling pada beberapa jenis suhu konstan dengan putaran yang konstan pula pada 150 rpm. Tabung dialysis yang mengandung vesikel kemudian didialisis sebanyak 3 kali dengan air selama 1 jam.

Vesikel yang terbentuk mungkin saja berukuran sangat besar (200-2000nm) jika vesikel dibuat dengan campuran fosfolipid-etanol-air, tetapi sangat berbeda ukuran vesikel yang terbentuk dari campuran fosfolipid-metanol-air dan fosfolipid-1-propanol-air; dimana ukuran partikel dapat dikontrol berturut-turut pada kisaran 100-1000nm dan 50-300nm. Perbandingan jumlah air yang ditambahkan juga berpengaruh terhadap ukuran partikel. Peningkatan jumlah air akan menurunkan ukuran partikel, karena peningkatan jumlah air akan meningkatkan ikatan hydrogen pada molekul lipid.

Vesikel yang terbentuk kemudian dikarakterisasi meliputi bentuk dan sebaran ukurannya serta efisiensi penyerapannya.



Gambar 4.8. Bentuk vesikel yang diamati dengan *Freeze-fracture electron micrograph*. (A) fosfolipid-metanol-air; (B). fosfolipid-etanol-air; (C) fosfolipid-1-propanol-air; (D) fosfolipid-2-propanol-air

Penyiapan vesikel dengan cara ini dianggap sangat sederhana, dan pembentukan vesikel dengan ukuran yang bervariasi dapat terjadi secara spontan tanpa peralatan yang rumit atau modifikasi komponen lipid. Prosedur ini tidak menggunakan pelarut yang meninggalkan residu yang tidak dapat diterima secara farmaseutik, tidak menggunakan tahapan sonifikasi, sehingga produksi skala besar tidak sulit.

Vesikel yang terbentuk memiliki karakteristik yang baik untuk digunakan pada model membran biologis untuk mempelajari kemampuan fusi ke membran, atau kemampuannya mengubah ikatan protein membran, dan permeabilitas material berberat molekul rendah seperti ion-ion, asam amino, dan sebagai pembawa obat untuk dienkapsulasi dan pelepasan terkendali beberapa jenis obat di dalam tubuh. Teknik

koaserasi ini sederhana, bersifat reproduibel dalam memproduksi vesikel sebagai sistem penghantar obat atau gen.

Beberapa metode pembuatan vesikel:

b. *Freeze-Drying of monophasic Solution Technique.*

Freeze-drying (liofilisasi) adalah metode standar pada pembuatan beberapa produk farmasi. Sebagian besar produk tersebut diliofilisasi dari larutan air sederhana. Hanya pelarut air yang harus dihilangkan melalui proses liofilisasi, meskipun demikian ada beberapa produk farmasi yang dibuat melalui proses freeze-drying yang sistemnya menggunakan pelarut organik.

Pada metode ini sistem kosolven campuran pelarut *tersier butyl alcohol* (TBA) dan air yang paling sering digunakan dalam penelitian. Penggunaan campuran pelarut ini dalam metode ini menawarkan banyak kelebihan, yaitu lebih sederhana pengeringannya dari larutan berair, dapat meningkatkan pembasahan atau pelarutan, meningkatkan kecepatan sublimasi dan menurunkan waktu pengeringan, meningkatkan stabilitas produk kering, menurunkan waktu rekonstitusi, dan meningkatkan jaminan sterilitas larutan *bulk predried*.

Penambahan air pada produk liofilisasi menghasilkan suspensi vesikel secara spontan. Ukuran dan distribusi ukurannya sangat bergantung pada beberapa faktor yaitu komposisi lipid, tipe pembawa, perbandingan lipid/pembawa. Mekanisme pembentukan vesikel pada metode ini berlangsung sebagai berikut:

Saat pendinginan, pertama kali terbentuk padatan TBA hidrat yang dihasilkan dalam formasi interfase es-air, soybean phosphatidil cholin akan mengumpul dipermukaan TBA hidrat sebagai tetesan akibat tegangan permukaan. Seiring dengan menurunnya temperatur, semakin banyak terbentuk lipid-TBA hidrat padat yang mengkristal beserta larutan bulk yang akan memadat menjadi seperti gula pasir ketika suhu terus turun.

Selama berlangsungnya proses penghilangan pelarut, SPC pada permukaan TBA hidrat akan menjadi bentuk *phospholipid bilayer fragments* (PBFs) dengan kepala polar mengarah keluar dan rantai aryl mengarah ke pusat bilayer. Pada penambahan air, PBFs akan secara spontan membentuk suspensi vesikel.


Pada metode ini, agregasi dan penyatuan (fusi) antara PBFs efektif dihambat, indeks polidispersi dan ukuran vesikel akan berupa bentuk tunggal dengan ukuran seragam. Padatan TBA hidrat mempunyai bentuk speris dengan diameter 150-400nm, masing-masing PBFs mengandung cukup lipid untuk membentuk vesikel dengan ukuran berkisar 100-200nm. Pada metode ini, ukuran padatan TBA hidrat dan vesikel dapat dikontrol dengan baik.

Penambahan sukrosa pada campuran lipid TBA-air akan meningkatkan viskositas campuran yang dapat menghambat terbentuknya padatan TBA hidrat yang besar dan menjadi kekuatan dalam pembentukan PBFs. Disamping itu fusi antar PBFs dapat dicegah.

c. Pembentukan vesikel kecil dengan metode ekstrusi

Ekstrusi dilakukan untuk mengecilkan ukuran vesikel yang telah terbentuk dengan melewati vesikel

berukuran besar pada filter dengan ukuran pori yang diinginkan. Vesikel yang terbentuk kemudian ukurannya seragam dan tergolong unilamellar vesikel (LUVs).



Gambar 4.9. Perubahan struktur fosfolipid pada pembentukan vesikel. (A) larutan homogeny dari SPC dan sukrosa dalam campuran TBA/air; (B). padatan TBA hidrat; (C) perubahan dari bentuk SPC ke PBFs; (D) bentuk vesikel seterah penambahan air

Penyerapan Obat ke dalam vesikel


1) Metode transmembran berdasarkan gradien pH Untuk memasukkan obat ke dalam vesikel dilakukan dengan pengangkutan pasif dan aktif. Jika obat mempunyai kelarutan yang baik dalam TBA/air dan afinitas yang baik pada fosfolipid baik pada interaksi hidrofobik atau interaksi elektrostatis atau keduanya, maka digunakan pendekatan pengangkutan pasif dengan membentuk disperse fosfolipid dengan material pembawa.

Jika obat dapat diangkut sebagai respon beberapa gradien, maka digunakan metode aktif. Untuk cara ini harus dibuat perbedaan pH larutan di dalam pembawa dan diluar pembawa sehingga obat dapat ditransfer ke dalam vesikel.

Vesikel dengan pH internal yang rendah mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mengangkut obat-obat kationik, di lain pihak, tingginya pH intraliposomal akan meningkatkan penyerapan muatan negatif (obat-obat anionik) dan amfifilik.

Dalam pengaturan gradien pH pelintasan membran vesikel, pH cairan kompartemen ekterior harus dinaikkan. Rancangan kondisi dapat mengacu pada lebih dari satu pendekatan di bawah ini :


- a) Penambahan suatu bahan pengalkilasi, buffer alkalin untuk meningkatkan pH
- b) Meningkatkan media ekterior dengan suatu buffer melalui teknik filtrasi gel atau teknik dialysis.



Gambar 4.10. Pengangkutan obat dengan perbedaan gradient pH

- 2) Hidrasi
 Penggunaan pendekatan hidrasi-rehidrasi telah dikembangkan dan dapat menyerap obat ke dalam vesikel pada kisara 50-85%. Metode ini dapat digunakan untuk produksi skala besar, dan vesikel yang mengandung obat, protein, dapat dikering-bekukan dan direkonstitusi dengan larutan garam buffer tanpa berefek pada penyerapan obat.

- 3) Metode gradient ammonium sulfat
 Metode ini sering digunakan untuk doxorubicin, obat masuk ke vesikel dalam bentuk netral, kemudian kehadiran ion sulfat akan membentuk endapan doxorubisin sulfat dalam vesikel.



Gambar 4.11. Metode gradien ammonium sulfat

- 4) Adsorpsi fisika dan ikatan kovalen
Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk memasukkan obat ke dalam vesikel adalah adsorpsi fisika, penggabungan saat pembuatan vesikel, dan pengikatan kovalen pada obat aktif dan bahan tambahan inert.

Pembuatan niosom

Metode pembuatan berpengaruh pada jumlah bilayer, ukuran, kapasitas distribusi dan efisiensi penyerapan pada fase air dan permeabilitas membran dari vesikel. Beberapa metode pembuatan niosom antara lain (Blazek, et al,2001, Arora, Rajnish and Jain, C.P. 2007):

a. *Lipid film hidration* (hidrasi lapis tipis)

Metode tradisional untuk memproduksi niosom meliputi pengeringan lemak menjadi lapisan tipis dengan menggunakan pelarut organik, dan kemudian

menghidrasi lapisan ini dengan pelarut air. Vesikel multilamellar yang dihasilkan dapat diproses lebih lanjut melalui sonifikasi, ekstrusi atau penanganan lain untuk mengubahnya menjadi vesikel unilamellar. Optimasi penyerapan dapat dilakukan dengan mengubah variasi lipid, volume cairan penghidrasi dan waktu hidrasi.

b. *Ether Injection* (Injeksi Eter)

Campuran surfaktan-kolesterol dilarutkan dalam dietil eter dan diinjeksikan perlahan melintasi jarum ke dalam fase air. Terbentuk *Large Unilamellar Vesikel* (LUVs) selama penguapan eter. Kelemahan dalam metode ini adalah sejumlah kecil eter sering tertinggal dalam suspensi vesikel dan sangat sulit untuk dikeluarkan.

c. *Hand shaking* (pengocokan)

Campuran surfaktan, kolesterol dilarutkan dalam dietil eter pada labu alas bulat, dan pelarut organik dikeluarkan pada temperatur kamar di bawah tekanan. Surfaktan kering dihidrasi dengan suatu fase air pada 50-60 °C dengan putaran yang lembut. Akan terbentuk *Large Multilamellar Vesikel* (LMVs)

d. *Sonication*

Suatu fase air ditambahkan ke dalam campuran surfaktan-kolesterol pada gelas vial. Kemudian campuran disonifikasi selama beberapa waktu tertentu. Dihasilkan vesikel kecil, uniform dan unilamellar. Vesikel niosom yang dihasilkan ini umumnya ukurannya sangat besar dibandingkan liposom, diameternya tidak lebih kecil daripada 100 nm.

e. Metode yang digambarkan oleh Handjani-Vila

Sejumlah yang sama lipid (atau campuran lipid) dan larutan air dari senyawa aktif dicampur dan

digoyang untuk mendapatkan fase lamellar yang homogen. Campuran yang dihasilkan, dihomogenkan pada temperatur yang terkontrol dengan diputar atau ultrasentrifugasi

f. *Reverse Phase Evaporation* (Penguapan fase balik)


Lipid-lipid dilarutkan dalam kloroform dan $\frac{1}{4}$ volume *Phosphat Buffer Saline* (PBS). Campuran disonifikasi dan diuapkan di bawah tekanan. Lipid yang terbentuk kemudian dihidrasi. Penguapan dilanjutkan hingga hidrasi sempurna.

g. Metode Alternatif

Ukuran dan jumlah bilayer dari vesikel yang terdiri dari polioksietilen alkil eter dan kolesterol dapat diubah pada cara alternatif ini. Temperatur diatas 60°C menghasilkan SUV hingga LMVs ($> 1\mu\text{m}$), ketika pengocokan yang hebat pada temperatur kamar, menghasilkan efek yang berlawanan melalui perubahan vesikel multilamellar menjadi vesikel unilamellar. Perubahan dari vesikel multilamellar menjadi unilamellar pada temperatur lebih tinggi merupakan karakteristik dari surfaktan polioksietilen alkil eter.

Pembuatan *Ethosome* (Wahid *et al*, 2011; Maurya *et al*, 2011)


Ethosom dapat diformulasi dengan dua metode yakni dengan metode panas dan dingin. Secara garis besar, etosom dibuat seperti yang digambarkan dengan skema berikut:



Gambar 4.12. Skema Pembuatan *Ethosome* (Wahid *et al*, 2011)

a. Metode dingin

Metode ini merupakan metode umum yang digunakan dalam pembuatan ethosom. Dalam metode ini, fosfolipid, obat, dan lipid dicampur. Propilen glikol atau poliol lainnya ditambahkan ketika sedang diaduk. Campuran ini dipanaskan sampai suhu 30°C dan dijaga konstan. Air dipanaskan sampai 30°C dalam tempat yang berbeda kemudian ditambahkan dalam campuran tadi, selanjutnya diaduk selama 5 menit dalam keadaan tertutup.




Gambar 4.13. Skema pembuatan *Ethosom* Metode Dingin (Wahid *et al*, 2011)

b. Metode panas

Pada metode ini fosfolipid didispersikan dalam air pada suhu 40°C sampai terbentuk larutan koloid. Pada tempat yang lain etanol dan propilen glikol dicampur dan dipanaskan sampai suhunya mencapai 40°C. Secara bersamaan keduanya dicampur pada suhu 40°C, fase organik ditambahkan pada fase air. Obat dilarutkan dalam air atau etanol tergantung dalam sifat

hidrofilik/hidrofobik. Ukuran dari vesikel ethosom dapat dikurangi dengan melakukan proses sonikasi atau ekstruksi.



Gambar 4.14. Skema pembuatan *Ethosome* Metode Panas (Wahid *et al*, 2011: 974)

Pembuatan Transferosom

Metode pembentukan transferosom terdiri atas dua langkah. Pertama, pembuatan lapis tipis dilanjutkan dengan proses hidrasi dan diubah ke ukuran yang diinginkan dengan metode sonikasi. Kedua, vesikel yang telah disonikasi diseragamkan ukurannya dengan cara diekstrusi melalui membran polikarbonat.

Campuran bahan vesikel yaitu fosfolipid dan surfaktan dilarutkan dalam campuran pelarut organik (kloroform-metanol), selanjutnya pelarut diuapkan diatas temperatur transisi lipid (suhu kamar untuk forfatidilkolin murni atau 50°C untuk dipalmitoil fosfatidilkolin) dengan dengan menggunakan *Rotary Evaporator*, hingga terbentuk lapisan tipis pada

permukaan labu. Sisa pelarut dihilangkan di bawah kondisi vakum selama satu malam. Lapisan tipis yang terbentuk selanjutnya dihidrasi dengan penambahan larutan buffer (pH 6,5) dan diaduk dengan kecepatan 60 rpm selama satu hari pada suhu kamar. Setelah itu vesikel dikembangkan dengan cara didiamkan selama 2 hari pada suhu kamar. Untuk membuat vesikel kecil, MLVs disonikasi pada temperatur kamar atau 50°C selama 30 menit, atau pada temperatur 4°C selama 30 menit. Vesikel hasil sonikasi selanjutnya diekstruksi secara manual sebanyak 10 kali melintasi lapisan membran polikarbonat berdiameter 200-100nm.

Dalam pembuatan vesikel-vesikel di atas, beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain :

- a. Penghilangan pelarut organik yang digunakan

Pada umumnya, formula vesikel mengandung campuran lipid, kolesterol, antioksidan (untuk mencegah oksidasi fosfolipid) serta pelarut organik untuk memfasilitas dispersi fosfolipid, sementara pelarut yang biasa digunakan adalah kloroform, eter, metilen klorida, methanol dalam bentuk tunggal atau kombinasi.

Meskipun pelarut-pelarut ini membantu pencampuran lipid dan mendistribusikan uniform lipid dalam *lipid bilayer*, sejumlah residu pelarut tersebut dapat bertahan di akhir pembuatan, yang dapat memengaruhi kesehatan pengguna. Jika penghilangan secara sempurna tidak dapat dilakukan, maka harus dipastikan bahwa residu pelarut yang masih tertinggal berada di bawah kadar toksik dari pelarut tersebut. Tidak ada batas penerimaan tertinggi

untuk pelarut organik seperti kloroform yang dapat ditoleransi oleh manusia.

b. Melindungi fosfolipid dari oksidasi

Banyak dari disperse fosfolipid mengandung lipid tidak jenuh (rantai aril) pada bagian rantainya. Lipid ini mudah mengalami degradasi oksidatif atau peroksidasi lipid. Reaksi ini dapat terjadi selama pembuatan, penyimpanan, dan saat penggunaan.

Peroksidasi oksidatif adalah proses yang melibatkan reaksi radikal bebas dan menghasilkan formasi peroksida siklik dan hidroperoksida.

Reaksi degradasi oksidatif terjadi pada lipid tidak jenuh yang tidak dilindungi saat pembuatan dan penyimpanan. Reaksi oksidasi pada fosfolipid ini dapat diminimalkan dengan:

- 1) menjaga di bawah kondisi gas inert misalnya nitrogen,
- 2) disimpan dalam wadah terlindung dari cahaya,
- 3) menghilangkan logam berat atau menambahkan EDTA, dan
- 4) menambahkan antioksidan seperti alfa tokoferol

c. Penghilangan endotoksin

Pirogen adalah substansi yang menyebabkan kenaikan suhu (demam) ketika diinjeksikan. Depirogenasi dapat dilakukan melalui membran filter yang dapat mengadsorpsi endotoksin melalui interaksi Lipid A dengan permukaan membran yang tidak bermuatan. Endotoksin dalam larutan mungkin menempati agregat

yang berbeda, sebagian besar pada agregat yang besar (diameter 0,1 μ m). penambahan agen pengkelat dapat memecahkan aggregate tersebut menjadi unit-unit kecil. Penggunaan surfaktan (ct.natrium deoksikolat) dapat mengecilkan endotoksin menjadi sub unit yang sangat kecil.

d. Penghilangan obat bebas (pemisahan dengan *size-exclusion chromatography*)

Dalam pembuatan vesikel khususnya yang ditujukan sebagai penghantaran obat dengan pelepasan terkontrol, maka penghilangan obat bebas atau obat yang tidak terserap dari permukaan vesikel perlu dilakukan, mengingat dosis yang diperhitungkan adalah dari obat yang terserap dalam vesikel.

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghilangkan obat yang tidak terserap antara lain adalah dengan menggunakan kromatografi pertukaran ion. Pemisahan dengan metode ini dapat dilakukan jika muatan liposom dan obat yang diserap berbeda. Cara lain adalah dengan menggunakan metode ultrafiltrasi. Metode ini mudah dilakukan dan dipersyaratkan ukuran vesikel dan molekul obat berbeda. Sistem ultrafiltrasi yang tersedia secara komersial terdiri dari wadah, *cartridges*, dan *cassette-filter-unit* yang terhubung dengan pompa dan dapat menampung volume cairan pada kisaran 100-2000mL.

e. Mengontrol distribusi ukuran partikel

Pada pembuatan vesikel terkadang dihasilkan vesikel dengan ukuran yang sangat beragam. Untuk menyeragamkan ukuran vesikel, dapat

dilakukan dengan melewati vesikel membran polikarbonat (nucleopore) dibantu dengan tekanan yang rendah.

f. Sterilisasi vesikel (penggunaan parenteral)
Pemilihan metode sterilisasi untuk vesikel didasarkan pada beberapa unsur:

- 1) Efek metode sterilisasi terhadap kualitas
- 2) Sifat ekonomis dari proses sterilisasi
- 3) Peralatan sterilisasi

Vesikel bersifat termolabil dan dapat mengalami hidrolisis pada temperatur sterilisasi (121°C). Demikian pula dengan sterilisasi menggunakan metode *Irradiasi-Gamma* dapat menyebabkan reaksi peroksidasi lipid tidak jenuh.

Metode sterilisasi yang paling sesuai untuk diterapkan pada vesikel hanya metode filtrasi melintasi membran filter berdiameter $0,2\ \mu\text{m}$.

Ketika penyaringan vesikel dilakukan di atas suhu fase transisinya, maka vesikel yang lebih besar dari $2\ \mu\text{m}$ dapat disaring karena fleksibilitas membran lipid meningkat.

C. Karakteristik vesikel

Karakterisasi vesikel dilakukan setelah dihasilkan produk dan selama penyimpanan untuk memastikan kualitas produk. Metode yang digunakan untuk mengkarakterisasi vesikel harus bersifat reproduibel, tepat dan cepat. Beberapa parameter karakteristik vesikel meliputi:

a. Distribusi ukuran vesikel

Ukuran rata-rata dan distribusi ukuran vesikel merupakan parameter penting ketika vesikel diharapkan

untuk penggunaan terapi, terutama jika digunakan melalui rute inhalasi, atau parenteral. Karakterisasi morfologi vesikel dapat ditentukan melalui:

1) *Freeze-fracture electron microscopy*

Prosedur ini tidak cocok untuk memantau stabilitas karena melelahkan dan membutuhkan banyak waktu.

2) *Dynamic light scattering technique*

Merupakan metode yang sesuai untuk memantau stabilitas vesikel, teknik ini memiliki keterbatasan ketika digunakan sampel polidisperse, namun fungsi autokorelasi yang digunakan dalam menghitung distribusi ukuran vesikel memberikan angka rata-rata ukuran vesikel yang tepat.

b. Penentuan keberadaan residu fase organik dalam campuran fosfolipid

Umumnya digunakan pelarut organik dalam pembuatan vesikel. Kloroform digunakan sebagai pelarut fosfatidilgliserol telur dan fosfatidilkolin untuk melindungi lipid terhadap oksidasi selama penyimpanan, juga memfasilitasi disperse molekul yang baik dari berbagai jenis lipid selama proses pembuatan. Meskipun demikian, residu kloroform dari vesikel harus dihilangkan demi keamanan vesikel, karena kontaminan dalam kloroform seperti CCL_4 merupakan senyawa karsinogenik.

c. Kadar obat terserap (*persen drug entrapment*)

Keberadaan obat yang terserap dalam vesikel dapat ditentukan melalui teknik kromatografi kolom atau dengan metode yang lainnya. Vesikel yang telah dibuat mengandung campuran obat yang

terenkapsulasi dan yang tidak terenkapsulasi (obat bebas).

Sebagian besar prosedur diawali dengan menghitung jumlah obat bebas dari fraksi obat bebas dan obat yang terenkapsulasi, kemudian dapat dilanjutkan dengan salah satu prosedur berikut:

- 1) Jumlah obat yang terserap (terenkapsulasi) dihitung berdasarkan pengurangan dari jumlah total obat yang ditambahkan dalam formula terhadap jumlah obat yang bebas.
- 2) Setelah prosedur awal, kemudian dilanjutkan dengan menangani fraksi obat yang terenkapsulasi dengan menambahkan larutan detergen pada vesikel untuk melisiskan vesikel dan setelah seluruh obat telah keluar dari vesikel ke media berair disekitarnya, selanjutnya obat tersebut ditentukan kadarnya sebagai kadar obat terserap.

d. Identifikasi dan pengukuran fosfolipid

Fosfolipid dan hasil-hasil degradasi ditentukan setelah diekstraksi dari vesikel. campuran lipid dapat dipisahkan menggunakan *Thin Layer Chromatographic* (TLC) dua dimensi atau *High Performance Liquid Chromatographic* (HPLC). Pada metode TLC, spot yang mengandung konstituen tunggal dipisahkan dan diukur sebagai fosfor menggunakan spektrofotometer.

Lipid dapat dideteksi pada daerah panjang gelombang 203-205nm. Asam lemak tidak jenuh menunjukkan nilai absorbansi yang tinggi sedangkan asam lemak jenuh menunjukkan nilai absorbansi yang lebih rendah pada spektrum UV panjang

gelombang 200 nm. Prosedur ini menggunakan kloroform sebagai pelarut.

Identifikasi adanya residu kloroform dan kuantitas CCl_4 dalam PC dilakukan dengan melarutkan PC kering dalam kloroform, lalu dideteksi dengan metode *Gas Chromatographic* (GC).

- e. Penentuan residu pelarut dalam vesikel
Penentuan residu pelarut didasarkan pada uji kualitatif dan kuantitatif masing-masing pelarut yang digunakan dengan membandingkan sampel dengan pelarut murninya.

D. Stabilitas Vesikel

Stabilitas vesikel adalah pertimbangan utama dalam seluruh tahapan produksi dan pemberiannya (aplikasinya). Stabilitas sediaan dipertahankan dari pengaruh fisik dan kimia terhadap bahan aktif dan vesikelnnya selama masa penyimpanan dan penggunaannya. Studi terhadap stabilitasnya harus melibatkan uji fisika, kimia dan parameter mikrobiologisnya.

Stabilitas vesikel meliputi:

a. Stabilitas kimia

Komponen utama pembentuk vesikel adalah lipid. Lipid pembentuk vesikel ini merupakan derivat dari alam dan atau sintetik. Fosfolipid yang menjadi komponen penyusun beberapa jenis vesikel merupakan asam lemak tidak jenuh yang diketahui dapat mengalami reaksi oksidasi. Reaksi ini dapat menyebabkan :

- 1) Perubahan permeabilitas bilayer vesikel
- 2) Mengubah *shelf-life* vesikel

Degradasi lipid vesikel dapat terjadi melalui:

a) Peroksidasi lipid.

Degradasi oksidatif lipid secara umum dapat diminimalkan dengan melindungi sediaan dari cahaya melalui:

- 1) Penambahan antioksidan seperti alfa-tokoferol.
- 2) Penambahan EDTA pada formula lipid untuk menghilangkan logam berat.
- 3) Pembuatan vesikel dilakukan di bawah lingkungan gas nitrogen dan argon.

b) Hidrolisis lipid

Degradasi lipid mengarah pada pembentukan lyso-fosfatidilkolin. Kehadiran lyso-fosfatidilkolin, meningkatkan permeabilitas vesikel dan sangat penting untuk menjaga keberadaannya pada saat pembuatan.

Metode yang dapat diterapkan untuk menjaga lyso-fosfatidilkolin berada pada kadar minimal adalah dengan menggunakan bahan baku (lechitin) yang bebas lyso-fosfatidilkolin.

b. Stabilitas fisika

Stabilitas fisika vesikel dapat diamati dari rata-rata ukuran dan distribusi ukuran vesikel.

Metode yang dapat digunakan untuk menilai perubahan terhadap sifat fisika vesikel antara lain adalah :

- 1) *Light scattering*
- 2) Mikroskop elektron

Beberapa masalah dalam stabilitas vesikel yang perlu diperhatikan adalah :

- 1) Ukuran vesikel

Dilaporkan bahwa semua vesikel yang dihasilkan pada semua metode pembuatan memiliki ukuran yang heterogen dengan potensi masalah fisika dan kimia. Distribusi ukuran vesikel akan berubah saat diukur sesaat setelah pembuatan dan setelah penyimpanan. Vesikel akan mengalami fusi (penggabungan) dan tumbuh menjadi vesikel besar. Fusi dan pecahnya vesikel pada penyimpanan menjadi masalah terhadap kondisi obat dalam vesikel.

- 2) Interaksi obat dengan lipid
Fosfolipid sangat rentan terhadap reaksi oksidasi dan hidrolisis. Perubahan sifat fisika-kimia lipid akibat reaksi tersebut pasti akan berpengaruh terhadap obat-obat yang terdisposisi pada bagian *lipid bilayer* tersebut.
- 3) Faktor formulasi dan lingkungan.
Sedapat mungkin vesikel diformulasi dengan melibatkan komponen yang tidak memengaruhi satu sama lainnya. Pemilihan komponen vesikel perlu mempertimbangkan kemungkinan pengaruh lingkungan terhadap stabilitas vesikel saat pembuatan, pemakaian dan penyimpanan. Penggunaan surfaktan sebagai pembentuk vesikel pada niosom dirancang untuk menghindari instabilitas vesikel terhadap pengaruh oksidan dari lingkungan, seperti yang sangat mudah terjadi pada penggunaan fosfolipid.
Pada kondisi formulasi yang harus menggunakan bahan-bahan yang mudah rusak secara fisika dan kimia karena kondisi lingkungan, maka perlu diperjatkan cara-cara penanganannya. Misalnya pada pembuatan dan penyimpanan vesikel


fosfolipid, keberadaan udara nitrogen atau gas inert selalu dipertahankan. Pengaruh lain yang dapat berpengaruh dalam formulasi vesikel adalah pH, ion-ion kuat, dan sistem pelarut.

E. Mekanisme Penghantaran obat

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penetrasi obat melintasi kulit pada TDS adalah memformulasi senyawa obat dalam suatu sistem penghantar, misalnya vesikel (liposom, niosom, etosom, transferosom, dan lain-lain). Secara umum, peningkatan kemampuan obat yang diformulasi dalam bentuk vesikel untuk melintasi kulit didasarkan pada interaksi yang terjadi antara komponen vesikel (*lipid bilayer*) dengan *lipid bilayer* di stratum korneum dan pada bagian interseluler.

Mekanisme Penetrasi Liposom dan Niosom

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya pada buku ini (bab III), bahwa vesikel yang tersusun dari fosfolipid akan dengan mudah melintasi struktur *lipid bilayer* stratum korneum dan interselulernya.




Gambar 4.15
Cara liposom
melintasi
membran

Vesikel memfasilitasi transport melalui pergerakan struktur liposom dalam daerah ekor (lipid) pada *lipid bilayer* stratum korneum.

Penetrasi vesikel (liposom dan niosom) melintasi kulit melalui mekanisme pengurangan kehilangan air transepidermal dan interaksi lipid bilayer stratum korneum dengan lipid pada vesikel.

Pada sisi target, vesikel melintasi membran secara langsung dan dengan mekanisme fagositosis (endositosis) seperti pada gambar berikut.




Gambar 4.16. Mekanisme pelintasan liposom pada sisi target

Mekanisme Penetrasi *Ethosome*

Peningkatan penghantaran obat menggunakan *ethosome* terjadi melalui mekanisme akibat interaksi etanol dan etosom dengan lipid kulit. Interaksi etanol dengan lipid kulit Etanol meningkatkan fluiditas dan menurunkan kerapatan lipid melalui interaksinya dengan molekul lipid pada bagian polar, sehingga permeabilitas kulit meningkat. Etosom yang fleksibel

berpenetrasi melintasi bilayer stratum korneum yang telah dirusak oleh etanol dan selanjutnya membuka jalur baru melalui interaksinya dengan bagian ekor bilayer (*lipid region*) stratum korneum. Interaksi ini menyebabkan terjadinya perenggangan *lipid bilayer* dan terjadinya fusi etosom pada lipid kulit, yang menyebabkan terlepasnya obat pada lapisan kulit yang lebih dalam (Anitha, *et al*, 2011; Tiwari, *et al*, 2010; Akiladevi, *et al*, 2010).




Gambar 4.17. Mekanisme Penerasi *Ethosome* pada Kulit (Maurya, *et al*, 2011)

Mekanisme Penetrasi Perkulutan Transferosom

Transferosom merupakan vesikel yang paling lunak dan fleksibel. Kandungan etanolnya menyiapkan jalan bagi vesikel ini untuk melintasi sel stratum korneum dengan mengurangi kerapatan *lipid bilayer* stratum korneum sehingga memberi jalur masuk bagi vesikel ini. Kelenturan transferosom memungkinkan vesikel ini melewati seluruh jalur penetrasi perkulutan,

yakni melalui celah antar sel, appendageal dan jalur yang telah disiapkan oleh etanol melintasi stratum korneum. Fleksibilitas yang dioptimalkan pada pembuatan transferosom, menyebabkan vesikel ini mampu melintasi celah yang sempit dengan menyesuaikan bentuk dan ukurannya.

Fleksibilitas transferosom dan peningkatan permeabilitas kulit, memungkinkan transferosom berpenetrasi lebih cepat dibandingkan vesikel jenis lainnya, dan mencapai lapisan kulit lebih dalam hingga sirkulasi sistemik dengan tetap mempertahankan obat yang dikandungnya. Aliran transferosom dari lapisan-lapisan epidermis mengikuti gradient air. Aplikasi transferosom pada stratum korneum yang kering, menyebabkan transferosom menuju lapisan kulit sebelah dalam yang lebih kaya akan air, seterusnya hingga masuk ke aliran darah.



Gambar 4.18. Rute penetrasi vesikel. (A).Konvensional vesikel;(B) Transferosom; (C) Deformasi transferosom; (D) Reformasi transferosom; (E) Stratum korneum

F. Patch

Sediaan transdermal yang paling sering dijumpai di pasaran saat ini adalah *transdermal therapeutic sistem* (TTS) yang biasa disebut sebagai plester (*patch*). *Patch* dirancang untuk membawa sejumlah obat yang efektif terapeutik untuk melintasi kulit manusia.

Komponen Patch

Patch terdiri atas beberapa komponen yang menyusunnya komponen utama dalam pembuatan sistem penghantaran obat transdermal tipe *patch*, yaitu (Patel, Divyesh, et.al, 2011; Kumar P, 2011):

a. Drug

Obat dalam sediaan ini dalam keadaan terlarut (terdispersi molekuler) dengan pembawanya dan berkontak langsung dengan lapisan pelepasan. Obat biasanya ditampung dalam suatu penampung (*Drug Reservoir*), berupa lapisan yang dilengkapi dengan material yang dapat menampung obat dan mengontrol pelepasan obat. Obat harus terdispersi dengan baik dalam bagian cair yang inert dalam lapisan ini (Kandavilli, Sateesh. 2002).

b. Matriks Polimer

Polimer adalah komponen penting dalam sistem penghantaran obat transdermal. Beberapa jenis bahan polimer telah digunakan untuk mengontrol kecepatan penghantaran obat. Mekanisme pelepasan obat tergantung pada sifat fisikakimia obat dan polimer yang digunakan pada pembuatan. Beberapa kriteria memuaskan dari polimer dalam penghantaran obat transdermal, adalah:

- 1) Bobot molekul. Suhu transisi, gugus fungsional atau polimer akan membantu difusi dan pelepasan obat yang spesifik.
- 2) Polimer dapat bercampur dengan obat dalam segala perbandingan
- 3) Polimer tidak bereaksi secara fisika atau kimia dengan obat
- 4) Polimer harus mudah dibuat dan difabrikasi menjadi produk obat dan tidak mahal
- 5) Polimer harus stabil dan tidak mengalami dekomposisi dengan adanya obat dan bahan tambahan lain yang digunakan dalam formulasi pada keadaan lembab atau pada temperatur tubuh.
- 6) Polimer dan hasil degradasinya harus tidak toksik
- 7) Tidak mengandung bahan kosolven yang dapat ditambahkan untuk meningkatkan kelarutan obat.

Polimer merupakan dasar dari pembuatan sistem penghantar seperti transdermal *patch* tipe matriks. Menurut Kandavilli, *et al*, (2002); Rathbone, *et al*, (2002), beberapa polimer yang digunakan sebagai pembawa pada pembuatan *patch* tipe matriks ada dua jenis, yaitu polimer hidofilik seperti hidroksi propil metil selulosa (HPMC), hidroksi propil selulosa (HPC) dan polivinilpirolidon (PVP). Yang kedua berupa polimer hidrofobik seperti etil selulosa (EC), polietilen dan polivinil klorida.

Penggunaan polimer hidofilik seperti PVP akan menyebabkan media disolusi mudah berpenetrasi ke dalam matriks, sehingga terjadi difusi bahan obat yang cepat. Namun dalam

penggunaannya, polimer hidrofilik tidak sesuai untuk bahan yang mudah larut dalam air. Penggunaan polimer hidrofobik seperti etil selulosa dapat memperlambat laju pelepasan obat. Semakin tinggi konsentrasi etil selulosa yang digunakan, maka laju pelepasan obat makin lama.

Agar pelepasan obat lebih efektif perlu dilakukan modifikasi sifat polimer dengan menggunakan campuran polimer yang bersifat hidrofilik dan hidrofobik, seperti kombinasi PVP dan etil selulosa. Pengaruh penambahan PVP ke dalam campuran etil selulosa menyebabkan terbentuknya pori-pori sehingga menyebabkan laju pelepasan obat menjadi konstan (Kandavilli, Rathbone, 2002).

c. Bahan tambahan

Bahan tambahan adalah bahan yang digunakan untuk memodifikasi sifat polimer dan kecepatan pelepasan obat. Bahan tambahan tersebut adalah :

1) Polimer peanut silang; tingginya derajat tautan silang, menyebabkan obat lebih kuat bersama polimer dan difusi molekul melintasi matriks berlangsung sangat lambat. Hal ini berguna untuk mengontrol kecepatan pelepasan obat meninggalkan matriks menuju kulit untuk selanjutnya berpenetrasi.

2) Campuran polimer

Polimer dapat dikombinasi dalam beberapa variasi untuk menggabungkan kelebihan dari masing-masing polimer. Penggabungan polimer memudahkan dalam produksi dan memanipulasi pengangkutan obat dan memperbaiki sifat hidrasi, kecepatan degradasi dan kekuatan mekanik.

3) *Plasticizer*

Plasticizer dapat mengurangi kekakuan polimer serta meningkatkan karakteristik difusi obat. Jenis *Plasticizer* yang sering digunakan, antara lain adalah propilen glikol, polietilen glikol, gliserol, dan dibutil ftalat.

Menurut *Mellen*, (1963), Pengelastis atau *plastizer* dalam konsep sederhana dapat didefinisikan sebagai pelarut organik dengan titik didih tinggi. Apabila ditambahkan ke dalam resin yang keras atau kaku seperti karet dan plastik maka, akumulasi gaya intramolekuler pada rantai panjang akan menurun sehingga kelenturan atau fleksibilitas kelunakan (*softness*) bertambah (*Dede*, 2007).

d. Peningkat penetrasi

Untuk mengurangi resistensi *stratum corneum* dan variasi biologis dari *stratum corneum*, digunakan bahan-bahan yang dapat meningkatkan penetrasi dalam kulit (*Swarbrick*, 1995). Senyawa ini mampu meningkatkan permeabilitas kulit melalui penurunan sifat barrier untuk meningkatkan fluks penetran. Peningkat penetrasi salah satunya adalah merupakan senyawa kimia yang dapat meningkatkan permeabilitas *stratum korneum* dengan mengurangi sifat *barrier* *stratum korneum*. Beberapa persyaratan bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai peningkat penetrasi perkutan antara lain bersifat tidak toksik, tidak mengiritasi dan tidak menyebabkan alergi, tidak memiliki aktivitas farmakologik, dapat mencegah hilangnya substansi endogen dari dalam tubuh, dapat bercampur dengan bahan aktif dan bahan pembawa dalam sediaan,

dapat diterima oleh kulit dan dengan segera dapat mengembalikan fungsi kulit ketika dihilangkan dari sediaan (Williams, 2004; Vasant. V, 2004). Merupakan Enhancer dapat digolongkan atas pelarut, surfaktan, dan misel kimia.

Peningkat penetrasi dapat digunakan dalam formulasi obat transdermal untuk memperbaiki *fluks* obat melewati membran. *Fluks* obat melewati membran dipengaruhi oleh koefisien difusi obat melewati *stratum corneum*, konsentrasi efektif obat yang terlarut dalam pembawa, koefisien partisi antara obat dengan *stratum corneum* dan dengan tebal lapisan membran. Peningkat penetrasi yang efektif dapat mengurangi efek penghalangan dari *stratum corneum* (Williams, 2004:56).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya pada bagian lain dalam buku ini, bahwa peningkat penetrasi dapat bekerja melalui tiga mekanisme yaitu dengan cara merusak struktur *stratum corneum*, berinteraksi dengan protein interseluler dan memperbaiki partisi obat, *coenhancer* atau *cosolvent* ke dalam *stratum corneum* (Walters Kenneth A, 2002:43). Bahan peningkat penetrasi yang biasa digunakan dalam pembuatan *patch* adalah etanol, menthol, methanol, terpenoid, surfaktan (seperti natrium laurel sulfat, pluronic F68, Pluronic F127, dan lain-lain).

e. *Drug reservoir* (penampung obat)

Komponen ini harus kompartibel dengan obat dan harus memungkinkan untuk obat bergerak dengan kecepatan yang diinginkan. Jika digunakan ointment, *drug reservoir* ini harus memiliki viskositas yang menjamin proses pembuatannya dapat diandalkan.

Komponen reservoir harus memiliki sifat adhesi dan kohesi untuk mempertahankan sistem. Bahan yang dapat digunakan sebagai *drug reservoir* adalah minyak mineral, poliisobutilen, dan silika koloidal.

f. *Backing layer*

Backing merupakan lapisan film yang biasanya terbuat terbuat dari lapisan polyester, *ethylene vinyl alcohol* (EVA), atau lapisan polyurethane dengan fungsi utama komponen ini adalah untuk menyediakan penyokong, dan melindungi *patch* dari lingkungan luar. Lapisan ini berguna untuk melindungi obat dari air dan sebagainya yang dapat merusak obat. Sebagai lapisan penyokong, komponen ini harus memiliki sifat-sifat berikut:

- 1) Komponen ini harus dapat mencegah bentuk sediaan meninggalkan tempat ini menuju permukaan.
- 2) Bersifat impermeable terhadap obat dan bahan peningkat penetrasi.
- 3) Kelembaban rendah.
- 4) Memiliki elastisitas, fleksibilitas, dan gaya tarik yang optimal.
- 5) Kompatibel dengan obat, enhancer, adhesive, dan bahan tambahan lainnya.

Membran penyokong ini dapat tersusun dari lapisan berwarna, *aluminium vapor coated layer*, film plastik (polietilen, polivinil klorida, dan polyester) dan *head seal layer*.

g. *Rate controlling membran*

Membran ini berfungsi untuk mengendalikan kecepatan pelepasan obat dari *reservoir* dan *multi-layer patch*. Membran terbuat dari polimer alam seperti kitosan, polypropylene berpori mikro dan

poly-2-hydroxyethyl methacrylate (PHEMA) yang berfungsi sebagai membran pengatur jumlah dan kecepatan pelepasan obat dari sediaan menuju permukaan kulit (Kandavilli, Sateesh. 2002;63).

h. *Adhesive layer*

Merupakan bagian yang akan melekatkan komponen-komponen *patch* dan melekatkan *patch* ke kulit. Sediaan transdermal *patch* didesain untuk dapat melekat pada wajah atau bagian belakang tubuh, sehingga bahan perekatnya tidak mengiritasi, tidak menyebabkan sensitasi dan mengganggu keseimbangan flora normal kulit selama penggunaan. Lapisan perekat atau semacam lem ini juga berfungsi untuk menempelkan *impermeable backing* beserta *drug reservoir* pada kulit.

Tiga kelas utama polimer yang potensial untuk digunakan dalam aplikasi medik sebagai lapisan adhesif pada sediaan *patch*, yaitu :

- 1) Poliisobutilen tipe sensitif terhadap tekanan,
- 2) Acrylic tipe sensitif terhadap tekanan, dan
- 3) Silikon tipe sensitif terhadap tekanan.

i. *Release liner*

Pembatas ini berfungsi melindungi *patch* selama penyimpanan. Lapisan ini berguna untuk mencegah melekatnya lapisan perekat pada kemasan sebelum digunakan dan harus dilepaskan sebelum penggunaan sistem transdermal ini. Lapisan ini mencegah kehilangan obat yang berpindah ke lapisan adhesif selama penyimpanan, serta mencegah dari kontaminasi. Lapisan ini tersusun atas lapisan dasar yang mungkin bersifat oklusif atau tidak, dan pembungkus lapisan tersusun atas silicon

atau Teflon. Bahan penyusun lainnya adalah polyester, foil, dan metalized laminat.

Tabel 4.4. Komposisi *patch*

No.	Polimer	Diproduksi	Obat	Tipe sistem
1.	Etil sellulosa T-50	Sigma	Isosorbit dinitra	Matriks
2.	HPMC		Hidrokortison	Gel
3.	Eudragit NE, eudragit E 100, eudragit L 100	Rohm, Germany	Coumarin Melilot ekstrak kering	Matriks
4.	MDX-4-421 (a silicon)	Dow corning	L-Timolo maleat	Matriks
5.	Carboksil vinil polimer		L-Dopa	Gel
6.	Soybean lecitin	Lucas meyer, Germany	Scopolamin, broxaerol	Gel matriks
7.	Cariflex TR-1107	Shell Chemical, Japan	Dihidro etorpin	Obat dalam adhesive
8.	Sillikon oil EVA Polisobutilen Scotch pak 1006	Adhesive research	Arecoline	Reservoir Membran Adhesive Backing film
9.	2-Etilhexil akrilate dan akrilik acid copolimer	Mitsubishi petrochem Co, Japan	PGE	Obat- dalam- adhesive matiks


Saat ini, terdapat dua tipe *patch* yang berkembang yaitu *patch* dengan sistem reservoir dan *patch* dengan sistem matriks (*drug in adhesive system*). Inti perbedaan diantara keduanya adalah pada sistem reservoir pelepasan obat dari sediaan dan laju permeasi kulit ditentukan oleh kemampuan kulit mengabsorpsi obat sedangkan pada sistem matriks laju pelepasan obat dari sediaan diatur oleh matriks. Contoh obat yang diberikan secara transdermal *patch* adalah nitrogliserin (digunakan untuk pengobatan angina). Pada umumnya *patch* (plester) nitrogliserin transdermal ditempelkan di dada atau punggung. Yang harus diperhatikan adalah *patch* ini harus ditempatkan pada kulit yang bersih, kering, dan sedikit ditumbuhi rambut agar *patch* dapat menempel dengan baik.

Tipe *patch* transdermal :

Patch transdermal terdiri dari beberapa tipe, antara lain :

1) *Single layer drug in adhesive*

Pada tipe ini, lapisan adhesif langsung mengandung obat. Lapisan adhesif ini tidak hanya berfungsi melekatkan berberapa lapisan, tetapi berperan untuk melepaskan obat ke kulit. Lapisan adhesif dikelilingi oleh lapisan sementara dan *backing layer*.




Gambar 4.19. Skema *patch* tipe *Single layer drug in adhesive* (Sheth S Nirav dan Raja Mistry, 2011)

Sistem ini dikarakteristikkan sebagai sistem yang dapat menyerap obat secara langsung dengan perekat yang kontak pada kulit. Sistem transdermal ini dirancang agar adhesif tidak hanya disiapkan sebagai sistem perekat pada kulit, tetapi juga sebagai dasar formula, menahan obat dan seluruh bahan tambahan di bawah lapisan tipis pendukung tunggal. Kecepatan pelepasan obat dari sistem ini bergantung pada difusinya melintasi kulit (Sheth S Nirav dan Raja Mistry, 2011).

2) *Multi layer-Drug-in-Adhesive*


Multi-layer Drug-in-Adhesive mirip dengan *Single layer Drug in Adhesive* tetapi mengandung lapisan yang dapat melepaskan obat dengan segera dan lapisan lainnya yang akan mengontrol pelepasan obat bersama dengan lapisan adhesif. Lapisan adhesif bertanggung jawab pula dalam pelepasan obat. *Patch* ini juga mempunyai lapisan sementara dan lapisan pendukung yang tetap (*permanent backing*). Tipe ini memiliki tambahan satu lapis membran antara dua lapisan adhesif yang mengandung obat atau terdapat berbagai obat dalam lapisan-lapisan adhesif di bawah lapisan pendukung.



Gambar 4.20. Tipe *patch Multi layer-Drug-in-Adhesive* (Sheth S Nirav dan Raja Mistry, 2011)

3) *Drug Reservoir in adhesive*

Reservoir transdermal sistem dikarakterisasi dengan adanya kompartemen cair yang mengandung larutan obat atau terdispersi yang dipisahkan dari lapisan pelepasan oleh membran semipermeabel dan adhesif. Komponen adhesif bertanggung jawab untuk berlekatan dengan kulit dan dapat menyatu dengan membran dan lapisan pelepasan atau sebagai konfigurasi konsentris di sekitar membran.



Gambar 4.21 . Tipe *patch Drug Reservoir in adhesive* (Sheth S Nirav dan Raja Mistry, 2011)

4) *Vapour patch*

Pada *patch* tipe ini, lapisan adhesif tidak hanya sebagai perekat beberapa lapisan bersama-sama, tetapi juga melepaskan aroma. *Patch* ini tergolong

baru di pasaran, biasanya digunakan untuk melepaskan minyak esensial dalam saluran nafas. Beberapa jenis *vapour patch* tersedia di pasaran yang digunakan untuk meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi kondisi asap rokok.

5) *Reservoir System*

Pada sistem ini, penampung obat (*drug reservoir*) tertanam antara lapisan pendukung (*backing layer*) dan membran yang mengontrol pelepasan. Obat dilepaskan hanya dengan melintasi membran pengatur ini, yang memiliki pori berukuran kecil (*micro porous*) atau tidak berpori. Di dalam kompartemen penampung obat, obat dapat dalam bentuk larutan, suspensi, gel atau dispersi dalam matriks polimer padat. Polimer adhesif hipoalergenik dapat digunakan sebagai permukaan luar membran polimer yang cocok dengan obat.

6) Sistem matriks

a) *Drug in adhesive sistem*


Pada tipe ini penampung obat dibentuk melalui disperse obat dalam polimer adhesif dan penyebaran polimer adhesif obat menggunakan pelarut atau dilebur pada lapisan pendukung. Pada bagian atas penampung, dilekatkan lapisan polimer adhesif untuk melindungi.

b) *Matrix-indispersion system*

Pada tipe ini, obat didispersikan secara homogen dalam matriks polimer lipofilik atau hidrofilik. Cakram polimer yang mengandung obat dilekatkan pada dasar lempeng oklusif dari lapisan pendukung yang impermeable.

c) *Drug matrix in adhesive*

Sistem matriks ini mengandung matriks semi padat yang mengandung obat dalam bentuk larutan atau disperse yang berhubungan langsung dengan lapisan pelepasan. Komponen yang bertanggung jawab untuk merekatkan kulit secara konsentrik berkonfigurasi di sekitar matriks semi padat.



Gambar 4.21. Tipe *Drug matrix in adhesive* (Sheth S Nirav dan Raja Mistry, 2011).

6) *Mikroreservoir system*

Sistem penghantaran obat tipe ini adalah kombinasi penampung dengan matriks sistem disperse. Penampung obat dibentuk dengan mensuspensikan obat dalam dalam larutan polimer larut air, kemudian didispersikan larutan yang homogen ini dalam polimer lipofilik untuk membentuk ribuan rongga speris berukuran mikroskopik sebagai penampung obat. Suspensi yang merupakan sistem termodinamika tidak stabil, distabilkan dengan pautan silang polimer pada tempat tersebut dengan agen penaut silang.

Kebanyakan sediaan transdermal *patch* diformulasi untuk melepaskan bahan aktif pada laju

pelepasan orde nol selama waktu tertentu. Namun, sekarang obat dapat diberikan menuju sirkulasi sistemik dengan rute transdermal melalui sistem *patch*. Dan yang paling penting, jika terjadi efek samping seperti reaksi alergi, toksik, dan sebagainya, terapi obat dapat dihentikan dengan melepaskan sediaan seketika dari kulit.

Meskipun ada beberapa variasi, saat ini sistem penghantar obat tipe *patch* tetap menggunakan salah satu dari tiga prinsip desain dasar, yaitu bahwa obat dalam perekat (adhesif), obat dalam matriks (biasanya polimer), atau obat dalam reservoir (Mark Gibson, 2009). Keuntungan sediaan *patch* transdermal:

- a. menghindari metabolisme lintas pertama presistemik dan sistemik,
- b. mengontrol pelepasan (pelepasan tertunda),
- c. penggunaannya menyenangkan, dengan rute yang tidak merusak jaringan,
- d. penggunaannya mudah untuk penghantaran obat topikal dan sistemik,
- e. mengurangi kemungkinan toksisitas sistemik, dan
- f. mengurangi keluhan pasien.

Kelemahan sediaan *patch* transdermal

1. dapat menyebabkan iritasi kulit dan dosis yang dapat diformulasikan dalam *patch* terbatas,
2. *lag time* untuk absorpsi/onset dan variasi kecepatan absorpsi obat sehubungan dengan sisi pemberian dan kegagalan sifat perekatnya, dan
3. pembuatannya berbiaya tinggi.

Metode Pembuatan *Patch*

a. *Asymetric TPX membran method*

Suatu proptotipe *patch* dapat difabrikasi untuk film polyester heat sealable (type 1009,3m) dengan membran konkav berdiameter 1 cm, dapat digunakan sebagai membran pendukung (*backing membran*). Sampel obat diisi ke dalam membran konkav, dan ditutup dengan membran asimetrik TPX {poli(4-metil-1-penten)}, kemudian disegel dengan adhesive.

Pembuatan :

TPX dilarutkan dalam campuran pelarut sikloheksan dan non pelarut tambahan pada suhu 60°C hingga terbentuk larutan polimer. Larutan polimer tersebut disimpan pada suhu 40°C selama 24 jam dan dituang ke dalam pelat kaca. Film diuapkan pada suhu 50°C selama 30 detik, selanjutnya pelat kaca tersebut dibenamkan dalam wadah koagulasi pada suhu kamar. Setelah 10 menit dibenamkan, membran dapat dikeluarkan dan dikeringkan dalam oven suhu 50°C selama 12 jam.

b. *Circular Teflon mould method.*

Larutan yang mengandung polimer dalam beberapa variasi dalam pelarut organik. Jumlah obat terlarut dihitung separuh dari jumlah pelarut organik yang digunakan. Enhancer dengan konsentrasi berbeda dilarutkan dalam setengah bagian pelarut organik, kemudian ditambahkan. Palstiziser (di-N-butilftalat) ditambahkan ke dalam larutan obat-polimer. Campuran seluruhnya diaduk selama 12 jam dan dituang dalam cetakan Teflon. Cetakan ditempatkan pada permukaan yang datar dalam laminar air flow (LAF) dengan kecepatan aliran udara 0,5 m/s dan ditutup dengan corong terbalik untuk mengontrol

penguapan pelarut. Pelarut boleh diuapkan selama 24 jam. Film yang kering disimpan selama 24 jam pada suhu $25 \pm 0,5^\circ\text{C}$ dalam desikator yang mengandung silica gel sebelum dilakukan evaluasi untuk meminimalkan efek aging. Tipe film dievaluasi setelah 1 minggu sejak pembuatan.

c. *Mercury substrate method*

Pada metode ini, obat dilarutkan dalam larutan polimer yang mengandung plastiziser. Larutan kemudian di aduk selama 10-15 menit untuk menghasilkan disperse yang homogeni dan dituang dalam permukaan merkuri, ditutup dengan corong terbalik untuk mengontrol penguapan pelarut.

d. *By using "IPM membranes" method*

Pada metode ini, obat didispersikan dalam campuran air dan propilen glikol yang mengandung carbomer 940 dan diaduk selama 12 jam menggunakan *magnetic stirrer*. Dispersi kemudian dinetralkan dan dibuat kental dengan trietanolamin. Buffer pH 7,4 dapat digunakan pula dalam pembentukan larutan gel, jika obat terlarut dalam larutan yang sangat encer. Bentuk gel akan disatukan dengan membran IPM.

e. *By using "EVAC membranes" method*

Dalam menyiapkan sistem transdermal untuk target terapeutik, digunakan carbopol gel 1% sebagai reservoir, polietilen (PE), etilen vinil acetat copolymer (EVAC) sebagai membran yang mengontrol kecepatan.

Jika obat tidak larut dalam air, propilen glikol digunakan untuk penyiapan gel. Obat dilarutkan dalam propilen glikol, resin carbopol akan ditambahkan ke dalam larutan dan dinetralkan

dengan menggunakan larutan natrium hidroksida 5% w/w. Obat dalam gel ditempatkan pada lapisan pendukung, menutupi area yang disiapkan. Membran yang mengontrol kecepatan ditempatkan di atas gel dan tepinya akan disegel dengan pemanasan untuk mencegah kebocoran.

f. *Aluminium backed adhesive film method*

Sistem penghantaran obat transdermal dapat menghasilkan matriks yang tidak stabil jika mengandung obat lebih besar dari 10 mg. Metode ini sesuai untuk diterapkan dalam pembuatan sistem penghantar ini. Dalam pembuatan dengan metode ini, kloroform dipilih sebagai pelarut karena kebanyakan obat dan adhesifnya larut dalam pelarut ini. Obat dilarutkan dalam kloroform dan bahan adhesif ditambahkan ke larutan obat dan dilarutkan bersama. Matriks yang dibuat dilapiskan pada aluminium pendukung dan tepinya dieratkan.

g. *By using Proliposom*

Proliposom disiapkan melalui penggunaan teknik deposit film. Sediaan disiapkan dengan memasukkan 5 mg serbuk manitol dalam labu alas bulat 100ml dan disimpan pada temperatur 60-70°C dan labu di putar pada 80-90 rpm dan manitol dikeringkan selama 30 menit. Setelah kering, temperatur diatur pada 20-30°C. obat dan lecithin (0,1:2,0) dilarutkan dalam 0,5 ml campuran pelarut organik yang sesuai dalam labu alas bulat pada suhu 37°C. Setelah kering sempurna, sebanyak 0,5 ml campuran pelarut ditambahkan kembali dan dikeringkan. Campuran ini kemudian diliofilisasi dan obat yang diangkut oleh manitol (proniosom) ditempatkan dalam desikator semalam dan lalu diayak melewati ayakan dengan mesh 100.

Serbuk dikumpulkan dan dibekukan hingga dilakukan karakterisasi.

h. *By using free film method*

Film bebas dari selulosa asetat disiapkan melalui penguapan di permukaan merkuri. Larutan polimer 2% disiapkan dengan menggunakan kloroform. Plastizer disatukan pada konsentrasi 40% w/w dari bobot polimer. Sebanyak 5 ml larutan polimer dituang dalam cawan petri. Kecepatan penguapan pelarut dikontrol dengan menempatkan corong terbalik pada cawan petri. Film yang terbentuk diamati melalui permukaan merkuri setelah penguapan pelarut sempurna.

Film yang kering dilepaskan dan disimpan antara lembaran kertas minyak dalam desikator hingga akan digunakan. Film bebas dengan ketebalan berbeda dapat disiapkan dengan mengubah volume larutan polimer.

Evaluasi *patch*

Evaluasi *patch* transdermal meliputi:

a. Studi interaksi

Bahan tambahan merupakan komponen yang hampir selalu ada dalam bentuk sediaan farmasi. Stabilitas formulasi tergantung dari ketercampuran antar masing-masing bahan dan dengan obat. Stabilitas kimia dan fisika sediaan sangat memengaruhi stabilitas dan bioavailabilitas obat. Jika tidak terdapat data yang mendukung dalam pemilihan bahan tambahan, maka perlu dipelajari tentang kompatibilitasnya dengan bahan lain dan obat dalam formula.

Karakteristik fisika kimia masing-masing komponen formula seperti pengukuran kadar, titik lebur, panjang gelombang maksimum, absorbs maksimum, dan sebagainya, dapat dibandingkan dengan menggunakan teknik analisis termal, FT-IR, UV dan kromatografi.

- b. Ketebalan *patch*
Perbedaan ketebalan obat yang diangkut oleh *patch* dapat diukur dengan micrometer digital dan dihitung rata-rata ketebalannya dan standar deviasi dari masing-masing *patch* yang diukur diuji.
- c. Keseragaman bobot
Patch yang telah dibuat, dikeringkan terlebih dahulu pada suhu 60°C sebelum diuji. Beberapa bagian tertentu *patch* dipotong dan ditimbang dengan timbangan analitik. Rata-rata bobot dan standar deviasi dapat dikalkulasi dari bobot setiap *patch*.
- d. Ketahanan lipat
Strip tertentu harus dipotong merata dan berulang-ulang dilipat di tempat yang sama sampai pecah/patah. Jumlah kali film dapat dilipat di tempat yang sama tanpa pecah menunjukkan nilai ketahanan lipatnya.
- e. Kandungan lembab (*moisture content*)
Ditimbang masing-masing film yang telah dibuat dan disimpan dalam desikator (suhu kamar) yang mengandung kalsium klorida aktif selama 24 jam. Setelah 24 jam, film ditimbang kembali dan dihitung persen kandungan lembabnya mengikuti rumus:
$$\% \text{ kandungan lembab} = \frac{\text{bobot awal} - \text{bobot akhir}}{\text{bobot akhir}} \times 100$$
- f. Penyerapan lembab (*moisture uptake*)

Film yang telah ditimbang bobotnya disimpan dalam desikator selama 24 jam yang mengandung larutan kalium klorida dengan kelembaban 84%. Setelah 24 jam film ditimbang kembali dan dihitung penyerapan lembabnya dengan rumus:

$$\% \text{ penyerapan lembab} = \{(\text{bobot awal} - \text{bobot akhir}) / \text{bobot awal}\} \times 100$$

g. *Water vapour permeability (WVP)*

Permeabilitas uap air *patch* dapat diukur dengan menggunakan metode penggantian sirkulasi udara oven dengan udara alami. WVP dapat diukur menggunakan rumus:

$$WVP = w/A$$

WVP dalam satuan gm/m² per 24 jam

W adalah jumlah uap yang berpermeasi melintasi *patch* dalam gm/24 jam dan A adalah luas permukaan paparan sampel dalam m².

h. Kadar obat

Seluas area tertentu *patch* dilarutkan dalam sejumlah volume tertentu pelarut yang sesuai. Kemudian larutan disaring melewati penyaring dan dianalisis obat yang terkandung dalam sediaan dengan metode UV atau HPLC. Masing-masing nilai dirata-ratakan dari 3 kali replikasi perlakuan.

i. *Uniformity of dosage unit test*

Keseragaman dosis per unit *patch* dapat dilakukan dengan menimbang bobot dari bagian-bagian *patch* dan dilarutkan dalam volume tertentu (labu takar). Larutan disonikasi untuk mendapatkan hasil ekstraksi obat yang maksimum. Hasilnya diendapkan selama 1 jam dan supernatannya dicuplik dan dilarutkan dalam sejumlah volume pelarut. Larutan disaring menggunakan penyaring

dengan diameter pori 0,2 μm dan dianalisis dengan metode UV atau HPLC dan kadar per potong dikalkulasi.

- j. *Polariscope examination*
Uji ini dilakukan untuk mengamati bentuk kristal obat dari *patch* dengan *polariscope*. Bagian dari beberapa area di tempatkan di atas objek gelas dan diamati kristal obatnya apakah ada bentuk kristal atau amorf dalam *patch*.
- k. *Shear Adhesion test*
Uji ini dilakukan untuk mengukur kekuatan kohesi dan adhesi polimer. Ini dapat dipengaruhi oleh bobot molekul dan derajat pautan silang dan dekomposisi polimer, tipe dan jumlah *tackifier* yang ditambahkan. Pita adhesif direkatkan pada plat stainless steel; sejumlah bobot tertentu digantungkan dari pita adhesif. Kekuatan adhesi ditentukan dengan mengukur waktu hingga pita adhesif terlepas.
- l. *Peel Adhesion test*
Dalam tes ini, akan ditentukan gaya yang dibutuhkan untuk menghilangkan sebuah lapisan perekat dari substrat tes yang disebut *peel adhesive*. Berat molekul polimer perekat, jenis dan jumlah bahan tambahan yang bervariasi akan ditentukan sifat *peel adhesive*. Satu pita direkatkan pada sebuah pelat *stainless steel* atau membran pendukung pilihan dan kemudian pita ditarik dari substrat dengan sudut 180° , dan gaya yang dibutuhkan untuk menghilangkan pita diukur.
- m. *Thumb tack test*
Ini adalah uji kualitatif yang diterapkan untuk menilai sifat tempelan perekat. Ibu jari hanya ditekan pada bahan perekat dan sifat penempelan dideteksi.

ii. *Flatness test*

Tiga longitudinal strip akan dipotong dari setiap film di bagian yang berbeda seperti salah satu dari pusat, satu dari sisi kiri, dan satu lagi dari sisi kanan. Panjang setiap strip diukur dan variasi panjang, karena ketidakseragaman di kerataan (*flatness*) diukur dengan menentukan persen penyempitan, dengan 0% penyempitan setara dengan 100% kerataan.

o. *Percentage Elongation break test*

Persentase elongasi patahan ditentukan dengan mencatat panjang sebelum titik patahan, persentase elongasi dapat ditentukan dengan rumus:

$$\text{Persen elongasi} = \{(L_1 - L_2) / L_2\} \times 100$$

L_1 : panjang akhir untuk masing-masing strip

L_2 : panjang awal untuk masing-masing strip

p. *Rolling ball tack test*

Ujian ini mengukur kelembutan polimer dalam hubungannya untuk berbicara. Dalam tes ini, bola *stainless steel* diameter 7/16 inci dilepaskan pada jalur miring yang cenderung menggulung ke bawah dan ketemu bidang horisontal, menghadap ke permukaan perekat. Jarak perjalanan bola sepanjang perekat diukur sebagai tempelan, yang dinyatakan dalam inci.

q. *Quick Stick (peel-tack) test.*

Dalam tes ini, pita ditarik dari substratnya pada suhu 90°C dengan kecepatan 12 inci/menit. Kekuatan kupas yang dibutuhkan untuk memecahkan ikatan di antara perekat dan substrat itu diukur dan tercatat sebagai nilai tempel, yang dinyatakan dalam ons atau gram per inci.

r. *Probe Tack test*
Dalam tes ini, ujung probe yang bersih dengan permukaan yang ditentukan kekasaran dikontakkan dengan perekat, dan ketika ikatan terbentuk antara probe dan perekat. Selanjutnya dilakukan penghilangan adhesif pada probe secara mekanik. Gaya yang dibutuhkan untuk menarik alat uji tersebut jauh dari perekat, dicatat sebagai kekuatan tempel dan dinyatakan dalam gram.

s. *In vitro skin permeation studies*
Uji permeasi in vitro dilakukan dengan menggunakan sel difusi. Kulit bagian perut tikus wistar yang telah dicukur bulunya dibersihkan dengan air suling. Selanjutnya kulit tersebut dipasang pada alat, kemudian ditempelkan sediaan *patch*. Selanjutnya alat dioperasikan pada suhu 37°C. Kompartemen penerima adalah larutan dapar fosfat pH 7,4 yang dilengkapi *magnetic stirrer*. Sejumlah tertentu volume cuplikan diambil (dari kompartemen penerima) secara periodik dan diukur kadar obat yang berhasil melintasi kulit dengan metode UV atau HPLC. Fluks ditentukan berdasarkan slope antaranilai tunak dan jumlah obat yang terpenetrasi ($\text{mg}\cdot\text{cm}^{-2}$) vs waktu (jam) serta koefisien permeabilitas yang diperoleh dengan membagi fluks dengan dosis awal ($\text{mg}\cdot\text{cm}^{-2}$).

t. *Skin Irritation study*
Uji iritasi dan sensitasi dilakukan dengan menggunakan kelinci sehat (bobot badan 1,2-1,5 kg). Pada bagian punggung kelinci dibersihkan dan dicukur bulunya. Selanjutnya sediaan *patch* dilekatkan pada kulit kelinci. Sediaan diangkat

setelah 24 jam dan kulit kelinci diamati dan diklasifikasikan dalam 5 tingkatan kerusakan kulit.

u. *Stability studies*

Stabilitas *patch* ditentukan berdasarkan petunjuk dengan menyimpan sampel *patch* pada suhu $40^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban $75 \pm 5\%$ selama 6 bulan. Sampel diamati pada hari ke 0, 30, 60, 90 dan 180 dan dianalisis kesesuaian kandungan obatnya.

Kondisi yang memungkinkan penggunaan *patch*:

- a. Ketika pasien tidak dapat mentolerir efek samping (termasuk konstipasi) ketika obat diberikan per-oral dan sistem ini merupakan metode alternatif dalam penghantaran obat
- b. Pengontrolan nyeri dapat mengandalkan rute pemberian ini. Rute ini mungkin berguna pada pasien dengan gangguan kognitif atau mereka yang dengan alasan lain tidak mampu mengobati dirinya sendiri dengan obat nyerinya.
- c. Ketika *patch* dapat dikombinasi dengan obat lain yang dapat menghasilkan efek sinergis.

Kondisi yang tidak memungkinkan penggunaan *patch*:

- a. Penanganan nyeri akut dan ketika kadar obat tercapai dengan cepat.
- b. Ketika dosis yang digunakan setara atau lebih besar dari 30mg/24 jam.

Mekanisme Pelepasan Obat

Absorpsi transdermal merupakan proses difusi obat yang berlangsung lambat dari gradient obat dengan konsentrasi tinggi (*patch*) menuju konsentrasi

rendah (nol) pada kulit. *Patch* harus dijaga tetap melekat pada kulit untuk waktu yang disarankan (beberapa jam hingga sehari). Formula ini diharapkan dapat menjaga konsentrasi obat dalam darah pada jendela terapeutik dengan kadar yang tidak lebih rendah dari *minimum effect concentration* (MEC) dan tidak mencapai kadar minimum toksik.

Perpindahan obat dari matriks *patch* ke lapisan-lapisan kulit difasilitasi oleh senyawa peningkat penetrasi yang digunakan dalam formula. Senyawa ini akan berintegrasi dengan *lipid bilayer* stratum korneum dan interseluler, sehingga terbentuk jalur penetrasi obat menuju lapisan kulit yang lebih dalam.

V

PERKEMBANGAN SEDIAAN TRANSDERMAL

Senyawa obat berbeda satu sama lain dari sifat fisika-kimia, dosis, cara interaksinya dengan membran fisiologis, farmakokinetik dan farmakodinaminya. Semua itu berkaitan dengan pertimbangan dalam memilih bentuk sediaan, rute penggunaan, dan konsentrasi terapeutiknya. Rute pemberian obat secara transdermal telah menawarkan banyak keuntungan dari segi efektifitas dan efisiensi penggunaan obat, toksisitas serta derajat kepatuhan dan kenyamanan pasien yang menggunakan. Meskipun demikian, tidak semua senyawa obat dapat diformulasi dalam bentuk sistem penghantaran obat transdermal.

A. Pertimbangan Pemilihan Senyawa Obat

Idealnya, obat-obat yang akan diberikan secara transdermal memiliki sifat-sifat (Gaur, et.al, 2009; Vinod, K.R. et.al, 2010):

1. Memiliki bobot molekul relatif kecil (kurang dari 500 Dalton).

Pada umumnya sediaan transdermal dapat mengangkut obat dengan sifat ini. Hal ini karena pada dasarnya stratum korneum pada kulit merupakan *barrier* yang cukup efektif untuk menghalangi molekul asing masuk ke tubuh sehingga satu sisi, hanya molekul-molekul yang berukuran sangat kecil saja yang dapat menembusnya.

Transferosom menunjukkan kelebihan yang berbeda dengan kemampuannya mengangkut molekul dengan bobot molekul rendah dan tinggi dengan sifatnya yang *ultradeformable*, sehingga tidak ada halangan dengan ukuran jalur yang dilaluinya.

2. Memiliki koefisien partisi sedang (larut baik dalam lipid maupun air).

Sifat partisi obat ini diperlukan agar obat-obat dapat melewati ruang hidrofilik dan lipofilik sepanjang pelintasannya di kulit. Molekul dengan koefisien partisi menengah ($\log K$ 1-3) dan molekul yang sangat lipofilik ($\log K >3$), akan menggunakan rute interselular sebagai jalur untuk melintasi stratum korneum. Namun untuk molekul-molekul ini, dipertimbangkan untuk dapat terpartisi keluar dari stratum korneum menuju lapisan-lapisan epidermis di bawahnya (*viable epidermal*). Untuk molekul yang lebih hidrofilik ($\log K <1$), melintasi kulit melalui jalur transeluler.

3. Memiliki titik lebur yang relatif rendah.

Telah diketahui bahwa senyawa organik memiliki titik lebur yang tinggi, relatif mudah larut dalam air pada suhu dan tekanan yang normal. Molekul lipofilik akan berpenetrasi melintasi kulit lebih cepat dibandingkan molekul hidrofilik. Oleh

karena itu sifat lipofilisitas menjadi salah satu sifat kandidat obat transdermal. Sifat kelarutan senyawa dalam air juga diperlukan mengingat umumnya sediaan topical diformulasi dengan berbasis air.

4. Ionisasi

Sesuai dengan teori partisi dan pH, maka hanya bentuk yang tidak terion yang dapat melintasi membran/barrier lipid dalam jumlah yang signifikan. Sehingga derajat ionisasi obat menjadi pertimbangan dalam pemilihannya untuk diformulasi menjadi sediaan transdermal.

5. Memiliki *effective dose* yang relatif rendah.

6. Perbaiki bioavailabilitas

Pada umumnya sistem penghantaran obat transdermal mampu menghantarkan obat dan melepaskan obat secara perlahan di sirkulasi sistemik. Penetrasi obat melalui kulit yang berlangsung bertahap memungkinkan kadar obat dalam darah dapat konstan dan lama tergantung besar dosis yang diaplikasikan serta fuks obat. Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa proses pelintasan kulit berlangsung diawali dengan terjadinya obat pada stratum korneum, kemudian terpartisi ke dalam sel-sel dan inteselular stratum korneun dan selanjutnya mengalami absorpsi secara difusi menuju lapisan kulit yang lebih dalam hingga ke sirkulasi sistemik.

Sediaan yang dirancang dalam sistem ini mampu memperpanjang waktu paruh dan meningkatkan bioavailabilitas obat disbanding penggunaan obat konvensional (ct. peroral).

Tabel 5.1. Parameter penentuan obat dalam TDDS
(Dhamecha, et.al,2009)

Parameter	Batas ideal
Kelarutan dalam air	>1mg/mL
Lipofilisitas	$10 < K_{o/w} < 1000$
Bobot molekul	< 500 Dalton
Titik lebur	< 200°C
pH dalam air	5-9
Dosis penggunaan	<10mg/hari

Transferosom dalam penggunaannya sebagai penghantar obat transdermal, dapat mengangkut obat-obat NSAID seperti diklofenak; ketoprofen, meloksikam, indometasin, dan lain-lain; kortikosteroid seperti prednisolon, protein *gap junction*, albumin, insulin, interferon, transdermal immunisasi, hormon seks, analgesik topical dan agen anestetik, serta obat-obat anti kanker (Anand, et.al, 2012; Shivanand, 2009).

Suatu obat dapat dibuat dalam bentuk sediaan *Patch* jika dosis pemberiannya kurang dari 20 mg per hari, waktu paruh pendek, tidak memberikan efek toksik pada kulit, berat molekul kurang dari 500 dalton, memiliki koefisien partisi 1-3, serta kelarutan dalam minyak dan air lebih besar dari 1 mg/ml.

Lapisan adhesif merupakan *barrier* yang menghambat laju pelepasan obat yang mengikuti orde nol (konstan) sedangkan pada sistem matriks material polimer yang iner akan berikatan dengan obat dan mengendalikan laju pelepasan dari sediaan. *Patch* dengan tipe matriks pembuatannya lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan tipe membran (Hendrati, 2009).

Obat-obat yang diformulasi dalam bentuk sediaan *patch* transdermal antara lain adalah nikotin untuk mengurangi efek asap rokok; estrogen untuk penanganan menopause dan osteoporosis; nitrogliserin untuk angina; dan klonidin untuk penanganan hipertensi. Saat ini sementara dikembangkan penggunaan kontrasepsi hormonal, antidepresan dan penghilang nyeri, dan stimulant *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) (Bharadwaj, 2011).

B. Kemajuan Dalam Formulasi Sediaan Transdermal

Data statistik menunjukkan bahwa penelitian, pengembangan, dan penggunaan sediaan transdermal mengalami peningkatan hampir dua kali lipat sejak tahun 2005 hingga 2010. Hampir semua industri mengembangkan bentuk sediaan ini. *Transdermal Drugs Delivery Sistem* (TDDS) dianggap lebih ideal penggunaannya dibandingkan pemberian injeksi dan peroral, tetapi banyak obat yang tidak efektif berpenetrasi di kulit karena permeabilitasnya terhadap barrier kulit rendah. Produsen obat saat ini mengembangkan beberapa senyawa dan teknologi yang dapat meningkatkan penetrasi perkutan obat-obat tersebut sehingga menambah deretan senyawa obat yang dapat dihantarkan secara transdermal (Bharadwaj, 2011).

Beberapa obat telah diteliti dan dikembangkan dalam suatu TDDS untuk memperbaiki bioavailabilitasnya dari rute pemberian yang lazim (konvensional). Obat-obat tersebut antara lain adalah:

a. Propranol hidroklorida.

Sejak bioavailabilitas oral propranolol hidroklorida diketahui rendah dengan efek

metabolisme lintas pertama yang tinggi, maka dikembangkanlah propranolol hidroklorida dalam bentuk *patch* dengan tipe matriks yang berbeda untuk mendapatkan polimer dengan pelepasan obat transdermal yang baik. Hasil uji pelepasan obat secara *in vitro* dengan menggunakan sel difusi Franz, dihasilkan pelepasan tertinggi pada penggunaan 2% larutan polimer etil selulosa dengan eugenol sebagai peningkat penetrasi (Sheth, 2011).

Formulasi transferosom propranolol hidroklorida menggunakan fosfatidilkolin 1,5% telah menampakkan karakteristik yang baik dengan kadar obat terserap (PDE) sebesar 68,26%. Vesikel transferosom ini berbentuk multilamellar vesikel (MLV) dan multivesikular vesikel (MVV) dengan diameter berkisar 2,4 - 28,8 μm (Pasry, 2012)



Gambar 5.1. Transferosom Propranolol hidroklorida (Pasry, 2012)

b. Timolol maleat

Timolol maleat adalah beta adreno reseptor bloker yang digunakan untuk mengatasi penyakit kardiovaskular seperti infark miokardia, angina

pectoris, dan hipertensi. Obat ini 8-10 kali lebih paten dibanding propranolol hidroklorida; cepat diabsorpsi di saluran cerna, dan memberi kadar puncak plasma 5-10 ng/mL setelah 1 jam; dimetabolisme di hati hampir 80% dengan waktu paruh 2-2,5 jam. Waktu paruh yang singkat ini menyebabkan diperlukannya frekuensi pemberian yang lebih sering untuk menjaga kadar terapeutik.

Swarnlata, et al telah memformulasi senyawa ini dalam sistem penghantaran transdermal *patch* menggunakan dua tipe polimer yaitu Hidroksipropilmetiselulosa (HPMC) dan etil selulosa (EC) serta dengan polimer tunggal polivinil alkohol (PVA). Polimer PVA 10% menghasilkan permeabilitas yang lebih tinggi dengan kadar obat yang terpenetrasi sebesar $1,589 \pm 0,2\%$ obat/cm² dibanding campuran polimer HPMC:EC (2:8) $0,987 \pm 0,2\%$ obat/cm² selama 4 jam.

c. Nicardipine hydrochloride

Nicardipine hydrochloride adalah suatu *calcium canal bloker* yang digunakan untuk menangani angina kronik stabil dan hipertensi. Pada pemberian oral, aksi obat dicapai pada menit ke 5-10 dengan durasi 15-30 menit. Waktu paruh obat bervariasi antara 2-4 jam dan bioavailabilitasnya rendah antar 20-40%. Formulasi obat ini dalam bentuk matriks *patch* campuran propilen glikol (PG), asam oleat (OA), dan dimetil isosorbid (DMI) dan campuran polimer PG/OA memperlihatkan fluks yang sangat baik.

Penggunaan polimer hidroksi propil selulosa gel 2% sebagai reservoir dan peningkat penetrasi limonene 4%, mampu meningkatkan fluks

permeabilitas nicardipin hidroklorida seiring peningkatan vinil asetat sebagai adhesif.

d. Captopril

Captopril adalah sediaan oral yang aktif sebagai ACE (angiotensin converting enzyme) inhibitor; digunakan secara luas untuk menangani hipertensi dan gagal jantung kongesti. Obat ini disarankan sebagai obat pilihan pada terapi hipertensi karena efektif dan toksisitasnya rendah. Waktu parunya pendek (2-3 jam) aksinya panjang 6-12 jam. Bioavailabilitasnya oralnya 75%, tetapi kehadiran makanan menurunkan absorpsinya sebesar 30-50%. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kecepatan oksidasi di kulit secara bermakna lebih rendah dibanding oksidasinya di usus; dan hasil oksidasinya di usus membentuk senyawa captopril disulfide yang menunjukkan absorpsi yang rendah di usus.

Formulasi *patch* captopril dalam matriks EC:HPMC (2:2) meningkatkan kecepatan pelepasan obat dan penetrasinya melintasi kulit (kelinci). Matriks ini secara *in vivo* menunjukkan tidak terdapatnya reaksi iritasi dan stabil selama 3 bulan.

e. Nifedipin


Nifedipin adalah obat yang potensial digunakan dalam penanganan hipertensi. Tetapi metabolisme lintas pertama yang ekstensif menyebabkan bioavailabilitas oralnya menjadi rendah. Sankar, et al, telah memformulasi dan mengevaluasi nifedipin transdermal *patch* yang disiapkan dengan polimer EC yang mengandung gliserin (40%) sebagai pastiziser. Formula ini memperlihatkan fleksibilitas yang baik pada penyimpanan suhu kamar dan studi

pelepasan in-vivo menunjukkan bahwa pelepasan obat dapat dikontrol selama 4 jam dengan jumlah obat yang dapat dilepaskan sebesar 82,6% pada jam ke-24.

Nifedipin juga telah diformulasi dalam sistem vesikel yaitu niosom dan etosom. Niosom yang dibentuk dengan metode hidrasi lapis tipis mampu menyerap nifedipin dengan PDE optimal sebesar 76% pada perbandingan span 60 dan kolesterol 200 μmol : 200 μmol ; dengan metode *slurry* mampu menyerap nifedipin dengan PDE optimal sebesar 66,042% pada perbandingan span 60 dan kolesterol 150 μmol :150 μmol . Niosom Nifedipin yang dibentuk dengan metode hidrasi lapis tipis mempunyai ukuran yang berkisar antara 0,48 μm -14,4 μm , dengan bentuk vesikel Multilamellar (MLV) sementara niosom Nifedipin yang dibentuk dengan metode *slurry* berukuran 24 μm , dengan bentuk vesikel Multilamellar (MLV) (Munir, 2011).

Ethosom nifedipin telah dibuat dengan mengoptimalkan kadar forfolipid (Nurasia, 2011) dan kadar etanol (Rizal, 2011) menghasilkan ethosom nifedipin terserap dalam niosom sebesar 71,44% dengan pembentuk vesikel terdiri dari fosfatidilkolin 1,5% dan etanol 50%. Vesikel ethosom noifedipin yang terbentuk berupa MLV dan MVV dengan diameter berkisar 1-15 μm (Rizal, 2012).

Uji in vitro pelepasan nifedipin dari sediaan niosom gel transdermal menunjukkan fuks sebesar 8,394 $\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{menit}^{-1}$, $r = 0,990$ (Anah, 2012).



Gambar 5.2. Vesikel nifedipin. (A) niosom nifedipin. (B) etosom nifedipin(Munir, 2011; Rizal 2012)

f. Asam 5-Aminolevulinik (ALA)

Sediaan topikal asam 5-aminolevulinik untuk pengobatan penyakit neoplastik dan nonneoplastik kutaneus seperti kanker kulit, keratosis, psoriasis dan acne vulgaris telah digunakan secara luas. Senyawa obat ini memiliki keasaman yang tinggi dan merupakan senyawa yang bersifat hidrofilik, bersifat toksik (dapat merusak dan mematikan sel), serta mempunyai keterbatasan untuk berpenetrasi ke dalam kulit. Untuk meningkatkan penetrasi dan mengurangi toksisitasnya, maka senyawa obat ini telah dikembangkan dalam bentuk vesikel liposom yang dibentuk dari fosfolipid dan kolesterol dan mampu meningkatkan *uptake* nya pada sisi target serta efikasinya dibandingkan penggunaan ALA bebas. Dengan sistem ini, stabilitas dan efek toksiknya dapat diperbaiki. ALA yang diformulasi dalam tranferosom yang dibentuk dari lyso-fosfolipid (SL80-3) dan surfaktan (Brij76) menunjukkan kemampuan penetrasi perkutan ALA (Han, 2011).

g. Flurbiprofen

Obat antiinflamasi ini telah diformulasi dalam bentuk niosom dengan penyusun span 60 (71,25mg), kolesterol (71,25 mg) dan disetilfosfat (7mg) untuk mendapatkan perbandingan formula 47,5: 47,5: 5. Niosom yang dihasilkan mampu menyerap obat sebesar 65% w/w. Sediaan ini pada penggunaan transdermal telah mampu memperbaiki efikasi terapeutiknya (Narsimha, 1993).

h. Pisoksikam

Niosom yang tersusun dari surfaktan nonionic telah dapat digunakan untuk mengangkut piroksikam dan memperbaiki efek terapeutiknya pada pemberian transdermal (Narsimha, 1993).

i. Ketoprofen

Sistem penghantaran ketoprofen dalam niosom telah dirancang dengan mengoptimasi penyerapannya dalam vesikel menggunakan campuran lipid yakni surfaktan nonionik span 60 dan kolesterol (1:1). Niosom yang dihasilkan dapat menyerap ketoprofen sebesar 66,16%; dengan bentuk vesikel MLVs berdiameter 1- 6 μm . Studi bioavailabilitas sediaan niosom gel ketoprofen transdermal dosis 20mg/kgBB secara in vivo pada kelinci menunjukkan kadar puncak plasma sebesar 1,415 $\mu\text{g/mL}$ yang dicapai pada jam ke 1,5, dengan AUC_{0-10} sebesar 8,29 $\mu\text{g}\cdot\text{jam/mL}$ (Ismail, 2010;Latifah, 2012).



Gambar. 5.3. Niosom ketoprofen (Ismail, 2010).
Optical micrograph pembesaran 100x
(Ismail, 2010)

- j. Ketolorac
Antiinflamasi non steroid potensial ini telah diformulasi dalam bentuk niosom melalui hidrasi obat ke dalam proniosom. Vesikel ini menunjukkan kemampuannya menghantarkan ketolorac melintasi kulit yang dengan peningkatan permeasi dan pengurangan lag time yang signifikan.
- k. Nimesulide
Nimesulide telah dikembangkan dalam bentuk sistem penghantaran obat transdermal dengan mengkarakterisasi dan mengevaluasi secara in vitro. Niosom nimesulide dihasilkan melalui optimasi penyerapan senyawa obatnya dalam vesikel yang dibentuk dari tween dan span dengan metode hidrasi lapis tipis. Hasil pengamatan terhadap kemampuan berpenetrasi melintasi kulit menunjukkan bahwa niosom nimesulide dapat melepaskan obat bebas secara perlahan serta meningkatkan retensi obat dalam kulit dan meningkatkan kemampuan penetrasinya dibanding-

kan dengan formulasi konvensionalnya (Shahiwala, 2002).

l. Estradiol

Vesikel niosom yang tersusun dari surfaktan nonionik polioksietilen alkil eter telah dapat menghantarkan hormon ini melintasi stratum korneum pada studi *in vitro* (Varshosaz, 2003)

m. Levonorgestrol

Suatu proniosom yang didasarkan pada sistem penghantaran obat transdermal terhadap levonorgestrol telah dikembangkan dan menghasilkan karakteristik yang memuaskan secara *in vitro* dan *in vivo*. Proniosom levonorgestrol dapat dikonversi menjadi niosom dengan menghidrasinya. Aplikasinya dalam sediaan *patch* telah menunjukkan efektifitasnya sebagai kontrasepsi (Fang, et al, 2001).

n. Ketokonazol

Niosom ketokonazol yang dibuat dengan metode injeksi eter menggunakan surfaktan nonionik tween 80 atau tween 40; kolesterol dan obat telah dievaluasi kemampuannya melepaskan obat menggunakan *cup plate method* dan aktivitas anti funginya pada kelinci. Niosom ketokonazol menunjukkan pencapaian efek terapi potensial dengan dosis yang lebih rendah dibandingkan sediaan konvensionalnya (Agarwal, 2001).

o. Pengangkutan DNA

Niosom telah terbukti menunjukkan kemampuan untuk menyerap dan menghantarkan vaksin DNA untuk penggunaan transdermal (Fang, 2001).

Tabel berikut memuat obat-obatan lain yang telah diformulasi dalam sistem penghantaran obat transdermal.

Tabel 5.2. Obat-obat yang telah diformulasi dalam liposom (Kozubek, et.al. 2000)

Drug	Application	Commercial name	Composition of liposo
Amikacin	Bacterial infections	MiKasome	HSPC/CH/DSPG
Adriamycin (doxorubicin)	Stomach cancer	-	DPFC/CH
Ampicilin	<i>Listeria monocytogenes</i>	-	CH/PC/PS 5:4:1 CH:DSPC:DPPG 10:10:1
Annamycin	Kaposi's sarcoma, Breast cancer, Leukemia	Annamycin	Liposomes
Amphotericin B	Systemic fungal infections	AmBisome	HSPC/CH/DSPG
All- <i>cis</i> -retinoic acid	Acute promyelocytic leukemia, Lymphoma, Prostate cancer	ATRAGEN	Liposomes
Muramyl dipeptide	Immunostimulator	-	DSPC/PS 1:1
1- β -D-Arabinofuranosidecytosine	Leukemia	-	SM/PC/CH 1:1:1
Ciprofloxacin	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-	DPFC
Clofazone	Macrophage suppression	-	PC/CH
Cis-diaminodichloroplatinum(II)	Cancers	-	Liposomes
Cyclosporin	Immunosuppressor	-	PC/CH
Chloroquine	Malaria	-	PC/PG/CH 10:1:5
Cu/Zn superoxide dismutase	Antiinflammatory	-	Liposomes
Doxorubicin	Cancers	Doxil	HSPC/CH/PEG-DSP
Doxorubicin	Breast cancer	EVACET	
Daunorubicin	Cancers	DaunoXome	DSPC/CH
Ganciclovir	Cytomegalovirus retinitis	-	Liposomes
Interleukin 2	Immunostimulant	-	DMPC
Leukotriene A4	Not estimated	-	PC/DCP/CH 7:2:1
Lipid A	Immunoadjuvant	-	Liposomes
Mitoxantron	Colon cancer	-	PC/Ch 7:1
Methotrexate	Cancers	-	DPFC/PI 18:2w/w
Nystatin	Systemic fungal infections	NYOTRAN	Liposomes
$\text{Na}_2\text{B}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	Cancers	-	DSPC/CH
Pentostam	Leishmaniasis	-	Niosomes
Platinum drugs e.g. cisplatin	Mesothelioma	PLATAR	Liposomes
Lurtotecan	Cancers	NX 211	Liposomes
Oligonucleotides against <i>c-myc</i>	Cancers	INXC-6295	Liposomes TCS
Prostaglandin E1	Anti-inflammatory	-	PC
Ribavirin	Herpes simplex	-	Liposomes
Streptosotocin	Lymphocyte activator	-	DMPC/CH 2:1
Suramin	Trypanosomes	-	DPPC

Sistem penghantaran obat transferosom telah dilaporkan dapat mengangkut dan menghantarkan protein dan peptide. Protein dan peptide adalah molekul biogenik besar yang sangat sulit diangkut ke dalam

tubuh, ketika diberikan per-oral, protein ini mengalami degradasi sempurna di saluran cerna. Berikut tabel yang memuat obat-obatan yang telah diformulasi dalam transferosom (Vinod, et al, 2012).

Insulin telah sukses dihantarkan oleh transferosom, dalam arti bahwa senyawa berbobot molekul besar ini tidak diinjeksikan (non invasive) dan berhasil melintasi kulit. Pada umumnya, insulin diberikan melalui rute subkutan yang tidak menyenangkan. Encapsulasi insulin dalam transferosom telah memperbaiki kelemahan penggunaannya. Efek hipoglikemik diperoleh setelah 90-180 menit setelah pemberian tranferosom insulin ini (R, Walve, 2011).

Tabel 5.3. Obat-obat dalam formula transferosom (Vinod, et al, 2012; Ravi, et al, 2012)

Obat	Indikasi	Keunggulan
Meloxicam	NSAID	Improved Meningkatkan permeasinya di kulit
Methotrexate	Anti kanker	Meningkatkan permeasinya di kulit
Oestradiol	Estrogen	Improved Meningkatkan fluks transdermal
Curcumin	NSAID	Improved Meningkatkan bioavailabilitas dan permeabilitas
Kortikosteroid	vitiligo	Improved sisi spesifik dan keamanan obat (aksi maksimal pada dosis rendah)
Norgetrol	progestin	Improved fluks transdermal
Tamoxifen	Kemoterapi	Improved fluks transdermal
Protein larut		Non invasive immunisasi; melintasi kulit normal

Human serum albumin		
Interferon - α	Pelindung antiviral	Efisiensi penghantaran
Interleukin-2	Regulator leukosit	Pelepasan terkontrol
Insulin	Hipoglikemik	Efisiensi enkapsulasi dan pengganti rute injeksi sub kutan
tetracain	Analgesic topikal	Sesuai untuk penanganan nyeri lokal non invasif
Anestetik	Anestesia	Anestesi untuk periode diperpanjang
Capsaisin	Nyeri	Meningkatkan penetrasi di kulit
Kolkisin	Gout	Meningkatkan penetrasi di kulit

Berikut adalah perkembangan formulasi obat dalam bentuk *patch* transdermal selama 10 tahun terakhir. Wakil satu formula obat dapat menunjukkan bahwa formulasi sediaan transdermal setiap tahun mengalami perkembangan.

Tabel 5.4. Perkembangan *Patch* sebagai sistem penghantaran obat transdermal (Vinod, K.R. et.al, 2010).

Tahun	Obat	Polimer	Indikasi	Hasil
2010	Ketotifen Fumarat	Etil selulosa dan HPMC	Asma dan kondisi alergi	Transdermal <i>patch</i> meningkatkan efikasi ketotifen fumarat untuk beberapa penyakit asma dan kondisi alergi
2009	Glimepiride	Etilen vinil asetat (EVA)	Diabetes	Glimepiride TDDS dengan

				polimer yang digunakan dapat menunjukkan hasil yang optimum
2008	Pentazocine hydrochloride	Cellulose acetate and ethyl cellulose	Nyeri	Fluks obat dipengaruhi oleh konsentrasi enhancer dan jenis membran pengontrol kecepatan yang digunakan
2007	Isosorbide dinitrate & bisoprolol	Acrylic resin	Hipertensi	Pada sediaan <i>patch</i> , efek kombinasi lebih baik dibanding penggunaan tunggal
2006	Formoterol Fumarate		Obstruksi kronik paru	Penggunaan menthol/NMP dan isopropyl myristat (IPM)/NMP dan pelarut efektif meningkatkan permeasi FF dan potensial digunakan secara transdermal
2005	Naloxone	HPMC	Opioid yang menginduksi CNS dan depresi pernafasan	Kadar tunak Naloxone dalam TDDS dapat ditingkatkan.
2004	Fentanyl	HEC,EC, Carbomer940	Analgesik	Telah dibandingkan efek adhesi dari PSAs dalam TDDS
2003	Bupropion	Eudragit E100	Depresi	Sangat memungkinkan untuk memformulasi obat ini dalam

				patch tipe matriks dengan pelepasan obat yang dapat dimodifikasi dengan penggunaan Eudragit E100
2002	Pinacidil monohydrate	Eudragit RL 100 & PVP K	Hipertensi	Perbandingan Eudragit RL 100 dan PVP K (60:40) dapat meningkatkan kecepatan pelepasan obat.
2001	Ketotifen fumarate	Ethyl cellulose, eudragits, PVP	Asma bronchial	Kecepatan permeasi dapat ditingkatkan pada penggunaan IPM dan LA tunggal
2000	Glibenclamide	poly methyl methacrylate	hiperglikemia	Sistem transdermal efektif mencegah keadaan hipoglikemik seperti yang diakibatkan pada penggunaan oral

Penggunaan surfaktan sebagai bahan peningkat penetrasi juga telah berkembang, baik penggunaannya dalam sediaan transdermal pada bentuk sediaan konvensional maupun pada *Drug Delivery System* (DDS).

Tabel 5.5. Penggunaan surfaktan dalam meningkatkan penetrasi obat-obat

Permeant	Surfactant	Skin ^a	Reference
Flufenamic acid	nonionic surfactants e.g. polyoxyethylene (20) sorbitan monopalmitate, sorbitan monopalmitate, sorbitan trioleate, poloxamer 184, 231(10% in white petrolatum)	Rabbit	Hwang <i>et al.</i> , 1983
Naloxone	nonionic surfactants e.g. sorbitan laurate, polysorbate 20 polyoxyethylene (4) lauryl ether, sorbitan oleate, poloxamer 188 anionic surfactants e.g. sodium lauryl sulfate, sodium laurate, sodium oleate(10% in propylene glycol)	Human	Aungst <i>et al.</i> , 1986
Methyl nicotinate	cetyl trimethyl ammonium bromide, sodium lauryl sulphate, Brij 36T(1.5% in aqueous solution)	Human	Ashton <i>et al.</i> , 1992
Nitroglycerin ^b	oleyl surfactants containing ethylene oxide (EO) e.g. EO-2-oleyl ether, EO-10-oleyl ether(0.14 M in propylene glycol)	Human	Kadir <i>et al.</i> , 1993
Diazepam	sodium lauryl sulfate, cetyltrimethylammonium bromide, benzalkonium chloride, polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate (0.5% in water-propylene glycol system (1:1 v/v))	Rat	Shokri <i>et al.</i> , 2001
Lidocaine hydrochloride	nonionic surfactants: sucrose laurate, sucrose oleate (2% in Transcutol)	Porcine ear	Cázares-Delgado <i>et al.</i> , 2005
Ketotifen	polyoxyethylene lauryl ether, polyoxyethylene lauryl ether, sodium dodecyl sulfate(5% in stick-type formulation)	Hairless mouse	Kimura <i>et al.</i> , 2007

Permeant	Surfactant	Skin ^a	Reference
Diclofenac sodium	fenchone, menthone, menthol, limonene, thymol, 1, 8-cineole(1 % in carbopol gel with propylene glycol)	Rat	Arellano <i>et al.</i> , 1996
	nerolidol, farnesol, carvone, menthone and limonene oxide(0, 0.25, 0.5, 1, 1.5 and 2.5% in ethanol glycerin phosphate buffer solution (60:10:30))	Rat	Nokhodchi <i>et al.</i> , 2007
Thyrotropin releasing hormone	cineole, carveol, menthone(3% in 47% ethanol)	Human	Magnusson <i>et al.</i> , 1997
5-Fluorouracil	carvone, 1, 8 cineol, thymol(5% in 50% ethanol)	Porcine	Gao and Singh, 1997
Caffeine	11 terpenes e.g. terpinen-4-ol, α -terpineol, neomenthol, geraniol(0.4 M in propylene glycol)	Mouse	Godwin and Michniak, 1999
Tamoxifen	eugenol, limonene, menthone(5% in 50% propylene glycol)	Porcine	Zhao and Singh, 2000
Nicardipine HCl	fenchone, thymol, nerolidol(2% in hydroxypropyl cellulose gel)	Hairless mouse	El-Kattan <i>et al.</i> , 2001
Ketoprofen	limonene, cineole, menthol(5% in microemulsion)	Rat	Rhee <i>et al.</i> , 2001
Haloperidol	carvacrol, linalool, α -terpineol(5% in propylene glycol)	Human	Vadki <i>et al.</i> , 2002b
Haloperidol	carvacrol, linalool, α -terpineol (5% in 50% ethanol)	Human	Vadki <i>et al.</i> , 2002a
Propranolol HCl	p-menthane monoterpenes and related compounds (e.g. p-menthane, menthone, menthol, carvacrol, thymol)(5% in 40% ethanol)	Newborn pig	Songkro <i>et al.</i> , 2003
Mefenamic acid	1,8-cineole(5, 10, 25% in polyethylene glycol 400)	Porcine ear	Heard <i>et al.</i> , 2006
Ketotifen	menthol, limonene(5% in stick-type formulation)	Hairless mouse	Kimura <i>et al.</i> , 2007

Ket: a. studi invitro; b. pretreatment di kulit sebagai enhancer

DAFTAR PUSTAKA

- Abdassah, Marline. 2004. *Liposom sebagai sistem penghantar obat kanker (review altikel)*. Bandung: Jurusan Farmasi UNPAD.
- Akiladevi, D., Sachinandan Basak. 2010. Ethosomes - A Noninvasive Approach For Transdermal Drug Delivery. *Internatoinal Journal of Current Pharmaceutical Research*, Vol 2, Issue 4.
- Amlalo, Ralph Nii Okai Tettey. 2005. *In vitro Release of Ketoprofen from proprietary and extemporaneously manufactured gel* (Thesis). Grahamstown: Fakulaty of Pharmacy, Rhodes University, p. 27-31.
- Anand, Pushpa, A. Samnani, M. Bhoumick, B.K. Dubey. 2012. Ultra Deformable Elastic Vesicles Transferosomes for enhanced skin delivery,-An update. *Word Journal of Pharmaceutical Research*, Vol.1(2):10-21, available on line at www.wjpr.net.
- Anitha, P., et al. 2011. Ethosomes - A noninvasive vesicular carrier for transdermal drug delivery. *Int. J. Rev. Life. Sci.*, Vol 1 (1).
- Ansel, Howard C. 2008. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi edisi IV*. Jakarta: UI Press.
- Arora, Rajnish and Jain, C. P. 2007. Advances in niosome as a Drug carrier. *Asian Journal of Pharmaceutics*, 1(1) April-June: 29-39.

- Avinash, Kaushik, Abha, Dwivedi, Mukesh Sunda. 2011. Transferosome: The Drug Loaded Ultradeformable vesicles for transdermal drug delivery. A Review Article, *Int. Research Journal of Pharmacy*, 2(11): 40-42, available online www.irjponline.com.
- Bangham, A. D. 1993. *Liposome*. The Babraham Connection Chem Phys Lipids 64: 275 -285.
- Benson, Heather, A. E. 2005. *Transdermal Drug Delivery: penetration Enhancement Tehniques*. Western Australian: Biomedical Research Institute, School of Pharmacy, Curtin University of Technology.
- Bharadwaj, Snigdha, Garg, Vipin Kumar, Sharma, P. K., Bansal, Mayank, Kumar, Nitin. 2011. Recent Advancement In Transdermal Drug Delivery System, Review. *International Journal Of Pharma Professional's Research Article*, Volume2, Issue1: 247-254, available Online at www.ijppronline.com.
- Blazek-Welsh, A. I. dan D.G. Rhodes. 2001. Maltodextrin-based Proniosome. *AAP Pharmaceutical Sciences*, 3(1): 1-8.
- Cave, G. 2004. Lipid Vesicles and Other Colloids as A Drug Carrier on The Skin. *Adv. Drug Deliv. Rev.* 56: 675-711.
- Cevc, Gregor, Gebauer, Dieter, Stieber, Juliane, Schatzlein, Andreas, Blume, Gabriele. 1997. Ultraflexible Vesicles, Transferosomes, Have an Extremely Low Pore Penetration Resistance and Transport Therapeutic Amounts of Insulin Across

The Intact Mammalian Skin. *Elsevier: Biochimica et Biophysica Acta* 1368, p. 201-215.

Darnpanid. 2004. *The Effect of Phospholipid as Penetration Enhancer on Skin Permeation of Ketoprofen*. Mahidol University: Faculty of Graduate Studies.

Dave, Vivek., *et al.* 2010. Ethosome for Enhanced Transdermal Drug Delivery of Aceclofenac. *International Journal of Drug Delivery* 2.

Dhamecha, Dinesh, L., Rathi, Amit, A., Saifee, Maria , Lahoti, Swaroop, R., Dehghan, Mohd. Hassan, G. 2009. Drug Vehicle Based Approaches Of Penetration Enhancement. *International Journal Of Pharmacy And Pharmaceutical Sciences*, Vol. 1(1) July-Sep.

Dirjen POM. 1995. *Farmakope Indonesia, Edisi IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Friend, D., Catz, P., Heller, J., Reid, J., Baker, R. 1988. Transdermal Delivery of Levonorgesterol I. Alkanols as Permeation Enhancers. *J Control Rel*, 7: 243-50.

Girhepunje, Kundlik., *et al.* 2010. Ethosomes: A Novel Vasicular Carrier for Enhanced Dermal Delivery of Ciclopirox Olamine. *Scholar Research Library*. Vol 2 Issue 1.

Grassi, Mario, *et al.* 2007. *Understanding Drug Release and Absorption Mechanisms*. London: Taylor & Francis Group, 53-63.

- Gregoriadis, Gregory. 2007. *Liposome Technology; Liposome Preparation and Related Techniques*. Third Edition, Vol I, Informa Healthcare USA, Inc.
- Gregoriadis, Gregory. 2007. *Liposome Technology; Entrapment of Drug and Others Material into Liposome*, Third Edition, Vol II, Informa Healthcare USA, Inc.
- Gupta, Ankur *et al.* 2007. Design and Development of a Proniosomal Transdermal Drug Delivery System for Captopril. *Topical Journal of Pharmaceutical Research*, 6(2): 687-693.
- Hamzah, Nurasiah. 2011. *Formulasi dan Karakterisasi Sistem Penghantaran Obat Ethosom yang Mengandung Nifedipin (Skripsi)*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin.
- Insook Han, Min Young Kang, Moonkyu Kim and Jung Chul Kim. 2011. Enhancing Skin Delivery of 5-Aminolevulinic Acid with Transferosome Using Lyso-Phospholipid and Surfactant. *Journal of Pharmaceutical Investigation*, Vol 41, (1): 19-24.
- Ismail, Isriany. 2010. *Studi Bioavailabilitas Formula Niosom Ketoprofen Gel (Tesis)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Ismail, Isriany. 2009. Strategi Penggunaan Obat Melalui Kulit, Tinjauan Pemilihan Bentuk Sediaan Farmasi. *Jurnal Kesehatan*, Volume II No. 3.
- Jufri, Mahdi, dkk. 2004. Arah dan Perkembangan Liposom Drugs Delivery System. *Majalah Ilmu Kefarmasian*, Vol I(2): 59-68.

- Kavitha, K., *et al.* 2010. Chemical Permeation Enhancers for Transdermal Drug Delivery. *Scholars Research Library*, 2(6).
- Kozubek, Arkadiusz, *et al.* 2000. Liposomal drug delivery, a novel approach: PLARomes. *Acta Biochimica Polonica*, Vol 47(3): 639-649.
- Kulkarni, R., Yadav, J. D., Vaidya, K. A., and Gandhi, P. P. 2011. Transferosomes: An Emerging Tool For Transdermal Drug Deliver. *Int. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, Vol. 2(4): 735-741.
- Kumar, R., *et al.* 2009. Ethosomes: Novel Vesicular Carriers in The Transdermal Drug Delivery. *Journal of Global pharma Technology*, Rev. 2(6).
- Kumar, Pvan, K., P.R. Radhika, T. Sivakumar. 2010. Ethosomes - A Priority in Transdermal Drug Delivery. *International Journal of Advances in Pharmaceutical Sciences*, Volume 1.
- Lasic, D. D. 1998. Novel Application of liposomes. *Trend Biotechnol*, 16: 307 - 327.
- Latifah, R., Ismail, Isriany, dan Wahyudin, Elly. 2011. Kapasitas Jerap Niosom Terhadap Ketoprofen dan Prediksi Penggunaan Transdermal. *Indonesian Journal of Pharmacy*, Vol 22(2): 85-91.
- Leekumjorn, Sukit. 2004. *Synthesis and Characterization of Potensial Drug Delivery Systems using Nonionic Surfactant "Niosom"*.
- Ligth, Douglas. 2004. *Cell, Tissues, and Skin*. Philadelphia: Chelsea House Publisher.

- Manish, Gupta and Vimukta Sharma. 2011. Targeted Drug Delivery System: A Review. *Research Journal of Chemical Sciences*, Vol. 1(2): 135-138, available online at: www.isca.in.
- Manusroi, Aranya, et al. 2003. Characterization of Vesicles Prepared with Various Non-Ionic Surfactan Mixed with Colesterol. *Colloids and Surfaces B:Biointerfaces* 30(2003): 129-138.
- Maurice, Jean V. and Daniel, Losif . 2005. *Assesing Bioavailability of Drug Delivery System*. London: Taylor & Francis Group.
- Maurya, Sheo Datta., et al. 2011. Enhancement of Transdermal Permeation of Indinavir Sulfate via EthosomeVesicles. *The African Journal of Pharmaceutical Sciences and Pharmacy*, Volume 2(1).
- Morrow, D. I. J. 2007. *Innovative Strategies for Enhancing Topical and Trandermal Drug Delivery*. Bentham Science Publisher Ltd.
- Munir, Ayu. 2011. *Formulasi dan karakterisasi Sistem Penghantaran Obat Niosom yang mengandung Nifedipin (Skripsi)*. Makassar: Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin.
- Parashar, B., Kaur, A., Nisha, G., Singh, B., Maurya, Yadav. 2012. Transferosomes- An approach for Vesicular Drug Delivery System. *Internationale Pharmaceutica Scientia*, April-June 2012 Vol. 2, p.85-91, available online <http://www.ipharmsciencia.com>.
- Pasry, Ita Puspitasari. 2012. *Formulasi dan Karakterisasi Sistem Penghantaran Obat Transferosom yang*

- Mengandung Propranolol HCl (Skripsi)*. Makassar: Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin.
- Patel, Piyush K. 2005. *Preparation and Evaluation of Topical Enalapril Maleat Ethosomes as An Alternative to Oral Route*. Mangalore: Rajiv Gandhi University of Health Sciences. Page 4.
- Patil, Pradeep, *et al.* 2004. Effect of Formulation Variables on Preparation and Evaluation of Gelled Self-emulsifying Drug Delivery System (SEDDS) of Ketoprofen. *AAPS PharmSciTech*, 5(3): 1-8.
- Pirvu, Cristina Dinu., *et al.* 2010. Elastic Vesicles as Drugs Carriers Through The Skin. *Farmacia*, Vol.58, Issue 2.
- R., Walve, J., Bakliwal, R. S., Rane, R. B., Pawar, P. S. 2011. Transferosome: A surrogated Carrier for Transdermal Drug Delivery System. *Intl. Journal of Applied Biology and Pharmaceutical technology*, Vol 2(1) Jan-Mar, p.204-213, available online at www.ijabpt.com.
- Ranade, Vasant V., Manfred A. Hollinger. 2003. *Drugs Delivery system edisi 2*. University of California: CRC Press Pharmacology & Toxicology series.
- Ravi, Kumar, Singh, Manvir, Bala, Rajni, Seth, Nimrata, Rana, A.C. 2012. Transferosome: A Novel Approach For Transdermal Drug delivery (Review Article). *Intl. Research Journal of Pharmacy*, 3(1), p.20-24, available online at www.irjponline.com.

- Reiser, Miriam Regina Luise. 2009. *Effect of Continuous Phase Drug Concentration, Evaporation and Partitioning on Transdermal Drug Permeation Kinetics with Lipophilic Vehicles* (Inaugural dissertation). Deutschland: Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel.
- Rhee, Gye Ju, et al. 1999. Topical Oleo-Hydrogel Preparation of Ketoprofen with Enhanced Skin Permeability. *Drug Dev. and Indust. pharm*, 25(6): 717-726.
- Rizal. 2012. *Pengaruh Konsentrasin Etanol terhadap Penjerapan Nifedipin pada formula Ethosome*, (Skripsi). Makassar: Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin.
- Rosen, Mayer R. 2005. *Delivery System Handbook for Personal Care and Cosmetic Products., Tecnology, Aplication, and Formulation*. Norwich, New York., U.S.A: William Andrew Publishing. Page 286.
- Rowe, Raymond C., et al. 2006. *Pharmaceutical Excipients*, electronic version. London, UK: Pharmaceutical Press and The American Pharmacists Association.
- Saltzman, W. Mark. 2001. *Drug delivery; Engineering Principles for Drug Therapy*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Sari, Sartini · Kartika. 2012. *Formulasi dan Karakterissi Prednisolon Patch Tipe Matriks dan Uji pelepasan secara In Vitro* (Skripsi). Makassar: Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin.

- Shahiwala, Aliasgar dan Misra, Ambikanandan. 2002. *Studies in Topical Application of Niosomally Entrapped Nimesulide. J Pharm Pharmaceutical Sciences*, 5(3): 220-225.
- Shargel, Leon. 2005. *Biofarmasetika dan Farmakokinetika Terapan* (Terj). Surabaya: Airlangga University Press. 173-175.
- Sheth, Nirav, S., Mistry, Rajan B. 2011. Formulation and evaluation of transdermal patches and to study permeation enhancement effect of eugenol. *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, 1(03): 96-101.
- Singh, Anjali, Priyanka Rathore, Meenakshi Shukls and Statish Nayak. 2010. Comparative Studies on Skin permetion of Miconazole Using Different Novel Carrers. *IJSPR*, Vol. 1 Issue 9.
- Songkro, S. 2009. An overview of skin penetration enhancers: penetration enhancing activity, skin irritation potential and mechanism of action . *Songklanakarinn, J.Sci. Technol*, 31 300 (3), 299-321.
- Swarnlata, S., Saraf, S., Dixit, V.K., Selvam ,R., Panner, Singh, Anoop Kumar, T., Sivakumar. 2010. Transdermal drug delivery systems for antihypertensive drugs - A review. *The International Journal of Pharmacy*, 1(1),1-8, available online at www.pharmscidirect.com.
- Tiwari, Raj Kumar., Nitesh S. Chaunan, Yogesh H. S. 2010. Ethosome: A potential Carries for Transdermal Drug Delivery. *International Jurnal of Drug Development & Research*, Vol 2 Issue 2.

- Touitou E., Godin B., Weis, C. 2000. Enhanced Delivery of Drug into and Across the Skin by Ethosomal Carrier. *Drug Deliv. Res.* 50.
- Touitou, Elka, Brian W. Barry. *Enhancement in Drug Delivery*. CRC Press Taylor & Francis Group, LLC.
- Uchegbu, Ijeoma F., and Schatzlein Andreas G. 2003. *Generic Manufacturers Should Exploit Drug Delivery Technology for Improved Therapeutics*. Business Briefing: Pharmatech. Page 203.
- Uchegbu, Ijeoma F., and Schatzlein, Andreas G. 2003. *Generic Manufacturers Should Exploit Drug Delivery Technology for Improved Therapeutics*. Business Briefing: Pharmatech. 203-208.
- Verma, Surender S. K., Singh Navneet S., P Mathur, V Valecha. 2010. Nanoparticle Vesicular System: A versatile Tool for Drug Delivery. *J. Chem. Res*, Vol 2(2).
- Vijay, Sharma K., Mishra D. N., Sharma A. K. and Srivastava B. 2010. Liposomes: Present Prospective and Future Challenge. *International Journal of Current Pharmaceutical Review and Research*, Vol. 1 Issue 2.
- Vinod, Kombath Ravindran, Kumar, Minumula Suneel, Anbazhagan, Sockalingam, Sandhya, Subadhra, Saikumar, Parre, Rohit, Reddy Tera, Banji, David. 2012. Critical Issues Related To Transfersomes - Novel Vesicular System. *Acta Sci. Pol., Technol. Aliment*, 11(1): 67-82.
- Wahid, Ambekar Abdul, Nagaraju Ravouru and Swan Ramesh Lakshman. 2011. Ethosom: A Tool for

Transdermal Drug Delivery. *Current Trends in Biotechnology and Pharmacy*, Vol. 5(1).

Walters, Kenneth A. 2002. *Dermatological and Transdermal Formulation*. Marcel Dekker, Inc.

Williams A. C. 2003. *Transdermal and Topical Drug Delivery*. London: Pharmaceutical Press.

BIODATA PENULIS



Isriany Ismail, S.Si.,M.Si.,Apt, lahir di Makassar (dahulu Ujung Pandang) tanggal 12 Januari 1973. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Kompleks Mangkura, Makassar (1983), Pendidikan menengah di SMPN 3 Makassar (1988) dan SMAN 3 Makassar (1991). Menyelesaikan pendidikan strata satu (S1;1997) dan Profesi Apoteker (1997) di Jurusan Farmasi, F.MIPA Universitas Indonesia, Depok. Program Magister diselesaikan pada Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2010.

Pengalaman mengajar dimulai di Jurusan Farmasi Universitas Pancasakti Makassar (1998), Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Timur (UIT) (2001-2002), Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFA) Kebangsaan (2005-2009) dengan membina mata kuliah Farmaseutika Dasar, Teknologi Sediaan Farmasi, Galenika, Parasitologi, Ilmu Resep, dan Teknologi obat tradisional. Tahun 2008 terangkat menjadi Dosen PNS di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin dan fokus dalam membina mata kuliah Teknologi Sediaan Farmasi II (liquid dan semisolid) dan Kosmetologi, serta pengembangan prestasi mahasiswa farmasi UIN Alauddin.

Beberapa hasil karya ilmiah penulis adalah Studi Bioavailabilitas Formula Niosom Ketoprofen Gel (Tesis);

Kapasitas Jerap Niosom Terhadap Ketoprofen Dan
Prediksi Penggunaan Transdermal (Jurnal Majalah
Farmasi Indonesia,UGM); Strategi Penggunaan Obat
Melalui Kulit (Tinjauan Pemilihan Bentuk Sediaan
Farmasi); Aplikasi Farmaseutik Vesikel Sebagai Sistem
Penghantaran Obat (*Vesicle Drug Delivery System*);
Aplikasi Niosom *Drug Delivery System* Pada Obat AINS
Sebagai Upaya Menurunkan Efek *Peptic Ulcer*;
Transdermal Drug Delivery System: Rute Alternatif
Penggunaan Obat *Pro Long Action* (Jurnal Kesehatan FIK
UIN Alauddin); Desain Bentuk Sediaan Farmasi:
Larutan,Suspensi dan Emulsi (Buku,Penerbit: UIN
Alauddin University Press).

Biografi Penulis



Isriany Ismail, S.Si.,M.Si.,Apt, lahir di Makassar (dahulu Ujung Pandang) tanggal 12 Januari 1973. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Kompleks Mangkura, Makassar (1983), Pendidikan menengah di SMPN 3 Makassar (1988) dan SMAN 3 Makassar (1991). Menyelesaikan pendidikan strata satu (S1;1997) dan Profesi Apoteker (1997) di Jurusan Farmasi, F.MIPA Universitas Indonesia, Depok. Program Magister diselesaikan pada Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2010

Pengalaman mengajar dimulai di Jurusan Farmasi Universitas Pancasakti Makassar (1998), Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Timur (UIT) (2001-2002), Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFA) Kebangsaan (2005-2009) dengan membina mata kuliah Farmaseutika Dasar, Teknologi Sediaan Farmasi, Galenika, Parasitologi, Ilmu Resep, dan Teknologi obat tradisional. Tahun 2008 terangkat menjadi Dosen PNS di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin dan fokus dalam membina mata kuliah Teknologi Sediaan Farmasi II (liquid dan semisolid) dan Kosmetologi, serta pengembangan prestasi mahasiswa farmasi UIN Alauddin.

Beberapa hasil karya ilmiah penulis adalah Studi Bioavailabilitas Formula Niosom Ketoprofen Gel (Tesis); Kapasitas Jerap Niosom Terhadap Ketoprofen Dan Prediksi Penggunaan Transdermal (Jurnal Majalah Farmasi Indonesia,UGM); **Strategi Penggunaan Obat Melalui Kulit (Tinjauan Pemilihan Bentuk Sediaan Farmasi)**; Aplikasi Farmaseutik Vesikel Sebagai Sistem Penghantaran Obat (*Vesicle Drug Delivery System*); Aplikasi Niosom *Drug Delivery System* Pada Obat AINS Sebagai Upaya Menurunkan Efek *Peptic Ulcer*; *Transdermal Drug Delivery System: Rute Alternatif Penggunaan Obat Pro Long Action* (Jurnal Kesehatan FIK UIN Alauddin); Desain Bentuk Sediaan Farmasi: Larutan,Suspensi dan Emulsi (Buku,Penerbit: UIN Alauddin University Press).



ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS
082348671117 - au_press@yahoo.com

