

**dr. Azizah Nurdin, M.Sc**

*Peresapan*

**OBAT**

**dalam Kehamilan**

Terjemahan Buku: *"Prescribing in Pregnancy"*



**dr. Azizah Nurdin, M.Sc.**

**PERESEPAN OBAT  
DALAM KEHAMILAN**

**Terjemahan buku : "Prescribing in Pregnancy"**



**Alauddin University Press**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

*All Rights Reserved*

**PERESEPAN OBAT DALAM KEHAMILAN**

**Terjemahan buku : "Prescribing in Pregnancy"**

Penulis:

**dr. Azizah Nurdin, M.Sc.**

Editor:

**Isriany Ismail**

Cetakan: I 2014

xiv + 289 halaman, 14 cm x 21 cm

**ISBN : 978-602-237-974-4**

Alauddin University Press

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa

## SAMBUTAN REKTOR

*Jika engkau ingin meng"abadi", maka tinggalkanlah "Legacy"*

Ungkapan di atas memberi gambaran bahwa setiap manusia hendaknya selalu melahirkan karya terbaiknya untuk dipersembahkan kepada umat. Karya itu akan menjadi sebuah *legacy* yang akan selalu diingat dan dikenang, bahkan diabadikan dalam catatan sejarah peradaban anak manusia. Jutaan bahkan milyaran anak manusia telah dan akan lahir di permukaan dunia ini, namun tidak semua mampu mencatatkan dirinya dalam kelindan sejarah yang "menyejarah". Hanya sebagian kecil anak manusia yang mampu menghadirkan dan meng"abadi"kan dirinya dalam garis lingkaran lintasan sejarah.

Dalam bingkai dan konstruksi emosional, manusia pada hakikatnya ingin abadi. Itulah sebabnya manusia ingin selalu mengabadikan momentum penting dalam ruang dan waktu yang senantiasa berubah. Mereka membuat gambar, foto, lukisan, dan sejenisnya yang seakan-akan berkeinginan menyetop waktu yang senantiasa berubah. Demikian pula aktivitas manusia membangun monumen bersejarah tidak lain tujuannya untuk mengabadikan sebuah peristiwa penting dalam sejarah peradaban manusia, bahkan Khairil Anwar berkata: *"Aku ingin hidup seribu tahun lagi"*.

Karya akademik pada hakikatnya merupakan sebuah monumen penting dalam kehidupan yang dapat menjadi *legacy*. Karya itu dapat dinikmati oleh siapa saja yang cinta terhadap pengetahuan. Karya akademik bukan sekadar sebuah tulisan yang menjadi hiasan di dalam rak, lemari atau ruang baca, tetapi dia mampu melahirkan perubahan dan memberikan pencerahan kepada manusia. Terlebih

dalam perspektif eskatologis, karya akademik dapat menjadi amal jariah di "alam sana".

Atas dasar kesadaran itulah, maka program Gerakan Seribu Buku (GSB) ini dilaksanakan, dengan harapan setiap dosen mampu melahirkan "legacy" dalam catatan kehidupannya berupa karya tulis yang dipublikasikan. Gerakan ini diharapkan menjadi "trigger" untuk melahirkan karya-karya berikutnya.

Saya merasa gembira bahwa dosen UIN Alauddin tidak saja mampu berorasi di atas mimbar, tetapi juga dapat menuangkan gagasan, ide, dan pikirannya dalam bentuk tulisan. Hingga periode akhir masa jabatan saya sebagai Rektor, program GSB ini telah tuntas dilaksanakan. Itu artinya, hingga saat ini tidak kurang dari 1000 buah karya akademik telah dipublikasikan oleh para dosen UIN Alauddin Makassar. Fakta ini harus diapresiasi dan menjadi catatan penting bagi pejabat (Rektor) berikutnya.

Karya tulis merupakan perbendaharaan terbesar di dunia akademik. Hanya dengan budaya menulis dan membaca, maka dunia akademik menjadi hidup, bahkan al-Quran mengisyaratkan bahwa lahir dan hadirnya pengetahuan serta peradaban harus diawali dengan budaya "iqra/baca" dan "al-qalam/pena". Karena itulah, UIN sebagai kampus peradaban harus menjadi pioneer dari tradisi literasi ini, sebab rendahnya budaya "baca-tulis" pada suatu bangsa atau sebuah kampus mengindikasikan lemahnya kesadaran terhadap eksistensi diri, alam, dan Tuhan.

Samata, 2 Oktober 2014  
Rektor,

**Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, MS**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat ALLAH S.W.T karena atas Rahmat-nya lah buku ini dapat kami selesaikan dengan tepat waktu.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kami haturkan kepada Universitas Islam Negeri Alauddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk ikut serta dalam Penulisan Gerakan Seribu Buku. Kepada Kepala Penjaminan Mutu, Zulfahmi Alwi, atas kebijaksanaan yang diberikan dalam penyelesaian buku ini. Sahabat saya, Darmawansyih, atas segala kemurahan hati dalam memberikan informasi untuk proses penyelesaian buku ini. Semoga ilmu yang terdapat dalam buku ini dapat digunakan dengan mudah dalam praktek sehari-hari untuk peresepan obat wanita yang sedang hamil.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kami berikan terhadap suami tercinta, Yasser A. Wirawan, untuk segala cinta, kasih, semangat, bantuan dalam penyelesaian buku ini. Untuk putri tercinta, A. Rafifa Asilah, saya ingin memberikan peluk dan cium yang hangat, untuk segala pengertian dan kesabaran dalam menghadapi kesibukan saya. Untuk kedua orang tua, Nurdin Juddah dan Aminah Akil, terima kasih atas doa dan cinta yang selalu ada sepanjang hidup saya. Segala kata-kata tidak akan mampu mengekspresikan betapa besar terima kasih saya terhadap segala kasih sayangmu.

Kami menyadari buku ini jauh dari sempurna. Saran dari pembaca sangat dibutuhkan untuk perbaikan ke depannya. Semoga buku ini bermanfaat.

Terima Kasih

Makassar, September 2014

Penulis

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	
IDENTIFIKASI ABNORMALITAS FETUS.....	1
BAB II	
PENGOBATAN KONDISI UMUM, RINGN DAN KONDISI YANG DAPAT SEMBUH SENDIRI (SELF LEMITING).....	17
BAB III	
ANTIBIOTIK PADA KEHAMILAN.....	47
BAB IV	
ANTIKOAGULAN PADA KEHAMILAN.....	63
BAB V	
PENGOBATAN PENYAKIT KARDIOVASKULAR..	93
BAB VI	
PENGOBATAN PENYAKIT ENDOKRIN.....	111
BAB VII	
OBAT-OBATAN PENYAKIT REMATIK SELAMA KEHAMILAN.....	123
BAB VIII	

OBAT-OBATAN PSIKOTROPIKA DI KEHAMILAN.....	145
BAB IX PENATALAKSANAAN DIABETES DALAM KEHAMILAN.....	165
BAB X PERESEPAN PADA IBU HAMIL DALAM PERJALANAN .....	191
RINGKASAN.....	206

## BAB 1

# IDENTIFIKASI ABNORMALITAS FETUS

*Lena M. Macara*

### **Poin penting**

- Hari 18-55 postkonsepsi adalah waktu kemungkinan terjadi teratogenik maksimal ketika sebagian besar organ yang berdifferensiasi.
- Efek teratogenik obat dapat mempengaruhi baik struktur dan fungsi organ.
- Penilaian dengan USG rinci janin oleh petugas kesehatan terlatih harus mendeteksi sebagian besar kelainan struktural utama, tetapi kelainan ringan sering tidak terdeteksi.
- Pasien yang berisiko cacat tabung saraf (NTDs) harus mengonsumsi 5 mg asam folat setiap hari selama minimal 6 minggu sebelum konsepsi.

### **Pendahuluan**

Diperkirakan bahwa 2-3% dari seluruh kehamilan di Inggris mengalami kelainan bawaan. Hampir setengah dari kelainan ini memiliki etiologi yang tidak pasti, kurang lebih 25% mungkin terkait dengan berbagai masalah genetik dan hanya 2% yang terkait dengan faktor lingkungan termasuk obat-obatan.

Meskipun ini merupakan proporsi yang sangat kecil dari semua cacat lahir namun kelompok ini termasuk kelompok kritis, karena dengan menghindari beberapa obat akan mencegah kelainan tersebut. Bagi orang tua dan dokter, karena itu adalah salah satu dari beberapa daerah di mana hasil kehamilan dapat dipengaruhi.

Baik jumlah dan spektrum produk obat yang tersedia, baik yang 'tidak melalui peresepan (*over the counter*) dan yang diresepkan, telah sangat berkembang dalam dekade terakhir. Pada waktu tertentu, lebih dari 80% dari perempuan dalam usia subur tahun menggunakan beberapa jenis obat dan sekitar 50% dari wanita hamil diresepkan obat selain vitamin atau suplemen selama kehamilan [1,2].

Bab ini bertujuan untuk memandu dokter dalam pemantauan perkembangan kehamilan normal, pilihan apa saja yang tersedia untuk menilai perkembangan janin dalam rahim dan kelainan terkait dengan penggunaan obat selama kehamilan yang dapat dideteksi sebelum persalinan. Bab-bab berikut akan memberikan panduan tentang resep kehamilan, menyoroti obat-obatan yang harus dihindari pada kehamilan, dan menawarkan obat-obatan yang memiliki risiko minimal untuk kehamilan sambil memastikan bahwa masalah medis yang mendasari yang ditangani.

## **Perkembangan embrio dan janin**


Hal ini jelas bahwa tidak semua obat mempengaruhi kehamilan dengan efek yang sama. Hal ini disebabkan peristiwa pembelahan sel yang sangat cepat yang berkembang biak untuk membentuk embrio dan janin. Memahami urutan dan waktu proses pembelahan ini dapat membantu kita untuk memahami sistem organ yang mana yang mungkin akan terpengaruh pada setiap tahap kehamilan dan mengantisipasi efek jangka panjang yang mungkin terjadi.

Perkembangan janin dapat dibagi menjadi tiga tahap utama: pra-diferensiasi atau fase pra-embriionik; dari konsepsi sampai 17 hari post-konsepsi; tahap embrio mulai dari 3-8 minggu post-konsepsi; dan fase janin dari minggu 8


sampai aterm. Selama tahap pra-diferensiasi, sel-sel membagi dengan cepat dan tetapi *totipotential*. Setiap kejadian terhadap kehamilan selama fase ini tampaknya memiliki efek 'semua atau tidak sama sekali'. Jika sebagian besar sel-sel yang terkena, kehamilan secara spontan akan mengalami keguguran tetapi ketika hanya beberapa sel yang terpengaruh, sel-sel totipoten yang tersisa akan muncul untuk menggantikan sel yang rusak tanpa adanya efek jangka panjang yang buruk.

Selama periode embrio, sel-sel ini membelah dan membentuk sistem organ definitif (Gambar 1.1). Karena sel-sel kini telah membelah, jika sel tersebut rusak secara luas, efek permanen mungkin terjadi pada organ akhir. Meskipun periode embrionik pendek, masing-masing organ akhir memiliki waktu kerentanan tertentu dimana terdapat kecenderungan keparahan yang mungkin terjadi akibat pengaruh teratogenik. Dalam beberapa keadaan, pengaruh teratogenik tergantung pada dosis obatnya.

Periode janin terutama terjadi pada saat pertumbuhan dan pematangan organ tubuh, oleh karena itu sebagian besar obat tidak menyebabkan cacat struktural yang signifikan pada masa tersebut. Namun, organ-organ seperti korteks serebral, saluran pencernaan, dan glomerulus ginjal terus membelah dan berkembang selama kehamilan hingga periode neonatal. Oleh karena itu, organ ini tetap rentan terhadap gangguan pertumbuhan atau kerusakan fungsional organ akibat produk obat selama tahap akhir kehamilan. Perubahan ini sering terlihat samar dan akan menjadi jelas ketika janin tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, efek teratogenik dari obat yang diberikan selama kehamilan dapat dengan mudah diabaikan.



Gambar 1.1 waktu perkembangan janin. Jangka waktu yang kritis bagi pengembangan sistem organ. Dicitak ulang dari gambar 8,15 dari Moore et al: The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 6/E © 1998 with permission from Elsevier



**Gambar 1.2** Pengukuran nuchal normal

Banyak juga menilai kedalaman cairan *nuchal* di leher janin. Hal ini, dikombinasikan dengan parameter biokimia, dapat mengukur risiko terjadinya kelainan kromosom. Selain itu, pengukuran *nuchal fluid* yang besar dikaitkan dengan peningkatan risiko kelainan jantung janin dan penilaian secara detail terhadap jantung pada trimester selanjutnya sangat disarankan. Pemeriksaan lebih luas anatomi janin pada trimester pertama dilakukan pada bagian yang dipilih. Pada 11-12 minggu, pemeriksaan lengkap janin dapat dicapai hanya pada 50- 60% kasus.



**Gambar 1.3** Meningkatkan pengukuran nuchal.

Dengan penambahan pemeriksaan TV dan menunda pemeriksaan sampai 12-14 minggu kehamilan, 90% dari kehamilan dapat berhasil diperiksa [3,4]. Meskipun opsi ini menawarkan jaminan awal untuk orang tua, sebagian besar departemen tidak memiliki personil terlatih atau sumber daya yang menawarkan tingkat pemeriksaan USG akurat pada trimester pertama.


Bagi sebagian besar pasien, anatomi janin masih dievaluasi antara 18 dan 20 minggu kehamilan menggunakan 'scan anomali rutin'. Meskipun ini direkomendasikan untuk semua kehamilan, pada saat penulisan buku ini, scan anomali rutin masih belum tersedia pada beberapa pusat kesehatan utama di Skotlandia dan Inggris kecuali untuk indikasi tertentu seperti obat dalam kehamilan yang pada saat itu masih kontroversial.

Banyak kelompok telah dievaluasi pada trimester kedua dengan pemeriksaan USG dan menegaskan bahwa 70-90% dari kelainan yang signifikan harus dapat dideteksi pada umur kehamilan tersebut [5,6]. Ada beberapa alasan untuk variasi persentase ini. Daftar struktur tubuh yang dianggap penting untuk pemeriksaan pada setiap kehamilan adalah tergantung masing-masing pusat kesehatan dan banyak departemen tidak memeriksa jantung janin, wajah, atau anggota badan secara detail. Oleh karena itu pemeriksaan dapat selesai sesuai protokol departemen tetapi mungkin saja tidak mengevaluasi organ yang sangat terpengaruh oleh obat tertentu. Selain itu, beberapa anomali kongenital seperti diafragma hernia, mikrosefali, dan hidrosefalus mungkin tidak jelas sampai akhir trimester kedua setelah waktu scan detail standar dilakukan, dan masalah fungsional lainnya dari organ-organ seperti otak atau ginjal akan tetap tidak teridentifikasi sampai periode neonatal. Selain itu fitur

dismorfik, seperti pemendekan tulang wajah atau penanda samar lainnya tidak akan terlihat pada mempertimbangkanyang standar.

Melihat fakta-fakta diatas, wanita yang beresiko mengalami kelainan bawaan akibat obat selama kehamilan harus diperhatikan pada setiap tahap rujukan untuk memastikan bahwa pemeriksaan USG detail telah dilakukan dan kadang-kadang diulang pada tahap yang tepat dalam kehamilan.

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi USG 3D telah memungkinkan pemeriksaan yang lebih rinci dari permukaan janin dan terbukti sangat berguna dalam penilaian wajah janin. Gambar tiga dimensi terbukti sangat sulit baik untuk mendapatkan dan menginterpretasikan pemeriksaan kurang dari 24 minggu kehamilan. Ketika konfirmasi masalah janin seperti bibir sumbing sangat diperlukan, maka dapat dilakukan rujukan ke pusat tersier pada petugas kesehatan yang memiliki pengalaman USG 3D.



**Gambar 1.4** Gambar tiga dimensi USG wajah janin yang normal (24 minggu kehamilan).

Setelah kelainan janin telah dapat diidentifikasi pada USG, Informasi lanjut dapat diperoleh dari studi MRI pada janin. Sampai saat ini, studi ini terutama digunakan pada saat penelitian, mengevaluasi, misalnya, apakah MRI dapat memprediksi keparahan *spina bifida* atau tingkat perkembangan paru janin pada diafragma hernia bawaan.

### **Manajemen kehamilan**

#### **Pra-kehamilan: mengurangi resiko kelainan janin**

Idealnya semua manajemen kehamilan harus dimulai pada periode pra-konsepsi. Dokter harus menyadari efek potensi obat yang lebih sering diresepkan, seperti yang dijelaskan dalam Tabel 1.1. Bila memungkinkan, obat non-esensial harus dihentikan dan polifarmasi dikurangi menjadi monoterapi, serta memilih orang-orang dengan profil teratogenik minimal. Wanita yang sedang menjalani terapi antihipertensi dan antikonvulsan, pengobatan untuk rheumatoid lama, harus bertemu dengan dokter mereka untuk mengoptimalkan terapi obat tersebut sebelum konsepsi. Seperti yang tampak pada Gambar 1.1, banyak perkembangan organ kritis akan terjadi sebelum wanita melakukan pemeriksaan pertama kehamilan, dan karena itu penghentian obat apapun secara tiba-tiba pada minggu 10-12 hanya memiliki nilai yang kecil baik perempuan atau janinnya.

*Risiko NTD pada kehamilan dapat dikurangi dengan penggunaan dosis tinggi asam folat. Agar efektif, 5 mg asam folat harus dikonsumsi setidaknya 6 minggu sebelum konsepsi dan berlanjut sampai minggu ke-12 kehamilan. Setiap wanita usia subur yang mengalami pengobatan yang terkait dengan risiko NTD, harus diresepkan dosis asam folat yang lebih tinggi [7,8].*

Asam folat juga dapat mengurangi risiko *wajah sumbing* pada pasien dengan terapi antikonvulsan, tapi ini

didasarkan pada data yang kurang jelas [9].

Tabel 1.1 Obat-obatan yang terkait dengan kelainan bawaan specific


<b>Fetal effects</b>	<b>Medication</b>
<b>Central nervous system</b>	
Neural tube defects (spina bifida, anencephaly, encephalocele)	Sodium valproate, hydantoin, rifampicin
Other structural defects	Retinoids, warfarin, carbamazepine, sodium valproate
Mental impairment	Anti-epileptics, alcohol
<b>Cardiac</b>	Lithium, thalidomide, retinoids, paroxetine valproate
<b>Renal</b>	
Oliguria, renal failure	NSAIDS, ACE inhibitors, COX-2 inhibitors
<b>Gastrointestinal tract</b>	
Necrotising enterocolitis	Augmentin, NSAIDS
Gastroschisis	Cannabis, recreational drugs
<b>Facial</b>	
Cleft lip and palate	Rifampicin, retinoids, steroids Sodium valproate, benzodiazepines
Abnormal facial features	Alcohol
<b>Skeletal</b>	Thalidomide, cocaine, tetracyclines
<b>Growth restriction</b>	$\beta$ -blockers, alcohol, valproate, amphetamines
<b>Placental abruption</b>	Aspirin, warfarin, crack cocaine

Pelayanan antenatal: kelainan janin yang umum terdeteksi dengan USG.

### Sistem saraf pusat

Kegagalan penutupan tabung saraf dapat mengakibatkan berbagai kerusakan. Pada usia kehamilan 12 minggu, jika tulang tengkorak tidak jelas divisualisasikan pada USG maka *anencephaly*, kegagalan tulang tengkorak untuk


berkembang, harus dideteksi (Gambar 1.5a-1.5b).



**Gambar 1.5** (a) gambar pertengahan sagital normal janin 12 minggu dengan tulang tengkorak normal (C) terlihat; (b) 12-minggu janin dengan anencephaly. Kranial vault tidak ada dan jaringan otak janin (B) terlihat mengambang bebas.

Meskipun *spina bifida* biasanya mempengaruhi tulang belakang bagian bawah, hingga 80% dari bayi juga akan memiliki tanda-tanda intrakranial pada trimester kedua, karena adanya cerebellum yang abnormal dan hidrosefalus (Gambar 1.6). Dengan adanya pencitraan USG dan amniosentesis, maka untuk mendeteksi NTD dengan menggunakan pita khusus asetilkolinesterase seharusnya tidak lagi diperlukan. Lebih dari 90% dari NTDs harus dideteksi dengan penilaian USG trimester kedua. Kelainan lain seperti malformasi Dandy-Walker (Gambar 1.7) dan

kista otak harus dideteksi saat antenatal.



**Gambar 1.6** Malformasi tipe Arnold-Chiari di bayi dengan spina bifida, menampilkan cerebellum abnormal (C).




**Gambar 1.7** USG kepala janin. Area besar echolucent (tipe malformasi-Dandy-Walker (DW)) terdapat dalam fosa posterior.

## Sistem kardiovaskular

Bahkan di unit spesialis di mana jantung dan seluruh saluran diperiksa, 70-80% dari kelainan dapat diidentifikasi antenatal, tetapi pada populasi umum tingkat deteksi bisa didapatkan serendah 15% [10,11]. Ketika pandangan empat-

ruang normal jantung terlihat (Gambar 1.8), seharusnya pada saat itu 40% dari anomali harus dapat disingkirkan.



**Gambar 1.8** Gambaran empat katup normal pada jantung memperlihatkan ventrikel (V) dan atrium (A).

### Wajah Sumbing

Posisi janin, ukuran kecil dari *alveolar ridge*, tungkai janin yang berada di depan wajah, dan indeks massa tubuh ibu yang meningkat dapat membuat petugas untuk memeriksa sepenuhnya. Ketika gambaran lengkap wajah diperoleh, 50-70% dari bibir sumbing dengan atau tanpa celah langit-langit dapat dikenali (Gambar 1.9a-1.9b). Bibir sumbing yang tersembunyi tidak terdeteksi sebelum lahir, kemungkinan besar karena posisi lidah janin, dari *echogenicity* sama seperti langit-langit yang menghalangi terlihatnya profil cacat tersebut.

Kelainan kraniofasial lain seperti *hypertelorism* tidak dapat diidentifikasi dengan pengambilan gambar USG 2D. Dengan meningkatnya pengalaman pencitraan 3D, penanda 'kecil' tersebut telah dapat divisualisasikan, tetapi

kepentingan untuk mendapatkan informasi ini, terutama pada trimester ketiga mungkin masih dipertanyakan.



**Gambar 1.9** (a) Profile normal bibir janin (L) pada trimester kedua; (b) profile bibir janin yang menampilkan bibir atas (L) dengan celah besar (C) terlihat.

### Masalah Skeletal

Merupakan hal yang relatif mudah untuk mengukur kaki janin selama kehamilan, tetapi banyak penyimpangan halus dalam pertumbuhan yang tidak muncul hingga

sampai trimester ketiga, jauh melampaui waktu pemindaian anomali detail. Karena penilaian panjang ekstremitas janin rutin dilakukan di sebagian besar departemen, cacat kasar akibat obat thalidomide harus mudah dideteksi pada usia 18 minggu. Ketika teratogenesis dicurigai, pemeriksaan tangan, kaki, dan jumlah jari-jarinya harus dilakukan secara hati-hati. Etiologi lain, seperti masalah kromosom, harus disingkirkan sebelum menghubungkan cacat apapun dengan efek konsumsi obat.

### **Kelainan Fetal: Pilihan orang tua**

Setelah kelainan diidentifikasi, orang tua harus diberi konseling mengenai bentuk kelainan dan masalah terkait. Di tempat yang ditentukan, orang tua harus ditawarkan tes diagnostik untuk mengkonfirmasi kariotipe janin. Ketika kelainan ini cenderung memiliki risiko yang signifikan dari cacat fisik atau mental, orang tua memiliki pilihan untuk mengakhiri kehamilan. Setelah 22 minggu kehamilan selesai, jantung janin harus dihentikan sebelum persalinan dan karenanya setiap upaya harus dilakukan untuk memfasilitasi diagnosis dini bila memungkinkan. Ketika orang tua memilih untuk melanjutkan kehamilan, maka pengelolaan kehamilan, persalinan mungkin perlu dimodifikasi tergantung pada fasilitas yang tersedia hingga orang tua mungkin perlu dirujuk ke pusat-pusat regional.

### **Ringkasan dan poin-poin kunci**

Kebanyakan kelainan kongenital tidak berhubungan dengan penggunaan obat-obatan dalam kehamilan. Ketika obat yang dikonsumsi diketahui menyebabkan kelainan struktural, mempertimbangkanyang detail pada trimester kedua harus ditawarkan untuk mengkonfirmasi

perkembangan janin yang normal. Ketika suatu kelainan terdeteksi, orang tua memiliki pilihan untuk menghentikan kehamilan (pertimbangan komisi etik) jika masalahnya adalah substansial atau bisa dilanjutkan hingga persalinan. Detil scan USG tidak dapat mendeteksi kelainan fungsional seperti retardasi mental atau masalah kecil seperti fitur dismorfik. Dalam hal ini kelainan tersebut terdeteksi saat lahir, penyebab lainnya dari keterbelakangan mental harus disingkirkan sebelum penggunaan obat dijadikan sebagai penyebabnya. Sangat bijaksana untuk semua dokter jika mendapati seorang wanita yang telah menggunakan obat selama kehamilan untuk memastikan dokumentasi yang cermat pada saat antenatal mengenai perkembangan janin karena banyak masalah fungsional sering tidak teridentifikasi sampai anak berusia beberapa bulan dan mengingat-ingat waktu paparan obat dan pemeriksaan yang dilakukan dapat menjadi sulit di kemudian hari.

## Referensi

1. Kaufman DW, Kelly JP, Rosenberg L, et al. **Recent patterns of medication use in the ambulatory adult population of the United States: the Slone survey.** *JAMA* 2002;287(3):337-44.
2. Andrade SE, Gurwitz JH, Davis RL, et al. **Prescription drug use in pregnancy.** *Am J Obstet Gynaecol* 2004;191(2):398-407.
3. Economides DL, Whitlow BJ, Braithwaite JM. **Ultrasonography in the detection of fetal abnormalities in early pregnancy.** *BJOG* 1999;106: 516.
4. Souka AP, Pilalis A, Kavalakis Y, Komaz Y, Antsaklis P, Anstakalis A., **Assessment of fetal anatomy at the 11-14 week examination.** *Ultrasound Obstet Gynaecol* 2004;24:730-4.
5. Chitty LS, Hunt GH, Moore J, Lobb MO.,

- Effectiveness of routine ultra-sonography in detecting fetal structural problems in a low risk population. *BMJ* 1991;303:1165-9.**
6. **Smith NC, Hau C., A six year study of the antenatal detection of fetal abnormality in six Scottish health boards. *Br J Obstet Gynaecol* 1999;106:206-12.**
  7. **Reynolds EH., Anti-convulsants, folic acid and epilepsy. *Lancet* 1973; 1:1376-88.**
  8. **MRC Vitamin Research Study Group., Prevention of neural tube defects: results of the MRC vitamin study. *Lancet* 1991;338:131-9.**
  9. **Shaw GM, Lammer EJ, Wasserman CR, O'Malley CD, Tolarova MM., Risks of oro-facial clefts in children born to women using multi-vitamins containing folic acid periconceptionally. *Lancet* 1995;346: 399.**
  10. **Allan LD., Echocardiographic detection of congenital heart disease in the fetus: present and future. *Br Heart J* 1995;74:103-6.**
  11. **Westin M, Saltvedt S, Bergman G, et al., Routine ultrasound examination at 12 or 18 gestational weeks for prenatal detection of major congenital heart malformations? A randomised controlled trial comparing 36,299 fetuses, *Br J Obstet Gynaecol* 2006;113:675-82**

## **BAB 2**

### **PENGOBATAN KONDISI UMUM, RINGAN DAN KONDISI YANG DAPAT SEMBUH SENDIRI (*SELF LIMITING*)**

Anthony J. Avery, Susan L. Brent

Bab ini berkaitan dengan pengelolaan beberapa kondisi umum, ringan, dan kondisi sembuh sendiri (*Self limiting*) yang mungkin terjadi selama kehamilan. Karena kebanyakan kondisi seperti ini bersifat minor, kami akan menekankan pentingnya perawatan tanpa obat dan manuver seperti penggunaan narkosa intermiten agar membatasi paparan janin terhadap setiap obat yang digunakan. Paparan pada janin selama 10 minggu pertama kehamilan sangat berpengaruh terhadap risiko terbesar cacat bawaan, karena saat tersebut adalah periode organogenesis. Namun, obat yang diminum selama tahap akhir kehamilan dapat menimbulkan cacat yang lebih halus. Selain itu, neonatus dapat mengalami gejala penarikan (*withdrawal*) terkait obat-obatan tertentu yang diresepkan selama kehamilan. Meskipun terdapat masalah ini, masih dibutuhkan penggunaan obat-obatan untuk meringankan gejala yang sangat mengganggu dalam beberapa kasus.

Poin-poin penting.

1. Bila memungkinkan, cobalah terlebih dahulu perawatan tanpa obat.
2. Dalam memilih obat:
  - Pilihlah obat yang memiliki catatan keamanan yang terbaik dari waktu ke waktu.
  - Hindari obat-obat baru, kecuali keamanannya telah ditetapkan dengan jelas.

- Jangan menganggap bahwa obat-obatan *over-the-counter* (belum ditetapkan keamanannya) dan obat-obatan herbal aman untuk dikonsumsi.
  - Pada nasihat produsen pada peringatan dan kontraindikasi kehamilan, periksalah versi terbaru dari ringkasan karakteristik produk.
3. Dalam menentukan dosis dan gambaran pengobatan:
- Hindari penggunaan pada 10 minggu pertama kehamilan jika mungkin.
  - Menggunakan dosis efektif terendah.
  - Menggunakan obat untuk periode waktu terpendek yang diperlukan.
  - Jika memungkinkan, gunakan obat-obatan intermitten daripada terus-menerus.
  - Jika terindikasi untuk penggunaan kronis, pertimbangan menghentikan atau mengurangi dosis obat sebelum perkiraan tanggal kelahiran, dengan mempertimbangkan potensi risiko dan manfaat dari strategi tersebut

Dalam bab ini kami berfokus pada obat-obatan dalam kehamilan sebagai berikut:

- Gejala yang berhubungan dengan saluran pencernaan.
- Penyakit minor yang melibatkan saluran pernapasan.
- Nyeri.
- Infeksi jamur umum.
- Infestasi umum.

Ringkasan obat yang dibahas masing-masing terkait keadaan di atas disajikan dalam Tabel 2.1. Kami menyimpulkan bab ini dengan memberikan nasihat tentang penggunaan obat yang tidak disengaja pada kehamilan.

Tabel 2.1 Obat yang digunakan untuk kondisi umum, ringan dan sembuh sendiri dan keamanannya dalam kehamilan.

Drug	Trimester 1	Trimester 2	Trimester 3	Comment
<b>Nausea and vomiting</b>				
Cyclizine	1	1	1	Widest experience with promethazine and cyclizine
Promethazine	1	1	1	
Metoclopramide	1	1	1	
Dompardone	1	1	1	
Prochlorperazine	1	1	1	
Hyoscine hydrobromide	2	2	2	
<b>Symptoms affecting the gastrointestinal tract</b>				
Antacids	1	1	1	
Alginate antacid, e.g., Gaviscon, Algicon	1	1	1	
Omeprazole	1	1	1	
Ranitidine	1	1	1	
Omeprazole	1	1	1	
Lansoprazole	2	2	2	
Lactulose	1	1	1	
Senna	1	1	2	
Bisacodyl	1	1	1	
Docusate	2	2	2	
Glycerin suppositories	1	1	1	
Loperamide	2	2	2	
Co-phenotrope	2	2	2	
<b>Minor ailments involving the respiratory tract</b>				
Topical sympathomimetics, e.g., xylometazoline	1	1	1	
Intranasal corticosteroids	1	1	1	
<b>Antitussives</b>				
Dextromethorphan	2	2	2	
Pholcodine	2	2	2	
Sodium cromoglicate drops	1	1	1	
Beclomethasone nasal spray	1	1	1	
Chlorphenamine	1	1	1	
Promethazine	1	1	1	

(Continued)

Drug	Trimester 1	Trimester 2	Trimester 3	Comment
Cetirizine	2	2	2	
Loratadine	2	2	2	
Fexofenadine	3	3	3	
Levocetirizine	3	3	3	
Desloratadine	3	3	3	
		<b>Pain</b>		
Paracetamol	1	1	1	
Aspirin (at analgesic doses)	2	2	3	See text for comments on low-dose aspirin Ibuprofen preferred
NSAIDs	2	1	3	
COX 2s	3	3	3	
Opioids including codeine, morphine, pethidine, fentanyl, hydromorphone, oxycodone	1	1	2	Newborn infant may be opioid dependant
Tramadol	2	2	2	
Sumatriptan	3	3	3	
Ergotamine	3	3	3	
		<b>Common fungal infections</b>		
Clotrimazole (topical)	1	1	1	Nystatin less effective than clotrimazole
Nystatin (topical)	1	1	1	
Fluconazole	2	2	2	Avoid high dose/regular use
Ketoconazole	3	3	3	
Itraconazole	3	3	3	
Griseofulvin	3	3	3	
Terbinafine	3	3	3	
		<b>Common infestations</b>		
Malathion	1	1	1	
Permethrin	1	1	1	Aqueous preparations preferable
Phenothrin	1	1	1	
Carbaryl	2	2	2	
Piperazine	2	1	1	
Mebendazole	2	1	1	

Perhatikan penjelasan sebelum menggunakan tabel di atas. Gunakan obat dalam dosis serendah mungkin dengan waktu yang sesingkat mungkin.

Keterangan:

1. Obat nampaknya aman digunakan selama kehamilan.
2. Keamanan masih belum jelas, data masih belum cukup.
3. Tidak aman atau hanya sedikit pengalaman yang terbatas.

## **SALURAN PENCERNAAN**

### **Mual dan Muntah**

Sebagian besar wanita menderita mual, muntah, atau keduanya selama tahap awal kehamilan, biasanya antara usia 6 hingga 12 minggu kehamilan. Meskipun dikenal dalam bahasa sehari-hari sebagai '*morning sickness*', gejala dapat terjadi setiap saat sepanjang hari. Penyebabnya kurang dipahami, meskipun diduga terkait dengan peningkatan kadar hormon *human chorionic gonadotropin*. Konsentrasi hormon tersebut di darah yang lebih tinggi terlihat pada kehamilan ganda dan hal ini dianggap sebagai penjelasan gejala yang lebih parah yang kadang-kadang dialami. Kebanyakan wanita yang menderita gejala mual dan muntah berhasil membatasi ini dengan menghindari makanan yang cenderung memperburuk gejala dan kemudian makan pada waktu dimana gejala berkurang. Saran sederhana seperti memakan makanan kecil yang tinggi karbohidrat dan rendah lemak dan menghindari volume besar cairan dapat membantu (mengganti volume yang kecil dengan lebih sering). Hal ini juga penting untuk menjaga hidrasi yang memadai, terutama di masa hiperemesis.

Muntah yang lebih parah dapat terjadi pada sebagian kecil wanita dan dapat menyebabkan dehidrasi, ketosis, dan penurunan berat badan, membutuhkan perawatan rumah sakit. Jika mual dan muntah parah, pengobatan dapat dibenarkan. Uji coba terkontrol belum pernah dilakukan dan hanya terdapat sedikit bukti dari keberhasilan komparatif obat dalam mengurangi gejala. Namun demikian, tersedia data untuk hasil penggunaan beberapa obat antiemetik. Sebuah meta-analisis dari 24 penelitian yang melibatkan lebih dari 200.000 wanita yang terpapar utamanya antihistamin menyimpulkan bahwa tidak ada peningkatan risiko teratogenisitas terkait dengan penggunaan obat tersebut [1]. Sejumlah obat lain telah digunakan, termasuk antagonis dopamin metoclopramide dan domperidone, serta fenotiazin, proklorperazin. Obat ini belum dikaitkan dengan efek teratogenik, meskipun penelitian hanya melibatkan sejumlah kecil wanita dibandingkan dengan penelitian penggunaan antihistamin [2].

Baru-baru ini, sebuah ulasan Cochrane [3] telah melaporkan tentang efektivitas metode yang berbeda dalam pengobatan mual dan muntah di awal kehamilan, termasuk pemberian antihistamin, jahe, pyridoxine, dan akupunktur atau akupresur. Dari obat yang dipertimbangkan, pyridoxine (dalam dosis 10-25 mg, tiga kali sehari) adalah yang paling mungkin menyebabkan efek samping tetapi tampaknya lebih bermanfaat dalam mengendalikan mual muntah. Hiosin hidrobromida tersedia sebagai *patch transdermal*, belum terbukti memiliki peningkatan insiden cacat lahir, meskipun jumlah perempuan yang terpapar relatif kecil. Penggunaannya hanya diberikan pada keadaan di mana agen lain yang sering diberikan gagal meredakan gejala [4].

Sebuah percobaan tunggal dari akar jahe segar masuk dalam ulasan Cochrane [3] dan dilaporkan manfaatnya untuk mengatasi muntah dan mual, tanpa efek samping. Dalam *review* yang sama, hasil yang beragam dari uji akupresur atau akupunktur dilaporkan tanpa demonstrasi yang jelas dari peningkatan khasiat terhadap akupresur boneka atau standar saran diet dan gaya hidup. Kami belum mengetahui adanya studi terkontrol *morning sickness* yang menggunakan obat homeopati.

Penatalaksanaan hiperemesis gravidarum mungkin melibatkan penggunaan kortikosteroid atau 5HT3 antagonis ondansetron, meskipun masih sedikit data yang diterbitkan saat ini tersedia untuk agen tersebut.

### **Refluks gastroesofagus dan nyeri dada (*heartburn*)**

Refluks gastroesofagus dan *heartburn* dilaporkan dialami sebagian besar perempuan pada kehamilan. Gejala ini umum pada kehamilan, terutama karena penurunan tekanan sfingter esofagus bagian bawah yang mungkin berhubungan dengan meningkatnya kadar progesteron [5]. Penurunan tekanan sfingter esofagus bagian bawah terlihat dalam keseluruhan tiga trimester. Menurut sebuah penelitian kecil, titik terendah tekanan berada pada usia kehamilan 36 minggu dan kembali normal saat postpartum [6]. Gejala serupa dengan yang dialami pada orang tidak hamil. Tindakan konservatif seperti menghindari makan sore hari atau sebelum istirahat, menaikkan posisi kepala tempat tidur 10-15 cm dan menghindari makanan berlemak atau pedas/sangat berbumbu dapat membantu.

Antasida mengandung kalsium, magnesium, atau aluminium mungkin berguna dan umumnya dianggap aman, tetapi penting untuk mempertimbangkan

menggunakan formulasi 'seimbang' (magnesium dan aluminium) untuk menghindari masalah diare atau konstipasi. Preparat yang mengandung alginat sebagian besar tidak diserap dan dianggap aman untuk digunakan. Sukralfat adalah agen pelindung mukosa yang tidak diserap dalam jumlah yang banyak dan telah terbukti efektif dalam mengurangi *heartburn* dan regurgitasi selama kehamilan [7].

Obat-obatan penghambat-H<sub>2</sub>-histamin sering digunakan untuk mengobati refluks gastrooesophageal pada pasien yang tidak hamil. Data dari studi hewan dan laporan anekdotal pada manusia meyakinkan tentang penggunaan obat ini pada kehamilan aman, meskipun dapat muncul efek anti-androgen yang telah diidentifikasi pada tikus yang diberikan simetidin [8]. Pemantauan dari 553 perempuan yang diberikan penghambat-H<sub>2</sub> dalam sebuah studi tidak menunjukkan peningkatan malformasi dibandingkan dengan kontrol - Kelompok terbesar (dari 330 perempuan) menerima ranitidine [9]. Mengingat bukti ini, ranitidine dapat dianggap sebagai penghambat-H<sub>2</sub> pilihan dimana antasida dan perubahan gaya hidup telah terbukti tidak efektif.

*Proton pump inhibitor* (PPI) telah banyak digunakan dalam pengobatan refluks gastro-esofagus dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian toksisitas pada hewan menunjukkan peningkatan kematian embrio dan janin pada tikus dan kelinci yang diberikan dosis omeprazole jauh melebihi yang diberikan kepada manusia [10]. Sebuah studi prospektif dari 113 wanita yang mengkonsumsi omeprazole selama periode organogenesis tidak menemukan peningkatan kejadian malformasi mayor dibandingkan dengan kelompok kontrol [11]. Namun, terdapat beberapa laporan *anencephaly* [12]. Meskipun demikian, omeprazole sekarang menjadi salah satu dari sedikit obat berlisensi

untuk digunakan dalam kehamilan. Sedikit informasi yang tersedia untuk lansoprazole, meskipun belum terbukti memiliki efek teratogenik dalam studi reproduksi hewan [13]. Serangkaian kasus prospektif baru-baru ini dalam pengobatan ibu menggunakan PPI terhadap hasil kehamilan, termasuk penggunaan lansoprazole telah diterbitkan. Insiden malformasi sejalan dengan tingkat malformasi keseluruhan untuk kehamilan berisiko tinggi yang diselenggarakan pada pusat database tersebut [14]. Angka-angka kecil yang terlibat membatasi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian dan PPI tetap menjadi pilihan ketiga.

### Konstipasi

Konstipasi pada kehamilan adalah umum dengan meningkatnya kadar progesteron yang mempengaruhi motilitas usus. Konsumsi preparat besi dan aluminium yang mengandung antasida juga dapat menyebabkan gejala ini. Prinsip pengobatan konstipasi adalah sama dengan pasien yang tidak hamil. Pengobatan lini pertama harus melibatkan meningkatkan asupan buah (kering serta segar) dan sayuran. Asupan cairan juga harus ditingkatkan. Agen seperti *ispaghula husk* (misalnya, Fybogel®, Regulan®) dikonsumsi dengan banyak cairan dapat membantu. Laktulosa tidak banyak diserap dan juga dapat membantu, meskipun belum ada banyak literatur yang mendukung penggunaannya. Penggunaan pencahar stimulan *bisacodyl* sebagai agen lini ketiga selama kehamilan telah disarankan karena penyerapan sistemiknya yang rendah [15]. *Senna* tidak dianggap teratogenik [12], meskipun mungkin merangsang kontraksi rahim pada trimester ketiga [16], dan mungkin disarankan menghindari penggunaannya berdekatan dengan masa taksiran partus. *Natrium docusate*

belum dikaitkan dengan cacat bawaan tertentu dan dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam dosis rendah sebagai agen-lini keempat. Pencahar yang mengandung magnesium atau garam natrium sebagai bahan utama dapat menyebabkan gangguan elektrolit dan sebaiknya dihindari. Gliserol (gliserin) supositoria nampaknya tidak memiliki efek buruk pada janin.

### Diare

Diare selama kehamilan memiliki penyebab serupa dengan yang terjadi pada pasien tidak hamil dan harus diselidiki sesuai dengan gejala dan tanda-tanda yang muncul. Gastroenteritis adalah penyebab paling umum dari diare pada masa melahirkan dan biasanya dapat sembuh sendiri *self-limiting*. Pengobatan harus ditujukan untuk menjaga hidrasi, dan ini mungkin sangat penting mengingat efek samping dehidrasi yang buruk pada janin. Larutan rehidrasi oral harus digunakan jika diperlukan. Penggunaan obat-obatan anti-diarea sebaiknya dihindari karena pengalaman yang masih terbatas.

*Diphenoxylate* dengan atropin (co-phenotrope: Lomotil®) belum ditemukan bersifat teratogenik pada hewan. Satu laporan menunjukkan masalah dengan kombinasi agen ini pada manusia [17], tapi waktu pemberian tidak konsisten dengan cacat yang ditemukan. Sebuah studi kecil melaporkan tidak ada kelainan dalam tujuh bayi yang terpajan selama trimester pertama [18].

Belum ada laporan publikasi yang mengidentifikasi hubungan loperamide dengan cacat bawaan [12]. Sebuah penelitian prospektif kecil melaporkan bahwa perempuan yang terpapar loperamide selama kehamilan cenderung untuk memiliki bayi yang lebih kecil, meskipun

penjelasannya masih tidak jelas [19]. Jika penggunaan jangka pendek diperlukan, loperamide dapat menjadi pilihan.

### **Hemoroid**

Meskipun banyak orang dewasa menderita wasir, hal ini sering dialami seiring dengan kehamilan. Pengobatan mirip dengan yang diberikan pada individu-individu tidak hamil, yakni: menghindari konstipasi, pengobatan dengan obat pencahar [20], atau penggunaan krim zat *astringent* jika perlu.

## **SALURAN PERNAPASAN BAGIAN ATAS**

Infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan *hay fever* merupakan masalah umum bagi wanita usia subur. Di bawah ini kami membahas kelayakan penggunaan agen antimikroba pada ISPA. Kami akan mengomentari keamanan obat yang digunakan untuk pengobatan simptomatik gangguan pernapasan bagian atas.

### **Peran antibiotik**

Pada pasien dengan gejala flu biasa, penelitian menunjukkan bahwa tidak ada indikasi untuk menggunakan antibiotik [21]. Jika sinusitis berkembang, kebanyakan studi menunjukkan bahwa antibiotik mengurangi durasi gejala dan karena itu penggunaannya dapat dibenarkan [22]. Namun demikian, kita harus ingat bahwa sebagian besar pasien akan sembuh total dari sinusitis baik mereka yang menerima antibiotik atau tidak menerima dan ini dapat mempengaruhi pilihan pengobatan pada kehamilan.

Sebuah penelitian meta-analisis yang melibatkan pengobatan sakit tenggorokan dengan agen antimikroba menunjukkan bahwa pengobatan hanya memberikan manfaat sederhana [23]. Misalnya, gejala dari setengah pasien membaik dalam waktu 3 hari dan 14 pasien perlu dirawat untuk mencegah salah satu dari mereka mengalami hari tambahan sakit tenggorokan setelah 1 minggu. Terdapat kecenderungan penurunan risiko glomerulonefritis dengan pengobatan antibiotik [23]. Insiden komplikasi ini, bagaimanapun, adalah sangat rendah dalam masyarakat Barat sehingga sulit untuk membenarkan penggunaan antibiotik untuk alasan ini saja.

Secara keseluruhan, kami sarankan tidak meresepkan antibiotik untuk wanita hamil dengan ISPA kecuali gejala sangat berat. Untuk pasien dengan tonsilitis, mungkin layak dilakukan apusan tenggorokan sebelum memutuskan untuk memberikan pengobatan.

### **Pengobatan simtomatik untuk masalah pernapasan umum atas**

Mengingat bahwa pengobatan ISPA pada dasarnya adalah penanganan gejala, penting untuk fokus pada keamanan preparat obat yang tersedia dan mengenali bahwa perawatan non-farmakologis seperti inhalasi uap yang dapat membantu [24]. Preparat obat *Over-the-counter* untuk pilek mengandung keragaman bahan. Sering bahan utama adalah parasetamol atau aspirin (lihat bagian tentang nyeri dan penggunaan analgesik pada kehamilan untuk rincian lebih lanjut dari obat ini). Bahan-bahan lain mungkin termasuk simpatomimetik, antihistamin, agen anti-inflamasi nonsteroid, dan stimulan seperti kafein. Preparat multipel bahan sebaiknya dihindari dan mungkin paling aman untuk memberikan parasetamol saja jika obat diperlukan untuk

menangani demam atau malaise. Simpatomimetik dapat membantu pada gejala awal hidung tersumbat [25] tetapi mereka efeknya berkurang dari waktu ke waktu dan dapat menyebabkan kongesti kembali (*rebound*). Tetes hidung atau semprot hidung lebih disarankan dibandingkan preparat sistemik jika pengobatan diberikan. Jika seorang wanita ingin menggunakan obat pilek favorit tertentu, keamanan harus diperiksa pada produsen; bahan dalam preparat tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan.

### **Batuk**

Tidak ada bukti yang nyata untuk atau terhadap penggunaan obat *over-the counter* untuk batuk akut [26]. Opioid lemah seperti kodein, pholcodine, atau dekstrometorfan sering digunakan dengan tujuan menekan batuk, meskipun kodein khususnya, tampaknya tidak lebih efektif daripada plasebo [26]. Ekspektoran dan mukolitik umumnya dianggap tidak efektif, tapi sebuah percobaan menunjukkan bahwa orang dewasa menunjukkan penggunaan guaifenesin bermanfaat dan percobaan kecil lain menunjukkan penurunan frekuensi batuk dengan Bisolvon®, preparat *mucoytic* yang tidak tersedia di Inggris [26]. Bukti lebih lanjut diperlukan untuk menentukan keamanan banyak obat *over-the-counter* pada kehamilan [27].

### **Hay fever**

*Hay fever* mungkin menjadi masalah bagi beberapa wanita selama kehamilan. Menghindari alergen pencetus, jika diketahui dapat mengurangi kebutuhan penggunaan obat-obatan. Pengobatan topikal umumnya harus dicoba sebelum menggunakan terapi sistemik untuk mengurangi paparan janin terhadap obat. Tetes mata sodium

kromoglikat dianggap aman karena dosis sistemiknya sangat kecil [28]. Preparat kortikosteroid topikal pada semprotan hidung adalah agen pilihan untuk rhinitis dan tampaknya aman dalam dosis yang relatif kecil digunakan untuk *hay fever* [29]. Penggunaan kortikosteroid sistemik harus dihindari jika mungkin dan tidak ada indikasi diberikan injeksi [30]. Simpatomimetik topikal telah dibahas sebelumnya. Masalah penggunaan agen-agen ini pada *hay fever* adalah bahwa penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kongesti hidung kembali (*rebound*).

Jika antihistamin sistemik dianggap penting, agen sedasi tua seperti klorfenamin atau promethazine lebih disarankan dibandingkan agen non-sedasi yang lebih baru dengan alasan data keamanan yang lebih luas [31]. Pengalaman yang terbatas dengan cetirizine belum menunjukkan peningkatan risiko dan dapat dianggap sebagai pilihan kedua yang cocok jika sedasi menjadi masalah [32,33]. Kekhawatiran mengenai kejadian hipospadia setelah paparan loratadine menyebabkan diadakan investigasi oleh Badan Obat Eropa [34]. Sebuah hubungan kausal tidak dapat dibenarkan atau dikecualikan dengan bukti yang ada dan hingga penyelidikan lebih lanjut telah dilaksanakan, loratadine harus digunakan dengan hati-hati pada kehamilan. Data yang saat ini tersedia tidak memadai untuk menilai keamanan fexofenadine, levocetirizine, atau desloratadine pada kehamilan.

## **NYERI DAN PENGGUNAAN ANALGESIK PADA KEHAMILAN**

Penggunaan dengan hati-hati, urutan analgesik WHO dapat diberlakukan untuk penggunaan pengobatan rasa sakit selama dua trimester pertama kehamilan. Kami

mengomentari penggunaan analgesik yang umum di bawah ini.

### **Parasetamol**

Parasetamol digunakan secara luas pada semua tahap kehamilan untuk menghilangkan nyeri dan sebagai antipiretik. Penggunaannya jangka pendek selama kehamilan belum dikaitkan dengan cacat bawaan jika diminum dalam dosis terapi normal. Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan parasetamol yang sering antara 20 dan 32 minggu kehamilan dikaitkan dengan peningkatan risiko asma pada sub-kelompok anak usia 6-7 tahun [35,36]. Keterbatasan metodologis berarti bahwa temuan harus ditafsirkan dengan hati-hati dan pada saat ini parasetamol masih tetap merupakan pilihan obat lini pertama pada keadaan nyeri ringan sampai sedang pada semua tahap kehamilan.

### **Aspirin**

Aspirin juga digunakan secara luas pada kehamilan. Pada dosis tinggi telah terbukti teratogenik pada hewan percobaan, sementara masih ada kontroversi tentang risiko pada kehamilan manusia [37]. Aspirin memiliki sejumlah aksi/efek yang tidak diinginkan pada wanita hamil, terutama pada akhir kehamilan. Dalam dosis analgesik, agen ini meningkatkan risiko perdarahan maternal atau neonatus berdasarkan efek anti-plateletnya [38]. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan penutupan duktus arteriosus dalam rahim dengan menghambat prostaglandin sintetase. Juga, mungkin menunda persalinan dan meningkatkan durasi persalinan [39]. Untuk alasan ini, dosis analgesik aspirin sebaiknya dihindari pada trimester ketiga kehamilan. Sebaliknya, aspirin dosis rendah (yang telah digunakan

dalam pencegahan hipertensi yang terinduksi pada kehamilan dan pre-eklampsia) tampaknya tidak menyebabkan efek samping [40].

### **Obat anti-inflamasi non-steroid**

*Non-steroid anti-inflammatory drugs* (NSAID) belum dikaitkan dengan cacat bawaan, tetapi mereka sebaiknya dihindari pada periode *periconceptional* karena implantasi blastokista dapat terhambat [41]. Obat ini memiliki efek/kerja yang serupa meskipun tidak identik dengan aspirin dan penghambatan prostaglandin sintetase pada janin dapat menyebabkan penutupan duktus arteriosus dalam rahim yang menyebabkan hipertensi pulmonal. Oleh karena itu, penggunaan NSAID harus dihindari pada trimester ketiga jika memungkinkan, meskipun efek pada duktus mungkin lebih mungkin terjadi setelah minggu 34 kehamilan. Selain itu pada masa persalinan NSAID dapat meningkatkan risiko perdarahan karena efeknya pada platelet. Selain itu, penggunaan NSAID selama kehamilan telah dilaporkan menyebabkan oligohidramnion reversibel sebagai konsekuensi dari pengurangan produksi urin janin [42]. Jika NSAID dipertimbangkan penting pemberiannya selama kehamilan, adalah logis untuk menggunakan obat-obatan yang mapan, seperti ibuprofen, diklofenak, atau indometasin yang telah memiliki data paling jelas. Pertimbangan dapat diberikan untuk penggunaan agen topikal seperti *rubefaciants* atau NSAID jika sesuai.

Pengalaman masih kurang dalam penggunaan COX-2 *inhibitor* pada kehamilan, meskipun penelitian pada hewan tidak menunjukkan risiko pada embrio. Secara umum dibandingkan dengan NSAID non-selektif, obat ini dapat menyebabkan penutupan dini duktus arteriosus. Saat ini tidak dianjurkan pada setiap tahap kehamilan.

## **Analgesik Opioid**

Sebagian besar data yang berkaitan dengan keamanan analgesik opioid pada kehamilan telah dikumpulkan dari studi perempuan yang menyalahgunakan opioid. Zat tersebut sering dipalsukan dan pengguna opiat mungkin secara tidak sengaja menggunakannya campuran dengan obat lain. Dua proyek surveilans Amerika (*Michigan Medicaid dan Kolaborasi Project Perinatal*) belum mencatat tingkat cacat bawaan berat yang terkait dengan penggunaan morfin, petidin, fentanil, hidromorfon, oksikodon, atau metadon [12]. Beberapa penelitian yang diterbitkan telah mengidentifikasi kemungkinan peningkatan malformasi terkait dengan penggunaan kodein [18,43,44]. Namun demikian, pengalaman yang luas menunjukkan bahwa obat ini cukup aman pada kehamilan [29].

Perhatian utama pada pengguna regular opioid selama kehamilan adalah bahwa bayi yang lahir sering tergantung opioid. Untuk mencegah reaksi penarikan (*withdrawal*), bayi-bayi ini memerlukan penyapihan perlahan dari opioid dan perawatan yang 'tenang' selama periode postpartum.

Kami tidak mengakui bukti keamanan yang dipublikasikan tramadol pada awal kehamilan, meskipun *British National Formulary* (BNF) mencatat bahwa telah menemukan sifat embriotoksik pada hewan [45]. Obat ini telah digunakan selama persalinan, dengan tidak ada laporan efek samping buruk pada neonatus [46].

## **Migrain**

Migrain adalah salah satu gangguan yang sering meningkat selama kehamilan, terutama selama trimester kedua dan ketiga [47]. Dengan alasan keamanan, obat pilihan pertama adalah parasetamol. NSAID, seperti

ibuprofen mungkin menjadi alternatif tetapi kurang diminati karena alasan-alasan yang telah diberikan di atas. Alkaloid ergot, seperti ergotamine adalah uterotonika dan sebaiknya dihindari selama kehamilan [48]. Dari agonis serotonin, yang paling luas dan sering penggunaannya adalah *sumatriptan*, dan data menunjukkan dapat digunakan apabila kebutuhan mendesak [49]. Obat-obatan yang lebih baru di kelas ini harus digunakan dengan hati-hati meskipun tidak ada data peningkatan risiko yang ditunjukkan. Jika pengawasan obat terhadap mual dianggap penting, antiemetik antihistamin seperti promethazine atau cyclizine harus dipertimbangkan; jika perlu, dosis sesekali proklorperazin atau metoclopramide yang mungkin berisiko rendah, khususnya selama trimester kedua dan ketiga.

Beberapa wanita akan mengambil perawatan profilaksis untuk migrain ketika mereka hamil dan mungkin ingin melanjutkan pengobatan selama kehamilan. Ada data yang mendukung penggunaan  $\beta$ -blocker, khususnya propranolol dan metoprolol selama kehamilan [49]. Namun demikian, kajian kebutuhan lebih lanjut harus dilakukan pada trimester kedua dan ketiga dan idealnya harus dihentikan sebelum kelahiran karena potensi efek yang merugikan pada denyut jantung janin dan hipoglikemia pada bayi baru lahir. Terdapat juga banyak pengalaman pada penggunaan antidepresan trisiklik seperti amitriptyline, pada kehamilan dan ini dapat dilanjutkan sampai trimester ketiga ketika risiko gejala penghentian (*withdrawal*) pada bayi baru lahir harus dipertimbangkan dibandingkan manfaatnya untuk ibu. Terdapat sedikit data yang mendukung penggunaan pizotifen pada kehamilan, meskipun produsen menyarankan dapat digunakan dalam situasi di mana kontrol belum mencapai hasil dengan rejimen lain [50].

## INFEKSI JAMUR UMUM

### Candida

Infeksi candida pada vagina adalah penyebab umum ketidaknyamanan selama kehamilan. Agen topikal seperti clotrimazole yang memiliki penyerapan sistemik yang rendah dianggap tanpa risiko yang signifikan. Sebuah tinjauan sistematis terbaru pengobatan kandidiasis vagina pada kehamilan menyimpulkan bahwa imidazoles seperti clotrimazole dan econazole lebih efektif daripada nistatin dan bahwa pengobatan selama 7 hari mungkin diperlukan [51]. Pengobatan sistemik mungkin kurang diminati. Terdapat laporan cacat bawaan pada perempuan yang mengkonsumsi secara teratur flukonazol oral dosis tinggi pada trimester pertama kehamilan untuk infeksi jamur yang sedang berlangsung seperti *coccidiomycosis* [52]. Terdapat sedikit data yang tersedia pada paparan penggunaan dosis intermiten atau dosis tunggal obat seperti yang mungkin terlihat untuk kandidiasis vagina. Sebuah studi pemantauan pemberian resep mencatat hasil akhir kehamilan pada wanita yang telah mengkonsumsi dosis tunggal 150 mg flukonazol (275 perempuan), beberapa dosis 50-mg (3 perempuan) atau beberapa dosis 150-mg (11 perempuan) baik selama atau sesaat sebelum hamil [53]. Tidak ada kelainan yang ditemukan pada mereka yang telah mengambil flukonazol pada awal kehamilan. Penelitian prospektif lain menyimpulkan bahwa paparan dosis tunggal atau masa singkat penggunaan flukonazol selama trimester pertama tampaknya tidak meningkatkan kejadian cacat bawaan [54]. Sebuah studi lebih lanjut telah mengkonfirmasi temuan ini, selain melaporkan tidak ada bukti peningkatan risiko kelahiran prematur atau berat bayi lahir rendah pada kehamilan yang diteliti [55]. Meskipun data ini meyakinkan,

flukonazol jelas sebaiknya dihindari selama kehamilan dan paparan dosis intermiten atau rendah yang tidak disengaja seharusnya tidak menjadi perhatian. Itrakonazol dan ketoconazole secara kimiawi berkaitan dengan flukonazol dan juga dikonsumsi per-oral. Beberapa laporan telah menghubungkan obat ini dengan malformasi kongenital [12] dan mereka harus dihindari.

### **Infeksi Jamur Pada Kulit**

Imidazoles topikal seperti clotrimazole dapat digunakan untuk mengobati sebagian besar infeksi kulit jamur pada kehamilan. Pengobatan topikal biasanya tidak efektif untuk infeksi jamur kuku, tetapi pada bukti saat ini, pengobatan sistemik harus dihindari pada kehamilan. Secara khusus, griseofulvin telah ditemukan bersifat embriotoksik dan teratogenik pada beberapa spesies hewan [12]. Lebih sedikit data yang tersedia untuk terbinafine meskipun penelitian pada hewan belum menemukan efek buruk pada janin [56]. Namun demikian, kami menyarankan menghindari penggunaan obat dalam kehamilan kecuali benar-benar diperlukan.

## **INFEKSI UMUM**

Kutu kepala dan *threadworms* adalah dua infestasi pada perempuan usia sekolah mungkin sulit dikendalikan. Skabies juga tidak jarang ditemukan pada orang dewasa muda. Kondisi ini dibahas akan dibahas berikut.

### **Kutu Kepala**

Kutu (*Pediculus capitis*) memiliki siklus hidup sekitar 40 hari, meskipun kutu sering telah berinfestasi beberapa bulan sebelum terdeteksi. Pengobatan biasanya melibatkan aplikasi topikal salah satu dari empat insektisida: fenotrin,

permethrin, malathion, atau carbaryl. Namun, menyisir dengan sisir bergigi halus juga telah ditemukan efektif (untuk rincian lihat Livingstone [57]) dan kit 'Bug Buster®' dapat didapatkan menggunakan resep FP10 di Inggris.

Banyak organisasi perawatan primer di Inggris memiliki kebijakan mosaik untuk perawatan kutu dalam rangka mencoba meminimalkan perkembangan resistensi, tetapi penting untuk mempertimbangkan pilihan yang paling tepat dalam kehamilan. Salah satu obat lini pertama dalam mengobati kutu kepala adalah malathion, karena sudah terdapat lebih banyak pengalaman dengan obat ini dibandingkan dengan preparat agen yang lebih baru. Meskipun agen ini adalah antikolinesterase, namun dapat dimetabolisme oleh wanita hamil jika diserap secara sistemik, sehingga pembatasan paparan pada janin perlu diperhatikan. Pilihan lain preparat yang mengandung dimeticone (Hedrin®) telah tersedia yang bertindak sebagai inhibitor fisik sepenuhnya pada proses *encapsulating* kutu. Karena tidak diserap dan tidak mengandung insektisida tradisional dianggap cocok untuk digunakan oleh wanita hamil [58]. Saat ini telah banyak pengalaman dengan piretroid seperti permethrin dan fenotrin yang digunakan sebagai agen lini kedua. Preparat topikal mengandung air lebih baik dari pada yang mengandung alkohol karena penyerapan sistemik nampaknya lebih rendah. Jika insektisida digunakan pada wanita hamil, menyisir secara intensif dengan sisir deteksi selama 1-2 minggu setelah pengobatan dapat membantu menghindari infestasi kembali dari kutu yang menetas dari telur yang tidak terpengaruh oleh pengobatan. Hal ini dapat membantu menghindari perlunya pengobatan berikutnya. Kontak harus dirawat hanya jika mereka memiliki bukti infestasi kutu.

### **Skabies**

Skabies (*Sarcoptes scabiei*) adalah parasit yang bersembunyi di bawah kulit dan menyebabkan gatal-gatal yang intens, yang sering lebih buruk pada malam hari. Mereka menyebar melalui kontak pribadi yang dekat. Banyak obat yang digunakan untuk kutu efektif terhadap skabies. Namun, mengingat pertimbangan yang diuraikan di atas, pengobatan pilihan pada kehamilan adalah preparat malathion mengandung air dengan piretroid menjadi pengobatan lini kedua. Preparat harus dioleskan ke seluruh tubuh termasuk kepala dan leher. Pruritis membutuhkan waktu untuk sembuh setelah pengobatan dan karena itu antihistamin sedatif seperti klorfenamin dapat membantu di malam hari.

### **Threadworms**

Threadworms (*Enterobius vermicularis*) berkembang di saluran pencernaan dari telur yang tertelan. Cacing betina kemudian dapat muncul ke kulit perianal untuk bertelur, sering di malam hari. Pruritis terjadi dan menggaruk daerah perianal memungkinkan telur ditransfer ke kuku. Infestasi berulang atau menyebarkan ke orang lain dapat terjadi. Pengobatan non-farmakologis melibatkan langkah-langkah kebersihan bertujuan untuk memutus siklus infestasi berulang. Hal ini termasuk mandi atau mandi di pagi hari untuk menghilangkan telur, menggosok kuku, mencuci tangan dengan bersih sebelum memegang makanan, sering mengganti sprei dan mengenakan celana pas di malam hari. Ini adalah metode yang paling diharapkan untuk mengendalikan masalah pada wanita hamil, terutama pada trimester pertama kehamilan. Anggota lain rumah dapat diobati pada saat yang sama dengan pemberian *antihelminthics*.

Langkah-langkah kebersihan sederhana kadang-kadang terbukti tidak efektif dan obat-obatan mungkin diperlukan jika cacing menyebabkan masalah yang signifikan dengan pruritis. Sayangnya data yang berhubungan dengan keamanan dua agen yang umum digunakan, mebendazole dan piperazine relatif jarang. Mebendazol diketahui teratogenik pada tikus dan meskipun diserap dengan buruk oleh saluran pencernaan pada manusia, produsen menyatakan bahwa penggunaannya merupakan kontraindikasi pada kehamilan [59]. Piperazine belum dilaporkan teratogenik pada hewan tetapi secara sistemik diserap dengan kadar yang lebih besar daripada mebendazole. Penggunaan baik mebendazole atau piperazine sebaiknya dihindari, terutama pada trimester pertama. Namun demikian, wanita yang telah mengkonsumsi obat ini secara tidak sengaja dapat diyakinkan bahwa risiko terhadap janin adalah rendah [60].

### **Penggunaan Obat yang Tidak Disengaja Dalam Kehamilan**

Tidak jarang bagi seorang wanita untuk mengkonsumsi obat untuk penyakit ringan dan kemudian menyadari bahwa dia sedang hamil. Hal ini menunjukkan pentingnya pemberian resep yang bijaksana (dan dalam mengkonsumsi obat) untuk semua wanita dengan usia subur. Dalam banyak kasus adalah mungkin untuk memberikan saran berdasarkan informasi dari lembar data dan publikasi seperti BNF [45]. Namun, perlu dicatat bahwa *National Teratology Information Service* di *Newcastle-upon-Tyne, UK*, sering memberikan saran dalam kasus ketidakpastian (lihat Lampiran 4 dari BNF untuk nomor telepon). Mereka memiliki akses ke pengetahuan yang cukup berkaitan dengan hasil kehamilan untuk sejumlah obat-obatan yang

relatif besar dan tidak lanjut jika terpapar obat di mana data saat ini terbatas, dalam rangka untuk memberikan respon yang lebih tepat untuk masa depan. Dengan demikian, dalam kasus-kasus penggunaan obat yang tidak disengaja umumnya petugas kesehatan mendapatkan informasi yang cukup mengenai risiko terhadap janin dan wanita hamil.

### Referensi

1. Seto A, Einarson T, Koren G., **Pregnancy outcome following first trimester exposure to antihistamines—metaanalysis.** *Am J Perinatol* 1997;14: 119-24.
2. Nelson-Piercy C., **Treatment of nausea and vomiting,** *Drug Saf* 1998; 19:155-64.
3. Jewell D, Young G., **Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy.** *The Cochrane Database of Systematic Reviews* 2003;Issue 4:Art No CD000145.
4. Scialli A, van Tonningen RM., **Antiemetics and hyperemesis gravidarum.** In: Schaefer C (ed.), *Drugs During Pregnancy and Lactation.* Amsterdam: Elsevier Science; 2001.
5. Baron TH, Ramirez B, Richter JE., **Gastrointestinal motility disorders during pregnancy.** *Ann Intern Med* 1993;118:366-75.
6. Van Thiel DH, Gavaler JS, Stremple J., **Heartburn of pregnancy,** *Gastroenterology* 1977;72:666-8.
7. Ranchet G, Gangemi O, Petrone M., **Sucralfate in the treatment of gravidic pyrosis,** *G Ital Ostericia Ginecol* 1990;12:1-16.
8. Parker S, Schade RR, Pohl CR, et al., **Prenatal and**

- neonatal exposure of male rat pups to cimetidine but not ranitidine adversely affects subsequent adult sexual functioning, *Gastroenterology* 1984;86:675-80.
9. Garbis H, Elefant E, Diav-Citrin O, et al., Pregnancy outcome after exposure to ranitidine and other H<sub>2</sub> -blockers, A collaborative study of the European Network of Teratology Information Services. *Reprod Toxicol* 2005;19:453-8.
  10. Broussard CN, Richter JE., Treating gastro-oesophageal reflux disease during pregnancy and lactation: what are the safest therapy options? *Drug Saf* 1998;19:325-37.
  11. Lalkin A, Loebstein R, Addis R, et al., The safety of omeprazole during pregnancy: a multicenter prospective controlled study, *Am J Obstet Gynecol* 1998;179:727-30.
  12. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ., **Drugs in Pregnancy and Lactation, 7th edition.** Baltimore: Lippinott, Williams & Wilkins; 2005.
  13. Wyeth Pharmaceuticals. **Summary of product characteristics for Zoton<sup>®</sup>, (lansoprazole),** Available at: <http://www.emc.medicines.org.uk/>. Accessed 22 January 2006.
  14. Hedgley CA, McElhatton PR, Thomas SHL. Outcome of pregnancy following maternal treatment with proton pump inhibitors (PPIs), *Clin Toxicol* 2005;43:431.
  15. Rost van Tonningen M., **Gastrointestinal and antilipidemic agents and spasmolytics.** In: Schaefer C (ed.), *Drugs During Pregnancy and Lactation*, Amsterdam: Elsevier Science; 2001.
  16. Lee A, Schofield S., **Drug use in pregnancy: 2.**

- Common medical problems, *Pharm J* 1994;252:57-60.
17. Siebert JR, Barr M, Jr, Jackson JC, Benjamin DR., Ebsteins anomaly and extracardiac effects. *Am J Dis Child* 1989;143:570-2.
  18. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. *Birth Defects and Drugs in Pregnancy*. Littleton, MA: Publishing Sciences Group; 1977.
  19. Einarson A, Mastroiacovo P, Arnon J, et al., Prospective, controlled, multi-centre study of loperamide in pregnancy. *Can J Gastroenterol* 2000;14: 185-7.
  20. Alonso-Coello P, Guyatt G, Heels-Ansdell D, et al., **Laxatives for the treatment of hemorrhoids.** *The Cochrane Database of Systematic Reviews* 2005;Issue 4:Art No CD004649.
  21. Arroll B, Kenealy T., **Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis.** *The Cochrane Database of Systematic Reviews* 2005;Issue 3:Art No CD000247.
  22. Williams JW, Aguilar C, Cornell J, et al., **Antibiotics for acute maxillary sinusitis.** *The Cochrane Database of Systematic Reviews* 2003;Issue 2:Art No CD000243.
  23. Del Mar CB, Glasziou PP, Spinks AB., **Antibiotics for sore throat.** *The Cochrane Database of Systematic Reviews* 2004;Issue 2:Art No CD000023.
  24. Singh M., **Heated, humidified air for the common cold.** *The Cochrane Database of Systematic Reviews* 2004; Issue 2:Art No CD001728.
  25. Taverner D, Latte J, Draper M., **Nasal decongestants for the common cold.** *The*

*Cochrane Database of Systematic Reviews* 2004; Issue 3:Art No CD001953.

26. Schroeder K, Fahey T., **Over-the-counter medications for acute cough in children and adults in ambulatory settings.** *The Cochrane Database of Systematic Reviews* 2004;Issue 4:Art No CD001831.
27. Werler MM, Mitchell AA, Hernandez-Diaz S, Honein MA., **Use of over-the-counter medications during pregnancy,** *Am J Obstet Gynecol* 2005;193:771-7.
28. Dykes MHM., **Evaluation of an antiasthmatic agent cromolyn sodium (Aarane, Intal).** *JAMA* 1974;227:1061-2.
29. Lee A., **Common problems in pregnancy.** In: Lee A, Inch S, Finnigan D (eds.), *Therapeutics in Pregnancy and Lactation.* Oxford: Radcliffe; 2000.
30. Anonymous. **Any place for depot triamcinolone in hay fever?** *Drug and Ther Bull* 1999;37(3):17-18.
31. Schatz M, Pettiti D., **Antihistamines and pregnancy.** *Ann Allerg Asthma Immunol* 1997;78:157-9.
32. Einarson A, Bailey B, Jung G, et al., **Prospective controlled study of hydroxyzine and cetirizine in pregnancy.** *Ann Allerg Asthma Immunol* 1997;78:183-6.
33. Rost van Tonningen M., **Antiallergy drugs and desensitisation.** In: Schaefer C (ed.), *Drugs During Pregnancy and Lactation.* Amsterdam: Elsevier Science; 2001.
34. European Medicines Agency (EMA)., **Report on Loratadine,** 28th April 2004: CPMP/1333/03. available at:

- <http://www.emea.eu.int/pdf/human/referral/loratadine/> Accessed 22 January 2006.
35. Shaheen SO, Newson RB, Sherriff A, et al. Paracetamol use pregnancy and wheezing in early childhood. *Thorax* 2002;57:958-63.
  36. Shaheen SO, Newson RB, Henderson AJ, et al. Prenatal paracetamol exposure and risk of asthma and elevated IgE in childhood. *Clin Exp Allergy Rev* 2005;35:18-25.
  37. Reprorisk database. In: *Drug index information system (exp. 03/99)*. Denver, CO: Micromedex Inc.; 1999.
  38. Stuart MJ, Gross SJ, Elrad H, Graeber JE. Effects of acetylsalicylic acid ingestion on maternal and neonatal haemostasis. *N Engl J Med* 1982;307:902-12.
  39. Lewis RN, Schulman D. Influence of acetylsalicylic acid, an inhibitor of prostaglandin synthesis on the duration of human gestation and labour. *Lancet* 1973;2:1159-61.
  40. CLASP Collaborative Group. Low dose aspirin in pregnancy and early childhood development: follow-up of the collaborative aspirin study in pregnancy. *Br J Obstet Gynaecol* 1995;102:861-8.
  41. Dawood MY. Nonsteroidal antiinflammatory drugs and reproduction. *Am J Obstet Gynecol* 1993;169:1255-65.
  42. Hickok DE, Hollenbach KA, Reilley SF, Nyberg DA. The association between decreased amniotic fluid volume and treatment with nonsteroidal anti-inflammatory agents for preterm labour. *Am J Obstet Gynecol* 1989;160:1525-31.
  43. Bracken M, Holford TR. Exposure to prescribed drugs in pregnancy and association with

- congenital malformations.** *Obstet Gynecol* 1981;58:336-44.
44. **Saxen I. Epidemiology of cleft lip and palate: an attempt to rule out chance correlations.** *Br J Prev Soc Med* 1975;29:103-10.
  45. **Joint Formulary Committee. British National Formulary, 50th edition.** London: British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; 2005.
  46. **Viegas OA, Khaw B, Ratnam SS. Tramadol in labour pain in primiparous patients. A prospective comparative clinical trial.** *Eur J Obstet Gynecol Re-prod Biol* 1993;49:131-5.
  47. **Uknis A, Silberstein SD. Review article: migraine and pregnancy.**
  48. *Headache* 1991;31:372-4.
  49. **Pfaffenrath V, Rehm M. Migraine in pregnancy. What are the safest treatment options?** *Drug Saf* 1998;19:383-8.
  50. **Reuvers M. Analgesics and antiphlogistics.** In: **Schaefer C (ed.), Drugs During Pregnancy and Lactation.** Amsterdam: Elsevier Science; 2001.
  51. **Novartis. Datasheet for Sanomigran OR (pizotifen).** Available at: <http://www.emc.medicines.org.uk/>. Accessed 31 July 2006.
  52. **Young GL, Jewell D. Topical treatment for vaginal candidiasis (thrush) in pregnancy.** The Cochrane Database of Systematic Reviews 2001; Issue 4: Art No CD000225.
  53. **Pursley TJ, Blomquist IK, Abraham J, Andersen HF, Bartley JA. Fluconazole-induced congenital anomalies in three infants.** *Clin Infect Dis* 1996;22:336-40.

54. Inman WH, Pearce G, Wilton L. **Safety of fluconazole in the treatment of vaginal candidiasis. A prescription-event monitoring study, with special reference to the outcome of pregnancy.** *Eur J Clin Pharmacol* 1994;**46**: 115-8.
55. Mastriacovo P, Mazzone T, Botto LD, et al. **Prospective assessment of pregnancy outcomes after first trimester exposure to fluconazole.** *Am J Obstet Gynecol* 1996;**9**:1645-50.
56. Sorensen HT, Nielsen GL, Olesen C, et al. **Risk of malformations and other outcomes in children exposed to fluconazole in utero.** *Br J Clin Pharmacol* 1999;**48**:234-8.
57. Novartis. **Datasheet for Lamasil OR (terbinafine).** Available at: <http://www.emc.medicines.org.uk/>. Accessed 22 January 2006.
58. Livingstone C. **Lice and scabies.** *Pharm J* 1998;**260**:204-6.
59. Burgess IF, Brown CM, Lee PN. **Treatment of head louse infestation with dimeticone lotion: randomised controlled equivalence trial.** *BMJ* 2005;**330**:1423-5.
60. Janssen-Cilag Ltd. **Datasheet for mebendazole (Vermox) tablets.** Available at: <http://www.emc.medicines.org.uk/>. Accessed 22 January 2006.
61. Leach F. **Management of threadworm infestation during pregnancy.** *Arch Dis Child* 1990;**65**:

## **BAB 3**

### **ANTIBIOTIK PADA KEHAMILAN**

Tim Weller, Conor Jamieson

#### **Poin-poin penting**

- Terdapat sedikit bukti tentang keamanan sebagian besar terapi antimikroba dalam kehamilan.
- Pengalaman klinis menunjukkan keamanan penisilin dan sefalosporin.
- Infeksi serius pada kehamilan harus ditangani secara agresif.

#### **Pendahuluan**

Penggunaan agen antimikroba selama kehamilan seringkali perlu dipertimbangkan dikarenakan wanita hamil berada pada risiko yang sama tertular penyakit menular seperti orang lain. Mereka memang mungkin lebih rentan terhadap infeksi tertentu seperti infeksi saluran kemih. Dalam beberapa kasus seperti bakteriuria asimtomatik, terapi utamanya diperlukan untuk mencegah kematian janin [1], bukan untuk pengobatan ibu. Terlepas dari siapa yang menjadi penerima manfaat utama, penting untuk mengetahui komponen mana yang dapat digunakan dengan risiko minimal pada infeksi ringan dan mengapresiasi keseimbangan risiko untuk kasus yang lebih serius.

Ketika risiko pada janin sedang dinilai, beberapa hal harus dipertimbangkan. Dengan banyaknya obat antimikroba kita sekarang memiliki lebih dari 40 tahun pengalaman terbebas dari kelainan bawaan. Hasil studi yang dilakukan pada hewan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Sulfonamid misalnya, dapat menyebabkan malformasi besar pada janin ketika diberikan dalam dosis tinggi pada

tikus [2], tapi teratogenitas belum tercatat pada manusia meskipun digunakan selama lebih dari 50 tahun. Salah satu alasan mengapa hewan laboratorium merupakan model yang buruk untuk mempelajari kerusakan janin terhadap antibiotik dikarenakan efek terhadap flora normal gastrointestinal mereka dan berakibat pada metabolisme hewan.

Namun demikian, terdapat beberapa obat-obatan dengan toksisitas yang terbukti pada manusia yang pasti harus dihindari. Streptomisin misalnya, telah menyebabkan ototoksitas neonatal setelah pengobatan jangka panjang TB [3,4]. Implikasinya, golongan aminoglikosida lain seperti gentamisin, tobramisin, netilmisin, dan amikasin harus dihindari untuk infeksi ringan meskipun tidak ada bukti kuat bahwa mereka menyebabkan masalah yang sama.

Perubahan dinamika aliran darah dan efek fisiologis lainnya pada kehamilan dapat mempengaruhi farmakokinetik banyak obat. Philipson menunjukkan bahwa konsentrasi ampisilin serum pada wanita yang hamil usia 9-36 minggu setengah kadarnya dengan yang ditemukan pada wanita yang sama ketika mereka tidak hamil [5]. Konsentrasi pada ibu yang rendah telah digambarkan setelah mengkonsumsi banyak agen antimikroba meskipun implikasi terapeutik ini sulit untuk dinilai.

Kegagalan pengobatan antibiotik dapat disalahkan pada pilihan antibiotik yang salah dan obat mungkin diganti dengan agen potensi yang lebih beracun. Hal ini bisa sangat berbahaya ketika kepedulian terhadap janin mencegah dokter memberikan dosis tinggi saat mengobati infeksi serius pada ibu. Secara umum, dosis dewasa penuh harus digunakan ketika merawat infeksi pada wanita hamil. Demikian pula, panjang terapi harus ditentukan oleh penyakit dan tidak terlalu dipengaruhi oleh fakta bahwa

pasien hamil. Pengobatan yang tidak memadai, yang dapat diikuti oleh pengobatan lebih lanjut antibiotik, kemungkinan akan menempatkan ibu dan janin berisiko lebih besar menjalani masa pengobatan penuh dengan obat yang sesuai.

### **Agen Antimikroba**

Tabel 3.1 memperlihatkan daftar sebagian besar agen antimikroba yang tersedia di Inggris bersama-sama dengan efek toksik yang mungkin terjadi terhadap janin selama kehamilan. Masing-masing diberi peringkat keamanan:

- **'Aman'**- studi terkontrol pada wanita gagal untuk menunjukkan risiko bagi janin pada trimester pertama atau trimester selanjutnya. Obat pilihan pertama jika agen antimikroba harus digunakan.
- **'Perhatian'** - Belum ada studi terkontrol pada wanita hamil dan studi pada hewan belum menunjukkan risiko bagi janin, atau hewan penelitian telah menunjukkan efek buruk yang belum dikonfirmasi dalam studi terkontrol pada wanita di trimester pertama atau selanjutnya. Agen ini hanya boleh diberikan jika potensi manfaat melampaui risiko.
- **'Hindari'** - menunjukkan bahwa agen membawa bukti risiko janin manusia. Ini hanya boleh digunakan pada infeksi yang mengancam jiwa di mana tidak ada obat lain yang cocok.

Table 3.1 Agen antimikroba dan Efek Samping yang mungkin ditimbulkan

Agent	Use	Adverse effects on fetus		Comments
		First trimester	Second and third trimester	
Penicillins Phenoxymethylpenicillin, penicillin G and long-acting penicillins	Probably safe		Allergy; possibility of sensitising the fetus	No adverse effects recorded during decades of use
Ampicillin and amoxicillin	Probably safe		Allergy; possibility of sensitising the fetus	No adverse effects recorded during decades of use
Ampicillin pro-drugs (talampicillin, pivampicillin, becampicillin)	Probably safe		Allergy; possibility of sensitising the fetus	Limited data; no adverse effects recorded
Co-amoxiclav	Probably safe		Allergy; possibility of sensitising the fetus	Limited data; no adverse effects recorded
Ticarcillin, piperacillin/tazobactam and other antipseudomonal penicillins	Probably safe		Allergy; possibility of sensitising the fetus	No adverse effects recorded during decades of use
Flucloxacillin and other antistaphylococcal penicillins	Probably safe		Allergy; possibility of sensitising the fetus	No adverse effects recorded during decades of use

**Tabel. 3.2 Infeksi Pada Kehamilan dengan rekomendasi pengobatan**

Condition	First-choice treatment	Second-choice treatment	Comments
Asymptomatic bacteriuria or simple cystitis	Nitrofurantion (except at term), co-amoxiclav or cefalexin by mouth	Ampicillin or amoxicillin, pivmecillinam	Seven days for asymptomatic bacteriuria, 3 days for cystitis
Acute pyelonephritis	Cefuroxime or co-amoxiclav intravenously		Treat for 7-10 days but may switch to oral when afebrile for 24 h
Pharyngitis	Phenoxymethylpenicillin by mouth or benzylpenicillin intravenously	Erythromycin	Antibiotics usually unnecessary as 70-80% caused by viruses
Sinusitis	Amoxicillin or co-amoxiclav		Antibiotics often unnecessary
Chest infection (mild)	Amoxicillin (+ erythromycin if atypicals suspected) by mouth	Erythromycin	As per British Thoracic Society recommendations [6]
Chest infection (severe)	Cefuroxime (+ erythromycin if atypicals suspected) intravenously		As per British Thoracic Society recommendations [6]
Tuberculosis	Rifampicin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol	Seek expert advice as many agents may be teratogenic	As per British Thoracic Society recommendations [7]
Skin/soft tissue/wound infection	Flucloxacillin	Clindamycin	

Bacterial vaginosis	Metronidazole by mouth	Metronidazole or clindamycin intravaginal gel/cream or clindamycin by mouth	
Gonorrhoea	Ceftriaxone intramuscularly or cefixime by mouth	Intramuscular spectinomycin	
Syphilis	Intramuscular procaine penicillin G	Seek expert advice	
Chlamydia trachomatis	Erythromycin	Amoxicillin	
Pelvic inflammatory disease	Intramuscular ceftriaxone + intravenous/oral erythromycin ± oral metronidazole if severe disease		
Listeriosis	Amoxicillin or ampicillin	Add intravenous gentamicin if severe disease	
Endocarditis Streptococcal	Benzylpenicillin + gentamicin		For full details see British Society for Antimicrobial Chemotherapy guidelines [8]
Staphylococcal	Flucloxacillin + gentamicin		
Meningitis	Benzylpenicillin	Cefotaxime or ceftriaxone	
Serious undiagnosed sepsis	Cefuroxime/cefotaxime ± gentamicin ± metronidazole		

## Pengobatan dan pencegahan infeksi tertentu

Tabel 3.2 memperlihatkan daftar beberapa infeksi umum yang dihadapi dalam kehamilan. Agen infeksi direkomendasikan adalah untuk terapi empiris yang didasarkan pada patogen yang paling mungkin menyebabkan setiap infeksi. Sangat penting untuk mengambil kultur dari pasien hamil sebelum pengobatan sehingga perubahan yang aman dan berkhasiat dapat dilakukan jika pasien tidak berrespon atau jika organisme penyebab membuktikan resistensi terhadap terapi awal.

Pilihan pertama pengobatan biasanya dengan agen yang terdaftar sebagai 'aman' dalam Tabel 3.1, meskipun tidak selamanya demikian. Pilihan kedua dapat digunakan jika pasien alergi terhadap senyawa pertama atau bakteri penyebab infeksi resisten terhadapnya. Dimana salah satu antibiotik secara signifikan lebih baik daripada semua terapi lain, hal ini mungkin dianjurkan meskipun perlu untuk hati-hati ketika meresepkan pada masa kehamilan. Beberapa kondisi cukup sering tidak terlihat dalam kehamilan untuk setiap agen yang cocok dianggap aman. Dalam kasus seperti masalah yang disorot dalam tabel, saran spesialis harus dicari dari seorang ahli di lapangan sebelum memulai pengobatan. Dengan demikian, jika infeksi perlu diobati maka harus mengobatinya dengan baik dan dosis yang dipilih harus sesuai dengan yang normal digunakan untuk kondisi tersebut.

Pencegahan infeksi pada kehamilan melindungi baik ibu dan anak. Profilaksis harus diberikan setiap kali risiko penyakit melampaui risiko terkait agen yang digunakan untuk mencegahnya. Rezim profilaksis direkomendasikan pada kehamilan secara rinci dalam Tabel 3.3. Dalam kebanyakan kasus tidak berbeda dari yang digunakan untuk pasien yang tidak hamil.

**Tabel 3.3 Antimikroba profilaksis dalam kehamilan**

<b>Kondisi</b>	<b>Profilaksis pilihan pertama</b>	<b>Profilaksis pilihan kedua</b>	<b>Keterangan</b>
Endokarditis	Amoxicillin	Clindamycin	Sesuai dengan pedoman Kemoterapi Antimikroba Komunitas Inggris
Profilaksis tindakan Bedah Meningitis meningokokkal	Rifampicin	Ceftriaxone secara intramusular	
Tindakan Bedah setril	Tidak ada profilaksis		Berdasarkan Skotlandia
Tindakan Bedah-steril yang terkontaminasi	Cefuroxime - dosis tunggal		Reomendasi Pedoman Jaringan Interkolega [9]
Tindakan bedah Terontaminasi	Cefuroxime dan metronidazole - satu hingga tiga dosis		
Tuberkulosis	Isoniazid		Berikan suplemen Pyridoxine dengan isoniazid

### Infeksi saluran kemih

Alasan paling umum bagi wanita hamil untuk minum antibiotik adalah untuk mengobati sistitis akut atau bakteriuria asimtomatik. Kondisi kedua ini terkait dengan insiden signifikan pielonefritis dan kemungkinan persalinan prematur dan bayi berat badan lahir rendah, menjadikan pengobatan penting diberikan [1]. Disarankan pemberian antibiotik selama 7 hari jika bakteriuria adalah tersembunyi/samar, tetapi infeksi simtomatik adalah memberi respon lebih singkat, 3 hari [10]. Antibiotik pilihan pertama yakni nitrofurantoin (kecuali selama persalinan) atau sefalosporin generasi pertama, seperti cefalexin. Amoksisilin adalah alternatif jika organisme penyebab infeksi rentan, namun tingkat resistensi sekitar 50% pada *Escherichia coli* dari infeksi saluran kemih yang diperoleh-dari-komunitas [11]. Pivmecillinam juga terbukti memiliki kemanjuran dan keamanan, dan tingkat resistensi yang sangat rendah. Para produsen co-amoxiclav tetap menyarankan untuk berhati-hati, tapi itu tampaknya menjadi alternatif yang aman. Meskipun trimetoprim secara teoritis teratogenik selama trimester pertama, penggunaan jangka pendek nampaknya tidak menyebabkan masalah.

Terdapat saat-saat ketika *Pseudomonas aeruginosa* atau isolat resisten lainnya, tidak sensitif terhadap semua obat oral yang direkomendasikan di atas pada hasil kultur. Dalam kasus ini, penting untuk menetapkan organisme yang benar-benar menyebabkan infeksi dengan mengulang kultur urin sebelum pengobatan dilakukan. Pasien mungkin harus mendapatkan antibiotik yang berpotensi berbahaya, seperti gentamisin intramuskular, atau dirawat di rumah sakit untuk pemberian obat intravena aman, seperti ceftazidime.

## Infeksi Saluran Pernafasan Bawah

Patogen bakteri yang paling umum pada saluran pernapasan bagian bawah, *Streptococcus pneumoniae*, biasanya sensitif terhadap penisilin, amoksisilin, dan ampisilin. Agen ini harus menjadi pilihan pertama untuk terapi empiris infeksi ringan yang diperoleh dari masyarakat. Agen lain, seperti co-amoxiclav dapat diindikasikan jika kultur mengungkapkan *Haemophilus influenzae* atau jika pasien gagal memberikan respon.

Pasien dirawat di rumah sakit dengan infeksi paru yang parah dapat diobati dengan cefuroxime atau cefotaxime sesuai dengan pedoman *British Thoracic Society* [6].

Eritromisin memiliki dua indikasi pada infeksi saluran pernapasan bawah yang diperoleh dari-komunitas:

- Untuk mengobati pneumonia 'atipikal' yang disebabkan oleh bakteri seperti *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae* dan *Legionella pneumophila*.
- Untuk Pengobatan oral pada pasien yang alergi terhadap penisilin.

Dalam kedua kasus, makrolida baru azitromisin dan klaritromisin efektif tetapi mereka tidak memiliki catatan keamanan yang terbukti jelas pada kehamilan.

## Tuberkulosis

Meskipun kemungkinan teratogenesis diduga baik pada penggunaan rifampisin dan ethambutol, namun mereka telah ditemukan aman dalam praktek klinis. *The Joint Tuberculosis Committee* dari *British Thoracic Society* merekomendasikan bahwa pengobatan tuberkulosis pada wanita hamil seharusnya tidak berbeda dengan yang biasanya diberikan [7]. Dari agen lini kedua, streptomisin mutlak dikontraindikasikan pada kehamilan karena terjadinya ototoksisitas pada janin [3,4]. Etionamid dan

prothionamide hanya boleh digunakan jika tidak ada senyawa lain yang tersedia karena mereka mungkin teratogenik.

### **Infeksi pada Saluran Kelamin**

*The British Association* untuk Kesehatan Seksual dan HIV menghasilkan pedoman berbasis bukti untuk pengelolaan penyakit menular seksual (<http://www.bashh.org/guidelines/ceguidelines.asp>).

Berikut ini didasarkan pada pedoman tersebut. Terdapat bukti yang bertentangan mengenai hubungan antara vaginosis bakteri dengan kelahiran prematur. Disarankan bahwa wanita hamil dengan gejala harus diobati dengan seperti biasa dengan menggunakan metronidazol. Antibiotik ini memiliki beberapa risiko teoritis tetapi telah ditemukan aman dalam praktek klinis. Wanita tanpa gejala sebaiknya tidak disrining atau diobati.

Gonore dalam kehamilan dapat diobati dengan menggunakan dosis tunggal ceftriaxone 250 mg intramuskular atau cefixime 400 mg per oral. Jika organisme resisten atau pasien alergi terhadap sefalosporin, maka spectinomycin 2 g intramuskular dianjurkan.

Semua wanita hamil harus diskrining untuk sifilis. Pengobatan harus dilakukan jika infeksi awal terdeteksi, karena bila tidak, infeksi janin hampir tak terelakkan. Pemberian Obat pada kehamilan dengan penisilin prokain G 750 mg intramuskular selama 10 hari tidak berbeda dari rejimen standar. Terapi untuk pasien alergi penisilin dapat menjadi sulit karena agen lain seperti eritromisin yang tidak andal mengobati anak yang belum lahir [12]. Dalam kasus seperti ini saran ahli diperlukan seperti desensitisasi penisilin pada pasien mungkin menjadi pilihan terbaik.

Infeksi *C. trachomatis* selama kehamilan harus diobati dengan eritromisin oral, sedGambarn doxycycline dan

ofloksasin merupakan kontraindikasi. Pasien yang tidak dapat mentoleransi pemberian 500 mg empat kali sehari selama 7 hari dapat diberikan 500 mg dua kali sehari selama 2 minggu. Alternatif adalah amoksisilin, yang menginduksi latensi in vitro dan mungkin tidak dapat diandalkan atau azitromisin yang belum sepenuhnya dievaluasi dalam kehamilan. Sebuah tes penyembuhan harus dilakukan 3 minggu setelah akhir terapi.

Penyakit radang panggul (PID) tidak jarang pada kehamilan dan berhubungan dengan peningkatan morbiditas baik ibu dan janin. Pengobatan sulit karena tidak ada rejimen berbasis bukti direkomendasikan untuk keamanan dalam kehamilan. Kombinasi yang dipilih harus didasarkan pada pola sensitivitas lokal dan mungkin termasuk pemberian ceftriaxone intramuskular atau intravena ditambah eritromisin oral, atau intravena, dan metronidazol per-oral pada penyakit yang berat secara klinis.

### **Listeriosis**

Infeksi *Listeria monocytogenes* selama kehamilan biasanya terjadi pada trimester ketiga. Bayi lahir mati terjadi kemudian pada 22% kasus yang tidak diobati dan aborsi spontan, persalinan prematur, atau infeksi neonatal juga dapat terjadi [13]. Ampisilin intravena atau amoxicillin terbukti efektif bagi ibu dan dapat mencegah kerusakan janin. Pada infeksi maternal yang parah, mungkin juga diperlukan untuk memberikan gentamisin.

### **Kolonisasi streptokokus Grup B**

Streptokokus Grup B merupakan penghuni normal saluran kelamin wanita dan dapat menyebabkan meningitis neonatal dan bakteremia. Meskipun organisme ini sering dapat dideteksi selama kehamilan, pengobatan ibu sebelum

persalinan tidak efektif dan tidak perlu. Namun, pemberian selektif benzilpenisilin untuk pasien berisiko tinggi telah terbukti mengurangi kejadian infeksi neonatal [14]. Profilaksis intrapartum harus dipertimbangkan jika streptokokus Grup B kebetulan terdeteksi pada minggu-minggu akhir kehamilan atau jika bayi sebelumnya telah memiliki penyakit infeksi neonatal oleh streptokokus B [15]. Pengobatan disarankan dengan benzilpenisilin 2,4 g tiap 6 jam sampai melahirkan. Klindamisin intravena 900 mg setiap 8-jam dapat digunakan untuk wanita dengan alergi penisilin.

### **Sepsis Berat**

Sangat jarang menjumpai pasien hamil yang terdiagnosis sepsis serius. Ketika situasi seperti ini terjadi, risiko ibu lebih penting dari risiko janin. Oleh karena itu, antibiotik yang paling tepat untuk kondisi pasien harus diberikan dalam dosis penuh. Setelah patogen dan resistensi antimikroba telah diidentifikasi, pengobatan dapat diarahkan pada organisme tersebut. Pilihan yang cocok untuk terapi empiris yakni dengan sefalosporin generasi kedua atau ketiga (cefuroxime atau cefotaxime) dengan penambahan gentamisin dan/atau metronidazole jika hal ini dibenarkan oleh kondisi klinis pasien. Jika aminoglikosida diperlukan pemantauan yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan obat yang cukup dan baik ibu maupun janin tidak terkena dosis yang sangat tinggi.

### **HIV**

Tujuan dari pengobatan infeksi HIV pada kehamilan adalah mengurangi risiko toksisitas pada janin untuk meminimalkan *viral load* dan perkembangan penyakit pada ibu dan untuk mencegah penularan infeksi ke neonatus. Profilaksis saat ini direkomendasikan untuk semua wanita

hamil yang terinfeksi HIV untuk mencegah penularan vertikal [16]. Telah terbukti bahwa tingkat penularan HIV dari ibu ke anak secara signifikan berkurang jika AZT digunakan selama kehamilan [17,18]. Namun, terapi kombinasi dengan beberapa agen baru memaksimalkan pencegahan penularan serta memberikan pengobatan yang optimal bagi ibu. Umumnya direkomendasikan bahwa perempuan yang sedang menerima terapi infeksi HIV harus tetap mendapatkan obat yang sama selama kehamilan [19]. Saran spesialis harus dicari untuk pengelolaan pasien tersebut.

### **Toksoplasmosis**

Diagnosis toksoplasmosis akut dapat ditegakkan pada ibu dengan deteksi IgM spesifik atau peningkatan IgG maternal. Infeksi janin hanya dapat dikonfirmasi oleh isolasi parasit dari darah janin. Penularan ke janin relatif jarang pada trimester pertama, tetapi ketika kasus terjadi, penyakit berlangsung parah. Dalam trimester ketiga, infeksi maternal hampir selalu menular ke janin, tetapi sebagian besar bayi tidak memiliki penyakit yang jelas saat lahir.

Manajemen toksoplasmosis pada kehamilan memerlukan pengetahuan khusus, dan hubungan dengan seorang ahli disarankan. Infeksi maternal dapat diobati dengan menggunakan klindamisin 300 mg tiap 6 jam per-oral selama 3-4 minggu. Jika IgM positif, perlindungan janin dapat menggunakan spiramisin 1 g tiap 8 jam per-oral selama kehamilan.

### **Profilaksis tindakan bedah**

Meskipun operasi elektif dihindari pada kehamilan, operasi darurat mungkin diperlukan. Seperti pada pasien tidak hamil, pemberian agen janga watu pendek dengan tepat diindikasikan. Jika terdapat bukti sepsis intra-

abdominal, sefalosporin parenteral seperti cefuroxime ditambah metronidazol harus diberikan. Alternatif termasuk co-amoxiclav atau klindamisin. Jumlah dosis 1-3, tergantung pada tingkat kontaminasi yang diharapkan (lihat Tabel 3.3). Jika terbukti terdapat infeksi pada operasi, pengobatan 3-5 hari diperlukan.

Risiko infeksi setelah operasi darurat caesar adalah hal yang substansial dan jelas dibutuhkan antibiotik profilaksis. Terdapat risiko yang lebih kecil setelah prosedur elektif, tetapi sebagian besar praktisi masih memberikan antibiotik perioperatif. Satu dosis cefuroximen dengan atau tanpa metronidazole seharusnya cukup, asalkan diberikan cukup dini untuk hadir dalam jaringan ketika sayatan dibuat. Oleh karena itu, harus diberikan sebelum atau selama induksi anestesi. Tidak ada keuntungan, bahkan terdapat kerugian yang signifikan, dalam menunda profilaksis hingga setelah tali pusat telah dijepit.

### **Vaksinasi**

Sebagai aturan umum, imunisasi selama kehamilan harus dihindari jika mungkin, meskipun kebanyakan vaksin mungkin aman untuk memberikan. Perhatian khusus disarankan dalam kaitannya dengan vaksin hidup [20]. Imunisasi terhadap rubella kontraindikasi diberikan selama kehamilan dan konsepsi harus dihindari pada bulan setelah pemberian vaksin. Demikian pula vaksin polio tidak sebaiknya diberikan dalam 4 bulan pertama kehamilan. Dalam keadaan ketika terdapat risiko signifikan penyakit, adanya paparan hepatitis B darah yang positif atau perjalanan ke daerah yang endemik demam kuning misalnya, maka manfaat yang diperoleh dengan imunisasi ibu mungkin lebih besar daripada risiko pada janin.

## Referensi

1. Condie AP, Brumfitt W, Reeves DS, Williams JD. **The effects of bacteriuria in pregnancy on foetal health.** In: Brumfitt W, Asscher AW (eds.), *Urinary Tract Infection*. London: Oxford University Press; 1973.
2. Kato T, Kitagawa S. **Production of congenital abnormalities in the fetuses of rats and mice with various sulphonamides.** *Congenit Abnormal* 1973;13:7-15.
3. Assael BM, Parini R, Rusconi F. **Ototoxicity of aminoglycoside antibiotics in infants and children.** *Pediatr Infect Dis* 1982;1:357-67.
4. Conway N, Birt BD. **Streptomycin in pregnancy: effect on the foetal ear.** *BMJ* 1966;ii:260-3.
5. Philipson A. **Pharmacokinetics of antibiotics in pregnancy and labour.** *Clin Pharmacokinet* 1979;4:297-309.
6. The British Thoracic Society. **Guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults.** *Thorax* 2001;56(Suppl IV): iv1-64.
7. The Joint Tuberculosis Committee of the British Thoracic Society. **Chemotherapy and management of tuberculosis in the United Kingdom: recommendations 1998.** *Thorax* 1998;53(7):536-48.
8. Elliott TSJ, Foweraker J, Gould FK, et al. **Guidelines for the antibiotic treatment of endocarditis in adults: report of the Working Party of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy.** *J Antimicrob Chemother* 2004;54:971-81.
9. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. **Antibiotic prophylaxis in surgery.** SIGN Publication No. 45, Edinburgh, July 2000.
10. Bint AJ, Hill D. **Bacteriuria in pregnancy an update on significance, diagnosis and management.** *J Antimicrob Chemother* 1994;33(Suppl A):93-7.
11. Farrell DJ, Morrissey I, De Reubis D, Robbins M,

- Felmingham D. A UK multicentre study of the antimicrobial sensitivity of bacterial pathogens causing urinary tract infection. *J Infect* 2003;46:96-100.
12. Hashisaki P, Wertzberger GG, Conrand GL, Nichols CR. Erythromycin failure in the treatment of syphilis in pregnant women. *Sex Transm Dis* 1983;10:36-8.
  13. Kalstone C. Successful antepartum treatment of listeriosis. *Am J Obstet Gynecol* 1991;164:57-8.
  14. Omenaca Teres F, Mattoras R, Garcia Perea A, Elorza MD. Prevention of neonatal group B streptococcal sepsis. *Pediatr Infect Dis J* 1987;6:874.
  15. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Prevention of Early Onset Neonatal Group B Streptococcal Disease. Guideline Number 36. Available at: [www.rcog.org.uk](http://www.rcog.org.uk). Accessed November 2003.
  16. Minkoff H, Augenbraun M. Antiretroviral therapy for pregnant women. *Am J Obstet Gynecol* 1997;176:478-89.
  17. Connor EM, Sperling RS, Gelber R, et al. Reduction of maternal-infant transmission of human immunodeficiency virus type 1 with zidovudine treatment. *NEJM* 1994;331:1173-80.
  18. Lallemand M, Jourdain G, Le Coeur S, et al. A trial of shortened zidovudine regimens to prevent mother-to-child transmission of human immunodeficiency virus type I. *NEJM* 2000;343:982-91.
  19. British HIV Association. Guidelines for the management of HIV infection in pregnant women and the prevention of mother-to-child transmission of HIV. Available at: [www.bhiva.org](http://www.bhiva.org). Accessed 31 March 2005.
  20. Salisbury DM, Begg NT (eds.). **Immunisation Against Infectious Disease**. London: HMSO; 1996.

## BAB 4

### ANTIKOAGULAN PADA KEHAMILAN

Bethan Myers

#### Pendahuluan

Antikoagulan digunakan dengan meningkatnya jumlah situasi klinis pada kehamilan. Hal ini termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit tromboemboli vena, profilaksis terhadap pre-eclampsia, pertumbuhan janin intrauterin terhambat, pengelolaan sindrom antifosfolipid (APS), dan thromboprophylaxis pada pasien dengan penyakit katup atau katup prostetik mekanik. Tromboemboli vena (VTE) senantiasa menjadi penyebab langsung utama kematian ibu di Inggris [1] dan VTE pada kehamilan merupakan penyebab penting morbiditas, tidak hanya selama atau segera setelah kehamilan, tetapi juga dalam jangka panjang [2]. Kehamilan dan masa nifas adalah saat berisiko utama untuk VTE, karena kedua perubahan fisiologis dalam faktor-faktor koagulasi menyebabkan keadaan *hypercoagulable* [3,4] dan stasis vena [5,6]. Semua wanita harus menjalani penilaian faktor risiko VTE pada awal kehamilan.

Saat ini telah banyak pengalaman dalam penggunaan heparin berat molekul rendah (LMWH) yang nampaknya aman dan efektif untuk profilaksis VTE dan pengobatan dalam kehamilan. Sebuah pemahaman yang jelas tentang penggunaan yang tepat antikoagulan sangat penting untuk mengoptimalkan manajemen, mengurangi morbiditas dan mortalitas akut dan juga untuk menghindari komplikasi jangka panjang sindrom pasca-trombotik. Bab ini membahas penggunaan LMWH dan antikoagulan lain dalam situasi di atas dalam kehamilan.

### **Poin-poin penting**

Indikasi untuk antikoagulan pada kehamilan

- Thromboprophylaxis dan pengobatan VTE vena.
- Manajemen APS.
- Profilaksis terhadap pre-eclampsia dan hambatan pertumbuhan janin intrauterin.
- Profilaksis pada pasien dengan penyakit katup atau katup buatan mekanik.

### **Heparin**

Heparin tak terpecah (UFH) adalah mukopolisakarida alami dengan berbagai panjang rantai (5000 hingga > 40.000 Da). Namun, efek antikoagulan dari UFH sulit untuk diprediksi. Setelah dosis standar UFH, parameter koagulasi harus dipantau sangat ketat untuk mencegah kelebihan atau kekurangan antikoagulasi akibat variabel farmakokinetik. UFH menghasilkan kadar plasma bervariasi tergantung pada tingkat ikatan protein dalam plasma dan pada epitel [7,8]. Pemantauan ketat, biasanya dengan waktu tromboplastin parsial teraktivasi (aPTT), dan penyesuaian dosis diperlukan. Pada kehamilan, respon aPTT untuk heparin dapat dilemahkan karena kenaikan beberapa faktor pembekuan (FVIII, fibrinogen) dan protein yang mengikat heparin, sehingga membatasi kebenaran tes [9]. Ini berarti bahwa aPTT mungkin tidak benar-benar mencerminkan status antikoagulan yang mendasarinya.





Efek samping yang dikenali mencakup risiko 2% dari patah tulang vertebra sebagai gejala sekunder osteoporosis tercatat dengan penggunaan yang berkepanjangan, alergi dan trombositopenia yang terinduksi oleh heparin (HIT) [10]. HIT merupakan reaksi yang dimediasi antibodi dengan trombositopenia biasanya berkembang 5-10 hari setelah mulai pengobatan, yang disebabkan oleh antibodi terhadap kompleks heparin-platelet. Terdapat risiko paradoks pembentukan trombus yang berpotensi mengancam nyawa, dan paparan lebih lanjut untuk semua jenis heparin merupakan kontraindikasi. Bagaimanapun ini merupakan komplikasi yang jarang pada kehamilan.

LMWH hanya terdiri dari rantai pendek polisakarida. Mereka didefinisikan sebagai garam heparin yang memiliki berat molekul rata-rata kurang dari 8000 Da. Molekul ini diperoleh dengan berbagai metode fraksinasi atau depolymerisasi polimer heparin. Ada beberapa LMWH yang tersedia di Inggris, termasuk enoxaparin, dalteparin, dan Tinzaparin yang tampaknya memiliki efek serupa meskipun secara klinis tidak identik. LMWH memiliki farmakokinetik yang dapat diandalkan dan waktu paruh yang panjang, sehingga tidak membutuhkan frekuensi suntikan yang sering [11]. Saat ini sudah terdapat pertimbangan yang diterbitkan cukup besar dalam penggunaan LMWH dalam kehamilan untuk thromboprophylaxis dan pengobatan VTE. Hanya lima laporan fraktur osteoporosis dalam literatur [12,13] dan tidak ada kasus HIT yang terjadi pada kehamilan. Greer dan Nelson-Piercy [14] melakukan peninjauan secara sistematis dari semua studi yang diterbitkan sampai dengan akhir 2003. Mereka memasukkan 64 studi yang melaporkan 2.777 kehamilan. Hasilnya menunjukkan keamanan dan efektivitas LMWH, tanpa kematian maternal. VTE terjadi pada 0.86% (95% *confidence interval* (CI), 0,55-1,28%) dan trombosis arteri yang

berhubungan dengan sindrom antifosfolipid pada 0,5% (CI, 0,28-0,84%) dari kehamilan. Perdarahan yang signifikan terjadi pada 1,98% (95% CI, 1,34-2,57%) umumnya terkait dengan penyebab obstetrik utama reaksi alergi kulit pada 1,8% (95% CI, 1,34-2,37%), trombositopenia terkait dengan heparin pada 0,11% (95% CI, 0,02-0,2%), fraktur osteoporosis pada 0,04% (95% CI, <0,01- 0,2% dan tidak ada kasus HIT.

Baik UFH maupun LMWH melewati plasenta dan tidak ada bukti teratogenesis atau risiko perdarahan janin. Zat ini tidak diekskresikan dalam ASI dan dapat digunakan dengan aman selama menyusui.

### Poin-poin penting

#### Karakteristik heparin

- UFH membutuhkan pemantauan berkala dengan aPTT.
- LMWH yang diserap dengan baik dan memiliki waktu paruh yang panjang.
- UFH memiliki risiko alergi, HIT dan osteoporosis; LMWH memiliki risiko yang jauh lebih rendah.
- Baik UFH maupun LMWH melewati plasenta; aman untuk menyusui.

### Obat lain

Warfarin dan *coumarin* lain menghambat aktivasi faktor pembekuan *dependent-vitamin-K*. Mereka melintasi plasenta dan keduanya bersifat teratogenik dan dikaitkan dengan risiko perdarahan janin [15,16]. Embriopati terdiri dari hipoplasia hidung, bintik kalsifikasi *chondral*, dan *scoliosis* dan terjadi terutama antara usai 6 dan 12 minggu kehamilan [17]. Risiko tergantung dosis, dimana dosis lebih besar dari 5 mg/hari telah dikaitkan dengan peningkatan risiko [18]. Selain itu terdapat hubungan risiko disfungsi neurologis

minor atau IQ rendah [19]. Karena peningkatan risiko perdarahan baik pada janin dan ibu saat *coumarin* digunakan dalam masa kehamilan, *coumarin* dihentikan penggunaannya sebelum persalinan untuk mengurangi risiko perdarahan.

*Danaparoid Sodium* (Organon) adalah LMWH yang terdiri dari glikosaminoglikan. Terdapat risiko klinis *crossreactivity* yang sangat kecil dengan heparin dan oleh karena itu pada pasien yang memiliki reaksi alergi pada kulit atau HIT, agen ini dapat digunakan sebagai alternatif. Agen ini tidak melintasi plasenta dan tidak disekresi ke dalam ASI. Terdapat laporan anekdotal dari penggunaannya dalam kehamilan [20,21].

Fondaparinux (arixtra) adalah agen antitrombotik baru, yang merupakan *pentasaccharide* sintetis. Agen ini telah ditetapkan sebagai obat kategori B pada kehamilan dari studi hewan. Namun, masih sangat sedikit data pada kehamilan manusia. Terdapat beberapa laporan kasus anekdotal [22] dan Serangkaian kecil dari lima kasus [23]. Terdapat bukti bahwa obat ini melintasi plasenta [23] dan studi hewan menunjukkan bahwa agen ini disekresi dalam ASI [24]. Oleh karena itu, saat ini, itu hanya disarankan penggunaannya di mana antikoagulan alternatif tidak cocok.

*Lepirudin* adalah inhibitor langsung trombin sintetis. Kegunaan utamanya adalah dalam pengaturan HIT. Agen ini diketahui melewati plasenta, dan hanya terdapat beberapa laporan kasus dari penggunaannya dalam kehamilan di trimester pertengahan dan ketiga [25,26].

Agen trombolitik melisis gumpalan dengan mengaktifkan plasminogen, yang pada gilirannya memicu fibrinolisis. Penggunaan agen ini terbatas pada trombosis yang mengancam jiwa. Perdarahan adalah komplikasi utama.

Aspirin adalah agen anti-platelet dibandingkan sebagai antikoagulan. Tidak dianjurkan untuk thromboprophylaxis vena [27]. Agen ini terbukti aman pada kehamilan dengan dosis rendah [28] dan memiliki manfaat pada wanita dengan APS dengan keguguran berulang [29] dan juga dalam kasus Gambar sindrom myeloproliferative dimana terdapat kelebihan produksi trombosit dan/atau sel darah merah.

### Poin-poin penting

Agen antikoagulan lain:

- *Coumarins* menembus plasenta, bersifat teratogenik dan dapat menyebabkan perdarahan janin.
- Danaparoid natrium dapat digunakan untuk pasien yang memiliki HIT.
- Fondaparinux adalah agen sintetis baru, masih sedikit pengalaman penggunaannya dalam kehamilan.
- Lepirudin adalah inhibitor trombin langsung yang melintasi plasenta; agen ini dapat digunakan pada pasien yang memiliki HIT.

### Thromboprophylaxis VTE

Keputusan untuk merekomendasikan thromboprophylaxis tergantung pada identifikasi perempuan yang berisiko di awal kehamilan dan stratifikasi risiko mereka yang memerlukan profilaksis antenatal dan postpartum atau profilaksis postpartum saja. Pada tahun 2004 *Royal College of Obstetricians (RCOG)* menerbitkan panduan tentang thromboprophylaxis pada kehamilan, persalinan, dan masa nifas [30], mencantumkan daftar faktor risiko dan menilai tingkat risiko. Tabel 4.1 merangkum faktor risiko yang perlu dipertimbangkan. Pedoman ini telah diadaptasi menjadi sebuah algoritma untuk perencanaan thromboprophylaxis (Gambar 4.1).

### **Profilaksis antenatal**

Riwayat personal VTE sebelumnya dikaitkan dengan peningkatan risiko kekambuhan secara keseluruhan 3,5 kali lipat. Sebuah studi prospektif menunjukkan tidak dilakukannya antenatal berulang dalam kelompok wanita yang mengalami VTE sebelumnya dikaitkan dengan faktor risiko sementara dan tidak ada cacat trombofilik tapi tingkat kekambuhan 5,9% jika VTE sebelumnya idiopatik atau berhubungan dengan trombofilia [31]. Kehamilan sebelumnya/kejadian terkait pil juga memiliki tingkat kekambuhan yang lebih tinggi seperti yang diharapkan [31] dan ini muncul merata sepanjang tiga trimester. Studi lain [32] menunjukkan peningkatan bertahap insiden di setiap trimester, namun masih menunjukkan risiko yang signifikan pada trimester pertama menunjukkan bahwa profilaksis harus dimulai di awal kehamilan. Wanita yang menggunakan antikoagulasi jangka panjang harus menggantinya dengan LMWH sebelum usia 6 minggu kehamilan dan pengobatan dosis harus dipertimbangkan. Pada wanita dengan penanda trombofilik yang teridentifikasi tetapi tidak ada riwayat trombosis pribadi, manajemen akan tergantung pada jenis dan jumlah defek yang dialami ditambah dengan penilaian faktor risiko lain yang mungkin, selain meninjau riwayat keluarga.

### **Profilaksis postnatal**

Semua wanita dinilai yang perlu mendapat profilaksis antenatal tentu juga membutuhkan membutuhkan thromboprophylaxis peri dan postnatal karena VTE secara signifikan lebih umum pada periode postpartum daripada pada periode antenatal. Wanita yang dinilai berada pada 'resiko medium' (lihat Gambar 4.1) akan menerima profilaksis peri dan post-partum biasanya untuk 6 periode minggu. Selain itu, pedoman RCOG merekomendasikan 5

hari profilaksis bagian semua wanita yang telah menjalani operasi sesar [33].

**Tabel 4.1 Faktor Risiko VTE dalam kehamilan**

Telah dimiliki sebelumnya	Onset baru atau transien
VTE sebelumnya	Prosedur Bedah dalam kehamilan atau masa nifas seperti evakuasi sisa konsepsi yang tertinggal
Thrombofilia Kongenital Defisiensi Antitrombin Defisiensi Protein C Defisiensi Protein S Faktor V Leiden Varian gen protrombin	Sterilisasi postpartum Hiperemesis Dehidrasi Sindrom hiper-stimulasi ovarium Infeksi berat, contoh pyelonefritis Imobilitas (istirahat/tirah baring >4 hari) Pre-eklampsia
Sindrom antifosfolipid yang didapat	Kehilangan darah yang banyak
Antioagulan Lupus	Perjalanan panjang
Antibodi anticardiolipin	Persalinan lama
Usia lebih 35 tahun	Persalinan instrumental mid-kavum
Obesitas (IMT > 30mg/m <sup>2</sup> ) sebelum kehamilan atau selama kehamilan	Imobilitas setelah melahirkan
Paritas > 4	
<i>Varicose vein</i> berat	
Paraplegia	
Penyakit sel sabit ( <i>Sickle</i>	

cell)	
Gangguan Inflamasi seperti sindrom nefritik, beberapa penyakit jantung	
Gangguan Myeloproliferative seperti Thrombositemia esensial	
Polisitemia vera	

Manajemen standar terdiri dari penggunaan LMWH sekali sehari pada dosis tetap [34] (lihat Tabel 4.2). Terdapat perdebatan mengenai perlunya memantau kadarnya selama kehamilan. Pengobatan harus dihentikan ketika persalinan, untuk memungkinkan penilaian dan perlunya anestesi regional. Anestesi regional tidak boleh diberikan dalam waktu 10-12 jam sejak pemberian dosis profilaksis, karena risiko kecil hematoma tulang belakang [35,36]. Dosis LMWH dapat diberikan 3-4 jam setelah pengangkatan kateter epidural/spinal.

Jika LMWH diberikan sementara kateter epidural adalah masih in situ, maka kateter ini tidak boleh diangkat selama 10-12 jam setelah injeksi [37]. Perawatan harian kemudian dilanjutkan seperti biasanya selama 6 minggu. Konversi ke warfarin adalah pilihan alternatif postnatal, meskipun terdapat resistensi relatif terhadap warfarinisasi pada periode pasca-melahirkan, karena keadaan *hypercoaguable* [38]. Ketidaknyamanan pemeriksaan INR ditambah pengobatan ganda LMWH dan warfarin hingga stabil bermakna bahwa banyak wanita memilih untuk tetap dengan LMWH pada masa nifas.

#### Poin-poin penting Profilaksis VTE

- Faktor risiko VTE harus dinilai di awal kehamilan.

- Pedoman RCOG 2004 memberikan panduan tentang stratifikasi risiko.
- Waktu risiko tertinggi untuk VTE adalah 6 minggu pertama setelah melahirkan.
- VTE Antenatal terjadi pada seluruh trimester kehamilan.

### Pengobatan VTE

Ketika VTE diduga dalam kehamilan, antikoagulan harus dimulai pemberiannya tanpa penundaan, sambil menunggu tes konfirmasi diagnostik. Bagi sebagian besar pasien, pengobatan menggunakan LMWH berat dalam dosis-terkait-berat badan dua kali sehari [39] (berbeda dari rejimen yang digunakan diluar kehamilan (lihat Tabel 4.2.) Terdapat bukti jelas pada pasien tidak hamil dengan kesetaraan keamanan dan manfaat LMWH dengan UFH.

**Table 4.2** Antenatal prophylactic and therapeutic doses of LMWH

Prophylaxis	Enoxaparin (100 units/mg)	Dalteparin	Tinzaparin
Normal body weight (50–90 kg)	40 mg daily	5000 units daily	4500 units daily
Body weight < 50 kg	20 mg daily	2500 units daily	3500 units daily
Body weight > 90 kg*	40 mg 12-hourly	5000 units 12-hourly	4500 units 12-hourly
Higher prophylactic dose	40 mg 12-hourly	5000 units 12-hourly	4500 units 12-hourly
Therapeutic dose	1 mg/kg 12-hourly	90 units/kg 12-hourly	90 units/kg 12-hourly

\*BMI > 30 in early pregnancy.

LMWH memiliki risiko komplikasi perdarahan lebih rendah dan Gambar kematian lebih rendah pada pasien yang tidak hamil dibandingkan dengan UFH [40]. Pedoman kehamilan telah diproduksi berdasarkan bukti ini pada pasien yang tidak hamil dan pada bagian inti informasi diakumulasikan penggunaan kedua agen tersebut dalam kehamilan (RCOG, ACCP [27, 39]).

Pedoman ini menjelaskan dua pendekatan yang dapat diterima, yakni:

- 1) Pemberian awal UFH diikuti sedikitnya pemberian LMWH subkutan 3 bulan dalam dosis terapeutik atau dosis subkutan UFH yang disesuaikan.
- 2) Dosis terapi LMWH atau dosis UFH yang disesuaikan diberikan subkutan, digunakan baik untuk pengobatan akut dan jangka panjang.

Penyesuaian Dosis UFH tergantung pada pemantauan aPTT yang cermat. Selain resistensi heparin jelas disebabkan oleh peningkatan berbagai faktor pembekuan selama kehamilan, audit menunjukkan buruknya kemampuan resistensi ini. Namun, dalam situasi di mana VTE dialami mendekati waktu kelahiran dan perhatian lebih dekat untuk pemantauan yang hati-hati, waktu paruh UFH intravena yang pendek (1-2 jam) adalah menguntungkan, memungkinkan kontrol ketat antikoagulasi selama persalinan. Ketika risiko dianggap sangat tinggi, penyaring vena cava inferior dapat diinsersikan untuk mengurangi risiko emboli selama persalinan. Jenis baru penyaring relatif telah tersedia yang dapat dibiarkan in situ selama beberapa bulan, tidak seperti sebelumnya yang maksimum 7-10 hari, yang mampu membantu manajemen lebih lanjut pada periode berisiko tinggi ini. Ketika UFH digunakan untuk jangka waktu pendek atau panjang, jumlah trombosit harus diperiksa pada 1 dan 2 minggu dan kemudian diperiksa

bulanan untuk mengeklusikan HIT. Penghentian heparin segera dan substitusi dengan danaparoid harus dilakukan. Pengobatan dengan LMWH dipantau oleh pemeriksaan anti-Xa, 3-4 jam setelah dosis pagi. Pengobatan dua kali sehari lebih disarankan pada kehamilan [41,42] dimana sehari paruh LMWH berkurang karena peningkatan klirens ginjal [43]. Selain itu tidak perlu memeriksa jumlah trombosit pada wanita yang diobati dengan LMWH kecuali sebelumnya pernah terpapar UFH [44].

Pedoman merekomendasikan durasi dosis pengobatan 6 bulan. Dimana VTE telah terjadi di awal kehamilan, dosis mungkin mengurangi tingkat profilaksis setelah waktu ini asalkan tidak ada faktor risiko tambahan. Setelah kelahiran pengobatan harus dilanjutkan selama minimal 6 minggu. Dosis kemudian dikurangi sekitar waktu taksiran persalinan dan pasien diinstruksikan untuk menghentikan penggunaan heparin saat melahirkan.

Anestesi epidural atau spinal tidak dapat diberikan selama paling sedikit 24 jam setelah dosis pengobatan LMWH dan 10-12 jam setelah dosis profilaksis. Begitu pula waktu penggantian kateter epidural sama dengan diatas.

### Poin-poin penting

#### **Pengobatan VTE**

- Jika dicurigai VTE, pengobatan harus segera dimulai, sementara menunggu pemeriksaan diagnostic.
- Dosis pengobatan dan frekuensi berbeda dengan kasus non-hamil.
- Anestesi Epidural atau spinal kontraindikasi diberikan dalam waktu 24 jam dari dosis pengobatan penuh.

## Manajemen APS

Titer Antibodi antifosfolipid (APL) rendah sering terjadi pada kehamilan dan tidak signifikan; APS adalah suatu kondisi yang didefinisikan oleh kriteria laboratorium yang ketat dan klinis [45]. Dirangkumkan sebagai berikut:

*Gambaran klinis: morbiditas kehamilan*

- a. Kematian janin pada/setelah usia 10 minggu dengan morfologi janin yang normal.
- b. Kelahiran prematur sebelum usia kehamilan 34 minggu karena:
  - Pre-eklampsia Berat/eklampsia.
  - Gambaran insufisiensi plasenta yang jelas, misalnya:
    - Tes surveilans janin yang abnormal.
    - Sinyal Doppler arteri umbilikalis yang abnormal.
    - Oligohidramnion.
    - Berat badan lahir <persentil ke-10 sesuai usia.
- c. Mengalami keguguran Tiga kali atau lebih yang tidak dapat dijelaskan (<10 minggu).

*Gambaran klinis: peristiwa trombotik*

- a. Trombosis vena atau arteri-sistem vaskular serebral, arteri koroner, emboli paru, hati vena renal.
- b. Gangguan trombosis pembuluh kecil.

*Fitur Laboratorium*

Gambaran satu atau lebih APL hadir pada dua kesempatan setidaknya dalam rentang 12 minggu:

- a. Antibodi anticardiolipin titer menengah atau tinggi.
- b. Antibodi Anti-beta 2 glikoprotein 1.
- c. Antikoagulan lupus.

Pasien dengan kejadian trombosis sebelumnya dan APS harus menerima konseling pra-kehamilan. Pasien-pasien ini mungkin mendapatkan antikoagulasi jangka panjang dan

membutuhkan konseling mengenai risiko trombotik dan keguguran pada kehamilan dan diskusi khusus tentang pergantian dari penggunaan warfarin untuk heparin. Tujuan dalam pengelolaan kehamilan adalah untuk memaksimalkan kesempatan hasil akhir janin yang sukses dan untuk mencegah trombosis dan masalah klinis lain pada ibu.

Sehubungan dengan hasil kehamilan, terdapat beberapa uji coba. Meskipun APS merupakan gangguan kekebalan tubuh, belum ada bukti bahwa steroid meningkatkan Gambar kelahiran hidup, dan malah dapat menyebabkan morbiditas ibu dan janin [46,47]. Sebuah percobaan acak terkontrol (RCT) pada wanita dengan keguguran berulang dan APLS menunjukkan tingkat kelahiran hidup dari 40% ketika diobati dengan aspirin saja, dan peningkatan 70% ketika digunakan kombinasi aspirin dosis rendah dan LMWH [48].

RCT lainnya melaporkan tingkat keberhasilan yang tinggi dengan aspirin saja dan tidak ada manfaat yang signifikan dalam Gambar kelahiran hidup dengan penambahan heparin [29]. Namun, percobaan ini telah dikritik karena keterlibatan perempuan dengan titer aPL rendah dan pengacakan hingga usia 12 minggu kehamilan, dimana sebagian besar keguguran kehamilan terkait-APL biasanya terjadi. Sebuah meta-analisis dari tiga percobaan memeriksa peran aspirin saja dibandingkan dengan plasebo atau supportive care tidak menemukan manfaat yang signifikan [49]. Akhirnya meta-analisis dari dua percobaan terkontrol menyimpulkan bahwa pada wanita dengan keguguran berulang dan aPL; pengobatan dengan heparin dosis rendah ditambah aspirin dosis rendah secara signifikan mengurangi keguguran 54% bila dibandingkan dengan pengobatan aspirin saja [49]. Kehamilan terkait aPL yang diterapi dengan aspirin dan heparin masih berrisiko

tinggi terjadi komplikasi sepanjang ketiga trimester [48,50,51].

### **Poin-poin penting**

#### **APS**

- Titer Antibodi rendah umum pada kehamilan dan tidak signifikan.
- Kehamilan pada wanita dengan APS tetap berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi.
- Pengobatan dengan aspirin dosis rendah dan LMWH signifikan meningkatkan hasil akhir.

### **Pencegahan komplikasi kehamilan yang terkait dengan trombofilia**

Beberapa penelitian menyatakan adanya hubungan antara trombofilik hereditas dan status trombofilik yang diperoleh dan hasil kehamilan yang merugikan, termasuk kematian janin dalam sepanjang tiga trimester, pre-eklampsia, dan hambatan pertumbuhan janin intrauterin. Kebanyakan penelitian dibatasi oleh metodologi yang buruk atau fokus pada satu komplikasi kehamilan [52-57]. Namun, baru-baru ini, meta-analisis yang komprehensif mengkonfirmasi bahwa wanita dengan trombofilia memiliki peningkatan risiko komplikasi kehamilan [58-60]; mereka juga mengidentifikasi fakta bahwa meskipun risiko relatif meningkat, risiko absolut masih rendah dan oleh karena itu tidak ada kasus untuk *screening* universal.

Satu sampai tiga persen wanita mengalami keguguran berulang (RPL) dari tiga atau lebih keguguran [61]. Penelitian kecil menunjukkan thromboprophylaxis dengan LMWH secara signifikan meningkatkan hasil kehamilan [52,53,62,63]. Baru-baru ini sebuah laporan penelitian prospektif besar, kasus-terkontrol [64] telah dilakukan pada wanita dengan riwayat satu kali kematian janin setelah 10

minggu dan gangguan trombofilik. LMWH (enoxaparin, 40 mg o.d) dibandingkan dengan aspirin dosis rendah (100 mg o.d), dimana keduanya mulai diberikan dari minggu kedelapan. Penelitian ini menunjukkan superioritas dramatis enoxaparin lebih dari aspirin dalam hasil akhir kelahiran hidup (OR, 15,5, 95% CI, 7-34,  $p < 0,001$ ) dan juga dalam analisis subkelompok individu trombofilia (termasuk defisiensi protein C, defisiensi protein S dan Factor V Leiden). Berat lahir bayi lebih tinggi pada kelompok enoxaparin dan bayi kecil-untuk-masa-kehamilan terlihat lebih sering pada kelompok yang diobati dengan aspirin. Mungkin dapat dipertimbangkan pemberian LMWH pada wanita dengan RPL, terlepas dari ada atau tidak adanya penanda trombofilik [65].

Saat ini berlangsung uji coba menangani masalah ini. Penambahan dosis rendah aspirin untuk rejime LMWH masih kontroversial. Meskipun kombinasi ini muncul efektif dalam pengaturan APS, patofisiologi yang mendasari di sini tidak dapat dibandingkan dan diperlukan studi di bidang ini untuk mengoptimalkan pengobatan kelompok perempuan ini. Hal ini adalah masalah yang diakui, namun demikian, merekrut studi acak adalah hal yang sulit dilakukan pada wanita yang telah mengalami keguguran beberapa kali.

### **Poin-poin penting**

#### **Komplikasi kehamilan dan trombofilia**

- Studi menunjukkan peningkatan hasil pada RPL dengan LMWH.
- Penelitian selanjutnya diperlukan untuk memperjelas peran LMWH pada RPL tanpa trombofilia.
- Studi acak pada kelompok perempuan sulit untuk dilakukan.

## **Manajemen terapi antikoagulan pada pasien dengan katup jantung prostetik**

Manajemen terapi antikoagulan ibu hamil dengan katup buatan menimbulkan tantangan yang signifikan karena risiko trombotik jelas bagi ibu yang menggunakan preparat heparin dibandingkan dengan risiko terhadap bayi warfarin (teratogenesis, gangguan perkembangan saraf dan perdarahan). Sebuah tinjauan sistematis yang dilakukan oleh Chan et al. [17] menganalisis hasil untuk ibu dan janin dalam tiga rejime yang paling umum digunakan. Yakni:

1. Penggunaan warfarin selama kehamilan.
2. Penggantian warfarin dengan UFH selama minggu 6-12 kehamilan.
3. Penggunaan UFH keseluruhan.

Heparin digunakan pada saat kelahiran dalam semua kelompok untuk menghindari kelahiran dengan janin yang mengalami antikoagulasi. Penggunaan warfarin seluruhnya dikaitkan dengan risiko terendah gangguan tromboemboli (3,9%), tetapi juga penggunaan warfarin memberikan resiko embriopati pada 6,4% dari kelahiran hidup. Mengganti warfarin dengan UFH pada trimester pertama menghapuskan kemungkinan kejadian embriopati tetapi dikaitkan dengan peningkatan insiden trombosis katup (9,2%). Penggunaan UFH selama kehamilan memiliki tingkat trombosis katup mengkhawatirkan, 60% bila digunakan pada dosis rendah dan 25% pada dosis yang disesuaikan. Para penulis mengomentari keterbatasan penelitian ini: Pasien adalah kelompok heterogen dalam hal jenis dan lokasi katup (dua pertiga memiliki katup prostesis mitral dan 50% memiliki pembungkus dan katup bola, fitur kedua risiko lebih tinggi), adanya aritmia, jenis studi, dan akurasi pelaporan.

Jumlah kasus dalam berbagai studi yang dikaji umumnya kecil. Sulit untuk meramalkan data ini untuk

katup yang baru dan kurang thrombogenic dengan penggunaan LMWH. Terdapat sejumlah studi kasus yang melaporkan trombosis katup dan stoke terkait dengan LMWH [66-70]. Penggunaan LMWH pada ibu hamil dengan katup jantung secara sistematis dilaporkan oleh Oran dkk. [71]. Enam puluh tujuh kehamilan pada wanita dengan katup prostetik diobati dengan berbagai dosis LMWH kemudian diperiksa. Trombosis katup terjadi pada 7 kasus (10,4%). Insiden tromboemboli total adalah 13,4% (9/67), dan Angka kematian adalah 1,49%. 8 dari 9 keadaan trombotik, pasien menerima dosis tetap, bukan dosis LMWH yang disesuaikan, dan dalam 2 kasus mendapatkan dosis tetap yang rendah. Kadar Anti-Xa dipantau pada 42 kehamilan, dan di grup ini hanya ada satu komplikasi tromboemboli. Tingkat kelahiran hidup 90% dan tidak ada kelainan kongenital.

Masih ada kelangkaan relatif data sebagai panduan pengelolaan pada kelompok perempuan ini dan beberapa pendekatan dapat diterima. Jika LMWH digunakan, pemantauan ketat kadar anti-Xa tingkat sangat penting mempertahankan tingkat tinggi 1,0-1,2, dan diperlukan kontrol ketat yang sama pada dosis-UFH-yang-disesuaikan. Penggunaan warfarin antara usia 13 dan 36 minggu kehamilan umumnya digunakan. Aspirin dalam dosis rendah dapat ditambahkan dengan penggunaan heparin [72]. Studi yang dirancang untuk mengklarifikasi isu-isu yang sulit seputar manajemen pasien ini masih diperlukan.

### **Poin-poin penting**

#### **Antikoagulasi dan katup jantung mekanis**

- Penatalaksanaan senantiasa menjadi tantangan dengan semua perawatan masalah.
- Informasi terkini yang masih tidak memadai sebagai panduan pemberian pilihan pengobatan terbaik.

- Warfarin muncul menjadi yang terbaik dalam pencegahan trombosis, tetapi dengan risiko masalah janin.
- Heparin tampaknya memiliki risiko serius yang lebih tinggi pada trombosis katup.

### Kesimpulan

Antikoagulan digunakan seiring peningkatan jumlah indikasi pada kehamilan. Manajemen dan profilaksis VTE pada kehamilan telah banyak disederhanakan melalui pengenalan penggunaan LMWH. Kesadaran akan pentingnya penilaian risiko awal kehamilan yang akurat telah menyebabkan semakin banyak perempuan yang mendapatkan profilaksis antenatal dan postpartum untuk kasus-kasus berisiko tinggi atau profilaksis pascapersalinan saja bagi pasien risiko menengah. Meskipun ada berbagai sistem risiko penilaian, strategi profilaksis serupa muncul dan mudah-mudahan akan tergambarkan melalui pengurangan lebih lanjut morbiditas dan mortalitas akibat VTE pada kehamilan. Terdapat pedoman yang relatif jelas dalam kasus APS, namun studi lebih lanjut diperlukan dalam bidang pencegahan komplikasi kehamilan dan untuk pengelolaan wanita dengan katup logam.

### Referensi

1. Drife J for CEMACH (Confidential Enquiry into Maternal and Child Health). **Thrombosis and thrombo-embolism**. In: *Why Mothers Die 2000- 2002*. London: RCOG Press; 2004, Chapter 2.
2. McColl MD, Ellison J, Greer IA, Tait RC, Walker ID. **Prevalence of the post-thrombotic syndrome in young women with previous venous thromboembolism**, *Br J Haematol* 2000 108(2):272-4.

3. Clarke P, Brennand J, Conkie JA, McCall F, Greer IA, Walker ID. **Activated protein C sensitivity, protein C, protein S and coagulation in normal pregnancy.** *Thromb Haemost* 1998;79:1166-70.
4. Greer IA. **Haemostasis and thrombosis in pregnancy.** In: Bloom AL, Forbes CD, Thomas DP, Tuddenham EGD (eds.), *Haemostasis and Thrombosis*. Churchill Livingstone: Edinburgh; 1994:987-1015.
5. Macklon NS, Greer IA. **The deep leg venous system in the puerperium. An ultrasound study.** *Br J Obstet Gynaecol* 1997;104:198-200.
6. Lindhagen A, Bergqvist A, Bergqvist D, Hallbook T. **Late venous function in the leg after deep venous thrombosis occurring in relation to pregnancy.** *Br J Obstet Gynaecol* 1996;93:348-52.
7. Glimelius B, Busch C, Hook M. **Binding of heparin on the surface of cultured endothelial cells.** *Thromb Res* 1978;12:73-82.
8. Young E, Prins M, Levine MN, Hirsch J. **Heparin binding to plasma proteins, an important mechanism for heparin resistance.** *Thromb Haemost* 1992;79:1-17.
9. Hyers TM, Hull RD, Weg JG. **Antithrombotic therapy for venous thrombo-embolic disease.** *Chest* 1995;108:335s-51s.
10. Nelson-Piercy C. **Hazards of heparin: allergy, heparin-induced thrombocytopenia and osteoporosis.** In: Greer IA (ed.), *Bailliere's Clinical Obstetrics and Gynaecology - Thromboembolic Disease in Obstetrics and Gynaecology*. London: Bailliere Tindall; 1997:489-509.
11. Weitz JL. **Low molecular weight heparins.** *N Engl J Med* 1997;337:688-98.
12. Hunt BJ, Doughty H, Majurnder G, et al. **Thromboprophylaxis with low molecular weight heparin (Fragmin) in high risk pregnancies.** *Thromb Haemost* 1997;77:39-43.

13. Byrd LM, Johnston TA, Shiach C, Hay C. **Osteopenic fractures and low molecular weight heparin in pregnancy.** *J Obstet Gynaecol* 2004; **2451**:1113-7.
14. Greer IA, Nelson-Piercy C. **Low-molecular weight heparins for throm- boprophylaxis and treatment of venous thromboembolism in preg- nancy: a systemic review of safety and efficacy.** *Blood* 2005;106(2): 401-7.
15. Bates SM, Ginsberg JS. **Anticoagulants in pregnancy: fetal defects.** In: Greer IA (ed.), *Bailliere's Clinical Obstetrics and Gynaecology*. London: Bail- liere Tindall; 1997:479-88.
16. Bates S, Greer IA, Ginsberg J, Hirsh J. **Use of antithrombotic agents during pregnancy.** *Chest* 2004;126(Suppl 3):627s-44s.
17. Chan WS, Anand S, Ginsberg JS. **Anticoagulation of pregnant women with mechanical heart valves.** *Arch Intern Med* 2000;160:191-6.
18. Vitale N, De Feo M, De Santo LS, Pollice A, Tedesco N, Cotrufo M. **Dose-dependent fetal complications of warfarin in pregnant women with mechanical heart valves.** *J Am Coll Cardiol* 1999;33:1637-41.
19. Wesseling J, van Driel D, Heymans HAS, et al. **Coumarins during preg- nancy: long-term effects on growth and development of school-age children.** *Thromb Haemost* 2001;85(4):577-755.
20. Myers B, Westby J, Strong J. **Prophylactic use of danaparoid in high-risk pregnancy with heparin- induced thrombocytopenia positive skin reaction.** *Blood Coagul Fibrinolysis* 2003;14:485-7.
21. Schindewolf M, Mosch G, Bauersachs RM, Lindhoff- Last E. **Safe anticoagulation with danaparoid in pregnancy and lactation.** *Thromb Haemost* 2004;92(1):211.
22. Wijesiriwardana A, Lees DA, Lush C. **Fondaparinux as anticoagulant in a pregnant woman with heparin**

- allergy. *Blood Coagul* 2006;17(2):147-9.
23. Dempfle CE. Minor transplacental passage of fondaparinux in vivo. *N Engl J Med* 2004;350:1914-5.
  24. Fondaparinux sodium package insert. West Orange, NJ: Organon/ Sanofi-Synthelabo LLC, January 2002.
  25. Harenberg J, Jorg I, Bayerl C, Fiehn C. Treatment of a woman with lupus pernio, thrombosis and cutaneous intolerance to heparins using lepirudin during pregnancy. *Lupus* 2005;14(5):411-2.
  26. Huhle G, Geberth M, Hoffman U, Heene DL, Harenberg J. Management of heparin-associated thrombocytopenia in pregnancy with subcutaneous r-hirudin. *Gynaecol Obstet Invest* 2000;49:67-9.
  27. Geerts WH, Pineo GF, Heit JA, et al. Prevention of venous thromboembolism. ACCP guidelines. *Chest* 2004;126:343S.
  28. CLASP (Collaborative Low-dose Aspirin Study in Pregnancy) Collaborative Group. CLASP: a randomised trial of low-dose aspirin for the prevention and treatment of pre-eclampsia among 9364 pregnant women. *Lancet* 1994;343:619-29.
  29. Farquharson RG, Quenby S, Greaves M. Antiphospholipid syndrome in pregnancy: a randomised, controlled trial of treatment. *Obstet Gynaecol* 2002;100:408-13.
  30. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. *Thromboprophylaxis During Pregnancy, Labour and After Vaginal Delivery*. Guideline Number 37. London: RCOG Press; 2004.
  31. Pabinger I, Grafenhofer H, Kyrle PA, et al. Risk of pregnancy associated recurrent venous thromboembolism in women with a history of venous thrombosis. *J Thromb Haemost* 2005;3(5):949-54.
  32. Voke J, Hunt BJ, Keidan J, Pavord S, Spencer N, on

- behalf of the British Society for Haematology Obstetric Haematology Group. The management of antenatal venous thromboembolism in the UK and Ireland: a prospective multicentre survey. *Br J Haematol*, submitted.
33. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Report of the RCOG Working Party on Prophylaxis Against Thromboembolism in Gynaecology and Obstetrics. London: RCOG Press; 1995.
  34. Greer IA, Hunt BJ. Low molecular weight heparin in pregnancy: current issues. *Br J Haematol* 2005;128:593-601.
  35. Baron EM, Burke JA, Akhtar N, Young WV. Spinal epidural haematoma associated with tissue plasminogen activator treatment of acute myocardial infarction. *Cathet Cardiovasc Intervent* 1999;48:390-6.
  36. Shaieb MD, Watson BN, Atkinson RE. Bleeding complications with enoxaparin for deep venous thrombosis prophylaxis. *J Arthroplasty* 1999;14:432-8.
  37. American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. Second consensus statement, 2002. Available at: <http://www.asra.com>.
  38. British Society for Haematology. Guidelines on oral anticoagulation: third edition. *Br J Haematol* 1998;101:374-87.
  39. Thompson AJ, Greer IA. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. *Thromboembolic Disease in Pregnancy and the Puerperium: Acute Management*. Guideline Number 28. London: RCOG Press; 2001.
  40. Hull RD, Raskob GE, Pineo GF, et al. Subcutaneous low-molecular-weight heparin compared with continuous intravenous heparin in the treatment of proximal-vein thrombosis. *N Engl J Med* 1992;326:975-82.

41. Rodie VA, Thompson AJ, Stewart FM, Quinn AJ, Walker ID, Greer IA. Low molecular weight heparin for the treatment of venous thromboembolism in pregnancy: a case series. *BJOG* 2002;109:1020-4.
42. Merli G, Spiro TE, Olsson CG, et al. Subcutaneous enoxaparin once or twice daily compared with intravenous unfractionated heparin for treatment of venous thromboembolic disease. *Ann Intern Med* 2001;134:192-202.
43. Casele HL, Laifer SA, Woelkers DA, Venkataramanan R. Changes in pharmacokinetics of the low molecular heparin enoxaparin during pregnancy. *Am J Obstet Gynaecol* 1999;181:1113-7.
44. Warkentin TE, Greinacher A. Heparin-induced thrombocytopenia: recognition, treatment and prevention. 7th ACCP conference on antithrombotic and thrombolytic therapy. *Chest* 2004;126(Suppl 3):311S-37S.
45. Miyakis S, Lockshin MD, Atsumi T, et al. International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS). *J Thromb Haemost* 2006;4(2): 295-306.
46. Cowchock FS, Reece EA, Balaban D, Branch DW, Plouffe L. Repeated fetal losses associated with antiphospholipid antibodies: a collaborative randomised trial comparing prednisolone with low-dose heparin treatment. *Am J Obstet Gynaecol* 1992;166:1318-23.
47. Silver RK, MacGregor SN, Sholl JS, Hobart JM, Neerhof MG, Ragin A. Comparative trial of prednisolone plus aspirin versus aspirin alone in the treatment of anticardiolipin antibody-positive obstetric patients. *Am J Obstet Gynaecol* 1993;169:1411-7.
48. Rai RS, Cohen H, Dave M, Regan L. Randomised

**controlled trial of aspirin and aspirin plus heparin in pregnant women with recurrent miscarriage associated with phospholipid antibodies (or antiphospholipid antibodies). *Br Med J* 1997;314:253-7.**

49. Empson M, Lassere M, Craig JC, Scott JR. **Recurrent pregnancy loss with antiphospholipid antibody: a systemic review of therapeutic trials. *Obstet Gynaecol* 2002;99:135-44.**
50. Backos M, Rai R, Baxter N, Chilcott IT, Cohen H, Regan L. **Pregnancy complications in women with recurrent miscarriage associated with antiphospholipid antibodies treated with low-dose aspirin and heparin. *Br J Obstet Gynaecol* 1999;106:102-7.**
51. Branch DW, Silver RM, Blackwell JL, Reading JC, Scott JR. **Out-come of treated pregnancies in women with antiphospholipid syndrome: an update of the Utah experience. *Obstet Gynaecol* 1992;80: 614-20.**
52. Preston FE, Rosendaal FR, Walker ID, et al. **Increased fetal loss in women with hereditary thrombophilia. *Lancet* 1996;348: 913-6.**
53. Brenner B. **Clinical management of thrombophilia-related placental vascular complication. *Blood* 2004;103:4003-9.**
54. Sanson BJ, Friederich PW, Simioni P. **The risk of abortion and still-birth in anti-thrombin, protein C, and protein S deficient women. *Thromb Haemost* 1996;75:387-8.**
55. Vossen CY, Preston FE, Conard J, et al. **Hereditary thrombophilia and fetal loss: a prospective follow-up study. *J Thromb Haemost* 2004;2:592-6.**
56. Gris JC, Quere L, Monperyrroux F, et al. **Case-control study of the frequency of thrombophilic disorders in couples with late fetal loss and no thrombotic**

- antecedant-the Nimes Obstetricians  
Haematologists study 5 (NOHA5). *Thromb Haemost*  
1999; 81:891-9. and
57. Kupferminc MJ, Eldor A, Steinman N, et al. Increased frequency of genetic thrombophilia in women with complications of pregnancy. *N Engl J Med* 1999;340:50-2.
  58. Rey E, Kahn SR, David M, Shrier I. Thrombophilic disorders and fetal loss: a meta-analysis. *Lancet* 2003;361:901-8.
  59. Robertson L, Wu O, Langhorne P, et al. Thrombophilia and pregnancy: a systemic review. *Br J Haematol* 2005;132:171-96.
  60. Kovalevsky G, Gracia CR, Berlin JA, Sammel MD, Barnhart KT. Evaluation of the association between hereditary thrombophilias and recurrent pregnancy loss. *Arch Intern Med* 2004;164:558-63.
  61. Stirrat GM. Recurrent miscarriage. *Lancet* 1990;336:673-5.
  62. Carp H, Dolitzky M, Inbal A. Thromboprophylaxis improves the live birth rate in women with consecutive recurrent miscarriages and hereditary thrombophilia. *J Thromb Haemost* 2003;1:433-8.
  63. Brenner B, Hoffman R, Blumenfeld Z, Weiner Z, Younis J. Gestational outcome in thrombophilic women with recurrent pregnancy loss treated by enoxaparin. *Thromb Haemost* 2000;83:693-7.
  64. Gris JC, Mercier E, Quere I, et al. Low-molecular weight heparin versus low dose aspirin in women with one fetal loss and a constitutional thrombophilic disorder. *Blood* 2004;103(10):3695-9.
  65. Greer IA. Procoagulant microparticles: new insights and opportunities in pregnancy loss? *Thromb Haemost* 2001;85:3-4.

66. Idir M, Madonna F, Roudaut R. Collapse and massive pulmonary oedema secondary to thrombosis of a mitral mechanical valve prosthesis during low-molecular weight heparin therapy. *J Heart Valve Dis* 1999;8: 303-4.
67. Berndt N, Khan I, Gallo R. A complication in anticoagulation using low- molecular weight heparin in a patient with mechanical valve prosthesis. A case report. *J Heart Valve Dis* 2000;9:844-6.
68. Lev-Ran O, Kramer A, Gurevitch J, Shapira I, Mohr R. Low molecular weight heparin for prosthetic heart valves: treatment failure. *Ann Thorac Surg* 2000;69:264-5.
69. Roberts N, Ross D, Flint SK, Arya R, Blott M. Thromboembolism in pregnant women with mechanical prosthetic heart valves anticoagulated with low molecular weight heparin. *BJOG* 2001;108:327-9.
70. Mahesh B, Evans S, Bryan AJ. Failure of low molecular weight heparin in the prevention of prosthetic mitral valve thrombosis during pregnancy: case report and review of the options for anticoagulation. *J Heart Valve Dis* 2002;11:745-50.
71. Oran B, Lee-Paritz A, Ansell J. Low molecular weight heparin for the prophylaxis of thromboembolism in women with prosthetic mechanical heart valves during pregnancy. *Thromb Haemost* 2004;94:747-51.
72. Turpie AG, Gent M, Laupacis A, et al. Comparison of aspirin with placebo in patients treated with warfarin after heart valve replacement. *N Engl JMed* 1993;329:524-9.



## BAB 5

# PENGOBATAN PENYAKIT KARDIOVASKULAR

Asma Khalil, Pat O'Brien

### Pendahuluan

Wanita dapat menderita penyakit kardiovaskular untuk pertama kalinya dalam masa kehamilan; keadaan ini mungkin berhubungan dengan kehamilan (seperti preeklampsia) atau karena *unmasking* (sebelumnya tersamarkan) dari kondisi yang tidak didiagnosis sebelumnya, seperti stenosis mitral. Wanita dengan penyakit jantung yang sudah ada perlu pengelolaan yang cermat pada kehamilan; perubahan fisiologis normal yang terkait dengan kehamilan (dan menetap untuk jangka waktu variabel setelah kelahiran) membutuhkan permintaan tambahan pada sistem kardiovaskular. Idealnya perawatan harus diberikan oleh tim khusus multidisiplin berpusatkan ahli termasuk dokter kandungan, dokter ahli jantung, ahli hematologi, dan anestesi, semua dengan keahlian di bidang ini.

Hanya 4% dari gangguan perkembangan disebabkan oleh bahan kimia dan fisik, yang hanya sebagian kecil disebabkan oleh produk obat [1]. Namun, daftar obat yang fetotoksik embrio yang dikenal mencakup beberapa yang digunakan pada pasien jantung termasuk *inhibitor angiotensin-converting enzyme* (ACE inhibitor), fenitoin dan warfarin. Ketika memberikan resep obat baru terutama untuk pengobatan jangka panjang, untuk wanita usia reproduksi, kemungkinan hamil harus lebih disadari, kontrasepsi yang sesuai diatur dan jika kehamilan direncanakan, pengobatan disesuaikan.

Kondisi kardiovaskular yang paling umum yang dihadapi oleh dokter adalah gangguan hipertensi dan

aritmia. Namun, demografi populasi hamil berubah: usia rata-rata meningkat, dan kondisi yang berhubungan dengan usia, seperti penyakit jantung iskemik, dihadapi lebih umum pada kehamilan. Selain itu, wanita yang memiliki penyakit jantung bawaan sendiri dan menjadi hamil. Sampai saat ini, perempuan demikian tidak bertahan dalam tahun-tahun reproduksi mereka atau disarankan untuk menghindari kehamilan. Namun, sekarang untuk pertama kalinya para wanita dapat hamil; mereka sering memiliki penyakit jantung yang kompleks dan dapat menggunakan berbagai obat kardiovaskular, termasuk antikoagulan.

### **Antihipertensi**

Antihipertensi yang paling umum digunakan dalam kehamilan adalah  $\alpha$ -metildopa, nifedipin, labetalol, dan hydralazine. Penting untuk diingat bahwa pre-eklampsia adalah gangguan endotel multisistem dan bahwa pengobatan antihipertensi sambil membantu untuk mengontrol hipertensi ibu, hanya sedikit mengubah penyebab yang mendasari patologi.

*Metildopa* - dianggap aman selama kehamilan [2]. Meskipun melewati plasenta tidak ada laporan efek samping janin [3,4], dan tindak lanjut jangka panjang pada anak lebih dari 7 tahun tidak menemukan bukti kelainan jangka panjang pada anak-anak dari ibu yang diobati pada kehamilan [5]. Metildopa adalah depresan saraf pusat dan dapat menyebabkan kantuk ibu, depresi dan hipotensi postural. Ini memiliki efek yang sama pada janin yang menghasilkan variabilitas denyut jantung janin berkurang pada *cardiotocograph* tersebut. Meskipun demikian metildopa tetap merupakan obat lini pertama untuk hipertensi esensial dalam bulan-bulan sebelum pemuahan dan untuk pengobatan antihipertensi yang dimulai selama kehamilan.

Meskipun karena terkait depresi, biasanya diganti pada saat postnatal dengan alternatif lain seperti  $\beta$ -blocker.

**Antagonis Saluran kalsium** (*Calcium Channel antagonist*)- yang paling umum dalam kehamilan adalah nifedipine, tetapi penggunaan nicardipine, nitrendipin, dan isradipin juga telah dijelaskan. Beberapa penelitian besar telah menunjukkan bahwa antagonis saluran kalsium pada trimester kedua dan ketiga (ketika obat ini paling sering digunakan) adalah antihipertensi yang efektif dan tidak memiliki efek samping yang signifikan [6-11]. Sebuah studi kohort prospektif terhadap pasien menghubungi layanan informasi teratogen di Kanada menunjukkan tidak ada peningkatan malformasi janin dengan paparan antagonis kalsium pada trimester pertama [12]. Beberapa laporan kasus menimbulkan kekhawatiran tentang efek sinergis yang mungkin dari nifedipine dan magnesium sulfat (kombinasi sering terjadi pada wanita dengan pre-eklampsia), menyebabkan reaksi hipotensi serius [13]. Namun, percobaan besar oleh MAGPIE tidak menemukan bukti sinergi tersebut dan memang menemukan bahwa magnesium sulfat tampaknya tidak memiliki efek antihipertensi [14].

**Hydralazine** - adalah vasodilator, pada kehamilan biasanya diberikan secara parenteral dalam pengelolaan hipertensi akut (lihat di bawah).

**Reseptor blockers  $\beta$ -adrenergik ( $\beta$ -blocker)** - Kelas ini mencakup daftar panjang obat termasuk atenolol, bisoprolol, esmolol, labetalol, metoprolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, dan timolol. Yang paling umum digunakan dalam kehamilan adalah labetalol dan atenolol. Mereka paling sering digunakan dalam kehamilan sebagai

antihipertensi atau antiaritmia, tetapi juga memiliki kegunaan yang kurang umum seperti pada migrain atau sindrom Marfan. Banyak yang memiliki aktivitas baik- $\beta$  1 dan  $\beta$ -2; labetalol terutama non-selektif  $\beta$ -blocker dengan beberapa lemah aktivitas  $\alpha$ -blocking. Semua  $\beta$ -blocker melewati plasenta. Dari bukti yang ada sampai saat ini,  $\beta$ -blocker tampaknya tidak menjadi paparan berikut teratogenik pada trimester pertama [15].

Beberapa studi telah menemukan peningkatan risiko pembatasan pertumbuhan intrauterin (IUGR) terutama dengan pengobatan jangka panjang dengan dosis yang lebih tinggi [16,17]. Namun, penyakit ibu yang mendasari mungkin menjelaskan efek ini dan studi terkontrol lain tidak menemukan perbedaan dalam tingkat IUGR antara kelompok yang terbuka dan non-terpapar [15,18]. A *Cochrane review* [19] dari 12 percobaan dari  $\beta$ -blocker versus plasebo/tidak ada pengobatan untuk hipertensi ringan sampai sedang menyarankan bahwa IUGR lebih umum dengan  $\beta$ -blocker (risiko relatif, 1,36; 95% *confidence interval* (CI), 1,02-1,82 ). Namun, ketika *Butters' trial* [17] (yang digunakan dosis besar dari awal kehamilan) dikeluarkan, risiko relatif jatuh ke 1,30 dan gagal mencapai signifikansi statistik (95% CI, 0,97-1,74). Sebuah meta-analisis yang lebih baru dari berbagai antihipertensi untuk ringan sampai sedang hipertensi dalam kehamilan menemukan bahwa jatuhnya pengobatan diinduksi tekanan arteri rata-rata adalah sebanding dengan peningkatan risiko IUGR [20]. Para penulis menyimpulkan bahwa efek ini tidak spesifik untuk  $\beta$ -blocker, namun hipertensi yang over-diobati dengan antihipertensi apapun bisa merusak perfusi plasenta dan menyebabkan IUGR. IUGR secara teoritis juga dimediasi melalui penurunan gula darah dengan blokade  $\beta$ -

reseptor. Namun, pertumbuhan postnatal dan perkembangan tampaknya tidak menjadi terpengaruh [21]. Secara ringkas risiko IUGR terkait dengan penggunaan blocker  $\beta$ - pada kehamilan tampaknya kecil terutama ketika dosis besar dihindari dan penggunaannya hanya terbatas pada trimester ketiga. Ketika digunakan, hipertensi tidak boleh over-diobati dan pertumbuhan janin harus dipantau dengan pertumbuhan scan serial. Jika  $\beta$ -blocker digunakan sampai dengan saat pengiriman, ada risiko teoritis bradikardia neonatal, hipotensi, dan hipoglikemia karena efek memblokir  $\beta$ - [22]. Namun, dalam prakteknya efek samping seperti tampak langka.

### ACE inhibitor

Kelas ini obat ini termasuk captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, dan lain-lain. ACE inhibitor menghambat konversi angiotensin I menjadi angiotensin II. Penggunaannya luar kehamilan telah menjadi lebih luas dalam beberapa tahun terakhir, namun data yang paling tersedia pada penggunaannya dalam kehamilan lihat kaptopril dan enalapril. Namun, ada kemungkinan bahwa obat-obat lain di kelas ini memiliki efek pada janin dan bayi sama.

Data yang dipublikasikan menunjukkan bahwa penggunaan ACE inhibitor pada trimester pertama dikaitkan dengan peningkatan risiko kelainan kongenital besar, terutama dari sistem kardiovaskular atau saraf pusat (rasio risiko, 2,71, 95% CI, 1,72-4,27) [23]. USG pemeriksaan rinci dari struktur janin, termasuk penilaian jantung hati harus ditawarkan pada 18-22 minggu kehamilan. Setiap wanita menemukan bahwa dia hamil sementara mengambil inhibitor ACE harus diubah menjadi agen antihipertensi lain, jika memungkinkan. Eksposur sengaja terhadap inhibitor ACE pada trimester pertama tidak dianggap

sebagai indikasi untuk terminasi kehamilan atau prosedur diagnostik invasif. Paparan pada trimester kedua dan ketiga dapat menyebabkan hipotensi ditandai janin dan penurunan (janin) aliran darah ginjal, kadang-kadang bahkan menyebabkan gagal ginjal janin dalam rahim. Oligohidramnion berat dapat menyebabkan hipoplasia paru, kontraktur anggota badan, dan kelainan kraniofasial. IUGR dan kelahiran prematur telah dilaporkan. Efek samping ini bertahan pada neonatus dengan perfusi ginjal yang buruk dan laju filtrasi glomerulus; mungkin ada hipotensi signifikan dan gagal ginjal cukup parah untuk menyebabkan kematian neonatal. Dimana inhibitor ACE harus dilanjutkan, volume cairan ketuban dan pertumbuhan janin harus dipantau secara hati-hati. Tekanan darah dan fungsi ginjal harus dipantau secara ketat pada neonatus [24].

**Angiotensin II inhibitor** - termasuk losartan dan valsartan. Ini adalah antagonis spesifik reseptor angiotensin II dan akibatnya memiliki sifat yang mirip dengan ACE Inhibitor. Ini adalah obat yang relatif baru dan data dalam kehamilan masih minim, tetapi tampaknya kemungkinan bahwa mereka akan menimbulkan efek toksik yang sama janin diamati dengan inhibitor ACE di trimester kedua dan ketiga [25]. Akibatnya obat ini tidak dianjurkan pada kehamilan kecuali semua jalan pengobatan lain telah dieksplorasi.

**Prazosin** - adalah blocker  $\alpha$ -adrenoreseptor yang kadang-kadang digunakan dalam kehamilan sebagai pengobatan antihipertensi lini kedua, biasanya dalam kombinasi dengan  $\beta$ -blocker [26]. tampaknya aman, tapi tindakan pencegahan harus diambil terhadap pertama dosis hipotensi.

## **Keadaan Darurat Hipertensi**

Pengobatan definitif untuk hipertensi yang tidak terkontrol dan preeklamsia adalah pengiriman. Namun demikian, tekanan darah harus dikendalikan dalam persalinan atau sebelum anestesi. Agen yang paling sering digunakan adalah intravena (iv) hydralazine atau labetalol, atau oral nifedipine.

Ketika hydralazine atau labetalol diberikan iv, ada risiko yang signifikan dari penurunan endapan tekanan darah, yang dapat menyebabkan gangguan plasenta perfusi dan kelainan denyut jantung janin. Akibatnya, i.v. lambat administrasi adalah wajib [27]. Ketika nifedipine digunakan dalam situasi ini, perawatan juga harus dilakukan untuk menghindari terlalu cepat penurunan tekanan darah. Untuk alasan ini, rute sublingual harus dihindari; oral (dan bahkan perumusan slowrelease) adalah lebih baik. Magnesium sulfat merupakan obat pilihan untuk pencegahan primer kejang pada wanita dengan berat pre-eklampsia [14] dan untuk pencegahan kejang berulang di eklampsia [28]. Sebagaimana disebutkan di atas, telah ada kekhawatiran tentang efek sinergis mungkin antagonis saluran kalsium dan magnesium pada tekanan darah, tapi ini sebagian besar telah diabaikan oleh Pengadilan MAGPIE [14].

## **Pencegahan pre-eklampsia**

### **Aspirin**

Telah lama diketahui bahwa trombosit yang terlibat dalam patogenesis preeklampsia dan beberapa studi kecil pada 1980-an menunjukkan bahwa aspirin dapat mencegah pre-eklampsia pada mereka yang berisiko [29]. Meskipun beberapa penelitian besar yang dirancang dengan baik gagal untuk mengkonfirmasi janji ini awal [30,31], studi meta-analisis baru-baru ini [32] yang melibatkan lebih dari 30.000 wanita menemukan bahwa penggunaan aspirin dosis

rendah dikaitkan dengan penurunan 10% di kedua diagnosis pre-eklampsia (interval kepercayaan 95%, 3-16%) dan jumlah bayi yang lahir sebelum 34 minggu (2-17%).

### **Antioksidan**

Stres oksidatif diyakini memainkan peran utama dalam pre-eklampsia. Baru-baru ini, uji coba secara acak terkontrol plasebo besar meneliti khasiat vitamin antioksidan C dan E dalam pencegahan pre-eklampsia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa vitamin ini tidak dikaitkan dengan penurunan kejadian pre-eklampsia [33].

### **Poin-poin penting**

- Inhibitor ACE dan antagonis reseptor angiotensin II merupakan kontraindikasi pada kehamilan.
- B-Blockers adalah agen antihipertensi yang aman untuk digunakan pada trimester ketiga namun dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan jika digunakan dalam dosis tinggi dari awal kehamilan.
- Methyldopa adalah antihipertensi yang aman untuk digunakan selama kehamilan.
- Aspirin dosis rendah dapat mengurangi risiko pre-eklampsia, namun efeknya sederhana.

## **DIURETIK**

### **Diuretik Thiazide**

Kelompok ini termasuk hydrochlorothiazide dan bendroflumethazide. Mereka menghambat penyerapan natrium dan klorida di tubulus ginjal distal dan menyebabkan hilangnya kalium. Mereka tampaknya tidak bersifat teratogenik [15]. Mereka menyebabkan penurunan volume intravaskular dan meskipun ada risiko teoritis penurunan perfusi uteroplasenta yang mengarah ke IUGR,

ini belum pernah dibuktikan. Ketika digunakan jangka panjang pada kehamilan (biasanya untuk wanita dengan gagal jantung dan/atau edema paru), elektrolit ibu harus diperiksa secara teratur. Mempertimbangkan untuk memantau IUGR rutin dan oligohidramnion. Jika ibu telah diberikan tiazid menjelang akhir kehamilan, neonatus juga berisiko ketidakseimbangan elektrolit (hiponatremia, hipokalsemia) atau hipoglikemia (karena efek diabetogenic pada ibu).

Furosemide adalah loop diuretik kuat yang tindakan habis dalam 2-4 jam. Hanya indikasi dalam kehamilan adalah gangguan kardiovaskular seperti edema paru atau gagal jantung; itu tidak boleh digunakan untuk pre-eklampsia karena secara signifikan mengurangi volume intravaskular (sehingga memperburuk penurunan intravaskular yang melekat dalam kondisi ini). Jika digunakan dalam jangka panjang, penurunan volume plasma dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan pada janin, meskipun tampaknya tidak secara signifikan mengurangi volume cairan amnion [34]. Furosemide tampaknya tidak bersifat teratogenik.

Spirolakton adalah antagonis aldosteron yang menyebabkan retensi kalium. Tidak tampak teratogenik [15]; Namun, pengalaman terbatas sehingga relatif dikontraindikasikan pada kehamilan. Spironolactone dikenal memiliki efek anti-androgenik dan secara teoritis dapat menyebabkan feminisasi janin laki-laki, meskipun hal ini belum pernah dilaporkan.

Amiloride langsung mempengaruhi tubular transportasi dan merupakan diuretik kalium hemat. Tidak tampak teratogenik [15]. Namun, seperti spironolactone, data yang kurang dan obat merupakan kontraindikasi relatif pada kehamilan.

## Anti-arrhythmics

Aritmia ringan dan palpitasi tampaknya lebih umum pada kehamilan tetapi umumnya tidak perlu diobati. Namun, jika efektivitas jantung sebagai pompa menjadi terganggu, pengobatan penting. Anti-arrhythmics tersebut diatur dalam kelas (1A, 1B, 1C, 2, 3 dan 4) sesuai dengan pengaruhnya terhadap konduksi listrik di jantung dan aritmia yang mereka digunakan [35].

1. Kelas 1A - Ini termasuk Disopiramid, quinidine dan procainamide.  
Dua yang terakhir digunakan relatif umum pada kehamilan dan tidak tampak teratogenik [15]. Pada dosis tinggi, quinidine memiliki efek oxytoxic dan dapat menyebabkan aborsi [36], tetapi dalam dosis terapi tampaknya aman.
2. Kelas 1B - Ini termasuk lidokain, fenitoin dan lain-lain. Lidocaine tidak memiliki efek teratogenik, tetapi toksisitas lidokain ibu (misalnya, hipertermia) juga dapat menyebabkan toksisitas janin [37]. Efek teratogenik fenitoin pertama kali diakui tahun 1964 [38] dan dijelaskan pada Bab 9
3. Kelas 1C - flekainid telah digunakan untuk mengobati aritmia janin; tidak tampak teratogenik atau fetotoksik pada manusia.
4. Kelas 2  $\beta$ -blocker - ini telah dipertimbangkan sebelumnya.
5. Kelas 3 - Ini termasuk amiodaron, bretylium dan sotalol  $\beta$ -blocker. Amiodarone telah digunakan baik untuk aritmia ibu dan janin. Meskipun berisi tingkat tinggi yodium dan dapat menyebabkan goiter kongenital atau hipotiroidisme [39], ini tampaknya bersifat sementara [15]. Namun demikian, sebagai data terbatas, amiodaron seharusnya tidak menjadi obat lini pertama dalam kehamilan, baik untuk

aritmia ibu atau untuk kasus-kasus rumit takikardia supraventricular janin (SVT). Sotalol telah digunakan baik untuk aritmia ibu dan janin. Seperti  $\beta$ -bloker lainnya, ia memiliki potensi untuk menyebabkan IUGR, sehingga USG serial ditunjukkan. Sotalol efektif dalam fibrilasi atrium janin (AF), tetapi dalam SVT janin Gambar kematian tinggi dan tingkat konversi yang rendah, sehingga risiko tampaknya lebih besar daripada manfaatnya. Untuk pengobatan ibu, risiko dan manfaat harus dipertimbangkan secara individual [40,41].

6. Kelas 4 - Ini termasuk antagonis kalsium diltiazem dan verapamil. Kelas obat telah dibahas sebelumnya.

### Kardioversi Listrik

Kardioversi arus searah tampaknya aman dan efektif dalam kehamilan. Penggunaannya telah dilaporkan dalam kehamilan untuk pengobatan AF, atrial flutter dan tahan terhadap terapi obat [35,40] takikardia atrium.

### Digoxin

Digoxin telah berhasil digunakan untuk mengontrol gagal jantung, atrial flutter dan fibrilasi, dan tidak ada efek buruk pada janin telah dilaporkan mengikuti dosis terapi pada kehamilan. Digoxin bebas melintasi plasenta [42] dan telah terbukti efektif dalam mengobati SVT janin dalam rahim [43-45]. Tingkat digoxin harus dimonitor selama kehamilan sebagai toksisitas ibu dapat berakibat fatal bagi janin; Selanjutnya, *clearance* ginjal meningkat sebagai kemajuan kehamilan, sehingga dosis mungkin perlu ditingkatkan.

## **Nitrat.**

Kelompok ini mencakup gliseril trinitrat, isosorbid mononitrat dan isosorbid dinitrate. Umumnya digunakan sebagai dilator koroner pada penyakit jantung iskemik, mereka juga telah digunakan sebagai tokolitik. Data Kehamilan terbatas, meskipun penggunaannya diharapkan meningkat sebagai usia rata-rata kehamilan, dan karenanya kejadian penyakit jantung iskemik, naik. Namun, mereka tampaknya aman; hipotensi transien sesekali pada ibu tidak muncul parah cukup untuk secara signifikan mempengaruhi perfusi plasenta [15].

## **Antikoagulan**

Banyak wanita dengan penyakit jantung pada kehamilan akan memerlukan baik thromboprophylaxis atau antikoagulasi penuh. Antikoagulan pada kehamilan dijelaskan secara rinci dalam Bab 4.

## **Poin-poin penting**

- Dalam kehamilan, diuretik pilihan adalah tiazid dan furosemid.
- Aritmia yang paling umum dalam kehamilan adalah SVT.
- Adenosine dapat digunakan untuk mengakhiri SVT pada kehamilan.
- Kardioversi aman pada kehamilan.
- Digoxin aman dan tingkat maternal efektif untuk AF, tetapi beracun dapat fatal bagi janin.

## **Referensi**

1. Schardein JL. **Chemically-Induced Birth Defects, 4th edition.** New York: Marcel Dekker; 2000.
2. Redman CWG, Beilin LJ, Bonnar J. **Treatment of**

- hypertension in pregnancy with methyldopa: blood pressure control and side effects. *Br J Obstet Gynaecol* 1977;84:419-26.**
3. Jones HMR, Cummings AJ, Setchell KDR, Lawson AM. **A study of the deposition of  $\alpha$ -methyldopa in newborn infants following its administration to the mothers for the treatment of hypertension during pregnancy. *Br J Clin Pharmacol* 1979;7:433-40.**
  4. Whitelaw A. **Maternal methyldopa treatment and neonatal blood pressure. *Br Med J* 1981;283:471.**
  5. Ounsted M, Cockburn J, Moar VA, Redman CWG. **Maternal hypertension with superimposed preeclampsia: effects on child development at 7 1/2 years. *Br J Obstet Gynaecol* 1983;90:644-9.**
  6. Marlettini MG, Crippa S, Morselli-Labate AN, et al. **Randomized comparison of calcium antagonists and  $\beta$ -blockers in the treatment of pregnancy-induced hypertension. *Curr Ther Res* 1990;48(4):684-92.**
  7. Orlandi C, Marlettini MG, Cassani A, et al. **Treatment of hypertension during pregnancy with the calcium antagonist verapamil. *Curr Ther Res* 1986;39(6):884-93.**
  8. Chidress CH, Katz VL. **Nifedipine and its indications in obstetrics and gynecology. *Obstet Gynecol* 1994;83:616-24.**
  9. Carbonne B, Jannet D, Touboul C, Khelifati Y, Milliez J. **Nicardipine treatment of hypertension during pregnancy. *Obstet Gynecol* 1993;81:908-14.**
  10. Allen J, Maigaard S, Forman A, et al. **Acute**

- effects of nitrendipine in pregnancy-induced hypertension. *Br J Obstet Gynaecol* 1987;94: 222-6.
11. Wide-Svensson DH, Ingemarsson I, Lunell N, et al. Calcium channel blockade (isradipine) in treatment of hypertension in pregnancy: a randomised placebocontrolled study. *Am J Obstet Gynecol* 1995;173: 872-8.
  12. Magee LA, Schick B, Donnemfield AE, et al. The safety of calcium channel blockers in human pregnancy: a prospective multicenter cohort study. *Am J Obstet Gynecol* 1996;174:823-8.
  13. Waisman GD, Mayorga LM, Camera MI, Vignolo CA, Martinotti A. Magnesium plus nifedipine: potentiation of hypotensive effect in pre-eclampsia? *Am J Obstet Gynecol* 1988;159:308-9.
  14. The Magpie Trial Collaborative Group. Do women with pre-eclampsia, and their babies, benefit from magnesium sulphate? The Magpie Trial: a randomised placebo-controlled trial. *Lancet* 2002;359:1877-90.
  15. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. *Drugs in Pregnancy and Lactation, 5th edition*. Baltimore: Williams and Wilkins; 1998.
  16. Easterling TR, Brateng D, Schmucker B, Brown Z, Millard SP. The prevention of pre-eclampsia; a randomized trial of atenolol in hyperdynamic patients before onset of hypertension. *Obstet Gynecol* 1999;93: 725-33.
  17. Butters L, Kennedy S, Rubin PC. Atenolol in essential hypertension during pregnancy. *Br Med J* 1990;301:587-9.
  18. Lydakakis C, Lip GY, Beavers M, Beavers DG. Atenolol and fetal growth in pregnancies complicated by hypertension. *Am J Hypertens*

- 1999;12:541-7.
19. Magee LA, Duley L. Oral beta-blockers for mild to moderate hypertension during pregnancy. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2003; Issue 3: Art No CD002863.
  20. von Dadelszen P, Ornstein MP, Bull SB, Logan AG, Koren G, Magee LA. Fall in mean arterial pressure and fetal growth restriction in pregnancy hypertension: a meta-analysis. *Lancet* 2000;355:87-92.
  21. Reynolds B, Butters L, Evans J, Adama T, Rubin PC. First year of life after the use of atenolol in pregnancy-associated hypertension. *Arch Dis Child* 1984;59:1061-3.
  22. Rubin PC, Butters L, Kelman AW, Fitzsimons C, Reid JL. Labetalol disposition and concentration - effect relationships during pregnancy. *Br J Clin Pharmacol* 1983;15:465-70.
  23. Cooper WO, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG, et al. Major congenital malformations after first-trimester exposure to ACE inhibitors. *N Engl J Med* 2006;354:2443-51.
  24. Brent RL, Beckman DA. Angiotensin-converting enzyme inhibitors: an embryopathic class of drugs with unique properties: information for clinical teratology counsellors. *Teratology* 1991;43:543-6.
  25. Saji H, Yamanaka M, Hagiwara A, Ijira R. Losartan and fetal toxic effects. *Lancet* 2001;357:363.
  26. Lubbe WF, Hodge JV. Combined alpha and beta receptor antagonism with prazosin and oxprenolol in control of severe hypertension in pregnancy. *N Z Med J* 1981;94:169-72.

27. Spinnato JA, Sibai BM, Anderson GD. **Fetal distress after hydralazine therapy for severe pregnancy-induced hypertension.** *South Med J* 1986;79:559-62.
28. Eclampsia Trial Collaborative Group. **Which anticonvulsant for women with eclampsia? Evidence from the Collaborative Eclampsia trial.** *Lancet* 1995;345:1455-63.
29. Rubin PC. **Aspirin and preeclampsia.** *Curr Obstet Gynaecol* 1994;4: 166-9.
30. Sibai BM, Caritis S, Thom E. **Prevention of preeclampsia with low dose aspirin in healthy, nulliparous pregnant women.** *N Engl J Med* 1993;329:1213-9.
31. CLASP Collaborative group. **CLASP: a randomised trial of low dose aspirin for the prevention and treatment of preeclampsia among 9364 pregnant women.** *Lancet* 1994;343:619-29.
32. Askie LM, Duley L, Henderson-Smart DJ, on behalf of the PARIS Collaborative Group. **Antiplatelet agents for the prevention of preeclampsia: a meta-analysis of individual patient data.** *Lancet* 2007;369:1791-8.
33. Poston L, Briley AL, Seed PT, Kelly FJ, Shennan AH. **Vitamin C and vitamin E in pregnant women at risk for pre-eclampsia (VIP trial): randomised placebo-controlled trial.** *Lancet* 2006;367:1145-54.
34. Votta RA, Parada OH, Windgrad RH, Alvarez OH, Tomassinni TL, Patoria A. **Furosemide action on the creatinine concentration of amniotic fluid.** *Am J Obstet Gynecol* 1975;123:621-4.
35. Jogler JA, Page RL. **Treatment of cardiac arrhythmias during pregnancy.** *Drug Saf*

- 1999;20:85-94.
36. Rotmensch HH, Rotmensch S, Elkayam U. Management of cardiac arrhythmias during pregnancy: current concepts. *Drugs* 1987;33:623-33.
  37. Macaulay JH, Bond K, Steer PJ. Epidural analgesia in labor and fetal hyperthermia. *Obstet Gynecol* 1992;80:665-9.
  38. Janz D, Fuchs V. Are anti-epileptic drugs powerful when given during pregnancy? *Ger Med Monogr* 1964;9:20-3.
  39. Grosso S, Berardi R, Cioni M, Morgese G. Transient neonatal hypothyroidism after gestational exposure to amiodarone: a follow-up of two cases. *J Endocrinol Invest* 1998;21:699-702.
  40. Oudijk MA, Michon MM, Kleinman CS, et al. Sotalol in the treatment of fetal dysrhythmias. *Circulation* 2000;101:2721-6.
  41. Brown CEL, Wendel GD. Cardiac arrhythmias during pregnancy. *Clin Obstet Gynecol* 1989;32:89-102.
  42. Chan V, Tse TF, Wong V. Transfer of digoxin across the placenta and into breast milk. *Br J Obstet Gynaecol* 1978;85:605-9.
  43. Harrigan JT, Kangos JT, Sikka A, et al. Successful treatment of fetal congestive heart failure secondary to tachycardia. *N Engl J Med* 1981;304:1527-9.
  44. Hsieh Y, Lee C, Chang C, Tsai H, Yeh L, Tsai C. Successful prenatal digoxin therapy for Ebstein's anomaly with hydrops fetalis. A case report. *J Reprod Med* 1998;43:710-2.
  45. Tikanoja T, Kirkinen P, Nikolajev K, Eresmaa L, Haring P. Familial atrial fibrillation with fetal onset. *Heart* 1



## BAB 6

# PENGOBATAN PENYAKIT ENDOKRIN

*Anastasios gazis*

Bab ini mengulas pengobatan tiroid, biasa dan gangguan adrenal pituitary yang dapat mempersulit kehamilan.

### Kelenjar tiroid

Wanita yang sehat biasanya memiliki 10-20 g dari jaringan tiroid dan - quires harian asupan sekitar 50 mcg dari iodin untuk mencegah goitre (pembesaran tiroid). Minimal 150 mcg setiap hari umumnya merekomendasikan untuk mendukung produksi hormon tiroid yang memadai. Dalam kelenjar tiroid, sel follicular perangkap iodida dan trans-pelabuhan itu untuk koloid inti. Di sini, peroxidase tiroid catalyses oksidasi dan lampiran iodida untuk tyrosyl residu dari thy-roglobulin dari mana hormon tiroid yang dihasilkan. Approximately 100 mcg dari thyroxine (t4-dengan residu empat iodida) dan 30 mcg dari tri-iodothyronine (t3-dengan residu tiga iodida) dilepaskan dari kelenjar tiroid setiap hari di bawah *thyroid-stimulating hormone* (TSH). TSH mengatur penangkapan iodida dan pelepasan hormon tiroid. Sebuah erat diatur loop berumpan balik menanggapi konsentrasi hormon tiroid perifer dan mengontrol pelepasan TSH dari kelenjar hipofisis anterior.

Kurang dari 0,5% hormon tiroid yang beredar adalah "bebas" dalam sirkulasi perifer dan tersedia untuk segera digunakan. Sekitar-lebih 80% terikat globulin pengikat tiroid (TBG), 10% untuk transthyretin dan 10% untuk albumin. Terikat hormon tiroid bertindak sebagai penyangga untuk

menjamin pasokan siap hormon tiroid gratis untuk semua jenis sel. T<sub>4</sub>, hormon tiroid terbanyak beredar, adalah de-iodinated untuk T<sub>3</sub>, yang bertindak atas transkripsi untuk mengatur transcriptional perubahan dalam sel.

### **Fisiologi tiroid pada kehamilan**

Pengiriman plasental ibu hormon tiroid yang diperlukan untuk perkembangan janin yang normal, khususnya untuk mengembangkan intelektual. Meskipun tiroid janin mulai berfungsi pada 10-12 minggu kehamilan, sintesis hormon tiroid hanya dari 18 sampai 20 minggu kehamilan. Keluaran meningkat terhadap istilah [1] tetapi kebanyakan beredar janin hormon tiroid maternally berasal bahkan pada trimester ketiga.

Selama trimester pertama, ada dua perubahan signifikan fisiologi ibu tiroid. Pertama, estrogen merangsang produksi globulin (TBG) tiroksin mengikat dan menghambat para mantan-cretion. Resultant dekat menggandakan TBG ini dikaitkan dengan peningkatan signifikan konsentrasi total beredar T<sub>4</sub> dan T<sub>3</sub> tetapi sedikit perubahan dalam tingkat hormon gratis [2]. Kedua, human chorionic Gonadotropin (hCG) agonis lemah dari TSH re-ceptor dan jadi merangsang produksi dan pelepasan tiroid hormones. hCG konsentrasi puncak menjelang akhir trimester pertama, yang menyebabkan hipertiroidisme ringan sementara di 10-20% perempuan. Seperti perubahan fisiologis, tidak membutuhkan pengobatan pada umumnya.

### **Hipotiroidisme pada kehamilan**

Hypothyroidism ibu adalah terkait dengan komplikasi obstetrik seperti pengiriman kecil dan janin kerugian. Ketersediaan hormon tiroid ibu yang memadai dan plasental

hormon tiroid mentransfer sangat penting bagi perkembangan janin normal.

Identifikasi paling awal dari hubungan antara status tiroid ibu dan perkembangan intelektual janin berasal dari daerah mana endemik yodium defisiensi dengan hipotiroidisme ibu dan janin dikaitkan dengan mendalam neurologis defisit pada bayi. Bandara mendalam CITS fi de absent pada bayi sejak lahir hipotiroid yang lahir dari ibu eutiroid. Namun, konsentrasi hormon tiroid rendah pada ibu gratis di akhir trimester pertama dikaitkan dengan perkembangan psikomotor yang buruk pada bayi [3]. Eksposur yang tidak memadai untuk tiroksin pada trimester kedua dan ketiga kehamilan (dan fi beberapa bulan pertama setelah kelahiran) juga dikaitkan dengan signifikan cacat intelektual dan kadang-kadang neurologis. Sebuah penelitian yang mengamati perkembangan intelektual anak berusia 7 tahun yang lahir dari ibu dengan TSH tinggi (rata-rata 13,2 uL) tapi T4 normal selama kehamilan menunjukkan bahwa 1 dari 5 kelompok ini memiliki IQ kurang dari 85 dibandingkan dengan 1 dalam 20 dari kontrol kelompok dengan TSH yang normal [4].

Pada wanita yang diobati dengan tiroksin untuk hipotiroidisme, perubahan fisiologis kehamilan memerlukan peningkatan suplementasi hormon tiroid [5] sekitar sepertiga. Dalam sebuah penelitian, usia kehamilan awal di mana peningkatan dosis hormon tiroid yang diperlukan adalah 5 minggu, dengan median 8 minggu [6]. Dosis meningkat dataran tinggi di sekitar 16 minggu kehamilan. Rekomendasi saat ini adalah untuk mempertahankan TSH ibu antara 0,5 dan 2,0 uL. Kehamilan di mana persyaratan tiroksin meningkat dan besarnya peningkatan yang diperlukan seringkali diremehkan. Oleh karena itu beberapa penulis merekomendasikan peningkatan tiroksin ibu dari 25-

50 mcg setiap hari segera setelah kehamilan dikonfirmasi [7].

Terapi tiroksin yang tidak memadai hipotiroidisme maternal umumnya dianggap sebagai penyebab utama sindrom hipotiroidisme janin. Namun, penelitian di Amerika Serikat [8] dan negara-negara lain menunjukkan bahwa defisiensi asupan yodium ibu dapat berkontribusi untuk ketidakmampuan ibu eutiroid tampak sehat untuk meningkatkan dengan produksi tiroksin untuk kehamilan. Di negara-negara seperti Jepang di mana diet yang dilengkapi yodium, kurang dari 0,5% dari wanita hamil mengalami peningkatan TSH, sedangkan di Amerika Serikat, prevalensi adalah sekitar 2,5%. Ibu defisiensi yodium dikaitkan dengan penurunan rasio T4 ke T3 yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid ibu. Meskipun ini mempertahankan TSH ibu normal, otak janin sebagian besar tergantung pada deiodinasi T4 ibu untuk pasokan dari T3. Ibu yodium defisiensi dapat menutupi hipotiroidisme janin relatif.

Pencegahan hipotiroidisme janin memerlukan asupan yodium dan pengobatan kasus hipotiroidisme yang tersisa pada wanita usia subur, baik preconceptionally dan melalui kehamilan.

### **Hipertiroidisme pada kehamilan**

Hipertiroidisme mempengaruhi sekitar 0,2% dari kehamilan. Signifikan hipertiroidisme ibu membutuhkan perawatan karena terkait dengan peningkatan angka kematian janin, hambatan pertumbuhan, hidrops janin, dan preeklamsia. Penyebab paling umum adalah penyakit Graves, meskipun setiap penyebab hipertiroidisme dapat terjadi pada kehamilan. Strategi diagnostik dan terapeutik dibatasi oleh kebutuhan mutlak untuk menghindari

radioisotop, untuk menghindari operasi jika mungkin dan untuk meminimalkan risiko bahaya iatrogenik lainnya.

### **hCG dan tiroid**

Peningkatan fisiologis di hCG pada trimester pertama dari kehamilan mungkin berhubungan dengan tirotoksikosis ibu sementara dan biasanya tidak memerlukan pengobatan. Hiperemesis gravidarum dapat berhubungan dengan tingkat yang sangat tinggi dari hCG. Tirotoksikosis terkait mungkin memerlukan pengobatan, meskipun dosis rendah obat antitiroid biasanya yang mencukupi. Hal ini kemudian harus ditarik dengan cepat sebagai hiperemesis menyelesaikan. Penyakit trofoblas gestasional juga berhubungan dengan serum yang tinggi hCG, mual, muntah dan tirotoksikosis.

### **Penyakit Graves**

Penyakit Graves disebabkan oleh stimulasi reseptor TSH thyroidal ibu oleh antibodi dari ibu berasal. Namun, saat kehamilan berlanjut, tirotoksikosis Graves biasanya membaik dan dosis obat antitiroid dapat dikurangi. Sekitar sepertiga dari wanita mampu menghentikan obat antitiroid pada trimester ketiga kehamilan [9]. Tidak pasti mengapa titer maternal antibodi yang berasal merangsang baik menurun atau diimbangi oleh peningkatan titer antibodi TSH-reseptor blocking maternal [10].

Tirotoksikosis janin mempengaruhi sekitar 1% dari ibu dengan penyakit Graves. Merangsang dan memblokir antibodi kedua melewati plasenta dan dapat menyebabkan tirotoksikosis janin atau hipotiroidisme setelah reseptor TSH janin menjadi aktif pada sekitar 20 minggu kehamilan. Titer antibodi tiroid ibu dapat bertahan meskipun pengobatan

obat antitiroid atau ibu antenatal ablasi tiroid. Euthyroidism ibu tidak menjamin euthyroidism janin, dan kewaspadaan untuk hipertiroidisme janin atau neonatus diperlukan. Jika TSH-reseptor antibodi titer maternal negatif, janin tampaknya tidak beresiko.

### **Postpartum tiroiditis**

Sampai dengan 10% dari wanita mengalami postpartum tiroiditis. Secara karakteristik, ini dimulai segera setelah melahirkan dan dapat bertahan selama 12-18 bulan. Sebuah periode hipertiroidisme diikuti oleh salah euthyroidism atau periode hipotiroidisme sebelum pembangunan kembali negara eutiroid. Beberapa wanita memerlukan  $\beta$ -blokade untuk melawan gejala adrenergik selama fase thyrotoxic dan beberapa memerlukan perawatan tiroksin untuk melawan gejala hipotiroid. Secara umum, pengobatan tiroksin meruncing lebih dari 6 bulan untuk menentukan apakah hipotiroidisme permanen. Hal ini dapat terjadi jika, misalnya, hipotiroidisme tidak karena tiroiditis postnatal, tetapi diagnosis alternatif seperti tiroiditis Hashimoto.

### **Pilihan obat antitiroid pada kehamilan**

Jika obat antitiroid digunakan, itu harus pada dosis terendah dan untuk durasi sesingkat mungkin. Ibu TSH harus dipertahankan ke bagian bawah kisaran referensi dan T4 ke arah atas sebagai tirotoksikosis ringan kurang berbahaya bagi perkembangan janin dari hipotiroidisme. Sebagai obat antitiroid melewati plasenta, penilaian sering status tiroid ibu mungkin 4-6 minggu diperlukan untuk meminimalkan dosis obat antitiroid dan mengurangi risiko hipotiroidisme janin iatrogenik. 'blok dan mengganti' rejimen tidak dapat digunakan karena transfer transplasenta dari obat antitiroid.

Tidak ada percobaan prospektif acak yang besar pada kehamilan yang membandingkan obat thionamide, propiltiourasil dan karbimazol (methimazole). Data yang tersedia [11] menunjukkan bahwa meskipun kedua obat melewati plasenta, fungsi tiroid janin saat lahir tidak berbeda apakah propiltiourasil atau karbimazol telah digunakan [12]. Dua cacat bawaan telah menimbulkan kekhawatiran pada bayi terkena narkoba thionamide. Yang pertama, aplasia kutis adalah cacat bawaan ringan ditandai dengan lesi kulit kecil satu atau beberapa pada kulit kepala janin. Hal ini terjadi secara spontan pada sekitar 1 dari 2.000 kelahiran dan ada laporan kasus pada sekitar 1 dari 2.000 methimazole [13], tetapi tidak ada di bayi terkena propiltiourasil. Kedua, atresia choanal atau esofagus ditemukan pada 2 dari 241 bayi yang terpajan methimazole selama kehamilan dalam sebuah studi [14]. Setidaknya satu kasus atresia choanal telah dilaporkan pada bayi yang ibunya terkena propiltiourasil [11]. Meskipun kurangnya data yang kuat, propiltiourasil menjadi obat pilihan pada kehamilan. Dimana propiltiourasil tidak tersedia atau tidak dapat digunakan untuk alasan apapun, karbimazol (methimazole) adalah alternatif yang dapat diterima.

Thionamides diekskresikan dalam ASI, methimazole ke tingkat yang lebih besar daripada propiltiourasil. Namun, jumlah yang terlalu rendah untuk mempengaruhi fungsi tiroid bayi atau pengembangan intelektual [15] dan keduanya dapat digunakan pada ibu menyusui.

### **Kelenjar adrenal Hipoadrenalisme**

Primer (adrenal) hipoadrenalisme merupakan penyebab tersering dari hypoadrenalism pada kehamilan dan umumnya membutuhkan perawatan sebelum konsepsi

mungkin. Hal ini biasanya berhubungan dengan mineralokortikoid defisiensi yang memerlukan penggantian dengan mineralokortikoid sintetik kuat, fludrocortisone.

Glukokortikoid dan mineralokortikoid penggantian biasanya tidak memerlukan penyesuaian selama kehamilan. Beberapa wanita memerlukan penyesuaian ke atas sederhana penggantian glukokortikoid pada trimester ketiga. Buruh dan pengiriman mengerahkan yang mencukupi stres fisiologis untuk memerlukan pengobatan glukokortikoid tambahan. Hal ini biasa untuk memberikan 100 mg hidrokortison intramuskular pada di set tenaga kerja. Jika persalinan yang berkepanjangan, infus saline terus menerus dengan 25-50 mg hidrokortison setiap 6 jam mungkin diperlukan. Dosis glukokortikoid harus dua kali lipat selama 24-48 jam setelah melahirkan dan kemudian dengan cepat meruncing ([http://www.adshg.org.uk/comms/publications/surgicalguidelines colour.pdf](http://www.adshg.org.uk/comms/publications/surgicalguidelines%20colour.pdf)).

### **Hiperplasia adrenal kongenital**

Glukokortikoid dan mineralokortikoid pengobatan pada wanita yang memiliki hiperplasia adrenal kongenital umumnya tidak memerlukan penyesuaian melalui kehamilan. Ada sedikit bukti untuk mendukung penilaian berulang dari ibu androgen profile untuk menyesuaikan pengobatan sebagai janin dilindungi dari androgen maternal oleh aromatase plasenta.

Pada pengiriman, pengobatan glukokortikoid harus disesuaikan dengan cara yang sama seperti untuk wanita yang membutuhkan suplemen untuk hipoadrenalisme primer. Pada beberapa wanita dengan hiperplasia adrenal kongenital, pengiriman vagina dapat menyebabkan kerusakan signifikan tidak bisa ke jalan lahir jika tidak

anatomis normal atau operasi jika telah ada sebelumnya. Operasi caesar elektif mungkin lebih baik dalam ibu-ibu ini.

## **Kelenjar pituitari**

### **Hipopituitarisme**

Hipopituitarisme tidak menghalangi kehamilan, tetapi kurangnya gonadotropin mencegah ovulasi normal. Persiapan kehamilan harus mencakup penghentian pengobatan hormon pertumbuhan sebagai efek pada janin tidak pasti. Induksi ovulasi dan/atau dibantu konsepsi yang diperlukan untuk membangun kehamilan. Unit fetoplasenta kemudian relatif mandiri berkesinambungan, meskipun penggantian dan penyesuaian hormon tiroid dan glukokortikoid ibu diperlukan seperti pada wanita dengan hipoadrenalisme primer dan hipotiroidisme. Hipopituitarisme dikaitkan dengan tidak terdeteksi atau rendah TSH dan menghalangi penggunaannya dalam menilai kecukupan penggantian.

### **Prolaktinoma**

Hiperprolaktinemia biasanya membutuhkan pengobatan untuk mengizinkan ovulasi dan pembuahan. Prolaktinoma juga berhubungan dengan risiko pada ibu dari pembesaran adenoma dan/atau hipofisis dan pada tingkat lebih rendah, janin dari obat dopaminergik.

Kehamilan normal dikaitkan dengan dua kali lipat perkiraan dalam ukuran hipofisis. Pada ibu, negara hyperoestrogenic kehamilan khusus lagi merangsang ekspansi prolactinsecreting sel (lactotrophs). Dalam seorang wanita dengan prolaktinoma, hal ini dapat menyebabkan sakit kepala atau gejala tekanan yang lebih serius seperti hormon sekunder defisiensi atau kehilangan penglihatan jika ada pembesaran suffisien.

Sebuah microprolactinoma (<10 mm diameter) sangat tidak mungkin menyebabkan masalah permanen atau serius. Risiko gejala seperti sakit kepala pada ibu adalah dari urutan 1 atau 2% dan kehilangan penglihatan atau sekunder hormon defisiensi sangat tidak mungkin. Hal ini biasa untuk meninjau ibu selama trimester setiap untuk menilai secara klinis gejala ekspansi. Apabila perluasan prolaktinoma menyebabkan gejala tekanan serius, agonis dopamin digunakan, tetapi ini akan menjadi dengan mengorbankan menyusui karena produksi susu bergantung pada kenaikan fisiologis normal prolaktin ibu.

Sebuah macroprolactinoma (>10 mm diameter) membawa risiko yang lebih besar dari masalah selama kehamilan. Sekitar 40% dari ibu mengembangkan gejala tekanan dan 25% atau lebih mengembangkan gangguan penglihatan. Dimana kehamilan diinginkan, ibu harus ditangani sebelum kehamilan untuk mengecilkan adenoma sebanyak mungkin. Agen dopaminergik biasanya dihentikan, setelah kehamilan confirmed. Sang ibu membutuhkan pemantauan secara cermat. Ladang Visual biasanya dinilai setiap trimester dan hipofisis MRI memerintahkan jika ada signi fi gejala atau tanda-tanda tidak bisa. Terapi dopaminergik mungkin perlu di-restart. Operasi hipofisis pada kehamilan harus dihindari, jika mungkin.

Risiko pada janin dari obat dopaminergik digunakan untuk mengobati hiperprolaktinemia minimal jika dihentikan setelah kehamilan confirmed. Obat dopaminergik bromocriptine atau cabergoline umumnya lebih disukai pada wanita yang dapat menjadi hamil. Data dari 1.410 kehamilan menunjukkan bahwa risiko aborsi spontan dan malformasi janin tidak meningkat pada wanita yang mengambil bromocriptine selama bulan pertama kehamilan [16]. Data serupa ada dari penelitian yang lebih

kecil dari wanita yang mengambil garis cabergo untuk pertama bulan kehamilan [17]. Bromokriptin umumnya digunakan sebagai baris pertama dan kabergolin sebagai terapi lini kedua. Pergolide tidak digunakan karena dapat berhubungan dengan cacat katup jantung.

### Referensi

1. Thorpe-Beeston J, Nicolaides K, Felton C, Butler J, McGregor A. **Maturation of the secretion of thyroid hormone and thyroid-stimulating hormone in the fetus.** *N Engl J Med* 1991;324:532-6.
2. Burrow GN, Fisher DA, Larsen PR. **Maternal and fetal thyroid function.** *N Engl J Med* 1994;331:1072-8.
3. Pop VJ, Kuijpers JL, van Baar AL, et al. **Low maternal free thyroxine concentrations during early pregnancy are associated with impaired psychomotor development in infancy.** *Clin Endocrinol* 1999;50:149-55.
4. Haddow JE, Palomaki GE, Allan WC, et al. **Maternal thyroid deficiency during pregnancy and subsequent neuropsychological development of the child.** *N Engl J Med* 1999;341:549-55.
5. Mandel S, Larsen P, Seely E, Brent G. **Increased need for thyroxine during pregnancy in women with primary hypothyroidism.** *N Engl J Med* 1990;323:91-6.
6. Alexander EK, Marqusee E, Lawrence J, Jarolim P, Fischer GA, Larsen PR. **Timing and magnitude of increases in levothyroxine requirements during pregnancy in women with hypothyroidism.** *N Engl J Med* 2004;351:241-9.
7. Toft A. **Increased levothyroxine requirements in pregnancy - why, when, and how much?** *N Engl J Med* 2004;351:292-4.

8. Hollowell JG, Staehling NW, Hannon WH, et al. **Iodine nutrition in the United States. Trends and public health implications: iodine excretion data from National Health and Nutrition Examination Surveys I and III (1971-1974 and 1988-1994).** *J Clin Endocrinol Metab* 1998;**83**:3401-8.
9. Weetman AP. **Graves' Disease.** *N Engl J Med* 2000;**343**:1236-48.
10. Kung AWC, Jones BM. **A change from stimulatory to blocking anti-body activity in Graves' disease during pregnancy.** *J Clin Endocrinol Metab* 1998;**83**:514-8.
11. Cheron RG, Kaplan MM, Larsen PR, Selenkow HA, Crigler JF. **Neonatal thyroid function after propylthiouracil therapy for maternal Graves' disease.** *N Engl J Med* 1981;**304**:525-8.
12. Momotani N, Noh J, Oyanagi H, Ishikawa N, Ito K. **Antithyroid drug therapy for Graves' disease during pregnancy. Optimal regimen for fetal thyroid status.** *N Engl J Med* 1986;**315**:24-8.
13. Mandel SJ, Brent GA, Lasson PR. **Review of antithyroid drug use during pregnancy and report of a case of aplasia cutis.** *Thyroid* 1994;**4**:129-33.
14. Di Gianantonio E, Schaefer C, Mastroiacovo P, et al. **Adverse effects of prenatal methimazole exposure.** *Teratology* 2001;**64**:262-6.
15. Azizi F, Khoshniat M, Bahrainian M, Hedayati M. **Thyroid function and intellectual development of infants nursed by mothers taking methimazole.** *J Clin Endocrinol Metab* 2000;**85**:3233-8.
16. Turkalj I, Braun P, Krupp P. **Surveillance of bromocriptine in pregnancy.** *JAMA* 1982;**247**:1589-91.
17. Robert E, Musatti L, Piscitelli G, Ferrari CI. **Pregnancy outcome after treatment with the ergot derivative, cabergoline.** *Reprod Toxicol* 1996;**10**: 333-7

## **BAB 7**

# **OBAT-OBATAN PENYAKIT REMATIK SELAMA KEHAMILAN**

Mary Gayed, Caroline Gordo

### **Pendahuluan**

Banyak penyakit reumatologik akan muncul pada wanita selama usia reproduksi. Hal ini sering memerlukan penggunaan terapi antirematik untuk memungkinkan penyakit tersebut terkontrol, dan kehamilan dapat dicapai hingga cukup bulan. Meskipun kecenderungan alami pasien untuk mengurangi atau menghentikan obat-obatan sebanyak mungkin selama kehamilan dan menyusui, aktivitas penyakit harus dikontrol dan terapi obat harus dikurangi untuk ibu dengan dosis minimum yang memberikan risiko yang minimal untuk ibu dan bayi tetapi tanpa risiko kejadian buruk akibat penyakit tersebut. Pasien membutuhkan konseling pra-kehamilan untuk memastikan bahwa mereka mengkonsumsi obat-obatan yang tepat sebelum dan selama awal kehamilan. Nasehat harus mencakup tentang risiko penyakit dan komplikasi yang mungkin terjadi dalam kehamilan dan konsekuensinya untuk ibu dan bayi.

### **Analgetik**

Analgesik sederhana yang digunakan untuk nyeri muskuloskeletal dan mudah diperoleh tanpa peresepan. Mereka digunakan dalam kehamilan oleh wanita terlepas dari apakah mereka memiliki atau tidak memiliki penyakit rematik dan sepenuhnya dijelaskan dalam Bab 2 dan diringkas dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1 risiko obat-obatan yang digunakan dalam penyakit rematik untuk kehamilan dan menyusui

Penggunaan utama dalam penyakit rematik	Resiko janin	Kontraindikasi pada kehamilan	Kontraindikasi dalam masa menyusui kesuburan	Penurunan	
	<i>Analgesic, anti-in</i>	<i>Antithrombotic drug</i>			
Paracetamol	Analgesia	Mungkin	Tidak	Tidak	Tidak diketahui
Codeine	Analgesia	Pernapasan depresi, Sindrom withdrawal	Tidak ada-hati-hati diperlukan	Tidak ada-hati-hati diperlukan	Tidak diketahui
Aspirin	Antithrombotic	Risiko sangat rendah dengan dosis kecil, dosis tinggi terkait dengan perdarahan neonatal dan hipertensi pulmonal	Tidak ada-direkomendasikan dosis rendah	Tidak ada-direkomendasikan dosis rendah	Tidak diketahui
Heparin and low-molecular-weight heparin	Antithrombotic	Tidak ada bukti	Tidak	Tidak	Tidak diketahui
NSAIDS (secara umum)	Analgesia	Akhir kehamilan-penyempitan ductus arteriosus	Hati-hati diperlukan dalam posisi dan trimester ketiga	Lihat di bawah	Penghambatan Silia dalam tabung falopi

Ibuprofen

Contoh NSAID ringan

Akhir kehamilan-  
penyempitan ductus  
arteriosis

Hati-hati diperlukan  
dalam posisi dan  
trimester ketiga

Tidak ada-dosis  
rendah

Kasus  
penghambatan  
folikel pecah

Tabel 7.1 (Sambungan)

	Penggunaan utama dalam penyakit reumatik	Resiko janin	Kontraindikasi pada kehamilan	Kontraindikasi dlm masa menyusui	Penurunan kesuburan
Indomethacin	Contoh NSAID ampuh, digunakan dalam ankilosa	Malformasi kongenital, berkepanjangan kehamilan keguguran, hipertensi pulmoner	Ya	Ya	Kasus penghambatan folikel pecah
Obat-obatan antirematik					
Hydroxychloroquine	RA, SLE	Tidak direkomendasikan dosis	Tidak - Dosis Rendah	Tidak - Dosis Rendah	Belum ada bukti
Sulphasalazine	RA, spondyloarthropathies	Aplastic anemia di ibu dosis mengatakan 2 g; folat suplemen yang direkomendasikan	Tidak	Tidak- Hindari dosis tinggi	Pada pria: fabra ulama, mengurangi mobilitas sperma dan bentuk-bentuk normal
Gold	RA	Tidak ada konfirmasi	Tidak - Dosis Rendah	Tidak - Dosis Rendah	
Leflunomide	RA, SLE	Kelainan kongenital; Penghanyutan diperlukan sebelum merencanakan	Ya	Ya	Belum ada bukti Belum Ada bukti
Penicillamine	RA	Penyakit jaringan ikat	Ya	Ya	Belum ada bukti

### Obat immunosupresif

prednisolone	SLE, RA, vasculitis	LGambar (katarak, Sumbing langit-langit, Infeksi)	Tidak ada-hati-hati diperlukan dengan dosis tinggi	Tidak ada-hati-hati diperlukan dengan dosis tinggi	Belum ada bukti
metotrexate	RA, SLE, psoriasis	Cytopenia, kelainan wajah dan rGambar	Ya	Ya	Ya, di dosis tinggi pada wanita dan Oligospemi pada pria
Cyclosporin	RA, SLE, vasculitis	Sementara kekebalan perubahan, pertumbuhan retardations	Tidak ada-dosis rendah	Tidak ada-hati-hati diperlukan	Tidak
azathioprine	RA, SLE, vasculitis	Kelainan kongenital sporadis, sementara perubahan kekebalan	Tidak ada-hati-hati yang diperlukan dengan dosis tinggi	Bukti Conflicting	Tidak
Mycophenolate	SLE, vasculitis	Beberapa kelainan janin	Ya	Ya	Belum ada bukti
Cyclophosphamide	SLE, vasculitis	Chromosomal abnormalities, cytopenia	Ya	Ya	Gonadotoxic pada kedua jenis kelamin

		<i>Biological agents</i>			
Etanercept	RA	Tidak cukup data	Ya	Ya	
Infliximab	RA	Tidak cukup data	Ya	Ya	Belum ada bukti
					Belum ada bukti

## Aspirin

Aspirin saat ini jarang digunakan dalam pengobatan artritis inflamasi, tapi masih sering digunakan tanpa peresepan. Ketika digunakan untuk dosis terapi analgesic seperti NSAID lainnya (lihat Bab 2). Hal ini kontras dengan aspirin dosis rendah yang dikonsumsi oleh pasien dengan kegugran janin berulang akibat Sindrom dengan antifosfolipid, karena risiko keguguran dapat dikurangi dengan aspirin (sendiri atau dalam kombinasi dengan heparin) [1]. Aspirin dosis rendah juga dapat digunakan sebagai agen anti trombosit dan mengurangi resiko pre-eclampsia selama kehamilan pada wanita dengan lupus eritematosus sistemik (SLE) dan kehamilan lain yang berisiko tinggi [1]. Paparan aspirin dalam kehamilan tidak memiliki hubungan dengan peningkatan kelainan bawaan atau anomali fisik kecil pada bayi [2].

## Corticosteroids

Kortikosteroid digunakan sebagian besar untuk mengontrol penyakit rematik sistemik ibu seperti SLE dan vaskulitis, tetapi kadang-kadang digunakan untuk membantu kontrol artritis inflamasi dalam kehamilan, spondylitis. Kurang dari 10% dari oral prednisolone (dan prednison) diberikan kepada ibu sampai pada janin sebagai enzim dehidrogenase 11- $\beta$ -hydroxysteroid dalam plasenta yang mengkonversi kortisol dan corticosterone ke bentuk-bentuk 11-keto yang tidak aktif. Oleh karena itu tampaknya aman untuk menggunakan obat-obatan (dan bahkan methyl prednisolone intravena) pada wanita yang memerlukan penyakit kortikosteroid untuk kontrol rematik (dan inflamasi lain) selama kehamilan [3]. Obat-obat tersebut adalah pengobatan pilihan untuk lupus dan flares vaskulitis dan prednisolone atau intra artikular methylprednisolone mungkin berguna untuk rematik yang menyebar dan

spondyloarthropathies yang menyulitkan kehamilan. Kortikosteroid ini lebih aman daripada OAINS dosis tinggi dan dapat digunakan dalam semua trimester kehamilan. Pada manusia, mereka dapat menyebabkan kemungkinan sumbing pada bibir dan langit-langit akibat paparan hidrokortison dan prednison selama trimester pertama kehamilan. Namun, mungkin ada bias pelaporan pertama beberapa besar studi menemukan bahwa tidak ada peningkatan signifikan kejadian bibir sumbing. Data saat ini menyarankan bahwa paparan embrio terhadap kortikosteroid mungkin meningkatkan kejadian bibir sumbing dari 1 per 1000 kelahiran di populasi umum menjadi 3 per 1000 kelahiran, tetapi tidak ada kelainan bawaan lainnya yang dilaporkan yang terpajan steroid yang di inaktivasi oleh 11-B-hydroxysteroid dehydrogenase [4].

## Memodifikasi penyakit obat-obatan antirematik

### Obat antimalaria

Klorokuin dan hydroxychloroquine adalah agen obat yang digunakan sebagai agen lini kedua dalam pengelolaan SLE dan RA (rheumatoid arthritis). Saat ini dianjurkan untuk melanjutkan terapi hydroxyl chloroquine selama kehamilan dan menyusui, karena itu akan mengurangi risiko lonjakan akibat penyakit ibu dan komplikasi yang terkait dan terbukti tidak menyebabkan kerusakan janin [4,5]. Klorokuin saat ini jarang digunakan peningkatan risiko kejadian toksisitas Retina pada wanita yang tidak hamil, dan pasien yang mengkonsumsinya harus mengganti dengan hidroksi klorokuin sebelum mereka hamil. Tidak ada data mengenai penggunaan mepacrine dalam kehamilan dan menyusui, sehingga tidak disarankan. Pengobatan dengan dosis terapi yang sesuai yakni 200 - 400 mg hydroxy chloroquine sehari belum dapat meningkatkan

risiko kelainan bawaan [6 - 8]. Disamping risiko teoritis toksisitas dari paparan hydroxy chloroquine dalam rahim dan selama menyusui, tidak ditemukan adanya kemungkinan penyebab penurunan ketajaman penglihatan, atau kelainan pada visual, buta warna, kelainan electroretino-gram dan elektro-oculogram, pengendapan kornea sekunder atau retinopati pigmen [9,10]. Hidroksi klorokuin telah dikaitkan dengan tingkat kelahiran bayi prematur yang lebih tinggi daripada populasi umum, tapi hal ini paling mungkin dikaitkan dengan penyakit mendasar yang diderita ibu dimana obat tersebut juga diresepkan [9]. Bukti baru menunjukkan bahwa ia juga memiliki sifat antitrombotik yang mungkin bermanfaat terutama pada pasien dengan mungkin antiphospho-lipid [11].

### Sulphasalazine

Sulphasalazine telah dianggap sebagai obat yang aman dalam kehamilan dan menyusui, ketika diamati pada ibu hamil dengan penyakit usus RA atau penyakit inflamasi usus [12,13]. Namun, beberapa ahli menyarankan bahwa sulphasalazine harus dihindari pada trimester terakhir, karena risiko teoritis patologis "jaundice"/kuning karena perubahan bilirubin dari albumin, tetapi tidak ada laporan terjadinya kernicterus pada bayi baru lahir. Ketika jumlah sulphasalazine telah diukur dalam darah tali pusat, jumlah yang ada dapat diabaikan dan dengan demikian kemampuan perubahan bilirubin tampaknya sangat rendah [14]. Anemia Aplastik telah dilaporkan di pada abortus janin akibat paparan sulphasalazine di trimester pertama. Juga telah ada kasus neutropenia pada bayi yang ibunya

mengonsumsi 3 g setiap hari selama kehamilan [15,16], tetapi ini adalah peristiwa langka. Sulphasalazine telah ditemukan aman untuk digunakan pada wanita menyusui. Ada satu laporan diare neonatal yang dikaitkan dengan peningkatan dosis selama terapi ibu [17]. Suplemen folat direkomendasikan sebelum dan selama kehamilan, karena sulphasalazine mengganggu penyerapan folat [18].

### **Emas**

Laporan penggunaan emas dalam kehamilan masih terbatas. Ahli rheumatology biasanya merekomendasikan bahwa wanita usia subur yang mendapat preparat emas harus menggunakan kontrasepsi yang memadai. Telah diusulkan bahwa jika diberikan bulanan sebagai terapi pemeliharaan, setiap kali suntik preparat harus diatur bersamaan dengan dimulainya menstruasi. Sehingga sangat mudah untuk menarik terapi preparat emas jika haid tertunda dan pasien dicurigai hamil [19]. Senyawa emas melewati barier plasenta dan telah ditemukan di hati dan ginjal pada janin yang abortus, tetapi tidak ada bukti mengenai efek teratogenik terapi emas (intramuskular atau oral) dalam kehamilan [20-22]. Karena kurangnya bukti, itu telah direkomendasikan bahwa dosis dan frekuensi suntikan preparat emas direduksi menjadi seminimal mungkin, dan biasanya dosis bulanan telah cukup untuk mempertahankan pengendalian penyakit dalam kehamilan, mengingat bahwa artritis biasanya meningkat dalam kehamilan. Pendekatan alternatif ini untuk menghentikan suntikan preparat emas ketika kehamilan ditegakkan. Namun, banyak ahli reumatologi memiliki pilihan untuk meninggalkan pasien pada intermiten emas suntikan untuk meminimalkan risiko

flares arthritis selama atau setelah kehamilan. Meskipun risiko melanjutkan terapi rendah, perempuan harus tepat menasihati dan dimonitor terus selama kehamilan [19].

Emas diekskresikan dalam ASI dan diserap oleh bayi. Ada beberapa laporan terjadinya ruam, Nefritis, hepatitis, dan masalah-masalah hematologikal pada bayi baru lahir, tapi tidak ditemukan adanya hubungan sebab-akibat antara keduanya [19,23]. Sehingga dianjurkan untuk menyusui dengan hati-hati atau tidak sama sekali, karena potensi risiko toksisitas emas pada bayi [23], tetapi dalam prakteknya, karena preparat emas sekarang jarang digunakan untuk pengelolaan penyakit rematik, ini adalah masalah yang jarang.

### Leflunomide

Leflunomide adalah pengobatan arthritis rheumatoid yang baru dan efektif. Leflunomide merupakan kontraindikasi dalam kehamilan dan menyusui, dan kontrasepsi yang handal dan aman dianjurkan untuk pria dan wanita yang mengkonsumsi leflunomide. Pasien wanita harus memiliki tes kehamilan yang negatif sebelum memulai terapi karena obat ini bersifat teratogenik [24,25]. Perhatian tambahan mengenai leflunomide adalah waktu paruhnya yang sangat panjang. Metabolit aktif telah terdeteksi selama 2 tahun setelah penghentian pemberian obat kecuali rejimen cholestyramine diberikan [19, 25] untuk pengolahan cepat leflunomide. Jika levelnya bertahan dalam tingkat yang lebih lanjut cholestyramine dapat diberikan [19,25]. Saat ini, masih sedikit data yang mengetahui tentang efek janin dan bayi akibat paparan leflunomide selama kehamilan.

### **Penicillamine**

Penicillamine adalah agen yang digunakan dalam pengobatan artritis rheumatoid (AR), sklerosis sistemik, dan penyakit Wilson. Penggunaan penicillamine merupakan kontraindikasi dalam kehamilan, karena paparan terhadap janin telah ditemukan menyebabkan penyakit jaringan ikat, hernia, dan kelambatan pertumbuhan [26]. Oleh karena itu disarankan untuk menghentikan penicillamine sebelum konsepsi atau segera setelah kehamilan ditegakkan, dan juga harus dihindari dalam masa menyusui. Satu-satunya pengecualian adalah penyakit Wilson, dimana manfaat lebih besar daripada risiko karena penicillamine diperlukan untuk memberikan perlindungan pada janin dari kelebihan kadar copper/ion tembaga pada ibu [27,28].

### **Methotrexate**

Metotreksat adalah antagonis asam folat, digunakan dalam pengobatan RA, SLE, vaskulitis dan psoriasis; Ini merupakan kontraindikasi dalam kehamilan karena sangat teratogenik [24]. Metabolit aktif akan berada dalam sel atau jaringan beberapa bulan setelah penghentian, jadi itu harus dihentikan 3-6 bulan sebelum rencana konsepsi, baik pria dan wanita. Perlu dicatat bahwa embrio adalah yang paling rentan terhadap zat metabolit pada Minggu 5 pada saat penutupan tabung saraf berlangsung [29]. Sangat penting untuk melanjutkan suplemen asam folat, bahkan setelah penarikan methotrexate pada wanita dalam perencanaan dan menjalani kehamilan.

Pengalaman dengan methotrexate selama kehamilan adalah terutama dari pasien Onkologi yang mendapat terapi methotrexate, atau pasien yang menggunakan

metotreksat untuk terminasi kehamilan [30,31]. Dalam kasus ini yang direkomendasikan ketika mengobati RA adalah dosis metotreksat yang lebih tinggi dari dosis seminggu sekali yakni 10 mg. Dalam kasus pasien Onkologi janin akan terpapar lebih dari satu agen kemoterapi [31]. Hasil dari studi ini telah menunjukkan beberapa anomali pada bayi, termasuk anencephaly, hidrocephali, dan meningomielocoele.

Ada 63 kasus penggunaan metotreksat di kehamilan trimester pertama untuk pengobatan reumatologi dengan dosis mingguan 20 mg atau kurang [4]. Dalam kehamilan dimana terminasi kehamilan tidak direncanakan, 11 kehamilan menyebabkan keguguran, 33 berlanjut hingga persalinan, dan 4 memiliki kelainan bawaan [4].

Methotrexate merupakan kontraindikasi dalam laktasi, karena disekresi kedalam air susu dalam jumlah kecil. Rasio susu-plasma adalah 0,08, namun potensi akumulasi mungkin terjadi, yang menyebabkan penekanan kekebalan tubuh, neutropenia dan karsinogenesis [19,32].

### Cyclosporin

Cyclosporin digunakan dalam pengobatan vaskulitis RA, SLE, dan pada penerima organ transplantasi. Sekitar 800 kasus pasien hamil mendapatkan cyclosporin telah dilaporkan, sebagian besar adalah penerima organ transplantasi [4,33,34].

Tidak ada pola spesifik anomali kongenital yang dapat diidentifikasi, dan tingkat insiden adalah 3%, yang tidak melebihi dari populasi umum [4]. Ada peningkatan kejadian prematur dan berat bayi lahir rendah, tetapi hal ini tidak jelas apakah karena terapi cyclosporin atau penyakit yang

mendasari ibu yang membutuhkan terapi [4].

Cyclosporin dianggap aman untuk digunakan dalam kehamilan setelah konseling yang memadai mengenai dosis terendah yang mungkin. Ada 15 kasus yang dilaporkan menyusui tanpa efek samping, tetapi menyusui tidak dianjurkan, karena disekresi melalui ASI dan dapat menyebabkan efek immunosupresif pada bayi [4,35].

### **Azathioprine**

Ini adalah immunosuppressant sitotoksik yang digunakan untuk mengobati SLE, penyakit usus inflamasi, keganasan hematologi dan pasien transplantasi ginjal. Janin harus dilindungi dari efek potensi teratogenik obat karena janin kekurangan enzim inosinatopyrophosphorylase yang diperlukan untuk mengkonversi azathioprine ke metabolit aktif 6-MP [36].

Azathioprine dapat digunakan dalam kehamilan untuk mengendalikan penyakit berat pada ibu. Maksimum direkomendasikan dosis adalah 2 mg/kg [4]. Efek samping dari terapi ibu pada janin jarang tetapi telah ada beberapa laporan mengenai pertumbuhan janin terhambat, anomali kromosom transien, adrenal hypoplasia dan penurunan antibodi serum [19,37,38]. Penurunan haematopoiesis dilaporkan pada bayi yang ibunya yang diterapi dengan dosis melebihi 2 mg/kg harian [39]. Namun, studi tentang kehamilan dan persalinan normal neonatus sehat telah dilaporkan pada banyak perempuan dengan SLE, penyakit usus inflamasi dan transplantasi ginjal yang telah diterapi dengan azathioprine selama kehamilan [4,40-42].

Menyusui tidak dianjurkan karena dosis rendah azathioprine (0,1% dari dosis ibu) dapat ditemukan dalam

air susu ibu. Ini mungkin menyebabkan potensi immunosupresi jangka panjang dan karsinogenesis, tapi laporan ini belum pasti. Beberapa unit melanjutkan dosis rendah azathioprine pada ibu menyusui karena adanya risiko tinggi flare/ lonjakan rematik pascamelahirkan dan penyakit inflamasi lain serta tidak adanya efek yang merugikan pada anak [4].

### **Mycophenolate mofetil**

Mycophenolate mofetil adalah obat immunosupresif yang digunakan dalam pengobatan vaskulitis, SLE dan pasien pasca transplantasi. Ini merupakan kontraindikasi dalam kehamilan dan hanya akan diberikan pada wanita dan pria usia subur dengan kontrasepsi. Rekomendasinya adalah bahwa mycophenolate mofetil harus dihentikan setidaknya 6 bulan sebelum kehamilan tercapai, karena waktu paruh yang panjang dan resirkulasi enterohepatik.

Tidak ada studi kontrol pada pasien dengan pengobatan mycophenolate mofetil selama kehamilan. Data yang tersedia dari files perusahaan obat dan Registrasi Kehamilan Transplantasi Nasional menunjukkan bahwa ada peningkatan risiko kelainan bawaan, tetapi tidak ada fenotipe spesifik yang ditemukan [4]. Menyusui merupakan kontraindikasi untuk wanita mendapat terapi micophenolate mofetil, karena tidak ada data tentang ekskresi dalam ASI dan potensi sitotoksiknya pada bayi baru lahir.

### **Cyclophosphamide**

Siklofosfamid digunakan dalam pengobatan SLE dan vaskulitis. Kesuburan merupakan masalah penting dalam penggunaannya pada wanita dan pria yang berharap untuk memiliki anak, karena ada risiko

infertilitas yang signifikan, meningkat seiring dengan usia pada pemberian dosis pertama kali dan total dosis akumulasi. Apakah diberikan secara oral atau sebagai infus intravena [43]. Ketika dikonsumsi secara oral setiap hari, kegagalan ovarium permanen dapat berkembang di lebih dari 70% wanita [19], namun risikonya kurang dengan infus intravena intermiten.

Siklofosfamid merupakan kontraindikasi selama kehamilan, karena teratogenik. Risiko cacat struktural tertinggi pada trimester awal; laporan anomali craniofacial dan keterlambatan pertumbuhan telah dilaporkan [44]. Namun, tingkat keguguran atau anomali kongenital tidak ditemukan meningkat pada wanita yang telah menyelesaikan terapi siklofosfamid sebelum kehamilan [45]. Disarankan bahwa perempuan harus tidak hamil setidaknya 3 bulan setelah menghentikan siklofosfamid. Ada beberapa laporan tentang terapi siklofosfamid intravena untuk vaskulitis yang mengancam kehidupan dan lupus Nefritis pada ibu di trimester ketiga kehamilan [1,46]. Ini sangat berhubungan dengan risiko tinggi keterlambatan dan kematian janin, mungkin karena efek gabungan dari penyakit dan obat. Persalinan janin sebelum terapi sitotoksik ini biasanya lebih disukai, karena penyakit ini lebih mudah untuk dikontrol setelah persalinan dan pendekatan ini menghindari neonatus terpapar obat. Steroid oral dosis tinggi atau infus intravena methylprednisolone dianggap lebih aman bagi janin, meskipun hanya sedikit data dan tidak ada percobaan sebelumnya.

Menyusui merupakan kontraindikasi selama terapi siklofosfamid, karena siklofosfamid ditemukan dalam

konsentrasi yang substansial dalam air susu ibu, dan supresi haematopoiesis telah dilaporkan pada bayi disusui [4,47].

## **Biological agents**

### **Etanercept**

Etanercept adalah antagonis tumor nekrosis faktor, digunakan dalam pengobatan pasien dengan AR sedang sampai parah, yang tidak berespon secara adekuat terhadap satu atau lebih penyakit yang menggunakan obat antirematik modifikasi. Saat ini merupakan kontraindikasi dalam kehamilan, karena hanya ada sedikit bukti tentang efek selama kehamilan. Telah ada laporan dari seorang wanita dengan psoriasis arthritis yang mendapat etanercept, 50 mg dua kali seminggu, melahirkan seorang anak dengan VATER (vertebra anomali, anal anomali, masalah trakea, masalah esofagus, cacat radial atau ginjal) [48]. Namun, ada laporan lain yang menunjukkan tidak ada peningkatan risiko anomali kongenital atau efek samping lainnya pada wanita hamil yang mengambil etanercept. Saat ini tidak diketahui apakah atau teratogenesis terkait masalah dosis [4]. Menyusui juga dikontraindikasikan, karena banyak obat-obatan dan imunoglobulin telah terbukti dikeluarkan dalam air susu ibu, dan potensi efek samping bagi janin tidak diketahui [4].

### **Infliximab**

Infliximab juga dikontraindikasikan pada kehamilan dan menyusui, karena kurangnya bukti-bukti yang tersedia dan harus dihentikan segera setelah kehamilan ditegakkan.

Studi telah dilakukan membandingkan kedua wanita dengan penyakit Crohn dan RA yang menjadi hamil saat mendapat terapi infliximab. Dalam satu studi, ternyata ditemukan hasil kehamilan tidak berbeda dari kelompok kontrol yang sehat. Komplikasi yang diamati termasuk prematur dan tetralogi of Fallot [25]. Dalam analisis yang lebih baru 96 perempuan yang mendapat terapi Infliximab selama kehamilan, lima bayi dilahirkan dengan komplikasi termasuk tetralogi of Fallot, malformasi usus, dan kesulitan pernafasan [48].

### **Rituximab**

Saat ini ada tidak ada data mengenai efek dari paparan janin oleh terapi rituximab (antibodi monoklonal anti-CD 20) yang diberikan kepada ibu sebelum atau selama kehamilan. Perusahaan obat merekomendasikan menghentikan obat 12 bulan sebelum merencanakan kehamilan karena deplesi B-sel pada ibu bisa berakhir lebih dari 6 bulan. Demikian pula ada tidak ada data mengenai ekskresi rituximab dalam ASI dan menyusui harus berhenti sebelum terapi dimulai.

### **Kesimpulan**

Sebelum kehamilan sangat penting untuk menasihati ibu mengenai efek dari penyakit reumatik pada kehamilan. Pasien akan membutuhkan saran yang detail tentang penggunaan terapi antireumatik dan analgesik selama konsepsi, kehamilan dan menyusui, dan potensi manfaat dan komplikasi. Tidak boleh dilupakan bahwa perempuan dapat mengambil obat-obatan lainnya,

seperti ACE inhibitor untuk hipertensi atau proteinuria dan pompa-proton inhibitor untuk dispepsia, yang juga perlu dibahas dan mungkin diganti sebelum terjadi pembuahan. Dengan manajemen yang terkoordinasi antara rheumatologist, dokter kandungan dan dokter lain yang terlibat dalam perawatan pasien dengan manifestasi sistemik, penyakit rematik, kebanyakan wanita saat ini dapat menjalani kehamilan dengan baik.

## Referensi

1. Gordon C. **Pregnancy and autoimmune diseases.** *Best Pract Res Clin Rheumatol* 2004;18(3):359-79.
2. Bonaminio PN, de Regnier R, Chang E, Day N, Manzi S, Ramsey-Goldman R. **Minor physical anomalies are not increased in the offspring of mothers with systemic lupus erythematosus.** *Ann Rheum Dis* 2006; 65(2):246-8.
3. Clowse M, Petri M. **Pregnancy and SLE.** In: Tsokos G, Gordon C, Smolen J (eds.), *Systemic Lupus Erythematosus: A Companion to Rheumatology, 1st edition.* Philadelphia: Mosby Elsevier; 2007:449-59.
4. Ostensen M, Khamashta M, Lockshin M, et al. **Anti-inflammatory and immunosuppressive drugs and reproduction.** *Arthritis Res Ther* 2006;8(3):209.
5. Clowse ME, Magder L, Witter F, Petri M. **Hydroxychloroquine in lupus pregnancy.** *Arthritis Rheum* 2006;54(11):3640-7.
6. Costedoat-Chalumeau N, Amoura Z, Aymard G, et al. **Evidence of transplacental passage of hydroxychloroquine in humans.** *Arthritis Rheum* 2002;46(4):1123-4.
7. Buchanan NM, Toubi E, Khamashta MA, Lima F, Kerslake S, Hughes GR. **Hydroxychloroquine and lupus pregnancy: review of a series of 36 cases.** *Ann Rheum Dis* 1996;55(7):486-8.

8. Costedoat-Chalumeau N, Amoura Z, Duhaut P, et al. **Safety of hydroxy- chloroquine in pregnant patients with connective tissue diseases: a study of one hundred thirty-three cases compared with a control group.** *Arthritis Rheum* 2003;**48**(11):3207-11.
9. Motta M, Tincani A, Faden D, et al. **Follow-up of infants exposed to hydroxychloroquine given to mothers during pregnancy and lactation.** *J Perinatol* 2005;**25**(2):86-9.
10. Klinger G, Morad Y, Westall CA, et al. **Ocular toxicity and antenatal exposure to chloroquine or hydroxychloroquine for rheumatic diseases.** *Lancet* 2001;**358**(9284):813-4.
11. Pierangeli SS, Chen PP, Gonzalez EB. **Antiphospholipid antibodies and the antiphospholipid syndrome: an update on treatment and pathogenic mechanisms.** *Curr Opin Hematol* 2006;**13**(5):366-75.
12. Norgard B, Czeizel AE, Rockenbauer M, Olsen J, Sorensen HT. **Population-based case control study of the safety of sulfasalazine use during pregnancy.** *Aliment Pharmacol Ther* 2001;**15**(4):483-6.
13. Nielsen OH, Andreasson B, Bondesen S, Jarnum S. **Pregnancy in ulcerative colitis.** *Scand J Gastroenterol* 1983;**18**(6):735-42.
14. Jarnerot G, Andersen S, Esbjorner E, Sandstrom B, Brodersen R. **Albumin reserve for binding of bilirubin in maternal and cord serum under treatment with sulphasalazine.** *Scand J Gastroenterol* 1981;**16**(8): 1049-55.
15. Zwi LJ, Becroft DM. **Intrauterine aplastic anemia and fetal hydrops: a case report.** *Pediatr Pathol* 1986;**5**(2):199-205.
16. Levi S, Liberman M, Levi AJ, Bjarnason I. **Reversible congenital neutropenia associated with maternal sulphasalazine therapy.** *Eur J Pediatr* 1988;**148**(2):174-5.
17. Branski D, Kerem E, Gross-Kieselstein E, Hurvitz H, Litt R, Abrahamov **Bloody diarrhea a possible**

- complication of sulfasalazine transferred through human breast milk. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 1986;5(2):316-7.
18. Hernandez-Diaz S, Werler MM, Walker AM, Mitchell AA. Folic acid antagonists during pregnancy and the risk of birth defects. *N Engl J Med* 2000;343(22):1608-14.
  19. Janssen NM, Genta MS. The effects of immunosuppressive and antiinflammatory medications on fertility, pregnancy, and lactation. *Arch Intern Med* 2000;160(5):610-9.
  20. Richards AJ, Henderson W. Transfer of gold from mother to foetus. *Lancet* 1977;1:99.
  21. Cohen DL, Orzel J, Taylor A. Infants of mothers receiving gold therapy. *Arthritis Rheum* 1981;24(1):104-5.
  22. Ostensen M, Husby G. Antirheumatic drug treatment during pregnancy and lactation. *Scand J Rheumatol* 1985;14(1):1-7.
  23. Ostensen M, Skavdal K, Myklebust G, Tomassen Y, Aarbakke J. Excretion of gold into human breast milk. *Eur J Clin Pharmacol* 1986;31(2):251-2.
  24. Temprano KK, Bandlamudi R, Moore TL. Antirheumatic drugs in pregnancy and lactation. *Semin Arthritis Rheum* 2005;35(2):112-21.
  25. Chakravarty EF, Sanchez-Yamamoto D, Bush TM. The use of disease modifying antirheumatic drugs in women with rheumatoid arthritis of childbearing age: a survey of practice patterns and pregnancy outcomes. *J Rheumatol* 2003;30(2):241-6.
  26. Miehle W. Current aspects of D-penicillamine and pregnancy. *Z Rheumatol* 1988;47(Suppl 1):20-3.
  27. Scheinberg IH, Sternlieb I. Pregnancy in penicillamine-treated patients with Wilson's disease. *N Engl J Med* 1975;293(25):1300-2.
  28. Walshe JM. Pregnancy in Wilson's disease. *Q J Med* 1977;46(181):73-83.
  29. Schroder H, Fogh K. Methotrexate and its

- polyglutamate derivatives in erythrocytes during and after weekly low-dose oral methotrexate therapy of children with acute lymphoblastic leukemia. *Cancer Chemother Pharmacol* 1988;21(2):145-9.
30. Hausknecht RU. Methotrexate and misoprostol to terminate early pregnancy. *N Engl J Med* 1995;333(9):537-40.
  31. Schleuning M, Clemm C. Chromosomal aberrations in a newborn whose mother received cytotoxic treatment during pregnancy. *N Engl J Med* 1987;317(26):1666-7.
  32. Johns DG, Rutherford LD, Leighton PC, Vogel CL. Secretion of methotrexate into human milk. *Am J Obstet Gynecol* 1972;112(7):978-80.
  33. Armenti VT, Ahlswede KM, Ahlswede BA, Jarrell BE, Moritz MJ, Burke JF. National transplantation pregnancy registry - outcomes of 154 pregnancies in cyclosporine-treated female kidney transplant recipients. *Transplantation* 1994;57(4):502-6.
  34. Hussein MM, Mooij JM, Roujouleh H. Cyclosporine in the treatment of lupus nephritis including two patients treated during pregnancy. *Clin Nephrol* 1993;40(3):160-3.
  35. Moretti M, Sgro M, Johnson D, Sauve R, Woolgar M. Cyclosporin excretion into breast milk. *Transplantation* 2003;7:3144-6.
  36. Polifka JE, Friedman JM. Teratogen update: azathioprine and 6-mercaptopurine. *Teratology* 2002;65(5):240-61.
  37. Scott JR. Fetal growth retardation associated with maternal administration of immunosuppressive drugs. *Am J Obstet Gynecol* 1977;128(6):668-76.
  38. Cote CJ, Meuwissen HJ, Pickering RJ. Effects on the neonate of prednisone and azathioprine administered to the mother during pregnancy. *J Pediatr* 1974;85(3):324-8.
  39. Davison JM, Dellagrammatikas H, Parkin JM. Maternal azathioprine therapy and depressed haemopoiesis in

- the babies of renal allograft patients. *Br J Obstet Gynaecol* 1985;92(3):233-9.
40. Hayslett JP, Lynn RI. Effect of pregnancy in patients with lupus nephropathy. *Kidney Int* 1980;18(2):207-20.
  41. Meehan RT, Dorsey JK. Pregnancy among patients with systemic lupus erythematosus receiving immunosuppressive therapy. *J Rheumatol* 1987;14(2):252-8.
  42. Bermas BL, Hill JA. Effects of immunosuppressive drugs during pregnancy. *Arthritis Rheum* 1995;38(12):1722-32.
  43. Lockshin MD. Fertility in systemic lupus erythematosus. In Tsokos G, Gordon C, Smolen J (eds), *Systemic Lupus Erythematosus: A Companion to Rheumatology*, 1<sup>st</sup> edition. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2007:460-5.
  44. Kirshon B, Wasserstrum N, Willis R, Herman GE, McCabe ER. Teratogenic effects of first-trimester cyclophosphamide therapy. *Obstet Gynecol* 1988;72(3 Pt 2):462-4.
  45. Gershenson DM. Menstrual and reproductive function after treatment with combination chemotherapy for malignant ovarian germ cell tumors. *J Clin Oncol* 1988;6(2):270-5.
  46. Clowse ME, Magder L, Petri M. Cyclophosphamide for lupus during pregnancy. *Lupus* 2005;14(8):593-7.
  47. Wiernik PH, Duncan JH. Cyclophosphamide in human milk. *Lancet* 1971;1(7705):912.
  48. Carter JD, Valeriano J, Vasey FB. Tumor necrosis factor-alpha inhibition and VATER association: a causal relationship. *J Rheumatol* 2006;33(5):1014-7.



# BAB 8 OBAT-OBATAN PSIKOTROPIKA DI KEHAMILAN

*Neelam Sisodia*

## **Pendahuluan**

Wanita yang menggunakan obat-obatan psikotropika di kehamilan jatuh ke dalam dua kelompok: mereka yang secara aktif sedang dirawat untuk gangguan kejiwaan yang sudah ada dan orang-orang yang saat ini mengalami gejala gangguan kejiwaan selama kehamilan mereka. Untuk kelompok kedua, beberapa pasien memiliki riwayat gangguan kejiwaan, dan gejala mereka menandakan kekambuhan kondisi yang sudah ada dan sisanya akan mengalami penyakit untuk pertama kalinya.

Prevalensi gangguan kejiwaan selama kehamilan adalah sama seperti pada perempuan yang tidak hamil dengan usia yang sama. Antara 15 dan 20% dari semua wanita hamil akan memiliki masalah kesehatan mental [1], mulai dari ringan sampai sedang penyakit seperti kecemasan menyeluruh, depresi ringan, obsesif kompulsif dan kecemasan dengan panik/gejala fobia hingga penyakit parah seperti depresi moderat hingga berat, gangguan afektif bipolar, dan skizofrenia.

Pedoman Nasional Institut for Health and Clinical Excellence (NICE) untuk kesehatan mental pada antenatal dan setelah melahirkan [2] merekomendasikan bahwa sedapat mungkin intervensi psikososial dan terapi

psikologis (mendukung psikoterapi, terapi kognitif terapi interpersonal) harus menjadi pengobatan lini pertama untuk kondisi ringan sampai moderat. Ambang batas untuk menggunakan obat psikotropika harus relatif tinggi dan hanya diberikan jika pendekatan psikologis tidak meringankan gejala.

Penyakit berat, di mana gejala psikotik mungkin memainkan peran lebih cenderung sangat mengganggu kemampuan seorang wanita untuk merawat dirinya selama kehamilan dan bayinya setelah melahirkan jika tidak diobati. Sementara pendekatan psikologis terus memainkan peran yang positif dalam pengobatan kondisi ini obat juga memainkan peran yang lebih penting, dan ambang batas untuk penggunaannya lebih rendah. Seperti semua wanita usia subur mungkin berpotensi menjadi hamil, perempuan sebagai bagian dari rencana pengobatan psikologi harus diberitahu tentang pentingnya menggunakan kontrasepsi yang memadai untuk menghindari kehamilan pada saat mengkonsumsi obat-obatan yang dapat berpotensi membahayakan janin, pada saat yang sama juga diberi informasi tentang potensi efek buruk pada janin/bayi jika ibu dengan gangguan kejiwaan tidak diobati. Sedapat mungkin perempuan harus dibantu untuk merencanakan kehamilan selama periode remisi dalam penyakit, sehingga mereka bisa hamil dengan bebas dari obat psikotropika. Idealnya mereka harus berhasil tanpa obat psikotropika sepanjang trimester pertama. Jika hal ini tidak mungkin, maka tujuan kedua adalah menggunakan dosis obat dengan dosis terendah yang memberikan kontrol adekuat pada gejala yang muncul.

Tujuan untuk memulai atau melanjutkan pengobatan

signifikan penyakit mental dengan obat psikotropika selama kehamilan adalah untuk meringankan penderitaan selama ini juga untuk mencegah kerusakan/kambuh pasca melahirkan. Pembahasan rinci gangguan kejiwaan di kehamilan dan pasca melahirkan adalah di luar lingkup dari bab ini. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun rekomendasi penelitian terakhir mengenai kesehatan ibu dan anak [3] menemukan bahwa psikiatri merupakan penyebab kematian kedua secara tidak langsung pada ibu di Inggris. Jika semua kematian ibu, termasuk yang dipastikan oleh *Office Nasional Statistik Linkage Studi* akan disertakan, maka bunuh diri muncul sebagai penyebab utama kematian ibu dan kondisi kejiwaan berkontribusi sebesar 25% dari semua kematian ibu.

Oleh karena itu, setiap upaya akan dilakukan selama periode kehamilan awal untuk mengidentifikasi perempuan yang memiliki risiko signifikan untuk mengalami gangguan kejiwaan serius selama kehamilan atau pasca melahirkan [4], karena kondisi yang sudah ada sebelumnya, penyakit onset baru atau riwayat keluarga yang penyakit yang serius. Perawatan kemudian dapat dikoordinasikan dengan tepat antara perawatan primer medis, dokter kebidanan, dan psikiatri tingkat dewasa yang sedapat mungkin bekerjasama dengan dokter subspecialis psikiatri perinatal [5].

Sementara yang ideal adalah bahwa perempuan harus merencanakan konsepsi pada suatu waktu ketika mereka berada di kondisi psikologis yang baik dan tidak mengkonsumsi obat psikotropika, pada kenyataannya sekitar 50% dari kehamilan tidak direncanakan pada saat konsepsi. Sekitar 33% [6,7] perempuan telah dilaporkan untuk menebus resep obat selama trimester pertama

kehamilan dan proporsi signifikan dari jumlah tersebut mengkonsumsi obat-obatan psikotropika. Kecenderungan alami dari kebanyakan wanita di saat ini adalah untuk menghentikan pengobatan segera pada saat kehamilan diketahui, karena takut konsekuensi yang merugikan obat pada janin yang sedang berkembang. Namun, dokter dan profesional kesehatan lainnya yang peduli pada perempuan ini harus memberitahu peringatan terhadap penghentian obat yang tiba-tiba.

Wanita yang menderita gangguan kejiwaan yang ringan hingga moderat yang sedang hamil dan sementara mengkonsumsi preparat antidepresan yang ditentukan dalam perawatan primer harus dianjurkan untuk menghentikan obat secara bertahap, karena penghentian pengobatan mendadak dapat menyebabkan gejala yang tidak menyenangkan, yang berefek kesedihan dan kecemasan tentang potensi paparan teratogen terhadap janin.

Dalam kasus perempuan menerima pengobatan untuk gangguan kejiwaan parah, evaluasi menyeluruh perlu dibuat untuk menilai risiko dan manfaat. Ada potensi risiko efek samping janin dari obat psikotropika di berbagai tahap kehamilan, dan bukan hanya pada tahap organogenesis yang biasanya telah selesai pada saat kehamilan yang tidak sengaja diketahui. Ada juga risiko untuk janin jika ibu mengalami kekambuhan penyakit mental yang serius dan mengabaikan perawatan kebidanan dan psikiatris dan keselamatan ibu dan janin. Jika ini adalah risiko signifikan, maka akan lebih bermanfaat bagi wanita untuk melanjutkan pengobatan, bahkan jika persiapan psikotropika harus diganti dengan untuk memungkinkan

keselamatan maksimal dalam kehamilan. Seorang wanita yang sengaja hamil saat mendapat terapi obat psikotropika dengan potensi untuk menimbulkan kelainan pada janin harus memiliki akses awal ke USG untuk skrining detail dalam menentukan efek dari paparan sehingga kehamilan tidak perlu diakhiri.

Seperti hampir semua obat-obatan psikotropika yang melewati plasenta, setiap preparat yang diberikan untuk wanita hamil akan mencapai embrio dan janin. Waktu paparan obat-obatan psikotropika adalah penting untuk pengembangan sistem saraf dan jantung pusat (pengembangan sistem saraf pusat dimulai antara hari 16 dan 18 dan tabung saraf menutup hari 30, dua minggu setelah terlambat haid; berbagai struktur di jantung dibentuk antara hari 22 dan 35, lima minggu setelah haid terakhir). Karena sistem saraf pusat terus berkembang sepanjang kehidupan janin, dan pada awal bayi perkembangannya struktural dan fungsionalnya masih rentan terhadap efek samping dari obat psikotropika (dan zat lain yang berpotensi berbahaya) sampai akhir kehamilan dan seterusnya [8-10].

### Prinsip Umum

- Intervensi Psikososial dan terapi psikologis harus menjadi pendekatan lini pertama pada gangguan kejiwaan ringan dan (non-psikotik).
- Gangguan kejiwaan yang parah, terutama mereka yang disertai dengan gejala psikotik, membutuhkan manajemen kuat sebagai konsekuensi dari gangguan kejiwaan yang tidak diobati yang memiliki konsekuensi yang merugikan bagi ibu dan

- janin bayi.
- Jika obat perlu diberikan selain perawatan psikologis, wanita hamil perlu dilibatkan dalam diskusi untuk pengobatannya.
- Bukti terus berubah. Secara umum, ada lebih banyak informasi yang tersedia tentang persiapan remaja, baik dari segi potensi efek samping dan manfaat, dan yang terbaik adalah menghindari obat yang lebih baru.
- Fisiologis dan farmakokinetik perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehamilan mempengaruhi metabolisme obat dan karenanya dosis obat mungkin perlu disesuaikan.
- Menggunakan dosis terkecil yang efektif
- Hindari menggunakan lebih dari satu preparat.
- Pertimbangkan *tapering-off* dosis obat menjelang akhir kehamilan, (i.e., selama sebagai risiko pada wanita hamil di negara ini tidak lebih besar daripada risiko efek samping pada neonatus) oleh 36-38 wk kehamilan.

### Antidepresan trisiklik

Imipramine adalah prototipe trisiklik antidepresan (TCA). Obat lain dalam kelompok ini termasuk amitriptyline, clomipramine, dosulepin, dothiepin, lofepramine, trimipramine, desipramine, dan nortriptyline.

TCA's telah digunakan selama lebih dari 40 tahun. Tidak ada bukti hubungan antara pengobatan dengan TCA's dan meningkatnya insiden cacat kelahiran atau hasil kehamilan yang merugikan lainnya (meskipun beberapa laporan kasus ada dari tahun 1970-an hingga 1980 ada hubungan antara

antidepresan trisiklik dengan ekstremitas bawaan dan malformasi jantung, polydactyly dan Hipospadia) [11]. Perawatan harus dilakukan menjelang akhir kehamilan, namun, sebagai gejala penarikan/*withdrawal* seperti jitteriness, hyperexcitability, oclonus, kejang dan masalah mengisap telah dilaporkan, terutama pada bayi prematur. Sampai saat ini, tidak ada sebarang petunjuk bahwa penggunaan TCAs dalam kehamilan menyebabkan efek yang merugikan pada anak-anak dalam hal perkembangan saraf seperti global IQ, bahasa dan perilaku (berbeda dengan bukti-bukti yang tersedia yang menghubungkan depresi berat yang tidak diobati pada ibu dengan perkembangan kognitif rendah dan gangguan perilaku pada anak-anak, terus-menerus dengan usia 11 tahun terutama pada anak-anak laki-laki).

TCAs telah kurng digunakan dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam perawatan primer dan umum dewasa psikiatri karena potensi untuk keracunan akut (terutama cardiotoxicity) ketika digunakan untuk menyakiti-diri dan mungkin intoleransi terhadap efek samping anticholinergic. Namun, jika evaluasi menyeluruh tentang potensi untuk menyakiti diri dapat dilakukan, obat-obatan yang diberikan dalam jumlah kecil dan dosis dititrasi perlahan-lahan tidak ada alasan mengapa TCAs tidak boleh digunakan dimana menonaktifkan gejala depresi akan bisa dilakukan.

Imipramine dan amitriptyline bahkan saat ini dianggap sebagai obat pilihan ketika mengobati depresi moderat dan parah selama kehamilan [12] dan dapat digunakan untuk mengontrol gejala dan melumpuhkan kecemasan dan panik yang tidak dapat diperbaiki oleh intervensi psikologis. TCAs juga memiliki keuntungan yakni diekskresikan dalam konsentrasi rendah dalam air susu ibu dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa

mereka membahayakan neonates. Pengobatan dengan TCAs karena itu dapat diberikan setelah persalinan dan pada ibu menyusui.

### **Antidepresan inhibitor reuptake serotonin selektif /adrenaline**

Penggunaan serotonin selektif *re-uptake inhibitor* antidepresan (SSRI) seperti citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, dan sertraline telah meningkat selama dekade terakhir terutama sebagai pengobatan lini pertama untuk depresi ringan sampai sedang. Telah ditekankan bahwa SSRI lebih baik ditoleransi daripada TCAs dan lebih aman untuk overdosis.

Sebelumnya dianggap sebagai relatif aman dalam kehamilan dan menyusui, SSRI adalah contoh tentang bagaimana bukti dasar dapat berubah dari waktu ke waktu untuk obat baru. Dalam beberapa tahun terakhir telah ada sejumlah studi dan laporan kasus tentang SSRI dan venlafaxine dengan berbagai komplikasi neonatal seperti prematur, berat lahir rendah, neonatal pernafasan dan kesulitan neurobehavioural dan peningkatan penerimaan neonatal. Juga, telah ada hubungannya dengan insiden yang lebih tinggi dari tiga atau lebih kongenital anomali minor dan gejala penarikan neonatal dengan menggunakan fluoxetine. Kemungkinan hipertensi pulmoner pada bayi yang terkena SSRI pada akhir kehamilan (setelah 20 minggu kehamilan) sekarang diperkirakan meningkat sampai enam kali lipat [13]. Paroxetine telah dikaitkan dengan cacat septum ventrikel dan Cacat septum atrium [14] dengan risiko yang meningkat sekitar dua kali lipat dibandingkan dengan populasi umum. Itu masih harus dilihat apakah ini adalah efek kelas SSRI atau

specific ke paroxetine, tetapi pedoman NICE untuk kehamilan dan setelah melahirkan tidak merekomendasikan paroxetine dalam kehamilan.

Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa peningkatan SSRI dan venlafaxine dapat dikaitkan dengan meningkatnya gejala penarikan neonatal [15], ternyata menjadi paling berat dengan paroxetine. Meskipun SSRI tidak benar-benar kontraindikasi dalam kehamilan, paparan terhadap neonatus mungkin perlu berhati-hati karena pada pemantauan, neonatal dapat muncul masalah (gerakan abnormal, hipo hipertonia, insomnia dan dyspnoea) hingga bertahan hingga 5 hari.

SSRI telah dikaitkan dengan gangguan perdarahan pada orang dewasa, dan ada laporan kasus yang melibatkan bayi yang baru lahir. Bayi-bayi yang terkena fluoxetine prenatal mungkin memiliki kecenderungan untuk menderita penyakit. SSRI terus digunakan saat ini pada tahap tetapi beberapa obat seperti fluoxetine dan citalopram telah dilaporkan menyebabkan mudah marah dan penurunan nafsu makan bayi, terutama mereka yang prematur atau memiliki berat lahir rendah. Sertraline adalah saat ini berkaitan dengan sedikit masalah dalam menyusui.

## **Poin Kunci**

- Imipramine dan amitriptyline harus dianggap sebagai pilihan terapi lini pertama ketika antidepresan dibutuhkan dalam kehamilan.

## **Obat menstabilkan suasana hati**

Obat-obatan yang menstabilkan suasana hati seperti litium

dan obat anti-epilepsi carbamazepine, natrium valproate, dan lamotrigine dapat digunakan oleh psikiater dalam pengobatan akut mania, sebagai pengobatan pemeliharaan untuk gangguan afektif bipolar dan dalam pengobatan depresi resisten kronis. Semua obat menstabilkan suasana hati berpotensi teratogenik dan fetotoksik dan efek samping dari obat anti-epilepsi adalah juga berlaku bila digunakan dalam gangguan psikiatrik karena digunakan pada wanita dengan epilepsi.

Terutama wanita dengan gangguan afektif bipolar cenderung menggunakan obat penstabil mood untuk sebuah kehidupan reproduksi mereka. Karena itu penting bahwa mereka dibuat sadar akan risiko terlibat dalam melahirkan anak, baik dari pengobatan yang digunakan dan dari penghentian konsumsi obat yang mereka lakukan. Pedoman NICE mengenai kesehatan mental kehamilan dan setelah melahirkan merekomendasikan bahwa jika seorang wanita dengan gangguan afektif bipolar merencanakan kehamilan atau sudah hamil, dosis rendah obat antipsikotik dapat dipilih - untuk menstabilkan suasana hati baik untuk pengobatan akut mania dan sebagai prophylaxis bagi yang memiliki keadaan mental yang stabil. Obat anti-epilepsi dibahas dalam Bab 9.

## **Lithium**

Lithium telah lama dikenal untuk dihubungkan dengan malformasi kongenital jantung pada anomali Ebstein, yang melibatkan kelainan katup trikuspid. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, telah ditetapkan bahwa risiko anomali Ebstein's pada kehamilan tidaklah setinggi yang diperkirakan. Saat ini informasi yang

tersedia menunjukkan bahwa peningkatan kejadian anomali Ebstein berkisar antara 1:1.000 dan 1:2.000, dibanding kejadian 1:200.000. Meskipun risiko anomali Ebstein's diperkirakan pada bayi terkena lithium 10 - 20 kali lebih tinggi daripada yang diharapkan, risiko mutlaknya termasuk kecil (0.05 - 1.00%). Analisis data gabungan dari beberapa studi menunjukkan bahwa keseluruhan risiko penyakit jantung bawaan bervariasi dari 0,9 sampai 12,0% pada kehamilan terpapar lithium dibandingkan dengan 0,5-1,0% di populasi umum [16].

Risiko lain yang terkait dengan lithium yang belum diyakini, tapi telah ada laporan kasus yakni polyhydramnios setelah poliuria janin, bayi diabetes insipidus, aritmia, penyakit kuning, dan hipotiroidisme. Karena perubahan volume plasma ibu yang cepat pada saat, kadar serum lithium dapat meningkat tajam, menyebabkan toksisitas ibu dan bayi. Sindrom '*floppy bayi*' telah dijelaskan dalam konteks ini ditandai dengan kelesuan, hypotonia, sianosis, tachypnoea, takikardi dan eflaks isap yang jelek.

Wanita yang secara tidak sengaja hamil saat terpapar lithium tidak boleh tiba-tiba menghentikan pengobatan karena ada risiko significant akan kekambuhan penyakit mereka. Sruing USG awal akan memperjelas apakah atau janin memiliki cacat jantung bawaan, memungkinkan ibu hamil untuk membuat keputusan tentang melanjutkan kehamilan atau tidak.

Berbagai sumber ditinjau [17-19] menyarankan bahwa lithium adalah obat pilihan ketika penstabil *mood* diperlukan dalam kehamilan. Namun, bagi banyak perempuan itu

mungkin tidak dapat diterima karena selain kemungkinan malformasi jantung bawaan akibat terpapar di awal kehamilan, mungkin ada efek fetotoksik dari lithium jika terus digunakan dalam kehamilan lanjut. Perempuan tersebut mungkin memilih untuk tidak menggunakan lithium jadi sebaiknya dipantau ketat untuk tanda-tanda awal kekambuhan, dimana antipsikotik dosis kecil seperti haloperidol atau trifluoperazine mungkin segera diperlukan.

Apakah lithium digunakan dalam kehamilan akan sangat tergantung pada kasus per kasus. Pertimbangan risiko dan manfaatnya, harus diperhatikan selain respon untuk perawatannya. Wanita harus terlibat erat dalam keputusan yang dibuat.

### **Poin Penting**

Lithium digunakan dalam kehamilan

- Kehamilan harus ditegakkan sedini mungkin dan skrining USG dilakukan untuk menegakkan usia kehamilan.
- Rujukan mendesak ke spesialis fetomaternal mengenai penggunaan obat-obatan harus dibuat.
- Lithium tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba karena ada risiko *relaps*.
- Jika seorang wanita telah sebelumnya merasa baik selama 2 tahun atau lebih, lithium dapat perlahan-lahan ditarik selama kehamilan dengan dosis 200 mg setiap 4 minggu.
- Jika wanita dinilai berada pada risiko tinggi untuk kambuh jika lithium ditarik, kelanjutan dari

konsumsi lithium selama kehamilan mungkin diperlukan. Tingkat Lithium harus dipantau bulanan hingga 28 minggu kehamilan dan minggu-minggu sesudahnya.

- Ureum, elektrolit dan fungsi tiroid harus secara teratur dipantau.
- Scan USG terperinci yang lebih lanjut akan diperlukan untuk menyingkirkan kelainan jantung bawaan terutama jika lithium telah dihentikan segera sebelum atau setelah pembuahan.
- Lithium harus sedapat mungkin ditarik dan diturunkan perlahan-lahan dosisnya pada 38 minggu kehamilan.
- Untuk alasan apapun, misalnya, penurunan keadaan mental seorang wanita atau persalinan prematur, seorang wanita masih mengkonsumsi lithium pada awal persalinan, tingkat lithium harus dipantau selama persalinan dan pada periode pasca melahirkan karena bahaya naiknya kadar serum pada ibu secara tiba-tiba.
- Lithium harus diberi 400 mg sehari pada hari 1 pasca melahirkan secara bertahap dosis ditingkatkan seperti dosis pra-kehamilan selama 14 hari, dengan pemantauan serum awal mingguan untuk memastikan hidrasi yang adekuat.
- Litium diekskresikan dalam konsentrasi significant dalam air susu ibu dan karena itu tidak dianjurkan pada ibu menyusui (obat antipsikotik

dapat ditawarkan sebagai gantinya).

## **Antipsikotik**

Antipsikotik digunakan dalam pengelolaan gangguan kejiwaan yang akut dan kronis seperti skizofrenia, gangguan afektif bipolar (psikosis depresi, hypomania, mania), dan penyakit seperti skizofrenia. Individu dalam penyakit ulangan mungkin melanjutkan untuk konsumsi obat antipsikotik. Meskipun beberapa antipsikotik tipikal yang bekerja dengan cara memblokir reseptor dopamin berpotensi dapat mengurangi kesuburan dengan meningkatkan kadar prolaktin serum, antipsikotik atypical cenderung untuk tidak memiliki efek ini (risperidone dan amisulpiride dikecualikan). Perempuan yang mengonsumsi antipsikotik tersebut mungkin menjadi hamil dan dapat meneruskan kehamilannya. Efek akut atau kronis penyakit psikotik pada ibu umumnya lebih besar daripada risiko janin terhadap obat antipsikotik dan sangat penting untuk mengobati penyakit psikotik secara komprehensif.

## **Obat antipsikotik tipikal**

Data pada penggunaan phenothiazines (chlorpromazine, trifluoperazine dan fluphenazine) dalam kehamilan ini didasarkan pada studi tentang hiperemesis gravidarum. Dosis obat yang kecil digunakan untuk kondisi tersebut daripada penyakit psikotik, ini harus diingat antara risiko dan manfaatnya. Telah ada laporan kasus malformasi kongenital seperti penyebab microcephaly, sindaktil, dan cacat jantung yang terkait dengan penggunaan phenothiazine, tetapi studi besar telah gagal untuk menunjukkan risiko yang signifikan. Ada

sedikit bukti teratogenik terkait dengan penggunaan seperti haloperidol, antipsikotik tipikal dari kelompok butirophenone.

Dalam praktek klinis jika efek sedasi diperlukan pada penyakit akut psikotik, maka chlorpromazine dapat digunakan dalam dosis terbagi. Haloperidol dan Trifluoperazine adalah obat pilihan. Ini adalah praktek terbaik untuk meresepkan antipsikotik sebagai terapi oral dalam kehamilan untuk memungkinkan fleksibilitas lebih besar dalam pemberian dosisnya. Pedoman NICE pada kehamilan dan setelah melahirkan tidak merekomendasikan penggunaan rutin depot antipsikotik dalam kehamilan karena efek samping ekstrapiramidal dapat terjadi pada anggota badan/bayi beberapa bulan setelah konsumsi obat. Fluphenazine adalah satu-satunya antipsikotik yang tersedia sebagai depot di Inggris untuk penggunaan selama kehamilan.

Phenothiazines seperti haloperidol dapat menyebabkan gejala penarikan atau gejala-gejala ekstrapiramidal pada neonatus dan karena itu sedapat mungkin, pengobatan harus ditarik pada 36-38 minggu kehamilan.

### **Atipikal antipsikotik**

Antipsikotik 'atypical' baru telah meningkat penggunaannya selama dekade terakhir karena mereka dikatakan lebih baik toleransi sedasinya dan efek samping ekstrapiramidal minimal. Karena reseptor blokade dopamin adalah lemah dalam kelompok obat-obatan ini, kadar prolaktin cenderung meningkat dan karena itu

kesuburan tidak menurun. Kehamilan dapat terjadi pada waktu pergantian pengobatan antipsikotik tipikal menjadi atipikal.

Database untuk penggunaan dan efek obat antipsikotik atipikal masih minim untuk saat ini. Sejumlah laporan kasus ada, yang menggambarkan hasil yang beragam dari kehamilan yang terkena clozapine. Ini termasuk ibu hiperglikemia dan gestational diabetes serta janin dan bayi masalah (*floppy baby sindrom*, kejang dan malformasi tak terdefiniskan). Clozapine tidak dapat rekomendasikan dalam kehamilan saat ini, terkait efek agranulositosis pada pasien dewasa. Laporan kasus penggunaan olanzapine pada kehamilan tidak terkait dengan kelainan bawaan spesifik, tapi diabetes gestational, macrosomia janin, bayi dengan pembesaran jantung, penyakit kuning, dan kejang telah dilaporkan [20]. Saat ini masih sedikit yang diketahui tentang penggunaan quetiapine dan risperidone dalam kehamilan.

### **Poin Penting**

- Pilihan obat anti-kejang dalam kehamilan adalah trifluoperazine dan haloperidol.
- Menggunakan pengobatan oral, dalam dosis terendah dimungkinkan (ini akan juga mengurangi risiko efek samping ekstrapiramidal seperti obat-obatan antimuskarinik yang tidak dianjurkan dalam kehamilan).
- Dosis yang diturunkan dan penghentian pengobatan antara 36 dan 38 minggu kehamilan sedapat

mungkin dilakukan.

- Observasi neonatus untuk efek samping.
- Trifluoperazine dan haloperidol dapat digunakan dalam menyusui.

## Referensi

1. Oates M. **Psychiatric disorders in pregnancy and the post-partum period.** In: Greer I, Nelson-Piercy C and Walters B (eds.), *Maternal Medicine: Medical Problems in Pregnancy.* New York: Churchill-Livingstone; 2007:295–308.
2. National Institute for Health and Clinical Excellence. **Antenatal and Postnatal Mental Health: Clinical Management and Service Guidance.** NICE Guideline Number 45; 2007.
3. Oates M for CEMACH. **Deaths from psychiatric causes.** In: *Why Mothers Die 2000–2002, Sixth Report of the Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United Kingdom.* London: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; 2004:152–73.
4. Cantwell R, Oates M. **Screening in pregnancy for serious risk of postnatal mental illness.** In: O’Keane V, Marsh M, Senevratne G (eds.), *Psychiatric Disorders in Pregnancy.* London and New York: Taylor & Francis Group; 2006:5–20.
5. Royal College of Psychiatrists Council. **Perinatal Maternal Mental Health Services, Report CR88.** London: Royal College of Psychiatrists; 2000.
6. Rubin P. **Drug treatment in pregnancy.** *BMJ* 1998;317:1503–6.
7. Wilton LV, Pearce GL, Martin RM, Mackay FJ and Mann RD. **The out-comes of pregnancy in women exposed to newly marketed drugs in general practice in England.** *Br J Obstet Gynaecol* 1998;105:882–9.
8. McElhatton P. **Teratogenicity and psychotropic drug**

- use in pregnancy. In: O'Keane V, Marsh M, Senevratne G (eds.), *Psychiatric Disorders in Pregnancy*. London and New York: Taylor & Francis Group; 2006:223-46.
9. Wieck A. **Management of psychosis before, during and after pregnancy.** In: O'Keane V, Marsh M, Senevratne G (eds.), *Psychiatric Disorders in Pregnancy*. London and New York: Taylor & Francis Group; 2006:107-24.
  10. Sanz E, De-las-Cuevas C, Kiuru A, Bate A and Edwards R. **Selective serotonin-reuptake inhibitors in pregnant women and neonatal with drawal syndrome: a database analysis.** *Lancet* 2005;365:482-7.
  11. Garbis H, McElhatton P. **Psychotropic, sedative-hypnotic and Parkinson drugs.** In: Schaefer C (ed.), *Drugs in Pregnancy and Lactation*. Amsterdam: Elsevier Science; 2001:182-91.
  12. The National Teratology Information Service (NTIS). **Treatment of depression in pregnancy.** Monograph, 2005.
  13. Chambers CD, Hernandez-Diaz S, Van Marter LJ, Werler MM, Louik C, Jones KL and Mitchell AA. **Selective serotonin-reuptake inhibitors and risk of persistent pulmonary hypertension of the newborn.** *N Engl J Med* 2006;354:579-87.
  14. The National Teratology Information Service (NTIS). **Use of Paroxetine in pregnancy.** Monograph, 2005.
  15. Ferreira E, Carcellar AM, Agogue C, Martin BZ, St-Andre M, Francoeur D and Berard A. **Effects of selective serotonin-reuptake inhibitors and venlafaxine during pregnancy in term and pre-term neonates.** *Pediatrics* 2007;119:52-9.
  16. Viguera AC, Cohen LS, Baldessarini RJ and Nonacs R. **Managing bipolar disorder during pregnancy: weighing the risks and benefits.** *Can J Psych* 2002;47(5):426-36.
  17. Llewelyn A, Stowe ZN, Strader JRJ. **The use of lithium and management of women with bipolar disorder**

- during pregnancy and lactation [review]. *J Clin Psychiat* 1998;59(Suppl 6):57-64.
18. Garbis H and McElhatton P. Psychotropic, sedative-hypnotic and Parkinson drugs. In: Schaefer C (ed.) *Drugs in pregnancy and lactation*. Amsterdam: Elsevier Science; 2001:182-91.
  19. McElhatton P. Teratogenicity and psychotropic drug use in pregnancy. In: O'Keane V, Marsh M and Senevratne G (eds.) *Psychiatric disorders in pregnancy*. London and New York: Taylor & Francis Group; 2006:223-46.
  20. The National Teratology Information Service (NTIS). **Minipreg summaries on clozapine, olanzapine, quetiapine and risperidone 2002.**



## BAB 9

# PENATALAKSANAAN DIABETES DALAM KEHAMILAN

*Nick Vaughan, Kate Morel, Louise Walker*

### Pendahuluan

Diabetes adalah gangguan yang paling umum yang mempengaruhi hasil kehamilan. Dua sampai tiga per seribu konsepsi dan proporsi yang signifikan pada wanita hamil normal mungkin akan mengalami komplikasi diabetes gestasional. Namun, dengan prevalensi diabetes tipe 2 yang meningkat secara dramatis, lebih dari seperempat dari semua diabetes sebelum kehamilan masuk dalam kelompok ini. Diabetes tipe 2 sangat terkait dengan deprivasi sosial pada etnik minoritas. Hal ini membawa risiko sama besar dari luaran bayi seperti pada diabetes tipe 1.

Di Inggris, bayi perempuan dengan diabetes tipe 1 atau tipe 2 memiliki kemungkinan lahir mati sebesar lima kali lipat dan kemungkinan untuk meninggal di bulan pertama kelahiran adalah sebesar tiga kali lipat dibandingkan dengan bayi dari ibu yang tidak menderita diabetes. Bayi-bayi ini memiliki risiko dua kali lipat untuk menderita kelainan kongenital. Hasil statistic ini berasal dari laporan Confidential Enquiry into Maternal and Child Health (CEMACH report). Penelitian ini menyoroti tentang perlunya kepastian pelayanan yang efektif dan terintegrasi bagi wanita dengan diabetes meliputi konseling, pelayanan dasar yang bertanggungjawab, dan pelayanan spesialisik esensial. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kerja keras untuk mencapai standar yang ditetapkan oleh *Diabetes*

*National Service Framework (NSF) [2] dan NSF untuk anak, pelayanan remaja dan maternal. Tujuan dari deklarasi 15 tahun lalu pada deklarasi St. Vincent [4] adalah memperoleh luaran kehamilan yang hamper sama antara wanita dengan diabetes dan wanita non-diabetes.*

Kehamilan merupakan risiko tinggi bagi wanita yang menderita diabetes serta janinnya, dan kontrol metabolik yang baik bagi wanita hamil dengan diabetes adalah hal yang sangat penting. Komplikasi seperti makrosomia, hipoglikemia neonatal, keguguran, KJDR, dan hidramnion, serta peningkatan kematian perinatal dan morbiditas neonatal dapat diminimalkan dengan upaya intensif untuk mencapai normoglikemia. Beberapa pusat melaporkan bahwa saat ini tingkat mortalitas perinatal pada bayi dari ibu yang menderita *insulin dependent diabetes* hampir mendekati nilai pada wanita normal, tetapi masih cukup mengecewakan bahwa hasil seperti ini tidak secara luas dapat tercapai. Perlu diingat bahwa komplikasi yang sering pada kehamilan seperti infeksi, hidramnion, pre-eklampsis, dan insufisiensi plasenta dapat lebih sering terjadi dan komplikasi spesifik dari diabetes seperti retinopati dapat berkembang pesat selama kehamilan. Selain itu, peningkatan kelainan kongenital berat dibandingkan dengan kehamilan non-diabetes langsung berhubungan dengan kontrol metabolik dalam beberapa bulan sebelum dan pada saat konsepsi.

Pada kelompok pemerhati diabetes dalam kehamilan, perhatian dititikberatkan pada pendekatan tim multidisiplin, yang terdiri tim diabetologist, dokter kandungan, perawat khusus diabetes, bidan, ahli gizi, neonatologist, dan yang paling penting adalah pasien sendiri. Pendidikan prakonsepsi dan konseling untuk wanita dengan diabetes

pra-kehamilan, penggunaan alat pemantauan glukosa darah di rumah untuk mencapai kontrol glikemik yang optimal, pengawasan ketat ibu dan janin dengan waktu dan metode persalinan yang dipilih adalah untuk mengurangi luaran kehamilan yang buruk dari ibu hamil dengan diabetes.

Hal ini diterima bahwa kontrol glikemik yang baik harus dicapai sebelum dan selama kehamilan untuk mengurangi risiko hasil luaran kehamilan yang buruk. Peningkatan kadar glukosa darah pada periode pra-konsepsi dihubungkan dengan meningkatnya kejadian abortus dan kelainan kongenital berat. [5-7]. Haemoglobin terglikosilasi (HbA1c) sebaiknya digunakan untuk memantau control glikemik jangka panjang. Selama periode prakonsepsi dan selama kehamilan direkomendasikan bahwa HbA1c harus berada dalam kisaran yang normal seperti pada wanita nondiabetik. Salah satu keputusan yang paling baik adalah pilihan terapi insulin baik sebelum dan selama kehamilan. Setiap pasien harus memiliki regimen insulin yang cukup fleksibel untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal sepanjang hari dan malam, tanpa hipoglikemia serius, dan yang juga akan mengakomodasi peningkatan kebutuhan insulin sebagai imbas dari kehamilan yang sedang berlangsung. Bab ini menguraikan bagaimana menentukan manajemen diabetes untuk wanita dengan diabetes, baik tipe 1 dan tipe 2, serta bagi mereka dengan diabetes gestasional yang membutuhkan terapi insulin. Tidak boleh dilupakan bahwa di banyak Negara wanita hamil dengan diabetes tipe 2 secara substansial melebihi jumlah mereka yang tipe 1 dan peningkatan prevalensi sedang terlihat di Inggris. Beberapa pasien yang sebelumnya tidak dideteksi menderita diabetes tipe 2 dapat terdeteksi selama kehamilan. Namun, identifikasi diabetes gestasional

tidak dibahas karena hal ini sudah dibahas dengan baik pada bab lain [8,9].

### **Perubahan Metabolik pada ibu hamil yang normal dan ibu hamil dengan diabetes**

Penting untuk penatalaksanaan diabetes pada kehamilan adalah pemahaman perubahan metabolik yang terjadi pada ibu tanpa diabetes. Konsentrasi glukosa plasma tetap sangat konstan, meskipun sedikit lebih rendah daripada wanita yang tidak hamil. Hal ini meningkatkan resistensi insulin akibat perubahan dalam lingkungan hormonal termasuk meningkatnya kadar estrogen, progesteron dan human placental lactogen. Peningkatan Sekresi insulin mampu mengimbangi perubahan ini jika cadangan sel-pulau fungsional tidak memadai untuk memenuhi peningkatan kebutuhan insulin, maka diabetes gestasional akan berkembang. Seperti 50% pasien dengan diabetes gestasional akan berkembang menjadi non-insulin dependent diabetes di kemudian hari ada kemungkinan bahwa mereka sudah memiliki defek sel- $\beta$  intrinsik.

Awalnya terjadi adaptasi metabolik selama kehamilan dengan peningkatan penyimpanan energi dan sebagian besar berat badan awal yang terlihat pada kehamilan merupakan konsekuensi dari penumpukan lemak. Namun, tuntutan kebutuhan substrat janin secara bertahap meningkat dan di akhir trimester kedua ini cukup besar. Sebagai akibatnya terjadi peningkatan kehilangan glukosa pada janin dan peningkatan mobilisasi lemak pada ibu yang menyebabkan peningkatan plasma asam lemak non-esterifikasi dan level keton. Hal ini kadang-kadang disebut sebagai '*accelerated starvation*' [10]. Pada pasien dengan

diabetes, transfer preferensial glukosa ke janin sangat merusak untuk kontrol metabolik ibu kecuali ada kompensasi yang memadai dengan peningkatan diet karbohidrat.

Sel  $\beta$  janin biasanya tidak dirangsang oleh perubahan fisiologis glukosa, tetapi ketika diabetes maternal ibu tidak terkontrol dengan baik maka janin terekspose lebih tinggi dari biasanya. Peningkatan pengiriman metabolit merangsang pulau (Langerhans) janin, menyebabkan hiperinsulinemia dan hiperplasia sel- $\beta$ . Difusi yang difasilitasi glukosa melewati plasenta menjadi jenuh sekitar 11 mmol/L, sehingga laju perpindahan glukosa ke janin tidak meningkat ketika glukosa darah ibu meningkat melampaui tingkat ini. Dengan demikian, efek menguntungkan dari kontrol glukosa darah ibu hanya terlihat di bawah sekitar 10 mmol/L. Peningkatan kontrol dari 'buruk' menjadi 'rata-rata' akan memiliki sedikit efek fisiologis pada transport glukosa dan tidak akan bermanfaat bagi perkembangan janin dan kemajuan. Hiperinsulinemia janin dapat mengarah ke makrosomia, mungkin menghambat pematangan paru dan produksi surfaktan, dan peningkatan respon sel- $\beta$  selama persalinan dapat menyebabkan hipoglikemia persisten.

### **Kelompok pemerhati perawatan diabetes pada kehamilan**

Perawatan harus difokuskan dalam unit yang mengkhususkan diri dalam pengelolaan kehamilan dengan diabetes dan sebaiknya dikelola oleh tim multidisipliner yang terdiri dari diabetologist dan dokter kandungan dengan minat khusus pada kehamilan dan diabetes, perawat khusus diabetes, ahli gizi, neonatologist, dan dokter mata.


Pasien harus dapat dipantau secara teratur dan sering (setidaknya dua minggu dengan kontak telepon di antara sampai 34 minggu dan kemudian mingguan) sebelum, selama, dan setelah kehamilan. Klinik Bersama, dengan dokter kandungan, diabetolog, perawat khusus diabetes, dan ahli gizi, adalah tempat perawatan yang optimal. Wanita-wanita dengan diabetes gestasional harus mendapatkan perawatan yang sama.

### **Konseling Pre-Konsepsi**

Idealnya, kehamilan pada wanita dengan diabetes harus direncanakan. Diskusi tentang perlunya kontrol glikemik yang baik sebelum dan selama kehamilan sebaiknya dilakukan sebelum setiap upaya untuk hamil. Mayoritas wanita dengan diabetes tipe 2 akan membutuhkan insulin dan beberapa persiapan untuk ini mungkin diperlukan sebelum konsepsi yang dimaksud. Bagi wanita kelebihan berat badan dengan diabetes tipe 2 atau diabetes gestasional sebelumnya, itu juga merupakan kesempatan untuk meninjau ulang pola diet untuk mendorong perubahan pola makan dan gaya hidup untuk membantu mereka untuk meningkatkan kontrol glikemik dan mencapai berat badan yang optimal sebelum konsepsi. Kontrol glikemik yang intensif serta penurunan berat badan sebelum konsepsi dapat memperbaiki luaran kehamilan [11].

Malformasi kongenital umumnya terjadi pada kehamilan dengan diabetes tipe 2, tapi ini mungkin hanya mencerminkan tingkat kontrol glikemik pada awal kehamilan. Meskipun penurunan dramatis dari banyak komplikasi yang berhubungan dengan kontrol metabolik yang buruk, angka kejadian malformasi kongenital pada bayi dari ibu dengan diabetes tetap dua sampai tiga kali lebih besar dari kejadian pada populasi umum. Anomali

janin dan beberapa malformasi masih lebih sering terjadi dibandingkan dengan populasi normal. Hal ini memiliki membuktikan keterkaitan secara langsung level HbA1 pada saat konsepsi [12] (Gambar 10.1).



Gambar 9.1 Risiko relatif malformasi kongenital dalam diabetes pada kehamilan yang berhubungan dengan HbA1 di konsepsi.

Organogenesis untuk semua tempat di mana anomali kongenital anak dari ibu dengan diabetes yang paling umum adalah dasarnya lengkap dalam 6 minggu pertama dari kehamilan, sebelum ibu mungkin menyadari dia bahkan hamil. Kehamilan harus demikian idealnya ditunda sampai kontrol metabolic jangka panjang telah dicapai. Sebagai patokan biasanya digunakan control HbA1c pada kisaran normal non-diabetik. Wanita dengan diabetes memiliki peningkatan risiko terjadinya defek neural tube janin and sebaiknya diberikan suplemen asam folat (5 mg/hari) [13-16] dilanjutkan sampai kehamilan 12 minggu.

## Penatalaksanaan Diabetes dalam Kehamilan

### Manajemen Nutrisi

Modifikasi diet yang adekuat mungkin merupakan satu-satunya aspek yang paling penting dalam konteks penatalaksanaan diabetes dalam kehamilan. Tanpa itu, pencapaian kontrol glikemik mendekati normal merupakan hal yang sulit, bahkan tidak mungkin. Tujuan dari terapi nutrisi dan nasehat dietetic selama kehamilan adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kontrol glikemik.
- Memastikan nutrisi yang cukup untuk ibu dan janin.
- Memberikan panduan tentang keamanan pangan dan menghindari makanan spesifik yang merugikan selama kehamilan.
- Mengelola masalah umum untuk kehamilan yang dapat mempengaruhi asupan makanan atau kebutuhan nutrisi.
- Mengelola berat badan.

Ada konsensus bahwa semua wanita dengan diabetes (tipe 1 atau tipe 2) harus menerima saran prakonsepsi dari seorang ahli diet yang terdaftar dan kemudian secara teratur sepanjang kehamilan dalam menemui tim spesialis multidisiplin. Hal ini sangat penting untuk mereka dengan diabetes tipe 1 yang sudah ada karena mereka sangat mungkin untuk menyesuaikan diri dosis insulin waktu makan mereka sesuai dengan karbohidrat yang terkandung pada makanan mereka, merencanakan aktivitas fisik dan kadar glukosa darah sebelum makan. Wanita dengan diabetes gestasional juga harus memiliki akses ke ahli gizi. Peningkatan luaran kehamilan telah ditunjukkan dalam sebuah penelitian intoleransi glukosa pada wanita hamil di Australia dimana dilakukan percobaan pada mereka yang

menerima saran diet individual dari seorang ahli diet terdaftar sebagai bagian dari manajemen mereka [17]. Konsultasi diet juga menyediakan kesempatan untuk mendiskusikan tentang menyusui, manajemen berat badan postpartum dan untuk wanita dengan diabetes gestasional, diet dan saran gaya hidup untuk mengurangi risiko diabetes berkembang di masa depan.

Untuk mengoptimalkan kontrol glikemik, karbohidrat yang adekuat didistribusikan melalui makanan biasa dan makanan ringan (antara waktu makan dan pada waktu tidur) direkomendasikan untuk semua wanita dengan diabetes pada kehamilan, termasuk mereka dengan diabetes gestasional. Hal ini penting untuk membantu mencegah episode hipoglikemik, menjaga sensitivitas insulin dan menghindari '*starvation ketosis*'. Tak pelak, di mana insulin digunakan untuk mencapai kontrol glikemik yang ketat, risiko hipoglikemia akan lebih besar dan ketakutan hipoglikemia menjadi potensi penghalang untuk mencapai target glukosa darah yang diperlukan. Penyertaan makanan dengan indeks glycemic karbohidrat rendah dapat membantu meningkatkan kontrol glikemik. Pilihan indeks glikemik rendah dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi risiko hipoglikemia dan ketosis, dan mengurangi hiperglikemia postprandial selama kehamilan [11]. Jika wanita kelebihan berat badan, atau memiliki peningkatan berat badan yang berlebihan selama kehamilan, mereka akan membutuhkan tuntunan memilih diet rendah lemak yang tepat, makanan ringan yang kaya karbohidrat, seperti buah, yoghurt rendah lemak dan buah dikeringkan.

Diet selama kehamilan harus memiliki kandungan gizi cukup. Ini tidak berbeda untuk wanita yang memiliki kecenderungan diabetes gestasional atau telah menderita

diabetes gestasional. Ada persyaratan tambahan untuk nutrisi tertentu selama kehamilan. Meskipun beberapa dari ini akan mengalami peningkatan penyerapan dan penurunan kehilangan zat, penilaian diet dengan ahli gizi, akan memperbaiki preconsepsi, dapat mengidentifikasi wanita yang berisiko dan perubahan pola makan yang tepat atau suplemen dapat disarankan. Suplementasi folat sampai 12 minggu kehamilan sangat penting. Secara umum, pilihan makanan yang kaya nutrisi harus didorong (seperti buah, sayuran, biji-bijian, daging tanpa lemak, produk susu rendah lemak) bukan makanan yang tinggi kalori, lemak dan gula dan makanan dengan nilai gizi sedikit (seperti kue).

Balai pengawasan makanan secara berkala meninjau dan meng-*update* saran untuk kehamilan, dan rekomendasi yang spesifik ini tersedia di situs *web* mereka (<http://www.eatwell.gov.uk>). Guideline dapat dikategorikan ke dalam nasihat mengenai kebersihan makanan untuk mencegah kontaminasi makanan selama kehamilan dan untuk menghindari atau membatasi makanan yang mengandung polutan atau alergen, karena risiko keracunan makanan atau karena kandungan vitamin A, kafein, atau kadar alkohol.

Mual, nyeri ulu hati, mulas, sembelit, anemia adalah masalah umum dalam kehamilan. Bagi wanita dengan diabetes, ini dapat sangat mengganggu karena dapat mempengaruhi kontrol glikemik serta asupan gizi. Dalam banyak kasus, nasihat mengenai pilihan makanan dan pola makan mungkin cukup untuk meredakan masalah ini, setidaknya ke tingkat yang memungkinkan pencapaian asupan gizi yang adekuat. Namun, beberapa wanita dengan diabetes tipe 1 dengan mual parah atau hiperemesis gravidarum mungkin memerlukan beberapa bentuk

dukungan nutrisi untuk mencegah hipoglikemia atau ketoasidosis. Para wanita ini akan membutuhkan masukan dari tim spesialis yang mencakup ahli gizi.

Bila mungkin, wanita gemuk dengan diketahui menderita diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2 harus didorong untuk menurunkan berat badan prakonsepsi [18], meskipun penurunan berat badan aktif selama kehamilan tidak dianjurkan karena berisiko mengorbankan gizi dan pertumbuhan janin. Rekomendasi untuk mendapatkan berat badan yang tepat dalam kehamilan antara 7 dan 16 kg [19], berdasarkan BMI prakonsepsi dan mungkin menyarankan bahwa makanan rendah lemak, pilihan kaya nutrisi lebih baik untuk mengganti makanan tinggi lemak, makanan berkalori tinggi untuk mencegah kelebihan berat badan selama kehamilan. Terdapat beberapa konsensus, walaupun sedikit tentang energi yang optimal, karbohidrat dan komposisi lemak diet untuk wanita dengan diabetes gestasional meskipun diet rendah kalori saat ini tidak direkomendasikan [18]. Wanita dengan berat badan berlebih yang telah menderita diabetes gestasional harus didorong untuk melanjutkan kebiasaan makan yang sehat postpartum, untuk mencapai penurunan berat badan untuk mengurangi risiko terkena diabetes gestasional pada kehamilan berikutnya dan mengurangi risiko diabetes tipe 2 di kemudian hari.

### **Terapi Insulin**

Beberapa faktor harus dipertimbangkan ketika memilih rejimen insulin. Setiap rejimen harus dapat diperhitungkan perubahan sensitivitas insulin substansialnya sehingga dapat digunakan meningkatkan dosis harian insulin beberapa kali lipat selama perkembangan kehamilan. Pengukuran glukosa darah di rumah secara teratur penting

tidak hanya untuk memenuhi variasi konsentrasi glukosa darah sehari-hari, tetapi juga untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan insulin. Ini harus dilakukan dengan alat pengukuran glukosa darah di rumah yang mempunyai memori (berguna untuk menilai kepatuhan). Dengan tingkat pengawasan ini dan pasien hampir selalu termotivasi tinggi, memungkinkan untuk mencapai kontrol regimen insulin yang tepat pada pemakaian kombinasi dua atau lebih insulin injeksi. Namun, penggunaan beberapa suntikan ('*bolus regimen basal*') telah menjadi praktek umum. Perubahan substansial dalam strategi paling baik dimulai sebelum hamil.

### **Pemilihan Rejimen Insulin**

Adalah lebih baik untuk menggunakan human insulin pada diabetes dalam kehamilan, meskipun adab sebagian kecil pasien yang masing menggunakan insulin dari hewan, karena koma hipoglikemik mungkin sulit berubah. Insulin Porcine mungkin diterima tetapi insulin sapi (bovine) sebaiknya dihindari karena dapat menghasilkan tingka antibodi insulin yang bebas melintasi plasenta. Ini dapat menyebabkan morbiditas bayi, mungkin mempengaruhi fungsi sel- $\beta$  janin dan mempengaruhi sekresi insulin neonatal. Sementara analog insulin saat ini memiliki sifat teoritis menarik untuk kehamilan, namun tidak ada yang diizinkan untuk digunakan dalam kehamilan. Beberapa analog short-acting yang digunakan lebih luas, tampaknya tanpa masalah.

### **Rejimen Insulin satu kali sehari**

Rejimen ini Jarang sekali tepat pada wanita yang didiagnosa diabetes sebelum kehamilan, namun injeksi sekali sehari sebelum sarapan bisa sangat efektif pada

beberapa wanita dengan diabetes tipe 2 atau diabetes gestasional ringan. Setiap individu biasanya dapat memproduksi insulin yang cukup dalam keadaan puasa di malam hari untuk mempertahankan normoglikemia dan dengan perantaraan insulin, misalnya, sebuah isofan, seperti Humulin I (Lilly), Insulatard (Novo Nordisk-) akan cocok. Tambahan *short-acting* atau insulin yang larut, misalnya, Actrapid (Novo Nordisk-) atau Humulin S (Lilly) dapat ditambahkan kemudian sebagai komponen *fast acting* untuk melawan postprandial hiperglikemia. Penggunaan rejimen tersebut secara signifikan mengurangi kejadian makrosomia janin pada wanita dengan diabetes gestasional bila dibandingkan dengan pengobatan dengan diet saja [20].

Yang lebih baru analog insulin *short acting* lispro (Humalog (Lilly)) dan aspart insulin (Novorapid (Novo Nordisk-)) memiliki karakteristik penyerapan yang cepat yang memberikan konsentrasi insulin puncak lebih cepat dari yang diperoleh dengan insulin manusia. Pemberian insulin ini menghasilkan konsentrasi glukosa plasma postprandial lebih rendah [21,22]. Ini adalah terapi menarik dalam konteks peningkatan resistensi insulin yang berhubungan dengan kehamilan. Namun, tidak diketahui apakah insulin analog ini teratogenik. Insulin maternal hanya dapat melewati plasenta jika antibodi terikat. Dalam uji klinis dengan lispro insulin, belum ada peningkatan respon antibody yang diamati. Ini berarti transfer insulin sedikit dari ibu ke janin tidak meningkatkan risiko malformasi kongenital [21,23]. Sebuah studi multinasional multisenter pada 500 kehamilan yang terpapar lispro insulin (Humalog) selama organogenesis tidak menunjukkan peningkatan kejadian malformasi [24].

Kecemasan yang berkembang bahwa penggunaan lispro insulin selama kehamilan dengan komplikasi diabetes dapat mempercepat retinopati melalui pengaruhnya terhadap IGF-1 (insulin-like growth factor 1) sistem [25]. Hal ini tampaknya tidak mungkin mengingat lispro insulin berikatan dengan IGF-1 reseptor dengan afinitas hanya sekitar 1/1000 dengan manusia. Insulin aspart (Novorapid) hanya memiliki 69% aktifitas IGF-1 dari insulin manusia. Sementara sisanya tidak memiliki izin untuk digunakan dalam kehamilan, analog insulin ini yang digunakan di beberapa center.

### **Kombinasi dua kali sehari dari Insulin short acting dan intermediate acting**

Jenis rejimen ini masih cukup banyak digunakan di luar kehamilan meskipun berkurang dalam preferensi untuk rejimen prandial basal dan sangat mampu memberikan kontrol yang memadai selama kehamilan. Kombinasi yang biasanya digunakan adalah insulin larut dengan insulin isofan. Formulasi Pra-campuran insulin ini harus dihindari pada kehamilan karena memiliki fleksibilitas yang cukup. Adalah lebih baik untuk mengubah wanita yang menggunakan insulin yang bebas campuran selama periode prakonsepsi. Kemampuan untuk mengubah Proporsi insulin short acting dan insulin intermediate-acting penting karena saat kehamilan berlanjut, keseimbangan diperlukan antara kedua rejimen tersebut dapat berubah seiring dengan meningkatnya resistensi insulin. Sering ditemukan bahwa hiperglikemia sebelum sarapan tidak dapat dicegah dengan meningkatkan dosis malam insulin isofan tanpa menimbulkan hipoglikemia pada malam hari, sebagian sebagai hasilnya penggunaan glukosa berlanjut di unit

fetoplasenta. Solusi untuk masalah ini adalah dengan membagi injeksi malam, insulin *short acting* bersama dengan makan malam dan insulin *intermediate acting* diberikan pada waktu tidur. Dengan demikian, selama kehamilan berlangsung, proporsi insulin *short-acting* yang diperlukan mungkin meningkat, mencerminkan peningkatan resistensi insulin, dan untuk mengontrol hiperglikemia postprandial pada sore hari sering perlu untuk meninggalkan dosis pagi insulin *intermediate acting* sebagai tambahan pemberian insulin *short acting* waktu makan siang. Dari umur kehamilan 36 minggu dan seterusnya ada kecenderungan untuk konsentrasi glukosa darah puasa turun yang mungkin memerlukan pengurangan atau bahkan penghilangan injeksi malam Insulin *intermediate acting*. Penurunan dramatis mendadak dalam kebutuhan insulin pada umur kehamilan ini merupakan tanda waspada untuk dokter akan kemungkinan insufisiensi plasenta yang mengancam kehamilan.

### **Pemberian beberapa kali injeksi insulin setiap hari**

Banyak pasien muda dengan diabetes telah menggunakan rejimen tersebut, menggunakan alat injeksi insulin dengan bentuk pen. Ini merupakan cara yang memuaskan untuk mencapai kontrol metabolik yang sangat baik, mudah dipahami oleh pasien dan dapat dengan mudah diubah untuk mengatasi variasi dalam diet dan aktivitas. Secara umum, insulin *short-acting* insulin diberikan dengan masing-masing makanan utama setiap hari dan isofan diberikan pada waktu tidur. Pemantauan diri sangat penting untuk jenis rejimen ini, tapi ini tidak akan berbeda dari apa yang diperlukan selama kehamilan. Sayangnya, insulin glargine (Lantus (Sanofi-Aventis)), sementara yang biasa digunakan di kedua tipe 1 dan

diabetes tipe 2, adalah tidak berlisensi untuk kehamilan dan secara teoritis tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam kehamilan. Rejimen ini memiliki afinitas mengikat enam kali lipat lebih tinggi untuk IGF-1 reseptor dan studi eksperimental memperlihatkan peningkatan mitogenisitas sel tumor pada dosis tinggi. Sampai studi skala besar menunjukkan bahwa transfer plasenta insulin glargine mirip untuk transfer insulin manusia dan tidak ada peningkatan risiko untuk janin, agen ini tidak dianjurkan. Penggunaannya mungkin hanya dibenarkan pada hipoglikemia berat yang telah menjadi masalah, dan harus ada diskusi penuh dari isu-isu keselamatan dengan pasien. Selain itu, ini berarti bahwa pasien yang diberikan insulin glargine harus beralih kembali ke insulin basal isofan di periode prakonsepsi, atau segera kehamilan yang tidak direncanakan terdeteksi. Insulin Detimir (Levemir (Novo Nordisk-)), analog insulin *long acting* lain tidak menyebabkan peningkatan aktivitas IGF-1, sehingga akhirnya mungkin terbukti menjadi alternatif yang menarik insulin *long-acting*, tapi sekali lagi saat ini belum direkomendasikan untuk digunakan dalam kehamilan.

### **Infus Continuous subcutaneous insulin**

*Loop* terbuka infus insulin subkutan dengan miniatur pompa dapat mencapai kontrol glikemik mendekati normal pada pasien terpilih yang tepat. Namun, rejimen injeksi multipel tetap menjadi solusi sederhana yang memungkinkan mencapai hasil yang sangat mirip dan infus insulin subkutan yang berkelanjutan berpotensi lebih berbahaya pada kehamilan. Hipoglikemia berat adalah risiko yang signifikan dan perkembangan ketoasidosis yang cepat jika terjadi kegagalan memompa insulin. Pilihan ini harus dipertimbangkan sangat hati-hati dan mungkin hanya

dilakukan di pusat-pusat dengan pengalaman pompa yang luas.

### Agen Hipoglikemik Oral

Umumnya, wanita dengan diabetes tipe 2 diberikan sulfonilurea dan/atau metformin sebelum konsepsi. Sampai sekarang, obat ini masih sangat jarang digunakan dalam pengelolaan diabetes pada kehamilan, meskipun penggunaan metformin telah meningkat baru-baru ini. Kekhawatiran utama tentang penggunaan sulfonilurea pada kehamilan adalah kemungkinan untuk meningkatkan derajat hiperinsulinemia janin oleh stimulasi yang diinduksi obat langsung Sulfonilurea, dengan pengecualian glyburide [26], melewati plasenta dan telah terlibat sebagai penyebab langsung hipoglikemia neonatal [27]. Agen *long-acting* klorpropamid sangat berbahaya dan sebaiknya tidak digunakan dalam 4 minggu terakhir kehamilan. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa obat ini teratogenik. metformin yang tidak melewati plasenta, telah dilaporkan berguna dalam beberapa individu obesitas dengan diabetes tipe 2 yang tidak cukup dikendalikan oleh diet [28]. Ada berbagai teori dan manfaat praktis dari menggunakan terapi metformin bukan terapi insulin pada kehamilan, tapi tidak ada cukup data untuk saat ini yang mendukung penggunaannya secara rutin. Beberapa laporan penggunaan metformin selama kehamilan pada wanita dengan sindrom ovarium polikistik tidak memiliki efek merugikan pada kehamilan. Pada perempuan, mengkonsumsi metformin sebelum, selama trimester pertama, atau selama kehamilan [29-32] mengurangi tingkat aborsi spontan dan perkembangan pertumbuhan normal, dan morbiditas serta mortalitas maternal terlihat normal. Dapat juga terlihat

penurunan risiko diabetes gestasional dengan terus menggunakan metformin selama kehamilan [33]. Kebanyakan pihak, bagaimanapun terus merekomendasikan metformin untuk tidak digunakan secara rutin kecuali setiap potensi bahaya sebanding dengan manfaat penggunaan metformin, misalnya, resistensi insulin berat atau penolakan untuk menggunakan insulin. glitazones tidak memiliki izin untuk digunakan dalam kehamilan dan tidak dianjurkan.

### **Target untuk pemantauan Kontrol metabolik**

Konsentrasi glukosa darah rata-rata diurnal pada wanita hamil non-diabetes adalah sekitar 5 mmol/L pada 30 minggu kehamilan [34]. Wanita diabetes harus bertujuan untuk tingkat kontrol, berusaha untuk mendapatkan nilai gula darah puasa dan preprandial antara 4 dan 6 mmol/L [35] dan nilai-nilai postprandial kurang dari 10 mmol/L. Hal ini akan tercermin dalam nilai HbA1c dalam kisaran yang normal, tentunya <7% dan sebaiknya mendekati 6%. Tidak boleh dilupakan bahwa ada juga penurunan fisiologis glukosa darah yang dapat diamati sekitar 20 minggu kehamilan. Penurunan ini di tingkat HbA1c adalah karena meningkatnya haematopoiesis dan kehadiran sel darah merah yang tidak terglukosilasi dalam sirkulasi pada kehamilan.

Petugas kesehatan dan wanita mungkin sering tidak menyadari pola ini dan mungkin salah mengartikan pergeseran fisiologis ini sebagai suatu peningkatan kontrol.

Pengukuran glukosa darah di rumah merupakan aspek penting manajemen rutin dan harus dilakukan 4-6 kali/hari untuk mengenali kebutuhan modifikasi dosis insulin. Penyesuaian dosis ini dapat dilakukan oleh tim medis, namun pasien harus didorong dan dibantu untuk

mendapatkan kepercayaan diri untuk melakukan ini sendiri. Profiling glukosa darah terus-menerus dapat menjadi alat tambahan yang berguna untuk menilai dan mengoptimalkan kontrol glikemik. Level HbA1c harus diukur secara teratur karena hal ini memberikan penilaian obyektif terhadap kontrol glikemik. Nilai target harus berada di tengah nilai rentang non-diabetes normal.

Hipoglikemia merupakan konsekuensi tak terelakkan dari kontrol ketat glikemik. Semua wanita yang menggunakan insulin karena itu harus menyediakan glukagon 1 mg (Lilly) atau GlucaGen (Novo Nordisk-) untuk digunakan dalam terapi hipoglikemia moderat hingga yang parah untuk dan keluarga mereka harus mengerti dalam penggunaannya.

### **Manajemen persalinan**

Perubahan dramatis dalam sensitivitas insulin dapat terjadi pada penderita diabetes yang tergantung insulin pada saat persalinan. Setelah proses persalinan telah dimulai, kebutuhan insulin menurun. Setelah melahirkan, setelah efek plasenta dan produk hormonalnya telah menurun ada pengurangan cepat lebih lanjut dalam penggunaan insulin. Memang, segera setelah persalinan, kebutuhan insulin dapat jatuh di bawah nilai sebelum kehamilan.

Selama persalinan skema sederhana adalah dengan menggunakan infus konstan 10% glukosa dengan kecepatan 1 L setiap 8 jam. Infus insulin dari insulin larut, awalnya dimulai dengan 1 unit/jam, adalah juga diberikan; ini akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan glukosa darah [35]. Sistem ini dapat digunakan terlepas dari dosis insulin subkutan terakhir, tetapi ketika induksi persalinan atau

operasi *caesar* telah direncanakan, maka waktu yang terbaik untuk memulai adalah saat sarapan setelah injeksi insulin isofan sebelum tidur. Begitu bayi diahirkan, infus insulin harus dikurangi atau, pada wanita dengan diabetes gestasional, infus diberhentikan sama sekali. Infus glukosa dilanjutkan sampai makan berikutnya pada pasien yang bersalin pervaginam atau sampai diet normal kembali pada mereka yang bersalin dengan operasi caesar. Dosis insulin sebelum hamil harus dilanjutkan saat ini dan disesuaikan dengan kadar gula darah. Tambahan 40-50 g karbohidrat relatif terhadap asupan makanan pra-kehamilan, umumnya direkomendasikan selama menyusui.

Wanita juga harus berhati-hati pada risiko potensial hipoglikemia pada saat menyusui, terutama di tengah malam. Mereka mungkin butuh saran tentang makanan ringan atau cairan yang mengandung karbohidrat yang tepat. Obat hipoglikemik oral yang sedang digunakan sebelum kehamilan, mungkin sebaiknya dihindari. Sejumlah kecil sulphonylureas disekresikan ke dalam ASI dan karena itu dapat secara teoritis menginduksi hipoglikemia pada bayi. Ini mungkin berefek signifikan terutama pada sulphonylurea kerja lambat klorpropamid. Metformin tidak dianjurkan untuk digunakan dalam laktasi. Namun, tidak ada bukti bahaya bagi bayi oleh jumlah kecil metformin yang disekresikan ke dalam ASI [36]. Paparan bayi terhadap metformin dapat diminimalkan dengan menyusui sebelum mengkonsumsi obat dan dengan menghindari menyusui selama setidaknya 2-3 jam setelah minum obat. Telah dikemukakan bahwa antibiotik profilaksis harus diberikan setelah operasi *section caesar* untuk mengimbangi peningkatan risiko infeksi luka pada wanita dengan diabetes [35].

## Penatalaksanaan Ketoasidosis Diabetik

Wanita hamil dengan diabetes jauh lebih rentan terhadap ketoasidosis diabetik karena kombinasi dari resistensi insulin dan katabolisme dipercepat akibat kehamilan. Faktor pencetus adalah hampir sama pada sebagian orang-orang dengan diabetes meliputi muntah, infeksi, kegagalan pemberian insulin, atau kegagalan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan insulin. Ketoasidosis pada kehamilan harus diobati dengan urgensi dapat terjadi kematian janin pada hampir 50% kasus. Pasien sebaiknya ditangani pada unit perawatan medis intensif bersama dengan pemantauan janin yang ketat. Penggantian cairan dan kalium yang adekuat menjadi sangat penting sebagai tambahan infus insulin intravena disesuaikan untuk mencapai pengurangan konsentrasi glukosa plasma. Rehidrasi awal harus dengan salin normal; kemudian harus diubah menjadi 10% dekstrosa, setelah glukosa darah kurang dari 10 mmol/L dan dilanjutkan sampai pasien bebas dari keton.

Penggunaan kortikosteroid dalam persalinan prematur sebelum 34 minggu kehamilan untuk mempercepat pematangan paru janin dapat secara dramatis meningkatkan resistensi insulin. Demikian pula, penggunaan agen intravena  $\beta$  simpatomimetik untuk mengobati kontraksi rahim dini akan menyebabkan hiperglikemia yang parah dan ketoasidosis kecuali diantisipasi dengan tepat. Pemantauan glukosa secara hati-hati perlu selalu dilakukan bersamaan dengan pengobatan dan terapi insulin intravena agresif.

## Kesimpulan

Sementara perbaikan dalam prognosis untuk kehamilan komplikasi diabetes telah dicapai di masa lalu dua atau tiga dekade, laporan CEMACH baru-baru ini [1] telah menunjukkan bahwa perawatan diabetes selama kehamilan masih sangat bervariasi dan hasil merugikan masih jauh di dibanding kehamilan tanpa diabetes. Semua kelompok perempuan, terlepas dari jenis atau kelompok etnis harus memasuki kehamilan dengan kontrol glikemik yang baik. Kehamilan sebaiknya diikuti kondisi yang normoglikemia tidak hanya selama kehamilan tetapi juga pada periode prekonsepsi. Pendekatan tim multidisiplin merupakan salah satu penentu keberhasilan. Pilihan regimen insulin mungkin pada awalnya tampak beragam, apakah dua, tiga atau empat suntikan sehari, tetapi hal ini sangat penting untuk mencapai normoglikemia dengan aman dan menghindari hipoglikemia serius. Tidak ada regimen yang sangat ideal; tergantung pada kerjasama pasien dan pemahamannya.

## Poin Penting

- Capailah gula darah terkontrol sejak prekonsepsi.
- Berikan 5 mg asam folat secara oral pada wanita dengan diabetes dan sedang hamil.
- Tujuan utama seluruh regimen insulin adalah untuk mencapai normoglikemia secara aman, tanpa ada hipoglikemia yang serius.
- Agen hipoglikemia oral tidak direkomendasikan penggunaannya dalam kehamilan.

## Referensi

1. Confidential Enquiry into Maternal and Child Health. **Pregnancy in women with type 1 and type 2 diabetes in 2002-03, England, Wales and Northern Ireland.** London: CEMACH; 2005.
2. Diabetes National Service Framework Delivery Strategy, 2003. Available at: <http://www.dh.gov.uk/PolicyAndGuidance/HealthAndSocialCareTopics/Diabetes/fs/en>.
3. National Service Framework for Children, Young people and **Maternity Services**, 2004. Available at: <http://www.dh.gov.uk/PolicyAndGuidance/HealthAndSocialCareTopics/ChildrenServices/fs/en>.
4. Krans HMJ, Porta M, Keen H (eds.). **Diabetes Care and Research in Europe: The St Vincent Declaration Action Programme.** Copenhagen: WHO; 1992.
5. Diabetes Control and Complications Trial Research Group. **Pregnancy outcomes in the Diabetes Control and Complications Trial.** *Am J Obstet Gynecol* 1996;174:1343-53.
6. Dunne F. **Type 2 diabetes in pregnancy.** *Semin Fetal Neonatal Med* 2005;10:33340.
7. Penney GC, Mair G, Pearson DW. **Scottish diabetes in pregnancy group.** Outcomes of pregnancy in women with type 1 diabetes in Scotland; a national population-based study. *BJOG* 2003;110:315-8.
8. Naylor CD. **Diagnosing gestational diabetes mellitus. Is the gold standard valid?** *Diabetes Care* 1989;12:565-72.
9. Coustan DR. **Gestational diabetes.** *Diabetes Care* 1993;16(Suppl 3):8-15. 10 Freinkel N. Effects of the conceptus on maternal metabolism during pregnancy. In: Lerbak BS, Wrenshall GA (eds.), *On the Nature and Treatment of Diabetes.* Amsterdam: Excerpt Medica; 1965:679.
- 11 Dornhorst A, Frost G. **The dietary management of**

- diabetic pregnancies.** In: Frost G, Dornhorst A, Moses R (eds.), *Nutritional Management of Diabetes Mellitus*. Chichester, UK: John Wiley and Sons Ltd.; 2003.
- 12 American College of Obstetricians and Gynaecologists: **Management of diabetes mellitus in pregnancy.** ACOG *Tech Bull* 1986;92:1-5.
  - 13 Ray JG, Singh G, Burrows RF. **Evidence for suboptimal use of pericon- ceptional folic acid supplements globally.** *BJOG* 2004;111:399-408.
  - 14 Relton CL, Hammal DM, Rankin J, Parker L. **Folic acid supplementation and social deprivation.** *Public Health Nutr* 2005;8:338-40.
  - 15 Brown CJ, Dawson A, Dodds R, et al. **Report of the Pregnancy and Neonatal Care Group.** *Diabetic Med* 1996;13(9 Suppl 4):543-53.
  - 16 Stiete H, Stiete S, Petschaelis A, et al. **Malformations in diabetic pregnancy.** *Diabetologia* 1994;37(Suppl 1):A172.
  - 17 Crowther C, Hillier J, Moss J, et al. **Effect of treatment of gestational diabetes on pregnancy outcomes.** *N Engl J Med* 2005;325(24):2477- 86.
  - 18 Diabetes UK Nutrition Subcommittee of the Diabetes Care Advisory Com- mittee. **The implementation of nutritional advice for people with diabetes.** *Diabetic Med* 2003;20:786-807.
  - 19 Pittendreigh J. **Food facts: healthy eating during pregnancy.** Birmingham, AL: British Dietetic Association. Available at: <http://.www.bda. uk/latest- food-facts.php>. Accessed March 2006.
  - 20 Coustan DR, Imrah J. **Prophylactic insulin treatment of gestational diabetes reduces the incidence of macrosomia, operative delivery and birth trauma.** *Am J Obstet Gynecol* 1984;150:836-42.
  - 21 Anderson JH, Jr, Brunelle RL, Koivisto VA, et al. **Reduction of postpran- dial hyperglycaemia and frequency of hypoglycaemia in IDDM patients on insulin-analog treatment.** *Diabetes* 1997;46:265-70.

- 22 Pettit DJ, Ospina P, Kolaczynski JW, Jovanovic L. Comparison of an insulin analog, insulin aspart and regular human insulin with no insulin in gestational diabetes mellitus. *Diabetes Care* 2003;26: 183-6.
- 23 Fineberg NS, Fineberg SE, Anderson JH, et al. Immunologic effects of insulin lispro (Lys (B23), Pro (B29) human insulin) in IDDM and NIDDM patients previously treated with insulin. *Diabetes* 1996;45:1750-4.
- 24 Wyatt JW, Frias J, Hoyme E, et al. Congenital anomaly rate in offspring of women with diabetes treated with Humalog. *Diabetologia* 2003;46(Suppl 2):A259.
- 25 Kitzmiller J, Main E, Ward B, Theiss T, Peterson D. Insulin lispro and the development of proliferative diabetic retinopathy during pregnancy. *Diabetes Care* 1999;22:874.
- 26 Langer O, Conway DL, Berkus MD, Xenakis EM, Gonzales O. A comparison of glyburide and insulin in women with gestational diabetes mellitus. *N Engl J Med* 2000;343(16):1134-8.
- 27 Adam PAJ, Schwartz R. Diagnosis and treatment: should oral hypoglycaemic agents be used in paediatric and pregnant patients. *Paediatrics* 1968;42:819-23.
- 28 Coetzee EJ, Jackson WP. Metformin in the management of pregnant non-insulin dependent diabetes. *Diabetologia* 1979;16:241-5.
- 29 Glueck C, Phillips H, Cameron D, et al. Continuing metformin throughout pregnancy in women with polycystic ovary syndrome appears to safely reduce first-trimester spontaneous abortion: a pilot study. *Fertil Steril* 2001;75:46-52.
- 30 Jakubowicz D, Iuorno M, Jakubowicz S, et al. Effects of metformin on early pregnancy in the polycystic ovary syndrome. *J Clin Endocrinol Metab* 2002;87:524-9.
- 31 Glueck C, Wang P, Goldenberg N, Sieve-Smith L. Pregnancy outcomes among women with polycystic ovary syndrome treated with metformin. *Hum Reprod*

2002;17:2858-64.

- 32 Glueck C, Bornovali N, Goldenberg N, et al. Pre-eclampsia, polycystic ovary syndrome, metformin and pregnancy outcomes. *Diabet Med*
- 33 Glueck C, Wang P, Kobayashi S, et al. Metformin therapy throughout pregnancy reduces the development of gestational diabetes in women with polycystic ovary syndrome. *Fertil Steril* 2002;77: 520-5.
- 34 Gillmer MD, Beard RW, Brooke FM, Oakley NW. Carbohydrate metabolism in pregnancy. Part 1. Diurnal plasma glucose profile in normal and diabetic women. *Br Med J* 1975;iii:402-4.
- 35 Gillmer MD, Holmes SM, Moore MP, et al. Diabetes in pregnancy; obstetric management. In: Sutherland HW, Stowers JM (eds.), *Carbohydrate Metabolism in Pregnancy and the Newborn*. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1984:102-18.
- 36 Hale T, Kristensen J, Hackett L, et al. Transfer of metformin into human milk. *Diabetologia* 2002;45:1509-14.

## BAB 10

# PERESEPAN PADA IBU HAMIL DALAM PERJALANAN

*Pauline A. Hurley*

Resep yang perlu diperhatikan bagi wisatawan hamil adalah imunisasi sebelum perjalanan, obat-obatan yang dapat diambil untuk mabuk perjalanan, malaria profilaksis, dan pengobatan diare. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan saran bagi 'kotak pertolongan pertama' untuk wisatawan hamil.

### Imunisasi

Tidak ada vaksin, toksoid, atau immunoglobulin dapat dianggap sepenuhnya aman untuk kehamilan. Penyakit akut baik sebagai akibat dari pemberian vaksin [1,2] atau sebagai akibat tertular infeksi membawa risiko persalinan premature dengan akibat morbiditas, mortalitas, atau risiko infeksi rahim. Imunisasi harus diberikan pada kehamilan hanya jika ada risiko jelas dan perjalanan ke daerah endemik tidak dapat dihindari. Secara umum, vaksin hidup harus dihindari pada kehamilan termasuk BCG, MMR, demam kuning, dan sediaan oral polio.

Tabel 10.1 merangkum pedoman untuk imunisasi pada kehamilan dan Tabel 10.2 memberikan rekomendasi saat ini untuk perjalanan yang berasal dari National formularium Inggris [3] dan American College of Obstetricians dan Komite Ginekologi Opini kertas No 282 [4].

Perlu dicatat bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) tidak lagi merekomendasikan vaksinasi kolera untuk wisatawan internasional dan seharusnya tidak lagi menjadi

persyaratan masuk ke negara asing [5]. Vaksin tersebut tidak efektif karena hanya memberikan perlindungan pribadi terbatas dan tidak mencegah penyebaran ditularkan melalui air pada penyakit diare akut.

Tabel 10.1 Protap Imunisasi pada wanita hamil

*Tidak akan muncul efek samping di luar trimester pertama: Studi pada hewan belum menunjukkan risiko janin tetapi tidak ada studi terkontrol pada wanita*

Hepatitis A	Immune globulin	Hepatitis B	Immune globulin
Rabies	Immune globulin	Tetanus	Immune globulin
Varicella zoster	Immune globulin		

*Hanya akan diberikan jika ada indikasi yang tepat dan risiko terinfeksi: Studi pada hewan belum menunjukkan efek buruk tetapi tidak ada penelitian pada wanita*

BCG	Vaccine	Cholera	Vaccine
Diphtheria	Toxoid	E. Coli	Vaccine
Influenza	Vaccine	Meningitis	Vaccine
Plague	Vaccine	Pneumococcus	Vaccine
Polio	Vaccine	Tetanus	Toxoid
Tularaemia	Vaccine	Typhoid	Vaccine

*Manfaat vaksinasi mungkin dapat diterima: ada bukti yang positif tentang risiko janin*

Yellow fever	Vaccine
--------------	---------

*Vaksin merupakan kontraindikasi dalam kehamilan*

Measles	Vaccine
Mumps	Vaccine
Rubella	Vaccine
Smallpox	Vaccine
Varicella	Vaccine

Imunisasi difteri yang meluas terhadap anak telah hampir mengeradikasi penyakit ini dari Inggris tapi toksoid

difteri dianjurkan jika imunisasi atau dosis ulangan/*booster* tidak diberikan dalam 10 tahun sebelumnya dan perjalanan ke daerah berisiko tinggi tidak dapat dihindari (Afrika atau benua India). *Booster* Difteri dan tetanus sekarang umum diberikan dalam bentuk kombinasi [3,4].

Tabel 10.2 Rekomendasi untuk imunisasi dan perjalanan

<b>Wilayah dunia</b>	<b>Rekomendasi untuk semua wilayah</b>	<b>Disarankan untuk beberapa wilayah</b>
Indian subcontinent	Hepatitis A Polio meningitis Tetanus Typhoid TB	Demam Kuning Meningococcal
Timur Laut	Hepatitis A Tetanus Polio TB	Japanese encephalitis
Timur Tengah	Hepatitis A meningitis Tetanus Polio TB	Meningococcal
Afrika	Hepatitis A Typhoid Tetanus Polio TB	Demam Kuning Meningococcal meningitis
Amerika Tengah dan Selatan	Hepatitis A TB Typhoid Tetanus Polio	Demam Kuning
Eropa Timur	Hepatitis A Polio Tetanus	
Wilayah diluar perhatian medis atau daerah pedesaan >30 hari	Rabies Hepatitis B	

## **Tetanus**

Tetanus selama kehamilan dikaitkan dengan morbiditas yang tinggi, dengan angka kematian tetanus neonatal berkisar 65% [6]. Tampaknya tidak ada efek samping dari pemberian toksoid pada kehamilan dan *American College of Obstetricians dan Gynaecologists* mendukung penggunaannya dalam kehamilan terutama jika wanita mungkin melahirkan dalam kondisi yang tidak higienis [7]. Dosis ulangan/*booster* direkomendasikan setiap 10 tahun. Total lima dosis dikatakan dapat memberikan perlindungan seumur hidup, tapi booster tetap dianjurkan dalam hal terjadi cedera yang rawan tetanus.

## **Meningitis meningokokus**

Saat ini tidak ada vaksin yang efektif terhadap zero grup B dari meningococcus, yang merupakan penyebab paling umum dari meningitis di Inggris. Vaksinnya tersedia sebagai bakteri campuran kapsuler polisakarida yang dimurnikan dari zerogrup A dan C, W135 dan Y, tapi ini hanya direkomendasikan jika benar ada risiko infeksi. Hal ini akan berlaku untuk mereka yang bepergian ke sub-Sahara Afrika, Delhi, Nepal, Bhutan, Pakistan dan haji yang bepergian ke Arab Saudi. Vaksinasi ini memberikan perlindungan selama 3-5 tahun [3].

## **Tifoid**

Ada tiga vaksin yang tersedia untuk pencegahan tifoid: monovalen vaksin seluruh sel yang dimatikan dengan panas dan diawetkan dengan fenol, sebuah tifoid polisakarida Vi antigen yang mengandung Vi antigen dari kapsul bakteri dan vaksin oral hidup yang dilemahkan. Vaksin oral hidup merupakan kontraindikasi pada kehamilan. Tidak ada data yang tersedia tentang keamanan vaksin lainnya pada kehamilan dan tidak ada yang 100% efektif dan tentu saja

tidak memberikan jaminan untuk tidak memperhatikan kebersihan dan persiapan makanan. Vaksinasi menyampaikan perlindungan selama 3 tahun. Vi vaksin polisakarida kapsuler sering diberikan dalam kombinasi dengan vaksin hepatitis A [3].

### **Hepatitis A**

Risiko tertular hepatitis A tidak berbeda untuk wanita hamil daripada wisatawan lain. Sementara itu biasanya berhubungan dengan perjalanan ke daerah pedesaan di negara berkembang, telah dilaporkan pada wisatawan bepergian ke tujuan yang lebih dekat. Infeksi ibu dikatakan tidak berkaitan dengan transmisi perinatal, namun solusio plasenta dan kelahiran prematur dari bayi yang terinfeksi telah dilaporkan [8].

Vaksin hepatitis A tersedia untuk imunisasi aktif, tetapi tidak ada data yang didapatkan tentang keamanan penggunaannya pada kehamilan. Perlindungan sepuluh tahun dicapai dengan memberikan tiga dosis lebih dari 6 bulan. Pemberiannya bisa dipercepat pada wisatawan. Secara teoritis, karena ini bukan vaksin hidup risikonya kecil tapi ada kekhawatiran tentang penggunaannya dalam kehamilan, karena respon demam terhadap vaksinasi ini tidak jarang. Imunisasi pasif dengan imunoglobulin manusia normal adalah cara yang biasa dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi wisatawan, jika mereka sebelumnya tidak menerima vaksinasi hepatitis A. Imunoglobulin tersebut memberikan perlindungan 4 bulan dan tidak memberi risiko pada kehamilan [7].

### **Hepatitis B**

Infeksi Hepatitis B pada kehamilan dapat menyebabkan penyakit parah pada ibu dan infeksi kronis pada neonatus [9]. Semua perempuan hamil di Inggris diskriminasi pada awal

kehamilan dan jika mereka ditemukan negatif dengan menggunakan serologi untuk infeksi sebelumnya atau akibat imunisasi, mereka dapat diberikan vaksin hepatitis B rekombinan dalam hal bahwa mereka akan bepergian ke daerah endemis dan beresiko tinggi terhadap paparan darah atau produk darah yang mengandung hepatitis B [4].

### **Demam kuning**

Demam kuning disebarkan oleh nyamuk yang terinfeksi, tetapi terbatas pada Afrika bagian tropis dan Amerika Selatan. Selama epidemi terjadi, kematian orang dewasa yang belum diimunisasi dapat melebihi 50%. Vaksin adalah vaksin beku-kering hidup yang dilemahkan. Risiko bagi janin tidak diketahui, dan harus dianggap sebagai kontraindikasi pada kehamilan. Perjalanan ke daerah yang membutuhkan bukti imunisasi harus dihindari pada kehamilan [1].

Daerah dengan resiko terbesar dari paparan di atas adalah Timur Tengah, Amerika Tengah dan Selatan, Asia, Eropa Timur, dan daerah endemis Afrika. Perjalanan ke daerah ini sebaiknya dihindari pada kehamilan.

### **Polio**

Imunisasi polio direkomendasikan untuk sebagian besar wilayah wisatawan. Vaksin oral hidup (Sabin) tidak lagi direkomendasikan, kecuali selama wabah dan merupakan kontraindikasi pada kehamilan, meskipun tidak ada kerusakan janin telah dilaporkan setelah pemberian selama kehamilan. Vaksin Suntik (Salk) dapat digunakan dan memberikan perlindungan selama 10 tahun. Untuk wisatawan biasanya diberikan dalam kombinasi dengan difteri dan tetanus [3].

## **Rabies**

Imunisasi terhadap rabies pada kehamilan dianjurkan hanya jika ada risiko yang signifikan dan tidak ada akses cepat ke fasilitas medis, yang dapat memberikan prophylaxis pasca-paparan. Pemberian penuh tiga dosis diperlukan untuk memberikan perlindungan 3-5 tahun [3].

## **Profilaksis Malaria**

Perlu diingat bahwa tidak ada rejimen obat yang menjamin perlindungan lengkap terhadap malaria. Komplikasi penyakit ini lebih parah pada kehamilan, aborsi pertengahan trimester, kelahiran premature, dan berat badan lahir rendah adalah komplikasi langsung [7]. Transmisi transplasenta dapat terjadi dengan konsekuensi yang membahayakan bagi neonatus. Dehidrasi, trombositopenia, rupture limpa, dan kejang semuanya telah dilaporkan. Ada juga bukti bahwa infeksi malaria plasenta dapat meningkatkan risiko penularan patogen lainnya melalui darah seperti HIV [10].

Menghindari gigitan nyamuk dengan cara fisik adalah saran terbaik. Ini akan mencakup mengenakan pakaian pelindung, celana panjang dan kemeja lengan panjang bersama-sama dengan menggunakan penolak serangga. Banyak preparat/produk yang mengandung DEET (14C-N, N-diethyl-m-tolamide), yang telah terbukti diserap melalui kulit dan melewati penghalang plasenta dalam beberapa studi hewan [11]. Keamanan DEET pada kehamilan tidak dipastikan ada bukti yang mengatakan bahwa zat tersebut terakumulasi dalam jaringan lemak dan otak dan ada laporan dari seorang anak dengan keterbelakangan mental, gangguan koordinasi sensorimotor dan dysmorphology kraniofasial lahir dari seorang ibu yang telah menggunakan

DEET setiap hari selama kehamilan [12].

Penting untuk ditekankan bahwa malaria profilaksis perlu dimulai 1 minggu sebelum masuk dan dilanjutkan selama 4 minggu setelah meninggalkan daerah malaria. Kombinasi yang dianjurkan akan tergantung pada area yang akan dikunjungi. Secara umum, untuk area berisiko rendah seperti Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Tengah, baik kombinasi proguanil dan klorokuin atau doksisiklin dianjurkan. Untuk daerah risiko variatif seperti Selatan dan Asia Tenggara, proguanil dan klorokuin atau meflokuin atau Malarone yang lebih dianjurkan. Untuk daerah-daerah berisiko tinggi seperti Sub-Sahara Afrika, meflokuin atau Malarone disarankan. Namun, tidak semua dari ini direkomendasikan untuk digunakan dalam kehamilan (lihat Tabel 13.3).

*Klorokuin* (300 mg/minggu) yang dianggap aman pada kehamilan, tetapi terapi agen tunggal menjadi kurang efektif. Lebih banyak wilayah di dunia menjadi resisten terhadap klorokuin dan beberapa daerah *multidrug resistant*.

*Pirimetamin sulphadoxine* dipasarkan sebagai fansidar tidak lagi dianjurkan karena hubungannya dengan agranulositosis dan reaksi kulit termasuk sindrom *Stevens-Johnson* dan nekrolisis epidermal toksik [13].

*Mefloquine* (250mg/minggu) harus dihindari pada trimester pertama (atau sekitar waktu pembuahan), seperti telah ditunjukkan memiliki efek teratogenik pada hewan percobaan. Dalam uji coba menggunakan mefloquine akhir kehamilan ada kemungkinan peningkatan jumlah bayi lahir mati, tapi ini tidak dibuktikan dalam penelitian lebih lanjut [14,15].

**Table 10.3 Profilaksis Malaria dalam Kehamilan**

<b>Obat</b>	<b>Saran dalam Kehamilan</b>	<b>Komentar</b>
Chloroquine	Aman bagi kehamilan	
Proguanil	Aman tapi disarankan dgn suplemen folat	Mungkin dikombinasikan dengan chloroquine
Mefloquine	Hindari di trimester 1	dilaporkan teratogenik pada hewan percobaan
Malorpim (pyrimethamine and dapsone)	Tidak disarankan dalam kehamilan	Kemungkinan resiko teratogenik ditambah neonatal hemolisis
Doxycycline	Tidak disarankan dalam kehamilan	
Malarone (proguanil and atovaquone)	Hindari kecuali sangat penting	Informasi terbatas
Chinca alkaloids (quinine and quinidine)	Tidak digunakan untuk prophylaxis	bisa pakai pada terapi dan infeksi berat

*Proguanil* dipasarkan sebagai Paludrine (200 mg setiap hari) akan muncul sebagai agen aman pada kehamilan tetapi lebih baik digunakan dalam terapi kombinasi dengan klorokuin.

*Malarone*, kombinasi proguanil hidroklorida (100 mg) dan atovaquone (250 mg) setiap hari, memiliki informasi yang terbatas pada penggunaannya dalam kehamilan. Obat ini tidak terdaftar sebagai kontraindikasi tetapi sebaiknya dihindari kecuali sangat penting [16].

Alkaloid kina dan *quinidine* telah dikaitkan dengan kelahiran mati dan kelainan bawaan dan oleh karena itu tidak dianjurkan untuk digunakan dalam kehamilan, meskipun mereka masih memiliki tempat dalam perawatan ibu hamil yang terinfeksi berat [17].

Demikian pula *doxycycline* merupakan kontraindikasi terutama di tahap kehamilan akhir karena mempengaruhi perkembangan tulang pada hewan studi dan jelas telah terbukti menyebabkan perubahan warna gigi pada manusia. Daerah yang membawa risiko tertinggi malaria yang resisten multidrug adalah Afrika Timur, Thailand, Papua New Guinea, dan Thai-Kamboja dan perbatasan Myanmar. Kantong malaria juga ditemukan di Armenia, Azerbaijan, Georgia, Tajikistan, dan Turkmenistan. Perempuan harus sangat disarankan agar tidak bepergian ke daerah-daerah selama kehamilan.

### **Antibiotik dan agen anti infeksi lainnya**

Bakteri, virus, jamur, dan infeksi parasit adalah tidak biasa dalam kehamilan, infeksi saluran kemih menjadi risiko tertentu, dan obat-obatan yang cocok untuk pengobatan kondisi ini dibahas dalam Bab 3. Antibiotik dapat dibawa sebagai bagian dari kit pertolongan pertama untuk wisatawan dan secara umum berikut dapat dipertimbangkan untuk dibawa:

- Amoksisilin untuk infeksi saluran pernapasan bagian atas dan saluran kemih.
- Metronidazole adalah antiparasit yang berguna, terutama untuk pengobatan giardiasis dan amoebiasis. Meskipun dapat digunakan untuk diare, seharusnya mungkin tidak akan dibawa dalam kit pertolongan

pertama jika diberikan tanpa pengawasan medis. Ini seharusnya hanya digunakan ketika pilihan terapi lain tidak tersedia [18].

- Agen antijamur nistatin dan Canestan dapat dengan aman digunakan secara topikal pada kehamilan dan harus menjadi bagian dari 'kit', terutama di iklim panas di mana kejadian kandidiasis vagina dapat meningkat [19].

Tabel 13.4 memberikan gambaran dan obat yang biasa digunakan untuk pengobatan diare dan komentar yang berkaitan dengan penggunaannya dalam kehamilan [20]. Obat-obatan yang dapat digunakan untuk kondisi umum lainnya yang dapat dianggap sebagai bagian dari 'kit medis'.

Tabel 10.4 Obat yang dapat digunakan traveler yang sedang hamil

Obat	Indikasi	Saran untuk kehamilan
Bismuth subsalicylate (Pepto-Bismuth)		Hindari
Loperamide (Imodium)	Diare	Aman
Diphenylate dengan atropine (Lomotil)	Diare	Use loperamid in preference
Piperazine (Antepar)	Antiparasitik	Kontraindikasi
Trimethoprim	Anti-infeksi (folate antagonist)	Laporan kasus dan percobaan belum dilaporkan meningkatkan abnormalitas fetus
Ciprofloxacin	Anti-infeksi	Keamanannya belum dipastikan
Metronidazole	Giardiasis/amoebiasis	Digunakan jika terapi lain tidak bisa
Quinacrine	Giardiasis	Kontraindikasi

**Poin Penting :**

- Immunisasi seharusnya diberikan pada ibu hamil jika indikasinya jelas dan perjalanan ke daerah endemis tidak dapat dihindari.
- Tidak ada regimen obat yang diyakini memberikan proteksi penuh terhadap malaria.
- Wanita dengan masalah kesehatan sebelumnya atau riwayat obstetric buruk disarankan untuk tidak bepergian jauh.
- Saran untuk 'kotak Pertolongan pertama' pada ibu hamil.

**Tabel 10.5** Saran untuk "Kotak Pertolongan Pertama" untuk traveler yang sedang hamil

<b>Indikasi</b>	<b>saran</b>
Umum	Kotak steril medis
Mabuk perjalanan	Vitamin B6 atau cyclizine
Profilaksis malaria	Proguanil, klorokuin dan asam folat
Diarea	Loperamid (dan metronidazole jika diperlukan dibawah supervisi ketat )
Gatal	Canesten pessari dan krim
Infeksi traktus urinarius & respiratorius	Amoxycillin
Analgesik	Paracetamol dan kodein fosfat



## REFERENSI

1. Hurley P. **Vaccination in pregnancy.** *Curr Obstet Gynaecol* 1998;8:169-75.
2. **Guidelines for vaccinating pregnant women.** In: **Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP).** Atlanta, GA: Center Disease Control & Prevention; 2002.
3. **Immunological products and vaccines, Chapter 14.** *British National Formulary, 51st edition.* London: Pharmaceutical Press; 2006:611-31.
4. **Immunization in pregnancy.** ACOG Committee Opinion No. 282. 2003.
5. Cholera. In: Salisbury D, Begg N (eds.), **Immunisation against Infectious Disease.** London: HMSO; 1996.
6. Tetanus. In: Salisbury D, Begg N (eds.), **Immunisation against Infectious Disease.** London: HMSO; 1996.
7. Samuel BU, Barry M. *The pregnant traveller.* *Infect Dis Clin N Am* 1998;12(2):325-54.
8. Watson JC, Fleming DW, Bordella AJ, et al. **Vertical transmission of hepatitis A resulting in an outbreak in a neonatal intensive unit.** *J Infect Dis* 1993;167(3):567-71.
9. Nelson-Piercy C. **Chapter 11.** In: *Handbook of Obstetric Medicine.* Oxford: Isis Medical Media; 1997:162.
10. Bloland PB, Wirima JT, Steketee RW, et al. **Maternal HIV infection and infant mortality in Malawi: evidence for increased mortality due to placental malaria.** *AIDS* 1995;9:721-6.
11. Blomquist L, Thorsell W. **Distribution and fate of**

- insect repellent 14C- *N,N*-diethyl-*m*-toluamide in the animal: II. Distribution and excretion after cutaneous application. *Acta Pharmacol Toxicol* 1977;41:235.**
12. Sheaffer C, Peters PW. **Intrauterine diethyltoluamide exposure and fetal outcome. *Reprod Toxicol* 1992;6(20):175-6.**
  13. Clarification: Fansidar-not for malaria prophylaxis. *DTB* 1998;36:24.
  14. Nosten F, ter Kuile F, Maelankiri L, et al. **Mefloquine prophylaxis prevents malaria during pregnancy: a double-blind, placebo controlled-study. *J Infect Dis* 1994;169(3):595-603.**
  15. Phillips-Howard PA, Steffen R, Kerr L, et al. **Safety of mefloquine and other antimalarial agents in the first trimester of pregnancy. *J Travel Med* 1998;5 (3):121-6.**
  16. Radloff PD, Phillips J, Nkeyi M, et al. **Atovaquone and proguanil for plasmodium faciparum malaria. *Lancet* 1996;247:1511.**
  17. McEvoy GK, Litvak K, Welsh OH, et al. (eds.). **American Hospital Formulary Service Drug Information. Bethesda: American Society of Health - System Pharmacists; 1997.**
  18. Hammill HA. **Metronidazole, clindamycin and quinolones. *Obstet Gynecol Clin North Am* 1989 ; 16: 531-40.**
  19. Rosa FW, Baum C, Shaw M. **Pregnancy outcomes after first-trimester vaginitis drug therapy. *Obstet Gynecol* 1987;69(5):751-5.**
  20. Hurley PA. **Travelling in pregnancy. *The Diplomat* 1999;5:25**



ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS

