

Analisis Kimia

Farmasi

Haeria, S.Si.,M.Si



HAERIA

ANALISIS KIMIA
FARMASI I

ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

ANALISIS KIMIA FARMASI I

Penulis:
HAERIA

Editor:
ISRIANY ISMAIL

Cetakan: I 2012
xiv - 229 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978 602 237 300 1

Alauddin University Press
Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa

SAMBUTAN REKTOR

*Tidakkah engkau malu pergi ke laut, sementara pulang hanya membawa sekendi air, padahal di dalam laut terdapat begitu banyak mutiara yang terpendam... demikian nasihat puitis Jalauddin Rumi dalam buku *The Sufi Book of Life*.*

Syair inspiratif ini memberikan dorongan bagi siapa saja yang mengabdikan dirinya di dunia pendidikan apalagi di perguruan tinggi untuk menghasilkan dan melahirkan karya-karya akademik yang dapat memberikan pencerahan kepada siapapun. Sebuah ironi, jika orang-orang yang bergelut di dunia perguruan tinggi, ternyata hanya membawa sekendi "air" pengetahuan untuk mengobati dahaga masyarakat, padahal begitu banyak mutiara yang terpendam di dalamnya yang dapat memberi "sinar" kehidupan. Atas dasar inilah, ikhtiar untuk menjadikan kampus UIN Alauddin sebagai kampus peradaban harus terus digulirkan, sebab hanya kampus yang menjadikan orientasi "Peradaban" sebagai basis aktivitas dan tradisi keilmuannya yang akan mampu membawa semangat perubahan di tengah masyarakat menuju masyarakat madani.

Kampus peradaban yang dicita-citakan hanya bisa terwujud jika pengembangan kultur dan *mindset* akademik lebih relevan dengan suasana dan wadah yang bernama universitas Islam. Sebaliknya, jika orientasi peradaban hanya sebatas jargon dan simbol, maka status "universitas" dan "Islam" akan menjadi beban bagi kita maupun masyarakat. Di satu sisi, UIN akan menjadi universitas pinggiran, sementara di sisi lain, karakter keislaman menjadi hilang. Karena itu,

diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk mengawal UIN Alauddin mencapai visi dan misinya untuk menjadi *world class university* yang berperadaban.

Untuk mencapai visi itu, maka program GSB (Gerakan Seribu Buku) ini menjadi salah satu langkah strategis memacu sivitas akademika untuk tidak sekadar meneguk "air" pengetahuan di perguruan tinggi, tetapi dapat membawa ribuan bahkan jutaan kendi "air dan mutiara" pengetahuan ke tengah masyarakat. Orang bijak berkata "*Buku adalah pengusung peradaban, tanpa buku sejarah menjadi sunyi, ilmu pengetahuan menjadi mati, dan kehidupan bisa kehilangan arti.*"

Oleh karena itu, saya sangat bersyukur kepada Allah swt, atas terselenggaranya program GSB ini, baik tahun I maupun tahun II. Program GSB telah membuktikan kepada publik bahwa UIN Alauddin memiliki kekuatan dan potensi yang cukup besar untuk mewujudkan dan menghantarkan kampus ini menuju kampus peradaban melalui maha karya para civitas akademika. Melalui program GSB ini, potensi sumber daya UIN Alauddin akan terus digali, diapresiasi dan dihargai sehingga melahirkan kreasi, ide dan prestasi.

Selaku Rektor, saya senantiasa berharap agar *tagline* "Peradaban" yang selama ini digulirkan harus menjadi visi dan misi bersama yang tertanam dalam sebuah bingkai kesadaran kolektif bagi seluruh sivitas akademik untuk mewujudkan UIN Alauddin sebagai universitas yang kompetitif dan berkarakter. Untuk itu, tiga agenda besar; *pencerdasan, pencerahan dan prestasi* harus menjadi fokus perhatian utama bagi sivitas akademika UIN Alauddin. Ketiga agenda ini dirancang sebagai sebuah strategi untuk menjadikan UIN Alauddin lebih terbuka, dan menjadi pusat kepeloporan

pengembangan nilai dan akhlak serta keunggulan akademik-intelektual yang dipadukan dengan pengembangan teknologi untuk membangun sebuah masyarakat yang berperadaban.

Akhirnya, perkenankan saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya dalam menghasilkan karya akademik ini. Semoga gagasan yang dituangkan di dalam buku ini mampu menjadi "air" penyejuk dan pengobat dahaga bagi masyarakat yang haus akan pencerahan, dan dapat menjadi "mutiara" yang memberikan cahaya bagi peradaban.

Samata, 1 Nopember 2012
Rektor

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, MS

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil' alamin...

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah swt, buku Analisis Kimia Farmasi I ini dapat terselesaikan pada waktunya. Buku ini merupakan edisi pertama dan masih merupakan jilid I dari buku Analisis Kimia Farmasi yang rencananya akan kami susun.

Maksud dari penyusunan buku ini adalah untuk membantu mahasiswa Farmasi dalam lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang tertarik dengan bidang Analisis Kimia Farmasi. Di samping itu, buku ini juga dimaksudkan untuk memudahkan mahasiswa farmasi karena keterbatasan buku-buku referensi Kimia Farmasi yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia.

Dalam edisi ini, buku Analisis Kimia Farmasi memuat berbagai metode analisis yang disajikan dalam buku-buku acuan resmi, dan dilengkapi dengan metode-metode analisis yang baru dikembangkan oleh para peneliti bidang kajian Analisis Kimia Farmasi yang telah dilaporkan dalam bentuk jurnal Internasional.

Dengan selesainya penyusunan buku ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan semangat, saran, dan doa.

Kami sangat menyadari bahwa buku ini masih sangat jauh dari sempurna, isinya masih sangat terbatas dan belum mampu menjawab berbagai pertanyaan tentang analisis senyawa obat. Akhirnya, kritikan yang

membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat.

Makassar, September 2012

Haeria

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR	iii
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Analisis Kualitatif	2
B. Analisis Kuantitatif	3
II. PENYIAPAN SAMPEL	9
A. Pengambilan Sampel	9
B. Penyiapan Sampel	11
C. Pemisahan Golongan Senyawa	16
III. ANALISIS UNSUR DAN GUGUS FUNGSI ..	23
A. Analisis Unsur Non Logam	23
B. Analisis Logam-logam	33
C. Analisis Anion	41
D. Analisis Gugus Fungsi	44
IV. ANALISIS SENYAWA TURUNAN ASAM HIDROKSIBENZOAT	57
A. Pendahuluan	57
B. Metode Analisis Dasar	61
1. Titrasi Langsung Dari Asam Bebas	61
2. Titrasi Langsung Garam Hidroksibenzoat dalam Sistem Dua Fase	62
3. Penentuan Ester Asam Hidroksibenzoat dengan Hidrolisis Dan Titrasi Kembali	64
4. Metode Bromometri	66

5. Metode Iodometri	68
6. Metode Fotometri	70
C. Metode Lain	74
V. ANTIINFLAMASI NON STEROID	77
A. Pendahuluan	77
B. Klasifikasi AINS	78
1. Inhibitor Siklooksigenase Non Selektif	78
2. Inhibitor Siklooksigenase Selektif	86
C. Metode Analisis	87
1. Analisis Diflunisal	87
2. Analisis Diklofenak	88
3. Analisis Asam Mefenamat	91
4. Analisis Ibuprofen	97
5. Analisis Ketoprofen	97
6. Analisis Indomethacin	100
7. Analisis Piroksikam	100
8. Analisis Fenilbutazon	106
9. Analisis Selekoksisib	107
10. Analisis Parasetamol dan Fenasetin	108
VI. XANTHIN	113
A. Pendahuluan	113
B. Analisis Senyawa Turunan Xanthin	114
1. Uji Kualitatif	114
2. Uji Kuantitatif	115
a. Metode Argentometri	115
b. Metode Iodometri	117
c. Metode Titrasi Bebas Air	108
d. Metode Spektrofotometri	119
e. Metode Gravimetri	124
f. Metode Kromatografi	124
g. Campuran yang mengandung xantin ...	125

VII. SENYAWA TURUNAN ASAM BARBITURAT	127
A. Pendahuluan	127
B. Metode Isolasi	129
C. Uji Warna dan Mikrokrystal	131
D. Pembuatan Derivat Asam Barbiturat	133
E. Metode Analisis Kuantitatif	134
1. Titrasi Asam Basa	134
2. Titrasi Konduktometri	136
3. Metode Argentometri	139
4. Penetapan Secara Potensiometri	140
5. Metode Bromometri	141
6. Metode Spektrofotometri	141
7. Metode Kolorimetri dengan Garam Kobalt	144
8. Metode Kromatografi	146
VIII. SULFONAMIDA	149
A. Pendahuluan	149
B. Metode Penetapan Kadar Sulfonamida	151
1. Metode Diazotasi	151
2. Titrasi Bebas Air	156
3. Metode Bromometri	161
4. Metode Argentometri	165
5. Spektrofotometri	166
6. Spektrofluorometri	172
7. Metode Kromatografi	172
IX. ANTIHISTAMIN	175
A. Pendahuluan	175
B. Antihistamin	176
C. Analisis Beberapa Senyawa Antihistamin	178

1. Analisis siproheptadin HCl, Methdilazin HCl dan Prometazin	178
2. Analisis klorfeniramina maleat	181
3. Analisis Sinnarisin	183
4. Analisis Prometazin	183
5. Analisis Cetrizin	185
X. VITAMIN	187
A. Pendahuluan	187
B. Analisis Vitamin	187
1. Vitamin B1	187
a. Metode Fluorometrik Tiokrom	189
b. Metode Asam Silikotungstat	189
c. Metode Kolorimetri	190
d. Metode Alkalimetri	191
e. Metode Titrasi Bebas Air	192
f. Metode Argentometri	192
g. Metode Gravimetri	193
2. Vitamin B2	194
a. Metode Fluorometri	195
b. Metode Spektrofotometri	201
3. Vitamin B6	201
a. Metode Spektrofotometri	202
b. Metode Kolorimetri	203
c. Metode Titrasi Bebas Air	204
d. Metode Kromatografi	204
4. Vitamin B 12	205
a. Metode Spektrofotometri	206
b. Metode Kolorimetri Sianida	207
c. Metode Kolorimetri Disianida	207
5. Vitamin C	207
a. Metode Volumetri	208
b. Metode Kolorimetri	210

c. Metode Spektrofotometri Ultraviolet	212
d. Metode Spektrofluorometri	212
e. Metode Polarografi	214
6. Vitamin A	214
a. Metode Kolorimetri Carr-Price	215
b. Metode Kolorimetri perubahan akseroftol menjadi Anhidroakseroftol	215
c. Metode Spektrofotometri	216
d. Metode Kromatografi	217
7. Vitamin D	218
a. Metode Spektrofotometri Ultraviolet	219
b. Metode Kolorimetri	219
8. Vitamin E	219
a. Metode Serimetri	220
b. Metode Spektrofotometri	221
c. Metode Kolorimetri	221
DAFTAR PUSTAKA	223

I

PENDAHULUAN

Kimia Farmasi melibatkan penggunaan sejumlah teknik dan metode untuk memperoleh aspek kualitatif, kuantitatif dan informasi struktur dari suatu senyawa obat. Analisis kualitatif merupakan analisis untuk mengidentifikasi unsur, spesies, dan atau senyawa-senyawa yang ada dalam sampel. Analisis kualitatif berkaitan dengan cara untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu analit yang dituju dalam suatu sampel. Analisis kuantitatif adalah analisis untuk menentukan jumlah (kadar) absolut atau relatif dari suatu unsur atau spesies yang ada di dalam sampel. Analisis struktur adalah penentuan letak dan pengaturan ruang atom dalam suatu unsur atau molekul, serta identifikasi gugus-gugus karakteristik (gugus fungsional) dalam suatu molekul.

Pengawasan obat merupakan salah satu disiplin ilmu farmasi yang paling utama. Pengetahuan teoritis dan praktis yang dimiliki bertujuan untuk memberikan kemampuan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efikasi obat, yang merupakan salah satu tugas dari seorang ilmuwan farmasi.

Prosedur analisis dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apakah identitas obat yang terdapat dalam suatu produk benar?
- Apakah kandungan obat yang dinyatakan dalam formulabener?
- Apakah formula produk hanya mengandung zat aktif saja atau juga bahan-bahan pengotor (impurities) ?
- Bagaimana stabilitas obat dalam formula dan seberapa lama waktu hidup (*self life*-nya)?
- Seberapa cepat obat dilepaskan dari bentuk sediaannya sehingga dapat diabsorpsi oleh tubuh?
- Apakah identitas dan kemurnian senyawa obat yang digunakan untuk formulasi sesuai dengan spesifikasinya?
- Apakah identitas dan kemurnian bahan tambahan untuk pembuatan formula sesuai dengan spesifikasinya?
- Berapakah konsentrasi bahan pengotor yang terdapat dalam bahan obat murni?
- Berapakah konsentrasi obat dalam sampel, jaringan, atau cairan biologis?
- Berapakah nilai pKa, koefisien partisi, kelarutan, dan juga stabilitas obat yang sedang dikembangkan?

A. Analisis Kualitatif

Dalam analisis kualitatif dan identifikasi senyawa-senyawa anorganik dan senyawa organik, terdapat perbedaan-perbedaan yang penting. Sebagian besar senyawa anorganik merupakan senyawa ionik yang dapat ditentukan dengan suatu bagan (prosedur) tertentu. Senyawa organik pada umumnya terikat dalam

ikatan kovalen, dan belum ada suatu bagan atau skema yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasinya.

Tujuan analisis kualitatif adalah untuk mengidentifikasi zat-zat, terutama obat yang berupa sediaan kimiawi atau galenis, dalam bentuk serbuk, tablet, larutan, emulsi, salep, suppositoria, atau bentuk sediaan lain yang berupa campuran atau zat murni. Metode identifikasi dapat dilakukan menurut tahap-tahap berikut:

1. Uji organoleptis, dengan menggunakan indera untuk menentukan warna, bau, rasa, dan tekstur dari suatu zat.
2. Penentuan sifat-sifat fisika seperti kelarutan, penentuan titik lebur, titik didih, indeks bias, viskositas, bobot jenis, dan lain-lain.
3. Penentuan unsur-unsur.
4. Penentuan gugus fungsional yang khas.
5. Pemisahan campuran secara kimiawi
6. Penentuan jenis zat berdasarkan reaksi kimia reagen tertentu.

B. Analisis Kuantitatif

Struktur kimia obat merupakan titik awal untuk menentukan prosedur yang cocok untuk melakukan identifikasi dan analisis kuantitatif. Untuk menganalisis senyawa yang tidak diketahui, maka biasanya dianalisis berdasarkan unsur, ion, radikal, atau gugus fungsinya. Seorang kimiawan farmasi mengidentifikasi suatu senyawa melalui reaksi kimia, baik senyawa yang diisolasi dari bahan alam maupun senyawa hasil sintesis.

Berbagai macam metode analisis baku telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, dalam berbagai literatur ilmiah, atau dalam bentuk buku teks.

Dalam setiap analisis, pemilihan metode merupakan masalah yang terpenting. Pemilihan suatu metode analisis harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- Tujuan analisis, biaya yang dibutuhkan, serta waktu yang diperlukan
- Level analit yang diharapkan dan batas deteksi yang diperlukan.
- Macam sampel yang akan dianalisis serta praperlakuan sampel yang dibutuhkan
- Jumlah sampel yang dianalisis
- Ketepatan dan ketelitian yang diinginkan untuk analisis kuantitatif
- Ketersediaan bahan rujukan, senyawa baku, bahan-bahan kimia, pelarut yang dibutuhkan
- Peralatan yang tersedia
- Kemungkinan adanya gangguan pada saat deteksi atau pada saat pengukuran sampel.

Metode yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu metode harus:

1. *Sensitif*, metode harus dapat digunakan untuk mendapatkan kadar senyawa dalam konsentrasi yang kecil.
2. *Presisi*, metode tersebut menghasilkan suatu hasil analisis yang sama atau hampir sama dalam satu seri pengukuran
3. *Akurat*, metode harus menghasilkan nilai rata-rata (*mean*) yang sangat dekat dengan nilai sebenarnya.
4. *Selektif*, untuk penetapan kadar senyawa tertentu, metode tersebut tidak dapat terpengaruh oleh adanya senyawa lain.

5. *Rugged* (kasar), perubahan komposisi pelarut atau variasi lingkungan tidak menyebabkan perubahan hasil analisis.
6. Praktis, metode tersebut mudah dikerjakan serta tidak banyak memerlukan waktu dan biaya.

Pada analisis senyawa anorganik secara *volumetric* biasanya dibagi berdasarkan reaksi yang terjadi selama titrasi seperti asidi-alkalimetri, pengendapan, reduksi-oksidasi, dan lain-lain. Pembagian ini kurang tepat untuk analisis senyawa organik. Juga harus diingat bahwa reaksi ini tidak spesifik, karena reaksi ini tidak hanya untuk satu senyawa saja, tetapi dapat juga untuk senyawa lain yang mengandung unsur, ion, radikal, dan gugus fungsi yang sama. Analisis dengan metode modern, pembagian berdasarkan metode seperti spektrofotometri UV-Vis, spektrofluorometri, dan kromatografi, juga kurang cocok. Oleh karena itu, pembagian berdasarkan struktur kimia merupakan cara pengelompokan yang cocok untuk senyawa obat.

Perlu diketahui bahwa tidak satupun metode yang dapat digunakan untuk analisis gugus tertentu, ion tertentu, atau radikal tertentu. Adanya gugus lain yang terdapat bersamanya dalam suatu struktur kimia dapat mengganggu reaksi sehingga reaksi tersebut tidak kuantitatif. Dengan gravimetrik ini, maka cara analisis telah dikembangkan. Kita harus mengetahui dan dapat memilih cara analisis yang paling cocok untuk suatu senyawa atau campuran senyawa yang dianalisis. Sebagai contoh, fenol dapat direaksikan dengan brom membentuk 2,4,6-tribromfenol. Tetapi reaksi ini tidak dapat digunakan untuk analisis fenol dari minyak

tumbuh-tumbuhan, sebab minyak juga mengandung senyawa yang tidak jenuh yang akan bereaksi dengan brom sehingga akan mengganggu reaksi penetapan. Kita harus memahami dengan baik reaksi kimia dan metode yang digunakan untuk penetapan suatu senyawa. Kita tidak boleh hanya bergantung pada prosedur yang telah ada, tetapi kita harus dapat memodifikasi metode ini untuk pengembangan metode analisis suatu senyawa.

Pada umumnya prosedur kerja untuk suatu analisis dapat dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Pengambilan sampel (sampling)
2. Penyiapan sampel
3. Pemisahan terhadap unsur, ion, radikal atau senyawa yang mengganggu
4. Reaksi tertentu terhadap senyawa yang dianalisis
5. Metode pengukuran
6. Analisis data.

Tidak semua analisis senyawa membutuhkan penerapan semua tahap di atas. Sebagai contoh pada penetapan tablet asetanilid secara gravimetrik. Pada analisis ini, asetanilid disari lalu dikeringkan dan ditimbang sampai berat konstan sehingga dalam hal ini hanya terjadi pemisahan senyawa aktif tanpa menggunakan reaksi kimia.

Selain mengetahui reaksi kimia, kita juga harus mengetahui cara analisis secara spektrofotometri, elektrokimia, kromatografi, dan beberapa cara pengukuran fisik lainnya. Sebagai contoh pada penetapan kadar parasetamol dengan metode spektrofotometri UV, maka metode ini merupakan metode yang paling praktis untuk sediaan tunggal. Akan

tetapi metode ini tidak dapat digunakan untuk sediaan yang berwarna karena zat pewarna dapat mengganggu pengukuran pada daerah UV. Pada setiap campuran yang mengandung parasetamol, metode ini juga terganggu dengan adanya senyawa yang mempunyai serapan pada daerah yang sama.

Pemilihan metode analisis sangat tergantung dari matriks sampel dan tujuan analisis. Untuk melihat stabilitas parasetamol, metode spektrofotometri tidak tepat untuk digunakan dalam analisis karena hasil peruraian parasetamol juga menyerap pada panjang gelombang yang sama. Oleh karena itu, metode kromatografi terutama kromatografi cair kinerja tinggi merupakan metode pilihan untuk analisis karena akan terjadi pemisahan antara parasetamol dan hasil uraiannya. Obat-obat biofarmasetik, seperti insulin, hormone pertumbuhan, dan interferon dapat ditetapkan kadarnya dengan kromatografi penukar ion atau dengan ELISA.

Cara menyatakan hasil analisis juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Tidak semua hasil analisis dapat dinyatakan dalam persen (%). Untuk senyawa murni, hasil analisis dapat dinyatakan dalam persen (%), sehingga dapat diketahui apakah senyawa tersebut memenuhi persyaratan kadar atau tidak. Pada sediaan tablet, setelah diketahui persyaratan keseragaman bobot dan bobot rata-rata tablet, kadar senyawa aktif dinyatakan dalam mg per tablet. Sementara itu pada sediaan injeksi maupun sirup, kadar senyawa aktif dinyatakan dalam mg/mL atau mg per volume tertentu, misalnya 10 mg/ 5 mL.

II

PENYIAPAN SAMPEL

Pengetahuan yang baik mengenai proses sampling (pengambilan sampel) dan tujuan analisis dapat menghindari kesalahan analisis. Tingkat kepercayaan terhadap data analisis juga sangat tergantung bagaimana suatu sampling dilakukan. Sampel yang diambil harus bersifat *representative* (mewakili) populasi zat/bahan yang akan dianalisis dan haruslah homogen.

Konsep dasar dari metode penyiapan sampel adalah untuk merubah sistem matriks menjadi sampel yang sesuai untuk analisis. Dalam banyak hal, sediaan obat atau sampel secara umum tidak dapat dianalisis secara langsung misalnya dengan kromatografi tanpa terlebih dahulu dilakukan *pretreatment* (perlakuan awal) terhadap sampel tersebut. Tahap ini termasuk sebagai sampling atau langkah pemisahan sampel dari pengotor yang mungkin ada sehingga mengganggu analisis lebih lanjut.

A. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel merupakan masalah yang sangat penting dalam analisis kimia. Oleh karena itu, cara pengambilan yang tidak tepat, meskipun metode

analisisnya tepat, hasilnya tidak akan memberikan petunjuk yang benar mengenai sifat zat yang akan diselidiki. Meskipun demikian, masalah ini kurang mendapat perhatian dari seorang analis.

Aturan yang pasti mengenai cara pengambilan sampel dan besar sampel yang harus diambil tidak dapat dirumuskan secara umum, sebab cara pengambilan sampel sangat tergantung pada sifat dan jumlah bahan yang dianalisis. Cara pengambilan sampel padat akan berbeda dengan cara pengambilan sampel cair, dan akan berbeda pula dengan sampel gas. Namun pada prinsipnya, sampel yang dianalisis harus berifat *representative*. Berdasarkan prinsip ini, maka dikenal dua macam cara pengambilan sampel dalam analisis kimia yaitu:

1. Pengambilan sampel acak (*random*).

Cara pengambilan sampel ini dilakukan terhadap bahan yang homogen atau dianggap homogen. Misalnya larutan sejati, *batch* tablet, ampul, dan sebagainya.

Serbuk sampel yang diterima analis untuk dianalisis harus dianggap bukan sampel yang homogen. Untuk dapat disampel secara *random*, sampel tersebut harus digerus hingga homogen. Begitu pula larutan, suspensi atau emulsi harus dikocok hingga homogen, kemudian dilakukan pengambilan sampel secara *random*.

2. Pengambilan sampel *representative*.

Sampel yang dikirim ke laboratorium untuk dianalisis harus representatif untuk menghindari resiko hasil analisis yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Cara ini dilakukan jika bahan yang akan dianalisis tidak homogen. Dalam hal ini, sampel harus diambil dari bagian-bagian yang berbeda-beda dari setiap wadah (bagian atas, tengah, samping, bawah, dan

sebagainya). Masing-masing sampel harus dicampur homogen kemudian sampel diambil secara *random* untuk dianalisis.

Seringkali sampel yang kita kumpulkan sangat besar sehingga untuk analisis perlu direduksi sampai diperoleh sampel ofisial (untuk memperoleh sampel representatif), yang selanjutnya akan dianalisis. Untuk zat padat, cara reduksi dilakukan sebagai berikut:

Sampel dituangkan perlahan-lahan hingga diperoleh kumpulan sampel yang berbentuk kerucut. Ujung kerucut ditekan kemudian dibagi empat dengan menarik garis tengah yang saling tegak lurus lalu diambil dua bagian yang berseberangan, dan dikumpulkan. Perlakuan seperti semula diulangi sehingga didapatkan sampel ofisial yang sesuai. Untuk sampel yang beratnya lebih dari 100 kg, diambil 500 g; sampel dengan berat 100 kg diambil 250 g; untuk sampel yang beratnya kurang dari 10 kg, diambil sampel ofisial paling banyak 125 g.

Jika sampel *representative* telah diperoleh, maka sampel harus diberi label untuk memudahkan mencarinya jika tidak langsung dianalisis. Sampel juga harus disimpan dalam wadah yang sesuai untuk menjamin kestabilan sifat fisika kimianya.

B. Penyiapan Sampel

Sampel seringkali harus dikumpulkan dari tempat yang jauh dari laboratorium analisa sehingga sampel harus disimpan lebih dahulu. Wadah penyimpanan dan kondisi penyimpanan sampel seperti suhu, kelembaban, dan cahaya harus dikontrol sehingga tidak ada perubahan yang signifikan yang akan mempengaruhi validitas data analisis.

Berikut beberapa pengaruh yang harus diperhatikan selama penyimpanan sampel:

- a. Peningkatan suhu dapat mengakibatkan hilangnya analit yang bersifat *volatile*, degradasi oleh panas atau agen biologis, atau peningkatan reaktivitas kimia.
- b. Suhu rendah dapat mengakibatkan analit yang memiliki kelarutan yang rendah dalam pelarut tertentu dapat mengalami deposit atau pengendapan.
- c. Perubahan kelembaban akan mempengaruhi kandungan air pada bahan padat higroskopis atau dapat pula menyebabkan terjadinya reaksi hidrolisis.
- d. Radiasi sinar ultraviolet, khususnya dari sinar matahari langsung akan menginduksi reaksi-reaksi fotokimia, fotodekomposisi, atau polimerisasi.
- e. Oksidasi yang diinduksi oleh udara dapat menyebabkan kerusakan sampel terutama untuk sampel-sampel yang sensitif terhadap oksidasi.

Masalah khusus untuk sampel dengan kadar sekelumit (*trace analyst*) dalam suatu larutan adalah kemungkinan adanya penyerapan analit pada permukaan dinding wadah atau adanya kontaminasi oleh senyawa-senyawa yang dilepaskan oleh wadah. Untuk sampel yang mengandung analit anorganik harus disimpan dalam wadah plastik karena kalium, natrium, boron, dan silikat dapat dilepaskan oleh wadah-wadah gelas ke dalam larutan sampel. Sebaliknya, untuk sampel yang mengandung pelarut organik atau cairan organik harus disimpan dalam wadah gelas.

Sampel yang dibawa ke laboratorium untuk dianalisis dapat berasal dari berbagai macam ukuran, bentuk, dan mengandung analit yang berkadar tinggi sampai dengan berkadar sangat rendah. Sampel dapat mempunyai kandungan air yang bervariasi, demikian juga komponen yang akan dianalisis juga beraneka ragam. Pra-perlakuan sampel sering digunakan untuk mengkondisikan sampel sehingga siap untuk dilakukan analisis dengan metode tertentu. Contoh pra-perlakuan sampel adalah cara pemekatan bagi sampel dengan kadar analit yang sangat rendah. Berikut adalah contoh-contoh pra-perlakuan sampel yang lain:


- Memanaskan sampel yang mengandung analit yang tahan panas pada suhu 100-120°C untuk menghilangkan pengaruh variasi kandungan air.
- Menimbang sampel sebelum dan sesudah pemanasan sehingga kandungan air dapat diketahui.
- Memisahkan analit dengan karakteristik tertentu menggunakan teknik pemisahan antara lain; destilasi, sentrifugasi, filtrasi, ekstraksi pelarut, dan ekstraksi fase padat (*solid phase extraction*).
- Menghilangkan komponen matriks sampel yang dapat mengganggu analisis komponen yang dituju.
- Memekatkan analit jika kandungan analit dalam sampel dibawah kisaran konsentrasi metode analisis yang digunakan, misalnya dengan penguapan, destilasi, ko-presipitasi, pertukaran ion, ekstraksi pelarut, dan ekstraksi fase padat atau dengan elektrolisis.

Berikut akan diuraikan teknik pra-perlakuan sampel yang sering digunakan dalam analisis:

1. Analisis langsung
Senyawa dalam bentuk sediaan cair seringkali dapat dilakukan pengukuran secara langsung atau diencerkan atau dipekatan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengukuran. Untuk kromatografi, pengenceran dilakukan dengan fase gerak. Beberapa pengotor dalam suatu pelarut yang mudah menguap seperti etanol dan metanol dalam bentuk sediaan dapat dianalisis secara langsung (diinjeksikan langsung) menggunakan kromatografi gas.

2. Teknik pemisahan
Berbagai teknik pemisahan yang dapat diterapkan dalam analisis senyawa obat, antara lain:

a. Kristalisasi dan Sublimasi
Rekristalisasi merupakan suatu metode pemisahan yang berdasarkan prinsip bahwa suatu larutan jenuh dari hasil yang masih kotor di dalam pelarut yang sesuai, pada pendinginan akan memisahkan zat yang dilarutkan tadi dalam keadaan murni. Pemilihan bahan pelarut merupakan hal yang penting. Pelarut yang baik adalah pelarut yang memiliki daya melarutkan zat yang dikehendaki yang tinggi. Zat pelarut yang sering digunakan adalah air, metil alkohol, etil alkohol, aseton, kloroform, eter, benzene, dan petroleum eter. Dalam keadaan tertentu, piridin juga amat baik digunakan sebagai pelarut. Bila diperlukan, dapat pula dibuat campuran pelarut untuk meningkatkan efektifitasnya dalam melarutkan senyawa yang diinginkan.



Gambar 1.1. Tahapan dalam rekristalisasi

Sublimasi merupakan metode pemisahan senyawa dari gas menjadi padatan yang dapat dipisahkan. Ada anggapan bahwa teknik ini sangat menguntungkan karena zat yang dikehendaki dari bentuk gas dapat dipisahkan sebagai padatan (pada pendinginan) tanpa mengalami fase cair. Pada

analisis obat, teknik yang biasa digunakan adalah teknik mikrosublimasi.

b. Destilasi

Destilasi adalah suatu metode pemisahan dan pemurnian suatu zat. Prinsip zat ini dijadikan bentuk uap dan pada pendinginan kembali berbentuk cair. Berbagai metode destilasi yang dicantumkan dalam literatur resmi untuk analisis senyawa obat antara lain:

- 1) Destilasi dengan tekanan udara.
- 2) Destilasi bertingkat
- 3) Destilasi dengan uap air.

c. Ekstraksi

1) Ekstraksi padat-cair

Untuk ekstraksi padat-cair ini, prosedur yang paling sering dijumpai adalah ekstraksi senyawa dari bentuk sediaan padat seperti analisis dalam sediaan tablet. Prosedur ini merupakan prosedur yang sederhana karena melibatkan pemilihan pelarut atau gabungan pelarut yang secara ideal akan melarutkan secara sempurna senyawa yang akan dianalisis dan hanya sedikit melarutkan senyawa lain yang akan mengganggu analisis lebih lanjut.

C. Pemisahan Golongan Senyawa

Untuk memisahkan berbagai senyawa dalam analisis obat digunakan ; *Stas-Otto-Gang* (dalam bahasa Jerman, *Gang* berarti cara) yang disederhanakan. Tahap analisis yang ditemukan sekitar tahun 1850 ini berasal dari Jean Servais Stas, professor ilmu kimia di Brussel, yang tidak lama kemudian diubah menjadi lebih praktis oleh Friederich Julius Otto, professor dalam ilmu kimia


farmasi di Braunschweig. Cara analisis ini didasarkan atas pembagian senyawa ke dalam fase air dan fase yang tak tercampurkan dengan air, yakni fase pelarut organik. Pemisahan sebagian besar campuran obat yang dilakukan dengan membaginya hanya ke dalam dua pelarut tidaklah cukup, pemisahan baru akan mantap jika diterapkan prinsip kedua dari Stas-Otto-Gang, yaitu yang menyangkut pembentukan ataupun penguraian garam. Prinsip ini menyangkut perbedaan kelarutan, garam akan bersifat hidrofil, sedangkan asam atau basanya lebih lipofil. Kebasaan ataupun keasaman larutan serta keragaman sifat lipofil pelarut memungkinkan pemisahan lebih lanjut.

a. Tahap Pembentukan Garam

Asam organik, berbagai jenis fenol, dan zat netral dalam suasana asam diekstraksi dengan eter; dinyatakan dengan fraksi I.

Fraksi I: Ekstrak eter dalam suasana asam	Asam karboksilat, fenol, zat netral
--	-------------------------------------

Sebelum dikocok dengan eter, lebih baik jika digunakan air yang diasamkan dengan asam sulfat sebab asam organik kuat akan lebih mendesak kembali disosiasi obat yang bersifat asam; sama halnya dengan asam tartrat yang terkadang ditambahkan.




Yang terekstraksi adalah asam organik bergugus hidrofil, misalnya asam tartrat itu sendiri, asam sitrat, berbagai asam amino, dan berbagai asam sulfonat. Demikian juga senyawa fenol hidrofil seperti asam askorbat.

Pengocokan fraksi I eter dengan larutan basa menyebabkan berbagai asam karbonat dan fenol masuk ke fase air dalam bentuk garamnya, sedangkan dalam eter tertinggal berbagai zat netral yang kelarutannya tidak dipengaruhi oleh basa. Fase eter yang diperoleh dengan cara tersebut dinyatakan sebagai fraksi IB;

Fraksi IB	Zat netral
-----------	------------

Larutan basa diasamkan kembali dengan asam sulfat, kemudian dikocok dengan eter, diperoleh fraksi IA yaitu fraksi eter yang mengandung asam, berbagai fenol, dan senyawa dengan basa dari eter masuk ke dalam fase air, misalnya ureida.



Fraksi IA	Asam karbonat, fenol, senyawa yang larut dalam larutan alkali
-----------	---

Pemisahan fraksi IA dapat dilakukan dengan mengaramkan asam karbonat dengan larutan natrium bikarbonat dalam air, sedangkan fenol baru dapat digaramkan dengan alkali hidroksida. Pemisahan demikian tidaklah tepat karena tidak menghasilkan fraksi murni ketika dilakukan kromatografi lapis tipis.

Pada pengocokan dengan eter dalam suasana asam sulfat untuk memisahkan fraksi I, bukan hanya senyawa yang bersifat basa yang akan tertinggal dalam fase air dan akan larut sebagai garam sulfat, tetapi juga berbagai asam, fenol, dan senyawa netral yang sukar larut dalam eter. Ternyata cara yang paling tepat adalah dengan menetralkan larutan asam sulfat, lalu mengasamkannya sampai pH 4 dengan asam tartrat, dan selanjutnya diekstraksi dengan kloroform (panas). Dengan cara tersebut diperoleh fraksi II yang tidak saja mengandung berbagai asam karbonat, fenol, dan senyawa netral yang larut dalam kloroform, tetapi juga berbagai basa lemah. Keasaman asam tartrat tidak cukup untuk menahan suatu basa lemah, seperti alkaloida (seperti papaverin dengan ikatan N aromatik) sebagai garam dalam fase air, apabila biasanya juga larut baik dalam kloroform.

Fraksi II: Ekstrak kloroform Suasana asam tartrat	Asam, fenol, dan zat netral yang larut dalam kloroform Basa lemah
---	--

Bila fase air dibasakan dengan NaOH, basa akan dibebaskan yang kemudian dapat dikocok dengan eter; untuk melengkapinya dapat dikocok lagi dengan kloroform. Kedua fase organik tersebut disatukan dan dinyatakan sebagai Fraksi III.

Fraksi III: Ekstrak eter dalam suasana Na-Alkali	Berbagai basa
---	---------------

Basa yang tidak dapat diekstraksi dari fase Na-alkali adalah yang bersifat sebagai fenol, misalnya morfin yang larut dalam air sebagai natrium fenolat. Untuk memisahkan basa yang demikian, fase Na-alkali dinetralkan dan dibasahi dengan amoniak karena amoniak adalah basa lemah yang dengan fenol membentuk fenolat yang larut dalam air. Pada pH 9 (yang juga merupakan titik isoelektrik larutan amoniak) basa fenol dapat melarut paling baik dalam pelarut organik, untuk misalnya morfin yang sukar larut, dapat digunakan pelarut organik kloroform : isopropanol (3:1) dan diperoleh Fraksi IV.

Fraksi IV: Ekstrak kloroform- isopropanol dalam suasana amoniak	Berbagai basa fenol
--	---------------------

Apabila Fraksi III hanya dikocok dengan eter, dalam fraksi IV akan terdapat juga basa bukan fenol yang sukar larut dalam eter, tetapi larut dalam kloroform.

Setelah dipisahkan dari fraksi IV, di dalam fase air (di sini larutan amoniak) akan tertinggal senyawa yang tak dapat dipisahkan dengan pengocokan. Dalam fraksi V ini akan terdapat fraksi hidrofili (misalnya asam hidroksamat dan asam sulfonat), sulfonamida, karbohidrat, asam amino, dan senyawa ammonium kuarterner.

Fraksi V: Senyawa yang tak dapat diekstraksi	Asam hidrofili, sulfonamida, karbohidrat, asam amino, senyawa amonim kuarterner
--	--

b. Pembagian Zat

Setelah pemisahan dengan pembentukan garam, sifat pembagian zat ke dalam dua fase pelarut, yang dinyatakan dengan koefisien partisi K_v , adalah khas. Menurut Nernst, jika struktur molekul dalam kedua fase sama serta peristiwa seperti asosiasi dan disosiasi dapat ditahan, K_v pada suhu yang tetap untuk masing-masing senyawa juga tetap.

$$K_v = \frac{\text{konsentrasi senyawa dalam air}}{\text{konsentrasi senyawa dalam pelarut organik}}$$

Makin besar K_v makin banyak pelarut organik yang harus digunakan untuk menarik senyawa dengan sempurna ke dalamnya; makin kecil K_v , makin mudah pula ekstraksinya. Jika $K_v = 1$, maka konsentrasi zat dalam air sama dengan konsentrasi zat dalam fase organik. Di sini, pada campuran air dan pelarut organik yang sama, maka pembagian kedua fase akan sama besarnya. Jika fase organik dipisahkan, harus ditambahkan sejumlah pelarut organik yang sama banyak dengan jumlah fase organik sebelumnya sehingga zat yang tertinggal dalam air akan terbagi lagi ke dalam pelarut organik itu dengan perbandingan 1:1. Jadi apabila semula terdapat 100 mg senyawa, untuk $K_v = 1$ dengan jumlah fase pelarut yang sama, pada ekstraksi pertama akan diperoleh 50 mg senyawa dalam pelarut organik dan 50 mg dalam fase air. Pada ekstraksi kedua, senyawa akan terbagi lagi masing-masing 25 mg ke dalam kedua fase tersebut, dan pada ekstraksi ke tiga, senyawa terbagi masing-masing 12,5 mg lagi. Jumlah

senyawa seluruhnya yang tereakstraksi dalam pelarut organik adalah 87,7 mg dan dalam fase air tersisa 12,5 mg.

Jika ekstraksi pertama menggunakan pelarut organik sejumlah 3 kali air, pembagian menjadi 3:1; ini berarti terdapat 75 mg senyawa dalam pelarut organik dan tersisa 25 mg dalam air. Jadi lebih efektif melakukan 3 kali ekstraksi dengan setiap kali jumlah pelarut organik sama banyak dengan air daripada mengekstraksi sekaligus dengan menggunakan pelarut organik sejumlah 3 kali air.

III

ANALISIS UNSUR DAN GUGUS FUNGSI

A. Analisis Unsur Non Logam

Identifikasi senyawa yang terekstraksi dalam fraksi dilakukan dengan cara kromatografi lapis tipis, menentukan titik leleh senyawa dan titik leleh campuran, reaksi warna khusus, dan spektrofotometri. Yang pertama-tama diperiksa adalah sifat fisika senyawa yaitu bentuk, bau, rasa, dan kelarutan. Percobaan pendahuluan kimia meliputi kelarutannya dalam asam dan basa. Pada analisis unsur diperiksa keberadaan nitrogen, sulfur, dan halogen, dan apabila reaksinya positif, diperiksa lebih lanjut sifat ikatan unsur. Akhirnya diperiksa reaksi terhadap gugus fungsi.

1. Analisis Unsur Karbon dan Hidrogen

Senyawa anorganik, dengan sedikit pengecualian, tidak terbakar seperti halnya zat organik. Senyawa anorganik tidak menghitam pada pemanasan akibat pembentukan arang. Jadi jika suatu zat terbakar dengan api atau menghitam pada pemanasan, maka senyawa itu adalah mungkin organik. Senyawa organik yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan juga S, N, atau halogen, biasanya dapat dibakar sepenuhnya dengan

pemanasan dan akan menyisakan sedikit titik karbon atau beberapa zat pengotor. Garam logam dari asam organik dapat dianggap memiliki bagian anorganik, misalnya logam. Seperti misalnya sifat suatu senyawa yang meskipun dipanaskan, tetapi tidak terbakar sepenuhnya bahkan dengan api yang kuat. Sebaliknya senyawa tersebut meninggalkan residu anorganik (yang mungkin mengandung karbon yang muncul dengan warna abu-abu yang tidak terbakar). Hal ini dapat menyatakan bahwa senyawa ini terdiri dari suatu karbonat (dari natrium atau garam kalium), oksida (dari garam kalsium), sulfat (dari garam yang mengandung belerang), atau campuran zat-zat tersebut.

Bukti yang meyakinkan bahwa senyawa tersebut adalah organik adalah dengan deteksi karbon dan hidrogen pada pemanasan, substansi dengan oksida tembaga dengan cara yang diberikan di bawah ini;

Percobaan: Panaskan sejumlah kecil dari gula, $C_{12}H_{22}O_{11}$ pada wadah krus tertutup, sebuah kasa asbes yang telah pijar, atau pisau (bukan spatula perak) kemudian bakar. Uji benzena sulfonat natrium, $C_6H_6SO_3Na$, dengan cara yang sama dan jelaskan hasil yang diperoleh.

Untuk mendeteksi karbon dan campuran hydrogen, sekitar 0,1g. gula dengan sekitar 1g. serbuk tembaga oksida dalam tabung uji dan dipasangkan dengan tabung reaksi yang dilengkapi dengan tabung gelas bengkok pada sumbat tabung sehingga gas dapat keluar menggelembung di bawah permukaan larutan kalsium hidroksida yang terkandung dalam tabung uji kedua. Jika, pada pemanasan campuran dan memungkinkan beberapa waktu untuk udara dipindahkan, larutan ini menjadi keruh yang

menunjukkan bahwa sampel mengandung karbon; pembentukan tetesan air pada dinding bagian atas dari tabung yang dipanaskan menunjukkan adanya hidrogen pada senyawa. Lepaskan tabung yang berisi air kapur sebelum mendinginkan oksida tembaga.

Senyawa organik mengandung unsur C (karbon). Oleh karena itu untuk mengetahui suatu zat merupakan senyawa organik atau bukan perlu ditunjukkan adanya unsur C tersebut. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain:

a. Pengarangan/*vercaling*/pirolisa

Zat dipanaskan dalam cawan porselen dengan syarat api tidak langsung di bawah zat supaya perubahan lebih jelas. Amati gejala pengarangan, yaitu terjadi perubahan warna menjadi cokelat kemudian hitam. Pada pemanasan lebih lanjut, warna hitam akan menghilang. Untuk mempercepat penghilangan warna hitam, dapat ditambahkan HNO_3 beberapa tetes. Sebelum terjadi pengarangan mungkin dapat dilihat nyala.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Tidak semua senyawa organik memberikan nyala.
- 2) Ada senyawa anorganik yang memberikan nyala pada pemanasan monofosfit dan hipofosfit.
- 3) Apabila hasil negatif, bukan berarti tidak ada senyawa organik. Ada beberapa senyawa organik yang tidak memberikan pengarangan. Senyawa tersebut antara lain:
 - a). Senyawa yang pada pemanasan akan menyublim/menguap, misalnya: senyawa organik yang cair, kamfer, naftalin, fenol, naftol, fenacetin.

- b). Senyawa yang terurai tanpa pengurangan, misalnya:
- Acetat : asam asetat/aseton
 - Formiat, oksalat : CO dan CO₂
 - Cyanida: cyan + logam oksida/karbonat (kalau ada logam)
 - Senyawa nitro/ nitrat: cyan
- 4) Pengamatan mungkin keliru dengan adanya warna hitam dari oksida logam. Misal: CuO, Fe₂O₃, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kepastian adanya unsur C, pada pemanasan lebih lanjut warna hitam harus hilang.

b. Percobaan Penfield

Senyawa yang mengandung C apabila dipanaskan dengan PbCrO₄ akan menjadi PbCO₃ yang pada pemanasan lebih lanjut akan menjadi PbO + CO₂. Gas CO₂ yang keluar dapat ditunjukkan dengan adanya Ba(OH)₂ yang akan menghasilkan endapan Ba(CO₃)₂ berwarna putih.

- 1) Untuk zat yang tidak mudah menguap
Dilakukan dalam tabung sempit $\text{AE} = 0,75 \text{ cm}$; panjang = 10 cm.
PbCrO₄ dilumerkan dahulu kemudian dihaluskan. Dalam tabung dimasukkan 0,5 gram PbCrO₄ dan 25 mg zat. Tabung diletakkan mendatar dan campuran zat dipanaskan dengan Ba(OH)₂.
- 2) Untuk zat yang mudah menguap
Dilakukan dalam tabung sempit $\text{AE} = 1,5 \text{ cm}$; panjang = 10 cm. PbCrO₄ dipijarkan dulu

dalam tabung kemudian zat ditambahkan ke dalam pijaran tersebut dan segera tutup dengan gabus (longgar). Pada pendinginan akan terlihat zat yang tidak terbakar akan menyublim pada dinding tabung. Dengan pemanasan setempat, diusahakan supaya ada bagian dinding yang bersih (untuk meletakkan air barit). Tabung diletakkan mendatar, teteskan air barit dan selanjutnya dilakukan cara 1.

c. Pemijaran dengan CuO

CuO yang halus dipijarkan kemudian didinginkan dalam tabung CuO tersebut dicampur dengan zat yang akan diperiksa (harus kering) dan dipijar lagi. CO₂ yang keluar akan dialirkan ke dalam larutan air barit, menyebabkan terjadinya kekeruhan.

2. Penentuan Unsur N, S, P, dan Halogenida

Untuk penentuan unsur-unsur N, S, P, dan halogenida dikenal beberapa cara, antara lain:

- a. Percobaan *Beilstein*
- b. Percobaan *Kjeldahl*
- c. Percobaan *Faraday*
- d. Percobaan *Lassaigne*
- e. Percobaan *Castellana*
- f. Percobaan *Wurzschnin*

Uji Halogen

a. Uji Beilstein

Metode yang paling sesuai untuk menguji halogen dalam senyawa organik adalah dengan membakar sejumlah kecil dari sampel pada kawat tembaga (Beilstein). Suatu tembaga halida yang

menguap akan terbentuk dan dapat ditandai dengan adanya nyala yang berwarna hijau. Tes standar yang digunakan dalam analisis kualitatif anorganik tidak dapat diterapkan secara langsung untuk senyawa halogen organik karena sampel tidak mengionisasi (Pengecualian: garam amina). Tes standar ini dapat digunakan jika halida organik yang pertama kali terurai melalui penggabungan dengan kapur atau natrium. Substansi organik akan dihancurkan dan halogen diubah menjadi kalsium atau natrium halida, yang larut dalam air dan memberikan endapan dengan perak nitrat. Metode sekering dengan natrium adalah sama seperti yang dijelaskan di bawah ini untuk nitrogen, larutan disaring menjadi asam dengan asam nitrat dan direbus selama 5 menit untuk mengusir hidrogen sianida, ditambahkan larutan perak nitrat encer, dan endapan yang terbentuk menunjukkan adanya halogen.

Percobaan: (1) *Uji Beilstein*- panaskan ujung kawat tembaga hingga memijar dan nyalanya tidak berwarna. Biarkan kawat menjadi dingin, celupkan ke dalam sejumlah kecil bahan yang akan diuji, kemudian panaskan kembali ujung kawat tersebut. Jika sampel berupa cairan, gunakan satu atau dua tetes sampel untuk membasahi kawat dan pastikan bahwa kawat tembaga tidak cukup panas untuk menguapkan sampel sebelum menyala. Percobaan ini dilakukan pada bromoasetanilida (*solid*) dan pada karbontetraklorida (*liquid*).

Prosedur: 1) Kawat Cu yang bersih dicelupkan ke dalam HNO_3 , lalu pijar pada nyala oksidasi dari pembakar bunsen. Lakukan berkali-kali.

- 2) Kawat Cu dipijar, lalu dicelupkan ke dalam oksida tembaga, setelah dipijar:
- Kawat Cu yang mengandung oksida tembaga dicelupkan pada gas lalu panaskan lagi. Kalau positif akan berwarna hijau.
 - Untuk zat yang mudah menguap: zat digulung dalam kertas saring. Kalau cair dengan diresapkan pada kertas saring (misal: etil bromida). Masukkan ke dalam lubang udara sambil kawat CuO kita pegang pada nyala.

Selain halogenida, senyawa yang juga memberi warna hijau adalah senyawa nitrogen. Misal: ureum, NH_4CNS , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, NH_4 formiat, beberapa turunan pirolidin dan turunan chinolin. Diduga terbentuk cyan tembaga yang mudah menguap dan asam borat. Persoalan NaCl (Beilstein negatif) Hal ini dimungkinkan karena tertutup oleh nyala Na (kuning).

- b. **Calcium oxide fusion:** Panaskan sejumlah kecil kapur murni yang terdapat dalam tabung reaksi pada api kuat dengan nyala Bunsen, bila telah menjadi sangat panas, segera tambahkan 2 tetes karbontetraklorida. Biarkan tabung menjadi dingin, cuci isi tabung ke dalam beker gelas dengan 10 mL *Laquadestillata*, tambahkan asam nitrit encer hingga bereaksi asam dan didihkan. Uji dengan kertas lakmus dan tambahkan lagi asam bila dibutuhkan. Saring larutan jika berkabut dan tambahkan 2-3 tetes larutan 5% perak nitrat. Amati endapan yang terbentuk.

1. Percobaan Kjeldahl (N dan P)

Prinsip: senyawa N dengan H_2SO_4 diubah menjadi $(NH_4)_2SO_4$ yang dengan basa membebaskan NH_3 yang dapat ditunjukkan dengan pereaksi Nessler. Senyawa P diubah menjadi PO_4^{3-} yang dapat ditunjukkan dengan amin molybdat dan HNO_3 , dimana terbentuk amin fosfomolybdat yang berbentuk kristal spesifik bila diamati di bawah mikroskop.

Pelaksanaan:

Dalam tabung reaksi dimasukkan 100 mg zat,, tambahkan 10 tetes asam sulfat lalu panaskan sampai larutan jenuh. Setelah dingin, encerkan dengan 1mL H_2O . tambahkan larutan NaOH encer sampai reaksi basa (alkalis). Dinginkan dan periksa dengan satu tetes pereaksi Nessler.

Untuk P: setelah destruksi (pengenceran dengan air) tambahkan HNO_3 dan ammonium molybdat. Panaskan, lebih baik tambahkan NH_4NO_3 padat sedikit supaya lebih pekat dan terjadi endapan kuning (lihat di mikroskop).

Catatan:

- percobaan ini sangat peka, karena itu sebaiknya dilakukan percobaan blanko tanpa zat untuk mengetahui apakah reagensia tidak mengandung NH_3 .
- beberapa zat (misal: senyawa diazo, turunan nitro) dengan percobaan ini sukar membebaskan NH_3 , hal ini dapat diatasi dengan penambahan sukrosa.

2. Percobaan Faraday (N dan Halogen)

Prinsip: memijar zat dengan CaO dimana senyawa yang mengandung N: NH_3 , halogen: Ca halogenida.

Pelaksanaan:

100 mg zat dalam tabung reaksi dicampur dengan serbuk CaO. Mula-mula dipanaskan perlahan dengan api kecil, perlahan-lahan suhu dinaikkan sampai pijar kemudian didinginkan. Asbes dipasang dekat ujung tabung dan di atasnya dipasang lakmus merah yang basah. Jika ada N, maka ada NH_3 dan lakmus menjadi biru. Halogen akan terdapat sebagai Ca halogenida dalam tabung sisa pijar. Tarik dengan air dan periksa seperti biasa sebagai ion-ion.

Catatan:

- tidak semua senyawa organik yang mengandung N memberikan NH_3 dengan cara ini, misalnya senyawa nitro diazo. Jadi bila hasil dengan cara ini negatif, maka coba lagi dengan cara Lassaigne yang lebih umum.
- untuk senyawa yang mudah menguap dipakai tabung lebar. CaO dipijar terlebih dahulu dalam tabung itu lalu ketika panas zat dimasukkan (50 mg atau = 1 tetes).

3. Percobaan Lassaigne

Prinsip: dengan memijar logam Na, maka senyawa organik yang mengandung C, H, O, N, S, P, dan halogen berubah menjadi:

N \rightarrow NaCN, CN

S \rightarrow Na_2S , S

P \rightarrow Na_3P , PH_3

Halogen \rightarrow Na halogenida

Pelaksanaan:

Dalam tabung reaksi dimasukkan sepotong logam Na dan sedikit zat. Mula-mula dipanaskan perlahan pada api kecil, Na mulai meleleh dan tercampur baik dengan zat (tabung dimiringkan agar Na yang meleleh dapat bercampur baik dengan zat). Perlahan-lahan api dibesarkan sampai akhirnya dipijar sampai merah selama $\pm 10-15$ menit.

Tabung didinginkan dan ditambahkan 1 mL air, aduk, didihkan sebentar, dan akhirnya disaring dengan kertas saring. Filtrat harus jernih, bila tidak jernih berarti destruksi tidak sempurna dan harus diulang lagi. Filtrat ini disebut filtrat Lassaigne dan dipakai untuk penentuan selanjutnya.

Catatan:

- dengan pemijaran yang cukup lama kelebihan logam Na diubah menjadi Na_2O sehingga tidak berbahaya kalau kena air.
- bila disamping C, N, ada S, kemungkinan terbentuk CNS yang akan mengganggu penentuan N. Untuk menghindarkannya, dipakai logam Na berlebih.


4. Percobaan Castellana (Untuk S dan P)

Percobaan ini memakai prosedur yang sama dengan percobaan Lassaigne, bedanya percobaan ini yang dipakai untuk mendestruksi bukan logam Na, tetapi campuran antara Mg dan Na_2CO_3 dengan perbandingan 1:2. Keuntungan cara ini adalah selain prosesnya lebih cepat, reaksi juga tidak sebahaya cara Lassaigne karena tidak menggunakan logam Na yang meledak jika bercampur dengan air. Uji ini dapat dipakai untuk memeriksa unsur S dan N dengan cara yang sama seperti cara Lassaigne.

5. Percobaan Wurzschnitt (untuk P)

Dalam sebagian senyawa terapeutik dan farmasetik, fosfor merupakan turunan asam fosfat dan dapat diidentifikasi sebagai fosfat setelah dihidrolisis. Jika tidak demikian halnya, senyawa fosfor organik didestruksi oksidatif dengan cara memanaskannya dengan asam nitrat atau dengan natrium peroksida dalam "bom" Wurzschnitt (cawan nikel yang tertutup dan disekrup). Disini juga akan terjadi senyawa fosfat yang dapat diidentifikasi dengan penambahan ammonium molybdat.

Reaksi:



Percobaan Wurzschnitt juga dapat digunakan baik untuk identifikasi maupun penentuan kadar unsur lain seperti belerang yang nantinya akan berubah menjadi sulfat.

B. Analisis Logam-logam

Untuk memeriksa adanya logam-logam, sampel dipijarkan dalam cawan porselen atau pecahan porselen.

Caranya: Sedikit sampel (lebih kurang 0,1 g dimasukkan dalam cawan porselen, kemudian dipanaskan di atas nyala api, mula-mula dengan api kecil kemudian dengan api yang lebih besar.

Pada waktu pemijaran diperhatikan sifat-sifat zat, misalnya perubahan warna, bau uapnya, sifat lelehan, dan lain-lain. Jika zat mengandung karbon, pada pemijaran mula-mula akan mengarang (hitam). Jika dipijarkan terus, arang akan membentuk karbon

dioksida dan akan menguap. Dari bau uapnya, kita dapat menduga adanya beberapa zat, misalnya bau asam sulfida menunjukkan adanya belerang. Bau bawang menunjukkan adanya preparat yang mengandung logam arsen. Preparat opium mempunyai bau yang spesifik. Juga harus diperhatikan warna lelehan zat yang tidak menunjukkan perubahan pada waktu pemijaran dan lain-lain. Pada pemijaran dapat pula dilihat adanya peristiwa menggelembung yang menunjukkan adanya gula, derivatsulfonamida, vitamin C, dan lain-lain. Setelah sifat-sifat ini diamati, maka sisa pemijarannya berupa oksida atau karbonat logam.

Untuk menghilangkan sisa-sisa karbon, maka pada saat pemijaran ditambahkan asam nitrat pekat beberapa tetes.

Caranya: zat yang dipijarkan dalam cawan porselen tadi dibiarkan dingin, setelah dingin ditetesi asam nitrat pekat 3 sampai 5 tetes, kemudian dipanaskan di atas api kecil, perlahan-lahan apinya diperbesar sampai pijar, bila perlu penambahan asam nitrat pekat ini dilakukan beberapa kali, kemudian diidentifikasi sisa pemijarannya.

Pada pemeriksaan zat organik, kation diperiksa dari sisa pemijaran, tetapi harus diperhatikan adanya logam-logam seperti senyawa ammonium, raksa, dan arsen yang tidak meninggalkan sisa warna karena senyawa ini menyublim pada waktu pemijaran. Oleh karena itu, senyawa ini harus diperiksa terlebih dahulu sebelum pemijaran. Sisa pemijaran kemudian diamati baik sifat fisis/kimianya; misalnya warna, rasa, kelarutan, dan reaksi-reaksi kimia yang berhubungan.

Sisa pemijaran berwarna :

- Putih :
natrium, kalium, kalsium, magnesium,
barium, aluminium
- Kuning :
bismuth, timbal
- Hitam coklat : perak, stibium, kuprum
- Coklat atau merah : besi
- Waktu panas kuning, setelah dingin kuning :
seng

Reaksi-reaksi untuk Kation

a. Ammonium

- Sampel dilarutkan dalam air, kemudian ditambah larutan natrium hidroksida dan dipanaskan, akan membebaskan gas ammonia (NH_3) yang membirukan kertas lakmus merah basah atau dapat dikenal dari baunya.
- Larutan yang sangat encer ditambah larutan natrium hidroksida, ditambah beberapa tetes pereaksi Nessler, akan terbentuk endapan jingga.

b. Raksa (Hg)

- Larutan sampel ditambah air brom, panaskan dan celupkan kawat tembaga yang telah dibersihkan ke dalam larutan tersebut, kemudian kawat tembaga digosok dengan kertas saring, akan terbentuk sepuhan raksa yang mengkilap.

Membedakan raksa (I) dengan raksa (II)

- Dengan larutan natrium hidroksida. Raksa (I) membentuk endapan hitam, sedangkan raksa (II) membentuk endapan merah.
- Dengan larutan kalium iodida, Raksa (I) akan membentuk endapan kuning, bila ditambah

larutan kalium iodida berlebihan akan terbentuk endapan abu-abu. Raksa (II) akan membentuk endapan merah, bila ditambah kalium iodida berlebih endapan akan larut.

c. Arsen (As)

- Reaksi *Gitzeit*

Dalam tabung reaksi :

- Sampel ditambah dengan serbuk seng, ditambah asam klorida encer, panaskan perlahan-lahan, di atas tabung diberi kapas yang dibasahi dengan larutan timbal asetat, dan di atasnya lagi ditutup kertas saring yang diberi kristal perak nitrat. Uap arsen (AsH_3) yang keluar akan bereaksi dengan perak nitrat. Jika perak nitrat kering, akan terbentuk warna kuning dari $\text{AsAg}_3 \cdot 3 \text{AgNO}_3$. Jika perak nitrat basah, akan terbentuk warna hitam dari perak.
- Sampel ditambah asam nitrat pekat, ditambahkan ammonium molybdat, panaskan di atas penangas air, akan terbentuk endapan kuning.
- Sampel ditambah natrium hidroksida, panaskan, kemudian asamkan dengan asam asetat, tambah 2 tetes perak nitrat, akan terbentuk endapan merah coklat.

d. Natrium (Na)

- Sisa abu berwarna putih
- Sisa abu ditambah asam pikrat, panaskan sedikit, terbentuk kristal berbentuk sapu lidi.
- Sisa abu ditambah asam asetat, tambahkan air, tambahkan larutan seng uranil asetat, panaskan sedikit, terbentuk kristal berbentuk almond.
- Sisa abu ditambah asam sulfat pekat, panaskan sedikit (1), diambil filtrat ditambah asam sulfat

- pekat, panaskan sedikit (2). Kemudian (1) dicampur dengan (2), terbentuk kristal yang spesifik.
- e. Kalium (K)
- Sisa abu berwarna putih
 - Sisa abu dengan reagen triple nitrit (reagen K) terbentuk kristal segi yang berwarna hitam (bedakan dengan amonium)
 - Sisa abu ditambah asan pikrat, panaskan sedikit, terbentuk kristal jarum yang besar.
- f. Kalsium (Ca)
- Sisa abu berwarna putih
 - Sisa abu ditambah asam sulfat pekat, biarkan beberapa menit, terbentuk kristal seperti jarum.
 - Sisa abu dilarutkan, ditambah asam asetat, tambah ammonium asetat, terbentuk endapan yang tidak larut dalam ammonia atau asam asetat.
 - Sisa abu ditambah larutan natrium tartrat, terbentuk kristal yang spesifik.
- g. Magnesium (Mg)
- Sisa abu berwarna putih
 - Larutan sisa abu ditambah natrium hidroksida sampai alkalis, kemudian tambahkan 2 tetes titan yellow, terbentuk endapan merah yang bergumpal.
 - Beberapa tetes larutan sampel diletakkan diobjek gelas, tambah sedikit kristal ammonium klorida dan sedikit asam sitrat, tambah ammonium fosfomolybdat sedikit, tambah 1 tetes ammonium hidroksida 14N, diamkan sebentar, terbentuk kristal seperti bintang, I atau H.

- h. Barium (Ba)
- Sisa abu berwarna putih
 - Sisa abu dilarutkan dalam asam klorida 2 N, tambahkan 1 tetes asam sulfat 2 N, terbentuk endapan putih.
- i. Aluminium (Al)
- Sisa abu berwarna putih
 - Tambahkan beberapa tetes larutan 0,05 % quinalizarin dalam 0,25 N natrium hidroksida pada larutan alkalis dari aluminium, panaskan hingga mendidih, dinginkan. Kemudian tambahkan asam asetat berlebih, terbentuk warna merah ungu.
 - Larutan aluminium ditambahkan 1 tetes pereaksi alizarin S tambah asam asetat 2 N sampai warna ungu tepat hilang, kemudian tambah 1 tetes berlebihan, terbentuk endapan berwarna merah.
- j. Borat
- Sisa abu berwarna putih mengkilat
 - Sisa abu ditambah metanol, kemudian dibakar, terbentuk nyala hijau
- k. Bismuth (Bi)
- Sisa abu berwarna kuning (dingin), jika panas berwarna jingga.
 - Larutkan sisa abu dengan asam klorida encer, tambah larutan kalium iodida, terbentuk endapan jingga, jika ditambah KI berlebih, endapan akan larut.
 - Sisa abu ditambah asam sulfat pekat (di atas objek gelas), panaskan hati-hati sampai kering, basahi dengan sedikit air, tambah kalium sulfat

berlebihan, terbentuk kristal hexagonal dari $3K_2(SO_4)Bi(SO_4)_3$.

l. Timbal (Pb)

- Sisa abu berwarna kuning
- Larutkan sisa abu dalam asam sulfat encer, tambah larutan kalium bikromat, terbentuk endapan kuning yang larut dalam natrium hidroksida berlebih.
- Larutkan sisa abu dalam asam klorida encer, kalau perlu dipanaskan sedikit, tambah kalium kromat, terbentuk endapan kuning dari $PbCrO_4$.

m. Seng(Zn)

- Sisa abu panas berwarna kuning, bila dingin berwarna putih
- Sisa abu ditambah 2 tetes asam sulfat encer, 1 tetes larutan tembaga (II) sulfat 0,1%, 3 tetes pereaksi ammonium merkuri tiosianat, terbentuk endapan berwarna ungu.

Reagen ammonium merkuri tiosianat :

HgCl ₂	3 g
NH ₄ CNS	9 g
H ₂ O	100 mL

- Larutkan sisa abu dalam natrium hidroksida, lalu tambahkan pada ditizon yang dilarutkan dalam karbontetraklorida, terbentuk warna ungu merah.
- Larutan sisa abu ditambah larutan kalium ferisianida, terbentuk endapan kuning muda. Apabila ditambah asam asetat, endapan larut kembali.
- Larutan sisa abu ditambah ammonium hidroksida, terbentuk endapan, bila ditambah berlebih, endapan larut kembali.

- n. Perak (Ag)
- Sisa abu berwarna hitam coklat
 - Larutan sisa abu ditambahkan asam klorida encer, terbentuk endapan putih dari AgCl, apabila ditambahkan ammonium hidroksida, endapan akan larut.
 - Larutan sisa abu ditambah larutan kalium iodida, terbentuk endapan kuning.
 - Larutan sisa abu ditambahkan larutan kalium bikromat, terbentuk endapan berwarna merah.
- o. Stibium (Sb)
- Sisa abu berwarna hitam coklat
 - Larutan sisa abu ditambah larutan asam fosfomolybdat, terbentuk endapan berwarna biru.
- p. Tembaga (Cu)
- Sisa abu berwarna hitam coklat
 - Larutan sisa abu ditambah 1 tetes asam klorida 25%, terbentuk warna ungu, kemudian berubah menjadi coklat tua.
- q. Besi (Fe)
- Sisa abu berwarna coklat atau merah
 - Gerus larutan besi dengan kristal kalium sianida (KCNS) terbentuk endapan warna merah darah.
 - Sisa abu larutkan dalam asam klorida 2 N, 2 tetes dari larutan ini digerus dengan kristal kalium ferosianida, terbentuk warna biru.
 - Dengan ammonium sulfida, terbentuk endapan hitam, yang larut dalam asam klorida encer.
 - Dengan dimetilglioksim, terbentuk endapan merah.

C. Analisis Anion

a. Asetat

- *Esterifikasi*: sedikit sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 1 mL asam sulfat pekat, dan 2 - 3 mL etanol. Tabung ditutup dengan kapas yang dibasahkan, kemudian panaskan hati-hati, akan terbentuk bau yang spesifik dari etil asetat. Setelah dingin diencerkan dengan air, baunya akan semakin kuat.
- *Dengan perak nitrat*: larutan pekat dari asetat ditambah larutan perak nitrat, terbentuk endapan berwarna putih.
- *Dengan larutan besi (III) klorida*: larutan netral dari asetat ditambah larutan besi (III) klorida, terbentuk warna merah gelap. Warna ini dirusak oleh asam klorida encer.
- Asam borat dan borax
Larutan sampel diasamkan dengan asam klorida encer, kemudian teteskan pada kertas kurkumin, keringkan, terbentuk warna merah biru. Bila diuapi dengan ammonia akan terbentuk warna biru.
- Campur zat dengan kristal kalsium florida, tambah asam sulfat pekat secukupnya sampai terbentuk pasta. Kemudian letakkan sedikit pasta ini di atas kawat platina dan bakar di atas nyala Bunsen, terbentuk nyala hijau.
- *Membedakan asam borat dengan borax*:
 - Asam borat; zat ditambah metanol, kemudian dibakar, terbentuk nyala hijau.
 - Borax; zat ditambah asam sulfat pekat beberapa tetes, tambah metanol, kemudian dibakar, terbentuk nyala hijau.

b. Bromida

- Larutan zat ditambah 2 tetes karbontetraklorida, 1 tetes asam klorida encer, sedikit larutan antrium hipoklorit secara perlahan-lahan, campur, maka lapisan karbontetraklorida akan berwarna coklat.
- Larutan zat ditambah dengan asam nitrat encer, larutan perak nitrat, terbentuk endapan kuning dari AgBr. Endapan ini larut dalam ammonium hidroksida pekat, kalium sianida, dan natrium tiosulfat, tetapi tidak larut dalam asam nitrat encer.

c. Iodida

- Larutan sampel ditambah asam nitrat encer, larutan perak nitrat, akan terbentuk endapan kuning dari AgI. Endapan ini larut dalam kalium sianida, dan natrium tiosulfat, tetapi tidak larut dalam asam nitrat encer dan ammonium hidroksida pekat.
- Larutan zat ditambah 2 tetes karbontetraklorida, 1 tetes asam klorida encer, sedikit larutan antrium hipoklorit secara perlahan-lahan, campur, maka lapisan karbontetraklorida akan berwarna ungu.

d. Klorida

- Larutan sampel ditambah asam nitrat encer, larutan perak nitrat, akan terbentuk endapan kuning dari AgCl. Endapan ini larut dalam ammonium hidroksida encer, kalium sianida, dan natrium tiosulfat. Perak klorida diendapkan kembali dari larutan amoniakal dengan penambahan asam nitrat encer.

- e. Karbonat
- Sampel ditambah asam sulfat 2 N, gas yang terjadi dialirkan ke dalam air barit, terbentuk endapan putih.
- f. Sianida
- *Uji Biru Prussian*: 2 mL larutan sampel ditambah 1 mL larutan natrium hidroksida 10%, panaskan di atas penangas air, jangan sampai kering, tambah kristal besi (II) sulfat sedikit, asamkan dengan asam sulfat 2N, tambah larutan besi (III) klorida, larutan akan berwarna biru. Jika kadar sianida rendah maka larutan berwarna hijau, dan bila dibiarkan berlama-lama akan berwarna biru.
- g. Nitrat
- Tuangkan larutan dengan hati-hati melalui dinding tabung reaksi yang berisi pereaksi difenil amin (0,5 g difenilamin dalam 100 mL asam sulfat, encerkan dengan 20 mL air) akan terbentuk cincin berwarna biru.
- h. Oksalat
- Larutan sampel ditambah larutan perak nitrat, terbentuk endapan putih dari perak oksalat ($\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$), tidak larut dalam air, larut dalam ammonium hidroksida dan dalam asam nitrat encer.
 - Larutan sampel yang netral, ditambah kalsium klorida, terbentuk endapan putih dari kalsium oksalat (CaC_2O_4), tidak larut dalam asam asetat encer, tetapi larut dalam asam klorida encer dan asam nitrat encer.

- i. Fosfat
 - Larutan sampel ditambah asam nitrat encer, larutan ammonium molybdat, terbentuk endapan kuning.
- j. Sulfat
 - Larutan sampel ditambah air barit, terbentuk endapan putih
- k. Sitrat
 - Sampel ditambah nikotinamid atau piridin, asam asetat anhidrat, kemudian panaskan perlahan-lahan, akan terbentuk warna ungu (reaksi dilakukan dalam cawan porselen).

D. Analisis Gugus Fungsi

Berbagai tes untuk penentuan gugus fungsi yang dibahas dalam bagian ini adalah:

No	Gugus Fungsi	Test
1	Alkohol	a. Oksidasi asam kromat b. Uji iodoform c. Uji Lucas
2	Aldehyd dan Keton	a. Reaksi dengan 2,4-dinitrofenilhidrazin b. Oksidasi aldehyd dengan asam kromat c. Uji iodoform d. Uji Tollens
3	Alkena	a. Reaksi dengan bromine b. Oksidasi dengan permanganate
4	Amin	Spektroskopi IR dan NMR
5	Asam Karboksilat	a. Netralisasi b. Esterifikasi
6	Ester	a. Uji feri hidroksamat b. Hidrolisis

7	Halida	a. Uji Beilstein
8	Fenol	a. Reaksi dengan bromine/ air b. Reaksi dengan besi (III) klorida
9	Gugus aromatis	Reaksi dengan aluminium klorida/kloroform



1. Alkohol

a. Oksidasi Asam Kromat


Reagen asam kromat dibuat dengan menuang secara perlahan-lahan 25 mL asam sulfat pekat ke dalam larutan 25 g asam kromat (CrO_3) dalam 75 mL air.

Prosedur: tambahkan 1 tetes atau 30 mg sampel ke dalam 1 mL aseton *grade reagen* dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 1 mL larutan pereaksi asam kromat, kocok dan campurkan. Alkohol primer dan sekunder akan mereduksi warna orange dari pereaksi asam kromat menjadi suspensi berwarna hijau atau biru dari garam kromat Cr(III) dalam 2-5 detik. 1-butanol, 2-butanol dan 2-metil-2 propanol dapat digunakan sebagai senyawa referensi.


Alkohol primer dan sekunder memberikan reaksi yang berbeda dengan alkohol tersier dalam uji ini. Alkohol primer akan teroksidasi oleh asam kromat menghasilkan senyawa aldehyd yang pada reaksi oksidasi selanjutnya akan menghasilkan asam karboksilat.



Alkohol sekunder akan bereaksi dengan asam kromat menghasilkan senyawa keton menurut reaksi berikut ini:




Alkohol tersier tidak bereaksi dengan reagen ini:



b. Uji Iodoform

Uji iodoform sebenarnya terutama digunakan untuk identifikasi senyawa keton dengan gugus metil yang melekat pada gugus karbonilnya. Namun beberapa alkohol dapat dioksidasi menjadi keton sehingga memberikan reaksi yang positif untuk uji ini.




c. Uji Lucas

Pereaksi untuk uji Lucas ini dibuat dengan cara menambahkan 136 g zeng klorida anhidrat kepada 105 g asam klorida pekat dengan pendinginan.

Prosedur: masukkan 0,1 mL sampel ke dalam tabung reaksi yang berisi 1 mL reagen Lucas. Kocok larutan secara cepat, bila perlu gunakan *vortex*. Pembentukan alkil klorida ditandai dengan pembentukan suatu lapisan yang tidak larut atau emulsi. Alkohol tersier akan membentuk lapisan emulsi dalam waktu kurang

dari 1 menit, alkohol sekunder akan memberikan reaksi dalam waktu yang lebih lama, 5-10 menit, sedangkan alkohol primer tidak memberikan reaksi. Uji ini hanya dapat diterapkan terhadap alkohol yang tidak larut dalam air. 1-butanol, 2-butanol, 2-metil-2-propanol (tert-butil alkohol) dan 2-propen-1-ol (alil alkohol) dapat digunakan sebagai senyawa pembanding.

Alkohol primer, sekunder, dan tersier memberikan reaksi yang berbeda dengan asam klorida sebagai akibat dari kemampuan mereka untuk menghasilkan karbokasi yang stabil, yang selanjutnya akan bereaksi membentuk alkil klorida. Alkil klorida merupakan senyawa yang tidak larut dalam cairan asam klorida. Reaktivitas karbokasi dari ketiga jenis alkohol berturut-turut adalah; alkohol tersier > sekunder > primer. Keberadaan dari zeng klorida sebagai asam Lewis dapat memberikan suasana reaksi yang lebih asam dibandingkan dengan asam klorida sendiri sehingga mampu mempercepat reaksi pembentukan karbokasi:



2. Aldehid dan Keton


a. Reaksi dengan 2,4-dinitrofenilhidrazin

Reagen 2,4-dinitrofenilhidrazin dibuat dengan melarutkan secara hati-hati 8,0 g 2,4-dinitrofenilhidrazin dalam 40 mL asam sulfat pekat dan ditambahkan secara perlahan-lahan 60 mL air, homogenkan. Tambahkan 200 mL etanol

grade reagen ke dalam larutan yang hangat ini dan saring untuk memisahkan endapan.

Prosedur: larutkan 20 mg sampel (1-2 mL cairan) dengan 0,5 mL etanol dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 mL larutan reagen 2,4-dinitrofenilhidrazin, kocok tabung reaksi kuat-kuat. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya endapan berwarna kuning hingga merah. Jika endapan tidak terbentuk, panaskan larutan selama 30 detik dan kocok tabung reaksi kembali. Jika endapan masih belum terbentuk, diamkan selama 15 menit.

Reaksi antara sampel dengan 2,4-dinitrofenilhidrazin dengan aldehyd dan keton dalam medium asam merupakan tes yang sensitif. Gugus karbonil akan bereaksi dengan 2,4-dinitrofenilhidrazin melalui serangan nukleofilik pada atom karbon karbonil yang diikuti dengan eliminasi molekul air.



Aldehyd dan keton aromatik akan bereaksi menghasilkan dinitrofenilhidrazin yang berwarna merah, sedangkan aldehyd dan keton nonaromatik berwarna kuning.

b. Oksidasi aldehyd dengan asam kromat

Prosedur sama dengan identifikasi alkohol, hasil positif ditunjukkan dengan timbulnya endapan berwarna kehijauan untuk aldehyd. Aldehyd alifatik menunjukkan reaksi positif dalam 15 detik, sedangkan aldehyd aromatik akan bereaksi


dalam 30 - 45 detik. Aseton dan keton lainnya akan teroksidasi oleh reaksi ini, tetapi dalam waktu 2-3 menit.

c. Uji Iodoform

Reagen ini dibuat dengan melarutkan 50 g kalium iodida dan 25 g iodium dalam 200 mL air.

Masukkan 75 mg atau 3 tetes sampel dalam Erlenmeyer 25 mL dan tambahkan 1 mL air; untuk senyawa yang tidak larut dalam air, tambahkan 1,2-dimetiletan tetes pertetes hingga sampel terlarut. Tambahkan 1 mL larutan natrium hidroksida dan reagen iodoform tetes pertetes hingga warna merah dari iodine menetap setelah larutan dikocok. Panaskan larutan pada suhu 60°C di atas *water bath*. Bila perlu tambahkan lagi reagen iodoform untuk mempertahankan warna merah. Hilangkan kelebihan iodine dengan menambahkan NaOH 2,5 M dan 5 mL air. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya endapan kuning dari iodoform dalam 15 menit. Saring endapan, cuci dengan air, keringkan dan gunakan untuk penentuan titik leleh.

Keton dan alkohol dengan gugus metil akan dirubah secara langsung menjadi gugus karbonil, sesuai reaksi berikut:





d. Uji Tollens

Reagen Tollens harus dibuat segar. Reagen ini dibuat dengan menempatkan 2 mL larutan perak nitrat 5% dalam tabung reaksi, tambahkan 1 tetes larutan NaOH 10%, akan terbentuk endapan perak oksida. Endapan ini dilarutkan dengan penambahan ammonia encer (2%).

Pengujian ini dilakukan dengan menambahkan beberapa tetes reagen pada sejumlah kecil sampel. Timbulnya cermin perak menunjukkan reaksi yang positif.

Pembuatan reagen Tollens didasarkan pada pembentukan kompleks silver diammin yang larut dalam air menurut reaksi:



3. Alkena

Alkena mempunyai gugus fungsi yang berupa ikatan-ikatan rangkap (*double bound*) oleh karena itu alkena bersifat lebih reaktif dibanding alkana, salah satunya yaitu ikatan rangkap alkena dapat mengadisi Hidrogen Halida (HBr). Jika gas HBr yang bertekanan dialirkan ke dalam cairan alkena maka gas HBr akan diadisi oleh cairan alkena, sehingga tekanan dari gas HBr setelah reaksi akan berkurang. Jumlah tekanan gas sebelum dan sesudah reaksi dapat diukur dengan menggunakan peralatan analitik.

Alkena bereaksi cepat dengan Br_2 dalam larutan CCl_4 , terjadi perubahan warna larutan dari larutan berwarna merah menjadi tidak berwarna (*decolorization of bromine*).

Alkena juga bereaksi dengan larutan permanganat encer yang dingin (*Baeyer test*) menghasilkan endapan coklat dari mangan dioksida. Tetapi uji ini tidak bersifat spesifik karena tidak hanya alkena yang dapat bereaksi tetapi senyawa-senyawa lain yang mempunyai gugus fungsi yang sama dan mudah teroksidasi seperti alkuna, aldehida juga dapat bereaksi dengan uji ini.

Alkena larut dalam H_2SO_4 pekat yang dingin dengan cepat, reaksi ini menghasilkan garam oxonium yang larut dan senyawa sulfonat, sedangkan alkana, alkil halida tidak larut sehingga uji ini digunakan untuk membedakan alkena dari alkana dan alkil halida.

Struktur dari alkena dapat ditentukan dengan reaksi ozonolisis (pemaksapisahan dengan ozon), berdasarkan identifikasi dari senyawa yang dihasilkan.

4. Amin

Amina adalah senyawa organik yang merupakan turunan dari ammonia dengan satu atau lebih gugus organik yang mensubstitusi atom H, amina seperti ammonia bersifat basa karena adanya pasangan elektron bebas pada amonia aromatik.

- Pemeriksaan senyawa basa amin

Dengan pereaksi Mayer, senyawa basa amin membentuk endapan kekuning-kuningan. Caranya; ke dalam larutan zat yang jernih, yang bersifat asam lemah akibat penambahan asam sulfat, ditambahkan beberapa tetes pereaksi.


Reaksi tidak sama untuk semua senyawa basa amin. Morfin dan efedrin hanya memberikan sedikit endapan atau sama sekali tidak.

Pereaksi Mayer: 1,35 g HgCl_2 dalam 100 ml larutan KI 5%

- Pemeriksaan amin alifatik primer (reaksi *Senfol*)
Larutan amin dalam etanol dituangi karbondisulfida sama banyak, dipanaskan sampai karbondisulfida yang berlebih menguap. Pada sisa larutan ditambahkan beberapa tetes larutan raksa (II) klorida 5%, tercium bau khas mustard jika ada amin alifatik primer.
- Pemeriksaan amin aromatik primer (reaksi *Diazo*)
Sejumlah 50 mg zat dilarutkan dalam 2 mL HCl 3 N. Larutan direaksikan dengan 2 tetes pereaksi Diazo I, kemudian dituangkan ke dalam 2 mL pereaksi Diazo II, terbentuk warna merah jingga atau endapan.
- Pemeriksaan amin sekunder
Zat dilarutkan dalam 2 mL HCl 3 N, didinginkan pada 5°C , kemudian direaksikan dengan 2 mL larutan NaNO_2 1%. Lima menit kemudian larutan diencerkan dengan 5 mL air dan dikocok dua kali, setiap kali dengan 5 mL eter. Larutan eter dicuci, dan akhirnya diuapkan sampai kering. Kepada sisa penguapan ditambahkan 50 mg fenol, dipanaskan sebentar, didinginkan dan direaksikan dengan 1 mL H_2SO_4 , terbentuk warna biru-hijau pekat yang bila hasil reaksi dituangkan ke dalam air berubah menjadi merah. Jika dibasakan, warna hijau-biru semula timbul lagi (percobaan nitrosamin dan *Liebermann*).

5. Asam Karboksilat



Reaksi netralisasi: timbang sampel sebanyak 200 - 300 mg. Masukkan ke dalam Erlenmeyer 125 mL. Jika sampel larut dalam air, larutkan dalam 50 mL air suling. Jika sampel tidak larut dalam air larutkan dalam etanol 95% etanol secukupnya, lalu tambahkan 25 mL air suling. Tambahkan 2-3 tetes indikator fenolftalein, dan titrasi larutan dengan NaOH 0,1 M hingga terjadi perubahan warna indikator.



6. Ester

- Uji Hidroksilamin


Sebanyak 50 mg atau 2 tetes larutan sampel ditambahkan 1 mL larutan hidroksilamin hidroklorida 0,5 M dalam metanol. Tambahkan tetes demi tetes larutan natrium hidroksida 2,5 M hingga larutan menjadi alkali (gunakan kertas pH). Kemudian tambahkan 3 tetes larutan natrium hidroksida. Panaskan campuran hingga mendidih, dinginkan, dan tambahkan tetes demi tetes HCl 1,5 M sambil dikocok hingga pH menjadi 3. Tambahkan 2 atau 3 mL metanol jika larutan keruh. Lalu tambahkan 1 tetes larutan FeCl_3 0,7 M. Hasil uji positif ditandai dengan timbulnya warna biru merah.



- Hidrolisis Ester

Sebanyak 1 g larutan sampel dan 10 mL larutan natrium hidroksida 2,5 M dimasukkan dalam labu alas bulat 50 mL, hubungkan dengan kondensor refluks. Refluks larutan selama 1 jam, kemudian diekstraksi dengan 20 mL dietil eter. Larutan eter dikeringkan, destilasi untuk memperoleh alkohol. Identifikasi alkohol yang diperoleh.

Larutan natrium hidroksida diasamkan dengan HCl 1,5 M dan dinginkan. Jika terbentuk endapan, kumpulkan endapan dengan filtrasi vakum. Jika tidak terbentuk endapan. Ekstraksi larutan dengan 20 mL dietil eter. Keringkan dan destilasi hingga diperoleh residu asam karboksilat. Identifikasi senyawa karboksilat yang diperoleh.




7. Halida (sama dengan uji Halogen= *Beilstein*)

8. Fenol


- Reaksi dengan Bromin.

Kepada 0,1 g sampel dilarutkan dalam 10 mL air, ditambahkan tetes demi tetes larutan bromine pekat, kocok hingga warna bromine menjadi hilang. Hilangnya warna orange-coklat dari bromin menunjukkan hasil uji positif.



- Reaksi dengan FeCl_3

Sebanyak 30 mg atau 1 tetes larutan uji disuspensikan dalam 1 mL kloroform. Tambahkan 1 tetes piridin dan 3 tetes larutan FeCl_3 0,06 M dalam kloroform. Hasil uji positif ditandai dengan adanya warna biru dari kompleks Feri fenolat.



IV

ANALISIS SENYAWA TURUNAN ASAM HIDROKSIBENZOAT


A. Pendahuluan

Asam benzoat, merupakan asam kuat yang dapat digunakan sebagai standar primer untuk suatu basa kuat melalui titrasi langsung dari asam terhadap titik akhir fenolftalein. Kehadiran gugus hidroksil pada ini asam benzoat pada posisi orto akan meningkatkan ionisasi dari hydrogen karboksil. Sedangkan asam meta dan para-hidroksibenzoat akan terionisasi dalam taraf yang sama dengan asam benzoat. Substitusi pada gugus hodroksil oleh gugus alkil atau asil tidak meningkatkan ionisasi asam. Sebagai hasilnya, semua asam hidroksibenzoat dan turunannya dengan gugus karboksil yang tidak tersubstitusi dapat dianalisis kuatitatif melalui titrasi secara langsung dengan suatu basa kuat terhadap fenolftalein sebagai indikator titik akhirnya.

Asam monohidroksibenzoat terdapat dalam bentuk isomer orto, meta, dan para. Dari semua isomer ini, bentuk isomer orto, asam salisilat, dan turunannya merupakan senyawa yang penting karena efek fisiologik

dan antiseptiknya. Termasuk dalam kelompok ini adalah garam seperti natrium salisilat, ester dari gugus karboksil seperti metal salisilat dan ester dari gugus hidroksil seperti asam asetilsalisilat. Ester karboksi dari isomer para dikenal sebagai turunan paraben dan menjadi penting dalam farmasi karena efeknya dan pengawet antibakteri (*preservatives*). Senyawa paraben ini juga aktif sebagai bakteriostatik dan menghambat pertumbuhan jamur. Isomer meta dan turunannya sedikit atau bahkan tidak digunakan dalam farmasi karena keterbatasan efek fisiologik sebagaimana pada isomer orto, maupun sifat antiseptiknya sebagaimana pada isomer para.

Struktur dari asam o-hidroksibenzoat dan turunan dari asam hidroksibenzoat yang banyak digunakan dalam farmasi ditunjukkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 4.1. Struktur asam o-hidroksibenzoat dan turunan dari asam hidroksibenzoat a) asam salisilat; b)

asam asetilsalisilat; c) metil salisilat; d) Natrium salisilat; e) metil paraben; f) propil paraben; g) para aminosalisilat.

Asam gentisat, asam 2,5-hidroksibenzoat, merupakan produk oksidasi biologik dari asam salisilat dan saat ini merupakan senyawa yang menarik karena efek antirematiknya. Asam p-aminosalisilat juga penting dalam farmasi karena efek antituberkulosisnya.

Gugus karboksil pada posisi orto yang relatif terhadap gugus hidroksil akan menurunkan ionisasi hidrogen dari gugus hidroksil.

Fenol memiliki pKa 9,89, sehingga di dalam air gugus OH fenolik merupakan asam yang sangat lemah untuk dititrasi dengan baku basa. Dalam pelarut organik tertentu, fenol dan senyawa fenol yang mempunyai gugus ester pada posisi orto atau para dapat dititrasi dengan basa yang sesuai. Sebagai contoh, metil salisilat dalam dimetilformamida dapat dititrasi sebagai asam kuat dengan titran kalium metoksida dalam metanol-benzen.

Senyawa fenol dengan ion besi (III) membentuk senyawa kompleks yang berwarna. Asam o-hidroksi benzoat dengan ion besi (III) membentuk warna violet, senyawa m-hidroksi benzoat dengan ion besi (III) tidak membentuk warna, sementara asam p-hidroksi benzoat dengan ion besi (III) membentuk endapan kuning amorf. Adanya gugus hidroksil pada inti aromatisnya memperbesar reaktivitas terhadap halogen. Asam hidroksibenzoat dan turunannya bereaksi kuantitatif dengan bromium dan iodium. Dalam larutan sedikit basa, senyawa salisilat bereaksi sedikit lambat dengan

iodium membentuk endapan merah tetraiodofenilkuinon.

Asam hidroksi benzoat dan esternya tidak larut atau sedikit larut dalam air, tetapi larut dalam alkohol, eter, dan kloroform. Garam alkalinnya larut dalam air tetapi tidak cukup basa untuk dititrasi dengan baku asam. Metode umum untuk menetapkan garam alkali ini adalah dengan merubah garam tersebut menjadi asam dengan penambahan asam kuat berlebihan, kemudian disari dengan pelarut organik. Setelah pelarut diuapkan, asam bebas kemudian dititrasi dengan baku basa. Sementara itu titrasi langsung terhadap natrium salisilat dan garam salisilat lainnya dapat dilakukan berdasarkan perbedaan kelarutan asam bebas yang besar dalam air dan dalam eter. Titrasi dilakukan dengan menambah eter untuk melarutkan asam organik yang terbentuk. pH larutan relatif tetap sampai semua garam diubah menjadi asam bebas dan terdapat kelebihan titran asam.

Ester asam hidroksi benzoat dapat dihidrolisis dalam larutan basa. Prosedur analisis kuantitatif dibuat dengan menggunakan sejumlah tertentu larutan baku basa untuk hidrolisis dan selanjutnya kelebihan basa dititrasi kembali dengan baku asam. Ester karboksil seperti metil salisilat dan nipagin tidak larut dalam air dan dapat dihidrolisis dengan dipanaskan di bawah pendingin balik menggunakan KOH-etanolik.

Senyawa-senyawa turunan asam hidroksi benzoat menyerap energi radiasi pada daerah ultraviolet. Metode spektrofotometri sangat berguna terutama untuk penetapan beberapa senyawa ini dalam campuran.

Asam hidroksi benzoat dan turunannya dapat ditetapkan juga dengan kromatografi cair kinerja tinggi

(KCKT) dengan detektor UV-Vis karena senyawa-senyawa ini mempunyai kromofor. Kromatografi gas juga dapat digunakan untuk analisis asam benzoat setelah diderivatisasi dengan agen penderivat tertentu.

B. Metode Analisis Dasar

1. Titrasi Langsung dari Asam Bebas


Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, asam hidroksibenzoat adalah asam yang cukup kuat untuk dititrasi secara langsung dengan suatu larutan basa standar. Selanjutnya akan dijelaskan dengan analisis sampel asam salisilat.

a. Penentuan Asam Salisilat

Asam salisilat dikeringkan pada suhu 100°C selama 1 jam, atau dengan asam sulfat selama 3 jam. Sekitar 500 mg sampel ditimbang akurat dan dilarutkan dengan 25 mL alkohol yang telah dinetralkan terhadap NaOH 0,1 N, menggunakan 3 tetes fenolftalein sebagai indikator. Penggunaan alkohol sebagai pelarut dibutuhkan karena asam praktis tidak larut dalam air. Larutan alkohol dari asam salisilat kemudian dititrasi dengan 0,1 N natrium hidroksida hingga warna *pink* pertama dari indikator mulai terlihat. Natrium hidroksida harus bebas karbonat untuk mencegah kesalahan titik akhir akibat adanya pelepasan karbondioksida.

$$\% \text{ Asam} = \frac{\text{ml. x N (NaOH) x B.E x 100}}{\text{Berat sampel (mg.)}}$$

di mana B.E adalah berat ekuivalen dari asam yang digunakan.



Gambar 4.2: Reaksi antara asam salisilat dengan natrium hidroksida

Ester hidroksil dapat juga ditetapkan dengan metode ini karena masih mengandung gugus karboksil. Misalnya asam asetilsalisilat. Senyawa ini harus dihidrolisis terlebih dahulu untuk mencegah kelebihan basa pada saat titrasi. Untuk analisis senyawa ini menggunakan larutan 0,1 N natrium hidroksida suhu dipertahankan pada 15 sampai 20°C. Metode ini memiliki kelemahan dalam penentuan ester dalam hal esternya adalah ester asam itu sendiri dan setiap asam bebas yang mungkin terbentuk dari dekomposisi ester melalui hidrolisis. Metode terbaik untuk ester ini adalah metode titrasi kembali di mana asam dititrasi pertama kali dengan basa standar sehingga terjadi hidrolisis, kemudian kelebihan basa dititrasi dengan larutan asam standar.

2. Titrasi Langsung Garam Hidroksibenzoat dalam Sistem Dua Fase

Metode titrasi dua fase dapat diaplikasikan pada garam-garam yang larut dalam air, tetapi asamnya tidak larut air dan larut dalam pelarut yang tidak bercampur dengan air. Sebagai contoh adalah natrium salisilat, ammonium, dan strontium salisilat.

a. Penentuan Natrium Salisilat

Prosedur

Sebanyak 2 g sampel natrium salisilat yang sebelumnya telah dikeringkan terlebih dahulu pada 105°C selama 4 jam, ditimbang seksama dan dilarutkan dalam 25 mL air dalam corong pisah. Sebanyak 75 mL eter dan 10 tetes indikator bromfenol biru ditambahkan kemudian larutan dititrasi dengan 0,5 N asam klorida. Larutan dikocok kuat-kuat setiap setelah penambahan asam sampai timbul warna hijau apel pada lapisan air. Lapisan air dipisahkan ke dalam labu kecil dan lapisan eter dicuci 2 kali dengan 5 mL air. Cairan pencucian ditambahkan ke dalam bagian air tadi. Sebanyak 20 mL eter ditambahkan dan titrasi dilanjutkan dengan pengadukan yang kuat, hingga lapisan air berwarna hijau apel yang permanen. Bagian pertama dari eter dibuang karena efisiensi ekstraksi pelarut berbanding lurus dengan perbedaan konsentrasi, zat terlarut yang terekstraksi, antarlarutan dan pelarut ekstraksi. Dalam kasus ini, sebagaimana pendekatan titik ekuivalen, konsentrasi asam salisilat dalam eter sedemikian rupa sehingga meskipun rasio distribusi asam salisilat dalam eter terhadap air sangat besar, asam mungkin cukup tetap dalam lapisan air untuk mempengaruhi titik akhir titrasi.

Perhitungan :

$$\% \text{ garam} = \frac{\text{ml.} \times \text{N (HCl)} \times \text{B.E} \times 100}{\text{Berat sampel (mg.)}}$$

Bentuk sediaan larutan dari senyawa ini seperti eliksir natrium salisilat diuji dengan cara mengambil sejumlah volume larutan yang mengandung 3 sampai 4

meq asam salisilat, dan dititrasi seperti cara di atas dengan larutan 0,1N asam hidroklorida. Tablet digerus dan aliquot dari serbuk diambil dan diperlakukan seperti penentuan garam. Metode ini lebih cepat dari metode dimana asam dibebaskan dari garam dengan penambahan asam kuat, diekstraksi dengan pelarut *immiscible*, dan dititrasi setelah dipisahkan dari pelarut.

3. Penentuan Ester Asam Hidroksibenzoat Dengan Hidrolisis dan Titrasi Kembali

Ester ini terbentuk dari gugus hidroksil yang teresterkan, seperti asam asetilsalisilat, dapat dilarutkan dalam larutan natrium hidroksida encer dan dihidrolisis sempurna dengan pendidihan atau pemanasan selama beberapa menit di atas *water bath* dengan suatu basa berlebih.

a. Penentuan Asam Asetilsalisilat

Prosedur

Sekitar 1,5 g asam asetilsalisilat ditimbang seksama dan sebelumnya telah dikeringkan melalui asam sulfat selama 5 jam. Pengeringan pada 100°C dapat menyebabkan dekomposisi akibat hidrolisis ester. Tepat 50 mL 0,5 N natrium hidroksida ditambahkan lalu campuran dididihkan selama 10 menit. Natrium hidroksida 0,5 N cukup untuk menetralkan asam salisilat dan asam asetat yang terbentuk dari hidrolisis. Kelebihan natrium hidroksida dititrasi dengan 0,5 N asam sulfat terhadap titik akhir fenolftalein. Dilakukan titrasi blanko menggunakan sejumlah volume yang sama dari basa standar pada kondisi yang sama, menggunakan 3 tetes indikator fenolftalein.

Perhitungan:

$$\% \text{ ester} = \frac{(a - b) \text{ ml.} \times N (\text{asam}) \times B.E \times 100}{\text{Berat sampel (mg.)}}$$

di mana a adalah milliliter asam yang dibutuhkan pada titrasi blanko, b adalah militer asam yang digunakan pada titrasi kembali, B.E adalah berat ekivalen dari ester. Berat ekivalen dari ester adalah berat molekul dari ester dibagi 2, karena basa yang ada menetralsisir kedua asam bebas dari ester dan asam yang dilepaskan dari hidrolisis. Untuk ester karboksil, berat ekivalen setara dengan berat molekulnya.

Ester volatile, seperti etil atau metil salisilat, dihidrolisis dengan cara direfluks dalam 0,5N natrium hidroksida alkoholik selama 1 jam. Kelebihan basa kemudian dititrasi kembali dengan 0,5N asam sulfat. Dilakukan titrasi blanko dengan menggunakan natrium hidroksida alkoholik volume sama dengan penentuan sampel.

Ester asam p-hidroksibenzoat yang dikenal dengan paraben atau parasept membutuhkan pH yang lebih tinggi dan waktu hidrolisis yang lebih lama dibanding ester asam salisilat. Penentuan paraben dapat dilakukan dengan menggunakan larutan 1N natrium hidroksida untuk hidrolisis, dan hidrolisis dilakukan selama 1 jam dengan mendidihkan larutan. Titrasi kembali dilakukan menggunakan 1 N asam sulfat, dengan biru bromtimol sebagai indikator. Penggunaan larutan standar pada konsentrasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa garam dari asam lemah memiliki sedikit pengaruh pada pH larutan pada titik ekivalen.

Fenil salisilat, pada hidrolisis akan menghasilkan asam salisilat dan fenol. Fenol bersifat asam lemah dan akan bereaksi dengan sebagian dari basa yang digunakan dalam hidrolisis. Oleh sebab itu, penentuan fenil salisilat dengan cara hidrolisis kuantitatif tidak memuaskan. Senyawa ini dapat dihidrolisis dengan basa dalam jumlah yang berlebih, diikuti dengan ekstraksi pengasaman (*acidification extraction*) dengan penguapan eter, dan dititrasi langsung sebagai asam salisilat atau dapat ditentukan dengan metode Brominasi.

Untuk asam asetilsalisilat dalam bentuk sediaan, misalnya tablet, di mana hidrolisis parsial diperlukan, maka digunakan metode metode titrasi berulang. Pada metode ini, sampel dianalisis dengan cara yang sama pada penentuan asam salisilat, termasuk dititrasi dengan 0,1N natrium hidroksida menggunakan indikator fenolftalein. Dalam hal ini, sebanyak 300 mg sampel yang digunakan adalah alikuot dari serbuk 20 tablet asam asetilsalisilat.

4. Metode Bromometri


Metode bromometri adalah metode yang umum untuk seluruh senyawa fenolik dan dapat pula diterapkan untuk senyawa asam hidroksibenzoat. Ester dari asam hidroksibenzoat harus dihidrolisis terlebih dahulu sebelum dibrominasi.


a. Penentuan Asam Salisilat

Sampel, dapat berupa asam bebas, garam dari asam, atau larutan dari ester yang tersabunkan, dilarutkan dalam air, diencerkan hingga volume yang dikehendaki, dan suatu alikuot, mengandung 30 sampai 40 mg asam salisilat, dimasukkan ke dalam labu iodine 500 mL. Tepat sejumlah 30 mL larutan standar 0,1N

bromide-bromat dan 5 mL asam klorida ditambahkan, kemudian labu ditutup segera untuk mencegah penguapan bromine. Bromine dilepaskan sebagai hasil reaksi antar bromat dalam bromide dalam larutan asam. Labu dikocok berulang-ulang selama 30 menit, kemudian didiamkan selama 15 menit. Sebanyak 5mL larutan 30% kalium iodida dimasukkan ke dalam labu secara hati-hati untuk mencegah penguapan bromine, kemudian ditutup dan leher labu dicuci dengan air. Labu dikocok agar bromine dapat bereaksi sempurna dengan kaliumiodida dan membebaskan sejumlah iodine yang sebanding dengan kelebihan bromine. Tutup labu dilepas dan dicuci dengan air. Sebanyak 5mL kloroform ditambahkan untuk melarutkan senyawa tribromofenol yang mengendap, dan iodine bebas dititrasi dengan larutan 0,1N natrium tiosulfat hingga berwarna kuning pucat. Sebanyak 5mL larutan indikator kanji 1% ditambahkan, titrasi dilanjutkan hingga larutan berwarna biru tua. Larutan harus dikocok baik-baik untuk menarik iodine dari lapisan kloroform. Dilakukan titrasi blanko. Pada titrasi ini, sebanyak 6 atom bromin dibutuhkan untuk 1 molekul asam, sehingga berat ekuivalen dari sampel adalah 1/6 dari berat molekulnya. Hal ini berarti bahwa metode ini sangat sensitif dan dapat digunakan bahkan untuk bahan dalam jumlah kecil.

$$\% = \frac{(a - b) \text{ ml.} \times N (\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) \times \text{B.E} \times 100}{\text{Berat sampel (mg.)} \times \text{alikuot}}$$





Gambar 4.3: Reaksi antara asam salisilat dengan brom menghasilkan endapan putih tribromofenol

Metode ini merupakan metode pilihan untuk fenil salisilat dan paraben. Dalam hal fenil salisilat, kedua produk hidrolisis akan dibrominasi, dan berat ekuivalen dari sampel adalah 1/12 dari berat molekulnya. Dalam sediaan, paraben selalu terdapat dalam jumlah kecil sehingga metode ini cukup sensitif untuk digunakan.

5. Metode Iodometri

Iodin tidak cukup banyak bereaksi dengan asam hidroksibenzoat dalam suasana asam, tetapi dalam larutan alkali, iodine bereaksi dengan salisilat membentuk senyawa yang sangat tidak larut, tetraiodofenilkuinon yang berwarna merah. Endapan ini *bulky*, namun mudah ditangani. Dari 1 atau 2 mg dari asam salisilat menghasilkan endapan yang dapat disaring dan dicuci dengan mudah. Endapan ini tidak larut dalam larutan asam atau basa encer, juga dalam pelarut organik yang umum seperti eter, kloroform, aseton, alkohol, dan sebagainya. Karena iodine tidak stabil dalam larutan alkali (iodine cepat teroksidasi menjadi iodat dalam larutan dengan pH diatas 9), maka pH

larutan harus dikontrol. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari natrium karbonat ke dalam reaksi.

a. Penentuan Asam Salisilat

Prosedur

Sampel yang mengandung 0,1 sampai 0,2 g asam salisilat yang sebelumnya telah dikeringkan pada suhu 100°C , ditimbang seksama dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Sampel dilarutkan dalam 100 mL larutan yang mengandung 1 g natrium karbonat untuk setiap 0,1 g asam salisilat. Larutan di simpan di atas *water bath* dan dibiarkan selama 15 menit. Sekitar 50 sampai 60 mL larutan standar 0,1N iodine ditambahkan dan didiamkan di atas *water bath* selama 1 jam. Selama proses ini, iodine akan dilepaskan yang ditandai dengan warna coklat dari larutan yang harus dipertahankan. Larutan dibiarkan dingin, dan kelebihan iodine dihilangkan dengan penambahan 0,1N natrium tiosulfat hingga warna coklat dari larutan menjadi hilang. Kelebihan tiosulfat yang besar untuk menghindari dekomposisinya yang dapat mendepositkan sulfur bebas, sehingga dapat menambah bobot dari endapan. Bagian supernatan disaring melalui *Gooch crucible*, yang sebelumnya dikeringkan pada 100°C , sementara *bulk* presipitat dipertahankan dalam labu. Endapan ini dicuci beberapa kali dengan cara didekantasi dengan air panas dan sebanyak 200 mL ditransfer ke filter secara kuantitatif. Kesempurnaan pencucian dapat ditunjukkan dengan menguji filtrat dengan larutan perak nitrat yang diasamkan dengan beberapa milliliter asam nitrat. Pencucian dinyatakan sempurna bila tidak ada lagi kekeruhan (*opalescence*) dari filtrat. Krus dan residu dikeringkan pada 100°C selama 1

jam dan ditimbang. Setiap gram tetraiodofenilenkuinon ekuivalen dengan 0,4016 g asam salisilat.

Senyawa salisilat yang lain dapat ditentukan dengan prosedur yang sama. Dalam hal asam asetilsalisilat dan ester tipe II, maka hidrolisis ester harus dilakukan dengan membiarkan larutan di atas *water bath* selama 15 menit sebelum penambahan larutan iodine. Ester yang lain dapat dihidrolisis dengan pemanasan dengan natrium hidroksida berlebih selama 1 jam sebelum larutan diasamkan, dan asam salisilat bebas diekstraksi dengan kloroform. Kloroform diuapkan dengan hati-hati sebelum natrium karbonat ditambahkan, dan larutan kemudian dipanaskan lagi untuk menghilangkan kloroform yang tersisa sebelum penambahan larutan iodine.

6. Metode Fotometri

a. Spektrofotometri UV

Asam hidroksibenzoat dan turunannya dapat ditentukan secara kuantitatif pada daerah ultraviolet karena asam hidroksibenziat dan turunannya mempunyai gugus kromofor yang mampu menyerap sinar UV. Panjang gelombang maksimal asam hidroksibenzoat dan turunannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Panjang Gelombang maksimum asam hidroksibenzoat dan turunannya.

No	Senyawa	Larutan	λ maks	Keterangan
1	Asetosal	Kloroform	278 nm	Larutan dalam air antara 220-350 nm tidak mempunyai serapan

2	Asam gentisat	Air pH 5-8	320 nm	
3	Asam p-aminosalisilat	Air pH 7	265 nm	
4	p-hidroksibenzoat	Alkohol	255 nm	Semua ester memiliki λ maks yang sama
5	Asam p-hidroksibenzoat	Air, pH dibawah 7		
6	p-hidroksibenzoat	Alkohol + NaOH	301 nm	Setiap 100 mL alkohol + 2 tetes 0,2 N NaOH
7	Asam salisilat	Air pH 5-8 Kloroform Air pH 1-6	296 nm 308 nm 298 nm	

1) Penentuan Asam Asetilsalisilat

Sebanyak 100 mg asetosal ditimbang seksama lalu dilarutkan dalam 0,1N asam sulfat. Larutan dimasukkan dalam labu ukur 100 mL dan ditambahkan 0,1N asam sulfat sampai batas tanda. Sebanyak 1,0 mL larutan di atas diambil dan dimasukkan dalam labu ukur 100 mL, dan ditambahkan 0,1 N asam sulfat sampai batas tanda. Larutan ini kemudian dibaca absorbansinya pada 229 nm terhadap blanko yang berisi 0,1N asam sulfat sehingga diperoleh absorbansi larutan baku (A_b). Untuk sampel dilakukan cara yang sama sehingga diperoleh absorbansi sampel (A_s). Untuk perhitungan kadar sampel, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{kadar asetosal} = \frac{A_s}{A_b} \times \text{konsentrasi baku} \times \text{faktor pengenceran}$$

Campuran asam salisilat dan asetosal sering terdapat dalam sediaan karena peruraian asetosal, masing-masing dapat ditetapkan dengan menggunakan serapan daerah ultraviolet.

Prosedur:

Sampel yang mengandung lebih kurang 360 mg asetosal ditimbang seksama, dilarutkan dalam sejumlah kecil kloroform, jika perlu disaring, dan diencerkan dengan kloroform hingga 100 mL. Larutan dibaca asorbansinya pada panjang gelombang 308 nm (A_2). Larutan diencerkan 100 kali dengan kloroform dan dibaca absorbansinya pada 278 nm (misalnya A_1). Sebagai blanko digunakan kloroform. Pembacaan dilakukan dengan tebal sel 1 cm. jumlah asetosal dan asam salisilat dapat dihitung dengan persamaan:

$$\text{Asetosal (mg)} = 1347 A_1 - 2,3 A_2$$

$$\text{Asam salisilat (mg)} = 3,58 A_2 - 3,49 A_1$$

b. Spektrofotometri Sinar Tampak


Salah satu metode tertua untuk mengidentifikasi asam salisilat adalah berdasarkan reaksinya dengan garam feri dan menghasilkan warna violet. Intensitas dari warna larutan yang dihasilkan ini digunakan sebagai dasar metode kuantitatif selama beberapa tahun ini. Pankratz dan Bandelin telah melakukan studi terbaru tentang kondisi optimum bagi reaksi ini, dan akurasi dan reproduibilitasnya pada penentuan berbagai garam dan ester asam salisilat yang umum digunakan dalam pengobatan. Spektra absorpsi maksimum dari kompleks ferisalisilat ditunjukkan pada 525 nm, dan memenuhi hukum Beer. Range pH yang

terbaik adalah antara 4 dan 6. Reprodusibilitas 1% dapat juga diperoleh pada penentuan ester.

1) Penentuan Asam Salisilat dengan Feri Nitrat Secara Kolorimetri

Penyiapan Kurva Standar

Sampel asam salisilat 0, 2 g sebelumnya dikeringkan pada 100°C selama 1 jam, ditimbang seksama dan dilarutkan dalam 15 mL alkohol dan diencerkan hingga tepat 1,0 liter. Diambil alikuot masing-masing 5,10,15,20, dan 25 mL, dimasukkan dalam labu ukur 100 mL, ditambahkan feri nitrat 1% dalam larutan asam nitrat 1% sebanyak 5 mL sebagai pembentuk warna, dan larutan diencerkan dengan air hingga volume 100,0mL. Absorbansi larutan dibaca dengan Spektrofotometer Beckman pada 525 nm dengan air sebagai blanko dan dengan tebal sel 1 cm. hasil yang diperoleh kemudian diplot sebagai absorbans persen konsentrasi. Dari pengenceran alikuot di atas diperoleh konsentrasi 1,2,3,4, dan 5 %.



Gambar 4.4. Reaksi antara asam salisilat dengan Fe(III) nitrat

2). *Penentuan asam salisilat dalam sediaan farmasi menggunakan tembaga (II) asetat sebagai pembentuk warna (Saha, and Baksi, 1985)*

Sebuah metode spektrofotometri sederhana dan cepat untuk penentuan asam salisilat sendiri atau dalam sediaan farmasi telah dikembangkan berdasarkan kompleksasi asam salisilat dengan tembaga (II) asetat untuk membentuk kompleks stabil hijau kekuningan pada pH 5,5-6. Spesies hijau kekuningan memiliki absorpsi maksimum pada 730 nm dengan absorptivitas molar $0,02 \times 10^3 \text{ l mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$. Hukum Beer dipatuhi selama rentang 0,2-4,0 mg mL⁻¹ asam salisilat dan kompleks stabil selama 30 jam. Ketepatan metode ini 1,42%.

C. Metode Lain

1. Titrasi *Non Aqueous*

Titrisasi bebas air relatif sederhana dan dapat dilakukan secara tepat dan teliti. Asam hidroksibenzoat dan turunannya dapat ditetapkan secara TBA. Dalam pelarut basa, gugus hidroksil dari fenol dapat dititrasi dengan asam sebaik gugus karboksil. Asam salisilat setelah dilarutkan dalam dimetil formamida dapat dititrasi dengan natrium metoksida dengan indikator azo violet atau secara potensiometri. Pada titrasi potensiometri, asam salisilat menunjukkan dua titik akhir karena baik gugus hidroksil maupun karboksil keduanya tertitrasi. Asam salisilat juga dapat dititrasi sebagai asam karboksilat dalam benzene-metanol dan dalam asetonitril dengan titran natrium metilat dalam benzene-metanol dengan indikator biru timol. Amonium, litium, dan natrium salisilat dapat dititrasi dalam asam asetat glasial dengan asam perklorat. Titik

akhir dapat ditetapkan dengan indikator kristal violet atau secara potensiometri.

Metode Polarografi

Metode polarografi telah dilaporkan untuk penentuan salisilat, asam asetilsalisilat, dan asam gallat dengan tetrametilamonium iodida sebagai pendukung elektrolit. Asam p-aminosalisilat pada tahap awal didiazotasi, kalium karbonat ditambahkan berlebih, dan larutan ditetapkan secara polarografi.

2. Metode Kromatografi

Asam hidroksibenzoat dan turunannya dapat menyerap sinar UV, karenanya dapat dideteksi dengan detektor UV-Vis. Adanya asam benzoat secara bersama-sama dengan asam sorbat, propil paraben dan metil paraben (sebagai pengawet) dapat ditetapkan kadarnya secara kromatografi cair kinerja tinggi dengan menggunakan kolom C_{18} dengan detektor spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 254 nm. Fase gerak yang digunakan adalah metanol : dapar asetat pH 4,4 (35 : 65) selama 9 menit dan selanjutnya fase gerak diubah dengan metanol - dapar asetat pH 4,4 (50 : 50). Dapar asetat dibuat dengan melarutkan 3,8 g ammonium asetat dalam 1 liter air lalu pH-nya diatur menjadi 4,4 dengan asam asetat. Volume sampel yang diinjeksikan sebanyak 20 μ L.

V

ANTIINFLAMASI NON STEROID

A. Pendahuluan

Obat antiinflamasi non steroid (NSAID) banyak digunakan untuk pengobatan rasa sakit minor dan untuk pengobatan edema dan kerusakan jaringan akibat peradangan penyakit sendi (arthritis). Sejumlah obat ini memiliki aktivitas anti piretik selain memiliki aksi analgesik dan anti inflamasi, sehingga memiliki utilitas dalam pengobatan demam. Sebagian besar obat ini bekerja dengan menghambat biosintesis prostaglandin. Istilah "non steroid" digunakan untuk membedakan jenis obat-obatan ini dengan steroid, yang juga memiliki khasiat serupa. NSAID bukan tergolong obat-obatan jenis narkotika.

Mekanisme kerja NSAID didasarkan atas penghambatan isoenzim COX-1 (*cyclooxygenase-1*) dan COX-2 (*cyclooxygenase-2*). Enzim *cyclooxygenase* ini berperan dalam memacu pembentukan prostaglandin dan tromboksan dari *arachidonic acid*. Prostaglandin merupakan molekul pembawa pesan pada proses inflamasi (radang).

Jenis Obat Anti-inflamasi Nonsteroid Obat anti-inflamasi nonsteroid (OAINS) merupakan kelompok obat yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia

untuk mendapatkan efek analgetika, antipiretika, dan anti-inflamasi. Pemilihan OAINS merupakan pengobatan dasar untuk mengatasi peradangan-peradangan di dalam dan sekitar sendi seperti lumbago, artralgia, osteoarthritis, artritis reumatoid, dan gout artritis. Disamping itu, OAINS juga banyak digunakan pada penyakit-penyakit non-rematik, seperti kolik empedu dan saluran kemih, trombosis serebri, infark miokardium, dan dismenorea.


B. Klasifikasi AINS

Obat golongan Antiinflamasi Non Steroid digolongkan berdasarkan struktur kimianya sesuai dengan selektivitasnya dalam menghambat enzim sikooksigenase (COX). Secara kimiawi obat antiinflamasi nonsteroid dibagi menjadi (Goodman & Gilman's, 2001):

1. Inhibitor siklooksigenase non selektif

a. Salisilat : Aspirin, Diflunisal

Salisilat adalah turunan dari asam 2-hidroksi benzoat (asam salisilat). Salisilat ditemukan pada Tahun 1838 setelah ekstraksi asam salisilat dari kulit pohon willow. Asam salisilat digunakan dalam pengobatan sebagai garam natrium tetapi pada akhir 1800 digantikan dengan turunan produk asetilasi yaitu asetilsalisilat (ASA) atau aspirin. Utilitas terapi ditingkatkan oleh esterifikasi dari kelompok hidroksil fenolik seperti dalam aspirin, dan dengan substitusi dari kelompok hidrofobik/lipofilik pada C-5 seperti pada diflunisal.




Gambar 5.1. Struktur beberapa turunan asam salisilat

Salisilat merupakan asam organik kuat dan akan membentuk garam dengan suatu bahan alkali. Gugus karboksil secara substansial bersifat lebih asam dan terionisasi dalam pH fisiologis dibandingkan dengan gugus hidroksi fenolik.


- b. Derivat asam propionate: Ibuprofen, Naproksen, Ketoprofen, flurbiprofen, oksaprozin. Beberapa NSAID yang paling berguna secara struktural berasal dari asam arylasetat. Senyawa ini sering disebut sebagai "profen" berdasarkan akhiran dari anggota prototipe, ibu profen. Seperti salisilat, senyawa ini adalah asam organik kuat

(pKa =3-5) dan dengan demikian membentuk garam larut dalam air dengan reagen basa. Asam para arylpropionat ditandai dengan struktur umum Ar-CH(CH₃)-COOH yang sesuai dengan struktur umum yang diperlukan. Senyawa ini sebagian besar terionisasi pada pH fisiologis dan lebih lipofilik dari pada ASA atau asam salisilat.





Gambar 5.2. Struktur Asam propionate dan turunannya

Substituen α -CH₃ dalam profen meningkatkan aktivitas penghambatan *siklooksigenase* dan mengurangi toksisitas dari *profen*. Alfa (α) karbon dalam senyawa ini adalah kiral dan enantiomer S-(+) - dari *profen* adalah inhibitor *siklooksigenase* yang lebih kuat. Kebanyakan produk *profen*, kecuali naproxen (Naprosyn™), dipasarkan sebagai rasemat.



Gambar 5.3. Isomerisasi dari Profen rasemat (DeRuiter, 2002)

c. Derivat Aril asetat : Diklofenak




Gambar 5.4. Struktur derivat asam aril asetat

Senyawa ini juga merupakan turunan dari asam asetat, tetapi dalam hal ini substituen pada posisi 2- adalah heterosiklik atau karbon siklik


terkait. Ini tidak tidak secara signifikan mempengaruhi sifat asam dari senyawa ini. NSAID Asam heteroary lasetat yang dipasarkan di negara ini dapat di sub klasifikasi sebagai *indena/indoles*, yaitu *pyrol* dan *oxazoles* seperti berikut:

a. Asam asetat inden dan indol.




Gambar 5.5. Struktur turunan asam asetat inden dan indol

b. Asam asetat pirol:



Gambar 5.6. Struktur turunan asam asetat pirol

c. *Asam oksaloasetat*





Oxaprozin (Daypro)

Gambar 5.7. Struktur Oxaprozin

d. Derivat asam antranilat

Senyawa ini dianggap turunan N-aril tersubstitusi dari asam antranilat yang merupakan bio isoster dari asam salisilat. Senyawa ini mempertahankan sifat asam yang merupakan ciri khas kelas ini, namun tercatat bahwa sementara asam mefenamat dan asam meclofenamat adalah turunan asam antranilat, diklofenak berasal dari asam aril asetat. Fenamates yang paling aktif memiliki alkil kecil atau substituen halogen pada posisi 2',3'dan /atau posisi 6'dari bagian N-aril (meclofenamat berefek 25kali lebih kuat darimefenamat).






Gambar 5.8. Struktur senyawa turunan asam antranilat.


e. Derivat Oksikam

Oxicam (piroksikam dan meloxicam) dicirikan oleh 4-hydroxy benzothiazine heterosiklik. Keasaman dari oxicam tersebut diberikan oleh 4-OH dengan anion enolat yang distabilkan oleh ikatan hidrogen intramolekular ke gugus NH amida. Juga, kehadiran substituen karboksamida pada posisi 3-dari cincin benzothiazine memberikan kontribusi terhadap keasaman dengan menstabilkan muatan negatif yang terbentuk selama ionisasi (resonansi stabilisasi). Meskipun senyawa ini asam ($pK_a = 6,3$), mereka agak kurang asam dibandingkan NSAID asam karboksilat. Namun oxicam terutama terionisasi pada pH fisiologis dan keasaman diperlukan untuk aktivitas penghambatan COX.




Gambar 5.9: Struktur senyawa turunan oksikam

f. Derivat Fenilpirazolon : fenilbutazon, oksifenbutazon



Gambar 5.10. Struktur inti senyawa derivat fenilpirazolon


Kelompok ini ditandai dengan struktur 1-aryl-3,5-pyrazolidinedione. Kehadiran proton yang terletak pada dua elektron dari gugus karbonil membuat senyawa ini bersifat asam. PKa untuk fenilbutazon adalah 4,5. Oxyphenbutazone adalah metabolit terhidroksilasi dari fenilbutazon.



Gambar 5.11. Struktur turunan fenilpirazolon

2. Inhibitor siklooksigenase-2 selektif : Celecoxib, rofecoxib, dan valdecoxib

Semua COX-2 inhibitor adalah anggota diary 1-5-heterosiklik. Celecoxib memiliki cincin pusat *pirazol* dan dua substituen *fenil* berdekatan, satu mengandung sebuah gugus metil dan yang lainnya bagian kutub sulfonamida; sulfonamida yang terikat pada daerah hidrofilik yang berbeda pada COX-2 tetapi tidak COX-1. Rofecoxib memiliki cincin pusat *furanone* dan dua substituen *fenil* berdekatan, satu mengandung sebuah gugus metil sulfon, tidak seperti celecoxib. Valdecoxib memiliki cincin pusat *oxazole* dan satu cincin *fenil* dengan kutub sulfonamida seperti celecoxib.




Gambar 5.12. Beberapa senyawa inhibitor siklooksigenase-2 selektif

a. Turunan Anilid

Anilid adalah acetamid sederhana dari anilin yang mungkin atau tidak mengandung gugus 4-hidroksi atau 4-alkoksi. Acetanilide adalah cincin terhidroksilasi setelah pemberian untuk menghasilkan acetaminophen, analgesik/antipiretik yang aktif sementara phenacetin (jarang digunakan) mengalami dealkilasi oksidatif untuk menghasilkan asetaminofen. Perhatikan bahwa anilides tidak memiliki gugus fungsi asam karboksilat dan

karena itu mereka digolongkan sebagai obat netral dan memiliki sedikit (jika ada) aktivitas penghambatan terhadap siklooksigenase.



Gambar 5.13. Struktur senyawa derivat anilid

C. Metode Analisis

1. Analisis Diflunisal

Diflunisal [5- (2',4'- difluorophenyl) salicylic acid] adalah senyawa sintesis dari analog asam salisilat dengan aktivitas sebagai anti inflamasi nonsteroid. Berbagai metode telah dijelaskan untuk penentuan diflunisal, seperti spektrofotometri derivatif, spektroskopi NMR, kromatografi, immunoassay, dan metode elektrokimia (Sayir and Kir, 2004).

a. Metode Spektrofotometri derivatif

Telah dikembangkan metode spektrofotometri UV derivatif untuk analisis diflunisal, yang digunakan sebagai obat anti-inflamasinon-steroid. Panjang gelombang untuk analisis diflunisal dengan metode spektrofotometri UV derivatif orde pertama dan kedua diperoleh masing-masing 235,6nm dan 228,8nm. Rentang linearitas ditemukan 1,0-25,0 μ g mL⁻¹ untuk metode spektrofotometri UV turunan pertama dan 1,0-20,0 μ g mL⁻¹ untuk turunan orde dua. Metode Spektrofotometri UV ini juga dapat

diterapkan pada sampel sintesis dan tablet yang mengandung diflunisal.

- 1) Pembuatan larutan standar
Larutan stok diflunisal dengan konsentrasi $1000 \mu\text{g mL}^{-1}$ dibuat dalam pelarut metanol. Larutan kerja standar diperoleh dengan mengencerkan larutan stok hingga konsentrasi berkisar $0,05 \text{ mg mL}^{-1}$ sampai 30 mg mL^{-1} untuk diflunisal. Larutan kerja dibuat setiap hari.
- 2) Penyiapan sampel dari tablet diflunisal
Sepuluh tablet diflunisal ditimbang seksama dan ditentukan berat rata-ratanya. Tablet diserbukkan dan ditimbang serbuk tablet setara dengan 500 mg diflunisal dan ditransfer ke dalam labu ukur 100 mL, kemudian dicampur dengan 50 mL metanol. Campuran dikocok mekanis selama 15 menit dan diencerkan sampai volume akhir dengan metanol. Kemudian, sejumlah tertentu (μL) dari larutan sampel yang jernih digunakan untuk analisis.

2. Analisis Diklofenak

a. Dengan metode spektrofotometri

Kashkeli, *et al* (2009) telah mengembangkan suatu prosedur analisis yang sederhana, sensitif, cepat, dan ekonomis untuk menentukan natrium diklofenak secara spektrofotometri dengan menggunakan media air tanpa menggunakan reagen kimia. Parameter seperti waktu, suhu, kondisi asam dan basa, serta gangguan oleh obat analgesik lainnya diteliti dengan larutan konsentrasi $5 \mu\text{g mL}^{-1}$ pada panjang gelombang 276 nm. Pada kondisi parameter yang optimal, dilakukan hal yang sama pada larutan 0,1-

30mg.mL⁻¹ dengan koefisien regresi 0,9998 dan diperoleh batas deteksi lebih rendah dari 0,01µgmL⁻¹. Metode ini diterapkan untuk diklofenak dalam sampel sediaan tablet, serum, dan urin.

1) Prosedur penetapan diklofenak dalam tablet
Empat merek tablet yang mengandung natrium diklofenak (ND) dari produsen yang berbeda yang dibeli dari pasar lokal, dianalisis dengan menggunakan metode ini. Sepuluh tablet dari setiap merek dihaluskan dan dicampur. Jumlah yang sama dengan berat rata-rata satu tablet dikumpulkan secara acak, ditransfer ke labu ukur 100 mL, dilarutkan dan dicukupkan volumenya dengan air suling. Larutan diencerkan dari setiap sampel dan dianalisis dengan Spektrometer UV-Vis. Konsentrasi natrium diklofenak per tablet dihitung dengan bantuan persamaan untuk kurva kalibrasi linier dari ND dan dengan memperhitungkan faktor pengenceran yang digunakan.

2) Prosedur penetapan diklofenak dalam serum dan urin

Sampel darah dan urin dikumpulkan sebelum asupan ND (kosong) pada hari ke-1 dan setelah pemakaian ND pada hari ke-2. Sukarelawan diminta untuk tidak menggunakan analgesik termasuk ND satu minggu sebelum pemeriksaan dan menggunakan diet yang sama pada hari ke-1 dan hari ke-2. Tablet ND diberikan hanya setelah pengambilan sampel urin blanko. Sampel darah dikumpulkan 2 jam setelah setelah pemberian sementara sampel urin dikumpulkan 12 jam setelah pemberian tablet 50 mg. Serum diperoleh

sebagai supernatan dari blanko dan sampel darah yang mengandung ND dipisahkan dengan metode sentrifugasi. Untuk membebaskan sampel urin dan serum dari cemaran yang tidak larut air, maka 1,0mL blanko dan sampel yang mengandung ND dilewatkan melalui kolom DSC-18 (yang digunakan dalam ekstraksi fase padat), yang telah dicuci dengan 2 mL metanol. Sampel urin atau serum perolehan diencerkan sampai 10,0mL dengan air suling dan dianalisis untuk memperoleh kandungan natrium diklofenaknya menggunakan spektrometer UV-Visible dengan air suling sebagai blanko untuk merekam spektrum sampel serum dan urin blanko dan yang mengandung ND. Perbedaan antara absorbansi blanko dan sampel yang sebenarnya menunjukkan konsentrasi ND setelah memasukkan nilainya dalam persamaan linear baku ND dan mengalikan dengan faktor pengenceran. Perlakuan ini dilakukan karena adanya kesulitan dalam mengukur absorbansi dari sampel serum atau sampel urin yang sebenarnya sebagai blanko terhadap serum atau urin yang mengandung ND.

Larutan standar ND digunakan untuk mengkonfirmasi panjang gelombang maksimal ND.

b. Metode Kolorimetrik

El Sherif, et al (2006) telah mengembangkan sebuah metode kolorimetri untuk penentuan kuantitatif natrium diklofenak dan asam mefenamat dalam bentuk murni dan dalam

sediaan farmasi. Hal ini didasarkan pada reaksi antara amina aromatik sekunder dengan p-dimetil-aminocinnamaldehid dalam media metanol yang diasamkan untuk membentuk produk merah mutlak sangat stabil (λ_{\max} pada 538 nm untuk natrium diklofenak) atau biru (λ_{\max} pada 665 nm untuk asam mefenamat). Hukum Beer dipatuhi pada rentang 10-80 mg mL⁻¹ untuk natrium diklofenak dan 1-8 mg mL⁻¹ untuk asam mefenamat. Reaktan dipanaskan pada penangas air mendidih selama 6 dan 5 menit untuk masing-masing obat. Persentase rata-rata perolehan kembali ditemukan masing-masing 100,73±0,87% & 100,73±0,44%. Metode ini berhasil diterapkan untuk penentuan beberapa formulasi sediaan farmasi.

3. Analisis Asam Mefenamat

a. Metode Titrimetri

Asam mefenamat dapat dititrasi menurut Farmakope Inggris 1980 sebagai berikut: larutan zat dalam 100 mL etanol dititrasi dengan 0,1 N NaOH (1/10 mmol) dengan menggunakan indikator merah fenol.

b. Metode Spektrofotometri

Tabrizi (2006) telah mempelajari sebuah metode spektro fluorimetrik sederhana, sensitif, dan cepat dikembangkan untuk penentuan asam mefenamat dalam sediaan farmasi dan urin. Prosedur ini didasarkan pada oksidasi asam mefenamat dengan serum (IV) untuk menghasilkan serum (III), dan fluoresensi yang dipantau pada panjang gelombang 354 nm

setelah eksitasi pada panjang gelombang 255 nm. Variabel yang mempengaruhi oksidasi obat diteliti dan dioptimalkan. Pada kondisi eksperimental yang digunakan, grafik kalibrasi yang linier disiapkan dalam rentang 0,03-1,5mg L⁻¹. Batas deteksi adalah 0,009mgL⁻¹ dan standar deviasirelatif untuk penentuan 5 replikasi asam mefenamat pada tingkat konsentrasi 1,0mg L⁻¹ adalah 1,72%. Perolehan kembali diperoleh pada kisaran 102-107% dan 102-109%.

Prosedur:

Pembuatan Kurva kalibrasi

Dibuat seri konsentrasi larutan standar asam mefenamat dalam labu ukur 10 mL, sehingga mengandung obat dalam kisaran konsentrasi 0,03-1,5mgL⁻¹. Untuk setiap botol ditambahkan 0,1mL Ce (IV) dan 1,0 mL larutan H₂SO₄, dicukupkan volumenya dengan air suling dan didiamkan selama 10 menit. Intensitas fluoresensi diukur pada panjang gelombang 354 nm dengan eksitasi panjang gelombang 255 nm terhadap blanko yang disiapkan dengan prosedur yang sama.

Asam Mefenamat Kapsul

Isi dari sepuluh kapsul asam mefenamat digerus halus. Suatu sampel serbuk ditimbang akurat yang mengandung 25,0 mg asam mefenamat dan dipindahkan ke labu ukur 100mL, dilarutkan dalam 2,0 mL NaOH dan volume dicukupkan dengan suling air. Larutan ini diencerkan secara kuantitatif untuk menghasilkan konsentrasi dalam kisaran larutan standar kejadian


kemudian dilanjutkan seperti yang dijelaskan pada prosedur untuk kurva kalibrasi.

Asam Mefenamat dalam Urin


Sampel urin yang diperoleh dari *volunteer* sehat berjenis kelamin laki-laki yang telah diberikan asam mefenamat kapsul 250 mg. Sampel urin dikumpulkan 4 jam setelah pemberian dan disimpan dalam *refrigerator* suhu 4°C. Aliquot dari sampel disentrifugasi dan sebanyak 0,5 mL dari supernatan digunakan untuk penentuan asam mefenamat. Sampel dipindahkan ke tabung *sentrifuge* dan pH disesuaikan dengan menambahkan 2-3 mL HCl. Kemudian, campuran diekstraksi dengan 2 x 6 mL dietil eter selama 15 menit. Lapisan organik dikumpulkan dan diuapkan hingga kering di atas *water bath*. Residu obat dilarutkan dengan 0,5 mL NaOH dan 1,0 mL air suling dan dipindahkan ke dalam labu ukur 10 mL. Asam mefenamat ditentukan seperti pada prosedur sebelumnya dengan menggunakan *blanko* sampel urin yang tidak mengandung obat.

c. Asam Mefenamat secara Kolorimetri dengan metode MBTH

Alarfaj (2009), mengembangkan metode analisis asam mefenamat dengan reagen 3-Methylbenzothiazolin-2-one hydrazine (MBTH). Asam mefenamat bereaksi dengan reagen MBTH dan dengan adanya larutan feri klorida dalam media metanol dan produk berwarna hijau diukur serapannya pada panjang gelombang 602 nm.



Gambar 5.13. Penyerapan spektrum produk asam mefenamat (3mg/ mL) / MBTH (0,003M) + FeCl₃ · 6H₂O (0,06M) dalam metanol.



Gambar 5.14. Reaksi asam mefenamat dengan reagen MBTH

Reaksi asam mefenamat dengan MBTH dengan kehadiran suatu oksidasi dan dihasilkan melalui reaksi kopling oksidatif. MBTH (I) kehilangan dua elektron dan satu proton ketika teroksidasi dengan oksida tembaga klorida hexahydrate, membentuk intermediet elektrofilik(II), yang merupakan species kopling aktif. Reagen diharapkan menyerang atom karbon dengan kerapatan elektron maksimum dalam asam mefenamat untuk membentuk produk (III) yang berwarna menurut skema berikut ini. Mekanisme reaksi asam mefenamat dengan MBTH Kondisi optimum untuk reaksi ini dipelajari dengan hati-hati. Serapan maksimum pada panjang gelombang 602 nm diperoleh segera setelah menggunakan 4 mL 0,15M $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ dan 2 mL 0,015 M MBTH pada suhu kamar dan produk tetap stabil hingga 35 menit.

Prosedur metode MBTH

Untuk bahan baku

Gunakan labu volume trik 10mL, masukkan aliquot yang berbeda dari larutan asam mefenamat setara dengan $1-6\mu\text{g mL}^{-1}$, tambahkan larutan 4mL FeCl_3 diikuti dengan 2mL reagen MBTH. Volume dicukupkan dengan metanol dan absorbansi diukur untuk setiap larutan pada panjang gelombang 602 nm terhadap reagen blanko. Kurva kalibrasi dibuat seperti dijelaskan di atas.

Untuk sediaan tablet

Timbang secara akurat sejumlah isi serbuk dari 10 tablet setara dengan 12,5 mg obat. Pindahkan ke dalam labu Erlenmeyer kecil dan tambahkan 5 mL metanol. Saring ke dalam labu volumetrik 25 mL,

cukupkan volumenya dengan metanol dan lanjutkan seperti yang dijelaskan pada metode pembuatan kurva kalibrasi. Tentukan kadar asam mefenamat menggunakan persamaan regresi kurva baku.

d. Penentuan campuran asam mefenamat dan asam flufenamat dengan metode kemiluminesens (*chemiluminescens*)

Ali, et al (2000) mengembangkan sebuah metode *chemiluminescent* baru dengan menggunakan injeksi alir untuk penentuan yang cepat dan sensitif asam mefenamat dan flufenamat. Metode ini didasarkan pada reaksi *chemiluminescence* (2,20-bipyridyl) trisruthenium (III). Ru (bipy) secara kimia dihasilkan dari pencampuran dua cairan yang berisi larutan dari tris (2,20-bipyridyl) ruthenium (II) dan asam serium (IV) sulfat. Metode ini dapat diterapkan pada sediaan farmasi dan cairan biologis.

4. Analisis Ibuprofen

Dengan metode HPLC

Lockwood (1982) telah meneliti tentang analisis ibu profen dan metabolitnya. Ibu profen [2- (4-isobutylphenyl) asam propionat] adalah obat anti-inflamasinon-steroidoral yang digunakan secara luas dalam pengobatan arthritis. Metabolit utama dalam tubuh manusia adalah 2- [4- (2-hidroksi-2-methylpropyl) fenil] -propionat (OH-ibuprofen) dan 2- [4- (2-carboxypropyl) propionat phenyllacid (COOH-ibuprofen). Berbagai teknik yang digunakan untuk mengukur ibu profen dan metabolitnya dalam sampel biologis adalah kromatografi kertas, kromatografi gas-cair (GLC) dengan derivatisasi, kombinasi GLC-

spektrometri massa dan kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC). Penulis ini melaporkan bahwa metode HPLC sangat membantu pengukuran ibu profen baku dan kadar metabolit dalam urin dan plasma sehingga dapat sangat membantu dalam studi metabolisme obat dan farmakokinetik.

5. Analisis Ketoprofen

Spektrofotometri

Kormosh, et al (2009) telah mengembangkan sebuah metode spektrofotometri yang sederhana, cepat, dan sensitif untuk penentuan ketoprofen dalam sediaan farmasi. Metode ini didasarkan pada reaksi ketoprofen dengan reagen analisis -Astra Phloxin FF- pada pH 8,0-10,8 dan diikuti oleh ekstraksi asosiasi ion yang terbentuk dalam toluena dengan deteksi spektrofotometri (ketoprofen memiliki maksimum serapan pada $\lambda=563\text{nm}$, $\epsilon=7,6 \times 10^4 \text{L} \times \text{mol}^{-1} \times \text{cm}^{-1}$). Plot kalibrasi linier dari ketoprofen 0,8-16,0 $\mu\text{g} \times \text{mL}^{-1}$, dan batas deteksi adalah 0,037 $\text{mg} \times \text{mL}^{-1}$.

Prosedur:

1) Prosedur umum

Sebanyak 3 sampai dengan 60 μg ketoprofen dimasukkan ke dalam tabung reaksi 10mL, dan ditambahkan 0,5mL larutan dapar pH9 universal, 1,5 mL $1 \times 10^{-3} \text{molL}^{-1}$ Astra Phloxin FF dan 3,0 mL 2molL^{-1} larutan Na_2SO_4 . Larutan dicampur dengan baik dan diencerkan sampai 5,0 mL dengan air. Ditambahkan (5,0mL) toluena ke labu dan dikocok selama 1 menit. Absorbansi dari lapisan toluene diukur pada $\lambda 563 \text{ nm}$ terhadap blanko.




Figure 2. The absorption spectra of: Astra Phloxin FF $5 \times 10^{-6} \text{ mol} \times \text{L}^{-1}$ aqueous solution in different forms and ion associate of ketoprofen ($2 \times 10^{-3} \text{ mol} \times \text{L}^{-1}$, $3.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \times \text{L}^{-1}$ Astra Phloxin FF, pH 9) with Astra Phloxin FF in toluene.




Figure 7. Calibration curve for the ketoprofen determination. pH 9, $3 \times 10^{-4} \text{ mol} \times \text{L}^{-1}$ of Astra Phloxin FF, $1.2 \text{ mol} \times \text{L}^{-1} \text{ Na}_2\text{SO}_4$; extractant - toluene, $\lambda = 563 \text{ nm}$, $l = 0.3 \text{ cm}$.

Gambar 5.16. Spektra absorpsi dari senyawa ketoprofen dalam toluen

6. Analisis Indomethacin

a. Metode Titrimetri

Menurut Farmakope Inggris, 1980, Indometasin dapat dititrasi dalam larutan aseton dengan NaOH 0,1N (1/10 mmol) dengan menggunakan indikator fenolftalein.

b. Metode Spektrofotometri dan fluorometri

Tiga metode spektrofotometri dan satu metode fluorimetric telah dijelaskan untuk penentuan indometasin dalam sampel bulk dan dalam bentuk sediaan. Metode ini didasarkan pada pembentukan spesies berwarna dengan m-aminofenol - chloramine T, resorsinol - NaClO atau reagen phloroglucinol - NaClO, dan spesies yang berfluorosensi dengan reagen m-aminofenol - chloramine T, di bawah kondisi percobaan yang ditetapkan. Keempat metode menunjukkan karakteristik yang optimum meliputi presisi dan akurasi. Semua metode sederhana, sensitive, dan memiliki reproduibilitas sebesar $\pm 1,7\%$.

7. Analisis Piroksikam


Berbagai metode telah digunakan untuk penentuan dari Piroksikam dalam formulasi farmasi dan cairan biologi. Termasuk kromatografi *spectrophotometry*, *voltammetry* and *fluorescence*.

a. Penentuan piroksikam dan Propranolol dalam sediaan farmasi secara spektrofotometri.

Piroxicam [4-hydroxy-2-methyl-n-(2-pyr idyl)- 2H-1, 2-benzothiazine-3-carboxamide-1, 1-dioxide] adalah obat anti-inflammasi non-steroid dengan efek analgesik dan anti piretik. Piroksikam menunjukkan respon yang cepat dan efektif dalam pengobatan berbagai penyakit seperti arthritis, osteo arthritis

spondylitis, arthritis spondilitis, gout, rheumatoid arthritis, gangguan muskuloskeletal, rasa sakit pasca melahirkan, dan cedera olahraga. Efek samping yang dilaporkan paling serius adalah efek gas trointestinal seperti ulkus.

Tabrizi, (2007) telah mengembangkan suatu metode *spectrofluorimetric* yang sederhana, sensitif, dan cepat untuk penentuan piroksikam dan propranolol dalam formula farmasi. Metode ini didasarkan pada oksidasi piroksikam dan propranolol dengan serium (IV) untuk menghasilkan serium (III), yang fluoresensinya dimonitor pada $\lambda=352$ nm setelah dieksitasi pada $\lambda=255$ nm. Variabel yang mempengaruhi oksidasi obat ini dipelajari dan dioptimalkan. Dibawah kondisi eksperimental, grafik kalibrasi yang linier diperoleh pada rentang 0,02-3,0 dan 0,02-2,4 mg/L, masing-masing untuk piroksikam dan propranolol. Batas deteksi untuk piroksikam dan propranolol adalah 0,006 dan 0,008 mg/L masing-masing dan standar deviasirelatif dari penentuan 5 replikasi obat ini pada tingkat konsentrasi 1,0mg/L adalah 1,65 dan 1,79%. Perolehan kembali diperoleh pada kisaran 95-108%.



1) Pembuatan Kurva Kalibrasi

Aliquot dari larutan standar piroksikam (atau propranolol) dengan konsentrasi 10 mg/L diambil sebanyak 0,02-3,0 mL (atau 0,02-2,4 mL) dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mL. Selanjutnya ditambahkan atau 0,1 mL Ce (IV) dan 1,0 mL larutan H₂SO₄ ke dalam tiap labu berturut-turut. Setiap labu dicukupkan volumenya dengan air suling lalu didiamkan pada suhu kamar selama 10 menit. Intensitas fluoresensi dari setiap larutan diukur pada panjang gelombang 352 nm setelah dieksitasi pada panjang gelombang 255 nm terhadap larutan *blanko*.

2) Analisis Sediaan

Isi lima kapsul piroksikam yang masing-masing mengandung 10 mg piroksikam, ditransfer ke labu ukur 100 mL dan dilarutkan dalam 15 mL etanol dan 2,0 mL larutan NaOH. Kemudian volume dicukupkan hingga tanda dengan air untuk mendapatkan larutan piroksikam dengan konsentrasi 500 mg/L. Ditentukan kadar piroksikam menurut metode pada kurva kalibrasi.

b. Penentuan piroksikam dalam sediaan farmasi dan dalam cairan biologi menggunakan "*europium-sensitized luminescence*"

Sebuah metode *luminescence* sederhana, selektif dan sensitif untuk uji piroksikam dalam larutan air telah dikembangkan oleh Al Kindy *et al* (2006). Metode ini berdasarkan sensitisasi pendaran dari europium (Eu³⁺) dengan pembentukan kompleks terner dengan piroksikam dengan keberadaan TOPO dan Tween-80 sebagai surfaktan.

Fluoresensi dari piroksikam dan kompleksnya dengan Europium ditentukan dalam sistem air dalamdapar Tris0.01M dan TW-80 (0,15%). Piroksikam menunjukkan sinyalfluoresensi yang lemahpada 458 nm dan dieksitasi pada panjang gelombang 359 nm. Disisi lain, sensitisasi lemah dari europium *luminescence* diamati untuk kompleks binerEu-PX pada kondisi ini. Jelas di sini bahwa kehadiranmolekul air di shell koordinasi pertama dariion lantanida adalah faktor utama yang memberikan kontribusi untuk efek pendinginan *nonradiative* dari proses emisi seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.




Fig. 1. (1) Luminescence of Eu^{3+} in Tris buffer, (2) luminescence spectra of Eu^{3+} -PX system in Tris buffer and Tw-80 and (3) luminescence spectra of Eu^{3+} -PX-TOPO system in Tris buffer and Tw-80, $[\text{Eu}^{3+}] = 0.38 \text{ mM}$; $[\text{PX}] = 2 \text{ ppm}$, $[\text{Tris}] = 0.01 \text{ M}$, Tw-80 = 0.15%, $\lambda_{\text{ex}} = 359 \text{ nm}$ and $\lambda_{\text{em}} = 615 \text{ nm}$.

Gambar 5.17. Spectra *luminescence* dari piroksikam-europium

Dengan keberadaan TW-80 maka intensitas *luminescence* meningkat bila dibandingkan dengan yang menggunakan larutan penyangga (dapar) saja. Karakteristik intensitas pendaran europium mengindikasikan bahwa ligan Piroksikam sekitarnya menyerap dan mentransfer energi lebih efisien dengan kelasi ion europium dengan keberadaan TW-80. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan hidrofobisitas lingkungan dalam surfaktan dan penurunan *quenching* dari keadaan tereksitasi 5D0 ion Eu melalui jalur nonradiasi yang disediakan oleh osilator OH dari molekul air terkoordinasi.

- c. Metode spektrofotometrik tidak langsung untuk penentuan piroksikam dan tenoksikam melalui oksidasi dengan kalium permanganat. Amin, *at al* (2010), telah mengembangkan tiga validasi metode *spectrophotometric* yang cepat, sederhana, akurat, dan selektif untuk penentuan piroksikam (PX) dan tenoxicam (TX) dalam bahan baku dan dalam bentuk sediaan. Metode ini didasarkan pada oksidasi dari piroksikam dan tenoksikam oleh kalium permanganat berlebih dalam medium asam sulfat dan penentuan oksidasi dan berikutnya yang tidak bereaksi dengan mereaksikannya dengan *metilenblue* (metodeA), pewarna *amaranth* (metodeB) dan pewarna oranye II (metodeC), dalam media yang sama dengan λ max masing-masing 660, 520 dan 485 nm. Analisis regresi dari plot Beer-Lambert menunjukkan korelasi yang baik dalam konsentrasi masing-masing berkisar 1,0-8,0, 1,0-9,0 dan 1,0-7,2 $\frac{1}{4}$ gmL⁻¹ untuk metode A, B dan C, untuk piroksikam dan masing-masing 0,3-7,0, 0,3-

1,6 dan 0,3-2,5 $\frac{1}{4}$ mg mL^{-1} untuk metode A, B dan C, untuk tenoksikam.

Prosedur:

Metode ini tergantung pada oksidasi PX dan TX yang dilakukan dengan menambahkan (0,5-12, 0,5-15 dan 0,5-10 mg mL^{-1} , dari PX) dan (0,1-10, dan 0,1-2 0,1-3,5 mg mL^{-1} , dari TX) masing-masing menggunakan metode A, B dan C, kepada volume berlebih (2,0 mL dan 1,0 mL, dari KMnO_4 konsentrasi $5,0 \times 10^{-4}\text{M}$) untuk masing-masing PX dan TX, dan menambahkan volume optimum H_2SO_4 (1,0 mL dari larutan 0,2 M untuk PX dan 0,3 mL dari larutan 2,0 M untuk TX). Campuran dipanaskan dalam penangas air (5,0 menit pada 50°C), lalu didinginkan. Setelah proses oksidasi telah selesai yang diketahui dengan mengamati hilangnya warna kalium permanganat, maka ditambahkan reagen pewarna sejumlah (0,45, 1,5 dan 1,2 mL, $1,0 \times 10^{-3}\text{M}$) menggunakan metode A, B dan C, untuk PX dan (0,25, 1,0 dan 0,8 mL, dari $1,0 \times 10^{-3}\text{M}$) menggunakan metode A, B dan C, untuk TX). Volume dibuat hingga 10,0 mL dengan aseton, penurunan intensitas warna MB, AM dan pewarna AO diukur secara spektrofotometri pada panjang gelombang maksimal 660, 520 dan 485 nm, untuk MB, AM dan AO. Kisaran konsentrasi ditentukan dalam dengan memplot konsentrasi PX dan TX terhadap absorbansi pada λ_{max} yang sesuai.

Untuk tablet.

Isi dari sepuluh tablet ditimbang akurat yang setara dengan 100 mg sampel obat, dilarutkan dalam 10 mL aseton, dan kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur 100 mL, dan diencerkan dengan pelarut, dikocok

dengan baik selama 15 menit, kemudian disaring melalui *sintered glass crucible* G4. Sebanyak 1,0mL alikuot dari larutan uji diencerkan sampai 100mL dalam labu ukur dengan pelarut. Alikuot dari larutan obat diencerkan, kemudian diperlakukan sebagai dijelaskan dalam prosedur umum di atas.




Figure 1. Absorption spectra for the reaction product of $5.0 \mu\text{g mL}^{-1}$ of PX and $1.6 \mu\text{g mL}^{-1}$ of TX with KMnO_4 ($5.0 \times 10^{-4} \text{ M}$) and MB, AM and AO dyes ($1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$).

Bull. Chem. Soc. Ethiop. 2010, 24(1)

Gambar 5.18. Spectra Absorpsi dari piroksikam-tenoksikam

8. Analisis Fenilbutazon

Titration Bebas Air

Fenilbutazon dapat dititrasi dengan cara larutan zat dalam DMFA 30 mL dititrasi dengan larutan 0,1 N tetra-n-butyl ammonium hidroksida (1/10 mmol) dengan menggunakan indikator larutan biru timol.

9. Analisis Selekoksisb

Celecoxib 4- [5- (4-methylphenyl) -3 - (trifluorometil) pyrazol-1-il] benzene sulfonamida dan merupakan sebuah diaryl yang tersubstitusi pirazol. Senyawa ini adalah obat anti inflamasi non steroid (NSAID), yang merupakan inhibitor *cylooxygenase 2* (cox-2). Sebuah survei literatur menunjukkan metode HPLC dapat digunakan untuk pengukuran celecoxib dalam sediaan farmasi dan dalam cairan biologis. Senyawa ini juga dapat diukur dengan metode HPTLC, spectrofluometric dan Densitometri.

a. Spektrofotometri

Revati, et al (2011) melaporkan metode analisis untuk selekoksisb dalam bentuk baku maupun dalam sediaan farmasi secara spektrofotometri.

Prosedur :

Celecoxib (10mg) ditimbang secara akurat dan dilarutkan dalam kloroform dan volume dicukupkan hingga 100,0 mL untuk membentuk larutan stok (100µg/mL). Larutan stok ini diencerkan dengan kloroform untuk mendapatkan larutan kerja standar 10µg/mL dan kemudian di *scan* dalam rentang sinar UV. Ini menunjukkan penyerapan maksimum pada panjang gelombang 255 nm (Gambar 1). Diambil 2, 4,6, 8 dan 10mL alikuot dari larutan kerja standar yang setara dengan 2-10 µg dalam serangkaian labu ukur 10mL dan volume dicukupkan dengan kloroform. Pengukuran absorbansi larutan dilakukan terhadap blanko kloroform pada panjang gelombang 255 nm. Kurva kalibrasi celecoxib diplot. Konsentrasi sampel dibaca dari kurva kalibrasi atau dihitung dari persamaan regresi.

Prosedur untuk kapsul

Berat rata-rata kapsul dihitung dengan menimbang 20 kapsul. Sejumlah serbuk obat ini yang setara dengan 100,0 mg diekstraksi secara berurutan dengan kloroform (4 X 20 mL) dan ekstrak dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 100 mL setelah penyaringan melalui kertas filter What man No.1. Volume dicukupkan dengan kloroform (100µg/mL). Kemudian larutan ini diencerkan dengan kloroform untuk mendapatkan larutan kerja standar 100µg/mL. Volume dicukupkan hingga 10,0mL dengan kloroform. Absorbansi dibaca dan konsentrasi celecoxib ditentukan dengan menggunakan kurva kalibrasi. Perhitungan kemudian dibuat dengan faktor pengenceran untuk mengetahui konsentrasi obat dalam kapsul.

10. Analisis Parasetamol dan Fenasetin

Parasetamol (N-asetil-4-aminofenol) banyak digunakan sebagai bahan aktif dalam sediaan farmasi. Zat ini terutama digunakan sebagai alternatif terhadap aspirin karena aktivitas analgesik dan antipiretiknya. Metode analisis untuk parasetamol telah dibahas dalam berbagai kajian. Beberapa prosedur analisis yang dapat digunakan untuk parasetamol, termasuk diantaranya adalah teknik pemisahan seperti TLC, HPLC, dan GC atau penggunaan resin pertukaran ion telah diusulkan untuk penentuan parasetamol. Metode spektrofotometri untuk penentuan parasetamol dalam kombinasi dengan kafein juga telah dijelaskan, sebagaimana dengan analisis parasetamol dengan salisilamid atau dengan oxyphenbutazone

dan salisilamid melalui reaksi nitrosation dan selanjutnya melalui reaksi khelasi.

a. Secara Titrimetri

Terhadap 100 mg zat ditambahkan 10 mL asam sulfat encer dan kemudian dididihkan selama 1 jam menggunakan pendingin balik. Selanjutnya ditambahkan 10 mL air suling, 40 g es dan 15 mL HCl encer. Titrasi dengan larutan 0,1 N Amonium-seri (IV) nitrat sampai timbul warna kuning dengan menggunakan 2 tetes feroin.

b. Metode Spektrofluorometri

Metode *spectrophotometric* untuk penentuan parasetamol ini berdasarkan oksidasi dari analit untuk menghasilkan fluorophore 2,2'-dihidroksi-5, 5'-diacetyl diaminebiphenyl. Natrium hipoklorit digunakan sebagai pereaksi oksidasi pada pH optimum 10,0 (dapar larutan natrium karbonat asam borat). Metode ini memuaskan untuk diterapkan dalam penentuan parasetamol dalam sediaan farmasi dan cairan biologis. Senyawa ini menunjukkan fluoresensi dengan eksitasi maksimum pada $\lambda_{maks}=335$ nm dan emisi maksimum $\lambda_{maks}=427$ nm.




Fig. 1. Oxidation of paracetamol.

Gambar 5.19. Oksidasi parasetamol menjadi 2-2-dihidroksi-5-5-diasetilaminofenol

Prosedur umum:


- 1) Ke dalam labuukur 50 mL dimasukkan 5-500 μg parasetamol, 10 mL larutan dapar $\text{Na}_2\text{CO}_3\text{-H}_3\text{BO}_3$ 0,4 M (pH 10,0) dan 3,5 mL 10×10^{-3} larutan natrium hipoklorit. Campuran diencerkan dengan air hingga 45 mL dan dipanaskan pada 80°C selama 2 menit. Didinginkan hingga 20°C dan dicukupkan volumenya dengan air hingga 50 mL. Suatu larutan blanko disiapkan dengan cara yang sama. Intensitas fluoronsensi diukur pada $\lambda_{\text{em}} = 427$ nm dan $\lambda_{\text{ex}} = 335$ nm. Dibuat kurva kalibrasi dari parasetamol dengan konsentrasi yang diketahui. Jika jumlah parasetamol adalah 0,5 - 5 mg maka konsentrasi natrium hipoklorit harus 10^{-2}M .
- 2) **Prosedur untuk sediaan parasetamol**
 Suatu sampel yang mengandung 100-700 mg parasetamol dimasukkan ke dalam labuukur 1 L dan diencerkan dengan *aqua bidestillata*, dicukupkan volumenya hingga tanda. Larutan disaring dengan

kertas saring Whatman No.1. sebanyak 5,0 mL filtrat dicampurkan dengan 10 mL larutan dapar 0,4 M $\text{Na}_2\text{CO}_3\text{-H}_3\text{BO}_3$ (pH= 10,0) dan 3,5 mL 10^{-2}M larutan natrium hipoklorit. Campuran diencerkan dengan *aqua bidestillata* hingga sekitar 45 mL dan dipanaskan pada 80°C selama 2 menit. Setelah dingin, larutan diencerkan hingga 50 mL dengan *aqua bidestillata*. Intensitas fluoresensi ditentukan seperti cara tersebut di atas.

Jika dalam formula mengandung asam salisilat dan/atau asamasetilsalisilat, senyawa ini diekstraksi sebelumnya dengan etil eter dalam medium asam. Untuk tujuan ini, larutan sampel (5 mL) diperlakukan dengan 1 mL 1M HCl, dipindahkan ke dalam corong pisah 100mL dan dikocok dengan 10 mL eter etil selama 10 menit. Parasetamol ditentukan dalam fase air seperti ditunjukkan di atas.

c. **Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi.**

Altun, (2011) telah mengembangkan metode KCKT untuk menentukan parasetamol, kofein dan dipiron. Parasetamol, kofein, dan dipiron dipisahkan menggunakan " μ -Bondapack C8" melalui elusi isokratik dengan laju alir 1,0 mL/menit. Fase geraknya (dalam perbandingan volume) adalah 0.01 M KH_2PO_4^- : methanol : acetonitrile : isopropyl alkohol (420:20:30:30) dan menggunakan detektor spektrofotometrik pada $\lambda_{\text{max}}=215 \text{ nm}$.



Gambar 5.20. Kromatogram campuran parasetamol (I), kofein (II) dan dipiron (III) dengan metode kromatografi cair.

Pembuatan larutan standar:

Parasetamol (20,00 mg), kofein (10,00 mg), dan dipiron (15,00 mg) ditimbang akurat dan dimasukkan ke dalam labuukur 10 mL dan dilarutkan dalam fase gerak dan volume dicukupkan dengan fase gerak.

Pembuatan larutan kerja.

Larutan kerja disiapkan secara terpisah dalam fase gerak untuk parasetamol, kofein, dan dipiron. Alikuot dari setiap larutan kerja digabungkan dan diencerkan dengan fase gerak sehingga konsentrasi akhir adalah 100 µg/mL, 50µg/mL, dan 150µg/mL.

d. Analisis Parasetamol dan Fenasetin

Nagaraja, *at al* (1998) telah mengembangkan suatu metode spektrofotometrik yang cepat, sensitive, dan sederhana untuk penentuan produk hidrolisis dari parasetamol dan fenasetin dengan natrium 1,2-naftokuionon-4-sulfonat dan setiltrimetil ammonium bromide (CTA) dalam medium alkali. Absorbansi diukur pada λ_{max} 570 dan 500 nm dan absorpsipitas


molar ditemukan pada $1,118 \times 10^{-4}$ dan $4,54 \times 10^{-3}$ mol L^{-1} untuk parasetamol dan fenasetin. Spesies berwarna yang dihasilkan memenuhi hukum Beer pada rentang 1-20 mikrogram mL^{-1} untuk parasetamol dan 2-24 mikrogram mL^{-1} untuk fenasetin. Sensitivitas ditingkatkan dengan penambahan CTA. Metode ini berhasil dengan baik untuk diterapkan pada penentuan parasetamol dan fenasetin dalam berbagai bentuk sediaan farmasi

VI

XANTHIN

A. Pendahuluan

Xantin merupakan turunan alamiah dari purin. Senyawa turunan xantin yang banyak digunakan dalam farmasi adalah kafein, teobromin, dan teofilin.



Gambar 6.1. Rumus struktur Xantin

Tabel 6.1: Beberapa senyawa xantin

Nama	Nama Kimia	Berat Molekul
Kofein	1,3,7-trimetil xantin	194,19
Teofilin	1,3-dimetil xantin	180,17
Teobromin	3,7-dimetil xantin	180,17

Senyawa xantin merupakan senyawa yang bersifat sebagai basa lemah dengan nilai pK_b antara 13 sampai 14. Teofilin dan teobromin bersifat asam lemah dengan nilai pK_a 8,6 dan 9,9. Kafein sendiri tidak bersifat

asam karena tidak memiliki atom hidrogen yang dapat dibebaskan.

B. Analisis senyawa turunan xantin

1. Uji Kualitatif

Kafein, teobromin, dan teofilin dapat dideteksi dengan reaksi *Mureksid*. Sekitar 5 mg sampel dilarutkan dalam 1 mL asam hidroklorida pekat dalam cawan porselen. Sekitar 50 mg kalium klorat ditambahkan dan larutan diuapkan hingga kering. Ke dalam cawan porselin kemudian ditambahkan beberapa tetes larutan ammonia hingga membasahi keseluruhan residu. Jika terdapat kafein, teobromin, atau teofilin maka residu akan berwarna *pink* keunguan.

Ketelitian dari uji ini telah dilaporkan sebelumnya. Senyawa xantin akan memberikan warna *pink*, sedangkan senyawa turunan asam urat memberikan warna *orange-pink* ungu. Sangat banyak senyawa yang tidak memberikan warna atau memberikan warna yang tidak memberikan hasil positif. Keberadaan beberapa senyawa tertentu akan menghambat reaksi meskipun terdapat senyawa xantin dalam sampel.



Penentuan secara mikrokimia dapat dilakukan melalui reaksi pembentukan kristal pada penambahan pereaksi. Berbagai pereaksi yang sering digunakan adalah reagen Krant, merkuri asetat, kalium ferisianida, dan reagen Mayer. Perbedaan kelarutan dari senyawa xantin berdasarkan sifat keasamannya juga merupakan salah satu metode untuk membedakan senyawa turunan xantin ini. Reagen alkaloid, Dragendorf memberikan endapan berwarna orange-kuning dengan kofein dan endapan merah dengan teobromin. Kedua senyawa

turunan xantin ini dapat dibedakan dengan menggunakan reagen Nessler atau kalium dikromat-asam sulfat. Teofilin akan bereaksi dengan larutan kupri sulfat-natrium hidroksida sehingga dapat dibedakan dari kofein dan teobromin. Larutan xantin dilarutkan dalam larutan ammonia dan dikromatografi kertas dengan menggunakan pelarut isopropanol:asam klorida 2 N dan menunjukkan nilai Rf Kofein, 0,85; teofilin, 0,75; dan teobromin, 0,63.

2. Uji Kuantitatif

a. Metode Argentometri

Teobromin dan teofilin, tetapi tidak dengan kofein, akan membentuk senyawa perak yang mengendap menurut reaksi berikut:



Gambar 6.2: Reaksi antara teofilin dan teobromin dengan AgNO₃

Kafein tidak dapat bereaksi dengan perak karena tidak memiliki atom hidrogen yang dapat dibebaskan.

Teobromin biasanya terdapat sebagai garam natrium atau kalsium dan dikombinasikan dengan salisilat atau asetat. Sifat keasaman senyawa-senyawa tersebut perlu dipertimbangkan dalam analisis.

Cara penetapan kadar teobromin:

Sejumlah sampel yang setara dengan 500 mg teobromin ditimbang secara seksama dan ditambahkan 125 mL air. Ke dalam larutan ditambah 1 mL larutan merah fenol 0,1% dalam alkohol dan 4 mL asam sulfat 1 N. Jika perlu larutan ditambah asam agar larutan bersifat sedikit asam, yang ditandai dengan larutan yang berwarna kuning. Larutan dididihkan selama 10 sampai 15 menit lalu didinginkan sampai kurang lebih 40°C. Larutan ditambah natrium hidroksida 1 N sampai berwarna merah kebiruan dan kemudian ditambah tetes demi tetes asam sulfat 0,1N sampai berwarna kuning. Larutan selanjutnya ditambah 40 mL perak nitrat 0,1 N, dicampur lalu dititrasikan dengan natrium hidroksida 0,1 N sampai berwarna merah kebiruan. Tiap mL natrium hidroksida 0,1 N setara dengan 18,02 mg teobromin.


Catatan: Larutan harus dididihkan untuk memastikan zat terlarut sempurna dan untuk menghilangkan karbon dioksida.

Variasi lain dari metode argentometri adalah dengan menggunakan metode Volhard, yaitu dengan menyaring endapan garam perak yang terjadi dan kelebihan perak dititrasikan dengan ammonium tiosianat. Sediaan teofilin seringkali ditetapkan dengan cara ini.

Teofilin sering kali terdapat dalam sediaan tablet, kapsul, injeksi, dan suppositoria. Garam natriumnya, dalam campuran dengan natrium asetat, natrium glisinat, atau natrium salisilat. Aminofilin merupakan campuran dari teofilin dan etilendiamin.

Penyiapan sampel:

Sejumlah 20 tablet teofilin ditimbang dan ditentukan berat rata-rata pertablet. Tablet kemudian diserbukkan. Alikuot sampel mengandung 0,2 sampai 0,25 g teofilin anhidrat. Sampel dimasukkan ke dalam labu ukur 200 mL dan ditambahkan 50 mL air dan 15 mL ammonia 10%. Larutan ini didiamkan selama 30 menit sambil sesekali dikocok kemudian diencerkan dengan air hingga tanda. Larutan ini disaring, 20 mL filtrat pertama dibuang. Larutan selanjutnya ditambah 2 mL besi (III) ammonium sulfat 8% dan dititrasi dengan ammonium tiosianat 0,1 N. Tiap mL perak nitrat setara dengan 18,02 mg teofilin.



Gambar 6.3. Reaksi yang terjadi pada penetapan teofilin dengan metode Volhard

b. Metode Iodometri

Bila kofein direaksikan dengan iod dalam suasana asam, maka akan membentuk endapan

periodida, $C_8H_{10}O_2N_4.HI.I_4$. Teobromin akan bereaksi serupa. Jumlah iod yang bereaksi bervariasi, tergantung dari kelebihan ion selama titrasi.

Prosedur:


Sejumlah sampel yang setara dengan lebih kurang 500 mg kofein ditimbang seksama lalu dilarutkan dalam air secukupnya. Larutan diencerkan dengan air sampai 100,0 mL, jika perlu disaring. Sebanyak 5,0 mL larutan dipipet dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer berutup kaca, ditambah 10 mL larutan iodat-iodida 0,1 N dan 5 mL asam klorida 3,5%, lalu ditutup segera dan dikocok. Larutan dipindahkan ke dalam tabung sentrifuge dan diputar selama 3-5 menit pada 2000 rpm. Pada 10,0 mL larutan yang jernih dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1N menggunakan indikator kanji.

c. Metode Titrasi Bebas Air (TBA)

Kofein, teobromin, dan teofilin dapat dititrasi sebagai basa dalam pelarut bebas air. Namun hasil analisis turunan purin ini tidak memuaskan dengan metode analisis TBA. Titik akhir pada kofein sukar diamati, namun demikian hal ini dapat diatasi dengan metode titrasi potensiometri dengan menggunakan pelarut asam asetat *glacial* dan anhidrida asam asetat.

Prosedur:

Sejumlah sampel yang setara dengan lebih kurang 200 mg ditimbang seksama. dilarutkan dalam 10 mL anhidrida asam asetat dan 20 mL benzene. Larutan dititrasi secara potensiometri dengan asam perklorat 0,1 N. Tiap mL asam perklorat 0,1 N setara dengan 19,42 mg kofein.



Gambar 6.4. Reaksi penetapan kadar kafein dengan metode TBA menggunakan larutan baku asam perklorat.

Teofilin dalam dimetilformamida dapat dititrasi sebagai asam.

Aminofilin merupakan campuran dari teofilin dan etilendiamin. Aminofilin mengandung tidak kurang dari 78,0% dan tidak lebih dari 83,5% teofilin; tidak kurang dari 12,8% dan tidak lebih dari 14,1% etilendiamin, masing-masing dihitung terhadap zat anhidrat. Pada aminofilin, perlu ditetapkan kadar keduanya.

Cara penetapan kadar etilendiamin:

Sejumlah sampel yang setara dengan lebih kurang 500 mg etilendiamin ditimbang seksama, dilarutkan dalam 30 mL air. Larutan dititrasi dengan asam klorida 0,1 N menggunakan indikator brom fenolbiru. Tiap mL asam klorida 0,1 N setara dengan 3,005 mg etilendiamin.

d. Metode Spektrofotometri

Senyawa turunan xantin dapat mengabsorpsi cahaya dengan baik dan dapat ditentukan melalui pengukuran secara spektrofotometrik. Pada pH 6, kafein, teobromin dan teofilin mencapai absorbansi

maksimum pada kisaran panjang gelombang 272 sampai 273 nm.

Prosedur penentuan teofilin dalam sediaan tablet:

Ditimbang serbuk tablet setara dengan 0,5 g aminofilin secara seksama dan dimasukkan ke dalam labu ukur, dikocok dengan air kemudian diencerkan hingga batas volumenya. Larutan ini disaring, 50 mL filtrat pertama dibuang. Sebanyak 10,0 mL aliquot dipipet ke dalam labu ukur 500 mL. Ditambahkan 5 mL asam klorida pekat dan larutan diencerkan lagi hingga batas volume. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 270 nm terhadap blanko. Dibuat kurva standar dari larutan teofilin yang diketahui konsentrasinya, diikuti dengan perhitungan konsentrasi dari sampel aminofilin.

Bahan tambahan tablet tidak mempengaruhi pengukuran, kecuali senyawa turunan asam barbiturat.

Penentuan teofilin dalam sediaan krim:

Krim teofilin dilarutkan dalam natrium karbonat 0,5 N dan dicampur dalam corong pisah selama 10 menit. Setelah itu didiamkan 5 menit dan akan terbentuk dua lapisan. Lapisan dipisahkan dan disaring melalui kertas *Whatman*. Sebanyak 0,10 mL filtrat diencerkan untuk memperoleh larutan dengan konsentrasi 40 mg/L. Larutan ini kemudian dianalisis dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 284 nm untuk menentukan konsentrasi teofilin dalam sediaan.

Penentuan kafein dalam minuman ringan:

Kafein dapat diekstraksi dari larutan *aqueous* dengan pelarut klorin seperti diklormetan atau

kloroform. Teknik ini umum digunakan untuk dekofeinasi kopi dan teh. Setelah kofein diekstraksi, dapat dianalisis secara langsung dengan mengukur absorbansi larutan pada panjang gelombang 260 nm.

Pembuatan larutan standar:

Suatu larutan stok kofein 1000 bpj dibuat dengan melarutkan 198,2 mg kofein dalam 200,0 mL air suling. Larutan standar kerja dibuat dengan memipet 25, 12,5, 10, 7,5, 5 dan 2,5 mL alikuot dari larutan standar ke dalam labu ukur 50,0 mL, diencerkan dengan air suling hingga batas volume.

Penyiapan sampel:

Sebanyak 200 mL alikuot dari air suling yang mendidih ditambahkan ke setiap gelas kimia 250 mL yang berisi 2 g kopi instan dan 1 kantong teh celup (3,2 g daun teh kering). Kopi dan teh distirer selama 30 detik menggunakan *magnetic stirrer* (500 rpm) dan didinginkan hingga suhu ruangan.

Ekstraksi kofein:

Sebanyak 50,0 mL alikuot diambil dari larutan standar kerja atau larutan sampel. Alikuot ini dimasukkan dalam corong pisah dan ditambahkan 25 mL diklormetan. Kofein diekstraksi dengan mengintervensi corong pisah sebanyak tiga kali. Lapisan diklormetan dipisahkan ke dalam labu bersih dan prosedur ekstraksi diulangi sebanyak 2 kali atau lebih kemudian lapisan pelarut digabungkan. Absorbansi sampel kemudian diukur pada spektrofotometer dan konsentrasi dihitung dengan rumus:

$$\text{Caffeine content (mg)} = \text{Conc (ppm)} \times \left(\frac{(\text{Total Sample Vol (ml)})^2}{(\text{Measured Sample Vol (ml)}) \times 1000} \right)$$

e. Metode Gravimetri

Self dan Rankin telah mengembangkan prosedur *gravimetric* untuk penentuan kuantitatif dari teobromin dan teofilin. Metode ini lebih akurat untuk teobromin dibandingkan dengan teofilin. Metode ini merupakan metode baku untuk penentuan teobromin natrium salisilat.

Teofilin dapat ditentukan dalam aminofilin melalui ekstraksi dari larutan yang sedikit asam dengan suatu pelarut yang terdiri dari 3 bagian volume kloroform dan 1 bagian volume isopropanolol. Oleh karena kelarutan dalam pelarut rendah, maka penggunaan campuran pelarut dapat meningkatkan kelarutannya secara nyata. Prosedur *gravimetric* lain untuk penentuan teofilin adalah menggunakan perak ammonium klorida sebagai bahan pengendap. Kelebihan perak dapat ditentukan dengan mengasamkan filtrat dan menimbang endapan perak klorida. Teobromin dapat diekstraksi dan ditimbang atau dapat diendapkan dengan asam tungstat. Kofein memberikan endapan dengan asam silikotungstat, setelah endapan dibakar, dapat ditimbang untuk menentukan kadar kofeinnya.

f. Metode kromatografi

Penentuan teofilin dalam plasma:

Suatu metode yang sederhana dan sensitif untuk penentuan teofilin dalam plasma dengan metode kromatografi lapis tipis telah dikembangkan. Metode ini meliputi ekstraksi senyawa obat dan menggunakan

standar internal asetaminofen menggunakan kloroform:isopropanol (75:25) dan dipisahkan dengan plat KLT silica dengan pelarut asam asetat : isopropanol : toluene (1:12:6) sebagai pelarut pengelusi.

Pembuatan larutan standar:

Larutan stok mengandung 10 mg/mL teofilin atau asetaminofen dalam metanol. Larutan standar kerja dibuat dengan mengencerkan 1 mL larutan stok hingga 10 mL dengan air sehingga diperoleh konsentrasi akhir 1 mg/mL. larutan ini kemudian digunakan untuk *spiked* sampel plasma.

Penyiapan sampel:

Sebanyak 2,0mL sampel plasma dalam Erlenmeyer ditambahkan 2 μ L asetaminofen (1mg/mL) sebagai standar internal dan 1 mL ammonium sulfat jenuh. Sampel kemudian diekstraksi dengan 5 mL kloroform:isopropanol (75:25) setelah dicampur dengan menggunakan vortex. Erlenmeyer kemudian dikocok selama 10 menit dan disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 8000 rad min⁻¹. Fase organik dipisahkan dan diuapkan untuk dikeringkan dibawah aliran gas nitrogen. Residu kering dilarutkan kembali dengan 2 mLmetanol, kemudian ditotolkan pada plat KLT. Semua pengerjaan dilakukan dalam suhu ruangan.

g. Campuran yang mengandung xantin

Suatu campuran senyawa xantin yang sering ditemukan biasanya aminofilin dengan suatu turunan asam barbiturat. Suatu metode untuk analisis produk ini meliputi penambahan perak nitrat secara berlebihan ke dalam suatu larutan amoniakal, penyaringan dari endapan perak teofilinat dan diikuti dengan titrasi dari

kelebihan perak dalam filtrat. Barbiturat diekstraksi dari alikuot filtrat, dikeringkan, dan ditimbang.

Campuran teofilin dan fenobarbital dapat dititrasi secara potensiometrik dalam larutan etanol. Tablet teofilin, pentobarbital, dan papaverin telah dianalisis melalui ekstraksi pentobarbital dan ditentukan secara spektrofotometrik. Larutan teofilin papaverin kemudian dianalisis dengan menggunakan dua panjang gelombang. Tablet aminofilin-fenobarbital dapat dianalisis secara spektrofotometrik.

Prosedur:

Reagen ammonia encer. Sebanyak 4mL ammonium hidroksida pekat diencerkan hingga 1 liter. Ditimbang serbuk tablet yang setara dengan 15 mg fenobarbital dan dimasukkan ke dalam corong pisah yang berisi 25 mL asam hidroklorida 1:1. Ditambahkan 60 mL eter dan campuran dikocok. Setelah terjadi pemisahan fase, larutan asam dilewatkan melalui corong pisah sebanyak dua kali yang berisi 50 mL eter dan pengocokan diulangi. Larutan hasil pencucian eter ini dimasukkan ke dalam labu ukur 500 mL. Ketiga larutan eter ini dicuci dengan 10 mL asam hidroklorida 1:1 dan 10 mL air, hasil pencucian ini ditambahkan ke dalam labu ukur.

Penentuan fenobarbital:

Larutan eter digabungkan dan diuapkan hingga kering. Residu ditransfer secara kuantitatif ke dalam labu ukur 200 mL dengan penambahan 100 mL larutan ammonia encer, setelah itu larutan diencerkan hingga sekitar 190 mL dengan larutan ammonia. Setelah itu diasamkan dengan asam hidroklorida, pH ditentukan dengan kertas lakmus. Campuran diencerkan dengan air hingga volume, dihomogenkan dan disaring. Sebanyak

10,0mL alikuot dipipet ke dalam labu ukur 100 mL, ditambahkan 1 tetes larutan ammonia 1:1, kemudian larutan diencerkan dengan larutan ammonia hingga batas tanda. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 240,5 nm terhadap blanko.

Penentuan teofilin:

Larutan asam dalam labu ukur 500 mL diencerkan dengan air. Sebanyak 5 mL alikuot, atau alikuot yang mengandung 0,5 sampai 1,0 mg teofilin dipindahkan ke dalam labu ukur 100 mL. Larutan diencerkan hingga volume dengan air dan absorbansi diukur terhadap larutan asam encer (1:18). Absorpsitivitas teofilin ditentukan dalam pelarut yang sama.

Pengasaman dan penyaringan dilakukan untuk menghilangkan senyawa stearat yang dapat mempengaruhi pengukuran. Campuran teobromin-fenobarbital dapat dipisahkan melalui ekstraksi pelarut, diikuti dengan penentuan senyawa secara argentometrik, gravimetrik, atau spektrofotometrik.

Metode ekstraksi pelarut, biasanya diikuti dengan penentuan secara gravimetrik telah dikembangkan untuk berbagai campuran yang mengandung kofein, barbiturat, aspirin, asetanilid, asetofenetidin, dan lain sebagainya. Kofein dan natrium bromide dapat dipisahkan melalui ekstraksi, kofein ditimbang dan bromide dititrasi dengan perak.

Kofein dan antipirin kadang-kadang juga dikombinasi. Suatu metode iodometrik telah dikembangkan untuk menganalisis campuran ini. Penentuan secara iodometrik dapat dilakukan setelah

pemisahan secara kromatografi. Kofein yang terelusi dapat ditentukan secara spektrofotometrik.


Spektrofotometri ultraviolet dapat diterapkan untuk penentuan campuran teobromin-teofilin. Teofilin dapat ditentukan dalam campuran dengan teobromin dan kofein diendapkan dengan reagen kupri asetat. Kelebihan tembaga dianalisis secara *volumetric*.

VII

SENYAWA TURUNAN ASAM BARBITURAT

A. Pendahuluan


Asam barbiturat atau malonylurea atau 6-hydroxyuracil merupakan senyawa organik berdasarkan kerangka hetero siklik pirimidin. Senyawa ini berupa serbuk, tidak berbau, dan larut dalam air. Asam barbiturat adalah senyawa induk dari obat barbiturat, meskipun asam barbiturat sendiri tidak aktif farmakologik. Senyawa ini ditemukan oleh ahli kimia Jerman Adolf von Baeyer pada 4 Desember 1864 pada perayaan Santo Barbara (yang diberikan sebagai nama senyawa), dengan menggabungkan urea dan asam malonat dalam suatu reaksi kondensasi. Asam malonat sejak itu kemudian diganti dengan dietilmalonat, sebagai ester untuk menghindari masalah keasaman dari asam karboksilat dan karboksilat ini tidak reaktif.



Gambar 7.1. Reaksi pembentukan asam barbiturat dari asam malonat dan urea

Sampai Tahun 1903 ketika dua ilmuwan Jerman yang bekerja di Bayer, Emil Fischer dan Joseph von Mering menemukan bahwa barbital sangat efektif mengakibatkan anjing tertidur. Barbital kemudian dipasarkan oleh Bayer dengan nama dagang Veronal. Dikatakan bahwa Von Mering mengusulkan nama ini karena tempat yang paling damai yang ia tahu adalah kota Verona Italia.

Barbiturat adalah obat yang bekerja sebagai depresan sistem saraf pusat, dan karena itu dapat menghasilkan efek dengan spektrum yang luas, mulai dari sedasiringan sampai anestesitotal. Senyawa ini juga efektif sebagai anxiolytics, sebagai hipnotik, dan sebagai anti konvulsan. Barbiturat juga memiliki efek analgesik, namun efeknya agak lemah. Senyawa ini memiliki potensi kecanduan, baik fisik maupun psikologis. Saat ini sebagian besar barbiturat telah digantikan oleh benzo diazepin dalam praktek medis rutin, misalnya dalam pengobatan kecemasan dan insomnia terutama karena benzo diazepin secara signifikan kurang berbahaya ketika terjadi overdosis. Namun, barbiturat masih digunakan dalam anestesi umum untuk epilepsi dan bantuan bunuh diri (*euthanasia*). Barbiturat adalah turunan asam barbiturat.



Gambar 7.2. Struktur Barbiturat

Barbiturat dalam banyak kasus digunakan baik sebagai asam bebas atau sebagai garam natrium, kalsium, kalium, magnesium, lithium, dan lain-lain. Garam kodein dan dionine berbasis asam barbiturat telah dikembangkan. Pada tahun 1912, Bayer memperkenalkan derivatif lain dari asam barbiturat, fenobarbital, dengan nama dagang luminal sebagai obat hipnotis-sedatif.

Tabel 7.1. Senyawa Turunan Asam Barbiturat

Nama Umum	R1	R2	IUPAC name
Allobarbital	CH ₂ CHCH ₂	CH ₂ CHCH ₂	5,5-diallylbarbiturat
Amobarbital	CH ₂ CH ₃	CH ₂ - CH ₂ CH(CH ₃) 2	5-ethyl-5-isopentyl- barbiturat
Aprobarbital	CH ₂ CHCH ₂	CH(CH ₃) ₂	5-allyl-5-isopropyl- barbiturat
Alphenal	CH ₂ CHCH ₂	C ₆ H ₅	5-allyl-5-phenyl- barbiturat
Barbital	CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃	5,5-diethylbarbiturat
Ballobarbital	CH ₂ CHCH ₂	CH ₂ CBrCH ₂	5-allyl-5-(2-bromo- allyl)-barbiturat
Phenobarbital	CH ₂ CH ₃	C ₆ H ₅	5-ethyl-5- phenylbarbiturat

B. Metode Isolasi

Senyawa barbiturat banyak terdapat dalam bentuk sediaan tablet, kapsul, atau larutan. Untuk maksud identifikasi obat, maka senyawa ini harus dipisahkan terlebih dahulu dari sediaan, dari bahan tambahan sediaan, atau dari produk dekomposisinya. Kebanyakan metode resmi menawarkan proses ekstraksi pelarut untuk pemisahan tersebut. Campuran dilarutkan dalam alkali dan larutan alkali diekstraksi dengan pelarut organik, ekstrak lalu dipisahkan. Larutan *aqueous*

kemudian diasamkan dan asam barbiturat yang dibebaskan diekstraksi. Ekstrak diuapkan dan residu ditimbang. Prosedur ini memungkinkan terjadinya pemisahan dari senyawa-senyawa lain yang mungkin ada dalam sediaan. Asam barbiturat sendiri sangat mudah larut dalam eter dan kloroform, sukar larut dalam air dan sangat tidak larut dalam petroleum benzen.

Rotondaro telah merancang suatu prosedur yang efisien untuk maksud pemisahan ini. Prosedur ini berdasarkan sifat keasaman yang lemah dari senyawa asam barbiturat. Krahl, telah menuliskan bahwa nilai pKa dari 30 senyawa turunan asam barbiturat adalah sekitar 7,21 sampai 8,34. Oleh sebab itu, barbiturat dapat diekstraksi secara kuantitatif dari bufer pH 7,2 sampai 7,5, tetapi tidak dapat dipisahkan dari larutan alkali kuat.

Prosedur: Suatu sample yang presentatif mengandung 100 - 150 mg barbiturat, dimasukkan dalam corong pisah 125 mL lalu ditambahkan 10 - 15 mL air. Larutan kemudian diasamkan dengan asam klorida 10% hingga berlebih beberapa tetes. Campuran ini diekstraksi dengan 25 mL kloroform, lapisan kloroform dialirkan dan dilewatkan pada 4 corong pisah yang berisi pelarut berikut:

- Corong I : berisi 10 - 15 mL air, 1 g natrium bikarbonat dan 2-3 tetes HCl 10% pH larutan harus 7,2-7,5.
- Corong II : berisi 10 mL natrium hidroksida 0,1 N
- Corong III : berisi 10 mL natrium hidroksida 0,1 N
- Corong IV : berisi 10 mL air

Kloroform dikocok selama 1-2 menit pada setiap corong pisah sebelum dipisahkan. Prosedur ini diulang sebanyak 4 kali dengan menggunakan kloroform 15 mL. Gabungan ekstrak kloroform mengandung senyawa yang bersifat netral seperti fenacetin dan produk dekomposisi lain yang bersifat netral.

Derivat asam barbiturat akan tertinggal dalam corong 2, 3, dan 4. Isi dari ke tiga corong ini digabungkan dan larutan ini dapat digunakan langsung untuk penentuan kuantitatif barbiturat dengan menggunakan salah satu metode yang akan dibicarakan dalam bab ini.

Campuran tablet yang mengandung sejumlah asam stearat akan mempengaruhi prosedur analisis ini. pKa dari asam stearat dalam air diperkirakan sekitar 5,0 sehingga praktis akan terjadi retensi dari stearat dalam bufer bikarbonat. Suatu prosedur untuk memisahkan stearat adalah dengan metode pengendapan menggunakan barium hidroksida, lalu difiltrasi atau disentrifugasi.

C. Uji Warna dan Mikrokristal

Parri, 1924 telah menjelaskan suatu uji warna untuk senyawa barbiturat dengan menggunakan reagen kobalt dalam medium basa. Uji ini dapat diterapkan untuk semua turunan barbiturat.

Reagen: Larutan kobalt asetat; larutan kobalt asetat 1% dalam metanol anhidat.

Larutan Isopropilamin; larutan isopropilamin 4% dalam metanol anhidrat.

Prosedur: beberapa miligram sampel dilarutkan dalam 1 mL kloroform, tambahkan 0,5-1 mL larutan kobalt asetat dan 0,5-1 mL larutan isopropilamin. Hasil uji positif

ditandai dengan terbentuknya warna biru-violet. Larutan harus dibandingkan dengan reagen blanko.

Metode lain adalah dengan menggunakan reaksi Millon, Deniges, Parri, dan Zwickker, juga reaksi dengan xanthidrol dan merkuri asetat.

Jika sampel mengandung senyawa tunggal dari barbiturat, maka senyawa ini dapat diidentifikasi dengan beberapa cara. Metode ini merupakan aplikasi dari pembentukan warna yang spesifik dari reaksi pengendapan. Misalnya, jika komponen mengandung ikatan karbon-karbon tidak jenuh pada substituen alkilnya, maka ikatan ini mampu menghilangkan warna dari permanganat atau bromin.

Prosedur: sekitar 50 mg derivat asam barbiturat dilarutkan dalam 5 mL larutan natrium karbonat 5%. Ditambahkan 5 tetes larutan kalium permanganat 0,1 N, hasil uji positif ditandai dengan hilangnya warna dari permanganat dan diikuti dengan timbulnya warna coklat.

Uji permanganat untuk heptabarbital, jika dilakukan dalam natrium hidroksida 2 N akan menimbulkan warna hijau.

Semua turunan barbiturat 5,5-disubstitusi dan asam tiobarbiturat akan membentuk derivat xantil yang tidak larut, sementara derivat N-metil tidak memberikan endapan pada kondisi pengujian seperti yang dijelaskan berikut ini.

Prosedur: Sebanyak 30 sampai 50 mg dari sampel dan xanthidrol dua kali bobot sampel dilarutkan dalam 0,5 sampai 1 mL asam asetat glasial. Larutan dipanaskan selama 1 menit lalu didinginkan. Endapan kristalin halus akan terbentuk secara perlahan jika barbiturat tidak

mengandung N-substituen. Pembentukan endapan dapat terjadi dalam beberapa jam.

D. Pembuatan Derivat Asam Barbiturat

Perbedaan titik leleh dari senyawa turunan barbiturat merupakan dasar untuk penentuan bentuk kristal yang berbeda. Asam barbiturat harus direkristalisasi terlebih dahulu sebelum penentuan titik lelehnya.

Beberapa derivat dari asam barbiturat dengan titik leleh yang tinggi dapat dibuat. Umumnya dapat dibuat sebagai derivat *p*-nitrobenzil dan xantil.

Prosedur *derivat p-nitrobenzil*: sekitar 0,02 mol natrium karbonat dan 0,02 mol asam barbiturat dilarutkan dalam air mendidih secukupnya hingga menghasilkan larutan jenuh. Larutan ini ditambahkan 0,04 mol *p*-nitrobenzilbromida yang dilarutkan dalam alkohol 2 kali volume larutan *aqueous*. Campuran ini direfluks selama setengah hingga satu jam. Setelah didinginkan, endapan kristal dipisahkan dengan cara difiltrasi dan dicuci dengan air. Kristal ini kemudian direkristalisasi dengan campuran kloroform-alkohol.

Prosedur *derivat xanthil*: satu gram xanthidrol dilarutkan dalam 10 mL asam asetat glasial, ditambahkan 0,6 g barbiturat dan larutan dipanaskan diatas *water bath* selama 30 menit, kemudian didinginkan. Endapan kristal akan muncul segera atau belum terbentuk hingga hari berikutnya. Endapan kemudian dicuci dengan 20 mL etanol dan direkristalisasi lagi dengan sejumlah kecil *n*-amil asetat : aseton (1:1). Kristal dapat dipisahkan dalam beberapa jam.

Tabel 7.2 : Titik leleh (°C) beberapa derivat p-nitrobenzil dan xanthil dari barbiturat.

Asam Barbiturat	Derivat <i>p</i> -Nitrobenzil	Derivat xanthil
Aprobarbital	192-193	230-231
Amobarbital	169-172	253-254
Cyclopal	182	135
Dial	131-133	227-228
Probarbital	157-157,5	212-214
Phenobarbital	182-184	220-221
Pentobarbital	151-153	223
Butethal	148-149	253-254
Propallylonal	204-206	255-256
Thiopental		167-168
Butallylonal	191,5	251
Cyclobarbital	198,5	248
Secobarbital	158	183
Barbital	195	246-248
Dormin	196-199	242
Dormovit	184,5	
Rutonal	188	282


Beberapa derivat dapat juga dibentuk dengan p-klorobenzil, o-klorobenzil, p-bromobenzil, dan o-bromobenzil, juga kompleks Cu-piridin.

E. Metode Analisis Kuantitatif

1. Titrasi Asam - Basa

Semua barbiturat dapat ditetapkan sebagai asam berbasa satu. Titrasi dalam air dihindari karena sifat keasaman barbiturat yang lemah dan kelarutannya dalam air kecil. Oleh karena itu, dilarutkan dengan pelarut campuran air-alkohol atau alkohol.

Cara penetapan kadar barbital dengan metode alkalimetri: sejumlah sampel yang setara dengan lebih kurang 500 mg ditimbang seksama, dilarutkan dalam 40 mL etanol 95% dan 25 mL air. Larutan dititresi dengan natrium hidroksida 0,1 N menggunakan indikator timolftalein dan dilakukan titrasi blanko. Tiap mL natrium hidroksida 0,1 N setara dengan 18,42 mg barbital.




Gambar 7.3. Reaksi antara turunan barbiturat dengan metode alkalimetri

Natrium barbiturat dapat dititresi dengan baku asam dengan indikator jingga metil. Dalam kasus ini, perlu ditambahkan kloroform dan dikocok terus menerus untuk melarutkan asam bebas yang terjadi selama titrasi. Titrasi yang paling cocok untuk barbiturat dilakukan dalam suasana bebas air.

Cara penetapan kadar fenobarbital dengan metode titrasi bebas air adalah sebagai berikut: sejumlah sampel yang setara kurang lebih 500 mg yang ditimbang seksama dan dilarutkan dalam 20 mL dimetilformamida. Larutan dititresi dengan litium metoksida 0,1 N dengan menggunakan indikator timolftalein atau secara potensiometri. Dilakukan juga titrasi blanko. Tiap mL

larutan litium metoksida 0,1 N setara dengan 23,22 mg fenobarbital.



Gambar 7.4. Reaksi antara fenobarbital dengan litium metoksida


Natrium barbiturat juga dapat ditetapkan secara titrasi bebas air dengan menggunakan pelarut asam asetat glasial atau campuran propilenglikol - isopropanol dan larutan baku asam perklorat.

2. Titrasi Konduktometri

Monzon, *at al*, 2008 telah mengembangkan sebuah pengujian yang sederhana dan dapat diandalkan untuk Fenobarbital dalam tablet, dengan metode titrasi *conductimetric* yang dimodifikasi. Penggunaan penambahan amonium hidroksida meningkatkan keasaman Fenobarbital dan diikuti dengan penentuan secara tidak langsung dengan NaOH sebagai titran.

Prosedur: Standar Fenobarbital ditimbang, ditransfer ke seltitrasi; ditambahkan 100mL air suling dan diaduk dengan pengaduk magnetis selama 20 menit. Setelah pengadukan, ditambahkan 0,35 mL amonium dan larutan dititrasi dengan 0,5 M NaOH. Untuk kalibrasi pengukur konduktivitas digunakan 0,01 M KCl. Elektroda dimasukkan ke dalam larutan titrasi, dan konduktivitas tercatat pada saat yang sama dari penambahan masing-masing volume titran.

Analisis Fenobarbital dalam tablet: Dua puluh tablet ditimbang dan berat rata-rata dihitung sebelum digerus menjadi bubuk halus. Serbuk tablet setara dengan berat rata-rata satu tablet (250mg) ditimbang dan dimasukkan ke seltitrasi; ditambahkan 100mL air suling dan diaduk dengan pengaduk magnetis selama 20 menit. Setelah pengadukan, ditambahkan 0,35 mL amonium dan larutan dititrasi dengan 0,5 MNaOH. Titrasi diulang lima kali dan nilai rata-rata dihitung. Mengingat perubahan volume, nilai-nilai yang diamati dikoreksi dengan faktor pengenceran. Titik akhir dalam titrasi *conductimetric* diperoleh dari plot dengan ekstrapolasi dari dua cabang linier.




Gambar 7.5. Kurva titrasi konduktometri dari a) Fenobarbital baku, b) Fenobarbital tablet, c) placebo, dengan NaOH 0,5 M.


3. Metode Argentometri

Dalam suasana basa, barbiturat dan perak nitrat akan membentuk garam yang larut. Reaksi ini tergantung suasana larutannya. Reaksi yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut:


a. Pada pH 8-9




Kekeruhan pada titik akhir titrasi disebabkan oleh:



b. Pada pH > 11



Kekeruhan pada titik akhir disebabkan oleh:



Metode Budde untuk penetapan kadar turunan asam barbiturat secara argentometri berdasarkan pada reaksi ini.

Cara penetapan kadar barbiturat secara argentometri:

Sejumlah sampel yang setara dengan 200 mg barbiturat ditimbang seksama dan dilarutkan dalam 30 mL natrium karbonat 3%. Larutan dititrasi dengan perak nitrat 0,1 N sampai terjadi kekeruhan yang tetap yang pertama. Tiap mL perak nitrat 0,1 N setara dengan 1/10 berat molekul barbiturat.

Schulek dan Rozsa telah memodifikasi metode Budde ini dengan cara melarutkan sampel dalam natrium tetraborat 5% dan dititrasi dengan perak nitrat 0,1N menggunakan indikator kalium kromat. Reaksi ini hanya berlaku pada barbiturat yang kedua atom nitrogennya tidak tersubstitusi, seperti barbital. Dalam kasus ini, 1 mol barbiturat setara dengan 2 mol perak.

Metode Schulek dan Rozsa: sejumlah sampel yang setara dengan lebih kurang 125 mg barbital

ditimbang seksama, dilarutkan dalam 25 mL natrium tetraborat 5% dan dipanaskan. Larutan ditambah indikator kalium kromat 10% dan larutan yang masih panas ini dititrasi dengan perak nitrat 0,1 N sampai terjadi perubahan warna suspensi dari kuning hijau menjadi merah yang stabil pada pendidihan. Tiap mL perak nitrat setara dengan 9,20 mg barbitol.

4. Penetapan secara potensiometri

Penetapan kadar secara potensiometri dapat dilakukan dengan metode argentometri dengan menggunakan elektroda baku perak-perak klorida dan elektroda indikator perak. Dengan metode ini akan didapatkan hasil yang lebih tepat dan teliti.

Penyiapan sampel:

Jika tidak ada stearat:

Sejumlah sampel yang setara dengan 200 mg barbiturat ditimbang secara seksama dan dilarutkan dalam 50 mL natrium karbonat 3% dan 25 mL aseton. Tambahkan air sampai 100 mL.

Jika ada stearat:

Sejumlah sampel yang setara lebih kurang 500 mg barbiturat ditimbang seksama, dilarutkan dalam 125 mL natrium karbonat 3%, ditambah 63 mL aseton. Encerkan dengan air hingga 250 mL. Larutan ini disaring dengan kertas saring, 25 mL filtrat pertama dibuang. Sebanyak 100 mL filtrat ini dipipet untuk penetapan kadar.

Cara penetapan kadar:

Larutan sampel dititrasi dengan perak nitrat 0,1 N secara potensiometri. Elektroda perak sebagai elektroda indikator dicelupkan ke dalam larutan

yang dititrasi. Elektrode kalomel jenuh dicelupkan di tempat lain yang mengandung kalium klorida jenuh. Kedua gelas piala tersebut dihubungkan dengan jembatan pipa U yang berisi suatu gel yang terdiri atas 3 g agar, 20 g kalium nitrat, dan 100 mL air. Dibuat kurva antara potensial terhadap volume titrasi. Titik akhir ditunjukkan dengan kenaikan potensial yang tajam pada kurva tersebut. Tiap mL perak nitrat 0,1 N setara dengan 1/10 berat molekul mg barbiturat.

5. Metode Bromometri


Beberapa barbiturat memiliki substituen pada posisi 5 yang merupakan gugus yang tidak jenuh, seperti dial. Gugus ini dapat dititrasi secara kuantitatif dengan metode bromometri.

Cara penetapan kadar dial: sejumlah sampel yang setara dengan lebih kurang 125 mg ditimbang seksama dan dilarutkan dalam 50 mL kloroform. Larutan ditambah kalium bromat 0,1 N dan 5 g kalium bromida, serta 5 mL asam sulfat 2 N. Larutan dikocok baik-baik dan didiamkan pada tempat gelap selama 1 jam. Larutan ditambahkan 10 mL kalium iodida 10% dan iodium yang bebas dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 N dengan menggunakan indikator 1 mL larutan kanji 1%. Setiap ikatan rangkap bereaksi dengan 2 atom brom. Tiap mL kalium bromat 0,1 N setara dengan 5,25 mg dial.

6. Metode Spektrofotometri.

Turunan asam barbiturat menunjukkan absorbansi yang spesifik pada daerah ultraviolet. Ionisasi asam barbiturat menyebabkan perubahan pada

spektranya. Reaksi ionisasi senyawa turunan asam barbiturat dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 7.6. Reaksi ionisasi turunan asam barbiturat dalam larutan dapar pH 9,9 dan natrium hidroksida 1N

Senyawa barbiturat pada posisi 5,5- tersubstitusi merupakan asam berbasas dua karena atom hidrogen pada atom nitrogen dapat terionisasi. Asam ini mempunyai nilai pK_{a1} lebih kurang 8 dan pK_{a2} lebih kurang 12. Senyawa turunan asam barbiturat menunjukkan spektra yang serupa.

Tabel 7.3 : Spektra asam barbiturat 5,5- tersubstitusi

Pelarut	Panjang gelombang (nm)		
	Maksimum	Minimum	Titik isokratik
Asam 0,1 N	-	-	221-223
Dapar pH 9,5-10,5	238-241	-	226-228
Basa 0,5 N	252-255	232-235	247-249

Senyawa N-metil-5,5-R,R barbiturat hanya mempunyai satu atom hidrogen yang mudah terionisasi, sehingga larutan dalam basa kuat tidak akan menunjukkan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 235 nm

Tiobarbiturat dalam suasana asam menunjukkan absorbansi maksimum pada panjang gelombang kira-

kira 240 nm dan 285 nm, dalam dapar pH 10 menunjukkan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 252 nm dan 305 nm. Sementara dalam larutan basa kuat, tiobarbiturat menunjukkan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 305 nm dan minimum pada panjang gelombang 247 nm.

Kestabilan barbiturat sangat rendah dalam suasana basa, sehingga absorbansi barbiturat dalam natrium hidroksida sebaiknya diukur dalam satu jam.

a. Penyiapan sampel

Jika dalam sampel mengandung bagian dari bahan yang mengalami dekomposisi yang akan mempengaruhi absorpsi (aspirin, asam salisil, dan sebagainya), maka disarankan untuk melakukan tahapan ekstraksi sebelum melakukan analisis. Hasil ekstraksi adalah larutan barbiturat dalam larutan natrium hidroksida yang dapat digunakan untuk pengukuran spektrofotometrik setelah penyesuaian pH, atau barbiturat dapat diperoleh sebagai residu yang dikeringkan yang kemudian dilarutkan dengan pelarut yang sesuai.

Prosedur untuk tablet:

Sejumlah serbuk tablet yang setara dengan 25 mg fenobarbital ditimbang secara seksama dan dimasukkan ke dalam labu ukur 250 mL dan dilarutkan. Larutan kemudian diencerkan hingga tanda dan disaring dengan kertas *Whatman* No.41. 25 mL filtrat pertama dibuang. Sebanyak 10 mL aliquot dari filtrat diencerkan hingga 100,0mL dengan pelarut dan absorbansinya diukur. Keberadaan stearat dalam sampel tidak mempengaruhi hasil pengukuran. Prosedur ini dapat dilakukan untuk sediaan kapsul.

Prosedur untuk eliksir:

Sebanyak 5 mL eliksir dipipet ke dalam labu ukur 100 mL, kemudian ditambahkan pelarut yang sesuai. Sebanyak 5,0mL dari aliquot larutan ini diencerkan hingga 100,0mL dan diukur absorbansinya terhadap larutan blanko yang dibuat dari basis eliksir.

b. Pengukuran

Berbagai pendekatan telah dilakukan dalam pengukuran barbiturat dengan spektrofotometer ultraviolet. Senyawa ini dapat dilarutkan dalam alkali kuat dan absorbansinya diukur pada panjang gelombang maksimum 255 nm. Sementara larutan dalam bufer pH 10 diukur pada panjang gelombang 240 nm.

Larutan yang dibuat mengandung barbiturat 1-2,5 mg per 100 mL. Larutan dengan pH 10 dapat dibuat dalam dapar borat atau dapar karbonat atau dalam amonia 0,1 - 1%. Larutan asam dibuat dalam asam klorida atau asam sulfat. Jika larutan alkali kuat digunakan, maka harus dibuat dalam natrium hidroksida 0,45 N. Kedua larutan ini harus mengandung konsentrasi barbiturat yang sama. Pengukuran dibuat terhadap blanko yang sesuai.

7. Metode kolorimetri dengan garam kobalt

Reaksi Parri dapat digunakan sebagai dasar analisis kuantitatif dengan metode ini. Larutan kobalt asetat disiapkan dengan mengencerkan 125 mg kobalt asetat dalam 100 mL metanol anhidrat.


Larutan isopropilamin disiapkan dengan mengencerkan 25 mL isopropilamin dengan metanol anhidrat sampai 100 mL.

Cara penetapan kadar secara kolorimetri: sejumlah sampel yang setara dengan 25-60 mg barbiturat

ditimbang seksama dan dilarutkan dalam kloroform sampai 50,0mL. Pada 5,0 mL larutan tersebut ditambahkan 5 mL larutan isopropilamin dan 5 mL larutan kobalt asetat, lalu diencerkan dengan kloroform sampai 25,0mL. Absorbansi larutan diukur pada panjang gelombang 565 nm dengan menggunakan pereaksi blanko.

Tiobarbiturat dapat ditetapkan dengan cara yang sama. Sedangkan tiopental menunjukkan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 400 nm disamping 565 nm.

Metode kolorimetri yang lain untuk penetapan asam barbiturat dilakukan oleh Bartzatt. Metode uji yang dilakukan oleh Bartzatt ini bersifat spesifik karena struktur cincin dalam barbiturat merupakan prasyarat untuk terbentuknya turunan asam violurat yang berwarna merah-violet (gambar 7.7). Metode ini dapat digunakan untuk analisis sampel, baik dalam bentuk cair ataupun padat.



Gambar 7.7. Reaksi pembentukan turunan asam violurat yang berwarna merah-violet dari asam barbiturat.

Warna merah dari turunan asam violurat ini dibentuk berdasarkan pada reaksi antara asam barbiturat dengan natrium nitrit dalam suasana asam. Reaksi ini tidak menyebabkan perubahan temperatur yang signifikan. Pembentukan asam violurat

berlangsung pada suhu ruangan dalam waktu kurang dari 2 menit dan stabil selama 24 jam pada suhu 25°C.

Larutan asam barbiturat yang telah diketahui konsentrasinya digunakan sebagai larutan baku. Cara analisis asam barbiturat dengan metode ini adalah sebagai berikut:

Sejumlah tertentu larutan (1,0 - 3,0 mL) atau sampel padat yang telah dilarutkan dalam volume yang sama ditambah dengan 0,50 mL NaNO_2 jenuh dalam air. Larutan selanjutnya ditambah dengan 0,10 mL asam asetat 2M dan dicampur. Larutan ditambah air secukupnya hingga volume akhir 4,00 mL. Absorbansi larutan dibaca pada panjang gelombang 530 nm. Sebagai blanko digunakan NaNO_2 , asam asetat dan air.

8. Metode Kromatografi

Tiopental dan metabolit utamanya (pentobarbital) dalam plasma telah dianalisis dengan menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi (Schmid and Wolf, 1989). Eluat yang keluar dari kolom dilakukan penyinaran dengan sinar ultraviolet secara *on line* sehingga akan menyebabkan pergeseran spektra pentobarbital ke arah panjang gelombang yang lebih besar (batokromik), akibatnya kedua senyawa ini menjadi sensitif terhadap detektor UV pada panjang gelombang 270 nm.

Pentobarbital yang tidak disinari dengan UV tidak menunjukkan absorbansi yang signifikan pada panjang gelombang di atas 240 nm, sementara itu setelah disinari dengan sinar UV dengan sumber sinar merkuri akan muncul spektra di daerah 270 nm. Reaksi fotokimia dapat diamati dalam waktu yang relatif singkat.

Tiopental menunjukkan pita spektra di daerah 285 nm karena tidak ada pengaruh yang signifikan yang disebabkan oleh penyinaran dengan sinar UV secara *online*. Larutan stok tiopental dan pentobarbital disiapkan dalam metanol dengan konsentrasi 1 mg/mL. Kurva kalibrasi disiapkan dengan konsentrasi 0,2-50 µg/mL yang dibuat dengan mengencerkan larutan baku stok dan memasukkan dalam plasma darah kontrol yang diperoleh dari suatu rumah sakit.

Penyiapan sampel: sejumlah volume plasma darah dan asetonitril dicampur dan dikocok kuat. Protein yang terendapkan selanjutnya disentrifugasi dengan kecepatan ± 10.000 xg selama 3 menit. Sebanyak 20,0 µL supernatan diinjeksikan ke dalam KCKT.

Pemisahan tiopental dan pentobarbital dengan KCKT dilakukan dengan kolom yang pendek (*Whatman PartiSphere C8*, 11 cm x 0,46 i.d). Fase gerak yang digunakan adalah asetonitril 50% dalam bufer fosfat 120 mM pH 6,2. Pada kondisi ini, pentobarbital akan terelusi pada waktu retensi 4,25 menit.


Pentobarbital dan natrium pentobarbital dalam sediaan farmasi telah dianalisis dengan metode KCKT oleh Morley dan Erlord. Pemisahan dilakukan dengan kolom Nucleosil C-18 (15 cm x 0,46 cm dengan ukuran partikel 5 mikron). Fase gerak yang digunakan adalah dapar fosfat 0,01 M pH 3,5-asetonitril (72:28) yang diantarkan secara isokratik. Detektor yang digunakan adalah spektrofotometer UV pada panjang gelombang 214 nm.

VIII

SULFONAMIDA

A. Pendahuluan








Senyawa golongan sulfonamida yang memiliki efek farmakologi memiliki rumus umum $R_1NHC_6H_4SO_2NR_2R_3$. Mayoritas gugus amin dan gugus sulfonamid terletak pada posisi para satu sama lain. Pada umumnya, R_1 dan R_2 merupakan atom hidrogen sementara R_3 adalah gugus yang bervariasi.



Gambar 8.1. Struktur umum sulfonamida

Tabel 8.1. Rumus bangun dan berat molekul berbagai sulfonamida

No	Nama Sulfonamida	Rumus Struktur	BM
1	Sulfanilamid		172,21
2	Sulfaguanidin		232,26

3	Sulfadiazine		250,28
4	Sulfamerazin		264,31
5	Sulfametazin		278,33
6	Sulfasomidin		278,33
7	Sulfathiazole		255,3
8	Sulfisoksazol		267,31
9	Sulfapiridin		249,3

Bentuk sediaan yang umum dari senyawa obat sulfonamida termasuk diantaranya adalah tablet, suspensi, larutan parenteral, larutan oftalmik, dan

ointment. Golongan sulfonamida bersifat bakteriostatik, namun pada kadar tinggi dalam urin, sulfonamida dapat bersifat bakterisid. Dalam hubungannya dengan beberapa prosedur kolorimetri, suatu pembandingan dibuat untuk metode klinik untuk menentukan sulfonamida dalam cairan biologis dan dalam makanan.


Umumnya metode analisis untuk sulfonamida berdasarkan pada gugus amin aromatik primer atau hidrogen asam pada molekulnya. Gugus amin aromatik primer dapat didiazotasi atau dititrasi dalam media *nonaqueous*. Adanya inti benzene dalam strukturnya, memungkinkan kelompok senyawa ini dapat dibrominasi atau diiodisasi. Hidrogen asam dalam sulfonamida dapat dititrasi dengan suatu basa dan lebih baik dalam pelarut bukan air. Beberapa turunan sulfonamida akan membentuk garam perak yang tidak larut sehingga dapat ditentukan dengan metode argentometri. Metode kolorimetri pada sulfonamida dapat dilakukan berdasarkan adanya gugus amin aromatis primer yang dapat didiazotasi dan dikopling dengan naftil etilendiamin sehingga menghasilkan senyawa berwarna.

B. Metode Penetapan Kadar Sulfonamida

1. Metode Diazotasi


Metode diazotasi adalah metode yang paling umum digunakan untuk penentuan gugus amin aromatis primer dari suatu senyawa. Metode ini sangat sesuai untuk senyawa sulfonamida karena adanya gugus amin aromatis bebas atau adanya gugus amin aromatis yang dapat dihasilkan dari reaksi hidrolisis atau reduksi.

Diazotisasi merupakan reaksi antara gugus amin aromatis dengan asam nitrit membentuk garam diazonium, menurut reaksi berikut:



Gambar 8.2. Reaksi antara amin aromatis primer, sekunder dan tersier dengan asam nitrit.

Bila reaksi diazotasi digunakan untuk tujuan analitis, maka sampel dilarutkan dalam suatu asam mineral kuat berlebih, biasanya asam klorida, dan dititrasi dengan larutan standar natrium nitrit. Titik akhir dideteksi secara elektrokimia atau munculnya warna biru ketika menggoreskan beberapa tetes larutan sampel pada kertas kanji iodida, atau pasta kanji iodida sebagai indikator eksternal. Kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi iodida pada kertas indikator dan membebaskan iodine yang akan membentuk warna biru dengan amilum.



Indikator lain yang sering digunakan adalah indikator dalam yang terdiri dari campuran tropeolin OO dan metilen biru. Tropeolin OO merupakan indikator asam basa yang berwarna merah dalam suasana asam dan berwarna kuning bila dioksidasi oleh asam nitrit, dan perubahan warna ini tidak reversibel. Sedangkan metilen biru sebagai pengkontras warna sehingga pada titik akhir titrasi akan terjadi perubahan dari ungu menjadi biru sampai hijau.


Selain itu, dapat juga digunakan indikator redoks difenil benzidin disulfonat sebagai indikator dalam. Indikator ini dibuat dengan mengoksidasi sebagian asam difenilbenzidin disulfonat dengan kalium bikromat. Pada titik akhir titrasi terjadi perubahan warna kuning menjadi violet. Selama diazotasi, beberapa sulfonamida menghasilkan warna kuning tua sehingga menutupi perubahan indikator, tetapi titik akhir ini masih dapat ditetapkan bila pada titrasi dilakukan penyinaran dengan lampu kuning seperti lampu natrium.


Hampir semua gugus amin aromatik dapat didiazotasi, tetapi beberapa diantaranya bereaksi secara lambat sehingga tidak dapat ditentukan dengan metode titrasi langsung. Dalam kasus ini, reaksi diazotasi harus dikatalisis dengan penambahan kalium atau natrium bromida. Pada kasus yang lain dibutuhkan adanya penambahan nitrit secara berlebihan. Setelah reaksi diazotasi terjadi sempurna, kelebihan nitrit dititrasi dengan asam sulfanilat, dan kelebihan sulfanilat dititrasi kembali dengan natrium nitrit. Suatu prosedur alternatif kadang-kadang digunakan jika amin hidroklorida tidak larut dan senyawa yang terbentuk merupakan garam yang larut dengan alkali. Sampel ini harus dilarutkan dalam natrium hidroksida. Dalam kondisi ini, reaksi

diazotasi akan terjadi dengan cepat sehingga tidak ada kesulitan yang timbul akibat terjadinya endapan sebelum terjadi diazotasi.

Senyawa amin yang lain, khususnya nitroamin aromatik, akan menghasilkan garam diazonium yang potensial oksidasinya tinggi sehingga kelebihan asam nitrit tidak dapat ditentukan dengan keberadaan senyawa diazonium. Pada saat titrasi dimulai, akan timbul warna biru tua ketika larutan digoreskan pada kertas kanji iodida. Kesulitan ini kemungkinan terjadi karena penggunaan kalium iodida dalam jumlah yang kecil. Normalnya, dibutuhkan beberapa detik untuk pembentukan warna biru dengan garam nitro diazonium, sementara warna yang timbul diakibatkan oleh kehadiran asam nitrit terjadi seketika. Dalam hal ini mungkin dibutuhkan untuk melakukan titrasi secara potensiometri untuk menghilangkan gangguan tersebut.

Jika gugus amino tidak dalam bentuk bebas, seperti dalam struktur suksinil sulfatiazol dan ftalil sulfatiazol, maka gugus asil harus dihidrolisis dengan asam atau alkali encer untuk membentuk amin yang dapat didiazotasi. Reaksi yang terjadi pada hidrolisis ftalil sulfatiazol pada penetapan kadarnya secara diazotasi dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 8.3. Reaksi hidrolisis ftalisulfatiazol dan penentuan secara diazotasi

Penentuan Sulfadiazin


Reagen: Natrium nitrit 0,1 M. Larutan ini distandarisasi terhadap asam sulfanilat baku USP.

Indikator kanji iodida: Indikator ini dibuat sesuai dengan prosedur dalam Farmakope. Ditambahkan larutan dari 750 mg KI dalam 5 mL air yang ditambahkan ke dalam 100 mL air panas. Kemudian 2 g zink klorida dilarutkan dalam 10 mL air. Larutan ini dipanaskan hingga mendidih, dan ditambahkan suspensi 5 g amilum solani dalam 30 mL air dingin sambil diaduk. Larutan ini dididihkan selama lebih dari 2 menit kemudian didinginkan.

Prosedur: sebanyak kurang lebih 500 mg sulfadiazine ditimbang seksama, dilarutkan dalam 10 mL asam klorida pekat dan 75 mL air (jika perlu hangatkan sampai larut) lalu dinginkan. Larutan dititrasi perlahan-lahan dengan larutan baku natrium nitrit 0,1 N pada suhu tidak lebih dari 15°C. Natriumnitrit ditambahkan dengan kecepatan 4-8 mL permenit sampai lebih kurang 1 mL sebelum titik akhir, kemudian penambahan dilakukan lebih lambat hingga satu tetes larutan segera memberikan warna biru pada kertas kanji iodida. Titrasi dianggap selesai jika titik akhir dapat ditunjukkan lagi setelah larutan dibiarkan selama 1 menit. Titik akhir juga dapat ditentukan secara

potensiometri. Tiap mL natrium nitrit 0,1 N setara dengan 25,03 mg sulfadiazine.

Pada penetapan sulfadiazine di atas, reaksi yang terjadi adalah:



Gambar 8.4. Reaksi penetapan kadar sulfadiazin dengan metode diazotasi.

Keuntungan utama dari metode diazotasi adalah metode ini dapat diterapkan pada hampir semua senyawa sulfonamida. Selain itu natrium nitrit merupakan senyawa baku yang stabil dan mudah dibakukan. Kerugiannya adalah titrasi harus dilakukan perlahan-lahan dan metode nitrimetri ini kurang spesifik. Pada permulaan penggunaan indikator luar agak sulit dalam menetapkan titik akhirnya, tetapi dengan sedikit latihan, kesulitan ini akan mudah diatasi. Dan jika titik akhir ditetapkan secara potensiometri akan menunjukkan ketelitian yang tinggi.


2. Titrasi Bebas Air

Titrasi bebas air seringkali digunakan untuk menetapkan senyawa yang bersifat sebagai asam lemah atau basa lemah. Untuk penetapan senyawa yang bersifat basa lemah, maka dibutuhkan suatu pelarut yang lebih asam dari air, misalnya asam asetat glasial. Sebaliknya, untuk menitrasi senyawa asam lemah, maka dibutuhkan pelarut yang lebih basa dari air. Pelarut basa


yang umum diantaranya adalah dimetilformamida, butilamin, dan etilendiamin. Baik basa lemah atau asam lemah akan menunjukkan kekuatan yang sama bila dilarutkan dalam asam asetat glasial. Dengan memilih pelarut yang lebih lemah sifat asamnya, misalnya asetoneitril. Fritz telah mampu membedakan antara amin aromatik dengan amin alifatik dengan menggunakan asam perklorat sebagai titran.

Etilendiamin dan butilamin merupakan basa yang lebih kuat dari dimetilformamida, dan tentu saja sifat asamnya lebih lemah, sehingga dapat dititrasi dalam kedua pelarut ini. Dengan memilih pelarut yang berbeda sifat asam dan sifat basanya, dan dengan indikator yang sesuai, maka banyak jenis senyawa yang dapat dititrasi.


Beberapa antidiabetik oral dapat ditetapkan secara titrasi asam basa karena memiliki gugus $-SO_2NH-$. Beberapa jenis titrasi bebas air yang dapat diterapkan pada senyawa sulfonamida. Karena sifat asamnya dihasilkan oleh adanya gugus $-SO_2NH-$, maka sulfonamida dapat dititrasi dengan larutan basa. Daftar pelarut yang dapat digunakan adalah alkohol, aseton, dimetilformamida, dan dibutilamin dengan alkali *aqueous*, natrium metoksida anhidrat, atau basa-basa kuarterner sebagai titran. Beberapa sulfonamida juga dapat dititrasi sebagai basa dalam asam asetat glasial menggunakan asam perklorat sebagai titran. Pada kasus yang terakhir ini, sifat basa dari sulfonamida terlalu lemah sehingga membatasi penggunaan indikator yang tersedia.




Klorpropamid



Glibenklamid



Tolbutamid



Talsiklamid

Gambar 8.5. Beberapa struktur kimia antidiabetik oral

Penentuan Sulfisoksazol


Reagen : Dimetilformamida (kualitas teknis); Natrium metoksida (0,1N). Larutan standar ini dibuat sesuai metode Fritz dan Lisicki dengan menambahkan sekitar 6 g logam natrium pada 100 mL metanol, kemudian didinginkan dalam air es. Bila reaksi telah sempurna, tambahkan 150 mL metanol dan 1500 mL benzene, kemudian larutan disimpan dalam wadah borosilikat, bebaskan dari karbondioksida dan kelembaban.

Larutan indikator biru timol 0,3% dalam metanol, asam benzoat.

Standarisasi: larutan natrium metoksida distandarisasi terhadap asam benzoat dengan menggunakan dimetilformamida sebagai pelarut dan biru timol sebagai indikator. Sekitar 400 mg asam benzoat dilarutkan dalam 80 mL dimetilformamida dalam labu ekstraksi 200 mL. Setelah penambahan sekitar 10 tetes indikator biru timol, larutan dititrasi dengan natrium metoksida hingga warna biru sebagai titik akhir. Lakukan titrasi blanko.

Prosedur:

Sekitar 800 mg sulfisoksazol ditimbang seksama, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL dan dilarutkan dengan 50 mL dimetilformamida, kocok bila perlu. Setelah penambahan 5 tetes larutan indikator biru timol, larutan dititrasi dengan natrium metoksida hingga muncul warna biru sebagai titik akhir.




Gambar 8.6. Reaksi penetapan kadar sulfisoksazol dengan metode TBA menggunakan larutan baku Litium metoksida.

Dengan menggunakan sistem bebas air dengan pelarut dimetilformamida atau butilamin dan titran natrium metoksida dalam benzene metanol, semua sulfonamida yang mempunyai hidrogen asam dapat dititrasi. Sulfatiazol, sulfadiazin, sulfametazin, suksinil sulfatiazol, ftalazol dapat dititrasi dalam dimetil formamida dengan indikator biru timol. Sulfanilamid terlalu lemah keasamannya untuk dititrasi dalam pelarut

tersebut sehingga diperlukan pelarut yang lebih basa seperti butilamin atau etilen diamin dengan indikator azoviolet.

Campuran sulfanilamid dan sulfonamid lainnya dapat ditetapkan tanpa pemisahan terlebih dahulu. Pertama dititrasi dalam pelarut dimetilformamida dengan indikator biru timol. Dalam hal ini, sulfanilamid tidak dapat ditetapkan. Dengan melakukan titrasi dalam pelarut butilamin dengan indikator azoviolet, maka akan diperoleh kadar sulfonamida, sehingga dengan demikian dapat dihitung kadar sulfanilamidnya.

Sulfaguanidin tidak dapat dititrasi dengan semua metode asidi-alkalimetri (termasuk TBA) sebab sulfaguanidin tidak mengandung hidrogen asam karena adanya efek mesometri menurut reaksi:



Gambar 8.7. Reaksi mesomeri sulfaguanidin

Sebagai titran dalam titrasi bebas air, sebaiknya digunakan baku litium metoksida karena pembuatannya lebih aman dan tidak membentuk endapan gelatinous. Dalam pelarut basa, karbondioksida bersifat sebagai asam kuat dan akan mengganggu titrasi. Oleh karena itu, titran dan sampel harus dihindarkan dari karbondioksida.

Penetapan titik akhir dapat dilakukan secara potensiometri dengan elektroda gelas-antimon untuk pelarut basa, sedangkan untuk pelarut benzen atau alkohol lebih baik digunakan elektrode kalomel-




antimon. Dalam pelarut basa, elektroda kalomel sebagai elektroda indikator, sementara elektroda gelas sebagai indikator baku.


Keuntungan utama dari titrasi bebas air pada sulfonamid adalah bahwa dalam banyak hal, perubahan warna indikator pada titik akhir cukup tajam. Selain itu, titrasi dapat dilakukan cukup tepat. Kerugiannya adalah natrium metoksida tidak seestabil natrium nitrit sehingga diperlukan pembakuan kembali setiap satu atau dua hari. Selain itu pelarut organik memiliki koefisien muai yang lebih besar daripada air, sehingga perlu diperhatikan suhu pada saat penetapan.

3. Metode Bromometri

Metode bromometri dan metode argentometri dapat diterapkan untuk sulfonamida, namun penggunaannya tidak seluas penggunaan metode diazotasi dan metode titrasi bebas air.

Sulfonamida dapat bereaksi dengan bromin yang akan mensubstitusi gugus benzen dan dalam beberapa kasus, susbtitusi akan terjadi pada cincin heterosikliknya, menurut reaksi sebagai berikut:





Gambar 8.8. Reaksi antara sulfonamida dengan bromin

Reaksi ini tergantung kepada sulfonamida yang dianalisis, reaksi ini juga tergantung kepada lingkungan. Oleh karena itu kondisi reaksi harus dipertahankan untuk memperoleh hasil yang baik.

Dua prosedur umum yang digunakan: (1) sulfonamida dapat dititrisi langsung dengan bromat dengan keberadaan bromida dan titik akhir ditentukan secara potensiometri atau dengan indikator seperti metil merah. (2) metode yang lain adalah dengan menambahkan bromat dalam jumlah berlebih, kemudian larutan didiamkan hingga waktu tertentu sebelum kelebihan bromat dititrisi kembali dengan mengubahnya menjadi iodium dengan penambahan kalium iodida. Iodium yang dibebaskan kemudian dititrisi dengan natrium tiosulfat. Setiap perlakuan ini memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing.

Kerugian metode bromometri adalah karena teknik ini tidak spesifik. Senyawa fenol seperti asam salisilat dapat mengikat brom sehingga dapat mengganggu penetapan. Selain itu, senyawa yang memiliki atom hidrogen yang mudah tersubstitusi, senyawa tak jenuh dan senyawa yang mudah dioksidasi oleh brom akan mengganggu penetapan dengan cara ini. Sulfonamida yang berbeda akan mengikat jumlah brom yang berbeda pula. Namun demikian, keuntungan dari

metode ini adalah pada titrasi kembali memberikan titik akhir yang jelas.

a. Titrasi Kembali metode Wajahn

Ditimbang seksama 0,2 - 0,3 g sampel sulfadiazin dan dilarutkan dalam sejumlah kecil HCl 3%. Tambahkan 3 g KBr dan HCl pekat secukupnya hingga konsentrasi HCl 25%. Tambahkan larutan baku KBrO_3 0,1 N tetes demi tetes melalui buret hingga larutan berwarna kuning. Tambahkan segera 1 g KI lalu campuran ini dititrasi dengan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1 N dengan menggunakan indikator kanji.

b. Titrasi Langsung metode Wajahn

Metode ini mirip dengan titrasi kembali metode Wajahn, kecuali menggunakan metil merah sebagai indikator internal. Larutan dititrasi dengan KBrO_3 0,1 N dan titik akhir ditandai dengan hilangnya warna merah.

c. Titrasi Kembali metode Conway

Sampel sulfadiazin ditimbang seksama 0,25-0,35 g dan dilarutkan dalam 20 mL NaOH 2% dalam labu erlenmeyer bertutup. Ke dalam larutan ini ditambahkan sejumlah tertentu larutan KBrO_3 -KBr 0,1 N, 80 mL asam asetat glasial dan 5 mL HCl pekat. Tutup labu dan kocok selama 30 detik lalu diamkan selama 1,5 menit. Kelebihan bromin dititrasi dengan arsenit 0,1 N hingga warna bromin hilang.

d. Titrasi Langsung metode Conway

Sampel disiapkan seperti metode di atas. Tambahkan 5 tetes metil merah alkoholik, larutan diasamkan dan dititrasi dengan bromat-bromida hingga warna merah menghilang.

Menurut De Reeder, suatu produk yang tidak larut dapat terjadi dengan metode titrasi kembali Wajahn. Namun demikian, nampaknya hal ini tidak

mempengaruhi hasil analisis. Reaksi antara sulfonamida dengan bromin sebenarnya terjadi dengan cepat pada tahap awalnya, namun cenderung melambat pada akhirnya. Untuk alasan ini, maka reagen harus ditambahkan tetes demi tetes, khususnya pada saat mendekati titik akhir. Kelebihan bromin ditandai dengan adanya warna kuning. Pada metode langsung, endapan dari sulfonamida terbrominasi akan mengadsorpsi beberapa indikator, sehingga kelebihan bromin dibutuhkan untuk menghilangkan warnanya. Penambahan asam asetat akan mencegah pembentukan endapan tersebut.

Tabel 8.3: Ekuivalensi senyawa sulfonamida dengan bromin

No	Sulfonamida	Jumlah mol Br ₂
1	Sulfasetamid	2
2	Sulfadiazin	3
3	Sulfamerazin	3
4	Sulfametazin	2
5	Sulfatiazol	3
6	Sulfapiridin	2
7	Sulfanilamid	2
8	Sulfaguanidin	2

Pada metode Conway, kelebihan bromin harus diusahakan sekecil mungkin untuk mencegah *overbrominasi* dan tidak boleh lebih dari 1 mL. Pada metode titrasi langsung, reaksi berlangsung lambat dan cenderung mengakibatkan hasil yang tinggi, kecuali titrasi dilakukan dengan sangat lambat. Untuk mencegah oksidasi dari indikator sebelum titik akhir


tercapai, De Reeder merekomendasikan bahwa metil merah harus ditambahkan sesaat sebelum titik akhir.

4. Metode Argentometri

Beberapa senyawa sulfonamida akan membentuk garam perak yang tidak larut. Menurut De Reeder, sulfadiazin, sulfamerazin, sulfametazin, sulfapiridin, sulfatiazol, sulfadimetin, dan suksinilsulfatizol dapat ditentukan dengan menggunakan perak nitrat.

Prosedur umum: sebanyak 0,2 - 0,3 g sampel sulfonamida dilarutkan dalam sejumlah kecil NaOH 0,1 N. Larutan disesuaikan untuk memberikan warna biru muda terhadap timolftalein lalu diencerkan dengan 50 mL air. Warna biru dari indikator dihilangkan dengan 1 atau 2 tetes asam sulfat 0,1 N, lalu ditambahkan 25 mL perak nitrat 0,1 N. Diamkan ditempat gelap, pisahkan endapan dengan kertas saring berlapis dan dicuci dengan air. Filtrat diasamkan dengan asam nitrat dan kelebihan perak nitrat dititrasi dengan amonium tiosianat 0,1N dengan menggunakan feri amonium sulfat sebagai indikator. Satu mL perak nitrat 0,1 N setara dengan 0,1 mmol sulfonamida.

Pada penetapan kadar ini, reaksi umum yang terjadi adalah sebagai berikut:



Gambar 8.9. Reaksi antara sulfonamid dengan perak nitrat membentuk endapan perak-sulfonamid

5. Spektrofotometri

a. Spektrofotometri UV

Semua sulfonamida mempunyai spektra yang hampir sama pada daerah ultraviolet karena mempunyai gugus kromofor sama, *p*-anilin sulfonat. Oleh karena itu metode spektrofotometer ultraviolet tidak dapat digunakan untuk penetapan campuran sulfonamida atau menetapkan suatu sulfonamida yang telah terurai. Dengan demikian, sebelum melakukan analisis kuantitatif, maka perlu dilakukan kromatografi lapis tipis untuk memastikan apakah hanya menghasilkan satu bercak atau tidak. Jika hanya menghasilkan satu bercak maka metode spektrofotometri UV dapat diterapkan.

Cara penetapan sulfadiazin dengan spektrofotometri UV dilakukan dengan melarutkan sulfadiazin dalam etanol dan diukur pada panjang gelombang 270 nm. Sebanyak 100 mg sulfadiazin ditimbang seksama, dilarutkan dalam 50 mL etanol. Larutan dimasukkan dalam labu ukur 100 mL dan dicukupkan volumenya hingga batas tanda. Absorbansi larutan diukur pada panjang gelombang 270 nm terhadap blanko etanol. Kadar sampel dihitung sesuai rumus berikut ini:

Kadar sulfadiazin = $A_s / A_b \times \text{konsentrasi baku} \times \text{faktor pengenceran}$.

b. Spektrofotometri sinar tampak / kolorimetri

1). Reaksi dengan 8-hidroksikuinolin

Nagaraja *at al*, 2007, telah mengembangkan metode spektrofotometri untuk penetapan kadar beberapa senyawa sulfonamida. Metode ini berdasarkan pada reaksi diazotasi dari sulfacetamide, sulfadiazine,

sulfaguanidine, sulfamerazine, sulfamethazine, sulfamethoxazole, dan reaksi *coupling* dengan 8-hidroksikuinolin dalam media alkali menghasilkan senyawa yang berwarna merah dan memiliki panjang gelombang maksimum pada 500 nm.

Prosedur:

Pembuatan larutan standar: larutan standar sulfonamida ($1000 \mu\text{g mL}^{-1}$) dibuat dengan melarutkan 100 mg senyawa sulfonamida dalam 2,0 mL asam sulfat 10 mol.L^{-1} kemudian diencerkan dengan air hingga batas tanda dalam labu ukur 100 mL. Larutan kerja standar yang mengandung $25 \mu\text{g.mL}^{-1}$ dibuat dengan pengenceran larutan standar tersebut.


Pengukuran absorbansi: Aliquot dari larutan standar sulfonamida dipindahkan ke dalam labu ukur 25 mL, ditambahkan 1,0 mL asam sulfat. Didinginkan, kemudian ditambahkan 1,5 mL natrium nitrit 1% sambil digoyang-goyangkan. Larutan ini didiamkan selama 5 menit dan ditambahkan 2,5 mL asam sulfamat 2%. Dikocok-kocok dan didiamkan 5 menit. Kemudian ditambahkan 2,0 mL 8-hidroksikuinolin 0,5%, dan ditambahkan 2 mL natrium hidroksida 5 mol.L^{-1} dan dicukupkan volumenya dengan etanol 95% dan dihomogenkan. Setelah didiamkan selama 5 menit, diukur absorbansinya pada 500 nm.

2). Metode Bratton-Marshall


Metode Bratton-Marshall merupakan cara umum untuk penetapan kadar senyawa-senyawa yang mempunyai amin aromatis primer. Metode ini berdasarkan reaksi diazotasi yang diikuti dengan reaksi pengkoplingan garam diazonium dengan N-(1-naftil)-etilen diamin membentuk senyawa yang berwarna ungu

yang dapat diukur absorbansinya pada panjang gelombang 545 nm.


Sebanyak 5,0 mL yang mengandung 0,10 - 0,25 mL sulfonamida dalam alkali 0,5 N, dinetralkan terhadap fenoltalein dengan asam klorida 0,02 N. Larutan ditambah 5 mL asam klorida 0,5 N dan natrium nitrit 0,1%, larutan didiamkan selama 3 menit dan kelebihan asam nitrit dihilangkan dengan menambahkan 5 mL asam sulfamat 0,5%. Larutan selanjutnya ditambah 5 mL N-(1-naftil)-etilen diamin 0,1% dan diencerkan dengan air sampai 50,0 mL. Warna terbentuk sedemikian cepat dan absorbansi diukur dalam waktu 15 detik karena bila dibiarkan lama akan terjadi pengendapan dari zat yang berwarna.



Selanjutnya kelebihan asam nitrit dihilangkan dengan penambahan asam sulfamat menurut reaksi:



Selanjutnya garam diazonium dikopling dengan naftil-etilendiamin sehingga terbentuk senyawa yang berwarna menurut reaksi;



Gambar 8.10. Reaksi penetapan kadar sulfisoksazol dengan metode Bratton-Marshall

3). Metode asam tiobarbiturat

Asam tiobarbiturat merupakan pereaksi yang spesifik untuk sulfadiazin. Inti pirimidin akan tersubstitusi pada posisi 2 dengan pereaksi tiobarbiturat dan membentuk warna merah. Sebagai substitusinya mungkin amina, 2-sulfonamid, 2-sulfamid-5-karboksi, amina 2-fenil sulfamid-5-iod. Akan tetapi jika inti piridin tersubstitusi pada posisi 4 atau 6 tidak akan terbentuk warna. Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan untuk penetapan kadar sulfadiazine yang tercampur dengan sulfonamida lain seperti sulfamerazin dan sulfametazin. Sulfapiridin juga membentuk warna dengan pereaksi ini, tetapi tidak stabil, sehingga tidak akan mengganggu penetapan kadar sulfadiazine. Warna yang terjadi dipengaruhi oleh pH, oleh sebab itu keasaman harus dikontrol pada pH 2.

4). Metode p-benzokuinon

Suatu metode spektrofotometri yang sederhana telah dikembangkan untuk analisis 15 senyawa sulfonamida dalam sediaan farmasi. Metode ini berdasarkan pada interaksi antara p-benzokuinon dengan sulfonamida dalam HCl 0,1M. Kromofor yang dihasilkan dapat diukur absorbansinya pada panjang gelombang 500 nm.

Larutan p-benzokuinon dibuat dengan konsentrasi 2% dalam etanol dan dibuat baru setiap hari.

Larutan standarsulfonamida disiapkan dengan konsentrasi 1 mg/mL dalam etanol. Pengenceran lebih lanjut dengan etanol dilakukan sedemikian rupa sehingga memberikan konsentrasi sulfonamida antara 100-500 µg/mL.

Prosedur: sebanyak 1,0 mL larutan sulfonamida (100 - 500 µg/mL) dipindahkan dengan pipet ke dalam tabung reaksi 20 mL yang mengandung 1 mL larutan p-benzokuinon dan 1 mL HCl 0,1 M. Campuran diletakkan pada penangas air yang suhunya dikontrol pada 90°C selama 10 menit. Larutan didinginkan lalu dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 10 mL dan diencerkan volumenya sampai tanda dengan air. Larutan selanjutnya diukur absorbansinya pada panjang gelombang 500 nm terhadap blanko yang diperlakukan sama dengan perlakuan sampel.

5). Spektrofotometri derivatif

Spektra turunan orde ketiga dan orde keempat telah digunakan untuk penentuan kadar sulfatiazol, sulfanilamide, dan campuran keduanya. Metode ini sesuai untuk sulfatiazol pada kisaran 1-22 µg/mL dan untuk sulfanilamide pada kisaran 0,5 - 4 µg/mL dan

juga dapat digunakan untuk menentukan kadar sulfonamida dalam sediaan farmasi.

Spectra UV larutan sulfatiazol dan sulfanilamide menunjukkan saling tumpang tindih antar keduanya pada semua kisaran pH yang disarankan. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memisahkan keduanya dengan spektrofotometri orde 0.

Prosedur penentuan sulfatiazol dan sulfanilamide: sampel yang mengandung 1-22 $\mu\text{g/mL}$ atau 0,5 - 14 $\mu\text{g/mL}$ sulfanilamid atau campuran keduanya dimasukkan dalam labu ukur 25 mL lalu ditambahkan 5 mL asetat pH 4,5 dan etanol sampai 2,5 mL, diencerkan dengan air sampai 25 mL. Spektra absorpsi sampel direkam dengan kecepatan *scanning* 750 nm/menit pada panjang gelombang antara 200-400 nm. Spektra yang diperoleh dihaluskan menjadi 15 titik halusan. Spektra derivatif orde ketiga direkam dengan $\Delta\lambda = 28 \text{ nm}$; sementara spektra derivatif keempat direkam dengan $\Delta\lambda = 54 \text{ nm}$. Berdasarkan pada spektra ini, maka dikembangkan metode berikut.

Sulfatiazol: kandungan sulfatiazol ditentukan dari spektrum derivatif orde ketiga dengan mengukur signal pada panjang gelombang 297 nm (${}^3\text{D}_{297}$) atau dari spektrum derivatif keempat pada panjang gelombang 290,6 (${}^4\text{D}_{290,6}$) menggunakan titik potong 0 yang bersesuaian dengan sulfanilamide dalam kedua panjang gelombang tersebut.

Sulfanilamide: kandungan sulfanilamide ditentukan dari spektrum derivatif orde ketiga dengan mengukur signal pada panjang gelombang 268 nm (${}^3\text{D}_{268}$) atau dari spektrum derivatif keempat pada panjang gelombang 278 (${}^4\text{D}_{278}$) menggunakan titik potong 0 yang bersesuaian dengan sulfatiazol.

Dalam sediaan farmasi: sejumlah tertentu serbuk tablet diekstraksi dengan etanol dengan bantuan pengocokan mekanik lalu disaring dengan kertas saring dan filtratnya digunakan untuk pengukuran. Sebanyak 2,5 mL sampel diencerkan sampai 100,0 mL dengan etanol. Alikuot larutan diambil; sulfatiazol dan sulfanilamide ditentukan kadarnya sebagaimana di atas.

6. Spektrofluorometri

Madhulika, *at al*, 2011 telah mengembangkan metode spektrofotometri yang sensitif dan sederhana untuk penetapan kadar sulfametoksazol dalam bentuk sediaan farmasi. Metode ini berdasarkan atas pemindaian larutan baku dan sampel dalam metanol. Produk fluoresensi yang terbentuk diukur setelah eksitasi pada 385 nm.

Spektrofluorometri dan fluoresensi yang diinduksi secara fotokimia pada suhu ruangan (*room temperature photochemically-induced fluorescence*, RTPF) telah digunakan untuk penentuan sulfasetamid, sulfaguanidin, dan sulfametazin dalam susu dan sediaan farmasi.

Prosedur analisis untuk metode RTPF: sejumlah aliquot masing-masing larutan sampel ditempatkan dalam kuvet kuarsa dan disinari dengan sinar ultraviolet dari lampu merkuri dalam waktu tertentu pada suhu kamar. Pembacaan intensitas fluoresensi masing-masing larutan sampel dilakukan pada panjang gelombang eksitasi dan panjang gelombang emisi tertentu.

7. Metode Kromatografi

Metode KCKT dengan detektor fluoresensi telah dikembangkan dan divalidasi oleh Maudens, dkk untuk

penentuan 12 senyawa sulfonamida (sulfaguanidin, sulfanilamid, sulfasetamid, sulfadiazin, sulfatiazol, sulfapiridin, sulfamerazin, sulfameter, sulfametazin, sulfametoksipirin, sulfakloropiridazin, dan sulfadoksin) dalam madu dengan melakukan derivatisasi *post-column* menggunakan fluoresamin. Perlakuan sampel meliputi hidrolisis dengan asam diikuti dengan ekstraksi cair-cair dan ekstraksi fase padat pada penukar ion kation yang kuat. Pemisahan kromatografi cair dilakukan selama 45 menit dengan total waktu analisis selama 60 menit.

Pemisahan kromatografi dilakukan dengan kolom Purospher Star RP-18 (15 cm x 0,46 cm i.d dengan ukuran partikel 5 mikron) yang dilengkapi dengan kolom pengaman (0,4 cm x 0,4 cm, dengan ukuran partikel 5 mikron). Elusi dilakukan secara gradien dengan menggunakan campuran dapar asetat 0,0819% b/v 0,020 M, natrium asetat dalam air yang pH nya diatur sampai 4,75 dengan asam asetat-asetonitril (98:2 v/v)(pelarut A) dan campuran bufer asetat yang sama dengan di atas : asetonitril (68 : 32 v/v) (pelarut B) dengan kecepatan alir 0,7 mL/menit. Kondisi elusi gradien awal adalah: pelarut B 2% lalu meningkat hingga pelarut B-nya 35% dalam waktu 31 menit dengan komposisi akhir pelarut B 75% dalam waktu 10 menit. Kolom dibilas selama 7 menit dengan pelarut B konsentrasi 95%. Kondisi awal gradien harus dibuat kembali dengan segera dan kolom dikondisikan selama 12 menit. Reagen penderivat *post-column* merupakan campuran fluoresamin-2-merkptoetanol-asetonitril-bufer fosfat 0,021 M (natrium dihidrogen fosfat monohidrat dalam air 0,276 % b/v yang pHnya diatur 3 dengan asam ortofosfat 85%) dengan perbandingan

campuran (0,025 : 0,2 : 25 : 75 b/v) yang disimpan pada tempat gelap pada suhu 4°C. Sebagai tempat derivatisasi *post-coloumn* digunakan tabung PTFE untuk HPLC (10cm x 1/16 inchi.o.d x 0,25 mm, i.d., 1 inchi = 2,54 cm). Suhu kolom dan tabung reaksi adalah 45°C. deteksi dilakukan pada panjang gelombang eksitasi 420 nm dan panjang gelombang emisi 485 nm.

IX

ANTIHIISTAMIN

A. Pendahuluan

Histamin adalah suatu alkaloid yang disimpan di dalam sel *mast*, dan menimbulkan berbagai proses faal dan patologik. Histamin pada manusia adalah mediator penting untuk reaksi-reaksi alergi yang segera dan reaksi inflamasi, mempunyai peranan penting pada sekresi asam lambung, serta berfungsi sebagai neurotransmitter dan modulator. Efek histamin adalah pada organ sasaran, langsung, atau tidak langsung terhadap aktivasi berbagai sel inflamasi dan sel efektor yang berperan pada penyakit alergi. Histamin berinteraksi dengan reseptor spesifik pada berbagai jaringan target. Reseptor histamin ditemukan pada sel basofil, sel *mast*, neutrofil, eosinofil, limfosit, makrofag, sel epitel, dan endotel. Reseptor histamin dibagi menjadi histamin 1 (H_1), histamin 2 (H_2), dan histamin 3 (H_3).

Histamin dapat menimbulkan efek bila berinteraksi dengan reseptor histaminergik, yaitu reseptor H_1 , H_2 , dan H_3 . Interaksi histamin dengan reseptor H_1 menyebabkan interaksi otot polos usus dan bronki, meningkatkan permeabilitas vaskular, dan meningkatkan sekresi usus, yang dihubungkan dengan peningkatan cGMP dalam sel. Interaksi dengan reseptor H_1 juga menyebabkan vasodilatasi arteri sehingga

permeabel terhadap cairan dan plasma protein yang menyebabkan sembab, pruritik, dermatitis, dan urtikaria. Efek ini di blok oleh antagonis-H1. Interaksi histamin dengan reseptor H2 dapat meningkatkan sekresi asam lambung dan kecepatan kerja jantung. Produksi asam lambung disebabkan penurunan cGMP dalam sel dan peningkatan cAMP. Peningkatan sekresi asam lambung dapat menyebabkan tukak lambung. Efek ini di blok oleh antagonis H2. Reseptor H3 adalah reseptor histamin yang baru di temukan pada tahun 1987 oleh Arrange dan kawan-kawan; terletak pada ujung syaraf jaringan otak dan jaringan perifer yang mengontrol sintesis dan pelepasan histamin, mediator alergi lain, dan peradangan. Efek ini di blok oleh antagonis H3.

B. Antihistamin

Antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada sisi reseptor H1, H2, dan H3. Efek antihistamin bukan suatu reaksi antigen-antibodi karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek antihistamin yang sudah terjadi. Antihistamin pada umumnya tidak dapat mencegah produksi histamin. Antihistamin bekerja terutama dengan menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor khas.


1. Berdasarkan hambatan pada reseptor khas, antihistamin dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :
 - a. Antagonis H1, digunakan untuk pengobatan gejala-gejala akibat reaksi alergi. Antagonis H1 sering pula disebut antihistamin klasik yaitu senyawa dalam konsentrasi rendah dapat menghambat secara

bersaing kerja histamin pada jaringan yang mengandung reseptor H1. Biasa digunakan untuk mengurangi gejala alergi karena cuaca misalnya bersin, gatal pada mata, hidung, dan tenggorokan. Gejala pada alergi kulit, seperti urtikaria dermatitis pruritik dan ekzem.

- b. Antagonis H2 digunakan untuk mengurangi sekresi asam lambung pada pengobatan penderita tukak lambung. Antagonis H2 merupakan senyawa yang menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor H2 sehingga dapat menghambat sekresi asam lambung. Biasa digunakan untuk pengobatan tukak lambung dan usus. Efek samping antagonis H2 antara lain: diare, nyeri otot, dan kegelisahan.
- c. Antagonis H3, sampai sekarang belum digunakan untuk pengobatan, masih dalam penelitian lebih lanjut dan kemungkinan berguna dalam pengaturan sistem kardiovaskular, pengobatan alergi, dan kelainan mental.

2. Penggolongan obat antihistamin menurut struktur kimia :

Secara umum, senyawa antihistamin golongan antagonis H1 memiliki struktur dasar yang terdiri dari 2 cincin aromatik yang terhubung ke karbon pusat, nitrogen, atau oksigen. "Spacer" antara atom pusat dan amina, biasanya terdiri 2-3 karbon (Bisa linear, cincin, bercabang, jenuh, atau tidak jenuh). Bila amina ini dapat tersubstitusi dengan gugus alkil kecil. Kiralitas di X dan adanya cincin yang berbeda akan meningkatkan potensi obat.



Gambar 9.1. Struktur dasar antihistamin antagonis H1

Tabel 9.1. Klasifikasi kimia dari antihistamin antagonis H1


Bromofeniramin Klorfeniramin Deksklorfeniramin Feniramin Dimetinden Tripolidin Akrivastin	Karbinoksamin Klemastin Dimenhidrinat Difenhidramin Doksilamin Feniltoksamin	Antazolin Pirilamin Tripelenamin	Prometazin Mequitazin Trimepazin	Buklizin Siklizin Meklizin Oksatomid Hidoksizin Setrizin Levosetrizin	Azatadin Siproheptadin Ketotifen Loratadin Desloratadin Bilastin Ebastin Terfenadin Feksafenadin Levokabastin Mizolastin Rupatadin

C. Analisis beberapa senyawa antihistamin

1. Analisis siproheptadin HCl, methdilazin HCl dan Prometazin teoklat dengan menggunakan asam kloranilat secara spektrofotometri.

Siproheptadin HCl, methdilazin HCl, dan Prometazin teoklat telah ditentukan kadarnya dalam bentuk murni dan dalam sediaan farmasi secara spektrofotometri. Metode ini berdasarkan pembentukan suatu *charge-transfer complex* antara asam kloranilat sebagai suatu π -akseptor dan

senyawa obat uji sebagai n-donor dalam campuran asetonitril-kloroform.



Gambar 9.2. Reaksi pembentukan kompleks transfer muatan dari asam kloranilat dengan senyawa n-donor

Pembuatan larutan standar: ditimbang seksama siproheptadin HCl, methdilazin HCl, dan Prometazin teoklat yang setara dengan 100 mg basenya dan dilarutkan dalam 20 mL air suling. Larutan dipindahkan secara kuantitatif ke dalam corong pisah, dibuat alkali dengan penambahan larutan ammonia dan dikocok dengan 10 mL kloroform. Ekstrak disaring melalui kertas saring yang mengandung natrium fosfat anhidrat ke dalam labu ukur 100 mL dan dicukupkan volumenya dengan kloroform sehingga diperoleh larutan standar base dengan konsentrasi 1 mg mL⁻¹. Larutan ini diencerkan untuk memperoleh larutan kerja dengan konsentrasi 500 µg mL⁻¹.

Prosedur:

- Pembuatan kurva kalibrasi
Seri volume larutan standar dibuat dengan range dari 0,25 sampai 1,25 mL (CPH), 0,20 sampai 1,00 mL (MDH) atau 0,25 sampai 1,50 mL (PMT) ditransfer ke dalam labu ukur 5 mL dan dicukupkan 2 mL dengan


penambahan kloroform. Kemudian ditambahkan 0,50 mL dari asam kloranilat dan volume dicukupkan 5 mL dengan asetonitril dan absorbansi diukur pada 520 nm terhadap blanko.

- Analisis tablet

Sebanyak 20 tablet ditimbang dan diserbukkan lalu ditimbang serbuk tablet yang setara dengan obat base seperti pada pembuatan larutan standar. Dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dan diekstraksi dengan 60 mL air suling dengan pengocokan yang kuat selama 20 menit. Untuk PMT tablet, ditambahkan 2 mL HCl 0,1 M untuk melarutkan garamnya. Larutan kemudian dicukupkan volumenya dengan air suling, dicampur dan disaring. Dalam corong pisah dimasukkan 50 mL filtrat dan dibasakan dengan penambahan larutan ammonia dan diekstraksi dengan 10 mL kloroform, dialirkan dan dikeringkan melalui natrium sulfat anhidrat, diencerkan hingga tepat 50,0 mL dengan kloroform.

- Analisis sirup

Diukur secara tepat sampel sirup MDH yang setara dengan 50 mg obat base, dipindahkan secara kuantitatif ke dalam corong pisah dan dianalisis seperti pada analisis tablet.



Gambar 9.3. Struktur senyawa siproheptadin, methdilazin dan prometazin.

2. Analisis klorfeniramina maleat

Analisis kualitatif dapat dilakukan dengan reagen cyanogen bromide dan timbulnya warna orange menunjukkan hasil yang positif.

Analisis kuantitatif.

a. Metode Polarografi

Metode polarografi langsung untuk penentuan klorfeniramina maleat dalam sediaan farmasi telah dikembangkan. Metode ini didasarkan pada reduksi dari klorfeniramina maleat dalam media asam (pH 1,2-4,0). Pengaruh pH pada gelombang polarografi diamati melalui rekaman dc polarogram dalam berbagai elektrolit pendukung. Grafik kalibrasi adalah bujur sangkar untuk 5 sampai 20 $\mu\text{g mL}^{-1}$ dari klorfeniramina

minmaleat dalam masing-masing $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ dapar asam klorida pH 2,0 dan dapar phthalate pH 4,0. Metode ini sederhana dan cepat. Metode ini dapat diterapkan untuk analisis klorfenira minmaleat dalam tablet, sirup, dan injeksi. Tidak ada gangguan dari aset aminofen, fenil propanol aminhidroklorida, dan asam askorbat.

b. Kromatografi Cair Kinerja Tinggi

Penetapan kadar deksklorfeniramin maleat dalam tablet campuran dengan deksametason dilakukan dengan menggunakan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) fase balik dengan kolom Agilent TC-18 ($4,6 \times 250 \text{ mm}$) dan fase gerak campuran larutan Kalium Dihidrogen Fosfat $0,05\text{M}$: Metanol, laju aliran 1 mL/menit , Sensifitas $1,000 \text{ AUFS}$ pada panjang gelombang 254 nm . Hasil uji identifikasi terhadap sampel yang ditentukan dengan parameter waktu retensi, menunjukkan bahwa sampel mengandung deksklorfeniramin maleat. Uji validasi dari tablet Dextamine® (PT. Phapros) secara statistik diperoleh persen *recovery* sebesar $100,5\%$; standar deviasi relatif(RSD) = $1,5274$; batas deteksi (LOD) = $4,1784 \mu\text{g/mL}$; dan batas kuantitasi (LOQ) = $13,9281 \mu\text{g/mL}$. Ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan memiliki ketepatan dan ketelitian yang baik.

3. Analisis Sinnarisin

Spektrofotometri

Metode spektrofotometri ekstraktif yang sederhana, cepat, dan sensitif telah dikembangkan untuk analisis cinnarizine (CNR) dalam bentuk murni dan dalam sediaan farmasi. Metode ini didasarkan padapembentukan kompleks yang larut kloroform dari

CNR dengan timol biru (TB) dan dengan kresol merah (CR) dalam dapar NaO Ac - Ac OH pH 3,6 untuk TB dan KCl-HCl pH 1,6 untuk CR dengan penyerapan maximum masing-masing pada panjang gelombang 405 nm dan 403 nm untuk di TB dan CR,.Kondisi reaksi dioptimalkan untuk mendapatkan intensitas warna maksimum. Hukum Beer dipatuhi dalam kisaran masing-masing 0,6-15,8 dan 0,8-16,6gmL⁻¹ untuk TB dan CR,. Berbagai parameter analitik telah dievaluasi dan hasilnya memiliki nilai validasi secara statistik.

4. Analisis Prometazine


a. Spektrofotometri

Suatu metode spektrofotometri yang sederhana, cepat, dan sensitif untuk penentuan sejumlah kecil prometazin hidroklorida dalam larutan *aqueous* telah dikembangkan. Metode ini berdasarkan atas oksidasi prometazin hidroklorida dengan natrium hipoklorida dan dikopling dengan asam sulfanilat. Penambahan natrium hidroksida membentuk larutan berwarna merah intensif. Absorbansi larutan diukur pada panjang gelombang 513 nm. Hukum Beer dipenuhi pada konsentrasi 4 -28 µg/mL dengan absorpsitivitas molar $8,28 \times 10^3 \text{ l.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$. Kondisi optimum untuk pembentukan warna ini telah dijelaskan dan metode ini telah sukses digunakan untuk penentuan prometazin HCl dalam sediaan baku dan sediaan farmasi. Bahan tambahan dilaporkan tidak mempengaruhi metode ini.


Tablet: Sebanyak 20 tablet ditimbang dan diserbukkan. Sejumlah serbuk tablet yang mengandung 10 mg prometazin hidroklorida dilarutkan dalam 40 mL asam sulfat 0,1 N dan dicampurkan selama 15 menit dan disaring. Filtrat kemudian ditambahkan 20 mL eter,

kemudian lapisan eter dicuci dengan 10 mL asam sulfat 0,1 N. Lapisan air dikumpulkan dan dinetralkan dengan 0,1 N NaOH dan volume dicukupkan dengan air suling hingga 100,0mL. Alikuot dari larutan ini diperlakukan sebagaimana dijelaskan diatas untuk penentuan prometazin HCl.

Injeksi: Vial 2 mL yang mengandung 50 mg prometazin HCl dipindahkan dalam labu ukur 100 mL dan diencerkan dengan air suling. Dibuat pengenceran yang sesuai untuk larutan standar kerja, dan penentuan prometazin HCl dilakukan sesuai dengan metode yang dijelaskan sebelumnya.



Gambar 9.4. Spektra absorpsi a) 75 μ g prometazin HCl dengan asam sulfanilat terhadap blanko, b) blanko terhadap air suling.



Gambar 9.5. Reaksi prometazin dengan asam sulfanilat

5. Analisis Cetrizin

Tablet: Dua metode yang akurat, tepat, sensitive, dan ekonomis untuk penentuan cetrizin dan dekstrometorfan dalam sediaan tablet secara simultan telah dikembangkan. Metode pertama meliputi pembentukan dan penyelesaian persamaan simultan menggunakan panjang gelombang 230 nm dan 280 nm sebagai panjang gelombang analitis untuk kedua senyawa obat tersebut dalam metanol. Metode kedua meliputi analisis berdasarkan Q-analisis pada pengukuran absorpsivitas pada panjang gelombang 224 nm (sebagai titik isobestik) dan panjang gelombang 280 nm (λ max dari cetrizin).

X

VITAMIN

A. Pendahuluan

Vitamin adalah kumpulan molekul senyawa kecil yang menjadi bahan gizi penting dalam organisme multi-selular dan juga manusia. Kata vitamin adalah singkatan dari kata "vital amine" dan menjadi istilah seperti sekarang karena vitamin pertama yang ditemukan adalah bagian dari kelas senyawa organik ini. Dan walaupun banyak vitamin yang ditemukan sesudah itu adalah bukan "amines", tetapi namanya tetap dipertahankan.

Vitamin, pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok yaitu vitamin yang larut air dan vitamin yang larut lemak. Vitamin larut air terdiri dari vitamin B dan vitamin C, sedangkan vitamin yang larut lemak terdiri dari vitamin A, D, E, dan vitamin K.

B. Analisis Vitamin

1. Vitamin B1 (ThiaminHCl)



Gambar 10.1. Struktur thiamin

Tiamin hidroklorida padatan kristalin yang berwarna putih dengan bau yang khas. Senyawa ini bersifat higroskopis dan produk anhidrousnya dengan cepat mengabsorpsi sekitar 4% air ketika kontak dengan udara. Tiamin akan meleleh dengan mengalami dekomposisi pada suhu 248°C. Satu gram akan terlarut dalam 1mL air, 18 mL gliserol, 100 mL alkohol 95% dan 315 mL alkohol absolut. Praktis tidak larut sebagian dalam eter, benzene, heksan, dan kloroform.

Tiamin hidroklorida stabil dalam keadaan kering, dan pemanasan pada 100°C selama 24 jam tidak mengurangi potensinya. Dalam larutan *aqueous* tiamin dapat disterilkan pada suhu 110°C, namun jika pH larutan di bawah 5,5, tiamin akan segera rusak. Satu gram vitamin B1 kristalin setara dengan 333,000 IU.

Tiamin mononitrat terdapat sebagai kristal putih atau serbuk kristalin dengan bau khas yang lemah. Senyawa ini praktis nonhigroskopik dan meleleh, dengan mengalami dekomposisi pada 196 - 200°C. Kelarutan tiamin mononitrat dalam air adalah sekitar 2,8 gram dalam 100 mL pada suhu ruang. pH dari larutan 2% dalam air adalah 6,0 - 7,5. Dalam bentuk padat, tiamin mononitrat bersifat lebih stabil dibanding hidroklorida dan tidak mengalami *deliquesce* ketika terpapar pada kelembaban 90%.


Metode kimia, biologi, dan mikrobiologi tersedia untuk analisis dari tiamin ini. Metode biologik berdasarkan pada efek pencegahan dan penyembuhan polyneuritis pada hewan uji. Metode mikrobiologi menggunakan *Phycomyces blakesleanus* dan *Lactobacillus fermenti*. Metode fermentasi yeast diadopsi dari *Association of Official Agricultural Chemists*.

a. Metode Fluorometrik Tiokrom

Sekarang ini, metode tiokrom telah sering digunakan untuk pengujian garam tiamin dan untuk penentuan vitamin B1 dalam ekstrak tanaman. Metode ini merupakan metode baku dalam USP XV dan *International Pharmacopeia*.

Tiamin harus diekstraksi secara kuantitatif dari bahan makanan, biologik, dan farmaseutikal. Biasanya, dididihkan dengan asam encer dan diikuti dengan perlakuan menggunakan preparat enzim yang mengandung fosfatase, akan membebaskan tiamin dari kompleksnya. Bahan yang kaya protein perlu didigesti terlebih dahulu dengan enzim proteolitik, seperti pepsin. Ekstrak tiamin bebas harus dipurifikasi untuk menghilangkan bahan-bahan pengganggu. Dilewatkan pada zeolit, suatu penukar ion anorganik. Kalium klorida yang diasamkan akan mengelusi tiamin dari zeolit.

Oksidasi tiamin dengan kalium ferisianida alkalin menghasilkan tiokrom, suatu senyawa yang berfluorosensi biru.



Gambar 10.2. Tiokrom

Tiokrom dapat diekstraksi dengan isobutanol dan fluorosensinya ditentukan.

b. Metode Asam Silikotungstat

Tiamin dalam tablet dan larutan dapat ditentukan melalui reaksi pengendapan dengan asam

silikotungstat, suatu metode baku dalam BP. Sampel dilarutkan dalam air, diasamkan dengan asam hidroklorida, lalu dipanaskan hingga mendidih. Larutan asam silikotungstat ditambahkan tetes demi tetes ke dalam larutan yang mendidih. Endapan difiltrasi, dicuci dengan asam hidroklorida encer, kemudian dengan air, dan terakhir dengan aseton. Residu dikeringkan hingga berat konstan. Setiap gramnya setara dengan 0,1936 g tiamin hidroklorida.

c. Metode kolorimetri

1) Metode p-aminoasetofenon

Tiamin akan bereaksi kopling dengan p-aminoasetofenon terdiasotasi membentuk warna merah yang memiliki absorbansi pada panjang gelombang 520 nm. Adalah penting untuk mengekstraksi tiamin dan memurnifikasi melalui kolom zeolit seperti pada metode tiokrom. Metode kolorimetri ini dapat digunakan untuk menentukan tiamin dalam keadaan tiamin terfosforilasi dan juga dalam analisis uriin. Metode ini tidak direkomendasikan untuk bahan-bahan yang kaya protein dan kadar tiamin yang rendah.

2) Metode 6-aminotimol

Dasar metode ini adalah reaksi antara tiamin dengan 6-aminotimol terdiasotasi. Hasil peruraian tiamin tidak menghasilkan warna dengan pereaksi ini. Dekstrosa, maltose, sukrosa, pati, kasein, gelatin, pepton, urea,, gliserofosfat, dan logam berat dengan kadar 100 kali lebih besar dari kadar tiamin tetap tidak mengganggu. Riboflavin, guanine, asam nikotinat, nikotinamida, piridoksin, asam pantotenat, adenine, triptofan, tirosin, dan histidin yang terdapat dengan

kadar 20 kali lebih besar daripada tiamin juga tidak mengganggu.

Pereaksi 6-aminotimol dibuat dengan melarutkan 50 mg 6-aminotimol dalam 50 mL asam klorida 0,35% dan mengencerkan dengan air secukupnya hingga 100 mL.

Cara uji: sejumlah 5,0 mL pereaksi 6-aminotimol didinginkan dengan es, ditambahkan 2,0 mL natrium nitrit 0,1% lalu dicampur dan didiamkan selama 1 menit. Selanjutnya ditambahkan 5,0 mL natrium hidroksida 20% dan diencerkan dengan air secukupnya sampai 20,0 mL. Sejumlah 1,0 mL pereaksi ini ditambahkan 1,0 mL larutan sampel. Setelah 5 menit, larutan diencerkan untuk mendapatkan absorbansi yang sesuai. Gunakan larutan blanko.

Jika larutan sampel berwarna atau keruh, dilakukan penetapan seperti di atas kemudian warna yang terjadi disari dengan campuran pelarut yang terdiri dari 90 mL toluene dan 10 mL n-butanol. Lapisan pelarut organik dipisahkan dan ditambah sedikit natrium sulfat anhidrat untuk mengeringkan pelarut lalu diukur absorbansinya.

d. Metode Alkalimetri

Adanya hidroklorida dalam struktur tiamin hidroklorida dapat dititrasi dengan natrium hidroksida 0,1 N menggunakan indikator brom timol biru.

Cara: 500 mg tiamin hidroklorida ditimbang seksama, dilarutkan dalam air bebas karbondioksida lalu dititrasi dengan NaOH 0,1 N menggunakan indikator brom timol biru. Tiap mL NaOH 0,1 N setara dengan 33,70 mg tiamin hidroklorida.

e. Metode Titrasi Bebas Air

Tiamin hidroklorida dalam asam asetat glasial dapat dititrasi dengan asam perklorat dengan sebelumnya ditambah raksa (II) asetat berlebih. Kedua atom nitrogen dalam tiamin hidroklorida tertitrasi sehingga berat ekivalennya setengah dari berat molekulnya. Sebagai indikator digunakan p-naftol benzene, merah kuinaldin, atau kristal violet.

Cara: 250 mg tiamin hidroklorida ditimbang seksama, ditambahkan 10 mL asam asetat glasial dan 10 mL raksa (II) asetat 5% dalam asam asetat glasial, dan ditambahkan 20 mL dioksan. Selanjutnya larutan dititrasi dengan asam perklorat 0,1 N menggunakan indikator 3 tetes kristal violet sampai warna biru. Tiap mL asam perklorat 0,1 N setara dengan 16,86 mg tiamin hidroklorida.

f. Metode Argentometri

Adanya klorida dalam tiamin hidroklorida menjadi dasar dari metode ini. Metode Volhard adalah metode yang sesuai. Suasana penetapan harus asam sebab jika dalam suasana basa, maka akan terjadi reaksi antara perak nitrat dengan basa membentuk $\text{Ag}(\text{OH})$ yang pada tahap selanjutnya akan membentuk endapan putih Ag_2O . Akibatnya, perak nitrat tidak hanya bereaksi dengan sampel tetapi juga bereaksi dengan basa.

Cara: 100 mg tiamin ditimbang seksama dan dilarutkan dalam 20 mL air. Larutan diasamkan dengan asam nitrat encer dan ditambahkan 10 mL perak nitrat 0,1N. Endapan yang terjadi disaring dan dicuci dengan air sampai bebas klorida. Filtrat selanjutnya dititrasi dengan larutan baku ammonium tiosianat 0,1 N menggunakan indikator besi (III) ammonium sulfat. Tiap


mL perak nitrat 0,1N setara dengan 16,86 mg tiamin hidroklorida.

g. Metode Gravimetri

Tiamin dalam tablet dan injeksi dapat ditetapkan secara gravimetrik dengan cara mengendapkan larutan tiamin menggunakan asam silikowolframat.

Cara: sejumlah tablet yang telah ditimbang secara seksama dan setara dengan lebih kurang 50 mg tiamin hidroklorida dilarutkan dengan air secukupnya hingga 50 mL lalu ditambahkan 2 mL asam klorida pekat dan dipanaskan hingga mendidih. Pada larutan mendidih ditambahkan cepat tetes demi tetes 4 mL asam silokowolframat yang baru disaring dan dididihkan lagi selama 4 menit. Larutan disaring melalui filter kaca masir lalu dicuci dengan 50 mL campuran mendidih yang terdiri dari 1 bagian volume asam klorida pekat dan 19 bagian air mengandung asam silikowolframat 0,2 % b/v. Dicuci 2 kali tiap kali dengan 5 mL aseton. Residu dikeringkan pada suhu 105°C selama satu jam lalu didinginkan selama 10 menit. Dibiarkan dalam eksikator di atas larutan asam sulfat 38% lalu ditimbang. Tiap gram residu setara dengan 192,9 mg tiamin hidroklorida.

2. Vitamin B2 (Riboflavin)



Gambar 10.3. Struktur Vitamin B2

Riboflavin, 6,7-dimethyl-9-(D-1'-ribityl) isoalloxazine, kristal kuning sampai orange-kuning yang berbentuk jarum dengan titik leleh 282°C. Vitamin B2 tidak larut dalam eter, kloroform, benzene, dan aseton. Kelarutan dalam air bervariasi mulai dari 1 bagian dalam 3000 sampai 1 bagian dalam 15.000. Variasi ini tergantung pada perbedaan bentuk kristalnya. Riboflavin lebih larut dalam larutan garam isotonik dibandingkan dalam air dan sangat larut dalam larutan alkali encer. Larutan *aqueous* berfluorosensi hijau-kuning dengan serapan maksimum pada panjang gelombang 565 nm pada pH 6 jika terpapar dengan radiasi ultraviolet.

Karena sifatnya yang sensitif terhadap alkali, riboflavin lebih stabil terhadap asam mineral. Radiasi dengan sinar UV atau sinar tampak dari larutan alkali menghasilkan senyawa lumiflavin, radiasi dalam larutan asam atau netral menghasilkan lumikrom; suatu senyawa yang berfluorosensi biru.

Bahan-bahan pereduksi seperti natrium hidrosulfit akan mereduksi riboflavin menjadi senyawa dehidro, leukoflavin yang tidak berfluorosensi. Reaksi ini bersifat reversibel dan leukoflavin mudah teroksidasi kembali menjadi riboflavin oleh oksigen dari udara.

Metode fluorometri merupakan metode pilihan untuk riboflavin. Prosedur ini telah banyak diterapkan dengan modifikasi yang sesuai dan menjadi metode resmi dalam USP dan AOAC. Riboflavin dapat juga ditentukan secara spektrofotometri dan polarografi.

a. Metode Fluorometri

Ada tiga prosedur umum yang dapat diterapkan untuk penentuan riboflavin secara fluorometri, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Metode Langsung (*Direct determination*). Prosedur ini digunakan untuk campuran yang bebas dari pigmen atau bahan lain yang dapat mempengaruhi serta mengandung riboflavin dalam konsentrasi yang tinggi ($> 0,1\%$).

Prosedur: berat sampel yang digunakan tergantung kepada kandungan riboflavinnya. Kelarutan riboflavin dalam air pada suhu ruangan berkisar 100 mg/L, sehingga berat sampel yang akan diuji tidak boleh melebihi 100 mg riboflavin.

Sejumlah sampel yang sesuai ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu ukur 1 L. Sekitar 700 mL air suling mendidih ditambahkan, labu diagitasi selama 5 sampai 10 menit. Beberapa sampel riboflavin mungkin membutuhkan pemanasan dan agitasi tambahan untuk menyempurnakan kelarutan. Larutan didinginkan pada suhu ruangan, diencerkan dengan air suling dan dihomogenkan, jika perlu

disentrifugasi atau disaring. Suatu larutan jernih kristal dibutuhkan untuk pengukuran fluorosensi. Sejumlah aliquot larutan jernih diencerkan dengan air hingga volume tepat, dan menghasilkan konsentrasi sekitar 0,2 µg riboflavin permililiter. Larutan ini digunakan untuk pengukuran fluorosensi.

Pengukuran dan perhitungan: larutan sampel dimasukkan ke dalam kuvet, fotofluorimeter disesuaikan untuk memperoleh sensitivitasnya, kemudian dilakukan pembacaan. Karena riboflavin rusak oleh cahaya ultraviolet, maka pembacaan tidak stabil dan perlu dilakukan sesegera mungkin.

Penentuan blanko dilakukan dengan penambahan beberapa granul natrium hidrosulfit ke dalam aliquot larutan sampel. Fluorosensi yang terjadi setelah reduksi riboflavin tidak boleh lebih besar dari fluorosensi yang ditemukan dengan larutan standar yang diberikan perlakuan sama. Keadaan ini menunjukkan kemurnian dari larutan.

$$\frac{A - C}{B - D} \times 0,2 \times \frac{fp}{BS (g)} = \text{mcg riboflavin per g}$$

Dimana A adalah pembacaan sampel, C adalah blanko, B adalah pembacaan standar, D adalah standar blanko. Faktor pengenceran berdasarkan pada pengenceran dari filtrat awal untuk menghasilkan larutan sampel. Misalnya, 2 mL diencerkan hingga 1000 mL, maka faktor pengenceran adalah 500.

- 2) Metode aditif langsung (*Direct additive determination*). Banyak bahan farmasetik yang kemungkinan mengandung senyawa berfluorosensi dan pigmen

yang dapat mempengaruhi penentuan riboflavin dengan metode langsung. Dalam beberapa kasus, metode aditif langsung atau metode adsorpsi aditif dapat digunakan. Pada metode aditif langsung, penambahan sejumlah riboflavin yang diketahui pada larutan uji digunakan untuk kompensasi bahan-bahan yang mempengaruhi yang mungkin mengabsorpsi cahaya fluoresensi.

Prosedur ini dapat digunakan untuk campuran vitamin dari bahan makanan yang diperkaya vitamin atau sediaan farmasi misalnya sediaan vitamin. Sampel dari produk alami atau sampel alami yang mengandung riboflavin harus dihidrolisis enzimatis terlebih dahulu untuk memisahkan bahan asilumnya menjadi bahan riboflavin yang bebas dari berbagai jenis ikatan.

Ekstraksi: sejumlah sampel yang sesuai didigesti di atas tangas uap dengan asam sulfat 0,05 N sebanyak 10 sampai 15 kali bobot sampel selama 20 menit. Campuran didinginkan pada suhu ruangan dan pH disesuaikan menjadi 4 sampai 4,5 dengan natrium asetat 2 N. Ditambahkan 1 mL larutan enzim kemudian didinginkan hingga suhu ruangan, diencerkan dengan air suling hingga tanda, dihomogenkan dan disentrifugasi atau difiltrasi.

Sejumlah alikuot dari filtrat jernih diencerkan hingga volume yang tepat hingga menghasilkan konsentrasi 0,02 sampai 0,2 µg riboflavin permililiter. Larutan ini digunakan untuk pengukuran fluoresensi (larutan sampel).

Pengukuran fluoresensi dan perhitungan: Tepat 1 mL larutan standar II (untuk metode aditif langsung) ditambahkan ke dalam 15 mL air suling,

dihomogenkan, dan dimasukkan ke dalam kuvet. Fluorosensi dari larutan ini diukur.

Tepat 15 mL larutan sampel dipipet ke dalam kuvet dan fluorosensi dibaca sebagai A. Pembacaan harus dilakukan segera dan penunjukan pertama dari galvanometer yang harus diambil. Kuvet harus segera dikeluarkan dari instrument. Tepat 1 mL larutan standar II ditambahkan ke dalam larutan sampel. Dicampur hingga homogen lalu dimasukkan ke dalam instrumen, fluorosensi dibaca sebagai B.

Larutan dikeluarkan dari kuvet, dan beberapa kristal natrium hidrosulfit ditambahkan dan dihomogenkan. Fluorosensi segera dibaca dan hasil pembacaan disebut sebagai C. Sinar yang ditransmisikan juga harus dibaca dan dicatat.

Bila pembacaan sinar yang ditransmisikan tidak berubah setelah penambahan natrium hidrosulfit, maka hal ini mengindikasikan bahwa seluruh riboflavin telah tereduksi. Fluorosensi yang terbaca pada titik ini menjadi pembacaan blanko C dan digunakan dalam perhitungan menurut rumus:

$$\frac{A - (1,07C)}{B - (0,94A)} \times 1,600 \times \frac{1}{16} \times \frac{fp}{BS (g)} = \text{mcg riboflavin per g (ppm)}$$

Sejumlah minimum natrium hidrosulfit harus digunakan untuk merusak fluorosensi riboflavin. Blanko ini meningkatkan spesifitas dari metode ini. Bahan-bahan yang berfluorosensi lainnya mungkin tidak berpengaruh. Pada rumus di atas, konstanta 1,07 dan 0,94 untuk menghitung perubahan volume dari 15 mL bila A dicatat, dan menjadi 16 mL bila pembacaan B dan C dicatat.

Untuk penentuan riboflavin dalam sediaan farmasi, USP XV menggunakan modifikasi metode aditif langsung seperti yang dijelaskan di atas. Tahap pemurnian tambahan meliputi penambahan larutan kalium permanganat pada larutan riboflavin selama 2 menit. Riboflavin stabil terhadap permanganat dalam larutan asam. Kelebihan permanganat dihilangkan dengan hidrogen peroksida. Perhitungan dapat lebih sederhana dan dapat digunakan kuvet dengan kapasitas lebih kecil dari 16 mL.

Prosedur:

Siapkan 4 atau lebih tabung reaksi. Ke dalam tiap tabung reaksi tambahkan 10 mL larutan sampel. Ke dalam 2 atau lebih tabung reaksi tambahkan 1,0 mL larutan standar (1 μg riboflavin per mL) dan ke dalam dua tabung reaksi lainnya tambahkan 1,0 mL air. Ke setiap tabung reaksi, tambahkan 1,0 mL asam asetat glasial dan 0,5 mL larutan kalium permanganat (1 dalam 25). Campuran didiamkan selama 2 menit, lalu tambahkan 0,5 mL larutan hidrogen peroksida 3%, kocok, warna permanganat akan rusak dalam 10 detik. Tabung reaksi dikocok untuk mengeluarkan oksigen yang dilepaskan.

Fluorosensi dari larutan sampel yang mengandung 1,0 mL larutan standar diukur dalam fotofluorometer yang sesuai, hasil pembacaan ini disebut sebagai A. Fluorosensi dari larutan yang mengandung 1,0 mL air disebut sebagai B. Kemudian untuk mereduksi riboflavin digunakan 10 mg natrium hidrosulfit, dicampurkan ke dalam dua atau lebih tabung reaksi, fluorosensi diukur dalam 5 detik, hasil pengukuran disebut sebagai C.

Perhitungan: jumlah mg dari riboflavin tiap mL larutan sampel dihitung sesuai rumus:
 $(B-C)/10,000 (A-B)$, rasio dari $(B-C)/(A-B)$ antara 0,66 dan 1,5.

- 3). Metode adsorpsi aditif. Pada prosedur ini bahan yang sangat mempengaruhi dieliminasi melalui tahap adsorpsi dan bahan yang dieliminasi tersebut dikompensasi dengan penambahan sejumlah tertentu riboflavin yang diketahui ke dalam larutan uji. Prosedur ini dapat diterapkan secara universal pada seluruh sampel. Namun, metode ini membutuhkan lebih banyak waktu tetapi memberikan hasil yang reproduibel dan mendekati akurat.

Ekstraksi: Bahan diekstraksi mengikuti prosedur pada metode aditif langsung.

Adsorpsi dan Elusi. Sejumlah alikuot larutan sampel atau pengenceran yang sesuai dari ekstrak sampel diukur secara akurat dan dilewatkan pada kolom adsorpsi. Sekitar 0,75 g Florisil ditimbang dan ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Sebanyak 10 sampai 20 mL dari alikuot harus mengandung 10,02 sampai 1,0 μg riboflavin per mL. Setelah larutan dialirkan seluruhnya, kolom dicuci dengan air suling mendidih sebanyak 10 mL.

Riboflavin dielusi dari kolom adsorpsi menggunakan 5 mL eluen asam asetat-piridin panas, eluat dikumpulkan dalam gelas silinder aktinik bertutup. Konsentrasi dari riboflavin yang dielusi disesuaikan menjadi 0,02 sampai 0,1 μg per mL. Larutan didinginkan, lalu dicukupkan volumenya dan dicampur dengan baik.

Pengukuran fluoresensi dan perhitungan. Fluoresensi diukur dan perhitungan dibuat sesuai prosedur pada metode aditif langsung.


b. Metode Spektrofotometri

Larutan riboflavin dalam dapar pH 4,0 menunjukkan absorbansi maksimum pada 444 nm dengan $E^{1\%}_{1\text{ cm}}$ 320. Cara ini digunakan untuk penetapan kemurnian riboflavin atau untuk penetapan riboflavin dengan kadar lebih besar dari 90%. Penetapan riboflavin dilakukan pada tempat yang terlindung dari cahaya.

Cara penetapan riboflavin tunggal secara spektrofotometri: lebih kurang 100 mg riboflavin yang ditimbang seksama dilarutkan dengan pemanasan dalam campuran 2 mL asam asetat glasial dan 150 mL air. Larutan selanjutnya diencerkan dengan air, selanjutnya didinginkan dan ditambah air secukupnya hingga 1000 mL. Pada 10,0 mL larutan ditambah 3,5 mL natrium asetat 0,1M kemudian ditambah air secukupnya hingga 100,0mL. Larutan akhir diukur absorbansinya dengan kuvet 1 cm pada panjang gelombang 444 nm. Kadar riboflavin dihitung dengan menggunakan riboflavin baku sebagai pembanding.

3. Vitamin B6 (Pyridoksin HCl)

Secara alami vitamin B6 terdapat sebagai campuran piridoksin, piridoksal, dan piridoksammin dengan perbandingan yang bervariasi. Rumus bangun senyawa tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 10.4. Struktur kimia piridoksin HCl, Piridoksal HCl, dan Piridoksamin HCl

Piridoksin HCl bersifat lebih stabil dibandingkan dengan kedua bentuk lainnya dan faktanya bahwa piridoksin merupakan vitamin yang paling stabil. Larutan *aquous* asam lebih stabil dalam suhu ruangan dan dapat dipanaskan selama 30 menit pada suhu 120°C tanpa mengalami dekomposisi. Piridoksin akan rusak dalam larutan netral atau alkali oleh cahaya ultraviolet, sedangkan dalam larutan asam tidak demikian.

Penetapan kadar secara mikrobiologi atau secara hayati dari ketiga senyawa tersebut menunjukkan tanggapan yang selektif. Sedangkan metode fisika dan kimia tidak dapat membedakan ketiga senyawa tersebut. Metode fisika dan kimia hanya cocok untuk piridoksin murni dan sediaannya.

a. Metode Spektrofotometri


Pada daerah ultraviolet, piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin menunjukkan daerah serapan yang karakteristik walaupun tidak ada serapan maksimum untuk ketiganya. Kadar vitamin B₆ dalam larutan dapat pH 6,75 dapat ditetapkan pada panjang gelombang 325 nm. Pada panjang gelombang ini piridoksin dan piridoksamin menunjukkan absorbansi maksimum,

sedangkan piridoksal menunjukkan absorpsi maksimum pada panjang gelombang 316 nm. Kurva penyerapan piridoksin sendiri berubah dengan berubahnya pH larutan. Larutan piridoksin dalam asam klorida 0,1 N menunjukkan satu absorpsi maksimum pada panjang gelombang 291 nm, sedangkan dalam larutan netral atau larutan alkali menunjukkan dua absorpsi maksimum.

Cara penetapan kadar piridoksin dalam tablet tunggal secara spektrofotometri: Sebanyak 20 tablet ditimbang dan diserbuk. Pada sejumlah serbuk yang ditimbang seksama yang setara dengan lebih kurang 25 mg piridoksin HCl ditambahkan 50 mL asam klorida 0,1 N sambil sekali-kali diaduk. Larutan diencerkan dengan asam klorida 0,1 N secukupnya hingga 100 mL. Diukur absorpsinya menggunakan kuvet dengan ketebalan 1 cm pada panjang gelombang maksimum (lebih kurang 291 nm). Kadar piridoksin hidroklorida dihitung terhadap piridoksin hidroklorida baku.

b. Metode Kolorimetri

Piridoksin bereaksi dengan reagen Folin-Denis menghasilkan warna biru. Senyawa ini kemudian dikopling dengan senyawa diazo seperti asam sulfanilat terdiazotasi dan *p*-aminoasetofenon terdiazotasi. Metode Scudi berdasarkan pada uji indofenol dengan 2,6-dikloro-*p*-benzokuin-4-koroimina dalam dapar Veronal menghasilkan warna biru yang dapat diekstraksi dengan pelarut organik.



Gambar 10.5. Reaksi antara piridoksin dengan 2,6-dikloro-p-benzokuin-4-koroinina

Reaksi ini merupakan reaksi umum untuk senyawa fenol yang berkedudukan para terhadap gugus hidroksil fenol tidak tersubstitusi. Metode ini menunjukkan kepekaan yang rendah jika sampel mengandung kurang dari 0,1 mg dan peruraian dapat terjadi sebelum warna terbentuk mencapai maksimum.

c. Metode Titrasi Bebas Air

Piridoksin hidroklorida dapat ditetapkan secara titrasi bebas air setelah ditambah raksa (II) asetat. Cara penetapan kadar piridoksin hidroklorida dengan titrasi bebas air dapat dilakukan sebagai berikut: lebih kurang 300 mg piridoksin hidroklorida yang ditimbang seksama dilarutkan dalam 40 mL asam asetat glasial lalu dititrasi dengan asam perklorat 0,1N menggunakan 3 tetes indikator kristal violet sampai biru hijau. Tiap mL asam perklorat 0,1 N setara dengan 20,56 mg piridoksin hidroklorida.

d. Metode Kromatografi

Kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) dengan detektor fluorosen telah digunakan secara luas untuk analisis kuantitatif vitamin B₆ dalam bahan makanan.

Sampel yang telah digerus (2,5 g jika kandungan vitamin B₆ lebih besar daripada 2,0 µg/g dan sebanyak 5

8 jika kandungan B₆ nya lebih rendah) dicampur dengan 25 mL larutan asam asetat 0,05 M; 2,5 mL larutan asam glioksalat 1M; 400 mL larutan besi (II) sulfat (36,56 mg 0,05M); dan 20 mg fosfatase asam. Campuran digoyangkan terus menerus pada suhu 37°C selama semalam. Setelah selesai inkubasi, campuran didinginkan dan diencerkan sampai 50 mL dengan air mendidih lalu disaring atau disentrifugasi. Sebanyak 5,0 mL aliquot dicampur dengan 4,5 mL larutan natrium borohidrida 0,1 M lalu dikocok, selanjutnya ditambah dengan 0,5 mL asam asetat glasial. Larutan disaring dan selanjutnya digunakan untuk analisis dengan KCKT. Pemisahan dilakukan dengan kolom oktadensil silan (250 x 4,6 µm i.d; ukuran partikel 5 mikron) yang dihubungkan dengan kolom pengaman oktadesil silan (4 mm x 4 mm i.d; ukuran partikel 10 mikron). Eluen dihantarkan secara isokratik yang tersusun atas: asetonitril-kalium dihidrogen fosfat 0,05 M yang mengandung natrium heptan sulfonat 0,05M atau natrium oktan sulfonat 0,03 M; pH diatur 2,5 dengan asam ortofosfat. Kecepatan alir fase gerak 1 mL/menit dengan panjang gelombang eksitasi dan emisi detektor masing-masing sebesar 290 dan 395 nm.

4. Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Sianokobalamin adalah suatu senyawa kompleks koordinat kobalt dengan komposisi C₆₁₋₆₄H₈₆₋₉₂N₁₄O₁₃PCo, dan bobot molokulnya sekitar 1500. Sianokobalamin terdapat sebagai kristal merah tua atau serbuk kristalin. Kristal kering akan cepat mengabsorpsi kelembaban hingga 10-12% kelembaban relatif 50%. Kandungan lembab ini dapat dihilangkan dengan

pemanasan 105°C dan tekanan 5 atm. Sianokobalamin tidak larut dalam aseton, kloroform, dan eter. Satu gram sianokobalamin larut dalam 80 mL air pada suhu 25°C, dan juga larut dalam alkohol.

Vitamin B₁₂ bersifat netral dan mengandung gugus siano, kobalt merupakan unsur trivalent dan memiliki enam bilangan koordinasi. Gugus siano dapat digantikan oleh beberapa ion misalnya ion klor menjadi klorokobalamin, atau hidroskobalamin. Dengan hidrolisis asam, sianokobalamin akan menghasilkan satu ekivalen 5,6-dimetilbenzilimidazol.

Metode analisis biologi merupakan metode yang utama dalam analisis sianokobalamin. Metode mikrobiologi paling sering digunakan dalam analisis produk-produk farmasi yang mengandung vitamin B₁₂. Metode kimia yang sering digunakan adalah metode spektrofotometri, *countercurrent distribution method*, metode kolorimetri sianida, metode kolorimetri disianida, dan metode radioaktif.

a. Metode Spektrofotometri

Metode spektrofotometri sebenarnya tidak terlalu spesifik untuk analisis vitamin B₁₂. Pigmen merah dan pseudo-vitamin B₁₂ umumnya menunjukkan absorpsi ultraviolet yang mirip. Metode ini banyak digunakan untuk menentukan konsentrasi dari vitamin B₁₂ kristal atau larutannya tanpa kehadiran bahan-bahan yang mempengaruhi absorbansinya.

Prosedur: sebanyak 4 mg sianokobalamin ditimbang seksama dengan timbangan mikro dan dilarutkan dengan air secukupnya hingga volume tepat 100,0mL, lalu dihomogenkan. Absorbansi larutan ditentukan pada kuvet kuarsa 1 cm pada panjang gelombang 361 nm. Gunakan air sebagai larutan blanko.

$\% \text{ sianokobalamin} = (10.000A/207W) \times 100/(100-C)$ Di mana A adalah absorbansi, W adalah berat sampel dalam milligram, C adalah persen *loss on drying*, dan 207 adalah nilai $A^{1\%}_{1\text{cm}}$ sianokobalamin dalam air.

b. Metode Kolorimetri Sianida


Pengujian kolorimetri sianida dapat digunakan untuk menentukan sianokobalamin atau total kobalamin dalam sediaan farmasi. Metode berdasarkan pada pelepasan kuantitatif dari gugus siano dari vitamin B₁₂ melalui iluminasi dengan cahaya tampak diikuti dengan isolasi dan penentuan hydrogen sianida yang dilepaskan. Prosedur ini dapat diterapkan pada kisaran kadar vitamin B₁₂ sebesar 2µg sampai 20 µg .

c. Metode Kolorimetri Disianida

Pengujian kolorimetri disianida dapat digunakan untuk menentukan sianokobalamin atau total kobalamin dalam sediaan farmasi, cairan fermentasi, dan konsentrat. Metode ini membutuhkan sampel sebanyak 200 µg dan berdasarkan pada perbedaan spektrum visibel dari vitamin B₁₂ dengan spektrum kompleks disianida yang terbentuk dalam larutan yang mengandung ion sianida.

5. Vitamin C

Vitamin C (asam askorbat) terdapat sebagai serbuk atau kristal yang berwarna putih kekuningan. Dalam keadaan kering, asam askorbat cukup stabil di udara, tetapi dalam bentuk larutan akan sangat mudah teroksidasi oleh udara. Reaksi ini dikatalisis oleh beberapa unsur logam khususnya tembaga. Bila terpapar cahaya, maka vitamin C akan berubah warna menjadi warna gelap.



Gambar 10.6. Struktur asam askorbat

a. Metode Volumetri

1) Titrasi Iodometri

Kandungan asam askorbat dalam larutan atau sediaan murninya dapat ditentukan secara titrasi dengan larutan iodine 0,1 N. Metode ini merupakan metode baku dalam USP XV. Modifikasi dari metode ini adalah dengan menggunakan titrasi potensiometri untuk penentuan titik akhirnya dan dapat diterapkan untuk sediaan farmasi yang berwarna.


2) Titrasi dengan 2,6-diklorofenol-indofenol

Metode ini dikembangkan oleh Tillman berdasarkan titrasi dengan larutan 2,6-diklorofenol-indofenol dan merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam analisis vitamin C. Titik akhir dapat ditentukan secara visual, elektrometrik, atau potensiometrik. Metode ini tidak spesifik untuk asam askorbat oleh karena bahan reduktor yang lain seperti senyawa sulfhidril, tiosulfat, bentuk reduksi dari turunan asam nikotinat, riboflavin, serta senyawa besi organik, dan anorganik dapat mempengaruhi. Beberapa modifikasi telah dilaporkan untuk meningkatkan spesifitas dari metode ini serta untuk menjamin stabilitas vitamin C selama proses ekstraksi. Pelarut terbaik dan media ekstraksi untuk asam askorbat adalah asam

metafosfat dan asam oksalat yang akan melindungi vitamin C dari pengaruh katalisis ion tembaga. Prosedur yang banyak digunakan untuk menghilangkan pengaruh dari bahan tersebut di atas meliputi:

- a) Konversi dari total asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat dengan melewatkannya melalui Norit atau dengan menggunakan asam askorbat oksidase.
- b) Penentuan jumlah bahan pereduksi yang tersisa.
- c) Reduksi asam dehidroaskorbat menjadi asam askorbat dengan menggunakan hydrogen sulfida pada pH 4 - 7.
- d) Titrasi asam askorbat dengan DCIP.

Asam askorbat bereaksi lebih cepat dengan 2,6-diklorofenol-indofenol dibandingkan bahan-bahan pereduksi yang disebutkan tadi. Hal ini yang menjadi alasan untuk pengukuran secara fotometrik dimana intensitas warna DCIP diukur segera setelah penambahan larutan asam askorbat.



Gambar 10.7. Reaksi antara asam askorbat dengan DCIP

3) Titrasi dengan N-bromosuksinimide

N-bromosuksinimida dalam larutan *aqueous* akan mudah mengoksidasi larutan asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat, sementara N-bromosuksinimide akan tereduksi secara ireversibel menjadi suksinimida dengan membentuk hidrogen bromida. Dengan kehadiran kalium iodida, kelebihan N-bromosuksinimida setelah seluruh asam askorbat teroksidasi akan melepaskan iodine. Titik akhir dari titrasi dapat ditentukan dengan mudah menggunakan indikator kanji. Bahan yang dapat mempengaruhi reaksi oksidasi oleh N-bromosuksinimida sebelum iodine dilepaskan dari KI dalam medium asam asetat adalah natrium sulfit, sulfida, tiosulfat, dan tiourea.

b. Metode Kolorimetri

1) Metode 2,4-dinitrofenilhidrazin

Asam dehidroaskorbat dengan 2,4-dinitrofenilhidrasin akan membentuk suatu osazon yang membentuk warna merah dalam asam sulfat kuat. Roe, *at al*, telah menggunakan reaksi ini untuk menentukan asam dehidroaskorbat secara langsung dan untuk menentukan asam askorbat setelah oksidasi menjadi bentuk dehidro.

2) Metode 4-metoksi-2-nitroanilin

Berbagai metode untuk penentuan asam askorbat adalah berdasarkan reaksi dengan senyawa diazonium. Asam askorbat dengan 4-metoksi-2-nitroanilin terdiazotasi akan membentuk senyawa yang berwarna biru tua. Metode ini cukup spesifik untuk asam askorbat. Asam dehidroaskorbat, asam 2,3-diketogulonat, tiamin, riboflavin, piridoksin,

pantotenat, asam folat, niasin, niasinamida, vitamin A, D, dan E, fenol, gliserol, propilenglikol, dan tween tidak mempengaruhi. Bahan pereduksi seperti ion fero dan stano juga sulfur dioksida tidak mempengaruhi jika terdapat dalam jumlah normal.

Reagen.

Reagen amino. Asam asetat glasial (126 mL), ditambahkan ke dalam 500 mg 4-metoksi-2-nitroanilin dan larutan diencerkan hingga 250 mL dengan asam sulfat 10%.

Reagen nitrit. Larutan natrium nitrit 0,2% dalam air Larutan stok asam askorbat. Asam askorbat USP dilarutkan dalam asam oksalat 0,5% hingga diperoleh konsentrasi akhir 0,5 mg asam askorbat.

Standar A. Larutan asam askorbat yang mengandung 1 mg dengan mengencerkan larutan awal.

Standar B. Larutan asam askorbat yang mengandung 1,5 mg dengan mengencerkan larutan awal.

Cara penetapan vitamin C dengan pereaksi 4-metoksi-2-nitroanilin sebagai berikut: sebanyak 2 mL pereaksi 4-metoksi-2-nitroanilin ditambah 2 mL natrium nitrit 0,2%, diaduk hingga warna jingga hilang lalu ditambah 75 mL n-butyl alkohol dan dicampur. Larutan ini selanjutnya ditambah 0,5-2 mg asam askorbat 0,5% dipindahkan ke dalam corong pisah. Selanjutnya larutan ditambah 25 mL natrium hidroksida 10% dan 150 mL dietil eter, dikocok baik-baik, dan didiamkan hingga memisah. Lapisan air dipisahkan. Lapisan organik dicuci tiga kali dengan 15 mL natrium hidroksida 10%. Lapisan air dan cairan hasil cucian dengan air diencerkan dengan air hingga 200,0mL. Blanko dibuat dengan cara yang

sama tanpa penambahan pereaksi. Absorbansi larutan diukur pada panjang gelombang 570 nm.

c. Metode Spektrofotometri Ultraviolet

Asam askorbat menunjukkan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 265 nm dalam larutan *aqueous* yang netral, panjang gelombang maksimum ini akan bergeser ke 245 nm oleh adanya asam mineral.

Ion tembaga (Cu^{2+}) sangat mempengaruhi stabilitas dari asam askorbat, dan pengaruh ini dapat dihilangkan dengan penambahan KCN ke dalam air yang digunakan sebagai pelarut dalam penentuan secara spektrofotometri.


Metode penentuan asam askorbat dengan kehadiran bahan pengotor yang juga mengabsorpsi sinar ultraviolet adalah berdasarkan pada pembacaan absorbansi sebelum dan setelah destruksi asam askorbat sehingga dibutuhkan blanko. Dalam sebuah prosedur, spektrum ditentukan dalam larutan yang mengandung KCN, larutan kemudian diberikan perlakuan iradiasi ultraviolet dengan waktu yang lama hingga absorbansi mencapai angka konstan. Perbedaan antara dua pembacaan adalah proporsional terhadap asam askorbat. Pada metode yang lain, asam askorbat dirusak dengan oksidasi, dengan kehadiran Cu^{2+} menjadi asam dehidroaskorbat.

d. Metode Spektrofluorometri

Suatu metode spektrofluorometri untuk menentukan kadar vitamin C yang mendasarkan pada reaksi yang dikatalisis oleh hemoglobin telah dikembangkan.

Ke dalam labu takar 25 mL dimasukkan 0,1 mL hidrogen peroksida $1,0 \times 10^{-3}$ M; 1,5 mL p-kresol $1,0 \times 10^{-3}$ M; 6,0 mL larutan dapar fosfat pH 10,4 yang mengandung $\text{NH}_3\text{-NH}_4\text{Cl}$ 5,0 M; sejumlah tertentu sampel yang mengandung asam askorbat 9×10^{-10} M dan 0,5 mL hemoglobin $1,0 \times 10^{-5}$ M. Larutan diencerkan dengan air suling sampai batas tanda sebelum dilakukan penggoyangan. Larutan selanjutnya diletakkan di dalam penangas air yang suhunya dijaga tetap pada suhu 25°C selama 10 menit. Intensitas fluoresensi larutan sampel (F) dan blanko (F_0) diukur pada panjang gelombang eksitasi 318 nm dan panjang gelombang emisi 422 nm. Selanjutnya dihitung selisih $F-F_0$.

Metode spektrofotometri lain untuk analisis kuantitatif vitamin C adalah berdasarkan pada reaksi antara asam askorbat (AA) dengan metilen biru (MB). Intensitas fluoresensi MB diukur pada panjang gelombang eksitasi 664 nm dan panjang gelombang emisi 682 nm. Konsentrasi MB menurun sebagai fungsi penurunan intensitas fluoresensi MB karena terbentuk MB yang kurang berwarna (Leuco-MB) setelah terjadi reaksi antara AA dan MB. Reaksi ini merupakan reaksi redoks yang mana AA akan dioksidasi menjadi asam dehidroaskorbat sementara MB akan direduksi menjadi Leuco-MB yang kurang berwarna.




Gambar 10.8. Reaksi antara asam askorbat dengan metilen biru menghasilkan asam dehidroaskorbat dan Leuco-MB

e. Metode Polarografi

Asam askorbat teroksidasi pada elektroda tetes merkuri dan ini menjadi dasar pengujian polarografik yang spesifik. Asam dehidroaskorbat tidak dapat teroksidasi pada katoda tetes merkuri. Metode ini telah diaplikasikan pada jus buah dan sediaan farmasi. Hasilnya dibandingkan dengan metode titrimetri dan metode fotometri diklorofenol-indofenol serta metode dinitrofenilhidrazin.

6. Vitamin A



Gambar 10.9. Struktur vitamin A

Vitamin A alkohol bebas sangat mudah teroksidasi oleh udara atau bahan oksidator lainnya dan juga sangat sensitif terhadap cahaya. Secara alamiah

vitamin A terdapat sebagai ester dan bersifat lebih stabil terhadap oksidasi.

Ada tiga metode yang umum digunakan untuk analisis vitamin A, yaitu metode biologi, metode kolorimetri Carr-Price, dan metode spektrofotometri ultraviolet.

a. Metode Kolorimetri Carr-Price

Metode ini berdasarkan atas reaksi antara akseroftol dengan antimony triklorida anhidrat dalam kloroform yang menghasilkan warna biru. Reaksi ini terjadi antara antimony triklorida dengan rantai tidak jenuh dari akseroftol. Karoten, asam polien, dan beberapa senyawa dalam minyak ikan juga menghasilkan warna biru. Intensitas warna yang terjadi mencapai maksimum dengan cepat tetapi segera memudar. Pembacaan biasanya dilakukan dalam waktu 10 sampai 15 detik setelah sampel ditambah pereaksi.

b. Metode Kolorimetri dengan Perubahan Akserofotl Menjadi Anhidroakseroftol

Akseroftol mudah diubah menjadi anhidroakseroftol dengan bantuan sejumlah kecil asam mineral atau asam organik kuat. Pada metode Budowski dan Bondi, akseroftol diubah menjadi anhidroakseroftol dalam pelarut benzen dengan katalisator asam toluen-*p*-sulfonat pada suhu kamar. Kenaikan absorbansi pada panjang gelombang 399 nm merupakan hasil dehidrasi yang berbanding langsung dengan jumlah akseroftol yang terkandung. Reaksi ini dapat dihentikan dengan penambahan alkali. Pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 358 nm, 377 nm, dan 399 nm dalam benzen merupakan cara yang baik untuk mengetahui

kemurnian akseroftol yakni dengan melihat bahwa $A_{399\text{nm}}/A_{377\text{nm}}$ sebesar 0,868 dan $A_{358\text{nm}}/A_{377\text{nm}}$ sebesar 0,692.

Larutan katalisator dibuat dengan melarutkan 15 mg asam toluene-p-sulfonat monohidrat dalam 100 mL benzene yang telah didestilasi lalu direfluks sampai larut. Digunakan kalsium klorida pada ujung pendingin balik. Kurang lebih 10 mL benzene didestilasi untuk menghilangkan air dan larutan dijaga terhadap kelembaban udara dan didiamkan sampai dingin lalu ditambah benzene anhidrat sampai 100 mL. larutan diaktifkan sebelum digunakan dengan melakukan destilasi ulang.

Cara analisis: sebanyak 1,0 mL larutan sampel dalam benzen dicampur dengan 4 mL larutan katalisator. Setelah satu menit, larutan dinetralkan dengan 5 mL natrium hidroksida 0,5 N, dan dikocok selama satu menit. Kedua larutan dipisahkan dengan sentrifugasi dan larutan jenuh benzene diukur pada panjang gelombang 399 nm terhadap blanko yang terdiri dari 1 mL sampel dalam benzene yang diencerkan dengan 4 mL benzene. Tiap mL sampel setara dengan $A/0,0122$ satuan. Nilai 0,0122 adalah kenaikan daya resap sesuai dengan 1 satuan akseroftol.

c. Metode Spektrofotometri

Spektrum absorpsi ultraviolet dari vitamin A dan vitamin A asetat mempunyai absorbansi maksimum pada panjang gelombang antara 325 sampai 328 nm dalam berbagai pelarut.

Penetapan dilakukan secepat mungkin, terlindung dari cahaya, dan terlindung dari senyawa oksidator. Sebelum dilakukan penetapan kadar, skala spektrofotometer diperiksa terlebih dahulu. Sebagai

pedoman dapat digunakan garis raksa pada panjang gelombang 313,16 nm dan 334,5 nm serta garis hydrogen pada 379,7 nm dan 486,1 nm. Ketepatan absorbansi yang telah dikoreksi lebih rendah jika dibandingkan dengan absorbansi yang diamati langsung dan digunakan dalam perhitungan. Karena itu pengukuran absorbansi membutuhkan perhatian khusus dan sekurang-kurangnya harus dilakukan dua kali penetapan.


d. Metode Kromatografi

Aktivitas isomer vitamin A cukup berbeda sehingga untuk memisahkannya dikembangkan dengan kolom *micropore*. Sampel (1,0 - 10,0 g) dihomogenkan. Sebanyak 30 mL air ditambahkan ke dalam sampel jika sampelnya padat. Saponifikasi dilakukan dengan mencampur 40 mL sampel yang telah dihomogenkan dengan 12 mL larutan KOH 60%; 80 mL etanol mutlak; 0,5 mL ter-butylhidroksi toluene etanolik 1%; dan 0,5 g asam askorbat untuk menghindari terjadinya oksidasi. Sampel diaduk selama 16 jam pada suhu kamar. Setelah selesai disaponifikasi, larutan diencerkan sampai 250 mL dengan air dan etanol untuk memperoleh suatu rasio etanol:air (1:1 v/v). Sebanyak 20 mL alikuot dimasukkan ke dalam *cartridge Kieselguhr* dan setelah 20 menit diekstraksi dengan 50 mL petroleum eter ringan. Eluat selanjutnya diuapkan dan dilarutkan kembali dengan 2-50 mL isooktana. Isomer geometri retinol dipisahkan dengan kolom pengaman (7 x 2 mm i.d) dan kolom analisis (10 cm x 0,2 cm i.d) yang keduanya berisi silica gel dengan ukuran partikel 3 mikron. Sebagai eluen adalah heksan yang mengandung 1-oktanol dalam konsentrasi rendah. Karena panjang gelombang absorpsi

maksimum isomer-isomer ini berbeda maka digunakan detektor *photodiode array (PAD)*.

7. Vitamin D

Vitamin D terdiri dari dua jenis, yaitu vitamin D₂ atau kalsiferol (ergosterol teraktivasi) dan vitamin D₃ atau 7-dehidrokolesterol teraktivasi. Keduanya diproduksi dengan bantuan energi dari radiasi ultraviolet menjadi ergosterol dan 7-dehidrokolesterol. Prosedur fisikokimia yang dapat diterapkan untuk analisis vitamin D adalah spektrofotometri ultraviolet atau kolorimetri.



Gambar 10.10. Struktur Vitamin D₂ (A) dan D₃ (B)

a. Metode Spektrofotometri Ultraviolet


Kedua jenis vitamin D₂ dan D₃ memiliki absorbansi maksimum pada panjang gelombang 265 nm dalam heksan. Metode spektrofotometri ultraviolet dapat diterapkan untuk penentuan kemurnian dari vitamin D kristalin dan juga pada bahan dengan potensi yang tinggi setelah pemisahan dengan kromatografi dari berbagai bahan yang dapat mempengaruhi pengukuran. Ada dua tahap dalam kromatografi adsorpsi yang telah diterapkan pada minyak sayur sebelum analisis secara spektrofotometri.

b. Metode Kolorimetri

Berbagai reaksi warna dapat digunakan untuk menganalisis vitamin D secara kuantitatif. Metode yang paling umum digunakan adalah reaksi antimony triklorida yang diperkenalkan oleh Carr dan Price untuk analisis vitamin A, dan dimodifikasi oleh Brockmann dan Chen untuk analisis Vitamin D.

8. Vitamin E

Vitamin E merupakan salah satu vitamin yang larut lemak. Keaktifan vitamin E dalam beberapa senyawa tokoferol berbeda satu sama lain. Dikenal α -; β -; γ dan δ - tokoferol. Alfa tokoferol menunjukkan keaktifan vitamin E yang paling tinggi. Struktur kimia tokoferol adalah sebagai berikut:



α -tokoferol R = H
 α - tokoferol asetat R = CH₃CO

Gambar 10.11.Struktur vitamin E

a. Metode Serimetri

Metode serimetri didasarkan atas sifat mereduksi dari tokoferol setelah tokoferol asetat dihirolisis dengan asam. Tokoferol tidak stabil dalam larutan basa.

Cara penetapan kadar tokoferol asetat murni: Lebih kurang 250 mg tokoferol asetat yang ditimbang seksama dimasukkan ke dalam labu coklat kuning dasar bulat 100 mL dan dilarutkan dalam 25 mL etanol mutlak. Larutan ditambah 20 mL larutan asam sulfat 15% dalam etanol 95%, lalu direfluks selama 3 jam dan didinginkan. Larutan dipindahkan ke dalam labu ukur coklat kuning 200 mL. Sebanyak 50,0mL larutan diukur seksama ditambah 50 mL larutan asam sulfat 1,5% dalam etanol 95% dan 20 mL air lalu dicampur baik-baik. Larutan dititrasi dengan serium (IV) sulfat 0,01 N menggunakan indikator 2 tetes difenilamin. Titrasi dilakukan terlindung dari cahaya langsung, sebaiknya ditempat gelap, dengan tetesan diatur tiap 10 detik. Dilakukan titrasi blanko. Tiap mL larutan serium (IV) sulfat setara dengan 2,3638 mg tokoferol asetat.

b. Metode Spektrofotometri

Alfa tokoferol dalam etanol 95% menunjukkan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 292 nm dan minimum pada panjang gelombang 257 nm. Jika digunakan pelarut sikloheksan maka α -tokoferol menunjukkan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 298 nm dan minimum pada panjang gelombang 257 nm. Alfa tokoferol asetat dalam etanol 95% menunjukkan absorbansi maksimum pertama pada panjang gelombang 284 nm dan kedua pada panjang gelombang 279 nm serta absorbansi minimum pada panjang gelombang 281 nm. Dalam sikloheksan, α -tokoferol menunjukkan absorbansi maksimum ketiga pada panjang gelombang 288 nm dengan minimum pada panjang gelombang 286 nm.

Untuk penetapan kadar α -tokoferol dalam etanol, digunakan panjang gelombang 292 nm atau 298 nm dalam sikloheksan. Sementara itu, untuk α -tokoferol asetat panjang gelombang 284 nm dapat digunakan untuk kedua pelarut tersebut.

c. Metode Kolorimetri

Dalam AOAC (1995), penetapan kadar vitamin E dalam makanan baik dalam bentuk kering maupun basah dilakukan secara kolorimetri. Prinsipnya adalah α -tokoferol diekstraksi dari sampel dengan pelarut organik. Residu lemak disabunkan, α -tokoferol diisolasi dengan kromatografi lapis tipis dan ditetapkan kadarnya secara kolorimetri.

DAFTAR PUSTAKA

- Altun, M.L, 2002, *HPLC Method for the Analysis of Paracetamol, Caffeine and Dipyrone*, Turk J.Chem
- Alarfaj, N.A, Altamimi, S.A, and Almarshadi, L.Z, 2009, *Spectrophotometric Determination of Mefenamic Acid in Pharmaceutical Preparations*, Asian Journal of Chemistry, Vol. 21(1), p. 217-216
- Auterhoff, H and Kovar, K.A, 2002, *Identifikasi Obat*, Penerbit ITB, Bandung
- Abdel-Hamid, M.E, Najib, N.M, Suleirnan, M.S, and El-Sayed, Y.M, 1987, *Differential Spectrophotometric, Fluorimetric and HPLC Determination of Diflunisal and its Tablets*, Analyst, Vol.112
- Amin, A.S, Dessouki, H.A, and Khalil, K.M, 2010, *Indirect Spectrophotometric Determination of Piroxicam and Tenoxicam Through Oxidation With Potassium Permanganate*, Bull. Chem. Soc. Ethiop
- Alpdogan, G, Karabina, K and Sungur, S, 2002, *Derivative Spectrophotometric Determination of Caffeine in Some Beverages*, Turk, J.Chem.
- Al-Ghannam, S.M and Al-Olyan, A.M, 2005, *Differential Electrolytic Potentiometric Titration of Vitamin C in Pharmaceutical Preparations*, Journal of Food and Drug Analysis, Vol.13
- Ahuja, S and Scypinski, S, 2001, *Handbook of Modern Pharmaceutical Analysis*, Academic Press, New York.

- Basavaiah, K and Charan, V.S, 2002, *The Use of Chloranilic Acid for the Spectrophotometric Determination of Three Antihistamines*, Turk J.Chem, 26
- Bartzatt, R, 2002, *Determination of Barbituric Acid, Utilizing a Rapid and Simple Colorimetric Assay*, J.Pharm, Biomed, Anal, 29
- Criado, P.R, Maruta, C.W, Criado, Roberta, F.J and Filho, Carlos d'Apparecido, M, 2010, *Histamin, Histamine Receptors and Antihistamine: New Concepts*, An Bras Dermatol, 85 (2)
- Clark, E.G.C, 1971, *Isolation and Identification of Drugs in Pharmaceutical, Body Fluid and post-mortem material*, The Pharmaceutical Press, London
- Dubey, S.K, Venkatesh, C, and Hemanth, J, 2011, *Spectrofluorometric Determination of Celecoxib in Bulk and Formulations*, American Journal of Pharmtech Research, Vol I.
- El Sherif, Z.A, Walash, M.I, El-Tarras, M.F, and Osman, A.O, *Colorimetric Determination of Two Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs Using P-Dimethylaminocinnamaldehyde*.
- Fiesher, L.F, 1941, *Experiment in Organik Chemistry*, DC Heath and Company, New York
- Gandjar, I.G, Rohman, A, 2010, *Kimia Farmasi Analisis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hailin Zhu, Hengwu Chen, and Yonglie Zhou, 2003, *Determination of Thiamin in Pharmaceutical Preparation by Sequential Injection Renewable*

Surface Solid Phase Spectrofluorometry, Analytical Sciences; Vol 9

- Hossu, A.M, Maria, M.F, Stoica, A, Ilie, M, and Jordan, M, 2009, *Determination of tocopherol in oil pharmaceuticals by using the spectrofluorimetry and method validation*, Ovidius University Annals of Chemistry
- Hussein, A.A, Al-Janabi, S, and Mahood, A.B.M, *Determination of Theophylline Stability in New Cream Formulation*, Asian Journal of Medical Sciences, I (3)
- Higuchi, T, 1961, *Pharmaceutical Analysis*, Interscience Publisher, New York
- Hulshoff, A, Van Der Houwen, O.AG.J, Barends, D.M and Kostenbauder, H.B, 1979, *The Determination of Pentobarbital and Other Barbiturates in Blood Plasma By Gas-LC with on Coloumn and Pre Coloumn Butylation*, Analytica Chimica Acta.
- Jenkins, G.L, 1967, *Quantitative Pharmaceutical Chemistry*, 6th edition, Mc Graw-Hill Book Company, New York,
- Jedlicka, A and Klimes, J, 2005, *Determination of Water- and Fat-Soluble Vitamins in Different Matrices Using High-Performance Liquid Chromatography*, Chem.Pap, 59 (3)
- Khaskheli, A.R, Sirajuddin, Abro, K, Sherazi,S.T.H, Sfridi, H.I, Mahesar, S.A, and Saeed Munawar, 2009, *Simpler and Faster Spectrophotometric Determination of Diclofenac Sodium in Tablets*,

Serum dan Urine Samples, Pak. J. Anal. Environ. Chem. , Vol. 10 (1 & 2)

- Kormosh, Z, Hunka, I, and Basel, Y, 2009, *Spectrophotometric Determination of Ketoprofen and Its Application in Pharmaceutical Analysis*, Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research, Vol. 66
- Karmi, O, Zayed, A, Baraghehi, S, Qadi, M and Ghanem, R, 2011. *Measurement of Vitamin B12 concentration: A Review on Available Methods*, The IIOAB Journal
- Kar, A, 2005, *Pharmaceutical Drug Analysis*, New Age International (P) Limited, Publisher, New Delhi
- Mitra, S, 2003, *Sample Preparation Technique in Analytical Chemistry*, Wiley-Interscience, New York.
- Muszalska, I, Puchalska, M and Sobczak, A, 2011, *Determination of Vitamin B6 By Means of Differential Spectrophotometry in Pharmaceutical Preparation in The Presence of Magnesium Compounds*, Acta Poloniae Pharmaceutica n Drug Research, Vol. 68 (6).
- Madhulika, CH, Smith, A.A, Seetaramajah, K, Muthu, A.K and Manavalan, R, 2011, *Spectrophotometric Determination of Sulphamehtoxazole in Pharmaceutical Formulation*, Internation Journal of Pharmaceutical Sciences, Review and Research.
- Monzon, C.M, Delfino, M.R, and Sarno, Maria del C, 2008, *Phenobarbital in Pharmaceutical Tablets By Modified Conductimetric Analysis*, The Journal of The Argentine Chemical Society, Vol.9

- Mohrig, J.R, Hammond, C.N, and Schatz, P.F, 2010, *Techniques in Organik Chemistry*, W. H. Freeman and Company, New York
- Ozlu, C, Basan, H, Satana, E, Ertas, N, and Goger, N.G, 2004, *Quantitative Determination of Ketoprofen in Gels and Ampouls By Flow Injection UV Spectrophotometry*, Adnan Menderes University, 4th AACD Congress, Kuşadası-AYDIN, TURKEY Proceedings Book 119.DOC
- Pedersen, O, 2006, *Pharmaceutical Chemical Analysis: Methods for Identification and Limit Test*, CRC Taylor & Francis, New York
- Peinado, S.F, Ceba, M.R, and Gutierrez, A.F, 1999, *Determination of the antibacterial drug sulfamethoxazole in pharmaceutical preparations containing trimethoprim by spectrofluorimetry after derivatization with fluorescamine*, Fresenius J Anal Chem.
- Raja, GJ, Sekaran, CB, Teja, DW, Badhuri, B and Jayasree, B, 2009, *Simple Spectrophotometric Methods for the Determination of Sulfamethaxazole in Pharmaceuticals Using Folincicalteau and Orcinol as Reagents*, E-Journal of Chemistry
- Revathi, R, Perumal, R.V, Sudharshini, S, Ansar, A.M, Thilagalakshmi, A and Dinesh, A.P, 2011, *Simple UV Spectrophotometric Determination of Celecoxib in Pure Form and in Pharmaceutical Formulation*, International Journal of Pharmaceutical Science Letters, Vol.I (2).

- Raza, A, 2008, *Spectrophotometric Determination of Mefenamic Acid in Pharmaceutical Preparation*, Analytical Laboratory, Bio Fine Pharmaceuticals (Pvt.)Ltd. Multan, Pakistan
- S. P. Sastry , D. S. Mangala and K. Ekambareswara Rao, *Spectrophotometric and fluorimetric methods for the determination of indomethacin*,
- Sudjadi and Rohman, A, 2008, *Analisis Kuantitatif Obat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Sayin, F and Kir, F, 2004, *Determination of Diflunisal in Tablets Using Derivative UV Spectrophotometric Method*, FABAD J. Pharm. Sci., 29, 121-126
- Sultan, S.M, 1987, *Determination of Aspirin in Pharmaceutical Preparation by Spectrophotometry After Oxidation with Potassium Dichromate*, Analyst, Vol.112
- Suzen, S, Akay, C, Tartilmis, S, Erdol, R.S, Onal, A and Cevheroglu, S, 1998, *Quantitation of Acetaminophen in Pharmaceutical Formulation Using High Performance Liquid Chromatography*, J. Fac. Pharm. Ankara
- Shamsa, F and Amani, L, 2006, *Determination of Sulfamethoxazole and Trimethoprim in Pharmaceuticals by Visible and UV Spectrophotometry*, Iranian Journal of Pharmaceutical Research
- Sengar, MR, Gandhi, SV, Patil, UP, and Rajmane, VS, 2010, *Simultaneous Determination of Diclofenac Sodium and Thiocolchicoside in Fixed Dose*

- Combination By Spectrophotometry, Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, Vol.3*
- Tabrizi, A.B, 2007, *A Simple Spectrofluorimetric Method for Determination of Piroxicam and Propranolol in Pharmaceutical Preparations*, Journal of Food and Drug Analysis, Vol. 15(3).
- Tabrizi, A.B, 2006, *A Simple Spectrofluorimetric Method for Determination of Mefenamic Acid*, Bull. Korean Chem. Soc. 2006, Vol. 27 (8).
- Tella, A.C, Olabemiwo, O.M, Obiyenwa, K, and Salawu, M.O, 2010, *A Method of Assay for The Estimation of Sulphadimidine in Tablets*, African Scientist, Vol.11
- Vogel, A.I, 1958, *Elementary Practical Organik Chemistry; Quantitative Organik Analysis*, Longman, London
- Watson, D.G, 1999, *Pharmaceutical Analysis, A Textbook for Pharmacy Student and Pharmaceutical Chemists*, Churchill Livingstone, New York.

BIODATA PENULIS



Haeria, S.Si, M.Silahir di Camba (Sulawesi Selatan) pada tanggal 15 Juli 1978. Menyelesaikan Sekolah Dasartahun 1990 dan Sekolah Menengah Pertama tahun 1993. Keilmuan Farmasi mulai digeluti sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Farmasi (SMF) Depkes Ujung Pandang tahun 1993-1996, dilanjutkan kejenjang Strata Satu Farmasi Universitas Pancasakti Makassar (lulus tahun 2004) dan program Magister Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin (lulus tahun 2011). Saa ini penulis adalah doseneteta ppada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Beberapa karya ilmiah termasuk penelitian yang telah dihasilkan penulis adalah Analisis Senyawa Xanthin, Kokristal Farmasi sebagai Alternatif Perbaikan Bioavailabilitas Obat, Karakteris asidan Uji Disolusi Kokristal Asiklovir dan Asam Askorbat.



ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS
082348671117 - au_press@yahoo.com

