

Syarfaini, SKM., M.Kes

Berbagai Cara Menilai Status



Syarfaini, SKM., M.Kes.

BERBAGAI CARA MENILAI STATUS GIZI MASYARAKAT



Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

**BERBAGAI CARA MENILAI
STATUS GIZI MASYARAKAT**

Penulis:

Syarfaini, SKM., M.Kes.

Editor:

Isriany Ismail

Cetakan: I 2014

x + 218 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978-602-237-969-0

Alauddin University Press

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa

SAMBUTAN REKTOR

Jika engkau ingin meng"abadi", maka tinggalkanlah "Legacy"

Ungkapan di atas memberi gambaran bahwa setiap manusia hendaknya selalu melahirkan karya terbaiknya untuk dipersembahkan kepada umat. Karya itu akan menjadi sebuah *legacy* yang akan selalu diingat dan dikenang, bahkan diabadikan dalam catatan sejarah peradaban anak manusia. Jutaan bahkan milyaran anak manusia telah dan akan lahir di permukaan dunia ini, namun tidak semua mampu mencatatkan dirinya dalam kelindan sejarah yang "menyejarah". Hanya sebagian kecil anak manusia yang mampu menghadirkan dan meng"abadi"kan dirinya dalam garis lingkaran lintasan sejarah.

Dalam bingkai dan konstruksi emosional, manusia pada hakikatnya ingin abadi. Itulah sebabnya manusia ingin selalu mengabadikan momentum penting dalam ruang dan waktu yang senantiasa berubah. Mereka membuat gambar, foto, lukisan, dan sejenisnya yang seakan-akan berkeinginan menyetop waktu yang senantiasa berubah. Demikian pula aktivitas manusia membangun monumen bersejarah tidak lain tujuannya untuk mengabadikan sebuah peristiwa penting dalam sejarah peradaban manusia, bahkan Khairil Anwar berkata: "*Aku ingin hidup seribu tahun lagi*".

Karya akademik pada hakikatnya merupakan sebuah monumen penting dalam kehidupan yang dapat menjadi *legacy*. Karya itu dapat dinikmati oleh siapa saja yang cinta terhadap pengetahuan. Karya akademik bukan sekadar sebuah tulisan yang menjadi hiasan di dalam rak, lemari atau ruang baca, tetapi dia mampu melahirkan perubahan dan memberikan pencerahan kepada manusia. Terlebih

dalam perspektif eskatologis, karya akademik dapat menjadi amal jariah di "alam sana".

Atas dasar kesadaran itulah, maka program Gerakan Seribu Buku (GSB) ini dilaksanakan, dengan harapan setiap dosen mampu melahirkan "legacy" dalam catatan kehidupannya berupa karya tulis yang dipublikasikan. Gerakan ini diharapkan menjadi "trigger" untuk melahirkan karya-karya berikutnya.

Saya merasa gembira bahwa dosen UIN Alauddin tidak saja mampu berorasi di atas mimbar, tetapi juga dapat menuangkan gagasan, ide, dan pikirannya dalam bentuk tulisan. Hingga periode akhir masa jabatan saya sebagai Rektor, program GSB ini telah tuntas dilaksanakan. Itu artinya, hingga saat ini tidak kurang dari 1000 buah karya akademik telah dipublikasikan oleh para dosen UIN Alauddin Makassar. Fakta ini harus diapresiasi dan menjadi catatan penting bagi pejabat (Rektor) berikutnya.

Karya tulis merupakan perbendaharaan terbesar di dunia akademik. Hanya dengan budaya menulis dan membaca, maka dunia akademik menjadi hidup, bahkan al-Quran mengisyaratkan bahwa lahir dan hadirnya pengetahuan serta peradaban harus diawali dengan budaya "iqra/baca" dan "al-qalam/pena". Karena itulah, UIN sebagai kampus peradaban harus menjadi pioneer dari tradisi literasi ini, sebab rendahnya budaya "baca-tulis" pada suatu bangsa atau sebuah kampus mengindikasikan lemahnya kesadaran terhadap eksistensi diri, alam, dan Tuhan.

Samata, 2 Oktober 2014
Rektor,

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, MS

KATA PENGANTAR

Penilaian status gizi adalah sebuah metode mendeskripsikan kondisi tubuh sebagai akibat keseimbangan makanan yang dikonsumsi dengan penggunaannya oleh tubuh, yang biasanya dibandingkan dengan suatu nilai normatif yang ditetapkan. Dalam Penilaian status gizi dibahas berbagai metode yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan status gizi tersebut. Metode penilaian status gizi (PSG) ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama: metode secara langsung yang terdiri dari penilaian secara Antropometri, Biokimia, Biofisik dan Klinis. Kelompok kedua: penilaian dengan melihat statistik kesehatan dan faktor ekologi yang biasa disebut dengan penilaian status gizi (PSG) tidak langsung karena tidak menilai individu secara langsung.

Peran dan kedudukan penilaian status gizi (PSG) adalah untuk mengetahui status gizi, yaitu ada tidaknya malnutrisi pada individu dan masyarakat. Data penilaian status gizi dapat dikumpulkan dengan berbagai cara. Pengumpulan data ini akan menjadi penting kedudukannya karena akan memberikan informasi tentang bagaimana mengidentifikasi kelompok atau individu yang memiliki resiko mengalami masalah gizi; mengukur hubungan antara asupan gizi dan kesehatan; menentukan jenis intervensi untuk meningkatkan status gizi serta memonitor efek dari intervensi gizi.

Pengetahuan dan keterampilan dalam penilaian status gizi sangat penting buat mereka yang bergerak di bidang epidemiologi, gizi masyarakat dan gizi klinik, dan peneliti yang bergerak dibidang kesehatan.

Agar pemahaman terhadap cara menilai status gizi masyarakat dapat lebih menyeluruh, maka pembahasan dalam buku mencakup delapan Bab dimana isi tiap babnya disesuaikan dengan tingkatan kebutuhan informasi.

Diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, para mahasiswa, para peneliti dan pemerhati masalah gizi maupun khalayak umum yang ingin melihat besarnya prevalensi masalah gizi dengan menggunakan metode-metode penilaian status gizi sehingga lebih tepat dalam membuat kebijakan dan pengembangan strategi penanggulangan masalah gizi di Indonesia.

Pada akhirnya, kritik dan saran yang sifatnya membangun tetap penulis harapkan dari pembaca demi kesempurnaan dari penyusunan buku ini. Harapan penulis, semoga buku ini mampu memberikan manfaat dalam hal menyajikan informasi terkait dengan berbagai cara menilai status gizi masyarakat sebagai dasar untuk menentukan jenis intervensi gizi dalam perbaikan masalah gizi di Indonesia.

Makassar, 2014

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pengertian.....	1
B. Metode Penilaian Status Gizi	3
C. Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Memilih Metode PSG	8
D. Istilah-Istilah yang berhubungan dengan Status Gizi.....	10
BAB II PENILAIAN STATUS GIZI SECARA ANTROPOMETRI	
A. Konsep Pertumbuhan Sebagai dasar Antropometri Gizi.....	13
B. Pengertian dan Syarat Penggunaan Antropometri.....	24
C. Parameter Antropometri.....	25
D. Indeks Antropometri.....	46
E. Penggunaan Indeks Antropometri.....	55
F. Pengendalian Kualitas Data Antropometri	60
G. Klasifikasi Status Gizi.....	64
H. Aplikasi Antropometri.....	70
I. Keunggulan dan Kelemahan Keunggulan dan kelemahan Antropometri Gizi Keunggulan antropometri	70

BAB III PENILAIAN STATUS GIZI SECARA BIOKIMIA

A.	Pengertian.....	73
B.	Pemeriksaan Biokimia Zat Gizi Makro dan Mikro	75
C.	Pemeriksaan Zat Gizi Spesifik pada Gizi Kurang	120
D.	Keunggulan dan Kelemahan.....	123

BAB IV PENILAIAN STATUS GIZI SECARA BIOSFISIK

A.	Pengertian.....	125
B.	Pemeriksaan Radiologu, tes fungsi fisik dan Sitologi Pemeriksaan Radiologi	125

BAB V PENILAIAN STATUS GIZI SECARA KLINIS

A.	Pengertian dan Jenis Pemeriksaan Klinis	129
B.	Pemeriksaan Fisik pada Masalah Gizi Kurang Keunggulan dan Kelemahan.....	146
C.	Keunggulan dan Kelemahan Pemeriksaan Klinis	157

BAB VI SURVEY KONSUMSI MAKANAN

A.	Pengertian, Tujuan dan Metode Pengukuran	169
B.	Kesalahan Pengukuran dan Perencanaan Konsumsi Makanan.....	179
C.	Perencanaan dan Pengorganisasian Konsumsi Makanan	182
D.	Pengolahan, Analisis dan Interpretasi Data Hasil Pengukuran Survey Konsumsi Makanan	185
E.	Angka Kecukupan Gizi (AKG).....	191

BAB VII STATISTIK VITAL

A.	Pengertian.....	195
----	-----------------	-----

B.	Kelemahan Statistik Vital	202
BAB VIII PENGUKURAN FAKTOR EKOLOGI		
A.	Pengertian.....	213
B.	Faktor Ekologi yang Berhubungan dengan Penyebab Malnutrisi	206
C.	Metode Pengumpulan data Variabel Ekologi	224
DAFTAR PUSTAKA		215
BIODATA PENULIS		218

x

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

Penilaian didefinisikan sebagai sebuah proses pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi. Sedangkan status gizi didefinisikan sebagai status kesehatan seseorang atau kelompok orang sebagai hasil dari asupan makanan dan utilisasi zat gizi oleh tubuh yang dapat berubah selama periode kehidupannya. Oleh karena itu penilaian status gizi dapat didefinisikan sebagai interpretasi informasi yang diperoleh dari penilaian asupan makanan, biokimia, antropometri dan studi klinik.

Penilaian status gizi sejak awal merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi masalah gizi, khususnya kekurangan gizi pada populasi/orang-orang yang hidup di negara berpenghasilan rendah, dengan penekanan pada kelompok yang rentan (Bayi, ibu hamil, lansia dll). Saat ini, metode penilaian status gizi sudah sangat jauh berkembang, tidak hanya untuk kelompok yang rawan dan negara berpenghasilan rendah saja yang menggunakan metode ini tetapi juga negara-negara berkembang dan maju di seluruh dunia.

Penilaian status gizi perlu dilakukan untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit yang erat kaitannya dengan asupan gizi. Semakin maju ilmu pengetahuan mengenai hubungan antara status gizi dan penyakit, semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan mengenai indikator yang digunakan dalam pengukuran tubuh manusia, semakin kuat pula keyakinan tentang perlunya dilakukan penilaian status gizi terhadap

masyarakat secara teratur. Indikator status gizi yang dikembangkan oleh pakar dapat digunakan untuk menginterpretasi keadaan gizi masa kini, masa lalu dan prospeknya di masa mendatang. Kemampuan untuk mengidentifikasi risiko status gizi pada seseorang dan kemampuan untuk secara efektif meningkatkan kesehatannya melalui peningkatan ke arah status gizi baik menyebabkan keterampilan dalam melakukan penilaian status gizi menjadi suatu keharusan bagi semua tenaga kesehatan yang peduli kepada perawatan kesehatan yang lebih *cost-effective*.

Penilaian status gizi saat ini merupakan komponen penting dari asuhan gizi pasien rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit. Disamping hubungan penting antara status gizi dan kesehatan secara umum, gizi ternyata sangat berpengaruh terhadap kesembuhan pasien yang mengalami penyakit atau luka akut, penilaian status gizi yang benar sering menjadi indikator terhadap keberhasilan upaya pemulihan kesehatan pasien. Dengan demikian dokter perlu menerapkan cara paling tepat dalam mendiagnosis, mengevaluasi dan memonitor status gizi pasien yang berada dalam keadaan risiko tinggi.

Dilapangan identifikasi status gizi suatu populasi dengan metode tertentu dapat mencerminkan masalah gizi masyarakat di daerah tersebut serta penyebabnya, sehingga upaya penanggulangannya dapat dilakukan secara tepat. Penegakan diagnosa dalam bidang gizi tidak cukup hanya dilakukan dengan satu metode saja, tetapi perlu digunakan dua atau lebih metode sehingga dapat diambil interpretasi dari status gizinya untuk kemudian ditentukan tindakan/upaya intervensi yang tepat untuk mengatasinya.


Menurut Supariasa (2002) Penilaian status gizi merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui status gizi seseorang. Cara penilaian status gizi dapat ditentukan dengan cara penilaian langsung, meliputi: antropometri, biokimia, klinis dan biofisik atau secara tidak langsung, meliputi: survei konsumsi, statistik vital dan faktor ekologi.

Menurut Gibson (1998), mengemukakan bahwa, penilaian status gizi adalah upaya menginterpretasikan semua informasi yang diperoleh melalui penilaian antropometri, konsumsi makanan, biokimia dan klinik. Informasi ini digunakan untuk menetapkan status kesehatan perorangan atau kelompok penduduk yang dipengaruhi oleh konsumsi dan utilisasi zat-zat gizi.

B. Metode Penilaian Status Gizi

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Keadaan gizi seseorang dapat dikatakan baik bila terdapat keseimbangan antara perkembangan fisik dan perkembangan mental intelektual.

Penilaian status gizi di masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi empat penilaian yaitu antropometri, klinis, biokimia dan biofisik. Sedangkan penilaian status gizi secara tidak langsung yaitu survei konsumsi makanan, statistik vital dan faktor ekologi.



Bagan 1.1. Metode Penilaian Status Gizi, Jellife D.B.,1989

Penilaian Status Gizi Secara langsung

Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi empat penilaian yaitu:

1. Antropometri

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Antropometri digunakan untuk pengukuran berbagai variasi ukuran fisik dan komposisi dari tubuh manusia untuk berbagai tingkat umur dan status gizi.

Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh.

2. Klinis

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel (*superficial epithelial tissues*) seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid.

Penggunaan metode ini umumnya untuk survey klinis secara cepat (*rapid clinical survey*). Survey ini dirancang untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Disamping itu digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik yaitu tanda (*sign*) dan gejala (*symptom*) atau riwayat penyakit.

3. Biokimia

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain : darah, urine, tinja, dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot.

Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi

yang lebih parah lagi. Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka penentuan kimia faali dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik.

4. Biofisik

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur dari jaringan. Umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian buta senja epidemik, cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap.

Dalam Melakukan keempat metode penilaian status gizi secara langsung, pelaksana penilaian harus mempunyai keterampilan saat melakukan pengukuran karena presisi dan akurasi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya. Selain hal tersebut di atas, alat-alat yang digunakan saat melakukan pengukuran atau penilaian harus dalam keadaan baik dan terpelihara dengan melakukan kalibrasi secara berkala.

Penilaian Status Gizi Secara Tidak Langsung

Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi tiga yaitu: survei konsumsi makanan, statistik vital dan faktor ekologi. Pengertian dan penggunaan metode ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Survey Konsumsi Makanan

Survey konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi.

Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga dan individu. Survey ini dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi.

2. Statistik Vital

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat.

3. Faktor Ekologi

Bengoa mengungkapkan bahwa malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi dan lain-lain. Pengukuran faktor ekologi dipandang sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi di suatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi.

C. Faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Memilih Metode Penilaian Status Gizi

Hal mendasar yang perlu diingat bahwa setiap metode penilaian status gizi mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dengan menyadari kelebihan dan kelemahan tiap-tiap metode, maka dalam menentukan diagnosis suatu penyakit perlu digunakan beberapa jenis metode. Penggunaan satu metode akan

memberikan gambaran yang kurang komprehensif tentang suatu keadaan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menggunakan metode adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan pengukuran sangat perlu diperhatikan dalam memilih metode, seperti tujuan ingin melihat fisik seseorang, maka metode yang digunakan antropometri. Apabila ingin melihat status vitamin dan mineral dalam tubuh sebaiknya menggunakan metode biokimia.

2. Unit Sampel yang Akan Diukur

Berbagai jenis unit sampel yang akan diukur sangat mempengaruhi penggunaan metode penilaian status gizi. Jenis unit sampel yang akan diukur meliputi individual, rumah tangga/keluarga dan kelompok rawan gizi.

3. Jenis Informasi yang Dibutuhkan

Pemilihan metode penilaian status gizi sangat tergantung pula dari jenis informasi yang diberikan. Jenis informasi itu antara lain: asupan makanan, berat dan tinggi badan, tingkat hemoglobin dan situasi sosial ekonomi. Apabila menginginkan informasi tentang asupan makanan, maka metode yang digunakan adalah survey konsumsi. Dilain pihak apabila ingin mengetahui tingkat hemoglobin maka metode yang digunakan adalah biokimia. Membutuhkan informasi seperti berat badan dan tinggi badan, sebaiknya menggunakan antropometri. Begitu pula jika membutuhkan informasi tentang situasi sosial ekonomi sebaiknya menggunakan faktor ekologi.

4. **Tingkat Reliabilitas dan Akurasi yang Dibutuhkan**
Masing-masing metode penilaian status gizi memiliki tingkat reliabilitas dan akurasi yang berbeda-beda. Contoh penggunaan metode klinis dalam menilai tingkatan pembesaran kelenjar gondok adalah sangat subjektif sekali. Penilaian ini membutuhkan tenaga medis dan paramedis yang sangat terlatih dan mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidang ini.
5. **Tersedianya Fasilitas dan Peralatan**
Dalam penilaian status gizi ada berbagai jenis fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan. Fasilitas tersebut ada yang mudah didapat dan ada pula yang sangat sulit diperoleh. Pada umumnya fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dalam penilaian status gizi secara antropometri relatif lebih mudah didapat dibanding dengan peralatan penentuan status gizi dengan biokimia.
6. **Tenaga**
Ketersediaan tenaga, baik jumlah maupun mutunya sangat mempengaruhi penggunaan metode penilaian status gizi. Jenis tenaga yang digunakan dalam pengumpulan data status gizi antara lain : ahli gizi, dokter, ahli kimia, dan tenaga lain.
7. **Waktu**
Ketersediaan waktu dalam pengukuran status gizi sangat mempengaruhi metode yang akan digunakan. Waktu yang ada bisa dalam mingguan, bulanan dan tahunan. Apabila kita ingin menilai status gizi di suatu masyarakat dan waktu yang tersedia relatif singkat, sebaiknya dengan menggunakan metode antropometri.

8. Dana

Masalah dana sangat mempengaruhi jenis metode yang digunakan untuk menilai status gizi. Umumnya penggunaan metode biokimia relatif mahal dibanding dengan metode lainnya. Penggunaan metode disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penilaian status gizi.

Jadi, pemilihan metode penelitian status gizi harus selalu mempertimbangkan faktor tersebut diatas. Faktor-faktor itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi selalu saling mengait. Oleh karena itu, untuk menentukan metode penilaian status gizi, harus memperhatikan secara keseluruhan dan mencermati kelebihan dan kekurangan tiap-tiap metode itu.

D. Istilah-Istilah yang berkaitan dengan status gizi

Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan status gizi. Istilah-istilah tersebut akan diuraikan dibawah ini:

Gizi (Nutrition)

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi.

Keadaan Gizi

Keadaan akibat dari keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi dan penggunaan zat-zat gizi

tersebut, atau keadaan fisiologik akibat dari tersedianya zat gizi dalam seluler tubuh.

Status Gizi (Nutrition Status)

Ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau perwujudan dari nutrire dalam bentuk variabel tertentu. Contoh: Gondok endemik merupakan keadaan tidak seimbang pemasukan dan pengeluaran yodium dalam tubuh.

Gizi Baik = Gizi Seimbang

Keadaan Apabila asupan gizi seimbang dengan kebutuhan gizi yang dibutuhkan dalam tubuh.

Gizi Kurang = Gizi tidak seimbang

Keadaan Apabila Asupan gizi lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam tubuh.

Gizi Lebih = Gizi tidak seimbang

Keadaan Apabila Asupan gizi lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam tubuh seperti dalam gambar berikut:

Malnutrition (Gizi Salah, Malnutrisi)

Keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif maupun absolut satu atau lebih zat gizi.

Ada empat bentuk malnutrisi:

- a) Under Nutrition: Kekurangan konsumsi pangan secara relatif atau absolut untuk periode tertentu.
- b) Specific Defisiensi : Kekurangan zat gizi tertentu, misalnya kekurangan vitamin A, yodium, Fe, dan lain-lain.
- c) Over Nutrition: Kelebihan konsumsi pangan untuk periode tertentu.

- d) Imbalance karena disproporsi zat gizi, misalnya: kolesterol terjadi karena tidak seimbangnya LDL (Low Density Lipoprotein), HDL (High Density Lipoprotein) dan VLDL (Very Low Density Lipoprotein).

Kurang Energi Protein (KEP)

Kurang Energi Protein (KEP) adalah seseorang yang kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari dan atau gangguan penyakit tertentu.

Anemia

Anemia adalah Suatu keadaan dimana kadar hemoglobin dalam darah seseorang kurang dari batas normal dan merupakan manifestasi akhir dari defisiensi zat besi.

Xerophthalmia

Xeroftalmia adalah kelainan pada mata akibat Kurang Vitamin A. Kata Xeroftalmia berarti "mata kering" karena terjadi kekeringan pada selaput lendir (konjungtiva) dan selaput bening (kornea) mata

Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

Gangguan Akibat Kekurangan Yodium adalah kumpulan gejala-gejala yang disebabkan oleh gangguan akibat kekurangan yodium (*Iodine Deficiency Disorders*). Gejala: pembesaran kelenjar Gondok dan Kretin (cebol)

BAB II

PENILAIAN STATUS GIZI SECARA ANTROPOMETRI GIZI

A. Konsep Pertumbuhan sebagai dasar Antropometri Gizi


Penilaian Status Gizi dengan metode antropometri adalah menjadikan ukuran tubuh manusia sebagai alat menentukan status gizi manusia. Konsep dasar yang harus dipahami dalam menggunakan antropometri secara antropometri adalah Konsep Dasar Pertumbuhan.

Pertumbuhan secara gamblang dapat diartikan terjadinya perubahan sel tubuh dalam 2 (dua) bentuk yaitu: Pertambahan sel dan pembelahan sel, yang secara akumulasi terjadinya perubahan ukuran tubuh. Jadi pada dasarnya menilai status gizi dengan metode antropometri adalah menilai pertumbuhan. Hanya saja pertumbuhan dalam pengertian pertambahan sel memiliki batas waktu tertentu. Para pakar antropometri sepakat bahwa pada umumnya pertumbuhan manusia dalam arti pertambahan sel akan berhenti pada usia 18-20 tahun, walaupun masih ditemukan sebelum 18 pertumbuhan sudah berhenti, dan sebaliknya setelah 20 tahun masih ada kemungkinan pertumbuhan masih berjalan.

Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan Pertumbuhan

Pertumbuhan secara konseptual didefinisikan sebagai perubahan kuantitatif dalam arti pertambahan ukuran dan struktur. Perubahan ukuran dan struktur tersebut tidak hanya terjadi pada bagian badan yang besar yang berada diluar, namun juga dalam organ tubuh, termasuk otak. Pengertian pertumbuhan juga

hanya dibatasi untuk perubahan struktur dan faali dalam konstitusi fisik. Perubahan akibat pertumbuhan yang bersifat kumulatif dan dapat diukur secara langsung. Konsep pertumbuhan mengandung dua pengertian yaitu bertambahnya jumlah sel atau hiperplasi, dan bertambahnya ukuran sel atau hipertrofia. Dengan demikian pertumbuhan berkaitan dan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau tingkatan dimensi sel, organ maupun individu yang diukur dengan ukuran berat (gram, pound, kilogram), ukuran panjang (cm, meter), umur tulang, dan keseimbangan metabolik dengan mengukur retensi Kalsium dan Nitrogen tubuh.



Gambar 2.1. Anak-anak dalam masa pertumbuhan

Pertumbuhan dalam kehidupan manusia dimulai sejak janin dalam kandungan berlanjut pada masa bayi, kanak-kanak dan pada masa remaja kemudian berakhir pada masa dewasa. Pertumbuhan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan mengikuti perjalanan waktu. Selama pertumbuhan terjadi perubahan ukuran fisik. Ukuran fisik tidak lain adalah ukuran tubuh manusia baik dari segi dimensi, proporsi maupun komposisinya. Ukuran fisik manusia dapat diukur. Ilmu


yang mempelajari ukuran fisik pada bagian tubuh tertentu dikenal dengan sebutan antropometri.

Membahas pertumbuhan sebenarnya kita tidak dapat lepas dari pembahasan mengenai siklus hidup manusia (human life cycle). Dalam setiap tahapan siklus hidup manusia menggambarkan terjadinya adanya proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan akan berhenti setelah manusia sampai pada tahap "dewasa". Setelah usia 1 (satu) tahun, pertumbuhan anak akan mengalami perlambatan, tetapi tubuh mengalami perubahan dramatis. Perubahan internal yang melengkapi masa itu adalah mulai terjadi penambahan masa dan kepadatan tulang serta jaringan otot. Mulai memasuki usia dua tahun, seorang anak akan kehilangan sebagian besar lemak tubuhnya. Beberapa bagian otot, terutama pada tungkai, punggung dan pantat mulai mengencang dan kuat, dan tulang tungkai kaki semakin panjang dan padat. Pada usia pra sekolah (4-5 tahun) pertumbuhan otot sudah lebih sempurna, sehingga akan menunjang perkembangan motoriknya. .

Kecepatan pertumbuhan anak akan berbeda pada setiap masa. Terdapat dua periode, di mana pertumbuhan anak terjadi sangat cepat, yang disebut masa tumbuh pesat (*growth spurt*), yaitu pada masa balita dan masa remaja. Terdapat pula periode di mana terjadi kegoncangan pertumbuhan yang disebut *growth faltering*. *Growth faltering* merupakan kejadian yang sangat umum terjadi pada anak umur 0 - 6 bulan, dengan tanda goncangan grafik pertumbuhan, baik dalam pertumbuhan masa tubuh maupun pertumbuhan linear, yang keduanya menjurus ke arah penurunan grafik bila dibandingkan dengan rujukan tertentu.

Perkembangan

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan dan beriringan pada diri seorang anak mulai dari konsepsi sampai dewasa. Proses tersebut merupakan interaksi yang terus menerus antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Siklus kehidupan manusia mengalami dua kali masa tumbuh pesat atau yang disebut "*growth spurt periode*", yaitu pada masa anak-anak (*childhood*) dan masa remaja (*adolescence*). Masa anak-anak meliputi umur 1 sampai dengan 10 tahun, dan masa ini terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan umur dan perkembangannya. Kelompok pertama adalah toddlers (1-3 tahun), kelompok kedua adalah usia pra sekolah (4-5 tahun), dan kelompok ketiga adalah usia sekolah (6-10 tahun). Usia pra sekolah merupakan masa kritis dalam tumbuh kembang anak karena pada masa ini fase pertumbuhan anak telah melampaui fase *growth faltering*, namun diikuti dengan perkembangan yang lebih pesat. Beberapa hal yang mempengaruhi antara lain karena pada masa ini anak sudah mulai mengenal lingkungan sekitar, sehingga faktor lingkungan mulai berpengaruh terhadap keadaan gizi dan kesehatan anak usia pra sekolah.



Gambar.2.2. Anak-anak dalam masa perkembangan

Definisi perkembangan menurut Sinclair, D (1973) meliputi parameter psikologi, idea dan pemahaman dan perolehan skill motorik dan sensory. Hurlock, B (1980) dalam psikologi perkembangan menganggap penting dasar permulaan merupakan sikap kritis karena dasar permulaan merupakan atau mengarah kepada penyesuaian diri pribadi atau sosial bila sudah tua. Banyak para ahli psikologi memandang tahun pra sekolah merupakan tahapan penting atau kritis dimana mulai diletakkan dasar struktural perilaku komplek yang dibentuk dalam kehidupan.

Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Pengertian ini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ dan system organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya termasuk juga perkembangan emosi, intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya.

Perkembangan manusia meliputi perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi sepanjang kehidupan, berlangsung terus-menerus, bersifat irreversibel dan merupakan proses yang kompleks dan lebih ditekankan sebagai penambahan fungsi. Ilmu baru tentang perkembangan manusia lebih menekankan segala aspek yang berkaitan perubahan perilaku yang meliputi perubahan kecerdasan, ekspresi emosi, kreatifitas, moralitas dan kemampuan bersosialisasi.

Perkembangan juga seperti pertumbuhan mengikuti suatu pola spesifik dan dapat diramalkan mengikuti hukum arah perkembangan yang disebut

Hukum Cephalocaudal yang menjelaskan bahwa perkembangan menyebar keseluruh tubuh dari kepala ke kaki dan hukum proximodistal yang menetapkan bahwa perkembangan menyebar keluar dari titik poros sentral ke anggota tubuh. Perkembangan akan mengikuti pola yang berlaku umum jika kondisi lingkungan mendukung. Setiap tahapan perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Perkembangan sangat dibantu rangsangan. Setiap tahapan mempunyai risiko. Perkembangan terjadi karena kematangan dan pengalaman dari lingkungan serta perkembangan dipengaruhi oleh budaya. Namun disadari tahap perkembangan anak berbeda seperti yang dikemukakan oleh beberapa pakar.

Pola perkembangan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, fisik dan psikis yang menimbulkan perbedaan tampilan dari setiap anak. Perkembangan mencakup rangsangan yang diberikan kepada anak dan umumnya pencapaian perkembangan optimal tergantung rangsangan (stimuli) dari luar dan umumnya anak mencapai perkembangan tertentu pada umur yang lebih tinggi. Perkembangan mengikuti jalur pertumbuhan dan memiliki pola sesuai dengan umur dan taraf perkembangan. Apabila beberapa taraf perkembangan tidak dicapai oleh anak pada umur batas anak, maka perlu dicurigai bahwa anak-anak mengalami kelambatan perkembangan dan perlu dikonsultasikan kepada ahlinya. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat dipindahkan dan harus berjalan beriringan. Misalkan perkembangan kepala terjadi sangat cepat khususnya pada tahun pertama umur bayi, karena otak berkembang sangat pesat. Perkembangan kepandaian bayi terutama tergantung

pada berfungsinya otak dan sistem syaraf serta rangsangan yang diterima anak. Waktu dilahirkan bayi hanya dapat melakukan sesuatu terbatas untuk dirinya, tetapi kemudian secara teratur semakin berkembang sampai mampu mengontrol tubuhnya dan melakukan pekerjaan khusus. Tingkatan (fase-fase) perkembangan kemampuan anak menurut umur perlu diketahui untuk dapat dipakai sebagai indikator perkembangan kepandaian anak.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan

1. Faktor Internal (genetik)

Gen yang terdapat di dalam nukleus dari telur yang dibuahi pada masa embrio mempunyai sifat tersendiri pada tiap individu. Manifestasi hasil perbedaan antara gen ini dikenal sebagai hereditas. DNA yang membentuk gen mempunyai peranan penting dalam transmisi sifat-sifat hereditas. Timbulnya kelainan familial, kelainan khusus tertentu, tipe tertentu dari dwarfism adalah akibat transmisi gen yang abnormal. Haruslah diingat bahwa beberapa anak bertubuh kecil karena konstitusi genetiknya dan bukan karena gangguan endokrin atau gizi. Peranan genetik pada sifat perkembangan mental masih merupakan hal yang diperdebatkan. Memang hereditas tidak dapat disangsikan lagi mempunyai peranan yang besar tapi pengaruh lingkungan terhadap organisme tersebut tidak dapat diabaikan. Pada saat sekarang para ahli psikologi anak berpendapat bahwa hereditas lebih banyak mempengaruhi inteligensi dibandingkan dengan lingkungan. Sifat-sifat emosional seperti perasaan takut, kemauan dan temperamen lebih banyak

dipengaruhi oleh lingkungan dibandingkan dengan hereditas.

a. Jenis kelamin.

Pada umur tertentu pria dan wanita sangat berbeda dalam ukuran besar, kecepatan tumbuh, proporsi jasmani dan lainnya sehingga memerlukan ukuran-ukuran normal tersendiri. Wanita menjadi dewasa lebih dini, yaitu mulai adolesensi pada umur 10 tahun, sedangkan pria mulai pada umur 12 tahun.

b. Ras atau bangsa.

Oleh beberapa ahli antropologi disebutkan bahwa ras kuning mempunyai hereditas lebih pendek dibandingkan dengan ras kulit putih. Perbedaan antar bangsa tampak juga bila kita bandingkan orang Skandinavia yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang Itali.

c. Keluarga.

Tidak jarang dijumpai dalam suatu keluarga terdapat anggota keluarga yang pendek sedangkan anggota keluarga lainnya tinggi.

d. Umur.

Kecepatan tumbuh yang paling besar ditemukan pada masa fetus, masa bayi dan masa adolesensi.

2. Faktor Eksternal (Lingkungan)

Faktor lingkungan sangat menentukan tercapainya potensi genetik yang optimal. Apabila kondisi lingkungan kurang mendukung atau jelek, maka potensi genetik yang optimal tidak akan tercapai. Lingkungan ini meliputi lingkungan bio-fisiko-

psikososial yang akan mempengaruhi setiap individu mulai dari masa konsepsi sampai akhir hayatnya.

a. Gizi (defisiensi vitamin, iodium dan lain-lain).

Dengan menghilangkan vitamin tertentu dari dalam makanan binatang yang sedang hamil, Warkany menemukan kelainan pada anak binatang tersebut. Jenis kelainan tersebut dapat diduga sebelumnya dengan menghilangkan vitamin tertentu. Telah dibuktikan pula bahwa kurang makanan selama kehamilan dapat meningkatkan angka kelahiran mati dan kematian neonatal. Diketahui pula bahwa pada ibu dengan keadaan gizi yang jelek tidak dapat terjadi konsepsi. Hal ini disinggung pula oleh Warkany dengan mengatakan *The most serious congenital malformation is never to be conceived at all.*

b. Mekanis (pita amniotik, ektopia, posisi fetus yang abnormal, trauma, oligohidramnion).

Faktor mekanis seperti posisi fetus yang abnormal dan oligohidramnion dapat menyebabkan kelainan kongenital seperti clubfoot, mikrognatia dan kaki bengkok. Kelainan ini tidak terlalu berat karena mungkin terjadi pada masa kehidupan intrauterin akhir. Implantasi ovum yang salah, yang juga dianggap faktor mekanis dapat mengganggu gizi embrio dan berakibat gangguan pertumbuhan.

c. Toksin kimia (propiltiourasil, aminopterin, obat kontrasepsi dan lain-lain).

Telah lama diketahui bahwa obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kelainan seperti misalnya palatoskizis, hidrosefalus, disostosis kranial.

d. Bayi yang lahir dari ibu yang menderita diabetes melitus sering menunjukkan kelainan berupa

makrosomia, kardiomegali dan hiperplasia adrenal. Hiperplasia pulau Langerhans akan mengakibatkan hipoglikemia. Umur rata-rata ibu yang melahirkan anak mongoloid dan kelainan lain umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan umur ibu yang melahirkan anak normal. Ini mungkin disebabkan oleh kelainan beberapa endrokin dalam tubuh ibu yang meningkat pada umur lanjut, walaupun faktor lain yang bukan endokrin juga ikut berperan.

- e. Radiasi (sinar Rontgen, radium dan lain-lain). Pemakaian radium dan sinar Rontgen yang tidak mengikuti aturan dapat mengakibatkan kelainan pada fetus. Contoh kelainan yang pernah dilaporkan ialah mikrosefali, spina bifida, retardasi mental dan deformitas anggota gerak. Kelainan yang ditemukan akibat radiasi bom atom di Hiroshima pada fetus ialah mikrosefali, retardasi mental, kelainan kongenital mata dan jantung.
- f. Infeksi (trimester I: rubela dan mungkin penyakit lain, trimester II dan berikutnya: toksoplasmosis, histoplasmosis, sifilis dan lain-lain). Rubela (German measles) dan mungkin pula infeksi virus atau bakteri lainnya yang diderita oleh ibu pada waktu hamil muda dapat mengakibatkan kelainan pada fetus seperti katarak, bisu tuli, mikrosefali, retardasi mental dan kelainan kongenital jantung. Lues kongenital merupakan contoh infeksi yang dapat menyerang fetus intrauterin sehingga terjadi gangguan pertumbuhan fisis dan mental. Toksoplasmosis pranatal dapat mengakibatkan makrosefali kongenital atau mikrosefali dan renitinitis.

- g. Imunitas (eritroblastosis fetalis, kernicterus).
Keadaan ini timbul atas dasar adanya perbedaan golongan darah antara fetus dan ibu, sehingga ibu membentuk antibodi terhadap sel darah merah bayi yang kemudian melalui plasenta masuk ke dalam peredaran darah bayi yang akan mengakibatkan hemolisis. Akibat penghancuran sel darah merah bayi akan timbul anemia dan hiperbilirubinemia. Jaringan otak sangat peka terhadap hiperbilirubinemia ini dan dapat terjadi kerusakan.
- h. Anoksia embrio (gangguan fungsi plasenta)
Keadaan anoksia pada embrio dapat mengakibatkan pertumbuhannya terganggu.

Jenis Jenis pertumbuhan

Pada dasarnya jenis pertumbuhan dapat dibagi dua yaitu: pertumbuhan yang bersifat linier dan pertumbuhan massa jaringan. Dari sudut pandang antropometri, kedua jenis pertumbuhan ini mempunyai arti yang berbeda. Pertumbuhan linier menggambarkan status gizi yang dihubungkan pada saat lampau dan pertumbuhan massa jaringan menggambarkan status gizi yang dihubungkan pada saat sekarang atau saat pengukuran.

a. Pertumbuhan linier

Bentuk dari ukuran linier adalah ukuran yang berhubungan dengan panjang. Contohnya panjang badan, lingkar badan, dan lingkar kepala. Ukuran linear yang rendah biasanya menunjukkan keadaan gizi yang kurang akibat kekurangan energi dan protein yang diderita waktu lampau. Ukuran linear

yang paling sering digunakan adalah tinggi atau panjang badan.

b. Pertumbuhan Massa Jaringan

Bentuk dan ukuran massa jaringan adalah massa tubuh. Contoh ukuran massa jaringan adalah berat badan, lingkaran lengan atas (LLA), dan tebal lemak bawah kulit. Apabila ukuran ini rendah atau kecil, menunjukkan keadaan gizi kurang akibat kekurangan energi dan protein yang diderita pada waktu pengukuran dilakukan. Ukuran massa jaringan yang paling sering digunakan adalah berat badan.

B. Pengertian dan Syarat Penggunaan Antropometri

Antropometri berasal dari kata *anthropos* dan *metros*. *Anthropos* artinya tubuh dan *metros* artinya ukuran. Antropometri artinya ukuran dari tubuh. Antropometri menurut Hinchliff (1999) adalah pengukuran tubuh manusia dan bagian-bagiannya dengan maksud untuk membandingkan dan menentukan norma-norma untuk jenis kelamin, usia, berat badan, suku bangsa dll.

Antropometri menurut Stevenson (1989) dan Nurmiyanto (1991) adalah suatu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik tubuh manusia berupa ukuran, bentuk, dan kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah *design*.

Syarat-syarat yang mendasari penggunaan Antropometri yaitu:

1. Alat mudah didapat dan digunakan seperti dacin, pita lingkaran atas, microtoice dan alat poengukur panjang bayi yang dapat dibuat sendiri di rumah.
2. Pengukuran dapat dilakukan berulang-ulang dengan mudah dan objektif. Contohnya, apabila terjadi

kesalahan pada pengukuran lingkaran lengan atas pada anak balita, maka dapat dilakukan pengukuran kembali tanpa harus persiapan alat yang rumit. Berbeda dengan pengukuran status gizi dengan metode biokimia, apabila terjadi kesalahan maka harus mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu yang relatif mahal dan rumit.

3. Pengukuran tidak selalu harus oleh tenaga khusus profesional, dapat oleh tenaga lain setelah mendapat pelatihan.
4. Biaya relatif murah, karena alat mudah didapat dan tidak memerlukan bahan-bahan lainnya.
5. Hasilnya mudah disimpulkan, memiliki *cutt of point* dan baku rujukan yang sudah pasti.
6. Secara ilmiah diakui kebenarannya dan hampir semua negara menggunakan antropometri sebagai metode untuk mengukur status gizi masyarakat khususnya untuk penapisan status gizi. Hal ini dikarenakan antropometri diakui kebenarannya secara ilmiah.

C. Parameter Antropometri

Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara lain Umur, Berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas (LILA), lingkaran kepala, lingkaran dada, Lingkaran pinggul dan tebal lipatan kulit. Di bawah ini akan dijelaskan setiap parameter tersebut.

1. Umur

Faktor umur sangat penting dalam penentuan status gizi. Kesalahan penentuan umur meningkatkan interpretasi status gizi salah. Batasan umur yang digunakan (Puslitbang Gizi Bogor, 1980), yaitu:

- a. Tahun umur penuh (*completed year*)

Contoh: 6 tahun 2 bulan, dihitung 6 tahun
5 tahun 11 bulan, dihitung 5 tahun

- b. Bulan usia penuh (*completed month*): digunakan untuk anak umur 0-2 tahun

Contoh: 3 bulan 7 hari, dihitung 3 bulan
2 bulan 26 hari, dihitung 2 bulan

Cara Menghitung Umur

Tentukan tanggal, hari, bulan dan tahun pada waktu balita di timbang, kemudian kurangi dengan tanggal, hari, bulan dan tahun balita pada waktu lahir, sehingga didapatkan umur balita dari pengurangan atau selisih angka-angka keduanya.

Cara lain Membulatkan Umur

1. Bila kelebihan atau kekurangan hari sebanyak 16 hari s/d 30 hari, dibulatkan menjadi 1 bulan.

Contoh :

19 bulan + 17 hari = 20 bulan

19 bulan - 16 hari = 18 bulan

2. Bila kelebihan atau kekurangan hari sebanyak 1 hari s/d 15 hari, dibulatkan menjadi 0 bulan.

Contoh :

20 bulan + 15 hari = 20 bulan

19 bulan - 14 hari = 19 bulan

Contoh Perhitungan Umur:

Alif, lahir pada tanggal 17 mei 2000, datang ke posyandu tanggal 25 nopember 2000.

Hitung umur ALIF:

Tanggal	Hari	Bulan	Tahun
Ditimbang	25	11	2000
Lahir	17	05	2000
Selisih	+8	+6	0

Selisih hari = +8 hari	→ 0 bulan
Selisih bulan = +6 bulan	→ 6 bulan
Selisih tahun = 0 tahun	→ 0 bulan
Jumlah (Umur Anak) =	→ 6 bulan

Jadi umur Alif adalah 6 bulan 8 hari dibulatkan menjadi 6 bulan.

2. Berat Badan

Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting pada masa bayi dan balita. Berat badan merupakan hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh. Berat badan dipakai sebagai indikator yang terbaik saat ini untuk mengetahui keadaan gizi dan tumbuh kembang anak, sensitif terhadap perubahan sedikit saja, pengukuran objektif dan dapat diulangi.

Berat badan menggambarkan jumlah dari protein, lemak, air dan mineral pada tulang. Pada remaja, lemak tubuh cenderung meningkat, dan protein otot menurun. Pada orang yang edema dan asites terjadi penambahan cairan dalam tubuh. Adanya tumor dapat menurunkan jaringan lemak dan otot, khususnya terjadi pada orang kekurangan gizi.

Pada masa bayi-balita, berat badan dapat dipergunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi, kecuali terdapat kelainan klinis seperti dehidrasi, asites, edema, dan adanya tumor. Di samping itu pula berat badan dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan dosis obat dan makanan.

Berat badan merupakan pilihan utama karena berbagai perhitungan, antara lain:

1. Parameter yang paling baik, mudah terlihat perubahan dalam waktu singkat karena perubahan-perubahan konsumsi makanan dan kesehatan.
2. Memberikan gambaran status gizi sekarang dan gambaran tentang pertumbuhan.
3. Merupakan ukuran antropometri yang sudah dipakai secara umum dan luas di Indonesia sehingga tidak merupakan hal baru memerlukan penjelasan secara meluas.
4. Ketelitian pengukuran tidak banyak dipengaruhi oleh ketrampilan pengukur.
5. KMS (Kartu Menuju Sehat) yang digunakan sebagai alat yang baik untuk pendidikan dan memonitor kesehatan anak menggunakan juga berat badan sebagai dasar pengisiannya.
6. Karena masalah umur merupakan faktor penting untuk penilaian status gizi, berat badan terhadap tinggi badan sudah dibuktikan dimana-mana sebagai indeks yang tidak tergantung pada umur.
7. Alat pengukur dapat diperoleh di daerah pedesaan dengan ketelitian yang tinggi dengan menggunakan dacin yang juga sudah dikenal oleh masyarakat.

Penentuan berat badan dilakukan dengan cara menimbang. Alat yang digunakan di lapangan sebaiknya memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Mudah digunakan dan dibawa dari suatu tempat ke tempat yang lain.
- b. Mudah diperoleh dan relative murah harganya.
- c. Ketelitian penimbangan sebaiknya maksimum 0,1 kg dan Skalanya mudah dibaca.

d. Cukup aman untuk menimbang anak balita.

Alat yang dapat memenuhi persyaratan dan kemudian dipilih dan dianjurkan untuk digunakan dalam penimbangan anak balita adalah dacin. Penggunaan dacin mempunyai beberapa keuntungan antara lain:

- a. Dacin sudah dikenal umum sampai di pelosok pedesaan.
- b. Dibuat di Indonesia, bukan impor, dan mudah didapat.
- c. Ketelitian dan ketepatan cukup baik.

Dacin yang digunakan sebaiknya minimum 20 kg dan maksimum 25 kg. Bila digunakan dacin berkapasitas 50 kg dapat juga, tetapi hasilnya agak kasar, karena angka ketelitiannya 0,25 kg. Jenis timbangan lain yang digunakan adalah detecto yang terdapat di Puskesmas. Timbangan kamar mandi (*bath room scale*) tidak dapat dipakai menimbang anak Balita, karena menggunakan per, sehingga hasilnya dapat berubah-ubah menurut kepekaan per-nya. Alat lain yang diperlukan adalah kantong celana timbang atau kain sarung, kotak atau keranjang yang tidak membahayakan anak terjatuh pada waktu ditimbang. Diperlukan pula tali atau sejenisnya yang cukup kuat untuk menggantungkan dacin.

Cara Menimbang/Mengukur Berat Badan

Periksalah dacin dengan seksama, adakah masih dalam kondisi baik atau tidak. Dacin yang baik adalah apabila bandul geser berada pada posisi skala 0,0 kg, jarum penunjuk berada pada posisi seimbang. Setelah alat timbang lainnya (celana atau sarung timbang) dipasang pada dacin, lakukan peneraan yaitu cara

menambah beban pada ujung tangkai dacin, misalnya plastik berisi pasir. Berikut cara menimbang balita dengan menggunakan dacin yang biasa menggunakan istilah 9 (Sembilan) langkah penimbangan :

Langkah 1 : Gantungkan dacin pada dahan pohon, palang rumah atau penyanggah khusus yang sudah dibuat sebelumnya, serta pasang tali pengaman pada ujung batangan dacin. Pastikan posisi batang dacin harus sejajar dengan mata orang yang akan membaca hasil penimbangan.

Langkah 2 : Periksa apakah dacin sudah tergantung kuat. Cara untuk memeriksa ialah dengan cara menarik dacing kuat-kuat ke bawah. Hal tersebut sangat penting karena berhubungan dengan keselamatan balita yang akan ditimbang. Jika dacin tidak tergantung kuat dan terjadi insiden dimana dacin terlepas dan menimpa balita yang ditimbang, maka hal tersebut akan berhubungan dengan hukum dan pihak yang berwajib.

Langkah 3 : Geser bandul dacin pada angka nol

Langkah 4 : Pasang sarung timbang

Langkah 5 : Seimbangkan dacin dengan cara menggantung kantong (bisa terbuat dari kantong plastik atau kain yang dibuat khusus) yang berisi pasir pada ujung batang dacin. Penggunaan pasir dimaksudkan agar proses penyeimbangan dapat dilakukan dengan mudah, kalau tidak ada pasir, beras atau jagung juga boleh.


Langkah 6 : Masukkan balita ke dalam sarung timbang dan seimbangkan dacin. Hal-hal yang perlu di perhatikan sebelum anda memasukan balita ke dalam sarung timbang ialah pastikan pakaian yang

digunakan anak seminimal mungkin, lepaskan topi (jika menggunakan topi), sepatu, kaos kaki, pempers, dll. Tindakan tersebut bertujuan agar barang-barang tersebut tidak mempengaruhi berat badan balita yang sesungguhnya. Pada bagian ini dibutuhkan keterampilan dan kesabaran seorang Kader Posyandu untuk membaca hasil penimbangan, karena umumnya balita akan meronta dan membuat dacin sulit untuk diseimbangkan.

Langkah 7 : Tentukan berat badan balita dengan membaca angka yang terdapat pada ujung bandul geser.

Langkah 8 : Catat hasil penimbangan

Langkah 9 : Geser kembali bandul geser ke angka nol, letakkan batang dacin pada tali pengaman, selanjutnya keluarkan anak pada sarung timbang.



Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menimbang Berat Badan Anak

a. Pemeriksaan alat timbang

Sebelum digunakan, dacin harus diperiksa secara seksama, apakah masih dalam kondisi baik dan tidak. Dacin yang baik adalah apabila bandul geser berada pada posisi skala 0,0 kg, jarum penunjuk

berada pada posisi seimbang. Disamping itu keadaan bandul geser tidak longgar terhadap tangkai dacin. Untuk penelitian, peneraan alat timbang ini sangat penting untuk mendapatkank data dengan validitas yang tinggi.

b. Anak balita yang ditimbang

Balita yang akan ditimbang sebaiknya memakai pakaian seminim mungkin dan seringan mungkin. Sepatu, baju dan topi sebaiknya dilepaskan. Apabila hal ini tidak memungkinkan, maka hasil penimbangan harus dikoreksi dengan kain balita yang ikut tertimbang. Bila keadaan ini memaksa dimana anak balita tidak mau ditimbang tanpa ibunya atau orang tua yang menyertainya, maka timbangan dapat dilakukan dengan menggunakan timbangan injak dengan cara pertama, timbang balita beserta ibunya. kedua, timbang ibunya saja. Ketiga, hasil timbangan dihitung dengan mengurangi berat badan ibu dan anak, dengan berat badan ibu sendiri

c. Keamanan

Faktor keamanan penimbangan sangat perlu diperhatikan. Tidak jarang petugas di lapangan kurang memperhatikan keamanan itu. Misalnya langkah ke-2 dari 9 langkah penimbangan tidak dilakukan, maka kemungkinan dacin dan anak yang ditimbang bisa jatuh, karena dacin tidak tergantung kuat. Oleh karena itu, segala sesuatu menyangkut keamanan harus diperhatikan termasuk lantai dimana di lakukan penimbangan. Lantai tidak boleh terlalu licin, berkerikil atau bertangga. Hal itu dapat mempengaruhi keamanan, baik yang ditimbang, maupun petugas.

d. Pengetahuan dasar petugas

Untuk memperlancar proses penimbangan, petugas dianjurkan untuk mengetahui berat badan secara umum pada umur-umur tertentu. Hal ini sangat penting diketahui untuk dapat memperkirakan posisi bandul geser yang mendekati skala berat pada dacin sesuai dengan umur anak yang ditimbang. Cara ini dapat menghemat waktu, jika penimbangan dilakukan dengan memindah-mindahkan bandul geser secara tidak menentu.

3. **Tinggi Badan**

Tinggi Badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, TB tumbuh seiring dengan penambahan umur. Pertumbuhan TB tidak seperti BB, relatif kurang sensitif pada masalah kekurangan gizi dalam waktu singkat. Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap TB akan nampak dalam waktu yang relatif lama. Tinggi Badan (TB) merupakan parameter paling penting bagi keadaan yang telah lalu dan keadaan sekarang, jika umur tidak diketahui dengan tepat. Tinggi badan juga merupakan ukuran kedua yang penting, karena dengan menghubungkan BB terhadap TB (*quac stick*) faktor umur dapat dikesampingkan.

Tinggi atau panjang badan merupakan indikator umum ukuran tubuh dan panjang tulang. Namun, tinggi saja belum dapat dijadikan indikator untuk menilai status gizi, kecuali jika digabungkan dengan indikator lain seperti usia dan berat badan. Penggunaan tinggi, atau panjang, bukan tanpa kelemahan. Pertama, baku acuan yang tersedia

umumnya terambil dari penilaian tinggi badan subjek yang berasal dari masyarakat berstatus gizi baik di negara maju. Kedua, defisit pertumbuhan linier baru akan terjelma manakala defisiensi telah berlangsung lama yang berarti tidak akan termanifestasi semasa bayi. Jika bayi terukur lebih pendek ketimbang baku acuan, tidak berarti bayi tersebut tengah malnutrisi pascanatal, melainkan dampak dari ukuran lahir rendah. Ketiga, secara genetik setiap orang terlahir menurut ukuran yang tidak serupa: orang yang jika dibandingkan dengan populasi "acuan" berukuran lebih pendek tidak langsung berarti malnutrisi.

Alat untuk mengukur tinggi badan diantaranya:

- a. Alat Pengukur Panjang Badan Bayi
Alat ini dipergunakan pada bayi atau anak yang belum dapat berdiri.
- b. Microtoise: dipergunakan untuk anak yang sudah bisa berdiri

Pengukuran Panjang Badan Bayi/Anak belum bisa berdiri

Pengukuran tinggi badan anak yang belum bisa berdiri menggunakan alat ukur panjang badan


Penyiapan alat ukur:

1. Tempelkan alat pengukur pada permukaan keras yang rata, dianjurkan meja panjang atau tempat tidur dengan satu bagian menempel di tembok. Tempelkan bagian alat pengukur yang lebih panjang pada ujung yang menempel di tembok. Tarik meteran pengukur hingga anda bisa melihat angka 0 pada garis merah di kaca pengukur yang menempel di tembok. Prosedur ini sangat penting untuk memastikan pengukuran yang akurat.

2. Tempelkan ujung alat pengukur yang bukan menempel di tembok dengan menggunakan paku, pastikan stabil dan tidak berubah-ubah.
3. Setelah anda memastikan bahwa bagian atas sudah menempel dengan stabil maka meteran alat pengukur dapat anda tarik ke samping dan pengukuran tinggi siap dilakukan.

Langkah untuk melakukan pengukuran:

- a. Dengan bantuan ibu si anak, baringkan si anak di permukaan keras yang rata dengan memegang punggung si anak dengan satu tangan dan bagian bawah badan dengan tangan lainnya. Dengan perlahan-lahan turunkan si anak ke atas permukaan keras tersebut dengan bagian kaki menempel di tembok.



- b. Mintalah ibu si anak untuk berlutut di sebelah alat ukur menghadap alat ukur agar si anak lebih tenang.
- c. Pegang kepala si anak dari kedua arah telinganya. Dengan menggunakan tangan secara nyaman dan lurus, tempelkan kepala si anak ke bagian atas papan ukur sehingga si anak dapat memandang lurus ke arah depan. Garis pandang si anak harus tegak lurus dengan tanah. Kepala anda harus lurus

- dengan kepala si anak. Pandanglah langsung ke mata si anak.
- d. Pastikan si anak berbaring di atas permukaan keras. Tempatkan tangan kiri anda di ujung tulang kering si anak (sedikit di atas sendi mata kaki) atau pada lututnya. Tekanlah dengan kuat ke arah permukaan keras.
 - e. Dengan menggunakan tangan kanan anda, geserkan alat pengukur ke arah kepala si anak. Pastikan anda menekan rambut si anak. Jika posisi si anak sudah betul, baca dan catatlah hasil pengukuran.

Pengukuran Tinggi Badan Pada Anak bisa berdiri


Pengukuran tinggi badan anak yang sudah bisa berdiri menggunakan alat ukur Meteran microtoice
 Penyiapan alat ukur:

1. Tempelkan alat pengukur pada bagian dinding dengan bagian yang lebih panjang menempel di lantai dan bagian yang lebih pendek menempel di tembok. Tarik meteran pengukur ke atas hingga anda bisa melihat angka 0 pada garis merah di kaca pengukur yang menempel di lantai (anda harus berlutut untuk melihat angka 0 ini sehingga anda harus dibantu seseorang untuk menahan ujung atas meteran pengukur). Prosedur ini sangat penting untuk memastikan pengukuran yang akurat.
2. Tempelkan ujung atas alat pengukur dengan menggunakan paku, pastikan kestabilan alat tersebut.
3. Setelah anda memastikan bahwa bagian atas sudah menempel dengan stabil maka meteran alat

pengukur dapat anda tarik ke atas dan pengukuran tinggi siap dilakukan.

Cara pengukuran tinggi badan:

- Mintalah ibu si anak untuk melepaskan sepatu si anak dan melepaskan hiasan atau dandanan rambut yang mungkin dapat mempengaruhi hasil pengukuran TB anak. Mintalah si ibu untuk membawa anak tersebut ke papan ukur dan berlutut di hadapan si anak. Mintalah si ibu agar berlutut dengan kedua lutut di sebelah kanan si anak.
- Berlututlah anda dengan lutut sebelah kanan di sebelah kiri anak tersebut. Ini akan memberikan kesempatan maksimum kepada anda untuk bergerak.



- Tempatkan kedua kaki si anak secara merata dan bersamaan di tengah-tengah dan menempel pada alat ukur/dinding. Tempatkan tangan kanan anda sedikit di atas mata kaki si anak pada ujung tulang kering, tangan kiri anda pada lutut si anak dan dorong ke arah papan ukur/dinding. Pastikan kaki si anak lurus dengan tumit dan betis menempel di papan ukur/dinding.

- d. Mintalah si anak untuk memandang lurus ke arah depan atau kepada ibunya yang berdiri di depan si anak. Pastikan garis pandang si anak sejajar dengan tanah. Dengan tangan kiri anda peganglah dagu si anak. Dengan perlahan-lahan ketatkan tangan anda. Jangan menutupi mulut atau telinga si anak. Pastikan bahu si anak rata, dengan tangan di samping, dan kepala, tulang bahu dan pantat menempel di papan ukur/dinding.
- e. Mintalah si anak untuk mengambil nafas panjang.
- f. Dengan tangan kanan anda, turunkan meteran alat pengukur hingga pas di atas kepala si anak. Pastikan anda menekan rambut si anak. Jika posisi si anak sudah betul, baca dan catatlah hasil pengukuran dengan desimal satu di belakang koma dengan melihat angka di dalam kaca pengukuran. Naikkan meteran dari atas kepala si anak dan lepaskan tangan kiri anda dari dagu si anak.

4. Lingkar Lengan Atas (LILA)

Lingkar Lengan Atas (LILA) Merupakan salah satu pilihan untuk penentuan status gizi, karena mudah, murah dan cepat. Tidak memerlukan data umur yang terkadang susah diperoleh. Memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Lingkar lengan atas mencerminkan cadangan energi, sehingga dapat mencerminkan: Status KEP pada balita; Kurang Energi Kronik (KEK) pada ibu WUS dan ibu hamil dalam menentukan risiko bayi BBLR.

Beberapa tujuan pemeriksaan LILA adalah mencakup masalah WUS baik ibu hamil maupun

calon ibu, masyarakat umum dan peran petugas lintas sektoral. Adapun tujuan tersebut adalah:

- a. Mengetahui risiko KEK WUS, baik ibu hamil maupun calon ibu, untuk menapis wanita yang mempunyai risiko melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR).
- b. Meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat agar lebih berperan dalam pencegahan dan penanggulangan KEK.
- c. Mengembangkan gagasan baru di kalangan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.
- d. Meningkatkan peran petugas lintas sektoral dalam upaya perbaikan gizi WUS yang menderita KEK.
- e. Mengarahkan pelayanan kesehatan pada kelompok sasaran WUS yang menderita KEK.

Pengukuran LILA tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. Pengukuran LILA digunakan karena pengukurannya sangat mudah dan dapat dilakukan siapa saja. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, terutama jika digunakan sebagai pilihan tunggal untuk indeks status gizi, antara lain:

- a. Baku lingkaran lengan atas yang digunakan sekarang belum mendapat pengujian yang memadai untuk digunakan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil-hasil penelitian yang umumnya menunjukkan perbedaan angka prevalensi KEP yang cukup berarti antar penggunaan LILA di satu pihak dengan berat badan menurut umur atau berat badan menurut tinggi badan maupun indeks-indeks lain di pihak lain.

- b. Kesalahan pengukuran pada LILA (pada berbagai tingkat keterampilan pengukur) relatif lebih besar dibandingkan dengan tinggi badan, mengingat batas antara baku dengan gizi kurang, lebih sempit pada LILA daripada tinggi badan. Ini berarti kesalahan yang sama besar jauh lebih berarti pada LILA dibandingkan dengan tinggi badan.
- c. Lingkar lengan atas sensitif untuk suatu golongan tertentu (prasekolah), tetapi kurang sensitif pada golongan lain terutama orang dewasa. Tidak demikian halnya dengan berat badan.

Ambang Batas

Tabel 2.3. Ambang Batas Pengukuran LiLA

Klasifikasi	Batas Ukur
Wanita Usia Subur	
KEK	< 23,5 cm
Normal	23,5 cm
Bayi Usia 0-30 hari	
KEP	< 9,5 cm
Normal	9,5 cm
Balita	
KEP	< 12,5 cm
Normal	12,5 cm

Sumber: Sirajuddin, 2012.


Cara Mengukur LILA

Alat yang dipergunakan untuk mengukur lingkar lengan atas adalah suatu pita pengukur dari fiber glass atau sejenis kertas tertentu berlapis plastik.

Langkah-langkah pengukuran LILA secara urut yaitu:

1. Tetapkan posisi bahu (*acromion*) dan siku (*olecranon*)
2. Letakkan pita pengukur antara bahu dan siku

3. Tetukan titik tengah lengan



4. Lingkarkan pita LILA tepat pada titik tengah lengan
5. Pita jangan terlalu ketat, jangan pula terlalu longgar
6. Pembacaan skala yg tertera pada pita (dalam cm (centi meter))

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengukur LILA yaitu:

- a. Apabila orang tidak kidal, pengukuran dilakukan pada lengan KIRI, sedangkan pada orang kidal dilakukan pada lengan kanan.
- b. Lengan dalam posisi bebas (tanpa lengan baju, tanpa pelapis)
- c. Pastikan lengan tidak tegang atau kencang
- d. Pastikan pita LILA tidak dalam keadaan kusut.
- e. Batas ambang LILA WUS resiko KEK.
- f. Batas ambang LILA WUS resiko KEK di Indonesia adalah 23,5 cm yakni di bagian merah pita LILA. Bila pengukuran LILA hasilnya kurang dari 23,5 cm diperkirakan akan menghasilkan BBLR yang

akan berisiko kematian, gizi kurang, gangguan pertumbuhan dan gangguan perkembangan anak.

5. Lingkar Kepala

Lingkar kepala adalah standar prosedur dalam ilmu kedokteran anak secara praktis, biasanya untuk memeriksa keadaan patologi dari besarnya kepala atau peningkatan ukuran kepala. Contoh: *hidrosefalus* dan *mikrosefalus*. Lingkar kepala dihubungkan dengan ukuran otak dan tulang tengkorak. Ukuran otak meningkat secara cepat selama tahun pertama, tetapi besar lingkar kepala tidak menggambarkan keadaan kesehatan dan gizi. Bagaimanapun ukuran otak dan lapisan tulang kepala dan tengkorak dapat bervariasi sesuai dengan keadaan gizi.


Dalam antropometri gizi rasio lingkar kepala dan lingkar dada cukup berarti dan menentukan KEP pada anak. Lingkar kepala juga digunakan sebagai informasi tambahan dalam pengukuran umur. Secara normal, penambahan ukuran lingkar pada setiap tahap relatif konstan dan tidak dipengaruhi oleh factor ras, bangsa dan letak geografis. Saat lahir, ukuran lingkar kepala normalnya adalah 34-35 cm. Kemudian akan bertambah sebesar $\pm 0,5$ cm/bulan pada bulan pertama atau menjadi ± 44 cm. Pada 6 bulan pertama ini, pertumbuhan kepala paling cepat dibandingkan dengan tahap berikutnya, kemudian tahun-tahun pertama lingkar kepala bertambah tidak lebih dari 5 cm/tahun, setelah itu sampai usia 18 tahun lingkar kepala hanya bertambah ± 10 cm.

Dalam antropometri gizi, rasio lingkar kepala dan lingkar dada cukup berarti dalam menentukan KEP pada anak. Lingkar kepala dapat juga digunakan

sebagai informasi tambahan dalam pengukuran umur.

Adapun cara pengukuran lingkaran kepala adalah:

- a. Siapkan pita pengukur (meteran).
- b. Lingkarkan pita pengukur pada daerah glabella (frontalis) atau supra orbita bagian anterior menuju oksiput pada bagian posterior. Kemudian tentukan hasilnya.



- c. Cantumkan hasil pengukuran pada kurva lingkaran kepala

6. Lingkaran Dada


Biasanya dilakukan pada anak yang berumur 2 sampai 3 tahun, karena rasio lingkaran kepala dan lingkaran dada sama pada umur 6 bulan. Setelah umur ini, tulang tengkorak tumbuh secara lambat dan pertumbuhan dada lebih cepat. Umur antara 6 bulan dan 5 tahun, rasio lingkaran kepala dan dada adalah kurang dari satu, hal ini dikarenakan akibat kegagalan perkembangan dan pertumbuhan, atau kelemahan otot dan lemak pada dinding dada. Ini dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan KEP pada anak balita.

Alat dan teknik pengukuran

Alat yang digunakan adalah pita kecil, tidak mudah patah biasanya terbuat dari serat kaca (fiberglass). Pengukuran dilakukan pada garis puting susu. Masalah yang sering dijumpai adalah mengenai akurasi pengukuran, karena pernapasan anak yang tidak teratur. Pengukuran sebaiknya dibuat mendekati 1 desimal.

7. Tinggi Lutut

Tinggi lutut erat kaitannya dengan tinggi badan, sehingga data tinggi badan didapatkan dari tinggi lutut bagi orang tidak dapat berdiri atau lansia.



Pada lansia digunakan tinggi lutut karena pada lansia terjadi penurunan masa tulang >> bungkuk>> sukar untuk mendapatkan data tinggi badan akurat.

Data tinggi badan lansia dapat menggunakan formula atau nomogram bagi orang yang berusia >59 tahun
Formula (Gibson, RS; 1993)

Pria : $(2.02 \times \text{tinggi lutut (cm)}) - (0.04 \times \text{umur (tahun)}) + 64.19$

Wanita : $(1.83 \times \text{tinggi lutut (cm)}) - (0.24 \times \text{umur (tahun)}) + 84.88$

8. Jaringan Lunak

Otot dan lemak merupakan jaringan lunak yang bervariasi. Antropometri dapat dilakukan pada jaringan tersebut untuk menilai status gizi di masyarakat. Lemak subkutan (*subcutaneous fat*), penilaian komposisi tubuh termasuk untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah dan distribusi lemak dapat dilakukan dengan beberapa metode, dari yang paling sulit hingga yang paling mudah. Metode yang digunakan untuk menilai komposisi tubuh (jumlah dan distribusi lemak subkutan) antara lain:

- a) Ultrasonik.
- b) Densitometri (melalui penempatan air pada densitometer atau underwater weighting).
- c) Teknik Isotop Dilution.
- d) Metoda Radiological.
- e) Total Electrical Body Conduction (TOBEC).
- f) Antropometri (pengukuran berbagai tebal lemak menggunakan kaliper: *skin-fold calipers*).

Metode yang paling sering dan praktis digunakan di lapangan adalah Antropometri fisik. Standar atau jangkauan jepitan 20-40 mm², ketelitian 0.1 mm, tekanan konstan 10 g/ mm². Jenis alat yang sering digunakan *Harpender Calipers*, alat ini memungkinkan jarum diputar ke titik nol apabila terlihat penyimpangan. Ada beberapa pengukuran tebal lemak dengan menggunakan kaliper, antara lain:

- a. Pengukuran triceps.
- b. Pengukuran bisep.
- c. Pengukuran suprailiak.
- d. Pengukuran subskapular.

D. Indeks Antropometri

Parameter antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Kombinasi antara beberapa parameter disebut indeks antropometri. Dalam pengukuran indeks antropometri sering terjadi kerancuan, hal ini akan mempengaruhi interpretasi status gizi yang keliru. Masih banyak diantara pakar yang berkecimpung dibidang gizi sebelum mengerti makna dari beberapa indeks antropometri.

Beberapa indeks antropometri yang sering digunakan yaitu:

1. Berat Badan Menurut Umur (BB/U)

Berat badan adalah salah satu parameter yang sangat labil dan memberikan gambaran massa tubuh yang sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang mendadak misalnya karena terserang penyakit infeksi, asupan makanan yang berkurang akibat berkurangnya nafsu makan. Dalam keadaan normal, dimana keadaan kesehatan baik dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan gizi terjamin, maka berat badan berkembang mengikuti pertambahan umur.

Berat badan berhubungan linier dengan Tinggi Badan, maka indikator BB/U dapat memberikan gambaran masalah gizi masa lalu atau kronis. Disamping itu karena berat badan juga labil terhadap perubahan yang terjadi, maka BB/U juga memberikan gambaran masalah gizi saat kini (akut).

Bagaimana kemampuan indikator BB/U bila digunakan secara sendirian ?

- a) Untuk menilai keadaan **akut**: pada masyarakat yang secara umum miskin: **Tidak sensitif**. Sebaliknya pada masyarakat yang keadaan sosial-ekonominya secara umum baik: **Sensitif**.
- b) Untuk menilai keadaan **kronis**: pada masyarakat miskin: **Sensitif**. Sebaliknya pada masyarakat yang keadaan sosial-ekonominya baik: **Tidak sensitif**.

Kelebihan Berat Badan Menurut Umur (BB/U)

- a) Dapat dengan mudah & cepat dimengerti .
- b) Sensitif untuk melihat perubahan status gizi dalam jangka waktu yang pendek .
- c) Dapat mendeteksi kegemukan.

Kelemahan Berat Badan Menurut Umur (BB/U)

- a) Interpretasi status gizi keliru bila terdapat oedem.
- b) Data umur akurat sulit diperoleh terutama dinegara berkembang.
- c) Kesalahan pengukuran (pakaian & gerak).
- d) Sosial budaya adanya keengganan orangtua untuk menimbang anaknya.

2. Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)

Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal tinggi badan tumbuh seiring dengan penambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang pendek. Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang relatif lama. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka indeks Tinggi badan menurut umur (TB/U) menggambarkan status gizi masa lalu.

Beaton dan Bengoa (1973) menyatakan bahwa indeks TB/U di samping memberikan gambaran status gizi masa lampau, juga lebih erat kaitannya dengan status sosial ekonomi.

Bagaimana kemampuan indikator TB/U bila digunakan secara sendirian ?

- a. Bila banyak anak yang pendek indikator ini memberikan petunjuk tentang adanya masalah gizi kronis yang harus dicari penyebab dasar.
- b. Dapat digunakan sebagai indikator perkembangan keadaan sosial ekonomi pada masyarakat yang bersangkutan.
- c. Tidak Sensitif digunakan untuk memberikan indikasi adanya masalah gizi akut.

Kelebihan Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)

- a) Dapat memberi gambaran riwayat keadaan gizi masa lampau.
- b) Dapat dijadikan indikator keadaan sosial ekonomi penduduk.

Kelemahan Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)

- a) Kesulitan pengukuran tinggi badan pada Balita .
- b) Tidak dapat menggambarkan keadaan gizi masa kini .
- c) Data umur akurat sulit diperoleh .
- d) Kesalahan pembacaan skala ukur bila dilakukan oleh petugas yang non-profesional.
- e) Perubahan tinggi badan tidak begitu cepat dan tidak mungkin turun.

3. Berat badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB)

Berat badan memiliki hubungan yang linear dengan tinggi badan. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu. Jelliffe pada tahun 1966 telah memperkenalkan indeks ini untuk mengidentifikasi status gizi. Indeks BB/TB merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi saat ini (sekarang) dan merupakan indeks yang independen terhadap umur.

Bagaimana kemampuan indikator BB/TB bila digunakan secara sendirian ?

- a. Banyaknya anak dengan BB/TB rendah atau tidak proporsional atau kurus memberikan gambaran adanya masalah gizi akut yang disebabkan oleh kondisi yang berlangsung dalam tempo atau periode singkat
- b. Indikator BB/TB ini berguna untuk pemilihan sasaran (targeting) bagi tindakan intervensi segera seperti pemeriksaan kesehatan, PMT pemulihan agar berat badannya kembali proporsional dengan tinggi badan atau juga bentuk intervensi dengan memperbaiki kondisi lingkungan yang kurang sehat.

Kelebihan Berat Badan Menurut Tinggi badan (BB/TB)

Lebih obyektif karena tidak menggunakan parameter umur; dapat membedakan proporsi badan; Lebih cocok untuk menentukan status gizi orang dewasa

Kelemahan Berat Badan Menurut Tinggi badan (BB/TB)

Tidak sensitif terhadap perubahan umur

4. Lingkar Lengan Atas Menurut Umur (LLA/U)

Lingkar lengan atas memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Lingkar lengan atas berkorelasi dengan indeks BB/U maupun BB/TB. Lingkar lengan Atas merupakan parameter antropometri yang sangat sederhana dan mudah dilakukan oleh tenaga yang bukan profesional.

Lingkar Lengan atas sebagaimana dengan berat badan merupakan parameter yang labil, dapat berubah-ubah dengan cepat. Oleh karena itu, lingkar lengan atas merupakan indeks status gizi saat ini. Perkembangan lingkar lengan atas yang besarnya hanya terlihat pada tahun pertama kehidupan (5,4 cm), sedangkan pada umur 2 tahun sampai 5 tahun sangat kecil yaitu kurang lebih 1,5 cm per tahun dan kurang sensitif untuk usia selanjutnya.

LILA sulit digunakan untuk melihat pertumbuhan anak. Pada usia 2 sampai 5 tahun perubahannya tidak nampak secara nyata, oleh karena itu lingkar lengan atas banyak digunakan dengan tujuan *screening* individu, tetapi dapat juga digunakan untuk pengukuran status gizi. Penggunaan LILA sebagai indikator status gizi, disamping digunakan secara tunggal, juga dalam bentuk kombinasi parameter lainnya LLA/U dan LLA menurut tinggi badan yang juga sering disebut *Quack Stick*.

Kelebihan Lingkar lengan Atas Menurut Umur(LILA/U)

- a) Indikator yang baik untuk menilai KEP berat
- b) Alat ukur murah, sangat ringan, dapat dibuat sendiri.

- c) Alat dapat diberi kode warna untuk menentukan keadaan gizi, sehingga dapat digunakan oleh orang yang tak dapat baca tulis.

Kelemahan Lingkar lengan Atas Menurut Umur(LILA/U)

Hanya dapat mengidentifikasi anak dengan KEP berat dan Sulit menentukan ambang batas.

5. Indeks Massa Tubuh (IMT)

IMT merupakan alat yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa yang berumur diatas 18 tahun khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. IMT tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil dan olahragawan. Disamping itu pula IMT tidak bisa diterapkan pada keadaan khusus (penyakit) lainnya, seperti adanya edema, asites dan hepatomegali. Rumus perhitungan IMT adalah sebagai berikut:

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{\text{Tinggi badan (m)} \times \text{Tinggi Badan (m)}}$$

Batas ambang IMT ditentukan dengan merujuk ketentuan FAO/WHO, yang membedakan batas ambang untuk laki-laki dan perempuan. Batas ambang normal laki-laki adalah 20,1-25,0 dan untuk perempuan adalah 18,7-23,8.

Untuk kepentingan pemantauan dan tingkat defisiensi energi ataupun tingkat kegemukan, lebih lanjut FAO/WHO menyarankan menggunakan satu batas ambang antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan yang digunakan adalah menggunakan ambang batas laki-laki untuk kategori kurus tingkat berat dan menggunakan ambang batas pada

perempuan untuk kategori gemuk tingkat berat. Untuk Kepentingan Indonesia, batas ambang dimodifikasi lagi berdasarkan pengalaman klinis dan hasil penelitian di beberapa negara berkembang. Akhirnya diambil kesimpulan ambang batas IMT untuk Indonesia adalah dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Kategori ambang batas IMT untuk Indonesia

	Kategori	IMT
Kurus	Kekurangan berat badan tingkat berat.	< 17,0
	Kekurangan berat badan tingkat ringan.	17,1-18,5
Normal		18,6-25,0
Gemuk	Kelebihan berat badan tingkat ringan.	25,1-27,0
	Kelebihan berat badan tingkat berat.	>27,0

Sumber : Supariasa dkk,2002

Cara Menghitung IMT:

Fira mempunyai tinggi badan 162 dan berat badan 57 hitunglah IMT Fira?

Jawaban :

$$IMT = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{\text{Tinggi badan (m)} \times \text{Tinggi Badan (m)}}$$

$$IMT = 57 / 1,62 \times 1,62$$

$$IMT = 57 / 2,6244$$

$$IMT = 21,71 \text{ Kg/M}^2$$

Jadi Fira termasuk gizi normal karena IMT 21,71.

Berat normal adalah idaman bagi setiap orang agar mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Keuntungan apabila berat badan normal adalah penampilan baik, lincah dan risiko sakit rendah. Berat badan yang kurang dan berlebihan akan menimbulkan risiko terhadap berbagai macam penyakit.

Kerugian dari berat badan kurang adalah penampilan cenderung kurang baik, mudah letih, risiko sakit tinggi antara lain penyakit infeksi, depresi, anemia dan diare, wanita kurus yang hamil mempunyai risiko tinggi melahirkan bayi dengan BBLR, serta kurang mampu bekerja keras.

Kerugian dari berat badan lebih antara lain penampilan kurang menarik, gerakan tidak gesit dan lamban, mempunyai risiko penyakit jantung dan pembuluh darah, kencing manis, tekanan darah tinggi, gangguan sendi dan tulang, gangguan ginjal, gangguan kandungan empedu dan kanker serta pada wanita dapat mengakibatkan gangguan haid (haid tidak teratur, perdarahan yang tidak teratur) dan faktor penyakit pada persalinan.

6. Tebal Lemak Bawah Kulit Menurut Umur

Pengukuran lemak tubuh melalui pengukuran ketebalan lemak bawah kulit dilakukan pada beberapa bagian tubuh, misalnya pada bagian lengan atas, lengan bawah, di tengah garis ketiak, sisi dada, perut, paha, tempurung lutut, dan pertengahan tungkai bawah.

Lemak tubuh dapat diukur secara absolut dinyatakan dalam kilogram maupun secara relatif dinyatakan dalam persen terhadap berat tubuh total. Jumlah

lemak tubuh sangat bervariasi tergantung dari jenis kelamin dan umur. Umumnya lemak bawah kulit untuk pria 3,1 kg dan pada wanita 5,1 kg.

7. Rasio Lingkar Pinggang dengan Pinggul

Pengukuran rasio lingkar pinggang dan panggul yang menghasilkan indeks tinggi harus memperhatikan penyebabnya karena simpanan lemak atau otot torso yang berkembang. Jadi perlu diukur tebal lipatan kulit abdomen untuk mengetahuinya. Tujuan pengukuran lingkar pinggang dan pinggul adalah untuk mengetahui resiko tinggi terkena penyakit DM II, kolesterol, hipertensi, dan jantung. Lingkar pinggang diukur di indentasi terkecil lingkar perut antara tulang rusuk dan krista iliaka, subjek berdiri dan diukur pada akhir ekspirasi normal dengan ketelitian 0,6 cm menggunakan pitameter. Lingkar pinggul diukur penonjolan terbesar pantat, biasanya di sekitar pubic symphysis, subjek berdiri diukur menggunakan pitameter dengan ketelitian 0,1 cm.

Pengukuran lingkar pinggang dan lingkar pinggul harus dilakukan oleh tenaga terlatih dan posisi pengukuran harus tetap, karena perbedaan posisi pengukuran memberikan hasil yang berbeda.

Suatu studi prospektif menunjukkan rasio pinggang-pinggul berhubungan dengan penyakit kardiovaskular.

Rumus Menghitung Nilai WHR:

$$\text{WHR} = \text{Lpi}/\text{Lpa}$$

Tabel 2.2. Standar resiko penyakit degeneratif berdasarkan pengukuran WHR pada jenis kelamin dan kelompok umur.

Jenis kelamin	Kelompok umur	Resiko			
		Low	Moderate	High	Very high
Pria	20-29	< 0,83	0,83-0,88	0,89-0,94	> 0,94
	30-39	< 0,84	0,84-0,91	0,92-0,96	> 0,96
	40-49	< 0,88	0,88-0,95	0,96-1,00	> 1,00
Wanita	20-29	< 0,71	0,71-0,77	0,78-0,82	> 0,82
	30-39	< 0,72	0,72-0,78	0,79-0,84	> 0,84
	40-49	< 0,73	0,73-0,79	0,80-0,87	> 0,87

Sumber. Sirajuddin 2012.

E. Penggunaan Indeks Antropometri Gizi

Indeks antropometri yang umum digunakan dalam menilai status gizi adalah berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Indeks BB/U adalah pengukuran total berat badan termasuk air, lemak, tulang dan otot. Indeks tinggi badan menurut umur adalah pertumbuhan linier dan LLA adalah pengukuran terhadap otot, lemak, dan tulang pada area yang diukur.

Hasil pengukuran *tissue mass* seperti berat badan dan lingkaran lengan atas dapat berubah relative cepat, naik atau turun, tergantung makanan anak dan status kesehatan. Kedua parameter tersebut, berat badan lebih cepat terpengaruh oleh perbedaan konsumsi makanan daripada LLA. Parameter tinggi badan berubah secara lambat dan perlahan-lahan. Perbedaan tinggi badan dapat diukur setelah beberapa waktu lamanya.

Diantara bermacam-macam indeks antropometri, BB/U merupakan indikator yang paling umum digunakan sejak tahun 1972 dan dianjurkan juga menggunakan indeks TB/U dan BB/TB untuk membedakan apakah kekurangan gizi terjadi kronis atau

akut. Keadaan gizi kronis atau akut mengandung arti terjadi keadaan gizi yang dihubungkan dengan masa lalu dan waktu sekarang. Pada keadaan kurang gizi kronis, BB/U dan TB/U rendah, tetapi BB/TB normal. Kondisi ini sering disebut dengan stunting.

Pada tahun 1978, WHO lebih menganjurkan penggunaan BB/TB, karena menghilangkan faktor umur yang menurut pengalaman sulit didapat secara benar, khususnya di daerah terpencil dimana terdapat masalah tentang pencatatan kelahiran anak. Indeks BB/TB juga menggambarkan keadaan kurang gizi akut waktu sekarang. Walaupun tidak dapat menggambarkan keadaan gizi waktu lampau. Misalnya dulu pernah menderita kurang gizi kronis, tetapi sekarang sudah baik. Dengan demikian timbul pertanyaan tentang indikator mana yang lebih dapat dipercaya? Jawabannya tergantung pada tujuan penelitian atau program yang akan mempergunakan data antropometri tersebut. Dari berbagai jenis indeks tersebut diatas, untuk interpretasinya dibutuhkan ambang batas. Penentuan ambang batas diperlukan kesepakatan para ahli gizi. Ambang batas dapat disajikan ke dalam tiga cara yaitu, persen terhadap median, persentil dan standar deviasi unit.

1. Persen terhadap Median

Median adalah nilai tengah dari suatu populasi. Dalam antropometri gizi, median sama dengan persentil 50. Nilai median dinyatakan sama dengan 100% (untuk standar). Setelah itu dihitung persentase terhadap nilai median untuk mendapatkan ambang batas. Yayah K Husaini (1979) memberikan contoh, andai kata nilai median berat badan anak umur 2 tahun adalah sebesar 12 kg, maka 80% median

sama dengan 9,6 kg dan 60% median sama dengan 7,2 kg. Kalau 80 % dan 60 % dianggap ambang batas maka anak yang berumur 2 tahun dan mempunyai berat badan antara 7,2 kg sampai 9,6 kg (antara 60 % dan 80 % median) dinyatakan status gizi kurang dan di bawah 7,2 kg (dibawah 60 % median) dinyatakan status gizi buruk.

Indeks Antropometri lainnya seperti TB/U dan BB/TB dapat pula dihitung berdasarkan persen terhadap median. batasan-batasan status gizi dan indeks antropometri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Status gizi berdasarkan indeks Antropometri

Status Gizi	Indeks Antropometri		
	BB/U	TB/U	BB/TB
Gizi Baik	> 80%	> 90%	> 90%
Gizi Sedang	71-80%	81-90 %	81-90%
Gizi Kurang	61 – 70 %	71 – 80 %	71 – 80 %
Gizi Buruk	≤ 60%	≤ 70%	≤ 70%

Sumber : yayah K.Husaini, 1997

2. Persentil

Cara lain untuk menentukan ambang batas selain persen terhadap median adalah persentil. Para pakar merasa kurang puas dengan menggunakan persen terhadap median untuk menentukan ambang batas. Persentil 50 sama dengan Median atau nilai tengah dari jumlah populasi berada di atasnya dan setengahnya berada dibawahnya.

National Center For Health Statistic (NCHS) merekomendasikan persentil ke 5 sebagai batas gizi buruk dan kurang, serta persentil 95 sebagai batas gizi lebih dan gizi baik.

Sebagai contoh, ada 100 anak yang diukur tingginya, kemudain diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seorang anak yang bernama dzaki, berada pada urutan yang ke 15 berarti persentil 15, hal ini berarti 14 anak berada dibawahnya dan 85 anak berada diatasnya.

3. Standar Deviasi Unit (SDU)

Standar Deviasi Unit disebut juga Z-skor. WHO menyarankan menggunakan cara ini untuk meneliti dan untuk memantau pertumbuhan.

- a. 1 SD unit (1 Z skor) kurang lebih sama dengan 11% dari median BB/U
- b. 1 SD unit (1 Z skor) kira-kira 10% dari median BB/TB
- c. 1 SD unit (1 Z skor) kira-kira 5% dari median TB/U

Waterlow juga merekomendasikan penggunaan SD untuk menyatakan hasil pengukuran pertumbuhan atau *Growth Monitoring*. WHO memberikan gambaran perhitungan SD unit terhadap baku NHCS.

Contoh: 1 SD unit = 11-12 % unit dari median BB/U, misalnya seorang anak berada pada 75 % median BB/U, berarti 25 % unit dibawah median atau -2.

Pertumbuhan nasional untuk suatu populasi dinyatakan dalam positif dan negative 2 SD unit (Z-skor) dari median, yang termasuk hampir 98% dari orang-orang yang diukur yang berasal dari referens populasi. Dibawah median -2 SD unit dinyatakan sebagai kurang gizi yang equivalen dengan:

1. 78% dari median untuk BB/U (± 3 persentil).
2. 80% median untuk BB/TB.
3. 90% median untuk TB/U.

Rumus perhitungan Z-skor adalah:

1. Bila Nilai Riil, BB, TB di atas nilai Median

$$Z - skor = \frac{\text{Nilai (Riil)} - \text{Nilai (Median)}}{\text{Nilai (+1 SD)} - \text{Nilai (Median)}}$$

2. Bila Nilai Riil, BB, TB di bawah nilai Median

$$Z - skor = \frac{\text{Nilai (Riil)} - \text{Nilai (Median)}}{\text{Nilai (Median)} - \text{Nilai (-1 SD)}}$$

3. Bila Nilai Riil, BB, TB sama dengan nilai Median

$$Z - skor = \frac{\text{Nilai (Riil)} - \text{Nilai (Median)}}{\text{Nilai (Median)}}$$

Contoh : Seorang anak perempuan umur 24 bulan, TB. 90 cm, BB 11,2 kg. Hitung distribusi simpangan baku untuk ketiga anak tersebut.

Penyelesaian Soal: dapat dilihat dengan contoh tabel

BB Menurut Umur (BB/U)

		-3	-2	-1	Median	+1	+2	+3
1.	24 bulan	8,2	9,4	10,7	11,9	13,2	14,5	15,8
2.	45 bulan	10,7	12,5	14,4	16,2	18,2	20,1	22,4
3.	70 bulan	14,8	17,3	19,9	22,5	26,0	19,5	33,1

TB Menurut Umur (TB/U)

		-3	-2	-1	Median	+1	+2	+3
1.	24 bulan	79,6	79,9	83,2	86,5	89,8	93,0	96,3
2.	45 bulan	88,6	92,7	96,9	101,0			
3.	70 bulan	105,6	110,7	115,7	120,8	125,8	130,9	136,0

BB Menurut TB (BB/TB)

		-3	-2	-1	Median	+1	+2	+3
1.	24 bulan	5,3	6,0	6,8	7,5	8,3	9,0	9,8
2.	45 bulan	9,8	10,0	12,1	13,3	14,7	16,2	17,6
3.	70 bulan	13,8	15,4	17,1	18,7	20,4	22,2	24,0

Nilai Z-skor adalah :

1. Untuk BB/U karena nilai Nilai Riil, BB, TB di bawah nilai Median

$$Z - skor = \frac{\text{Nilai (Riil)} - \text{Nilai (Median)}}{\text{Nilai (Median)} - \text{Nilai (-1 SD)}}$$

$$Z\text{-skor} = \frac{11,2 - 11,9}{11,9 - 10,7} = \frac{-0,7}{1,2} = -0,58$$

2. Untuk TB/U Nilai Riil, BB, TB di atas nilai Median

$$Z - skor = \frac{\text{Nilai (Riil)} - \text{Nilai (Median)}}{\text{Nilai (+1 SD)} - \text{Nilai (Median)}}$$

$$Z\text{-skor} = \frac{90 - 86,5}{89,8 - 86,5} = \frac{3,5}{3,3} = 1,06$$

3. Untuk BB/TB Nilai Riil, BB, TB di atas nilai Median

$$Z - skor = \frac{\text{Nilai (Riil)} - \text{Nilai (Median)}}{\text{Nilai (+1 SD)} - \text{Nilai (Median)}}$$

$$Z\text{-skor} = \frac{11,2 - 7,5}{8,3 - 7,5} = \frac{3,7}{0,8} = 4,6$$

Dari hasil perhitungan Z-skor kemudian dibandingkan dengan standar yang ada.

F. Pengendalian Kualitas Data Antropometri

Untuk mendapatkan data antropometri yang baik harus dilakukan sesuai standar prosedur pengumpulan data antropometri. Tujuan dari prosedur standarisasi adalah memberikan informasi yang cepat dan menunjukkan kesalahan secara tepat sehingga perubahan dapat dilakukan sebelum sumber kesalahan dapat dipastikan.

Pengertian Validitas, Presisi dan Akurasi

Validitas

Validitas menentukan adekuasi pengukuran. Valid artinya apabila apa yang dihasilkan adalah refleksi atau interpretasi dari situasi sebenarnya. Jadi pengukuran dianggap valid bila metode atau alat yang digunakan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya penelitian status gizi dengan metode konsumsi makanan, harus dilakukan dengan jangka waktu yang relevan, pada populasi yang tepat dan dengan menggunakan pengukuran makanan yang benar-benar mengukur paparan (*exposure*) yang relevan, dan tidak ada kesalahan dalam melakukan klasifikasi dari luaran (*outcome*) yang diteliti.

Kalau hendak mengukur status gizi individu jangka panjang maka harus dipilih metode yang dapat menggambarkan makanan yang paling bisa dimakannya dan tidak menggunakan metode satu hari recall. Contoh lain untuk menggambarkan status gizi besi jangka panjang berdasarkan pemeriksaan laboratorium, maka pemeriksaan yang tepat adalah menilai cadangan besi di dalam tubuh dalam bentuk feritin daripada menilai hemoglobin. Studi yang membandingkan dua pengukuran yaitu antara pengukuran yang baru dengan pengukuran yang sudah diterima karena terpercaya dalam akurasi disebut studi validasi.

Presisi

Presisi adalah fungsi dari kesalahan acak atau random error dalam pengukuran, dan kebanyakan kasusnya memang merupakan variasi dalam pengukuran yang benar-benar terjadi. Apabila suatu pengukuran yang dilakukan berulang kali menghasilkan nilai yang sama,

maka pengukuran disebut mempunyai presisi yang tinggi. Presisi disebut juga reproduktifitas atau reliabilitas. Suatu pengukuran sebaiknya dilakukan beberapa kali yang tidak bergantung satu sama lain presisi dari masing-masing pengukuran dihitung dengan mengukur koefisien variasinya.

Akurasi

Akurasi berguna untuk mengetahui hasil pengukuran yang didapat apakah mendekati nilai sebenarnya atau tidak. Akurasi adalah kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran penyelia sebagai rujukan. Bisa saja suatu hasil pengukuran mempunyai presisi yang baik tetapi tidak akurat, terutama pada saat terjadi bias yang sistematis sehingga mempunyai koefisien variasi yang rendah tapi tidak mendekati nilai sebenarnya, Sebaliknya suatu pengukuran yang akurat harus diikuti dengan presisi yang tinggi.

Kesalahan dalam Pengukuran

Kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran dapat mempengaruhi presisi, akurasi, dan validitas pengukuran antropometri gizi. Ada 3 penyebab utama kesalahan yang signifikan yaitu:

- 1) Kesalahan pengukuran.
- 2) Perubahan hasil pengukuran baik fisik maupun komposisi jaringan.
- 3) Analisis dan asumsi yang keliru.

Sedangkan kesalahan lainnya yang umum terjadi dalam pengukuran antropometri antara lain:

- 1) Pada waktu melakukan pengukuran tinggi badan tanpa memperhatikan posisi orang yang diukur, misalnya belakang kepala, punggung, pinggul, dan tumit harus menempel di dinding. Sikapnya harus

dalam posisi siap sempurna. Disamping itu pula kesalahan juga terjadi apabila petugas tidak memperhatikan situasi pada saat anak diukur. Contohnya adalah anak menggunakan sandal atau sepatu.

- 2) Pada waktu penimbangan berat badan, timbangan belum di titik nol, dacin belum dalam keadaan seimbang dan dacin tidak berdiri tegak lurus.
- 3) Kesalahan pada peralatan. Peralatan yang digunakan untuk mengukur berat badan adalah dacin dengan kapasitas 20-25 kg dan ketelitian 0,1 kg. Untuk mengukur panjang badan, alat pengukur panjang badan berkapasitas 110 cm dengan skala 0,1 cm. Tinggi badan dapat diukur dengan mikrotoa berkapasitas 200 cm dengan ketelitian 0,1 cm. Lingkar lengan atas dapat diukur dengan pita LLA yang berkapasitas 33 cm dengan skala 0,1 cm.
- 4) Kesalahan yang disebabkan oleh tenaga pengukur. Kesalahan ini dapat terjadi karena petugas pengumpul data kurang hati-hati atau belum mendapat pelatihan yang memadai. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran sering disebut Measurement Error.

Mengatasi Kesalahan Pengukuran

Secara garis besar usaha untuk mengatasi kesalahan pengukuran, baik dalam mengukur sebab dan akibat serta dampak dari suatu tindakan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Memilih ukuran yang sesuai dengan apa yang ingin diukur. Misalnya mengukur tinggi badan menggunakan mikrotoa, dan tidak menggunakan alat ukur lain yang bukan diperuntukkan untuk mengukur tinggi badan.

- b. Membuat prosedur baku pengukuran yang harus ditaati oleh seluruh pengumpul data. Petugas pengumpul data harus mengerti tehnik, urutan dan langkah-langkah dalam pengumpulan data.
- c. Pelatihan dan refreshing petugas. Pelatihan petugas harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, baik ditinjau dari segi waktu maupun materi pelatihan. Materi pelatihan sebaiknya menekankan pada ketelitian pembacaan dan pencatatan hasil. Mengingat petugas akan melakukan pengukuran, maka dalam pelatihan harus dilakukan praktek terpimpin oleh petugas profesional dalam bidangnya. Apabila memungkinkan dilaksanakan pelatihan secara periodik.
- d. Kalibrasi alat ukur secara berkala. Alat timbang dan alat lainnya harus selalu ditera dalam kurun waktu tertentu. Apabila ada alat yang rusak, sebaiknya tidak digunakan lagi.
- e. Pengukuran silang antar pengamat. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mendapatkan presisi dan akurasi yang baik.
- f. Perekaman hasil langsung setelah pengukuran lalu hasilnya diteliti oleh orang kedua.
- g. Pengawasan dan uji petik

G. Klasifikasi status gizi

Dalam menentukan klasifikasi status gizi harus ada ukuran baku yang disebut reference. Baku antropometri yang digunakan di Indonesia adalah WHO - NHCS. Direktorat Bina Gizi Masyarakat. Depkes dalam pemantauan status gizi (PSG) anak balita tahun 1999 menggunakan buku rujukan World Health Organization - National Center for Health Statistic (WHO - NHCS).

Pada lokakarya antropometri tahun 1975 telah diperkenalkan baku harvard. Berdasarkan semi loka karya antropometri Aloho, 1991 telah direkomendasikan penggunaan baku rujukan WHO NHCS (Gizi Indonesia vol XV. No. 22 tahun 1990). Berdasarkan baku harvard status gizi dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Gizi lebih untuk over weight, termasuk kegemukan dan obesitas.
2. Gizi baik untuk well nourished.
3. Gizi kurang untuk under weight yang mencakup mild dan moderate PCM (Protein Calorie Malnutrition).
4. Gizi buruk untuk severe PCM, termasuk marasmus, marasmik - kwashiorkor, kwashiorkor.

Klasifikasi status gizi digunakan untuk memilah-milah nilai status gizi sedangkan garis pembatas (*cut off points*) digunakan untuk membedah (indikator) nilai status gizi.

Klasifikasi status gizi bermacam - macam:

1. Klasifikasi dengan satu indeks antropometri, yaitu BB/U, TB/U, LLA/U, dan LLA/T untuk gizi kurang ; serta BB/TB untuk seluruh spektrum keadaan gizi.
2. Klasifikasi dengan gabungan indeks antropometri, yaitu menurut Waterloow (BB/TB dan BB/U) dan WHO (BB/TB, BB/U, dan TB/U).
3. Klasifikasi dengan gabungan indeks antropometri dengan pemeriksaan fisis dan/ atau laboratorium, yaitu tatacara klasifikasi menurut *Wellcome Trust Party* (BB/U, edema) dan menurut Mc Larren (BB/U, edema, serum protein).
4. Klasifikasi dengan indeks antropometri dalam bentuk rasio dan pangkat/ akar, yaitu indeks massa tubuh (BMS = *Body Mass Index*) rasio berat (kg) terhadap tinggi (m) pangkat dua.

Untuk menentukan klasifikasi status gizi diperlukan ada batasan-batasan yang disebut dengan ambang batas. Batasan ini di setiap negara relatif berbeda, hal ini tergantung dari kesepakatan para ahli gizi di negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian empiris dan keadaan klinis. Di bawah ini akan diuraikan beberapa klasifikasi yang umum digunakan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Gomez (1956)

Baku yang digunakan oleh Gomez adalah baku rujukan Harvard. Indeks yang digunakan adalah berat badan menurut umur (BB/ U). Sebagai baku patokan digunakan persentil 50. Gomez mengklasifikasikan status gizi atau KEP yaitu normal, ringan, sedang dan berat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini (*) Baku = persentil 50 Harvard:

Tabel.2.4 Klasifikasi KEP menurut Gomez

Kategori (Derajat KEP)	BB/ U (% *)
0 = Normal	< 90 %
1 = Ringan	89 - 75 %
2 = Sedang	74 - 60 %
3 = Berat	< 60 %

Sumber Gibson Rosalind. S, 1990.

b. Klasifikasi kualitatif Menurut Wellcome Trust

Penentuan klasifikasi menurut Wellcome Trust sangat mudah dilakukan hal ini dikarenakan tidak memerlukan pemeriksaan klinis maupun laboratorium. Penentuan dapat dilakukan oleh tenaga medis setelah diberi latihan yang cukup. Baku yang digunakan adalah baku Harvard. Klasifikasi Status gizi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5. Menurut Wellcome Trust Klasifikasi Status Gizi

Berat Badan (% dari baku *)	Edema	
	Tidak ada	Ada
≥ 60 %	Gizi Kurang	Kwashiorkor
< 60 %	Marasmus	Marasmus- Kwashiorkor

Sumber, Solihin Pudjiadi, 1997

c. Klasifikasi menurut Waterlow

Waterlow membedakan antara penyakit KEP yang terjadi akut dan kronis. Beliau berpendapat bawa deposit Berat badan terhadap tinggi badan mencerminkan gangguan gizi yang akut dan menyebabkan keadaan *Wasting* (kurus - kering). Deposit tinggi menurut umur merupakan akibat kekurangan gizi yang berlangsung sangat lama. Akibat yang ditimbulkan adalah anak menjadi pendek *stunting* untuk umurnya. Klasifikasi status gizi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Klasifikasi menurut Waterlow

Kategori	Stunting (Tinggi menurut umur)	Wasting (Berat menurut tinggi)
0	>95 %	>90 %
1	90 - 80 %	90 -80 %
2	80 - 70 %	80 - 70 %
3	< 70 %	< 70 %

Sumber, Solihin Pudjiadi, 1997.

d. Klasifikasi menurut Jelliffe

Indek yang digunakan adalah berat badan menurut umur. Pengkategorian adalah I, II, III, IV. Untuk lebih jelasnya Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel.2.7. Klasifikasi KEP Menurut Jelliffe

Kategori	BB/ U (%)
KEP I	90 - 80
KEPII	80 - 70
KEP II	70 - 60
KEP IV	< 60

Sumber, Rekso dikusumo, 1996

e. Klasifikasi Bengoa

Ada 3 kategori yaitu KEP I, II, dan III. Indek yang digunakan adalah berat badan menurut umur. Dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel.2.8. Klasifikasi KEP

Kategori	BB/ U (%)
KEP I	90 -76
KEP II	75 -61
KEP III	Semua penderita dengan edema

Sumber, Rekso dikusumo,1996.

f. Klasifikasi Status Gizi menurut Kementrian Kesehatan 2010

Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak Berdasarkan Indeks

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-score)
Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak Umur 0 – 60 Bulan		
Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U)		
Anak Umur 0 – 60 Bulan		
Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Besar Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)		
Anak Umur 0 – 60 Bulan		
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak Umur 0 – 60 Bulan		
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak Umur 0 – 60 Tahun		

g. Klasifikasi Cara WHO

Pada dasarnya menggunakan 3 indek yaitu : BB/TB, BB/ U, dan TB/ U. Standar yang digunakan adalah National Center for Health Statistics, USA (NCHS) Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.10. Klasifikasi status gizi menurut WHO

BB/TB	BB/U	TB/U	Status Gizi
Normal	Rendah	Rendah	Baik, pernah kurang
Normal	Normal	Normal	Baik
Normal	Tinggi	Tinggi	Jangkung, masih baik
Rendah	Rendah	Tinggi	Buruk
Rendah	Rendah	Normal	Buruk, kurang
Rendah	Normal	Tinggi	Kurang
Tinggi	Tinggi	Rendah	Lebih, obesitas
Tinggi	Tinggi	Normal	Lebih, tidak obesitas
Tinggi	Normal	Rendah	Lebih, pernah kurang

Sumber, Supriasa, 2002

H. Aplikasi Antropometri

Penggunaan antropometri sebagai alat ukur status gizi semakin mendapat perhatian karena dapat digunakan secara luas dalam program perbaikan gizi di masyarakat. Di Indonesia seperti halnya dengan negara-negara lain di dunia, antropometri merupakan salah satu alat ukur status gizi yang telah digunakan dalam berbagai kegiatan dan program gizi. Penggunaan antropometri meliputi berbagai aspek antara lain: kualitas sumber daya manusia; penilaian dan pemantauan status gizi; pemantauan pertumbuhan anak, Kegiatan penapisan program gizi; kegiatan di Klinis dalam hubungan dengan penyakit dan pengobatan; Swa uji Risiko Kekurangan Energi Kronis dan Pemantauan Status Gizi orang Dewasa.

I. Keunggulan dan kelemahan Antropometri Gizi

Keunggulan antropometri

1. Prosedurnya sederhana, aman dan dapat dilakukan dalam jumlah sampel yang besar.
2. Relatif tidak membutuhkan tenaga ahli.
3. Alatnya murah, mudah dibawa, tahan lama, dapat dipesan dan dibuat di daerah setempat.
4. Tepat dan akurat, karena dapat dibakukan.
5. Dapat mendeteksi atau menggambarkan riwayat gizi di masa lampau.
6. Umumnya dapat mengidentifikasi status gizi sedang, kurang dan buruk karena sudah ada ambang batas yang jelas.
7. Dapat mengevaluasi perubahan status gizi pada periode tertentu atau dari satu generasi ke generasi berikutnya.
8. Dapat digunakan untuk penapisan kelompok yang rawan gizi.

Kelemahan Antropometri

1. Tidak sensitif, artinya tidak dapat mendeteksi status gizi dalam waktu singkat serta tidak dapat membedakan kekurangan zat gizi tertentu seperti zink dan Fe.
2. Faktor di luar gizi (penyakit, genetik dan penurunan penggunaan energi) dapat menurunkan spesifikasi dan sensitifitas pengukuran antropometri.
3. Kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran dapat mempengaruhi presisi, akurasi dan validitas pengukuran antropometri.

BAB III

PENILAIAN STATUS GIZI SECARA BIOKIMIA

A. Pengertian

Biokimia adalah kimia makhluk hidup. Biokimiawan mempelajari molekul dan reaksi kimia terkatalisis oleh enzim yang berlangsung dalam semua organisme. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen selular, seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan biomolekul lainnya. Saat ini biokimia lebih terfokus secara khusus pada kimia reaksi termediasi enzim dan sifat-sifat protein. Saat ini, biokimia metabolisme sel telah banyak dipelajari. Bidang lain dalam biokimia di antaranya sandi genetik (DNA, RNA), sintesis protein, angkutan membran sel, dan transduksi sinyal.

Pemeriksaan biokimia dalam penilaian status gizi memberikan hasil yang lebih tepat dan objektif daripada menilai konsumsi pangan dan pemeriksaan lain. Pemeriksaan yang sering digunakan adalah teknik pengukuran kandungan berbagai gizi dan substansi kimia lain dalam darah dan urine. Adanya parasit dapat diketahui melalui pemeriksaan feses, urine, dan darah.

Penilaian biokimia adalah pemeriksaan yang sifatnya langsung untuk menentukan status gizi seseorang. Dibandingkan dengan penilaian status gizi lain, penilaian biokimia merupakan cara yang paling obyektif dan bersifat kuantitatif. Selain itu penilaian secara biokimia dapat mendeteksi kelainan status gizi jauh sebelum terjadi perubahan dalam nilai antropometri serta gejala dan tanda-tanda kelainan klinik. Beberapa tes pada penilaian biokimia berguna untuk melihat asupan gizi saat ini, yang dapat dilakukan secara

bersama dengan penilaian konsumsi makanan untuk menilai adekuasi konsumsi makanannya.

Penilaian biokimia dibagi dalam dua kategori yaitu tes statis (Static test) dan tes Fungsional (functional test); ada juga yang menggunakan istilah tes langsung dan tidak langsung.

Tes statis didasarkan pada penentuan zat gizi atau hasil metabolisme di dalam darah, urin atau jaringan tubuh, misalnya pengukuran vitamin A, albumin atau kalsium di dalam serum. Meskipun hasilnya langsung didapat, namun kelemahannya adalah walaupun hasil tes menunjukkan nilai zat gizi di dalam jaringan atau cairan yang diambil sebagai sampel, tetapi hal ini tidak selalu mencerminkan status gizi seseorang secara keseluruhan, apakah tubuh secara keseluruhan menunjukkan gizi kurang, normal atau lebih. Misalnya status gizi dalam darah/serum, dapat dengan mudah ditentukan, tetapi pengukuran statis yang dilakukan satu kali tersebut tidak merupakan indikator yang spesifik untuk menentukan status gizi tubuh secara keseluruhan.

Tes fungsional dilakukan untuk menetapkan status gizi berdasarkan pertimbangan bahwa hasil akhir dari kekurangan zat gizi dan kepentingan biologiknya tidak semata-mata ditentukan oleh kadarnya di dalam darah dan jaringan, tetapi oleh kegagalan dari satu atau lebih proses fisiologik yang tergantung pada zat gizi tersebut untuk menunjukkan penampilan yang optimal. Beberapa contoh tes fungsional adalah tes adaptasi gelap untuk menilai status vitamin A, dan gangguan status imun/kekebalan yang merupakan akibat dari kurang energi protein dan kekurangan zat gizi lain.

B. Pemeriksaan Biokimia zat Gizi Makro dan Mikro
1. Pemeriksaan Biokimia zat gizi Makro
a. Penilaian Status Protein

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting, karena yang paling erat hubungannya dengan proses-proses kehidupan. Nama protein berasal dari bahasa Yunani (Greek) *proteus* yang berarti "yang pertama" atau "yang terpenting". Seorang ahli kimia Belanda yang bernama Mulder, mengisolasi susunan tubuh yang mengandung nitrogen dan menamakannya protein, terdiri dari satuan dasarnya yaitu asam amino (biasa disebut juga unit pembangun protein).

Protein dalam darah mempunyai peranan fisiologis yang penting bagi tubuh antara lain:

- 1) Untuk mengatur tekanan air, dengan adanya tekanan osmose dari plasma protein.
- 2) Sebagai cadangan protein tubuh.
- 3) Untuk mengontrol peredaran darah (terutama dari fibrinogen).
- 4) Sebagai transport yang penting untuk zat-zat gizi tertentu.
- 5) Sebagai antibodi dari berbagai penyakit terutama dari gamma globulin.
- 6) Untuk mengatur aliran darah, dalam membantu bekerjanya jantung.

Di dalam darah ada 3 fraksi protein yaitu:

- a. Albumin : kadar normalnya = 3,5 - 5 gr/100 ml
 - b. Globulin : kadar normalnya = 1,5 - 3 gr/100 ml
 - c. Fibrinogen : kadar normalnya = 0,2 - 0,6 gr/100 ml
- Pemeriksaan biokimia terhadap status protein dibagi dalam 2 pokok, yaitu penilaian terhadap somatic protein dan visceral protein. Perbandingan somatic dan visceral dalam tubuh antara 75% dan 25%.

Somatic protein terdapat pada otot skeletal, sedangkan visceral protein terdapat di dalam organ/visceral tubuh yaitu hati, ginjal, pankreas, jantung, erythrocyt, granulocyt dan lymphocyt.

Konsentrasi serum protein dapat digunakan untuk mengukur status protein. Penggunaan pengukuran status protein ini didasarkan pada asumsi bahwa penurunan serum protein disebabkan oleh penurunan produksi dalam hati. Penentuan serum protein dalam tubuh meliputi: albumin, transferrin, prealbumin (yang dikenal juga dengan transthyretin dan thyroxine-binding prealbumin), retinol binding protein (RBP), insulin-Like growth factor-1 dan fibronectin.

Prosedur penentuan serum protein

Ion kupri (Cu^{2+}) dalam reagen biuret bereaksi dengan peptida (-CONH) dan menghasilkan senyawa peptida berwarna violet. Intensitas warna secara langsung proporsional dengan jumlah peptida pada pengukuran dengan kisaran yang luas. Senyawa ini dibentuk hanya jika paling sedikit ada dua gabungan peptida (-CONH). Akibatnya protein bereaksi dengan reagen biuret, sedangkan asam amino, ammonia, urea dan senyawa lain berisi nitrogen sederhana tidak bereaksi.

- a. Berilah label setiap tabung uji, yaitu standar, referensi, pool dan setiap subjek uji.
- b. Tambahkan 3,0 ml reagen biuret pada setiap tabung.
- c. Pada tabung standar, tambahkan 50 μl larutan standar; pada tabung referensi tambahkan 50 μL serum referensi; pada tabung pool tambahkan 50

- μL serum pool; pada masing-masing subjek tambahkan dengan 50 μL serum uji.
- d. Campurkan setiap tabung secara merata, dan biarkan dalam lemari gelap pada posisi berdiri minimal 10 menit.
 - e. Tempatkan spectrophometer pada panjang gelombang 555 nm. Aturlah pada titik nol dengan menggunakan cuvet reagen biuret sebagai referensi kosong.
 - f. Pindahkan masing-masing isi tabung pada cuvet.
 - g. Baca dan catat penyerapan sampel standar, referensi dan pool.

Prosedur Penentuan Serum Albumin

Albumin merupakan komponen utama dari protein serum total dalam individu yang sehat. Serum Albumin diuji dalam sebagian besar laborat klinik melalui metode penguat warna (dye-binding methode) yang menggunakan bromocresol green. Serum albumin berikatan secara spesifik dengan brodresol green untuk membentuk senyawa BCG albumin biru yang menyerap secara maksimal pada 600 nm.

- a) Berilah label setiap tabung uji yaitu kosong, standar, referensi, pool dan setiap subjek uji.
- b) Tambahkan 5,0 ml reagen celup penyangga pada masing-masing tabung.
- c) Pada tabung kosong tambahkan 20 μl air distilasi terionisasi. Pada tabung standar tambahkan 20 μl larutan standar. Pada tabung referensi tambahkan 20 μl serum referensi. Pada tabung pool tambahkan 20 μl serum pool. Untuk masing-masing subjek uji tambahkan 20 μl serum uji.

- d) Campurkan masing-masing tabung secara merata, dan biarkan pada posisi berdiri selama 2 menit.
- e) Pindahkan masing-masing isi tabung pada cuvet.
- f) Tempatkan spektrofotometer pada panjang gelombang 600 nm.
- g) Aturlah pada titik nol dengan menggunakan reagen blank.
- h) Baca dan catat penyerapan sampel standar, referensi dan pool.

Warna akhir yang berkembang menjadi stabil selama 1 jam. Sampel yang mempunyai lebih dari 6 g/dl albumin harus didilusikan dengan salin isotonik dan diuji lagi. Hasilnya kemudian harus dikoreksi pada ilusi ini.

Prosedur Penentuan Serum Transthyretin

Perhatikan bahwa bak penampungan harus dijaga tidak meluap. Pelat harus diletakkan pada posisi horisontal pada tingkat permukaan dan suhu kamar meliputi prosedur uji ini.

- a. Siapkan, seperti yang dijelaskan di bawah, tiga konsentrasi berbeda serum standar (manusia) yang dikenal dengan konsentrasi TTR (yaitu 25 mg/dL); ini digunakan untuk kurva standar.
- b. Isikan bak 1 ke 3 dengan 5 μ L masing-masing dari tiga konsentrasi serum standar dengan menggunakan Hamilton syringe atau Eppendorf micropipet.
- c. Isikan bak 4 dengan 5 μ L serum referensi yang tidak diencerkan.
- d. Isikan bak 5 dengan 5 μ L serum pool yang tidak diencerkan.

- e. Isikan bak tambahan masing-masing dengan 5 μ L. Sampel serum uji.
- f. Setelah pengisian,biarkan pelat pada posisi terbuka berdiri selama 10-20 menit,lalu tutup pelat tersebut dengan tutup plastik agar terlindungi dari pengeringan selama inkubasi.
- g. Tinggalkan pelat ini tetap berdiri pada posisi horisontal dipermukaan level,suhu kamar,selama 48 jam. Periode inkubasi ini menyebabkan difusi untuk mencapai titik akhir (yaitu semua antigen yang tersedia telah bergabung dengan antibodi)
- h. Setelah 48 jam,ukur diameter dari cincin presipitin (sampai ketelitian 0,1 mm) yang diilluminasikan dengan lampu sorot kecil terhadap latar belakang gelap dengan menggunakan kaca pembesar.
Atau dengan cara lain menggunakan alat pengukur partigen. Saat digunakan, alat pengukur partigen ditempatkan sehingga cincin presipitin menyentuh kedua sisi kerucut pada diameternya yang terbesar; ambil pengukuran pada titik kontak antara diameter cincin presipitin dan penandaan dari alatpengukur tersebut. Dua pengukuran ortogonal pada masing-masing cincin presipitin harus diambil untuk memperkecil kesalahan akibat bentuk cincin yang tidak tepat berbentuk lingkaran.

2. Pemeriksaan Biokimia zat gizi mikro

a. Penilaian Status Zat Besi

Besi merupakan komponen penting dari sel-sel darah merah (70% dari total besi dalam tubuh) mioglobin (4%) serta enzim-enzim seperti sitokrom, katalase, dan peroksidase (kurang dari 1%). Sekitar 25% total besi

tubuh tersimpan terutama dalam hati. Selebihnya, terserak pada sel-sel retikulo endotelial dalam sumsum tulang dan limpa. Proses terbentuknya kondisi defisiensi besi terbagi menjadi 3 fase, yaitu:

- a. Deplesi besi.
- b. Iron-deficient erythropoiesis.
- c. Anemia kekurangan besi.

Fase pertama merupakan pengurasan cadangan besi yang tercermin sebagai penurunan kadar feritin serum. Penurunan kandungan besi dalam plasma (menjadi $60\mu\text{g/dL}$) dan peningkatan kemampuan ikat besi total (*total iron-binding capacity*), yang mengakibatkan persentase penenuhan menurun (menjadi kurang dari 15%) berlangsung pada fase kedua. Masih dalam fase ini, kadar protoporfirin eritrosit akan meningkat melebihi angka $100\mu\text{g/dL}$, karena pasok besi tak lagi cukup untuk mensintesis heme sementara kadar hemoglobin masih bertahan pada nilai normal. Terakhir, terjadi anemia hipokromik mikrositik, yang berakibat pada penurunan nilai MCHC (*mean corpuscular haemoglobine concentration*). Penurunan kadar besi ($<40\mu\text{g/dL}$) dan feritin ($<10\mu\text{g/dL}$) plasma terus berlanjut pada fase ini, disamping peningkatan protoporfirin eritrosit ($>20\mu\text{g/dL}$).

Penilaian status besi yang terbaik dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa indikator secara bersamaan. Temuan dua atau lebih nilai yang tidak normal mencerminkan adanya gangguan pada status besi. Ada beberapa indikator laboratorium untuk menentukan status besi yaitu:

1. Hemoglobin (Hb).
2. Hematokrit.

3. Besi serum.
4. Ferritin serum (Sf).
5. Transferrin saturation (TS).
6. Free erythrocytes protophophyrin (FEP).
7. Unsaturated iron-binding capacity serum.

a.1. Hemoglobin (Hb)

Hemoglobin adalah parameter yang digunakan secara luas untuk menetapkan prevalensi anemia. Garby et al, menyatakan bahwa penentuan status anemia yang hanya menggunakan kadar Hb ternyata kurang lengkap, sehingga perlu ditambah dengan pemeriksaan yang lain.

Hb merupakan senyawa pembawa oksigen pada sel darah merah. Hemoglobin dapat diukur secara kimia dan jumlah Hb/100 ml darah dapat digunakan sebagai indeks kapasitas pembawa oksigen pada darah. Kandungan hemoglobin yang rendah dengan demikian mengindikasikan anemia. Bergantung pada metode yang digunakan, nilai hemoglobin menjadi akurat samapai 2-3%. Metode yang lebih dulu dikenal adalah metode Sahil yang menggunakan teknik kimia dengan membandingkan senyawa akhir secara visual terhadap standar gelas warna. Ini memberi 2-3 kali kesalahan rata-rata dari metode yang menggunakan spektrofotometer yang baik.

Nilai normal yang paling sering dinyatakan adalah 14-18 gm/100 ml untuk pria dan 12-16 gm/100 ml untuk wanita (gram/100 ml sering disingkat dengan gm% atau gm/dl). Beberapa literatur lain menunjukkan nilai yang lebih rendah, terutama pada wanita, sehingga mungkin pasien tidak dianggap

menderita anemia sampai Hb kurang dari 13 gm/100 ml pada pria dan 11 gm/100 ml untuk wanita.

Metode

Diantara metode yang paling sering digunakan di laboratorium dan paling sederhana adalah metode Sahli, dan yang lebih canggih adalah metode cyanmethemoglobin. Pada metode sahli, hemoglobin dihidrolisis dengan HCL menjadi globin ferroheme. Ferroheme oleh oksigen yang ada di udara dioksidasi menjadi ferriheme yang segera bereaksi dengan ion Cl membentuk ferrihemechlorid yang juga disebut hematin atau hemin yang berwarna coklat. Warna yang terbentuk ini dibandingkan dengan warna standar (hanya dengan mata telanjang). Untuk memudahkan perbandingan, warna standar dibuat konstan, yang diubah adalah warna hemin yang terbentuk. Perubahan warna hemin dibuat dengan cara pengenceran sedemikian rupa sehingga warnanya sama dengan sangat berpengaruh. Disamping faktor mata, faktor lain, misalnya ketajaman, penyinaran dan sebagainya dapat mempengaruhi hasil pembacaan.

Meskipun demikian untuk pemeriksaan di daerah yang belum mempunyai peralatan canggih atau pemeriksaan di lapangan, metode sahli ini masih memadai dan bila pemeriksanya telah terlatih hasilnya dapat diandalkan. Metode yang lebih canggih adalah metode cyanmethemoglobin. Pada metode ini hemoglobin dioksidasi oleh kaliumferrosianida menjadi methemoglobin yang kemudian bereaksi dengan ion sianida (CN^{2-}) membentuk sian-methemoglobin yang berwarna merah. Intensitas warna dibaca dengan fotometer dan

dibandingkan dengan standar. Karena yang membandingkan alat elektronik, maka hasilnya lebih objektif. Namun, fotometer saat ini masih cukup mahal, sehingga belum semua laboratorium memilikinya.

Mengingat hal diatas, percobaan dengan metode sahli masih digunakan disamping metode cyanmethemoglobin yang lebih canggih.

Prosedur pemeriksaan dengan metode sahli

Pada metode sahli, hemoglobin dihidrolisis dengan HCL menjadi globin ferroheme, ferroheme oleh oksigen yang ada di udara dioksidasi menjadi ferriheme yang segera bereaksi dengan ion Cl membentuk Ferrimechlorid yang juga disebut hematin atau hemin yang berwarna coklat. Warna yang terbentuk ini dibandingkan dengan warna standar (hanya dengan mata telanjang). Untuk memudahkan perbandingan, warna standar dibuat konstan, yang diubah adalah warna hemin yang terbentuk. Perubahan warna hemin dibuat dengan cara pengenceran sedemikian rupa sehingga warnanya sama dengan warna standar. Karena yang membandingkan adalah mata telanjang, maka subjektivitas sangat berpengaruh. Di samping faktor mata, faktor lain, misalnya ketajaman, penyinaran dan sebagainya dapat mempengaruhi hasil pembacaan.

Meskipun demikian untuk pemeriksaan di daerah yang belum mempunyai peralatan canggih atau pemeriksaan dilapangan, metode sahli ini masih memadai dan bila pemeriksaannya telah terlatih hasilnya dapat diandalkan.

Reagensia:

1. HCl 0,1 N.

2. Aquadest.

Alat/sarana: pipet hemoglobin, alat Sahli, pipet pastur, pengaduk.

Prosedur kerja

1. Masukkan HCl 0,1 N ke dalam tabung sahli sampai angka 2.
2. Bersihkan ujung jari yang akan diambil darahnya menggunakan larutan desinfektan (alkohol 70%, betadin dan sebagainya), kemudian tusuk dengan lancet atau alat lain.
3. Isap dengan pipet hemoglobin sampai melewati batas, bersihkan ujung pipet, kemudian teteskan darah sampai ketanda batas dengan cara menggeserkan ujung pipet ke kertas saring/kertas tisu.
4. Masukkan pipet yang berisi darah ke dalam tabung hemoglobin, sampai ujung pipet menempel pada dasar tabung, kemudian tiup pelan-pelan. Usahakan agar tidak timbul gelembung udara. Bilas sisa darah yang menempel pada dinding pipet dengan cara mengisap HCl dan meniupnya lagi sebanyak 3-4 kali.
5. Campur sampai rata dan diamkan selama kurang lebih 10 menit.
6. Masukkan ke dalam alat pembanding, encerkan dengan aquades tetes demi tetes sampai warna larutan (setelah diaduk sampai homogen) sama dengan warna gelas dari alat pembanding. Bila sudah sama, baca kadar hemoglobin pada skala tabung.

Prosedur pemeriksaan dengan metode cyanmethemoglobin

Pada metode ini hemoglobin dioksidasi oleh kalium ferrosianida menjadi methemoglobin yang kemudian bereaksi dengan ion sianida (CN^{2-}) membentuk sian-methemoglobin yang berwarna merah. Intensitas warna dibaca dengan fotometer dan dibandingkan dengan standar. Karena yang membandingkan alat elektronik, maka hasilnya lebih objektif. Namun, fotometer saat ini masih cukup mahal, sehingga belum semua laboratorium memilikinya.

Reagensia:

1. Larutan kalium ferrosianida ($\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$) 0,6 mmol/l
2. Larutan kalium sianida (KCN) 1,0 mmol/l

Alat/sarana:

1. Pipet darah.
2. Tabung cuvert.
3. Kolorimeter.

Prosedur kerja:

- a. Masukkan campuran reagen sebanyak 5 ml ke dalam cuvert.
- b. Ambil darah kapiler seperti pada metode sahil sebanyak 0,02 ml dan masukkan ke dalam cuvert di atas, kocok dan diamkan selama 3 menit.
- c. Baca dengan kolorimeter pada λ 546.

Perhitungan:

$$\text{Kadar Hb} = \text{absorpsi} \times 36,8 \text{ gr/dl/100 ml}$$

Atau

$$\text{Kadar Hb} = \text{absorpsi} \times 22,8 \text{ mmol/l}$$

Cara Lain:

Prinsip : Darah dalam larutan mengandung KCN dan $\{\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6\}$ → mengubah Hb →


methemoglobin yang akan berikatan dg KCN → pigmen stabil sianmethemoglobin.

Alat dan Bahan :

- a) Tabung reaksi.
- b) Mikropipet 20 ul.
- c) Darah EDTA 10%.
- d) Reagen Drabkin.
- e) Spektrofotometer.

Prosedur:

- a) Siapkan dua buah tabung reaksi.
- b) Tabung reaksi pertama isi dengan reagen drabkin sebanyak 5 ml (Blanko). Tabung kedua isi dengan reagen drabkin 5 ml ditambah sampel darah EDTA 20 ul (Sampel homogenkan (campur)).



- c) Diamkan 10 menit pada suhu kamar.
- d) Baca pada spektrofotometer dengan Panjang gelombang 546, Faktor 36,77, program C/f. Baca absorbansi sampel terhadap blanko.

Nilai normal:

1. Laki - laki : 12 g/dl - 17 g/dl
2. Perempuan : 11 g/dl - 15 g/dl

a.2. Hematokrit (HCT)

Hematokrit (Hct) adalah proses pemisahan darah yang dilakukan untuk mengetahui nilai volume eritrosit dalam darah. Nilai hematokrit dinyatakan dalam persentase. Proses ini biasanya dilakukan untuk mengetahui nilai eritrosit rata-rata sehingga dapat dihasilkan diagnosa yang sesuai dengan kondisi pasien. Nilai hematokrit (Hct) yang rendah menunjukkan pasien mengalami anemia. Sedangkan hematokrit (Hct) yang tinggi menunjukkan bahwa pasien mengalami dehidrasi.

Hematokrit adalah volume eritrosit yang dipisahkan dari plasma dengan cara memutarinya di dalam tabung khusus yang nilainya dinyatakan dalam persen (%). Setelah sentrifugasi, tinggi kolom sel merah diukur dan dibandingkan dengan tinggi darah penuh yang asli. Persentase massa sel merah pada volume darah yang asli merupakan hematokrit. Darah penuh antikoagulasi disentrifugasi dalam tabung khusus. Karena darah penuh dibentuk pada intiselnya oleh sel darah merah (SDM) dan plasma, setelah sentrifugasi persentase sel-sel merah memberikan estimasi tidak langsung jumlah SDM/100 ml dari darah penuh (dan dengan demikian pada gilirannya merupakan estimasi tidak langsung jumlah hemoglobin). Hematokrit dengan demikian bergantung sebagian besar pada jumlah SDM, tapi ada beberapa efek (dalam hal jauh lebih sedikit) dari ukuran rata-rata SDM. nilai normal adalah 40%-54% untuk pria dan 37%-47% untuk

wanita. HCT biasanya hampir 3 kali nilai Hb (dengan menganggap tidak terdapat tanda hipokromia). Kesalahan rata-rata pada prosedur HCT yaitu kira-kira 1-2%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hematokrit:

- a) prosedur pengambilan sample darah yang tidak sesuai aturan.
- b) posisi dan kondisi pasien.
- c) jumlah lekosit yang cukup tinggi.
- d) nilai glukosa dan natrium darah yang tinggi.
- e) Hemolisis.
- f) penggunaan antikoagulan yang tidak tepat
- g) kecepatan dan waktu centrifugasi dan kesalahan paralaks, dll.

Prosedur penentuan hematokrit

Penentuan hematokrit haruslah dilakukan secara duplikat dengan menggunakan darah kapiler atau darah vena yang diantikogulasikan dengan EDTA. Pada saat menggunakan proses EDTA ini, akan digunakan tabung kapiler *Blue-banded* yang berisi antikoagulan.

1. Letakkan satu ujung atbung kapiler dalam setetes darah yang akan diuji, sehingga darah ditarik masuk ke tabung dengan aksi kapilaritas. Isi tabung dengan 10 mm pada ujung seberang. Hapus bagian luar tabung ini dengan penghapus. (catatan : gelembung udara dalam tabung tidak akan mempengaruhi hasil).

2. Segel ujung tabung yang kosong tersebut dengan penutup kecil atau sealer dengan menempatkan ujung kering tabung hematokrit ke dalam sealant pada posisi vertikal.
3. Tempatkan ujung yang ditutup pada tabung kapiler terhadap sisi kepala sentrifugasi dan tabung dalam celah radial. Catat nomor posisi dari spesimen ini.
4. Ulangi nomor 1 dan 3 di atas untuk setiap sampel uji.
5. Tutup erat penutup sentrifugasi pada bagian atas tabung kapiler dengan aman. Tutup bagian atasnya dan amankan penutupnya. Lakukan sentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 10000-15000 rpm. Catat bahwa tabung kapiler balans harus juga muat ke dalam kepala sentrifugasi jika hanya satu tes yang dilakukan.
6. Buka tabung-tabung dari sentrifugasi
7. Ukur tinggi sel darah merah dengan pembaca hematokrit. Jangan memasukkan *buffy coat* dalam pembacaan bila kolom eritrosit terbungkus. Jika kurang nyaman, tegakkan tabung kapiler. Ulangi penentuan jika duplikat berbeda dengan nilai lebih dari 1 % atau jika sampel telah rusak selama sentrifugasi.

Perhitungan hasil

Nyatakan hasil dalam persentase darah penuh (panjang sel terbungkus/panjang total). Ini merupakan volume sel darah terbungkus (PCV).

$$\begin{aligned} \text{Hm} &= \frac{\text{Tinggi volume eritrosit yang dimampatkan} \times 100\%}{\text{Tinggi total volume darah}} \\ &= \dots\% \end{aligned}$$

Interpretasinya:

- a. Nilai normal
- | | | |
|----------------|-----------|-----------|
| Menurut Wells | Laki-laki | : 42- 50% |
| | Wanita | : 40-48 % |
| Menurut Hepler | Laki-laki | : 40-54% |
| | Wanita | : 37-47 % |
| | Hamil Tua | : 23-34% |
- b. Nilai abnormal
- 1) Kurang dari nilai normal pada anemia.
 - 2) Lebih dari nilai normal pada polisithademia.

a.3. Serum Besi

Prosedur serum iron. Darah harus dikumpulkan menggunakan tabung terevakuasi bebas elemen tembusan. Hanya air terdeionisasi terdistilasi yang harus digunakan.

- a. Berilah label tabung uji dengan blanko, standar, referensi, *pool*, dan subjek test masing-masing.
- b. Tambahkan 2.5 ml reagen penyangga besi pada masing-masing tabung.
- c. Pada tabung berblanko tambahkan 0.5 ml standar besi. Pada referensi tambahkan 0.5 ml bahan referensi besi serum. Pada *pool* tambahkan dengan 0.5 ml serum *pooled*. Untuk masing-masing subjek uji, tambahkan 0.5 ml serum pada tabung yang cocok.
- d. Campurkan masing-masing tabung uji secara merata dengan vortex mixer.
- e. Pindahkan masing-masing sampel pada sebuah cuvet.
- f. Pasang pada panjang gelombang 560 nm. Nolkan spektrofotometer pada penyerapan nol dengan blanko reagen.

- g. Baca dan catat penyerapan awal sampel blanko, standar, referensi dan uji. Kembalikan sampel-sampel itu pada tabung yang sesuai setelah dilakukan pembacaan. Ini merupakan penyerapan awal (A_{initial}) yang diukur agar dilakukan pertimbangan mengenai perbedaan-perbedaan dalam turbiditas sampel.
- h. Tambahkan 0.05 ml reagen warna besi pada masing-masing tabung. Campur masing-masing tabung dan biarkan beridri selama kira-kira 10 menit dalam air pada 37°C .
- i. Pindahkan isi masing-masing tabung pada cuvet.
- j. Baca lagi dan catat penyerapan sampel blanko, standar, referensi, pool, dan uji menggunakan blanko untuk membuat nol penunjukan spektrofotometer. Ini merupakan penyerapan akhir (A_{final}).

Perhitungan hasil

Jika standar besi berisi $500\ \mu\text{g}/\text{dl}$, konsentrasi besi serum ($\mu\text{g}/\text{dl}$) dari sampel dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$500 \times \left(\frac{\text{test}_{\text{final}} - \text{test A}_{\text{initial}}}{\text{standar A}_{\text{final}} - \text{standar A}_{\text{initial}}} \right)$$

Faktor konversi pada satuan ($\mu\text{mol}/\text{L}$) = $\times 0,179$.

a.4. Transferrin saturation (TS)

Penentuan kadar zat besi dalam serum merupakan satu cara menentukan status besi. Salah satu indikator lainnya adalah Total Iron binding capacity (TIBC) dalam serum. Kadar TIBC ini meningkat pada penderita anemia. Karena kadar besi di dalam serum

menurun dan TIBC meningkat pada keadaan defisiensi besi maka rasio dari keduanya (*transferrin saturation*) lebih sensitif.

Rumus tersebut adalah sebagai berikut:

$$TS = \frac{\text{kadar besi dalam serum}}{TIBC} \times 100 \%$$

Apabila $TS > 16 \%$, pembentukan sel-sel darah merah dalam sumsum tulang berkurang dan keadaan ini disebut defisiensi besi untuk eritropoiesis.

a.5. Free Erythrocyte Protoporphyrin (FEP)

Apabila penyediaan zat besi tidak cukup banyak untuk pembentukan sel-sel darah merah di sumsum tulang maka sirkulasi FEP di darah meningkat walaupun belum nampak anemia. Dengan menggunakan fluorometric assay, maka penentuan FEP lebih cepat digunakan. Satuan untuk FEP dinyatakan dalam $\mu\text{g}/\text{dl}$ darah atau $\mu\text{g}/\text{dl}$ darah merah. Dalam keadaan normal kadar FEP berkisar $35 \pm 50 \mu\text{g}/\text{dl}$ RBC tetapi apabila kadar FEP dalam darah lebih besar dari $100 \mu\text{g}/\text{dl}$ RBC menunjukkan individu ini menderita kekurangan besi.

Prosedur free erythrocyte protoporphyrin

1. Tekan tombol "ON" pada henatofluorometer dan sisipkan blank glass cover slip ke dalam pemegang sampel.
2. Tekan tombol "MEASURE" dan catat pembacaan pada blank glass cover slip. Gunakan hanya blank cover slip dengan pembacaan dari 000-006.
3. Gunakan pipet pasteur plastik untuk menempatkan setetes darah penuh (kira-kira 20

μL) di atas blank cover slip dengan cara menyebarkannya, sehingga berhubungan pada posisi lubang.

4. Tekan tombol "MEASURE" dan catat pembacaan. Jangan subtraksikan pembacaan pada blank cover slip.
5. Ulangi (4) setelah 10 - 15 detik lewat dan kemudian kesampingkan glass cover slip.
6. Untuk kontrol darah, ambil setetes darah (sekitar $35 \mu\text{L}$) di atas glass cover slip yang bersih dengan menekan botol. Campurkan tetesan darah dengan ujung botol. Pindahkan tutup botol.
7. Tekan tombol "MEASURE" dan catat pembacaan. Kesampingkan glass cover slip.
8. Periksa kontrol-kontrol darah pada permukaan dan akhir setiap hari, atau setelah 50 pengujian yang bisa diterapkan. Nilai kontrol rendah, medium dan tinggi harus ada dalam harga yang dinyatakan.

Perhitungan hasil

Konsentrasi zink protoporphyrin yang dinyatakan dalam $\mu\text{mol/L}$ RBX's dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yang dalam hal ini hematokrit dinyatakan sebagai fraksi volume dari paket sel darah merah:

$$\frac{\text{Zn protoporphyrin dalam darah penuh } (\mu\text{mol/L})}{\text{hematokrit (vol.fraction)}}$$

Konsentrasi zink protoporphyrin juga dinyatakan dalam $\mu\text{g/dL}$ darah penuh: konversi pada satuan SI (mmol/L) = $\times 0,0177$. dapat faktor

a.6. Serum Ferritin (SF)

Untuk menilai status besi dalam hati perlu mengukur kadar ferritin. Menurut cook (dalam Mahdin anwar husaini, 1989) banyak ferritin yang dikeluarkan ke dalam darah secara proporsional menggambarkan banyaknya simpanan zat besi di dalam hati. Apabila didapatkan serum ferritin sebesar 30 mg/dl RBC berarti di dalam hati terdapat $30 \times 10 \text{ mg} = 300 \text{ mg}$ ferritin. Untuk menentukan kadar ferritin dalam darah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu dengan cara immunoradiometric assay (IRMA) atau dengan radio immuno assay (RIA) atau dengan cara enzyme-linked immuno assays (ELISA) yang tidak menggunakan isotop, tetapi enzim.

Dalam keadaan normal rata-rata SF untuk laki-laki dewasa adalah $90 \mu\text{g/l}$. perbedaan kadar serum ferritin ini menggambarkan perbedaan banyaknya perbedaan zat besi pada tubuh dengan zat besi pada laki-laki tiga kali lebih banyak dari wanita. Apabila seseorang mempunyai kadar SF kurang dari 12 orang yang bersangkutan dinyatakan sebagai kurang besi. Banyak orang yang sebenarnya menderita kurang besi, tetapi tidak dapat terdeteksi dengan cara ferritin karena kadar ferritin yang dikeluarkan dari hati menarik dalam darah apabila yang bersangkutan menderita penyakit kronis, infeksi dan sakit hati. Namun, apabila penyakit infeksi tidak umum terjadi di masyarakat, penentuan ferritin merupakan pilihan yang tepat.

Prosedur Penentuan serum ferritin

Catatan : Serum standar, pool, referensi dan uji semua harus dianalisa secara ganda. Biarkan tracer dan standar untuk menyesuaikan dengan temperatur ruang sebelum penggunaan.

1. Berilah label pada tabung-tabung : background, blangko, 5.0, 10.0, 25.0, 100, 250, 1000, 2500, pool, reference, dan tabung-tabung untuk masing-masing subjek.
2. Tambahkan 50 mL pada masing-masing serum standar, pool, referensi, dan tes pada tabung-tabung yang bersangkutan, mulai pertama kali dengan larutan paling encer.
3. Beritahukan pada petugas laboratorium bahwa anda siap dengan reagen tracer/immunobead. Ini harus dicampur dengan hati-hati dengan batang pengaduk untuk mencegah adanya pembentukan gelembung, prioritas untuk digunakan. Untuk menyesuaikan dengan *safety regulation*, seorang pengawas laborat mungkin harus mengawasi penambahan 200 μ L tracer yang digunakan pada masing-masing tabung. Kesampingkan tabung *background* sampai langkah 8.
4. Kocok rak tabung-tabung agar tercampur isinya (*vortex* tidak perlu), inkubasikan selama 30 menit pada 21 - 30 °C (suhu ruang).
5. Tambahkan 3,0 ml saline pada semua tabung (*mixing* tidaklah diperlukan pada tahap ini).
6. Sentrifugasikan semua tabung selama 10 menit pada kecepatan 1500 x gr/dl pada 4°C, untuk mengendapkan padatan-padatan pada dasar

- tabung. Proseslah dengan cepat sampai pada langkah berikutnya.
7. Ambillah supernatant pada masing-masing tabung dengan menggunakan peralatan hisap khusus.
 8. Sisipkan semua tabung (termasuk tabung *background*) ke dalam counter sinar gamma, dengan memperhatikan urutan tabung-tabung yang sesuai dengan jumlah counter gamma.
 9. Hitung setiap tabung sebentar dengan counter gamma.

Perhitungan Hasil

- a. Catat perhitungan rata-rata per menit (CPM) untuk masing-masing sampel standar, kontrol, dan uji.
- b. Substrasikan harga rata-rata CPM pada standar nol dari CPM tiap-tiap sampel standar, kontrol, dan uji untuk menghasilkan net CPM.
- c. Plotkan net CPM masing-masing standar pada Y-axis kertas semilog 4 siklus dan konsentrasi ferritin yang bersangkutan (ng/ml) pada X-axis
- d. Baca dari kurva standar konsentrasi ferritin (ng/ml) sampel uji dan sampel kontrol dari net CPM yang berkaitan dengannya.

Konversi pada satuan SI (mg/L) = $\times 1.0$

a.8. Serum Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC)

Prosedur penentuan serum *Unsaturated Iron Binding Capacity*:

- a. Berilah label pada tabung uji dengan blangko, standar, referensi, pool dan subjek tes masing-masing.

- b. Tambahkan 2,0 ml reagen penyangga UIBC pada masing-masing tabung.
- c. Pada yang blangko tambahkan 1,0 ml air bebas besi. Pada yang standar tambahkan 0,5 ml standar besi plus 0,5 ml air bebas besi. Pada yang referensi tambahkan 0,5 ml bahan referensi serum plus 0,5 ml standar. Untuk masing-masing subjek uji, tambahkan 0,5 ml serum pada tabung yang sesuai plus 0,5 ml standar.
- d. Campurkan masing-masing tabung uji secara merata dengan *vortex mixer*.
- e. Pindahkan masing-masing sampel pada sebuah cuvet.
- f. Pasang pada panjang gelombang 560 nm. Nol-kan spektrofotometer pada penyerapan nol dengan blangko reagen.
- g. Baca dan catat penyerapan awal sampel blangko, standar, referensi, dan uji. Kembalikan sampel-sampel itu pada tabung yang sesuai setelah dilakukan pembacaan. Ini merupakan penyerapan awal (A_{initial}), yang diukur agar dilakukan pertimbangan mengenai perbedaan-perbedaan dalam turbiditas sampel.
- h. Tambahkan 0,05 ml reagen warna besi pada masing-masing tabung. Campur tiap-tiap tabung dan biarkan berdiri selama kira-kira 10 menit dalam air pada 37 °C.
- i. Pindahkan isi masing-masing tabung pada cuvet.
- j. Bacalah lagi dan catat penyerapan sampel blangko, standar, referensi, pool, dan uji, menggunakan blangko untuk membuat nol penunjukan spektrofotometer. Ini merupakan penyerapan akhir (A_{final}). Kadang-kadang

perbedaan antara penyerapan akhir dan penerapan awal mungkin sangat kecil karena ketidakjenuhan transferrin dengan besi. Jika ini terjadi, sampel harus diencerkan (1 bagian serum dan 1 bagian air bebas besi) dan tes diulang. Hasilnya, yang dihitung menggunakan persamaan di bawah, harus kemudian dikalikan dengan 2,0.

Perhitungan Hasil

Jika standar besi berisi 500 mg/dl, kapasitas pengikat besi tidak jenuh dari serum (mg/dl) sama dengan :

$$500 - \left[\frac{500 \times (\text{tes } A_{\text{final}}) - (A_{\text{initial}})}{\text{Standar } (A_{\text{final}}) - (A_{\text{initial}})} \right]$$

Kapasitas pengikat besi total (TIBC) ($\mu\text{g/dl}$) = besi total pada serum ($\mu\text{g/dl}$) + kapasitas pengikat besi tidak jenuh dari serum ($\mu\text{g/dl}$). Faktor konversi pada satuan SI ($\mu\text{mol/L}$) = $\times 0,179$

b. Penilaian Status Vitamin

Penilaian status vitamin yang terkait dengan penentuan status gizi meliputi penentuan kadar vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, tiamin, riboflavin, niasin, vitamin B₆, vitamin B₁₂.

b.1. Vitamin A

Dalam gejala klinis defisiensi vitamin A akan tampak bila cadangan vitamin A dalam hati dan organ-organ tubuh lain sudah menurun dan kadar vitamin A dalam serum mencapai garis bawah yang diperlukan untuk mensuplai kebutuhan metabolik mata. Depleksi vitamin A dalam tubuh merupakan proses yang memakan waktu lama. Diawali dengan habisnya persediaan vitamin A di dalam

hati, menurunnya kadar vitamin A plasma (kelainan biokimia), kemudian terjadi disfungsi sel batang pada retina (kelainan fungsional), dan akhirnya timbul perubahan jaringan epitel (kelainan anatomis). Penurunan vitamin A pada serum tidak menggambarkan defisiensi vitamin A dini, karena deplesi telah terjadi jauh sebelumnya.

Kadar vitamin A dalam plasma tidak merupakan kekurangan vitamin A yang dini, sebab deplesi terjadi jauh sebelumnya. Apabila sudah terdapat kelainan mata, maka kadar vitamin A serum sudah sangat rendah (kurang dari $5 \mu\text{g}/100 \text{ ml}$), begitu juga kadar RBP-nya ($<20 \mu\text{g}/100 \text{ ml}$) konsentrasi vitamin A dalam hati merupakan indikasi yang baik untuk menentukan status vitamin A. Akan tetapi, biopsi hati merupakan tindakan yang mengandung resiko bahaya. Di samping itu, penentuan kadar vitamin A jaringan tidak mudah dilakukan.

Pada umumnya konsentrasi vitamin A penderita KEP rendah yaitu $<15 \mu\text{g}/\text{gram}$ jaringan hepar.

Metode penentuan serum retinol

Cara HPLC (*High Performance Liquid Chromatography*)

Prinsip:

Retinol dan standar retinil asetat yang ditambahkan dengan pelarut organik setelah protein serum didenaturasi. Dengan sistem fase berputar (revers phase) kedua protein tersebut dipisahkan dan diukur serapannya pada panjang gelombang 328 nm dengan HPLC. Konsentrasi retinol dalam serum dapat dihitung dari perbandingan puncak grafik retinol-asetat.

Prosedur:

- a. Seratus mikroliter plasma dimasukkan ke dalam tabung mikro ditambah 100 mikroliter etanol yang berisi standar retinil acetat (konsentrasi setara dengan 20 μg retinil/dl) dan 200 mikroliter heksan.
- b. Kemudian dikocok dengan vortex selama 1 menit.
- c. Setelah disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit lapisan heksan yang berisi ekstrak vitamin A dipipet sebanyak 150 μl .
- d. Ekstrak ini kemudian diuapkan dengan pertolongan gas nitrogen sampai kering.
- e. Ekstrak yang sudah kering kemudian ditambah 100 mikroliter isoprepanol, kemudian dikocok dan sebanyak 50 mikroliter disuntikan ke HPLC, dengan spesifikasi sebagai berikut.

1. Kolom : bondapak C18
2. Buffer (solvent) : metanol/air, (95/5, perbandingan volume)
3. Kecepatan aliran : 2,5 ml/menit
4. Tekanan : disesuaikan kecepatan aliran tersebut
5. Panjang gelombang detector : 328 nm
6. Sensitivitas detector : 0,01 AUFS
7. Suhu : kamar
8. Kecepatan rekoder : 1 cm/menit
9. Munculnya grafik : retinol 2,2 menit, Retynil acetat 3,0 menit

Perhitungan : Konsentrasi retinol dalam serum

Tinggi puncak grafik retinil x konsentrasi retinil asetat
Tinggi puncak grafik retinil asetat

Catatan:

- a. Semua tabung reaksi yang digunakan harus benar-benar bersih. Untuk mencapai ini tabung-tabung harus direndam dalam nitrat ataupun kromat selama 3 hari.
- b. Berdasarkan pengalaman, setiap 4-5 kali penyuntikan pada HPCL kolom perlu dicuci dengan dialiri buffer tanpa sampel selama sekitar 30 menit.
- c. Bila ada dugaan kadar vitamin A dalam serum agak tinggi (misalnya serum orang dewasa normal, anak yang baru saja diberi vitamin A dosis tinggi) serum yang digunakan 50 μ l saja.

Pengalaman di Puslitbang Gizi bogor selama ini sebuah kolom yang sudah digunakan untuk penentuan sekitar 250 sampel sudah tidak bias digunakan lagi. Hal ini mungkin terkait dengan kualitas pereaksi yang ada di Indonesia.

Penentuan Kadar vitamin A cara kolorimetri pereaksi trifluoroasetat/TFA. (Neeld & Pearson)

Prinsip:

Setelah protein didenaturasi dengan alcohol, vitamin A diekstraksi dengan pelarut organik. Ekstrak dipisahkan dan vitamin A ditentukan dengan direaksikan dengan TFA, dan warna biru yang terbentuk diukur serapannya pada panjang 620 nm. Karena karotin juga memberikan reaksi dengan TFA, meskipun jauh lebih lemah, perlu ada factor koreksi karena ada pengaruh dari karotin ini.

Cara Kerja (semi mikro)

1. Lima ratus mikroliter serum dalam tabung reaksi ditambah dengan 500 mikroliter etanol (atau dapat pula 1 N KOH dalam 90 % etanol)

2. Dikocok dengan tangan sampai rata. Ditambahkan 1000 mikroliter (= 1 ml) petroleum eter (40 - 60 °C) lalu dikocok dengan voltrex selama 1 menit.
3. Sentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 5-10 menit akan memisahkan ekstrak vitamin A di bagian atas serta campuran serum alkohol dibagian bawah.
4. Ekstrak dipipet sebanyak 750 mikroliter lalu diukur serapannya pada panjang gelombang 450 nm untuk penentuan karotin.
5. Ekstrak tersebut kemudian diuapkan sampai kering dengan gas nitrogen. Ditambah dengan 1500 mikroliter pereaksi TFA (campuran 1 bagian TFA dan 2 bagian kloroform yang disiapkan segar)
6. Warna biru yang terbentuk harus sudah diukur serapannya dalam waktu 30 detik pada panjang gelombang 620 nm.

Standar vitamin A yang dilarutkan dalam chloroform ada berisi 2 mg/ml, 4 mg/ml, dan 8 mg/ml disiapkan. Dipipet 25 ml dari masing-masing konsentrasi tersebut dan diukur serapannya setelah ditambah 1500 mikroliter pereaksi.

Standar tersebut setara dengan konsentrasi vitamin A dalam serum 10 µg/dl, 20 µg/dl, 30 µg/dl, dan 40 µg/dl.

Faktor koreksi karena pengaruh reaksi antara pereaksi dengan karotin dibuat sebagai berikut:

Disiapkan standar karotin yang berisi 10 µg/dl, 20 µg/dl, 40 µg/dl dan 80 µg/dl. Dipipet masing-masing sebanyak 750 mikroliter lalu diuapkan sampai kering dengan nitrogen. Kemudian

direaksikan dengan 155 mikroliter pereaksi dan serapannya diukur pada panjang gelombang 620 nm. Dengan demikian dapat dihitung faktor koreksi karena pengaruh karotin. Dari standar vitamin A dapat dihitung faktor perhitungan vitamin A dan dari standar karotin dapat dihitung faktor perhitungan karotin dengan prinsip:

$$\frac{\text{serapan sampel}}{\text{serapan standar}} \times \text{konsentrasi standar}$$

Catatan:

- a. Kecepatan pada pengukuran kecepatan pada panjang gelombang 620 nm tergantung pada pengalaman petugas laboratorium. Kalau sudah berpengalaman waktu yang diperlukan semenjak penambahan pereaksi samapai pengukuran serapan sejumlah 22-23 detik.
- b. Waktu melarutkan standar karotin mula-mula ditambah beberapa ml kloroform, baru kemudian ditambah PE sesuai tujuan. Bila langsung ditambah PE, sebagian karotin tidak larut.
- c. Pada penentuan vitamin A dengan cara kolorometri ini adalah total vitamin A (retinol dan retinil ester), sedangkan dengan HPLC hanya ditambah PE sebagai karotin tidak larut.
- d. Pada penentu vitamin A (retinol dan retinil ester), sedangkan dengan HPLC hanya retinol saja.

b.2. Vitamin D

Kekurangan vitamin ini dapat mengakibatkan penyakit rakhitis dan kadang-kadang tetani. Apabila

kekurangan terjadi pada masa pertumbuhan akan timbul osteomalasia. Sangat jarang ditemukan rakitis bawaan, insiden tertinggi terdapat pada umur 18 tahun.

Kekurangan vitamin D timbul kalsifikasi tulang yang tidak normal disebabkan oleh karena rendahnya saturasi kalsium dan fosfor dalam cairan tubuh. Keadaan resorpsi tulang akan melebihi pembentukannya hingga menyebabkan demineralisasi umum pada rangka yang berakibat menjadi lunaknya tulang-tulang serta deformitas torax, tulang punggung, pelvis dan tulang-tulang panjang.

Beberapa zat yang berhubungan dengan aktivitas vitamin D adalah:

- a. Vitamin D₂ (ersokalsiferol) yang dihasilkan oleh radiasi ersoterol (dalam tumbuh-tumbuhan) secara artifisial dengan sinar ultraviolet.
- b. Vitamin D₃ (kolekalsiferol) yang dihasilkan oleh radiasi pada kulit manusia dengan komponen ultraviolet sinar matahari dan juga terdapat secara alamiah pada sumber makanan hewani. Kolekalsiferol dikonversi di dalam hati dan mungkin usus menjadi 25(OH) kolekalsiferon.

Pada pemeriksaan biokimia penderita rakhtitis ditemukan hasil:

- a. Kadar kalsium serum normal atau lebih
- b. Kadar fosfor rendah
- c. Kadar fosfatase meninggi
- d. Kadar 25 (OH) vitamin D dibawah 4 mg/ml.

b.3.Vitamin E

Defisit vitamin E jarang sekali ditemukan oleh sebab makanan sehari-hari mengandung cukup vitamin E. namun demikian kita harus tetap waspada adanya kemungkinan keadaan subklinis, misalnya pada bayi berat badan lahir rendah dimana transfer vitamin E melalui plasenta tidak efisien.

Gangguan yang dapat dilihat karena kekurangan vitamin E adalah hemolisis dan mengurangnya umur hidup eritrosit. Penelitian pada binatang percobaan didapatkan bahwa defisit vitamin E menyebabkan kemandulan baik pada jantan dan betina. Gangguan lain adalah distrofi otot dan kelainan saraf pusat (ensefalomalasia). Pada pemeriksaan biokimia seorang anak dikatakan memiliki nilai normal vitamin E bila di dalam serum $\geq 0,7$ mg.

b.4. Vitamin C

Vitamin C diperlukan pada pembentukan zat kolagen oleh fibroblast hingga merupakan bagian dalam pembentukan zat intasel. Vitamin C diperlukan juga pada proses pematangan eritrosit dan pada pembentukan tulang dan dentin. Selain itu juga berperan dalam respirasi jaringan.

Pada scurvy (kekurangan vitamin C) pertumbuhan anak terganggu dan timbul pendarahan kapiler dimana-mana. Pada waktu anak dilahirkan persediaan vitamin C cukup banyak, maka kejadian infatle scurvy kebanyakan terjadi pada umur 6-12 bulan. Pada umur 1 tahun umumnya anak sudah mendapat diet yang lebih bervariasi sehingga angka kejadian menurun. Gejala-gejala yang menonjol adalah:

- a. Cengeng / mudah marah.
- b. Rasa nyeri pada tungkai bawah.

- c. Pseudoparalisis tungkai bawah, sedangkan tungkai atas jarang terserang.

Kelainan radiologis

Terutama pada bagian tulang yang sedang aktif tumbuh, seperti ujung sternum tulang rusuk, ujung distal femur, ujung proximal humerus, kedua ujung tibia dan fibula, dan ujung distal radius dan ulna. Gambaran radiologis menunjukkan adanya garis epifisis yang agak kabur dan tidak rata seperti biasa, osteoporosis ringan, pembengkakan pada ujung tulang panjang, terutama pada ujung bawah femur disebabkan oleh pendarahan subperiosteal.

b.5. VITAMIN B₁ (TIAMIN)

Defisiensi tiamin menyebabkan penyakit beri-beri. Bilamana diet wanita yang sedang mengandung tidak cukup mengandung vitamin B₁, maka anak yang dilahirkan dapat menderita beri-beri kongenital atau gejala beri-beri akan timbul pada bayi yang sedang disusui. Penyakit ini dapat pula timbul pada anak dengan penyakit gastrointestinal yang menahun, misalnya diare kronis dan sindrom seliak.

Gejala penyakit beri-beri pada bayi dan anak umumnya sama dengan gejala yang terjadi pada orang dewasa. Manifestasi penting ialah kelainan saraf, mental dan jantung. Kadang-kadang ditemukan kasus beri-beri bawaan, akan tetapi sebagian besar terdapat dalam triwulan pertama.

Gejala antiaminosis.

1. Beri-beri infantil umumnya ditemukan dalam keadaan akut. Gejala prodormal ringan saja atau tidak tampak sama sekali. Anak yang tampaknya

sehat selama 1-2 minggu tidak menunjukkan bertambahnya berat badan, kadang-kadang tampak gelisah, menderita pilek atau diare. Perubahan jantung datang tiba-tiba dengan takikardia dan dispne yang dapat mengakibatkan kematian mendadak. Pada pemeriksaan ditemukan jantung yang membesar terutama bagian kanan. Paru menunjukkan tanda kongesti, kadang-kadang terdapat edema, yang disertai oliguria sampai anuria. Pada kasus yang lebih menahun terdapat edema yang jelas, sering ditemukan efusi perikardial dan kadang-kadang asites. Muntah merupakan gejala yang sering ditemukan. Sistem urat saraf tidak mengalami banyak perubahan, hanya mungkin ditemukan atonia, refleks lutut mungkin negatif, meninggi atau berubah. Kadang-kadang terdapat kejang.

2. Kasus menahun sering ditemukan pada anak yang lebih besar (*late infancy childhood*). Penderita demikian umumnya lebih kecil dibandingkan anak yang sehat, keadaan gizinya kurang dan terdapat edema. Sering gejala yang menarik perhatian ialah atonia yang disebabkan oleh edema pita suara. Kadang-kadang perutnya membuncit karena meteorismus. Paralisis seperti yang tampak pada orang dewasa jarang terlihat pada anak, walaupun atonia tampak jelas dan refleks lutut berkurang atau menghilang.

Pencegahan.

Diet anak yang baik umumnya mengandung cukup tiamin. Pemberian vitamin B1 tambahan diperlukan untuk para ibu yang sedang mengandung atau

menyusui. Dianjurkan untuk memberikan 1,8 mg vitamin B1 setiap hari pada para ibu yang sedang mengandung dan 2,3 mg vitamin B1 pada ibu yang sedang menyusui, 0,4 mg untuk bayi dan 0,6-2 mg pada anak yang lebih besar. Anak dengan penyakit gastrointestinal menahun atau yang sedang mendapat makanan parenteral, harus diberi tiamin tambahan.

b.6.VITAMIN B2 (Riboflavin)

Vitamin B2 dapat dilarutkan dalam air dan berwarna kuning berfluoresensi, tahan panas dan asam, akan tetapi mudah dihancurkan oleh sinar dan media lindi.

Gejala defisiensi vitamin B2 akan tampak bilamana:

a. Stomatitis angularis

Pada sudut mulut terdapat maserasi dan retak-retak (fisura) yang memancar ke arah pipi. Kadang-kadang luka sudut mulut tersebut tertutup keropeng. Bilamana luka demikian berulang-ulang timbul pada akhirnya akan menimbulkan jaringan parut.

b. Glositis

Lidah akan tampak merah jambu dan licin karena struktur papil hilang.

c. Kelainan kulit

Perubahan pada kulit berupa luka seboroik pada lipatan nasolabial, alae nasi, telinga dan kelopak mata. Kadang-kadang ditemukan juga dermatitis pada tangan, sekitar vulva, anus dan perineum.

d. Kelainan mata

Dapat timbul fotofobia, lakrimasi, perasaan panas. Pada pemeriksaan dengan slitlamp akan tampak vaskularisasi kornea dan keratitis interstitialis.

Pencegahan dan pengobatan

Ariboflavinosis dapat dicegah dengan diet yang mengandung cukup susu, telur, sayur-mayur dan daging. Dianjurkan pemberian sehari-hari 0,6 mg untuk bayi, 1-2 mg untuk anak dan 2-3 mg untuk dewasa. Pada anak dengan tanda-tanda ariboflavinosis dapat diberikan 10 mg/hari vitamin B2 untuk beberapa minggu lamanya.

b.7. Niasin

Niasin dikenal juga sebagai pellagra preventive factor, oleh karena kekurangan niasin dalam makanan akan menyebabkan suatu penyakit pellagra (kulit kasar).

Gejala pellagra dikenal sebagai 3D yaitu dermatitis (radang pada kulit), diare dan dimensia (kemunduran fungsi otak). Di dalam tubuh niasin dapat dibentuk dari asam amino triptophan. Eksresi dari niasin dalam bentuk nicotinic acid bebas, niasinamida, nicotinuric acid, N-metil nicotinic acid, konjugasi dengan glisin. Batasan niasin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel .3.1. Batasan Niasin

Senyawa & satuan	Umur (thn)	Kriteria		
		Kurang	Margin	Cukup

Urinary nimethyl nicotinamide (mg/g kreatinin)	Semua umur	<0,2	0,2-5,59	0,6+
	Wanita Hamil	<0,8	0,8-2,49	2,5+

b.8. Vitamin B6

Vitamin B6 bentuk aktifnya adalah 2 macam yaitu pyridoxal phosphat dan pyrodoxamine phosphat. Beberapa substansi kimiawi yang tergolong ke dalam vitamin B6 adalah pyridoxin, pyridoxal dan pyridoxamin. Fungsi vitamin B6 adalah sebagai:

- Koenzim dari beberapa enzim.
- Mempengaruhi pemasukan asam amino ke dalam sel.
- Penting untuk fungsi normal dari susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi.

Gejala kekurangan vitamin B6 berupa dermatitis dan acrodynia yaitu dermatitis yang terjadi secara simetris dan terutama terdapat di berbagai tempat dikepala. Dalam keadaan kekurangan akan ditemukan piridoksi plasma di bawah 25 mg/ml dan piridoksin dalam urine 24 jam di bawah 20 mg untuk tiap g kreatinin dan asam piridoksi di bawah ini 0,5 mg. batasan dan interpretasi status vitamin B6 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.3.2. Batasan dan interpretasi status vitamin B6

Senyawa satuan	&	Umur (thn)	Kriteria		
			Kurang	Margin	Cukup
Urinary Pyridoxine (mcg/g kreatinin)		1-3	<90	-----	90+
		4-6	<80		80+
		7-9	<60		60+
		10-12	<40		40
		13-15	<30		30+

	16+	<20		20+
--	-----	-----	--	-----

b.9. Vitamin B12 (Kobalamin)

Vitamin B12 dianggap sebagai komponen antianemia dalam faktor ekstrinsik. Getah lambung orang normal mengandung substansi yang disebut faktor intrinsik yang bereaksi dengan faktor ekstrinsik yang terdapat dalam daging, susu atau bahan makanan lain untuk membuat substansi antianemia. Faktor antianemia tersebut diserap dan disimpan dalam hati. Pada anemia pernisiiosa biasanya faktor intrinsik tidak terdapat dalam getah lambung. Walaupun daging mengandung vitamin B12, namun tidak dapat digunakan oleh penderita anemia pernisiiosa, karena faktor intrinsik tidak ada. Vitamin B12 terikat pada protein dan hanya dapat dileaskan oleh faktor intrinsik untuk kemudian diserap. Kadar Vitamin B12 dikatakan rendah apabila kadarnya kurang dari 150 pg/ml. sedangkan menurut George Christajkis adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel.3.3. Batasan dan interpretasi status vitamin B12

Senyawa & satuan	Umur (thn)	Kriteria		
		Kurang	Margin	Cukup
Serum vitamin B12	Semua umur	<100	-----	100+

Defisiensi vitamin B12 dapat timbul bila:

- Terdapat kekurangan vitamin B12 dalam diet (seperti orang vegetarian).
- Tidak terdapat faktor intrinsik seperti pada penderita anemia pernisiiosa.

- c. Terdapat gangguan resorpsi (penyerapan kembali) vitamin B12.

Gejala

Defisiensi vitamin B12 menimbulkan anemia dengan gejala lidah yang halus dan mengkilap, tidak terdapat asam hidroklorida dalam asam lambung (pada penderita anemia pernisiiosa), perubahan saraf, anemia makrositik hiperkromik. Sel darah membesar dan berkurang jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh gangguan pembentukan atau proses pematangan sel darah merah.

Pengobatan

Pemberian vitamin B12 pada penderita anemia pernisiiosa akan merangsang sumsum tulang membuat sel darah merah. Pada anemia makrosistik lain, vitamin B12 akan memberikan perbaikan seperti halnya dengan asam folat. Vitamin B12 digunakan pula masa rekovalensi penyakit berat sebagai perangsang metabolisme.

c. Penilaian Status Mineral

c.1. Iodine

Yodium salah satu mineral mikro yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan serta fungsi otak. Meskipun kebutuhan yodium sangat sedikit (0.15 μg) kita memerlukan yodium secara teratur setiap hari. Kekurangan yodium akan mengalami gangguan fisik antara lain gondok, badan kerdil, gangguan motorik seperti kesulitan untuk berdiri atau berjalan normal, bisu, tuli atau mata juling. Sedangkan gangguan mental termasuk berkurangnya kecerdasan.

Untuk mengetahui *total goitre rate* (pembesaran kelenjar gondok) dimasyarakat bisa dilakukan dengan palpasi atau dengan cara lain yaitu dengan melakukan pemeriksaan kadar yodium dalam urin dan kadar *thyroid stimulating hormone* dalam darah. Metode penentuan kadar yodium dalam urin dengan menggunakan metode Cerium. Prosedur penentuan kadar yodium dengan metode Cerium adalah sebagai berikut:

- a. 10 ml urin didestruksi (pengabuan basah) dengan penambahan 25 ml asam klorat 28% dan 1 ml kalium kromat 0.5 %.
- b. Panaskan diatas hotplate sehingga volume larutan menjadi kurang dari 0.5 ml. Larutan ini diencerkan dengan air suling sehingga volume larutan menjadi 100 ml.
- c. Dari larutan terakhir ini dipipet 3 ml, kemudian ditambahkan 2 ml asam arsenit 0.2 N; lalu didiamkan selama 15 menit.
- d. Ke dalam tiap larutan kemudian ditambahkan 1 ml larutan cerium (4+) ammonium sulfat 0.1 M; dikocok kembali didiamkan selama 30 menit. Absorpsi dilakukan pada panjang gelombang 420 nm.

Kurva standar dibuat dengan cara yang sama seperti di atas pada kadar yodium 0.01; 0.02; 0.03; 0.04; dan 0.05 ppm. Larutan standar induk yang berkadar 100 ppm ddibuat dengan melarutkan 0.0168 g KIO_3 dalam 100 ml air suling. Karena kadar yodium dalam urin dinyatakan dalam mg 1 per g kreatinin, maka diukur pula kadar kreatinin urin dengan cara sebagai berikut:

- a. ml urin yang telah diencerkan 100 kali ditambahkan 4 ml H_2SO_4 1/12 N dan 0.5 ml natrium tungstat.
 - b. Setelah itu dikocok dan didiamkan selama 15 menit lalu dipusing selama 10 menit.
 - c. Supernatan dipisahkan lalu ditambahkan 0.5 ml larutan campuran 1 ml asam pikrat 10% dan 0.2 ml NaOH 10%.
 - d. Setelah didiamkan selama 15 menit, absorpsi larutan dibaca pada panjang gelombang 520 nm.
- Standar kreatinin dengan konsentrasi 1 mg dikerjakan dengan cara yang sama. Perhitungan kadar yodium per g kreatinin: jika diketahui konsentrasi yodium A $\mu\text{g/l}$ urin dan kadar kreatinin B g/l. maka kadar yodium A/B $\mu\text{g/g}$ kreatinin.

Batasan dan klasifikasi pemeriksaan kadar yodium dalam urin:

Suatu daerah dianggap endemis berat bila rata-rata ekskresi yodium dalam urin lebih *rendah* dari 25 μg yodium/gram kreatinin., endemik sedang bila ekskresi yodium dalam urin 25-50 μg iodium/gram kreatinin. Anak sekolah dapat digunakan sebagai target penelitian karena prevalensi GAKI pada anak sekolah umumnya menggambarkan prevalensi yang ada dalam masyarakat.

c.2. Zink

Zink adalah metaloenzim dan bekerja sebagai koenzim pada berbagai system enzim. Tubuh mengandung 1-2 g zink. Tulang, gigi, rambut, kulit, dan testis mengandung banyak zink. Dalam darah zink terdapat dalaam plasma terikat pada albumin

dan globulin. Penilaian konsentrasi zink jaringan tidak dapat dilakukan walaupun sudah dianjurkan analisa rambut, dan ekskresi zink ke urin bisa mencerminkan simpanan zink tubuh.

Dalam pemeriksaan kemungkinan penyebab kelambatan penyembuhan luka pasca bedah, mungkin analisa zink plasma (dengan spektometri absorpsi atomik) bisa membantu. Batasan dan interpretasi pemeriksaan kadar zink dalam plasma adalah 12-17 mmol/liter dikatakan normal.

c.3. Kalsium

Kalsium adalah mineral yang berada dalam tubuh \pm 2% dan lebih dari 99% terdapat didalam tulang. Kalsium darah mempunyai 2 fungsi essensial yaitu untuk proses pembekuan dan efek terhadap jaringan syaraf. Konsumsi yang dianjurkan untuk bayi sampai umur satu tahun cukup dengan 600 mg, bagi anak umur 1-10 tahun memerlukan 800 mg, sedangkan anak yang lebih besar dari 10 tahun memerlukan 1-1.5 g.

Masukan kalsium yang rendah menimbulkan perbaikan resorpsi dan menurunkan ekskresi kalsium dalam urin. Batasan dan interpretasi pemeriksaan kadar kalsium dalam darah adalah 2.1-2.6 mmol/liter dikatakan normal.

Prosedur Penentuan serum Kalsium

Instrumen yang digunakan harus dikalibrasikan dan diatur untuk determinasi serum kalsium sebelum digunakan:

- a. Hapus ujung probe pelan-pelan sebelum menempatkannya ke dalam larutan standar kalsium ($10\mu\text{g/dL}$).
- b. Tekan tombol sample. Lampu sample akan menyala dan lampu probe akan mati. Lampu baca akan mati display digital akan mereset ke nol.
- c. Pindahkan larutan standar hapuslah ujung probe pelan-pelan.
- d. Tekan tombol titrate. Probe akan bergerak ke dalam instrumen, lampu sample akan mati dan lampu titrate akan menyala. Angka-angka akan nampak. Ketika poin akhir dicapai, lampu baca akan menyala dan probe akan kembali ke muka instrumen.
- e. Catat pembacaan dan ulangi langkah a-e. Pembacaan harus ada antara 9.80 dan 10.20 untuk standar kalsium.
- f. Campurkan serum tes dengan teiliti. Ulangi langkah a-e dengan sample serum uji dan catat hasilnya.
- g. Ulangi langkah a-e dengan serum referensi terjamin dengan nilai kalsium yang diketahui.

c.4.Fosfor

Fosfor adalah suatu unsur yang penting bagi seluruh sel-sel hidup, sayur-sayuran dan hewan, dalam bentuk ester-ester organik, termasuk ATP. Disamping itu mineral tulang rangka sebagian besar terdiri dari kalsium fosfat. Konsentrasi fosfat anorganik di dalam cairan ekstra seluler merupakan faktor pengawas yang penting untuk mineralisasi tulang rangka, untuk pertumbuhan sel, dan juga merupakan salah satu penentu ester-ester fosfor di

dalam sel seperti 2,3-difosfoglisarat di dalam sel darah merah dan ATP di dalam sel-sel lainnya.

Absorpsi fosfat hanya berlangsung di daerah usus kecil, terutama di bagian tengah usus halus dan berlangsung dengan pengangkutan aktif yang membutuhkan natrium maupun secara difusi. Efisiensi pengangkutan fosfat lebih besar selama pertumbuhan aktif bila dibandingkan dengan orang dewasa. Tingkat absorpsi fosfat dari makanan juga dipengaruhi oleh masukan kation-kation yang dapat membentuk senyawa fosfat tidak larut di dalam usus yaitu kalsium, aluminium dan stronsium.

Tingginya kadar fosfat selama masa pertumbuhan penting untuk menjamin kelangsungan proses mineralisasi pada tulang-tulang dan tulang rawan yang sedang tumbuh. Kebutuhan fosfor dalam darah adalah 2.5-4.5 $\mu\text{g}/100 \mu\text{l}$.

c.5. Magnesium

Magnesium adalah ion intrasel dan bekerja sebagai kofaktor pada fosforilasi oksidatif dan juga didepositokan pada tulang. Konsentrasi magnesium dalam serum mempengaruhi transmisi syaraf dan kontraksi otot. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi kalsium seperti asam fitat, asam lemak, dan fosfor juga mempengaruhi absorpsi magnesium. Kekurangan mineral ini jarang terjadi kecuali pada KEP berat. ASI maupun susu sapi mengandung cukup magnesium untuk memenuhi kebutuhan bayi. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme Mg seperti hormon paratiroid, mempengaruhi pula magnesium. Batasan dan interpretasi pemeriksaan kadar magnesium dalam darah adalah 1.8-2.4 $\mu\text{g}/100 \text{ ml}$.

c.6. Krom (Chromium)

Krom berperan penting pada metabolisme karbohidrat dan glukosa. Mineral tersebut menstimulir sintesis asam lemak dan kolesterol dalam hepar. Kekurangan krom mengakibatkan pertumbuhan yang berkurang dan sindroma yang menyerupai diabetes mellitus. Hanya beberapa persen masukan krom dapat diserap oleh saluran pencernaan. Kadar krom dalam darah normal berkisar 0.14-0.15 $\mu\text{g}/\text{ml}$ untuk serum atau 0.26-0.28 $\mu\text{g}/\text{ml}$ untuk plasma.

c.7. Tembaga (Copper)

Kekurangan tembaga sangat jarang ditemukan terkecuali pada penderita KEP berat atau anak yang menderita diare menahun. Anak KEP dalam fase penyembuhan hanya mendapat diet susu rendah tembaga bisa menderita anemia, menunjukkan perubahan tulang seperti pada scurvy (kekurangan vitamin C), dan hipokupremia. Hipokupremia dapat juga terjadi oleh defek pada sintesis seruloplasma, malabsorpsi atau ekskresi yang berlebihan. Menkes *kinky hair syndrome* merupakan penyakit bawaan disebabkan defek absorpsi tembaga. Pada penderita demikian terdapat kadar tembaga dan seruloplasmin dalam sirkulasi yang rendah hingga mengakibatkan degenerasi otak yang progresif, pertumbuhan berkurang, rambut yang jarang dan mudah patah, kerusakan pada pembuluh nadi, dan kelainan tulang seperti pada *scurvy*.

Batasan dan klasifikasi pemeriksaan kadar tembaga dalam darah dalam keadaan normal = 80-150 μ g/100 ml.

c.8. Selenium

Pada binatang selenium diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan. Penyakit jantung endemik yang terdapat di daerah tertentu di negeri China dan menghinggapi terutama anak dan wanita muda dan dikenal dengan sebagai *Keshan disease* yang dianggap sebagai penyakit kekurangan selenium. Selenium belakangan makin banyak dipakai baik sebagai selenium organik tunggal maupun kombinasi dengan vitamin E, C, A, B₆, dan trace mineral lain. Dikatakan bahwa selenium dapat melindungi sel tubuh dari kehancuran hingga memperlambat proses menua.

C. Pemeriksaan Zat Gizi Spesifik Gizi Kurang

1. Kurang Energi Protein (KEP)

Analisis biokimia yang berkaitan dengan KEP yaitu menyangkut nilai protein tertentu dalam darah atau hasil metabolit dari protein yang beredar dalam darah dan yang dikeluarkan bersama urin. Jenis protein yang menggambarkan status gizi seseorang antara lain Prealbumin, Serum protein dan serum Albumin.

Tabel.3.4 Nilai Prealbumin dengan Status Gizi

Status gizi	Nilai prealbumin μ g/dl
Baik*)	23.8 +/- 0.9
Gizi sedang*)	16.5 +/- 0.8
Gizi kurang*) Marasmus**)	12.4 +/- 1.0
Gizi buruk*) Marasmus-Kwashiorkor*)	7.6 +/- 0.6

**	3.3 +/- 0.2
Kwashiorkor**)	3.2 +/- 0.4

Keterangan :

*) Menurut klasifikasi Waterlow

***) Menurut klasifikasi Welcome

Tabel.3.5 Batasan dan Interpretasi Kadar Serum Protein dan Serum Albumin

No	Senyawa & satuan	Umur (tahun)	kriteria		
			Kurang	Margin	Cukup
1	Serum Albumin (gr/100 ml)	< 1	-	<2.8	2.5+
		1 - 5	-	<3.0	3.0+
		6 - 16	-	<3.5	3.5+
		16+	<2.8	2.8-3.4	3.5+
		Wanita hamil	<3.0	3.0-3.4	3.5+
2	Serum Protein (gr/100 ml)	< 1	-	<5.0	5.0+
		1 - 5	-	<5.5	5.5+
		6 - 16	-	<6.0	6.0+
		16+	6.0	6.0-6.4	6.5+
		Wanita hamil	5.5	5.5-5.9	6.0+

2. Kurang Vitamin A (KVA)

Tabel.3.6 Penentuan Masalah Kesehatan masyarakat Kurang Vitamin A (KVA)

Indikator yang digunakan	Batas Prevalensi
Plasma Vitamin A $\geq 10 \mu\text{g}/\text{dl}$	$\geq 5\%$
Liver Vitammin A $\geq 5 \mu\text{g}/\text{dl}$	$\geq 5\%$

Sumber, WHO,1982

3. Anemia Gizi Besi (AGB)

Anemia adalah keadaan dimana kadar sel-sel darah merah dan hemoglobin dalam darah kurang dari normal. Hemoglobin terdapat dalam sel-sel darah merah dan merupakan pigmen pemberi warna merah sekaligus pembawa oksigen dari paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh. Oksigen ini akan digunakan untuk membakar

gula dan lemak menjadi energi. Hal ini dapat menjelaskan mengapa kurang darah dapat menyebabkan gejala lemah dan lesu yang tidak biasa. Paru-paru dan jantung juga terpaksa kerja keras untuk mendapatkan oksigen dari darah yang menyebabkan nafas terasa pendek. Walaupun gejalanya tidak terlihat atau samar-samar dalam jangka waktu lama. Kondisi ini tetap dapat membahayakan jiwa jika dibiarkan dan tidak diobati. Anemia adalah berkurangnya jumlah eritrosit serta jumlah hemoglobin dalam 100 ml darah. Secara fisiologis, anemia terjadi apabila terdapat kekurangan jumlah hemoglobin untuk mengangkut oksigen ke jaringan sehingga tubuh akan mengalami hipoksia. WHO seperti pada tabel berikut.

Tabel.3.7. Batasan Hemoglobin Darah

Kelompok	Batas nilai Hb
Bayi / balita	11 g/dl
Usia sekolah	12 g/dl
Ibu hamil	11 g/dl
Pria dewasa	13 g/dl
Wanita dewasa	12 g/dl

Sumber, WHO,1975

Tabel.3.8. Batasan Anemia (Menurut Depkes)

Kelompok	Batas Normal
Anak balita	11 gram %
Anak Usia sekolah	12 gram %
Wanita dewasa	12 gram %
Laki-laki dewasa	13 gram %

Ibu hamil	11 gram %
Ibu menyusui > 3 bulan	12 gram %

4. **Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)**
 Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) adalah sekumpulan gejala atau kelainan yang ditimbulkan karena tubuh menderita kekurangan Yodium secara terus - menerus dalam waktu yang lama secara berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup (manusia dan hewan) . Makin banyak tingkat kekurangan Yodium yang dialami makin banyak komplikasi atau kelainan yang ditimbulkannya, meliputi pembesaran kelenjar tiroid dan berbagai stadium sampai timbul bisu-tuli dan gangguan mental akibat kretinisme. Gangguan akibat kekurangan yodium adalah rangkaian kekurangan yodium pada tumbuh kembang manusia, Sprektum seluruhnya terdiri dari gondok dalam berbagai stadium, kretin endemik yang ditandai terutama oleh gangguan mental, gangguan pendengaran, gangguan pada anak dan dewasa, sering dengan kadar hormon rendah angka lahir dan kematian janin meningkat.

Beberapa cara untuk mengetahui besarnya masalah GAKY pada masyarakat cukup dilakukan survei pada usia anak sekolah yaitu 6-12 tahun. Di samping itu ada cara lain yaitu dengan melakukan pemeriksaan kadar tyroid stimulating hormone (TSH dalam darah) dan mengukur eksresi yodium dalam urine.

Defisiensi yodium merupakan penyebab dominan gondok endemik yang diklasifikasikan menurut ekskresi yodium dalam urin ($\mu\text{g}/\text{gr}$ kreatinin), antara lain:

- a. Tahap 1: gondok endemik dengan rata-rata >50 $\mu\text{g}/\text{gram}$ kreatinin dalam urin. Pada keadaan ini

- suplai hormon tyroid cukup untuk perkembangan fisik dan mental yang normal.
- b. Tahap 2: gondok endemik dengan rata-rata 25-50 $\mu\text{g}/\text{gram}$ kreatinin dalam urin. Pada kondisi ini sekresi hormon tyroid boleh jadi tidak cukup, sehingga menanggung resiko hypothyroidisme, tetapi tidak sampai ke kreatinisme.
 - c. Tahap 3: gondok endemik dengan rata-rata ekskresi yodium dalam urin kurang dari 25 mg/gram kreatinin. Pada kondisi ini populasi memiliki resiko menderita kreatinisme.

D. Keunggulan dan kelemahan Penilaian secara Biokimia

Keunggulan

Pemeriksaan biokimia bila dibandingkan dengan pemeriksaan lain dalam penentuan status gizi memiliki keunggulan-keunggulan antara lain:

1. Dapat mendeteksi defisiensi zat gizi lebih dini.
2. Hasil dari pemeriksaan biokimia lebih obyektif, hal ini karena menggunakan peralatan yang selalu ditera dan pada pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga ahli.
3. Dapat menunjang hasil pemeriksaan metode lain dalam penilaian status gizi.

Kelemahan

Selain memiliki keunggulan, pemeriksaan biokimia juga memiliki kelemahan, diantaranya:

1. Pemeriksaan biokimia hanya bisa dilakukan setelah timbulnya gangguan metabolisme.
2. Membutuhkan biaya yang cukup mahal
3. Dalam melakukan pemeriksaan diperlukan tenaga ahli.

4. Kurang praktis dilakukan dilapangan, hal ini karena pada umumnya pemeriksaan laboratorium memerlukan peralatan yang tidak mudah dibawa kemana-mana.
5. Pada pemeriksaan tertentu spesimen sulit untuk diperoleh, misalnya penderita tidak bersedia diambil darahnya.
6. Membutuhkan peralatan dan bahan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemeriksaan lain.
7. Belum ada keseragaman dalam memilih reference (nilai normal). Pada beberapa reference nilai normal tidak selalu dikelompokkan menurut nkelompok umur yang lebih rinci.
8. Dalam beberapa penentuan pemeriksaan laboratorium memerlukan peralatan laboratorium yang hanya terdapat dilaboratorium pusat, sehingga didaerah tidak dapat dilakukan.

BAB IV

PENILAIAN STATUS GIZI SECARA BIOFISIK

A. Pengertian

Penilaian status gizi dengan biofisik termasuk penilaian status gizi secara langsung. Penentuan status gizi dengan biofisik adalah melihat dari kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktur.

Tes kemampuan fungsi jaringan meliputi kemampuan kerja dan energi expenditure serta adaptasi sikap. Tes perubahan struktur dapat dilihat secara klinis maupun tidak dapat dilihat secara klinis. Perubahan yang dapat dilihat secara klinis seperti

pengerasan kuku, pertumbuhan rambut tidak normal dan menurunnya elastisitas kartilago. Pemeriksaan yang tidak dapat dilihat secara klinis biasanya dilakukan dengan pemeriksaan radiologi.

Penilaian status gizi secara biofisik sangat mahal, memerlukan tenaga yang profesional dan dapat diterapkan dalam keadaan tertentu. Penilaian secara biofisik dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu uji radiologi, tes fungsi fisik dan tes sitologi.

B. Pemeriksaan Radiologi, Tes fungsi Fisik dan Sitologi

Pemeriksaan Radiologi

Metode ini umumnya jarang dilakukan di lapangan. Metode ini dilakukan dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan-keadaan tertentu seperti riketsia, osteomalasia, fluorosis dan beri-beri. Penggunaan metode ini adalah pada survei yang sifatnya retrospektif dari pengukuran kurang gizi seperti riketsia dan KEP dini. Pada tabel di bawah ini akan diuraikan secara singkat tanda-tanda yang khas.

Tabel.4.1. Tanda-tanda khas berbagai jenis penyakit

Jenis Penyakit	Tanda-tanda Khas
Riketsia	Pelebaran tulang lengan dan tulang pinggul.
Osteomalasia	Kelainan bentuk dan merapuhnya tulang khususnya tulang pinggul.
Sariawan (bayi)	Menurunnya keadaan tulang, proses pengapuran (calcification) terutama pada lutut.
Beri-beri	Pembesaran jantung.
Fluorosis	Peningkatan pengerasan tulang,

pengapuran dan perubahan bentuk tulang belakang.

Sumber: Supariasa, 2002

Tes Fungsi Fisik

Tujuan utama dari tes biofisik adalah untuk mengukur perubahan fungsi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan gizi. Beberapa tes yang digunakan adalah ketajaman penglihatan, adaptasi mata pada suasana gelap, penampilan fisik, koordinasi otot dan lain-lainnya. Metode ini tidak praktis digunakan di lapangan.

Diantara tes tersebut di atas, yang paling sering digunakan adalah tes adaptasi yang digunakan pada suasana gelap. Tes ini untuk mengukur kelainan buta senja yang diakibatkan kekurangan vitamin A. Metode ini mempunyai kelemahan diantaranya:

a. Tidak spesifik untuk mengukur kekurangan vitamin A, karena ada faktor lain yang ikut mempengaruhinya.

b. Sulit dilakukan dan Tidak objektif.

Metode ini akan lebih berguna apabila dilakukan di daerah epidemis kekurangan vitamin A (buta senja)

Tes Sitologi

Tes ini digunakan untuk menilai kekurangan energi protein (KEP) berat, seperti yang disarankan oleh Sguires (1956), pemeriksaan ini dilakukan dengan melihat noda pada epitel dari mukosa oral.

Hasil dari penelitian pada binatang dan anak kekurangan energi protein (KEP) menunjukkan bahwa presentase perubahan sel meningkat pada tingkatan Kekurangan energi protein (KEP) dini.

BAB V

PENILAIAN STATUS GIZI SECARA KLINIS

A. Pengertian dan Jenis pemeriksaan klinis

Tanda-tanda klinis malnutrition (gizi kurang) tidak spesifik, karena ada beberapa penyakit yang mempunyai gejala yang sama, tetapi penyebabnya berbeda. Oleh karena itu pemeriksaan klinis ini harus dipadukan dengan pemeriksaan lain seperti antropometri, laboratorium, dan survei konsumsi makanan, sehingga kesimpulan dalam penilaian status gizi dapat lebih tepat dan lebih baik.

Penggunaan pemeriksaan klinis untuk mendeteksi defisiensi gizi mempunyai kelemahan bila

diinterpretasikan hanya atas dasar data klinis saja. Oleh sebab itu, adanya dukungan pemeriksaan konsumsi pangan dan biokimia serta pemeriksaan yang lain sangat membantu dalam menilai keadaan gizi individu atau masyarakat. Walaupun demikian, pemeriksaan fisik sebaiknya merupakan bagian integral dari survei gizi, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan fisik dapat mengungkapkan bukti adanya defisiensi gizi yang tidak akan terdeteksi dengan cara survei konsumsi atau cara laboratoris.
2. Walaupun hanya meliputi beberapa kasus saja, identifikasi memberikan tanda yang dapat digunakan untuk menentukan gizi kurang.
3. Pemeriksaan fisik tidak dapat mengungkapkan tanda-tanda penyakit, diagnosis dan pengobatannya. Hal itu sangat berguna untuk penanganan selanjutnya.

Pemeriksaan klinis (*assessment clinic*) secara umum terdiri dari dua bagian, yaitu:

1) Riwayat Medis (*Medical History*)

Dalam riwayat medis, kita mencatat semua kejadian-kejadian yang berhubungan dengan gejala yang timbul pada penderita beserta faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya penyakit tersebut. Catatan itu meliputi:

- a. Identitas penderita: umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, suku, dan sebagainya.
- b. Lingkungan fisik dan sosial budaya yang berkaitan dengan timbulnya penyakit tersebut (malnutrisi), antara lain lingkungan fisik (keadaan kesuburan tanah dan kandungan mineral tanah) dan lingkungan sosial dan budaya (adat-istiadat,

- kepercayaan, dan kebiasaan-kebiasaan, serta pola kehidupan masyarakat sekitarnya).
- c. Sejarah timbulnya gejala penyakit. Beberapa hal yang perlu diketahui adalah: kapan berat badan mulai turun, kapan ada gejala anoreksia atau nafsu makan menurun, kapan ada gejala muntah, apakah ada mencret atau tidak, kalau ada kapan mulai terjadi.
- d. Data-data tambahan yang juga perlu diketahui antara lain: Apakah penderita juga menderita anemia; pernah operasi usus; pernah menderita penyakit infeksi; pernah menderita penyakit kronis, seperti Luka pada lambung (*ulcus gaster*) dan Luka pada duodenum; ada kelainan bawaan (genetik). Data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan cara wawancara dengan penderita dan keluarganya, atau dengan observasi langsung pada rumah dan lingkungan penderita. Semua informasi tersebut perlu dikumpulkan untuk mengetahui lebih lanjut apakah gizi kurang disebabkan oleh penyebab primer, yaitu konsumsi makanan atau sebab lain seperti penyakit menahun, obat-obatan yang lama, keturunan (dalam hal ini mungkin disebabkan tidak terbentuknya enzim pencernaan) sehingga menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan.

2) Pemeriksaan Fisik

Pada pemeriksaan fisik kita melakukan pengamatan terhadap perubahan fisik, yaitu semua perubahan yang ada kaitannya dengan kekurangan gizi. Perubahari-pembahan tersebut dapat dilihat pada kulit atau jaringan epitel, yaitu jaringan yang

membungkus permukaan tubuh kita seperti rainbut, mata, muka, mulut, lidah, gigi dan lain-lain serta kelenjar tiroid. Komisi ahli WHO yang dikutip oleh Jelliffe (1966) dan Jelliffe (1989), mengelompokkan tanda-tanda klinis menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

1. Tanda-tanda (*sign*) yang memang benar berhubungan dengan kurang gizi bisa karena kekurangan salah satu zat gizi atau lebih yang di butuhkan tubuh.
2. Tanda-tanda (*sign*) yang membutatulkan investigasi (penyelidikan) lebih lanjut. Tanda-tanda ini mungkin karena gizi salah atau mungkin oleh faktor lain seperti kehidupan di bawah standar (miskin), buta huruf, dan lain-lain.
3. Tanda-tanda (*sign*) yang tidak berkaitan dengan gizi salah walaupun hampir mirip. Tanda-tanda ini dalam diagnosis untuk membedakannya memerlukan keahlian khusus.

Daftar Gambaran dan Pengelompokkan Tanda Klinis

1. Rambut

Kelompok 1. Berhubungan dengan kekurangan gizi.

- a. Kurang bercahaya (*lack of clustee*): rambut kusam dan kering.
- b. Rambut tipis dan jarang (*thinness and aparseness*)
- c. Rambut kurang kuat/mudah putus (*straightness*).
Kekurangan pigmen rambut (*dispigmentation*): berkilat terang, terang pada ujung. Mengalami perubahan warna: coklat gelap/terang, coklat merah/pirang dan kelabu.
- d. Tanda bendera (*flag sign*) dikarakteristikkan dengan pita selang-seling dari terang/gelapnya warna sepanjang rambut dan mencerminkan

epidose selang-seling dari KEP serta pengobatan yang telah diberikan. Mudah rontok (*easy pluckability*): dengan kekuatan sedang dan tidak sakit bila dicabut dan selalu diiringi oleh perubahan rambut lainnya.

2. Wajah

Kelompok 1. Berhubungan dengan kekurangan gizi.

- a. Penurunan pigmentasi (*defuse depigmentation*) yang tersebar secara berlebih apabila disertai anemia.
- b. Wajah seperti bulan (*moon face*), wajah menonjol ke luar, lipatan naso labial.
- c. Pengeringan selaput mata (*conjunctival xerosis*). WHO memberi kode XIA dan selalu terjadi pada bagian mata bilateral yang ditandai dengan kekeringan. Terdapat pula kekurangan cahaya dan transparansi dari bulbal conjunctiva, khususnya pada sebagian besar yang tampak pada bola mata.
- d. Bintik Bitot (*Bitot's spot*). WHO memberi kode X1B yaitu, gumpalan kecil putih pada permukaan mata, kering kelabu, keperakan/plak berbusa putih kapur, sering berbentuk putaran yang tidak teratur, lebih sering membatasi daerah lateral pada kornea.
- e. Pengeringan kornea (*cornea xerosis*). WHO memberi kode X2, yaitu keadaan kornea kering, kasar, menyerupai batu kecil.

Kelompok 2. Kemungkinan berhubungan dengan Kekurangan Gizi.

Perinasal veins: suatu keadaan yang mungkin disebabkan konsumsi alkohol berlebihan.

3. Mata

Kelompok 1. Berhubungan dengan kekurangan gizi.

- a. Selaput mata pucat (*pale conjunctiva*). Tanda-tandanya: muka pucat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan warna.
- b. Keratomalasia. Keadaan permukaan halus/lembut dari keseluruhan bagian tebal atau keseluruhan kornea, terutama kebocoran (*perforation*) dan prolapse selaput iris (selaput pelangi), yang biasanya mempengaruhi kedua mata. Jika kondisinya buruk, kornea berwarna putih buram
- c. *Angularpalpebritis*. Tanda - tandanya: celahan/rekahan di sebelah luas/sisi mata dan kadang-adang sangat erat kaitannya dengan *angular stomatitis*.

Kelompok 2. Kemungkinan berhubungan dengan kekurangan gizi.

- a. *Corneal vascularization*. Keadaan ini akibat dari serangan pada keseluruhan sisi kornea pada pembuluh kapiler. Penyebabnya adalah penyempitan *plexus limbal* normal dan dapat berakibat peradangan yang mempengaruhi kornea.
- b. *Conjunctival infection and circumcorneal*, yaitu infeksi pada kongjungtiva.
- c. *Corneal arcus*. Ini ditunjukkan dengan lingkaran berwarna terang mengelilingi sisi sebelah luar kedua selaput iris dan biasanya terjadi pada usia remaja dan pada pengidap kolesterol darah yang tinggi.
- d. *Xanthomata*. Ditandai dengan warna putih kekuningan sering membentuk plak pada kulit

yang kebanyakan terdapat di bawah mata (bagian bilateral).

e. *Corneal scars* (WHO memberi kode XS). Keadaan kornea yang sifatnya tebal, dalam, atau posisinya kuraug lebih $1/4$ bagian kornea yang harus diperhatikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kekurangan gizi khususnya kekurangan vitamin A atau mungkin juga oleh penyakit infeksi

Kelompok 3. Tidak Berhubungan dengan kekurangan gizi.

Pterygium. Luka ini disebabkan oleh sesuatu berbentuk sayap yang dihasilkan oleh lipatan-lipatan ganda yang berdaging dari konjungtiva, tumbuh cepat dan biasanya menyerang kornea bagian lateral. Kemungkinan penyebabnya adalah iritasi yang berlangsung lama, terutama karena sinar matahari dan angin.

4. Bibir

Kelompok 1. Berhubungan dengan kekurangan gizi.

- a. *Angular stomatitis*. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan celahan pada sudut-sudut mulut, Celahan ini bisa dangkal atau dalam, membentuk daerah kecil pada sudut mulut atau menyebar beberapa millimeter pada kulit diluarnya. Sedikit luka terlihat lebih mudah dengan mulut setengah terbuka. Tanda ini harus dilihat positif jika terjadi pada kedua sudut mulut.
- b. Jaringan parut angular. *Angular stomatitis* yang telah sembuh mungkin mengakibatkan bekas luka menjadi merah muda atau memutih pada sudut-sudut mulut, tergantung pada interval akutnya.
- c. *Cheilosis*. Luka ini dicirikan dengan celahan vertikal, yang lebih lanjut ter-komplikasi menjadi

merah, membengkak, dan terjadi ulcerasi pada bibir, selain pada sudutnya. Bagian tengah bibir bawah sering terpengaruh. Faktor iklim, seperti dingin dan angin, dapat kadang-kadang berpengaruh.

Kelompok 2. Kemungkinan berhubungan dengan kekurangan gizi yaitu Depigmentasi kronis pada bibir bawah

5. Lidah

Gejala pada mulut yang mempengaruhi lidah atau gusi harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan trauma lokal, seperti dari makanan pedas dan gigi palsu, serta kekurangan gizi.

Kelompok 1. Berhubungan dengan Kekurangan Gizi.

- a. Edema dari lidah. Ini dapat dideteksi dengan cara menekan gigi sepanjang tepi lidah.
- b. Lidah mentah atau *scarlet*. Lidah berwarna merah cerah, biasanya berukuran normal atau perlahan-lahan mengalami atrofi, denudasi/pengulitan, dan sangat nyeri.
- c. Lidah magenta. Lidah berwarna merah keunguan; mungkin bisa diikuti dengan perubahan morfologi. Uji coba telah dibuat untuk mengukur perubahan warna pada lidah dengan perbandingan pada pelat-pelat di *Reinhold colour atlas*. Uji coba ini berhasil menemukan bahwa warna juga dipengaruhi oleh konsentrasi hemoglobin yang berbeda, hipoksia, dan penebalan epitelium pada lidah.
- d. Atrofi papila (*papilla atrophic*). *Papilla filiform* yang telah hilang membuat lidah tampak halus. Penyebarannya bisa di tengah atau di tepi.

Kelompok 2. Kemungkinan berhubungan dengan kekurangan gizi.

- a. *Papilla hiperarnic* dan *hipertrophic*. Papila ini hipertrophic dan berwarna merah atau merah muda, dan menyebabkan lidah bergranula (seperti straberi merah).
- b. *Fissures*. Keadaan pecah-pecah pada permukaan lidah tanpa papilla pada pinggirnya atau permukaan bawahnya. Ini jangan sampai terkecoh dengan *congenital ridging* dan penainpakan yang dikenal dengan *scrotal tongue* yang tidak ada hubungannya dengan keperluan nutrisi.

Kelompok 3. Tak berhubungan dengan kekurangan gizi.

- a. *Geographic tongue*. Keadaan lidah dengan daerah bintik yang terdistribusi tidak teratur dari denudasi dan *atrophy epitelium*. Ini tidak terasa sakit dan nyeri. Penyebabnya tidak jelas dan tidak ada perawatan yang kelihatannya efektif.
- b. *Pigmented tongue*. Adanya daerah berbintik dengan pigmentasi berlendir biru-hitam, kadang-kadang disertai dengan bintik yang sama pada gusi. Ini mirip dengan area biru-hitam dari pigmentasi meningkat yang terlihat pada orang-orang yang berkulit gelap, biasanya kulit punggung bawah dan terutama terlihat pada anak baru lahir sebelum pigmentasi dewasa penuh terjadi.

6. Gigi

Kelompok 1. Berhubungan dengan kekurangan gizi.

- a. *Mottled enamel*. Pada gigi terdapat bintik putih dan kecoklatan, dengan atau tanpa erosi pada enamel,

- biasanya paling baik terlihat pada gigi seri atas. Ciri ini adalah karakteristik dari fluorosis.
- b. Karies gigi. Keadaan gigi yang rusak, tanggal dan terganti (*decayed, missing, foilled*) sering digunakan sebagai petunjuk adanya karies pada suatu masyarakat walaupun ada sebab yang lain seperti *chronic phyorrhoea* dan trauma. Kekurangan zat gizi pada wanita hamil mungkin sebagian berperan dalam menyebabkan karies pada pembentukan pertama gigi. Namun, karies pada gigi lebih berhubungan dengan pengaruh-pengaruh lokal pada makanan yang dikonsumsi, terutama pada kandungan zat makanan dan frekuensi pencernaan zat gula, tepung giling, dan makanan karbohidrat murni.
- c. Pengikisan (*attrition*). Pengikisan terjadi pada tepi gigi seri dan taring. Kelihatannya ini berhubungan dengan kekerasan makanan yang membutuhkan pengunyahan relatif lama. Ini lebih umum pada masyarakat pedesaan yang mengkonsumsi makanan tradisional.
- d. Hipolasia email (*enamel hypoplasia*). Formasi tidak sempurna pada permukaan gigi, terutama pada bagian tengah ketiga. *Hypoplasia* linear pada gigi seri telah dicatat pada anak-anak usia pra-sekolah. Wujud karakteristiknya adalah erosi *carved-out* yang mempengaruhi sisi yang berdekatan pada gigi seri, terutama di rahang atas. Suatu keterkaitan pada kekurangan gizi pada kaum ibu hamil telah dibuktikan.
- e. Erosi email (*enamel erosion*). Istilah ini menggambarkan area sangat terbatas, biasanya di sekitar tepi gusi, tempat email gigi telah tererosi.

7. Gusi

Kelompok 1. Berhubungan dengan kekurangan gizi. *Spongy, bleeding gums.* Bunga karang keunguan atau merah yang membengkak pada papila gigi bagian dalam dan/atau tepi gusi, yang biasanya mudah berdarah pada tekanan kecil. Tanda ini dapat terjadi dengan penggunaan obat-obatan tertentu yang relatif lama, termasuk hydantoinates yang digunakan dalam pemeliharaan anak-anak pengidap epilepsi. Dalam kasus ini terbukti sangat kurangnya vitamin C anak kecil (*infantile scurovy*) sehingga menyebabkan gigi-giginya pecah. Gusi berdarah tanpa hypertrophy biasanya disebabkan oleh infeksi periodontal (*pyorrhoea*).

Kelompok 2. Kemungkinan Berhubungan dengan Kekurangan Gizi.

Recession of gums. Kerusakan dan atrofi gusi yang menampakkan akar-akar gigi. Ini biasanya menjadi keadaan sekunder pada *pyorrhoea*.

Kelompok 3. Tidak berhubungan dengan kekurangan gizi.

Pyorrhoea (infeksi periodontal). Infeksi tepi gusi, yang menyebabkan merah dan gusi mudah berdarah tanpa hypertrophy.

8. Kelenjar

Kelompok 1. Berhubungan dengan kekurangan gizi.

a. Pembesaran tiroid. Kelenjar ini terlihat dan teraba membesar. Pembesaran bisa difus atau nodular. Inspeksi dan palpasi saat subjek menelan mungkin membantu dalam diagnosa. Untuk survey gondok endemik yang lebih khusus, teknik dan klasifikasi

yang direvisi oleh WHO selayaknya digunakan, seperti pada Tabel di bawah ini

Tabel.5.1.Klasifikasi Gondok

Tahap 0	Tidak ada gondok
Tahap 1 -a	Gondok terdeteksi hanya dengan palpasi/perabaan dan tidak nampak bahkan ketika leher dibentangkan penuh
Tahap 1-b	Gondok dapat diraba tapi kelihatan hanya saat leher terbentang penuh
Tahap 2	Gondok terlihat dengan posisi leher normal; perabaan tidak diperlukan untuk diagnosis
Tahap 3	Gondok sangat besar yang bisa dilihat pada jarak yang jauh

Sumber, WHO

b. Pembesaran parotid. Gejala ini positif jika terdapat pembengkakan kronis, terlihat pada kedua parotid. Kelenjar ini keras, tidak lunak, dan tidak nyeri. Kulit di atasnya tidak berubah. Pembengkakan nampak pada belahan telinga tersembunyi saat subyek diamati dari depart. Paling mudah diamati biasanya pada anak sekolah dan orang dewasa. Pembesaran parotid biasanya dianggap positif, tanpa memberi tingkatan menurut ukuran.

Kelompok 2. Kemungkinan berhubungan dengan kekurangan gizi.

Gynaecomastia. Pembesaran bilateral, terlihat, dan teraba pada puting dan jaringan dada glandular subaerolar pada laki-laki.

9. Kulit

Kelompok 1. Berhubungan dengan kekurangan gizi.

- a. Xerosis. Keadaan kulit yang mengalami kekeringan tanpa mengandung air. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat memperkirakan ini perlu tanda-tanda kulit yang lain berhubungan dengan lingkungan, seperti kondisi kotor, kurangnya pencucian, iklim kering, panas, berangin, dan kebiasaan penggunaan minyak pada tubuh, dan jarang terjadi karena genetik.
- b. Follicular hyperkeratosis. *Tipe I*: Dalam tipe ini lesi terdiri dari hyperkeratosis di sekitar folikel rambut dan membentuk plak yang rnip duri-duri. Kulit di sekitarnya kering dan kekurangan jumlah kelembaban yang normal dan tak beminyak, dalam literatur kondisi ini diistilahkan dengan *phrynoderma* (kulit katak). *Tipe II*: Dalam tipe ini lesi mempunyai bentuk yang sama, tetapi folikel rambut berisi darah atau pigmen, dan mempunyai lingkaran jingga di sekitarnya. Kulit tersebut tidak selalu kering, dan kondisi ini terlihat sebagian besar pada orang dewasa. Distribusinya biasanya pada daerah perut dan paha. Tandanya kurang jelas pada orang berkulit gelap.
- c. *Petechiae*. Bintik *haemorrhagic* kecil pada kulit atau membran berlendir yang sulit dilihat pada orang kulit gelap.
- d. *Pellagrous rash* atau *dermatosis* (sermatitis). Lesi kulit pelagra yang khas adalah area simetris, terdemarkasi (batas) jelas, berpigmen berlebihan dengan atau tanpa pengelupasan kulit (exfoliasi). Lesi ini umum pada bagian-bagian tubuh yang terkena sinar matahari, termasuk dagu dan lengan

- depan; jika tampak di sekeliling leher kondisi ini disebut *casal's necklace*. Dalam kasus akut, kulit menjadi merah, semakin bengkak, dan mungkin pecah-pecah, lesi ini terasa gatal dan terasa terbakar. Dalam keadaan kronis, dermatosis terjadi seperti kulit menebal, dan menjadi kasar disertai kekeringan, bersisik, dan berpigmen coklat.
- e. *Flaky-paint rash* atau dermatosis. Perluasannya sering berbintik/belang berhiperpigmentasi bilateral pada kulit yang mengelupas atau ulserasi (puru) dangkal, sering mirip luka bakar tahap kedua. Ini bisa terjadi di mana-mana, tapi biasanya pada pantat dan bagian belakang paha. Lesi ini disebut juga dengan istilah *crazy-pavement dermatosis*.
- f. *Scrotal and vulval dermatosis*. Lesi dari kulit skrotum atau vulva, sering terasa sangat gatal. Infeksi sekunder bisa saja terjadi.

Kelompok 2. Kemungkinan berhubungan dengan kekurangan gizi.

- a. *Mosaic dermatosis*. *Plaque mosaik* lebar tipis, sering terdapat di tengah, tapi cenderung mengelupas pada sekelilingnya.
- b. *Thickening and pigmentation of pressure point*. Penebalan difus, dengan pigmentasi pada titik penekan, seperti lutut, siku, dan depan belakang mata kaki. Ruas-ruas jari bisa juga terjadi. Area yang terpengaruh bisa berkerut dengan atau tanpa celahan.

10. Kuku

Kelompok 1. Berhubungan dengan Kekurangan Gizi.

Koilonychia. Keadaan kuku bagian bilateral berbentuk sendok pada kuku orang dewasa cacat karena *suggestive anemia* (kurang zat besi). Kuku yang sedikit berbentuk sendok dapat ditemukan secara umum hanya pada kuku jempol, dan pada masyarakat yang sering berkaki telanjang.

Kelompok 2. Kemungkinan Berhubungan dengan Kekurangan Gizi.

Transverse ridging or grooving of nails. Keadaan kuku yang memiliki lebih daripada satu keadaan yang ekstrem.

11. Jaringan Bawah Kulit

Kelompok 1. Berhubungan dengan kekurangan gizi.

- a. *Bilateral edema*. Biasanya pertama terlihat pada kaki dan mata kaki, kemudian bisa meluas pada area lain pada keadaan parah, bisa pada organ genital, wajah, dan tangan. Pada tahap awal, ia dapat diketahui dengan memberi tekanan kuat selama 3 detik dengan satu jari di bawah *portion tibia*. Tanda ini dinyatakan positif jika terdapat lubang yang terlihat dan terasa, yang tetap ada setelah tekanan dilepaskan.
- b. Lemak bawah kulit. Estimasi yang tepat terhadap gangguan atau deplesi dapat dilakukan dengan palpasi pada lipatan kulit. Jika ingin lebih teliti dan akurat bisa dengan menggunakan alat kaliper (pengukur tebal lemak).

12. Sistem Tulang dan Otot

Kelompok 1. Berhubungan dengan kekurangan gizi

- a. *Muscular wasting*. Ini dapat dideteksi dengan pengamatan dan palpasi lengan atas, terutama bisep atau otot trisep. Penilaian lebih mendalam

jaringan otot harus dilaksanakan dengan pengukuran antropometri. Pada anak yang sangat terpengaruh dengan kekurangan gizi energi protein, termasuk kwashiorkor, tingkatan *muscular wasting* dapat secara kasar dilakukan dengan pengujian kemampuan anak untuk mengangkat kepala dan kemampuan bangun dari posisi tidur ke posisi duduk.

- b. *Craniotabes*. Gejala ini ditandai dengan melunaknya daerah tengkorak, biasanya terjadi pada tulang *occipital* dan *parietal*. Tanda ini positif hanya pada masa bayi, terutama pada usia muda.
- c. *Frontal and parietal bossing*. Terjadinya penebalan terlokalisir dan penimbunan tulang parietal dan frontal pada tengkorak. Keadaan ini bisa disebabkan nutrisi, tapi ia dapat juga terjadi pada anak orang Afrika dengan anemia dengan inti sel darah berbentuk bulan sabit (*sickle-cell anemia*) dan pada masyarakat lain yang menderita talasemia sebagai masalah genetis. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang lebih tua yang menderita defisiensi zat besi kronis.
- d. *Persistently open anterior fontanelle*. Ini dapat didetinisikan sebagai *anterior fontanelle* yang terbuka pada palpasi setelah umur 18 bulan. Tandanya tidak spesifik sebagai penyakit tulang dan dapat ditemukan pada *hydrocephalus* dan kondisi yang lain.
- e. *Epiphyseal enlargement*. Pembesaran ujung *epiphyseal* pada tulang yang panjang, terutama mempengaruhi *radius* dan *ulna* pada pergelangan tangan, serta *tibia* dan *fibula* pada mata kaki. Pengukuran lebar atau keliling pergelangan

- tangan dapat dilakukan, dan kegunaan *epiphysumeter* (pengukur sekerup) atau teknik yang serupa telah direkomendasikan untuk memberikan diagnosis lapangan yang lebih objektif tentang penyakit tulang.
- f. *Beading of the ribs*. Nodular simetris pada sambungan *costochondral*, meijig-hasilkan pada *rosary*. Ia terutama merupakan bentuk efek pembesaran *epiphyseal*.
 - g. *Knock-knees*. Kondisi ini (*genu valgum*) juga terjadi di India dan mungkin karena defisiensi mineral tambahan.
 - h. *Bow-legs*. Di beberapa daerah, cacat ini terjadi tidak jarang karena kondisi tulang sangat tidak sesuai dengan efek lanjut penyakit tulang.
 - i. *Widespread or local pelvic skeletal deformities*. Cacat dari rongga dada. Namun banyak cacat rongga dada yang umum tidak berhubungan dengan malnutrisi (seperti *funnel chest*).
 - j. *Musculoskeletal haemorrhages*. Pada *haemorrhages* yang lebih luas bisa terjadi seperti: - *Intramuscular haematoma*, biasanya pada betis atau paha - *Haemarthrosis Subperiosteal haemorrhage*, yang mungkin hanya bisa diduga secara klinis, tetapi dapat diyakinkan dengan pengujian klinis yang mendalam dan dengan uji khusus, seperti aspirasi untuk *haemarthrosis*, dan radiologi untuk *subperiosteal haemorrhage*.

13. Sistem Internal

Kelompok 1. Berhubungan dengan kekurangan gizi.

- a. Sistem gastrointestinal: hepatomegali. Daerah perut perlu dipalpasi pada posisi standar, yaitu

dengan subjek berbaring, pinggang dan lutut ditekuk, jika dimaksudkan untuk mengetahui ukuran pembesaran hati. Ini dapat dicatat dalam sentimeter di bawah sisi tulang rusuk. Hepatomegali pada anak-anak dapat terjadi sebagai akibat konsumsi protein rendah, terlalu banyak makanan mengandung karbohidrat. Namun, hati yang dipalpasi membesar yang ditemukan pada anak-anak di banyak daerah tropis biasanya tampak mempunyai sebab campuran, termasuk malaria kronis, malnutrisi, dan akibat yang mungkin dari perpindahan larva *helminth* melalui hati.

- b. Sistem saraf: perubahan mental. Perubahan mental dapat terjadi pada usia berapa pun, tetapi yang paling menarik terlihat pada malnutrisi energi protein yang parah pada awal masa anak-anak khususnya pada kwashiorkor, saat si anak menjadi apatis (tidak peduli), kurang ceria dan kurang tertarik pada lingkungannya.
- c. Tes klinis sistem saraf pusat. Ini bisa termasuk kehilangan sensor, daya gerak yang lemah, hilangnya kepekaan indera posisi, hilangnya kepekaan indera vibrasi, hilangnya sentakan lutut dan tumit, dan kepayahan betis. Uji ini sangat sulit dilaksanakan secara akurat pada kondisi lapangan. Bahkan di rumah sakit masalah kesulitan mendapatkan hasil akurat sentakan lutut dan tumit ini demikian sudah lazim.
- d. Sistem kardiovaskular: pembesaran jantung. Tes yang paling sederhana adalah dengan melakukan palpasi untuk menilai keadaan pembesaran

jantung. Penyebab pembesaran jantung adalah anemia dan beri-beri.

e. Sistem kardiovaskular: *Tachycardia*. *Tachycardia* bisa terjadi pada anemia, beri-beri, dan pada penderita *cardiopathies* nutrisi tertentu.

Kelompok 2. Kemungkinan berhubungan dengan kekurangan gizi

Sistem kardiovaskular: tekanan darah. Untuk mengukur tekanan darah, harus digunakan alat yang distandarisasi. Berubahnya tekanan darah bisa disebabkan oleh faktor gizi, tetapi mungkin bisa karena faktor non-nutrisi. Oleh karena itu dalam penentuan harus hati-hati.

B. Pemeriksaan Fisik Pada Masalah Gizi Kurang

1. Kekurangan Energi Protein (KEP)

Kekurangan Energi Protein (KEP) adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Orang yang mengidap gejala klinis KEP ringan dan sedang pada pemeriksaan ha-nya nampak kurus. Namun gejala klinis KEP berat secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu marasmus, kwashiorkor, atau marasmic-kwashiorkor. (Departemen Kesehatan RI, 1999).

a. Tanda-Tanda Klinis

Pada pemeriksaan klinis, penderita KEP akan memperlihatkan tanda-tanda sebagai berikut:

Marasmus

- 1) Anak tampak sangat kurus, tinggal tulang terbungkus kulit.
- 2) Wajah seperti orang tua, Cengeng, rewel
- 3) Kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit, bahkan sampai tidak ada.
- 4) Sering disertai diare kronik atau konstipasi/susah buang air, serta penyakit kronik
- 5) Tekanan darah, detak jantung, dan pernafasan berkurang. Tanda-tanda klinis marasmus dapat dilihat pada Gambar 5.1

Kwashiorkor

- 1) Oedem umumnya di seluruh tubuh dan terutama pada kaki (*dorsum pedis*)
- 2) Wajah membulat dan sembab, Otot-otot mengecil, lebih nyata apabila diperiksa pada posisi berdiri dan duduk, anak berbaring terus-menerus
- 3) Perubahan status mental: cengeng, rewel, kadang apatis, Anak sering menolak segala jenis makanan (*anoreksia*)
- 4) Pembesaran hati, Sering disertai infeksi, anemia, dan diare/mencret, Rambut berwarna kusam dan mudah dicabut
- 5) Gangguan kulit berupa bercak merah yang meluas dan berubah menjadi hitam terkelupas (*crazy pavement dermatosis*).
- 6) Pandangan mata anak nampak sayu. Tanda-tanda klinis kwashiorkor dapat dilihat pada Gambar 5.1



Gambar 5.1 . *Marasmus-Kwashiorkor*

Tanda-tanda marasmic-kwashiorkor adalah gabungan dari tanda-tanda yang ada pada marasmus dan kwashiorkor yang ada. Tanda-tanda klinis marasmus-kwashiorkor dapat dilihat pada Gambar 5.1

b. **Metode penentuan**

Untuk mendeteksi Kurang Energi Protein (KEP), maka perlu dilakukan pemeriksaan (inspeksi) terhadap target organ yang meliputi: Kulit seluruh tubuh terutama wajah, tangan dan kaki; Otot-otot; Rambut Mata; Hati; Muka; Gerakan motorik

c. **Interpretasi**

Apabila dalam pemeriksaan fisik pada anak target organ banyak mengalami perubahan sesuai dengan tanda-tanda klinis yang Kurang Energi Protein (KEP), maka ada petunjuk bahwa anak tersebut kemungkinan besar menderita KEP. Meskipun demikian perlu dicennati bahwa penilaian KEP masih memerlukan pengamatan lebih lanjut apakah tennasuk marasmus,

kwashiorkor, atau kwashiorkor marasmis sesuai dengan tanda-tanda yang lebih spesifik.

2. Anemia Gizi Zat Besi

Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin darah kurang daripada harga normal.

a. Tanda-Tanda Klinis

Gejala-gejala/tanda-tanda yang dapat dilihat adalah Lelah, lesu, lemah, letih, lalai (SL); Bibir tampak pucat; Nafas pendek; Lidah licin; Denyut jantung meningkat; Susah buang air besar; Nafsu makan berkurang; Kadang-kadang pusing; Mudah mengantuk

b. Metode Penentuan

Untuk mendeteksi Anemia Gizi Zat Besi (AGB) maka perlu dilakukan pemeriksaan (inspeksi) terhadap target organ yang meliputi: Mata, Kuku, Bibir dan Lidah.

c. Interpretasi

Apabila dalam pemeriksaan fisik pada anak target organ banyak mengalami perubahan sesuai dengan tanda-tanda klinis anemia gizi besi, maka ada petunjuk bahwa kemungkinan besar anak tersebut menderita Anemia Gizi Besi.

Indikator Kesehatan Masyarakat

Masalah anemia merupakan masalah gizi utama yang masih dihadapi oleh pemerii Indonesia, Hal ini terbukti dengan masih tingginya prevalensi anemia. Pre vale anemia kelompok rawan masih cukup tinggi. Menurut data tahun 1992, anei merupakan masalah kesehatan masyarakat apabila metebihi prevalensi seperti pada tabel berikut ini:

Tabel.5.2. Indikator masalah kesehatan masyarakat Pada Anemia Gizi Besi

Kelompok	Prevalensi
Ibu Hamil	63,5 %
Anak balita	55,5%
Anak Usia Sekolah (6-12 tahun)	24-35%
Wanita dewasa	30-40%
Pekerja Berpenghasilan Rendah	30-40%
Pria Dewasa	20-30%

Sumber : Supariasa,2002

3. Gangguan Akibat Kurang Yodium (CAKY)

Gangguan akibat kurang yodium tidak hanya menyebabkan pembesaran kelenjar gondok tetapi juga berbagai macam gangguan lain. Kekurangan yodium pada ibu yang sedang hamil dapat berakibat abortus, lahir mati, kelainan bawaan pada bayi, meningkatnya angka kematian pranatal, melahirkan bayi kretin. Kekurangan yodium yang diderita anak-anak menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, gangguan fungsi mental, dan perkembangan fisik. Pada orang dewasa berakibat pada pembesaran kelenjar gondok, hipotiroid, dan gangguan mental. Kekurangan yodium pada tingkat berat dapat mengakibatkan cacat fisik dan mental, seperti tuli, bisu tuli, pertumbuhan badan terganggu, badan lemah, kecerdasan dan perkembangan mental terganggu. Akibat yang sangat merugikan adalah lahirnya anak kretin. Kretin adalah keadaan seseorang yang iahir di daerah endemik dan memiliki dua atau lebih kelainan-kelainan berikut:

- a. Satu perkembangan mental terhambat.
- b. Pendengaran terganggu dan dapat menjadi tuli.

- c. Perkembangan saraf penggerak terhambat, bila berjalan langkahnya khas, mata juling, gangguan bicara sampai bisu dan refleks fisiologi yang meninggi.

Istilah gondok endemik digunakan jika di suatu daerah ditemukan banyak penduduk yang mengalami pembesaran kelenjar gondok. Kriteria daerah endemik menurut Departemen Kesehatan adalah sebagai berikut. Kretin endemik terdapat di daerah gondok endemik. Kelainan kretin terjadi pada waktu bayi dalam usia kandungan atau tidak lama setelah diantarkan dan terdiri atas kerusakan pada saraf pusat dan hipotiroidisme. Kerusakan saraf pusat bermanifestasi dengan:

- a. Retardasi mental.
- b. Gangguan pendengaran sampai bisu tuli.
- c. Gangguan neuromotor, seperti gangguan bicara, cara jalan, dan lain-lain.
- d. Hipotiroidi dengan gejala:
 - 1) Mixedoma pada hipotiroidisme berat.
 - 2) Tinggi badan yang kurang, cebol (*stunted growth*) dan osifikasi terlambat.
 - 3) Pada pemeriksaan darah ditemukan kadar hormon tiroid rendah.

a. Tanda-tanda Klinis

Dalam rangka penentuan pembesaran kelenjar gondok, maka metode yang digunakan adalah inspeksi (pengamatan) dan palpasi (perabaan). Metode Inspeksi digunakan sebagai alat untuk menduga apakah ada pembesaran atau tidak, sedang-kan untuk mengkonfirmasi apakah pembesaran betul-betul pembesaran kelenjar

gondok, maka perlu dilakukan palpasi, sehingga palpasi disebut juga sebagai alat konfirmasi. Urutan pemeriksaan kelenjar gondok sebagai berikut:

- 1) Orang (sampel) yang diperiksa berdiri tegak atau duduk menghadap pemeriksa.
- 2) Pemeriksa melakukan pengamatan di daerah leher depan bagian bawah terutama pada lokasi kelenjar gondoknya.
- 3) Amatilah apakah ada pembesaran kelenjar gondok (termasuk tingkat II atau III).
- 4) Kalau bukan, sampel disuruh menengadahkan dan menelan ludah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang ditemukan adalah kelenjar gondok atau bukan. Pada gerakan menelan, kelenjar gondok akan ikut terangkat ke atas.
- 5) Pemeriksa berdiri di belakang sampel dan lakukan palpasi. Pemeriksa meletakkan dua jari telunjuk dan dua jari tengahnya pada masing-masing lobus kelenjar gondok. Kemudian lakukan palpasi dengan meraba dengan kedua jari telunjuk dan jari tengah tersebut.
- 6) Menentukan (mendiagnosis) apakah orang (sampel) menderita gondok atau tidak. Apabila salah satu atau kedua lobus kelenjar lebih kecil dari ruas terakhir ibu jari orang yang diperiksa, berarti orang tersebut normal. Apabila salah satu atau kedua lobus ternyata lebih besar dari ruas terakhir ibu jari orang yang diperiksa maka orang tersebut menderita gondok.

b. **Klasifikasi**
 Klasifikasi pembesaran kelenjar gondok dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Grade 0: Normal
 Dengan Inspeksi tidak terlihat, baik datar maupun tengadali maksimal, dan dengan palpasi tidak teraba
- 2) Grade IA
 Kelenjar gondok tidak terlihat, baik datar maupun penderita tengadah maksimal, dan palpasi teraba lebih besar dari ruas terakhir ibu jari penderita.
- 3) Grade IB
 Kelenjar gondok dengan inspeksi datar tidak terlihat, tetapi terlihat dengan tengadah maksimal dan dengan palpasi teraba lebih besar dari grade IA.
- 4) Grade II
 Kelenjar gondok dengan inspeksi terlihat dalam posisi datar dan dengan palpasi teraba lebih besar dari grade IB.
- 5) Grade III
 Kelenjar gondok cukup besar, dapat terlihat pada jarak 6 meter atau lebih.

Dalam rangka penentuan prevalensi gondok endemik, maka diperlukan rumus perhitungan TGR dan VGR

Prevalensi Total Goiter Rate (TGR)

$$= \frac{\text{Grade (IA+IB+II+III)}}{\text{banyaknya yang diperiksa}} \times 100$$

Prevalensi Visible Goiter Rate (VGR)

$$\frac{\text{Grade (I+II+III)}}{\text{banyaknya yang diperiksa}} \times 100$$

Indikator Kesehatan Masyarakat

Suatu daerah diklasifikasikan sebagai daerah endemis gondok apabila memiliki prevalensi Total Goitre Rate (TGR) sebagai berikut:

Prevalensi TGR : < 5 %	= Normal
Prevalensi TGR : 5,0 - 19,9 %	= Ringan
Prevalensi TGR : 20,0 - 29,9 %	= Sedang
Prevalensi TGR : > = 30 %	= Berat

4. Kekurangan Vitamin A

Penyakit mata yang diakibatkan kekurangan vitamin A disebut xerophthalmia. Penyakit ini merupakan penyebab kebutaan yang paling sering terjadi pada anak-anak di Indonesia yang umumnya terjadi pada usia 2-3 tahun. Hal ini karena setelah disapih, anak tidak diberi makanan yang memenuhi syarat gizi, sementara anak itu belum bisa mengambil makanan sendiri. Gejala xerophthalmia terbagi dua, yaitu:

- 1) Keadaan yang reversibel yaitu yang dapat sembuh seperti Buta senja (*hemeralopia*); *Xerosis conjunctiva*; *Xerosis kornea* dan Bercak bitot.
- 2) Keadaan yang ireversibel, yaitu keadaan yang agak sulit sembuh Ulserasi kornea dan Keratomalasia.

Klasifikasi yang ditetapkan pada pertemuan bersama WHO, UNICEF, Helen Keller Internasional dan IVACG di Jakarta pada tahun 1981 merupakan modifikasi klasifikasi, yaitu:

Klasifikasi kekurangan vitamin A:

- a) XN : Buta senja (*night blindness only*).
- b) XIA : Konjungtiva mengering (*conjunctiva xerosis*).

Yaitu terdapatnya satu atau lebih bintik-bintik konjungtiva yang kering dan tidak dapat dibasahi. Keadaan ini bisa dijelaskan sebagai munculnya segundukan pasir pada air pasang yang kembali surut.

- c) X1B : Bercak bitot dan konjungtiva mengering (*bitots spot + conjunctiva xerosis*) adalah suatu bentukan yang berwarna abu-abu kekuningan yang bentuknya seperti busa sabun., yaitu keadaan bergelembung atau seperti keju yang terdiri dari sel-sel cpitel konjungtiva yang mengeras dan bersisik melapisi sebagian atau seluruh permukaan yang kering, membentuk noda-noda bitot.
- d) X2 : Kornea mengering (*cornea xerosis*). kekurangan vitamin A yang makin parah, bintik-bintik luka menjadi bertambah padat dan tersebar ke atas dan mungkin meliputi seluruh kornea. Kornea pada kondisi ini memiliki rupa yang trcin;; berkabut jika diuji dengan lampu tangan.
- e) X3A : Ulserasi kornea + kornea mengering. Keadaan kekurangan vitamin A yang lebih parah lagi dari kornea mengering yang mengakibatkan kehilangan *frank epithelial* dan ulserasi stroma baik dengan kete-balan sebagian maupun seluruhnya. Tukak yang berlubang mungkin menjadi ter-sumbat dengan iris dan sembuh sebagai leukoma.
- f) X3B : Keratomalasia. Semua kornea dan konjungtiva menjadi satu menebal sehingga kadang-kadang bola mata menjadi rusak bentuknya. Keadaan perlunakan *limbus to limbus corned*. Biasanya terjadi dengan

adanya gabungan kekurangan protein dan vitamin

A.

g) XS yaitu Parut kornea (*cornea scars*) akibat sembuh dari luka.

h) XF yaitu *Xerophthalmia fundus*

Terjadinya noda-noda putih yang menyebar di seluruh fundus

Untuk mendeteksi Kekurangan Vitamin A Kurang Energi Protein (KEP) maka perlu dilakukan pemeriksaan (inspeksi) terhadap target organ yaitu mata. Tingkatan X1A sampai X2 sifatnya reversible, yang memiliki kemungkinan diobati hingga sembuh, sedangkan X3A sampai dengan tahap selanjutnya bersifat irreversible yang tidak dapat diobati hingga sembuh.

Indikator Kesehatan Masyarakat

Kriteria Kurang Vitamin A sebagai masalah kesehatan masyarakat menurut IVACG, (1981) adalah sebagai berikut:

- a. Bercak bitot dengan konjungtiva mengering >0,50 %
- b. Kornea mengering/ulserasi kornea/Keratomalasia >0,01 %
- c. Parut kornea >0,05 %, dari total yang diperiksa.

C. KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN PEMERIKSAAN KLINIS

Keunggulan Pemeriksaan

- 1) Pemeriksaan klinis relatif murah tidak memerlukan biaya terlalu besar.

- 2) Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan tidak memerlukan tenaga khusus tetapi, tenaga para medis bisa dilatih.
- 3) Sederhana, cepat, dan mudah diinterpretasikan.
- 4) Tidak memerlukan peralatan yang rumit.

Kelemahan Pemeriksaan

- 1) Beberapa gejala klinis tidak mudah dideteksi, sehingga perlu orang-orang yang ahli dalam menentukan gejala klinik tersebut. Namun demikian, para tenaga medis dapat dilatih untuk melakukan pemeriksaan klinis.
- 2) Gejala klinis tidak bersifat spesifik, terutama pada penderita KEP ringan dan sedang. Hal ini dikarenakan ada gejala klinik penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi lebih dari satu zat gizi. Gejala klinis yang sama adakalanya disebabkan bukan hanya disebabkan oleh satu macam zat gizi saja, contoh: *glossitis* (Luka pada lidah) bisa disebabkan oleh karena kekurangan riboflavin, niasin, asam folat, atau karena kekurangan Vitamin B₁₂. *nasolabial seboroik* dapat disebabkan karena defisiensi Vitamin B₆, B₂ atau niasin.

BAB VI

SURVEY KONSUMSI MAKANAN

A. Pengertian, Tujuan, dan Metode Pengukuran Survei Konsumsi Makanan

Survei diet atau penilaian konsumsi makanan adalah salah satu metode yang digunakan dalam penentuan status gizi perorangan atau kelompok. Banyak pengalaman membuktikan bahwa dalam

melakukan penilaian konsumsi makanan (survei dietetik) banyak terjadi bias tentang hasil yang diperoleh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: ketidaksesuaian dalam menggunakan alat ukur, waktu pengumpulan data yang tidak tepat, instrumen tidak sesuai dengan tujuan, ketelitian alat timbang makanan, kemampuan petugas pengumpulan data, daya ingat responden, daftar komposisi makanan yang digunakan tidak sesuai dengan makanan yang dikonsumsi responden dan interpretasi hasil yang kurang tepat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang cara-cara melakukan survei konsumsi makanan, baik untuk individu, kelompok maupun rumah tangga. Walaupun data konsumsi makanan sering digunakan sebagai salah satu metode penentuan status gizi, sebenarnya survei konsumsi tidak dapat menentukan status gizi seseorang atau masyarakat secara langsung. Hasil survei hanya dapat digunakan sebagai bukti awal akan kemungkinan terjadinya kekurangan gizi pada seseorang.

Tujuan Survei Konsumsi Makanan

Secara umum survei konsumsi makanan dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan makan dan gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi pada tingkat kelompok, rumah tangga dan perorangan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi makanan tersebut.

Secara lebih khusus, survei konsumsi digunakan untuk berbagai macam tujuan antara lain:

- a. Menentukan tingkat kecukupan konsumsi pangan nasional dan kelompok masyarakat.

- b. Menentukan status kesehatan dan gizi keluarga dan individu.
- c. Menentukan pedoman kecukupan makanan dan program pengadaan pangan.
- d. Sebagai dasar perencanaan dan program pengembangan gizi.
- e. Sebagai sarana pendidikan gizi masyarakat, khususnya golongan yang berisiko tinggi mengalami kekurangan gizi.
- f. Menentukan perundang-undangan yang berkenaan dengan makanan, kesehatan dan gizi masyarakat.

Metode Pengukuran Konsumsi Makanan Berdasarkan Jenis Data Yang Diperoleh

Berdasarkan jenis data yang diperoleh, maka pengukuran konsumsi makanan menghasilkan dua jenis data konsumsi, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Metode kualitatif

Metode yang bersifat kualitatif biasanya untuk mengetahui frekuensi makan, frekuensi konsumsi menurut jenis bahan makanan dan menggali informasi tentang kebiasaan makan (*food habits*) serta cara-cara memperoleh bahan makanan tersebut. Metode-metode pengukuran konsumsi makanan bersifat kualitatif antara lain: Metode frekuensi makanan (*food frequency*); Metode *dietary history*; Metode telepon; Metode pendaftaran makanan (*food list*)

Metode Kuantitatif

Metode secara kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi sehingga dapat dihitung konsumsi zat gizi dengan

menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) atau daftar lain yang diperlukan seperti Daftar Ukuran Rumah Tangga (URT), Daftar Konversi Mentah-Masak (DKMM) dan Daftar Penyerapan Minyak. Metode-metode untuk pengukuran konsumsi secara kuantitatif antara lain: Metode *recall* 24 jam; Perkiraan makanan (*estimated food records*); Penimbangan makanan (*food weighing*); Metode *food account*; Metode inventaris (*inventory method*); Pencatatan (*household food records*)

Metode Kualitatif dan Kuantitatif

Beberapa metode pengukuran bahkan dapat menghasilkan data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Metode tersebut antara lain: Metode *recall* 24 jam; Metode riwayat makan (*dietary history*)

Metode Pengukuran Konsumsi Makanan Berdasarkan Sasaran Pengamatan Atau Pengguna

1. Tingkat Nasional

Untuk menghitung tingkat konsumsi masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional pada suatu wilayah atau negara dilakukan dengan cara *Food Balance Sheet* (FBS). Langkah-langkah perhitungan FBS:

- a. Menghitung kapasitas produksi makanan dalam satu tahun (berasal dari persediaan/cadangan, produksi dan impor bahan makanan dari negara atau wilayah lain).
- b. Dikurangi dengan pengeluaran untuk bibit, ekspor, kerusakan pascapanen dan transportasi, diberikan untuk makanan ternak dan untuk cadangan.
- c. Jumlah makanan yang ada tersebut dibagi dengan jumlah penduduk.
- d. Diketahui ketersediaan makanan per kapita per tahun secara nasional.

Data *Food Balance Sheet* tidak dapat memberikan informasi tentang distribusi dari makanan yang tersedia tersebut untuk berbagai daerah, apalagi gambaran distribusi di tingkat rumah tangga atau perorangan. Selain itu juga tidak menggambarkan perkiraan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan status ekonomi, keadaan ekologi, keadaan musim dan sebagainya. Oleh karena itu FBS tidak boleh dipakai untuk menentukan status gizi masyarakat suatu negara atau wilayah. Berdasarkan kegunaannya, data FBS dapat dipakai untuk:

1. Menentukan kebijaksanaan di bidang petanian seperti produksi bahan makanan dan distribusi.
2. Memperkirakan pola konsumsi masyarakat.
3. Mengetahui perubahan pola konsumsi masyarakat.

2. Tingkat Rumah Tangga

Konsumsi makanan rumah tangga adalah makanan dan minuman yang tersedia untuk dikonsumsi oleh anggota keluarga atau institusi. Metode pengukuran konsumsi makanan untuk keluarga atau rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Metode Pencatatan (*food account*)

Pencatatan makanan terdiri dari catatan harian, yang dicatat oleh anggota rumah tangga tentang semua bahan makanan/makanan yang masuk ke rumah baik yang dibeli, diterima sebagai hadiah, atau diolah di rumah untuk digunakan selama periode tertentu, yang biasanya tujuh hari. Jumlah setiap makanan dinyatakan dalam ukuran rumah tangga. Pencatatan juga dilakukan terhadap merek dan harga makanan bersangkutan.

Metode ini berasumsi bahwa tidak ada perubahan yang berarti pada pola makan rumah tangga selama periode survei yang dilakukan. Umumnya makanan dan minuman yang dikonsumsi di luar rumah tidak diperhitungkan, begitu pula sisa makanan yang dibuang, makanan yang rusak atau yang diberikan ke hewan peliharaan.

Pelaporan makanan tingkat rumah tangga ini dapat dilakukan untuk mengumpulkan data dari sampel yang besar, sering pada bulan yang berbeda sepanjang tahun untuk mengantisipasi variasi musim, dengan demikian dapat diperoleh data tentang rata-rata konsumsi makanan setahun dan pola memilih makan suatu kelompok penduduk.

Kelebihan metode pencatatan (*food account*):

- a. Cepat dan relatif murah.
- b. Dapat diketahui tingkat ketersediaan bahan makanan keluarga pada periode tertentu.
- c. Dapat diketahui daya beli keluarga terhadap bahan makanan.
- d. Dapat menjangkau responden lebih banyak.

Kekurangan metode pencatatan (*food account*):

- a. Kurang teliti, sehingga tidak dapat menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga.
- b. Sangat tergantung pada kejujuran responden untuk melaporkan/mencatat makanan dalam keluarga.

2. Metode pendaftaran (*food list*)

Metode pendaftaran ini dilakukan dengan menanyakan dan mencatat seluruh bahan

makanan yang digunakan keluarga selama periode survei dilakukan (biasanya 1-7 hari). Pencatatan dilakukan berdasarkan jumlah bahan makanan yang dibeli, harga dan nilai pembeliannya, termasuk makanan yang dimakan anggota keluarga diluar rumah. Jadi data yang diperoleh merupakan taksiran/perkiraan dari responden. Metode ini tidak memperhitungkan bahan makanan yang terbuang, rusak atau diberikan pada binatang piaraan.

Jumlah bahan makanan diperkirakan dengan ukuran berat atau URT. Selain itu dapat dipergunakan alat bantu seperti *food model* atau contoh lainnya (gambar-gambar, contoh bahan makanan aslinya dan sebagainya) untuk membantu daya ingat responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang dibantu dengan formulir yang telah disiapkan, yaitu kuesioner terstruktur yang memuat daftar bahan makanan utama yang digunakan keluarga. Karena data yang diperoleh merupakan taksiran atau perkiraan maka data yang diperoleh kurang teliti.

Langkah-langkah metode pendaftaran makanan:

- a. Catat semua jenis bahan makanan atau makanan yang masuk ke rumah tangga. Dalam URT berdasarkan jawaban dari responden selama periode survei.
- b. Catat jumlah makanan yang dikonsumsi masing-masing anggota keluarga baik di rumah maupun diluar rumah.
- c. Jumlahkan semua bahan makanan yang diperoleh.

- d. Catat umur dan jenis kelamin anggota keluarga yang ikut makan.
- e. Hitung rata-rata perkiraan konsumsi bahan makanan sehari untuk keluarga.
- f. Bila ingin mengetahui perkiraan konsumsi per kapita, dibagi dengan jumlah anggota keluarga.

Kelebihan metode pendaftaran:

Relatif murah, karena hanya membutuhkan waktu yang singkat.

Kekurangan metode pendaftaran:

- a. Hasil yang diperoleh kurang teliti karena berdasarkan estimasi atau perkiraan.
- b. Sangat subyektif, tergantung kejujuran dari responden.
- c. Sangat bergantung pada daya ingat responden.

3. Metode inventaris (*inventory method*)

Metode inventaris ini juga sering disebut *log book method*. Prinsipnya dengan caranya menghitung/mengukur semua persediaan makanan di rumah tangga (berat dan jenisnya) mulai dari awal sampai akhir survei. Semua makanan yang diterima, dibeli dan dari produksi sendiri dicatat dan dihitung/ditimbang setiap hari selama periode pengumpulan data (biasanya sekitar satu minggu). Semua makanan yang terbuang, tersisa dan busuk selama penyimpanan dan diberikan pada orang lain atau binatang peliharaan juga diperhitungkan. Pencatatan dapat dilakukan oleh petugas atau responden yang sudah mampu/telah dilatih dan tidak buta huruf.

Langkah metode inventaris :

- a. Catat dan timbang/ukur semua jenis bahan makanan yang ada di rumah pada hari pertama survei.
- b. Catat dan ukur semua jenis bahan makanan yang diperoleh(dibeli, dari kebun,pemberian orang lain dan makan di luar rumah) keluarga selama hari survei.
- c. Catat dan ukur semua bahan makanan yang diberikan kepada orang lain, rusak, terbuang dan sebagainya selama hari survei.
- d. Catat dan ukur semua jenis bahan makanan yang ada di rumah pada hari terakhir survei.
- e. Hitung berat bersih dari tiap-tiap bahan makanan yang digunakan keluarga selama periode survei
- f. Catat pula jumlah anggota keluarga dan umur masing-masing yang ikut makan.
- g. Hitung rata-rata perkiraan konsumsi keluarga atau konsumsi perkapita dengan membagi konsumsi keluarga dengan jumlah anggota keluarga.

Peralatan yang diperlukan dalam metode inventaris antara lain: Kuesioner, Peralatan atau alat timbang dan Ukuran rumah tangga.

Kelebihan dari metode inventaris:
 Hasil yang diperoleh lebih akurat, karena memperhitungkan adanya sisa dari makanan, terbuang dan rusak selama survei dilakukan.

- Kekurangan metode inventaris:
- a. Petugas harus terlatih dalam menggunakan alat ukur dan formulir pencatatan.
 - b. Tidak cocok untuk responden yang buta huruf, bila pencatatan dilakukan oleh responden.

- c. Memerlukan peralatan sehingga biaya relatif lebih mahal.
- d. Memerlukan waktu yang relatif lama

4. Pencatatan makanan rumah tangga (*household food record*)

Pengukuran dengan metode *household food record* ini dilakukan sedikitnya dalam periode satu minggu oleh responden sendiri. Dilaksanakan dengan menimbang atau mengukur dengan URT seluruh makanan yang ada di rumah, termasuk cara pengolahannya.

Biasanya tidak memperhitungkan sisa makanan yang terbuang dan dimakan oleh binatang piaraan. Metode ini dianjurkan untuk tempat/daerah, dimana tidak banyak variasi penggunaan bahan makanan dalam keluarga dan masyarakatnya sudah bisa membaca dan menulis.

Langkah-langkah metode *household food record*:

- a. Responden mencatat dan menimbang/mengukur semua makanan yang dibeli dan diterima oleh keluarga selama penelitian (biasanya satu minggu)
- b. Mencatat dan menimbang/mengukur semua makanan yang dimakan keluarga, termasuk sisa dan makanan yang dimakan oleh tamu.
- c. Mencatat makanan yang dimakin anggota keluarga di luar rumah.
- d. Hitung rata-rata konsumsi keluarga atau konsumsi perkapita.

Kelebihan metode *household food record*:

Hasil yang diperoleh lebih akurat, bila dilakukan dengan menimbang makanan dan dapat dihitung intake zat gizi keluarga.

Kekurangan metode *household food record*:

- a. Terlalu membebani responden.
- b. Memerlukan biaya cukup mahal, karena responden harus dikunjungi lebih sering.
- c. Memerlukan waktu yang cukup lama.
- d. Tidak cocok untuk responden yang buta huruf.

5. Metode Telepon

Dewasa ini survei konsumsi dengan metode telepon semakin banyak digunakan terutama untuk daerah perkotaan dimana sarana komunikasi telepon sudah cukup tersedia. Untuk negara berkembang metode ini belum banyak dipergunakan karena membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk jasa telepon.

Langkah-langkah metode telepon:

- a. Petugas melakukan wawancara terhadap responden melalui telepon tentang persediaan makanan yang dikonsumsi keluarga selama periode survei.
- b. Hitung persediaan makanan keluarga berdasarkan hasil wawancara melalui telepon tersebut dan Tentukan pola konsumsi keluarga.

Kelebihan metode telepon adalah Relatif cepat, karena tidak harus mengunjungi responden dan Dapat mencakup responden lebih banyak Kekurangan metode telepon adalah Biaya relatif mahal untuk rekening telepon, Sulit dilakukan untuk daerah yang belum mempunyai jaringan telepon, Dapat menyebabkan terjadinya kesalahan

interpretasi dari hasil informasi yang diberikan responden, Sangat tergantung pada kejujuran dan motivasi serta kemampuan responden untuk menyampaikan makanan keluarganya.

3. Tingkat Individu atau Perorangan

Metode pengukuran konsumsi makanan untuk individu, antara lain:

1. Metode *recall* 24 jam

Prinsip dari metode *recall* 24 jam, dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Dalam metode ini, responden, ibu atau pengasuh (bila anak masih kecil) disuruh menceritakan semua yang dimakan dan diminum selama 24 jam yang lalu (kemarin). Biasanya dimulai sejak ia bangun pagi kemarin sampai dia istirahat tidur malam harinya, atau dapat juga dimulai dari waktu saat dilakukan wawancara mundur ke belakang sampai 24 jam penuh. Misalnya, petugas datang pada pukul 07.00 ke rumah responden, maka konsumsi yang ditanyakan adalah mulai pukul 07.00 (saat itu) dan mundur ke belakang sampai pukul 07.00, pagi hari sebelumnya. Wawancara dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa dengan *recall* 24 jam data yang diperoleh cenderung lebih bersifat kualitatif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data kuantitatif, maka jumlah konsumsi makanan individu ditanyakan secara teliti dengan menggunakan alat URT

(sendok, gelas, piring dan lain-lain) atau ukuran lainnya yang biasa dipergunakan sehari-hari. Apabila pengukuran hanya dilakukan 1 kali (1×24 jam), maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan makanan individu. Oleh karena itu, *recall* 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berturut-turut.

Tahapan melakukan Recall 24 jam Konsumsi Gizi Recall konsumsi gizi memiliki unit analisis terkecil selama 24 jam atau sehari. Jangka waktu minimal yang dibutuhkan untuk recall 24 jam konsumsi gizi adalah satu hari (dalam kondisi variasi konsumsi pangan dari hari ke hari tidak beragam) dan maksimal 7 hari. Namun paling ideal dilakukan dalam satu minggu atau 7 hari. Pengulangan recall dapat dilakukan untuk meningkatkan ketepatan data zat gizi yang diperoleh. Pengulangan dapat dilakukan pada musim berbeda, missal recall 24 jam konsumsi pangan yang pertama selama 7 hari dilakukan saat musim kemarau, pengulangan recall 24 jam konsumsi pangan (*recall* 24 jam konsumsi pangan tahap kedua) dilakukan selama 7 hari pada musim penghujan.

Langkah-langkah pelaksanaan *recall* 24 jam:

- a. Petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga (URT). Selama kurun waktu 24 jam yang lalu. Dalam membantu responden mengingat apa yang dimakan, perlu diberi penjelasan waktu kegiatannya

seperti waktu baru bangun, setelah sembahyang, pulang dari sekolah/bekerja, sesudah tidur siang dan sebagainya. Selain dari makanan utama, makanan kecil atau jajan juga dicatat. Termasuk makanan yang dimakan di luar rumah seperti di restoran, di kantor, di rumah teman atau saudara. Untuk masyarakat perkotaan konsumsi tablet yang mengandung vitamin dan mineral juga dicatat serta adanya pemberian tablet besi atau kapsul vitamin A. Petugas melakukan konversi dari URT ke dalam ukuran berat (gram). Dalam menaksir/memperkirakan ke dalam ukuran berat (gram) pewawancara menggunakan berbagai alat bantu seperti contoh ukuran rumah tangga (piring, gelas, sendok, dan lain-lain) atau model dari makanan (*food model*). Makanan yang dikonsumsi dapat dihitung dengan alat bantu ini atau dengan menimbang langsung contoh makanan yang akan dimakan berikut informasi tentang komposisi makanan jadi.

- b. Menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM).
- c. Membandingkan dengan Daftar Kecukupan Gizi yang Dianjurkan (DKGA) atau Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk Indonesia.

Agar wawancara berlangsung secara sistematis, perlu disiapkan kuesioner sebelumnya sehingga wawancara terarah menurut urutan waktu dan pengelompokan bahan makanan. Urutan waktu makan sehari dapat disusun berupa

makan pagi, siang, malam dan snack serta makanan jajanan. Pengelompokan bahan makanan dapat berupa makanan pokok, sumber protein nabati, sumber protein hewani, sayuran, buah-buahan dan lain-lain. Contoh kuesioner *recall* 24 jam dapat dilihat pada Lampiran. Metode *recall* 24 jam ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, sebagai berikut:

Kelebihan metode *recall* 24 jam:

- a. Mudah melaksanakannya serta tidak terlalu membebani responden.
- b. Biaya relatif murah, karena tidak memerlukan peralatan khusus dan tempat yang luas untuk wawancara.
- c. Cepat, sehingga dapat mencakup banyak responden.
- d. Dapat digunakan untuk responden yang buta huruf.
- e. Dapat memberikan gambaran nyata yang benar-benar dikonsumsi individu sehingga dapat dihitung intake zat gizi sehari.

Kekurangan metode *recall* 24 jam:

- a. Tidak dapat menggambarkan asupan makanan sehari-hari, bila hanya dilakukan *recall* satu hari.
- b. Ketepatannya sangat tergantung pada daya ingat responden. Oleh karena itu responden harus mempunyai daya ingat yang baik, sehingga metode ini tidak cocok dilakukan pada anak usia di bawah 7 tahun, orang tua berusia di atas 70 tahun dan orang yang hilang ingatan atau orang yang pelupa.

- c. *The flat slope syndrome*, yaitu kecenderungan bagi responden yang kurus untuk melaporkan konsumsinya lebih banyak (*over estimate*) dan bagi responden yang gemuk cenderung melaporkan lebih sedikit (*under estimate*).
- d. Membutuhkan tenaga atau petugas yang terlatih dan terampil dalam menggunakan alat-alat bantu URT dan ketepatan alat bantu yang dipakai menurut kebiasaan masyarakat. Pewawancara harus dilatih untuk dapat secara tepat menanyakan apa-apa yang dimakan oleh responden, dan mengenal cara-cara pengolahan makanan serta pola pangan daerah yang akan diteliti secara umum.
- e. Responden harus diberi motivasi dan penjelasan tentang tujuan dari penelitian.
- f. Untuk mendapat gambaran konsumsi makanan sehari-hari *recall* jangan dilakukan pada saat panen, hari pasar, hari akhir pekan, pada saat melakukan upacara-upacara keagamaan, selamatan dan lain-lain.

Karena keberhasilan metode *recall* 24 jam ini sangat ditentukan oleh daya ingat responden dan kesungguhan serta kesabaran dari pewawancara, maka untuk dapat meningkatkan mutu data *recall* 24 jam dilakukan selama beberapa kali pada hari yang berbeda (tidak berturut-turut), tergantung dari variasi menu keluarga dari hari ke hari.

2. Metode Riwayat Makan (*dietary history Method*)

Metode ini bersifat kualitatif 'karena memberikan gambaran pola konsumsi berdasarkan

pengamatan dalam waktu yang cukup lama (bisa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun). metode ini terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Komponen pertama adalah wawancara (termasuk *recall* 24 jam), yang mengumpulkan data tentang apa saja yang dimakan responden selama 24 jam terakhir.
- b. Komponen kedua adalah tentang frekuensi penggunaan dari sejumlah bahan makanan dengan memberikan daftar (*check list*) yang sudah disiapkan, untuk mengecek kebenaran dari *recall* 24 jam tadi.
- c. Komponen ketiga adalah pencatatan konsumsi selama 2-3 hari sebagai cek ulang.

Langkah-langkah metode riwayat makan:

- a. Petugas menanyakan kepada responden tentang pola kebiasaan makannya. Variasi makan pada hari-hari khusus seperti hari libur, dalam keadaan sakit dan sebagainya juga dicatat. Termasuk jenis makanan, frekuensi penggunaan, ukuran porsi dalam URT serta cara memasaknya (direbus, digoreng, dipanggang dan sebagainya).
- b. Lakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan untuk kebenaran data tersebut.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengumpulan data adalah keadaan musim-musim tertentu dan hari-hari istimewa seperti hari pasar, awal bulan, hari raya dan sebagainya. Gambaran konsumsi pada hari-hari tersebut harus dikumpulkan.

Kelebihan metode riwayat makan:

- a. Dapat memberikan gambaran konsumsi pada periode yang panjang secara kualitatif dan kuantitatif.
- b. Biaya relatif murah.
- c. Dapat digunakan di klinik gizi untuk membantu mengatasi masalah kesehatan yang berhubungan dengan diet pasien.

Kekurangan Metode Riwayat Makan:

- a. Terlalu membebani pihak pengumpul data dan responden.
- b. Sangat sensitif dan membutuhkan pengumpul data yang sangat terlatih.
- c. Tidak cocok dipakai untuk survei-survei besar.
- d. Data yang dikumpulkan lebih bersifat kualitatif.
- e. Biasanya hanya difokuskan pada makanan khusus, sedangkan variasi makanan sehari-hari tidak diketahui.

3. Metode frekuensi makanan (*food frequency*)

Metode frekuensi makanan adalah untuk memperoleh data tentang frekuensi konsumsi sejumlah bahan makanan atau makanan jadi selama periode tertentu seperti hari, minggu, bulan atau tahun. Selain itu dengan metode frekuensi makanan dapat memperoleh gambaran pola konsumsi bahan makanan secara kualitatif, tapi karena periode pengamatannya lebih lama dan dapat membedakan individu berdasarkan ranking tingkat konsumsi zat gizi, maka cara ini paling sering digunakan dalam penelitian epidemiologi gizi.

Kuesioner frekuensi makanan memuat tentang daftar bahan makanan atau makanan dan frekuensi penggunaan makanan tersebut pada periode tertentu. Bahan makanan yang ada dalam daftar kuesioner tersebut adalah yang dikonsumsi dalam frekuensi yang cukup sering oleh responden.

Langkah-langkah Metode frekuensi makanan:

- a. Responden diminta untuk memberi tanda pada daftar makanan yang tersedia pada kuesioner mengenai frekuensi penggunaannya dan ukuran porsinya.
- b. Lakukan rekapitulasi tentang frekuensi penggunaan jenis-jenis bahan makanan terutama bahan makanan yang merupakan sumber-sumber zat gizi tertentu selama periode tertentu pula.

Kelebihan Metode Frekuensi Makanan:

- a. Relatif murah dan sederhana.
- b. Dapat dilakukan sendiri oleh responden.
- c. Tidak membutuhkan latihan khusus.
- d. Dapat membantu untuk menjelaskan hubungan antara penyakit dan kebiasaan makan.

Kekurangan Metode Frekuensi Makanan

- a. Tidak dapat untuk menghitung intake zat gizi sehari.
- b. Sulit mengembangkan kuesioner pengumpulan data.
- c. Cukup menjemukan bagi pewawancara.
- d. Perlu percobaan pendahuluan untuk menentukan jenis bahan makanan yang akan masuk dalam daftar kuesioner.
- e. Responden harus jujur dan mempunyai motivasi tinggi.

4. Metode *estimated food records*

Metode ini disebut juga *food records* atau *diary records*, yang digunakan untuk mencatat jumlah yang dikonsumsi. Pada metode ini responden diminta untuk mencatat semua yang is makan dan minum setiap kali sebelum makan dalam Ukuran Rumah Tangga (URT) atau menimbang dalam ukuran berat (gram) dalam periode tertentu (2-4 hari berturut-turut), termasuk cara persiapan dan pengolahan makanan tersebut.

Langkah-langkah pelaksanaan *food record*:

- a. Responden mencatat makanan yang dikonsumsi dalam URT atau gram (nama masakan, cara persiapan dan pemasakan bahan makanan).
- b. Petugas memperkirakan/estimasi URT ke dalam ukuran berat (gram) untuk bahan makanan yang dikonsumsi tadi.
- c. Menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan DKBM.
- d. Membandingkan dengan AKG.

Metode ini dapat memberikan informasi konsumsi yang mendekati sebenarnya (*true intake*) tentang jumlah energi dan zat gizi yang dikonsumsi oleh individu.

Kelebihan metode *estimated food records*:

- a. Metode ini relatif murah dan cepat.
- b. Dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar.
- c. Dapat diketahui konsumsi zat gizi sehari.
- d. Hasilnya relatif lebih akurat

Kekurangan metode *estimated food records*:

- a. Metode ini terlalu membebani responden, sehingga sering menyebabkan responden merubah kebiasaan makanannya.
- b. Tidak cocok untuk responden yang buta huruf.

- c. Sangat tergantung pada kejujuran dan kemampuan responden dalam mencatat dan memperkirakan jumlah konsumsi.

5. Metode penimbangan makanan (*food weighing*)

Metode pencatatan penimbangan makanan dalam survei konsumsi gizi merupakan Gold Standar (baku emas) untuk menentukan seberapa banyak makanan dan minuman benar-benar dikonsumsi oleh seseorang atau sekelompok masyarakat. Pada metode penimbangan makanan, responden atau petugas menimbang dan mencatat seluruh makanan yang dikonsumsi responden selama 1 hari.

Penimbangan makanan ini biasanya berlangsung beberapa hari tergantung dari tujuan, dana penelitian dan tenaga yang tersedia.

Langkah-langkah pelaksanaan penimbangan makanan:

- a. Petugas/responden menimbang dan mencatat bahan makanan/makanan yang dikonsumsi dalam gram.
- b. Jumlah bahan makanan yang dikonsumsi sehari, kemudian dianalisis dengan menggunakan Daftar komposisi bahan makanan (DKBM) atau DKGJ (Daftar Komposisi Gizi Jajanan).
- c. Membandingkan hasilnya dengan Kecukupan Gizi yang Dianjurkan (AKG). Perlu diperhatikan disini adalah, bila terdapat sisa makanan setelah makan maka perlu juga ditimbang sisa tersebut untuk mengetahui jumlah sesungguhnya makanan yang dikonsumsi.

Kelebihan metode penimbangan:

Data yang diperoleh lebih akurat/teliti.

Kekurangan metode penimbangan:

- a. Memerlukan waktu dan cukup mahal karena perlu peralatan.
- b. Bila penimbangan dilakukan dalam periode yang cukup lama, maka responden dapat merubah kebiasaan makan mereka.
- c. Tenaga pengumpul data harus terlatih dan trampil.
- d. Memerlukan kerjasama yang baik dengan responden.

B. Kesalahan Pengukuran dan perencanaan Survei Konsumsi Makanan

Dalam melakukan pengukuran konsumsi makanan atau survei diet, sering terjadi kesalahan atau bias terhadap hasil yang diperoleh. Macam bias ini secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Kesalahan acak (Random Bias)

Dapat terjadi karena kesalahan pengukuran tetapi hasilnya tidak mempengaruhi nilai rata-rata. Bias ini dapat memperbesar sebaran (deviasi) dari nilai pengukuran.

2. Kesalahan Sistematis

Dapat terjadi karena:

- a. Kesalahan dari kuesioner, misalnya tidak memasukkan bahan makanan yang sebetulnya penting.
- b. Kesalahan pewawancara yang secara sengaja dan berulang melewatkan pertanyaan tentang makanan tertentu.
- c. Kesalahan responden misalnya, tidak tepat dalam menentukan jumlah makanan yang dikonsumsi,

- the flat slope syndrome*, keinginan untuk menyenangkan pewawancara dsb.
- d. Kesalahan dari alat yang tidak akurat dan tidak distandarkan sebelum penggunaan.
 - e. Kesalahan dari Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM).

Sumber Bias dalam Pengukuran Konsumsi Makanan
 Sumber bias dalam pengukuran konsumsi makanan berasal dari beberapa faktor antara lain:

1. Kesalahan atau bias dari pengumpul data dapat terjadi karena:
 - a. Pengaruh sifat dalam bertanya, dalam mengarahkan jawaban, mencatat hasil wawancara atau sengaja membuat sendiri data tersebut.
 - b. Pengaruh situasi, misalnya perbedaan sikap pewawancara di rumah responden, karena ada orang lain yang ikut mendengarkan, dan keinginan untuk merahasiakan data responden.
 - c. Pengaruh hubungan timbal balik antara pewawancara dengan responden; misalnya perbedaan status, dan penerimaan masyarakat kurang baik terhadap pewawancara.
 - d. Kesalahan dalam melakukan konversi makanan masak ke mentah dan dari ukuran rumah tangga ke ukuran berat (gram)
2. Kesalahan / bias dari responden
 Kesalahan responden berasal dari:
 - a. Gangguan atau terbatasnya daya ingat
 - b. Perkiraan yang tidak tepat dalam menentukan jumlah makanan yang dikonsumsi

- c. Kecenderungan untuk mengurangi makanan yang banyak dikonsumsi dan menambah makanan yang sedikit dikonsumsi.
 - d. Membesar-besarkan konsumsi makanan yang bernilai sosial tinggi
 - e. Keinginan untuk menyenangkan pewawancara
 - f. Keinginan melaporkan konsumsi vitamin dan mineral tambahan
 - g. Kesalahan dalam mencatat
 - h. Kurang kerjasama, sehingga menjawab asal saja atau tidak tahu atau lupa
3. Kesalahan karena alat
- a. Penggunaan alat timbang yang tidak akurat karena belum distandarkan sebelum digunakan
 - b. Ketidaktepatan memilih ukuran rumah tangga (URT)
4. Kesalahan dari daftar komposisi bahan makanan (DKBM)
- a. Kesalahan penentuan nama bahan makanan/jenis bahan makanan yang digunakan.
 - b. Perbedaan kandungan zat gizi dari makanan yang sama karena tingkat kematangan, tanah, pupuk yang dipakai tidak sama
5. Kesalahan karena kehilangan zat gizi dalam proses pemasakan, perbedaan penyerapan, dan penggunaan zat gizi tertentu berdasarkan perbedaan fisiologis tubuh.

Mengurangi Bias dalam pengukuran konsumsi makanan

Mengurangi bias dalam pengukuran konsumsi makanan dapat dilakukan dengan cara Gunakan sampel dalam jumlah besar ; Ulangi pengukuran intake konsumsi terhadap subjek yang sama dalam beberapa

waktu dan Usahakan selalu melakukan kalibrasi terhadap alat-alat ukur.

Untuk mengurangi bias yang berhubungan dengan pengetahuan responden mengenai ukuran porsi, gunakan alat-alat bantu seperti gambar, model atau contoh bahan makanan langsung dan alat makan yang biasa dipergunakan.

C. **Perencanaan Dan Pengorganisasian Survei Konsumsi Makanan**

Untuk menjamin ketepatan dan kebenaran data hasil survei konsumsi makanan, maka diperlukan suatu perencanaan dan pengorganisasian yang baik dalam menentukan metode, teknik pelaksanaan, pengolahan dan analisa data serta interpretasinya. langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. **Penentuan tenaga pelaksana**

Dalam melakukan pemilihan tenaga yang akan diperlukan dalam sebuah survei konsumsi makanan terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan:

- a. mempunyai Latar Belakang dan pengalaman dalam bidang perencanaan menu dan penyelenggaraan makanan akan lebih baik .
- b. Sikap, personalitas dan karakter tenaga; orang yang sikapnya selalu menyenangkan mempunyai integritas tinggi dan sifatnya selalu gembira biasanya lebih disenangi oleh masyarakat, selain itu dapat memahami adat istiadat dan bahasa responden.
- c. lebih cocok tenaga wanita karena bisa lebih dekat dengan ibu-ibu rumah tangga, sehingga ibu bisa lebih terbuka.

2. Pelatihan tenaga

Selain kriteria tenaga, maka kepada tenaga pengumpul data juga perlu diberikan latihan yang menyangkut beberapa hal:

- a. kemampuan menjelaskan maksud dan tujuan survei kepada responden .
- b. seni dan teknik wawancara dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat dan memperoleh informasi yang diperlukan.
- c. Cara melakukan cek dan menyempurnakan data
- d. Penjelasan tentang jenis data yang diperlukan dan bagaimana cara memperolehnya dan mencatatnya.
- e. Tugas-tugas lain yang harus dilakukan dilapangan
- f. Pemahaman tentang adat istiadat dan bahasa pengantar yang digunakan sehari-hari pada masyarakat yang diteliti.

3. Penentuan sasaran dan besar sampel penelitian

Penentuan sasaran penelitian tergantung pada tujuan, sedangkan besarnya sampel yang akan diteliti tergantung pada tingkat homogenitas populasi yang akan diteliti serta hubungannya dengan data lain yang akan dicari, misalnya dengan data status gizi.

Tujuan penelitian dapat untuk mengetahui tingkat konsumsi kelompok masyarakat, rumah tangga maupun perorangan. Dengan demikian sasaran penelitian adalah unit-unit tersebut. Sampel penelitian diambil secara acak sehingga setiap variasi populasi dapat terwakili.

Apabila populasi cukup homogen maka sampel yang diperlukan tidak terlalu banyak. Sebaiknya makin tinggi variabilitas populasi, maka sampel yang diambil harus lebih besar. Bila hasil data yang diperoleh dari survei konsumsi makanan akan dihubungkan dengan data yang lain, maka sampel yang diambil harus cukup besar agar dapat diolah dan dianalisis secara statistik.

4. Pemilihan alat dan bahan

Alat dan bahan yang akan dipakai untuk survei konsumsi makanan tergantung dari metode yang akan digunakan.

5. Periode Waktu Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dari keadaan konsumsi makanan maka survei dilakukan pada tiap musim dalam setahun. Untuk mengetahui kebiasaan makan dan tingkat konsumsi masyarakat, maka variasi menu dari hari ke hari dan siklus menu keluarga akan menentukan periode waktu penelitian, dimana penelitian perlu dilakukan selama periode siklus tersebut.

6. Persiapan Masyarakat

Sebelum melakukan survei, maka hal yang penting dilakukan adalah pemberitahuan kepada masyarakat. Khususnya pimpinan masyarakat yang akan menjadi lokasi penelitian. Pemberitahuan ini akan memperlancar pelaksanaan penelitian.

D. Pengolahan, Analisis Dan Interpretasi Data Hasil Pengukuran Konsumsi Makanan

Faktor Konversi

Setelah data konsumsi diperoleh, amak pengolahan tahap pertama yang dilakukan adalah konversi dari ukuran rumah tangga ke dalam ukuran berat (gram) atau dari satuan harga ke satuan berat.

Konversi dari ukuran rumah tangga ke dalam ukuran berat (gram) diperlukan beberapa daftar antara lain:

a. Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM)

Daftar komposisi bahan makanan adalah Suatu daftar yang memuat susunan kandungan zat-zat gizi berbagai jenis bahan makanan atau makanan. Daftar Komposisi bahan makanan mempunyai arti yang sangat penitng dalam penggunaan secara praktis, namun demikian DKBM ini mempunyai keterbatasan diantaranya:

- 1) Banyak Jenis bahan makanan atau makanan yang tidak dijumpai dalam DKBM karena banyaknya varietas bahan makannan di Indonesia, oleh karena itu untuk analisis bahan makanan tersebut dilakukan dengan mengambil jenis bahan makanan yang relatif sama
- 2) Unsur-unsur perbedaan pengolahan bahan maknan sebagai penyebab perbedaan kandungan zat gizi tidak tergambarkan denga jelas pada DKBM
- 3) Adany kemungkinan kesalahan teknis dalam penganalisaan bahan makanan dilaboratorium.

Untuk menghitung jumlah zat gizi bahan makanan dapat dirumuskan:

$$KG_{ij} = (B_{ij}/100) \times G_{ij} \times (BDD_j/100)$$

Keterangan

KG_{ij} = kandungan zat gizi i makanan dari bahan makanan j dengan berat B gram

B_j = Berat bahan makanan j (gram)

G_{ij} = Kandungan zat gizi i dalam 100 gram BDD bahan makanan j

BDD_j = Persen bahan makanan j yang dapat dimakan (% BDD)

b. Daftar Kandungan Zat Gizi Jajanan (DKGJ)

Daftar Kandungan Zat Gizi Jajanan (DKGJ) adalah daftar yang memuat angka kandungan zat gizi berbagai jenis makanan jajanan. Daftar Kandungan Zat Gizi Jajanan (DKGJ) dibuat tersendiri tanpa digabung dengan DKBM yang sudah ada dengan alasan makanan jajanan merupakan campuran dari berbagai bahan makanan yang dianalisis secara bersamaan dalam bentuk olahan; dalam DKGJ susunan zat-zat gizi tercantum dalam satua gram bagian yang dapat dimakan(BDD) menurut ukuran Rumah tangga masing-masing sehingga tidak perlu dicantumkan kolom BDD, dan DKGJ hanya memuat kandungan energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, besi, vitamin A, vitamin C , Vitamin B1 dan air. Untuk menghitung kandungan zat gizi makanan jajanan dapat dirumuskan :

$$KG_{ij} = \frac{B_j}{100} \times G_{ij}$$

Bjd

KG_{ij} = kandungan zat gizi i makanan jajanan j dengan berat B_j (gram)

B_j = berat makanan jajanan j yang akan dianalisis (gram)

B_{jd} = berat makanan jajanan j yang tercantum dalam DKGJ (gram)

G_{ij} = Kandungan zat gizi i makanan jajanan j pada tabel DKGJ

Contoh :

Seseorang mengkonsumsi kue kelepon sebanyak 6 buah dengan berat keseluruhannya 75 gram (12,5 gram per buah). Bila diketahui berat kue kelepon dalam DKGJ 50 gr dan kandungan protein dan lemak DKGJ masing-masing 0,6 dan 2,7 maka jumlah protein dan lemak yang dikonsumsi dari kue kelepon tersebut adalah:

$$KG \text{ protein kelepon} = 75/50 \times 0,6 = 0,9 \text{ gram}$$

$$KG \text{ lemak kelepon} = 75/50 \times 2,7 = 4,1 \text{ gram}$$

c. Daftar Konversi Berat Mentah Masak (DKMM)

Dalam melakukan pengukuran konsumsi makanan sering dijumpai makanan dalam bentuk olahan (masak), bahkan seringkali jenis makanan jadi tersebut tidak dalam DKGJ. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dihitung dengan mengkonversikan makanan olahan tersebut dalam bentuk bahan makanan (mentah)

Untuk menaksir berat bahan makanan mentah dari makanan olahan (masak atau sebaliknya) dapat digunakan rumus :

$$FJ = \frac{BMj}{BOj}$$

$BMj = Fj \times BOj \rightarrow$ menaksir bahan makanan mentah dari berat masak

$BOj = BMj / Fj \rightarrow$ menaksir berat makanan olahan (masak) dari berat bahan makanan mentah

Keterangan :

Fj = faktor konversi berat mentah masak bahan makanan j

BMj = berat bahan makanan j dalam bentuk mentah

BOj = berat bahan makanan j dalam bentuk olahan (masak)

Contoh : Tempe kedele oseng-oseng dengan berat 40 gram, faktor konversi berat mentah - masak atau $F = 1,1$. dimana pada DKBM dan DKGJ tidak tersedia tempe kedele oseng-oseng. Untuk mengetahui kandungan zat gizinya, maka harus diubah menjadi tempe mentah terlebih dahulu. Berat tempe mentah kedele yaitu $40 \times 1,1 = 44$ gram

Selanjutnya untuk menghitung zat gizi digunakan DKBM

d. Daftar Konversi Penyerapan Minyak (DKPM)

DKPM memuat angka-angka yang menunjukkan persentase minyak yang terserap dalam bahan pangan mentah jika pangan tersebut diolah dengan menggunakan minyak goreng.

Secara umum rumus perhitungannya :

$$M_j = (BK_j) / (BM_j) \times 100$$

$$BK_j = (M_j) \times (BM_j) / 100$$

Keterangan :

BK_j = berat minyak yang diserap bahan makanan j (gram)

M_j = faktor konversi penyerapan minyak pada makanan j (persen)

BM_j = berat bahan makanan j dalam bentuk mentah BDD (gram)

Contoh :

Dalam penyusunan menu rendah kalori, seseorang yang akan memasak Kentang goreng harus menghitung energi dari kentang dan minyak goreng yang akan digunakan. Apabila kentang yang akan digoreng 150 gram (BDD) Maka energi yang akan diperoleh dari kentang goreng apabila faktor konversinya 19,9 adalah:

$$\text{Minyak yang diserap} = (19,9 \times 150 / 100) = 29,85 \text{ g}$$

Selanjutnya dengan menggunakan rumus (1), maka dapat dihitung jumlah Energi dari kentang goreng, yaitu:

$$\text{KG energi kentang goreng} = \text{KG energi kentang} + \text{KG minyak}$$

$$= (150/100) \times 83 \times 100/100 + (29,85/100 \times 870 \times 100/100)$$

$$= 124,5 + 259,7 = 384 \text{ Kalori.}$$

Jadi energi kentang goreng merupakan penjumlahan dari energi kentang Energi minyak goreng, yaitu sebesar 384 Kalori.

e. Daftar Ukuran Rumah Tangga (DURT)

Daftar Ukuran Rumah Tangga Adalah satuan jumlah makanan yang dinyatakan berupa peralatan dan ukuran yang lazim digunakan di rumah tangga sehari-hari, seperti piring, gelas, sendok, mangkok, potong, buah, ikat dsb.

DURT ini digunakan untuk menaksir jumlah bahan makanan ke dalam gram dan volume dalam liter.

Mis. 1 sdm gula pasir = 10 gr 1 sdm terigu = 5 gr;

1 sdm minyak goreng=10 gr; 1 gls nasi = 140 gr = 70 gr beras; dsb.

f. Daftar Bahan Makanan Penukar (DBMP)

Adalah daftar dari bahan makanan dengan kandungan zat gizi yang relatif Sama antara URT dan ukuran berat pada berbagai golongan bahan makanan, Sehingga masing-masing bahan makanan tersebut dapat dipertukarkan.

E. Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Angka kecukupan Gizi yang dianjurkan (AKG) adalah banyaknya masing-masing zat gizi esensial yang harus dipenuhi dari makanan mencakup hampir semua

orang sehat untuk mencegah defisiensi zat gizi. AKG dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, tinggi badan, genetika dan keadaan fisiologis seperti ibu hamil dan menyusui.

Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan (AKG) atau Recommended Dietary Allowances (RDA) adalah taraf konsumsi zat-zat gizi esensial, yang berdasarkan pengetahuan ilmiah dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hampir semua orang sehat di suatu negara. Kecukupan gizi dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, aktivitas, berat dan tinggi badan, genetika, serta keadaan hamil dan menyusui. Dalam perhitungan angka kecukupan gizi yang dianjurkan sudah diperhitungkan faktor variasi kebutuhan individual, dimana kebutuhan yang dianjurkan sudah mencakup hampir 97,5 % populasi, dan untuk kecukupan beberapa zat gizi seperti vitamin, mineral sudah diperhitungkan sampai cadangan zat gizi dalam tubuh. Sehingga perhitungan kecukupan zat gizi sudah memperhitungkan penambahan sebesar dua kali simpang baku (standar deviasi) dari kebutuhan rata-rata penduduk yang sehat.

Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan didasarkan pada patokan berat badan untuk masing-masing kelompok umur, gender, dan aktifitas fisik. Dalam penggunaannya bila kelompok penduduk yang dihadapi mempunyai rata-rata berat badan yang berbeda dengan patokan, maka perlu dilakukan penyesuaian. Bila berat badan kelompok penduduk tersebut dinilai terlalu kurus, maka AKG dihitung berdasarkan berat badan

idealnya. Angka Kecukupan gizi dianjurkan digunakan untuk tujuan:

- a) Merencanakan dan menyediakan suplai pangan untuk penduduk atau kelompok penduduk; perlu diketahui pola pangan dan distribusi penduduk .
- b) Menginterpretasikan data konsumsi makanan perorangan atau kelompok; perlu ditetapkan patokan berat badan untuk masing-masing gender, dan bila menyimpang dari patokan berat badan dilakukan penyesuaian.
- c) Perencanaan pemberian makanan di institusi, seperti rumah sakit, sekolah, industri, asrama, dan lain-lain .
- d) Menetapkan standar bantuan pangan; misalnya dalam keadaan darurat, dan untuk kelompok penduduk yang berisiko seperti balita, anak sekolah, ibu hamil.
- e) Menilai kecukupan persediaan pangan nasional .
- f) Merencanakan program penyuluhan gizi
- g) Mengembangkan produk pangan baru di industri.
- h) Menetapkan pedoman untuk keperluan labeling gizi pangan

Nilai AKG untuk semua zat gizi kecuali energi ditetapkan selalu lebih tinggi daripada kecukupan rata-rata sehingga dapat dijamin, bahwa kecukupan hampir seluruh penduduk terpenuhi. Oleh karena itu asupan dibawah nilai AKG tidak selalu berarti tidak cukup, tetapi makin jauh di bawah nilai tersebut risiko untuk memperoleh asupan tidak cukup meningkat. Khusus untuk energi, nilai kecukupannya ditaksir setara dengan nilai pakainya sebab asupan energi yang kurang maupun lebih dari nilai pakainya akan memberikan dampak pada terganggunya kesehatan.

Interpretasi Tingkat Konsumsi Perorangan

Misalnya diketahui BB seorang anak laki-laki usia 18 tahun adalah 52 kg. Berdasarkan hasil recall 24 jam diketahui tingkat konsumsi energi sehari adalah 2875 Kalori. Pada daftar AKG diketahui BB standar laki-laki usia 16 - 19 tahun adalah 56 kg dan AKG untuk energi = 2500 Kalori. Tentukan tingkat konsumsi energi dari laki-laki tersebut
Jawab :

$$\text{AKG individu} = \frac{52 \text{ kg}}{56 \text{ kg}} \times 2500 \text{ Kalori} = 2321,42 \text{ Kalori}$$

$$\text{Tingkat konsumsi energi} = \frac{2875 \text{ Kal}}{2321,42 \text{ Kal}} \times 100 \% = 123,8\%$$

Klasifikasi tingkat konsumsi dibagi menjadi empat, dengan cut of points sbb:

Baik = $\geq 100 \% \text{ AKG}$;

Sedang = $80 - 99 \% \text{ AKG}$;

Kurang = $70 - 80 \% \text{ AKG}$;

Defisit = $< 70 \% \text{ AKG}$.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka laki-laki tersebut tingkat konsumsi energinya tergolong baik.

BAB VII

STATISTIK VITAL

A. Pengertian

Salah satu cara untuk mengetahui gambaran keadaan gizi di suatu wilayah adalah dengan cara menganalisis statistik kesehatan. Dengan menggunakan statistik kesehatan, dapat dipertimbangkan penggunaannya sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat.

Malnutrisi dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian berkaitan dengan penyakit infeksi seperti tuberculosis. Angka kematian ibu, anak-anak, kematian perinatal dan life expectancy serta angka statistik kesehatan lainnya merupakan efek dari kombinasi ketidakcukupan gizi dan infeksi. Variasi dari statistik kesehatan merupakan bagian dari indikator tidak langsung dalam menilai status gizi di masyarakat.

Ada empat kategori yang dapat menjadi pertimbangan untuk melihat statistik kesehatan. Keempat kategori informasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Angka Kematian Berdasarkan Umur

Malnutrisi mempunyai angka insiden yang tinggi pada kelompok umur tertentu. Berdasarkan hal ini, maka angka kematian pada umur berdasarkan kelompok umur tertentu dapat dipertimbangkan sebagai indikator atau pencetus insiden dari berbagai tipe malnutrisi.

Angka kematian berdasarkan umur adalah jumlah kematian pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah rata-rata penduduk pada kelompok umur

tersebut. Biasanya disajikan sebagai per 1000 penduduk. Manfaat data ini adalah untuk mengetahui tingkat dan pola kematian menurut golongan umur dan penyebabnya. Beberapa keadaan kurang gizi mempunyai insidens yang tinggi pada umur tertentu, sehingga tingginya angka kematian pada umur tersebut dapat dihubungkan dengan kemungkinan tingginya angka keadaan kurang gizi. Angka kematian anak balita perlu dianalisis pada setiap distribusi umur. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada umur yang sama terdapat kejadian tertinggi dari penyakit tertentu.

Kelompok umur yang biasa digunakan untuk melihat angka kematian pada kelompok umur tertentu adalah

a. Angka Kematian Umur 2-5 Bulan

Angka kematian pada kelompok umur 2 sampai 5 bulan tetap merupakan indeks kesehatan yang baik. Periode umur ini merupakan periode dengan status gizi seseorang anak yang dapat tergantung pada praktik pemberian makanan, terutama apakah disusui atau tidak. Pada bayi yang tidak disusui, keadaan gizi kuranga mungkin disebabkan karena praktek pemberian susu yang rekatif encer sehingga tidak memenuhi kebutuhan, disamping itu ,keadaan gizi kurang disebabkan karena kurang baiknya sanitasi dan higien pemberian susu botol yang sering dihubungkan dengan diare dan pada akhirnya bia mengarah kekeadaan kurang gizi sindromk marasmus-diare.

Ada tiga keadaan defisiensi gizi yang sering dihubungkan dengan periode umur ini pada bayi yang disusui yaitu : Beri-beri infantil, Defisiensi vitamin B₁₂ atau asam folat, Riketsia yaitu

kekurangan vitamin D. Ketiga hal ini bisa terjadi karena kekurangan konsumsi vitamin B1, B12 dan Vitamin D pada ibu baik saat hamil atau saat menyusui.

b. Angka Kematian Umur 1-4 Tahun

Angka kematian bayi (*infant mortality rates*) telah cukup banyak digunakan sebagai indikator kesehatan masyarakat. Di negara berkembang, kesakitan dan kematian pada anak umur 1-4 tahun banyak dipengaruhi oleh keadaan gizi. Pengaruh keadaan gizi pada umur tersebut lebih besar daripada umur kurang dari satu tahun. Dengan demikian, angka kesakitan dan kematian pada periode ini dapat dijadikan informasi yang berguna mengenai keadaan kurang gizi di masyarakat.

Untuk melihat angka kematian pada umur 1-4 tahun sering kali sulit, namun beberapa estimasi dapat digunakan untuk melihat angka tersebut. Estimasi tersebut bisa didapatkan dengan menganalisis catatan kelahiran dan kematian, melakukan perhitungan dari hasil sensus atau pendataan di tingkat desa. Pembacaan hasil pada kelompok umur ini juga dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

- a) Melihat persentase kematian anak di bawah umur 5 tahun dibandingkan dengan total kematian pada semua umur.
- b) Melihat data rutin (tahunan) kematian umur 1-4 tahun per 1000 anak umur 1-4 tahun
- c) Melihat persentase kematian pada masa anak-anak yang terjadi pada periode 1-4 tahun

d) Melihat rasio angka kematian anak umur 1-4 tahun terhadap angka kematian bayi 1-12 bulan.

c. Angka Kematian Umur 13-24 Bulan
 Angka kejadian KEP pada umur ini sering terjadi, karena pada periode umur ini merupakan umur periode penyapihan. Anak yang disapih mengalami masa transisi pada pola makannya. Keadaan ini mengakibatkan asupan makanan berkurang. Masa ini disebut masa transisi tahun kedua (*secuntrant*) yaitu *second year transisional*.
 Angka kematian umur pada umur 13-24 bulan memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi beberapa negara, karena pada kelompok umur tersebut mudah menderita KEP dan defisiensi zat gizi lainnya.

Dalam pengumpulan data statistik yang perlu diestimasi dan dipertimbangkan adalah berbagai kendala yang di alami. Meskipun demikian estimasinya tetap dapat dilakukan, yang hasilnya adalah sebagai berikut : Analisis laporan kematian dan kelahiran, Penghitungan hasil sensus dan Pendataan di tingkat desa.

Beberapa kesulitan sering dijumpai dalam penggunaan data sebagai penilaian status gizi tidak langsung dimasyarakat. Secara garis besar kesulitan tersebut terbagi dua yaitu:

Pertama; masalah yang biasanya terjadi adalah ketepatan data yang dikumpulkan. Berkaitan dengan ketepatan data ini ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai reliabilitas dan validitas data. Apakah data yang dikumpulkan itu menghasilkan data yang sama apabila dilakukan penilaian beberapa kali (reliabilitas) ataukah data yang dikumpulkan itu menggunakan alat

ukur yang tepat (validitas). Hasil dari data yang dikumpulkan akan sangat tergantung dari metode pengumpulan data, penerimaan masyarakat, kemauan dan perhatian pemerintah serta institusi setempat. Kedua; mengenai interpretasi data. Interpretasi data tidak karena berbagai faktor yang berkaitan dengan status gizi, misalnya tingginya angka penyakit infeksi mungkin saja tidak hanya berkaitan dengan status gizi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi lain yang berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi.

2. Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyebab Tertentu

Informasi yang berkaitan dengan penyebab kesakitan dan kematian merupakan informasi yang penting untuk dapat menggambarkan keadaan gizi di suatu masyarakat. Namun, data tersebut sulit didapatkan dan walaupun adat tersebut ada, kita harus berhati-hati dalam mengambil kesimpulan bahwa penyebab kematian tersebut berkaitan dengan gizi. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor lain yang berkaitan dengan kematian, misalnya penyakit infeksi (diare, Ispa, dan lain-lain).

Identifikasi yang dilakukan oleh masyarakat mungkin bisa digunakan sebagai salah satu alternatif untuk melihat kemungkinan faktor penyebab kesakitan dan kematian. Misalnya diminta untuk menuliskan ada atau tidaknya anggota keluarga yang malnutrisi atau terkena penyakit dalam satu bulan terakhir.

Angka penyebab penyakit dan kematian pada umur 1-4 tahun merupakan informasi yang penting

untuk menggambarkan keadaan gizi di suatu masyarakat. Namun Perlu disadari bahwa angka tersebut terkadang kurang menggambarkan masalah gizi yang sebenarnya. Besarnya proporsi kematian balita dapat disebabkan oleh penyakit diare, parasit, pneumonia, atau penyakit-penyakit infeksi lainnya seperti campak dan batuk rejan.

Demikian pula halnya pada pencatatan penyebab penyakit. Keadaan kekurangan gizi yang menyertai penyakit lainnya tidak terekam sebagai penyakit penyerta. Seharusnya kalau suatu penyakit dianggap sebagai penyebab kematian akibat *kwashiorkor* dan *marasmus*, maka kedua penyakit tersebut harus dicatat dalam pelaporan dan bukan hanya salah satu saja. Dengan mengetahui penyebab kesakitan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan karena kekurangan gizi atau penyakit penyerta lainnya maka dilakukan intervensi secara komprehensif tidak hanya pada penyebab utamanya saja tapi juga pada penyebab penyertanya.

3. Statistik Layanan Kesehatan

Berbagai statistik layanan kesehatan dapat dilihat dari tempat layanan kesehatan tersebut berada. Tempat layanan kesehatan yang dapat dijangkau antara lain adalah Posyandu, Puskesmas, dan Rumah Sakit. Statistik layanan kesehatan di tingkat desa dapat dilihat dari Bidan Desa. Di bawah ini akan diuraikan data layanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

a. Puskesmas

Puskesmas sebagai lembaga mempunyai bermacam-macam aktivitas. Aktivitas ini ada yang dilaksanakan di dalam gedung (di Puskesmas

sendiri) dan di luar gedung Puskesmas termasuk kegiatan Posyandu. Salah satu kegiatan Puskesmas adalah dalam bidang gizi seperti Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) dan Pojok Gizi (POZI). Informasi yang didapatkan dari puskesmas sangat berguna untuk mendapatkan gambaran angka kesakitan dan kematian yang kemudian dikaitkan dengan keadaan gizi masyarakat setempat serta dapat juga dijadikan sebagai isyarat tentang kondisi kesehatan di wilayah kerja puskesmas tersebut. Kadang-kadang penyebab kematian kurang tepat menggambarkan penyebab kematian sebenarnya. Data kejadian kurang gizi umumnya lebih rendah dari yang sebenarnya. Kejadian ini ibarat gunung es yang sebenarnya jauh lebih banyak dan serius.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data di puskesmas agar dapat memberikan informasi yang benar adalah diagnosis yang dilakukan harus mudah dan dapat dipahami dengan jelas. Salah satu contoh misalnya kwashiorkor dapat dengan mudah dikenali dengan adanya oedem, buruknya pertumbuhan yang bisa dilihat dengan rendahnya berat badan, kehilangan massa otot. Contoh lain marasmus yang dapat didiagnosis dengan melihata sangat rendahnya berat badan dan kehilangan massa otot dan lemak subkutan.

b. Rumah Sakit

Statistik layanan kesehatan yang juga penting adalah rumah sakit. Meningkatnya kunjungan kasus gizi kurang yang dihadapi oleh rumah sakit juga meningkatkan isyarat adanya kekurangan gizi

masyarakat. Data mengenai meningkatnya kunjungan kasus gizi itu dapat dihubungkan dengan berbagai faktor, seperti masalah kemiskinan, harga-harga yang meningkat dan kejadian-kejadian alam seperti kekeringan.

4. Infeksi yang Relevan Dengan Gizi

Kaitan penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang merupakan hubungan timbal balik, yaitu hubungan sebab-akibat. Penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan gizi dan keadaan gizi yang jelek dapat mempermudah terkena infeksi. Penyakit yang umumnya terkait dengan masalah gizi antara lain diare, tuberkulosis, campak, dan batuk rejan (*whoopingn cough*).

Di negara yang sedang berkembang penyebab kematian awal banyak diakibatnya oleh penyakit infeksi. Salah satunya adalah diare. Etiologi penyakit ini bervariasi di setiap daerah, Namun interaksi antara penyebab infeksi (bakteri, virus dan atau parasit) dan kurang energi protein merupakan penyebab utama. Hal ini sering terjadi secara bersamaan antara satu dengan yang lainnya saling memengaruhi. Dengan adanya kenyataan seperti ini ditambah dengan praktik pemberian ASI yang tidak benar, maka data kesakitan dan kematian yang disebabkan diare dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk melihat keadaan status gizi secara tidak langsung dimasyarakat.

B. Kelemahan Statistik Vital

Berbagai kelemahan statistik vital dalam menggambarkan keadaan gizi secara tidak langsung banyak. Oleh karena itu, kadang-kadang gambaran yang diberikan tidak

memperlihatkan keadaan yang sebenarnya. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

1) Data tidak akurat

Tidak akuratnya data disebabkan oleh karena kesulitan dalam mengumpulkan data, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Kesulitan mendapatkan data yang sah muncul karena beberapa data cenderung ditutup-tutupi atau disembunyikan oleh pemerintah karena alasan politik. Ketidakakuratan data juga disebabkan oleh tenaga pengumpul data yang tidak mengerti tentang bagaimana mengumpulkan data handal dan sah.

2) Kemampuan untuk melakukan interpretasi secara tepat, terutama pada saat terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi keadaan gizi seperti tingginya kejadian penyakit infeksi, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Berdasarkan hal tersebut, perlu juga dipikirkan untuk melakukan interpretasi berdasarkan kawasan, musim, jenis kelamin, kelompok umur, dan lain-lain.

Dengan melihat kelemahan tersebut, statistik vital tetap dapat digunakan untuk menilai status gizi di suatu masyarakat akan tetapi membutuhkan tenaga yang profesional dalam hal interpretasi data dan pemahaman konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah gizi.


BAB VIII

PENGUKURAN FAKTOR EKOLOGI

A. Pengertian

Malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil yang saling mempengaruhi (*multiple overlapping*) dan interaksi beberapa faktor fisik, biologi dan lingkungan budaya. Jadi jumlah makanan dan zat-zat gizi yang tersedia bergantung pada keadaan lingkungan seperti iklim, tanah, irigasi, penyimpanan, transportasi dan tingkat ekonomi dari penduduk. Di samping itu, budaya juga berpengaruh seperti kebiasaan memasak, prioritas makanan dalam keluarga, distribusi dan pantangan maka bagi golongan rawan gizi.

Dalam Community Nutrition Level (CNL) equation merupakan persamaan bukan matematika yang dibentuk untuk melihat faktor-faktor yang berperan dalam status gizi masyarakat seperti dalam gambar.8.1 terutama kelompok yang rentan gizi seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui dan elderly.



Dengan menyadari hal tersebut di atas, dipandang sangat penting untuk melakukan pengukuran ekologi yang dapat menyebabkan malnutrisi di masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi.

B. Faktor Ekologi yang berhubungan dengan penyebab malnutrisi

Secara rasional, program yang bersifat preventif sebaiknya diarahkan pada semua faktor yang terlibat dalam kesehatan masyarakat disuatu daerah tertentu. Faktor ekologi yang berhubungan dengan penyebab malnutrisi dibagi dalam enam kelompok, yaitu keadaan infeksi, konsumsi makanan, pengaruh budaya, sosial ekonomi, produksi pangan, serta kesehatan dan pendidikan.

1. Keadaan Infeksi

Penyakit infeksi dan pertumbuhan yang tercermin dari status gizi, seringkali dijumpai bersama-sama dan keduanya dapat saling mempengaruhi. Infeksi dapat disebabkan dan menyebabkan kekurangan gizi. Sebaliknya kekurangan gizi dapat menurunkan daya tahan tubuh dari serangan penyakit infeksi.

Scrimshaw et.al, (1959) menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara infeksi (bakteri, virus dan parasit) dengan malnutrisi. Mereka menekankan interaksi yang sinergis antara malnutrisi dengan penyakit infeksi, dan juga infeksi akan mempengaruhi status gizi dan mempercepat malnutrisi.

Mekanisme patologisnya dapat bermacam-macam, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamaan, yaitu:

- a. Penurunan asupan zat gizi akibat kurangnya nafsu makan, menurunnya absorpsi dan kebiasaan mengurangi makan pada saat sakit.
- b. Peningkatan kehilangan cairan/zat gizi akibat Diare, Mual/muntah dan Perdarahan terus-menerus.

c. Meningkatnya kebutuhan nutrisi akibat Sakit (*human host*) dan Parasit yang terdapat dalam tubuh

Kaitan penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang merupakan hubungan timbal balik, yaitu hubungan sebab akibat. Penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan gizi, dan keadaan gizi yang jelek dapat mempermudah terkena infeksi. Penyakit yang umumnya terkait dengan masalah gizi antara lain diare, tuberculosis, campak, dan batuk rejan (*whooping cough*).

Infeksi juga mempunyai kontribusi terhadap kekurangan energi, protein dan zat gizi lain karena menurunnya nafsu makan sehingga tingkat kecukupan gizi menjadi berkurang. Kebutuhan energi pada saat infeksi bisa mencapai dua kali kebutuhan normal karena meningkatnya metabolisme basal, semua infeksi meningkatkan kebutuhan glukosa. Hal ini menyebabkan deplesi otot dan glikogen hati. Infeksi juga berpengaruh terhadap absorbs dan katabolisme serta mempengaruhi praktek pemberian makanan selama dan sesudah

2. Konsumsi Makanan

Pengukuran konsumsi makanan penting untuk Mengetahui kenyataan apa yang dimakan oleh masyarakat dan Berguna untuk mengukur status gizi serta Menemukan faktor diet yang dapat menyebabkan malnutrisi. Metode pengukuran konsumsi makanan dibedakan menjadi metode kualitatif dan metode kuantitatif.

Metode kualitatif biasanya untuk mengetahui frekuensi makan, frekuensi konsumsi menurut jenis bahan makanan dan menggali informasi tentang

kebiasaan makan (*food habits*) serta cara-cara memperoleh bahan makanan tersebut Metode kualitatif antara lain: Metode Frekuensi Makan (*Food Frequency*), Metode *Dietary History*, Metode Telepon, Metode Pendaftaran Makanan (*Food List*).

Metode Kuantitatif untuk mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi sehingga dapat dihitung konsumsi zat gizi dengan menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) atau daftar lain yang diperlukan seperti Daftar Ukuran Rumah Tangga (URT), Daftar Konversi Mentah-Masak (DKMM) dan Daftar Penyerapan Minyak. Metode kuantitatif antara lain: *Recall 24 Jam*, Perkiraan Makanan (*Estimated Food Records*), Penimbangan Makanan (*Food Weighing*), Metode *Food Account*, Metode Inventaris (*Inventory Method*), Pencatatan (*Household Food Records*)

3. Pengaruh Budaya

Kebudayaan sebagai sistem pengetahuan memungkinkan untuk melihat berbagai perubahan dan variasi pengetahuan terjadi dalam berbagai perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, termasuk didalamnya perubahan gaya hidup atau perilaku jangka panjang sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Perubahan gaya hidup pada gilirannya akan memengaruhi kebiasaan makan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Persoalan kekurangan gizi disebabkan karena tidak tersedianya zat-zat gizi dalam kualitas dan kuantitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kebutuhan zat-zat gizi ini pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi, dan

makanan yang dikonsumsi pada gilirannya amat ditentukan oleh kebiasaan yang bertalian dengan makanan. Kebiasaan makan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan telah ditanamkan sejak awal pertumbuhan manusia yang berakar dalam setiap kebudayaan manusia. Oleh sebab itu berbicara mengenai kebiasaan makan berarti berbicara juga tentang kebudayaan masyarakat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaruh budaya antara lain sikap terhadap makanan, penyebab penyakit, kelahiran anak, dan produksi pangan. Dalam hal sikap terhadap makanan, masih banyak terdapat pantangan, tahyul, tabu dalam masyarakat yang menyebabkan konsumsi makanan menjadi rendah. Konsumsi makanan yang rendah juga disebabkan oleh adanya penyakit, terutama penyakit infeksi saluran pencernaan. Disamping itu jarak kelahiran anak yang terlalu dekat dan jumlah anak yang terlalu banyak akan mempengaruhi asupan zat gizi dalam keluarga. Konsumsi zat gizi keluarga yang rendah, juga dipengaruhi oleh produksi pangan. Rendahnya produksi pangan disebabkan karena para petani masih menggunakan teknologi yang bersifat tradisional.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa setiap kelompok masyarakat betapapun sederhananya memiliki sistem klasifikasi makanan yang didefinisikan secara budaya. Setiap kebudayaan memiliki pengetahuan tentang bahan makanan yang dimakan, bagaimana makanan tersebut ditanam atau diolah, bagaimana mendapatkan makanan, bagaimana disiapkan dihidangkan dan dimakan. Makanan bukan saja hanya sebagai sumber gizi, lebih

dari itu makanan memainkan beberapa peran dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam pemahaman diatas makan beberapa peran makanan diantaranya makanan sebagai ungkapan ikatan sosial, makanan sebagai ungkapan kesetiawanan kelompok, makanan dan stress dan simbolis makanan dalam bahasa.

Masing-masing kebudayaan memiliki selalu memiliki rangkaian aturan yang menjelaskan siapa yang menyiapkan dan menghidangkan makanan, untuk siapa, dimana satu kelompok atau individu makan bersama, dimana dan dalam kesempatan apa dan aturan makan yang kesemuanya terpola secara budaya dan merupakan bagian dari cara-cara yang telah diterima dalam kehidupan setiap komunitas.

4. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi mencakup :

- a. Data sosial seperti keadaan penduduk suatu masyarakat, keadaan keluarga, pendidikan, keadaan perumahan.

Keadaan sosial ekonomi suatu keluarga sangat mempengaruhi tercukupi atau tidaknya kebutuhan primer, sekunder, serta perhatian dan kasih sayang yang akan diperoleh anak. Hal tersebut tentu berkaitan erat dengan pendapatan keluarga, jumlah saudara dan pendidikan orang tua. Selain itu Latar belakang pendidikan seseorang merupakan salah satu unsur penting yang dapat memengaruhi keadaan gizinya karena dengan tingkat pendidikan lebih tinggi diharapkan pengetahuan atau informasi tentang gizi yang dimiliki menjadi lebih baik. Sering masalah gizi timbul karena ketidaktahuan atau kurang informasi tentang gizi

yang memadai. Perlu dipertimbangkan bahwa faktor tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan gizi yang mereka peroleh.

b. Data ekonomi meliputi pekerjaan, pendapatan, kekayaan, pengeluaran dan harga makanan yang tergantung pada pasar dan variasi musim.

Pendapatan merupakan faktor yang paling menentukan kualitas dan kuantitas hidangan. Semakin banyak mempunyai uang berarti semakin baik makanan yang diperoleh. Dengan kata lain semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula persentase dari penghasilan tersebut untuk membeli daging, buah, sayuran dan beberapa jenis bahan makanan lainnya. Keterbatasan penghasilan keluarga turut menentukan mutu makanan yang disajikan. Tidak dapat disangkal bahwa penghasilan keluarga akan turut menentukan hidangan yang disajikan untuk keluarga sehari-hari, baik kualitas maupun jumlah makanan.

Di negara-negara berkembang, orang dengan status ekonomi rendah akan lebih banyak membelanjakan pendapatannya untuk makan. Dan bila pendapatannya bertambah biasanya mereka akan menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk menambah makanan. Dengan demikian, pendapatan merupakan faktor yang paling menentukan kuantitas dan kualitas makanan

5. Produksi Pangan


Konsumsi zat gizi yang rendah dalam keluarga juga dipengaruhi oleh produksi pangan. Rendahnya produksi pangan disebabkan karena para petani

masih menggunakan teknologi yang bersifat tradisional.

Data yang relevan untuk produksi pangan :

a) Penyediaan makanan keluarga (produksi sendiri, membeli atau barter).

Faktor lingkungan memengaruhi persediaan pangan dan asupan zat-zat gizi. Faktor lingkungan tersebut meliputi biologi, sosial, ekonomi, politik dan lingkungan fisik. Kaitan status gizi dengan faktor penjamu, agens dan lingkungan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar.8.2. Model Ekologi dalam bidang gizi,
Caliendo, 1979

- b) Sistem pertanian (alat pertanian, irigasi, pembuangan air, pupuk, pengontrolan serangga, penyuluhan pertanian)
- c) Tanah (kepemilikan tanah, luas per keluarga kecocokan tanah, tanah yang digunakan, jumlah tenaga kerja)
- d) Peternakan dan perikanan (jumlah ternak seperti, kambing, bebek) dan alat penangkap ikan.

e) Keuangan (keuangan yang tersedia, fasilitas untuk kredit)

6. Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan

Walaupun pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak merupakan faktor ekologi, tetapi informasi ini sangat berguna untuk meningkatkan pelayanan. Beberapa data penting tentang pelayanan kesehatan/pendidikan adalah:

- a) Rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan (Puskesmas), jumlah rumah sakit, tempat tidur, staf.
- b) Fasilitas dan pendidikan yang meliputi anak sekolah (jumlah, pendidikan gizi/kurikulum). Remaja meliputi organisasi yang ada di lingkungannya. Orang dewasa meliputi jumlah warga yang buta huruf. Media masa seperti radio, televisi, dll

C. Metode pengumpulan data variabel ekologi

1. Background Data

Latar belakang data yang dapat diperoleh antara lain dari library research, buku-buku, jurnal pada kedokteran, gizi, antropologi, pertanian, ekonomi dan demografi

2. Field data

Data dapat diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Observasi atau rapid ecological visit yang dapat dilakukan di dapur, kebun, pasar, dan peternakan
- b. Catatan lokal dari tempat-tempat di mana makanan dijual
- c. Survei khusus untuk mendapatkan data variabel ekologi dengan menggunakan kuesioner. Survei


membutuhkan dana yang besar, pengumpul data/enumerator, perlu direncanakan teknik pengumpulan data, sampel, pengolahan dan analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. (2009), Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Status Gizi, Ketersediaan dan Produksi Pangan. <http://anianaharani.blogspot.com> diakses pada 17 juli 2014
- Almatsier, S. 2004. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta : Gramedia
- Barasi, M. E, (2007), At A Glance Ilmu Gizi: Erlangga. Surabaya
- Caliendo .1979. Nutrition and World Food Crisis. New York
- D.N.Baron. 1981. Patologi Klinik. EGC Penerbit Buku Kedokteran.
- Deswarni I,dkk.1990. Buku Pegangan Dosen/Mahasiswa Program Diploma III-Gizi, Epidemiologi I. Pusdiknakes,Jakarta
- Fahmida ,dkk (2007) Nutritional Assessment : Handbook. SEAMEO-TROPMED RCCN-UI. Jakarta
- Gibson . S, 1990. Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, New York
- Hardinsyah dan Dodik Briawan, 1990. Penilaian dan Perencanaan Konsumsi Pangan. Bogor: Fakultas Pertanian 1PB
- Jelliffe d.B.1966.The Assessment of Nutritional Status of The Community. WHO.Geneva.
- _____. Community Nutritional Assessment. Oxford University Press, New York.
- Kementrian Kesehatan RI.2011. Keputusan Menkes RI, tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Direktorat Bina Gizi

- Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW, 2003, Biokimia Harper, Edisi XXV, Penerjemah Hartono Andry, Jakarta: EGC
- Pudjiadi. S. 1997. Ilmu Gizi Klinis Pada Anak. FK UI. Jakarta
- Soedarmo, P., 1995. Gizi dan Saya. FKUI, Jakarta
- Soekatri M. 2011. Gizi Seimbang Dalam Daur Kehidupan. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Soekirman. 2000. Ilmu Gizi dan Aplikasinya Untuk Keluarga dan Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Soetjningsih. 1998. Tumbuh Kembang Anak. Penerbit Buku Kedokteran Anak (EGC), Jakarta
- Suhardjo. 1990. Penilaian Keadaan Gizi Masyarakat. IPB Bogor.
- Sujana, W . Dasar Kebutuhan dan Kecukupan Gizi diakses 14 agustus 2014
- Supariasa, I Dewa Nyoman. 2002. Penilaian Status Gizi. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Syafiq A, dkk. 2007 . Gizi Kesehatan Masyarakat. PR Raja Grafindo perdasas. Jakarta
- Syarfaini. 2013. Seputar masalah Gizi dan Kesehatan Masyarakat. Alauddin Press.
- Yayah K. Husaini. 1997. Antropometri sebagai Indikator Gizi dan Kesehatan Masyarakat. Medika, No.8 tahun XXIII.
- Winarno. FG. 1997. Kimia Pangan dan Gizi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

BIODATA PENULIS



Syarfaini lahir di Pallime Kab. Bone pada tanggal 17 Maret 1981. Menamatkan pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin tahun 2002; Magister Kesehatan bidang Gizi kesehatan Masyarakat di Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin tahun 2007. Sejak tahun 2003 penulis aktif memberikan kuliah sebagai dosen luar biasa pada Fakultas Kesehatan Masyarakat dan D3 Analis Kesehatan di Universitas Indonesia Timur. Pada tahun 2008 kemudian penulis menjadi Dosen tetap di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sampai sekarang. Beberapa buku dan karya tulis ilmiah penulis yang telah dipublikasikan diantaranya buku dengan judul dasar-dasar ilmu gizi; seputar masalah gizi dan kesehatan masyarakat; Modul Pengalaman Belajar Lapangan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat; Buku Panduan Praktikum Gizi Kesehatan Masyarakat; jurnal ilmiah Hubungan Pemberian Makanan Tambahan Dengan Status Gizi Anak Sekolah Dasar Negeri 10 Ela-Ela Kabupaten Bulukumba (2005); Pengaruh Pemberian Formula Biskuit dengan Tambahan Tepung Ikan Gabus Terhadap Status Gizi Balita KEP umur 12-36 Bulan Kel.Pannampu Kota Makassar (2007); Faktor yang Berhubungan dengan Asupan makanan Pada Pasien rawat Inap di Rumah Sakit Islam Faisal makassar (2008) ; Hubungan Pengetahuan Sikap dan Perilaku Ibu tentang Surat Al-Baqarah Ayat 233 dengan Status Gizi Balita di

Wilayah Binaan Rumah Zakat Indonesia(2009); Hubungan Asupan Makanan dengan anemia defisiensi besi Pada Santriawati SMU Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kab.Enrekang (2009); Faktor yang berhubungan dengan Pola Pengasuhan Gizi pada Anak Balita di Kecamatan Tapalang Kab.Mamuju Prop.Sulawesi Barat (2010); Hubungan kebiasaan Merokok dengan Kadar Hemoglobin Siswa Kelas X dan Kelas XI SMA Negeri 10 makassar Tahun 2012; Pola Asuh Umum dan Pola Asuh dalam Perspektif Islam Terhadap Status Gizi Balita Etnik Makassar di Kelurahan Pallantikangh Kecamatan Bantaeng Kab.Bantaeng 2013.



ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS

