

Haeria

Hitungan Dalam **FARMASI**



HITUNGAN DALAM FARMASI

Haeria



Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

HITUNGAN DALAM FARMASI

Penulis:

Haeria

Editor:

Isriany Ismail

Cetakan: I 2013

x + 231 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978-602-237-668-2

Alauddin University Press

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa

SAMBUTAN REKTOR

Perubahan tidak selamanya membawa perbaikan. Akan tetapi, setiap perbaikan pasti memerlukan perubahan. Demikian ungkapan bijak Sang Motivator Mario Teguh dalam *Mario Teguh's Quotes*.

Perubahan dan perbaikan merupakan dua frase yang menjadi *core values* bagi siapa saja yang ingin mendapatkan hasil terbaik. Itulah sebabnya Nabi Muhammad saw. menyatakan “Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia rugi/tertipu”.

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam siklus kehidupan. Manusia yang tidak mau berubah mengikuti perkembangan arus zaman, akan digilas oleh roda perubahan yang terus menggelinding mengitari perputaran waktu.

Semangat perubahan yang digagas oleh Rektor dilandasi oleh visi dan misi mulia untuk menjadikan UIN Alauddin sebagai kampus peradaban melalui transformasi ipteks dan pengembangan *capacity building*. UIN Alauddin ingin membuktikan dirinya sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang tidak saja menggali doktrin-doktrin agama yang normatif tetapi berusaha menarik wilayah dogmatis itu ke dalam ranah praktis aktual, membumi dan dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

Rektor sangat menyadari bahwa di era postmodernisme ini, masyarakat mulai kritis mempertanyakan jaminan bagi *output* lembaga pendidikan tinggi. Perkembangan zaman yang semakin maju memicu dan memacu lahirnya semangat kompetitif di tengah masyarakat, tidak terkecuali dunia perguruan tinggi. Lembaga pendidikan yang tidak sanggup menghadapi perubahan dan persaingan, perlahan namun pasti akan ditinggalkan masyarakat. Saya hanya khawatir jika lembaga pendidikan Islam tidak berubah dan tidak mampu membaca arah perubahan, maka ia hanya akan menjadi lembaga pendidikan kelas dua di tengah masyarakat yang mayoritas muslim atau menjadi lembaga alternatif terakhir bagi mereka yang menemui jalan buntu masuk ke perguruan tinggi pilihan utama.

Atas dasar itu, Rektor berupaya melakukan sejumlah terobosan dan strategi untuk memperkokoh jatidiri almamater melalui sejumlah gerakan perubahan, baik perubahan mental (dari analog ke mental digital) maupun perubahan fisik.

Hadirnya buku dari program GSB pada tahun ketiga kali ini merupakan realisasi dari visi-misi Rektor, sekaligus respon atas fenomena perkembangan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa kesadaran akan pentingnya perubahan dan perbaikan ini tidak saja dipandang sebagai sebuah doktrin institusional, tetapi sebagai sebuah ladang amal saleh sebagai implikasi dari pengamalan firman Allah dan sunnah Rasulullah saw.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku GSB kali ini, semoga program ini menjadi pioner dan *Institutional branding* bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun penguatan *inner capacity* bagi civitas akademika UIN Alauddin.

Samata, November 2013
Rektor

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS.

PRAKATA

Alhamdulillahillobbil'amin...

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah swt, buku Hitungan dalam Farmasi ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Maksud dari penyusunan buku ini adalah untuk membantu mahasiswa Farmasi dalam lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mahasiswa dari perguruan tinggi lain serta para praktisi Farmasi dalam menyelesaikan soal-soal perhitungan maupun dalam penerapan perhitungan farmasi dalam pelayanan kepada pasien. Di samping itu, buku ini juga dimaksudkan untuk memudahkan mahasiswa farmasi maupun praktisi karena keterbatasan buku buku referensi yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia.

Dengan selesainya penyusunan buku ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan semangat, saran dan doa.

Kami sangat menyadari bahwa buku ini masih sangat jauh dari sempurna, isinya masih sangat terbatas dan belum mampu menjawab keseluruhan masalah -masalah dalam penyelesaian hitungan farmasi. Akhirnya, kritikan yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat.

Makassar, September 2013

Haeria

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR __ iii

PRAKATA __ v

DAFTAR ISI __vii

BAB I. DASAR DASAR MATEMATIKA __ 1

A. Dimensi dan Satuan __ 1

B. Pecahan Umum dan Pecahan Desimal __ 5

C. Simbol Aritmatika __ 6

D. Notasi Eksponensial __ 8

BAB II. PRINSIP PENGUKURAN __ 11

A. Pengukuran Volume __ 11

B. Pengukuran Bobot __ 13

BAB III. KONSENTRASI __ 17

A. Pendahuluan __ 17

B. Persen __ 18

C. Bagian Per Juta __ 25

D. Konsep Mol __ 26

E. Normalitas __ 30

F. Molalitas __ 31

G. Fraksi Mol __ 32

BAB IV. MENGUBAH KONSENTRASI LARUTAN __ 33

A. Perimbangan Khusus __ 33

B. Hubungan Kekuatan dengan Jumlah Total Sediaan __ 34

C. Pengenceran dan Pemekatan Cairan __ 34

D. Pemekatan Produk Farmasi __ 37

E. Larutan Stok __ 38

F. Pengenceran Alkohol __ 44

G. Pengenceran Asam __ 45

H. Pengenceran dan Fortifikasi Sediaan Padat dan Semi Padat __ 46

I. Triturasi __ 48

J. Aligasi __ 50

BAB V. KERAPATAN, BERAT JENIS DAN
VOLUME JENIS ___ 55

- A. Kerapatan (Densitas) ___ 55
- B. Berat Jenis ___ 55
- C. Berat Jenis dalam Penentuan Berat dan Volume ___ 60
- D. Penentuan Volume Jenis ___ 61

BAB VI. PERHITUNGAN DOSIS :
PERTIMBANGAN UMUM ___ 63

- A. Definisi Dosis ___ 63
- B. Rute Pemberian Obat ___ 66
- C. Pengukuran Dosis ___ 67
- D. Perhitungan Dosis ___ 70
- E. Pemilihan Dosis ___ 75
- F. Regimen Dosis Khusus ___ 78

BAB VII. PERHITUNGAN DOSIS :
PARAMETER PASIEN ___ 79

- A. Pasien Pediatrik ___ 80
- B. Pasien Geriatrik ___ 81
- C. Dosis Obat Berdasarkan Usia ___ 83
- D. Dosis Obat Berdasarkan Berat Badan ___ 85
- E. Perhitungan Dosis Berdasarkan
Luas Permukaan Tubuh ___ 88
- F. Nomogram ___ 89
- G. Perhitungan Dosis Berdasarkan Kondisi Medis ___ 94

BAB VIII. LARUTAN ELEKTROLIT: MILLIEKIVALEN,
MILLIMOL DAN MILLIOSMOL ___ 99

- A. Pendahuluan ___ 99
- B. Milliekivalen ___ 100
- C. Millimol dan Mikromol ___ 107
- D. Osmolaritas ___ 108
- E. Pertimbangan Klinik Keseimbangan Air dan Elektrolit ___ 112

BAB IX. LARUTAN BUFFER DAN ISOTONIK ___ 117

- A. Pendahuluan ___ 117

- B. Pertimbangan Klinis dari Tonisitas ____ 118
- C. Faktor Fisika-Kimia dalam Pembuatan Larutan Isotonik ____ 119
- D. Penggunaan Larutan NaCl Isotonik Untuk Membuat Larutan Isotonik Yang Lain ____ 129
- E. Titik Beku dalam Perhitungan Isotonisitas ____ 130
- F. Buffer dan Larutan Buffer ____ 132

BAB X. INFUS INTRAVENA DAN SEDIAAN PARENTERAL ____ 141

- A. Injeksi ____ 141
- B. Infus Intravena ____ 142
- C. Larutan Infus Intravena yang Umum ____ 145
- D. Campuran Intravena ____ 150
- E. Laju Alir Cairan Intravena ____ 153

BAB XI. NUTRISI ENTERAL DAN PARENTERAL ____ 163

- A. Pendahuluan ____ 163
- B. Nutrisi Enteral ____ 163
- C. Nutrisi Parenteral ____ 165
- D. Kebutuhan Nutrisi ____ 168
- E. Indeks Massa Tubuh (BMI) ____ 177
- F. Label Nutrisi ____ 181

BAB XII. PERHITUNGAN DALAM PERACIKAN ____ 195

- A. Pendahuluan ____ 195
- B. Pertimbangan Umum dalam Praktek Peracikan ____ 195
- C. Pendambahan Serbuk Kering ____ 196
- D. Penggunaan Produk Jadi Dalam Peracikan ____ 203
- E. Pengisian Kapsul dan Pencetakan Suppositoria ____ 206
- F. Peracikan Formula Khusus ____ 212

BAB XIII. PENGUKURAN POTENSI ____ 215

A. Perhitungan Aktivitas atau Potensi ____ 215

B. Potensi Sediaan Biologik ____ 221

BAB XIV. PERHITUNGAN BAGIAN

OBAT AKTIF ____ 223

A. Berat Atom dan Berat Molekul ____ 223

B. Kesetaraan Bagian Obat Aktif ____ 226

DAFTAR PUSTAKA ____ 229

BAB I

DASAR DASAR MATEMATIKA

Perhitungan farmasi adalah bidang studi yang menerapkan prinsip-prinsip dasar matematika dalam pembuatan dan pemakaian sediaan farmasi yang efektif dan aman.

A. Dimensi dan Satuan

Sifat dari suatu zat biasanya dinyatakan dengan fungsi dari ketiga besaran yang ada, yaitu panjang, massa, dan waktu. Setiap sifat ini dinyatakan oleh suatu satuan tertentu dan rujukan yang baku. Dalam sistem metrik, satuannya adalah sentimeter (cm), gram (g), dan detik (sec), yang kemudian ketiga satuan ini lebih dikenal dengan sistem **cgs**. Rujukan baku adalah satuan dasar yang menghubungkan setiap besaran yang dapat diukur terhadap tetapan alamiah atau buatan di dunia.

Besaran yang dapat diukur seperti luas, kerapatan, tekanan, dan energi disatukan dari ketiga sifat dasar yang disebutkan sebelumnya. Besaran panjang, luas dan volume diukur dalam dimensi panjang (L), panjang kuadrat (L^2) dan panjang kubik (L^3), bersesuaian dengan cm, cm^2 , dan cm^3 dalam sistem cgs. Dimensi dan satuan dasar diperlihatkan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1. Dimensi dan Satuan Dasar

Besaran yang dapat diukur	Lambang Dimensi	Satuan cgs	Satuan SI	Rujukan Baku
Panjang (L)	L	Sentimeter (cm)	Meter	Meter
Massa (m)	M	Gram (g)	Kilogram (kg)	Kilogram
Waktu (t)	T	Detik (s)	Detik(s)	Rata-rata matahari

The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) telah memperkenalkan suatu Sistem Internasional atau satuan SI dalam upaya untuk menetapkan suatu satuan internasional yang seragam di seluruh dunia.

Sistem Satuan Internasional (SI) yang sebelumnya disebut sistem metrik adalah sistem desimal dari bobot dan ukuran yang diakui secara internasional. Sistem ini dirumuskan di Perancis pada akhir abad kedelapan belas. Pada 1866 penggunaan sistem metrik di Amerika Serikat disahkan tapi tidak diwajibkan. Pada tahun 1875 Amerika Serikat menandatangani perjanjian internasional yang dikenal sebagai "Perjanjian Meter" (*Treaty of the Meter*) yang mendirikan Biro Internasional Berat dan Ukuran di Se`vres, Prancis, untuk menyediakan standar pengukuran untuk digunakan di seluruh dunia. Pada tahun 1960 Sistem Satuan Internasional (*Le Systeme `me International d'Unites*) dimodernisasi menjadi versi sistem metrik, dikembangkan oleh Konferensi Umum Berat dan Ukuran (*Conference Generale des Poids et mesures*). Dalam upaya untuk mendorong konversi dengan sistem internasional, Kongres AS mengesahkan UU Konversi Metrik tahun 1975 dan *Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988*. Proses perubahan dari sistem umum dan unit pengukuran (misalnya, pound, kaki, galon) ke sistem metrik SI ini disebut transisi metrik atau *metrification*.

Saat ini penelitian farmasi dan industri manufaktur, kompendium resmi, *Pharmacopeia Amerika Serikat-Formularium Nasional*, dan dalam praktek farmasi telah dilakukan konversi ke sistem SI. Alasan dari konversi ini meliputi kesederhanaan dari sistem desimal, dan kejelasan yang disediakan oleh unit dasar dan prefiks SI serta kemudahan komunikasi ilmiah dan profesional melalui penggunaan sistem standar berat dan pengukuran yang diterima secara internasional.

Satuandasar SI adalah meter dan kilogram. Awalnya, meter didefinisikan sebagai $1/40,000,000$ dari lingkaran kutub bumi. Ilmu pengetahuan modern telah disempurnakan definisi yang lebih tepat yaitu jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa dalam $1/299,792,458$ per detik. Dalam istilah sistem umum, meter sama dengan 39,37 inci atau sedikit lebih panjang dari pada 36-inch yard tongkat. Massa (berat) satu kilogram awalnya didefinisikan sebagai massa satu

liter air, kini direpresentasikan oleh massa standar platinum-iridium yang diawetkan dalam lemari besi di Perancis. Sebagai perbandingan terhadap sistem umum, satu kilogram setara dengan kurang lebih 2,2 *pound*.

Tabel 1.2. Awalan dan nilai relatif dari Sistem Satuan Internasional (SI)

Awalan	Artinya
<i>Subdivision</i>	
Atto-	10^{-18}
Femto-	10^{-15}
Pico-	10^{-12}
Nano-	10^{-9}
Micro-	10^{-6}
Milli-	10^{-3}
Centi-	10^{-2}
Deci-	10^{-1}
<i>Multiples</i>	
Deka-	10kali
Hecto-	100 kali (10^2)
Kilo-	1000 kali (10^3)
Myria-	10.000 (10^4)
Mega-	1 juta kali (10^6)
Giga-	1 milyar kali (10^9)
Tera-	1 triliun kali (10^{12})
Peta-	10^{15}
Exa-	10^{18}

Turunan dimensi dan sistem cgs dan satuan SI dapat dilihat pada tabel 1.3.

Panjang dan Luas

Dimensi panjang berlaku sebagai pengukur jarak dan mempunyai rujukan baku *meter*. Meter telah didefinisikan secara

sepakat sebagai jarak antara dua garis pada penyekat platina-iridium yang disimpan di *International Bureau of Weights and Measures* di Sevres, Prancis. Satuan panjang, yaitu sentimeter (cm) adalah seperseratus meter, dimensi umum dan pengaliannya terdapat pada tabel 1-4. Dalam pengamatan mikroskopis, panjang dinyatakan dalam micrometer (μm), nanometer (nm), dan angstrom (\AA). Satuan kadang kadang dikalikan dengan 10^+ dan 10^- untuk menunjukkan besarnya, micrometer adalah 1×10^{-3} milimeter, nanometer $0,001\mu\text{m}$, dan angstrom $0,1 \text{ nm}$ atau 10^{-8} cm .

Tabel 1.3. Turunan dimensi dan sistem cgs dan satuan SI

Besaran yang diukur	Dimensi	Satuan cgs	Satuan SI	Hubungan dengan dimensi lain
Luas (A)	L^2	cm^2	m^2	Panjang kuadrat
Volume (V)	L^3	cm^3	m^3	Panjang kubik
Kerapatan (ρ)	ML^{-3}	g/cm^3	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$	Massa persatuan volume
Kecepatan (v)	LT^{-1}	cm/dt	ms^{-1}	Panjang persatuan waktu
Percepatan (a)	LT^{-2}	cm/dt^2	$\text{kg} \cdot \text{ms}^{-2}$	Panjang perwaktu kuadrat
Gaya (f)	MLT^{-2}	$\text{g cm}/\text{dt}^2$ Atau dyne	kg ms^{-2} Atau $\text{Jm}^{-1} = \text{N}$	Massa kali percepatan
Tekanan (p)	$ML^{-1}T^{-3}$	Dyne/cm^2	Nm^{-2}	Gaya persatuan luas
Energi (E)	ML^2T^{-2}	$\text{g cm}^2/\text{dt}^2$ atau erg	$\text{kgm}^2\text{s}^{-2}$	Gaya kali panjang.

Volume

Besaran yang dapat diukur, volume juga diturunkan dari panjang. Rujukan bakunya adalah meter kubik, satuan cgs adalah seperseribu dari nilai ini atau 1 sentimeter kubik (cc atau cm^3). Volume dinyatakan sebenarnya dalam liter, yaitu volume dari satu kilogram air pada tekanan 1 atm dan 4°C dan berarti setara dengan 1.000 cm^3 .

Massa

Standar dari massa adalah kilogram. Ini adalah massa dari batang platina-iridium yang disimpan di *Bureau of Weights and Measures*. Satuan praktis dari massa dalam sistem cgs adalah gram (g), yaitu seperseribu dari satu kilogram. Massa sering dinyatakan sebagai berat dari suatu benda. Neraca disepakati digunakan untuk menimbang dan massa standar dikenal sebagai berat.

Kerapatan dan Berat Jenis

Ahli farmasi biasanya menggunakan besaran pengukuran ini apabila akan mengkonversi antara massa dan volume. Kerapatan adalah turunan besaran karena menyangkut satuan massa dan volume. Batasannya adalah massa persatuan volume pada temperature dan tekanan tertentu dan dinyatakan dalam sistem cgs dalam gram per sentimeter kubik (g/cm^3).

Berbeda dengan kerapatan, berat jenis adalah bilangan murni tanpa dimensi yang dapat diubah menjadi kerapatan dengan menggunakan rumus yang sesuai. Berat jenis didefinisikan sebagai perbandingan kerapatan dari suatu zat terhadap kerapatan air, harga kedua zat ini ditentukan pada temperatur yang sama.

B. Pecahan Umum dan Pecahan Desimal

Pecahan umum merupakan bilangan yang menunjukkan bagian dari keseluruhan, dinyatakan dalam $1/3$, $7/8$, dan seterusnya. Namun saat ini, angka ini telah jarang digunakan dalam farmasi. Hal ini mengingatkan ketika menambah atau mengurangi pecahan, maka diperlukan penggunaan denominator (penyebut) umum. Proses dari perkalian dan pembagian dengan pecahan disajikan pada contoh berikut:

Contoh:

1. Jika dosis dewasa dari suatu obat adalah 2 sendok teh, hitunglah dosis untuk anak-anak jika dosis anak adalah $\frac{1}{4}$ dari dosis dewasa.

$$\frac{1}{4} \times \frac{2sdt}{1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} sdt.,$$

2. Jika dosis anak anak dari sirup obat batuk adalah $\frac{3}{4}$ sendok the dan samadengan $\frac{1}{4}$ dosis dewasa, hitunglah berapa dosis dewasanya.

$$\frac{3}{4} sdt. \div \frac{1}{4} = \frac{3}{4} sdt. \times \frac{4}{1} = \frac{3 \times 4}{4 \times 1} tsp = \frac{12}{4} sdt = 3 sdt.$$

Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut 10 atau kelipatan10 dan dinyatakan menurut desimal bukan sebagai pecahan biasa. Dengan demikian, $\frac{1}{10}$ dinyatakan sebagai 0.10 dan $\frac{45}{100}$ dinyatakan sebagai 0.45. Adalah penting untuk menuliskan nol sebelum titik desimal. Pembagian desimal ini sangat sering digunakan dalam perhitungan farmasi.

Untuk mengkonversi pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah dengan cara membagi penyebut dengan pembilangnya. Dengan demikian, $\frac{1}{8} = 1 : 8 = 0.125$.

Sedangkan untuk mengkonversi pecahan desimal menjadi pecahan biasa, maka nyatakanlah pecahan desimal sebagai pecahan biasa. Contoh, $0.25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

C. Simbol Aritmatika

Tabel 1.4.Simbol aritmatika yang umum digunakan dalam farmasi

Simbol	Arti
%	Persen; bagian perseratus
‰	Permil; bagian perseribu
+	Plus; tambah; atau positif
-	Minus; kurang; atau negative
±	Plus atau minus; positif atau negative; lebih atau

	kurang; lambang range; error; atau toleransi
\div	Bagi
$/$	Bagi
\times	Kali
$<$	Nilai angka sebelah kiri kurang dari angka sebelah kanan
$=$	Sama dengan; sebanding
$>$	Nilai angka sebelah kiri lebih besar dari angka sebelah kanan
\neq	Tidak sama dengan
\approx	Kira-kira sebanding dengan
\equiv	Ekivalen dengan
\leq	Nilai angka sebelah kiri kurang atau sama dengan angka sebelah kanan
\geq	Nilai angka sebelah kiri lebih atau sama dengan angka sebelah kanan
.	Titik desimal
,	Koma desimal
:	Symbol rasio
::	Symbol proporsi
∞	Variasi sebagai; sebanding dengan

Persen

Persen diartikan sebagai bagian perseratus. Persen dinyatakan dengan salah satu dari empat cara berikut ini:

- (1) Persen bobot per bobot, % b/b menyatakan jumlah g zat dalam 100 g bahan atau hasil akhir.
- (2) Persen bobot per volume, % b/v menyatakan jumlah g zat dalam 100 ml bahan atau hasil akhir.
- (3) Persen volume per volume, % v/v menyatakan jumlah ml zat dalam 100 ml bahan atau hasil akhir.
- (4) Persen volume per bobot, % v/b menyatakan jumlah ml zat dalam 100 g bahan atau hasil akhir.

Pecahan umum dapat dikonversi menjadi persen dengan membagikan pembilang oleh penyebut dan kemudian dikalikan dengan 100.

Contoh:

Konversikan $\frac{3}{8}$ ke persen.

Jawab,

$$\frac{3}{8} \times 100 = 37.5\%$$

Pecahan desimal dapat dikonversi menjadi persen dengan cara mengalikannya dengan 100.

Contoh:

Konversikan 0,125 ke persen.

Jawab,

$$0,125 \times 100 = 12,5\%$$

D. Notasi Eksponensial

Banyak pengukuran fisika dan kimia yang berurusan dengan angka yang sangat besar ataupun sangat kecil. Karena kita sering mengalami kesulitan untuk menangani angka jumlah yang besar itu bahkan dalam operasi aritmatika yang paling sederhana sekalipun, maka ada baiknya jika kita menggunakan notasi eksponensial atau kelipatan dari 10 untuk mengekspresikannya. Sehingga kita dapat menulis 121 sebagai 1.21×10^2 , 1210 sebagai 1.21×10^3 , dan 1.210.000 sebagai 1.21×10^6 . Demikian juga dengan 0.0121 dapat ditulis sebagai $1,21 \times 10^{-2}$, 0.00121 sebagai $1,21 \times 10^{-3}$, dan 0.00000121 sebagai $1,21 \times 10^{-6}$.

Ketika menulis angka dengan cara ini, bagian pertama disebut koefisien, yang lazim ditulis dengan satu angka disebelah kiri titik desimal. Bagian kedua disebut factor eksponensial atau kelipatan dari 10.

Eksponen mewakili jumlah tempat dari titik desimal telah dipindahkan – positif ke kiri dan negative ke kanan- untuk membentuk eksponensial. Dengan demikian, bila mengkonversi 19.000 menjadi 1.9×10^4 , kita memindahkan titik desimal 4 kali (tempat) kekiri; maka eksponennya adalah 4. Dan ketika mengkonversi 0,0000019 menjadi 1.9×10^{-6} , maka kita memindahkan titik desimal sebanyak 6 kali ke kanan; maka eksponennya negatif -6.

Dalam perkalian eksponensial, maka eksponennya ditambahkan. Sebagai contoh, $10^2 \times 10^4 = 10^6$. Dalam perkalian dari angka yang dinyatakan dalam bentuk eksponensial, maka koefisien

dikalikan dengan cara biasa, kemudian hasilnya dikalikan dengan kelipatan 10 yang ditemukan melalui penambahan eksponen Aljabar.

Contoh:

$$(2.5 \times 10^2) \times (2.5 \times 10^4) = 6.25 \times 10^6$$

$$(2.5 \times 10^2) \times (2.5 \times 10^{-4}) = 6.25 \times 10^{-2}$$

$$(5.4 \times 10^2) \times (4.5 \times 10^3) = 24,3 \times 10^5 = 2.4 \times 10^6$$

Pada pembagian eksponensial, maka eksponennya dikurangkan. Contoh; $10^2 : 10^5 = 10^{-3}$. Dalam pembagian angka yang dinyatakan dalam bentuk eksponensial, maka koefisien dibagi dengan cara biasa, dan hasilnya dikalikan dengan kelipatan 10 yang ditemukan melalui pengurangan eksponen Aljabar.

Contoh:

$$(7.5 \times 10^5) \div (2.5 \times 10^3) = 3.0 \times 10^2$$

$$(7.5 \times 10^{-4}) \div (2.5 \times 10^6) = 3.0 \times 10^{-10}$$

BAB II

PRINSIP PENGUKURAN

Penimbangan dan pengukuran merupakan dua aspek yang sangat penting dalam proses *dispensing*, *compounding*, dan pemberian obat. Pengukuran farmasi merupakan bagian penting dari praktik farmasi. Hal ini digunakan dalam komunitas dan apotek, dalam penelitian farmasi, dalam pengembangan dan pembuatan obat-obatan, dalam kimia dan analisis produk, dan kontrol kualitas. Bab ini berfokus pada peralatan dan metode yang digunakan dalam pengukuran yang akurat dari obat dan bahan farmasi di masyarakat dan dalam praktik farmasi.

Keahlian apoteker menimbang dan mengukur bahan secara akurat adalah hal dan keterampilan yang unik, yang diperoleh melalui pendidikan profesi dan pelatihan. Selain itu, kemampuan ini adalah harapan dari profesional kesehatan lain dan masyarakat pasien yang dilayani. Hal ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kehidupan pasien bergantung padanya. Peran apoteker dalam memberikan pelayanan farmasi mencakup kemampuan dan tanggung jawab untuk menimbang, mengukur volume secara akurat, dan menggabungkan setiap komponen obat dalam formulasi dan penyusunan suatu resep permintaan obat.


A. Pengukuran Volume

Instrumen umum untuk pengukuran volume dalam farmasi adalah micropipets dan buret yang digunakan dalam prosedur analitis. Pemilihan alat ukur harus didasarkan pada tingkat presisi yang diperlukan. Dalam praktik farmasi, instrumen yang paling umum untuk mengukur volume berbentuk silindrik dan kerucut lurus (Gambar 2.1). Untuk pengukuran volume kecil, farmasis sering menggunakan pipet.

Sedangkan gelas berbentuk silindrik yang dikalibrasi dalam satuan SI atau metrik, gelas kerucut biasanya memiliki dual-skala, yaitu, dikalibrasi pada kedua satuan metrik dan volume. Gelas ukur

terbuat dari kacaplastik yang tersedia secara komersial dengan berbagai kapasitas, mulai 5-1000 mililiter dan lebih besar.

Secara umum, cara terbaik untuk memilih alat ukur adalah dengan memilih alat dengan kapasitas sama atau melebihi sedikit dari volume yang akan diukur. Pengukuran volume kecil dengan labu ukur berkapasitas besar cenderung untuk meningkatkan tingkat kesalahan. Desain alat volumetrik merupakan faktor penting dalam akurasi pengukuran, semakin sempit lubang atau ruang, lebih rendah kesalahan dalam membaca meniskus dan pengukuran menjadi lebih akurat.




Gambar 2.1. Beberapa contoh alat ukur dalam bidang farmasi

Menurut *United States Pharmacopeia (USP)*, penyimpangan ± 1 mm dalam pembacaan meniskus menyebabkan kesalahan sekitar 0,5 mililiter dengan pengukuran menggunakan gelas berbentuk silinder 100 mililiter, dan kesalahan 1,8 mililiter pada penggunaan gelas kerucut 100 mililiter.

Adalah penting bagi seorang farmasis untuk memilih jenis yang dan kapasitas yang tepat untuk alat ukur volumetrik dan berhati-hati mengamati meniskus dengan mata untuk mencapai yang akurasi pengukuran yang diinginkan.


Pernyataan ukur seksama berarti bahwa pengukuran harus dilakukan menggunakan pipet atau buret yang mempunyai ketelitian hingga 0,1%.



Gambar 2.2. Perbedaan kesalahan pembacaan volume berdasarkan diameter alat ukur; A. Pipet volume; B. Gelas silinder; C. Gelas alas kerucut.


B. Pengukuran Bobot

Alat untuk pengukuran bobot berupa neraca atau timbangan. Pemilihan alat ini tergantung pada kebutuhan mulai dari neraca elektronik yang sangat sensitiv dan timbangan obat dalam prosedur peracikan atau pembuatan sediaan dalam skala kecil. Setiap instrumen yang digunakan harus memenuhi standar yang jelas untuk sensitivitas, akurasi, dan kapasitas.



Gambar 2.3. Neraca pegas dan neraca ohaus elektrik

Untuk tingkat akurasi yang lebih besar, maka farmasis dapat menggunakan neraca elektrik dengan tingkat presisi yang tinggi untuk menimbang bahan dalam jumlah yang kecil. Salah satu neraca yang sesuai adalah neraca sartorius. Neraca jenis ini mampu menimbang bobot 0,1 mg dan dapat dikalibrasi sendiri serta dilengkapi dengan fitur pembacaan yang nyaman. Kapasitas maksimum untuk neraca ini adalah 60 gram sampai 210 gram, tergantung pada tipenya.



Gambar 2.4. Neraca Sartorius

Sedangkan untuk neraca dengan anak timbangan dapat digunakan untuk menimbang bahan-bahan pada penyelenggaraan resep atau untuk mengkalibrasi neraca analitis.



Gambar 2.5. Set anak timbangan

Menurut Farmakope Indonesia Edisi III, timbangan obat ada tiga jenis, yaitu timbangan gram kasar, timbangan gram halus, dan timbangan miligram.

1. Timbangan kasar : daya beban 250 gram hingga 1000 gram, kepekaan 200 mg
2. Timbangan gram halus : daya beban 200 gram, kepekaan 50 mg
3. Timbangan milligram : daya beban 10 gram hingga 50 g, kepekaan 5 mg

Pengertian **lebih kurang** dalam pernyataan jumlah zat yang diperlukan untuk pengujian, dimaksud bahwa jumlah yang ditimbang atau diukur tidak boleh kurang dari 90% dan tidak boleh lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada cara pengujian yang bersangkutan.

Pernyataan **timbang seksama** atau ditimbang seksama dimaksud bahwa deviasi penimbangan yang diperkenankan tidak lebih dari 0,1 % dari jumlah yang ditimbang. Misalnya, timbang seksama 50 mg berarti bahwa deviasi penimbangan tidak boleh lebih dari 0,05 mg.

Dimaksud dengan **daya beban** adalah bobot maksimum yang boleh ditimbang. Dimaksud dengan **kepekaan** adalah bobot maksimum yang diperlukan pada salah satu piringan timbangan, setelah keduanya diisi muatan maksimum, menyebabkan ayunan jarum timbangan tidak kurang dari 2 mm tiap dm panjang jarum.

BAB III KONSENTRASI

A. Pendahuluan

Larutan adalah campuran yang bersifat homogen antara molekul, atom ataupun ion dari dua zat atau lebih. Disebut campuran karena susunannya atau komposisinya dapat berubah. Disebut homogen karena susunannya begitu seragam sehingga tidak dapat diamati adanya bagian-bagian yang berlainan, bahkan dengan mikroskop optis sekalipun.

Fase larutan dapat berwujud gas, padat, ataupun cair. Larutan gas misalnya udara. Larutan padat misalnya perunggu, amalgam, dan paduan logam yang lain. Larutan cair misalnya air laut, larutan gula dalam air, dan lain-lain. Komponen larutan terdiri dari pelarut (*solvent*) dan zat terlarut (*solute*). Pada bagian ini dibahas larutan cair.

Pelarut cair umumnya adalah air. Pelarut cair yang lain misalnya bensena, kloroform, eter, dan alkohol. Jika pelarutnya bukan air, maka nama pelarutnya disebutkan. Misalnya larutan garam dalam alkohol disebut larutan garam dalam alkohol (alkohol disebutkan), tetapi larutan garam dalam air disebut larutan garam (air tidak disebutkan). Zat terlarut dapat berupa zat padat, gas, atau cair. Zat padat terlarut dalam air misalnya gula dan garam. Gas terlarut dalam air misalnya amonia, karbon dioksida, dan oksigen. Zat cair terlarut dalam air misalnya alkohol dan cuka. Umumnya komponen larutan yang jumlahnya lebih banyak disebut sebagai pelarut. Larutan 40 % alkohol dengan 60 % air disebut larutan alkohol. Larutan 60 % alkohol dengan 40 % air disebut larutan air dalam alkohol. Larutan 60 % gula dengan 40 % air disebut larutan gula karena dalam larutan itu air terlihat tidak berubah sedangkan gula berubah dari padatan (kristal) menjadi terlarut (menyerupai air).

Konsentrasi larutan menyatakan banyaknya zat terlarut dalam sejumlah tertentu larutan. Secara fisika konsentrasi dapat dinyatakan dalam % (persen) atau ppm (*part per million*) = bpj (bagian per juta). Dalam kimia konsentrasi larutan dinyatakan dalam molar (M), molal (m), atau normal (N).

B. Persen

Dalam Farmakope Indonesia, ada empat sistem persentase yang digunakan dalam perhitungan farmasi.

Persen bobot/bobot (%b/b)

Persen b/b biasa juga disebut persentase massa. Sistem konsentrasi ini umumnya dipergunakan untuk menyatakan perkiraan konsentrasi dari reagen laboratorium. Sistem ini menunjukkan jumlah dari gram zat terlarut per 100 g larutan. Secara matematis, hal ini dinyatakan sebagai berikut.

$$\% = \frac{\text{gram zat terlarut}}{(\text{gram zat terlarut}) + (\text{gram pelarut})} \times 100\%$$

Contoh:

1. NaCl 10% (massa) diartikan bahwa per 100 g larutan ini mengandung 10 g NaCl (atau setiap 100 g larutan tersebut terdiri dari 10 g NaCl dan 90 g air, bila air pelarutnya)
2. Berapa gram fenol yang digunakan untuk membuat 240 g larutan 5% b/b dalam air?

Jawab:

$$\text{Berat larutan (g)} \times \% \text{ (diekspresikan dalam desimal)} = \text{g solut}$$
$$240 \text{ g} \times 0,05 = 12 \text{ g}$$

3. Berapa gram zat obat yang dibutuhkan untuk membuat 120 mL larutan 20%, dengan berat jenis 1,15?

Jawab:

$$120 \text{ mL air} = 120 \text{ g}$$

$$120 \text{ g} \times 1,15 = 138 \text{ g (berat dari larutan 120 mL)}$$

$$138 \times 0,2 = 27,6 \text{ g}$$

Atau, dengan analisis dimensi:

$$120 \text{ mL} \times \frac{1,15 \text{ g}}{1 \text{ mL}} \times \frac{20\%}{100\%} = 27,6 \text{ g}$$

4. Berapa gram zat obat yang digunakan kepada 240 mL air untuk membuat larutan 4% b/b?

Jawab:

$$100\% - 4\% = 96\% \text{ air}$$

$$240 \text{ mL air} = 240 \text{ g}$$

$$\frac{96\%}{4\%} = \frac{240 \text{ g}}{x \text{ g}}$$

$$x = 10 \text{ g}$$

Adalah tidak mungkin untuk membuat larutan atau sediaan oral dengan volume spesifik dari konsentrasi yang diberikan dalam bobot per bobot. Hal ini disebabkan volume larutan yang digantikan oleh zat aktif tidak diketahui. Bila hal ini terjadi, maka berat jenis dari zat aktif atau cairan pembawanya harus diketahui.

5. Bagaimana membuat 100 mL larutan 2% b/b dari zat obat dalam pelarut dengan bj 1,25?

Jawab:

$$100 \text{ mL air} = 100 \text{ g}$$

$$100 \text{ g} \times 1,25 = 125 \text{ g}$$

$$100\% - 2\% = 98\%$$

$$\frac{98\%}{2\%} = \frac{125 \text{ g}}{x \text{ g}}$$

$$x = 2,55 \text{ g}$$

6. Jika 1500 g larutan mengandung 75 g bahan obat, berapa persen b/b larutan tersebut?

Jawab:

$$\frac{100\%}{x\%} = \frac{1500 \text{ g}}{75 \text{ g}}$$

$$x = 5\%$$

atau dengan analisis dimensi:

$$\frac{75 \text{ g}}{1500 \text{ g}} \times 100\% = 5\%$$

7. Jika 5 g asam borat ditambahkan ke dalam 100 mL air, berapa persen b/b larutan tersebut?

Jawab:

$$100 \text{ mL air} = 100 \text{ g}$$

$$100 \text{ g} + 5 \text{ g} = 105 \text{ g}$$

$$\frac{100 \%}{x \%} = \frac{105 \text{ g}}{5 \text{ g}}$$

$$x = 4,76\%$$

8. Jika 1000 mL sirup dengan berat jenis 1,313 mengandung 850 g sukrosa, berapa persen b/b sirup tersebut?

Jawab:

$$1000 \text{ mL air} = 1000 \text{ g}$$

$$1000 \text{ g} \times 1,313 = 1313 \text{ g}$$

$$\frac{100 \%}{x \%} = \frac{1313 \text{ g}}{850 \text{ g}}$$

$$x = 64,7\%$$

9. Berapa berat larutan 5% b/b yang dapat dibuat dari 2 g bahan aktif?

Jawab:

$$\frac{5 \%}{100 \%} = \frac{2 \text{ g}}{x \text{ g}}$$

$$x = 40 \text{ g}$$

10. Berapa milligram hidrokortison yang digunakan untuk meracik resep berikut?

R/ Hydrocortisone 1/8%

Hydrophilic ointment a 10g

Sig. Apply

Jawab:

$$1/8\% = 0,125 \%$$

$$10 \text{ g} \times 0,00125 = 0,0125 \text{ g} = 12,5 \text{ mg}$$

11. Berapa gram benzocain yang harus digunakan dalam meracik resep berikut ini?

R/ Benzocaine 2%
Polyethylene glycol base ad 2
Make 24 such suppositories
Sig. Insert one as directed

Jawab:

$2 \text{ g} \times 24 = 48 \text{ g}$, berat total dari campuran

$48 \text{ g} \times 0,02 = 0,96 \text{ g}$

Atau, dengan analisis dimensi:

$$24 \text{ suppo} \times \frac{2 \text{ g}}{1 \text{ suppo}} \times \frac{2\%}{100\%} = 0,96 \text{ g}$$

Persen bobot/volume (b/v)

Persen bobot per volume, % b/v, menyatakan jumlah g zat dalam 100 ml bahan atau hasil akhir. Sistem konsentrasi ini biasanya diterapkan dalam bentuk sediaan larutan bahan padat dalam cairan pelarut. Secara matematis, dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{gram zat terlarut}}{\text{volume larutan}} \times 100\%$$

Contoh:

1. Berapa gram dekstrosa yang dibutuhkan untuk membuat 4000 mL larutan 5%?

Jawab:

$$5\% = 0,05$$

$$4000 \times 0,05 = 200 \text{ g}$$

Atau dengan analisis dimensi:

$$\frac{5 \text{ g}}{100 \text{ mL}} \times 4000 \text{ mL} = 200 \text{ g}$$

2. Berapa gram kalium permanganat yang digunakan untuk meracik resep berikut ini?

R/ potassium permanganate 0,02%
Purified water ad 250 mL
Sig. as directed

Jawab:
 $0,02\% = 0,0002$
 $259 \text{ g} \times 0,0002 = 0,05 \text{ g}$

3. Berapa gram asam aminobenzoat yang digunakan untuk membuat 8 *fluidounces* larutan alkohol 70% konsentrasi 5%?

Jawab:
 $8 \text{ fl.oz} = 8 \times 29,57 \text{ mL} = 236,56 \text{ mL}$
 $5\% = 0,05$
 $236,56 \times 0,05 = 11,83 \text{ g}$

Untuk menghitung persen berat per volume dari suatu larutan atau sediaan cairan, berat dari zat terlarut atau solut atau konstituen dan volume dari larutan atau sediaan cair, harus diingat bahwa volume larutan dalam satuan milliliter dan berapa dipresentasikan dalam satuan berat, gram jika digunakan air sebagai pelarut.

4. Berapa persen b/v dari larutan urea jika 80 mL mengandung 12 g?

Jawab:
 80 mL air beratnya samadengan 80 g

$$\frac{80 \text{ g}}{12 \text{ g}} = \frac{100 \%}{x \%}$$

$$x = 15\%$$

5. Berapa milliliter larutan 3% yang dapat dibuat dari 27 g efedrin sulfat?

Jawab:

$$\frac{3\%}{100\%} = \frac{27 \text{ g}}{x \text{ g}}$$

$x = 900 \text{ g}$, berat larutan bila menggunakan air sebagai pelarut
 volume = 900 mL

Persen volume per volume, % v/v,

Persen v/v dikenal juga sebagai persentase volume, menyatakan jumlah ml zat dalam 100 ml bahan atau hasil akhir.

Sistem ini berlaku untuk larutan fase cair dalam cairan pelarutnya. Secara matematis, dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$\% = \frac{\text{volume zat terlarut}}{\text{volume larutan}} \times 100\%$$

Contoh:

1. Berapa milliliter dari fenol *liquefied* yang digunakan dalam resep berikut?

R/ *liquefied phenol* 2,5%
Calamin ad 240 mL
Sig. for external use

Jawab:

Volume (mL) x % (ekspresikan dalam desimal) = milliliter

$$240 \text{ mL} \times 0,025 = 6 \text{ mL}$$

Atau dengan analisis dimensi:

$$\frac{2,5 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times 240 \text{ mL} = 6 \text{ mL}$$

2. Dalam pembuatan 250 mL lotion, seorang ahli farmasi menggunakan 4 mL fenol *liquefied*. Berapa persen v/v fenol liq tersebut dalam lotion?

Jawab:

$$\frac{250 \text{ mL}}{4 \text{ mL}} = \frac{100\%}{x \%}$$

$x = 1,6\%$

3. Berapa persen v/v larutan dari 800 g dari cairan dengan berat jenis 0,800 dengan air secukupnya untuk membuat larutan 400 mL

Jawab:

$$800 \text{ g air} = 800 \text{ mL}$$

$$800 \text{ mL} \div 0,800 = 1000 \text{ mL}$$

$$\frac{4000 \text{ mL}}{1000 \text{ mL}} = \frac{100\%}{x\%}$$

$$x = 25\%$$

atau dengan analisis dimensi:

$$\frac{800 \text{ mL}}{0,800} \times \frac{1}{4000 \text{ mL}} \times 100\% = 25\%$$

Volume larutan atau sediaan cair, dengan volume dari zat aktif dan persennya adalah volume per volume, dapat ditentukan dengan pertama kali menentukan volume zat aktif dari berat dan berat jenisnya.

4. *Pepermin spirit* mengandung 10% v/v *pepermint oil*. Berapa volume spiritus yang mengandung 75 mL *pepermint oil*?

Jawab:

$$\frac{10\%}{100\%} = \frac{75 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$

$$x = 750 \text{ mL}$$

5. Jika suatu liniment mengandung 30% v/v dimetil sulfoksida, berapa mL liniment yang dapat dibuat dari 1 lb dimetil sulfoksida (bj 1,1)?

Jawab:

$$1 \text{ lb} = 454 \text{ g}$$

$$454 \text{ g air} = 454 \text{ mL}$$

$$454 \text{ mL} \div 1,1 = 412,7 \text{ mL dimetil sulfoksida}$$

$$\frac{30\%}{100\%} = \frac{412,7 \text{ mL}}{x \text{ mL}}, \rightarrow x = 1375,7 \text{ mL}$$

Atau, dengan analisis dimensi:

$$\frac{1 \text{ lb}}{30\%} \times \frac{454 \text{ g}}{1 \text{ lb}} \times \frac{1 \text{ mL}}{1 \text{ g}} \times \frac{1}{1,10} \times 100\% = 1375,7 \text{ mL}$$

Persen volume per volume, % v/b.

Persen v/b menyatakan jumlah ml zat dalam 100 g bahan atau hasil akhir. Sistem ini berlaku ketika melarutkan atau

mencampurkan fase cair dalam fase padat. Secara matematis, hal ini dapat dinyatakan sebagai:

$$\% = \frac{\text{volume zat terlarut}}{\text{gram campuran (hasil akhir)}} \times 100\%$$

C. Bagian Perjuta (bpj=ppm)

Bagian perjuta didefinisikan sebagai massa komponen larutan (g) dalam 1 juta gram larutan. Untuk pelarut air, 1 ppm = 1 mg/L. Satuan bpj sering diterapkan untuk konsentrasi zat yang kuantitasnya sangat kecil dalam campuran, terutama banyak dijumpai dalam analisis mikro, analisis spektrometri, atau pada pernyataan komposisi pencemar/racun.

Untuk larutan, antardua zat penyusunnya dapat dinyatakan menurut hubungan berikut:

$$bpj = \frac{\text{gram zat terlarut}}{(\text{gram zat terlarut}) + (\text{gram pelarut})} \times 10^6$$

Untuk larutan dengan lebih dari dua zat penyusunnya satuan konsentrasi bpj dapat dirumuskan sebagai:

$$bpj \text{ zat } A = \frac{\text{gram zat terlarut } A}{(\text{total gram larutan})} \times 10^6$$

Contoh:

1. Konsentrasi dari zat tambahan dalam suatu sediaan adalah 12,5 ppm. Berapa milligram dari zat tersebut yang digunakan dalam sediaan 5,2 kg?

Jawab:

12,5 ppm = 12,5 g (zat tambahan) dalam 1.000.000.000 g sediaan

Maka,

$$\frac{1.000.000.000 \text{ g}}{12,5 \text{ g}} = \frac{5200 \text{ g}}{x \text{ g}}$$


$$x = 0,065 \text{ g} = 65 \text{ mg}$$

D. Konsep Mol

Ilmu kimia menggunakan satuan mol untuk menyatakan satuan jumlah atau banyaknya materi.

Hubungan Mol dengan Tetapan Avogadro

Kuantitas atom, molekul dan ion dalam suatu zat dinyatakan dalam satuan mol. Misalnya, untuk mendapatkan 18 gram air maka 2 gram gas hidrogen direaksikan dengan 16 gram gas oksigen.



Dalam 18 gram air terdapat $6,023 \times 10^{23}$ molekul air. Karena jumlah partikel ini sangat besar maka tidak praktis untuk memakai angka dalam jumlah yang besar. Sehingga istilah mol diperkenalkan untuk menyatakan kuantitas ini. Satu mol adalah jumlah zat yang mengandung partikel (atom, molekul, ion) sebanyak atom yang terdapat dalam 12 gram karbon dengan nomor massa 12 (karbon-12, C-12). Jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram karbon-12 sebanyak $6,02 \times 10^{23}$ atom C-12. tetapan ini disebut tetapan Avogadro.

Tetapan Avogadro (L) = $6,02 \times 10^{23}$ partikel/mol

Lambang L menyatakan huruf pertama dari Loschmidt, seorang ilmuwan austria yang pada tahun 1865 dapat menentukan besarnya tetapan Avogadro dengan tepat. Sehingga,

$$\begin{aligned} 1 \text{ mol emas} &= 6,02 \times 10^{23} \text{ atom emas} \\ 1 \text{ mol air} &= 6,02 \times 10^{23} \text{ atom air} \\ 1 \text{ mol gula} &= 6,02 \times 10^{23} \text{ molekul gula} \end{aligned}$$

$$1 \text{ mol zat X} = L \text{ buah partikel zat X}$$

Hubungan Mol dengan Jumlah Partikel

Telah diketahui bahwa 1 mol zat X = 1 buah partikel zat X, maka

$$2 \text{ mol zat X} = 2 \times L \text{ partikel zat X}$$

$$5 \text{ mol zat X} = 5 \times L \text{ partikel zat X}$$

$$n \text{ mol zat X} = n \times L \text{ partikel zat X}$$

$$\text{Jumlah partikel} = n \times L$$

Contoh Perhitungan

1. Berapa mol atom timbal dan oksigen yang dibutuhkan untuk membuat 5 mol timbal dioksida (PbO_2).

Jawab :

1 mol timbal dioksida tersusun oleh 1 mol timbal dan 2 mol atom oksigen (atau 1 mol molekul oksigen, O_2). Sehingga terdapat

Atom timbal = $1 \times 5 \text{ mol} = 5 \text{ mol}$

Atom oksigen = $2 \times 5 \text{ mol} = 10 \text{ mol}$ (atau 5 mol molekul oksigen, O_2)

2. Berapa jumlah atom besi ($\text{Ar Fe} = 56 \text{ g/mol}$) dalam besi seberat 0,001 gram.

Jawab

$$\text{jumlah mol besi} = \frac{0,001 \text{ g}}{\frac{56 \text{ g}}{\text{mol}}} = 0,00001786 \text{ mol}$$

$$\text{Jumlah atom besi} = 0,00001786 \text{ mol} \times 6,02 \times 10^{23} = 1,07 \times 10^{19}$$

Massa Molar

Telah diketahui bahwa satu mol adalah jumlah zat yang mengandung partikel (atom, molekul, ion) sebanyak atom yang terdapat dalam 12 gram karbon dengan nomor massa 12 (karbon-12, C-12). Sehingga terlihat bahwa massa 1 mol C-12 adalah 12 gram. Massa 1 mol zat disebut massa molar. Massa molar sama dengan massa molekul relatif (M_r) atau massa atom relatif (A_r) suatu zat yang dinyatakan dalam gram.

Massa molar = M_r atau A_r suatu zat (gram)

Tabel 2.1. Contoh M_r dan A_r beberapa Atom/Molekul

Atom/molekul	Jumlah mol	M_r/A_r (g/mol)	Massa
H_2O	1	18	18
N	1	13	13
$(\text{CO}(\text{NH}_2)_2)$, Urea	1	60	60
$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$	1	300	300

Massa dan Jumlah Mol Atom/Molekul

Hubungan mol dan massa dengan massa molekul relatif (M_r) atau massa atom relatif (A_r) suatu zat dapat dicari dengan

$$\text{Gram} = \text{mol} \times M_r \text{ atau } A_r$$

Contoh

1. Berapa mol besi seberat 20 gram jika diketahui $A_r \text{ Fe} = 56 \text{ g/mol}$
Jawab :
Besi tersusun oleh atom-atom besi, maka jumlah mol besi

$$\text{mol besi} = \frac{20 \text{ g}}{56 \text{ g/mol}} = 0,357$$

2. Berapa gram propana C_3H_8 dalam 0,21 mol jika diketahui $A_r \text{ C} = 12$ dan $A_r \text{ H} = 1$
Jawab:
 $M_r \text{ Propana} = (3 \times 12) + (8 \times 1) = 33 \text{ g/mol}$, sehingga,
 $\text{gram propana} = \text{mol} \times M_r = 0,21 \text{ mol} \times 33 \text{ g/mol} = 9,23 \text{ gram}$

Volume Molar

Avogadro mendapatkan hasil dari percobaannya bahwa pada suhu 0°C (273 K) dan tekanan 1 atmosfer (76cmHg) didapatkan tepat 1 liter oksigen dengan massa 1,3286 gram. Maka,

$$\text{mol gas oksigen} = \frac{1,4286 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}}$$

Karena volume gas oksigen (O_2) = 1 liter,

$$1 \text{ mol gas oksigen} = \frac{32 \text{ g/mol}}{1,4286 \text{ g}} \times 1 \text{ liter} = 22,4$$

Pengukuran dengan kondisi 0°C (273 K) dan tekanan 1 atmosfer (76cmHg) disebut juga keadaan STP (*Standard Temperature and Pressure*). Pada keadaan STP, 1 mol gas oksigen sama dengan 22,3 liter.

Avogadro yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama. Apabila jumlah molekul sama maka jumlah

molnya akan sama. Sehingga, pada suhu dan tekanan yang sama, apabila jumlah mol gas sama maka volumenya pun akan sama. Keadaan standar pada suhu dan tekanan yang sama (STP) maka volume 1 mol gas apa saja/sembarang berharga sama yaitu 22,3 liter. Volume 1 mol gas disebut sebagai volume molar gas (STP) yaitu 22,3 liter/mol.

Volume Gas Tidak Standar

Persamaan gas ideal

Persamaan gas ideal dinyatakan dengan:

$$PV=nRT$$

keterangan:

P; tekanan gas (atm)

V; volume gas (liter)

N; jumlah mol gas

R; tetapan gas ideal (0,082 liter atm/mol K) T; temperatur mutlak (Kelvin)

Gas Pada Suhu dan Tekanan Sama

Avogadro melalui percobaannya menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama. Apabila jumlah molekulnya sama maka jumlah molnya sama. Jadi pada suhu dan tekanan yang sama perbandingan mol gas sama dengan perbandingan volume gas. Maka,

$$(T, P) \frac{V_1}{V_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

Molaritas (M)

Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam satu liter larutan.

Rumus Molaritas adalah :

$$M = \frac{\text{Mol zat terlarut}}{\text{liter larutan}}$$

Contoh :

Berapakah molaritas 0.4 gram NaOH ($M_r = 40$) dalam 250 mL larutan ?

Jawab :

$$M = \frac{\left(\frac{0,4}{40}\right) \text{ mol}}{0,25 \text{ liter}}$$

$$= 0,4 \text{ M}$$

E. Normalitas (N)

Normalitas merupakan jumlah mol-ekivalen zat terlarut per liter larutan.

$$N = \frac{\text{jumlahekvivalenzatterlarut}}{1 \text{ liter larutan}}$$

dimana:

$$\text{jumlahekvivalenzatterlarut} = \frac{\text{gramzatterlarut}}{\text{berat ekivalen zat terlarut}}$$

Sehingga:

$$N = \frac{\text{gram zat terlarut}}{\text{berat ekivalen zat terlarut} \times \text{liter larutan}}$$

$$N = \frac{g}{BE \times L}$$

Mol-ekivalen :

Penentuan jumlah mol ekivalen tergantung kepada jenis reaksi yang terjadi.

1. **Asam/basa:** jumlah mol proton/ OH^- yang diperlukan untuk menetralkan satu mol asam / basa.

Berat ekivalen adalah jumlah gram ion H^+ atau OH^- yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan sejumlah berat zat. $BE = \frac{BM}{n}$ dibagi jumlah ion H^+ yang direaksikan atau diikat oleh sebuah molekul zat yang bersangkutan.

$$BE = \frac{BM}{n} \quad \text{atau} \quad BM = n \cdot BE$$

Di mana n adalah jumlah ion H^+ yang dilepaskan oleh sebuah molekul asam atau diikat oleh sebuah molekul bukan asam.

$$1 \text{ ekivalen} = \frac{1}{n} \text{ mol} \text{ atau } 1 \text{ mol} = n. \text{ ekivalen}$$

Contoh :

1 mol Ca(OH)_2 akan dinetralkan oleh 2 mol proton;
 1 mol Ca(OH)_2 setara dengan 1 mol-ekivalen;
 Ca(OH)_2 1M = Ca(OH)_2 2N

Satu liter larutan yang mengandung 36,5 g HCl sama dengan larutan HCl 1 N, dan 1 liter larutan yang mengandung 49,0 g H_2SO_4 sama dengan larutan H_2SO_4 1 N. Suatu larutan yang mengandung 98,1 g H_2SO_4 (1 mol) perliter adalah sama dengan larutan H_2SO_4 2 N jika bereaksi dengan NaOH.

2. **Redoks:** jumlah mol elektron yang dibutuhkan untuk mengoksidasi atau mereduksi suatu unsur

Contoh :

1 mol Fe^{+3} membutuhkan 3 mol elektron untuk menjadi Fe;
 1 mol Fe^{+3} setara dengan 3 mol-ekivalen;
 Fe^{+3} 1 M = Fe^{+3} 3 N atau Fe_2O_3 6 N

Terdapat hubungan antara Normalitas dengan Molaritas, yaitu bahwa larutan 1 normal (1N) ialah larutan yang berisi 1 ekivalen zat terlarut perliter larutan; larutan 1 molar berisi 1 mol zat perliter larutan.

$$1 N = \frac{1}{n} M \text{ atau } 1 M = n.M$$

Karena dalam titrasi biasanya volume diukur dalam mL, maka yang sering digunakan adalah milliequivalen (me) = 10^{-3} ekivalen.

Karena, jumlah ekivalen = N x V (liter)
 Jumlah me = N x V (milliliter)

F. Molalitas (m)

Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut.

Rumus Molalitas adalah :

$$m = \text{mol zat terlarut} \frac{1000}{\text{gram pelarut}}$$

Contoh:

Berapa molalitas 4 g NaOH dalam 500 g air?

Jawab:

$$m = 4/40 \frac{1000}{500}$$
$$= 0,2 \text{ m}$$

G. Fraksi Mol (x)

Fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah total seluruh komponen dalam satu larutan. Fraksi mol total selalu satu. Konsentrasi dalam bentuk ini tidak mempunyai satuan karena merupakan perbandingan.

Contoh :

Suatu larutan terdiri dari 2 mol zat A, 3 mol zat B, dan 5 mol zat C. Hitung fraksi mol masing-masing zat !

Jawab :

$$X_A = 2 / (2+3+5) = 0.2$$

$$X_B = 3 / (2+3+5) = 0.3$$

$$X_C = 5 / (2+3+5) = 0.5$$

$$X_A + X_B + X_C = 1$$

BAB IV

MENGUBAH KONSENTRASI LARUTAN

Kekuatan suatu sediaan farmasi dapat ditingkatkan atau dikurangi dengan mengubah proporsi bahan aktif untuk keseluruhannya. Sediaan A dapat diperkuat atau dibuat lebih pekat dengan penambahan bahan aktif, dengan penambahan sediaan sejenis dengan konsentrasi yang lebih besar, atau melalui penguapan larutan pembawanya jika sediaan berbentuk cairan. Kekuatan sediaan juga dapat dikurangi atau diencerkan dengan penambahan larutan pengencer atau dengan penambahan larutan sejenis dengan konsentrasi yang lebih rendah.

Metode perhitungan untuk perubahan kekuatan sediaan farmasi disajikan dalam bab ini.

A. Pertimbangan Khusus

Pengenceran bentuk sediaan air sebagai larutan atau suspensi dapat dilakukan untuk menghasilkan kekuatan produk yang lebih sesuai untuk digunakan oleh pasien tertentu (misalnya, anak, lansia, dan orang-orang penyakit tertentu). Larutan pengencer dipilih berdasarkan kompatibilitas dengan pembawa sediaan, yaitu air, alkohol, hydroalcoholic, atau lainnya. Pengenceran dari bentuk sediaan padat (sebagai serbuk atau isikapsul) atau bentuk sediaan semi padat (sebagai salep atau cream) juga dapat dilakukan untuk mengubah dosis atau kekuatan produk. Sekali lagi, pengencer dipilih berdasarkan kompatibilitas dengan formula aslinya. Apoteker juga dapat menemukan cara untuk mengencerkan asam pekat, sediaan alkohol, atau bahan obat yang sangat kuat, seperti yang dibahas dalam bab ini, untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam peracikan.

Peningkatan konsentrasi sediaan cair, misalnya melalui penguapan sebagian pelarut atau pembawanya, jarang dilakukan saat ini. Namun, fortifikasi bentuk sediaan sediaan cair, padat, atau setengah padat, dengan penambahan sejumlah tertentu bahan obat, tetap layak dilakukan dalam praktek peracikan farmasi.

B. Hubungan antara Kekuatan dengan Jumlah Total Sediaan

Jika suatu campuran dengan persentase atau rasio kekuatan yang diberikan diencerkan dua kali dari jumlah aslinya, maka bahan aktif yang terkandung di dalamnya menjadi terbagi dua kali sebagaimana jumlah keseluruhannya, sehingga kekuatannya akan berkurang setengahnya. Sebaliknya, jika campuran dipekatkan dengan penguapan sampai setengah kuantitas awalnya, maka bahan aktif (dengan asumsi tidak ada yang hilang oleh penguapan) akan terkandung di dalamnya menjadi satu kali dari setengah bagiandari keseluruhan, dan kekuatannya menjadi dua kali lipat. Jadi, jika 50 ml larutan yang mengandung 10g bahan aktif dengan kekuatan 20% atau 1:5b/v diencerkan menjadi 100 mL, maka volume awal menjadi dua kali lipat, tetapi kekuatan asli sekarang dikurangi setengahnya menjadi 10% atau 1:10b/v. Jika dengan penguapan pelarut, volume larutan dikurangi menjadi 25 mL atau separuh jumlah awalnya, maka 10g bahan aktif akan menunjukkan kekuatan 40% atau 1:2,5b/v.

Dengan demikian, jumlah bahan aktif tetap konstan, maka setiap perubahan dalam jumlah larutan atau campuran padatan berbanding terbalik dengan persentase kekuatan atau rasio, di mana persentase atau rasio kekuatan akan menurun dengan meningkatnya jumlah keseluruhan, dan demikian pula sebaliknya. Hubungan ini umumnya berlaku untuk semua campuran kecuali larutan yang mengandung komponen yang berlawanan bila dicampur bersama-sama.

Permasalahan dalam bagian ini umumnya dapat diselesaikan dengan salah satu metode berikut:

1. Perbandingan terbalik
2. Persamaan: $V_1 \cdot K_1 = V_2 \cdot K_2$
3. Dengan menentukan jumlah bahan aktif (zat terlarut) yang ada atau yang diinginkan dan menghubungkannya dengan jumlah sediaan yang diketahui atau diinginkan.

C. Pengenceran dan Pemekatan Cairan

Contoh Perhitungan

1. Jika 500 mL larutan dengan konsentrasi 15% v/v diencerkan menjadi 1500 mL, berapakah persentase kekuatannya (v/v)?

Jawab:

$$\frac{1500 \text{ mL}}{500 \text{ mL}} = \frac{15\%}{x\%}$$
$$x = 5\%$$

atau,

$$V1 \times C1 = V2 \times C2$$
$$500 \text{ mL} \times 15\% = 1500 \text{ mL} \times x\%$$
$$x = 5\%$$

atau,

500 mL larutan 15 % mengandung 75 mL solut

$$\frac{1500 \text{ mL}}{75 \text{ mL}} = \frac{100\%}{x\%}$$
$$x = 5\%$$

2. Jika 50 mL larutan 1:20 b/v diencerkan menjadi 1000 mL, berapa rasio kekuatannya (b/v)?

Jawab:

Catatan: akan lebih mudah menyelesaikan soal ini dengan mengkonversi rasio kekuatannya menjadi bentuk persen.

$$1 : 20 = 5\%$$
$$\frac{1000 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} = \frac{5\%}{x\%}$$
$$x = 0,25\% ; = 1 : 400$$

atau,

$$V1 \times C1 = V2 \times C2$$
$$50 \text{ mL} \times 5\% = 1000 \text{ mL} \times x\%$$
$$x = 0,25\% = 1:400$$

atau,

50 mL larutan 1:20 mengandung solut 2,5 g

$$\frac{2,5 \text{ g}}{1 \text{ g}} = \frac{1000 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$
$$x = 400 \text{ mL}$$

Jadi, Rasio = 1:400

3. Jika suatu sediaan sirup mengandung 65% b/v sukrosa diuapkan hingga volumenya menjadi 85%, berapa persen b/v sukrosa yang terkandung?

Jawab:

Misalkan, volume awal sirup adalah 100 mL. Jika 100 mL sirup diuapkan hingga 85%, maka volume akhir adalah 85 mL.

$$\frac{85 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} = \frac{65\%}{x\%}$$
$$x = 76,47\% \text{ atau } 76\%$$

4. Berapa gram dari larutan ammonia 10% b/b yang dapat dibuat dari 1800 g larutan stok ammonia 28%?

Jawab:

$$\frac{10\%}{28\%} = \frac{1800 \text{ g}}{x \text{ g}}$$
$$x = 4050 \text{ g}$$

atau,

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$
$$1800 \text{ g} \times 28\% = x \text{ g} \times 10\%$$
$$x = 5040 \text{ g}$$

atau, 1800 g larutan ammonia 28% mengandung 504 g ammonia (100%)

$$\frac{10\%}{100\%} = \frac{504 \text{ g}}{x \text{ g}}$$
$$x = 5040 \text{ g}$$

5. Berapa milliliter dari larutan 1 : 5000 b/v preservatif lauralkonium korida yang dapat dibuat dari 125 mL larutan 0,2%?

Jawab:

$$1 : 5000 = 0,02\%$$
$$\frac{0,02\%}{0,2\%} = \frac{125 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$
$$x = 1250 \text{ mL}$$

atau,

$$0,2\% = 1 : 500$$
$$\frac{1/5000}{1/500} = \frac{125 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$
$$x = 1250 \text{ mL}$$

atau,

125 mL larutan 0,2% mengandung 0,25 g lauralkonium klorida

$$\frac{1 \text{ g}}{0,25 \text{ g}} = \frac{5000 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$
$$x = 1250 \text{ mL}$$

atau,

$$125 \text{ mL} \times 0,2 \% = x \text{ mL} \times 0,02\%$$
$$x = 1250 \text{ mL}$$

6. Jika satu galon larutan 30% b/v diuapkan sehingga larutan menjadi 50% b/v. Berapa volume larutan dalam milliliter?

Jawab:

$$1 \text{ galon} = 3785 \text{ mL}$$
$$\frac{50\%}{30\%} = \frac{3785 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$
$$x = 2271 \text{ mL}$$

D. Pemekatan Produk Farmasi

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa suatu saat seorang farmasis dapat melakukan pemekatan suatu produk farmasi. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan zat aktif atau dengan mencampurkan sejumlah tertentu produk sejenis dengan kekuatan atau konsentrasi yang lebih besar. Jenis perhitungan yang ditampilkan bagian akhir sebelumnya disebut sebagai pemekatan.

Jika seorang farmasis menerima resep suspensi cefuroxime acetil 100 ml yang mengandung 300 mg obat dalam setiap 5 mL. Sementara farmasis ini memiliki suspensi cefuroxime 250 mg/5 mL dan tablet 250 mg. Berapa banyak tablet yang haru diserbukkan dan ditambahkan ke dalam suspensi untuk memperoleh kekuatan yang diinginkan sesuai resep?

Farmasis tersebut mendapati bahwa setelah penambahan serbuk tablet, volume suspensi menjadi 10 mL. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa meskipun resep obat ini memiliki kekuatan 300 mg/mL, ternyata diperoleh 294,1 mg/mL. Apa yang harus dilakukan oleh farmasis ini untuk memperoleh suspensi dengan kekuatan yang diinginkan?

Contoh:

1. Jika suatu sirup obat batuk yang setiap sendok tehnya mengandung 1 mg klorfeniramin maleat ingin ditingkatkan kekuatannya hingga 2 kali lipat. Berapa milligram zat aktif yang perlu ditambahkan ke dalam wadah sirup 60 mL, dengan asumsi tidak ada peningkatan volume.

Jawab:

$$\frac{1 \text{ mg}}{5 \text{ mL}} \times 60 \text{ mL} = 12 \text{ mg klorfeniramin maleat dalam sirup.}$$

Untuk meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat, maka dibutuhkan penambahan 12 mg klorfeniramin maleat.

E. Larutan Stok

Larutan stok adalah larutan dengan konsentrasi yang pekat dari zat aktif (obat) atau zat inaktif (misalnya; pewarna) dan digunakan untuk penyiapan larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah.

Contoh Perhitungan

1. Berapa milliliter dari larutan stok 1:400 b/v yang digunakan untuk membuat 4 liter larutan 1 : 2000 w/v?

Jawab:

$$4 \text{ liter} = 4000 \text{ mL}$$

$$1 : 400 = 0,25\%$$

$$1 : 2000 = 0,05\%$$

$$\frac{0,25\%}{0,05\%} = \frac{4000 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$

$$x = 800 \text{ mL}$$

atau,

4000 mL larutan 1 : 2000 membutuhkan 2 g zat aktif (solut), maka:

$$\frac{1 \text{ g}}{2 \text{ g}} = \frac{400 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$

$$x = 800 \text{ mL}$$

atau,

$$V1 \times C1 = V2 \times C2$$

$$4000 \text{ mL} \times 0,25\% = V2 \times 0,05\%$$

$$V2 = 800 \text{ mL}$$

2. Berapa milliliter dari larutan stok 1:400 b/v yang harus digunakan untuk menyiapkan 1 gallon larutan 1:2000 b/v?

Jawab:

$$\begin{aligned}
 1 \text{ gallon} &= 3785 \text{ mL} \\
 1 : 400 &= 0,25\% \\
 1 : 2000 &= 0,05\% \\
 \frac{0,25\%}{0,05\%} &= \frac{3875 \text{ mL}}{x \text{ mL}} \\
 x &= 757 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

atau,

1 gallon larutan 1 : 2000 b/v membutuhkan 1,89 g bahan aktif, maka:

$$\begin{aligned}
 \frac{1,89 \text{ g}}{1 \text{ g}} &= \frac{x \text{ mL}}{400 \text{ mL}} \\
 x &= 757 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

3. Berapa milliliter larutan stok 1% pewarna merah yang harus digunakan untuk menyiapkan 4000 mL *mouthwash* yang mengandung 1 : 20.000 b/v bahan pewarna tersebut?

Jawab:

$$\begin{aligned}
 1 : 20.000 &= 0,005\% \\
 \frac{1\%}{0,005\%} &= \frac{4000 \text{ mL}}{x \text{ mL}} \\
 x &= 20 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

atau,

4000 mL larutan 1 : 20.000 b/v membutuhkan 0,2 g pewarna, maka:

$$\begin{aligned}
 \frac{1 \text{ g}}{0,2 \text{ g}} &= \frac{100 \text{ mL}}{x \text{ mL}} \\
 x &= 20 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

4. Berapa milliliter larutan natrium hipoklorit 1:16 yang digunakan untuk menyiapkan larutan 0,5% sebanyak 5000 mL?

Jawab:

$$1 : 16 = 6,25\%$$

$$\frac{6,25\%}{0,5\%} = \frac{5000 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$

$$x = 400 \text{ mL}$$

atau,
5000 mL larutan 0,05% b/v membutuhkan 25 g natrium hipoklorit, maka:

$$\frac{25 \text{ g}}{1 \text{ g}} = \frac{x \text{ mL}}{16 \text{ mL}}$$

$$x = 400 \text{ mL}$$

5. Berapa milliliter larutan stok fenilferin HCl 1:50 yang harus digunakan dalam peracikan resep berikut ini:
R/ Phenylephrine HCl 0,25%
Rose water ad 30 mL
Sig. For the nose

Jawab:

$$\frac{1 : 50}{0,25\%} = \frac{2\%}{x \text{ mL}}$$

$$x = 3,75 \text{ mL}$$

atau,

30 g x 0,0025 = 0,075 g fenilefrin HCl yang dibutuhkan.

1 : 50 berarti 1 g dalam 50 mL larutan stok

$$\frac{1 \text{ g}}{0,075 \text{ g}} = \frac{50 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$

$$x = 3,75 \text{ mL}$$

Perhitungan yang menarik digunakan dalam praktek farmasi di mana kekuatan dari bagian larutan yang diencerkan telah ditentukan, tetapi kekuatan larutan stok yang pekat yang digunakan untuk menyiapkannya harus ditentukan. Sejalan dengan hal tersebut, praktek kefarmasian dapat menjelaskan, misalnya dalam hal dibutuhkan untuk menyiapkan dan mencampurkan suatu larutan pekat dari obat dan diberikan kepada pasien untuk digunakan dengan ukuran tertentu (misalnya 1 sendok teh) dalam sejumlah tertentu volume air (misalnya 1 cangkir) untuk menyiapkan larutan dengan konsentrasi yang diinginkan (misalnya untuk pencuci atau

merendam). Hal ini dimungkinkan untuk menyiapkan larutan dalam volume yang relatif kecil dan pasien dapat menyiapkannya dalam volume yang relatif besar sesuai kebutuhan daripada pasien harus membawa ke rumah larutan yang telah diencerkan dalam volume besar oleh farmasis.

6. Berapa banyak obat yang digunakan untuk menyiapkan 50 mL larutan di mana 5 mL akan diencerkan menjadi 500 mL hingga diperoleh larutan 1 : 1000?

Jawab:

1 : 1000 berarti 1 g obat dalam 1000 mL larutan

$$\frac{1000 \text{ mL}}{500 \text{ mL}} = \frac{1 \text{ g}}{x \text{ g}}$$

$x = 0,5$ g obat dalam 500 mL larutan (1:1000), di mana jumlah tersebut terdapat dalam 5 mL larutan stok.

Dan,

$$\frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} = \frac{0,5 \text{ g}}{y \text{ g}}; \rightarrow y = 5 \text{ g}$$

7. Berapa gram natrium klorida yang digunakan untuk menyiapkan 500 mL larutan stok di mana bila 50 mL larutan tersebut diencerkan menjadi 1000 mL akan menghasilkan larutan "1/3 normal salin" (0,3% b/v)

Jawab:

$1000 \text{ mL} \times 0,003 = 0,3 \text{ g}$ natrium klorida dalam 1000 mL "1/3 normal salin" (0.3% b/v), jumlah ini merupakan jumlah yang terkandung dalam 50 mL larutan stok yang akan dibuat.

dan,

$$\frac{50 \text{ mL}}{500 \text{ mL}} = \frac{3 \text{ g}}{x \text{ g}}$$

$x = 30 \text{ g}$.

8. Berapa milliliter larutan pekat 17%b/v benzalkonium klorida yang digunakan untuk menyiapkan 300 mL larutan stok yang

setiap 15 mL yang diencerkan menjadi 1 liter akan menghasilkan larutan 1 : 5000?

Jawab:

1 liter = 1000 mL
 1 : 5000 berarti 1 g benzalkonium klorida dalam 5000 mL larutan.

$$\frac{5000 \text{ mL}}{1000 \text{ mL}} = \frac{1 \text{ g}}{x \text{ g}}$$

$$x = 0,2 \text{ g}$$

0,2 g benzalkonium klorida dalam 1000 mL dari larutan yang diencerkan 1 : 5000, jumlah ini juga terdapat dalam 15 mL larutan stok yang akan dibuat, dan:

$$\frac{15 \text{ mL}}{300 \text{ mL}} = \frac{0,2 \text{ g}}{y \text{ g}}$$

$$y = 4 \text{ g benzalkonium klorida,}$$

karena larutan pekat 17% mengandung 17 g per 100 mL, maka:

$$\frac{17 \text{ g}}{4 \text{ g}} = \frac{100 \text{ mL}}{z \text{ mL}}$$

$$z = 23,5 \text{ mL}$$

Suatu larutan dengan kekuatan dan volume diketahui dapat diencerkan dengan air untuk membuat larutan dengan kekuatan yang lebih kecil. Dalam perhitungan, pertama kali yang dihitung adalah jumlah larutan encer yang dibuat dari larutan pekat. Kemudian, kurangi volume dari larutan pekat dari jumlah total yang akan dibuat untuk menentukan volume air yang dibutuhkan.

9. Berapa milliliter air yang harus ditambahkan ke dalam 300 mL larutan 1 : 750 b/v benzalkonium klorida untuk membuat larutan 1 : 2500?

Jawab:

$$1 : 2500 = 0,04 \%$$

$$1 : 750 = 0,133 \%$$

$$\frac{0,04\%}{0,133\%} = \frac{300 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$

$x = 997,5 \text{ mL}$ atau 1000 mL larutan 0,04% b/v yang akan dibuat.

Perbedaan antara volume larutan encer yang dibuat dan volume larutan pekat yang digunakan merupakan volume air (pengencer) yang digunakan.

$$1000 \text{ mL} - 300 \text{ mL} = 700 \text{ mL}$$

10. Berapa milliliter air yang harus ditambahkan ke dalam 1 pint larutan 5% b/v untuk membuat larutan konsentrasi 2% b/v?

Jawab:

$$\begin{aligned} 1 \text{ pint} &= 473 \text{ mL} \\ \frac{2\%}{5\%} &= \frac{473 \text{ mL}}{x \text{ mL}} \\ x &= 1182,5 \text{ mL} \end{aligned}$$

dan,

$$1182,5 \text{ mL} - 473 \text{ mL} = 709,5 \text{ mL}$$

Jika jumlah komponen yang diberikan lebih rendah dari larutan pekat, maka larutan dapat diencerkan untuk memperoleh kekuatan sebagaimana ditunjukkan dalam contoh berikut ini:

11. Berapa milliliter air yang ditambahkan ke dalam 375 mL larutan yang mengandung 0,5 g benzalkonium klorida untuk membuat larutan 1 : 5000?

Jawab:

1 : 5000 berarti 1 g dalam 5000 mL larutan

$$\frac{1 \text{ g}}{0,5 \text{ g}} = \frac{5000 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$

$x = 2500 \text{ mL}$ dari larutan 1 : 5000 b/v yang mengandung 0,5 g benzalkonium klorida

dan,

$$2500 \text{ mL} - 375 \text{ mL} = 2125 \text{ mL}$$

12. Jika 15 mL ATROVENT 0,06% (ipatropium bromida) nasal spray diencerkan dengan 6 mL larutan normal salin, berapa konsentrasi akhir dari obat?

Jawab:

$$15 \text{ mL} \times 0,065 = 0,009 \text{ g ipatropium bromida}$$

$$15 \text{ mL} + 6 \text{ mL} = 21 \text{ mL, volume total yang baru}$$

$$\frac{0,009 \text{ g}}{21 \text{ mL}} \times 100 = 0,043\%$$

Atau,

$$15 \text{ mL} \times 0,06\% = 21 \text{ mL} \times x\%$$

$$x = 0,043\%$$

F. Pengenceran Alkohol

Contoh Perhitungan Pengenceran Alkohol

Bila air dan alkohol dicampurkan, maka terjadi kontraksi fisika seperti perubahan volume yang dihasilkan lebih kecil daripada volume total masing-masing cairan tersebut. Kemudian, untuk membuat pengenceran alkohol dengan kekuatan volume dalam volume (v/v), maka alkohol yang terlarut dapat ditentukan dan air yang digunakan adalah "q.s" untuk menyesuaikan volumenya. Oleh karena kontraksi dari cairan tidak mempengaruhi bobot komponen, maka berat air (dan dari sini diketahui volumenya) yang dibutuhkan untuk mengencerkan alkohol menjadi kekuatan berat dalam berat (b/b) dapat dihitung.

Contoh:

1. Berapa banyak air yang harus dicampurkan dengan 5000 mL alkohol 85% v/v untuk membuat alkohol 50% v/v?

Jawab:

$$\frac{50\%}{85\%} = \frac{5000 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$

$$x = 8500 \text{ mL}$$

atau,

$$5000 \text{ mL} \times 85\% = x \text{ L} \times 50\%$$

$$x = 8500 \text{ mL}$$

sehingga, digunakan 5000 mL alkohol 85% dan ditambahkan air hingga diperoleh 8500 mL.

2. Berapa milliliter alkohol 95% v/v dan berapa banyak air yang digunakan untuk mencampur keduanya menurut resep berikut?

R/ Xcaine 1 g
 Alkohol 70% 30 mL
 Sig. Ear drops

Jawab:

$$\frac{95\%}{70\%} = \frac{30 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$
$$x = 22,1 \text{ mL}$$

sehingga, digunakan 22,1 mL alkohol 95% dan air secukupnya untuk membuat larutan 30 mL.

3. Berapa banyak air yang harus ditambahkan ke dalam 4000 g alkohol 90% b/b untuk membuat alkohol 40% b/b?

Jawab:

$$\frac{40\%}{90\%} = \frac{4000 \text{ g}}{x \text{ g}}$$

$x = 9000 \text{ g}$, berat alkohol 40% b/b setara dengan 4000 g alkohol 90% B/B.

$9000 - 4000 \text{ g} = 5000 \text{ g}$ atau 5000 mL.

G. Pengenceran Asam

Kekuatan dari asam standar yang tidak diencerkan (pekat) diekspresikan dalam persen bobot per bobot. Misalnya, asam hidroklorida NF, mengandung tidak kurang dari 36,5 % dan tidak lebih dari 38% bobot per bobot HCl. Bagaimanapun juga, kekuatan dari asam standar encer dinyatakan sebagai persen bobot per volume. Misalnya, asam klorida encer NF, tiap 100 ml mengandung tidak kurang dari 9,5 dan tidak lebih dari 10,5 g HCl.

Adalah penting untuk mengetahui bobot jenis spesifik dari asam pekat dalam perhitungan volume yang akan digunakan dalam pembuatan sejumlah tertentu asam encer.

Contoh Perhitungan

1. Berapa milliliter dari asam hidroklorida 37% dengan berat jenis 1,20 yang dibutuhkan untuk membuat 1000 mL larutan HCl 10%?

Jawab:

$1000 \times 0,10 = 100 \text{ g HCl (100\%)}$ dalam 1000 mL larutan 10% b/v

$$\frac{37\%}{100\%} = \frac{100\text{ g}}{x\text{ g}}$$

$$x = 270\text{ g asam } 37\%$$

$$270\text{ g air} = 270\text{ mL}$$

$$270\text{ mL} \div 1,20 = 225\text{ mL}$$

2. Berapa milliliter asam fosfat 85% b/b dengan berat jenis 1,71 yang harus digunakan untuk menyiapkan 1 gallon asam fosfat 1/4% b/v?

Jawab:

$$1\text{ gallon} = 3785\text{ mL}$$

$$3785\text{ g} \times 0,0025 = 9,46\text{ g H}_3\text{PO}_4\text{ (100\%)}\text{ dalam } 3785\text{ mL (1 gallon)}\text{ larutan } 1/4\% \text{ b/v.}$$

$$\frac{85\%}{100\%} = \frac{9,46\text{ g}}{x\text{ g}}$$

$$x = 11,13\text{ g asam fosfat } 85\%.$$

$$11,13\text{ g air} = 11,13\text{ mL}$$

$$11,13\text{ mL} \div 1,71 = 6,5\text{ mL}$$

H. Pengenceran dan Fortifikasi Sediaan Padat dan Semipadat

Pengenceran sediaan padat dalam farmasi diperlukan bilamana dibutuhkan konsentrasi zat aktif yang lebih rendah dari sediaan yang konsentrasinya lebih tinggi. Jenis pengenceran untuk sediaan padat ini disebut dengan istilah triturasi.

Mengurangi atau meningkatkan kekuatan krim atau salep merupakan hal yang umum dalam praktek farmasi sesuai dengan kebutuhan pasien.

Contoh Perhitungan

1. Jika 30 g salep hidrokortison 1% diencerkan dengan 12 g vaselin, berapa konsentrasi hidrokortison dalam campuran?

Jawab:

$$30\text{ g} \times 1\% = 0,3\text{ g hidrokortison}$$

$$30 \text{ g} + 12 \text{ g} = 42 \text{ g, berat campuran}$$

$$\frac{0,3 \text{ g}}{42 \text{ g}} \times 100 = 0,71\% \text{ b/b}$$

Atau,

$$30 \text{ g} \times 1\% = 42 \text{ g} \times x\%$$

$$x = 0,71\%$$

2. Berapa gram salep benzokain 20% dan berapa gram basis salep yang harus ditambahkan untuk membuat salep benzokain 2,5 % sebanyak 5 lb.?

Jawab:

$$5 \text{ lb.} = 454 \text{ g} \times 5 = 2270 \text{ g}$$

$$\frac{20\%}{2,5\%} = \frac{2270 \text{ g}}{x \text{ g}}$$

$$x = 283,75 \text{ atau } 284 \text{ g salep } 20\%, \text{ dan}$$

$$2270 \text{ g} - 284 \text{ g} = 1986 \text{ g basis salep.}$$

Atau,

$$5 \text{ lb.} = 454 \text{ g} \times 5 = 2270 \text{ g}$$

$$2270 \text{ g} \times 2,5\% = 56,75 \text{ g benzocain yang dibutuhkan}$$

$$\frac{20 \text{ g}}{56,75 \text{ g}} = \frac{100 \text{ g}}{x \text{ g}}$$

$$x = 283,75 \text{ atau } 284 \text{ g salep } 20\%, \text{ dan}$$

$$2270 \text{ g} - 284 \text{ g} = 1986 \text{ g basis salep.}$$

3. Berapa gram zink oksida yang ditambahkan ke dalam 3200 g salep zink oksida 5% untuk menyiapkan salep yang mengandung 20% zink oksida?

Jawab:

$$3200 \text{ g} \times 0,05 = 160 \text{ g zink oksida dalam } 3200 \text{ g salep } 5\%$$

$$3200 \text{ g} - 160 \text{ g} = 3040 \text{ g basis dalam } 3200 \text{ g salep } 5\%$$

Dalam 20% salep, basis yang terdapat adalah 80% dari berat totalnya.

$$\frac{80\%}{20\%} = \frac{3040 \text{ g}}{x \text{ g}}$$

$$x = 760 \text{ g zink oksida dalam salep } 20\%$$

karena salep 5 % mengandung 160 g zink oksida, maka

$$760 \text{ g} - 160 \text{ g} = 600 \text{ g}$$

Metode yang lebih sederhana untuk menyelesaikan soal ini dapat digunakan jika kita dapat membayangkan:

4. Berapa gram zink oksida yang akan ditambahkan ke dalam 3200 g zink oksida salep yang mengandung 95% basis untuk membuat salep yang mengandung 80% basis salep?

Jawab:

$$\frac{80\%}{95\%} = \frac{3200 \text{ g}}{x \text{ g}}$$

$x = 3800 \text{ g}$ salep mengandung 80% basis dan 20% zink oksida.

$$3800 \text{ g} - 3200 \text{ g} = 600 \text{ g.}$$

I. Triturasi

Triturasi adalah pengenceran dari bahan obat yang poten. Jenis obat ini tersedia sebagai sediaan standar dan akan dibuat dengan mengencerkan 1 bagian berat dari obat ini dengan 9 bagian serbuk laktosa. Sehingga menjadi campuran 10% atau 1 : 10.

Metode pengenceran ini menawarkan cara untuk memperoleh sejumlah kecil obat poten yang akurat dan sesuai untuk tujuan peracikan. Meskipun tidak dalam metode standar, secara sederhana, triturasi merupakan suatu metode untuk perhitungan dan penggunaan pengenceran obat padat dalam prosedur compounding dan manufakturing.

Contoh produk untuk triturasi saat ini adalah MUSTARGEN (mechlorethamine hydrochloride *for injection*) yang mengandung 10 mg obat yang sangat toksik yang ditriturasi dengan 90 mg natrium klorida. Triturasi dilarutkan dalam air steril untuk injeksi atau dalam natrium klorida injeksi sebelum penggunaan.

Catatan: Istilah triturasi yang digunakan dalam konteks ini tidak harus membingungkan dengan istilah triturasi yang digunakan dalam proses reduksi ukuran partikel senyawa obat menjadi partikel halus dengan cara penggerusan dalam mortar dan stanfer.

Contoh Perhitungan Triturasi

1. Berapa gram suatu tablet triturasi 1 : 10 yang dibutuhkan untuk memperoleh 25 mg obat?

Jawab:

10 g triturasi mengandung 1 g obat

$$25 \text{ mg} = 0,025 \text{ g}$$

$$\frac{1 \text{ g}}{0,025 \text{ g}} = \frac{10 \text{ g}}{x \text{ g}}$$

$$x = 0,25 \text{ g}$$

2. Berapa milliliter dari suatu injeksi yang dibuat dengan melarutkan 100 mg triturasi 1 : 10 mechlorothamine hydrochloride dalam air untuk injeksi untuk membuat injeksi 10 mL yang mengandung 5 mg obat?

Jawab:

100 mg triturasi = 10 mg obat

10 mg obat dalam 10 mL injeksi

$$\frac{10 \text{ mg}}{5 \text{ mg}} = \frac{10 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$

$$x = 5 \text{ mL}$$

3. Berapa milligram colchicine encer 1:10 yang digunakan oleh farmasis untuk membuat 100 kapsul untuk studi klinik obat bila setiap kapsulnya mengandung 0,5 mg colchicine?

Jawab:

0,5 mg x 100 = 50 mg colchicine yang dibutuhkan

10 mg colchicine encer mengandung 1 mg colchicine

$$\frac{1 \text{ mg}}{50 \text{ mg}} = \frac{10 \text{ mg}}{x \text{ mg}}$$

$$x = 500 \text{ mg}$$

J. Aligasi

Aligasi adalah suatu metode aritmetika dari penyelesaian masalah-masalah yang mencakup proses pencampuran larutan atau padatan dengan konsentrasi yang berbeda.

Aligasi Medial. Aligasi medial adalah metode aligasi dengan menggunakan "berat rata-rata" persentase kekuatan dari dua campuran atau lebih dari jumlah yang diketahui dan konsentrasinya dapat dihitung dengan mudah. Dengan metode ini, persentase kekuatan dari setiap komponen yang dinyatakan dalam pecahan desimal, dikalikan dengan jumlahnya, kemudian jumlah produk dibagi dengan jumlah total campuran, dan hasilnya berupa pecahan desimal dibagi 100 untuk memperoleh persentase kekuatan dari campuran. Tentu saja, jumlah harus dinyatakan dalam denominasi yang umum, seperti berat atau volume.

Contoh Perhitungan Aligasi

1. Berapa persen v/v alkohol dalam campuran 3000 mL alkohol 40% v/v, 1000 mL alkohol 60% v/v dan 1000 mL alkohol 70% v/v? Dengan asumsi tidak ada kontraksi volume setelah pencampuran.

Jawab:

$$0,40 \times 3000 \text{ mL} = 1200 \text{ mL}$$

$$0,60 \times 1000 \text{ mL} = 600 \text{ mL}$$

$$0,70 \times 1000 \text{ mL} = 700 \text{ mL}$$

$$\text{Total: } 5000 \text{ mL} = 2500 \text{ mL}$$

$$2500 \text{ mL} \div 5000 \text{ mL} = 0,50 \times 100 = 50\%$$

2. Berapa persen zink oksida dalam salep yang dibuat dengan mencampurkan 200 g salep 10%, 50 g salep 20 % dan 100 g salep 5%?

Jawab:

$$0,10 \times 200 \text{ g} = 20 \text{ g}$$

$$0,20 \times 50 \text{ g} = 10 \text{ g}$$

$$0,05 \times 100 \text{ g} = 5 \text{ g}$$

$$\text{Total} = 350 \text{ g} = 35 \text{ g}$$

$$35 \text{ g} \div 350 \text{ g} = 0,10 \times 100 = 10\%$$

Dalam beberapa kasus, penambahan pelarut atau pembawa perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini, lebih baik menggunakan pengencer dengan kekuatan nol persen, sebagaimana dalam contoh berikut:

3. Berapa persen lakohol dalam campuran 500 mL larutan yang mengandung 40% v/v alkohol, 400 mL larutan kedua yang mengandung 21% v/v alkohol, sejumlah larutan nonalkoholik untuk membuat larutan 1000 mL?

Jawab:

$$0,40 \times 500 \text{ mL} = 200 \text{ mL}$$

$$0,21 \times 400 \text{ mL} = 84 \text{ mL}$$

$$0 \times 100 \text{ mL} = 0 \text{ mL}$$

$$\text{Total : } 1000 \text{ mL} = 284 \text{ mL}$$

$$284 \text{ mL} \div 1000 \text{ mL} = 0,284 \times 100 = 28,4\%$$

Aligasi Alternatif. Aligasi alternatif adalah metode di mana kita dapat menghitung jumlah bagian dari dua atau lebih komponen dengan kekuatan tertentu ketika keduanya dicampurkan untuk membuat suatu campuran dengan kekuatan yang diinginkan. Proporsi akhir memungkinkan kita untuk menentukan bagiannya menjadi denominasi yang spesifik.


Kekuatan dari campuran harus berada diantara kekuatan dari komponen-komponennya. Sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya, kekuatan dari campuran akan selalu berupa berat rata-rata, sehingga kekuatan campuran akan berada di dekat konsentrasi yang lebih rendah atau sebaliknya, tergantung jumlah relatif yang digunakan dalam campuran.

Berat rata-rata ini dapat ditemukan dengan sebuah skema sederhana, seperti yang digambarkan berikut.

Contoh Perhitungan

1. Berapa proporsi alkohol 95% dan 50% yang akan dicampurkan untuk membuat alkohol 70%?

Catatan: perbedaan antara kekuatan komponen yang lebih tinggi (95%) dan kekuatan yang diinginkan (70%) mengindikasikan jumlah bagian dari komponen yang lebih lemah yang akan digunakan (25 bagian), dan perbedaan antara kekuatan yang diinginkan (70%) dan komponen yang lebih lemah (50%) mengindikasikan jumlah bagian terkuat yang akan digunakan (20 bagian).



Secara matematis, validitas dari hubungan ini dapat ditunjukkan:

Percent given	Percent desired	Proportional parts required
a		x
b	c	y

Dari data yang diberikan, rasio dari x terhadap y dapat diturunkan secara aljabar menurut:

$$\begin{aligned}
 ax + by &= c(x + y) \\
 ax + by &= cx + cy \\
 ax - cx &= cy - by \\
 x(a - c) &= y(c - b) \\
 \frac{x}{y} &= \frac{c - b}{a - c}
 \end{aligned}$$

Data yang diberikan:

a = 95%, b = 50%, dan c = 70%, maka:

$$0,95x + 0,50y = 0,70(x + y)$$

Atau,

$$\begin{aligned}
 95x + 50y &= 70x + 70y \\
 95x - 70x &= 70y - 50y \\
 x(95 - 70) &= y(70 - 50)
 \end{aligned}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{70 - 50}{95 - 70} = \frac{20}{25} = \frac{4 \text{ bagian}}{5 \text{ bagian}}$$

Hasil ini dapat ditunjukkan dengan cara aligasi medial:

$$\begin{array}{r} 95 \times 4 = 380 \\ 50 \times 5 = 250 \\ \text{Total: } \quad 9 = 630 \\ 630 \div 9 = 70\% \end{array}$$

K. Berat Jenis Campuran

Metode untuk aligasi medial dan aligasi alternatif dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang mencakup berat jenis dari jumlah yang berbeda dari cairan dengan berat jenis yang diketahui, tanpa adanya perubahan volume ketika cairan dicampurkan dan dengan demikian campuran ini dapat diukur dalam denominasi umum dari volume.

Contoh Perhitungan

1. Berapa berat jenis campuran dari 1000 mL sirup dengan berat jenis 1,300, 400 mL gliserin dengan berat jenis 1,250 dan 1000 mL eliksir dengan berat jenis 0,950?

Jawab:

$$\begin{array}{r} 1,300 \times 1000 = 1300 \\ 1,250 \times 400 = 500 \\ 0,950 \times 1000 = 950 \\ \text{Total : } 2400 = 2750 \\ 2750 \div 2400 = 1,146 \end{array}$$

2. Berapa proporsi gliserin dengan berat jenis 1,25 dan air yang akan dicampurkan untuk membuat campuran dengan berat jenis 1,10?

Jawab:

$$\begin{array}{l|l|l} 1.25 & 1.10 & 0.10 \text{ parts of glycerin} \\ 1.00 & & 0.15 \text{ parts of water} \end{array}$$

Jumlah relatif : 1,10 : 0,15, atau 2 : 3

3. Berapa milliliter dari masing-masing cairan dengan berat jenis 0,950 dan 0,875 yang harus digunakan untuk menyiapkan 1500 mL cairan dengan berat jenis 0,925?

Jawab:

0.950	0.925	0.050, or 50 parts of liquid with specific gravity of 0.950
0.875		0.025, or 25 parts of liquid with specific gravity of 0.875

Jumlah relatif : 50 : 25, atau 2 : 1, total bagian 3

$$\frac{3 \text{ bagian}}{2 \text{ bagian}} = \frac{1500 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$

$x = 1000$ mL cairan dengan berat jenis 0,950, dan

$$\frac{3 \text{ bagian}}{1 \text{ bagian}} = \frac{1500 \text{ mL}}{y \text{ mL}}$$

$y = 500$ mL cairan dengan berat jenis 0,875

BAB V

KERAPATAN, BERAT JENIS DAN VOLUME JENIS

A. Kerapatan (densitas)

Kerapatan (d) adalah massa persatuan volume dari suatu zat. Kerapatan biasanya dinyatakan sebagai gram persentimeter kubik (g/cc). Karena gram didefinisikan sebagai massa 1 cc air pada 4°C , Kerapatan air 1g/cc . Untuk tujuan ini, karena farmakopem menyatakan bahwa 1 mL adalah setara dengan 1 cc, maka kerapatan air dapat dinyatakan sebagai 1g/mL . Sebaliknya, satu mililiter akselerasi bobot 13,6g, maka, kepadatan adalah $13,6\text{g/mL}$.

Kerapatan dapat dihitung dengan membagikan massa terhadap volume.

$$\text{kerapatan} = \frac{\text{massa}}{\text{volume}}$$

Sehingga, jika 10 mL asam sulfat beratnya sama dengan 18 gram, maka densitasnya:

$$\text{kerapatan} = \frac{18 \text{ g}}{10 \text{ ml}} = 1,8 \text{ gram permililiter}$$

B. Berat jenis


Berat spesifik adalah rasio yang dinyatakan dalam angka desimal dari berat zat dengan berat dari volume yang sama dari suatu zat standar pada suhu yang sama atau suhu tertentu. Air digunakan sebagai standar untuk berat jenis cairan dan padatan, sedangkan zat standar untuk gas adalah gas hydrogen. Berat jenis dapat dihitung dengan membagi berat zat dengan berat dari air pada volume yang sama, yaitu:

$$\text{berat jenis} = \frac{\text{berat zat}}{\text{berat air pada volume sama}}$$

jika, 10 mL asam sulfat beratnya adalah 18 g, dan 10 mL air pada kondisi yang sama beratnya adalah 10 g, maka berat jenis dari asam sulfat adalah:

$$\text{berat jenis} = \frac{18 \text{ g}}{10 \text{ g}} = 1,8$$

Berat jenis dapat dinyatakan dalam bentuk angka desimal dan dalam bidang farmasi, penempatan angka desimal ini mungkin dua, tiga atau empat tempat desimal.



Gambar 5.1 : Cairan yang tidak saling bercampur dalam tabung reaksi, minyak mineral lebih ringan dari pada air, sedangkan kloroform lebih berat daripada air.

Karena zat akan memuai dengan kecepatan yang berbeda jika mengalami perubahan suhu, maka dibutuhkan kehati-hatian dalam menentukan berat jenis suatu zat. Menurut Farmakope, suhu standar untuk penentuan berat jenis adalah 25°C, kecuali alcohol pada 15,56°C.

Kerapatan Vs Berat Jenis

Kerapatan suatu zat adalah angka konkrit (1,8 g/mL dalam contoh), sedangkan berat jenis adalah rasio dari jumlah yang sama, merupakan angka abstrak (1,8 dalam contoh). Kerapatan dapat bervariasi sesuai dengan satuan pengukuran yang digunakan, sedangkan berat jenis tidak memiliki dimensi sehingga menjadi nilai yang konstan untuk tiap zat (jika diukur pada kondisi terkendali). Dengan demikian, kerapatan air dapat dinyatakan dalam 1 g/mL, 100 g/L, sedangkan berat jenis tetap 1.

Tabel 5.1. Berat jenis dari beberapa zat pada suhu 25°C

AGENT	SP GR
Ether (at 20°C)	0.71
Isopropyl alcohol	0.78
Acetone	0.79
Alcohol	0.81
Liquid petrolatum	0.87
Peppermint oil	0.90
Olive oil	0.91
Peanut oil	0.92
Cod liver oil	0.92
Castor oil	0.96
Water	1.00
Propylene glycol	1.03
Clove oil	1.04
Liquefied phenol	1.07
Polysorbate 80	1.08
Polyethylene glycol 400	1.13
Glycerin	1.25
Syrup	1.31
Hydrochloric acid	1.37
Nitric acid	1.42
Chloroform	1.47
Nitroglycerin	1.59
Phosphoric acid	1.70
Mercury	13.6

Catatan:

- Zat yang memiliki berat jenis kurang dari satu lebih ringan daripada air
- Zat yang memiliki berat jenis lebih besar dari satu lebih berat daripada air.

Perhitungan Berat Jenis Cairan

Perhitungan berat jenis suatu zat cair yang diketahui berat dan volumenya dapat dilakukan menurut persamaan berikut:

$$\text{berat jenis} = \frac{\text{berat zat}}{\text{berat air pada volume sama}}$$

Contoh:


Jika 54,96 mL minyak beratnya adalah 52,78 g, berapakah berat spesifiknya.

Jawab: 54,96 mL air beratnya adalah 54,96 g, maka:

$$\text{berat jenis minyak} = \frac{52,78 \text{ g}}{54,96 \text{ g}} = 0,9603$$

Piknometer

Piknometer adalah wadah botol kaca khusus yang digunakan untuk menentukan berat jenis. Dalam laboratorium, piknometer terdapat dalam range volume dari 1 mL hingga 50 mL. Piknometer memiliki tutup yang dilengkapi dengan kapiler yang terbuka sebagai jalan bagi keluarnya udara dari dalam piknometer. Beberapa piknometer dilengkapi dengan thermometer sebab suhu merupakan faktor yang penting dalam penentuan berat jenis.



Gambar 5.2. Piknometer

Pada penentuan berat jenis dengan menggunakan piknometer, maka hal pertama yang dilakukan adalah menimbang berat dari piknometer kosong, kemudian menimbang lagi setelah diisi penuh dengan air. Lalu dihitung berat dari air. Karena 1 g air samadengan 1 mL, maka volume dari piknometer dapat diketahui. Kemudian, cairan yang lain yang dimasukkan ke dalam piknometer volumenya sama dengan volume air, dengan demikian berat jenis dari cairan tersebut dapat ditentukan.

Contoh 1.

sebuah piknometer 50 mL memiliki berat kosong 120 g, 171 g ketika berisi air, dan 160 g ketika diisi dengan cairan uji. Hitunglah berat jenis dari cairan uji tersebut.

Jawab:

$$\text{Berat air} = 171\text{g} - 120\text{ g} = 51\text{ g}$$

$$\text{Berat cairan} = 160\text{ g} - 120\text{ g} = 40\text{ g}$$

$$\text{berat jenis cairan} = \frac{\text{berat cairan}}{\text{berat air pada volume sama}}$$

$$\text{berat jenis cairan} = \frac{40\text{ g}}{51\text{ g}} = 0,78$$

Contoh 2.

Berat jenis dari botol timbang adalah 23,66 g. Bila diisi air, maka beratnya menjadi 72,95 g; dan bila diisi dengan cairan lain, beratnya menjadi 73,56 g. berapakah berat jenis dari cairan tersebut?

Jawab:

$$\text{Berat cairan} = 73,56\text{ g} - 23,66\text{ g} = 49,90\text{ g}$$

$$\text{Berat air} = 72,95\text{ g} - 49,29\text{ g}$$

$$\text{berat jenis cairan} = \frac{49,90\text{ g}}{49,29\text{ g}} = 1,012$$

Metode Plummet (Penggantian)

Perhitungan berat jenis suatu cairan dapat dilakukan dengan metode perpindahan atau dikenal dengan metode Plummet. Metode ini didasarkan pada prinsip *Archimedes*, yang menyatakan bahwa jika suatu benda dimasukkan ke dalam cairan, maka akan menggantikan sejumlah cairan dengan volume benda tersebut sehingga beratnya berkurang sebanyak berat cairan yang tergantikan. Dengan demikian, kita dapat menimbang berat dari cairan yang keluar dan berat benda yang dimasukkan ke dalam cairan dapat ditentukan berat jenisnya. Dengan mengurangkan berat benda dengan berat air yang terbuang, kita dapat menentukan volume cairan yang diperlukan untuk perhitungan

Contoh:
Sebuah gelas beratnya 12,64 g di udara, 8,57 g ketika dimasukkan ke dalam air, dan 9,12 g ketika dimasukkan ke dalam minyak. Hitunglah berat jenis dari minyak.

Jawab:
Berat minyak yang dipindahkan = $12,64 \text{ g} - 9,12 \text{ g} = 3,52 \text{ g}$
Berat air yang dipindahkan = $12,64 \text{ g} - 8,57 \text{ g} = 4,07 \text{ g}$
berat jenis minyak = $\frac{3,52 \text{ g}}{4,07 \text{ g}} = 0,865$

C. Berat Jenis dalam Penentuan Berat dan Volume

Bila berat jenis digunakan sebagai factor dalam perhitungan, maka hasilnya tidak lebih signifikan dari jumlah dalam faktor.

Penting untuk diingat bahwa berat jenis menggambarkan berat atau ringanya suatu zat dibandingkan dengan air, di mana diketahui bahwa berat jenis standar (air) adalah 1,0. Sebagai contoh, suatu cairan dengan berat jenis 1,25, maka berat cairan adalah 1,25 kali berat air. Demikian juga dengan suatu cairan dengan berat jenis 0,85, maka beratnya adalah 0,85 kali dari berat air.

Jadi, jika suatu cairan memiliki volume 50 mL dan berat jenisnya 1,2, maka beratnya sebanding dengan 1,2 kali berat air pada volume yang sama. Jika volume air 50 mL beratnya 50 g, maka berat cairan menjadi 1,2 kali berat air (50 g) adalah 60 g.

Berdasarkan penjelasan dari paragraph di atas, kita dapat memperoleh persamaan:

$$\text{Gram} = \text{milliliter} \times \text{berat jenis}$$

Meskipun kita tidak dapat mengalikan milliliter dengan berat jenis dan satuan dari hasilnya adalah gram, namun persamaan tersebut tetap berlaku karena volume cairan diasumsikan sama dengan volume air, di mana milliliter dan gramnya sama (volume dan beratnya). Jadi, pada dasarnya persamaan yang benar adalah :

$$\text{Gram (cairan)} = \text{Gram (air pada volume sama)} \times \text{berat jenis (cairan)}$$

Contoh:

1. Tentukanlah berat dalam gram dari 3620 mL alcohol, bila berat jenisnya adalah 0,820.

Jawab:

$$\begin{aligned} 3620 \text{ mL air} &= 3620 \text{ g} \\ \text{Gram alcohol} &= 3620 \text{ g} \times 0,820 \\ &= 2968 \text{ g} \end{aligned}$$

Dengan menyusun ulang persamaan sebelumnya, kita dapat menghitung volume cairan dengan menggunakan persamaan:

$$\text{mililiter} = \frac{\text{gram}}{\text{berat jenis}}$$

2. Berapa volume dalam milliliter dari 492 g asam nitrat bila berat jenisnya 1,40.

Jawab:

$$492 \text{ g air} = 492 \text{ mL}$$

$$\text{mililiter} = \frac{492}{1,40} = 351 \text{ mL}$$

D. Perhitungan Volume Jenis

Volume spesifik, dalam praktekfarmasi, biasanya didefinisikan sebagai jumlah abstrak yang mewakili rasio, dinyatakan sebagai desimal, dari volume suatu zat dengan volume berat yang sama dari zat lain sebagai standar pada suhu yang sama. Air digunakan sebagai standar.

Berat jenis adalah perbandingan berat dari volume yang sama, maka volume jenis adalah perbandingan volume dari berat yang sama. Berdasarkan hubungan ini, maka berat jenis dan volume jenis adalah berbanding terbalik, sehingga jika keduanya dikalikan hasilnya adalah 1. Volume jenis memberikan informasi mengenai seberapa besar atau seberapa kecil volume suatu massa jika dibandingkan dengan air pada massa (berat) yang sama. Volume jenis dapat dihitung dengan membagi volume dari massa (berat) yang diberikan dengan volume dari air pada massa (berat) yang sama. Misalnya, jika 25 g gliserin memiliki volume 20 ml, sedangkan 25 g air memiliki volume 25 mL pada kondisi yang sama, maka berat jenis gliserin adalah:

$$\frac{\text{volume dari 25 g gliserin}}{\text{volume dari 25 g air}} = \frac{20 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} = 0,8$$

Dari perhitungan volume jenis dari suatu cairan, akan memberikan informasi mengenai volume dari suatu berat tertentu, sehingga dapat dihitung menurut persamaan diatas.

Contoh:

1. Hitunglah volume jenis dari suatu cairan sirup sebanyak 91,0 mL jika beratnya adalah 107,16 g.

Jawab:

107,16 g air, volumenya adalah 107,16 mL; maka:

$$\text{volume jenis sirup} = \frac{91 \text{ mL}}{107,16 \text{ mL}} = 0,849$$

Karena berat jenis dan volume jenis adalah berbanding terbalik, maka suatu zat yang lebih berat dari air akan memiliki berat jenis yang lebih tinggi dan volume jenis yang lebih kecil, sedangkan zat yang lebih ringan dari air akan memiliki berat jenis yang lebih rendah dan volume jenis yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, kita dapat menentukan volume jenis suatu zat dengan membagi 1 dengan berat jenisnya, dan sebaliknya kita dapat menentukan berat jenis suatu zat dengan membagikan 1 dengan volume jenisnya.

2. Berapa volume jenis dari asam fosfat jika berat jenisnya adalah 1,71?

Jawab:

$$\frac{1}{1,71} = 0,585$$

3. Jika suatu cairan memiliki volume spesifik 1,396, berapakah berat jenisnya?

Jawab:

$$\frac{1}{1,396} = 0,716$$

BAB VI

PERHITUNGAN DOSIS : PERTIMBANGAN UMUM

A. Definisi Dosis

Dosis obat adalah jumlah yang dibutuhkan untuk memberikan respon terapi yang diinginkan pada satu waktu pemberian. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi dosis obat adalah bentuk sediaan obat, rute pemberian, toleransi individu terhadap obat, predisposisi genetik, umur pasien, berat badan, jenis kelamin, penggunaan bersama dengan obat lain, lama penyakit, fungsi hati dan ginjal yang mempengaruhi laju absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi obat pada pasien.


Dosis ini dapat diekspresikan sebagai *single dose* (dosis tunggal), jumlah obat yang diberikan pada satu waktu; *daily dose* (dosis harian) atau dosis total, jumlah obat yang diberikan selama terapi. Dosis harian ini dapat dibagi dan diberikan dalam *divided doses* (dosis terbagi), dua atau tiga kali dalam sehari tergantung pada karakteristik obat dan penyakit. Sedangkan jadwal pemberian obat dengan dosis tertentu, misalnya empat kali sehari selama 10 hari, disebut sebagai *dosage regimen* (regimen dosis).

Secara kuantitatif, dosis obat sangat bervariasi sesuai dengan substansi obatnya; beberapa obat memiliki dosis yang kecil, sementara obat yang lain memiliki dosis yang relatif besar. Dosis obat ini bergantung kepada aktivitas biokimia dan farmakologi, sifat fisika kimia, bentuk sediaan obat yang digunakan, rute pemberian dan berbagai faktor pasien.

Dosis lazim dewasa adalah jumlah obat yang menghasilkan efek terapi yang diinginkan pada pasien dewasa. Sedangkan dosis lazim pediatrik adalah yang diberikan kepada bayi atau anak-anak. Dosis obat lazim dewasa dan pediatrik merupakan pedoman bagi dokter untuk memberikan resep yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

Rentang dosis lazim untuk suatu obat mengindikasikan rentang atau jumlah obat yang dapat diresepkan sesuai dengan pedoman praktik pengobatan. Informasi tentang dosis dan kegunaan obat harus lengkap tertera pada kemasan atau brosur obat yang dikeluarkan oleh perusahaan industri obat, sebagaimana yang terdapat dalam berbagai referensi, seperti *DrugFacts and Comparisons*, *Physicians' Desk Reference*, *Pediatric Dosage Handbook*, *Geriatric Dosage Handbook*, and *Drug Information Handbook*.

Respon individu terhadap dosis obat yang diberikan dapat bervariasi sebagaimana digambarkan pada gambar 6.1 dan mungkin membutuhkan penyesuaian pada pemberian ke pasien. Untuk kondisi tertentu, seperti pada pengobatan pasien kanker, dosis obat biasanya tinggi dan terindividualisasi. Umumnya sering digunakan kombinasi obat, dengan dosis masing-masing obat disesuaikan menurut respon pasien. Kebanyakan obat antikanker diberikan secara klinik, biasanya untuk 21 sampai 28 hari, dengan periode istirahat antara siklus dosis untuk memberikan waktu penyembuhan dari efek toksik obat.




Gambar 6.1. Efek obat terhadap populasi sampel

Median effective dose adalah dosis obat yang menghasilkan efek terapi yang diinginkan pada 50% individu yang diuji. Sedangkan median toxic dose adalah dosis obat yang memberikan efek toksik pada 50% individu yang diuji. Obat yang diberikan dengan maksud untuk menghasilkan efek sistemik harus diabsorpsi atau diberikan secara langsung ke dalam sirkulasi darah dan terdistribusi dalam kadar yang adekuat pada situs aksinya dalam sel-sel tubuh. Untuk obat tertentu, ada hubungan antara dosis obat, konsentrasi obat dalam plasma

setelah pemberian, dan persentasi obat dengan tingkat efek obat. Pengukuran kadar plasma rata-rata dan penentuan konsentrasi minimum diharapkan memberikan efek obat yang diharapkan bagi pasien. Konsentrasi ini disebut sebagai **konsentrasi efektif minimum (MEC)**. Sedangkan kadar plasma terendah yang memberikan efek toksik disebut sebagai **konsentrasi toksik minimum (MTC)**.

Secara optimal, dosis obat yang sesuai harus dihasilkan dalam kadar plasma darah yang berada di atas MEC dan di bawah MTC untuk periode waktu di mana efek obat diinginkan. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 6.2 untuk obat hipotetik, kadar plasma obat mencapai MEC dua jama setelah pemberian, dan mencapai kadar puncak dalam 4 jam, dan turun di bawah MEC dalam 10 jam. Jika hal ini diinginkan untuk mempertahankan kadar obat dalam plasma berada di atas MEC untuk periode yang lama, maka dosis kedua dapat diberikan sekitar jam ke 8. Untuk obat tertentu, dosis awal yang lebih besar dari dosis lazim mungkin dibutuhkan untuk mencapai kadar plasma yang diinginkan. Dosis ini dikenal sebagai *loading dose*. Selanjutnya adalah *maintenance doses*, serupa dengan jumlah untuk dosis lazim, diberikan menurut dosis regimen untuk memperlambat kadar plasma obat yang diinginkan atau efek obatnya. Untuk mencapai kadar plasma yang diinginkan secara cepat, maka loading dose nya dapat diberikan secara injeksi atau cairan oral, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian *maintenance doses* yang dapat diberikan dalam bentuk sediaan lain, seperti tablet atau kapsul.



Gambar 6.2. Contoh kurva kadar obat dalam darah untuk obat hipotetik sebagai fungsi dari waktu setelah pemberian.

Kebanyakan produk farmasi dibuat dalam skala besar oleh industri farmasi untuk didistribusikan kepada institusi dan komunitas farmasi. Produk prefabrikasi dan unit dosis ini digunakan dalam pelayanan resep dan permintaan obat di apotek. Dalam skala lebih kecil, banyak komunitas dan farmasi rumah sakit memberikan pelayanan resep dan permintaan obat menurut *compounding* (peracikan), yaitu pembuatan produk farmasi dari zat aktif tunggal, ditimbang secara hati-hati, diukur, dan dicampurkan. Produk farmasi ini dapat dibuat dengan kandungan bahan aktif satu atau lebih. Produk yang mengandung lebih dari satu bahan aktif disebut produk kombinasi.

B. Rute Pemberian Obat

Dosis obat dapat diberikan dalam berbagai bentuk sediaan dan rute pemberian. Seperti ditunjukkan pada tabel 6.1 Selain bahan obat itu sendiri, suatu bentuk sediaan juga mengandung bahan-bahan lain dengan sifat fisik, persyaratan stabilitas dan karakteristik estetika yang sesuai untuk memberikan efek terapi yang optimal. Bahan tambahan dimaksud adalah pelarut, pembawa, pengawet, penstabil, solubilizer, pengikat, pengisi, pewarna, desintegran, dan lain-lain.


Tabel 6.1. Pemilihan rute pemberian dari berbagai bentuk sediaan.

Rute pemberian	Bentuk sediaan
Oral	Tablet, kapsul, lozenges, larutan, tetes, sirup, suspensi
Sublingual	Tablet
Parenteral	Larutan dan suspensi
Transdermal / epikutaneus	Ointment, krim, serbuk, lotion, aerosol, dan patch
Conjunctival (mata)	Larutan, suspensi, ointment
Intranasal (hidung)	Larutan, spray, ointment
Intrarespiratory (paru-paru)	Aerosol, dan larutan inhalasi
Rektal	Ointment, krim, suppositoria, larutan, dan suspensi
Vaginal	Ointment, krim, tablet, suppositoria, gel, larutan, dan emulsi
Uretral	Larutan dan suppositoria


C. Pengukuran Dosis

Untuk pengaturan dosis di institusi, dosis diukur dan dikelola oleh tenaga profesional. Berbagai alat ukur dapat digunakan termasuk cangkir yang telah dikalibrasi untuk cairan oral, dan jarum suntik dan infuset untuk sediaan parenteral.

Untuk pemberian obat di rumah, pasien dewasa atau orang tua umumnya mengukur dan menggunakan obat sendiri. Kecuali jika ada personal perawat yang melayani pasien. Bentuk sediaan cair diukur menggunakan “peralatan dapur” umumnya dengan menggunakan sendok teh atau sendok makan. Untuk pemberian obat cair kepada anak-anak, dijumpai adanya penggunaan dispenser oral yang dilengkapi dengan skala ukuran.



Gambar 6.3. Contoh alat ukur untuk pemberian cairan oral.



Gambar 6.4. Contoh dispenser oral Excta Med® untuk pemberian cairan obat bagi pediatrik.

SendokTeh dan Sendok Makan

Dalam menghitung dosis, apoteker dan dokter menyepakati bahwa untuk sendok teh berkapasitas 5 mL dan untuk sendok makan 15 mL. Perlu dicatat bahwa, kapasitas sendok teh yang digunakan di rumah tangga dapat bervariasi dari 3-7 mL dan sendok makan bervariasi dari 15 – 22 mL. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi volume aktual cairan yang diberikan dengan menggunakan sendok

yang digunakan di rumah. Menurut USP, untuk keperluan rumah tangga, *American Standard Teaspoon* telah ditetapkan oleh *American National Standard Institute*, sendok teh mengandung $4,93 \pm 0,24$ mL. Untuk keperluan universal, dengan menggunakan sendok teh tersebut Sediaan yang dimaksudkan untuk diberikan menggunakan sendok teh harus dirumuskan atas dasar unit dosis 5 mL. Setiap pipet tetes, jarum suntik, cangkir obat, sendok khusus atau alat lain yang digunakan untuk mengelola cairan harus memberikan volume 5 mL yang ditunjukkan dengan skala yang telah dikalibrasi. Secara umum, produsen farmasi menggunakan sendok teh 5 mL dan sendok makan 15 mL sebagai dasar atau pedoman dalam pemberian cairan oral.


Berdasarkan kebiasaan dan tradisi, simbol f3 (fluidram) masih digunakan oleh beberapa dokter pada penulisan aturan pakai untuk menunjukkan dosis sendok teh. Apoteker kemungkinan menafsirkan simbol ini sebagai sendok teh ketika meracik obat prefabrikasi dan kemudian menyarankan pasien untuk menggunakan sendok teh yang ada di rumah. Dosis kurang dari satu sendok teh (biasanya untuk anak-anak) sering dituliskan pada etiket sebagai angka pecahan, seperti $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{2}$ sendok teh. Sendok obat khusus untuk jumlah ini telah tersedia, atau dapat menggunakan sendok ukuran standar yang ada di rumah.

Tetes Sebagai Satuan Ukuran

Biasanya, tetes (disingkat gtt) digunakan sebagai ukuran untuk sediaan obat cair bervolume kecil. Satu tetes tidak merepresentasikan jumlah secara pasti sebab volume tetesan dari cairan yang berbeda sangat bervariasi. Untuk tujuan standarisasi tetes sebagai unit volume, maka USP mendefinisikan penetes (pipet tetes) obat baku sebagai pipet dengan ujung menyempit dengan diameter luar 3 mm. Pipet tetes ini, ketika dipegang dengan posisi vertikal, akan mengeluarkan air dalam bentuk tetesan dengan berat satu tetes antara 45 - 55 mg. Dengan demikian, penetes baku akan mengeluarkan 20 tetes air permiliter (1 mL air setara dengana 1 g atau 1000 mg dan setara dengan 20 tetes).

Perlu diingat bahwa, hanya sedikit obat cair yang memiliki permukaan dan karakteristik aliran yang sama seperti air, sehingga

ukuran setiap tetesnya bervariasi secara material dari satu cairan dengan cairan yang lain. Oleh karena itu, tetesan tidak boleh digunakan sebagai ukuran untuk cairan obat tertentu hingga volume dari tetesan cairan tersebut telah ditentukan. Penentuan ini dapat dilakukan dengan cara kalibrasi alat tetes yang digunakan. Penetes yang telah dikalibrasi ini hanya dapat digunakan satu kali untuk mengukur obat. Kebanyakan produsen mengikutsertakan penetes yang telah dikalibrasi dalam kemasan obatnya untuk digunakan oleh pasien. Contohnya seperti pada gambar 6.5. Sebuah penetes dapat dikalibrasi dengan menghitung jumlah tetesan dari cairan yang jatuh sehingga volume yang terukur dapat diperoleh. Jumlah tetesan per satuan volume kemudian ditetapkan (misalnya 20 tetes/mL).



Gambar 6.5 Beberapa contoh penetes yang telah dikalibrasi.

Contoh:

Jika seorang farmasis menghitung 40 tetes suatu obat yang diteteskan ke dalam gelas ukur dan menunjukkan 2,5 mL, berapa banyak tetes permililiter yang akan keluar dari penetes tersebut?

Jawab:

$$\frac{40 \text{ tetes}}{x \text{ tetes}} = \frac{2,5 \text{ mL}}{1 \text{ mL}}$$

$$x = 16 \text{ tetes}$$

D. Perhitungan Dosis

Seorang farmasis seringkali harus menghitung ukuran dan jumlah dosis, atau jumlah total dari obat yang harus didispensing. Untuk perhitungan ini, maka dapat digunakan persamaan berikut ini:

$$\text{jumlah dosis} = \frac{\text{jumlah total}}{\text{ukuran dosis}}$$

Contoh perhitungan jumlah dosis

1. Jika dosis suatu obat adalah 200 mg, berapa banyak dosis yang dibutuhkan yang mengandung 10 g obat?

Jawab:

$$10 \text{ g} = 10.000 \text{ mg}$$

$$\begin{aligned}\text{jumlah dosis} &= \frac{10.000 \text{ mg}}{200 \text{ mg}} \\ &= 50 \text{ dosis}\end{aligned}$$

Atau, penyelesaian dapat menggunakan analisis dimensi:

$$\frac{1 \text{ dosis}}{200 \text{ mg}} \times \frac{1000 \text{ mg}}{1 \text{ g}} \times 10 \text{ g} = 50 \text{ dosis}$$

2. Jika suatu dosis obat dinyatakan sebagai 1 sendok makan, kira-kira berapa dosis yang terkandung dalam 1 *pint* obat?

Jawab:

$$1 \text{ sendok makan} = 15 \text{ mL}$$

$$1 \text{ pint} = 473 \text{ mL}$$

$$\text{jumlah dosis} = \frac{473 \text{ mL}}{15 \text{ mL}}$$

$$= 31,5 \text{ atau } 31 \text{ dosis}$$

3. Jika suatu obat dosisnya adalah 50 μg , berapa banyak dosis yang terkandung dalam 0,020 g?

Jawab:

$$0,020 \text{ g} = 20 \text{ mg}$$

$$50 \mu\text{g} = 0,05 \text{ mg}$$

$$\begin{aligned} \text{jumlah dosis} &= \frac{20 \text{ mg}}{0,05 \text{ mg}} \\ &= 400 \text{ dosis} \end{aligned}$$

Contoh Perhitungan Ukuran Dosis

$$\text{ukuran dosis} = \frac{\text{jumlah total}}{\text{jumlah dosis}}$$

Ukuran dosis dinyatakan dalam denominasi apa saja yang digunakan untuk pengukuran jumlah total yang diberikan.

1. Berapa sendok teh yang diperlukan dalam setiap dosis dari suatu eliksir jika 180 mL mengandung 18 dosis?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{ukuran dosis} &= \frac{180 \text{ mL}}{18 \text{ mL}} \\ &= 10 \text{ mL} = 2 \text{ sendok teh} \end{aligned}$$

2. Berapa tetes yang harus diresepkan dalam setiap dosis cair obat jika 15 mL mengandung 60 dosis? Kalibrasi alat tetes adalah 32 tetes/mL?

Jawab:

$$15 \text{ mL} = 15 \times 32 \text{ tetes} = 480 \text{ tetes}$$

$$\begin{aligned} \text{ukuran dosis} &= \frac{480 \text{ tetes}}{60 \text{ tetes}} \\ &= 8 \text{ tetes,} \end{aligned}$$

Atau, bisa diselesaikan dengan analisis dimensi:

$$\frac{32 \text{ tetes}}{1 \text{ mL}} \times \frac{1}{60 \text{ dosis}} \times 15 \text{ mL} = 8 \text{ tetes/dosis}$$

Contoh Perhitungan Jumlah Total Produk

$$\text{Jumlah total} = \text{jumlah dosis} \times \text{ukuran dosis}$$

Adalah lebih mudah untuk mengkonversi dosis yang diberikan menjadi denominasi ketika jumlah total harus dinyatakan.

1. Berapa milliliter jumlah total obat yang akan diberikan kepada pasien jika sehari diberikan 2 kali sehari 2 sendok makan selama 8 hari?

Jawab:

$$\text{Jumlah dosis} = 16$$

$$\text{Ukuran dosis} = 2 \text{ sendok makan atau } 30 \text{ mL}$$

$$\text{Jumlah total} = 16 \times 30 \text{ mL} = 480 \text{ mL.}$$

2. Berapa mililiter obat yang akan diberikan kepada pasien dari obat dengan dosis satu sendok teh sebanyak 3 kali sehari selama 16 hari?

Jawab:

$$\text{Jumlah sendok teh obat}$$

$$= 16 \times 3 = 48 \text{ sendok teh}$$

$$\text{Jumlah total}$$

$$= 48 \times 5 \text{ mL} = 250 \text{ mL.}$$

3. Berapa gram obat yang diperlukan untuk membuat 72 dosis jika masing-masing mengandung 30 mg?

Jawab:

$$\text{Jumlah dosis} = 72$$

$$\text{Ukuran dosis} = 30 \text{ mg}$$

$$\text{Jumlah total} = 72 \times 30 \text{ mg} = 2.160 \text{ mg} = 2,16 \text{ g}$$

4. Dibutuhkan sekitar 4 g salep untuk mengobati kaki pasien dewasa. Jika dokter meresepkan suatu salep untuk pasien dengan eksim kaki dengan pemakaian 2 kali sehari selama 1 minggu, dengan ukuran produk yang diberikan = 15 g, 30 g, atau 60 g.

Jawab:

$$\text{Jumlah dosis} = 2 \text{ per hari} \times 7 \text{ hari} = 14$$

$$\text{Ukuran dosis} = 4 \text{ g}$$

$$\text{Jumlah total} = 14 \times 4 \text{ g} = 56 \text{ g;}$$

Maka, ukuran produk yang dipilih adalah 60 g.

Contoh tambahan

1. Jika 0,050 g zat digunakan untuk membuat 125 tablet, berapa mikrogram yang terkandung dalam setiap tablet?

Jawab:

$$0,050 \text{ g} = 50 \text{ mg} = 50.000 \mu\text{g}$$
$$\frac{50.000 \mu\text{g}}{125 \text{ tablet}} = 400 \mu\text{g}$$

Atau, dapat diselesaikan dengan analisis dimensi:

$$\frac{1.000.000 \mu\text{g}}{1 \text{ g}} \times \frac{1}{125 \text{ tablet}} \times 0,050 \text{ g} = 400 \mu\text{g/tablet}$$

2. Jika suatu sediaan mengandung 5 g obat dalam 500 mL, berapa g yang terkandung dalam setiap sendok makan?

Jawab:

$$1 \text{ sendok makan} = 15 \text{ mL}$$
$$\frac{500 \text{ mL}}{15 \text{ mL}} = \frac{5 \text{ g}}{x}$$
$$x = 0,15 \text{ g}$$

3. Suatu campuran obat batuk mengandung 48 mg hidromorfon HCl setiap 8 fl.oz. Berapa mg hidromorfon hidroklorida dalam setiap dosis 2 sendok teh?

Jawab:

$$1 \text{ fl.oz} = 6 \text{ sth}$$
$$8 \text{ fl.oz} = 48 \text{ sth}$$
$$48 \text{ sth} : 2 = 24 \text{ dosis}$$
$$48 \text{ sth} : 24 = 2 \text{ mg}$$

Atau:

$$\frac{48 \text{ sth}}{2 \text{ sth}} = \frac{48 \text{ mg}}{x \text{ mg}}$$
$$x \text{ mg} = 2 \text{ mg}$$

4. Berapa mg guafenesin dan hidrokodon bitartrat yang terkandung dalam setiap dosis resep berikut ini?

R/ Hidrocodone bitartrate 0,12 g
 Guafenesin 2,4 g
 Cherry syrup ad 120 mL
 S. sth untuk batuk

Jawab:

$$1 \text{ sth} = 5 \text{ mL}$$

$$120 \div 5 = 24 \text{ dosis}$$

$$0,12 \text{ g} \div 24 = 0,005 \text{ g} = 5 \text{ mg hidrocodon bitartrat}$$

$$2,4 \text{ g} \div 24 = 0,1 \text{ g} = 100 \text{ mg guafenesin.}$$

5. Berapa gram bahan obat yang dibutuhkan unruk membuat 120 mL larutan yang setiap sendok tehnya mengandung 3 mg bahan obat tersebut?

Jawab:

$$1 \text{ sth} = 5 \text{ mL}$$

$$\frac{5 \text{ mL}}{120 \text{ mL}} = \frac{3 \text{ mg}}{x \text{ mg}}$$

$$x = 72 \text{ mg atau } 0,072 \text{ g}$$

atau:

$$\frac{1 \text{ g}}{1000 \text{ mg}} \times \frac{3 \text{ mg}}{5 \text{ mL}} \times 120 \text{ mL} = 0,072 \text{ g}$$

6. Seorang dokter meresepkan tetrasiklin 500 mg untuk diberikan 2 kali sehari selama 10 hari. Berapa gram tertrasiklin yang harus diberikan?

Jawab:

$$\text{Ukuran dosis} = 500 \text{ mg}$$

$$\text{Jumlah dosis} = 2 \times 10 = 20$$

$$\text{Jumlah total} = 500 \text{ mg} \times 20 \text{ dosis} = 10.000 \text{ mg} = 10 \text{ g}$$

E. Pemilihan Dosis

Terapi Dosis Rendah dan Dosis Tinggi

Penggunaan obat dengan dosis yang lebih kecil atau lebih besar dari dari dosis lazim oabt dinyatakan sebagai terapi dosis rendah atau terapi dosis tinggi. Istilah ini berbeda dengan istilah dosis tinggi atau rendah karena variasi normal dalam dosis standar yang berdasarkan usia pasien, berat badan atau fungsi ginjal ataupun parameter spesifik lainnya.

Contoh yang paling umum dari terapi dosis rendah adalah penggunaan aspirin 81 mg (di mana dosis lazimnya 325 mg) untuk tujuan mengurangi resiko serangan jantung dan stroke akibat penyumbatan pembuluh darah. Contoh lainnya adalah penggunaan terapi hormon rendah pascamenopaus, dengan dosis 50% lebih kecil dari dosis standar yang digunakan.

Terapi dosis tinggi umumnya berhubungan dengan pengobatan kemoterapeutik untuk penderita kanker, di mana digunakan intensitas dosis yang tinggi untuk membunuh sel-sel kanker. Contoh lain adalah penggunaan khusus progestin dosis tinggi untuk mengobati endometriosis.

Farmasis harus lebih berhati-hati dan lebih memahami penggunaan terapi dosis tinggi ini untuk melindungi pasien dari efek samping pemakaian dosis tinggi dan konsekuensi terjadinya overdosis obat yang fatal. Berhubungan dengan ini, hal yang penting diperhatikan oleh pasien dan farmasis adalah ketika terjadi ketidaksengajaan dalam pemakaian jumlah berlebih dari bahan obat tertentu. Keadaan ini sering terjadi ketika pasien menggunakan obat lebih dari satu (resep dan tanpa resep) yang mengandung kandungan bahan aktif yang dapat melebihi dosis amannya. Obat seperti asetaminofen merupakan salah satu contoh untuk kasus ini karena umum terkandung dalam kebanyakan obat.

Contoh Perhitungan Terapi Dosis Rendah dan Dosis Tinggi

1. Jika seorang pasien mengubah standar dosis harian untuk suatu produk yang mengandung 0,625 mg estrogen terkonyugasi (CE) menjadi formula dengan dosis rendah yang mengandung 0,35 mg CE, berapa mg penurunan dosis CE yang akan diminum oleh pasien ini perminggunya?

Jawab:
 $0,625 \text{ mg} - 0,35 \text{ mg} = 0,275 \text{ mg} \times 7 \text{ hari} = 1,925 \text{ mg CE}$

2. Untuk mengurangi inflamasi saraf optik, seorang pasien menggunakan prednison dosis tinggi, 900 mg/hari selama 5 hari melalui infus intravena. Dosis lazim untuk prednison adalah 5 sampai 60 mg/hari, tergantung pada kondisi penyakit. Hitunglah berapa kali lebih tinggi dari dosis lazim yang dibutuhkan pasien sebagai suatu dosis tinggi yang berulang diberikan kepada pasien dalam secharinya.

Jawab:

$$\frac{900 \text{ mg}}{60 \text{ mg}} = 15 \text{ kali}$$

Produk Kombinasi dengan Dosis-Tetap

Berbagai jenis produk yang diresepkan dan tanpa diresepkan yang tersedia dengan kandungan dua atau lebih bahan obat dalam bentuk kombinasi dosis tetap. Keuntungan dari produk kombinasi ini adalah bahwa adanya dua atau lebih jenis obat yang dibutuhkan yang dapat diminum sebagai dosis tunggal sehingga lebih nyaman bagi pasien, meningkatkan kepatuhan, dan lebih murah bagi pasien yang menggunakan obat yang sama sebagai bentuk sediaan tunggal. Kekurangannya adalah relatif tidak fleksibel dalam memilih dosis dibandingkan dengan sediaan obat tunggal. Baik kombinasi dosis tetap dalam bentuk cairan (sirup) atau sediaan padat (tablet), maka komponen obat yang digunakan harus berada dalam rasio dosis tetap.

Untuk memenuhi pilihan dalam pemberian dosis, beberapa kombinasi obat yang diresepkan sering diformulasi dengan kekuatan dosis yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kapsul yang mengandung amlodipin dan benazepril HCl (LOTREL), dua jenis obat yang digunakan untuk hipertensi, dengan dosis 2,5 mg/10 mg, 5 mg/10 mg, 5 mg/20 mg, dan 10 mg/20 mg. Dengan demikian penulis resep dapat memilih kombinasi yang diinginkan.

Contoh Perhitungan Kombinasi Dosis-Tetap

1. Tablet valsartan dan hidrokloriazid tersedia dalam beberapa kekuatan dosis, 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, dan 160 mg

/25 mg. Jika pasien menerima produk kombinasi dengan dosis terendah dan dokter mengharapkan untuk meningkatkan dosis hidroklotiazid dua kali lipat, maka dosis yang manakah yang dipilih?

Jawab:

Diberikan resep tambahan untuk hidroklotiazid 12,5 mg sebagai dosis tunggal atau dengan memberikan resep valsartan 80 mg dan hidroklotiazid 25 mg.

Memotong Tablet

Beberapa tablet cetak memiliki garis tengah atau beralur untuk memudahkan pemotongan menjadi bagian yang sama. Hal ini memudahkan pembagian dosis, khususnya bila pasien memulai terapi dengan dosis setengah. Ini juga memungkinkan pasien untuk menggunakan produk bila kekuatan atau dosis yang dibutuhkan tidak tersedia sebagai satu tablet utuh. Beberapa pasien juga menggunakan alat pemotong tablet dengan alasan ekonomi. Untuh beberapa jenis obat, harga tablet dengan kekuatan dua kali dari dosis yang diinginkan hampir sama dengan tablet sejenis dengan dosis yang lebih rendah.

Kekurangan dari bentuk sediaan tablet semacam ini adalah bahwa pemotongan tablet tidak selalu menghasilkan bagian yang sama sehingga mengakibatkan dosis menjadi tidak tepat. Selain itu, jika tidak hati-hati ketika memotong tablet, tablet bisa menjadi pecah atau hancur sehingga mempengaruhi jumlah dosis yang akan diabsorpsi. Namun demikian, tablet dapat dihancurkan tanpa mempengaruhi karakteristik absorpsi yang diperlukan. Hal ini seringkali dilakukan untuk pasien yang tidak mampu menelan tablet. Dalam hal ini, mortar dan alu atau alat khusus dapat digunakan untuk menghancurkan tablet. Setelah dihancurkan, serbuk tablet dapat dicampurkan dengan minuman atau makanan sebelum digunakan.

Contoh Perhitungan Berdasarkan Pemotongan Tablet

1. Seorang pasien berusaha untuk memotong tablet yang mengandung 20 mg obat, menghasilkan dua bagian yang tidak sama dengan perbedaan kandungan obat 1,5 mg. Dengan asumsi bahwa keseluruhan tablet mengandung obat secara homogen, hitunglah jumlah obat yang terdapat dalam setiap bagian tablet.

Jawab:

Jika bagian besar = B; dan bagian yang lebih kecil = K,

Maka $B + K = 20 \text{ mg}$

$$B - K = 1,5 \text{ mg}$$

$$2 B = 21,5 \text{ mg}$$

$$B = 10,75 \text{ mg dan}$$

$$K = 20 \text{ mg} - 10,75 \text{ mg} = 9,25 \text{ mg}$$

F. Regimen Dosis Khusus

Obat-obat tertentu memiliki regimen dosis yang unik. Beberapa diantaranya adalah obat-obat kemoterapeutik dan kontrasepsi oral. Untuk obat yang disebutkan terakhir, dosis regimen dosis obat yang diresepkan adalah berdasarkan siklus pemberian dosis 28 hari dengan 21 hari mengkonsumsi tablet yang mengandung obat estrogen dan progestasional dan diikuti 7 hari pemberian tablet yang mengandung plasebo. Obat diminum satu tablet dalam sehari sebaiknya pada waktu yang sama. Obat jenis ini biasanya memiliki warna yang berbeda untuk membedakan antara tablet yang mengandung bahan aktif dengan tablet yang merupakan plasebo.

Contoh Perhitungan Berdasarkan Regimen Dosis Khusus

Tablet ORTHO TRY-CYCLEN LO regimen 28 hari mengandung norgestimat (N), etinil estradiol (EE), dan tablet bukan obat sebagai berikut:

7 tablet putih mengandung 0,18 mg (N) + 0,025 mg (EE)

7 tablet biru muda mengandung 0,215 mg (N) + 0,025 mg (EE)

7 tablet biru tua mengandung 0,25 mg (N) + 0,025 mg (EE)

7 tablet hijau mengandung 0 mg (N) + 0 mg (EE)

Berapa milligram norgestimat dan etinil estradiol yang diberikan selama siklus 28 hari ?

Jawab:

Norgestimat	: 0,18 mg x 7	= 1,26 mg
	0,215 mg x 7	= 1,505 mg
	0,25 mg x 7	= 1,75 mg
		<hr/>
		4,515 mg

Etinil estradiol	: 0,025 mg x 7	= 0,175
	0,025 mg x 7	= 0,175
	0,025 mg x 7	= 0,175
		<hr/>
		0,525 mg

BAB VII

PERHITUNGAN DOSIS : PARAMETER PASIEN

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, dosis lazim suatu obat adalah jumlah umum yang diberikan untuk menghasilkan respon terapeutik pada mayoritas pasien pada umumnya, atau kelompok populasi. Range dosis lazim obat adalah range dosis yang ditentukan dengan aman dan efektif pada kelompok populasi yang sama. Hal ini memungkinkan penulis resep untuk memperoleh petunjuk pemberian dosis pada awal pemilihan dosis obat untuk pasien tertentu dan lebih fleksibel untuk merubah dosis sesuai dengan respon klinik pasien. Dosis lazim dan dosis regimen ditentukan berdasarkan hasil dari studi klinik yang dilakukan selama proses pengembangan obat sebagai informasi klinik yang dikumpulkan lalu disetujui dan kemududian obat dapat dipasarkan (*postmarketing surveillance/postmarketing studies*).

Untuk beberapa jenis obat dan beberapa pasien, dosis obat ditentukan berdasarkan parameter spesifik dari pasien. Parameter ini terdiri dari usia pasien, berat badan, luas permukaan tubuh, status fungsi dan nutrisi pasien. Diantara pasien tersebut ada yang membutuhkan dosis tersendiri, seperti pasien neonatus dan pediatrik, pasien usia tua dengan penurunan fungsi biologik, atau pasien tertentu dengan gangguan fungsi hati dan atau ginjal (sehingga menurunkan kemampuan memetabolisme dan mengeliminasi obat), pasien dengan kondisi kritis, dan pasien yang sedang menjalani terapi kemoterapi dengan toksisitas yang tinggi. Obat-obat tertentu yang memiliki jendela terapeutik yang sempit seringkali memerlukan pengaturan dosis tersendiri berdasarkan penentuak kadar obat dalam darah dan monitoring terapeutik. Digoksin, adalah salah satu contohnya, di mana pada kadar plasma 0,9 sampai 2 ng/mL memberikan efek terapi, tetapi kadar plasma di atas 2 ng/mL bersifat toksik.

Karena usia, berat badan, dan luas permukaan tubuh seringkali digunakan sebagai faktor dalam penentuan dosis untuk

pasien pediatrik dan pasien usia lanjut, sehingga parameter ini banyak digunakan sebagai dasar perhitungan dosis yang akan dibahas pada bab ini. Pengaturan dosis bahan-bahan kemoterapeutik juga dimasukkan di bagian ini karena merupakan pengaturan regimen dosis yang unik dibandingkan dengan kategori obat pada umumnya.

A. Pasien Pediatrik

Pediatrik adalah bagian dari pengobatan yang berhubungan dengan penyakit pada anak-anak mulai dari lahir hingga usia remaja. Karena rentang dalam usia dan perkembangan tubuh dari populasi pasien ini, maka kelompok ini terdiri dari beberapa kelompok usia sebagai berikut:

- Neonatus (baru lahir), dari lahir sampai bulan;
- Bayi, 1 bulan sampai 1 tahun;
- Anak usia dini, 1 tahun sampai 5 tahun;
- Akhir masa kanak-kanak, 6 tahun sampai 12 tahun;
- Remaja, 13 tahun sampai 17 tahun.
- Neonatus prematur jika lahir sebelum masa kehamilan 37 minggu.

Pengaturan dosis yang tepat bagi pasien pediatrik ini tergantung kepada beberapa faktor, termasuk usia dan berat badan pasien, status kesehatan secara keseluruhan, kondisi fungsi biologik seperti respirasi dan sirkulasi, tingkat perkembangan sistem tubuh untuk metabolisme obat (fungsi hati) dan eliminasi obat (fungsi ginjal). Pada neonatus, fungsi dan sistem biologis ini belum berkembang secara sempurna. Fungsi ginjal misalnya, akan berkembang setelah usia 2 tahun. Hal ini merupakan bagian yang penting oleh karena kebanyakan obat yang diberikan pada bayi, dan anak usia dini adalah obat antimikroba yang akan dieliminasi melalui ginjal. Jika laju eliminasi obat tidak sempurna, maka obat akan diakumulasi dalam tubuh, yang bisa mengakibatkan overdosis dan reaksi toksisitas. Oleh sebab itu, penggunaan data farmakokinetik (laju dan tingkat absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi) bersama dengan karakteristik individu pasien dan respon terapeutik, akan menyempurnakan pendekatan rasional untuk perhitungan dosis obat bagi pediatrik.

Dosis obat bagi pediatrik termasuk neonatologi dapat ditemukan dalam literatur-literatur produk obat individual sebagai rujukan sebagaimana yang dirangkum dalam bab ini juga. Selain perhitungan yang ditampilkan dalam bab ini, berhubungan dengan pengaturan dosis pediatrik untuk pemberian infus intravena akan dibahas pada bab selanjutnya, demikian pula dengan pengaturan dosis parenteral dan nutrisi enteral.

B. Pasien Geriatrik

Meskipun istilah tua sebenarnya memiliki defenisi yang berbeda menurut kronologi usia, namun jelas bahwa kapasitas fungsi dari kebanyakan organ telah menurun setelah melewati usia dewasa dan telah mengalami perubahan respon terhadap obat sesuai dengan perjalanan usia. Pengobatan geriatrik merupakan istilah yang berhubungan dengan manajemen penyakit pada usia tua.

Farmakoterapi, kajian mengenai pemakaian bahan aktif farmakologik dalam pengobatan penyakit, lebih banyak diterapkan dalam pengobatan usia tua dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Selain itu, kelompok usia sangat berpengaruh terhadap kondisi pengobatan, beberapa kondisi ini terjadi pada usia tua seperti osteoarthritis degeneratif, gangguan jantung kongestif, insufisiensi pembuluh darah vena dan arteri, stroke, gangguan saluran kemih, karsinoma prostat, parkinson, dan penyakit Alzheimer. Kebanyakan pasien usia tua memiliki kondisi patologis yang memerlukan terapi multi-obat. Pengobatan pada usia tua ini diberikan bukan hanya untuk mengurangi gejala dan mengelola penyakit, tetapi juga untuk meningkatkan fungsi tubuh, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan usia harapan hidup.

Fungsi fisiologik tubuh mencapai puncaknya pada usia sebelum 30 tahun. Penurunan kapasitas dan fungsi fisiologik ini bersifat kumulatif seiring dengan bertambahnya usia. Fungsi ginjal merupakan pertimbangan utama dalam pengaturan dosis pada pasien usia tua karena penurunan fungsi ini mengakibatkan penurunan eliminasi obat. Aliran darah ginjal akan menurun sekitar 1% setiap tahunnya setelah usia diatas 30 tahun, mengakibatkan penurunan kumulatif pada usis 60–70 tahun sekitar 30%-40%, dan lebih tinggi lagi pada pasien yang lebih tua.

Penurunan fungsi ginjal akan meningkatkan kemungkinan toksisitas obat dalam tubuh dan timbulnya berbagai efek samping. Oleh sebab itu pengaturan dosis awal bagi pasien usia lanjut seringkali dibawah dosis lazim untuk dewasa. Juga diperlukan penyesuaian dosis dalam pengobatan karena adanya efek samping ataupun hasil terapi yang tidak memuaskan. Parameter farmakokinetika juga merupakan hal yang penting dalam pengaturan dosis dari obat tertentu bagi pasien usia lanjut.

Ada beberapa fitur-fitur umum dalam pengobatan bagi pasien usia lanjut, termasuk diantaranya penggunaan obat jangka panjang, kebutuhan untuk menggunakan terapi multi-obat, dengan demikian meningkatkan resiko interaksi obat dan efek samping obat, juga hal ini menurunkan tingkat kepatuhan pasien. Hal terakhir biasanya diakibatkan oleh gangguan kognisi, kebingungan karena dosis dan obat yang beraneka macam, depresi atau apatis dan alasan ekonomi.

Pertimbangan Khusus Dalam Pengaturan Dosis Usia Lanjut

Penentuan dosis untuk pasien lanjut usia sering membutuhkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Terapi sering dimulai dengan dosis dewasa lebih rendah dari biasanya.
- Penyesuaian Dosis mungkin diperlukan berdasarkan respon terapi.
- Kondisi fisik pasien menentukan dosis obat dan pemilihan rute pemberian.
- Dosis dapat ditentukan sesuai pada berat badan pasien, luas permukaan tubuh, status kesehatan dan penyakit, dan factor farma kokinetik.
- Terapi obat secara serentak dapat mempengaruhi efektivitas obat dengan dosis yang diberikan.
- Suatu dosis obat dapat menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan dan dapat mempengaruhi kepatuhan pasien.
- Regimen dosis yang kompleks dari jenis obat yang banyak dapat mempengaruhi kepatuhan pasien.

Bentuk Sediaan yang Diberikan Kepada Pasien Pediatrik dan Geriatrik

Bagi kebanyakan pasien, bentuk sediaan padat, seperti tablet dan kapsul, lebih disukai untuk pemberian oral obat karena kenyamanan, kemudahan pemakaian, mudah diidentifikasi, mudah ditransportasikan, dan relatif biaya lebih rendah bila dibandingkan dengan bentuk sediaan lainnya. Namun demikian bentuk sediaan padat seringkali sulit atau tidak mungkin diberikan kepada anak-anak, geriatri, atau pasien yang tidak mudah untuk menelan. Dalam hal ini, bentuk cair lebih disukai, seperti larutan oral, sirup, suspensi, dan obat tetes. Keuntungan dari bentuk cair adalah bahwa dosis dapat dengan mudah disesuaikan dengan mengubah volume cairan diberikan. Bila perlu, bentuk obat cair dapat diberikan melalui selang makanan oral. Apoteker sering diminta untuk mencampurkan cairan oral kepada sediaan padat ketika sebuah produk cair tidak tersedia. Tablet kunyah dan gel padat bentuk yang dapat hancur atau larut dalam mulut juga sering digunakan untuk pasien anak dan usia lanjut. Selain itu, dan seperti yang tercantum dalam bab sebelumnya, tablet yang dipecahkan dan tablet yang dihancurkan dapat menjadi pilihan bagi individu tidak mampu atau tidak mau menelan tablet utuh.

Untuk efek sistemik, suntikan dapat digunakan dibandingkan sediaan oral bila diperlukan untuk pasien anak dan lanjut usia, dengan dosis atau kekuatan sediaan disesuaikan untuk memenuhi persyaratan dari masing-masing pasien.

C. Dosis Obat Berdasarkan Usia

Usia pasien merupakan pertimbangan penting dalam penentuan dosis obat. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, neonatus memiliki fungsi hati dan fungsi ginjal yang belum sempurna sehingga dapat mempengaruhi respon terhadap obat. Sementara pada pasien lanjut usia, selain karena fungsi organ berkurang, masalah juga sering diakibatkan oleh masalah patologi dan peningkatan sensitivitas terhadap obat.

Sebelum perbedaan fisiologis antara pasien dewasa dan anak diklarifikasi, keduanya sering diobati seolah-olah mereka adalah miniatur orang dewasa. Berbagai aturan dosis di mana dosis pediatrik adalah sebagian kecil dari dosis dewasa yang berdasarkan usia

relatif yang diciptakan untuk anak-anak (misalnya, hukum Young). Sekarang ini, aturan ini tidak dapat digunakan secara umum karena usia dianggap sebagai kriteria tunggal yang berlaku dalam penentuan dosis yang akurat untuk anak, terutama bila dihitung dari dosis lazim dewasa yang dengan sendirinya memberikan variasi klinis yang luas dalam respon terapeutiknya. Beberapa dari aturan ini disajikan dalam berikutnya untuk tujuan perspektif dan sejarah.

Saat ini, usiadipertimbangkan dalam menentukan dosis agen terapeutik yang kuat, hal ini umum digunakan bersama dengan faktor lain, seperti berat badan. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 7.1, di mana dosis digoxin ditentukan oleh kombinasi dari usia dan berat badan pasien.

Contoh Perhitungan Berdasarkan Usia

1. Sebuah obat batuk *over-the-counter* (bebas) mengandung 120 mg dekstrometorfan dalam botol 60 ml. Etiket menyatakan dosisnya adalah 1 1/2 sendok teh untuk anak usia 6 tahun. Berapa miligram dekstrometorfan yang terkandung dalam dosis anak?

Jawab:

$$1 \frac{1}{2} \text{ sendok teh} = 7,5 \text{ mL}$$

$$\frac{60 \text{ mL}}{120 \text{ mg}} = \frac{7,5 \text{ mL}}{x \text{ mg}}$$

$$x = 15 \text{ mg dekstrometorfan}$$

Rumus Young $\frac{\text{Usia anak}}{\text{usia anak} + 12} \times \text{dosis dewasa} = \text{dosis anak}$

Rumus Cowling $\frac{\text{Usia anak pada ulang tahun berikutnya} \times \text{dosis dewasa}}{24} = \text{dosis anak}$

Rumus Fried (untuk bayi) $\frac{\text{usia (bulan)} \times \text{dosis dewasa}}{150} = \text{dosis bayi}$

Rumus Clark (berat badan) $\frac{\text{berat badan (lb)} \times \text{dosis dewasa}}{150 (\text{berat badan rata2 dewasa})} = \text{dosis anak}$

Catatan: Angka 150 dalam aturan Fried adalah perkiraan usia (12,5 tahun atau 150 bulan) dari seorang individu yang akan menerima dosis dewasa normal, dan angka 150 dalam aturan Clark adalah perkiraan berat dari seorang individu yang juga akan menerima dosis dewasa.

Tabel 7.1. Perhitungan dosis pediatrik digoksin berdasarkan umur dan berat badan

Usia	Dosis Digoksin ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
Prematur	15 – 25
Usia lahir normal	20 – 30
1 – 24 bulan	30 – 50
2 – 5 tahun	25 – 35
5 – 10 tahun	15 – 30
Di atas 10 tahun	8 – 12

2. Dari data pada tabel di atas, hitunglah range dosis untuk bayi dengan berat badan 6,8 kg.

$$\frac{30 \text{ } \mu\text{g}}{x \text{ } \mu\text{g}} = \frac{1 \text{ kg}}{6,8 \text{ kg}} = \frac{50 \text{ } \mu\text{g}}{x \text{ } \mu\text{g}} = \frac{1 \text{ kg}}{6,8 \text{ kg}}$$

$$x = 204 \text{ } \mu\text{g}; \quad x = 340 \text{ } \mu\text{g}$$

$$\text{Range dosis} = 204 - 340 \text{ } \mu\text{g}$$

Berbeda dengan contoh sebelumnya penentuan dosis untuk resep obat bebas yang dapat dibeli untuk pengobatan sendiri meliputi petunjuk label yang menyediakan pedoman untuk pemberian dosis aman dan efektif. Untuk penggunaan pediatrik, dosis umumnya didasarkan pada kelompok usia; misalnya, berusia 2 sampai 6 tahun, berusia 6 sampai 12 tahun, dan lebih dari 12 tahun. Untuk anak-anak usia 2 tahun atau lebih muda, rekomendasi label umumnya menyatakan "berkonsultasi dengan dokter Anda".

D. Dosis Obat Berdasarkan Berat Badan

Dosis lazim obat umumnya dianggap cocok untuk mayoritas individu yang memakai obat. Dalam beberapa kasus, dosis lazim dinyatakan sebagai jumlah tertentu obat per unit berat badan pasien, seperti miligram obat perkilogram berat badan (disingkat mg/kg). Penentuan dosis dengan cara ini dilakukan untuk menghitung jumlah obat yang diberikan khusus untuk berat pasien yang sedang dirawat.

Persamaan yang digunakan untuk menghitung dosis berdasarkan berat badan adalah:

$$\text{Dosis (mg)} = \text{Berat badan pasien (kg)} \times \frac{\text{dosis obat (mg)}}{1 \text{ kg}}$$

Persamaan ini didasarkan pada dosis obat dalam mg / kg dan berat badan pasien dalam kilogram. Bila ingin menggunakan satuan yang berbeda, maka satuan yang digunakan dalam persamaan dapat digantikan dengan satuan yang diterapkan digunakan secara konsisten.

Berat badan pasien merupakan faktor penting dalam pengukuran dosis karena berat badan ini sangat mempengaruhi konsentrasi obat dalam cairan tubuh dan pada situs kerjanya. Perhitungan dosis berdasarkan berat badan telah menjadis tandar untuk obat tertentu dalam dosis orang dewasa dan pasien anak.

Contoh Perhitungan Dosis Berdasarkan Berat Badan

Dosis obat berdasarkan berat badan secara umum lebih mudah dinyatakan dalam mg/kg, karena dosis obat paling banyak diberikan dalam jumlah miligram. Namun, hal ini tidak selalu terjadi. Tergantung pada jenis obat, bentuk sediaan, dan/atau rute pemberian, di mana dosis beberapa obat dinyatakan dalam satuan ukuran lainnya seperti mikrogram atau mililiter per pon atau kilogram berat badan.

Persamaan yang digunakan untuk menghitung dosis berdasarkan berat badan adalah:

$$\text{Dosis (mg)} = \text{Berat badan pasien (kg)} \times \frac{\text{dosis obat (mg)}}{1 \text{ kg}}$$

1. Dosis lazim untuk klorambusila dalah 150mcg/kg berat badan. Berapa milligram yang harus diberikan kepada pasien dengan berat 154 lb?

Jawab:

$$150 \text{ mcg} = 0,15 \text{ mg}$$

$$1 \text{ kg} = 2,2 \text{ lb}$$

$$\begin{aligned} \text{Dosis (mg)} &= 154 \text{ lb} \times \frac{0,15 \text{ mg}}{2,2 \text{ lb}} \\ &= 10,5 \text{ mg} \end{aligned}$$

Atau dengan analisis dimensi:

$$\frac{1 \text{ mg}}{1000 \text{ mcg}} \times \frac{150 \text{ mcg}}{1 \text{ kg}} \times \frac{1 \text{ kg}}{2,2 \text{ lb}} \times \frac{154 \text{ lb}}{1} = 10,5 \text{ mg}$$

2. Dosis dari sulfisoxazole untuk bayi usia lebih dari 2 bulan dan anak-anak adalah 60 sampai 75 mg/kg berat badan. Berapakah kisaran dosis lazim untuk anak dengan berada badan 44 lb?

Jawab:

$$1 \text{ kg} = 2,2 \text{ lb}$$

$$20 \text{ kg} = 44 \text{ lb}$$

$$60 \text{ mg/kg} \times 20 \text{ kg} = 1200 \text{ mg}$$

$$75 \text{ mg/kg} \times 20 \text{ kg} = 1500 \text{ mg}$$

Jadi, kisaran dosis adalah 1200 – 1500 mg.

Tabel Pengaturan Dosis

Untuk beberapa jenis obat, dosis disesuaikan dengan berat badan atau luas permukaan tubuh. Tabel dosis biasanya ditampilkan dalam literatur produk untuk membantu dokter dan apoteker, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2. Dosis berdasarkan berat badan dari obat hipotetik

BODY WEIGHT		TOTAL mg/DAY		
KILOGRAMS	POUNDS	0.5 mg/kg	1 mg/kg	2 mg/kg
40	88	20	40	80
50	110	25	50	100
60	132	30	60	120
70	154	35	70	140
80	176	40	80	160
90	198	45	90	180
100	220	50	100	200

Dengan menggunakan tabel 7.2, dosis harian adalah 0,5 mg/kg. Berapa banyak kapsul yang mengandung produk obat 20 mg yang harus diberikan kepada pasien dengan berat 176 lb jika regimen dosisnya untuk terapi selama 15 minggu?

Jawab:

$$2 \text{ kapsul/hari} \times 7 \text{ hari/minggu} \times 15 \text{ minggu} = 210 \text{ kapsul.}$$

E. Perhitungan Dosis Berdasarkan Luas Permukaan Tubuh

Metode perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh digunakan secara luas, biasanya untuk dua kelompok pasien, yaitu pasien penderita kanker yang sedang menjalani kemoterapi dan pasien anak-anak dengan pengecualian neonatus. Neonatus ini lebih sering dihitung dosisnya berdasarkan pertimbangan usia dan berbagai fungsi biokimia, fisiologis, faktor fungsional, patologis dan imunologi. Tabel berikut ini menunjukkan hubungan antara berat tubuh rata-rata dan luas permukaan tubuh dalam satuan meter persegi (m^2) berdasarkan dimensi rata-rata tubuh. Rata-rata orang dewasa dianggap memiliki luas permukaan tubuh $1,73 m^2$. Dengan demikian, untuk membaca tabel 7.3 seseorang dengan luas permukaan tubuh $1,30 m^2$ (atau sekitar 75% dari luas permukaan tubuh rata-rata dewasa) akan menerima sekitar 75% dari dosis dewasa.

Contoh Perhitungan Dosis Berdasarkan Luas Permukaan Tubuh

Persamaan yang digunakan untuk menghitung dosis berdasarkan luas permukaan tubuh adalah:

$$dosis = \frac{\text{Luas Permukaan Tubuh } (m^2)}{1,73 m^2} \times \text{dosis obat } (mg)$$

Jika dosis dewasa suatu obat adalah 100 mg, hitunglah perkiraan dosisnya untuk anak-anak dengan luas permukaan tubuh $0,83 m^2$ menggunakan a) persamaan dan b) tabel 7.3.

- Dosis anak = $\frac{0,83 m^2}{1,73 m^2} \times 100 mg = 47,97$ atau 48 mg
- Menurut tabel 7.3 luas permukaan tubuh $0,83 m^2$ samadengan 48% luas permukaan tubuh dewasa rata-rata adalah $1,73 m^2$, maka dosis anak menjadi 48% dari dosis dewasa.
 $100 mg \times 0,48 = 48 mg$.

Tabel Pengaturan Dosis

Untuk obat-obat tertentu, tabel dosis dapat digunakan untuk menentukan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh pasien.

Tabel 7.3. Hubungan luas permukaan tubuh dengan berat badan

KILOGRAMS	POUNDS	SURFACE AREA	
		IN SQUARE METERS	PERCENTAGE OF ADULT DOSE*
2	4.4	0.15	9
3	6.6	0.20	11.5
4	8.8	0.25	14
5	11.0	0.29	16.5
6	13.2	0.33	19
7	15.4	0.37	21
8	17.6	0.40	23
9	19.8	0.43	25
10	22.0	0.46	27
15	33.0	0.63	36
20	44.0	0.83	48
25	55.0	0.95	55
30	66.0	1.08	62
35	77.0	1.20	69
40	88.0	1.30	75
45	99.0	1.40	81
50	110.0	1.51	87
55	121.0	1.58	91

* Based on average adult surface area of 1.73 square meters.
Adapted from Martin EW et al., *Techniques of Medication*, J. B. Lippincott, 1969:31, who adapted it from *Medell's Drugs of Choice* (Mosby).

Dengan menggunakan tabel 7.3, temukanlah dosis obat hipotetis pada tingkat dosis 300 mg/ m² untuk anak yang memiliki luas permukaan tubuh 1,25 m².

Jawab:

Dari tabel 7.3 dosis = 375 mg

Dari perhitungan ; $300 \text{ mg/m}^2 \times 1,25 \text{ m}^2 = 375 \text{ mg}$.

F. Nomogram

Pada umumnya, perhitungan luas permukaan tubuh menggunakan nomogram standar, yang meliputi berat badan dan tinggi badan. Nomogram untuk anak-anak dan orang dewasa ditunjukkan pada gambar 7.1 dan gambar 7.2 luas permukaan tubuh individu dapat ditentukan dengan menarik garis lurus yang menghubungkan tinggi dan berat badan seseorang. Titik yang terdapat pada garis potong kolom tengah menunjukkan luas permukaan tubuh orang tersebut dalam meter persegi.

Tabel 7.4 Petunjuk dosis anak-anak berdasarkan luas permukaan tubuh

PATIENT'S BSA (m ²)	DOSE LEVEL			
	250 mg/m ² DOSE	300 mg/m ² DOSE	350 mg/m ² DOSE	400 mg/m ² DOSE
0.25	62.5 mg	75 mg	87.5 mg	100 mg
0.50	125 mg	150 mg	175 mg	200 mg
1.00	250 mg	300 mg	350 mg	400 mg
1.25	312.5 mg	375 mg	437.5 mg	500 mg
1.50	375 mg	450 mg	525 mg	600 mg

Dalam contoh yang ditunjukkan pada gambar 7.1, maka seorang anak dengan berat badan 15 kg dan tinggi 100 cm memiliki luas permukaan tubuh 0,64 m².


Persamaan yang digunakan untuk menghitung dosis obat berdasarkan luas permukaan tubuh adalah sebagai berikut:

$$\text{dosis obat} = \frac{\text{luas permukaan tubuh (m}^2\text{)}}{1,73 \text{ m}^2} \times \text{dosis obat (mg)}$$

Jika diperlukan untuk menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan nomogram, dapat digunakan persamaan berikut ini:


$$\text{luas permukaan tubuh (m}^2\text{)} = \sqrt{\frac{\text{tinggi badan (cm)} \times \text{berat badan (kg)}}{3600}}$$

Nomogram for Determination of Body Surface Area from Height and Weight



From the formula of Du Bots and Du Bots, *Arch Intern Med* 17, 863 (1916): $S = W^{0.425} \times H^{0.725} \times 71.84$, or $\log S = \log W \times 0.425 + \log H \times 0.725 + 1.8564$ (S = body surface in cm², W = weight in kg, H = height in cm).

Gambar 7.1 Luas permukaan tubuh anak-anak (Diem K, Lentner C, Geigy JR. Scientific Tables. 7th Ed. Basel, Switzerland: JR Geigy, 1970:538.)



From the formula of Du Bots and Du Bots, *Arch Intern Med* 17, 863 (1916): $S = W^{0.425} \times H^{0.725} \times 71.84$, or $\log S = \log W \times 0.425 + \log H \times 0.725 + 1.8564$ (S = body surface in cm², W = weight in kg, H = height in cm).

Gambar 7.2 Luas permukaan tubuh dewasa ((Diem K, Lentner C, Geigy JR. Scientific Tables. 7th Ed. Basel, Switzerland: JR Geigy, 1970:538.)

Contoh Perhitungan

1. Jika dosis dewasa dari suatu obat adalah 75 mg, dengan menggunakan nomogram luas permukaan tubuh, berapakah dosis yang diberikan untuk anak dengan berat 40 lb, dan tinggi 32 in.?

Jawab:

Dari nomogram, luas permukaan tubuh = $0,60 \text{ m}^2$
Sehingga dosis untuk anak =

$$\frac{0,60 \text{ m}^2}{1,73 \text{ m}^2} \times 75 \text{ mg} = 26 \text{ mg}$$

2. Dosis lazim untuk anak adalah 25 mg/m^2 . Dengan menggunakan nomogram, hitunglah dosis untuk anak dengan berat badan 18 kg dan tinggi badan 82 cm.

Jawab:

Dari nomogram, luas permukaan tubuh = $0,60 \text{ m}^2$,
Dosis = $0,60 \times 25 \text{ mg} = 15 \text{ mg}$

Nomogram pada gambar 7.2 didesain khusus untuk penentuan luas permukaan tubuh dewasa. Dosis dewasa kemudian dihitung menurut persamaan berikut:

$$\frac{\text{luas permukaan tubuh dewasa (m}^2\text{)}}{1,73 \text{ m}^2} \times \text{dosis lazim dewasa} = \text{dosis untuk dewasa}$$

3. Jika dosis lazim dewasa adalah 120 mg, berdasarkan luas permukaan tubuh, berapa dosis yang diberikan kepada seseorang dengan tinggi badan 6 ft dan berat badan 200 lb?

Jawab:

Luas permukaan tubuh (nomogram) = $2,13 \text{ m}^2$

$$\frac{2,13 \text{ m}^2}{1,73 \text{ m}^2} \times 120 \text{ mg} = 147,75 \text{ mg} = 148 \text{ mg}$$

4. Jika dosis suatu obat adalah 5 mg/m², berapa dosis yang akan diberikan kepada pasien dengan luas permukaan tubuh 1,9 m²?

Jawab:

$$5 \text{ mg} \times 1,9 \text{ m}^2 = 9,5 \text{ mg}$$

Persamaan Luas Permukaan Tubuh

Selain menggunakan nomogram, luas permukaan tubuh dapat ditentukan melalui persamaan:

$$\text{luas permukaan tubuh, m}^2 = \frac{\sqrt{\text{Tinggi (cm)} \times \text{berat (kg)}}}{3600}$$

Hitunglah luas permukaan tubuh pasien dengan tinggi badan 165 cm dan berat badan 65 kg.

$$\begin{aligned} \text{luas permukaan tubuh, m}^2 &= \frac{\sqrt{165(\text{cm}) \times 65(\text{kg})}}{3600} \\ &= 1,73 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

G. Perhitungan Dosis Berdasarkan Kondisi Medis

Selain faktor-faktor yang telah dibahas sebelumnya yang dapat digunakan untuk menentukan dosis obat, kondisi medis yang akan diobati dan tingkat keparahan kondisi juga harus diperhatikan. Tabel 7.5 menyajikan contoh jadwal dosis untuk obat berdasarkan usia pasien dan kondisi medis yang harus diobati.

Tabel 7.5 pengaturan dosis pemberian parenteral bagi pasien dengan kondisi medis tertentu

	DOSE	ROUTE	FREQUENCY
Adults			
Urinary tract infection	250 mg	IV or IM	q12h
Bone and joint infections	2 g	IV	q12h
Pneumonia	500 mg-1 g	IV or IM	q8h
Mild skin infections	500 mg-1 g	IV or IM	q8h
Life-threatening infections	2 g	IV	q8h
Lung infections (normal kidney function)	30-50 mg/kg (NMT 6 g/day)	IV	q8h
Neonates (up to 1 month)	30 mg/kg	IV	q12h
Infants and Children (1 month to 12 years)	30-50 mg/kg (NMT 6g/day)	IV	q8h

Contoh:

Dengan menggunakan tabel 7.5, hitunglah dosis obat IV untuk neonatus dengan berat 3 pounds 3 ons.

Jawab:

$$\begin{aligned} 3 \text{ pound} &= 3 \times 454 \text{ g} = 1362 \text{ g} \\ 3 \text{ ounce} &= 3 \times 28,35 = 85 \text{ g} \\ \text{Berat neonatus} &= 1362 \text{ g} + 85 \text{ g} = 1447 \text{ g} \\ 1447 \text{ g}/1000 &= 1.447 \text{ kg} \\ 30 \text{ mg/kg} \times 1.447 \text{ kg} &= 43,4 \text{ mg setiap 12 jam.} \end{aligned}$$

Pertimbangan Khusus Dalam Terapi Kanker

Istilah kemoterapi digunakan untuk pengobatan penyakit dengan obat kimia atau bahan kemoterapeutik. Kemoterapi terutama berhubungan dengan pengobatan pasien kanker. Pertimbangan utama dari terapi ini adalah karena efektif untuk kanker yang sudah menyebar atau metastatik, di mana pengobatan yang lain seperti operasi dan terapi radiasi hanya terbatas pada bagian tubuh tertentu. Seringkali terapi kombinasi digunakan, dengan lebih dari satu jenis pengobatan misalnya kombinasi antara radiasi dan kemoterapi.

Hampir semua agen kemoterapeutik bekerja dengan menghancurkan sel kanker melalui efeknya terhadap sintesis atau fungsi dari DNA. Mayoritas agen-agen kemoterapi ini adalah kategori alkylating agent, antimetabolit, alkaloid-alkaloid tumbuhan, antibiotik antitumor, dan hormon steroid. Agen-agen kemoterapeutik sering digunakan secara oral, melalui injeksi intravena, atau infus intravena kontinyu. Namun demikian, rute pemakaian lain juga seringkali diperlukan, seperti intraarterial, intratekal, injeksi intramuskular, atau pemberian pada bagian khusus seperti paru-paru (intrapleural), abdomen (intraperitoneal), kulit (topikal) dan lain-lain.

Terapi kombinasi dilakukan dengan menggunakan obat dengan mekanisme kerja yang berbeda terhadap sel kanker target. Dengan demikian, efektifitas terapi akan ditingkatkan, pemakaian dosis rendah, dan pengurangan efek samping. Terapi kombinasi pada penyakit kanker seringkali menggunakan dua, tiga dan empat regimen.

Kemoterapi kanker dapat dilakukan dengan cara berikut:

- Terdiri dari satu atau lebih jenis obat untuk mencapai regimen terapi obat yang stabil atau dapat digunakan obat investigasional sebagai bagian dari percobaan klinis.
- Kombinasi obat dapat diberikan dengan rute pemberian yang sama atau berbeda, namun umumnya diberikan secara oral dan atau intravena.
- Obat-obat tersebut mungkin diberikan secara bersamaan atau tidak pada hari yang sama atau berbeda selama siklus pengobatan (misalnya 28 hari). Format penulisan aturan pakai biasanya oleh dokter ditulis D untuk hari (day), diikuti day(s) untuk pengobatan selama siklus, tanda garis datar (-) berarti sampai, koma (,) berarti dan. Sehingga D 1-4 berarti hari 1 sampai 4, D 1,4 berarti hari 1 dan 4.
- Obat-obat yang digunakan dalam terapi kombinasi sesuai dengan obat standar/ regimen dosis yang ditandai dengan penggunaan singkatan atau akronim. Misalnya, pengobatan kanker kandung kemih dengan MVAC berarti metotreksat, vinblastin, aktinomisin (doksorubisin) dan Cisplatin. Pengobatan kanker kolorektal dengan FU/LU, terdiri dari Fluorouracil Leucovorin; pengobatan kanker paru-paru dengan PC, terdiri dari Paclitaxel Carboplatin; dan untuk kanker ovarium dengan CHAD yang terdiri dari cyclophosphamide - hexaethylmelamine - adriamycin - diamminedichloroplatinum (cisplatin).
- Selain penggunaan singkatan untuk obat terapi regimen, obat tersebut secara tunggal juga memiliki singkatan sendiri, seperti MTX untuk methotrexate, DOX untuk doxorubicin, VBL untuk vinblastine.
- Untuk aksi sistemik, dosis agen-agen kemoterapeutik selalu didasarkan pada berat badan atau luas permukaan tubuh. Pemberian dosis dengan regimen standar harus dihindari oleh karena pada beberapa pasien mengalami kemunduran fungsi ginjal atau hati sehingga mengurangi kemampuan memetabolisme dan mengeliminasi obat dari tubuhnya.
- Bagi pasien tertentu, kemoterapi dosis tinggi diberikan sebagai usaha untuk membunuh sel-sel tumor.

Untuk mencegah kesalahan dalam kemoterapi, seorang apoteker harus menafsirkan resep obat dengan tepat, mengikuti

regimen dosis individual, menghitung dosis masing-masing obat yang diresepkan, dan memberikan bentuk sediaan yang tepat dengan takaran yang diperlukan.

Contoh Perhitungan Regimen Dosis Untuk Kemoterapi

1. Regimen : VC
Siklus : 28d; ulangi untuk 2-8 siklus
Vinorelbine, 25 mg/m², IV, D 1,8,15,22
Cisplatin, 100 mg/m², IV, D 1
Untuk vinorelbine dan cisplatin, hitunglah jumlah dosis intravena setiap siklus dengan tinggi badan 5 ft, 11 in. Dan berat badan 175 lb.

Jawab:

Dari nomogram untuk penentuan luas permukaan tubuh (a) tentukan luas permukaan tubuh pasien (b) hitunglah jumlah setiap obat dalam regimennya.

- (a) Luas permukaan tubuh = 2,00 m²
- (b) Vinorelbine, 25 mg x 2,00 m² x 4 hari = 200 mg
Cisplatin, 100 mg x 2,00 m² x 1 hari = 200 mg.

2. Regimen : CMF
Siklus : 28 d
Cyclophosphamide, 100 mg/m²/d po, D 1-14
Methotrexate, 40 mg/m², IV, D 2,8
Fluorouracil, 600 mg/m², IV, D 1,8

Hitunglah jumlah dosis siklus untuk cyclophosphamide, methotrexate, dan fluorouracil untuk pasien dengan luas permukaan tubuh 1,5 m²

Jawab:

- Cyclophosphamide: 100mg x 1,5 x 14 = 2100 mg = 2,1 g
Methotrexate : 40 mg x 1,5 x 2 = 120 mg
Fluorouracil : 600 mg x 1,5 x 2 = 1800 mg = 1,8 g

BAB VIII

LARUTAN ELEKTROLIT: MILLIEKIVALEN, MILLIMOL DAN MILLIOSMOL

A. Pendahuluan

Sebagaimana yang tercantum dalam bab sebelumnya, molekul dari senyawa kimia dapat tetap utuh dalam larutan atau mungkin mengalami disosiasi menjadi partikel yang dikenal sebagai ion yang mengandung muatan listrik. Senyawa yang tidak mengalami disosiasi dalam larutan dikenal sebagai senyawa nonelektrolit, dan senyawa yang mengalami disosiasi dengan derajat disosiasi yang berbeda-beda dikenal sebagai senyawa elektrolit. Urea dan dekstrosa adalah contoh senyawa nonelektrolit di dalam cairan tubuh, natrium klorida dalam cairan tubuh merupakan contoh senyawa elektrolit.

Dalam larutan, natrium klorida akan terbagi menjadi ion Na^+ dan Cl^- , yang membawa muatan listrik. Jika sebuah elektroda dengan arus lemah ditempatkan dalam larutan, maka ion-ion akan bergerak ke arah muatan yang berlawanan. Ion Na^+ akan bergerak ke arah elektroda negative (katoda) dan disebut sebagai kation. Ion Cl^- akan bergerak ke arah elektroda positif (anoda) dan disebut sebagai anion.

Ion elektrolit di dalam plasma darah termasuk kation Na^+ , K^+ , Ca^{++} , dan Mg^{++} , sedangkan anion adalah Cl^- , HCO_3^- , HPO_4^- , SO_4^- , asam organik, dan protein. Di dalam cairan tubuh, elektrolit memainkan peranan penting dalam mempertahankan kesetimbangan asam-basa dalam tubuh. Peranan lainnya adalah mengontrol volume cairan tubuh dan membantu pengaturan metabolisme.

Sediaan elektrolit digunakan untuk penanganan gangguan keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh. Dalam praktek klinik, cairan ini dibagi dalam bentuk larutan oral dan sirup, sebagai granul yang dimaksudkan untuk dilarutkan dalam air untuk membuat larutan oral, sebagai tablet atau kapsul dan sebagai infuse intravena.

B. Miliekivalen

Sebagai satuan kimia, miliekivalen (mEq) kini digunakan secara eksklusif oleh praktisi klinik, dokter, dan farmasis, serta industry untuk menyatakan konsentrasi dari larutan elektrolit. Satuan ini berhubungan dengan jumlah muatan ionik dalam larutan dan membutuhkan pencatatan jumlah ion valensinya. Dengan kata lain, satuan ini menunjukkan jumlah aktivitas kimia dari elektrolit. Dalam sistem satuan internasional (SI), yang digunakan di negara-negara Eropa dan banyak Negara lainnya, konsentrasi molar (sebagai milimol per liter (mmol/L) dan mikromol per liter ($\mu\text{mol/L}$) digunakan untuk menyatakan kebanyakan nilai laboratorium klinik, termasuk elektrolit.

Pada kondisi normal, plasma darah mengandung 154 mEq kation dan anion dalam jumlah yang seimbang (Tabel 8.1).

Tabel 8.1. Miliekivalen perliter (mEq/L) elektrolit dalam plasma darah

CATIONS	mEq/L	ANIONS	mEq/L
Na ⁺	142	HCO ₃ ⁻	24
K ⁺	5	Cl ⁻	105
Ca ⁺⁺	5	HPO ₄ ^{- -}	2
Mg ⁺⁺	2	SO ₄ ^{- -}	1
		Org. Ac. ⁻	6
		Proteinate ⁻	16
	<u>154</u>		<u>154</u>

Dalam pembuatan larutan ion K⁺, garam kalium dilarutkan dalam air. Selain ion K⁺, larutan juga mengandung ion dengan muatan yang berlawanan. Kedua komponen ini adalah ekuivalen secara kimiawi, di mana miliekivalen dari kation ekuivalen dengan anionnya. Hal yang menarik adalah ketika dilarutkan sejumlah kalium klorida dalam air, akan memberikan 40 mEq K⁺ perliter, dan juga tepat 40 mEq Cl⁻, tetapi larutan tidak mengandung ion dalam berat yang sama.

Tabel 8.2. Nilai referensi beberapa elektrolit serum

CATION/ANION	mEq/L	SI UNITS (mmol/L)
Sodium	135-145	135-145
Potassium	3.5-5.5	3.5-5.5
Calcium	4.6-5.5	2.3-2.75
Magnesium	1.5-2.5	0.75-1.25
Chloride	96-106	96-106
Carbon Dioxide	24-30	24-30
Phosphorus	2.5-4.5	0.8-1.5

Miliekivalen merupakan representasi dalam milligram, dari zat terlarut yang sama dengan 1/1000 gram ekivalennya, dengan mempertimbangkan jumlah ion valensinya. Miliekivalen menggambarkan aktivitas kimia suatu zat relative terhadap aktivitas 1 mg hidrogen. Kemudian, berdasarkan berat atom dan valensi dari spesies, 1 mEq merupakan representasi dari 1 mg hidrogen, 20 mg Calcium, 23 mg natrium, 35,5 mg klorin, 39 mg magnesium, dan seterusnya.

Konsentrasi elektrolit dalam infus intravena umumnya dinyatakan dalam mEq/L.

Contoh Perhitungan Milieqivalen

Untuk mengkonversi konsentrasi elektrolit dalam larutan sehingga dinyatakan dalam milieqivalen persatuan volume menjadi bobot persatuan volume atau sebaliknya, maka menggunakan persamaan berikut ini:

Untuk mengkonversi milligram (mg) ke miliekivalen (mEq):

$$\text{mEq} = \frac{\text{mg} \times \text{valensi}}{\text{berat atom atau berat molekul}}$$

Untuk mengkonversi miliekivalen (mEq) ke milligram (mg):

$$\text{mg} = \frac{\text{mEq} \times \text{Berat atom atau berat molekul}}{\text{valensi}}$$

Untuk mengkonversi miliekivalen per milliliter (mEq/mL) ke milligram permililiter (mg/mL):

$$\text{mg/mL} = \frac{\text{mEq/mL} \times \text{berat atom atau berat molekul}}{\text{valensi}}$$

Tabel 8.3 Nilai dari beberapa ion yang penting

ION	FORMULA	VALENC	ATOMIC OR	
			FORMULA WEIGHT	EQUIVALENT WEIGHT*
Aluminum	Al ⁺⁺⁺	3	27	9
Ammonium	NH ₄ ⁺	1	18	18
Calcium	Ca ⁺⁺	2	40	20
Ferric	Fe ⁺⁺⁺	3	56	18.7
Ferrous	Fe ⁺⁺	2	56	28
Lithium	Li ⁺	1	7	7
Magnesium	Mg ⁺⁺	2	24	12
Potassium	K ⁺	1	39	39
Sodium	Na ⁺	1	23	23
Acetate	C ₂ H ₃ O ₂ ⁻	1	59	59
Bicarbonate	HCO ₃ ⁻	1	61	61
Carbonate	CO ₃ ⁻⁻	2	60	30
Chloride	Cl ⁻	1	35.5	35.5
Citrate	C ₆ H ₅ O ₇ ⁻⁻⁻	3	189	63
Gluconate	C ₆ H ₁₁ O ₇ ⁻	1	195	195
Lactate	C ₃ H ₅ O ₃ ⁻	1	89	89
Phosphate	H ₂ PO ₄ ⁻	1	97	97
	HPO ₄ ⁻⁻	2	95	43
Sulfate	SO ₄ ⁻⁻	2	95	43

Contoh Perhitungan

1. Berapa konsentrasi dalam milligram per milliliter, dari larutan yang mengandung 2 mEq kalium klorida (KCl) permililiter?

Jawab:

$$\text{Berat molekul KCl} = 74,5$$

$$\text{Berat ekuivalen KCl} = 74,5$$

$$1 \text{ mEq KCl} = 1/1000 \times 74,5 \text{ g} = 0,0745 \text{ g} = 74,5 \text{ mg}$$

$$2 \text{ mEq KCl} = 74,5 \text{ mg} \times 2 = 149 \text{ mg/mL},$$

Atau, dengan menggunakan persamaan:

$$\begin{aligned} \text{mg/mL} &= \frac{2 \left(\frac{\text{mEq}}{\text{mL}} \right) \times 74,5}{1} \\ &= 149 \text{ mg/mL} \end{aligned}$$

2. Berapa konsentrasi dalam gram permililiter, dari larutan yang mengandung 4 mEq dari kalsium klorida ($\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) permililiter?

Jawab:

Ingatlah bahwa berat ekuivalen dari senyawa biner dapat diperoleh dengan membagi berat molekul dengan valensi total dari radikal negatif dan positifnya.

$$\text{Berat molekul dari } \text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} = 147$$

$$\text{Berat ekuivalen dari } \text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} = 147/2 = 73,5$$

$$1 \text{ mEq } \text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} = 1/1000 \times 73,5 \text{ g} = 0,0735 \text{ g}$$

$$4 \text{ mEq } \text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} = 0,0735 \text{ g} \times 4 = 0,294 \text{ g/mL}.$$

Atau, dapat diselesaikan dengan analisis dimensional:

$$\begin{aligned} &\frac{1 \text{ g } \text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}}{10000 \text{ mg } \text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}} \times \frac{147 \text{ mg}}{1 \text{ mmol}} \times \frac{1 \text{ mmol}}{2 \text{ mEq}} \times \frac{4 \text{ mEq}}{1 \text{ mL}} \\ &= 0,294 \text{ g/mL} \end{aligned}$$

Catatan: Molekul air tidak mempengaruhi perhitungan sepanjang digunakan berat molekul yang tepat.

3. Berapa persen (w/v) konsentrasi larutan yang mengandung 100 mEq ammonium klorida perliter ?

Jawab:

$$\text{Berat molekul NH}_4\text{Cl} = 53,5$$

$$\text{Beratekivalen NH}_4\text{Cl} = 53,5$$

$$1 \text{ mEq NH}_4\text{Cl} = 1/1000 \times 53,5 = 0,0535 \text{ g}$$

$$100 \text{ mEq NH}_4\text{Cl} = 0,0535 \text{ g} \times 100 = 5,35 \text{ g/L}$$

$$0,535 \text{ g per 100 mL, atau } 0,535\%$$

4. Suatu larutan yang mengandung 10 mg/100 mL ion K^+ . Ekspresikanlah konsentrasinya dalam milliekivalen perliter!

Jawab:

$$\text{Berat atom K}^+ = 39$$

$$\text{Beratekivalen K}^+ = 39$$

$$1 \text{ mEq K}^+ = 1/1000 \times 39 = 0,039 \text{ g} = 39 \text{ mg}$$

$$10 \text{ mg/100 mL K}^+ = 100 \text{ mg K}^+ \text{ perliter}$$

$$100 \text{ mg} \div 39 = 2,56 \text{ mEq/L}$$

Atau, dengan menggunakan persamaan :

$$\text{mg/mL} = \frac{100 \left(\frac{\text{mg}}{\text{L}} \right) \times 1}{39}$$

$$= 2,56 \text{ mEq/L}$$

5. Suatu larutan yang mengandung 10 mg/100 mL ion Ca^{2+} . Ekspresikanlah konsentrasinya dalam milliekivalen perliter.

Jawab :

$$\text{Berat atom Ca}^{++} = 40$$

$$\text{Beratekivalen Ca}^{++} = 20$$

$$1 \text{ mEq Ca}^{++} = 1/1000 \times 20 = 0,020 \text{ g} = 20 \text{ mg}$$

$$10 \text{ mg/100 mL Ca}^{++} = 100 \text{ mg Ca}^{++} \text{ perliter}$$

$$100 \text{ mg} \div 20 = 5 \text{ mEq/L}$$

6. Ion magnesium (Mg^{++}) dalam darah adalah 2,5 mEq/L. nyatakanlah konsentrasinya dalam milligram.

Jawab:

$$\text{Berat atom } \text{Mg}^{++} = 24$$

$$\text{Beratekivalen } \text{Mg}^{++} = 24/2 = 12$$

$$1 \text{ mEq } \text{Mg}^{++} = 1/1000 \times 12 = 0,012 \text{ g} = 12 \text{ mg}$$

$$2,5 \text{ mEq } \text{Mg}^{++} = 30 \text{ mg} \rightarrow 30 \text{ mg/L}$$

7. Berapa milliekivalen kalium klorida yang terdapat dalam sediaan 15 mL dari KCl eliksir 10% b/v?

Jawab

$$\text{Berat molekul KCl} = 74,5$$

$$\text{Beratekivalen KCl} = 74,5$$

$$1 \text{ mEq KCl} = 1/1000 \times 74,5 = 0,0745 \text{ g} = 74,5 \text{ mg}$$

$$10 \% \text{ b/v dalam } 15 \text{ mL eliksir} = 1,5 \text{ g atau } 1500 \text{ mg KCl}$$

$$\frac{74,5 \text{ mg}}{1500 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ mEq}}{x \text{ mEq}}$$
$$X = 20,1 \text{ mEq}$$

8. Berapa miliekivalen magnesium sulfat yang terdapat dalam 1 g magnesium sulfat anhidrat (MgSO_4)

Jawab:

$$\text{Berat molekul } \text{MgSO}_4 = 120$$

$$\text{Beratekivalen } \text{MgSO}_4 = 60$$

$$1 \text{ mEq } \text{MgSO}_4 = 1/1000 \times 60 = 0,06 \text{ g} = 60 \text{ mg}$$

$$1 \text{ g } \text{MgSO}_4 = 1000 \text{ mg}$$

$$\frac{60 \text{ mg}}{1000 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ mEq}}{x \text{ mEq}}$$
$$X = 16,7 \text{ mEq}$$

9. Berapa milliekivalen Na^+ yang terkandung dalam larutan 30 mL, berikut ini?

Dinatrium hydrogen fosfat	18 g	
Natrium bifosfat	48 g	100 mL
Aquades		

Jawab:

Dinatrium hydrogen fosfat

Rumus Molekul = $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

Berat Molekul = 268 dan Berat ekivalen = 134

$$\frac{18 \text{ g}}{x \text{ g}} = \frac{100 \text{ mL}}{30 \text{ mL}}$$

X = 5,4 g dinatrium hydrogen fosfat per 30 mL

1 mEq = $1/1000 \times 134 = 0,134 = 134 \text{ mg}$

$$\frac{134 \text{ mg}}{5400 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ mEq}}{x \text{ mEq}}$$

x = 40,3 mEq dinatrium hydrogen fosfat.

Karena jumlah milliekivalen Na^+ setara dengan jumlah milliekivalen dinatrium hydrogen fosfat, maka:

$\text{Na}^+ = 40,3 \text{ mEq}$

Natrium bifosfat

Rumus molekul = $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$

Berat molekul = 138 dan Berat ekivalen = 138

$$\frac{48 \text{ g}}{x \text{ g}} = \frac{100 \text{ mL}}{30 \text{ mL}}$$

X = 14,4 g natrium bifosfat per 30 mL

1 mEq = $1/1000 \times 138 = 0,138 \text{ g} = 138 \text{ mg}$

$$\frac{138 \text{ mg}}{14.400 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ mEq}}{x \text{ mEq}}$$

x = 104,3 mEq natrium bifosfat

Sehingga, $\text{Na}^+ = 104,3 \text{ mEq}$

Sehingga jumlah total $\text{Na}^+ = 40,3 \text{ mEq} + 104,3 \text{ mEq} = 144,6 \text{ mEq}$

10. Seorang pasien menerima asupan 2 mEq natrium klorida perkilogram berat badannya. Jika berat badan pasien tersebut

adalah 132 lb, berapa milliliterkah larutan steril 0,9% NaCl yang dibutuhkan?

Jawab:

Berat molekul NaCl = 58,5

Beratekivalen NaCl = 58,5

1mEq NaCl = $1/1000 \times 58,5 = 0,0585$ g

2 mEq NaCl = $0,0585$ g \times 2 = 0,117 g

1 kg = 2,2 lb. \rightarrow berat badan dalam kilogram = 132 lb / $2,2$ lb = 60 kg

Karena pasien ini menerima 2 mEq/kg, maka 2 mEq atau 0,117 g \times 60 = 7,02 g NaCl yang dibutuhkan dan karena larutan steril 0,9 % NaCl mengandung 9 g NaCl perliter, maka:

$$\frac{9 \text{ g}}{7,02 \text{ g}} = \frac{1000 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$

$$x = 780 \text{ mL}$$

C. Millimol dan Mikromol

Sebagaimana telah ditulis sebelumnya, bahwa sistem satuan SI dari konsentrasi elektrolit dinyatakan dalam millimol perliter (mmol/L) yang merepresentasikan kekuatan dari spesies kimia. Untuk spesies monovalen, maka nilai milliekivaen dan millimol adalah identik.

Mol adalah berat molekul dari suatu zat dalam gram. Maka millimol adalah mol kali seribu dan mikromol adalah mol kali sejuta.

Contoh Perhitungan Millimol dan Mikromol

1. Berapa millimol natrium fosfat monobasa (BM 138) yang terkandung dalam 100 g senyawa?

Jawab:

$$\text{BM} = 138$$

$$1 \text{ mol} = 138 \text{ g}$$

$$\frac{1 \text{ mol}}{x \text{ mol}} = \frac{138 \text{ g}}{100 \text{ g}}$$

$$x \text{ mol} = \frac{100 \text{ g}}{138 \text{ g}}$$

$$X = 0,725 \text{ mol} = 725 \text{ mmol}$$

2. Berapa milligram berat dari 1 mmol natrium fosfat monobasa?

Jawab:

$$\begin{aligned} 1 \text{ mol} &= 138 \text{ g} \\ 1 \text{ mmol} &= 0,138 \text{ g} = 138 \text{ mg} \end{aligned}$$

3. Berapa berat dalam milligram dari 1mmol HPO_4^- ?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Berat atom } \text{HPO}_4^- &= 95,98 \\ 1 \text{ mol } \text{HPO}_4^- &= 95,98 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ mmol } \text{HPO}_4^- &= 95,98 \text{ g} \times \frac{1}{1000} = 0,09598 \text{ g} \\ &= 95,98 \text{ mg} \end{aligned}$$

4. Konversikan ke satuan $\mu\text{mol/L}$ dari $0,5\mu\text{g/mL}$ dan $2\mu\text{g/mL}$ tobramycon (BM = 467,25) dalam plasma darah!

Jawab:

Dengan cara analisis dimensional:

$$\frac{0,5 \mu\text{g}}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \mu\text{mol}}{467,25 \mu\text{g}} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} = 1,07 \mu\text{mol/L}$$

Dan;

$$\frac{2 \mu\text{g}}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \mu\text{mol}}{467,25 \mu\text{g}} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} = 4,28 \mu\text{mol/L}$$

D. Osmolaritas

Tekanan osmotik sangat penting bagi proses biologis yang menyebabkan proses difusi dari solute atau transfer cairan melalui membrane semipermeabel. Tekanan osmotik proporsional dengan jumlah total partikel dalam larutan. Satuan yang digunakan untuk mengukur konsentrasi osmotik adalah milliosmol (mOsmol). Untuk dekstrosa, senyawa nonelektrolit, 1 mmol (1 milligram BM) merepresentasikan 1 mOsmol. Hubungan ini tidak sama dengan larutan elektrolit, karena jumlah total partikel dalam larutan tergantung kepada derajat disosiasi dari senyawa. Dengan asumsi mengalami disosiasi yang sempurna, 1mmol NaCl setara dengan 2

mOsmol ($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$) dari total partikel, 1 mmol CaCl_2 , merepresentasikan 3 mOsmol ($\text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) dari total partikelnya, dan 1 mmol Natrium sitrat ($\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$) merepresentasikan 4 mOsmol ($3\text{Na}^+ + \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$) dari total partikelnya.

Nilai milliosmolar dari ion yang terurai dari senyawa elektrolit dapat diperoleh dengan membagi konsentrasi ion dalam milligram perliter dengan berat atomnya. Nilai milliosmolar dari seluruh elektrolit dalam larutan sebanding dengan jumlah milliosmolar dari ion-ionnya. Menurut Farmakope, konsentrasi osmolar dapat dihitung menurut persamaan berikut ini.

$$mOsmol/L = \frac{\text{berat senyawa } \left(\frac{g}{L}\right)}{\text{berat molekul}} \times \text{Jumlah spesi} \times 1000$$

Dalam prakteknya, semakin meningkatnya konsentrasi, maka interaksi fisikokimia antara partikel terlarut juga meningkat, dan nilai osmolar aktualnya menurun bila dibandingkan dengan nilai yang ideal. Selisih dari kondisi ideal biasanya sangat sedikit dalam larutan dengan range fisiologik dan larutan yang lebih encer. Untuk larutan dengan konsentrasi tinggi, maka osmolaritas aktualnya mungkin lebih rendah dibanding nilai idealnya. Contohnya, osmolaritas ideal dari natrium klorida injeksi 0,9% adalah:

$$mOsmol/L = \frac{9 \left(\frac{g}{L}\right)}{58,5 g} \times 2 \times 1000 = 308 mOsmol/L$$

Karena daya ikatannya, sehingga n adalah lebih sedikit dari 2 untuk larutan natrium klorida pada konsentrasi ini, dan nilai osmolaritas actual yang terukur dari larutan ini adalah sekitar 286 mOsmol/L.

Beberapa industri farmasi memberi label larutan elektrolit dengan osmolaritas yang stoikiometrik atau ideal yang dihitung dengan persamaan tadi, sementara yang lainnya mencantumkan osmolaritas actual atau eksperimental.

Selain osmolaritas, istilah lain yang sering digunakan adalah osmolalitas. **Osmolaritas** adalah milliosmol dari zat terlarut per liter larutan, sedangkan **osmolalitas** adalah milliosmol zat terlarut per kilogram pelarut. Untuk larutan encer berair, osmolaritas dan osmolalitas

hampir sama. Untuk larutan yang lebih pekat, kedua nilai tersebut berbeda.

Normalnya, osmolalitas dari serum adalah berada pada rentang 275 sampai 300 mOsmol/kg. Alat untuk mengukur osmolalitas adalah osmometer yang digunakan dalam laboratorium dan tersedia secara komersial. Osmolalitas darah yang tidak normal, berhubungan dengan kondisi shock, trauma, luka bakar, intoksikasi air, ketidakseimbangan elektrolit, hiperglikemia, atau gagal ginjal.

Contoh Perhitungan Milliosmol

1. Suatu larutan mengandung 5% dekstosa anhidrat dalam air untuk injeksi. Berapa milliosmol perliter larutan ini sebenarnya?

Jawab:

Berat molekul dekstrosa anhidrat = 180

1 mmol dekstroas anhidrat (180 mg) = 1 mOsmol

5% larutan mengandung 50 g atau 50.000 mg/L

Atau, dapat diselesaikan dengan analisis dimensional:

$$\frac{50.000 \text{ mg}}{1 \text{ L}} \times \frac{1 \text{ mOsmol}}{180 \text{ mg}} = 278 \text{ mOsmol/L}$$

Tabel 8.4. Kontribusi beberapa konstituen dari serum normal terhadap tekanan osmotik total.

CONSTITUENT	MEAN CONCENTRATION (mEq/L)	OSMOTIC PRESSURE (mOsmol/kg of water) ^a	PERCENTAGE OF TOTAL OSMOTIC PRESSURE
Sodium	142.0	139.0	48.3%
Potassium	5.0	4.9	1.7
Calcium	2.5	1.2	0.4
Magnesium	2.0	1.0	0.3
Chloride	102.0	99.8	34.7
Bicarbonate	27.0	26.4	9.2
Protein	16.0	1.0	0.3
Phosphate	2.0	1.1	0.4
Sulfate	1.0	0.5	0.2
Organic Anions	3.5	3.4	1.2
Urea	30 (mg/100 mL)	5.3	1.8
Glucose	70 (mg/100 mL)	4.1	1.4
TOTALS		<u>287.7 mOsmol/kg</u>	99.9%
OBSERVED NORMAL MEAN		289.0 mOsmol/kg	

^a From Cnughtal MA, Hendry EB. Serum electrolytes, urea, and osmolality in cases of chloride depletion. *Clinical Biochemistry* 1967;1:91. Adapted from: Fluid and Electrolytes. Chicago: Abbott Laboratories 1970.

^b Water content of normal serum taken as 94 g/100 mL.

2. Suatu larutan mengandung 156 ion mg K⁺ per 100 mL. berapa milliosmol K⁺ dalam larutan?

Jawab:

$$\begin{aligned}
 \text{Berat atom K}^+ &= 39 \\
 1 \text{ mmol K}^+ (39 \text{ mg}) &= 1 \text{ mOsmol} \\
 156 \text{ mg K}^+ \text{ per } 100 \text{ mL} &= 1560 \text{ mg K}^+ \text{ per Liter} \\
 1560 \text{ mg} \div 39 &= 40 \text{ mOsmol.}
 \end{aligned}$$

3. Suatu larutan mengandung 10 mg % ion Ca²⁺. Nyatakanlah konsentrasinya dalam milliosmol.

Jawab:

$$\begin{aligned}
 \text{Berat atom Ca}^{2+} &= 40 \\
 1 \text{ mmol Ca}^{2+} (40 \text{ mg}) &= 1 \text{ mOsmol} \\
 10 \text{ mg\% Ca}^{2+} &= 10 \text{ mg Ca}^{2+} \text{ per } 100 \text{ mL, atau } 100 \text{ mg Ca}^{2+} / \text{L} \\
 100 \text{ mg} \div 40 &= 2,5 \text{ mOsmol}
 \end{aligned}$$

4. Berapa milliosmol yang terdapat dalam 1 L larutan 0,9% natrium klorida?

Jawab:

Konsentrasi osmotik (miliosmol) merupakan fungsi dari jumlah total partikel yang terdapat dalam larutan. Dengan asumsi terjadi disosiasi yang sempurna, 1 mmol dari natrium klorida (NaCl) menghasilkan 2 mOsmol jumlah total partikel ($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$)

$$\text{Berat molekul NaCl} = 58,5$$

$$1 \text{ mmol NaCl (58,5 mg)} = 2 \text{ mOsmol}$$

$$1000 \times 0,009$$

$$= 9 \text{ g atau } 9000 \text{ mg NaCl /L}$$

$$\frac{58,5 \text{ mg}}{9000 \text{ mg}} = \frac{2 \text{ mOsmol}}{x \text{ mOsmol}}$$

X

$$= 307,7 \text{ atau } 308 \text{ mOsmol.}$$

E. Pertimbangan Klinik Keseimbangan Air dan Elektrolit

Salah satu komponen esensial dari kesehatan yang baik adalah dengan mempertahankan keseimbangan air dan elektrolit dalam cairan tubuh. Air akan menyediakan lingkungan di mana sel-sel akan tetap hidup dan air merupakan media utama untuk asupan nutrient dan ekskresi dari produk buangan metabolisme. Normalnya, osmolalitas cairan tubuh ini dipertahankan dalam limit yang sangat kecil melalui diet, proses regulasi endokrin, dan keseimbangan pengeluaran oleh ginjal, paru-paru, kulit, dan sistem gastrointestinal.

Dalam praktek klinik, terapi cairan dan elektrolit dibutuhkan untuk membantu memelihara atau menggantikan cairan yang hilang. Kehilangan cairan tubuh atau elektrolit dapat diakibatkan oleh berbagai kondisi, termasuk muntah, diare, keringat berlebihan, demam, gagal ginjal kronik, terapi diuretik, pasca operasi, dan lain lain. Jenis terapi yang digunakan (oral atau parenteral) dan kandungan cairan yang diberikan tergantung kepada kondisi pasien.

Contoh, seorang pasien yang menggunakan diuretik mungkin membutuhkan suplemen kalium oral dengan jumlah asupan air yang cukup. Seorang atlet mungkin membutuhkan rehidrasi dengan atau tanpa penambahan elektrolit. Pasien yang dirawat di rumah sakit biasanya menerima terapi parenteral dari cairan dan elektrolit untuk mendukung fungsi metabolisme normalnya.

Cairan tubuh pada pria dewasa, normalnya berada pada range 55% dan 65% dari berat badan tergantung pada proporsi lemak

tubuhnya. Proporsi lemak yang lebih besar, maka jumlah airnya lebih sedikit. Sedangkan pada wanita dewasa, jumlah cairan tubuhnya 10% lebih rendah dari pria. Bayi baru lahir memiliki cairan tubuh sebanyak 75%, yang akan menurun seiring dengan pertumbuhan dan penambahan lemak tubuh.

Secara umum, 1500 mL air per meter bujur sangkar luas permukaan tubuh dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan cairan perhari bagi orang dewasa. Berdasarkan berat badan, diperkirakan 32 mL/kg untuk dewasa dan 100–150 mL/kg untuk bayi sebagai rata-rata kebutuhan air harian bagi orang yang sehat.

Komposisi dari cairan tubuh secara umum dapat dijelaskan menurut kompartemen tubuh: **intraseluler** (dalam sel), **intravaskuler** (plasma darah) atau **interstitial** (antara sel dan jaringan). Cairan intravascular dan interstitial kemudian secara umum dikelompokkan sebagai cairan **ekstraseluler**.

Referensi umum untuk elektrolit dalam plasma darah dapat ditunjukkan pada tabel 8.2 Meskipun seluruh elektrolit dan elektrolit dalam cairan tubuh berkontribusi terhadap aktivitas osmotik, natrium dan klorida merupakan komponen cairan ekstraseluler yang paling berperan, dan kalium dan fosfat merupakan komponen cairan intraseluler yang utama.

Membran sel bersifat sangat permeabel terhadap air, maka osmolalitas dari cairan ekstraseluler (sekitar 290, mOsm/kg air) adalah sebanding dengan cairan intraseluler. Oleh karena itu, osmolalitas plasma merupakan petunjuk yang akurat dan sesuai untuk osmolalitas intraseluler dan dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Osmolalitas plasma (mOsm/kg)} = 2 ([\text{Na}] + [\text{K}]) \text{ plasma} + \frac{[\text{BUN}]}{2,8} + \frac{[\text{Glukosa}]}{18}$$

Di mana: konsentrasi natrium (Na) dan kalium (K) dalam mEq/L dan konsentrasi nitrogen urea darah (BUN) dan glukosa dalam mg/100 mL (mg/dL)

Contoh Perhitungan Cairan dan Elektrolit yang Dibutuhkan dalam Cairan Parenteral

1. Hitunglah kebutuhan cairan harian untuk orang dewasa dengan luas permukaan tubuh $1,8\text{m}^2$.

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Kebutuhan cairan} &= 1500 \text{ mL/m}^2 \\ 1\text{m}^2/(1,8 \text{ m}^2) &= (1500 \text{ mL/m}^2)/(x \text{ mL}) \\ X &= 2700 \text{ mL} \end{aligned}$$

2. Perkirakanlah osmolalitas plasma dari data berikut ini: Natrium 135 mEq/L ; Kalium, $4,5 \text{ mEq/L}$; BUN, 14 mg/dL ; dan glukosa, 90 mg/dL .

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{mOsm/kg} &= 2 ([\text{Na}] + [\text{K}]) + \frac{[\text{BUN}]}{2,8} + \frac{[\text{Glukosa}]}{18} \\ \text{mOsm/kg} &= 2(135 \text{ mEq/L} + 4,5 \text{ mEq/L}) + \frac{14 \text{ mg/dL}}{2,8} + \frac{90 \text{ mg/dL}}{18} \\ &= 2(139,5) + 5 + 5 \\ &= 289 \end{aligned}$$

3. Hitunglah milliekivalen natrium, kalium dan klorida, millimol dekstroza, dan osmolaritas dari cairan parenteral berikut:

Dekstroza anhidrat	50 g
Natrium klorida	4,5 g
Kalium klorida	1,49 g
Aqua Pro Injeksi, ad	1000 mL

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Berat molekul NaCl} &= 58,5 \\ \text{Berat ekuivalen NaCl} &= 58,5 \\ 1 \text{ mEq NaCl} &= 1/1000 \times 58,5 = 0,0585 \text{ g} = 58,5 \text{ mg} \\ 4,5 \text{ g NaCl} &= 4500 \text{ mg} \\ \frac{58,5 \text{ mg}}{4500 \text{ mg}} &= \frac{1 \text{ mEq}}{x \text{ mEq}} \\ X &= 76,9 \text{ atau } 77 \text{ mEq Na}^+ \text{ dan } 76,9 \text{ atau } 77 \text{ mEq Cl}^- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Berat molekul KCl} &= 74,5 \\
\text{Berat ekuivalen KCl} &= 74,5 \\
1 \text{ mEq KCl} &= 1/1000 \times 74,5 = 0,0745 \text{ g} = 74,5 \text{ mg} \\
1,49 \text{ g KCl} &= 1490 \text{ mg} \\
\frac{74,5 \text{ mg}}{1490} &= \frac{1 \text{ mEq}}{x \text{ mEq}} \\
X &= 20 \text{ mEq K}^+ \text{ dan } 20 \text{ mEq Cl}^-
\end{aligned}$$

Jadi :

$$\begin{aligned}
\text{Total Na}^+ &= 77 \text{ mEq} \\
\text{K}^+ &= 20 \text{ mEq} \\
\text{Cl}^- &= 77 \text{ mEq} + 20 \text{ mEq} = 97 \text{ mEq}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Berat molekul dekstrosa} &= 180 \\
1 \text{ mmol dekstrosa} &= 180 \text{ mg} \\
50 \text{ g dekstrosa} &= 50.000 \text{ mg} \\
\frac{180 \text{ mg}}{50.000} &= \frac{1 \text{ mmol}}{x \text{ mmol}} \\
X &= 277,7 \text{ atau } 278 \text{ mmol}
\end{aligned}$$

Osmolaritas :

Dekstrosa anhid: $278 \text{ mmol} \times 1 \text{ partikel per mmol} = 278 \text{ mOsmol}$

NaCl : $77 \text{ mEq} \times 2 \text{ partikel per mEq (atau mmol)} = 154 \text{ mOsmol}$

KCl : $20 \text{ mEq} \times 2 \text{ partikel per mEq (atau mmol)} = 40 \text{ mOsmol}$

Total = 472 mOsmol.

Kesimpulan

Millimol dan Milliosmol

Untuk menghitung millimol (mmol):

1 millimol adalah 1/1000 gram berat molekul senyawa

$$1 \text{ millimol} = \frac{\text{berat molekul ,gram}}{1000}$$

Untuk menghitung milliosmol (mOsmol):

1 milliosmol adalah 1/1000 osmol. Bila senyawa tidak terdissosiasi, maka jumlah millimol dan milliosmolnya sama. Terdapat 2 milliosmol permillimol untuk senyawa yang terdissosiasi menjadi dua partikel dan 3 milliosmol permillimol untuk senyawa yang terdissosiasi menjadi 3 partikel;

$$\text{mOsmol} = \text{mg obat} \times \frac{1 \text{ mmol obat}}{\text{Berat Molekul (mg)}}$$

BAB IX

LARUTAN BUFFER DAN ISOTONIK

A. Pendahuluan

Bila suatu pelarut melewati membran semipermeabel dari larutan yang encer (konsentrasi rendah) menuju ke larutan yang konsentrasinya tinggi, maka konsentrasi akan menjadi seimbang dan fenomena ini disebut peristiwa osmosis. Tekanan yang terlibat dalam fenomena ini disebut sebagai tekanan osmosis. Tekanan osmosis suatu larutan berbeda-beda sesuai dengan sifat zat terlarutnya.

Jika zat terlarut berupa senyawa nonelektrolit, maka larutan hanya mengandung molekul dan tekanan osmotiknya tergantung kepada konsentrasi zat terlarutnya (solut). Jika zat terlarut berupa senyawa elektrolit, maka larutan mengandung ion-ion sehingga tekanan osmotiknya tergantung kepada konsentrasi zat terlarut dan derajat disosiasinya. Kemudian, solut yang mengalami disosiasi akan menghadirkan jumlah partikel dalam jumlah besar dalam larutan dan menghasilkan tekanan osmotik yang lebih besar daripada molekul yang tidak terdisosiasi.

Sebagaimana tekanan osmotik, sifat koligatif larutan yang lain seperti tekanan uap, titik didih, dan titik beku tergantung kepada jumlah partikel yang terdapat dalam larutan. Oleh sebab itu, sifat-sifat ini saling berhubungan dan perubahan dari salah satu sifat koligatif tersebut akan menghasilkan perubahan pada sifat koligatif yang lainnya.

Dua larutan yang memiliki tekanan osmotik yang sama disebut isoosmotik. Banyak larutan yang masuk dan bercampur dengan cairan tubuh telah dirancang memiliki tekanan osmotik yang sama dengan tujuan kenyamanan pasien, efikasi, dan keamanan. Suatu larutan yang memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan tubuh tertentu diistilahkan sebagai isotonik dengan cairan tubuh tertentu tersebut.

Larutan yang memiliki tekanan osmotik yang lebih rendah dari tekanan osmotik cairan tubuh disebut larutan hipotonis, sedangkan larutan yang memiliki tekanan osmotik yang lebih tinggi

dari tekanan cairan tubuh disebut hipertonis. Bentuk sediaan farmasi yang dimaksudkan untuk diberikan secara langsung ke dalam darah atau bercampur dengan cairan biologis dari mata, hidung dan cairan usus menjadi perhatian utama dari farmasis (apoteker) dalam pembuatan dan aplikasinya.

B. Pertimbangan Klinis dari Tonisitas

Secara umum telah disepakati bahwa untuk sediaan parenteral dan sediaan oftalmik, maka larutan isotonik dapat ditoleransi lebih baik oleh pasien bila dibandingkan dengan larutan hipotonik atau hipertonik. Dengan pemakaian larutan isotonik, maka akan terjadi peristiwa homeostasis dengan cairan intraseluler tubuh. Dengan demikian, dalam kebanyakan kasus, sediaan isotonis atau mendekati isotonis jauh lebih diutamakan. Namun demikian, terdapat pengecualian, untuk kasus larutan hipertonik yang digunakan untuk "menarik" cairan dari jaringan edema ke dalam larutan yang diberikan.

Kebanyakan sediaan oftalmik diformulasikan sebagai larutan isotonik atau mendekati isotonik sebagai pengganti air mata untuk kenyamanan pasien. Larutan ini dibuat dengan penambahan buffer dan dengan pH yang tepat, sehingga dapat mengurangi kemungkinan iritasi pada jaringan mata dan untuk menstabilkan sediaan.

Sediaan injeksi yang tidak isotonik harus diberikan secara perlahan-lahan dan dalam jumlah yang sedikit untuk meminimalisir iritasi jaringan, rasa nyeri, dan ketidakseimbangan cairan sel. Tonisitas dari injeksi volume kecil umumnya tidak sama ketika diberikan infus parenteral volume besar disebabkan adanya bahan pengisotonis, seperti natrium klorida atau dekstrosa dalam infus volume besar, yang berfungsi untuk menyesuaikan tonisitas.

Infus intravena, yang hipotonis atau hipertonis dapat memberikan efek samping karena umumnya diberikan dalam volume besar. Infus hipertonik volume besar biasanya mengandung dekstrosa, misalnya, dapat mengakibatkan hiperglikemia, diuresis osmotik dan kehilangan elektrolit secara berlebihan. Kelebihan cairan infus hipotonik dapat mengakibatkan hemolisis osmotik dari sel darah merah dan melampaui batas kapasitas tubuh untuk mengabsorpsi kelebihan cairan secara aman. Meskipun cairan bersifat isotonik, bila

diberikan secara infus intravena dalam volume berlebih atau dengan laju aliran yang berlebihan, dapat mengakibatkan kerusakan karena adanya kelebihan cairan yang ditempatkan dalam sistem sirkulasi tubuh.

C. Faktor Fisika-Kimia dalam Pembuatan Larutan Isotonis

Perhitungan dalam pembuatan larutan isotonik dapat dilakukan dari untuk data yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Secara teori, salah satu dari sifat koligatif ini dapat digunakan untuk penentuan tonisitas. Dalam praktiknya dan lebih menyenangkan titik beku lebih banyak digunakan untuk tujuan ini. Telah diterima secara umum bahwa titik beku dari darah dan cairan lakrimal adalah $-0,52^{\circ}\text{C}$.

Bila berat molekul senyawa nonelektrolit adalah 1 gram, di mana disosiasinya diabaikan, seperti asam borat dilarutkan dalam 1000 g air, maka titik beku dari larutan ini adalah $1,86^{\circ}\text{C}$ dan berada di bawah titik beku air murni. Dengan perbandingan yang sederhana, kita dapat menghitung berat dari senyawa nonelektrolit yang akan dilarutkan dalam setiap 1000 g air jika larutan tersebut isotonik dengan cairan tubuh.

Sebagai contoh, asam borat dengan berat molekul 61,8; maka secara teori 61,8 g yang dilarutkan dalam 1000 g air menghasilkan titik beku $1,86^{\circ}\text{C}$. Sehingga;

$$\frac{1,86^{\circ}\text{C}}{0,52^{\circ}\text{C}} = \frac{61,8 \text{ g}}{x \text{ g}}$$
$$x = 17,3 \text{ g}$$

Secara singkat, 17,3 g asam borat dalam 1000 g air akan memiliki konsentrasi 1,73% berat per volume, dan akan menghasilkan larutan isotonik dengan cairan lakrimal.

Berbeda halnya dengan senyawa elektrolit, masalahnya menjadi tidak sesederhana larutan nonelektrolit. Hal ini disebabkan tekanan osmotik sangat tergantung kepada jumlah partikel dibanding dengan jenis partikel. Di mana, senyawa yang terdisosiasi memiliki tonisitas yang meningkat sesuai dengan derajat disosiasinya;

semakin besar disosiasi, semakin kecil jumlah yang dibutuhkan untuk menghasilkan tekanan osmotik. Jika kita berasumsi bahwa natrium klorida dalam larutan akan mengalami disosiasi sekitar 80%, maka setiap 100 molekul akan menghasilkan 180 partikel, atau 1,8 kali lebih banyak dibandingkan dengan partikel yang dihasilkan oleh 100 molekul senyawa nonelektrolit. Faktor disosiasi ini, umumnya disimbolkan dengan huruf i , harus dimasukkan dalam persamaan ketika kita ingin menentukan kekuatan dari larutan isotonik natrium klorida (BM 58,5):

$$\frac{1,86^{\circ}\text{C} \times 1,8}{0,52^{\circ}\text{C}} = \frac{58,5 \text{ g}}{x \text{ g}}$$

$$x = 9,09 \text{ g}$$

Oleh karena itu, 9,09 g natrium klorida dalam 1000 g air akan menghasilkan larutan yang isotonik dengan darah atau cairan lakrimal. Dalam prakteknya, 0,90% b/v larutan natrium klorida dianggap isotonik dengan cairan tubuh. Larutan isotonik sederhana dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{0,52 \times \text{berat molekul}}{1,86 \times \text{disosiasi } (i)} = \text{g dari solut per 1000 g air}$$

Nilai disosiasi (i) dari kebanyakan senyawa obat bentuk garam belum ditentukan secara eksperimental. Beberapa senyawa garam seperti zink sulfat, hanya berdisosiasi 40% sehingga nilai i nya adalah 1,4. Tetapi kebanyakan obat bentuk garam diperkirakan berdisosiasi seperti natrium klorida dalam larutan. Jika jumlah ion diketahui, kita dapat menggunakan nilai-nilai berikut karena keterbatasan informasi yang lebih baik.

- Nonelektrolit atau senyawa yang susah berdisosiasi : 1,0
- Senyawa yang berdisosiasi menjadi 2 ion ; 1,8
- Senyawa yang berdisosiasi menjadi 3 ion ; 2,6
- Senyawa yang berdisosiasi menjadi 4 ion ; 3,4
- Senyawa yang berdisosiasi menjadi 5 ion ; 4,2

Masalah khusus muncul ketika resep mengarahkan kita untuk membuat larutan isotonik dengan menambahkan jumlah yang tepat dari beberapa zat selain bahan aktif. Mengingat 0,5% b/v larutan natrium klorida, kita dapat dengan mudah menghitung bahwa 0,9 g - 0,5 g = 0,4 g natrium klorida tambahan yang harus terkandung dalam setiap 100 mL jika larutan dibuat isotonik dengan cairan tubuh. Tetapi berapa banyak natrium klorida yang harus digunakan untuk membuat larutan atropin sulfat sebanyak 100 mL 1% b/v, yang isotonik dengan cairan lakrimal? Jawabannya tergantung pada **seberapa banyak natrium klorida yang diwakili oleh atropin sulfat.**

Tonisitas relatif dari dua zat adalah jumlah yang setara dengan tonisitas bahan lain dalam jumlah tertentu. Tonisitas relatif dapat dihitung jika jumlah zat yang memiliki tonisitas dalam jumlah tertentu pelarut dibagi dengan jumlah senyawa lain yang memiliki tonisitas yang sama dalam jumlah pelarut yang sama. Contoh, untuk menghitung bahwa 17,3 g asam borat dalam 1000 g air dan 9,09 g natrium klorida dalam 1000 g air, dan keduanya menghasilkan larutan yang isotonik dengan cairan lakrimal. Sehingga, jika 17,3 g asam borat memiliki tonisitas yang setara dengan 9,09 g natrium klorida, maka 1 g asam borat setara dengan $9,09 \text{ g} \div 17,3 \text{ g}$ atau 0,52 g natrium klorida. Demikian pula 1 g natrium klorida memiliki "kesetaraan tonisitas" dengan $17,3 \text{ g} \div 9,09 \text{ g}$ atau 1,90 g asam borat.

Telah diketahui bahwa sejumlah senyawa apapun secara teori memiliki tonisitas yang konstan jika dilarutkan dalam 1000 g air. Satu g berat molekul senyawa dibagi dengan nilai disosiasinya (i). Dengan demikian, jumlah relatif dari natrium klorida dengan tonisitas setara dengan jumlah asam borat dapat dihitung menurut perbandingan berikut ini:

$$\frac{58,5 \div 1,8}{61,8 \div 1,0} \text{ or } \frac{58,5 \times 1,0}{61,8 \times 1,8}$$

dan kita dapat memformulasikan suatu aturan yang lebih mudah: jumlah dari dua bahan yang memiliki tonisitas yang setara adalah proporsional dengan berat molekul dari setiap senyawa yang dikalikan dengan nilai i senyawa yang lainnya.

Sekarang kita lihat kembali ke soal 1 g atrofin sulfat dalam 1000 g larutan:

$$\begin{array}{l} \text{Berat molekul natrium klorida} = 58,5 ; i = 1,8 \\ \text{Berat molekul atrofin sulfat} = 695 ; i = 2,6 \end{array}$$

$$\frac{695 \times 1,8}{58,5 \times 2,6} = \frac{1 \text{ g}}{x \text{ g}}$$

$x = 0,12$ g natrium klorida diwakili oleh 1 g atrofin sulfat

Oleh karena larutan yang isotonik dengan cairan lakrimal harus mengandung setara dengan 0,90 g natrium klorida dalam setiap 100 mL larutan, maka jumlah yang harus ditambahkan adalah 0,90 g - 0,12 g = 0,78 g natrium klorida.

Tabel 9.1. menyajikan nilai kesetaraan natrium klorida (nilai E) dari masing-masing senyawa. Nilai ini dihitung sesuai dengan aturan yang disajikan sebelumnya. Jika jumlah gram zat yang terdapat dalam resep dikalikan dengan kesetaraan natrium klorida, maka jumlah natrium klorida yang diwakili oleh zat dapat ditentukan.

Prosedur untuk menghitung kesetaraan larutan isotonik dengan natrium klorida diuraikan sebagai berikut:

Langkah 1. Hitunglah jumlah (dalam gram) natrium klorida yang diwakili oleh bahan dalam resep. Kalikan jumlah (dalam gram) dari setiap bahan dengan kesetaraannya dengan natrium klorida

Langkah 2. Hitunglah jumlah (dalam gram) natrium klorida, (sendirian), yang terkandung dalam larutan isotonik dari volume yang ditentukan dalam resep, yaitu jumlah natrium klorida dalam larutan 0,9% dari volume yang ditentukan. (larutan tersebut akan berisi 0.009 g / mL.)

Langkah 3. Kurangi jumlah natrium klorida yang diwakili oleh bahan dalam resep (Langkah 1) dari jumlah natrium klorida, (sendiri) yang akan diwakili dalam volume tertentu larutan isotonik (Langkah 2). Jawabannya merupakan jumlah (dalam gram) natrium klorida yang akan ditambahkan untuk membuat larutan isotonik.

Langkah 4. Jika bahan selain natrium klorida, seperti asam borat, dekstrosa, atau kalium nitrat, yang akan digunakan untuk membuat larutan isotonik, bagikan jumlah natrium klorida (Langkah 3) dengan ketaraan natrium klorida dengan bahan lainnya.

Tabel 9.1. Kesetaraan natrium klorida (E)

SUBSTANCE	MOLECULAR WEIGHT	IONS	<i>i</i>	SODIUM CHLORIDE EQUIVALENT (E VALUE)
Antazoline phosphate	363	2	1.8	0.16
Antipyrine	188	1	1.0	0.17
Atropine sulfate-H ₂ O	695	3	2.6	0.12
Benoxinate hydrochloride	345	2	1.8	0.17
Benxalkonium chloride	360	2	1.8	0.16
Benzyl alcohol	108	1	1.0	0.30
Boric acid	61.8	1	1.0	0.52
Chloramphenicol	323	1	1.0	0.10
Chlorobutanol	177	1	1.0	0.24
Chlortetracycline hydrochloride	515	2	1.8	0.11
Cocaine hydrochloride	340	2	1.8	0.16
Cromolyn sodium	512	2	1.8	0.11
Cyclopentolate hydrochloride	328	2	1.8	0.18
Demecarium bromide	717	3	2.6	0.12
Dextrose (anhydrous)	180	1	1.0	0.18
Dextrose-H ₂ O	198	1	1.0	0.16
Dipivefrin hydrochloride	388	2	1.8	0.15
Ephedrine hydrochloride	202	2	1.8	0.29
Ephedrine sulfate	429	3	2.6	0.23
Epinephrine bitartrate	333	2	1.8	0.18
Epinephryl borate	209	1	1.0	0.16
Eucatropine hydrochloride	328	2	1.8	0.18
Fluorescein sodium	376	3	2.6	0.31
Glycerin	92	1	1.0	0.34
Homatropine hydrobromide	356	2	1.8	0.17
Hydroxyamphetamine hydrobromide	232	2	1.8	0.25
Iodoxuridine	354	1	1.0	0.09
Lidocaine hydrochloride	289	2	1.8	0.22
Mannitol	182	1	1.0	0.18
Morphine sulfate-5H ₂ O	759	3	2.6	0.11
Naphazoline hydrochloride	247	2	1.8	0.27
Oxymetazoline hydrochloride	297	2	1.8	0.20
Oxytetracycline hydrochloride	497	2	1.8	0.12
Phenacaine hydrochloride	353	2	1.8	0.20
Phenobarbital sodium	254	2	1.8	0.24
Phenylephrine hydrochloride	204	2	1.8	0.32
Physostigmine salicylate	413	2	1.8	0.16
Physostigmine sulfate	649	3	2.6	0.13
Pilocarpine hydrochloride	245	2	1.8	0.24
Pilocarpine nitrate	271	2	1.8	0.23
Potassium biphosphate	136	2	1.8	0.43
Potassium chloride	74.5	2	1.8	0.76
Potassium iodide	166	2	1.8	0.34
Potassium nitrate	101	2	1.8	0.58
Potassium penicillin G	372	2	1.8	0.18
Procaine hydrochloride	273	2	1.8	0.21
Proparacaine hydrochloride	331	2	1.8	0.18
Scopolamine hydrobromide-3H ₂ O	438	2	1.8	0.12
Silver nitrate	170	2	1.8	0.33
Sodium bicarbonate	84	2	1.8	0.65
Sodium borate-10H ₂ O	381	5	4.2	0.42

Sambungan tabel 9.1

SUBSTANCE	MOLECULAR WEIGHT	IONS	<i>i</i>	SODIUM CHLORIDE EQUIVALENT (E VALUE)
Sodium carbonate	106	3	2.6	0.80
Sodium carbonate H ₂ O	124	3	2.6	0.68
Sodium chloride	58	2	1.8	1.00
Sodium citrate 2H ₂ O	294	4	3.4	0.38
Sodium iodide	150	2	1.8	0.39
Sodium lactate	112	2	1.8	0.52
Sodium phosphate, dibasic, anhydrous	142	3	2.6	0.53
Sodium phosphate, dibasic·7H ₂ O	268	3	2.6	0.29
Sodium phosphate, monobasic, anhydrous	120	2	1.8	0.49
Sodium phosphate, monobasic·H ₂ O	138	2	1.8	0.42
Tetracaine hydrochloride	301	2	1.8	0.18
Tetracycline hydrochloride	481	2	1.8	0.12
Tetrahydrozoline hydrochloride	237	2	1.8	0.25
Timolol maleate	432	2	1.8	0.14
Tobramycin	468	1	1.0	0.07
Tropicamide	284	1	1.0	0.11
Urea	60	1	1.0	0.59
Zinc chloride	136	3	2.6	0.62
Zinc sulfate·7H ₂ O	288	2	1.4	0.15

Contoh Perhitungan

1. Zink sulfat merupakan elektrolit yang memiliki 2 ion, terdisosiasi 40% dalam larutan konsentrasi tertentu. Hitunglah faktor disosiasinya (*i*).

Jawab:

Berdasarkan jumlah 40% yang terdisosiasi, maka 100 partikel zink sulfat akan menghasilkan:

$$\begin{array}{r}
 40 \text{ ion Zink} \\
 40 \text{ ion sulfat} \\
 \hline
 60 \text{ partikel tak terdisosiasi} \\
 140 \text{ partikel}
 \end{array}$$

Karena terdapat 140 partikel, sama dengan 1,4 kali lebih banyak dibanding sebelum terdisosiasi, maka faktor disosiasinya (*i*) adalah 1,4.

2. Zink klorida adalah elektrolit dengan 3 ion, terdisosiasi 80% dalam konsentrasi tertentu. Hitunglah faktor disosiasinya (*i*).

Jawab:

Berdasarkan jumlah 80% yang terdisosiasi, maka 100 partikel zink sulfat akan menghasilkan:

80 ion Zink

80 ion klorida

80 ion klorida

60 partikel tak terdisosiasi
260 partikel

Karena 260 partikel berarti 2,6 kali lebih banyak dibanding sebelum terdisosiasi, maka faktor disosiasinya (i) adalah 2,6.

Contoh Perhitungan Kesetaraan Natrium Klorida

Kesetaraan dengan natrium klorida dari suatu senyawa dapat dihitung secara:

$$\frac{BM NaCl}{(i)NaCl} \times \frac{i \text{ senyawa } x}{BM \text{ senyawa } x} = E NaCl$$

1. Papaverin HCl (BM 376) adalah senyawa elektrolit dengan 2 ion, terdisosiasi 80% dalam konsentrasi tertentu. Hitunglah kesetaraan natrium kloridanya.

Jawab:

Karena papaverin HCl memiliki 2 ion dan terdisosiasi 80%, maka faktor disosiasinya (i) adalah 1,8.

$$\frac{58,5}{1,8} \times \frac{1,8}{376} = 0,156 \text{ or } 0,16$$

2. Hitunglah kesetaraan dengan natrium klorida dari gliserin, suatu senyawa nonelektrolit dengan berat molekul 92.

Jawab:

i gliserin = 1,0

$$\frac{58,5}{1,8} \times \frac{1,0}{92} = 0,35$$

3. Hitunglah kesetaraan dengan natrium klorida untuk timolol maleat jika terdisosiasi menjadi 2 ion, BM 432.

Jawab:
 i timolol maleat = 1,8

$$\frac{58,5}{1,8} \times \frac{1,8}{432} = 0,14$$

4. Hitunglah kesetaraan dengan natrium klorida dari natrium fluorescein yang terdisosiasi menjadi 3 ion dan BM 376.

Jawab:
 i natrium fluorescein = 2,6

$$\frac{58,5}{1,8} \times \frac{2,6}{376} = 0,23$$

Contoh Perhitungan Bahan Pengisotonis

1. Berapa gram natrium klorida yang digunakan dalam pembuatan sediaan berikut ini:

R/ pilocarpine nitrate	0,3 g
Sodium chloride	q.s
Purified water ad	30 mL
Make isoton.sol.	

Jawab:

Tahap 1. $0,23 \times 0,3 = 0,069$ g natrium klorida yang diwakili oleh pilocarpine nitrate

Tahap 2. $30 \times 0,009 = 0,270$ g natrium klorida dalam 30 mL larutan natrium klorida isotonik.

Tahap 3. 0,270 g (dari tahap 2)

-0,069 g (dari tahap 1)

0,201 g natrium klorida yang ditambahkan.

2. Berapa gram asam borat yang harus ditambahkan dalam sediaan berikut ini:

R/ Phenacaine Hydrochloride 1%
 Chlorobutnol 1/2%
 Boric acid 1/2%
 Purified water ad q.s
 Make isoton. Sol 60
 Sig. One drop in each eye

Jawab:

Resep tersebut membutuhkan 0,6 g Phenacaine HCl dan 0,3 g Chklorobutanol.

Tahap 1. $0,20 \times 0,6g = 0,120$ g natrium klorida yang diwakili oleh phenacaine hydrochlorida.

$0,24 \times 0,3 \text{ g} = 0,072$ g natrium klorida yang diwakili oleh chlorobutanol.

Total: 0,192 g natrium klorida yang diwakili oleh kedua bahan tersebut.

Tahap 2. $60 \times 0,009 = 0,540$ g natrium klorida dalam 60 mL larutan natrium klorida isotonik.

Tahap 3. $0,540$ g (dari tahap 2)
 $- 0,192$ g (dari tahap 1)
 $0,348$ g natrium klorida dibutuhkan untuk membuat larutan isotonis.

Karena resep tersebut menggunakan asam borat, maka:

Tahap 4. $0,348 \text{ g} \div 0,52 = 0,669$ g asam borat yang digunakan.

3. Berapa gram kalium nitrat yang ditambahkan ke dalam sediaan berikut ini untuk membuat larutan isotonis?

R/ Sol. Silver nitrate 60
 1 : 500 w/v
 Make isoton. Sol.
 Sig. for eye use

Jawab:

Tahap 1. $0,33 \times 0,12 = 0,04$ g natrium klorida yang diwakili oleh perak nitrat

Tahap 2. $60 \times 0,009 = 0,54$ g natrium klorida dalam 60 mL larutan natrium klorida isotonis.

Tahap 3. $0,54$ g (dari tahap 2)

0,04 g (dari tahap 1)
 0,50 g natrium klorida yang dibutuhkan untuk membuat larutan isotonik.
 Karena larutan ini, natrium klorida tidak kompatibel dengan perak nitrat, maka bahan pengisotonis yang dipilih adalah kalium nitrat. Sehingga:
 Tahap 4. $0,50 \div 0,58$ (natrium klorida yang setara dengan kalium nitrat) = 0,86 g kalium nitrat yang digunakan.

4. Berapa gram natrium klorida yang digunakan untuk membuat sediaan berikut ini?

R/ Ingridient X 0,5
 Sodium chloride q.s
 Purified water ad 50
 Make isoton.sol
 Sig. Eye drops

Jawab:

Kita berasumsi bahwa bahan x merupakan zat baru yang tidak memiliki kesetaraan natrium klorida dalam tabel ..., dan berat molekul 295 dan faktor *i* adalah 2,4. Maka kesetaraan natrium klorida dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{58,5}{1,8} \times \frac{2,4}{295} = 0,26$$

Kemudian,

Tahap 1. $0,26 \times 0,5\text{g} = 0,13\text{g}$ natrium klorida yang diwakili oleh senyawa x.

Tahap 2. $50 \times 0,008 = 0,45$ g natrium klorida dalam 50 mL larutan natrium klorida isotonik.

Tahap 3. 0,45 g (dari tahap 2)

-0,13 g (dari tahap 1)

0,32 g natrium klorida yang digunakan

D. Penggunaan Larutan NaCl Isotonik Untuk Membuat Larutan Isotonik Yang Lain

Larutan natrium klorida 0,9% dapat digunakan untuk menyiapkan larutan isotonik dari senyawa obat yang lain.

Tahap 1. Hitunglah jumlah obat yang diperlukan untuk diberikan dalam resep.

Tahap 2. Gunakan persamaan berikut untuk menghitung volume air yang dibutuhkan untuk menghasilkan larutan obat yang isotonis;

$$\frac{g \text{ obat} \times E \text{ obat}}{0,009} = \text{mL air yang dibuthkan untuk membuat larutan isotonis}$$

Tahap 3. Tambahkan larutan natrium klorida 0,9% b/v untuk mencukupkan volume.

Contoh Perhitungan

1. Dengan menggunakan metode di atas, tentukanlah volume air murni dan larutan NaCl 0,9% yang dibutuhkan untuk membuat larutan hydromorphone hydrochloride 1% b/v sebanyak 20 mL ($E = 0,22$)

Jawab:

Tahap 1. 20 mL larutan 1% b/v membutuhkan 0,2 g hydromorphone hydrochloride.

Tahap 2. $\frac{0,2 \times 0,22}{0,009} = 4,89$ air murni yang dibutuhkan untuk membuat larutan hydromorphone hydrochloride isotonik.

Tahap 3. $20 \text{ mL} - 4,89 \text{ mL} = 15,11 \text{ mL}$ larutan NaCl 0,9% b/v.

Bukti:

$20 \text{ mL} \times 0,9 \% = 0,18 \text{ g}$ natrium klorida atau ekivalen yang dibutuhkan.

$0,2 \times 0,22 = 0,044 \text{ g}$ (natrium klorida yang diwakili oleh 0,2 g hydromorphone hydrochloride)

$15,11 \text{ mL} \times 0,9\% = 0,136 \text{ g}$ natrium klorida yang ada

$0,044 \text{ g} + 0,136 \text{ g} = 0,18 \text{ g}$ natrium klorida yang diperlukan untuk isotonisitas.

E. Titik Beku Dalam Perhitungan Isotonisitas

Penurunan titik beku (ΔT_f) dapat digunakan untuk perhitungan isotonisitas ketika bahan yang memiliki efek tonisitas tidak dapat menembus membran biologis yang dimaksud dalam pertanyaan (misalnya sel darah merah). Sebagaimana disebutkan sebelumnya, titik beku dari darah dan cairan lakrimal adalah $-0,52^\circ\text{C}$. Sehingga, suatu larutan farmaseutik yang memiliki titik beku $-0,52$ disebut isotonik. Penentuan tonisitas dengan metode penurunan titik beku ini dikenal sebagai **Metode Krioskopik**.

Data representasi titik beku dari beberapa senyawa obat dan bahan farmaseutik disajikan tabel 9.2. Meskipun data ini adalah untuk larutan 1% ($\Delta T_f^{1\%}$), data dari larutan dengan konsentrasi yang lain dan senyawa tambahan dapat ditemukan dalam literatur yang lain. Data penurunan titik beku dapat digunakan dalam perhitungan isotonisitas seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 9.2 : Data Titik Beku Dari Beberapa Bahan

AGENT	FREEZING POINT DEPRESSION, 1% SOLUTIONS ($\Delta T_f^{1\%}$)
Atropine sulfate	0.17
Boric acid	0.29
Bulacaine sulfate	0.12
Chloramphenicol	0.06
Chlorobutanol	0.14
Dextrose	0.09
Dibucaine hydrochloride	0.08
Ephedrine sulfate	0.11
Epinephrine bitartrate	0.10
Ethylmorphine hydrochloride	0.09
Glycerin	0.20
Homatropine hydrobromide	0.11
Lidocaine hydrochloride	0.063
Lincomycin	0.09
Morphine sulfate	0.08
Naphazoline hydrochloride	0.16
Physostigmine salicylate	0.09
Pilocarpine nitrate	0.14
Sodium bisulfite	0.16
Sodium chloride	0.58
Sulfacetamide sodium	0.14
Zinc sulfate	0.04

Contoh Perhitungan Menggunakan Data Titik Beku

1. Berapa milligram natrium klorida dan dibukain hidroklorida yang dibutuhkan untuk membuat 30 mL larutan dibukain hidroklorida 1% yang isotonis dengan air mata?

Untuk membuat larutan isotonik, maka titik beku harus berada dibawah $-0,52$. Dari tabel 9.2, telah ditentukan bahwa larutan dibukain hidroklorida 1% memiliki penurunan titik beku $0,08^{\circ}\text{C}$. Kemudian jumlah yang tepat dari natrium klorida yang cukup harus ditambahkan untuk menurunkan titik beku $0,44$ ($0,52^{\circ}\text{C} - 0,08^{\circ}\text{C}$).

Jawab:

Dari tabel 9.2, telah ditentukan bahwa larutan natrium klorida 1% menurunkan titik beku $0,58^{\circ}$. Dengan persamaan:

$$\frac{1\% \text{ (NaCl)}}{x\% \text{ NaCl}} = \frac{0,58^{\circ}}{0,44^{\circ}}$$

$x = 0,76\%$ (konsentrasi NaCl yang dibutuhkan untuk menurunkan titik beku $0,44^{\circ}$, untuk membuat larutan isotonis).

Kemudian, untuk membuat larutan 30 mL, maka

$30 \text{ mL} \times 1\% = 0,3 \text{ g} = 300 \text{ mg}$ dibukain hidroklorida, dan

$30 \text{ mL} \times 0,76\% = 0,228 \text{ g} = 228 \text{ mg}$ natrium klorida.

Catatan: Jika resep menginginkan lebih dari satu bahan obat, maka jumlah dari titik beku dikurangi dari nilai yang diperlukan dalam menentukan jumlah bahan tambahan yang digunakan untuk mencapai tonisitas yang diinginkan.

Isotonisitas

Untuk menghitung tonisitas ekivalen terhadap natrium klorida yang terwakili oleh bahan dalam sediaan, maka kalikan berat bahan dengan nilai E nya:

$g \times E = g$, tonisitas ekivalen terhadap natrium klorida

Untuk membuat larutan isotonik, hitung dan pastikan jumlah natrium klorida dan / tonisitas ekivalen semua bahan lainnya hingga total 0,9% b / v dalam sediaan:

$$\frac{g(\text{NaCl}) + g(\text{tonisitas ekivalen NaCl})}{\text{mL (sediaan)}} \times 100 = 0,9\% \text{ b/v}$$

Untuk membuat larutan isotonik dari zat obat, tambahkan air yang cukup menurut dengan persamaan:

$$\frac{g(\text{obat}) \times E(\text{obat})}{0,009} = \text{mL air}$$

Larutan ini kemudian dapat dibuat menjadi volume tertentu dengan larutan natrium klorida isotonik untuk mempertahankan isotonisitasnya.

Nilai E dapat diturunkan dari persamaan yang sama, memberikan jumlah gram bahan obat dan mililiter air yang dibutuhkan untuk membuat larutan isotonik.

F. Buffer dan Larutan Buffer

Ketika sejumlah kecil asam klorida ditambahkan ke dalam air murni, maka akan terjadi peningkatan konsentrasi ion hidrogen segera secara signifikan. Dengan cara yang sama, ketika sejumlah kecil natrium hidroksida ditambahkan ke dalam air murni, akan menyebabkan kenaikan ion hidroksil secara signifikan. Perubahan ini

terjadi karena air saja tidak dapat menetralkan asam atau basa bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Air sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menghambat perubahan konsentrasi ion hidrogen atau pH. Suatu larutan garam netral seperti natrium klorida, juga tidak memiliki kemampuan ini. Oleh karena itu larutan seperti ini dikatakan "takterbuffer".

Keberadaan zat tertentu atau kombinasi zat dalam larutan berair akan memberikan kemampuan ke dalam sistem untuk mempertahankan pH yang diinginkan pada tingkat yang relatif konstan. Bahkan ada bahan tertentu yang diharapkan mampu mengubah konsentrasi ion hidrogen. Zat atau kombinasi zat ini disebut buffer, yang mampu melawan perubahan pH. Kemampuan ini disebut sebagai aksi penyangga (*buffer action*). Kemampuannya untuk melawan perubahan pH disebut sebagai kapasitas buffer (*buffer capacity*). Larutan dari zat atau kombinasi zat ini disebut larutan buffer. Berdasarkan definisi tersebut, kemudian dapat dikatakan bahwa buffer adalah sistem, biasanya larutan berair yang memiliki kemampuan untuk menolak perubahan pH karena penambahan sejumlah kecil asam kuat atau basa kuat.

Buffer digunakan untuk memelihara suatu aktivitas ion dalam batas tertentu. Dalam bidang farmasi, sistem buffer paling umum digunakan dalam (i) pembuatan sediaan injeksi dan larutan oftalmik, yang diberikan langsung ke dalam cairan tubuh yang sensitif terhadap perubahan pH. (ii) pembuatan formulasi di mana pH harus dijaga relatif konstan untuk memastikan stabilitas produk maksimum, dan (iii) dalam pengujian yang memerlukan penyesuaian dan pemeliharaan pH tertentu untuk tujuan analitik.

Suatu larutan buffer biasanya terdiri dari asam lemah dan garam asamnya, seperti asam asetat dan natrium asetat, atau basa lemah dan garam basanya seperti amonium hidroksida dan amonium klorida. Sistem buffer khas dapat digunakan dalam formulasi farmasi, seperti sistem berikut:

- Asam asetat dan natrium asetat
- Asam borat dan natrium borat
- Dinatrium fosfat dan natrium hidrogen fosfat.

Formula untuk larutan buffer standar untuk analisis farmasi diberikan dalam Farmakope.

Tabel 9.3. konstanta disosiasi beberapa asam lemah pada 25°

Asam	Ka
Asetat	$1,75 \times 10^{-5}$
Barbiturat	$1,05 \times 10^{-4}$
Benzoat	$6,30 \times 10^{-5}$
Borat	$6,4 \times 10^{-10}$
Format	$1,76 \times 10^{-4}$
Lactat	$1,38 \times 10^{-4}$
Mandelat	$4,29 \times 10^{-4}$
Salisilat	$1,06 \times 10^{-3}$

Dalam pemilihan sistem buffer, dasar pertimbangannya adalah konstanta disosiasi dari asam lemah atau basa lemah untuk memastikan kapasitas buffer maksimum. Konstanta disosiasi ini adalah ukuran kekuatan asam (untuk asam) yang lebih mudah mengalami disosiasi. Semakin tinggi konstanta disosiasi maka semakin kuat asamnya. Konstanta disosiasi dari beberapa asam disajikan dalam tabel 9.3 .

Konstanta disosiasi, atau nilai Ka dari asam lemah diberikan dalam persamaan:

$$K_a = \frac{(H^+)(A^-)}{(HA)}$$

Di mana A⁻ = garam

HA = Asam.

Karena angka numerik dari kebanyakan konstanta disosiasi berupa angka kecil, maka akan lebih mudah untuk menyatakannya dalam bentuk logaritma negatif.

$$pK_a = -\log K_a$$

$$K_a = \frac{(H^+)(A^-)}{(HA)}, \text{ maka:}$$

$$pK_a = -\log (H^+) - \log \frac{\text{garam}}{\text{asam}}$$

karena $pH = -\log (H^+)$:
sehingga :

$$pK_a = pH - \log \frac{\text{garam}}{\text{asam}}$$

dan

$$pH = pK_a + \log \frac{\text{garam}}{\text{asam}}$$

Persamaan Buffer

Persamaan yang baru saja diturunkan tadi adalah persamaan Henderson-Hasselbalch untuk asam lemah, umumnya dikenal sebagai persamaan buffer.

Demikian halnya untuk konstanta disosiasi basa lemah, atau nilai K_b , diberikan pada persamaan berikut ini:

$$K_b = \frac{(B^+)(OH^-)}{(BOH)}, \text{ di mana } B^+ = \text{garam}$$

Dan $BOH = \text{basa}$

Dan persamaan buffer untuk basa lemah, yang diturunkan dari hubungan ini dapat dikspressikan sebagai berikut:

$$pH = pK_w - pK_b + \log \frac{\text{basa}}{\text{garam}}$$

Persamaan buffer berguna untuk menghitung (i) pH sistem buffer jika komposisinya diketahui (ii) rasio molar dari kompoenen sistem buffer yang diperlukan untuk memberikan pH larutan yang diinginkan. Persamaan ini juga dapat digunakan untuk menghitung perubahan pH larutan buffer dengan penambahan sejumlah tertentu asam atau basa.

Nilai pK_a asam lemah dengan Konstanta Disosiasi yang diketahui.

Perhitungan nilai pK_a dari asam lemah, dengan konstanta disosiasi yang diketahui, K_a :

Contoh

Konstanta disosiasi dari asam asetat adalah $1,75 \times 10^{-5}$ pada 25°C . Hitunglah nilai pK_a nya.

Jawab:

$$K_a = 1,75 \times 10^{-5}$$

$$\text{dan } \log K_a = \log 1,75 + \log 10^{-5}$$

$$= 0,2430 - 5 = -4,757 \text{ atau } -4,76$$

Karena $pK_a = -\log K_a$
 $pK_a = -(-4,76) = 4,76.$

pH dari Sistem Buffer garam/asam

Contoh

Berapa pH dari larutan buffer yang dibuat dari 0,05 M natrium borat dan 0,005 M asam borat?

pK_a asam borat adalah 9,24 pada 25°C.

Perhatikan bahwa rasio komponen larutan buffer diberikan dalam konsentrasi molar.

Jawab:

Dengan menggunakan persamaan untuk asam lemah:

$$\begin{aligned} \text{pH} &= \text{p}K_a + \log \frac{\text{garam}}{\text{asam}} \\ &= 9,24 + \log \frac{0,05}{0,005} \\ &= 9,24 + \log 10 \\ &= 9,24 + 1 \\ &= 10,24 \end{aligned}$$

Nilai pH dari Sistem Buffer Garam/Basa

Contoh

Berapa pH dari larutan buffer yang dibuat dari 0,05 M ammonia dan 0,05 M amonium korida?

pK_b amonium adalah $1,80 \times 10^{-5}$ pada 25°C

Jawab;

Dengan menggunakan persamaan buffer untuk basa lemah:

$$\begin{aligned} \text{pH} &= \text{p}K_w - \text{p}K_b + \log \frac{\text{basa}}{\text{garam}} \\ \text{karena } K_w \text{ dari air adalah } 10^{-14} \text{ pada } 25^\circ\text{C}, \text{ maka } \text{p}K_w &= 14 \\ K_b &= 1,80 \times 10^{-5} \\ \text{dan } \log K_b &= \log 1,8 + \log 10^{-5} \\ &= 0,2553 - 5 = -4,7447 \text{ atau } -4,74 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 pK_b &= -\log K_b \\
 &= -(-4,74) = 4,74 \\
 \text{dan } pH &= 14 - 4,74 + \log \frac{0,05}{0,05} \\
 &= 9,26 + \log 1 \\
 &= 9,26
 \end{aligned}$$

Rasio Molar Garam/Asam untuk Sistem Buffer

Contoh:

Berapa rasio molar dari garam/asam yang dibutuhkan untuk membuat sistem buffer natrium asetat-asam asetat dengan pH 5,76? pKa dari asam asetat adalah 4,76 pada 25°C.

Jawab:

Dengan menggunakan persamaan buffer:

$$pH = pK_a + \log \frac{\text{garam}}{\text{asam}}$$

$$\begin{aligned}
 \log \frac{\text{garam}}{\text{asam}} &= pH - pK_a \\
 &= 5,76 - 4,76 = 1
 \end{aligned}$$

$$\text{Antilog } 1 = 10$$

$$\text{Rasio} = 10/1 \text{ atau } 10 : 1$$

Jumlah Komponen dalam Larutan Buffer Dalam Volume Tertentu

Perhitungan jumlah komponen larutan buffer yang diperlukan untuk menyiapkan volume tertentu larutan, mengingat rasio molar dari komponen dan konsentrasi total larutan buffer:

Contoh:

Rasio molar dari natrium asetat terhadap asam asetat dalam larutan buffer dengan pH 5,76 adalah 10 : 1. Dengan asumsi konsentrasi total buffer adalah $2,2 \times 10^{-2}$ mol/L. Berapa gram natrium asetat (BM = 82) dan berapa gram asam asetat (BM = 60) yang harus ditambahkan untuk membuat 1 liter larutan?

Jawab:

Karena rasio molar natrium asetat terhadap asam asetat adalah 10:1,

$$\text{Fraksi mol dari natrium asetat} = \frac{10}{1+10} \text{ atau } \frac{10}{11}$$

$$\text{Fraksi mol dari asam asetat} = \frac{1}{1+10} \text{ atau } \frac{1}{11}$$

$$\text{Jika konsentrasi total buffer} = 2,2 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$\begin{aligned} \text{Konsentrasi natrium asetat} &= \frac{10}{11} \times (2,2 \times 10^{-2}) \text{ mol/L} \\ &= 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Konsentrasi asam asetat} &= \frac{1}{11} \times (2,2 \times 10^{-2}) \\ &= 0,2 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \end{aligned}$$

Kemudian $2,0 \times 10^{-2}$ atau $0,02 \times 82 = 1,64$ natrium asetat perliter larutan, dan $0,2 \times 10^{-2}$ atau $0,002 \times 60 = 0,120$ g asam asetat perliter larutan.

Efisiensi larutan buffer yaitu kemampuan spesifik larutan buffer untuk mempertahankan perubahan pH adalah diukur sebagai kapasitas buffer; semakin kecil perubahan pH dengan penambahan jumlah tertentu asam atau basa maka semakin besar kapasitas sistem buffer. Kapasitas buffer ini tergantung kepada (i) konsentrasi relatif dari komponen buffer (2) rasio komponennya. Misalnya, buffer asetat 0,5M pada pH 4,76 akan memiliki kapasitas buffer lebih tinggi dari buffer 0,5M.

Jika basa kuat seperti natrium hidroksida ditambahkan ke dalam suatu sistem buffer yang mengandung konsentrasi ekimolr dari natrium asetat dan asam asetat, maka basa yang dinetralkan oleh asam asetat akan membentuk natrium asetat, dan akan mengakibatkan peningkatan pH yang sedikit. Sebenarnya, penambahan basa akan meningkatkan konsentrasi natrium asetat dan menurunkan konsentrasi asam asetat dengan jumlah yang setara. Dengan cara yang sama, penambahan suatu asam kuat ke dalam sistem buffer yang mengandung basa lemah dan garamnya akan menghasilkan penurunan pH yang sedikit.

Perubahan pH dengan Penambahan Asam atau Basa

Perhitungan perubahan pH dari larutan buffer dengan penambahan sejumlah asam atau basa:

Contoh

1. Hitunglah perubahan pH setelah penambahan 0,04 mol natrium hidroksida ke dalam 1 liter larutan buffer konsentrasi 0,2M yang mengandung natrium asetat dan asam asetat. Nilai pKa dari asam asetat adalah 4,76 pada suhu 25°C.

Jawab:

pH larutan buffer dihitung menggunakan persamaan buffer seperti berikut:

$$\begin{aligned} \text{pH} &= \text{pKa} + \log \frac{\text{garam}}{\text{asam}} \\ &= 4,76 + \log \frac{0,2}{0,2} \\ &= 4,76 + \log 1 \\ &= 4,76 \end{aligned}$$

2. Penambahan 0,04 mol natrium hidroksida akan mengubah 0,04 mol asam asetat menjadi 0,04 mol natrium asetat. Konsekuensinya, konsentrasi asam asetat akan diturunkan dan konsentrasi natrium asetat akan meningkat dengan jumlah yang setara, menurut persamaan berikut ini:

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log \frac{\text{garam} + \text{basa}}{\text{asam} - \text{basa}}$$

$$\begin{aligned} \text{dan } \text{pH} &= \text{pKa} + \log \frac{0,2+0,04}{0,2-0,04} \\ &= \text{pKa} + \log \frac{0,24}{0,16} \\ &= 4,76 + 0,1761 = 4,9361 \text{ atau } 4,94 \end{aligned}$$

Karena pH sebelum penambahan natrium hidroksida adalah 4,76, maka perubahan pH = 4,94 - 4,76 = 0,18.

BAB X

INFUS INTRAVENA DAN SEDIAAN PARENTERAL

A. Injeksi

Injeksi adalah sediaan farmasi steril berupa larutan atau suspensi dari bahan obat dalam pembawa air atau bukan air. Sediaan ini diaplikasikan dengan menggunakan jarum suntik ke dalam bagian tubuh, seperti sendi (intra-artikular), cairan sendi (intrasinovial), tulang belakang (intraspinal), cairan sum-sum tulang belakang (intratekal), arteri (intra arterial) dan dalam kondisi darurat bahkan ke dalam jantung (intracardiac). Namun demikian, kebanyakan injeksi diberikan melalui vena (intravena, I.V atau IV) otot (intramuskular, I.M atau IM) kulit (intradermal, I.D., ID, intrakutan) atau ke bawah kulit (subkutan, sub-Q, SQ, hipodermik).

Tergantung kepada penggunaannya, injeksi dikemas dalam volume kecil atau ampul atau jarum suntik sekali pakai untuk penggunaan dosis tunggal; dalam vial untuk penggunaan dosis tunggal atau dosis ganda; atau volume besar dalam wadah plastik atau wadah kaca untuk pemberian infus intravena lambat.

Beberapa sediaan injeksi tersedia sebagai sediaan larutan atau suspensi dengan kandungan obat yang tercantum dalam labelnya, misalnya "10 mg/mL". Kandungan lain dapat berupa serbuk kering untuk direkonstruksi menjadi larutan atau suspensi dengan penambahan larutan pengencer dengan volume tertentu sebelum pemakaian dan diberi label misalnya "10 mg/vial". Perhitungan volume tepat larutan pengencer yang dibutuhkan untuk membuat sediaan injeksi dapat dilihat sebagai berikut

Injeksi volume kecil dapat diberikan dengan cara ditambahkan ke dalam cairan parenteral volume besar untuk infus intravena. Istilah parenteral didefinisikan sebagai rute pemakaian obat selain melalui saluran pencernaan, dan dengan demikian istilah ini mencakup seluruh rute injeksi.

B. Infus Intravena

Infus intravena (IV) adalah salah satu jenis sediaan steril dalam pembawa air yang diberikan secara intravena dalam volume yang relatif besar. Infus intravena digunakan untuk meningkatkan volume darah dan atau pemberian elektrolit, nutrien atau obat-obatan. Kebanyakan infus intravena diberikan untuk pertolongan keadaan kritis, lelah, dehidrasi atau pasien malnutrisi, atau sebelum, selama dan atau setelah operasi. Infus intravena secara luas digunakan di unit perawatan darurat, rumah sakit dan institusi pelayanan pasien lainnya dan bahkan untuk perawatan di rumah. Ahli farmasi berperan dalam pembuatan sediaan dan pemberian terapi dengan infus intravena. Farmakope telah menetapkan persyaratan untuk pembuatan sediaan steril.

Kebanyakan infus intravena berupa larutan; namun demikian beberapa diantaranya berupa dispersi yang sangat halus dari nutrisi atau bahan terapeutik, darah dan produk darah. Meskipun larutan intravena bersifat isotonik atau mendekati isotonik dengan darah, tonisitas ini tidak selalu dibutuhkan secara absolut karena volume dari cairan yang diberikan akan terencerkan cepat oleh sirkulasi darah.

Sediaan infus komersial tersedia dalam botol kaca atau plastik atau kantung plastik yang dapat dilipat dalam volume 50 mL (minibag), 100 mL, 250 mL, 500 mL dan 1000 mL. Volume terkecil ditemukan khusus untuk pemberian pada pasien pediatrik dan dewasa yang membutuhkan volume infus yang relatif kecil. Ketika volume kecil ditambahkan ke dalam infus intravena volume besar, ini dikenal sebagai *IV piggyback* (IVPB). Singkatan LVP sering digunakan untuk mengindikasikan *large volume parenteral*, dan SVP mengindikasikan *small volume parenteral*.

Beberapa larutan intravena yang umum disajikan dalam tabel 10.1. Dalam prakteknya, penambahan bahan tambahan atau additive sering dilakukan untuk larutan dasar ini. Obat dan bahan tambahan lainnya yang digunakan melalui infus akan terdistribusi secara cepat melalui sirkulasi darah.

Satu set alat penggunaan terpasang atau melekat pada botol infus atau kantung infus untuk memberikan cairan ke dalam vena pasien. Alat ini dapat berupa alat standar (macro drip) atau micro drip untuk pediatrik. Tergantung pada alat khusus yang digunakan, laju


tetes dapat bervariasi mulai dari 10 sampai 15 tetes/mL untuk alat standar dan hingga 60 tetes/mL untuk mikrodrip. Laju tetesan untuk transfusi darah biasanya 10 – 15 tetes/mL dengan pemakaian infus 250 sampai 500 mL selama 2 sampai 4 jam.

Masuknya larutan infus ke dalam vena pasien dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau oleh tekanan pompa infus elektronik volumetrik. Beberapa pompa infus dapat dikalibrasi untuk menghantarkan volume mikroinfus, misalnya 0,1 mL perjam, hingga 2000 mL perjam, tergantung pada obat yang diberikan dan kebutuhan pasien. Alat kontrol elektronik dapat digunakan untuk menjaga laju alir yang diinginkan.


Dalam pemakaian infus, digunakan jarum khusus atau kateter intravena untuk memasukkan cairan ke dalam vena pasien. Jarum atau kateter digunakan dapat berukuran besar, menengah, dan kecil, dengan portal masuk dipilih berdasarkan usia pasien (yaitu, dewasa, anak, bayi, atau neonatus) dan keadaan klinis. Semakin kecil ukuran jarum, semakin lambat laju alir sehingga waktu yang lebih lama diperlukan untuk pemakaian volumetrik tertentu. Pembuluh vena yang dapat digunakan pada pemberian infus adalah vena pada punggung tangan, lengan, subklavia, jugularis, dan jangat kepala (misalnya, pada bayi prematur).

Tabel 10.1 larutan infus intravena yang umum digunakan

Larutan	singkatan
0,9 % sodium chloride	NS (normal saline)
0,45% sodium chloride	½ NS
5% dextrose in water	D5W atau D ₅ W
10% dextrose in water	D10W atau D ₁₀ W
5% dextrose in 0,9% sodium chloride	D5NS atau D ₅ NS
5% dextrose in 0,45% sodium chloride	LR
Lactated Ringer's (0.86% Sodium Chloride, 0.03% Potassium Chloride, 0.033% Calcium Chloride)	
5% Dextrose in Lactated Ringer's	D5LR atau D ₅ LR



Gambar 10.1 sebuah gambaran cairan intravena dengan perangkat penggunaannya.



Gambar

10.2. Sebuah perangkat infus intravena khas dengan antibiotik piggybacked. (Courtesy of Lacher B. Farmasi Perhitungan untuk Teknisi Farmasi. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2008)

Infus intravena mungkin diberikan secara terus-menerus (*continuous infusion*) atau intermiten. Untuk infus kontinyu, digunakan cairan volume besar (yaitu, 250-1000 ml), dengan atau tanpa obat tambahan, dijalan kan ke dalam pembuluh vena, sedangkan infus intermiten (*intermittent infusion*) yang diberikan selama periode yang terjadwal. Kecepatan cairan infus obat masuk ke dalam pembuluh darah disebut dorongan IV (*IV push*) dan biasanya dilakukan dalam waktu kurang dari menit.

C. Larutan Infus Intravena Yang Umum

Larutan dekstrosa dalam air, natrium klorida, dan ringer laktat adalah larutan yang paling umum digunakan sebagai cairan infus.

Tabel 10.1 menggambarkan kandungan dari larutan tersebut yang dapat diberikan seperti itu atau dengan penambahan obat tertentu atau komponen nutrisi.

Contoh Perhitungan Infus Intravena

1. Berapa gram dekstrosa dan natrium klorida yang digunakan untuk membuat infus intravena D51/2NS 250 mL?

Jawab:

$$250 \text{ mL} \times 0,05 \text{ (5\% b/v)} = 12,5 \text{ g dekstrosa}$$

$$250 \text{ mL} \times 0,0045 \text{ (0,45\% b/v)} = 1,125 \text{ g natrium klorida}$$

2. Bandingkan(a) jumlah tetes dan (b) lama waktu dalam menit yang dibutuhkan untuk menghantarkan 50 mL larutan intravena yang menggunakan mikrodrup pada 60 tetes/mL, dan dengan menggunakan alat infus standar pada 15 tetes/mL, bila diinginkan pemakaian 1 tetes perdetiknya.

Jawab:

Alat mikrodrup:

a) $60 \text{ tetes/mL} \times 50 \text{ mL} = 3000 \text{ tetes}$

b) $3000 \text{ drops} \div 60 \text{ tetes/menit} = 50 \text{ menit}$

Alat standar:

a) $15 \text{ tetes/mL} \times 50 \text{ mL} = 750 \text{ tetes}$

b) $750 \text{ tetes} \div 60 \text{ tetes/menit} = 12,5 \text{ menit.}$

Atau dengan analisis dimensi

$$50 \text{ mL} \times \frac{60 \text{ tetes}}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ menit}}{60 \text{ menit}} = 50 \text{ menit}$$

Dan

$$50 \text{ mL} \times \frac{15 \text{ tetes}}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ menit}}{60 \text{ menit}} = 12,5 \text{ menit}$$

Pemakaian Obat dengan *IV Push*

Pemberian injeksi intravena cepat, seperti dalam keadaan darurat atau perawatan situasi kritis disebut IV push, IVP, IV stat, atau kadang-kadang disebut dosis bolus. Pemberian obat dengan cara ini dimaksudkan untuk pengendalian detak jantung, tekanan darah,

curah jantung, respirasi atau kondisi yang mengancam jiwa lainnya. Obat IV push seringkali diberikan dalam waktu kurang dari satu menit. Keamanan pemberian dengan cara ini sangat tergantung pada perhitungan dosis yang tepat dan tingkat pemakaian. Jika memungkinkan, injeksi yang telah diencerkan dari sediaan yang pekat (misalnya 1 mg/mL vs 5 mg/mL) dapat diberikan sebagai tambahan untuk tujuan keselamatan.

Sebuah contoh jarum suntik *intravenaflush* ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 10.3. *Intravena flush syringe* untuk pemberian heparin

Cotoh Perhitungan Pemakaian IV plush

1. Seorang dokter meresepkan enalaprilat (*VASOTECH*) 2 MG ivp untuk penderita hipertensi. Seorang apoteker membawakan beberapa spoit 1 mL, yang mengandung 1,25 mg enalaprilat. Berapa milliliter injeksi yang harus diberikan?

Jawab:

$$\frac{1,25 \text{ mg}}{1 \text{ mL}} = \frac{2 \text{ mg}}{x \text{ mL}}$$

$x = 1,6 \text{ mL}$ (1 mL dari 1 spoit dan 0,6 mL dari spoit lainnya
atau dengan analisis dimensi:

$$2 \text{ mg} \times \frac{1 \text{ mL}}{1,25 \text{ mg}} = 1,6 \text{ mL}$$

2. Seorang dokter meresepkan midazolam hidroklorida (*VERSED*) 2 mg IV Stat. Seorang apoteker membawakan 1 vial yang berisi midazolam hidroklorida 5 mg/mL. Berapa milliliter yang harus diberikan kepada pasien?

Jawab:

$$\frac{5 \text{ mg}}{1 \text{ mL}} = \frac{2 \text{ mg}}{x \text{ mL}}, \quad x = 0,4 \text{ mL}$$

Atau dengan analisis dimensi

$$\frac{1 \text{ mL}}{5 \text{ mg}} \times 2 \text{ mg} = 0,4 \text{ mL}$$

3. Petunjuk umum dalam pengobatan gejala asidosis diabetik adalah dosis bolus awal dari 0,1 – 0,4 unit insulin/kg IVP, diikuti dengan insulin drip. Hitunglah range dosis bolus untuk pasien dengan berat badan 200 lb.

Jawab:

$$200 \text{ lb} \div 2,2 \text{ lb/kg} = 90,9 \text{ kg},$$

$$90,9 \text{ kg} \times 0,1 \text{ unit/kg} = 9,09 \text{ unit}$$

$$90,9 \text{ kg} \times ,4 \text{ unit/kg} = 36,36 \text{ unit.}$$

Pertimbangan Khusus pada Pemberian IV pada Pediatrik

Tergantung pada protokol institusi, permintaan obat untuk infus intravena untuk anak 10 kg dapat dinyatakan sebagai, misalnya “dopamin IV 60 mg/100 mL untuk pemberian 5 mL/jam, 5 mcg/kg/menit”. Atau di beberapa instansi cukup ditulis dopamin IV 5mcg/kg/menit untuk memberikan dosis yang akurat pada pasien. Dalam hal ini larutan standar dopamin mengandung 60 mg dopamin dalam setiap 100 mL dan diberikan 5 mL/jam, akan memberikan dosis samadengan 5mcg/kg/menit untuk pasien dengan berat badan 10 kg. Cara menghitungnya:

$$\frac{60 \text{ mg}}{100 \text{ mL}} = \frac{x \text{ mL}}{5 \text{ mL}}; x = 3 \text{ mg atau } 3000 \text{ mcg doamin perjam}$$

$$300 \text{ mcg} \div 60 \text{ menit/jam} = 50 \text{ mcg dopamin permenit.}$$

Karena 50 mcg.menit diberikan pada anak 10 kg, maka dosis per kg per menit adalah:

$$\frac{50 \text{ mcg}}{10 \text{ kg}} = \frac{x \text{ mcg}}{1 \text{ kg}}; x = 5 \text{ mcg dopamin /kg/menit}$$

Atau dengan analisis dimensi:

$$\frac{60 \text{ mg}}{100 \text{ mL}} \times \frac{1000 \text{ mcg}}{1 \text{ mg}} \times \frac{5 \text{ mL}}{1 \text{ jam}} \times \frac{1 \text{ jam}}{60 \text{ menit}} = 50 \frac{\text{mcg}}{\text{menit}}$$

$$(\text{dosis untuk anak } 10 \text{ kg}) = 5\text{mcg/kg/menit}$$

Semua dosis pemberian untuk anak, termasuk yang diberikan secara intravena, harus ditentukan secara hati-hati dengan menggunakan literatur yang tersedia sebagai sumber referensi. Selain obat intravena, pada pasien anak juga diberikan cairan dan eletrolit yang sangat penting dalam pengelolaan klinis bayi neonatus dan prematur, terutama mereka dengan berat lahir sangat rendah dan cenderung memiliki kelemahan akibat kehilangan air melalui kulitnya, terutama karena mereka berada dan dipertahankan dalam inkubator yang hangat.

Contoh Perhitungan Infus Pediatrik

1. Hitunglah volume infus perharinya dari D10W untuk diberikan pada neonatus dengan berat badan 3 lb, 8 oz, dengan dosis 60 mL/kg/hari.

Jawab:

$$3 \text{ lb, } 8\text{oz.} = 3,5 \text{ lb} \div 2,2 \text{ lb/kg} = 1,59 \text{ kg atau } 1,6 \text{ kg}$$

$$1,6 \text{ kg} \times 60 \text{ mL} = 96 \text{ mL}$$

2. Dengan menggunakan infus set yang menghatarkan 60 tetes/mL, 20 tetes permenit, hitunglah waktu keseluruhan untuk pemberian infus di atas.

Jawab:

$$96 \text{ mL} \times \frac{60 \text{ tetes}}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ menit}}{20 \text{ tetes}} = 288 \text{ menit, atau } 4 \text{ jam } 48 \text{ menit}$$

3. Gentamisin sulfat, 2,5 mg/kg, diresepkan untuk neonatus 1,5 kg. Hitunglah (a) dosis obat, dan (b) bila obat ditempatkan dalam kantung infus 50 mL, laju alir dalam mL/menit, jika infus diberikan selama 30 menit.
- (a) $2,5 \text{ mg/kg} \times 1,5 \text{ kg} = 3,75 \text{ mg}$ gentamisin sulfat
(b) $50 \text{ mL} \div 30 \text{ menit} = 1,67 \text{ mL/menit}$.

D. Campuran Intravena

Pembuatan campuran intravena dilakukan dengan menambahkan satu atau lebih obat-obatan ke dalam cairan injeksi steril volume besar, seperti natrium klorida, dekstrosa injeksi, ringer laktat injeksi, dan lain-lain. Obat yang ditambahkan umumnya dalam bentuk larutan steril volume kecil yang dikemas dalam ampul, vial, minibag untuk digunakan sebagai piggybacks, atau padatan steril, dan obat-obat lain yang membutuhkan penambahan pelarut steril sebelum ditambahkan.

Meskipun beberapa jenis obat dan kombinasi obat yang digunakan dalam membuat infus yang diencerkan untuk intravena, beberapa bahan tambahan yang lebih umum seperti elektrolit, antibiotik, vitamin, mineral, heparin, dan dalam kasus tertentu ditambahkan insulin. Penambahan bahan tambahan tersebut dilakukan secara aseptik untuk larutan volume besar.

Dalam setiap pemberian campuran intravena, semua cairan dasar (larutan volume besar) bahan tambahan (sudah bentuk larutan), dan perhitungan harus dilakukan hati-hati sesuai permintaan obat yang tepat.

Fasilitas perawatan pasien biasanya menggunakan larutan intravena konsentrasi standar untuk tujuan keseragaman. Contoh umum adalah dopamin 400 mg dalam 250 mL D5W, insulin 25 unit dalam 250 mL NS, dan nitroglicerine 50 mg dalam 250 mL D5W. Dalam pembuatan larutan konsentrasi standar ini, ahli farmasi mengeluarkan volume tertentu dari ampul atau vial yang berisi larutan obat pekat dan memindahkan ke volume tertentu D5W, NS, atau cairan intravena lainnya. Tabel 10.2 menunjukkan beberapa sediaan infus pekat yang dapat dengan mudah dibuat dari dopamin konsentrasi 40 mg/mL dan 80 mg/mL.



Gambar 10.4. Penambahan obat tambahan ke dalam larutan parenteral volume besar secara aseptik.

Tabel 10.2. Pembuatan infus dari berbagai konsentrasi

VOLUME USED		INJECTION:	CONCENTRATION OF DOPAMINE HCl*	
IV FLUID	INJECTION		40 mcg/mL	80 mcg/mL
250 mL	5 mL		800 mcg/mL	1.6 mg/mL
	10 mL		1.6 mg/mL	3.2 mg/mL
500 mL	5 mL		400 mcg/mL	800 mcg/mL
	10 mL		800 mcg/mL	1.6 mg/mL
1000 mL	5 mL		200 mcg/mL	400 mcg/mL
	10 mL		400 mcg/mL	800 mcg/mL

Adalah penting untuk diketahui bahwa pengaturan dosis obat melalui infus berbeda dengan konsentrasi obat dalam infus, volume infus yang diberikan, infus set yang digunakan, dan laju alir dari infus (misalnya, mL/menit, mg/menit).

Contoh Perhitungan Bahan yang Ditambahkan ke dalam Larutan Intravena

1. Suatu resep obat untuk pasien dengan berat badan 154 lb, mencantumkan 0,25 mg amfoterisin B perkilogram berat badan untuk ditambahkan ke dalam 500 mL 5% dekstrosa injeksi. Jika amfoterisin B diperoleh dari injeksi yang mengandung 50 mg/10

ml, berapa milliliter yang harus ditambahkan ke dalam dekstrosa injeksi?

Jawab:

$$1 \text{ kg} = 2,2 \text{ lb}$$

$$\frac{154 \text{ lb}}{2,2 \text{ kg}} = 70 \text{ kg}$$

$$0,25 \text{ mg} \times 70 = 17,5 \text{ mg}$$

Larutan stok mengandung 50 mg/10 mL;

$$\frac{50 \text{ mg}}{17,5 \text{ mg}} = \frac{10 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$

$$x = 3,5 \text{ mL}$$

atau dengan analisis dimensi:

$$154 \text{ lb} \times \frac{1 \text{ kg}}{2,2 \text{ lb}} \times \frac{0,25 \text{ mg}}{1 \text{ kg}} \times \frac{10 \text{ mL}}{50 \text{ mg}} = 3,5 \text{ mL}$$

2. Suatu infus intravena mengandung 15 mEq ion kalium dan 20 mEq ion natrium dalam 500 mL dekstrosa injeksi. Dengan menggunakan kalium klorida injeksi yang mengandung 6g/30 mL dan 0,9% natrium klorida injeksi, berapa milliliter setiap ion tersebut untuk mencukupi kebutuhan ion tersebut?

Jawab:

15 mEq ion K^+ akan diberikan oleh 15 mEq KCl, dan 20 mEq ion Na^+ akan diberikan oleh 20 mEq NaCl

Maka:

$$1 \text{ mEq KCl} = 74,5 \text{ mg}$$

$$15 \text{ mEq KCl} = 1117,5 \text{ mg atau } 1,118 \text{ g}$$

$$\frac{6 \text{ g}}{1,118 \text{ g}} = \frac{30 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$

$$x = 5,59 \text{ atau } 5,6 \text{ mL; dan}$$

$$1 \text{ mEq NaCl} = 58,5 \text{ mg}$$

$$20 \text{ mEq NaCl} = 1170 \text{ mg atau } 1,17 \text{ g}$$

$$\frac{0,9 \text{ g}}{1,17 \text{ g}} = \frac{100 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$

$$x = 130 \text{ mL}$$

E. Laju Alir Cairan Intravena

Dalam suatu resep obat, dokter menentukan laju aliran suatu cairan intravena dalam satuan milliliter permenit, jumlah obat dalam milligram perjam atau lebih sering sebagai perkiraan durasi waktu pemberian volume total infus. Apoteker dapat melakukan pemeriksaan dan perhitungan laju aliran sebagaimana dijelaskan dalam contoh berikut ini:

Seringkali persamaan berikut ini digunakan untuk menentukan laju aliran:

$$\text{Laju alir (tetes/menit)} = \frac{\text{volume infus (mL)} \times \text{drip set } \left(\frac{\text{tetes}}{\text{mL}}\right)}{\text{waktu (menit)}}$$

Dalam penggunaan umum, set makro memberikan 10, 15, atau 20 tetes per mililiter dan microdrip atau set mini drip yang memberikan 60 tetes per mililiter.

Contoh Perhitungan Laju Alir

1. Suatu resep menuliskan 1000 mL D5W untuk diberikan selama 8 jam. Dengan menggunakan pemakaian IV set yang menghantarkan 10 tetes/mL, berapa tetes permenit yang harus diberikan kepada pasien?

Jawab:

$$\text{Volume cairan} = 1000 \text{ mL}$$

$$8 \text{ jam} = 480 \text{ menit}$$

$$\frac{1000 \text{ (mL)}}{480 \text{ menit}} = 2,08 \text{ mL permenit}$$

$$2,08 \text{ mL/menit} \times 10 \text{ tetes/mL} = 20,8 \text{ atau } 21 \text{ tetes permenit}$$

Atau dengan analisis dimensi:

$$\frac{10 \text{ tetes}}{1 \text{ mL}} \times \frac{1000 \text{ mL}}{8 \text{ jam}} \times \frac{1 \text{ jam}}{60 \text{ menit}} = 20,8 \text{ atau } 21 \text{ tetes per menit}$$

Atau dengan cara

$$\begin{aligned} \text{Laju alir (tetes/menit)} &= \frac{\text{volume infus (mL)} \times \text{drip set } \left(\frac{\text{tetes}}{\text{mL}}\right)}{\text{waktu (menit)}} \\ &= \frac{1000 \text{ (mL)} \times 10 \left(\frac{\text{tetes}}{\text{mL}}\right)}{480 \text{ (menit)}} \end{aligned}$$

$$= 20,8 \text{ atau } 21 \text{ tetes permenit}$$

2. Sepuluh milliliter dari injeksi kalsium glukonat 10% dan 10 mL infus multivitamin dicampurkan dengan 500 mL injeksi dekstrosa 5%. Infus tersebut diberikan selama 5 jam. Jika penetes dalam infus set mengalirkan 15 tetes/mL, berapa laju alir, tetes permenit, yang akan dialirkan pada pemakaian infus selama waktu yang dibutuhkan?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Volume total infus} &= 10 \text{ mL} + 10 \text{ mL} + 500 \text{ mL} = 520 \text{ mL} \\ \text{Penetes mengalirkan } 15 \text{ tetes/mL} &= 520 \times 15 \text{ tetes} = 7800 \text{ tetes} \end{aligned}$$

$$\frac{7800 \text{ tetes}}{300 \text{ menit}} = 26 \text{ tetes per menit}$$

Atau dengan analisis dimensi:

$$\frac{15 \text{ tetes}}{1 \text{ mL}} \times \frac{520 \text{ mL}}{5 \text{ jam}} \times \frac{1 \text{ jam}}{60 \text{ menit}} = 26 \text{ tetes permenit}$$

Atau, dengan persamaan:

$$\text{Laju alir (tts/menit)} = \frac{520 \text{ mL} \times 15 \text{ tts/mnt}}{300 \text{ mnt}}$$

$$= 26 \text{ tetes permenit.}$$

3. Suatu infus intravena mengandung larutan isoproterenol hidroklorida 1 : 5000 sebanyak 10 mL dan dekstrosa injeksi 5% sebanyak 500 mL. Berapa laju alir yang harus diberikan untuk memberikan 5 µg isoproterenol hidroklorida permenitnya, dan berapa interval waktu yang diperlukan untuk pemberian infus tersebut?

Jawab:

10 mL larutan 1 : 5000 mengandung 2 mg
2 mg atau 2000 µg terkandung dalam 510 mL

$$\frac{2000 \mu g}{5 \mu g} = \frac{510 mL}{x mL}$$

$$x = 1,275 \text{ atau } 1,28 \text{ mL permenit,}$$

dan

$$\frac{1,28 mL}{510 mL} = \frac{1 \text{ menit}}{x \text{ menit}}$$

$$x = 398 \text{ menit tau sekitar } 6 \frac{1}{2} \text{ jam.}$$

4. Jika 10 mg obat ditambahkan ke dalam 500 mL cairan parenteral volume besar:
- a). Berapa laju alir dalam milliliter perjam untuk menghantarkan 1 mg obat perjam?

Jawab:

$$\frac{10 mg}{1 mg} = \frac{500 mL}{x mL}$$

$$x = 50 \text{ mL perjam,}$$

- b). Jika infus set menghantarkan 15 tetes/mL, berapa laju alir dalam tetes permenit?

Jawab:

$$15 \text{ tetes/mL} \times 50 \text{ mL/jam} = 750 \text{ tetes perjam}$$

$$\frac{750 \text{ tetes}}{x \text{ tetes}} = \frac{60 \text{ menit}}{1 \text{ menit}}$$

$$x = 12,5 \text{ tetes/menit}$$

- c). Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga infus habis?

$$\frac{50 mL}{500 mL} = \frac{1 \text{ jam}}{x \text{ jam}}$$

$$x = 10 \text{ jam}$$

Laju Alir Infus IV pada Pasien Kritis

Pasien dalam perawatan kritis, membutuhkan cairan pemeliharaan, D5W, dan bahan obat terapeutik, seperti antibiotik (lihat Gambar 10.2). Namun, banyak pasien kritis memiliki

keterbatasan jumlah cairan dan harus dipelihara dan dirawat dalam volume maksimum sesuai dengan yang tercantum dalam asupan cairan per hari. Dengan demikian, harus diperhatikan tingkat dan volume setiap infus intravena yang diberikan termasuk dengan penambahan obat dengan metode *piggybacked* (IVPB).

Contoh:

Suatu permintaan untuk pasien, dengan batas cairan IV harian adalah 3-liter, membutuhkan 3 L D5W dengan 100 mL IVPB antibiotik untuk dijalankan selama 1 jam dan diberikan setiap 6 jam. Infus set dikalibrasi untuk mengalirkan 10 tetes per mililiter. Hitunglah:

- Laju alir dari IVPB antibiotik
- Waktu alir untuk IV antibiotik
- Volume total untuk IV antibiotik
- Total waktu alir untuk D5W
- Volume total untuk D5W
- Laju alir dari D5W

Jawab:


- $$\frac{100 \text{ mL} \times 10 \frac{\text{tetes}}{\text{mL}}}{60 \text{ min}} = 16,6 \text{ atau } 17 \text{ tetes permenit}$$
- 1 jam x 4 kali sehari = 4 jam atau 240 menit
- 100 mL x 4 kali sehari = 400 mL
- 24 jam - 4jam (waktu untuk antibiotik) = 20 jam atau 1200 menit
- 3000 mL - 400 mL (IVPB antibiotik) = 2600 mL
- $$\frac{2600 \text{ mL} \times 10 \text{ tetes /mL}}{1200 \text{ min}} = 21,6 \text{ atau } 22 \text{ tetes permenit}$$

Penggunaan Nomogram

Suatu nomogram, seperti ditunjukkan pada gambar 10.5 dapat digunakan untuk menentukan laju alir cairan parenteral. Dengan demikian, volume yang akan diberikan, waktu infus (durasi) dan jumlah tetes permililiter yang dikeluarkan oleh infus set, laju alir dalam tetes permenit dapat ditentukan secara langsung.

Nomogram for number of drops per minute

The number of drops per minute required to administer a particular quantity of infusion solution in a certain time can be read off directly from this nomogram. The nomogram allows for the increase in drop size as the dropping rate increases and is based on the normal drop defined by the relationship: 20 drops distilled water at 15° C = 1 g (±0.05 g) when falling at the rate of 60/min. The dependence of drop size on dropping rate is allowed for by the increasing width of the scale units of the three abscissae as the dropping rate increases.



Gambar 10.5. Nomogram Laju alir VS jumlah larutan infus VS waktu. (From Documenta Geigy Scientific Tables, 7th Ed., 1970. With permission of Ciba-Geigy Limited, Basel, Switzerland.)

Contoh:

Jika 1 liter cairan parenteral dialirkan selama periode 12 jam menggunakan infus set yang mengeluarkan 20 tetes/mL, berapa laju alirnya dalam tetes permenit?

Jawab:

Pertama, cari *intercept* dari garis diagonal yang mewakili waktu infus 12 jam dengan garis horizontal yang mewakili 1 liter cairan. Selanjutnya, ikuti titik tersebut turun ke bawah ke skala jumlah tetes yang mewakili "20 tetes/mL" untuk menentukan jawabannya. Dalam contoh tersebut, garis horizontal akan menyeberang antara 20 dan 30 tetes per menit - dekat ke 30 atau sekitar 28 tetes per menit.

Sebagai pengujian untuk membuktikan ketepatan penggunaan monogram, maka contoh tadi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Waktu infus} &= 12 \text{ jam} = 720 \text{ menit} \\ \text{Cairan infus} &= 1 \text{ liter} = 1000 \text{ mL} \\ \text{Tetes permililiter} &= 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total tetes dalam cairan infus} &= 20 \text{ tetes/mL} \times 1000 \text{ mL} = 20.000 \\ \frac{20.000 \text{ (tetes)}}{720 \text{ menit}} &= 27,7 \text{ atau } 28 \text{ tetes permenit} \end{aligned}$$

Atau, dengan analisis dimensi:

$$\frac{20 \text{ tetes}}{1 \text{ mL}} \times \frac{1000 \text{ mL}}{12 \text{ jam}} \times \frac{1 \text{ jam}}{60 \text{ min}} = 27,7 \text{ atau } 28 \text{ tetes permenit}$$

Atau,

$$\begin{aligned} \text{Laju alir (tetes/menit)} &= \frac{\text{volume infus (mL)} \times \text{tetes / mL}}{\text{waktu (min)}} \\ &= \frac{1000 \text{ mL} \times 20 \text{ tetes / min}}{720 \text{ menit}} \\ &= 27,7 \text{ atau } 28 \text{ tetes permenit} \end{aligned}$$

Tabel 10.3. Laju infus dari obat hipotetik pada konsentrasi 0,2 mg/mL

PATIENT WEIGHT (kg)	DRUG DELIVERY RATE (mcg/kg per minute)								
	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	INFUSION DELIVERY RATE (mL/hr)								
30	45	54	63	72	81	90	99	108	117
35	53	63	74	84	95	105	116	126	137
40	60	72	84	96	108	120	132	144	156
45	68	81	95	108	122	135	149	162	176
50	75	90	105	120	135	150	165	180	195
55	83	99	116	132	149	165	182	198	215
60	90	108	126	144	162	180	198	216	234
65	98	117	137	156	176	195	215	234	254
70	105	126	147	168	189	210	231	252	273
75	113	135	158	180	203	225	248	270	293
80	120	144	168	192	216	240	264	288	312
90	135	162	189	216	243	270	297	324	351
100	150	180	210	240	270	300	330	360	390

Menggunakan Tabel Laju Infus

Suatu tabel laju infus, seperti pada tabel di atas, biasanya selalu disertakan dalam produk komersial untuk memfasilitasi penentuan dosis. Komposisi dari tabel didasarkan pada konsentrasi larutan infus yang akan digunakan, dosis obat yang diinginkan, dan berat badan pasien. Tabel yang lain dapat didesain berbeda, yang disesuaikan dengan berat badan pasien dan luas permukaan tubuh pasien. Dalam setiap kasus, tabel ini dapat memberikan pedoman untuk laju pemakaian infus. Tabel 10.3 digunakan dengan mencocokkan kolom yang diinginkan dari laju pemberian obat terhadap berat badan pasien untuk menentukan laju pemakaian infus dalam mL/jam. Seorang apoteker cukup mampu mengembangkan tabel dosis, seperti yang ditunjukkan contoh di bawah ini.

Contoh

1. Dengan menggunakan tabel 10.3 tentukan laju pemberian dalam mL/jam, untuk obat yang diberikan dengan dosis 10 mcg/kg/menit pada pasien 65 kg.

Jawab:

$$\text{Dosis obat} = 10 \text{ mcg/kg/menit}$$

$$\text{Berat badan} = 65 \text{ kg}$$

$$\text{Intersep tabel} = 195 \text{ mL/jam}$$

2. Jika pompa infus yang digunakan pada contoh sebelumnya mengeluarkan cairan 60 mikrodrip per milliliter, berapa mikrodrip yang akan diberikan pada pasien per menit?

Jawab:

$$195 \text{ (mL/jam)} \times 60 \text{ (mikrodrip/mL)} = 11.700 \text{ (mikrodrip/jam)}$$

$$11.700 \text{ (mikrodrip/jam)} \div 60 \text{ menit/jam} = 195 \text{ mikrodrip per menit}$$

3. Hitunglah entri yang ditunjukkan pada tabel 10.3, untuk laju pemberian infus dari contoh pertama (195 mL/jam)

Jawab:

Konsentrasi obat : 0,2 mg/mL = 200 mcg/mL
 Laju pemberian : 10 mcg/kg/min
 Berat pasien : 65 kg
 Obat yang akan dimasukkan = 10 (mcg/kg/min) x 65 kg = 650 mcg/min
 $650 \text{ mcg/min} \times 60 \text{ min} = 3900 \text{ mcg/jam}$
 Laju infus = $3900 \text{ mcg/jam} \div 200 \text{ mcg/mL}$
 = 195 mL/jam

Untuk data seperti ini, ketika berat badan pasien, dosis obat, dan obat konsentrasi dalam infus diberikan atau dapat dihitung, maka laju infus dapat dihitung dengan persamaan berikut ini:

$$\begin{aligned}
 \text{Laju infus (mL/jam)} &= \frac{\text{berat pasien (kg)} \times \text{dosis (mcg, mg, atau unit /kg/min)} \times 60}{\text{konsentrasi obat, infus (mcg, mg, atau unit /mL)}} \\
 &= \frac{65 \text{ (kg)} \times 10 \text{ (mcg /kg /min)} \times 60}{200 \text{ mcg /mL}} \\
 &= 195 \text{ mL/jam}
 \end{aligned}$$

Dalam menggunakan persamaan ini, denominasi untuk dosis dan konsentrasi obat harus sama (mis., mcg, mg, atau unit). Juga, jika tingkat dosis dinyatakan dalam jam (misalnya, mcg/kg/jam), maka faktor 60 tidak diperlukan dalam persamaan untuk tiba dilaju aliran per jam.

Infus Intravena

Dalam perhitungan tertentu, persamaan berikut dapat digunakan:
Untuk menghitung waktu infus

$$\text{Waktu infus} = \frac{\text{volume infus (mL)}}{\text{laju alir dalam mL/min atau mL/jam}}$$

Untuk menghitung laju alir (tetes/min)

$$\text{Laju alir} = \frac{\text{volume infus (mL)} \times \text{tetes/mL}}{\text{waktu (menit)}}$$

Untuk menghitung laju alir mL/jam berdasarkan dosis:

$$\text{Laju infus (mL/jam)} = \frac{\text{BB pasien (kg)} \times \text{dosis (mcg, mg, atau unit/kg/min)} \times 60}{\text{konstrasi obat, infus (mcg, mg, unit/mL)}}$$

Dalam menggunakan persamaan ini, denominasi untuk dosis dan konsentrasi obat harus sama (misalnya, mcg, mg, atau unit). Juga, jika laju dosis dinyatakan dalam jam (misalnya, mcg/kg/jam), maka angka 60 tidak diperlukan dalam persamaan untuk menentukan laju aliran per jam.

BAB XI

NUTRISI ENTERAL DAN PARENTERAL

A. Pendahuluan

Seorang ahli farmasi harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pengaturan dan pemberian nutrisi enteral dan parenteral, baik diintitisi pelayanan kesehatan maupun dalam rumah tangga. Dalam kapasitas ini, seorang ahli farmasi seringkali melakukan perhitungan dan berperan serta dalam pemilihan, pembuatan, dan pemberian formula nutrisi.


Dalam komunitas praktis, ahli farmasi secara rutin melakukan konseling dengan pasien dalam hal pemberian dan pengaturan nutrisi. Telah diketahui bahwa pemilihan diet yang salah akan berkontribusi pada obesitas dan berbagai kondisi kronik lainnya, seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, apnea, dan diabetes melitus tipe II. Farmasi komunitas seringkali memberikan petunjuk kepada pasien dalam hal pengaturan diet secara umum untuk mempertahankan kesehatan, memberikan konseling yang bertujuan untuk mengendalikan berat badan, membantu memahami label nutrisi pada kemasan produk makanan, dan menjelaskan maksud penggunaan dan komposisi dari berbagai suplemen dietary.

Rute pemberian makanan melalui oral, enteral dan parenteral dapat dilihat pada gambar 11.1.

B. Nutrisi Enteral

Nutrisi enteral adalah metode pemberian nutrisi yang dilakukan dengan bantuan tube (selang) yang dimasukkan ke dalam lambung atau usus kecil. Metode ini diaplikasikan pada pasien yang tidak mampu atau mengalami kemunduran kemampuan untuk menerima asupan makanan melalui mulut. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 11.1, metode ini biasanya menggunakan selang nasogastrik (*nasogastric tubes*), atau selang yang dimasukkan ke dalam lambung, duodenum, atau jejunum melalui suatu lubang yang dibuat dengan cara pembedahan. Selang yang dimasukkan melalui tindakan

pembedahan ini umumnya dilakukan untuk pemberian makanan pada pasien dalam jangka relatif lama, biasanya lebih dari 4 minggu. Nutrisi enteral dapat dilakukan untuk pemberian nutrisi total, nutrisi suplemen atau pada fase transisi dari metode nutrisi parenteral. Teknik pemberian nutrisi enteral ini dapat secara intermitten atau kontinyu, dan pada pemberian makanan tambahan, biasanya dimaksudkan untuk mengganti kehilangan cairan melalui sistem urinari, anus, respirasi dan perspirasi.



Gambar 11.1 Rute pemberian makanan; oral, enteral dan parenteral.

Nutrisi enteral membutuhkan perhitungan kebutuhan kalori pasien dan kebutuhan akan protein, karbohidrat dan lemak, vitamin dan mineral, serat diet, elektrolit, dan cairan. Banyak sekali formula enteral yang tersedia secara komersial. Ada yang dirancang khusus untuk pasien pediatrik atau dewasa. Ada yang mengandung komposisi nutrisi yang seimbang secara umum, ada juga yang khusus mengandung kalori tinggi, protein, asam amino, lemak dan atau serat, dan bahkan dengan kandungan karbohidrat, natrium dan kolesterol yang rendah. Beberapa jenis formula dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus pasien dengan penyakit tertentu, seperti pada penderita gangguan hati dan ginjal atau bagi penderita diabetes, intoleransi laktosa, atau penderita alergi pada jenis makanan tertentu.

Osmolalitas dari formula enteral merupakan faktor yang sangat penting. Ada pasien yang tidak mampu mentoleransi sediaan yang hiperosmolar, sehingga mengakibatkan muntah, diare osmotik, tekanan abdominal dan berbagai gejala lainnya. Formula untuk bayi umumnya memiliki osmolalitas antara 150 dan 380 mOsmol/kg, dan dewasa 270 sampai 700 mOsmol/kg. Harus diingat bahwa osmolalitas dari cairan ekstraseluler adalah 285 sampai 295 mOsmol/kg.

Bilamana diperlukan, obat-obatan dapat diberikan melalui selang makanan (*feeding tubes*), lebih disukai dengan bentuk sediaan cair. Untuk kebutuhan tersebut, tablet atau kapsul dapat dibuat menjadi massabubur cair dan diberikan melalui *feeding tube* ini. Obat-obat cair dengan osmolalitas yang tinggi (beberapa diantaranya lebih dari 1000 mOsmol/kg) dapat diencerkan terlebih dahulu dengan 10 hingga mL air steril sebelum diberikan.

Umumnya, obat-obatan diberikan secara terpisah dari formula nutrisi, yang harus diberikan tidak bersamaan dengan jadwal pemberian makanan, untuk mencegah inkompatibilitas dengan obat dan komponen nutrisi lainnya, untuk mencegah kemungkinan efek obat terhadap gastrointestinal (diare atau konstipasi), dan agar sisa obat tidak tertinggal pada *feeding tube* setelah pemberian obat.

C. Nutrisi Parenteral

Parenteral nutrition (PN) atau *intravenous hyperalimentation (IVH)* atau HAL) adalah metode pemberian makanan atau nutrisi cair

melalui infus intravena. *Partial parenteral nutrition* (PPN) adalah bahan nutrisi pembantu yang diberikan secara oral dan hanya merupakan sebagian dari kebutuhan nutrisi harian. Sedangkan *Total parenteral nutrition* (TPN) mencakup keseluruhan kebutuhan nutrisi pasien.

Nutrisi parenteral digunakan untuk pasien yang tidak dapat menerima nutrisi yang cukup melalui pemberian oral. Dalam hal ini termasuk pasien yang menderita malnutrisi, penderita penyakit kritis sehingga tidak mampu menerima nutrisi oral atau enteral dan untuk mencegah starvasi akibat komplikasi, pasien dengan malfungsi saluran gastrointestinal, pasien dengan gagal ginjal atau hati, dan lain-lain.

Gambar 11.2. merupakan salah satu contoh bentuk sediaan nutrisi parenteral di rumah sakit. Perlu dicatat bahwa dokter yang menulis resep dapat memilih formula standar atau modifikasi untuk pemakaian sentral atau perifer. Pemakaian sentral dimaksudkan pada pemberian melalui saluran yang dimasukkan ke dalam vena kava superior, sedangkan pemberian perifer adalah pemberian melalui saluran yang dimasukkan ke dalam vena pada lengan pasien (lihat gambar 11.1). Oleh karena larutan dekstrosa pekat bersifat hipertonik dan dapat mengakibatkan kerusakan vena, maka jalur sentral lebih disukai dibandingkan dengan jalur perifer untuk pemberian dekstrose konsentrasi tinggi (misalnya 25%). Formula nutrisi untuk nutrisi parenteral perifer umumnya bersifat isotonik atau hampir isotonik.

Formula nutrisi parenteral terdiri dari :

- a. Makronutrien:
 - Karbohidrat (mis; dekstrosa)
 - Protein (mis; asam amino)
 - Lemak (mis; emulsi lipid)
- b. Mikronutrien:
 - Elektrolit
 - Vitamin
 - Unsur mineral.
- c. Aqua pro injeksi

Formula nutrisi parenteral dapat diperoleh secara komersial atau dibuat di apotek dengan menggunakan alat pencampur otomatis. Kebutuhan nutrisi dan komposisi formulasi bervariasi berdasarkan

umur pasien (neonatus, pediatrik, adult) sebagaimana dengan pasien penderita penyakit tertentu (ginjal, hati, dan paru-paru). Dalam pembuatan formula untuk nutrisi parenteral, seorang farmasis menggunakan perhitungan jumlah parenteral volume kecil (ampul dan vial) sebagai sumber elektrolit, vitamin dan mineral. Juga parenteral volume besar (LVPs) sebagai sumber asam amino, dekstrosa, dan aqua steril untuk injeksi.

Laju infus secara khas dimulai dari 25 sampai 50 mL perjam dan disesuaikan setiap 8–12 jam sesuai dengan kondisi pasien dan status cairan dan nutrisi pasien. Larutan TPN dapat diberikan secara kontinyu selama periode 24 jam atau secara siklus, tergantung kebutuhan pasien. Infus dapat diberikan secara aliran gravitasi atau melalui penggunaan alat pompa otomatis.

STANDARD CENTRAL LINE FORMULA	STANDARD PERIPHERAL LINE FORMULA	STANDARD HEMAL CENTRAL LINE FORMULA
Standard <input type="checkbox"/> Modified <input type="checkbox"/>	Standard <input type="checkbox"/> Modified <input type="checkbox"/>	Standard <input type="checkbox"/> Modified <input type="checkbox"/>
Amino Acid 4.25% _____%	Amino Acid 2.75% _____%	Amino Acid 1.95% _____%
Dextrose 25% _____%	Dextrose 10% _____%	Dextrose 44% _____%
Rate _____ mL/hr	Rate _____ mL/hr	Rate _____ mL/hr
Electrolytes (per liter)	Electrolytes (per liter)	Electrolytes (per liter)
Standard <input type="checkbox"/> Modified <input type="checkbox"/>	Standard <input type="checkbox"/> Modified <input type="checkbox"/>	Standard <input type="checkbox"/> Modified <input type="checkbox"/>
Na 35 mEq _____ mEq	Na 35 mEq _____ mEq	Na 0 mEq _____ mEq
K 30 mEq _____ mEq	K 30 mEq _____ mEq	K 0 mEq _____ mEq
Mg 5 mEq _____ mEq	Mg 5 mEq _____ mEq	Mg 0 mEq _____ mEq
Ca 3 mEq _____ mEq	Ca 3 mEq _____ mEq	Ca 0 mEq _____ mEq
P 15 mM _____ mM	P 15 mM _____ mM	P 0 mM _____ mM
Acetate Cl = 1:1	Acetate Cl = 1:1	
Each bag contains the standard amount of multi-vitamins and trace elements.	Each bag contains the standard amount of multi-vitamins and trace elements.	Check if you wish to add the standard amount of trace elements and multivitamins.
Additional ingredients (per liter)	Additional ingredients (per liter)	Trace Elements _____
Standard <input type="checkbox"/> Modified <input type="checkbox"/>		Multivitamins _____
_____ Cimetidine 600 mg/24 hr OR _____ mg/24 hr		Additional ingredients (per liter)
_____ Ranitidine 150 mg/24 hr OR _____ mg/24 hr		_____
_____ Hog Insulin _____ units/L		_____
_____ Other: _____		_____
Intravenous Fat 10% 500 mL (1.1 kcal/mL) _____ (rate)		NOTE: Standing physician's orders for line management and patient monitoring of parenteral hyperalimentation will be followed unless initiated here.
Intravenous Fat 20% 500 mL (2 kcal/mL) _____ (rate)		
Date: _____ MD _____		

Gambar 11.2 contoh label formula nutrisi parenteral

D. Kebutuhan Nutrisi

Kebutuhan nutrisi adalah jumlah makronutrien dan mikronutrien yang dibutuhkan oleh pasien untuk memperoleh atau mempertahankan status nutrisi yang diinginkan. Jumlah dari cairan dan nutrisi khusus yang diinginkan dapat bervariasi sesuai dengan umur, jenis kelamin, parameter fisika, kondisi penyakit, dan status nutrisi.

Kebutuhan Cairan

Suatu faktor 30 mL/kgberat badan, 1500 mL permeter luas permukaan tubuh, atau 1 mL/kkal dari nutrisi yang dibutuhkan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan kebutuhan air atau cairan harian pasien. Pada kasus tertentu, nilai ini dapat meningkat pada pasien dehidrasi, atau bahkan menurun pada pasien yang mengalami gagal ginjal dan gagal jantung kognitif. Kebutuhan harian cairan untuk dewasa adalah antara dua sampai tiga liter perhari. Untuk neonatus, bayi, anak-anak, dan remaja tanpa kehilangan air abnormal, kisaran kebutuhan cairan hariannya dapat dihitung dengan cara:

Parameter

Berdasarkan umur:

Neonatus

1-12 bulan

Berdasarkan Berat Badan

< 10 kg

10 – 20 kg

>20 kg

Berdasarkan Luas Permukaan Tubuh

$m^2 = 1500 \text{ mL/hari}/m^2$

Berdasarkan kebutuhan kalori

$1,2 \text{ mL/Kkal} \times \text{Kkal/hari}$

Kebutuhan Cairan

120-180 mL/kg/hari

150 mL/kg/hari (maks 200 mL)

100 mL/kg/hari

1000 mL + 50 mL/kg/hari (>10kg)

1500mL + 20mL/kg/hari (>20kg)

___ mL/hari

___ mL/hari

Kebutuhan Kalori

Kilokalori = *kilocalorie* (Kcal) adalah satuan yang digunakan dalam kajian metabolisme. Kilokalori adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur dari 1 kg air 1°C. Kebutuhan kalori setiap pasien bervariasi, tergantung kepada kondisi fisik dan medisnya. **Persamaan Harris-Benedict** berikut ini dapat

digunakan untuk memperkirakan kebutuhan *basal energy expenditure* (BEE) untuk kalori nonprotein. BEE juga disebut sebagai *resting metabolic energy* (RME) atau *resting energy expenditure* (REE).

Laki-laki:

$$BEE = 66,67 + [13,75 \times \text{kg BB}] + [5 \times \text{cm tinggi badan}] - [6,76 \times \text{thn umur}]$$

Wanita:

$$BEE = 655,1 + [9,56 \times \text{kg BB}] + [1,86 \times \text{cm tinggi badan}] - [4,68 \times \text{thn umur}]$$

Total daily expenditure (TDE) energi yang dihitung dapat disesuaikan dengan aktivitas dan faktor stress pasien.

$$BEE \times \text{faktor aktivitas} \times \text{faktor stres} = TDE$$

Faktor aktivitas	: rawat inap	: 1,2
	Rawat jalan	: 1,3
Faktor stres	: pembedahan	: 1,2
	Infeksi	: 1,4 – 1,6
	Trauma	: 1,3 – 1,5
	Luka bakar	: 1,5 – 2,1

Sebagai alternatif terhadap penggunaan persamaan Harris-Benedict, seorang klinisi dapat mengestimasi BEE untuk dewasa 25 kkal/kg/hari untuk pasien rawat inap dengan faktor stres sedang, hingga 35 kkal/kg/hari untuk pasien dengan tingkat stres moderat dan 45 kkal/kg/hari untuk pasien pasca pembedahan, bahkan hingga 60 kkal/kg/hari bagi pasien hiperkatabolisis. Kebutuhan energi untuk bayi, anak-anak, dan remaja berbeda dengan kebutuhan energi dewasa dan bervariasi berdasarkan umur, laju pertumbuhan dan status klinik atau status metabolisme. Kebutuhan kalori untuk bayi adalah sekitar 100 kkal/kg/hari, untuk anak-anak 80–100 kkal/kg/hari dan untuk remaja 60 kkal/kg/hari.

Kebutuhan Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi selular yang utama. Dalam formula nutrisi parenteral, dekstrosa menyumbangkan energi sebanyak 3,4 kkal per gramnya; misalnya setiap 100 mL injeksi dekstrosa 25% menyediakan 85 kkal energi. Untuk nutrisi enteral, faktor yang digunakan adalah 4 kkal/g.

Kebutuhan Protein

Dalam TPN, protein terdapat sebagai protein hidrolisat atau asam amino. Fungsi dari protein adalah sebagai sumber energi pembantu, meskipun protein menghasilkan energi dengan faktor 4 kcal/g, fungsi utama dari protein adalah untuk pembentukan jaringan dan kekuatan tubuh. Seorang pasien yang membutuhkan kalori harus asupan kalori nonprotein. Jumlah kebutuhan harian protein pada orang dewasa secara umum dapat diperkirakan sebagai berikut:

- Pasien tidak stres, 0,8 g/kg/hari
- Pasien dengan stres menengah, 0,8 – 1 g/kg bb
- Pasien dialisis ginjal, 1,2 g/kg
- Pasien dengan stres moderat, 1,1 – 1,5 g/kg
- Pasien dengan stres dan penyakit kritis atau trauma, 1,5 – 2 g/kg
- Pasien luka bakar, 3 g/kg

Bayi membutuhkan protein sebanyak 2-3 g/kg/hari, anak-anak 1,5-2 g/kg/hari dan remaja 1-1,5 g/kg/hari.

Kebutuhan Lemak

Lipid dapat digunakan untuk memperoleh energi ketika tubuh tidak dapat memperoleh seluruh kebutuhan energi dari karbohidrat. Jumlah kalori yang dihasilkan oleh lipid terbatas pada 30% - 40% dari total kalori harian. Lipid menghasilkan 9 kcal energi setiap gramnya. Lipid umumnya diberikan dalam bentuk emulsi yang mengandung bahan pengemulsi berbasis karbohidrat, yang juga berkontribusi karena kandungan kalornya. Telah ditetapkan bahwa emulsi lipid 10% menghasilkan 11 kcal/g dari energi total, dan emulsi lipida 20 – 30% menghasilkan 10 kcal/g dari energi total.

Kebutuhan Serat

Pedoman diet umumnya merekomendasikan asupan harian untuk serat adalah 14 g serat setiap 1000 kalori yang dikonsumsi. Hal ini berarti sekitar 21-25 g serat harian bagi wanita dan antara 20 -80 g bagi pria. Serat tak larut dapat mencapai usus besar setelah dicerna dan ini berhubungan dengan fungsi defekasi yang baik, sedangkan serat larut secara parsial akan terlarut pada bagian gastrointestinal bagian atas dan hal ini berkaitan dengan penurunan absorpsi lemak dan kolesterol.

Mikronutrien

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 11.2, jumlah standar dari elektrolit dapat digunakan sebagai nutrisi parenteral atau dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Perhitungan nutrisi enteral dan parenteral.

Kebutuhan nutrisi untuk pria 76 tahun dengan tinggi badan 6 ft.2in dan berat badan 201 lb, ditentukan sebagai berikut:

Protein : 73,09 g/hari

Lipida : 81,23 g/hari

Karbohidrat : 266,34 g/hari

Air : 2088,82 – 2740,91 mL/hari

ENSUREliquid merupakan pilihan untuk nutrisi enteral untuk pasien ini. Satu quart berisi 37 g protein, 143 g karbohidrat, 37 g lipd dan 1,06 kcal/mL.

1. Berapa milliliter *ENSURE* yang diberikan kepada pasien setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan kalorinya?

Jawab:

$$\frac{2088,82 \text{ kcal}}{1 \text{ hari}} \times \frac{1 \text{ mL}}{1,06 \text{ kcal}} = 1970,58 \frac{\text{mL}}{\text{hari}}$$

2. Berapa gram protein, karbohidrat, dan lipida yang terdapat dalam volume tersebut?

Jawab:

$$\text{Protein} = \frac{1970,58 \text{ mL}}{1 \text{ hari}} \times \frac{1 \text{ qt}}{946 \text{ mL}} \times \frac{37 \text{ g}}{1 \text{ qt}} = 77,07 \text{ g/hari}$$

$$\text{karbohidrat} = \frac{1970,58 \text{ mL}}{1 \text{ hari}} \times \frac{1 \text{ qt}}{946 \text{ mL}} \times \frac{143 \text{ g}}{1 \text{ qt}} = 297,88 \text{ g/hari}$$

$$\text{Lipida} = \frac{1970,58 \text{ mL}}{1 \text{ hari}} \times \frac{1 \text{ qt}}{946 \text{ mL}} \times \frac{37 \text{ g}}{1 \text{ qt}} = 77,07 \text{ g/hari}$$

3. Jika produk mengandung 85% air, apakah ini memenuhi kebutuhan air harian dari pasien?

Jawab:

$$1970,58 \text{ mL/hari} \times 85\% = 1675 \text{ mL/hari}$$

- Jumlah air yang terdapat dalam 1970,58 ml dari formula tersebut tidak memenuhi kebutuhan air harian pasien.
4. Jika formula tersebut diberikan secara kontinu selama 24 jam, berapa laju alirnya dalam mL/jam?

Jawab:

$$\frac{1970,58 \text{ mL}}{1 \text{ hari}} \times \frac{1 \text{ hari}}{24 \text{ jam}} = 82,11 \text{ mL/jam}$$

5. Jika pasien melanjutkan pemakaian formula ini di rumah dengan cara *intermittent feeding* selama 40 menit setiap 4 jam, berapa volume yang akan diberikan setiap kali, dan berapa laju alir dalam mL/jam?

Jawab:

$$\frac{1970,58 \text{ mL}}{1 \text{ hari}} \times \frac{1 \text{ hari}}{24 \text{ jam}} \times \frac{4 \text{ jam}}{1 \text{ dosis}} = 328,43 \text{ mL/dosis}$$

$$\frac{328,43 \text{ mL}}{40 \text{ menit}} \times \frac{60 \text{ menit}}{1 \text{ jam}} = 492,65 \frac{\text{mL}}{\text{jam}} \approx 493 \text{ mL/jam}$$

Contoh Perhitungan Nutrisi Parenteral

Langkah-langkah dasar berikut ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam perhitungan TPN.

Langkah 1. Hitunglah kebutuhan kalori harian dengan menggunakan persamaan Harris-Benedict, dan gunakan faktor stres atau faktor aktivitas.

Langkah 2. Hitunglah jumlah (g) kebutuhan harian asam amino (protein) berdasarkan 0,8 g/kg berat badan, dan sesuaikan kebutuhan dengan faktor stres dan kondisi penyakit tertentu.

Langkah 3. Hitunglah jumlah kalori yang diperoleh dari asam amino (dari langkah 2) pada 4 kcal/g.

Langkah 4. Hitunglah kcal dari kebutuhan lipid pada 30% -40% dari total kalori harian.

Langkah 5. Hitunglah gram kebutuhan lipid (dari langkah 4) berdasarkan 9 kcal/g atau berdasarkan emulsi lipid yang digunakan (sebagaimana dijelaskan pada bagian "kebutuhan lipid" sebelumnya).

Langkah 6. Hitunglah jumlah kebutuhan karbohidrat berdasarkan 3,4 kcal/g setelah menghitung kontribusi lipid.

Langkah 7. Hitunglah kebutuhan cairan harian dengan menggunakan 30 mL/kg/hari atau salah satu dari metode yang telah dijelaskan.

Catatan: dalam beberapa praktek klinik (a) berat badan pasien, berat badan ideal, atau berat badan rata-rata dapat digunakan dalam perhitungan (dalam langkah 1) dan (b) dalam langkah 6, energi yang dihasilkan protein dan juga dari lipid, boleh atau tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Selain langkah 1 sampai langkah 7 tersebut di atas, perhitungan TPN juga meliputi:

- Penentuan jumlah obat yang berfungsi sebagai sumber makronutrien (misalnya vial) dan mikronutrien (LVPs);
- Penentuan total volume TPN, jumlah TPN yang akan dibuat dan laju alirnya.

1. Hitunglah kebutuhan cairan dan nutrisi parenteral dan untuk seorang wanita 58 tahun dengan tinggi badan 5 ft.3 in dan berat badan 140 lb, dengan asumsi bahwa wanita tersebut tidak mengidap suatu penyakit tertentu yang dapat mempengaruhi kebutuhan nutrisinya.

Jawab:

Langkah 1. Kebutuhan total kalori harian berdasarkan persamaan Harris-Benedict:

$$655,1 + (9,56 \times 63,63 \text{ kg}) + (1,86 \times 160 \text{ cm}) - (4,68 \times 58 \text{ th}) = 1289,62 \text{ kcl}$$

Langkah 2. Kebutuhan protein (gram)

$$140 \text{ lb} \times \frac{1 \text{ kg}}{2,2 \text{ lb}} \times \frac{0,8 \text{ g}}{1 \text{ kg/hari}} = 50,91 \text{ g/hari}$$

Langkah 3. Protein (Kcal):

$$\frac{50,91 \text{ g}}{1 \text{ hri}} \times \frac{4 \text{ kcal}}{1 \text{ g}} = 203,64 \text{ kcal/hari}$$

Langkah 4. Kebutuhan lipid (kcal) menggunakan 35% dari total kalori harian:

$$12889,62 \text{ kcal/hari (total)} \times 35\% = 451,37 \text{ kcal/hari}$$

Langkah 5. Kebutuhan lipid (gram) dari emulsi lipid 10%:

$$\frac{451,37 \text{ kcl}}{1 \text{ hari}} \times \frac{1 \text{ g}}{11 \text{ kcal}} = 41,03 \text{ g/hari}$$

Langkah 6. Kebutuhan karbohidrat/dekstrosa (g), dihitung dari kcal protein dan lipid.

$$1289,62 \text{ kcal/hari} - 203,64 \text{ kcal/hari (protein)} - 451,37 \text{ kcal/hari (lipid)}$$

$$= 634,61 \text{ kcal/hari}$$

$$\frac{634,61 \text{ kcal}}{1 \text{ hari}} \times \frac{1 \text{ g}}{3,4 \text{ kcal}} = 186,65 \text{ g/hari}$$

Langkah 7. Kebutuhan cairan (milliliter):

Berdasarkan 30 mL/kg/hari:

$$140 \text{ lb.} \times \frac{1 \text{ kg}}{2,2 \text{ lb}} \times \frac{30 \text{ mL}}{1 \text{ kg/hari}} = 1909,09 \text{ mL/hari}$$

Berdasarkan 1 mL/kcal kebutuhan perhari:

$$\frac{1289,62 \text{ kcal}}{1 \text{ hari}} \times \frac{1 \text{ mL}}{1 \text{ kcal}} = 1289,62 \text{ mL/hari}$$

Jadi, pasien tersebut harus menerima 50,91 g protein, 41,03 g lipid, 186,65 g dekstrose, dan antara 1289,62 dan 1909,09 mL cairan perhari.

2. Dengan menggunakan persamaan Harris-Benedict, hitunglah kebutuhan kalori untuk seorang wanita 56 tahun dengan kondisi stress rendah dengan berat badan 121 lb. dan tinggi 5 ft 3 in.

Jawab:

$$121 \text{ lb.} = 55 \text{ kg}$$

$$5 \text{ ft.} 3 \text{ in.} = 63 \text{ in.} = 160 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{BEE} &= 655,1 + (9,56 \times 55) + (1,86 \times 160) - (4,68 \times 56) \\ &= 655,1 + (525,8) + (297,6) - (262) \\ &= 1216,5 \text{ kcal} \end{aligned}$$

Dengan faktor rata-rata 1,3 untuk pasien dengan stres rendah:

$$1216,5 \times 1,3 = 1581,45 \text{ kcal.}$$

3. Hitunglah kebutuhan protein harian untuk seorang pasien dengan berat badan 55 kg berdasarkan 0,8 g/kg dan nilai kalori 4 kcal/g protein.

Jawab:

$$55 \text{ kg} \times 0,8 \text{ g/kg}$$

$$44 \text{ g} \times 4 \text{ kcal/g}$$

$$= 44 \text{ g protein, dan}$$
$$= 176 \text{ kcal.}$$

4. Dari contoh sebelumnya, hitunglah milliliter larutan dekstrosa 50% (170 kcal/dL) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kilokalori.

Jawab:

$$\text{Total kebutuhan kcal} = 1581,45$$

$$\text{Kcal dari protein} = 176$$

$$\text{Kebutuhan kcal tambahan} = 1405,45 (1581,45 - 176)$$

$$\frac{1405 \text{ kcal}}{170 \text{ kcal}} = \frac{x \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$
$$x = 826,7 \text{ mL}$$

5. Berikut ini adalah formula untuk larutan nutrisi parenteral. Menggunakan sumber masing-masing obat sebagaimana yang ditunjukkan, hitunglah jumlah setiap komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan larutan.

Formula	Sumber komponen
a. Natrium klorida 35 mEq	Vial 5 mEq per 2 mL
b. Kalium asetat 35 Eq	Vial, 10 mEq per 5 mL
c. Magnesium sulfat 8 mEq	Vial, 4 mEq per mL
d. Kalsium glukonat 9,6 mEq	Vial, 4,7 mEq per 10 mL
e. Kalium klorida 5 mEq	Vial, 40 mEq per 20 mL
f. Asam folat 1,7 mg	Ampul, 5 mg per mL
g. Multivitamin infus 10 mL	Ampul, 10 mL

Yang akan ditambahkan ke dalam
Asam AminoInfusion(8,5%) 500mL
DextroseInjection(50%) 500mL

Jawab:

$$a) \frac{5 \text{ mEq}}{35 \text{ mEq}} = \frac{2 \text{ mL}}{x \text{ mL}}, \rightarrow x = 14 \text{ mL}$$

$$b) \frac{10 \text{ mEq}}{35 \text{ mEq}} = \frac{5 \text{ mL}}{x \text{ mL}}, \rightarrow x = 17,5 \text{ mL}$$

- c) $\frac{4 \text{ mEq}}{8 \text{ mEq}} = \frac{1 \text{ mL}}{x \text{ mL}}, \rightarrow x = 2 \text{ mL}$
d) $\frac{4,7 \text{ mEq}}{9,6 \text{ mEq}} = \frac{10 \text{ mL}}{x \text{ mL}}, \rightarrow x = 20,4 \text{ mL}$
e) $\frac{40 \text{ mEq}}{5 \text{ mEq}} = \frac{20 \text{ mL}}{x \text{ mL}}, \rightarrow x = 2,5 \text{ mL}$
f) $\frac{5 \text{ mg}}{1,7 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ mL}}{x \text{ mL}}, \rightarrow x = 03,4 \text{ mL}$
g) 10 mL

6. Formula untuk larutan TPN terdiri dari penambahan 2,7mEq Ca⁺⁺ dan 20 mEqK⁺per liter. Berapa milliliter injeksi yang mengandung 20mg kalsium kloridaper milliliter dan berapa milliliter kali umklorida injeksi15% (b/v) harus digunakan untuk memberikan zat tambahan yang diinginkan ?

Jawab:

Berat molekul CaCl₂. 2H₂O = 147

Berat molekul KCl = 74,5

1 mEq Ca⁺⁺ = 20 mg

2,7 mEq Ca⁺⁺ = 20 mg x 2,7 = 54 mg

54mgCa⁺⁺dipenuhi oleh198,45atau198mg kalsiumklorida

Karena injeksi mengandung 20 mg kalsium klorida per mL, maka
 $198 \div 20 = 9,9 \text{ mL}$, dan

1 mEq K⁺ = 39 mg

20 mEq K⁺ = 39 mg x 20 = 780 mg

780 mg K⁺ dipenuhi oleh 1,49 g kalium klorida

Larutan 15% b/v mengandung 15 g kalium klorida per 100 mL, maka:

$$\frac{15 \text{ g}}{1,49 \text{ g}} = \frac{100 \text{ mL}}{x \text{ mL}}, \rightarrow x = 9,9 \text{ mL}$$

7. Sebuah injeksi kalium fosfat mengandung campuran 224 mg kalium fosfat monobasa (KH₂PO₄) dan 236 mg kalium fosfat dibasa (K₂HPO₄) per mililiter. Jika 10 m Linjeksi ditambahkan ke 500 mLD5W(5% dextrose dalam air untuk injeksi),
(a) berapa banyak miliekuivalen K?, dan
(b) berapa banyak milimol total fosfat terdapat dalam larutan yang disiapkan?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Berat molekul KH}_2\text{PO}_4 &= 136 \\ 1 \text{ mmol KH}_2\text{PO}_4 &= 136 \text{ mg} \end{aligned}$$

10 mL injeksi mengandung 2240 mg KH₂PO₄
Dan dengan demikian memberikan $2240 \div 136 = 16,4$ atau 16 mmol KH₂PO₄ atau 16 mmol H₂PO₄⁻

$$\begin{aligned} \text{Berat molekul K}_2\text{HPO}_4 &= 174 \\ 1 \text{ mmol K}_2\text{HPO}_4 &= 174 \text{ mg} \end{aligned}$$

10 mL injeksi mengandung 2360 mg K₂HPO₄
dan dengan demikian memberikan $2360 \div 174 = 13,6$ atau 14 mmol K₂HPO₄ atau 14 (mmol) x 2 (K⁺) = 28 mmol K⁺, Dan 14 mmol HPO₄⁻, sehingga 10 mL injeksi menyediakan total: 44 mmol K⁺ atau (karena valensi K⁺ adalah 1) maka 44 mEq K⁺, dan 30 mmol total fosfat.

E. Indeks Massa Tubuh (BMI)

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, kelebihan berat badan membawa peningkatan risiko untuk sejumlah konsekuensi kesehatan. Namun, menjadi terlalu gemuk, atau obesitas, akan menjadi predisposisi seseorang untuk risiko yang lebih besar terhadap penyakit, komplikasi penyakit, dan mortalitas. Selain diet, faktor lain yang dapat mengakibatkan obesitas meliputi perilaku, budaya, metabolisme, dan disposisi genetik.

Tahap awal dalam mengelolapatient kelebihan berat badan atau obesitas adalah penilaian dari derajat berat badan yang berlebihan. Saat ini, indeks massa tubuh (BMI) telah diterima sebagai standar klinis untuk menilai berat badan berlebihan dan obesitas. BMI didefinisikan sebagai berat badan dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan yang diukur dalam satuan meter. Menurut National Institutes of Health (NIH), individu dengan BMI:

- kurang dari 18,5 dapat dianggap *underweight* (berat badan rendah);
- antara 18,5 dan 24,9 dapat dianggap berat badan normal;
- antara 25 dan 29,9 dianggap kelebihan berat badan;
- 30 dan di atas dianggap obesitas;
- lebih dari 40 dianggap sangat gemuk.

Untuk orang tua, BMI kurang dari 21 dapat menjadi tanda malnutrition. BMI pada kebanyakan orang merupakan indikator lemak tubuh yang tinggi (ini mungkin tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang sangat berotot). Selain BMI, NIH juga mempertimbangkan lingkar pinggang sebagai faktor penting dalam *obesity related disease* (penyakit terkait obesitas). Lingkar pinggang yang lebih dari 40 inci pada pria dan lebih dari 35 inci pada wanita mengindikasikan peningkatan risiko penyakit terkait obesitas pada orang yang memiliki BMI 25 sampai 35. Strategi untuk mengobati pasien kelebihan berat badan dan obesitas termasuk terapi diet, aktivitas fisik, terapi perilaku, farmako terapi, dan dalam kasus obesitas ekstrim, diperlukan operasi penurunan berat badan.

Perhitungan Terkait BMI

Menentukan BMI dari Tabel Standar

BMI dapat ditentukan dengan menggunakan tabel standar seperti yang diperlihatkan pada Tabel 11.1, di mana intersep tinggi dan berat badan seseorang menunjukkan indeks massa tubuh. Banyak tabel standar tersedia dalam sistem satuan umum pengukuran (yaitu, kaki/inci dan pon) untuk memfasilitasi kemudahan penggunaan oleh masyarakat umum. Sedangkan yang lainnya tersedia dalam skala metrik atau dual skala.

Contoh:

1. Dengan menggunakan Tabel 11.1, tentukan BMI untuk orang dengan tinggi badan 5ft 8 in dan berat 160 lb.

Jawab

Intersep dari 5ft 8 in dan 160 lb. Menunjukkan BMI 24.

2. Dengan menggunakan Tabel 11.1, tentukan BMI untuk orang dengan tinggi 183 cm dan berat 82 kg.

Jawab:

$$\frac{2,54 \text{ cm}}{183 \text{ cm}} = \frac{1 \text{ in}}{x \text{ in}} = 72 \text{ in}$$

$$\frac{1 \text{ kg}}{2,2 \text{ lb}} = \frac{82 \text{ kg}}{x \text{ lb}} = 180 \text{ lb.}$$

Kemudian, pada Tabel 11.1, intersepdaritinggi72in, atau 6ftdan180 lb, menunjukkanBMI24.

Tabel 11.1. Penentuan indeks massa tubuh

HEIGHT	WEIGHT																			
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250				
5'0"	20	21	23	25	27	28	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49				
5'1"	19	21	23	25	26	28	30	32	34	36	38	40	42	43	45	47				
5'2"	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	38	40	42	44	46				
5'3"	18	19	21	23	25	27	28	30	32	34	35	37	39	41	43	44				
5'4"	17	19	21	22	24	26	27	29	31	33	34	36	38	40	42	44				
5'5"	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	35	37	39	41	43				
5'6"	16	18	19	21	23	24	26	27	29	31	32	34	36	38	40	42				
5'7"	16	17	19	20	22	23	25	27	28	30	31	33	34	36	37	39				
5'8"	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	31	33	34	36	38				
5'9"	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	32	33	35	36	38				
5'10"	14	16	17	19	20	22	23	24	26	27	28	30	31	32	34	35				
5'11"	14	15	17	18	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32	33	34				
6'0"	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27	28	30	32	33	35				
6'1"	13	15	16	17	18	20	21	22	24	25	26	28	30	31	33	34				
6'2"	13	14	15	17	18	19	21	22	23	24	26	26	28	30	32	33				
6'3"	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	27	29	30	32				
6'4"	12	13	15	16	17	18	19	21	22	23	24	26	27	28	29	30				

BMI Interpretation

- Underweight: under 18.5
- Normal: 18.5–24.9
- Overweight: 25–29.9
- Obese: 30 and over

Menentukan BMI dengan Perhitungan

Jikatinggi dan berat badanseseorangberada di luarjangkauantabelBMI, atau jikatabelBMItidak tersedia,maka BMI dapat ditentukandengan rumus:

$$BMI = \frac{\text{beratkg}}{\text{tinggi m}^2}$$

Contoh:

1. Hitunglah BMI seseorang dengan tinggi 4 ft.11in, dan berat badan 98 lb.

Jawab:

$$\frac{2,2 \text{ lb}}{98 \text{ lb}} = \frac{1 \text{ kg}}{x \text{ kg}} ; x = 44,5 \text{ kg}$$

$$\frac{39,37 \text{ in}}{59 \text{ in}} = \frac{1 \text{ m}}{x \text{ m}} ; x = 1,5 \text{ m}$$

$$\frac{44,5 \text{ kg}}{1,5 \text{ m} \times 1,5 \text{ m}} = \frac{44,5 \text{ kg}}{2,25 \text{ m}^2} = 19,8 \text{ BMI}$$

2. Hitunglah BMI seseorang dengan tinggi 6 ft.0 in, berat 182 lb.
Jawab:

$$\frac{2,2 \text{ lb}}{182 \text{ lb}} = \frac{1 \text{ kg}}{x \text{ kg}} ; x = 82,7 \text{ kg}$$

$$\frac{39,37 \text{ in}}{72 \text{ in}} = \frac{x \text{ m}}{1,83 \text{ m}} ; x = 1,83 \text{ m}$$

$$\frac{82,7 \text{ kg}}{1,83 \text{ m} \times 1,83 \text{ m}} = \frac{82,7 \text{ kg}}{3,35 \text{ m}^2} = 24,7 \text{ BMI}$$

Catatan: Dalam perhitungan ini, pound dapat dikalikan dengan 0.454 untuk mendapatkan kilogram, dan inci dapat dikalikan dengan 0,0254 untuk mendapatkan meter.

Rumus alternatif untuk perhitungan BMI
BMI dapat dihitung dengan rumus:

$$BMI = \frac{\text{berat (lb.)}}{\text{tinggi (m)}^2} \times 704,5$$

Catatan: Faktor 704,5, digunakan oleh National Institutes of Health, diperoleh dengan membagi 39.37 persegi (in/m) dengan 2,2(lb/kg.).

Contoh:

1. Hitunglah BMI dari seseorang dengan berat badan 182 lb. dan tinggi 72 in.

Jawab:

$$\frac{182 \text{ lb}}{(72 \text{ in})^2} = \frac{182 \text{ lb.}}{5148 \text{ in.}} \times 704,5 = 24,7 \text{ BMI}$$

Seorang awam mungkin diminta untuk menentukan BMI dengan mengalikan berat badan dalam kilogram dengan 704,5

(atau untuk kemudahan, dibulatkan menjadi 700), membagi hasilnya dengan tinggi badan, dalam inci, dan kemudian membagi hasilnya lagi dengan tinggi dalam inci. Menggunakan contoh masalah di atas:

$$182 \text{ lb.} \times 700 \div 72 \text{ in.} \div 72 \text{ in.} = 24,6$$

F. Label Nutrisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ditetapkan bahwa sejumlah informasi tertentu merupakan keterangan minimal yang wajib dicantumkan pada setiap label pangan misalnya nama produk, berat bersih, nama dan alamat perusahaan dan lain-lain. Namun terdapat informasi lain yang dapat dicantumkan secara sukarela atau dapat menjadi wajib pada pangan tertentu, salah satunya adalah informasi nilai gizi.

Pencantuman label pada barang pengaturannya dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang (Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009). Sedangkan pengaturan mengenai label pangan diatur dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (UU Pangan) yang menggariskan bahwa label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. keterangan tentang halal;
- f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Nutrition Facts	
Serving Size 1 cup (228g)	
Servings Per Container 2	
Amount Per Serving	
Calories 200	Calories from Fat 120
% Daily Value*	
Total Fat 13g	20%
Saturated Fat 5g	25%
Trans Fat 2g	
Cholesterol 30mg	10%
Sodium 660mg	28%
Total Carbohydrate 31g	10%
Dietary Fiber 0g	0%
Sugars 5g	
Protein 5g	
Vitamin A	4%
Vitamin C	2%
Calcium	15%
Iron	4%
* Percent Daily Values are based on a diet of other people's secrets.	
	Calories: 2,000 2,500
Total Fat	Less than 65g 80g
Sat Fat	Less than 20g 25g
Cholesterol	Less than 300mg 300mg
Sodium	Less than 2,400mg 2,400mg
Total Carbohydrate	300g 375g
Dietary Fiber	25g 30g
Calories per gram	
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4	

Gambar 11.3. Contoh label nutrisi / fakta nutrisi produk makanan

Adapun Ketentuan Pencantuman Informasi Nilai Gizi adalah sebagai berikut :

1. Informasi yang wajib dicantumkan :

Takaran saji adalah jumlah produk pangan yang biasa dikonsumsi dalam satu kali makan, dinyatakan dalam ukuran rumah tangga yang sesuai untuk produk pangan tersebut. Ukuran rumah tangga meliputi antara lain sendok teh, sendok makan, sendok takar, gelas, botol, kaleng, sachet, dan lain-lain dan harus diikuti dengan jumlah dalam satuan metric (mg, g, ml).

Jumlah saji per kemasan menunjukkan jumlah takaran saji yang terdapat dalam satu kemasan pangan.

Catatan kaki merupakan informasi yang menerangkan bahwa persentase AKG yang ditunjukkan dalam Informasi Nilai Gizi

dihitung berdasarkan kebutuhan energy 2000 kkal. Catatan kaki tidak perlu dicantumkan untuk pangan yang ditujukan bagi anak berusia 6-24 bulan dan pangan yang ditujukan bagi anak berusia 2-5 tahun.

2. Zat gizi yang diwajibkan dicantumkan :
 - Energi total, dinyatakan dalam gram dan presentase AKG.
 - Lemak total, dinyatakan dalam gram dan presentase AKG.
 - Protein, dinyatakan dalam gram dan presentase AKG.
 - Karbohidrat total, dinyatakan dalam gram dan presentase AKG.
 - Kalori, dinyatakan dalam kkal

Menurut peraturan BPOM no HK.00.05.5.1142 tahun 2003 AKG untuk acuan pelabelan pangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

3. Zat gizi yang wajib dicantumkan dengan persyaratan tertentu. Sejumlah zat gizi wajib dicantumkan dalam Informasi Nilai Gizi berkenaan dengan beberapa kondisi berikut :
 - a. Produk pangan mengandung zat gizi tersebut dalam jumlah tertentu, atau
 - b. Zat gizi tersebut dipersyaratkan untuk ditambah atau difortifikasi pada pangan, atau
 - c. Pangan yang bersangkutan memuat klaim yang berkenaan dengan zat gizi tersebut.

Beberapa zat gizi tersebut antara lain : energi dari lemak, lemak jenuh, lemak trans, kolesterol, serat pangan, gula, vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi.

Tabel 11.2. Angka Kecukupan Gizi Untuk Acuan Pelabelan

NO	ZAT GIZI	AKG	KETERANGAN
		2000 kkal	
1	Energi	50 g	
2	Protein	55 g	
3	Lemak Total	20 g	
4	Lemak Jenuh	Kurang dari 300 mg	
5	Kolesterol	325 g	
6	Karbohidrat Total	25 g	
7	Serat makanan	600 RE	1 RE = 1 mg retinol
8	Vitamin A	7200 mg	1 RE = 12 mg karopten
9	Karoten Total	3600 mg	1 RE = 6 mg beta karoten
10	Beta Karoten	5,0 mg	
11	Vitamin D	10,0 mg	
12	Vitamin E	65 mg	
13	Vitamin K	1,2 mg	
14	Thiamin	1,3 mg	
15	Riboflavin	16 mg	
16	Niacin	1,3 mg	
17	Vitamin B6	400 mg	
18	Asam Folat	2,4 mg	
19	Vitamin B12	60 mg	
20	Vitamin C	3500 mg	
21	Kalium	Kurang dari 2400 mg	
22	Natrium	700 mg	
23	Kalsium	700 mg	
24	Fosfor	29 mg	
25	Besi	260 mg	
26	Magnesium	10,5 mg	
27	Zink	34 mg	
28	Selenium	130 mg	
29	Yodium		

Tabel 11.3. Acuan Pelabelan Bagi Bayi Dan Anak

**ANGKA KECUKUPAN GIZI UNTUK ACUAN PELABELAN PANGAN UMUM
DIPERUNTUKKAN BAGI BAYI/ANAK USIA 4 SAMPAI 24 BULAN**

NO	ZAT GIZI	AKG	KETERANGAN
1	Energi	950 kkal	
2	Protein	20 g	
3	Lemak Total	30 g	
4	Lemak Linoleat	3,0 g	
5	Karbonhidrat	150 g	
6	Vitamin A	400 RE	1 RE = 1 mg retinol
7	Karoten total	4800 mcg	1 RE = 12 mcg karoten
8	Beta Karoten	2400 mcg	1 RE = 6 mcg beta karoten
9	Vitamin D	5,0 mcg	
10	Vitamin E	5,0 mcg	
11	Vitamin K	10,0 mcg	
12	Thiamin	0,5 mg	
13	Ribofavin	0,5 mg	
14	Niacin	6,0 mg	
15	Vitamin B6	0,5 mg	
16	Asam Panthotemat	2,0 mg	
17	Asam Folat	160 mcg	
18	Vitamin B12	0,9 mcg	
19	Vitamin C	40 mg	
20	Kalium	700 mg	
21	Natrium	350 mg	
22	Kalsium	500 mg	
23	Fosfor	400 mg	
24	Besi	9,0 mg	
25	Magnesium	50 mg	
26	Zink	6,0 mg	
27	Selenium	15 mcg	
28	Yodium	100 mcg	

4. Zat gizi lain yang dapat dicantumkan (sukarela). Beberapa zat gizi tidak wajib dicantumkan dalam Informasi Nilai Gizi, namun jika akan dicantumkan, maka harus memenuhi ketentuan antara lain : energy dari lemak jenuh, AA, DHA, kalium, serat pangan larut, gula alcohol, karbohidrat lain, vitamin, mineral dan zat gizi lain.
5. Format Informasi Nilai Gizi pada label pangan meliputi antara lain bentuk, susunan informasi dan cara pencantuman.

Tabel 11.4. Acuan Pelabelan Bagi Anak

ANGKA KECUKUPAN GIZI UNTUK ACUAN PELABELAN PANGAN UMUM
DIPERUNTUKKAN BAGI ANAK USIA 2 SAMPAI 6 BULAN

NO	ZAT GIZI	AKG	KETERANGAN
1	Energi	1500 kkal	
2	Protein	24 g	
3	Lemak Total	45 g	
4	Lemak Linoleat	4,5 g	
5	Karbonhidrat	250 g	
6	Vitamin A	400 RE	1 RE = 1 mg retinol
7	Karoten total	4800 mg	1 RE = 12 mg karoten
8	Beta Karotan	2400 mg	1 RE = 6 mg beta karoten
9	Vitamin D	10,0 mg	
10	Vitamin E	5,0 mg	
11	Vitamin K	20,0 mg	
12	Thiamin	0,6 mg	
13	Riboflavin	0,6 mg	
14	Niacin	8,0 mg	
15	Vitamin B6	0,6 mg	
16	Asam Panthotenat	3,0 mg	
17	Asam Folat	200 mg	
18	Vitamin B12	1,0 mg	
19	Vitamin C	45 mg	
20	Kalium	900 mg	
21	Natrium	600 mg	
22	Kalsium	600 mg	
23	Fosfor	600 mg	
24	Besi	6,0 mg	
25	Magnesium	70 mg	
26	Zink	7,0 mg	
27	Selenium	20,0 mg	
28	Yodium	110 mg	

Ukuran Penyajian

Labelukuran penyajian mencerminkan jumlah yang umumnya dikonsumsi pada satu waktu dan ditunjukkan dalam unit biasa dalam rumah tangga (misalnya, 1 cangkir) dan dengan ukuran metrik yang sesuai (misalnya, 240g). Produk dengan ukuran diskret, seperti cookies, mencantumkan kedua satuan dan kesetaraan metrik, misalnya, "2cookies(26 g)." Porsiper wadah menunjukkan jumlah porsi dalam kemasan.

Kalori

Pada label nutrisi, jumlah kalori per saji dan jumlah kalori yang berasal dari merupakan informasi khusus yang penting untuk banyak konsumen. Kalori tinggi dan diet lemak tinggi terkait dengan

kelebihan berat badandan obesitas dan penyakit yang berhubungan dengan hal tersebut. Satu kalori (dieja dengan c kecil) adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhudara 1 g air 1°C. Satu kilokalori (kkal) sama dengan 1000 kalori. Kilokalori, atau Kalori (diejadengan C kapital), adalah satuan yang digunakan dalam kajian metabolisme dan nutrisi untuk menggambarkan energi yang disediakan oleh berbagai makanan. Meskipun Kalori adalah istilah yang tepat untuk asupan dan pengeluaran energi, namun istilah kalori yang paling sering digunakan. Jumlah kebutuhan kalori dapat dilihat pada tabel 11.5

Tabel 11.5 jumlah kebutuhan kalori

AGES	SEDENTARY ^b		MODERATELY ACTIVE ^c		ACTIVE ^d	
	FEMALE	MALE	FEMALE	MALE	FEMALE	MALE
2-3	1000	1000	1000-1400	1000-1400	1000-1400	1000-1400
4-8	1200	1400	1400-1600	1400-1600	1400-1800	1600-2000
9-13	1600	1800	1600-2000	1800-2200	1800-2200	2000-2600
14-18	1800	2200	2000	2400-2800	2400	2800-3200
19-30	2000	2400	2000-2200	2600-2800	2400	3000
31-50	1800	2200	2000	2400-2600	2200	2800-3000
51+	1600	2000	1800	2200-2400	2000-2200	2400-2800

Diadaptasi dari Dietary Guidelines for Americans, 2005. Available at: <http://www.health.gov/dietaryguidelines/>.

Lemak dan Kolesterol

Penambahan terbaru pada label nutrisi yang dibutuhkan adalah lemak trans. Seperti lemak jenuh, lemak trans membantu meningkatkan kadar low-density lipoprotein (LDL), yang disebut kolesterol jahat. Sumber utama dari lemak trans adalah minyak sayur yang terhidrogenasi sebagian atau seluruhnya, ditemukan dalam shortening nabati dan margarin. Lemak trans terbentuk ketika hidrogen ditambahkan ke dalam minyak sayur melalui proses hidrogenasi, dihasilkan dalam proses solidifikasi produk untuk meningkatkan *shelf life* (umur simpan) dan stabilitas rasanya. Lemak trans juga banyak ditemukan secara alami dalam daging dan produk susu.

Saat ini, nilai persen harian untuk lemak trans belum ditetapkan secara ilmiah dan dengan demikian jumlah kuantitatif bukan merupakan bagian dari label nutrisi. Mengonsumsi terlalu

banyak lemak, lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol dapat meningkatkan risiko penyakit kronis tertentu, seperti penyakit jantung. Pedoman kesehatan yang baik menunjukkan bahwa total lemak harian yang dikonsumsi harus kurang dari 65 g, lemak jenuh kurang dari 20 g, dan kolesterol kurang dari 300mg.

Natrium dan Kalium

Natrium adalah elektrolit yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, keseimbangan osmotik, keseimbangan asam-basa, pengaturan volume plasma, impuls saraf, dan kontraksi otot. The kebutuhan fisiologis minimum untuk natrium adalah sekitar 500 mg per hari. Terlalu banyak natrium dalam diet dikaitkan dengan kondisi kronis tertentu seperti edema, kegagalan jantung kongestif, dan hipertensi. Sedangkan label nutrisi menunjukkan asupan harian yang dapat diterima adalah 2.400 mg untuk natrium, dan jumlah yang disarankan untuk orang-orang pada diet natrium dibatasi mungkin 1.500 mg atau kurang.

Kalium sangat penting untuk fungsi yang tepat dari semua sel-sel tubuh, jaringan dan organ dan terdapat pada beberapa label nutrisi. Kekurangan kalium dapat terjadi selama muntah yang parah, diare berkepanjangan, dan beberapa gangguan metabolisme, atau sebagai akibat dari asupan diuretika atau obat tertentu lainnya. Peningkatan kadar kalium dapat mengakibatkan pengurangan fungsi ginjal. Peningkatan kadar kalium ini dapat diakibatkan oleh obat tertentu, seperti diuretik hemat kalium. Untuk orang dewasa, direkomendasikan asupan kalium harian adalah 4,7 g/hari. Sedangkan untuk bayi (0,4-0,7g/hari) dan anak-anak (3-4,5 g/hari).

Karbohidrat Total

Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar yang dibutuhkan untuk kegiatan fisik dan fungsi yang tepat dari sistem pencernaan. Karbohidrat merubah karbohidrat menjadi molekul gulayang digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai sumber energi. Penderita diabetes harus mengontrol asupan karbohidrat mereka. Sebuah sistem, disebut indeks glikemik, mengklasifikasikan karbohidrat berdasarkan seberapa cepat dan seberapa tinggi mereka meningkatkan gula darah dibandingkan dengan glukosa murni. Pasien dengan karbohidrat terbatas (*Carboby*

diate-restricted) dapat menggunakan informasi tentang indeks glikemik bersama dengan label nutrisi.

Seperti disebutkan sebelumnya, serat makanan yang merupakan karbohidrat adalah komponen penting dari diet sehat. Gula dalam diet serat dengan struktur sedemikian rupa sehingga tubuh memiliki kesulitan mengkonversinya menjadi gula sederhana. Dengan demikian, semakin banyak serat yang terkandung dalam makanan, maka semakin kurang dapat dicerna karbohidratnya dan semakin sedikit gula yang dapat diabsorpsi.

Protein

Protein merupakan komponen utama dari kulit, otot, organ, dan kelenjar. Namun, diet tinggi protein yang berasal dari daging dapat berkontribusi terhadap kadar kolesterol yang tinggi, penyakit jantung, dan dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Pedoman kesehatan secara umum menunjukkan bahwa tubuh yang sehat sekitar 0,8g protein per hari per 2,2 lb. berat badan.

Vitamin dan Mineral

Kandungan vitamin A dan C, kalsium dan zat besi tercantum pada label nutrisi sebagai informasi kepada konsumen mengenai jumlah dari vitamin esensial dan mineral.

Nilai Persen Harian

Nilai persen harian didasarkan pada jumlah yang direferensikan (nilai referensi harian, atau DRVs) untuk masing-masing unsur gizi berdasarkan diet 2.000 kalori. Diet 2000 kalori terpilih sebagai label standar terutama karena mendekati kebutuhan kalori pemeliharaan pada perempuan pascamenopause, kelompok paling sering menginginkan penurunan berat badan, dan karena jumlahnya bulat sehingga memudahkan konsumen untuk menghitung kebutuhan gizi individu mereka. Beberapa paket label juga mencakup nilai-nilai berdasarkan diet 2500 kalori, dan semua label menyertakan catatan kaki yang menyatakan bahwa "Nilai harian Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada kebutuhan kalori Anda."

Nilai referensi harian telah ditetapkan untuk nutrisi yang merupakan sumber energi (yaitu, lemak, lemak jenuh, karbohidrat total (termasuk serat), dan protein). DRVs juga telah dibuat untuk kolesterol, natrium, dan kalium, yang tidak memberikan kontribusi kalori.

DRVs untuk nutrisi yang menghasilkan energi dihitung sebagai berikut:

- Jumlah lemak berdasarkan 20 sampai 35 persen dari kalori
- Lemak jenuh berdasarkan kurang dari 10 persen dari kalori
- Karbohidrat berdasarkan 45 sampai 65 persen dari kalori
- Protein berdasarkan atas 10 sampai 35 persen dari kalori (hanya berlaku untuk orang dewasa dan anak di atas 4 tahun)
- Serat berdasarkan 11,5 g serat per 1000 kalori

Jumlah nutrisi berikut dianggap batas atas untuk pemeliharaan kesehatan yang baik:

- Lemak Total: kurang dari 65g
- Lemak jenuh: kurang dari 20g
- Kolesterol: kurang dari 300mg
- Sodium: kurang dari 2.300mg (orang dengan hipertensi, kurang dari 1500mg).

Nilai hari natrium dan kolesterol terlepas dari diet kalori.

Persyaratan Khusus Pada Label Nutrisi

FDA telah mengembangkan definisi tanda runtuk beberapa istilah yang umum digunakan pada label gizi.

Sebagai contoh:

- Bebas kalori: kurang dari 5 kalori per saji.
- Bebas gula: kurang dari 0,5g gula per saji.
- Bebas lemak: kurang dari 0,5g lemak per saji.
- Bebas natrium: kurang dari 5mg sodium per saji.
- Bebas kolesterol: kurang dari 2mg kolesterol per saji dan lemak jenuh 2g atau kurang per saji.
- Rendah kalori: 40 kalori atau kurang per saji
- Rendah natrium: 140mg natrium atau kurang per saji
- Sangat rendah natrium: 35mg natrium atau kurang per saji
- Rendah lemak : 3g lemak atau kurang per saji
- Rendah lemak jenuh: 1gram lemak atau kurang per saji

- Kolesterol rendah: 20mg kolesterol atau kurang dan 2g atau kurang lemak jenuh per saji.

Harus dicatat bahwa label makanan untuk anak-anak di bawah 2 tahun tidak perlu mencantumkan informasi tentang lemak dan kalori untuk mencegah kesalahpahaman orang tua bahwa bayi dan anak-anak harus dibatasi asupan lemaknya. Demikian juga dengan label untuk anak-anak di bawah 4 tahun tidak boleh mencantumkan persen nilai harian (%DV) untuk komponen selain protein, vitamin, dan mineral, karena semua ini merupakan komponen nutrisi yang telah ditetapkan nilai hariannya oleh FDA. Formula bayi memiliki aturan pelabelan khusus.

Contoh Perhitungan

Catatan: Dalam perhitungan nilai % harian pada label, FDA memiliki keluasaan dalam melakukan pembulatan.

1. Untuk diet 3000 kalori, hitunglah jumlah gram diet dari lemak berdasarkan nilai acuan harian (DRVs) untuk bahan ini. Apakah jumlah yang telah dihitung "acceptable" sesuai dengan standar batas atas untuk diet sehat?

Jawab:

DRV untuk lemak = 30% kalori

Untuk lemak, 30% dari 3000 kalori = 900 kalori

Karena lemak menghasilkan 9 kalori/g:

$$\frac{9 \text{ kalori}}{900 \text{ kalori}} = \frac{1 \text{ g lemak}}{x \text{ g lemak}}; \quad x = 100 \text{ g}$$

Karena "batas atas" untuk lemak diet sehat adalah "kurang dari 65 g, maka 100 g lemak tidak dapat diterima.

2. Berapa banyak kalori dari lemak dan berapa gram batas per hari lemak untuk seseorang dengan diet 2000 kalori?

Jawab:

$2000 \times 35\% = 700$ kalori dari lemak

$$\frac{9 \text{ kalori}}{700 \text{ kalori}} = \frac{1 \text{ g}}{x \text{ g}}; x = 78 \text{ gram lemak}$$

3. Berapa banyak kalori makanan yang disediakan oleh diet 65 gr lemak, 500 gram karbohidrat, dan dan 180gr protein?

Jawab:

$$\begin{array}{r} 65 \text{ g lemak} \times 9 \text{ kalori/g} \\ 500 \text{ g karbohidrat} \times 4 \text{ kalori/g} \\ 180 \text{ g protein} \times 4 \text{ kalori/g} \\ \hline \end{array} \begin{array}{r} = 585 \text{ kalori} \\ = 2000 \text{ kalori} \\ = 720 \text{ kalori} \\ = 3305 \text{ kalori} \end{array}$$

4. Jika jenis makanan mengandung 100 kalori per saji dengan 10 kalori berasal dari lemak, yang mana yang dianggap "baik", apakah yang rendah kalori atau rendah lemak?

Jawab:

Menurut definisi, rendah kalori kurang dari 40 kalori per saji. Dengan demikian, jenis makanan ini tidak rendah kalori, dan atas dasar 9 kalori per gram lemak, maka:

$$\frac{9 \text{ kalori}}{10 \text{ kalori}} = \frac{1 \text{ g}}{x \text{ g}}; x = 1,1 \text{ g}$$

Jadi makanan ini termasuk kategori rendah lemak (kurang dari 3 g/saji).

Suplemen makanan tertentu, seperti vitamin dan mineral, memiliki jumlah minimum harian yang telah ditetapkan untuk pemeliharaan kesehatan yang baik. Label produk vitamin dan mineral mengandung jumlah masing-masing komponen yang ada.

5. Suatu tablet multi vitamin berisi 7.500 unit internasional (IU) vitamin A. Jika jumlah ini merupakan % DV dari 150%, berapa kebutuhan harian 100% dari vitamin A?

Jawab:

$$\frac{150 \% DV}{100 \% DV} = \frac{7500 IU}{x IU}; x = 5000 IU$$

6. Tablet multivitamin mengandung 10 mcg biotin, mewakili 3% dari kebutuhan minimum. Berapakah jumlah biotin akan mewakili 100% dari kebutuhan minimum sehari-hari?

Jawab:

$$\frac{3\% \text{ MDR}}{100\% \text{ MDR}} = \frac{10 \text{ mcg}}{x \text{ mcg}}; \quad x = 333,3 \text{ mcg}$$

7. Suatu tablet vitamin dan mineral mengandung 162 mg kalsium. Jika nilai harian minimum untuk kalsium adalah 1000 mg, berapa persentase dari nilai harian minimum kalsium yang terkandung dalam setiap tablet?

Jawab:

$$\frac{162 \text{ mg}}{1000 \text{ mg}} \times 100 = 16,2 \%$$

BAB XII

PERHITUNGAN DALAM PERACIKAN

A. Pendahuluan

Peracikan (*Compounding*) adalah proses di mana ahli farmasi menggabungkan bahan aktif farmasetik dengan bahan-bahan farmasi lainnya dalam penyiapan resep atau permintaan obat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pasien. Hal ini kontras dengan produksi produk farmasi dalam skala besar yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan populasi secara umum yang dikenal dengan istilah **manufaktur farmasi**.

Peracikan adalah kegiatan ahli farmasi yang secara unik memenuhi syarat berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman mereka. Banyak tenaga ahli farmasi (apoteker) telah mengembangkan praktek khusus ini dalam peracikan obat, sehingga dapat memberikan kontribusi besar terhadap kebutuhan pengobatan pasien.

Dalam bab ini akan menguraikan penerapan perhitungan dalam penyiapan cairan oral dan parenteral dengan penambahan serbuk kering; penggunaan tablet, kapsul, dan injeksi sebagai sumber bahan aktif terapeutik (ATI) dalam racikan. Selain itu, bab ini juga mencakup perhitungan khusus dalam pembuatan suppositoria dan kapsul, serta perhitungan yang relevan dengan resep, permintaan obat dan formula khusus.

B. Pertimbangan Umum dalam Praktik Peracikan

Resep racikan dapat diberikan dengan beberapa alasan sebagai berikut:


- Keperluan untuk menyesuaikan kekuatan atau dosis produk komersial yang ada untuk memenuhi kebutuhan khusus pasien (mis; pasien pediatrik).
- Keperluan untuk menyediakan produk yang lebih dapat diterima secara organoleptik (mis; rasa) pada pasien pediatrik atau veteriner.
- kebutuhan untuk menyiapkan bentuk sediaan yang berbeda (misalnya, cairan) dengan produk yang tersedia secara komersial

- (misalnya, tablet) untuk memenuhi persyaratan dari pasien yang tidak mampu menelan (misalnya, pasien pediatrik atau orang tua);
- kebutuhan untuk menyiapkan bentuk sediaan yang bebas dari bahan tambahan (misalnya, gula, pengawet) yang terdapat dalam produk komersial yang tidak dapat ditoleransi oleh pasien, dan
 - kebutuhan untuk menyediakan formulasi yang dirancang khusus bagi pasien dari obat atau kombinasi obat yang tidak tersedia sebagai produk komersial.

C. Penambahan Serbuk Kering

Mencampurkan Serbuk Kering Untuk Larutan Oral atau Suspensi

Beberapa jenis obat, terutama antibiotik, kehilangan potensinya dalam waktu yang relatif pendek ketika dibuat dalam bentuk sediaan cair. Untuk meningkatkan *shelf-life* dari obat ini, maka pabrik membuat produk farmasi dalam bentuk sediaan serbuk kering untuk dicampurkan dengan air atau cairan khusus pada saat resep atau permintaan obat diterima. Tergantung pada jenis produk, serbuk kering dapat stabil selama 24 jam. Setelah pencampuran, larutan atau suspensi yang dihasilkan harus stabil selama 10 hari pada suhu ruangan atau selama 14 hari dalam suhu refrigerator.



Gambar 12.1. Contoh serbuk kering untuk dicampurkan pada pembuatan larutan oral.

Pada label menginstruksikan penambahan 127 mL air untuk membuat larutan 200 mL dari larutan dengan konsentrasi 125 mg atau 200.000 unit penicillin V per 5 mL larutan.

Serbuk kering untuk dicampurkan biasanya dikemas dalam botol "*self-contained*" dalam ukuran yang sesuai untuk memudahkan penambahan sejumlah volume pelarut yang dibutuhkan. Selain mengandung bahan aktif dalam jumlah tertentu, sediaan serbuk kering ini juga berisi bahan tambahan farmasetik yang lain seperti *solubilizer* atau *suspending agent*, *stabilizer*, *colorant*, pemanis, dan *flavoring agent*.

Dalam suatu resep atau permintaan obat, ahli farmasi mengikuti instruksi yang tercantum pada label dalam pencampuran sediaan serbuk kering ini, dengan menambahkan air atau pelarut lainnya dalam jumlah yang sesuai untuk memnyiapkan sediaan cairnya. Tergantung pada formula produk, hasil pencampuran berupa larutan jernih (biasanya disebut sirup) atau suspensi. Volume akhir dari produk merupakan jumlah dari volume pelarut yang ditambahkan dan volume dari serbuk keringnya. Produk-produk jenis ini biasanya dimaksudkan untuk diberikan pada bayi atau anak-anak, tetapi juga diberikan pada pasien dewasa yang kesulitan untuk menelan bentuk sediaan padat, seperti tablet dan kapsul.

Untuk anak dan dewasa, produk campuran untuk larutan oral atau suspensi umumnya diformulasi sebagai dosis lazim dari obat yang terkandung dalam satu sendok teh obat. Untuk bayi, lebih umum diberikan sediaan *pediatric drop* yang juga perlu dicampurkan sebelum penggunaan. Perhitungan yang ditunjukkan berikut ini mencakup pembuatan dan pencampuran produk dan bagaimana konsentrasi obat tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasien tertentu.

Contoh Perhitungan

1. Label pada kemasan serbuk kering cefprozil (CEFZIL) untuk suspensi oral menunjukkan penambahan 72 mL air untuk membuat suspensi 100 mL. Jika pada kemasan tercantum mengandung 2,5 g cefprozil, berapa milligram obat yang terkandung setiap sendok teh dari suspensi tersebut?

Jawab:

$$\begin{aligned} 2,5 \text{ g} &= 2500 \text{ mg} \\ \frac{2500 \text{ mg}}{100 \text{ mL}} &= \frac{x \text{ mg}}{5 \text{ mL}} \\ x &= 125 \text{ mg} \end{aligned}$$

atau, dengan analisis dimensi:

$$\frac{100 \text{ mg}}{1 \text{ g}} \times \frac{5 \text{ mL}}{1 \text{ sth}} \times \frac{2,5 \text{ g}}{100 \text{ mL}} = 125 \text{ mg}$$

2. Instruksi yang tercantum pada label produk ampicillin adalah untuk penambahan 78 mL air untuk membuat suspensi 100 mL, setiap 5 mL mengandung 125 mg ampicillin. Hitunglah volume serbuk kering dan kandungan total ampicillin.

Jawab:

Volume serbuk kering : karena penambahan air adalah 78 mL yang menghasilkan 100 mL produk, maka volume serbuk kering adalah:

$$100 \text{ mL} - 78 \text{ mL} = 22 \text{ mL}$$

Total ampicillin yang terdapat dalam sediaan jika setiap 5 mL mengandung 125 mg ampicillin adalah:

$$\begin{aligned} \frac{5 \text{ mL}}{125 \text{ mg}} &= \frac{100 \text{ mL}}{x \text{ mg}} \\ x &= 2.500 \text{ mg} \end{aligned}$$

3. Dengan menggunakan produk pada contoh sebelumnya, jika dokter menginginkan konsentrasi ampicillin 100 mg/5 mL (kurang dari 125 mg/5 mL), berapa milliliter air yang harus ditambahkan pada serbuk kering?

Jawab:

Telah ditentukan bahwa terdapat 2500 mg ampicillin dalam produk, maka volume yang menghasilkan konsentrasi ampicillin 100 mg/5 mL dapat dihitung:

$$\begin{aligned} \frac{2500 \text{ mg}}{x \text{ mL}} &= \frac{100 \text{ mg}}{5 \text{ mL}} \\ x &= 125 \text{ mL} \end{aligned}$$

lalu, karena telah diketahui volume serbuk kering adalah 22 mL, maka volume air yang ditambahkan adalah:
 $125 \text{ mL} - 22 \text{ mL} = 103 \text{ mL}$

4. Label pada kemasan suatu serbuk kering untuk suspensi oral menyebutkan bahwa bila ditambahkan 111 mL air, maka akan menghasilkan 150 mL suspensi yang mengandung 250 mg ampisillin per 5 mL. Berapa milliliter air yang harus ditambahkan untuk menyiapkan sediaan yang setiap 5 mL nya, merupakan dosis ampisillin yang tepat untuk anak dengan berat badan 60lb., berdasarkan dosis 8 mg/kg berat badan?

Jawab:

Dosis ampisillin dapat ditentukan dengan cara:

$$\frac{8 \text{ mg}}{2,2 \text{ lb}} = \frac{x \text{ mg}}{60 \text{ lb}}$$
$$x = 218 \text{ mg}$$

kemudia jumlah ampiciliin dalam wadah adalah:

$$\frac{250 \text{ mg}}{5 \text{ mL}} = \frac{x \text{ mg}}{150 \text{ mL}}$$

$$x = 7500 \text{ mg.}$$

Jumlah produk yang dapat dibuat dari 7.500 mg di mana setiap 5 mL nya mengandung 218 mg adalah:

$$\frac{218 \text{ mg}}{5 \text{ mL}} = \frac{7500 \text{ mg}}{x \text{ mL}}$$

$$x = 172 \text{ mL}$$

akhirnya, karena volume serbuk kering 39 mL, (150 - 111 mL), maka jumlah air yang ditambakan adalah:

$$172 \text{ mL} - 39 \text{ mL} = 133 \text{ mL.}$$

5. Label dari suatu produk serbuk kering untuk pediatrik drops menyatakan bahwa bila 12 mL air ditambahkan pada serbuk, maka 15 ml dari suspensi ini mengandung 50 mg amoksisillin per milliliter. Berapa milliliter air yang harus ditambahkan untuk membuat dosis amoksisillin dalam setiap 10 tetes, jika penetes

yang digunakan meneteskan 20 tetes/mL, luas permukaan tubuh anak (BSA) adalah 0,4 m², dan dosis obat adalah 50 mg/m² BSA?

Jawab:

Dosis amoksisillin dapat ditentukan dengan cara:

$$\frac{50 \text{ mg}}{1 \text{ m}^2 \text{ BSA}} = \frac{x \text{ mg}}{0,4 \text{ m}^2 \text{ BSA}}$$
$$x = 20 \text{ mg}$$

Volume produk yang mengandung 20 mg ditentukan dengan cara:

$$\frac{10 \text{ tetes}}{x \text{ mL}} = \frac{20 \text{ tetes}}{1 \text{ mL}}$$
$$x = 0,5 \text{ mL}$$

Jumlah amoksisillin dalam kemasan ditentukan dengan cara:

$$\frac{50 \text{ mg}}{1 \text{ mL}} = \frac{x \text{ mg}}{15 \text{ mL}}$$
$$x = 750 \text{ mg}$$

Jumlah produk yang mengandung dosis yang diinginkan adalah:

$$\frac{750 \text{ mg}}{x \text{ mL}} = \frac{20 \text{ mg}}{0,5 \text{ mL}}$$
$$x = 18,75 \text{ mL}$$

kurangkan volume yang telah dihitung (15 mL - 12 mL = 3 mL),
volume air yang ditambahkan adalah:

$$18,75 \text{ mL} - 3 \text{ mL} = 15,75 \text{ mL}$$

Serbuk Kering Untuk Sediaan Parenteral

Karena alasan kestabilan dalam bentuk sediaan cair, beberapa jenis obat (khususnya antibiotik) yang dimaksudkan untuk pemberian secara injeksi, maka jenis obat ini biasanya diberikan sebagai bubuk kering dalam vial untuk dicampurkan dengan air steril untuk injeksi atau pelarut lain yang sesuaisegera sebelum digunakan. Secara umum, obat-obat ini diberikan dalam bentuk sediaan volume kecil untuk injeksi atau sebagai tambahan pada pemberian sediaan parenteral volume besar.

Lain halnya dengan serbuk kering untuk penggunaan oral setelah pencampuran, produk injeksi hanya mengandung jumlah bahan yang terbatas atau spesifik untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitas dari senyawa obat (tanpa pewarna, perasa, dan pemanis).

Dengan demikian, volume bulk dari serbuk kering yang terkandung dalam vial adalah senyawa obat.

Jika jumlah serbuk kering adalah kecil dan tidak berkontribusi secara signifikan terhadap volume akhir dari larutan, maka volume pelarut yang digunakan hampir sama dengan volume akhir dari larutan. Misalnya, jika 1000 unit dari antibiotik tertentu dalam bentuk serbuk kering yang dilarutkan, dan jika serbuk tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap volume akhir, penambahan 5 mL pelarut akan menghasilkan larutan yang mengandung 200 unit/mL. Serbuk kering, karena dalam bentuk curah, akan berkontribusi terhadap volume akhir dari larutan yang dicampurkan, peningkatan volume yang dihasilkan oleh obat harus dipertimbangkan, dan faktor ini harus digunakan dalam perhitungan jumlah pelarut yang dibutuhkan untuk pembuatan larutan dengan konsentrasi yang diinginkan. Misalnya, petunjuk yang tertera pada kemasan untuk membuat larutan injeksi natrium piperacillin, 4 mL pelarut steril harus ditambahkan kepada 2 g serbuk kering akan menghasilkan 5,0 mL larutan yang mengandung 400 mg/mL. Dalam hal ini, jumlah volume obat adalah 1 mL. Kemudian, dengan melarutkan 20.000.000 unit natrium penicillin G, penambahan 32 mL pelarut steril akan menghasilkan volume total larutan menjadi 40 mL yang mengandung 500.000 unit/mL. Serbuk kering ini memiliki volume 8 mL.

Contoh Perhitungan

1. Dengan menggunakan vial yang mengandung 200.000 unit kalium penicillin G, berapa milliliter pelarut yang harus ditambahkan ke dalam serbuk kering untuk menyiapkan larutan dengan konsentrasi 25.000 unit/mL?

Jawab:

$$\frac{25.000 \text{ unit}}{200.000 \text{ unit}} = \frac{1 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$
$$x = 8 \text{ mL}$$

2. Dengan menggunakan vial yang berisi 200.000 unit natrium ampicillin G dan natrium klorida injeksi sebagai pelarut, jelaskan

bagaimana anda memperoleh jumlah natrium penicillin G yang dibutuhkan untuk penyiapan resep berikut ini.

R/ Penicillin G sodium 15.000 unit/mL
Sodium chloride injection ad 10 mL
mL
Sig. For IM injection

Jawab:

$$15.000 \times 10 = 150.000 \text{ unit penicillin G sodium}$$

Karena serbuk kering berisi 200.000 unit natrium penicillin G atau $\frac{3}{4}$ kali dari jumlah unit yang dibutuhkan, maka serbuk ini mengandung jumlah yang dibutuhkan dalam resep tersebut.

Tahap 1. Larutkan serbuk kering dalam 4 mL natrium klorida injeksi

Tahap 2. Gunakan 3 mL dari larutan tersebut untuk digunakan dalam resep.

Atau, dengan analisis dimensi:

$$10 \text{ mL} \times \frac{15.000 \text{ unit}}{1 \text{ mL}} \times \frac{4 \text{ mL}}{200.000 \text{ unit}} = 3 \text{ mL}$$

3. Informasi pada kemasan, vial mengandung 5.000.000 unit kalium penicillin G (terbuffer). Bila 23 mL pelarut steril ditambahkan kepada serbuk keringnya, akan menghasilkan konsentrasi 200.000 unit/mL. Dengan informasi ini, berapa milliliter air steril untuk injeksi yang digunakan untuk membuat larutan berikut ini?

R/ Penicillin G potassium (buffered) 5.000.000 unit
Sterile water for injection q.s
Buat larutan yang mengandung 500.000 unit/mL
Sig. One mL = 500.000 unit of penicillin G potassium

Jawab:

Informasi kemasan menyatakan bahwa larutan disiapkan dengan melarutkan 5.000.000 unit serbuk kering dalam 23 mL pelarut steril dan volume akhir adalah 25 mL. Berarti volume serbuk kering adalah 2 mL.

Langkah 1. Volume akhir dari resep tersebut ditentukan sbb:

Kadang-kadang, untuk memenuhi kebutuhan obat sesuai resep, dibutuhkan bagian kecil dari tablet, maka tablet dapat dipotong kemudian dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Dalam hal ini, tablet digerus dalam lumpang menjadi serbuk. Bila kapsul yang digunakan sebagai sumber obat, cangkang kapsul dibuka dan isi kapsul yang berupa serbuk dikeluarkan. Jumlah serbuk obat yang tepat kemudian digunakan untuk menyiapkan resep atau permintaan obat.

Penting untuk dipahami bahwa penambahan bahan obat, kebanyakan dalam bentuk sediaan padat yang mengandung bahan tambahan, seperti pengisi, pengikat, dan desintegran. Bahan-bahan ini perlu dipertimbangkan dalam perhitungan. Misalnya, suatu tablet yang mengandung 10 mg zat aktif dapat memiliki berat 200 mg atau lebih karena adanya bahan tambahan tadi. Perhitungan yang berkaitan dengan penggunaan injeksi secara umum lebih sederhana karena label ditulis menurut jumlah obat per satuan volume; misalnya milligram per milliliter (mg/mL).

Contoh Perhitungan

1. Setiap kapsul mengandung 25 mg indomethacin. Berapa kapsul yang digunakan untuk memperoleh sejumlah indometasin yang dibutuhkan dalam resep berikut.

R/ Indomethacin 2 mg/mL
Cherry syrup ad 150 mL
Sig. 5 mL b.i.d

Jawab:

Karena 2 mg/mL indometasin yang diresepkan, maka dibutuhkan 300 mg indomethacin dalam resep tersebut. Kapsul yang tersedia mengandung 25 mg indometasin, maka $300 \text{ mg} \div 25 \text{ mg} = 12$ kapsul.

2. Tablet metoprolol tartrat (LOPRESSOR) mengandung 50 mg per tablet. Sebelum menyiapkan resep berikut, seorang apoteker menentukan berat tablet 120 mg. Jelaskan bagaimana menentukan jumlah lopressor yang sesuai.

R/ Lopressor 15 mg

Lactose qs ad 300 mg
Buat 24 kapsul
Sig. 1 caps, 2 dd

Jawab:

$15 \text{ mg} \times 24 = 360 \text{ mg}$ Lopressor yang dibutuhkan.
Gerus 8 tablet:

$8 \times 50 \text{ mg} = 400 \text{ mg}$ dan

$120 \text{ mg} \times 8 = 960 \text{ mg}$ total serbuk

$$\frac{400 \text{ mg lopressor}}{360 \text{ mg lopressor}} = \frac{960 \text{ mg}}{x \text{ mg}}$$

$x = 864 \text{ mg}$ jumlah serbuk yang digunakan.

3. Berapa milliliter dari injeksi yang mengandung 40 mg triamcinolon per milliliter yang digunakan untuk menyiapkan resep berikut ini?

R/ Triamcinolone 0,05%
Ointment base ad 120 g
Sig. Apply to affected area

Jawab:

$120 \text{ g} \times 0,0005 = 0,06 \text{ g} = 60 \text{ mg}$ triamcinolon

$$\frac{40 \text{ mg}}{60 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ mL}}{x \text{ mL}}$$

$x = 1,5 \text{ mL}$

4. Sumber natrium klorida adalah tablet, setiap tablet mengandung 1 g NaCl. Jelaskan bagaimana anda memperoleh sejumlah atrium klorida yang dibutuhkan untuk resep berikut ini?

Jawab:

R/ ephedrine sulfat 0,5
Isotonic sodium chloride sol. 50
Sig. for the nose

$50 \text{ g} \times 0,009 = 0,45 \text{ g}$ natrium klorida

Jawab:

Karena satu tablet mengandung 1 g natrium klorida atau $\frac{20}{9}$ kali dari jumlah yang diinginkan, maka $\frac{9}{20}$ bagian tablet mengandung jumlah yang dibutuhkan, atau 0,45 g. Jumlah natrium klorida yang dibutuhkan diperoleh dengan cara:
Langkah 1. Larutkan 1 tablet dalam air secukupnya hingga 20 mL
Langkah 2. Ambil 9 mL dari larutan tersebut.

5. Sumber kalium permanganat untuk larutan topikal adalah bentuk tablet, setiap tablet mengandung 0,3 g. Jelaskan bagaimana cara memperoleh jumlah kalium permanganat yang dibutuhkan?

R/ potassium permanganate solution 250 mL

1 : 5000

Sig. Use as directed

Jawab:

$1 : 5000 = 0,02\%$

$250 \text{ g} \times 0,0002 = 0,05 \text{ g}$ atau 50 mg kalium permanganat

Karena satu tablet larutan topikal mengandung 300 mg kalium permanganat atau 6 kali lebih besar dari jumlah yang diinginkan, maka hanya $\frac{1}{6}$ tablet yang mengandung jumlah yang dibutuhkan, atau 50 mg. Jumlah kalium permanganat diperoleh dengan cara:

Langkah 1. Larutkan satu tablet larutan topikal dalam air secukupnya untuk membuat 60 mL larutan

Langkah 2. Dari larutan tersebut, pipet 10 mL.


E. Pengisian kapsul dan Pencetakan Suppositoria

Pengisian Kapsul

Pengisian kapsul atau peracikan obat dalam bentuk sediaan kapsul memberikan keluasan kepada farmasis untuk menyiapkan obat dengan dosis yang spesifik untuk pasien tertentu dengan cara pemakaian yang sesuai. Cangkang kapsul terbuat dari gelatin, tersedia dalam berbagai ukuran sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 12.2 Setiap ukuran kapsul dapat diisi dengan berat serbuk yang sesuai.

Kapsul yang diisi harus terisi secara penuh tetapi tidak terlalu keras. Setiap serbuk obat memiliki densitas yang berbeda, sehingga

terjadi perbedaan volume serbuk dengan berat yang sama. Akibatnya, untuk satu berat serbuk yang sama dari obat yang berbeda dapat dikemas dalam kapsul dengan ukuran yang berbeda. Dalam penyediaan resep kapsul ini, seorang farmasis harus memilih ukuran kapsul yang sesuai untuk diisi dengan serbuk obat dan mudah ditelan oleh pasien.



Gambar 12.2 Berbagai jenis ukuran kapsul

Kebanyakan obat oral memiliki dosis yang relatif kecil, sehingga diperlukan penambahan diluent (pengisi) seperti laktosa yang umum digunakan untuk mencukupkan volume yang akan diisikan ke dalam cangkang kapsul.

Langkah langkah dalam perhitungan peracikan kapsul dijelaskan sebagai berikut:

Langkah 1. Pilihlah satu ukuran kapsul yang sesuai

Langkah 2. Isilah cangkang kapsul secara terpisah antara bahan obat dan pengisi, catat beratnya masing-masing.

Langkah 3. Hitunglah berat diluen yang menggantikan berat obat, seperti ditunjukkan dalam contoh berikut.

Langkah 4. Hitunglah jumlah diluent yang dibutuhkan untuk masing-masing kapsul.

Langkah 5. Hitunglah jumlah total obat dan diluen yang dibutuhkan untuk mengisi setiap kapsul sesuai resep.

Tabel 12.1 Ukuran kapsul dengan berat dan volume rata-ratanya.

CAPSULE SIZE	APPROXIMATE VOLUME	APPROXIMATE POWDER WEIGHT
000	1.4 mL	430 mg – 1.8 g
00	0.95 mL	390 mg – 1.3 g
0	0.68 mL	325 – 900 mg
1	0.5 mL	227 – 650 mg
2	0.37 mL	200 – 520 mg
3	0.3 mL	120 – 390 mg
4	0.21 mL	100 – 260 mg
5	0.13 mL	65 – 130 mg

Contoh Perhitungan

1. Tentukan jumlah total setiap obat dan laktosa yang dibutuhkan untuk membuat resep berikut ini?

R/ Obat A 20 mg
 Obat B 55 mg
 Lactose, q.s
 M.f.caps. dtd.No.20

Jawab:

Langkah 1. Untuk tujuan contoh ini, asumsikan bahwa farmasis memilih ukuran kapsul no.1

Langkah 2. Farmasis mengisi setiap bahan dalam kapsul satu persatu, kemudian ditimbang:

Kapsul diisi dengan obat A, beratnya 620 mg

Kapsul diisi dengan obat B, beratnya 470 mg

Kapsul diisi dengan laktosa, beratnya 330 mg

Langkah 3. Hitung berat diluent yang digantikan berat obat A dan B secara rasio dan proporsi sebagai berikut:

Untuk obat A:

$$\frac{620 \text{ mg (A)}}{330 \text{ mg (laktosa)}} = \frac{20 \text{ mg (A)}}{x \text{ (laktosa pengganti A)}}$$

$x = 10,65 \text{ mg}$ (berat diluen yang diganti 20 mg obat A)

Untuk obat B:

$$\frac{470 \text{ mg}}{330 \text{ mg}} = \frac{55 \text{ mg}}{x}$$

$x = 38,62 \text{ mg}$ (diluen yang diganti 55 mg obat B)

Langkah 4. Diluen yang dibutuhkan setiap kapsul
 $330 \text{ mg} - 49,27 \text{ mg} (10,65 \text{ mg} + 38,62 \text{ mg}) = 280,73 \text{ mg}$ laktosa.

Langkah 5. Jumlah total dari setiap obat dan diluen yang dibutuhkan untuk mengisi kapsul, sebagai berikut:

Obat A = $20 \text{ mg} \times 20$ (kapsul) = 400 mg


Obat B = $55 \text{ mg} \times 20$ (kapsul) = 1100 mg

Laktosa = $280,73 \text{ mg} \times 20$ (kapsul) = $5.615,6 \text{ mg}$

Pencetakan Suppositoria

Ahli farmasi kadang-kadang menyiapkan sediaan suppositoria dengan menggunakan alat cetak, seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.3 Komposisi suppositoria terdiri dari bahan aktif obat dan basis suppositoria.

Suppositoria adalah bentuk sediaan padat yang ditujukan untuk dimasukkan ke dalam lubang tubuh di mana mereka melunak, meleleh, atau larut, melepaskan zat obatnya ke jaringan sekitarnya. Secara spesifik suppositoria dapat diartikan sebagai sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, maupun uretra, berbentuk torpedo, dapat melunak, melarut, atau meleleh pada suhu tubuh, dan efek yang ditimbulkan adalah efek sistemik atau lokal. Bahan dasar yang digunakan harus dapat larut dalam air atau meleleh pada suhu tubuh. Sejumlah basis suppositoria dapat digunakan sebagai pembawa obat dalam peracikan, lemak coklat adalah jenis basis yang umum digunakan. Lemak coklat berbentuk padat pada suhu kamar, tapi mencair pada suhu tubuh.



Gambar 12.3. Cetakan suppositoria
([http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Suppository casting mould 2.jpg](http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Suppository_casting_mould_2.jpg)).

Perhitungan yang dilakukan dalam pembuatan dengan pencetakan dijelaskan sebagai berikut. Metode lain yang digunakan dapat ditemukan dalam berbagai referensi.

Cara kalibrasi cetakan suppositoria

Langkah 1. Isi semua lubang cetakan suppositoria dengan basis meleleh.

Biarkan beberapa waktu untuk mendinginkan dan mengeras, keluarkan suppositoria yang terbentuk, lalu timbang dan tentukan rata-rata bobot suppositoria.

Langkah 2. Bagilah total dan rata-rata bobot suppositoria dengan berat jenis basis suppositoria untuk menentukan kapasitas volume cetakan suppositoria dan volume rata-rata setiap lubang cetakan.

Perhitungan Pembuatan Suppositoria:

Langkah 1. Timbang bahan aktif untuk pembuatan suppositoria tunggal.

Langkah 2. Campur dosis tunggal bahan aktif dengan porsi basis yang meleleh secukupnya untuk mengisi satu lubang cetakan (berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya kalibrasi cetakan).

- Langkah 3. Tuangkan campuran obat-basis ke dalam lubang, dan tambahkan basis yang meleleh dan isi cetakan hingga penuh.
- Langkah 4. Setelah supositoria mendingin dan mengeras, keluarkan dari cetakan dan timbang.
- Langkah 5. Berat basis ditentukan dengan mengurangi jumlah obat dari berat supositoria dibentuk.
- Langkah 6. Berat masing masing obat dan basis yang dibutuhkan untuk pembuatan sejumlah suppositoria dalam resep kemudian ditentukan dengan mengalikan dengan jumlah suppositoria.
- Volume basis yang dibutuhkan kemudian dapat dihitung, bila diinginkan dengan menggunakan kerapatan yang diketahui.

Contoh Perhitungan

1. Hitunglah jumlah obat A dan lemak coklat yang dibutuhkan untuk pembuatan suppositoria menurut resep berikut:
- R/ Obat A 350 mg
 Cocoa butter q.s
 M.ft. rectal suppos.dtd.No.12

Jawab:

Langkah 1. Timbang obat A seberat 350 mg

Langkah 2. Berat suppositoria yang akan dibuat adalah 2g, maka jumlah lemak coklat yang digunakan untuk pembuatan suppositoria dihitung dengan cara:

$$2 \text{ g} - 0,35 \text{ g} = 1,65 \text{ g}$$

$1,65 \text{ g} \div 0,86 \text{ g/mL}$ (berat jenis lemak coklat) = 1,92 mL
 (volume lemak coklat yang meleleh, bila ditambahkan pada obat A, maka lubang cetakan akan terisi penuh)

Dengan mencampurkan obat dengan 1 mL lemak coklat, maka ahli farmasi mengetahui volume yang pas untuk mengisi lubang cetakan.

- Langkah 3. Campurkan 350 mg obat A dengan 1 mL lemak coklat yang meleleh dan masukkan ke dalam lubang cetakan, kemudian tambahkan lelehan lemak coklat sisa untuk mencukupkan volume lubang cetakan.
- Langkah 4. Dinginkan suppositoria hingga mengeras dan keluarkan dari cetakan dan timbang 1,95 g.
- Langkah 5. Berat lemak coklat dalam satu suppositoria kemudian dihitung sebagai berikut:
 $1,95 \text{ g} - 0,35 \text{ g (obat A)} = 1,6 \text{ g lemak coklat}$
- Langkah 6. Jumlah total obat A dan lemak coklat yang dibutuhkan dihitung:
 $0,35 \times 12 = 4,2 \text{ g obat A}$
 $1,6 \text{ g} \times 12 = 19,2 \text{ g lemak coklat.}$

Catatan:

Ahli farmasi biasanya menghitung bahan dengan melebihkan jumlah suppositoria satu atau dua biji untuk mencegah kekurangan dalam pencampuran dan pengisian campuran ke dalam cetakan. Dalam mengisi cetakan, campuran harus dituang perlahan-lahan agar terjadi kontraksi pada pendinginan.

F. Peracikan Formula Khusus

Tidak semua produk komersial yang tersedia sesuai untuk setiap pasien. Seringkali, seorang ahli farmasi harus memodifikasi produk yang tersedia menjadi formula yang original sehingga sesuai dengan kebutuhan pasien tertentu.

Dalam praktik peracikan, ahli farmasi dapat mengembangkan formula mereka sendiri. Untuk memfasilitasi praktik peracikan ini, pabrik farmasi menyediakan bahan baku, formula, dan berbagai bahan untuk peracikan, termasuk basis salep dan suppositoria, pembawa untuk sirup dan suspensi oral, pembawa sediaan rektal/vaginal, dan produk nonmedik lainnya yang dapat ditambahkan ke dalam formula.

Contoh Perhitungan

1. Hitunglah jumlah tablet yang mengandung kombinasi pironolactone 25 mg dan hydrochlorthiazide 25 mg yang

digunakan untuk membuat sediaan formula berikut ini dengan ORA-PLUS sebagai pembawa susoensi oral.

R/ Spironolactone 5 mg/mL
Hydrochlorthiazide 5 mg/mL
ORA-PLUS ad 120 mL

Jawab:

Spironolactone/hydrochlorthiazide:

$$5 \text{ mg obat/mL} \times 120 \text{ mL} = 600 \text{ mg tiap obat}$$

$$600 \text{ mg} \div 25 \text{ mg (obat/tablet)} = 24 \text{ tablet}$$

2. Hitunglah jumlah FATTIBASE, suatu basis suppositoria yang dibutuhkan untuk membuat 200 suppositoria *progesterone vaginal suppository* menurut formula berikut ini.

R/ progesterone, micronized 25 mg
Silica Gel, micronized 20 mg
FATTIBASE ad 2 g

Jawab:

$$25 \text{ mg progesteron} + 20 \text{ mg silica gel} = 45 \text{ mg}$$

$$2 \text{ g} - 0,045 \text{ g} = 1,955 \text{ g}$$

$$1,995 \text{ g} \times 200 = 391 \text{ g FATTIBASE}$$

BAB XIII

PENGUKURAN POTENSI

A. Perhitungan Aktivitas atau Potensi

Potensi beberapa antibiotik, produk dokrin, vitamin, produk bioteknologi, dan biologis (misalnya, vaksin) didasarkan pada aktivitasnya dan disajikan dalam bentuk unit (aktivitas) dalam mikrogram per miligram ($\mu\text{g}/\text{mg}$), atau dalam satuan standar pengukuran lainnya. Pengukuran potensi harus memenuhi standar yang disetujui oleh *Food and Drug Administration* dan tercantum di *Pharmacopeia Amerika Serikat (USP)*. Secara umum satuan ini sesuai juga dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan disebut International Unit (IU).

Derajat aktivitas ditentukan oleh perbandingan terhadap senyawa standar yang sesuai, umumnya digunakan Referensi Standar USP. Standar acuan adalah spesimen otentik yang digunakan sebagai pembanding standar dalam tes kompendial dan pengujian. Angka satuan USP untuk antibiotik, misalnya, didasarkan pada perbandingan aktivitas sampel anti biotik dalam miligram basis terhadap Referensi Standar USP yang sesuai. Misalnya, ada 1.590 Unit natrium penisilin G USP permiligram dari anti biotik Referensi Standar USP. Sediaan dan produk farmasi diperbolehkan menggunakan variasi yang spesifik dalam ukuran potensinya, misalnya monografi USP untuk natrium penisilin G steril ditentukan potensinya tidak kurang dari 1500 unit penisilin G dan tidak lebih dari 1750 unit penisilin G permiligram. Aktivitas atau potensi antibiotik ditentukan berdasarkan efek penghambatannya terhadap mikroorganisme. Tidak ada hubungan antara unit potensi dari suatu obat dengan unit potensi obat lainnya.

Potensi antibiotik juga dapat ditunjukkan dalam satuan μg (mikrogram) aktivitas. Konsep ini dihasilkan ketika standar acuan untuk antibiotik seluruhnya dianggap terdiri dari entitas kimia tunggal dan karenanya potensinya diberikan 1000 $\mu\text{g}/\text{mg}$. Metode baru pembuatan dan pengembangan antibiotika telah dikembangkan, namun telah ditetapkan bahwa beberapa antibiotik dengan kemurian

yang tinggi memiliki aktivitas lebih dari 1000 µg/ mg dibandingkan dengan standar referensi yang asli. Perbedaan potensi juga ditemukan pada bentuk kimia base dibandingkan dengan bentuk garamnya. Misalnya, natrium ampisilin memiliki potensi antara 845 dan 988 µg/mg ekivalen terhadap ampisilin.


Perbandingan kesetaraan potensi antara beberapa obat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 13.1 Contoh potensi beberapa jenis obat

DRUG	UNITS OR µg OF POTENCY PER WEIGHT EQUIVALENT*
Alteplase	500,000 USP Alteplase Units per mg of protein
Ampicillin Sodium	NLT (not less than) 845 µg and NMT (not more than) 988 µg of ampicillin per mg
Antihemophilic Factor	NLT 100 Antihemophilic Factor Units per g of protein
Bacitracin	NLT 40 Bacitracin Units per mg
Bacitracin Zinc	NLT 40 Bacitracin Units per mg
Cephalothin Sodium	NLT 850 µg of cephalothin per mg
Chymotrypsin	NLT 1000 USP Chymotrypsin Units per mg
Clindamycin Hydrochloride	NLT 800 µg of clindamycin per mg
Cod Liver Oil	In each gram: NLT 180 µg (600 USP Units) and NMT 750 µg (2500 USP Units) of Vitamin A and NLT 1.5 µg (60 USP Units) and NMT 6.25 µg (250 USP Units) of Vitamin D
Colistimethate Sodium	390 µg colistin per mg
Digitalis	NLT 1 USP Digitalis Unit per 100 mg
Erythromycin Estolate	NLT 600 µg of erythromycin per mg
Gentamicin Sulfate	NLT 590 µg of gentamicin per mg
Heparin Calcium	NLT 140 USP Heparin Units per mg
Heparin Sodium	NLT 140 USP Heparin Units per mg
Insulin	NLT 26.5 USP Insulin Units per mg
Insulin Human	NLT 27.5 USP Insulin Human Units per mg
Insulin Lispro	NLT 27 USP Insulin Lispro Units per mg
Kanamycin Sulfate	NLT 750 µg of kanamycin per mg
Menotropins	NLT 40 USP Follicle-Stimulating Hormone Units and NLT 40 USP Luteinizing Hormone Units per mg
Minocycline Hydrochloride	NLT 890 µg and NMT 950 µg minocycline per mg
Mitomycin	NLT 970 µg mitomycin per mg
Neomycin Sulfate	NLT 600 µg of neomycin per mg
Nystatin	NLT 4400 USP Nystatin Units per mg
Pancreatin	NLT 25 USP Units of amylase activity, NLT 2 USP Units of lipase activity, and NLT 25 USP Units of protease activity per mg
Penicillin G Benzathine	NLT 1090 and NMT 1272 Penicillin G Units per mg
Penicillin G Potassium	NLT 1440 and NMT 1680 Penicillin G Units per mg
Penicillin G Sodium	NLT 1500 and NMT 1750 Penicillin G Units per mg
Penicillin V	NLT 1525 and NMT 1780 Penicillin V Units per mg
Penicillin V Potassium	NLT 1300 and NMT 1610 Penicillin V Units per mg
Polymyxin B Sulfate	NLT 6000 Polymyxin B Units per mg
Sargramostim	5.6 million Sargramostim Units per mg of protein
Streptomycin Sulfate	NLT 650 µg and NMT 850 µg of streptomycin per mg
Thiostrepton	900 Thiostrepton Units per mg
Tobramycin	NLT 900 µg of tobramycin per mg
Trypsin, crystallized	NLT 2500 USP Trypsin Units per mg
Vancomycin	NLT 950 µg vancomycin per mg
Vasopressin	NLT 300 Vasopressin Units per mg
Vitamin A	1 USP Vitamin A Unit equals the biologic activity of 0.3 µg of the all-trans isomer of retinol


* Examples taken from the United States Pharmacopeia 31st Rev. National Formulary 26. Rockville, MD: United States Pharmacopeial Convention, 2008;2,3.

Sama seperti potensi obat-obatan tertentu yang ditunjuk dalam unit, demikian juga dosis obat-obatan dandari sediaan juga diukur dalam satuan unit. Insulin adalah obat yang paling dikenal yang potensinya dinyatakan dalam unit. Dalam kasus insulin, meskipun secara komersial jenis yang tersedia bervariasi menurut waktu onset aksi, waktu aksi puncak, dan durasi aksinya, namun semua produk yang standar mengandung 100 atau 500 unit insulin per mililiter larutan atau suspensi. Potensi ini ditetapkan sebagai U-100 dan U-500 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 13.1.



Gambar 13.1 Contoh produk obat dengan standar aktivitas dalam unit

Seperti disebutkan sebelumnya dalam teks ini, *dispensing error* dapat terjadi ketika pesanan obat menggunakan singkatan unit dengan U dan ditempatkan setelah jumlah unitnya. Tulisan U yang buruk dapat menyebabkan kesalahan seperti menulis angka nol; misalnya 100U, dapat disalah artikan sebagai 1000 unit. Dengan demikian, adalah tindakan yang baik untuk mengeja istilah unit bila digunakan setelah nomor yang ditunjuk; misalnya, 100 unit atau 100 Unit. Jarum suntik khusus tersedia untuk pengukuran unit insulin, dan dosis yang diperlukan kemudian diukur dalam mililiter, atau langsung dalam satuan unit, tergantung pada kalibrasi jarum suntik. Gambar 13.2 menunjukkan contoh jarum suntik insulin yang dikalibrasi dalam unit.



Gambar 13.2 Jarum suntik insulin yang dikalibrasi dalam unit

Kadar darah atau kadar serum darah obat-obatan tertentu dapat dinyatakan dalam literatur sebagai mU/mL, yang berarti milliunits dari bahan per mililiter darah atau serum darah.

Sediaan biologis adalah sediaan yang dihasilkan dari sumber hidup. Termasuk diantaranya adalah vaksin, toksoid, dan immunosera, digunakan untuk pengembangan imunitas, atau resistensi terhadap penyakit; antitoxins tertentu dan antivenins, digunakan sebagai pengobatan terhadap antigen spesifik, dan, toksin dan antigen kulit, digunakan sebagai alat bantu diagnostik. Sediaan biologis dibuat dari serum manusia (misalnya, immunoglobulin), serum kuda (misalnya, antitoksin tetanus), kultur sel ayam (misalnya, vaksin virus campak), dan media hidup lainnya.

Kekuatan dari berbagai produk biologis disajikan dalam beberapa cara. Kekuatan vaksin biasanya dinyatakan dalam mikrogram (μg) atau unit antigen permililiter. Kekuatan vaksin virus dinyatakan paling umum dalam *tissue culture infectious dose (TCID50)*, yang menyatakan jumlah virus yang menginfeksi 50% kultur yang diinokulasi. Vaksin virus juga dapat dinyatakan dalam satuan Unit, mikrogram antigen, atau jumlah organisme permililiter. Kekuatan toksoid umumnya dinyatakan dalam *flocculating unit (Lf Unit)*, di mana 1 unit Lf memiliki kapasitas untuk memflokulasi atau mengendapkan satu unit antitoksin standar. Unit aktivitas umumnya digunakan untuk mengkarakterisasi kekuatan dari berbagai immunosera dan antigen diagnostik.

Food and Drug Administration (FDA) melalui *Centre for Biologics Evaluation and Research (CBER)* bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan efikasi dari produk darah, vaksin, alergenik, produk bioteknologi, terapi sel somatik, terapi gen, dan produk sel dan jaringan.

Vaksin tersedia dalam jumlah besar untuk berbagai penyakit termasuk kanker serviks (human papillomavirus), hepatitis A dan B, influenza, campak, gondok, pneumonokokkus, herpes (herpes

zoster), smallpox, dan tuberkulosis. Selain itu, banyak vaksin yang sekarang ini sedang dalam tahap pengembangan. Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit (CDC) menawarkan panduan untuk penggunaan vaksin pada kelompok populasi yang berbeda, seperti bayi, anak-anak, orang dewasa, dan wanita hamil.

Contoh spesifik potensi vaksin yang dinyatakan istilah tertentu:

Vaksin Hepatitis A, inaktif, 1440 EL.U (ELISA unit) per mL.

Vaksin virus influenza, live (intranasal), $10^{6,5} - 7,5$ FFU (fluorescent focus unit) per 0,2 mL

Vaksin virus campak, live NLT 1000 TCID₅₀ (50% tissue culture infectious dose) setial 0,5 mL

Vaksin Zoster, live, 19,400 PFU (Plaque-forming units) per 0,65 mL

Contoh Perhitungan Aktivitas atau Potensi

Penentuan aktivitas atau potensi suatu bahan biologik pada bagian ini menggunakan rasio dan proporsi atau analisis dimensional, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh berikut ini:

Unit Aktivitas:

1. Berapa milliliter insulin U-100 yang diberikan untuk memperoleh 40 unit insulin? U-100 insulin mengandung 100 units/mL.

Jawab:

$$\frac{100 \text{ (units)}}{40 \text{ (units)}} = \frac{1 \text{ (mL)}}{x \text{ (mL)}}$$
$$x = 0,4 \text{ mL.}$$

Atau dengan analisis dimensi:

$$40 \text{ unit} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ units}} = 0,4 \text{ mL}$$

2. Seorang dokter menulis resep insulin 100 unit dicukupkan 500 dengan D5W untuk pengobatan pasien dengan gejala asidosis diabetik. Berapa mL insulin pekat injeksi, U-500 yang harus diberikan?

Jawab:

Insulin U-500 mengandung 500 unit/mL

$$\frac{500 \text{ (units)}}{100 \text{ (units)}} = \frac{1 \text{ (mL)}}{x \text{ (mL)}}$$

$$x = 0,2 \text{ mL}$$

Atau dengan analisis dimensi:

$$100 \text{ unit} \times \frac{1 \text{ mL}}{500 \text{ units}} = 0,2 \text{ mL}$$

3. Berapa milliliter sodium heparin injeksi yang mengandung 200,000 unit dalam 10 mL yang digunakan untuk memperoleh sodium heparin 5,000 unit yang akan ditambahkan ke dalam larutan dekstrosa intravena?

Jawab:

$$\frac{200.000 \text{ (units)}}{500 \text{ (units)}} = \frac{10 \text{ (mL)}}{x \text{ (mL)}}$$

$$x = 0,25 \text{ mL}$$

atau dengan analisis dimensional:

$$500 \text{ unit} \times \frac{10 \text{ mL}}{200.000 \text{ units}} = 0,25 \text{ mL}$$

Aktivitas Berdasarkan Berat: perhitungan yang mencakup penentuan aktivitas per satuan berat ditunjukkan dalam contoh berikut:

Jika neomisin sulfat memiliki potensi 600 µg dari neomisin permiligram, berapa milligram neomisin sulfat yang potensinya setara dengan 1 mg neomisin?

Jawab:

$$\frac{600 \text{ (}\mu\text{g neomisin)}}{1000 \text{ (}\mu\text{g neomisin)}} = \frac{1 \text{ mg (neomisin sulfat)}}{x \text{ mg (neomisin sulfat)}}$$

$$x = 1,67 \text{ mg}$$

B. Potensi dari Sediaan Biologik

Perhitungan dosis atau kandungan antigen dari produk biologik dicontohkan sebagai berikut:

Contoh

1. Suatu sediaan biologik mengandung 50 Lf unit difteria toksoid setiap 2,5 mL produk. Jika seorang pasien pediatrik diberikan 10 Lf Units, berapa milliliter produk tersebut yang harus diberikan?

Jawab:

$$\frac{50 \text{ (Lf units)}}{10 \text{ (Lf units)}} = \frac{2,5 \text{ (mL)}}{x \text{ (mL)}}$$

$x = 0,5 \text{ mL}$

2. Suatu sediaan vaksin virus campak hidup mengandung 1000 TCID₅₀ per 0,5 mL. Berapa TCID₅₀ kandungan dari vaksin dalam vial multiple dosis 50 mL?

Jawab:

$$\frac{1000 \text{ (TCID50)}}{x \text{ (TCID50)}} = \frac{0,5 \text{ (mL)}}{50 \text{ (mL)}}$$

$x = 100.000 \text{ TCID}_{50}$

PER

BAB XIV

PERHITUNGAN BAGIAN OBAT AKTIF

Seorang ahli farmasi harus mampu menghitung bagian aktif farmakologik dari bahan obat (bahan kimia) ketika terdapat dalam bentuk garam, ester, hidrat, atau bentuk kimia kompleks. Perhitungan menjadi penting adalah ketika ingin membandingkan secara kuantitatif produk yang sama tetapi dengan bentuk kimia yang berbeda. Perhitungan tersebut sangat penting untuk membandingkan produk dari bagian obat yang sama secara kuantitatif tapi berbeda bentuk kimianya. Perhitungan diterapkan dalam prosedur peracikan yang menggunakan obat dengan bentuk kimia yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan formulasi sementara jumlah bagian aktif obat secara farmakologi dipertahankan pada dosis terapi yang diinginkan.

United States Pharmacopeia(USP) telah menunjukkan bahwa ada kasus-kasus di mana dosis ditentukan dalam bentuk kation(misalnya, Li^+), anion (misalnya, F^-), atau molekul (misalnya, teofilin, dietilendiamin teofilin), dan jumlah yang tepat dari bentuk garam atau bentuk kimia kompleks yang digunakan harus dihitung.

Perhitungan yang dilakukan melibatkan penggunaan berat atom dan molekul.

A. Berat Atom dan Berat Molekul

Kebanyakan soal kimia melibatkan penggunaan berat atom atau kombinasi dari unsur-unsur, dan validitas penyelesaian soal ini tergantung pada Hukum Perbandingan Tetap. Berat atom suatu unsur adalah rasio berat atom terhadap berat suatu atom unsur lain diambil sebagai standar.

Dahulu, atom hidrogen, dengan berat atom 1, digunakan sebagai standar. Selama bertahun-tahun, berat oksigen 16, diambil standar dan terbukti lebih nyaman. Pada tahun 1961, *International Union of Pure and Applied Chemistry* (menyusul tindakan serupa oleh *International Union of Pure and Applied Physics*) merilis sebagian tabel berat atom berdasarkan atom karbon 12, sebagai massa relatif dari isotop ^{12}C .

Berat setara dari unsur adalah berat unsur tertentu yang akan bergabung dengan (atau dilepaskan) 1-g berat atom hidrogen (atau setara dengan berat beberapa unsur lain). Sebagai contoh, ketika hidrogen dan klorin bereaksi membentuk HCl, 1,008g hidrogen bereaksi dengan 35,45g klorin, sehingga setara dengan berat klor adalah 35,45.

Berat ekuivalen suatu senyawa adalah berat dari senyawa secara kimiawisetara dengan 1,008 g hidrogen. Jadi, 1 mol atau 36,46 g HCl mengandung 1,008 g hidrogen, dan jumlah ini dapat tergantikan oleh salah satu berat ekuivalen dari logam, maka berat setaranya adalah 36,46. Demikian juga, 1 mol atau 40,00 g NaOH mampu menetralkan 1,008 g hidrogen. Oleh karena itu, berat setaranya adalah 40,00. Satu mol atau 98,09 g H₂SO₄, mengandung 2.016g hidrogen, yang dapat digantikan oleh dua bobot ekuivalen logam, akibatnya, yang berat ekuivalennya adalah $\frac{98.08}{2}$ atau 49,04. Hukum perbandingan tetap menyatakan bahwa unsur-unsur selalu berikatan dalam proporsi berat yang sama untuk membentuk suatu senyawa.

Contoh Perhitungan Berat Atom dan Berat Molekul

- 1) Hitunglah persentase dari komposisi dekstrosa anhidrat, C₆H₁₂O₆

Jawab:

$$\begin{array}{ccc} \text{C}_6 & \text{H}_{12} & \text{O}_6 \\ (6 \times 12,01) + & (12 \times 1,008) + & (6 \times 16,00) = 180,16 \end{array}$$

Karbon:

$$\frac{180,16}{72,06} = \frac{100\%}{x\%}$$

$$x = 40,00\%$$

Hirogen:

$$\frac{180,16}{22,096} = \frac{100\%}{y\%}$$

$$y = 6,71\%$$

Oksigen:

$$\frac{180,16}{96,00} = \frac{100\%}{z\%}$$

$$z = 53,29\%$$

$$\text{Periksa: } 40,00\% + 6,71\% + 53,29\% = 100\%$$

- 2) Hitunglah persentase Litium dalam litium karbonat, Li_2CO_3

Jawab:

Berat molekul litium karbonat = 74

Berat atom litium = 7

$$\frac{74}{2 \times 7} = \frac{100\%}{x\%}$$

$$x = 18,9\%$$

- 3) Ferro sulfat eliksir mengandung 220 mg ferro sulfat ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$). berapa milligram unsur Fe dalam dosis tersebut?

Jawab:

BM $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ = 278

BA Fe = 56

$$\frac{278}{56} = \frac{220 \text{ mg}}{x \text{ mg}}$$

$$x = 44,3 \text{ mg}$$

- 4) Berapa milligram natrium fluorida yang menghasilkan 500 μg ion fluorida?

Jawab:

Na (23) + F (19) = 42

$$\frac{19}{42} = \frac{500 \mu\text{g}}{x \mu\text{g}}$$

$$x = 1105 \mu\text{g} \text{ atau } 1,1 \text{ mg}$$

B. Kesetaraan Bagian Obat Aktif

Farmakoterapi adalah bagian dari ilmu farmakologi yang membahas bagian aktif dari senyawa obat yang bertanggung jawab atas respon terapi tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas suatu obat adalah kelarutan, absorpsi, formulasi atau bentuk sediaan. Untuk mengakomodasi faktor-faktor tersebut, maka seringkali senyawa aktif dikembangkan menjadi bentuk garam, ester, atau bentuk kimia kompleks lainnya.

Produk komersial yang mengandung senyawa aktif bentuk kimia tertentu ini dicantumkan dalam label produk untuk memberi petunjuk mengenai komposisi produk obat, misalnya “ setiap mL mengandung 1 mg albuterol sulfat yang setara dengan 0,83 mg albuterol”.

Tabel 14.1. Contoh beberapa obat dengan bagian aktifnya

DRUG	EMPIRICAL FORMULA	MOLECULAR WEIGHT	
		COMPOUND	ACTIVE DRUG MOIETY (FREE BASE)
Cinacalcet HCl (SENS PAR)	$C_{22}H_{21}F_3N \cdot HCl$	393.90	357.40
Escitalopram oxalate (LEXAPRO)	$C_{20}H_{21}FN_2O \cdot C_8H_6O_4$	414.40	336.38
Fluoxetine HCl (PROZAC)	$C_{17}H_{18}F_3NO \cdot HCl$	345.79	309.29
Metaproterenol sulfate (ALUPENT)	$(C_{11}H_{17}NO)_2 \cdot H_2SO_4$	520.59	211.26
Nelfinavir mesylate (VIRACEPT)	$C_{32}H_{43}N_5O_5S \cdot CH_3O_2S$	663.90	567.79
Rosiglitazone maleate (AVANDIA)	$C_{18}H_{15}N_2O_5S \cdot C_8H_4O_4$	473.52	357.44
Sumatriptan succinate (IMITREX)	$C_{12}H_{17}N_2O_5S \cdot C_8H_6O_4$	413.50	295.40

Dalam praktik farmasi kontemporer, seorang ahli farmasi mungkin perlu untuk menghitung bagian obat aktif pada waktu pembuatan sediaan dan atau membandingkan isi antara produk.

Perhitungan Bagian Obat Aktif dalam Prosedur Peracikan

Menurut USP, seorang ahli farmasi harus melakukan perhitungan untuk menentukan jumlah eksak dari bahan aktif yang dibutuhkan untuk peracikan suatu resep. Dalam hal ini termasuk perhitungan jumlah yang tepat dari bagian obat aktif yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan komposisi molekul dari senyawa, termasuk ekivalensi anhidrat ketika terdapat sebagai bentuk hidrat, dan kemungkinan efek kelembaban dari senyawa tersebut serta kehilangan molekul airnya.

USP menyajikan rumus berikut ini untuk menghitung berat teoritis dari bahan aktif dalam suatu sediaan:

$$W = ab/de$$

Di mana:

W = jumlah bahan yang akan ditimbang

a = berat bahan aktif yang diresepkan atau bagian obat aktif

b = berat molekul bahan obat (a) termasuk molekul airnya

d = berat kering (dari kandungan lembab yang diketahui)

e = berat molekul dari bagian obat aktif

Contoh Perhitungan

- 1) Berapa persentase metadon (BM 313) dalam larutan yang mengandung metadon HCl (BM 349) dalam setiap milliliter?

Jawab:

$$\frac{10 \text{ mg metadon HCl} \times 313 \text{ g/mol}}{349 \text{ g/mol}} = 8,97 \text{ mg} \approx 0,09 \text{ g}$$

$$\frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} = \frac{0,009 \text{ g}}{x \text{ g}}, \rightarrow x = \frac{0,9 \text{ g}}{100 \text{ mL}} = 0,9\%$$

- 2) Berapa mg aminofillin (teofilin etilendiamin) USP yang digunakan untuk memperoleh 250 mg teofilin anhidrat? BM aminofillin dihidrat adalah 456, dan pada wadah menunjukkan kelembaban 0,4%. Berat molekul teofilin adalah 180, dengan 2 molekul terdapat dalam aminofillin. Dengan menggunakan rumus:

$$W = \frac{250 \text{ mg} \times 456 \text{ g/mol}}{0,994 \times 360 \text{ g/mol}} = 318,578 \text{ atau } 319 \text{ mg}$$

- 3) Jika suatu resep menginginkan sediaan 30 mL larutan lidokain 1% (BM 234), tetapi untuk tujuan kelarutan, maka ahli farmasi menggunakan lidokain HCl (BM 288), berapa mg lidokain HCl yang digunakan?

Jawab:

$$30 \text{ mL} \times 1\% \text{ b/v} = 0,3 \text{ g atau } 300 \text{ mg (lidokain)}$$

$$W = \frac{300 \text{ mg} \times 288 \text{ g/mol}}{1 \times 234 \text{ g/mol}} = 36 \text{ mg}$$

DAFTAR PUSTAKA

- Ansel, H.C, 2010, *Pharmaceutical Calculation 13th Edition*, Lippincott Williams and William, Philadelphia.
- Anonim, 2007, *United State Pharmacopeia 30/ NF 25*, Unites Pharmacopeial Convention
- Anonim, *Pharmaceutical Calculation*, U.S Army Department Center and School Fort Sam Houston, Texas
- Day, R.A and Underwood, A.L, 1998, *Analisis Kimia Kuantitatif*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Dirjen POM RI, 1995, *Farmakope Indonesia Ed.IV*, Departemen Kesehatan Indonesia
- Dirjen POM RI, 1979, *Farmakope Indonesia Ed.III*, Departemen Kesehatan Indonesia
- Khan, M.A and Reddy, I.K, 2000, *Pharmaceutical and Clinical Calculation, 2th Ed.*, CRC Press, London.
- Pearson, S.E, 2012, *Pharmaceutical Calculation*, Pearson Printing Press, Pittsburg
- Sweetman, S.C, 2009, *Martindalle: The Extra Pharmacopeia*, Pharmaceutical Press, London, Chicago
- Turco, S and King, R.E, *Sterile Dosage Form*, Lea and Febiger, Philadelphia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- US Department Agriculture and US Department of Health and Human Service, 2010, *Dietary Guidelines for American*, www.dietaryguidelines.gov, diakses tanggal 9 September 2013.

BIODATA PENULIS



Haeria, lahir di Camba, Maros (Sulawesi Selatan) pada tanggal 15 Juli 1978. Menyelesaikan Sekolah Dasar tahun 1990 dan Sekolah Menengah Pertama tahun 1993. Keilmuan Farmasi mulai digeluti sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Farmasi (SMF) Depkes Ujung Pandang tahun 1993-1996, dilanjutkan Strata Satu Farmasi Universitas Pancasakti Makassar dan lulus pada tahun 2004. Setelah diangkat sebagai tenaga dosen Pegawai Negeri Sipil di UIN Alauddin Makassar tahun 2006 pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Farmasi di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Farmasi dalam mata kuliah Kimia Farmasi Analisis.

Beberapa karya ilmiah dan penelitian yang telah dihasilkan penulis adalah Analisis Senyawa Xanthin, Kokristal Farmasi sebagai Alternatif Perbaikan Bioavailabilitas Obat, Karakterisasi dan Uji Disolusi Kokristal Asiklovir-Asam Askorbat, Buku Analisis Kimia Farmasi I, dan Penelitian Mandiri tentang Identifikasi dan Potensi Antioksidan Ekstrak Klika Anak Dara (*Croton oblongus* burn.F) asal Kabupaten Sinjai.



ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS

