

TRANSDUKSI SINYAL BIOLOGIS

Afrisusnawati Rauf



Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang Undang:

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

All Rights Reserved

TRANSDUKSI SINYAL BIOLOGIS

Penulis:

Afrisusnawati Rauf

Editor:

Isriany Ismail

Cetakan: II 2018

viii + 195 halaman, 15,5 cm x 23 cm

ISBN : 978-602-237-667-5

Alauddin University Press

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Somba Opu Gowa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya yang tak ternilai dan tak dapat dihitung sehingga buku ini dapat diselesaikan. Buku yang berjudul “Transduksi Sinyal Biologis” ini disusun untuk memenuhi keterbatasan sumber materi ini.

Buku ini berisi materi tentang berbagai macam jalur penghantaran sinyal yang terdapat di dalam tubuh dan peristiwa-peristiwa molekuler yang mendasarinya. Sumber tulisan diambil dari beberapa buku dan jurnal yang relevan dengan materi tersebut. Di dalam buku ini juga disajikan ilustrasi berupa gambar dan ringkasan dalam bentuk tabel untuk memudahkan dalam pemahaman materi.

Penyusunan buku ini kiranya masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami menghaturkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam buku ini. Kami pun berharap pembaca buku ini dapat memberikan kritik dan sarannya kepada kami agar di kemudian hari kami bisa membuat buku yang lebih sempurna lagi. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa dan siapa saja yang ingin memperoleh informasi di dalamnya.

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu terselesainya buku ini. Semoga amalnya di terima Allah sebagai amal jariyah dan pedoman ini dapat bermanfaat.

Makassar, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR

KATA PENGANTAR_ii

DAFTAR TABEL_iv

DAFTAR GAMBAR_v

DAFTAR SINGKATAN_vi

BAB 1 BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI ANTAR SEL_1

BAB 2 KANAL ION_5

- A. POTENSIAL MEMBRAN_5
- B. KEMAMPUAN REGENERATIF DAN POTENSIAL AKSI_6
- C. KELUARGA KANAL ION_7
- D. PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN GERBANG KANAL ION_8
- E. PERAKITAN KANAL ION_9
- F. DESAIN DAN FUNGSI KANAL ION_10

BAB 3 SISTEM TRANSDUKSI SINYAL_12

- A. RESEPTOR_12
- B. JALUR TRANSDUKSI SINYAL_14
- C. KLASIFIKASI RESEPTOR_14

BAB 4 TRANSDUKSI SINYAL OLEH LIPID, KALSIUM, & SIKLIK AMP_28

- A. KOMPOSISI MEMBRAN BIOLOGIS_28
- B. PERANAN LIPID, KALSIUM, cAMP, DAN KALMODULIN_31

BAB 5 TRANSDUKSI SINYAL PADA SISTEM IMUN_38

BAB 6 TRANSDUKSI SINYAL PADA SISTEM ENDOKRIN_58

BAB 7 TRANSDUKSI SINYAL PADA SISTEM SARAF PUSAT_70

- A. SIGNALING NYERI_70
- B. SIGNALING PADA MOOD DAN DEPRESI_77
- C. SIGNALING PADA ALZHEIMER_79

BAB 8 APOPTOSIS _81

BAB 9 KANKER_88

BAB 10 INTEGRASI SINYAL DALAM BELAJAR DAN MEMORI_106

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Empat keluarga kanal ion di membran plasma neuron_7
- Tabel 2. Klasifikasi reseptor berdasarkan lokasi dan jalur transduksi sinyal yang mereka gunakan_14
- Tabel 3. Proses fisiologi yang diperantarai oleh GPCRs dan Protein G heterotrimerik _21
- Tabel 4. Tiga kelas utama reseptor GPCRs _23
- Tabel 5. Subunit $G\alpha$ pada mamalia_25
- Tabel 6. Konstituen lipid membran plasma_29
- Tabel 7. Sel leukosit sistem imun_40
- Tabel 8. Protein signaling antara leukosit-ke-leukosit (interleukin) _41
- Tabel 9. Molekul signaling sistem imun_41
- Tabel 10. Hematopoietic dan reseptor interferon, Jaks dan STATs_49
- Tabel 11. Kostimulator Limfosit T_55
- Tabel 12. Respon adenilil siklase terhadap regulator yang berbeda_64
- Tabel 13. Hormon-hormon yang disekresikan oleh hipotalamus, adrenal, pituitari anterior, dan kelenjar endokrin pankreas_66
- Tabel 14. Hormon menginduksi respon yang diperantarai oleh cAMP_67
- Tabel 15. Protein dengan mutasi dan perubahan bentuk terkait kanker_90
- Tabel 16. Empat jenis perbaikan DNA_95
- Tabel 17. Kerusakan untai ganda, sensing, repair, and signaling_96
- Tabel 18. Siklin dan siklin dependen kinase_ 101
- Tabel 19. Komponen utama terminal presinaptik di sinaps sistem saraf pusat_110
- Tabel 20. Komponen utama dari PSD pada sinaps excitatory glutamergic_112

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Ringkasan jalur signaling utama molekul pembawa ekstraseluler yang dapat menimbulkan respon intraseluler_2
- Gambar 2. Kanal ion subunit pola threading_9
- Gambar 3. Topologi rantai tunggal kanal kation bergerbang voltase_9
- Gambar 4. Reseptor GABA_A dan daerah pengikatan ligan_17
- Gambar 5. Kompleks reseptor NMDA_19
- Gambar 6. Reseptor terganggu protein G (GPCRs) _21
- Gambar 7. Representasi stereotipe keluarga rhodopsin (kelas A) G protein coupled reseptor_23
- Gambar 8. Struktur membran sel_30
- Gambar 9. Model fluid mosaik membran sel _30
- Gambar 10. Survival signaling melalui protein kinase B_33
- Gambar 11. Organisasi Adenilil siklase_34
- Gambar 12. Struktur protein kinase C dan protein kinase B_35
- Gambar 13. Signaling PKA melalui AKAPs_36
- Gambar 14. Perkembangan Sel T pembantu_43
- Gambar 15. Node NF- κ B nod_45
- Gambar 16. Sinyal melalui jalur IL-1/Toll_47
- Gambar 17. Signaling hulu pada jalur TNF_48
- Gambar 18. Jalur transduksi sinyal Reseptor sel T (TCR) _53
- Gambar 19. Reseptor neurotrophin: Reseptor p75NTR_60
- Gambar 20. Ligan-terikat Trk dan p75 reseptor neurotropin, dan adapter terkait_62
- Gambar 21. Anatomi nosiseptor_71
- Gambar 22. Pencetusan sinyal demam dan nyeri_77
- Gambar 23. Jalur signaling regulasi transkripsi bergantung CREB di neuron_80
- Gambar 24. Berbagai macam kematian sel, menginduksi apoptosis dan nekrosis_81
- Gambar 25. Jenis kematian sel_istiwa apoptosis_86
- Gambar 27. Jalur apoptosis (A) jalur ekstrinsik. (B) Jalur intrinsic_87
- Gambar 28. Struktur matriks metalloproteinase_89
- Gambar 29. Onset perbaikan pemutusan untai ganda_97
- Gambar 30. Siklus sel_99
- Gambar 31. Stimulasi sinyal pertumbuhan transisi dari fase G1 ke S_101
- Gambar 32. Siklus sel arrest yang dicetuskan oleh kerusakan DNA checkpoint signals_102
- Gambar 33. Sirkuit controller yang mengkoordinasi aktivitas p53 dan pRB_103
- Gambar 34. Interaksi protein-protein transsinaptik_108
- Gambar 35. Pelepasan neurotransmitter dari terminal presinaptik_109
- Gambar 36. Post sinaptik density_111
- Gambar 37. Tiga jenis neuron yang berbeda membentuk sirkuit neuron sensoris_126
- Gambar 38. Signaling dalam jalur pembelajaran di Aplysia_127
- Gambar 39. Sirkuit hippocampal pada hewan pengerat yang digunakan dalam studi LTP_129
- Gambar 40. Signaling dalam jalur pembelajaran di neuron hippocampal yang mengarah ke konsolidasi LTP_130

Gambar 41. Peristiwa pensinyalan hilir yang mengarah ke konsolidasi ingatan_131

DAFTAR SINGKATAN

A β Amiloid beta
AC adenylyl cyclase
ACh acetylcholine
ACTH adrenocorticotrophic hormone
ADP adenosine diphosphate
AIF apoptosis inducing factor AIP autoinducing peptides
AKAP A-kinase anchoring protein ALK activin receptor-like kinase
AMP adenosine monophosphate
AMPA a-amino-3-hydroxyl-5-methyl-4-isoxazole propionate acid
AMPK AMP-dependent protein kinase
APC antigen-presenting cell
APP amyloid b protein precursor
ATP adenosine triphosphate
AR amphiregulin

Bcl-2 B cell leukemia 2
BCR B-cell receptor
BCA-1 B cell attracting chemokine-1
BDNF brain derived neurotrophic factor
bFGF basic fibroblast growth factor

C1 protein kinase C homology-1
CAD caspase-activated deoxyribonuclease
CaM calmodulin
CaMKII calcium/calmodulin-dependent protein kinase II
cAMP cyclic AMP
CARD caspase recruitment domain
CBP CREB binding protein
CD cluster of differentiation
Cdk cyclin-dependent kinase
cGMP cyclic guanosine monophosphate
CNTF ciliary neurotrophic factor
cSMAC central supramolecular activation cluster
CHRAC chromatin accessibility complex
CICR Calcium induced calcium release
CNG cyclic nukleotida-gated
CREB cAMP response element-binding protein
CRE, cAMP respons element
CRTC1 CREB-regulated transcription coactivator-1
CO carbon dioxide
CTLA-4 cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4
CNTF ciliary neurotrophic factor

DA dopamine
DAG diacylglycerol
DAT dopamine transporter

DC dendritic cell
DD death domain
DED death effector domain
DIABLO direct IAP binding protein with low pI
DNA Deoxyribo nucleic acid
DISC death-inducing signaling complex
DIX disheveled and axin
DR death receptor

ECSIT evolutionarily conserved signalling intermediate in Toll pathway
ECM extracellular matrix
EGF epidermal growth factor
ER endoplasmic reticulum
ERK extracellular signal-regulated kinase
EPO erythropoietin

FADD Fas-associated death domain
FAK focal adhesion kinase
FH Forkhead factor

GABA g-aminobutyric acid
GDP guanosine diphosphate
GDNF glial-derived neurotrophic factor
Gg gusducin
Gt tansducin
GH growth hormone
GM-CSF granulocyte-macrophage colony-stimulating factor
GPCRs G protein-coupled receptors
GRK G protein-coupled receptor kinase
GSK-3 glycogen synthase kinase-3
GTP guanosine triphosphate
GluR1 Glucose transporter 1
GluR2 Glucose transporter 2
GluR3 Glucose transporter 3
GluR4 Glucose transporter 4

HRE Hormone response element
HB-EGF Heparin-binding epidermal growth factor

IAP inhibitor of apoptosis
ICAD inhibitor of CAD
ICAM intercellular cell adhesion molecule
ICOS inducible co-stimulatory molecule
IL interleukin
IFN interferon Ig immunoglobulin
IKKs N-terminal serin substrate kinase I κ B
IRF interferon regulatory factor

IP3/ InsP3R Inositol triphosphate
ISRE IFN-stimulated responsive element
ITAMs immunoreceptor tyrosine-based activation motif

Jak Janus kinase
JNK c-Jun N-terminal kinase

LFA-1 lymphocyte function-associated antigen 1
LPS lipopolysaccharide
LH luteinizing hormone
LTP long-term potentiation

MAGE melanoma antigen gene
MAP mitogen-activated protein
MAPK mitogen-activated protein kinase
MAPK/ERK, ras-mitogen activated protein kinase
MMP matrix metalloproteinase
MIP-1 macrophage inflammatory protein-1
MSH melanocyte stimulating hormone
MSG monosodium glutamate
MHC major histocompatibility complex
nAChR nicotinic acetylcholine receptor
NADE p75^{NTR}-associated cell death executor
NEMO NF- κ B essential modulator
NESs nuklir ekspor
NF- κ B nuclear factor kappa B
NGF nerve growth factor
NMDA N-methyl-D-aspartate
NMDAR N-metil-D aspartic acid reseptor
NO nitric oxide
NRAGE Neurotrophin receptor-interacting MAGE homolog
NRIF neurotrophin receptor interacting factor
NTF 4 neurotrophic faktor 4

PACAP hipofisis adenylate cyclase activating polipeptida
PDE phosphodiesterase
PDGF Platelet-derived growth factor
PIP phosphatidylinositol phosphatase
PIP2 phosphatidylinositol 4,5 biphosphate
PKA protein kinase A
PKB protein kinase B
PKC protein kinase C
PKG protein kinase G
PKR protein kinase R
PLA2 phospholipase A2
PLC phospholipase C
PP2B CaM-dependent protein fosfatase 2B

PS pseudosubstrate
PS presenilins
PTH parathyroid hormone
PTHrP parathyroid hormone related protein

OR odorant receptors

Rantes regulated upon activation, normal T cell expressed and secreted
RasGEF Ras guanine nucleotide exchange factors
RNA ribonucleic acid
RHD homologi rel domain
ROS reactive oxygen species
RPA replication protein A
RR response regulator
Rsk2 ribosomal protein S6 kinase-2
RTK receptor tyrosine kinase
RyR ryanodine receptor
RyR1 ryanodine recepto1
RyR2 ryanodine receptor 2
RyR3 ryanodine receptor 2

S/T serine/threonine
SAGA Spt-Ada-Gen5 acetyltransferase
SERCA sarco-endoplasmic reticulum calcium ATPase
SIK salt inducible kinase
Smac second mitochondrial activator of caspases
SNAP soluble NSF-attachment protein
SNARE soluble NSF-attachment protein receptor
SNF sucrose nonfermenting
STAT signal transducers and activators of transcription
STEP striatal enriched tyrosine phosphatase
SLC Secondary lymphoid tissue chemokine

TCR T cell receptor
TF transcription factor
TGF- α transforming growth factor- α
TGF- β transforming growth factor- β
TGIF TG3-interacting factor
TM transmembrane
TNF tumor necrosis factor
TPO thrombopoietin
TRADD TNF-R-associated death domain
TRP transient receptor potential
TPRV-1 transient receptor potential vanilloid-1
TRAF TNF receptor-associated factor
TRAIL TNF-related apoptosis-inducing ligand
TSH thyroid stimulating hormone

UP upstream (sequence)

VAMP vesicle-associated membrane protein

VEGFs Vascular endothelial growth factors

VDAC voltage-dependent anion channels

VEGF vascular endothelial growth factor

VGCC voltage-gated calcium channels

BAB 1

BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI ANTAR SEL

Sistem signaling terdiri dari reseptor yang berada di dalam membran plasma atau di dalam sel-sel yang diaktifkan oleh berbagai sinyal ekstraseluler atau *first messenger*, termasuk peptida, protein hormon dan faktor pertumbuhan, steroid, ion, produk metabolik, gas, dan berbagai agen kimia atau fisika (misalnya, cahaya). Sistem signaling juga termasuk transduser dan efektor yang terlibat dalam konversi sinyal menjadi respon fisiologis.


Garis besar umum untuk sistem signaling adalah sebagai berikut: signaling *cascade* dimulai dengan pengikatan hormon ke sisi pengikatan ligan yang sesuai pada permukaan luar domain reseptor membran. Hal ini menyebabkan aktivasi dari reseptor. Reseptor kemudian dapat membentuk konformasi baru, membentuk agregat atau terfosforilasi. Perubahan ini biasanya menghasilkan sebuah asosiasi adapter yang meneruskan dan memperkuat sinyal melalui sel dengan mengaktifkan molekul efektor spesifik dan menghasilkan *second messenger*. Hasil transduksi sinyal *cascade* adalah respons fisiologis, seperti sekresi, gerakan, pertumbuhan, pembelahan atau kematian.

Pensinyalan sel dimulai dengan pelepasan sebuah molekul *messenger* oleh sel yang terlibat dalam mengirim pesan ke sel-sel internal lain. Lingkungan ekstraseluler sel berisi ratusan molekul informasi yang berbeda, mulai dari senyawa kecil (steroid dan neurotransmitter), protein hormon larut untuk berikatan pada permukaan sel lain. Sel-sel hanya dapat merespon pesan ekstraseluler tertentu jika mereka mengekspresikan reseptor spesifik yang mengenali dan mengikat molekul *messenger*. Molekul yang berikatan dengan reseptor disebut ligan. Berbagai jenis sel memiliki komplemen reseptor yang berbeda, yang memungkinkan mereka untuk merespon pesan ekstraseluler yang berbeda. Bahkan sel-sel yang memiliki reseptor spesifik mungkin menanggapi utusan ekstraseluler sangat. Sel hati dan sel-sel otot polos memiliki reseptor β_2 Adrenergik. Aktivasi reseptor ini oleh adrenalin menyebabkan pemecahan glikogen dalam sel hati dan relaksasi dalam sel otot polos. Hasil yang berbeda ini mengikuti interaksi dengan rangsangan awal sama yang dapat ditelusuri ke protein intraseluler yang berbeda yang terlibat dalam respon di dua jenis sel. Dengan demikian jenis aktivitas yang melibatkan sel tergantung pada rangsangan yang diterima dan mesin intraseluler yang mempunyai waktu tertentu dalam hidupnya. Dalam kebanyakan kasus, molekul ekstraseluler messenger berikatan dengan reseptor di bagian permukaan luar sel yang menanggapi. Interaksi ini menginduksi perubahan konformasi pada reseptor yang menyebabkan sinyal harus diteruskan di membran ke domain reseptor sitoplasma. Sekali ia mencapai

permukaan bagian dalam membran plasma, ada dua rute utama sinyal yang ditransmisikan ke sel interior, dimana ia memunculkan respon yang tepat. Rute tertentu yang diambil tergantung pada jenis reseptor yang diaktifkan.

Salah satu jenis reseptor mengirimkan sinyal dari domain sitoplasmanya ke enzim terdekat, yang menghasilkan *second messenger*. Karena ia membawa (efek) respon selular dengan mencetuskan *second messenger*, enzim yang bertanggung jawab dinamakan sebagai efektor. *second messenger* adalah zat kecil yang biasanya mengaktifkan (atau menonaktifkan) protein spesifik. Tergantung pada struktur kimianya *second messenger* dapat menyebar melalui sitosol atau tetap tertanam di lipid membrane bilayer.

Jenis lain dari reseptor mengirimkan sinyal dengan mengubah domain sitoplasmanya ke stasiun perekrutan untuk signaling protein seluler. Protein berinteraksi satu sama lain, atau dengan komponen membran sel, dengan jenis interaksi domain spesifik, seperti domain SH3



Gambar 1. Ringkasan jalur signaling utama molekul pembawa ekstraseluler yang dapat menimbulkan respon intraseluler. (Karp, 2015)

Ringkasan jalur signaling utama molekul pembawa ekstraseluler yang dapat menimbulkan respon intraseluler. Dua jenis jalur transduksi sinyal digambarkan, satu jalur signaling diaktifkan oleh *second messenger* yang dapat berdifusi dan satu lagi signaling yang diaktifkan oleh perekrutan protein plasma dengan membran.

Kebanyakan transduksi melibatkan kombinasi dari mekanisme tersebut. Harus dicatat bahwa penanda jalur biasanya tidak linier seperti yang digambarkan di sini, tapi bercabang dan saling berhubungan untuk membentuk jaringan yang kompleks.

Sel berkomunikasi satu sama lain melalui messenger kimiawi. Di dalam jaringan, sebagian *messenger* berpindah dari sel ke sel melalui taut celah tanpa masuk ke dalam CES. Selain itu, sel juga dipengaruhi oleh *messenger* kimiawi yang disekresikan ke dalam CES. Messenger kimiawi ini berikatan dengan reseptor protein di permukaan sel atau, pada keadaan tertentu, di dalam sitoplasma atau inti sel, dan mencetuskan rangkaian perubahan intrasel yang menghasilkan efek fisiologis. Terdapat tiga jenis komunikasi antar sel yang umum, yang diperantarai oleh messenger dalam di CES:

1. Komunikasi saraf, dengan dilepaskannya neurotransmitter di taut sinaps dari sel saraf dan, setelah melewati celah sinaps yang sempit, bekerja pada pascasinaps.
2. Komunikasi endokrin, yakni hormon dan faktor pertumbuhan mencapai sel melalui sirkulasi darah
3. Komunikasi parakrin, yakni produk-produk sel berdifusi ke dalam CES untuk memengaruhi sel-sel di sekitarnya yang mungkin terletak agak jauh. Selain itu, sel mensekresikan *messenger* kimiawi yang dalam situasi tertentu berikatan dengan reseptor di sel yang sama, yaitu sel mensekresikan *messenger* tersebut (komunikasi autokrin). *Messenger* kimiawi antara lain adalah lemak, asam amino, steroid, polipeptida, dan pada beberapa keadaan adalah lemak, nukleotida purin, dan nukleotida pirimidin. Hal yang penting diperhatikan bahwa di berbagai bagian tubuh, *messenger* kimiawi yang sama dapat berfungsi sebagai neurotransmitter, mediator parakrin, hormon yang disekresikan oleh neuron ke dalam darah (hormon neural), dan hormon yang disekresikan oleh sel kelenjar ke dalam darah.
4. Komunikasi jukstakrin. Beberapa sel mengekspresikan berbagai pengulangan faktor pertumbuhan, misalnya transforming growth factor alpha ($TGF-\alpha$) di luar sel pada protein transmembran jangkar untuk sel. Sel lain memiliki reseptor $TGF-\alpha$ yang terikat ke dalam sel dapat berikatan dengan reseptor $TGF-\alpha$ di sel lain, sehingga kedua sel menjadi berikatan. Komunikasi bentuk ini mungkin penting dalam pembentukan fokus lokal pertumbuhan di dalam jaringan.

Ada tiga jenis interaksi jukstakrin. Jenis pertama, protein pada salah satu sel berikatan dengan reseptor yang terdapat pada sel berdekatan. Jenis kedua, reseptor pada satu sel berikatan pada ligan matriks ekstraseluler yang disekresikan oleh sel lain. Jenis ketiga, sinyal ditransmisikan langsung dari sitoplasma satu sel melalui saluran kecil ke sitoplasma sel yang berdekatan.

Sejumlah besar molekul dapat berfungsi sebagai pembawa informasi ekstraseluler. Diantaranya:

- Asam amino dan derivat asam amino. Contohnya meliputi glutamat, glisin, asetilkolin, epinefrin, dopamin, dan hormon tiroid. Molekul-molekul ini bertindak sebagai neurotransmitter dan hormon.
- Gas, seperti NO dan CO

- Steroid, yang diturunkan dari kolesterol. Hormon steroid meregulasi diferensiasi seksual, kehamilan, metabolisme karbohidrat, dan ekskresi ion natrium dan kalium
- Eicosanoid, yang terdiri dari 20 karbon yang diturunkan dari asam lemak yang dinamakan asam arakidonat. Eicosanoid meregulasi berbagai macam proses meliputi nyeri, inflamasi, tekanan darah, dan pembekuan darah. Beberapa obat *over the counter* yang digunakan untuk mengobati sakit kepala dan inflamasi menghambat sintesis eikosanoid.
- Sejumlah besar golongan polipeptida dan protein. Beberapa dari mereka terdapat sebagai protein transmembran pada permukaan sel yang saling berinteraksi. Beberapa bagian berhubungan dengan matriks ekstraseluler. Pada akhirnya, sejumlah besar protein diekskresikan ke dalam lingkungan ekstraseluler dimana mereka meregulasi proses seperti pembelahan sel, diferensiasi, respon imun, atau kematian dan kelangsungan hidup sel.

Molekul signaling ekstraseluler biasanya, tapi tidak selalu, dikenali oleh reseptor spesifik yang terdapat pada permukaan sel yang merespon. Reseptor mengikat molekul signalingnya dengan afinitas yang tinggi dan menerjemahkan interaksi ini pada permukaan luar sel menjadi perubahan yang terjadi di dalam sel.

- Reseptor terdangeng protein G (GPCRs) adalah keluarga besar reseptor yang berisi tujuh heliks transmembran. Reseptor ini menerjemahkan pengikatan ekstraseluler molekul pemberi sinyal ke aktivasi GTP yang mengikat protein.
- Reseptor protein-tirosina siklin (RTKs) mewakili kelas kedua reseptor yang telah berevolusi untuk menerjemahkan kehadiran molekul pembawa ekstraseluler ke perubahan di dalam sel. Pengikatan ligan ekstraseluler spesifik untuk RTK biasanya menghasilkan reseptor subsatuan yang diikuti oleh aktivasi reseptor domain protein kinase, yang terdapat dalam wilayah sitoplasma. Setelah aktivasi, protein kinase ini memfosforilasi spesifik tirosin residu dari substrat protein sitoplasma, sehingga mengubah aktivitas mereka, lokalisasi mereka atau kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan protein di dalam sel yang lain.
- Ligan-*gated* mewakili kelas ketiga reseptor permukaan sel yang mengikat ligan ekstraseluler. Kemampuan protein ini untuk melakukan arus ion di membran plasma diatur secara langsung oleh pengikatan ligan. Arus ion di membran dapat mengakibatkan perubahan sementara potensial membran, yang akan mempengaruhi aktivitas protein membran lain, misalnya, kanal bergerbang voltase. Urutan peristiwa ini adalah dasar bagi pembentukan impuls saraf. Selain itu, influx ion tertentu, seperti Ca^{2+} , dapat mengubah aktivitas enzim sitoplasma tertentu. Satu kelompok besar kanal bergerbang ligan berfungsi sebagai reseptor untuk neurotransmitter.
- Reseptor hormon steroid berfungsi sebagai faktor-faktor ligan-diregulasi factor transkripsi. Hormon steroid menyebar di seluruh membran plasma dan mengikat reseptor mereka, yang terdapat di dalam sitoplasma. Pengikatan hormon mengakibatkan perubahan konformasi yang menyebabkan kompleks hormon-reseptor berpindah ke nukleus dan mengikat elemen terdapat di

promotor atau enhancer dari hormone-responsive gen. Interaksi ini menimbulkan peningkatan atau penurunan tingkat transkripsi gen.

- Akhirnya, ada beberapa jenis lain dari reseptor yang bertindak dengan mekanisme yang unik. Beberapa reseptor-reseptor ini, misalnya, reseptor sel B - dan T- yang terlibat dalam respon terhadap antigen asing, berhubungan dengan molekul pemberi sinyal yang dikenal seperti sitoplasma protein-tirosin kinase.

BAB 2

KANAL ION

Membran plasma sel saraf dan otot berbeda dari sel-sel lain dalam tubuh. Sedangkan potensial di dalam membran plasma sel apapun akan berubah ketika permeabilitas ion di membran diubah, hanya terjadi di dalam sel-sel saraf dan otot. Di dalam sel-sel saraf dan otot, permeabilitas ion akan berubah sebagai akibat dari perubahan potensial membran. Sifat ini merupakan konsekuensi dari kehadiran sejumlah besar kanal ion dalam membran plasma yang membuka dan menutup dalam menanggapi perubahan tegangan. Ketika kanal ion terbuka, terdapat hingga 10 juta ion dapat mengalir menghasilkan konduksi pori-pori per detik, membangkitkan arus beberapa *picoamperes* (10-12amps). Kehadiran beberapa ribu kanal memberikan membran plasma kemampuan untuk secara aktif melakukan potensial aksi. Kanal ion bertanggung jawab untuk semua signaling listrik, dan mengatur berbagai proses termasuk keseimbangan osmotik, pelepasan hormon, detak jantung, gerak motorik, belajar, dan memori.

Kanal ion membuat membran plasma permeabel terhadap bagian dari kation anorganik tertentu (Na^+ , K^+ , Ca^{2+}) dan anion (Cl^-). Kanal terdiri dari beberapa subunit yang diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan pori-pori berongga yang memungkinkan difusi pasif satu arah ion baik dari luar sel atau di dalam sel. Beberapa kanal mengizinkan arus natrium, sementara yang lain memungkinkan untuk dilewati oleh ion kalium atau ion kalsium atau ion klorida. Kanal ion tidak terbuka sepanjang waktu, tetapi sebaliknya membuka dan menutup dalam respon pengikatan ligan ekstraseluler (neurotransmitter), pengikatan ligan intraseluler, atau perubahan dalam voltase membran. Mereka memiliki satu atau lebih "gerbang" yang secara mekanis membuka dan menutup pori-pori untuk mengangkut ion dalam menanggapi sinyal pengatur.

A. POTENSIAL MEMBRAN

Potensial membran timbul dari perbedaan konsentrasi ion dan permeabilitas selektif. Sel-sel saraf dan otot, tidak seperti jenis sel lain dalam tubuh, memiliki potensial membran yang cukup besar atau perbedaan potensial membran. Potensial membran timbul dari perbedaan dalam konsentrasi ion antara luar dan dalam lingkungan dan membran selektif permeabilitas untuk ion tertentu karena adanya kanal ion. Untuk melihat bagaimana konsentrasi ion dan permeabilitas selektif menimbulkan potensial membran akan dijelaskan dari empat jenis ion, natrium (Na^+), kalium (K^+), klorida (Cl^-) dan A^- . jenis ion A^- mewakili muatan negatif bersih biomolekul besar yang berada dalam sel. Empat jenis ion didistribusikan di luar dan di dalam sel dalam dua keadaan:

- Keseimbangan osmotik, konsentrasi netto ion di luar sel harus sama dengan konsentrasi netto ion di dalam sel.

- Keseimbangan muatan, muatan netto baik di luar sel dan di dalam sel harus nol.

B. KEMAMPUAN REGENERATIF MEMBRAN DAN POTENSIAL AKSI

Potensial aksi yang dihasilkan oleh gabungan bersama kanal natrium kerja cepat dan kanal kalium kerja lambat. Pembangkitan potensial aksi dimulai ketika ambang batas depolarisasi membuka kanal natrium. Ketika ini terjadi peningkatan permeabilitas membran untuk natrium; menurut persamaan GHK membran terdepolarisasi saat potensi bergerak menuju nilai keseimbangan untuk natrium. Pembukaan kanal natrium mengizinkan masuknya kation-kation natrium masuk ke dalam sel, yang mendepolarisasi membran lebih jauh sehingga memungkinkan pembukaan yang masih lebih lama dari kanal natrium. Keadaan ini berlanjut hanya dalam waktu singkat. Umpan balik positif pembukaan kanal natrium merangsang pembukaan lebih lanjut kanal natrium yang diakhiri ketika kanal inaktif.

Saat ini, kanal kalium juga membuka dalam menanggapi depolarisasi, mulai mendominasi. Penumpukan muatan positif di dalam sel melalui masuknya kation natrium diimbangi oleh penurunan muatan positif melalui pengeluaran kation kalium. Aktivitas yang lebih lambat ini menyebabkan potensial membran kembali ke potensial ion kalium. Pembukaan kanal kalium terus menerus selama beberapa waktu menyebabkan repolarisasi membran, dan memberikan kontribusi terhadap penutupan kanal natrium. Pada awal siklus potensial istirahat sekitar -60mV . Membran terdepolarisasi sejauh potensial aksi mencapai nilai positif karena influx ion natrium. Terjadi repolarizes menuju nilai hiperpolarisasi lebih dari -7mV yang didorong oleh efflux kalium dan kemudian kembali ke potensial istirahat. Tahap hiperpolarisasi penting. Dibutuhkan untuk meringankan inaktivasi kanal natrium, dan menyiapkan membran untuk aktivasi siklus berikutnya dan pencetusan potensial.

Secara ringkas, kanal natrium memulai dan menghasilkan bagian kenaikan potensial aksi; dipertahankan oleh umpan balik positif, dan kanal kalium menghasilkan bagian impuls selanjutnya yang perlahan-lahan menurun. Umpan balik positif dari kanal natrium adalah kunci untuk pembangkitan potensial aksi yang menjalar akson. Setelah depolarisasi kecil dimulai di daerah yang terbatas, penyebaran lateral ion ke ruang di sebelahnya memicu depolarisasi dalam ruang berikutnya dan seterusnya. Impuls tidak berhenti karena depolarisasi kecil memicu depolarisasi yang besar, yaitu sinyal yang diperkuat, sebagai hasil dari umpan balik positif. Dengan demikian, sekali dimulai, sebuah impuls menyebar tanpa kehilangan kekuatan, yaitu impuls regeneratif. Adanya ambang respon “semua atau tidak sama sekali” merupakan konsekuensi dari umpan balik positif dari kanal natrium dan umpan balik negatif dari kanal kalium. Umpan balik negatif hadir karena depolarisasi-diinduksi pengeluaran kalium menyebabkan hiperpolarisasi membran, dengan demikian bertindak secara negatif untuk menutup aliran ion kalium. Sebagai hasil dari kedua bentuk umpan balik ada istilah respon “semua atau tidak sama

sekali". Dibutuhkan sejumlah depolarisasi untuk memicu umpan balik positif yang didominasi influx natrium, dan sekali mulai proses akan berlangsung hingga selesai.

C. KELUARGA KANAL ION

Genom manusia mengandung ratusan gen yang menyandikan subunit kanal ion. Reseptor kanal ion akan bertambah lebih banyak melalui penggunaannya secara luas. Masih banyak bentuk kanal ion yang dihasilkan dengan mencampur bersama berbagai kombinasi subunit. Kanal ion dihasilkan berbeda antara satu sama lain dalam sifat-sifat biofisik mereka dalam beberapa cara. Mereka berbeda dalam:

- Selektivitas ion dan arah gerakan ion,
- Mekanisme gerbang
- Topologi dan rencana perakitan
- Waktu aktivasi dan inaktivasi, dan
- Potensial pembalikan aktivasi dan inaktivasi.

Kanal ion memiliki beberapa bagian pusat. Salah satunya adalah selektivitas, kemampuan untuk melewati beberapa jenis ion melalui membran secara cepat sementara mencegah ion jenis yang lainnya untuk masuk. Bagian yang terkait erat adalah arah pergerakan ion. Kanal ion membiarkan ion melewati dalam satu cara saja. Beberapa membiarkan ion masuk ke dalam sel sedangkan yang lain membiarkan ion meninggalkan sel, tetapi tidak ada yang memungkinkan bagian dua arah. Bagian penting lain dari saluran ion adalah gating, suatu kemampuan untuk membuka dan menutup pori-pori untuk dilewati oleh ion tertentu sebagai respon terhadap tegangan membran dan ligan, intraseluler dan ekstraseluler.

Jenis-jenis kanal ion dapat dikelompokkan ke dalam empat keluarga besar. Seperti dapat dilihat dalam Tabel 1. dua keluarga membuka dan menutup dalam menanggapi perubahan voltase membran, sehingga dikatakan bergerbang voltase. Salah satu keluarga ini mengizinkan perjalanan selektif kation dan keluarga lain memungkinkan perjalanan anion. Dua keluarga lainnya bergerbang ligan. Untuk alasan itu mereka dinamakan sebagai reseptor kanal ion. Kanal ion bergerbang voltase, yang terdapat dalam banyak jenis yang berbeda, dapat lebih jauh dibedakan oleh waktu aktivasi dan deaktivasinya, dan potensial pembalikannya. Yaitu, seberapa cepat mereka membuka dan menutup, dan pada voltase membran Akhirnya, keluarga yang berbeda dari kanal ion dicirikan oleh komposisi subunit dan cara di mana rantai polipeptida untuk setiap rantai subunit bolak-balik melalui membran (topologi).

Tabel 1. Empat keluarga kanal ion yang ditemukan di membran plasma neuron. (Beckerman, M. 2005)

Kanal ion	selektivitas	Topologi subunit	Rangkaian kanal
Kation 6TM		6TM, loop 24TM, 4 loops	<i>Tetramerik</i> <i>Monomeric</i>
Calcium	Ca ²⁺		
HCN	Na ⁺ ,K ⁺		
Potassium	K ⁺		
Sodium	Na ⁺		
Voltage-gated anion			
ClC	Cl ⁻	18TM	<i>Dimerik</i>
Reseptor Cys-loop		4TM	<i>Pentamerik</i>
nAChR	Kation		
GABAA,C	Anion (Cl ⁻)		
Glycine	Anion (Cl ⁻)		
5-HT3	Kation		
Glutamate receptor		3TM, loop	<i>Tertamerik</i>
AMPA	Na ⁺ ,K ⁺		
Kainite	Na ⁺ ,K ⁺		
NMDA	Ca ²⁺		

D. PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN GERBANG KANAL ION


Karakter *non-ohmic* resistensi membran adalah sangat signifikan. Pada non-ohmik, atau *rectifying*, resistor, arus ion melalui kanal jenis tertentu adalah satu arah. Ion akan melewati kanal ion dalam satu arah lebih mudah daripada arah yang lain. Jika ion masuk lebih mudah ke dalam sel, kanal ion dalam keadaan *inward rectifying*, dan jika mereka melewati kanal menuju luar sel, kanal ion dalam keadaan *outward rectifying*. Sifat *rectifying* membran adalah secara alami mengarah pada pengenalan gerbang yang terbuka dan tertutup dekat untuk mengizinkan arus ion melewati kanal.

Untuk model pembukaan dan penutupan kanal natrium dan kalium dalam menanggapi depolarisasi membran saraf, Hodgkin dan Huxley memperkenalkan tiga pintu gerbang. Perlu diingat kanal natrium cepat membuka sebagai depolarisasi membran dan kemudian menutup setelah interval waktu singkat. Hodgkin dan Huxley menggambarkan perilaku ini dalam dua gerbang: aktivasi gerbang dan inaktivasi gerbang. Pada potensial istirahat membran, gerbang aktivasi tertutup dan gerbang inaktivasi terbuka. Setelah melebihi ambang batas depolarisasi, untuk aktivasi, gerbang aktivasi terbuka memungkinkan ion natrium untuk memasuki sel. Lebih lanjut peningkatan depolarisasi memungkinkan gerbang aktivasi untuk membuka sepenuhnya, tetapi menutup pintu gerbang inaktivasi, yang bekerja lebih lambat, dalam menanggapi peningkatan depolarisasi, dengan demikian menutup arus ion natrium.

Gerbang ketiga yang diperkenalkan oleh Hodgkin dan Huxley adalah gerbang aktivasi untuk kalium. Gerbang ini juga dibuka oleh depolarisasi, tapi jauh lebih lambat dari gerbang aktivasi untuk natrium. Sebagai gerbang untuk kanal kalium yang membuka dalam menanggapi depolarisasi, ion kalium meninggalkan sel, sehingga melawan efek pemasukan natrium, dan akhirnya mengatasi repolarisasi sel. Repolarisasi mempercepat lebih lanjut penutupan kanal natrium dan mengarah ke hiperpolarisasi membran. Ketika hal ini terjadi gerbang inaktivasi dibuka; gerbang aktivasi ditutup, dan membran melemas kembali ke potensial istirahat, siap untuk putaran eksitasi berikutnya.


E. PERAKITAN KANAL ION

Saluran ion dirakit dari beberapa subunit yang diatur dengan cara yang umum untuk membentuk pori-pori dimana ion dapat berdifusi. Karakteristik pola subunit milik masing-masing dari empat keluarga saluran ion disajikan dalam gambar___. Dalam kasus kanal kation bergerbang voltase, unit inti, atau modul dasar, terdiri dari segmen polipeptida yang melewati membran plasma bolak-balik sebanyak enam kali sehingga N-C-terminal keduanya berada di sisi (sitoplasma) intraseluler. Seperti digambarkan dalam Gambar 2, ada sebuah *loop* (*helix*) antara segmen transmembran kelima dan keenam (TM5, TM6). Daerah *loop* dari setiap subunit bersama-sama membentuk pori-pori dan filter selektif (bagian tersempit pori-pori) yang memungkinkan jenis ion tertentu untuk mengalir. Pada kanal bergerbang voltase, segmen 4 transmembran (TM4) mengandung sejumlah muatan positif (arginin dasar atau residu asam amino lisin), dan bersama dengan elemen TM1-3 berfungsi sebagai sensor voltase. Pada kanal yang gerbangnya dikendalikan oleh ligan intraseluler, sisi pengikatan untuk regulator berlokasi di segmen C-terminal yang mengikuti TM6.



Gambar 2. Kanal ion subunit pola threading: (a) kanal kalium bergerbang voltase transmembran heliks 5 dan 6 bersama dengan loop membentuk pori-pori konduksi. Residu bermuatan positif dalam segmen transmembran 4 ditambah bagian transmembran heliks 1-3 membentuk sensor voltase. (b) bakteri ClC menampilkan threading 18 alpha heliks dengan panjang yang bervariasi. (c) reseptor asetilkolin kanal ion mengindikasikan keberadaan bagian amino terminal dari loop Cys dekat permukaan membran. (d) Reseptor AMPA kanal ion menunjukkan lokasi segmen

S1 dan S2, yang bersama dengan segmen Flop, membentuk domain pengikatan ligan. (Beckerman, M. 2005)



Gambar 3. Topologi rantai tunggal kanal kation bergerbang voltase. (Beckerman, M. 2005)

Kanal kation bergerbang voltase dirakit dengan salah satu dari dua cara. pada Shaker keluarga dari kanal kalium bergerbang voltase, empat dari enam unit TM inti disusun ke dalam cincin. Pada banyak kanal natrium bergerbang voltase dan kanal kalium bergerbang voltase, residu asam amino yang direplikasi antara empat subunit membentuk domain memiliki satu residu asam amino, (residu 2000 asam amino), $6 \times 4 = 24$ -pass, rantai polipeptida.

Pola *threading* dan rencana perakitan kanal anion bergerbang voltase berbeda dari kanal kation. Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2 (b), rantai polipeptida subunit CIC kanal klorida terdiri dari 18 alphaheliks dengan panjang yang bervariasi. Beberapa heliks melewati membran, tetapi yang lain tidak dan satu heliks tinggal sepenuhnya di dalam sitoplasma.

Dua keluarga kanal ion bergerbang ligan dapat dibagi lagi menjadi beberapa keluarga yang lebih kecil sesuai dengan jenis ligan, atau neurotransmiter yang terikat. Beberapa kanal ion bergerbang ligan mengizinkan perjalanan kation ke dalam sel, sementara yang lain memungkinkan anion seperti klorida untuk memasuki sel. Ketika ion negatif memasuki sel muatan netto di dalam sel menjadi lebih negatif dan tegangan membran bergeser ke nilai yang lebih hiperpolarisasi. Karena potensial aksi yang dihasilkan oleh depolarisasi melebihi ambang batas, masuknya ion negatif seperti klorin menekan *firing*. Neurotransmitter seperti GABA A, C, dan glisin yang beraksi melalui reseptor anionik dirujuk sebagai neurotransmitter inhibitori. Sebaliknya, neurotransmitter seperti glutamat dan asetilkolin yang beraksi melalui reseptor kationik dirujuk sebagai neurotransmitters eksitatori.

F. DESAIN DAN FUNGSI KANAL ION

Saluran ion berbentuk modular dalam desain dan fungsinya sebagai mesin molekul yang kecil. Kanal ion bergerbang voltase adalah desain yang modular. Masing-masing kanal ion adalah mesin molekul kecil dengan subunit inti (α) yang membentuk porinya, sensor voltase dan filter selektivitas. Kanal natrium bergerbang voltase, kalium dan kalsium memiliki satu atau dua regulator subunit β . Saluran kalsium mengandung tidak hanya memiliki sebuah $6TM \alpha_1$ inti subunit dan

subunit sitoplasma β , tetapi juga subunit ekstraseluler α_2 yang berhubungan dengan single-pass transmembran subunit δ oleh jembatan disulfida (subunit α_2 - δ), dan, dalam otot rangka dan beberapa neuron, sebuah subunit 4TM γ . Subunit ini semuanya memiliki peranan regulasi dalam aktivitas kanal.

Gerbang kanal ion adalah perangkat elektro dan kimia-mekanik yang membuka dan menutup dengan perubahan konformasi. Sensor voltase (atau pengikatan domain ligan) terhubung ke heliks yang membentuk pori-pori. Dalam menanggapi perubahan voltase (atau mengikat ligan), modul sensor melakukan aktivitas mekanik pada helices lapisan pori-pori untuk mengubah konformasinya dari tertutup menjadi terbuka. Berbagai mekanisme regulasi ditemui dalam berbagai kanal ion. Termasuk arah arah penghambatan elemen dan regulasi oleh second messenger, subunit $\beta\gamma$ protein G, dan protein kinase dan fosfatase.

Reseptor kanal ion mengubah konformasi dalam menanggapi pengikatan ligan. Seperti kasus signaling reseptor lainnya, mekanisme yang mendasari adalah biasanya alosterik. Reseptor berisi beberapa daerah pengikatan ligan. Pengikatan ligan di daerah regulator pada protein mengubah lingkungan elektrostatik menghasilkan stabilisasi protein dalam subset konformasi yang berbeda. Akibatnya bagian pengikatan di daerah aktif berubah dalam cara yang reversibel.

BAB 3

SISTEM TRANSDUKSI SINYAL

A. RESEPTOR

Sebagian besar sistem homeostatik memerlukan komunikasi sel ke sel melalui *messenger* kimia. Langkah pertama dalam aksi setiap *messenger* kimia interselular adalah pengikatan *messenger* pada target spesifik protein sel yang disebut "reseptor". Pengikatan messenger untuk reseptor kemudian memulai urutan peristiwa dalam sel yang mengarah pada respon sel pada *messenger*.

Istilah "reseptor" dapat menjadi sumber kebingungan karena kata yang sama digunakan untuk menunjukkan "detektor" di lengkung reflex. Kenyataan bahwa "reseptor" memiliki dua makna yang sama sekali berbeda, tapi konteks di mana istilah ini biasanya digunakan membuatnya cukup dapat menjelaskan apa yang dimaksud.

Reseptor adalah protein (atau glikoprotein) yang terletak di membran sel plasma atau di dalam sel, terutama dalam inti. Membran plasma adalah daerah yang paling umum, tempat sejumlah besar reseptor yang tidak larut lemak. Sebaliknya, sebagian kecil messenger yang larut lemak melewati membran (terutama oleh difusi) untuk mengikat reseptor mereka dalam sel. Reseptor membran plasma adalah protein transmembran; terbentang di sepanjang ketebalan. Seperti protein transmembran lain, reseptor membran plasma memiliki segmen dalam membran, satu atau lebih segmen yang membentang dari membran ke dalam cairan ekstraselular, dan segmen lain meluas ke cairan intraseluler. Seperti protein transmembran lain, reseptor sering terdiri dari dua atau lebih subunit non identic yang terikat secara bersama-sama.

Respon dari berbagai tipe sel yang berbeda terhadap *messenger* mungkin berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, neurotransmitter norepinefrin menyebabkan otot polos pembuluh darah berkontraksi, tapi melalui tipe reseptor yang sama, norepinefrin menyebabkan sel endokrin dalam pankreas menghasilkan sedikit insulin. Dalam esensinya, kemudian, fungsi reseptor sebagai molekul "*switch*" yang memunculkan respon sel ketika "diaktifkan" oleh *messenger* yang mengikatnya. Sama seperti ketika "switch" digunakan untuk menyalakan lampu atau radio, satu jenis reseptor dapat digunakan untuk menghasilkan tanggapan yang sangat berbeda di berbagai jenis sel.

Pertimbangan serupa menjelaskan fenomena lebih mengejutkan: satu sel mungkin berisi beberapa jenis reseptor berbeda untuk *messenger* tunggal. Kombinasi *messenger* dengan salah satu jenis reseptor mungkin menghasilkan respon selular yang cukup berbeda. Sebagai contoh ada dua jenis reseptor yang berbeda untuk hormon epinefrin dalam otot polos pembuluh darah, dan hormon ini dapat menyebabkan

kontraksi atau relaksasi otot tergantung pada derajat relatif pengikatan pada dua tipe reseptor yang berbeda. Tingkat pengikatan pada reseptor ditentukan oleh afinitas reseptor yang berbeda untuk messenger.

Sel memiliki reseptor tidak hanya untuk satu messenger. Pada kenyataannya, sebuah sel tunggal biasanya berisi banyak reseptor yang berbeda untuk *messenger* kimia yang berbeda. Karakteristik lain dari interaksi reseptor messenger adalah saturasi dan kompetisi. Pada kebanyakan sistem, respon sel terhadap *messenger* meningkat sama seperti peningkatan konsentrasi messenger ekstraseluler karena meningkatnya jumlah reseptor yang diduduki oleh molekul pembawa. Ada batas atas untuk respon ini, namun, karena hanya sejumlah reseptor yang tersedia terbatas, dan mereka menjadi jenuh di beberapa titik.

Kompetisi adalah kemampuan molekul messenger berbeda yang sangat mirip strukturnya untuk bersaing satu sama lain pada reseptor. Kompetisi terjadi secara fisiologis dengan messenger yang mirip, dan juga mendasari tindakan banyak obat. Jika dokter atau peneliti ingin memodifikasi aksi *messenger* khusus, mereka dapat memberikan molekul saingan, jika tersedia, yang berikatan dengan reseptor untuk messenger ini tanpa mengaktifkan mereka. Ini akan mencegah *messenger* dari pengikatan dan tidak memicu respon sel. Obat-obatan tersebut dikenal sebagai antagonis yang berkaitan dengan *messenger* kimia. Sebagai contoh, beta-bloker, digunakan dalam pengobatan tekanan darah tinggi dan penyakit lainnya, adalah obat yang melawan kemampuan epinefrin dan norepinefrin untuk mengikat ke salah satu dari reseptor beta-adrenergik. Di sisi lain, beberapa obat yang berikatan pada jenis reseptor tertentu memicu respons sel persis seperti jika *messenger* kimia asli telah dikombinasikan dengan reseptor; obat-obatan tersebut dikenal sebagai agonis dan digunakan untuk meniru aksi *messenger*. Sebagai contoh, obat dekongestan efedrin meniru aksi epinefrin.

Regulasi reseptor

Reseptor adalah subjek dari regulasi fisiologis. Jumlah reseptor sel telah (atau afinitas reseptor untuk messenger tertentu) dapat meningkat atau menurun, setidaknya dalam sistem tertentu. Contoh penting dari regulasi tersebut adalah fenomena **down-regulasi**. Ketika tinggi konsentrasi ekstraseluler *messenger* dipertahankan selama beberapa waktu, jumlah reseptor sel target untuk messenger bahwa dapat menurun disebut *down-regulasi*. *Down-regulasi* memiliki efek mengurangi respon sel target terhadap rangsangan yang sering atau intens oleh *messenger* dan sehingga muncul sebuah mekanisme umpan balik negatif lokal. Sebagai contoh, perpanjangan konsentrasi plasma yang tinggi dari hormon insulin, yang merangsang ambilan glukosa oleh sel target, menyebabkan down-regulasi reseptor dan aksi ini mengurangi kemampuan insulin untuk merangsang ambilan glukosa.

Perubahan dalam arah yang berlawanan (up-regulasi) juga terjadi. Sel yang mengalami perpanjangan periode konsentrasi yang sangat rendah dapat memiliki lebih banyak reseptor untuk messenger, dengan demikian meningkatkan sensitivitasnya. Sebagai contoh, hari setelah saraf ke otot dipotong, sehingga menghilangkan neurotransmitter yang dibebaskan oleh saraf tersebut, otot akan berkontraksi sebagai respon terhadap sejumlah neurotransmitter eksperimental yang disuntikkan jauh lebih kecil daripada yang dapat direspon oleh saraf yang terangsang.

Up-regulasi dan *down*-regulasi dimungkinkan karena terjadi degradasi yang terus-menerus dan sintesis reseptor. Penyebab utama dari *down*-regulasi reseptor membran plasma adalah sebagai berikut: pengikatan *messenger* ke reseptornya dapat merangsang internalisasi kompleks; kompleks messenger-reseptor diambil ke dalam sel oleh endositosis. Hal ini akan meningkatkan tingkat degradasi reseptor dalam sel. Dengan demikian, pada konsentrasi hormon yang tinggi, jumlah reseptor membran plasma jenis tersebut menurun secara bertahap.

Peristiwa berlawanan juga terjadi dan berkontribusi pada *up*-regulasi: sel mungkin mengandung penyimpanan untuk reseptor dalam membran vesikula intraseluler, dan ini tersedia untuk penyisipan ke dalam membran melalui eksositosis. Mekanisme penting lain *up*-regulasi dan *down*-regulasi adalah perubahan ekspresi gen yang mengkode reseptor.

Down-regulasi dan *up*-regulasi adalah respon fisiologis, tetapi ada juga banyak proses penyakit dimana jumlah reseptor atau afinitas mereka untuk messenger menjadi abnormal. Misalnya, penyakit myasthenia gravis terjadi karena penghancuran reseptor otot rangka untuk asetilkolin, neurotransmitter yang secara normal menyebabkan kontraksi otot dalam menanggapi rangsangan saraf; Hasilnya adalah kelemahan otot atau kelumpuhan.

B. JALUR TRANSDUKSI SINYAL

Transduksi sinyal

Kombinasi dari messenger dengan reseptor menyebabkan perubahan konformasi dari reseptor. Peristiwa dikenal sebagai aktivasi reseptor, yang selalu merupakan langkah awal yang mengarah pada tanggapan terhadap *messenger*. Tanggapan ini bisa dalam bentuk perubahan: (1) permeabilitas, transportasi bahan, atau listrik pada membran sel plasma; (2) metabolisme sel; (3) aktivitas sekresi sel; (4) tingkat proliferasi dan diferensiasi sel; dan (5) aktivitas sel kontraktile.

Meskipun terlihat lima jenis respon tanggapan utama, terdapat sebuah denominatur umum: semua terjadi karena perubahan langsung pada protein sel tertentu. Mari kita ambil beberapa contoh respon yang diinduksi messenger. Pembangkitan sinyal listrik dalam sel-sel saraf mencerminkan perubahan konformasi dari protein membran yang merupakan kanal ion dimana ion dapat berdifusi antara cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler. Perubahan dalam tingkat sekresi glukosa oleh hati mencerminkan perubahan aktivitas dan konsentrasi enzim dalam jalur sintesis metabolik glukosa. Kontraksi otot adalah hasil dari perubahan konformasi protein kontraktile.

Aktivasi reseptor oleh *messenger* adalah hanya langkah pertama menuju respon sel utama (kontraksi, sekresi dan seterusnya). Urutan peristiwa, antara aktivasi reseptor dan respon dapat sangat rumit dan dinamakan "jalur transduksi sinyal". "Sinyal" adalah aktivasi reseptor, dan "transduksi" menunjukkan proses dimana stimulus berubah menjadi respon.

C. KLASIFIKASI RESEPTOR

Tabel 2. Klasifikasi reseptor berdasarkan lokasi dan jalur transduksi sinyal yang mereka gunakan. (Vander, et al. 2001)

1. Reseptor Intraselular (untuk messenger yang larut lemak) bekerja di nukleus

<p>sebagai faktor transkripsi untuk mengubah kecepatan transkripsi gen tertentu</p> <p>2. Reseptor Membran Plasma (untuk messenger yang tidak larut lemak)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reseptor yang bekerja sebagai kanal ion 2. Reseptor yang berfungsi sebagai enzim 3. Reseptor yang mengikat dan mengaktifkan sitoplasmik JAK <i>Kinase</i> 4. Reseptor yang mengaktifkan protein G

Reseptor Inti

Reseptor inti sering berupa molekul lipid. Mereka dapat berdifusi langsung di seluruh lapisan lipid bilayer membran sel dan membran nukleus. Dalam inti, mereka dapat berikatan langsung dengan bahan DNA dan meningkatkan ekspresi. Dalam respon imun, dua molekul yang penting adalah kortikosteroid dan vitamin D, hasil keduanya berupa respon immunosupresif.

Reseptor inti merupakan anggota suatu superfamily yang besar dari factor transkripsi DNA, yang mengatur program yang terlibat dalam suatu spectrum fenomena fisiologis yang luas. Penjajaran sekuen dan bangunan pohon filogenetik menghasilkan suatu klasifikasi keluarga reseptor inti pada manusia menjadi enam kelompok evolusioner dengan ukuran yang tidak sama

Transduksi sinyal reseptor inti:

Reseptor inti dapat dikelompokkan ke dalam dua kelas besar menurut mekanisme aksi serta distribusi subset saat ligan tidak ada. Senyawa lipofilik kecil, seperti hormon alami dapat melewati membrane sel dan mengikat diri ke reseptor-reseptor inti yang terletak di sitosol (NR tipe I) atau nucleus sel (NR tipe II). Hal ini menyebabkan konformasi reseptor, yang dapat memicu sejumlah kejadian-kejadian hilir (tergantung kepada kelas mekanismenya, tipe I atau tipe II) dan akhirnya menyebabkan *upregulasi* atau *downregulasi* ekspresi gen. selain itu, dua kelas tambahan tipe III (yang merupakan varian tipe I) dan tipe IV (yang mengikat DNA sebagai monomer) juga telah diketahui. Oleh sebab itu, reseptor inti dapat dibagi lagi ke dalam empat kelas mekanisme.

Tipe I

Pengikatan ligan ke reseptor inti tipe I di dalam sitosol menyebabkan disosiasi atau pemisahan protein-protein homo-dimerisasi, translokasi atau perpindahan dari sitoplasma ke inti sel, dan pengikatan ke sekuen DNA spesifik yang dikenal sebagai unsur respons hormone (hormone response element, HRE). Reseptor inti tipe I mengikat diri ke HRE yang terdiri dari dua tempat ikatan yang dipisahkan oleh DNA dengan panjang yang berbeda-beda (*direct repeat*), dan satu tempat ikatan separuh yang sekuennya kebalikan dari tapak yang pertama (*inverted repeat*). Reseptor inti tipe I termasuk anggota sub-famili 3, seperti reseptor androgen, reseptor estrogen, reseptor glukokortikoid, dan reseptor progesteron.

Sejumlah reseptor inti dari subfamily 2 dapat mengikat diri ke HRE *direct repeat*, bukan ke HRS *inverted repeat*. Selain itu, sejumlah reseptor inti mengikat diri sebagai monomer atau dimer hanya dengan satu domain pengikatan DNA pada reseptor yang melekat satu ke HRE. Reseptor inti ini ligan endogennya masih belum diketahui.

Kompleks DNA/reseptor inti kemudian mencari protein lain yang mentranskripsi DNA hilir dari HRE ke RNA pembawa pesan dan akhirnya protein sehingga akan mengubah fungsi sel.

Tipe II

Berbeda dengan tipe I, selain mengikat diri ke DNA sebagai heterodimer (biasanya dengan RXR), reseptor tipe II terdapat di dalam nucleus. Jika ligan tidak ada, reseptor inti tipe II seringkali membentuk kompleks dengan protein *corepressor*. Pengikatan ligan ke reseptor inti menyebabkan pemisahan *corepressor* dan protein koaktivator. Protein-protein lain seperti RNA polymerase kemudian dibawa ke dalam kompleks NR²DNA yang mentranskripsi DNA menjadi RNA pembawa pesan. Reseptor inti tipe II termasuk subfamili 1, misalnya: reseptor asam retinoat, reseptor retinoid X, dan reseptor hormone tiroid.

Tipe III

Reseptor inti tipe III (terutama subfamily 2) sama dengan reseptor tipe I karena kedua kelas ini mengikat diri ke DNA sebagai homodimer. Namun, berbeda dari tipe I. Reseptor inti tipe III mengikat diri ke HRE *direct repeat*, bukan HRE *inverted repeat*.

Tipe IV

Reseptor inti tipe IV mengikat diri sebagai monomer atau dimer, namun hanya satu domain pengikatan DNA pada reseptor ini yang mengikat diri ke suatu tempat ikatan HRE. Reseptor tipe IV ditemukan pada sebagian besar subfamili reseptor inti.

Reseptor Kanal ion

Kanal ion teraktivasi ligan adalah kanal ion yang diatur dengan mengikat molekul ekstraseluler atau intraseluler yang disebut ligan. Ligan mengikat ligan spesifik mengikat domain terletak di segmen subunit transmembran saluran yang mengakibatkan perubahan konformasi yang dapat beralih keadaan saluran antara terbuka dan tertutup. Gerbang ligan kanal ion hadir terdapat dalam jumlah yang besar dalam sistem saraf pusat dan terlibat dalam beberapa fungsi seperti kecemasan, saraf involunter, kejang, pembelajaran dan memori. Dalam sebagian besar saluran ini dalam SSP, ligan adalah neurotransmitter seperti asetilkolin, glutamat, Aspartat dan GABA. Neurotransmitter adalah contoh ligan ekstraseluler yang beraksi pada kanal ion. Di sisi lain, ligan intraseluler kedua umumnya adalah yang terdapat di dalam sel seperti inositol trifosfat (IP₃) dan ATP.


Reseptor asetilkolin nikotinik

Didistribusikan dalam sistem saraf pusat dan tepi, kanal ion ini terlibat dalam transmisi sinaptik dan transmisi sinyal di persimpangan saraf-otot. Reseptor ini memiliki struktur pentamerik yang terdiri dari 5 subunit α , β , δ disusun dalam berbagai rasio dan ion tengah melakukan pori-pori/ γ . Ligan endogen termasuk asetilkolin, kolin dan ligan eksogen yaitu nikotin dan alkaloid beracun epibatidine yang didapatkan dari katak. Pengikatan ligan menginduksi perubahan konformasi dan mengakibatkan masuknya kation seperti Na⁺, K⁺ dan Ca²⁺. Di neuron, masuknya Ca²⁺ menginduksi pelepasan neurotransmitter dari vesikel sinaps. NM

(*Neurotransmitter Muskarinik*) dan NN (*Neurotransmitter Nikotinik*) adalah dua jenis reseptor asetilkolin nikotinik; NM terletak di persimpangan saraf-otot sementara NN terletak di sinapsis saraf. Senyawa karbakol, karbamat yang digunakan dalam pengobatan retensi urin pasca operasi dan suksinilkolin yang biasa digunakan sebagai relaksan otot untuk intubasi trakea bertindak sebagai agonis pada reseptor NM. antagonis reseptor NM termasuk α -bungarotoxin ditemukan di Taiwan relaksan otot dan krait yang digunakan dalam prosedur bedah seperti atrakurium, pankuronium, dan tubourarin. Reseptor NN terutama terletak di ganglia otonom dan antagonis di saluran ini termasuk mekamlamin, trimetofan dan hexametonium, semua obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan tekanan darah tinggi di masa lalu.

Reseptor GABA_A

Terutama berlokasi di otak, reseptor GABA adalah target untuk aksi neurotransmitter inhibisi utama di otak, yaitu GABA. Reseptor GABA_A adalah kanal ion teraktivasi ligan sementara reseptor GABA_B adalah reseptor metabotropik/GPCRs. Seperti reseptor asetilkolin nikotinik, reseptor GABA_A juga memiliki struktur pentamerik dengan 5 subunit. Fungsinya untuk konduktansi ion klorida (Cl⁻) dan masuknya anion ini menyebabkan membran mengalami hiperpolarisasi menuju penghambatan transmisi sinyal. Agonis GABA endogen pada reseptor GABA_A dan antagonis bikukulin yang kompetitif di tempat pengikatan GABA. Bikukulin digunakan hanya dalam studi penelitian pada epilepsi, karena dengan menghambat GABA, menyebabkan saraf tereksitasi. Sebagian besar obat-obatan secara klinis digunakan dengan aksi mengikat reseptor GABA_A untuk situs alosterik lain untuk mengarahkan aksi regulator alosterik positif termasuk barbiturat dan benzodiazepin yang digunakan untuk sedative-hipnotik, ansiolitik, antikonvulsan dan otot relaksan; propofol dan etomidat digunakan sebagai agen induksi pada anestesi umum; karisoprodol dan meprobamat yang digunakan sebagai obat untuk merelaksasi otot dalam kondisi spastik. Konduksi Cl⁻ difasilitasi oleh mekanisme yang berbeda; Barbiturat melakukan hal ini dengan memperpanjang waktu pembukaan kanal sementara benzodiazepin meningkatkan frekuensi pembukaan kanal.



Gambar 4. Reseptor GABA_A dan daerah pengikatan ligan. (Jacob, 2017)

Reseptor ionotropik glutamat


Glutamat dan Aspartat adalah dua neurotransmitter eksitatori utama di CNS dan distribusi utama reseptor glutamat adalah di otak. Reseptor ini menunjukkan afinitas tinggi untuk glutamat dibanding aspartat. Berdasarkan afinitas untuk ligan selain glutamat, reseptor ionotropik glutamat diklasifikasikan menjadi empat sub tipe yaitu AMPA, NMDA, Kainat, dan reseptor Delta.

Reseptor AMPA

Reseptor ini menunjukkan afinitas tinggi untuk asam α -amino-3*hydroxy*-5-*methyl*-4-*isoxazolepropionic* (AMPA). Didistribusikan terutama dalam otak dimana ia terlibat dalam sinapsis plastisitas dan proses dari perpanjangan potensiasi (LTP) sinyal saraf, yang merupakan mekanisme yang mendasari dalam belajar dan memory. Reseptor AMPA memiliki konformasi tetramer yang terdiri dari 4 subunit yaitu GluR1, GluR2, GluR3 dan GluR4. Saluran bebas-selektif permeabel kation seperti Na^+ , K^+ dan Ca^{2+} . Masuknya kation ke dalam sel menginduksi depolarisasi membran yang fungsinya mengarahkan eksitasi sel dan fungsi ini terlibat dalam potensial eksitatorik dan epileptogenik pada hiperaktivasi reseptor AMPA. Agonisnya mencakup AMPA dan asam glutamat dan antagonis endogen kynurenin. Regulator alosterik digunakan dalam farmakoterapi; agen positif alosterik termasuk piracetam, digunakan dalam pengobatan myoclonus dan cyclothiazide, diuretik digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Regulator alosterik negatif termasuk perampanel, antikonvulsan yang disetujui FDA US digunakan dalam pengobatan kejang parsial dan kejang tonik-klonik generalisata.

Reseptor NMDA

Dinamakan Reseptor NMDA setelah afinitasnya untuk sintesis senyawa N-*methyl*-D-*aspartate* menyerupai aksiligan endogen, glutamat. Reseptor NMDA menunjukkan afinitas yang sama untuk dua ligan endogen-glutamat dan glisin, dimana glutamat bertindak sebagai agonis dan glisin sebagai ko-agonis. Fungsi saluran bergantung pada pengikatan kedua ligan dan juga pada tegangan membran; gerbang kanal diatur oleh pengikatan ligan arus ion yang melalui saluran gernbang terbuka yang bergantung pada tegangan membran. Mg^{2+} dan Zn^{2+} bertindak sebagai regulator penghambatan reseptor oleh pengikatan situs reseptor ekstraseluler membran. Depolarisasi menghambat Mg^{2+} dan aliran ion Zn^{2+} dan mengaktifkan kembali konduktansi ion melalui kanal. Reseptor NMDA adalah *heterotetramer* dari subunit dua GluN1 dan GluN2. Tiap subunit masing-masing memiliki tiga domain yaitu domain ekstraseluler, domain transmembran dan domain sitoplasma. Domain ekstraseluler GluN1 mengikat glisin dan GluN2 mengikat glutamat; domain transmembran berisi pori-pori untuk arus ion dan domain sitoplasma ini berisi sisi pengikatan untuk pengaturan oleh kinase dan fosfatase. Agonis reseptor NMDA termasuk glutamat, aspartat, serin dan sikloserin. NMDA adalah agonis parsial. Antagonis termasuk agen anestesi ketamin dan Nitro; memantin yang digunakan dalam penyakit Alzheimer; dextromethorphan digunakan sebagai antitusif dan phencyclidine/PCP.



Gambar 5. Kompleks reseptor NMDA. (Jacob, 2017)

Reseptor Ryanodine

Reseptor Ryanodine pada dasarnya adalah kanal intraseluler yang mengatur *signaling* kalsium. Penamaan kanal berasal dari afinitasnya terhadap tanaman alkaloid ryanodine. Ada tiga isoform reseptor ryanodine: RyR1, RyR2 dan RyR3 yang terdistribusi di otot rangka, miokardium dan otak. Dalam otot rangka, reseptor ryanodine berpasangan dengan reseptor dihydropyridine yang merupakan kanal Ca^{2+} tipe L dan terlibat dalam mekanisme kopling penggabungan eksitasi-kontraksi. Dalam otot halus dari miokardium, masuknya Ca^{2+} melalui kanal Ca^{2+} teraktivasi tegangan mengaktifkan reseptor *ryanodine* melepaskan lebih lanjut Ca^{2+} dari penyimpanannya di retikulum sarkoplasma. Mekanisme ini disebut sebagai kalsium menginduksi pelepasan kalsium (CICR). Agonis reseptor ryanodine meliputi agonis endogen siklik ADP ribosa dan agen lain yaitu kafein dan obat anti-trypanosomal suramin. Dalam gangguan autosomal dominan yang jarang disebut ganas hipertermia (MH), ada peningkatan aktivitas reseptor ryanodine karena mutasi gen RYR1.

Reseptor Inositol triphosphate

Reseptor Inositol trifosfat atau InsP3R terletak di intra seluler dan didistribusikan di hampir semua jenis sel. Terletak berdekatan dengan penyimpanan Ca^{2+} intraseluler, InsP3R terlibat dalam pelepasan Ca^{2+} rilis dari penyimpanannya. Reseptor diatur oleh dua ligan yang merupakan *second messenger*, Inositol-1,4,5 trifosfat dan Ca^{2+} . Aktivasi phospholipase C menyebabkan hidrolisis dari phosphatidylinositol 4,5 bisphosphate (PIP2) memproduksi inositol trifosfat (IP3) dan diasil gliserin (DAG). IP3 yang larut dalam air berdifusi ke dalam sitoplasma yang mengikat reseptor trifosfat inositol dan menginduksi pelepasan Ca^{2+} dari penyimpanannya di sarkoplasma endoplasmik/sarkoplasma. Proses ini disebut sebagai kalsium diinduksi rilis kalsium (CICR). Agonis meliputi produk jamur adenosphostins yang diperoleh dari *Penicillium brevicompactum* dan antagonis termasuk obat antimalaria kina, quinidine dan klorokuin; immunosuppressan tacrolimus dan antikoagulan heparin.


Reseptor Purinergic P2X

Purinergik atau *purinoreseptor* terlibat dalam beberapa jalur signaling sel seperti proliferasi sel, sekresi sitokin dan apoptosis. Reseptor Jenis P1 dan P2Y, P2T dan P2U semua adalah reseptor metabotropik sementara reseptor P2X adalah kanal ionotropik teraktivasi ligan. Karena masuknya Ca^{2+} melalui saluran P2X terbuka; reseptor ini terlibat dalam inisiasi kontraksi otot-otot jantung, otot rangka dan otot-otot halus kandung kemih, vas deferens dan pembuluh darah. Aktivasi hilir calcineurin dan NF κ B terlibat dalam modifikasi ekspresi gen dalam limfosit. Kanal ini memiliki struktur trimeric dengan tiga subunit mengelilingi pusat pori-pori. Untuk aktivasi, 3 ATP molekul mengikat tiga subunit antarmuka. Ada 7 Subtipe reseptor P2X-P2X1 untuk P2X7 dan mereka dapat membentuk heteromultimers seperti P2X2 P2X3 dan P2X4 X6. ATP ekstraseluler adalah agonis endogen reseptor P2X. Antagonis termasuk suramin yang digunakan dalam pengobatan penyakit tidur dan penelitian agen yang bekerja di reseptor P2X1 (dalam trombosis); di P2X3, P2X4, dan P2X7 (dalam nyeri neuropatik); di P2X1, P2X3, dan P2X2/X3 (dalam disfungsi kandung kemih); di P2X7 (dalam *rheumatoid arthritis*, *osteoarthritis* dan depresi).

GPCRs

Kelompok yang dibentuk oleh G *protein-coupled receptor* (GPCRs) adalah yang terbesar dari jenisnya di tubuh. Perkiraan terbaru dari jumlah GPCRs pada manusia jatuh dalam kisaran 800 atau lebih. Jumlah ini terbagi kira-kira setengah antara reseptor yang mengikat sinyal sensorik yang berasal dari luar tubuh (ligan eksogen) dan sinyal yang dihasilkan secara internal oleh sel-sel lain (ligan endogen). GPCRs menghantarkan spektrum pesan yang sangat beragam ke dalam sel. Transduksi sinyal adalah cahaya (fototransduksi), ion kalsium ekstraseluler, tastan (*gustatory*), *odoran*, *feromon* (sinyal sex), bahan berbahaya (nyeri), imunologi (kemokin), endokrin (hormon), dan saraf (*neuromodulator* dan *neurotransmitter*).

Anggota *superfamily* GPCR kadang-kadang disebut sebagai reseptor 7TM karena rantai mereka melewati plasma membran bolak-balik sebanyak tujuh kali. GPCRs menyampaikan pesan ke dalam sel dengan mengaktifkan heterotrimeric G protein dan mengirimkan sinyal melalui jalur pertumbuhan. Dalam ketiadaan GPCR mengikat ligan, heterotrimeric protein G tetap dalam hubungan dekat dengan GPCRs. Ikatan ligan mengarahkan disosiasi protein G dan sinyal melalui *second messenger* yang menargetkan protein kinase/fosforilasi dan kanal ion.



Gambar 6. Reseptor terganggu protein G (GPCRs). (Karp, 2015)

GPCRs merupakan sasaran dari banyak obat-obatan karena keterlibatannya dengan reseptor sangat besar dalam sistem endokrin dan sistem saraf. Diperkirakan bahwa sekitar 40-60% dari semua terapi obat bertarget GPCRs. Beberapa obat bertindak sebagai agonis dan yang lain sebagai antagonis. Agonis menginduksi respon yang sama pada reseptor yang dipicu oleh ligan alami. Antagonis berikatan dengan reseptor tetapi reseptor tidak mengirimkan sinyal dalam menanggapi acara berikutnya. Dengan mengikat reseptor antagonis memblokir akses ligan alami untuk reseptor dan dengan demikian mencegah transmisi sinyal. Obat yang mengikat dalam mode antagonis dikenal sebagai bloker. Contoh-contoh yang menonjol adalah beta bloker, yang menghambat reseptor beta Adrenergik, dan antihistamin, yang menghambat reseptor H1 histamin.

Tabel 3. Proses fisiologis yang diperantarai oleh GPCRs dan Protein G *beterotrimetrik*. (Beckerman, M. 2005)

Stimulus	Reseptor	Efektor	Respon fisiologis
Epinefrin	Reseptor Adrenergik	α - <i>Adenilil siklase</i>	Pemecahan glukagon
Serotonin	Reseptor serotonin	<i>Adenilil siklase</i> cGMP	Sensitisasi perilaku dan belajar pada aplesia
Cahaya	Rhodopsin	<i>Fosfodiesterase</i>	Eksitasi visual
Kompleks IgE-antigen	Reseptor IgE sel mast	<i>Fosfolipase C</i>	Sekresi
Peptida f-Met	Reseptor kemotaktik	<i>Fosfolipase C</i>	Kemotaksis
Asetilkolin	Reseptor muskarinik	Kanal Kalium	Perlambatan aktivitas pacemaker

Kriteria klasifikasi GPCRs


G protein-*coupled* reseptor berbagi sedikit urutan homologi satu sama lain namun semua diatur dalam cara yang sangat mirip. Semuanya merupakan prolin rantai tunggal dengan topologi seperti yang digambarkan di gambar 7. Segmen transmembran terdiri dari residu asam amino hidrofobik yang dibentuk ke dalam alpha heliks. *Helicks* terhubung satu sama lain oleh tiga *loop* ekstraseluler E1-E3 dan tiga *loop* sitoplasma C1-C3. GPCR masing-masing memiliki daerah ekstraseluler N-terminal dan daerah sitoplasma C-terminal. Daerah ekstraseluler dan sitoplasma terdapat dalam jumlah cukup besar. *Loop* ekstraseluler E2 dan segmen N-terminus terutama untuk mengikat ligan. Struktur ini bervariasi dalam ukurannya satu sama lain dalam satu kelas GPCR. *Loop* intraseluler dan ujung sitoplasma heliks transmembran berpartisipasi dalam pengikatan dan aktivasi protein. Ekor sitoplasma ekor dan *loop* intraseluler ketiga (C3), khususnya, memberikan beberapa daerah untuk docking dan interaksi protein.

GPCRs dapat dikelompokkan ke dalam keluarga sesuai dengan karakteristik yang paling menonjol pada domain ekstraseluler dan intraseluler, keberadaan loop, dan struktural penting jembatan disulfide.

Terdapat tiga kelompok besar GPCRs dan daftar kelompok-kelompok kecil dengan beberapa anggota. Beberapa G protein-*coupled* reseptor lebih menonjol memiliki tiga keluarga besar yang tercantum pada tabel 3. Sebagian besar reseptor ini membentuk subfamili kecil. Masing-masing reseptor memiliki beberapa sub tipe dan setiap sub tipe dapat dinyatakan di salah satu dari sejumlah bentuk-bentuk alternatif.

Kelas A berisi sebagian besar GPCRs yang telah dikenal. Sering disebut sebagai keluarga *rhodopsin*, dinamai *rhodopsin* karena molekul ini bertanggung jawab untuk transduksi foton dalam sel-sel batang retina. Reseptor untuk spektrum yang beragam dari ligan termasuk sebagian besar hormon amida dan peptida dan neuromodulators milik keluarga ini. Reseptor kelas A mengikat sejumlah hormon glikoprotein LH, TSH dan MSH menggunakan domain ekstraseluler besar. Glikoprotein mengikat reseptor berbeda dari GPCRs untuk ligan lebih kecil. Reseptor kedua mengandalkan ekstraseluler loop yang dibentuk oleh heliks H3 ke heliks H6.

Kelas B GPCRs, keluarga sekretin, termasuk kalsitonin, 32-amino asam hormon peptida yang dikeluarkan oleh sel-sel "C" dalam kelenjar tiroid yang mengatur konsentrasi kalsium dalam darah. Sekretin, suatu hormon yang dikeluarkan oleh sel-sel "S" dalam usus kecil, merangsang pankreas untuk mengeluarkan cairan yang mengatur keasaman selama pencernaan. Hormon paratiroid (PTH) dan hormon paratiroid terkait protein (PTHrP) mengatur homeostasis tulang dan mineral. Banyak ligan untuk kelas B GPCRs seperti glukagon, sekretin dan VIP/PACAP (peptida usus vasoaktif/hipofisis adenylate cyclaseactivating polipeptida) cukup besar. Reseptor dalam keluarga ini memanfaatkan domain ekstraseluler yang jauh lebih besar daripada yang digambarkan di gambar 7, ditambah dekat ekstraseluler *loop*, untuk mengikat ligan



Gambar 7. Representasi stereotype keluarga rhodopsin (kelas A) G protein coupled reseptor: ditampilkan adalah membrane alpha heliks mencakup tujuh membran H1-H7, tiga ekstraseluler loop E1-E3, dan tiga sitoplasma loop C1-C3. (Beckerman, M. 2005)

Kelas C reseptor termasuk glutamat metabotropik dan reseptor GABA_B yang telah disebutkan sebelumnya. Kelompok GPCRs ini juga dikenal sebagai keluarga glutamat. Reseptor yang sinyalnya berupa kehadiran kalsium ekstraseluler juga termasuk kelompok ini adalah reseptor feromon. Domain ekstraseluler yang luas dan domain intraseluler yang besar adalah ciri kelompok ini. Domain protein ekstraseluler ini berisi dua lobus yang menjepit pada ligan. Domain ekstraseluler ini homolog ke pengikatan bakteri *periplasmic* protein (PBPs). Ini adalah protein yang ditemukan di ruang *periplasmic* antara membran luar dan dalam bakteri gram negatif.

Tabel 4. Tiga kelas utama reseptor GPCRs. (Beckerman, M. 2005)

Kelas A: <i>Rhodopsin family</i>	Kelas B: <i>Secretin family</i>	Kelas C: <i>Glutamat family</i>
<i>Adrenergic</i> α ₁ ,α ₂ ,β ₁ ,β ₂	<i>Calcitonin</i> CTR	Calcium CaR
<i>Angiotensin</i> AT _{1A} ,AT _{1B} ,AT ₂	<i>Glucagon</i> TR	GABA GABA _B R1 and GABA _B R2
Dopamine D1 to D5	<i>Latrotoxin</i> CL ₁ , CL ₂ , CL ₃	<i>Glutamate</i> mGluR1 to mGluR8
<i>Histamine</i> H ₁ ,H ₂	PTH/PTHrP PTH/PTHrPR	
<i>Melanocortin</i> MC ₁ , MC ₅	<i>Secretin</i> SCTR	
<i>Melatonin</i> ML _{1A} , ML _{1B}	VIP/PACAP VIP ₁ ,VIP ₂	
<i>Muscarinic acetylcholine</i> m ₁ , m ₅		
Neurokinin NK ₁ , NK ₂ , NK ₃		
<i>Opioid</i> delta (δ), kappa (κ),		

mu (μ)

***Prostanoid* EP1, EP 4, DP,
FP, IP,TP**

***Purine* A1,A2A,A2B,A 3,
P2Y1, P2Y 6**

***Serotonin* 5-HT receptor
*subtypes***

***Somatostatin* SST1, SST**

***Vasopressin* V1A,V1B,V 2**

Subunit *heterotrimerik* protein G

Seperti namanya, heterotrimeric protein G dibentuk dari tiga subunit yang berbeda. Subunit ini ditetapkan sebagai $G\alpha$, $G\beta$, dan $G\gamma$. Ada 20 subunit $G\alpha$ berbeda, 6 subunit $G\beta$ dan 12 subunit $G\gamma$ yang berbeda. Subunit $G\alpha$ berfungsi sebagai GTPase. Subunit $G\alpha$ dimatikan ketika GDP-terikat dan diaktifkan ketika GTP terikat. GPCRs menyediakan sinyal aktivasi dan juga berfungsi sebagai GEF, mengkatalis disosiasi pengikatan PDB dari keluarga $G\alpha$. Keluarga protein yang disebut regulator G protein signaling (RGS protein) berfungsi sebagai GAPs untuk subunit $G\alpha$. Mereka mengkatalisasi hidrolisis dari GTP oleh subunit $G\alpha$, sehingga menghentikan secara cepat signaling $G\alpha$.

Ada empat jenis subunit protein G alpha. Untuk sebagian besar GPCRs, satu jenis GPCR berpasangan dengan dan mengaktifkan hanya salah satu dari empat jenis subunit alpha. Namun, dalam beberapa kasus, GPCR dapat beralih dari satu jenis subunit ke subunit yang lain. Beberapa bagian dari GPCR berkontribusi terhadap pengikatan G protein spesifik. Daerah di ujung heliks H3, H5, H6, dan loop C2 dan khususnya C3, dan helix pendek (H8) terletak di daerah C-terminal hanya setelah helix H7 terlibat dalam coupling dan mengaktifkan berbagai anggota keluarga heterotrimeric G protein.

Sekali diaktifkan, subunit $G\alpha$ dan $G\beta\gamma$ bebas berdifusi secara lateral di sepanjang permukaan sitoplasma membran plasma, dan mengikat target signaling, terdekat atau efektor. Siklus aktivasi dan signaling selesai dengan hidrolisis dan gabungan kembali subunit $G\alpha$ dan $G\beta\gamma$. Setelah mengikat $G\alpha$, $G\beta\gamma$ menginduksi perubahan konformasi yang substansial dan meningkatkan afinitas $\gamma\alpha$ untuk GDP. Ketika terikat ke $G\alpha$, subunit $G\beta\gamma$ tidak dapat berikatan dengan efekturnya dengan dan sinyal karena daerah pengikatan pada $G\beta\gamma$ untuk efektor tumpang tindih yang untuk $G\alpha$.

Empat keluarga subunit $G\alpha$

Empat keluarga dari $G\alpha$ subunit disajikan dalam tabel 5 Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 5, subunit G_s mengikat dan menstimulasi adenil siklase, sementara subunit G_i menghambat efektor ini. Subunit G_q menstimulasi fosfolipase C, dan efektor subunit G_{12} yang belum teridentifikasi. Setiap keluarga $G\alpha$ berisi beberapa varian. Beberapa varian dan kelompok varian ditemukan di jaringan tertentu sementara yang lain didistribusikan lebih luas. Sebagai contoh, Subunit G_0

adalah spesifik di otak dan keluarga Gi kadang-kadang ditunjuk sebagai Gi/0 untuk merefleksikan dimasukkannya subunit G0 dalam keluarga ini.

Subunit G $\beta\gamma$ menargetkan banyak generator *second messenger* yang sama sebagai subunit G α . Seperti subunit G α , beberapa subunit G $\beta\gamma$ merangsang adenilil siklase sementara yang lain menghambatnya. Subunit G $\beta\gamma$ lainnya menstimulasi fosfolipase C. Subunit G α dan G $\beta\gamma$ bersama-sama menentukan tindakan keseluruhan G protein pada generator *second messenger*.

Tabel 5. Subunit G α pada mamalia. (Beckerman, M. 2005)

Family	Variasi gen	Efektor	Hubungan
Gs	as(S),as(L) aolf	+AC +AC	<i>Olfactory</i>
Gi	ai1,ai2,ai3 a0a,a0b at1,at2 ag az	-AC +PLC,+PLA2 +cGMP, PDE +PLC -AC	Otak Retina Gustatory
Gq	aq,a11,a14,a15,a16	+PLC	
G12	a12,a13		

GPCRs mengirim sinyal yang disampaikan oleh Odoran

Neuron penciuman yang terletak di rongga hidung mengekspresikan reseptor untuk berbagai macam sinyal kimia. Senyawa kimia yang dapat dirasakan, atau odoran, terdapat dalam jumlah ribuan. Termasuk aromatik dan alkohol alifatik, Aldehida, ester, eter dan keton; hidrokarbon aromatik; dan asam alifatik, alkana, dan amina. Perubahan kecil dalam struktur dapat dirasakan dan dikonversi menjadi bau yang berbeda. Reseptor penciuman yang berfungsi sebagai sensor kimia di neuron-neuron ini adalah milik keluarga besar evolusioner kuno grup A GPCRs. Banyak reseptor-reseptor ini memiliki sedikit urutan Homologi satu sama lain, terutama di daerah transmembran H3 melalui H6.

Transduksi sinyal penciuman. Siklik AMP sekarang digunakan sebagai *second messenger* tempat cGMP. Pengikatan tersebut mengaktifkan signaling protein G untuk adenilil siklase tipe III, yang mengkatalisis produksi cAMP dari ATP. Molekul cAMP mengikat siklik nukleotida-gated (CNG) kanal ion mengakibatkan pembukaan mereka. Sinyal awal kemudian diperkuat. Ion kalsium memasuki sel melalui saluran CNG mengikat dan mengaktifkan kanal klorida sehingga tidak hanya melakukan perubahan positif memasuki sel, tetapi perubahan negative.

Sistem penciuman menggunakan skema pengkodean kombinatorial untuk membedakan antara berbagai odoran. Neuron penciuman yang diberikan mengungkapkan satu jenis reseptor bau (atau) gen pada permukaannya. OR masing-masing dapat mengenali beberapa ligan orodan dan setiap jenis bau merangsang jumlah reseptor yang berbeda. Neuron mengekspresikan gen OR spesifik yang tersebar di salah satu dari empat daerah di rongga hidung. Jumlah ligan dikenali oleh

ORs berbeda yang saling tumpang tindih, dan bau tertentu kode oleh kombinasi, atau pola, ORs terletak pada sel yang berbeda. Sinyal tersebut dikirim dari hidung ke gelembung pencium dan dari sana dibawa ke korteks piriform.

Ada dua keluarga reseptor penciuman lainnya selain reseptor tersebut. Ini dinyatakan dalam struktur penciuman kedua, organ *vomerinasal*. Dua keluarga yang dikenal sebagai keluarga V1R dengan sekitar 35 anggota dan keluarga V2R dengan sekitar 150 anggota. Reseptor ini dapat berfungsi sebagai reseptor untuk mamalia *pheromones*. Menariknya, V1Rs adalah kelas A GPCRs dan V2Rs adalah kelas C GPCRs, bebas mengikuti sebagaimana situasi untuk rasa yang mana dua keluarga reseptor ditemukan, satu (T1Rs) milik kelas A dan yang kedua (T2Rs) milik kelas C.

GPCRs dan kanal Ion berespon terhadap rasa

Ada lima rasa utama, yaitu asin, manis, asam, pahit dan *umami*. Dua ini, rasa asin dan asam, dirasakan melalui interaksi garam dan asam dengan kanal ion khusus. Kanal ion ini memungkinkan untuk ion H^+ , K^+ , dan Na^+ masuk langsung ke dalam sel dan terlokalisasi dalam puting pengecap di lidah. Influx ion-ion ini memicu pembebasan neurotransmitter yang mengarah ke eksitasi sel-sel sensorik lain yang mengakibatkan persepsi rasa asin dan asam. Manis, pahit dan *umami* yang lebih kompleks. Modalitas rasa ini dirasakan melalui reseptor GPCRs.

Sensasi *umami* dihasilkan oleh zat aditif makanan *monosodium glutamat* (MSG). Glutamat yang ditemukan dalam banyak makanan kaya protein seperti daging, produk susu dan makanan laut, dan merupakan nutrisi penting. Umami dirasakan oleh GPCR yang berasal dari mGluR4, reseptor *glutamat metabotropik* milik kelas C GPCRs. Reseptor rasa berbeda dari bentuk neurotransmitter-pendeteksi yang bentuknya kehilangan 50% domain ekstraseluler. Modifikasi ini mengkonversi reseptor dari detektor glutamat afinitas tinggi ke afinitas rendah bentuk yang cocok untuk merasakan asam amino dan rasa manis. Ada tiga reseptor dalam keluarga kelas GPCRs. Mereka dinamakan sebagai T1R1, T1R2 dan T1R3. Mereka membentuk heterodimer dengan satu sama lain yang menghantarkan rasa manis (T1R2/T1R3) dan *umami* (T1R1/T1R3).

Pahit adalah rasa yang sangat penting karena sejak sinyal ditemukan dalam alkaloid dan racun lainnya yang berpotensi berbahaya. Sebuah keluarga yang terpisah dari GPCRs menghantarkan sinyal pahit. Keluarga ini, terdiri dari 30 atau lebih kelas reseptor C, dinamakan T2R. T2R2 terekspresi dengan subunit G protein alpha yang dikenal sebagai *gustducins* (Gg). *Gustducin* ini terkait erat dengan *transducin* (Gt) dan merupakan bagian dari jalur yang menyampaikan sinyal pahit dalam sel. Distribusi reseptor rasa berbeda dari reseptor untuk penciuman. Tujuan dalam penciuman adalah tidak hanya untuk mengenali berbagai macam bau tetapi untuk membedakan antara mereka juga. Seperti disebutkan di atas, setiap neuron mengungkapkan satu jenis reseptor penciuman. Rasa pahit berfungsi sebagai peringatan terhadap zat-zat berbahaya, dan hal ini tidak diperlukan bagi tubuh untuk membedakan antara sensasi pahit yang berbeda. Terdapat banyak jenis

reseptor pahit yang terekspresi di setiap sel dengan demikian memaksimalkan kepekaannya.

BAB 4

TRANSDUKSI SINYAL OLEH LIPID, KALSIMUM, & SIKLIK AMP

Signaling protein sitoplasma dihantarkan ke dalam membran sel plasma dalam menanggapi sinyal yang dikirimkan dari sel-sel lain. Molekul sinyal yang dihantar tergabung dalam modul dan kompleks, merupakan langkah pertama dalam mengubah sinyal ekstraselular ke dalam respons selular. Beberapa jenis molekul pemberi sinyal kecil, terutama, lipid, kalsium dan siklik *adenosin monofosfat* (AMP siklik, atau cAMP), bertindak sebagai perantara *signaling*. Mereka mengikat secara bersama-sama peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah pengikatan ligan dengan membantu mengangkut dan mengatur protein yang berfungsi sebagai transduser sinyal intraseluler utama. Karena peran mereka sebagai perantara *signaling*, molekul kecil ini sering disebut "penyampai pesan kedua (*second messenger*)".

Lokalisasi memainkan peranan yang penting dalam pengaturan jalur *signaling*, terutama sinyal yang berasal dari permukaan sel dan kontrol terakhir di nukleus, sitoskeleton, dan di tempat lain. Membran plasma berkontribusi terhadap lokalisasi ini, tidak hanya berfungsi sebagai pemisah antara bagian dalam dan luar sel, menyediakan media cair untuk penyisipan, gerakan lateral yang seragam, membran plasma juga berperan aktif dalam berlangsungnya proses *signaling*.

A. KOMPOSISI MEMBRAN BIOLOGIS

Membran biologis terdiri dari fosfolipid, glikolipid, protein dan kolesterol. Lipid membran terikat secara bersama-sama melalui interaksi ikatan lemah non kovalen seperti ikatan van der Waals dan ikatan hidrogen yang mengakibatkan terjadinya gerakan di antara membran.

Lipid yang ditemukan pada membran plasma dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar; yang mengandung asam lemak sebagai bagian dari komponen molekul lipid dan yang tidak mengandung asam lemak. Fosfolipid adalah contoh kelompok yang pertama, dan kolesterol adalah contoh yang paling penting pada kelompok kedua.

Fosfolipid

Struktur dasar dari membran plasma dibentuk oleh fosfolipid, yang merupakan salah satu komponen membran yang paling besar. Fosfolipid adalah molekul amfifatik yang memiliki kutub polar (larut air) dan nonpolar (tidak larut air).

Dalam lingkungan berair seperti tubuh, molekul-molekul ini disusun dalam suatu bentuk yang disebut sebagai lipid bilayer, terdiri dari dua lapisan fosfolipid. Daerah polar pada molekul berorientasi pada permukaan luar membran yang dapat

berinteraksi dengan air; daerah nonpolar, asam lemak berada di bagian tengah membran dan menjauh dari air. Fungsi penting lipid bilayer ini adalah untuk menciptakan penghalang semipermeabel. Lipofilik atau bagian yang tidak larut air, zat dapat dengan mudah menyeberangi membrane melalui bagian inti lipid. Contoh penting zat ini termasuk gas, seperti oksigen dan karbondioksida, molekul asam lemak, yang digunakan untuk membentuk energi dalam sel-sel otot.

Bahan-bahan hidrofil, atau yang larut dalam air ditolak oleh bagian hidrofobik interior. Mereka tidak dapat melewati membran dengan mudah. Zat ini harus menyeberangi membran menggunakan mekanisme transportasi khusus. Contoh zat tidak larut lipid yang memerlukan mekanisme transport meliputi molekul hara seperti glukosa dan asam amino, dan semua jenis ion (Na^+ , Ca^{2+} , H^+ , Cl^- , dan HCO_3^-). Oleh karena itu, membran plasma memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan komposisi intraseluler dengan mengizinkan secara selektif zat untuk bergerak masuk dan keluar sel.

Kolesterol

Kolesterol merupakan komponen penting dari membran plasma mamalia. Proporsi kolesterol dalam membran plasma bervariasi dari 10% sampai 50% dari total lipid. Kolesterol memiliki struktur yang kaku. Yang dapat menstabilkan membran sel dan mengurangi mobilitas alami kompleks lipid dari membran. Peningkatan jumlah kolesterol membuat lebih sulit bagi lipid dan protein untuk bergerak dalam membrane. Beberapa fungsi sel, seperti respon dari sel-sel system kekebalan tubuh, kehadiran antigen, bergantung pada kemampuan protein membrane untuk bergerak mengikat antigen. Penurunan fluiditas membrane akibat peningkatan kolesterol akan mengganggu fungsi-fungsi ini.

Tabel 6. Konstituen lipid membran plasma. (Kelly, Laurie. 2005)

Jenis	Lipid	Peranan
<i>Fosfolipid</i>	Fosfatidilkolin	Lapisan luar (exoplasmic)
	Fosfatidiletanolamin	Lapisan dalam (cytoplasmic)
	Fosfatidilserin	Lapisan dalam (cytoplasmic)
	Sphingomyelin	Lapisan dalam (cytoplasmic)
	Fosfatidilinositol	Lapisan luar (exoplasmic)
<i>Glikolipid</i>		Pengenalan antar sel
Kolesterol		Menstabilkan fluiditas membran


Protein

Protein juga berhubungan dengan lipid bilayer dan pada dasarnya mengambang di dalamnya. Protein intrinsik yang tertanam di dalam membran, dan protein ekstrinsik yang ditemukan pada permukaan internal atau eksternal membran. Protein ini menyediakan berbagai fungsi seluler yang penting dengan membentuk struktur sebagai berikut:

- Kanal / saluran
- Molekul *carrier* (pembawa)
- Enzim
- Reseptor kimia


- Antigen

Beberapa protein dapat membentuk saluran melalui membran sel yang memungkinkan bahan-bahan kecil yang larut dalam air seperti ion untuk memasuki atau meninggalkan sel. Protein dapat berfungsi sebagai molekul pembawa yang secara selektif mengangkut molekul berukuran lebih besar yang larut dalam air, seperti glukosa atau produk-produk seluler melintasi membrane. Regulator reaksi kimia spesifik, seperti enzim yang merupakan protein ekstrinsik ditemukan di bagian internal (misalnya adenilat siklase) atau eksternal (misalnya asetilkolinesterase) pada permukaan membran. Reseptor kimia ditemukan di permukaan luar dari membrane sel dan secara selektif mengikat berbagai molekul endogen seperti obat-obatan. Melalui aktivasi reseptor, banyak zat yang tidak mampu memasuki sel dan menyebabkan efek intraseluler langsung dapat mempengaruhi aktivitas intraseluler secara tidak langsung tanpa benar-benar melintasi membran. Protein lain yang ditemukan pada permukaan eksternal dari membrane plasma adalah antigen. Molekul-molekul ini berfungsi sebagai “sel penanda” yang memungkinkan system kekebalan tubuh untuk membedakan antara sel-sel sendiri dan sel asing atau organisme seperti bakteri dan virus.



Gambar 8. Struktur membran sel.

(<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9898/figure/A1970/?report=objectonly>)



Gambar 9. Model fluid mosaik membran sel

(<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9898/figure/A1970/?report=objectonly>)

B. PERANAN LIPID, KALSIMUM, cAMP, DAN KALMODULIN

Lipid

Membran plasma berisi microdomains dan caveola khusus untuk transduksi sinyal. Lipid di membran plasma bervariasi dalam tingkat kejenuhan dan panjang rantainya. Panjang rantai bervariasi, bahkan biasanya memiliki jumlah karbon antara 14 dan 24, dengan 16, 18, dan 20 paling umum pada fosfolipid dan glikolipid. Rantai dengan satu atau lebih ikatan rangkap tak jenuh. Struktur ikatan ini kaku. Dalam rantai saturasi penuh Asil karbon-karbon atom berikatan kovalen dengan dihubungkan oleh ikatan tunggal. Setiap karbon atom dalam sebuah rantai dapat menentukan jumlah maksimum ikatan dengan atom hidrogen, yang dikenal dengan istilah "jenuh." Rantai dapat memutar ikatan karbon-karbon yang ada padanya, dan dapat berikatan dengan kuat.

Caveola adalah domain membran yang kaya akan glicosphyngolipid, kolesterol, dan lipid-anchored protein. Caveola adalah invaginasi kecil bagian luar membran plasma. Mereka memainkan peran penting dalam signaling seperti pada proses transport. Caveola dapat berbentuk pipih, vesicular, berbentuk tabung dan dapat terbuka atau tertutup dari permukaan sel. Caveola adalah bahan yang larut dalam detergen dan diperkaya dengan material pelapis bernama caveolin yang berikatan pada kolesterol. Kolesterol dan sphingolipid yang diperkaya mikrodomains dapat mengapung dan berdifusi ke dalam lapisan lipid bilayer.

Ca²⁺ intrasel

Ca²⁺ intrasel berperan sebagai *second messenger* pada berbagai jalur signaling yang mengatur berbagai proses fungsi seluler. Sinyal Ca²⁺ dicetuskan dari pengikatan hormon atau faktor pertumbuhan pada reseptor transmembran, terbanyak adalah reseptor terganggu protein G (GPCR) atau reseptor tirosin kinase (RTK). Pengaktifan reseptor-reseptor ini akan menghasilkan sejumlah *second messenger* meliputi Fosfolipase C (PLC), yang sekali diaktivasi mengikat fosfatidilinositol 4,5 bifosfat (PIP₂) menghasilkan diasilgliserol dan inositol-1,4,5 trifosfat (InsP₃). InsP₃ kemudian terikat pada reseptor InsP₃ reseptor (InsP₃R), mengaktifkan kanal untuk melepaskan Ca²⁺ dari retikulum endoplasma. Sekali dilepaskan ke sitosol, Ca²⁺ dapat berpartisipasi dalam berbagai kaskade intraseluler dan mengaktifkan jenis kanal Ca²⁺ yang lain.

Konsentrasi Ca²⁺ bebas di dalam sitoplasma pada keadaan istirahat dipertahankan sekitar 100 nmol/L. Konsentrasi Ca²⁺ di dalam cairan interstisial adalah sekitar 12.000 kali lebih besar daripada konsentrasi sitoplasma (yaitu 1.200.000 nmol/L) sehingga terdapat gradient konsentrasi yang kuat dan mengarah ke dalam serta gradient listrik yang juga mengarah ke dalam. Sebagian besar Ca²⁺ intrasel berikatan dengan retikulum endoplasma dan organel lain, dan organel ini merupakan tempat penyimpanan Ca²⁺ yang dapat dimobilisasi untuk meningkatkan konsentrasi Ca²⁺ bebas di dalam sitoplasma melalui kanal bergerbang ligan. Ca²⁺ sitoplasma yang meningkat akan berikatan dengan, dan mengaktifkan sejumlah protein kinase.

Ca²⁺ masuk ke dalam sel melalui berbagai jenis kanal Ca²⁺. Sebagian dari kanal ini bergerbang voltase dan yang lain bergerbang ligan. Tampaknya terdapat


juga kanal yang diaktifkan oleh peregangan. Kanal Ca^{2+} bergerbang voltase sering dibagi menjadi jenis T (sementara/transient) atau L (long-lasting) bergantung pada terjadinya inaktivasi atau tidak selama depolarisasi menetap. Ca^{2+} dipompa keluar sel untuk dipertukarkan dengan 2H^+ oleh $\text{Ca}^{2+}\text{-H}^+$ ATPase, dan ion ini juga dibawa keluar sel oleh antiport yang diatur oleh gradien Na^+ yang mempertukarkan 3Na^+ untuk setiap Ca^{2+} .

Lipid dan Kinase mengaktifasi PKB

Protein kinase B adalah target utama penghantaran sinyal dari melalui membrane-terikat sinyal reseptor melalui lipid *second messenger*. Aktivasinya terjadi dalam dua tahap. Pada tahap pertama produk PI3K, PIP₃ berikatan dengan PKB melalui domainnya PH. Sebagai respon kinase bermigrasi ke membran plasma ketika difosforilasi oleh *3-phosphoinositide*-tergantung kinase-1 (PDK-1) dan kemudian ke lokasi kedua baik oleh kinase lain atau dengan kinase itu sendiri. Sekali diangkut ke membran plasma dan terfosforilasi, enzim PKB sepenuhnya diaktifkan. Seperti yang dibahas sebelumnya PIP₃-dimediasi signaling dihentikan oleh protein fosfatase PTEN yang mengubah PIP₃ menjadi PIP₂.

Protein kinase B terutama terlibat dalam insulin *signaling*. Salah satu target langsungnya adalah glikogen *sintase kinase 3* (GSK3). Dalam ketiadaan insulin signaling, GSK3 aktif, dan ketika memfosforilasi glikogen sintase ia akan menghambat perangsangan enzimatis sintesis glikogen. Sinyalnya berlangsung dengan cukup cepat. Dalam beberapa menit dari pengikatan insulin, PKB diaktifkan dan memfosforilasi GSK3, sehingga menjadi tidak aktif yang selanjutnya tidak mampu memfosforilasi sintesis glikogen. Terakhir, terjadi defosforilasi dan lebih mampu merangsang produksi glikogen. Efek lain dari pengikatan insulin pada GSK3 yang terinaktivasi adalah peningkatan translasi protein. Peristiwa ini juga diperlambat oleh GSK3.

Protein kinase B diaktifkan oleh sejumlah sinyal, bukan hanya insulin. Protein kinase B diaktifkan melalui PI3K ketika faktor pertumbuhan terikat pada anggota keluarga reseptor tirosin dimana reseptor insulin berada. Efek pada sel dari signaling protein kinase B adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidup sel. Kerja ini terutama dilakukan dengan menghambat protein yang mempromosikan bunuh diri sel, atau apoptosis. Dua contoh dari tindakan semacam ini disajikan dalam gambar 10. Contoh pertama adalah penghambatan *Bad signaling*. *Bad* adalah anggota dari kelompok regulator *apoptosis* dikenal sebagai keluarga Bcl-2. Beberapa anggota keluarga Bcl-2 mempromosikan terjadinya apoptosis sementara yang lain menghambatnya. Protein ini diatur oleh fosforilasi. Protein *Bad*, khususnya, mencetuskan *apoptosis*, tetapi aksi ini dihentikan oleh fosforilasi. Ketika PKB sepenuhnya diaktifkan, ia berdifusi dan memfosforilasi *Bad*, sehingga mencegah aksi *proapoptosis*.



Gambar. 10. Survival signaling melalui protein kinase B: (a) dalam ketiadaan PKB signaling Bad bertranslokasi dari sitoplasma ke mitokondria dimana ia memcetuskan respon *apoptosis*. (b) apabila PKB diaktifkan itu fosforilasi Bad, yang kemudian mengikat protein 14-3-3 dan bergerak di dalam sitoplasma. (c) dalam ketiadaan PKB-signaling, faktor transkripsi *Forkhead* (FH) bertranslokasi dari sitoplasma ke inti dimana ia memcetuskan ekspresi gen *proapoptosis*. (d) apabila PKB diaktifkan ia akan memfosforilasi FH, yang kemudian mengikat protein 14-3-3 dan akan bergerak di dalam sitoplasma. (Beckerman, M. 2005)


Contoh kedua disajikan dalam gambar 10 adalah penghambatan *Forkhead* dimediasi transkripsi. Protein *Forkhead* adalah faktor transkripsi. Protein kinase B mengkatalisis fosforilasi substrat pada situs-situs yang ditandai dengan urutan sekuen RXXXS/T. Di antara substrat PKB memiliki urutan sekuen konsensus ini adalah faktor-faktor transkripsi milik keluarga *Forkhead* (FH). Seperti yang terjadi untuk Bad, fosforilasi protein menginaktivasi. Dalam ketiadaan sinyal PKB, protein FH bertranslokasi dari sitoplasma ke nucleus dimana mereka menstimulasi transkripsi gen pencetus apoptosis. Ketika protein kinase B diaktifasi, ia dapat memfosforilasi FH menghasilkan pengikatan, dan imobilisasi oleh protein sitoplasma 14-3-3. Pengikatan pada protein 14-3-3 mencegah FH melaksanakan aksi *anti cell-cycle progression* dan dengan demikian memcetuskan kelangsungan hidup sel. Dalam kedua contoh ini, tanggapan selular signaling lipid-dimediasi protein kinase B adalah untuk kelangsungan hidup, penekanan program bunuh diri sel, dan perkembangan yang terus menerus melalui siklus sel.

Adenilil Siklase dan Fosfodiesterase menghasilkan dan meregulasi second messenger cAMP

Adenilil siklase adalah enzim integral membran yang mengkatalisis konversi ATP intraseluler ke siklik *adenosin monofosfat* (siklik AMP atau cAMP). Organisasi molekul *adenilil siklase* digambarkan dalam gambar 11. Dapat dilihat ada dua daerah transmembran (TM) (M1 dan M2) dan dua daerah sitoplasma besar (C1 dan C2). Masing-masing dengan wilayah transmembran terdiri dari enam heliks membrane spanning sangat hidrofobik yang terhubung dengan *loop* yang pendek. Salah satu daerah sitoplasma terletak di daerah antara TM. Wilayah sitoplasma lainnya adalah

C-terminal ke wilayah membran spanning kedua. Keseluruhan struktur molekul adenilil siklase menyerupai dimer, setiap unit terdiri dari wilayah TM yang diikuti wilayah sitoplasma. Namun, struktur seperti monomer tidak fungsional. Daerah sitoplasma bersama-sama membentuk inti molekul katalitik. Orientasi relatif C1 relatif terhadap C2 adalah penting, dan C1 dan C2 diharuskan untuk proses pengikatan dan katalis.


Besar dan lamanya signaling second messenger siklik nukleotida diatur oleh enzim kelas lain, yaitu nukleotida fosfodiesterase (PDEs). cAMP memiliki kelompok fosfat yang melekat pada karbon 3' dan karbon 5' dari ribosa. PDEs adalah enzim yang mengkatalisasi ikatan hidrolitik dari 3' ikatan fosfodiester di cAMP yang mengakibatkan degradasi ke inert 5' AMP. Mereka juga melaksanakan fungsi yang sama di cGMP untuk menghasilkan 5' GMP inert. PDEs menghentikan signaling *second messenger*. Mereka memodulasi sinyal-sinyal ini berdasarkan amplitudo dan durasi, dan melalui degradasi membatasi penyebaran cAMP ke kompartemen lain dalam sel.



Gambar 11. Organisasi Adenilil siklase. (Beckerman, M. 2005)

Fosfolipid dan Ca^{2+} mengaktivasi PKC

Ada beberapa subfamili protein kinase C (PKC), masing-masing ditandai dengan struktur domain yang sedikit berbeda. Seperti yang digambarkan dalam gambar 2, isozymes berbeda dari PKC memiliki subfamily baik subunit klasik, novel atau atipikal. Pseudosubstrat (PS) adalah bagian dari jaringan yang berinteraksi dengan dan memblok aktivitas domain katalitik, tetapi aktivasinya menghilangkan blok. Ada tiga persyaratan untuk aktivasi penuh protein kinase C. Pertama adalah fosforilasi. Protein kinase C, seperti protein kinase B, diaktifkan oleh fosforilasi. PKC difosforilasi oleh siklin hulu seperti PDK1. Syarat kedua adalah kehadiran subfamili-spesifik *second messenger* yang bertindak sebagai koaktivator.



Gambar 12. Struktur protein kinase C dan protein kinase B: (a) Protein kinase C family — konvensional (c), novel (n) dan atipikal (a). (b) protein kinase B dan PDK1 protein. Singkatan: pseudosubstrate (PS); Pleckstrin Homology (PH); repeat octicopeptide (OPR). (Beckerman, M. 2005)

Karakteristik utama protein PKC adalah isozymes (konvensional) klasik. Enzim-enzim ini diaktifkan oleh kalsium bersama dengan DAG. Domain C1nya mengikat DAG sementara domain C2 nya mengikat Ca^{2+} . Dua bagian lain dari protein, C3 dan C4, membentuk ATP dan mengikat substrat lobus katalitik inti. Pengikatan ligan untuk reseptor mengaktifkan PLC, yang kemudian memecah PIP2 menjadi DAG dan IP3. Yang terakhir merangsang pelepasan Ca^{2+} dari simpanan intraseluler dan bersama-sama Ca^{2+} dan DAG mengaktifkan protein kinase C. Pengikatan DAG ke domain C1 dan Ca^{2+} ke domain C2 memfasilitasi pengangkutan protein ke membran plasma dimana ia berikatan dengan molekul fosfatidilserin yang bermuatan negatif yang terkonsentrasi di sitoplasma. Dalam proses ini domain C1 sebagian besar bertanggung jawab untuk pengenalan fosfatidilserin sementara domain C2 lebih umum untuk membran lipid.


cAMP mengaktivasi PKA, yang meregulasi aktivitas kanal ion

AMP siklik adalah *second messenger* yang bertindak melalui cAMP-dependent protein kinase A (PKA) untuk membentuk jalur signaling cAMP. Jalur ini digunakan untuk menyampaikan berbagai hormon dan sinyal neuron untuk proses transkripsi di nukleus, kanal ion tertanam dalam membran plasma, dan untuk target lain seperti aktivitas sitoskeleton. Jalur signaling cAMP terdiri dari reseptor seperti GPCR, perantara seperti protein G, adenil siklase dan fosfodiesterase membentuk dan mengatur produksi cAMP, dan protein kinase A. Secara spesifik, pengikatan ligan pada GPCR mengaktifkan protein G. Pengikatan ke wilayah sitoplasma dekat membran plasma cukup bagi reseptor untuk diaktifkan oleh wilayah sitoplasma. Setelah diaktifkan, protein G berpindah posisi untuk merangsang produksi cAMP oleh adenil siklase. Molekul cAMP pada gilirannya, mengikat dan mengaktifkan protein kinase A.

Protein kinase A memiliki sepasang subunit katalitik (C) dan sepasang subunit regulator (R). Dalam bentuk yang tidak aktif, unit regulator mengikat ke situs katalitik dan menghambat aktivitas. Pengikatan cAMP ke subunit regulator

mengakibatkan perubahan konformasi yang memungkinkan disosiasi bentuk kompleks unit regulator. Setelah dibebaskan dari subunit regulator, subunit katalitik mampu mengkatalisasi transfer grup fosforil ke targetnya menggunakan ATP sebagai donor grup fosforil. Protein kinase A mampu memfosforilasi sejumlah protein yang berbeda. Pilihan target ditentukan oleh pilihan unit regulator dan lokasi subselulernya. Lokasi spesifik dalam sel ditentukan oleh AKAP.

Kompleks AKAP menyatukan tidak hanya protein siklin tetapi juga fosforilasi protein. PKA bersama-sama dengan protein fosfatase PP1 atau PP2A mengatur pembukaan kanal ion yang tertanam dalam membran plasma. AKAP yang membantu mengatur pembukaan dan penutupan kanal ion disebut reseptor NMDA di neuron di otak.



Gambar 13. Signaling PKA melalui AKAPs mengatur pembukaan kanal ion. Pengikatan neuromodulator pada GPCR memulai signaling pada neuron. Subunit Ga yang telah diaktifkan merangsang produksi cAMP oleh adenilil siklase. Molekul cAMP mengikat subunit regulator dari protein kinase A. Sebagai tanggapan, subunit regulator terlepas dari subunit katalitik, yang kemudian memfosforilasi kanal ion, mengatasi penghambatan oleh protein fosfatase. Setelah beberapa waktu, protein siklin tidak lagi mampu mempertahankan kanal dalam keadaan terfosforilasi dan kanal ion tertutup kembali (tidak ditampilkan). (Beckerman, M. 2005)

Di otak, protein kinase A berpartisipasi dalam "jalur belajar" bersama dengan beberapa protein siklin lain. Interaksi signaling yang bersifat jangka pendek melibatkan pengaturan kanal ion, dan yang bersifat jangka panjang adalah perubahan dalam ekspresi gen.

Kalmodulin

Kalmodulin adalah sebuah sensor kalsium yang terlibat dalam pengaktifkan banyak jalur signaling. Kalmodulin adalah protein yang terdapat dalam jumlah yang besar, terdiri dari 0,1% dari semua protein yang terdapat pada waktu tertentu dalam sel. Kalmodulin berfungsi sebagai sensor kalsium, dan untuk melaksanakan fungsi ini kalmodulin didistribusikan di sepanjang sitosol dan nukleus. Kalsium adalah regulator yang sangat penting dari sel-sel di otak, dan konsentrasi aktif dengan rasio Kalmodulin di neuron mungkin mencapai 2%. Kalmodulin adalah protein kecil, yang terdiri dari 148 residu asam amino. Diatur menjadi dua lobus yang dihubungkan oleh sebuah helix flexible. Kalmodulin memiliki empat situs

pengikatan kalsium; dua berada di lobus N-terminal dan dua berada di lobus C-terminal. Pengikatan kalsium menghasilkan pergeseran dalam populasi kesetimbangan.

Kalmodulin berfungsi sebagai kunci perantara dalam sejumlah jalur signaling. Ketika terikat pada kalsium kalmodulin akan menghasilkan aktivitas PI3K, nukleotida fosfodiesterase dan adenilil siklase, protein siklin seperti multifungsi CaM-dependent protein kinase II (CaMKII), fosforilasi protein seperti CaM-dependent protein fosfatase 2B(PP2B), dan sejumlah regulator sitoskeleton.

BAB 5

TRANSDUKSI SINYAL PADA SISTEM IMUN

Tubuh manusia memiliki tiga pusat signaling dan kontrol utama; sistem kekebalan tubuh, sistem endokrin dan sistem saraf. Masing-masing sistem memiliki sejumlah sel-sel di seluruh tubuh yang khusus untuk signaling. Sel-sel sistem kekebalan tubuh berkomunikasi menggunakan sitokin; sel-sel dari sistem endokrin mengirimkan hormon dan faktor pertumbuhan, dan sel-sel dari sistem saraf menggunakan neurotransmitter dan neuromodulator. Sistem kekebalan tubuh, terdiri dari beberapa organ, kelompok leukosit, dan sejumlah besar messenger ekstraseluler. Tugas sistem kekebalan tubuh adalah untuk mengidentifikasi dan menghancurkan patogen, entitas yang masuk ke dalam tubuh, membentuk dirinya dalam tempat khusus, menggandakan diri, menyebabkan kerusakan, dan keluar. Leukosit, sel darah putih, sangat motil, sel dengan masa hidup yang pendek, yang bergerak melalui sistem kardiovaskular dan sistem limfatik ke dalam jaringan yang rusak. Leukosit membunuh bakteri, protozoa, jamur, dan patogen multiseluler; menghancurkan sel-sel yang terinfeksi virus dan bakteri, dan menghilangkan sel-sel tumor.

Leukosit adalah sel dengan pergerakan yang sangat tinggi yang dapat bermigrasi dari darah ke jaringan dan kembali lagi ke dalam darah. Mereka menanggapi infeksi dengan menyerang dan menghancurkan agen penyebab, atau patogen. Mereka menimbulkan respon inflamasi, respon imun bawaan, dan respon imun adaptif. Respon inflamasi terhadap infeksi memicu respon fisiologis seperti demam dan nyeri, kemerahan dan bengkak, penumpukan sel darah putih, dan peningkatan leukosit di daerah infeksi. Pembentukan lingkungan lokal mencetuskan migrasi leukosit ke daerah infeksi, penghancuran agen invasif, dan perbaikan jaringan yang rusak. Dibutuhkan beberapa hari untuk respon imun adaptif bekerja, dan selama itu respon inflamasi mengandung infeksi.

Respon imun bawaan adalah bentuk filogenetik kuno pertahanan oleh organisme multisel melawan patogen. Respon ini melibatkan pengenalan permukaan sel host yang terletak pada permukaan luar patogen. Molekul tersebut merupakan karakteristik patogen. Karena reseptor dikode oleh genom host dan dengan demikian pengenalan respon ini disebut respon imun bawaan. Lipopolisakarida (LPS) adalah contoh molekul yang dikenal oleh reseptor yang diekspresikan pada sel dari host organisme multiseluler. Lipopolisakarida adalah komponen utama membran luar bakteri gram negatif seperti *Escherichia coli*.

Respon imun adaptif untuk vertebrata sangat unik. Melibatkan produksi antibodi dan memungkinkan host untuk menanggapi patogen yang telah lolos dari

respon imun bawaan, dan patogen yang belum dihadapi sebelumnya. Ada dua keadaan dasar: patogen mungkin berada di luar sel-sel host, atau mereka dapat menyembunyikan diri dalam sel-sel tubuh. Antibodi adalah reseptor yang mengenali dan mengikat antigen, zat-zat asing unik yang berasal dari patogen. Antigen (antibodi Generator) dapat berupa molekul atau struktur yang terletak pada permukaan patogen, toksin yang dikeluarkan oleh patogen, RNA asing, atau molekul lain yang diidentifikasi oleh host sebagai bukan bagian dari host. Pada situasi dimana patogen menyembunyikan diri dalam sel, solusi yang digunakan oleh sistem kekebalan tubuh adalah menyajikan fragmen peptida patogen, yaitu antigen, pada permukaan sel-sel host dimana mereka dapat dilihat dan dapat memicu respon imun. Antigen yang ditemukan pada bagian ekstraseluler diambil oleh leukosit yang khusus untuk mencerna mereka, dan ini disajikan pada permukaan sel leukosit.

Leukosit memediasi respon imun

Respon imun melibatkan deteksi, pergerakan (sel) antara jaringan dan darah, pembentukan lingkungan untuk perlindungan, produksi leukosit yang diperlukan untuk melawan infeksi, dan pemusnahan sel-sel penyerang dan sel yang sakit. Kelompok leukosit terbentuk dari sel induk hematopoietik (pembentukan darah) dalam beberapa tahap perkembangan di sejumlah lokasi di tubuh — di sumsum tulang, di jaringan limfoid, dalam sirkulasi darah, dan dalam jaringan tubuh. Ada dua kategori utama leukosit: sel yang bermigrasi dan keluar dari sistem limfatik dan matang dan berdiferensiasi disana dikategorikan sebagai limfosit. Sel-sel ini adalah pemain kunci dalam respon imun adaptif. Anggota kedua kelompok sel berdiferensiasi dan matang di sumsum tulang. Sel-sel myeloid ini adalah kunci mediator inflamasi dan respon imun bawaan dan tergolong dalam table___ sebagai myeloid yang diturunkan oleh fagosit/ granulosit.

Sel dendritik dan sel mast didistribusikan di seluruh tubuh, bekerja sebagai sentinel yang tujuannya adalah untuk mendeteksi keberadaan patogen. Sebagaimana telah disebutkan, presentasi antigen adalah cara sel menanggapi patogen seperti virus yang bersembunyi dalam sel host. Sistem kekebalan tubuh berinteraksi dengan virus patogen ini dengan mengangkut dan mempresentasikan antigen pada permukaan luar sel penyaji antigen (APC), di mana sel T dapat mengenali mereka melalui pengikatan ligan-reseptor. Dalam peran mereka sebagai sentinel, sel dendritik mampu mengambil bahan-bahan asing dari ruang ekstraseluler dan menampilkan pada permukaan sel untuk pengaktifan sel T. Mereka bersama dengan sel B dan makrofag disebut professional APC. Semua sel berinti dalam tubuh mampu menampilkan peptida yang berasal secara internal di sitosol dari pathogen penyerang. Aktivitas seperti ini konstitutif sehingga dalam ketiadaan patogen hanya molekul-diri yang ditampilkan di permukaan. Proses tampilan dan pengenalan adalah inti dari pengenalan diri melawan non-diri. Jika tidak ditangani dengan pengobatan pasien, mereka mengarah ke penolakan cangkok jaringan dan transplantasi organ.

Banyak leukosit yang tercantum dalam tabel 7. mengandung vesikel yang berisi histamin, hormon, dan agen inflamasi lain; dengan sitokin untuk signaling; dan dengan enzim yang memediasi penghancuran patogen. Mereka melepaskan isi

vesikel (butiran) mereka dalam menanggapi sinyal yang sesuai, dan sehingga mereka disebut granulosit, sementara leukosit yang mampu menelan patogen ditunjukkan dalam tabel 3 disebut sebagai fagosit.

Tabel 7. Sel leukosit sistem imun. (Beckerman, M. 2005)

Leukosit	Fungsi
Limfosit	
Sel dendritik	Antigen presenting cell (APC); sentinel tersebar di seluruh tubuh
Sel B	Menghasilkan antibodi; memperantarai respon imun adaptif; antigen presenting cell
Sel T	Memperantarai respon imun adaptif; membantu sel B untuk berespon terhadap antigen
Sel NK dan sel T sitotoksik	Membunuh sel yang terinfeksi karena virus dan sel kanker
Myeloid yang diturunkan fagosit/granulosit	
Basofil	Bersirkulasi di aliran darah ; memediasi respon inflamasi dan pengangkutan leukosit
Eosinofil	Menetap di jaringan mukosa; membunuh parasite multiselular
Sel mast	Sentinel terdistribusi luas di seluruh tubuh; memperantarai respon inflamasi dan alergi; mengangkut leukosit
Makrofag	Antigen presenting cell; menelan dan mencerna bakteri; jamur; sel yang telah mati
Neutrofil	Menelan dan mencerna bakteri; protozoa, jamur, sel terinfeksi virus, dan sel tumor

Sinyal Leukosit satu sama lain menggunakan sitokin

Leukosit secara terus menerus mengirim dan menerima pesan satu sama lain, bertindak dalam banyak cara seperti sistem saraf yang bertugas mengidentifikasi dan menghancurkan patogen. Sitokin adalah molekul kecil yang disekresikan, biasanya bermassa kurang dari 30kDa. Disintesis dan dikeluarkan oleh leukosit, tersering makrofag dan sel T. Mereka menyampaikan pesan ke leukosit yang lain dan sel-sel non-hematopoietik seperti neuron. Sinyal sitokin memerintahkan leukosit untuk tumbuh, berdiferensiasi, matang, bermigrasi, dan mati. Sinyal merangsang aktivitas antivirus dan antitumor, dan merangsang ketiga jenis respon imun.

Sitokin, seperti banyak protein yang dimiliki oleh lapisan kontrol, pleiotropik, atau multifungsi, dalam aktivitas mereka. Respon fisiologis spesifik yang ditimbulkan oleh sitokin bergantung pada konteks selular. Tanggapan yang berbeda diproduksi di lingkungan selular yang berbeda, yaitu dalam sel yang mengekspresikan campuran berbagai protein. Selain itu, efek spesifik sitokin di leukosit tidak hanya tergantung pada jenis leukosit tetapi juga berdasarkan kondisi fisiologis leukosit. Sebagai contoh, ia akan tergantung pada keadaan pematangan sel.

Sitokin sering bertindak dalam cara yang berlebihan di mana beberapa sitokin yang berbeda menghasilkan respon fisiologis yang sama dalam sel. Beberapa sitokin yang berbeda biasanya diproduksi pada waktu yang sama dan mereka bekerja sinergis. Penerimaan pesan yang disampaikan oleh sitokin sering memicu ledakan sinyal sitokin lain sehingga cascade peristiwa signaling. Sitokin menyampaikan sinyal sesuai yang ditargetkan. Mereka biasanya beroperasi dalam jarak pendek dan memiliki waktu paruh pendek. Namun, mereka dapat menyampaikan sinyal jarak jauh. Misalnya, mereka dapat mengirim pesan ke sumsum tulang untuk menginstruksikan sel untuk membuat lebih banyak leukosit. Akibat keseluruhan signaling sitokin adalah pengaktifan secara akan cepat dan perekrutan sel-sel sistem kekebalan tubuh dalam menanggapi terjadinya infeksi.

Interleukin adalah sitokin yang dikeluarkan sebagian besar oleh sel T. Setelah sel T, monosit (dan makrofag) adalah interleukin conversationalis yang paling banyak. Pesan diterima oleh leukosit lain, tetapi terutama oleh sel-sel B dan T, dan memerintahkan penerima untuk tumbuh dan berkembang dan untuk diferensiasi. Contoh representatif interleukins disajikan dalam tabel 4. Sementara secara lebih luas tapi dikompresi daftar sitokin disajikan dalam tabel 5. Seperti yang dapat dilihat dari tabel 4, sel-sel T mengirimkan beberapa sitokin. Signaling protein ini bekerja secara sinergis satu sama lain dengan cara bergantung pada sel untuk menginduksi berbagai perubahan pada penerimanya.

Meskipun kelompok leukosit berbeda hadir sepanjang waktu, jumlah mereka meningkat ketika terjadi infeksi, dan kemudian jumlah mereka berkurang setelah infeksi diatasi. Banyak dari sel-sel ini dipertahankan dalam keadaan dewasa menunggu sinyal yang memerintahkan mereka untuk berdiferensiasi menjadi spesifik, bentuk yang lebih matang. Aspek ini ditunjukkan dalam tabel dengan jumlah kehadiran diferensiasi dalam daftar petunjuk yang disampaikan oleh interleukins. Namun jenis lain dari instruksi disampaikan oleh interleukins untuk mengekspresikan bagian spesifik yang terletak di permukaan molekul sel, misalnya, yang termasuk ke dalam keluarga immunoglobulin (Ig) dari antigen-binding receptor.

Tabel 8. Protein signaling antara leukosit-ke-leukosit (interleukin). (Beckerman, M. 2005)

Interleukin	Sel pengirim	Sel penerima	Perintah
IL-1	Monosit dan sel	Sel Th	Proliferasi

	dendritik		
IL-2	Sel Th1	Mengaktivasi sel B dan sel T	Pertumbuhan dan proliferasi; produksi Ig
IL-3	Sel Th	Stem sel	Pertumbuhan dan diferensiasi
IL-4	Sel Th2	Mengaktivasi sel B dan sel T	Proliferasi dan diferensiasi; mempromosikan diferensiasi sel Th2; produksi Ig
IL-5	Sel Th2	Mengaktivasi sel B	Pematangan, proliferasi, dan diferensiasi; produksi Ig
IL-6	Monosit dan sel lain	Mengaktivasi sel B	Proliferasi dan diferensiasi; produksi Ig
IL-7	Sel stromal	Stem sel	Faktor pertumbuhan untuk pre-sel T dan sel B
IL-9	Sel T	Sel T	Pertumbuhan
IL-10	Sel B, sel T, monosir	Monosit, sel Th	Menghambat produksi sitokin
IL-11	Sumsum tulang sel stromal	Sel B	Pertumbuhan dan proliferasi
IL-12	Monosit dan sel APC lain	Sel Th1	Mempromosikan diferensiasi sel Th1


Tabel 9. Molekul signaling sistem imun. (Beckerman, M. 2005)

Keluarga dan anggota yang mewakili	Tugas
Toll/IL-1: IL-1, TLR1-10, Toll	Memperantarai respon imun terhadap bakteri patogen; memperantarai respon inflamasi dan menstimulasi limfosit
Tumor necrosis factor (TNF): FasL, TNF α , TRAIL, Apo3L	Memperantarai respon imun adaptif pertumbuhan, proliferasi, dan kematian (apoptosis)
Hematopoietic (reseptor sitokin kelas 1): Prolaktin, EPO, GH, GM-CSF, TPO, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12	Kunci mediator respon imun adaptif, meregulasi dan mengkoordinasi aktivitas leukosit, berfungsi sebagai leukosit spesifik growth-hormon, mempromosikan pertumbuhan dan proliferasi
Interferon/IL-10 (reseptor sitokin kelas 2): IFN α , IFN β , IFN γ , IL-10	Memperantarai respon antiviral dan antitumor, dan mempromosikan respon imun adaptif
Kemokin: IL-8, Rantes, MIP-1	Kemoatraktan leukosit

APC dan penuntun diferensiasi sel T naif ke sel T pembantu

Interaksi antara sel dendritik dan sel-sel naif T yang menuju ke diferensiasi sel T pembantu menggambarkan signaling interleukin. Sel dendritik immature

berfungsi sebagai sentinel di dalam tubuh. Morfologi mereka khusus untuk menangkap antigen dari sekitarnya. Ketika mereka menghadapi antigen, sel dendritik bermigrasi ke organ limfoid sekunder. Mereka berdiferensiasi menjadi sel dendritik menyajikan antigen, dan berinteraksi dengan sel T naif dengan demikian merangsang diferensiasi mereka ke dalam sel penolong T1 atau sel penolong T2 (gambar___). sel-sel penolong T1 dan T2 melakukan fungsi kekebalan tubuh yang berbeda. Sel penolong T1 mensekresikan sitokin yang menstimulasi aktivitas makrofag dalam respon inflamasi. Sel penolong T2 mensekresikan campuran sitokin yang memicu diferensiasi sel B ke dalam antibodi yang melepaskan sel plasma.



Gambar 14. Perkembangan Sel T pembantu: langkah pertama dalam spesifikasi melibatkan interaksi antara sel dendritik immature dan patogen yang mereka jumpai. Interaksi ini menentukan sifat yang tepat dari kompleks reseptor yang diekspresikan pada permukaan penyaji antigen sel dendritik dan jenis sitokin yang disekresikan ketika mereka berinteraksi dengan sel T naif dalam jaringan limfoid sekunder. Diferensiasi dipicu oleh interaksi antara sel dendritik (DC) dan sel T naif (Thp). Thp mengekspresikan IL-2, yang bertindak secara autocrine pada dirinya sendiri, menyebabkan diferensiasi menjadi sel Th1 atau sel Th2. Produksi IL-12 merangsang diferensiasi menjadi sel Th1 dan menghambat pembentukan sel Th2. Produksi IL-4 merangsang diferensiasi menjadi sel Th2 dan menghambat pembentukan sel Th1. (Beckerman, M. 2005)

Lima keluarga sitokin dan reseptor sitokin

Ada lima keluarga sitokin dan reseptor sitokin. Kelimanya secara representative ditampilkan dalam tabel___ . Keluarga pertama dalam tabel adalah keluarga tol/IL-1, yang dinamai interleukin-1 (IL-1) sitokin, anggota pendiri keluarga. IL-1 yang berasal dari makrofag untuk merangsang aktivitas limfosit. Ketika diterima oleh granulosit, IL-1 mencetuskan respon inflamasi. Reseptor tol adalah kunci mediator respon imun bawaan. Ligan mereka tidak sitokin tetapi sebaliknya adalah molekul penanda yang ditemukan pada permukaan patogen.

Keluarga sitokin berikutnya adalah keluarga tumor nekrosis faktor (TNF). Tumor nekrosis faktor superfamili terdiri dari sekelompok ligan dan reseptor yang mengkoordinasikan dan mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup leukosit. Mereka mengkoordinasikan pengembangan organ limfoid dan

struktur inflamasi sementara, merupakan bagian penting dari respon imun adaptif. Satu kelompok dari protein ini menyampaikan sinyal kematian yang menginstruksikan sel untuk bunuh diri, atau mati oleh apoptosis. Fungsi utama dari sinyal-sinyal ini adalah untuk homeostasis, pemeliharaan populasi stabil (dasar) dan pelestarian keseimbangan antara sub-populasi yang berbeda dari sel-sel yang siap untuk menanggapi infeksi masa depan.

Reseptor hematopoietin kadang-kadang disebut sebagai kelas I reseptor sitokin dan reseptor interferon/IL-10 sebagai kelas II reseptor sitokin. Hematopoietin adalah keluarga dengan lebih dari 20 molekul sinyal yang berbeda yang terutama menonjol pada signaling limfosit. Sebagaimana telah disebutkan, interleukin disekresikan oleh makrofag, sel T, dan sumsum tulang. Sel stroma menstimulasi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi beberapa jenis sel. Dalam menanggapi sinyal ini, sel-sel induk berdiferensiasi menjadi progenitor sel B dan sel T; Sel B berdiferensiasi menjadi antibodi yang mensekresikan sel plasma dan sel B dan sel makrofag mengekspresikan komponen inti dari respon spesifik antigennya

Interferon memediasi respon antivirus dengan memperingatkan leukosit lain bahwa terjadi serangan virus dan up-regulasi gen yang produknya memiliki aktivitas antivirus. Selain itu, interferon bertindak sebagai agen antitumor dengan men-down-regulasi gen yang penting bagi proliferasi sel, dan mereka mengatur ekspresi banyak gen yang penting untuk respon imun adaptif.

Terakhir, leukosit dituntun ke daerah infeksi oleh kemokin, sebuah keluarga kecil, 7-15-kDa protein kemoatraktan. Molekul-molekul ini dikeluarkan oleh beberapa jenis sel pada daerah infeksi untuk merekrut leukosit dari darah ke daerah infeksi dalam jaringan. Neutrofil, monosit, fibroblast, sel-sel endotel dan sel-sel epitel mensekresikan kemokin. Kemokin membentuk gradien konsentrasi kimia yang memandu migrasi monosit, neutrofil, eosinofil, dan limfosit, dan menahan gerakan mereka di lokasi yang sesuai.

Peran NF- κ B/Rel dalam respon imun adaptif


Signaling NF- κ B/Rel memainkan peran penting dalam inflamasi, respon imun bawaan, dan respon imun adaptif. Jalur signaling diaktifkan dalam respon terhadap tol-mengikat reseptor yang memiliki beberapa kesamaan dengan jalur aktivasi dalam menanggapi tumor nekrosis faktor. Keduanya memanfaatkan sinyal melalui modul signaling NF- κ B; keduanya menyampaikan sinyal melalui modul MAP kinase, dan keduanya menggunakan adapter milik keluarga TRAF untuk mengikat reseptor hulu ke hilir dalam signaling intraseluler.

Protein NF- κ B adalah faktor transkripsi yang mengatur gen sitokin, kemokin, molekul adhesi, peptida antimikroba dan faktor-faktor lain yang penting untuk respon imun. Dalam ketiadaan aktivasi sinyal, protein ini membentuk sitosolik modul inaktif dengan inhibitor I κ B mereka, dan satu set IKK regulator kinase. Protein IKK terdiri dari dua subunit katalis, IKK α dan IKK β , dan subunit regulator, IKK γ , juga disebut NF- κ B esensial modulator (NEMO). Kedua subunit

katalis IKK mampu untuk memfosforilasi protein IκB. IKKs ini sendiri diaktifkan oleh kinase hulu, dan titik kunci konvergensi dari berbagai regulasi peristiwa yang dipicu oleh sinyal ekstraseluler dan stress intraseluler.

Ada lima anggota keluarga protein NF-κB: NF-κB1 (p50/p105), NF-κB2 (p52/p100), c-Rel, RelB, dan Rel (p65). Dalam ketiadaan aktivasi sinyal, protein ini disimpan dalam bentuk yang tidak aktif di sitosol oleh faktor penghambatan IκB. Ketika efek represif IκBs ditingkatkan, NF-κBs membentuk homo dan heterodimer, kombinasi yang paling umum pada p65/p50, dan translokasi ke nukleus dimana mereka berfungsi sebagai faktor transkripsi. Protein NF-κB1 dan NF-κB2 yang dibentuk dan disimpan di sitosol sebagai prekursor p105 dan p100. Mereka diproses secara proteolitik untuk membuat bentuk-bentuk p50 dan p52 fungsional. Bagian C-terminus yang akan dihapus dari p105 dan p100 berisi serangkaian pengulangan ankyrin yang juga terdapat pada protein IκB dan memediasi penyimpanan mereka. Pengulangan Ankyrin ada 33 residu asam amino, modul interaksi protein-protein.

Dalam ketiadaan aktivasi sinyal, protein IκB mengikat ke daerah di domain Homologi Rel (RHD) NF-κBs, sehingga menutupi lokalisasi mereka nuklir urutan (NLSs) dan memaksa mereka retensi di sitosol. Protein IκB mengandung urutan nuklir ekspor (NESs) dan, ketika mereka pasti nuklir NF-κB dimers, mereka meningkatkan ekspor ke sitosol. Inhibisi pada NF-κB oleh protein IκB mengengang kembali oleh fosforilasi, yang menginduksi diperantarai ubiquitin-degradasi IκBs oleh proteasome 26S (gambar 9.3). Protein IκB mengandung N-terminal serin substrat kinase IκB (IKKs).



Gambar 15. Node NF-κB nod: rangsangan ekstraseluler dan stress intraseluler mengaktifkan protein hulu siklin, yang memfosforilasi IKKs. Hasilnya, IKKs memfosforilasi protein IκB, memicu baik ubiquitinasi/degradasi dan/atau nukleositolasmik bolak-balik, tergantung pada sinyal hulu dan subunit yang hadir. Protein NF-κB membentuk dimers yang bertranslokasi ke nukleus di mana mereka menstimulasi transkripsi gen responsif NF-κB. (Beckerman, M. 2005)

Peran Map Kinase dalam respon imun

Map kinase menyampaikan sitokin dan stres sinyal inflamasi, respon imun bawaan, dan adaptif. Mitogen-diaktifkan protein (Map) kinase menyampaikan sinyal

sitokin, stres, dan sinyal pertumbuhan yang disampaikan kepada mereka dari membran plasma ke nukleus dimana mereka merangsang transkripsi gen target. Ada tiga jalur kinase Map mamalia. Salah satu dari ini, jalur ekstraseluler diatur sinyal kinase (ERK), terutama membawa sinyal pertumbuhan. Dua lainnya, c-Jun NH₂-terminal kinase (JNK) dan jalur p38 Map kinase, menyalurkan sitokin inflamasi dan sinyal stress.

Terdapat tiga modul MAP Kinase. Pertama ini adalah Serin/Treonin kinase, memfosforilasi kinase kedua di dalam modul, yang merupakan dual spesifitas kinase. Kinase tengah memfosforilasi kinase ketiga dalam modul di Treonin dan residu tirosin, oleh karena itu dinamakan spesifitas ganda. Residu target disusun sebagai Thr-X-Tyr, dimana X adalah Glu, Pro, atau Lys ERK, JNK, dan jalur p38. Setelah mereka terfosforilasi, siklin ketiga dan terakhir dalam modul biasanya merangsang aktivitas transkripsional anggota keluarga beberapa faktor-faktor transkripsi. Tiga keluarga, mengaktifkan sinyal mereka di hulu dan hilir target mereka yang digambarkan dalam gambar _____

Ras dan Rho GTPase berfungsi sebagai molekul switch yang me-relay pertumbuhan, sitokin, dan sinyal stres dari reseptor dan adapter dan perantara lainnya ke modul MAP kinase. Ras penting untuk regulasi pertumbuhan sinyal. Ketika gen yang bermutasi di residu tertentu dia bisa terjebak dalam posisi "on" dan akan terus mengirim pesan yang tidak sesuai modul ERK MAP kinase.

Peranan protein adapter TRAF dan DD


Adapter TRAF dan DD menghantarkan sinyal dari reseptor ke sel. Faktor terkait reseptor tumor nekrosis faktor (TNF), atau TRAFs, membantu mengatur signaling node dalam jalur yang menengahi respon imun bawaan dan adaptif dan stres tanggapan. Protein ini berisi domain TRAF pada C-terminus. Domain TRAF terdiri dari dua bagian: domain TRAF-C yang berhadapan dengan reseptor dan domain coiled-coil yang memediasi interaksi dengan TRAF lainnya.

Adapter TRAF bertindak sebagai kunci perantara antara reseptor dan unsur-unsur signaling hilir. Domain N-terminal TRAFs berisi pola yang disebut Zink dan RING *fingers*. Pola tersebut terdiri dari regulasi empat residu sistein dan/atau histidin yang mengikat ion zink, memfasilitasi pembentukan domain kompak yang, bersama dengan domain C-terminus coiled-coil, mengatur penurunan signaling. Ada enam TRAFs pada mamalia, yang dinamakan TRAF1 melalui TRAF6. Protein TRAF2 dan TRAF6 secara krusial terlibat dalam TNF dan signaling tol, dimana mereka berfungsi sebagai adapter yang menghubungkan reseptor untuk menurunkan NF-kBs, signaling AP-1 dan cascades MAP kinase.

Jalur tol/IL-1R memediasi respon imun bawaan

Sekelompok membran plasma-terikat reseptor disebut keluarga Toll/IL-1R memainkan peran kunci dalam tanggapan leukosit terhadap lipopolisakarida bakteri (LPS). Toll/IL-1R diaktivasi dalam respon pengikatan ligan dengan reseptor. Reseptor ini telah identifikasi dalam tanaman, pada serangga (*Drosophila*), dimana ia dikenal sebagai jalur tol Dorsal, dan vertebrata yang dikenal sebagai jalur IL-1R/NF-kB.

LPS adalah komponen utama membran luar bakteri gram negatif seperti *E. coli*. Keberadaan LPS oleh leukosit, terutama makrofag, mengaktifkan jalur signaling Toll/IL-1R. Fokus dari jalur ini adalah nuclear faktor nuklir- κ B (NF- κ B) dan cascade MAP kinase yang menyebabkan aktivasi dari anggota keluarga AP-1 faktor transkripsi seperti c-Jun (gambar___). Pengikatan ligan mengakibatkan aktivasi yang cepat dan translokasi NF- κ B ke nukleus, dimana dan c-Jun meng-upregulasi ekspresi gen untuk IL-1, IL-6, interferon, TNF, molekul-molekul adhesi sel ICAM-1 dan E-selectin, dan Kemokin (IL-8 tidak ditampilkan). Sinyal melalui jalur ini tidak hanya dimulai oleh respon infeksi-mengandung imun bawaan, tetapi juga melepaskan respon imun adaptif.



Gambar 16. Sinyal melalui jalur IL-1/Toll: menunjukkan reseptor IL-1R dan IL-1RAcP yang berhubungan dengan beberapa protein adapter, yaitu, MyD88, Tollip dan ECSIT, yang membantu dalam merekrut kinase dan elemen signaling lain ke membran plasma. Langkah pertama dalam aktivasi mereka adalah perekrutan protein adapter plasma dengan membran. Serin Treonina kinase IRAK (terkait IL1R kinase) dan adaptor TRAF6 kemudian dirangkai di daerah tersebut. Protein ini mengaktifkan sejumlah siklin hulu yang secara kolektif ditunjukkan oleh gambar___ sebagai Tak1/Tab1/NIK, yang kemudian mengaktifkan jalur NF- κ B dan jalur MAP kinase JNK p38. (Beckerman, M. 2005)


Keluarga TNF memperantarai homeostasis, kematian, dan pertahanan hidup

Bunuh diri sel, atau apoptosis sel adalah bagian penting dari respons imun. limfosit T immatur yang tidak merespon dengan baik untuk antigen sendiri dieliminasi di timus melalui apoptosis. Timosit lain yang tidak memiliki pengaturan yang benar pada reseptor sel T (TCRs) dibuang dengan cara ini. Pada akhir respon imun, sel T aktif, matang akan dihilangkan, dan sistem kekebalan tubuh kembali ke tingkat basal dan siap untuk menanggapi infeksi berikutnya. Pemeliharaan tingkat basal jenis leukosit yang berbeda ketika tidak ada infeksi disebut sebagai homeostasis selular. Hal itu bergantung pada apoptosis untuk menghilangkan leukosit superflous.

Mekanisme signaling apoptosis tidak hanya digunakan untuk menghilangkan sel yang salah berfungsi dan leukosit superfluous. Ia menyediakan sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa sel-sel tidak bertahan di luar jaringan yang mereka miliki. Hal ini digunakan oleh sel-sel T sitotoksik untuk membunuh sel-sel yang terinfeksi virus dan sel-sel kanker.

Beberapa jaringan seperti mata, testis, dan bagian dari sistem saraf pusat tidak bisa mentolerir inflamasi. Mereka adalah daerah yang istimewa yang mengisolasi diri dari respon imun. Jika limfosit datang ke dalam kontak dengan sel di salah satu daerah-daerah tersebut, ia akan cepat menjalani apoptosis. Sel-sel tumor yang berusaha menghindari respon imun juga menggunakan mekanisme ini.

Reseptor TNF dapat dibagi menjadi dua kelompok sesuai dengan jenis protein adapter yang mereka gunakan. Anggota dari satu kelompok dari reseptor TNF memiliki pola TRAF mengikat di domain sitoplasma mereka, yang memediasi mengikat TRAFs, sementara anggota grup kedua memiliki pola domain kematian (DD) dan mengikat DD-bearing adapter. Reseptor milik kelompok kedua disebut reseptor kematian karena mereka menyampaikan petunjuk sel bunuh diri (apoptosis) untuk penerimanya. Ligan TNF adalah *single-pass transmembran protein* dengan C-terminus di luar sel dan mereka N-terminus di dalam sitoplasma. Mereka berkontak dengan reseptor TNF yang tereskrepsi pada permukaan sel yang berlawanan. Pengaturan reseptor dan ligan adalah 3:3. Tiga reseptor diatur simetris berhubungan dengan dengan tiga ligan.



Gambar 17. Signaling hulu pada jalur TNF: pengaturan ligan trimerik, reseptor dan adapter menyampaikan pesan untuk sinyal enzim. (a) sinyal Apoptosis disampaikan oleh *domain-beraang receptor* dan adapter diantaranya adalah protein kematian terkait domain Fas (FADD), protein TNF-R-terkait domain (TRADD) dan reseptor yang berinteraksi dengan protein (RIPs). (b) Sitokin inflamasi-(misalnya, IL-6 dan IFN γ) mempromosikan sinyal. (Beckerman, M. 2005)

Peran Hematopoietin dan reseptor terkait

Reseptor hematopoietin mengikat sebagian besar interleukins, sementara seperangkat reseptor mengikat interferon. Anggota dari keluarga hematopoietin sitokin adalah hormon leukosit dan faktor pertumbuhan. Meskipun semua anggota

keluarga ligan ini dan reseptor memiliki struktur yang mirip, ada beberapa perbedaan dalam struktur dan komposisi subunit yang memungkinkan pengelompokan anggota keluarga ke dalam subfamili. Rincian ini disajikan dalam tabel 6. Reseptor Hematopoietik dibentuk dari dua atau tiga subunit, masing-masing adalah single-pass glikoprotein. Masing-masing reseptor berisi ligan-mengikat subunit yang unik untuk tipe reseptor, ditambah satu atau lebih subunit yang umum, atau bersama, dengan beberapa jenis reseptor lainnya. Sejumlah sitokin memiliki rantai beta yang umum (βc); lainnya adalah rantai gamma (γc); dan yang lain memiliki subunit gp130 umum. Kelompok sitokin IL-12 yang tercantum dalam tabel berasal dari pola keseluruhan. Kelompok ini terdiri dari sitokin yang mengikat rantai homodimerik. Reseptor interferon dan IL-10 (kelas II) dibentuk dari beberapa subunit unik dan cara ini berbeda dari kelompok lain dalam tabel, yang secara kolektif disebut reseptor kelas I.

Sel mengatur aktivitas pengikatan reseptor membran plasma dengan memvariasikan komposisi subunit. Sel-sel dapat beralih antara rendah, menengah dan pengikatan afinitas tinggi dengan secara diferensial mengekspresikan subunit reseptor yang berbeda. Beberapa contoh dari bentuk kontrol disediakan oleh reseptor sitokin. IL-2 terdiri dari IL-2R α , IL-2 β , dan subunit IL-2 γ . Rantai IL-2 γ diekspresikan secara luas sementara dua bagian lain dinyatakan dalam mode terbatas. Dengan memvariasikan komposisi subunit reseptor untuk kerabatnya, ligan dapat berubah dari afinitas tinggi ke afinitas rendah dengan satu atau lebih kompleks afinitas menengah. Kemiripan tergantung dari afinitas pengikatan pada reseptor komposisi subunit yang terjadi dalam sistem reseptor IL-12 dan IL-6.

Tabel 10. Hematopoietic dan reseptor interferon, Jaks dan STATs (Beckerman, M. 2005)

Reseptor	Jak	STAT
Kelas I-Hematopoietin sitokin: reseptor homodimer: EPO, PRL, TPO GH	Jak2 Jak2	STAT5a, STAT5b STAT5a, STAT5b, STAT3
Reseptor yang membagi γc: IL-2, IL-7, IL-9, IL-15 IL-4	Jak1, Jak3 Jak1, Jak3	STAT5a, STAT5b, STAT3 STAT6
Reseptor yang membagi βc: GM, CSF, IL-3, IL-5	Jak2	STAT5a, STAT5b
Reseptor yang membagi gp130: IL-6, IL-11	Jak1, Jak2, Tyk2	STAT3
IL-12: IL-12Rβ1, IL-12Rβ2	Jak2, Tyk2	STAT4
Kelas II-interferon/IL-10 : IFNα, IFNβ IFNγ IL-10	Jak1, Tyk2 Jak1, Jak2 Jak1, Tyk2	STAT1, STAT2 STAT1 STAT1, STAT3, STAT5

Sistem interferon: Garis pertama pertahanan tuan rumah pada mamalia terhadap serangan virus

Interferon dikeluarkan ke dalam aliran darah yang mana mereka bersirkulasi ke seluruh tubuh untuk memperingatkan adanya serangan virus yang sedang berlangsung. Mereka memicu respons umum atau global, serangan virus pada sel-sel yang tidak menyerang bersama dengan mereka yang telah diserang. Invasi dari virus dan tahap replikasi virus yang dihasilkan menghasilkan molekul dsRNA (doublestranded RNA). Molekul ini hadir dalam sel hanya ketika virus telah menyerang dan mulai bereplikasi. Kehadiran dsRNA menghentikan serangkaian peristiwa regulasi. Sensor selular dari dsRNA disebut protein kinase R (PKR) diaktifkan oleh protein PKR. Protein PKR mengaktifkan NF- κ B, dan faktor regulasi IFN (IRF), yang berikatan dengan IFN-stimulated responsive elemen (ISRE) untuk mencetuskan transkripsi protein antivirus termasuk interferon. Selain itu, sinyal PKR sinyal mengontrol protein lain untuk menghentikan semua sintesis protein. Aksi ini memblokir kemampuan virus untuk meniru dan membuat protein yang dibutuhkan. Keseluruhan proses berlangsung melalui umpan balik negatif. Kehadiran dsRNA diperlukan untuk aksi PKR.

Transduksi sinyal interferon dimulai ketika ligan mengikat reseptor interferon dimer. Seperti halnya hematopoietin peristiwa ini merangsang perekrutan plasma membran dan aktivasi anggota keluarga Janus protein tirosin kinase. Fosforilasi merangsang perekrutan lebih lanjut protein STAT, yang difosforilasi oleh Jaks. Dalam kasus IFN α / β -diperantarai sinyal, Jak1 dan Tyk2 memfosforilasi STAT1 dan STAT2, yang kemudian membentuk heterodimer yang lebih lanjut berasosiasi dengan protein IRF

Trimer bertranslokasi ke nukleus dimana mereka menstimulasi transkripsi gen IFN α / β -responsif IFN γ memanfaatkan kumpulan sinyal transduser. Jak1 dan Jak2 direkrut untuk membran plasma dan memfosforilasi STAT1s, yang membentuk homodimers yang bertranslokasi ke nukleus di mana mereka menstimulasi transkripsi IFN γ -responsive gen. Sitokin seperti interferon memiliki respon berlapis-lapis. Selain menahan sintesis protein sel dan perbanyakan sel, mereka merangsang produksi enzim yang membunuh virus, merekrut sel-sel yang menyerang sel-sel yang mengandung virus, dan mengatur unsur-unsur lain dari respon imun adaptif.

Kemokin memberikan isyarat pemandu untuk leukosit

Kemokin adalah kemoatraktan yang memandu pergerakan leukosit. Beberapa kemokin adalah kemokin inflamasi sementara yang lain kemokin limfoid. Kemokin inflamasi menarik neutrofil, makrofag, dan leukosit pusat ke respon imun bawaan, makrofag dan neutrofil. Kemokin inflamasi disekresikan oleh beberapa jenis sel-sel termasuk leukosit dan sel-sel endotel yang melapisi pembuluh darah. Kemokin limfoid membantu mengatur arus leukosit dan sel pembagian kompartemen dalam jaringan limfoid. Dengan demikian, mereka bertindak untuk mempertahankan homeostasis antara berbagai populasi limfosit. Sel stromal, sel-sel endotel dan sel-sel lain yang tinggal di organ-organ limfoid menghasilkan molekul signaling ini.

Kemokin memiliki muatan positif dan mengikat heparin dan heparin sulfat, muatan negative polisakarida ditemukan dalam matriks ekstraseluler dan pada permukaan sel-sel endotel bermuatan. Molekul heparin dan heparin sulfat bertindak sebagai reseptor untuk kemokin. Kemokin akan bergerak ketika terikat ke polisakarida-terbungkus substrat dan membentuk gradien konsentrasi kemokin stabil. Migrasi leukosit memandu peningkatan gradien ke daerah target.

Kemokin terikat pada permukaan sel oleh G protein-coupled reseptor (GPCRs), reseptor tujuh transmembran yang terhubung ke protein G. Terdapat empat keluarga reseptor kemokin. Keluarga ini dibedakan satu sama lain berdasarkan struktur dan lokasi kromosomnya. Ciri struktural adalah kehadiran empat residu sistein (C) pada posisi spesifik. Keluarga CXC dan CC cukup besar dengan beberapa anggota masing-masing, sementara dua keluarga kecil, ditunjuk sebagai CX3C dan C, diketahui memiliki masing-masing satu anggota. Keluarga CXC memiliki suatu asam amino yang terletak antara sistein pertama dan kedua; dalam keluarga CC dua sistein berbatasan langsung satu sama lain. Terdapat cukup redundansi; dalam setiap keluarga reseptor-ligan, kemokin dapat mengikat lebih dari satu jenis reseptor, dan reseptor mengikat lebih dari satu jenis kemokin.

Kemokin limfoid membentuk jalur kimia dalam organ limfoid yang memandu migrasi limfosit dari daerah ke daerah membawa serta limfosit yang harus berinteraksi satu sama lain dalam respon imun adaptif. Sel B menarik kemokin (BCA-1), dan kemokin limfoid sekunder (SLC) yang mewakili limfoid kemokin. Mereka mengikat reseptor CXCR5 dan CCR7, masing-masing. Gradien BCA-1 kemokin memandu masuknya sel T dan sel dendritik ke organ limfoid. Demikian pula, gradien SLC sangat penting untuk kompartmental homing sel B dan sel-sel T, yang membantu menetapkan wilayah-wilayah yang berbeda dalam organ limfoid sekunder.

Reseptor sel B dan sel T mengenali antigen

Tahap pertama dari respon imun limfosit adalah produksi antibodi oleh sel-sel B, reseptor yang mengikat antigen spesifik. Ada dua kelas reseptor pengenal antigen, satu set diekspresikan pada sel B dan disebut sebagai reseptor sel B (BCRs), dan set lain diekspresikan pada sel T dan disebut sebagai reseptor sel T (TCRs). Kompleks histocompatibility utama (MHCs) juga mengenali antigen, dan ini dapat dianggap sebagai sebuah kelas ketiga reseptor pengenal antigen. Semua anggota keluarga dari glikoprotein dikenal sebagai immunoglobulins(Igs) yang berbagi struktur serupa dan melipat.

Setiap sel B terekspresi pada permukaannya sejumlah besar molekul Ig tunggal. Ketika sel B bertemu antigen yang ia kenali (yaitu, yang mengikat), ia akan matang dan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan banyak antibodi dengan tipe spesifik. Antibodi ini tidak lagi terikat pada membran reseptor tetapi sebaliknya dikeluarkan dan bebas untuk menyebar dan mengikat antigen spesifik setiap kali antigen terpapar pada permukaan bakteri atau patogen lain. Pengikatan ini tidak hanya menandai objek untuk dihancurkan oleh leukosit lainnya, tetapi juga

menginaktivasi virus dan racun bakteri dengan menghalangi kemampuan mereka untuk berikatan ke target selular mereka.

Terdapat dua sinyal yang berbeda yang dibutuhkan untuk menghasilkan selular responsif. Antigen mengikat BCR adalah langkah sinyaloing pertama. Sel B menelan kompleks antigen-antibodi, memproses antigen, dan menyajikan molekul MHC kelas II pada permukaan sel. Aktivasi Sel T (Th) penolong memiliki reseptor yang mengenali antigen spesifik yang menyampaikan sinyal kedua. Sinyal yang diteruskan ke dalam sel Th memicu produksi dan pelepasan sitokin sel Th. Sitokin berikatan pada reseptor sitokin pada sel B. Sinyal kedua ini memicu diferensiasi dan proliferasi sel B dan pelepasan antibodi yang dihasilkan dari sel-sel plasma.

Sel T menargetkan patogen seperti virus dan bakteri kecil yang bersembunyi di dalam sel-sel lain. Antigen reseptor pada TCRs mengenali urutan peptida pendek, biasanya 8 sampai 15 residu panjang, milik antigen yang telah diproses dan terikat molekul MHC yang dipresentasikan pada permukaan sel-sel MHC. Proses pengenalan TCR berbeda dari pengenalan antigen BCR karena kedua target seluruh molekul, didenaturasi atau bentuk asli protein atau sel-terikat karbohidrat. Molekul BCR maupun TCR memiliki unit pengikat antigen dan signaling yang berbeda. Tidak seperti BCR, TCRs tidak dibuat dalam jumlah dan disekresikan tetapi sebaliknya tetap terikat membran. Ekor signaling reseptor sel T dengan seperangkat rantai secara kolektif disebut CD3. Rantai CD3, dan sepasang z disulfide-terkait rantai, adalah anggota keluarga antibodi yang membantu molekul TCR dalam transduksi sinyal ke dalam sel.

MHCs mempresentasikan antigen pada permukaan sel


Hampir semua sel dalam tubuh manusia mengekspresikan protein MHC pada permukaannya. Antara 10^4 dan 10^6 MHCs kelas I hadir pada permukaan jenis sel yang berinti, dan sejumlah yang sama protein MHC kelas II diekspresikan pada permukaan sel-sel yang mengekspresikan MHC kelas II. Masing-masing alel MHC dapat mengikat 1000 sampai 2000 peptida berbeda yang diwakili di lebih dari 10 eksemplar per sel dan sampai beberapa ratus dalam beberapa kejadian. Ditemukan protein patogen dengan angka-angka yang jauh lebih kecil. 102-104 salinan terakumulasi pada permukaan sel. Peptida patogen memicu tanggapan meskipun mereka hanya sebagian kecil dari populasi total peptida fragmen — dari 0,01 sampai 0,1%. Dengan demikian, MHC harus menunjukkan sensitivitas tinggi dan selektivitas peptida asing sambil mempertahankan responsivitas yang rendah untuk peptidanya sendiri.

Individu yang berbeda mengekspresikan campuran yang berbeda dari molekul-molekul ini. Protein ini terletak pada inti dari diri versus yang tidak dikenali-diri. Tugas MHC adalah menyajikan antigen untuk sel T dan sel NK. MHC kelas I berinteraksi dengan reseptor CD8 pada sel T sitotoksik dan reseptor KIR pada sel NK. MHC Kelas II berinteraksi dengan reseptor CD4 pada sel T pembantu. Anggota kelas I anggota mengikat peptida yang berasal dari molekul-molekul yang ditemui di dalam sitosol sementara anggota kelas II mengikat peptida dari molekul-molekul yang rusak di endosom.

Antigen-mengenalinya reseptor membentuk signaling kompleks dengan Koreseptor

Campuran protein yang terekspresi pada permukaan leukosit merupakan penanda yang unik dari setiap populasi atau sub-populasi yang dimiliki leukosit. Ansambel yang berbeda dari protein mencerminkan tidak hanya jenis leukosit tetapi juga karakterisasi berbagai tahap perkembangan leukosit dan aktivasi/inaktivasi. Protein yang dapat digunakan dinamakan "kluster diferensiasi," atau CD, dinamakan demikian karena asosiasi mereka dengan garis spesifik atau tahap diferensiasi. Protein CD berfungsi sebagai reseptor, koreseptor, dan sebagai sel adhesi molekul.

Protein signaling-transmembran yang membentuk kompleks signaling dengan BCRs dan TCRs diwakili dalam daftar CD. Dua kelas utama sel T dibedakan satu sama lain oleh kehadiran jumlah molekul CD4 atau CD8 pada permukaan mereka. Sel-sel CD4 seperti sel-sel T pembantu memberi sinyal ke leukosit lain untuk berkumpul di tempat infeksi. Molekul CD4 bertindak dalam konser dengan reseptor sel T untuk mengikat peptida yang berasal dari molekul MHC-II terikat antigen. (TCR mengikat peptida, sementara molekul CD4 mengikat MHC-II). Kelompok sel T T_H1, seperti sel T sitotoksik, mengekspresikan protein CD8 pada permukaan mereka. Protein CD8 dalam konser dengan reseptor sel T mengikat peptida yang berasal dari molekul antigen terikat MHC kelas I.



Gambar 18. Jalur transduksi sinyal Reseptor sel T (TCR) menuju ekspresi gen diaktifkan oleh AP-1, NF- κ B, dan faktor transkripsi NFAT: dalam menanggapi pengikatan ligan pada TCR, CD45 (reseptor tirosin fosfatase) dan jumlah CD4 mengaktifkan Fyn dan Lck. Fyn dan Lck memfosforilasi rantai γ , δ , dan ϵ dari kompleks CD3 dan dimer ζ . Setelah terfosforilasi, ZAP-70 yang mengandung dua domain SH2 direkrut dan berikatan pada fosfatirosin dan kemudian diaktifkan melalui fosforilasi oleh Lck. ZAP-70 kemudian berinteraksi dengan PLC- γ , yang kemudian mengikat PIP₂ untuk memproduksi IP₃ dan peningkatan konsentrasi kalsium intraseluler. DAG mengaktifkan PKC, yang berfungsi sebagai kinase hulu untuk aktivasi NF- κ B, sementara ZAP-70 beraksi melalui RasGEF, Ras, dan cascade MAP kinase mengakibatkan aktivasi dari AP-1. (Beckerman, M. 2005)

Beberapa protein transmembran harus mengaitkan diri satu sama lain untuk mengefisienkan sinyal ke dalam sel. Signaling hulu dimulai dengan pengikatan

ligan dan penyatuan TCRs dengan koreseptor CD4 atau CD8 dan rantai CD3. CD3 terdiri dari beberapa rantai terpisah, yang dilambangkan sebagai δ , γ dan ϵ . Selain itu, terdapat rantai keempat, yang disebut ζ . Rantai ini membentuk homo- dan heterodimer yang berhubungan dengan rantai α/β TCR. Rantai CD3 dan ζ memiliki motif tirosin berbasis aktivasi immunoreseptor, atau ITAMs, di daerah sitoplasma mereka. Hal ini memungkinkan rantai CD3 untuk merekrut dan mengikat Fyn dan Lck protein tirosin kinase, memicu serangkaian langkah menuju aktivasi AP-1, NF-kB, dan NFAT -responsive gen.

Signaling melalui TCR dan protein asosiasinya berujung pada transkripsi transkripsi gen-encoding reseptor, transduser sinyal, adhesi sel molekuler, dan sitokin. Salah satu yang paling menonjol di regulasi sitokin melalui TCR adalah IL-2. Dibandingkan dengan transduksi oleh sitokin, signaling melalui TCR jauh lebih kompleks. Langkah menuju produksi IL-2, bersama dengan banyak produk gen lain, melibatkan aktivasi messenger jalur lipid. Tingkat kalsium intraseluler meningkat melalui stimulasi fosfolipase C aktivitas menuju produksi IP3 lebih besar, yang meningkatkan konsentrasi kalsium intraseluler. Ion kalsium bersama dengan kalmodulin mengaktifkan protein fosfatase, calcineurin, yang pada gilirannya, mendefosforilasi dan dengan demikian mengaktifkan factor of activated T cells (NFAT). NFATs bekerja sama dengan anggota keluarga AP-1 faktor-faktor transkripsi dan faktor transkripsi NF-kB. Faktor-faktor transkripsi ini merangsang transkripsi gen yang menyebabkan diferensiasi dan proliferasi sel T.

Kostimulator sinyal antara APC dan sel T

Tugas membedakan antara diri dan non-diri adalah sesuatu yang sulit. Beberapa mekanisme diperkirakan beroperasi untuk memastikan bahwa aksi yang tidak tepat tidak diambil oleh sel-sel T dan sel B. Salah satu mekanismenya adalah harus ada dua aktivasi sinyal independen sebelum sel-sel T dan B sepenuhnya diaktifkan. Sinyal pertama yang disampaikan oleh BCRs dan TCRs yang berasosiasi dengan koreseptor mereka CD4 dan CD8. Set kedua sinyal dikirim ke dalam sel melalui jalur kostimulator. Jalur kostimulator yang paling menonjol adalah sistem CD28/B7 dan jalur signaling CD40 CD40L.

Entri pertama dalam tabel 10 adalah reseptor CD40 dan ligan nya. Mereka adalah anggota dari superfamili TNF. Kostimulator sinyal yang disediakan melalui CD40 adalah bagian penting dari bantuan yang diberikan oleh sel T pembantu. Ligan CD40 terdapat pada sel-sel CD4+ dan CD8+ sel T, sedangkan reseptor CD40 ditemukan pada APC seperti sel B dan sel dendritik. Sinyal melalui CD40 CD40L mengaktifkan sel-sel B istirahat dan sel dendritik secara adekuat menstimulasi sel T.

Reseptor yang tersisa dan ligan semua milik cabang CD28 B7 superfamili immunoglobulin (Ig). Pertama, CD28, secara konstitutif dinyatakan pada permukaan sel-sel T. Sinyal melalui CD28 membantu menentukan bagaimana sel T akan membedakan. Dalam ketiadaan sinyal kostimulator sel T menjalani anergi, menjadi nonresponsif, atau toleran, terhadap antigen yang disajikan pada permukaan sel penyaji antigen (APC). Dalam keadaan ini sel-sel T tidak aktif. Mereka tidak berproliferasi atau tidak mengirim sinyal sitokin. Sinyal kostimulator

tidak hanya mencegah anergi tetapi juga membantu menentukan apakah sel T aktif akan menjadi sel T pembantu atau sel T efektor.

Tabel 11. Kostimulator Limfosit T. (Beckerman, M. 2005)

Reseptor	Ligan	Keterangan
CD40	CD40L	TNF superfamily
CD28/B7		Ig superfamily
CD28	B7-1, B7-2	Positive regulator
CTLA-4	B7-1, B7-2	Negative regulator
ICOS	ICOSL	Positive regulator
PD-1	B7-L1, B7-L2	Negative regulator

CD28 dan CTLA-4 mengikat sepasang ligan, B7-1 dan B7-2. Reseptor CTLA-4 diekspresikan secara langsung. Reseptor ini memiliki afinitas yang lebih tinggi untuk ligan B7 dibanding CD28, dan ketika ia diekspresikan ia menutup jalur sinyal. Pasangan kedua regulator positif dan negatif, ICOS dan PD-1, juga muncul dalam tabel. Glikoprotein ini tidak diekspresikan secara konstitutif tetapi diinduksi melalui signaling CD28 dan beraksi kemudian selama respon imun. Regulator positif, ICOS, membantu mempromosikan interaksi sel B-T sementara PD-1, seperti CTLA-4, menghentikan produksi sitokin dan siklus progresi sel.

Peran molekul sinyal limfosit

Limfosit-signaling molekul membentuk sinapsis imunologi. Untuk membawa jenis sinyal diperlukan untuk respon imun beberapa jenis molekul yang harus datang bersama-sama dan tepat di bawah permukaan proksimal sel-sel T dan APC. Sinyal ke dalam sel leukosit dipicu oleh kontak permukaan (adhesi sel) pada membran plasma, oleh antigen-signaling melalui reseptor sel T dan koreseptor, dan sinyal kostimulator. Molekul adhesi sel penting untuk proses ini termasuk integrins LFA-1 dan molekul adhesi sel milik superfamili Ig, seperti ICAMs. Molekul-molekul adhesi sel memainkan peran penting dalam motilitas leukosit.

Transmisi pesan di membran plasma dan ke interior sel dianggap sebagai suatu proses. Hal ini dilakukan dalam beberapa langkah yang berbeda. Dibutuhkan sejumlah waktu tertentu dan meliputi wilayah ruang. Tergantung pada karakter pesan, transmisi dapat cukup sederhana atau dapat memerlukan beberapa langkah-langkah perantara untuk menimbulkan respon selular yang tepat. Dalam kedua kasus transduksi sinyal tidak dilakukan oleh produk gen tunggal, tetapi dengan beberapa produk gen yang bekerja dekat dengan fisik dan kontak satu sama lain. Dalam respon imun reseptor sendiri terdiri dari sejumlah rantai polipeptida. Beberapa rantai yang terlibat dalam pengenalan, yang lain dengan mentransduksikan sinyal dari permukaan ekstraseluler sitoplasma. Reseptor ini bekerja bersama-sama dengan koreseptor dan dengan molekul adhesi sel untuk menyampaikan informasi ke dalam sel.

Dalam sistem kekebalan tubuh reseptor membentuk cluster dan mengatur ulang dirinya. Sinyal yang diterima pada permukaan sel membantu pembentukan cluster; karakter cluster pada gilirannya membentuk sinyal yang dihantarkan ke dalam sel interior. Lemak bilayer bukanlah bentuk pasif tetapi sebaliknya memainkan peran aktif dalam penyusunan ulang adaptif ini. Prosedur ini dimanfaatkan oleh leukosit, dan oleh sel-sel saraf.

Protein yang dibutuhkan untuk signaling antara sel T dan APC disusun menjadi struktur sinyal yang disebut imunologi sinaps (ISs). Istilah "sinaps" menandakan sebuah persimpangan antara sel-sel dimana informasi dikirimkan. Sinapsis sangat diperkaya dalam menandakan molekul yang tidak hanya mengirimkan sinyal tetapi juga secara adaptif mengontrol sifat pesan yang diteruskan seperti kekuatan mereka. Istilah "sinaps" berasal dari studi tentang transmisi sinyal antara sel-sel saraf. Makna dari istilah, yang diciptakan oleh Sir Charles S. Sherrington pada tahun 1897, adalah "untuk terikat bersama-sama."

Imunologi sinapsis membawa bersama sejumlah protein yang dibutuhkan untuk mendukung signaling berkelanjutan. Di antara komponen-komponen dari sinaps adalah reseptor, sitoplasma kinase, dan adapter dan anchor yang berhubungan di permukaan sel ke sitoskeleton. TCRs dan MHCs terletak di tengah-tengah sinaps imunologi. Seperti telah dibahas sebelumnya, TCRs berasosiasi dengan kompleks sitoplasma CD3, protein tirosin kinase seperti Lck dan Fyn, dan molekul kostimulator seperti CD28 dan CD40. Protein lain milik sinaps imunologi termasuk immunoglobulin ICAM-1 dan LFA-1 intergrins, yang mengikat satu sama lain, dan anggota kelompok molekul CD2 perekat Ig, yang meliputi CD48 (tikus) dan CD58 (manusia). Kelompok kedua terutama merekatkan protein mengelilingi bagian tengah sinaps imunologi.

Kinetik proofreading dan memicu Serial TCRs

TCR memanfaatkan kinetik proofreading dan memicu serial untuk membedakan antara antigen diri dan non-diri. Ia dapat memberitahu dirinya dari antigen non-diri bahkan ketika yang terakhir yang dimakamkan adalah antigen diri. Seluruh rangkaian difusi, fosforilasi dan peristiwa pengikatan dibutuhkan untuk mendatangkan suatu respon selular yang tepat untuk mengikat antigen. Terlibat adalah beberapa protein sitoplasma, yaitu Lck, Fyn dan ZAP-70, sejumlah adapter, sekelompok rantai transmembran, beberapa yang utama rantai ζ - ζ yang terkait dengan CD3, ditargetkan untuk beberapa fosforilasi, dan akhirnya PLC dan RasGTPase. Ternyata bahwa dua aspek signaling TCR terikat secara bersama-sama.

Menyelesaikan serangkaian langkah-langkah fosforilasi, termasuk rantai ζ - ζ , tergantung pada sifat peptida yang diikat oleh molekul MHC dan pengikatannya pada TCR. Jika ligan tidak antigen non-diri, seri aktivasi tidak akan berjalan sampai selesai sebelum ligan berdisosiasi dari reseptor. Disosiasi akan membatalkan urutan peristiwa difusi dan fosforilasi sebelum sinyal (optimal) yang kuat dapat dihasilkan..

Proses ini disebut *kinetik proofreading*. Ini adalah istilah yang pertama diperkenalkan pada 1970-an untuk menjelaskan bagaimana tingkat fidelity dapat dicapai dalam operasi seperti transkripsi dan translasi. Dalam proses ini, angka

kesalahan sangat rendah, pada 10^{-4} - 10^{-9} . Angka kesalahan yang rendah sulit untuk dipahami menggunakan termodinamika argumen sendiri karena dengan perbedaan energi antara langkah yang benar dan langkah yang salah adalah miniscule. Situasi ini sebanding dengan TCR, yang dapat memberitahu antigen diri dari non-diri ketika yang terakhir hadir dalam hanya 1 bagian dalam 10.000.

Proofreading kinetik terjadi bersama dengan jaringan lain dari langkah-langkah yang disebut memicu serial. Istilah "memicu" dalam hal ini merujuk kepada pembangkitan sinyal oleh TCR pada akhir serangkaian langkah-langkah internal. Dalam serial memicu, satu peptida-terikat untuk molekul MHC (pMHC) mampu mengikat beberapa TCRs, satu demi satu dalam mode serial. Setelah serangkaian difusi dan fosforilasi selesai TCR diinternalisasi dan pMHC dibebaskan untuk terlibat pada TCR lain. Dengan cara ini efek dari sejumlah kecil peptida non-diri diperkuat.

Pembentukan sinaps imunologi mengizinkan signaling optimal melalui TCR. Seperti disebutkan di atas, di sinaps Imunologi, cincin perekat molekul yang disebut perifer supramolekul aktivasi cluster (pSMAC) mengelilingi pusat cincin TCRs dan terkait protein signaling, yang secara kolektif disebut sebagai pusat supramolekul aktivasi cluster (cSMAC). Clustering ini bersama-sama dari TCRs ke cSMAC menyelesaikan dua hal. Mempromosikan serial yang memicu, dan membantu secara cepat untuk mematikan sinyal melalui reseptor internalisasi setelah pengiriman sinyal telah mencapai tingkat yang sesuai.

BAB 6

TRANSDUKSI SINYAL PADA SISTEM ENDOKRIN

Sistem endokrin terdiri dari sejumlah kelenjar yang mengandung sel-sel sekresi khusus yang melepaskan molekul pemberi sinyal ke dalam aliran darah, cairan tubuh lain dan ruang ekstraseluler. Kelenjar sistem endokrin termasuk kelenjar adrenal, hipotalamus, dan paratiroid, pineal, pituitari, dan kelenjar tiroid. Sel yang mensekresi hormon ditemukan di berbagai lokasi di dalam tubuh. Timus menghasilkan berbagai hormon yang mengatur pertumbuhan limfosit, pematangan dan homeostasis. Pankreas mengandung kelompok sel yang mensekresi hormon yang disusun dalam pulau pankreas (Pulau Langerhans) yang mengeluarkan insulin, glukagon dan somatostatin. Sel-sel epitel penghasil hormone secara strategis berada di sistem pencernaan, gonad, ginjal dan plasenta, dimana mereka secara langsung melakukan aktivitas mitogenik sel dan jaringan yang memerlukan pengisian konstan, dan kegiatan angiogenesis yang menghasilkan pembuluh darah baru.

Sel-sel dari sistem endokrin menghasilkan beberapa jenis hormon peptida dan polipeptida, steroid disintesis dari kolesterol, hormon yang berasal dari asam amino, dan hormon berasal dari asam lemak. Beberapa hormon bersifat lipofilik sementara yang lain larut dalam air. hormon lipofilik seperti steroid, retinoid dan tiroid adalah hormone kecil, relatif berumur panjang yang mampu melewati membran plasma dan masuk ke dalam sel dimana mereka mengikat reseptor inti. Hormon larut air memiliki waktu hidup cukup singkat dan mengikat reseptor yang tertanam dalam plasma membran sel target. Dua jenis reseptor transmembran mengikat hormon nonlipofilik: hormon polipeptida yang mencetuskan pertumbuhan dan penyembuhan luka diikat oleh reseptor tirosin kinase; sedangkan yang lain diikat oleh G protein-coupled reseptor.

Hormon polipeptida adalah yang molekul kecil kompak, berukuran mulai dari 6-45 kDa. Faktor pertumbuhan Epidermal (EGF) dan faktor pertumbuhan saraf (NGF) adalah faktor pertumbuhan polipeptida pertama yang ditemukan. Mereka dan faktor-faktor pertumbuhan lain mengikat reseptor tirosin kinase yang diekspresikan oleh sel penerima yang tepat. Reseptor tirosin kinase adalah protein rantai tunggal yang melewati membran plasma sebanyak satu kali. Mereka, bersama dengan nonreseptor tirosin kinase, secara eksklusif ditemukan di metazoans. Beberapa kelas protein yang berbeda membantu penghantaran sinyal hormon polipeptida ke dalam sel. Selain reseptor tirosin kinase dan tirosin kinase nonreseptor tersebut, elemen-elemen ini mencakup berbagai modular adapter, dan beberapa keluarga dari GTPases.

Peran faktor pertumbuhan pada Angiogenesis

Beberapa keluarga faktor pertumbuhan mengkoordinasikan dan mengontrol pembentukan pembuluh darah baru selama angiogenesis. Setiap kali jaringan baru dibuat tambahan pembuluh darah harus dibuat untuk memasok oksigen dan nutrisi dan membuang produk limbah. Proses pembangunan vaskular terjadi dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, disebut vasculogenesis, sel-sel endotel vaskular prekursor bermigrasi, berdiferensiasi, berproliferasi dan dirakit ke pengaturan awal koneksi vaskular dari ukuran yang seragam. Pada tahap selanjutnya, disebut angiogenesis, kisi-kisi awal dari tubulus diolah lebih lanjut melalui diferensiasi, pertumbuhan dan percabangan untuk membentuk sebuah sistem vaskular yang matang. Jaringan yang sepenuhnya ditumbuhkan berisi arteri besar yang bercabang ke dalam pembuluh darah kecil yang secara progresif berakhir di kapiler, dan berisi sistem baru dengan struktur vena yang besar.

Sel-sel endotel dan otot polos yang membentuk lapisan dan selubung pembuluh darah mengkoordinasikan kegiatan mereka dengan mengirim dan menerima berbagai sinyal kimia. Molekul pemberi sinyal terdapat di sel endotel vaskular-specific; sementara yang lain seperti diturunkan platelet derived growth factor (PDGF) dan basic fibroblast growth factor (bFGF) adalah bukan. Anggota keluarga vascular endothelial growth factor (VEGF) paling menonjol diantara faktor pertumbuhan vaskular spesifik. Mereka diperlukan untuk vasculogenesis dan juga memainkan peran dalam angiogenesis. Keluarga kedua faktor pertumbuhan, angiopoietins, berikatan dengan endothelial cell line-specific reseptor Tie. Mereka bekerja bersama-sama dengan endotel-specific ephrins dan VEGFs untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan angiogenesis. VEGFs dan angiopoietins bekerja melalui mekanisme parakrin untuk sinyal dan merekrut sel yang dekat. Ephrins tetap melekat pada plasma membran sel asal mereka dan sinyal disampaikan secara langsung melalui mekanisme juxtakrin.

Peran keluarga EGF dalam penyembuhan luka

Faktor pertumbuhan EGF keluarga mengkoordinasikan dan mengontrol penyembuhan luka dan penggantian sel dalam jaringan yang mengalami pergantian. Penyembuhan luka merupakan proses yang kompleks. Bahkan dalam kasus sederhana terpotongnya kulit mewajibkan adanya partisipasi dari agen sistem saraf untuk menghasilkan sinyal rasa sakit, dan unsur-unsur sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan respon inflamasi dan respon imun. Jaringan baru harus tumbuh untuk mengganti bahan yang rusak. Pembuluh darah tua yang rusak harus dihilangkan dan dibentuk pembuluh darah yang baru, dan jaringan ikat yang mendasari harus dibentuk kembali dan dipulihkan.


Pada kulit yang terpotong, gloss keratinosit (sel-sel kulit) bermigrasi ke wilayah yang cedera, dan setibanya di sana akan berproliferasi dan matang. Sinyal oleh anggota keluarga ligan EGF dan reseptor mereka sangat penting untuk aktivitas keratinosit selama penyembuhan luka. Beberapa keluarga ligan EGF terlibat dalam perbaikan kulit yang luka. Di antaranya adalah TGF α , HB-EGF, AR, dan betacellulin. Ligan ini disintesis oleh keratinosit, serta reseptor EGF mereka dan mensuplai proliferasi dan migrasi sinyal, melalui mekanisme autokrin. Dalam menanggapi sinyal-sinyal ini keratinosit meningkatkan produksi integrins.

Pengikatan dengan integrins ini pada ECM memperantarai kepatuhan substratum oleh keratinosit dan memicu ekspresi collagesase-1. Enzim ini mendegradasi ECM, suatu langkah yang diperlukan untuk renovasi dan perbaikan jaringan yang rusak. Sinyal autokrin terus menjaga ekspresi collagenase-1 selama migrasi dan perbaikan.

Selain kulit, perbaikan luka juga terjadi dalam saluran gastrintestinal, dalam jaringan otot yang mengikuti cedera, dan di daerah inflammation kronis. Sumber-sumber primer epitel faktor pertumbuhan meliputi kelenjar ludah submaxillary, kelenjar Brunner duodenum, sel-sel epitel dalam kelenjar susu, dan ginjal. Faktor pertumbuhan yang dilepaskan ke cairan tubuh — air liur, serum, susu, dan urin — dan perjalanan ke daerah cedera dan pertumbuhan. Sel-sel epitel di banyak tempat di tubuh terus-menerus diperbarui dan faktor pertumbuhan juga dilepaskan secara lokal di daerah tersebut. Dalam situasi ini faktor pertumbuhan bekerja dalam autokrin dan parakrin dan bukan melalui mekanisme endokrin.

Neurotrophins mengontrol pertumbuhan neuron, diferensiasi, dan kelangsungan hidup

Program kematian sel adalah proses penting dalam perkembangan sistem saraf. Proses ini digunakan untuk menghilangkan sel-sel yang asing. Neurotrophins adalah faktor tropik, bahan kimia yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan. Neurotrophins seperti NGF mengatur keputusan untuk bertahan hidup atau mati, mempromosikan perkembangan axonal dan dendritik, percabangan dan remodeling, dan membantu kontrol pembentukan dan plastisitas sinaps. Contoh lain dari faktor-faktor trophic adalah ciliary neurotrophic factor (CNTF), glial -derived neurotrophic factor (GDNF), PDGF, dan bFGF.




Gambar 19. Reseptor neurotrophin: Reseptor p75NTR memiliki empat Sistein berulang (CR1-CR4), sebuah segmen transmembran, dan domain kematian cytoplasic. Reseptor Trk memiliki Sistein segmen (C1), 3 leusin kaya berulang (LRRs), dua segmen Sistein (C2), 2 domain mirip antibodi (Ig1, Ig2), penyisipan segmen transmembran, dan domain sitoplasma kinase. Semua neurotrophins dapat mengikat p75NTR. NGF mengikat reseptor TrkA; BDNF dan NT4 mengikat reseptor TrkB, dan NT3 mengikat reseptor TrkC. (Beckerman, M. 2005)

Keluarga ligan dan reseptor neurotrophin berisi empat ligan dan dua reseptor. Empat ligan adalah NGF, brain derived neurotrophic factor (BDNF), neurotrophic faktor 4 (NT4), dan NT3. Ligan ini mengikat dua jenis reseptor neurotrophin, yaitu reseptor p75^{NTR} dan reseptor Trk. Seperti ditunjukkan dalam gambar 19 reseptor p75^{NTR} mengandung domain sitoplasma kematian, sedangkan reseptor Trk memiliki domain sitoplasma tirosin kinase. Kedua reseptor beraksi menggunakan set protein adaptor berbeda untuk menyampaikan berbagai pesan ke dalam sel seperti ditunjukkan dalam gambar 19. Reseptor Trk memanfaatkan adapter Shc dan Grb2, sementara p75 menggunakan TRAFs dan satu set empat atau lebih adapter (gambar 19) untuk menyampaikan pesan kematian dan penangkapan. Secara umum, reseptor p75^{NTR} menyampaikan pesan apoptosis dan reseptor Trk menyampaikan pesan kelangsungan hidup, tapi seperti yang diilustrasikan pada gambar 19. Gambaran lengkap jauh lebih banyak. Mereka dan reseptor faktor pertumbuhan lainnya bekerja sama satu sama lain dengan integrins dan cadherins untuk menyampaikan pesan ke sebagian besar atau seluruh titik kontrol dalam sel. Termasuk peraturan situs untuk ekspresi gen (untuk mempromosikan pertumbuhan dan diferensiasi), daerah fokus kontak antara sel-sel dan ECM (untuk mengontrol gerakan, adhesi, bentuk sel, dan perkembangan), dan mengontrol daerah mitokondria untuk apoptosis (untuk mengatur keputusan kematian versus kelangsungan hidup).

Peran reseptor tirosin kinase dalam transduksi sinyal

Reseptor tirosin siklin menghantarkan sinyal dari polipeptida faktor pertumbuhan ke dalam sel. Kecuali reseptor seperti p75, faktor pertumbuhan polipeptida mengikat anggota reseptor tirosin siklin (RTKs), reseptor yang melewati transmembran sebanyak satu kali yang memiliki aktivitas intrinsik tirosin kinase. Reseptor ini mengandung tiga wilayah fungsional: daerah ekstraseluler N-terminal yang berisi satu atau lebih daerah pengikatan ligan; segmen transmembran; dan wilayah cytoplasmic C-terminal yang berisi domain katalitik dan beberapa daerah fosforilasi.

RTKs yang mengikat faktor pertumbuhan polipeptida adalah domain modular linier. Salah satu domain yang terdapat di daerah ekstraseluler glikoprotein ini adalah domain Ig, domain fibronectin tipe III, domain kaya Sistein dan domain EGF mengikat ligan. Daerah juxtamembran terletak persis di daerah transmembran heliks dan, seperti yang disebutkan di atas, terdapat domain tirosin kinase di daerah C-terminal. Daerah docking dibuka ketika autofosforilasi residu tirosin dalam lingkaran aktivasi domain kinase dinyalakan yang mengakibatkan fosforilasi berikutnya dari residu tirosin. Ketika ini terjadi, protein yang mengandung fosfotirosin pengenalan modul dapat terdocking di daerah ini.



Gambar 20. Ligan-terikat Trk dan p75 reseptor neurotrophin, dan adapter terkait: NGF-terikat reseptor Trk (a). Second messenger dan signaling terkait intermedat terlibat dalam mengaktifkan PKB dan PKC (b) Neurotrophin-terikat p75 reseptor. (Beckerman, M. 2005)

Seperti reseptor single-pass transmembran lainnya, ligan yang mengikat di daerah ekstraseluler N-terminal tidak memiliki satu lingkungan elektrostatis yang cukup untuk menstabilkan konformasi yang berbeda di daerah sitoplasma C-terminal untuk bekerja sebagai sinyal. Sebaliknya pengikatan ligan mencetuskan pembentukan dari reseptor dimers yang stabil dan oligomer. Aktivitas ini membawa bersama dua atau lebih domain sitoplasma yang memprarkasai sinyal di dalam sel.

Transmisi sinyal ke bagian interior sel oleh reseptor tirosin kinase yang diikuti pengikatan ligan terjadi dalam dua tahap. Langkah pertama adalah autofosforilasi, atau fosforilasi silang, residu tirosin dalam lingkaran aktivasi domain katalitik. Membawa bersama-sama dari bagian sitoplasma RTK memicu langkah ini dengan hasil pengaktifan aktivitas katalisis domain kinase. Domain kinase kemudian mengkatalisis fosforilasi satu atau lebih residu tirosin di daerah sitoplasma di luar domain katalitik. Langkah kedua ini membuat situs docking yang tersedia untuk sinyal protein. Kunci untuk fungsi kedua ini adalah adanya protein-protein pengenalan modul, domain kompak yang mengenali urutan pendek peptida yang mengandung tirosin terfosforilasi, residu Serin dan Treonin.

Reseptor dimer dan oligomer dapat dibentuk dalam menanggapi pengikatan ligan di lebih dari satu cara. Ligan-dimediasi dimerisasi memicu sinyal hormon pertumbuhan manusia (hGH). Pertama-tama, ligan tunggal mengikat satu reseptor dan kemudian melekat pada reseptor kedua untuk membentuk sebuah jembatan yang saling berhubungan menghasilkan kompleks reseptor-ligan 1:2. Strategi yang berbeda teramati dalam EGF-diinduksi dimerisasi. Dalam hal ini, Bagian reseptor ekstraseluler membentuk dua bentuk jembatan menghasilkan kompleks 2:2. Secara lebih detail, pengikatan EGF-EGFR memicu perubahan konformasi yang mengekspos *loop* pada masing-masing molekul reseptor. *Loop* ini terikat satu sama lain untuk membentuk jembatan. Seperti diperhatikan sebelumnya, reseptor ErbB2 tidak memerlukan ligan untuk aktivasi. Hal ini terjadi karena *loop* yang menjembatani reseptor ini secara konstitutif terbuka.

Modul-modul pengenalan fosfoprotein yang digunakan secara luas dalam jalur signaling

Signaling protein menyebar dari satu lokasi ke yang lain, diaktifkan dan dinonaktifkan oleh pengikatan dan modifikasi post-translasi, yang direkrut, dikumpul dan dibongkar ke dalam kompleks signaling di titik kontrol selular. Pengaturan dari peristiwa-peristiwa ke jalur signaling sehingga urutan langkah signaling dapat terjadi dalam urutan yang benar pada waktu yang tepat di tempat yang tepat dimungkinkan melalui penggunaan domain modular signaling. Beberapa dari domain tersebut menyediakan sejenis lem yang memungkinkan satu protein mengikat protein lain, dan aktivitas ini akan diikuti pengikatan menuju perekrutan protein dan pembentukan sinyal kompleks. Domain lainnya yang dirancang untuk mengenali kehadiran modifikasi post-translasi seperti penambahan kelompok fosforil. Hasil dari pengikatan ligan adalah adanya satu atau lebih residu tirosin terfosforilasi dekat sitoplasma C-terminus dari reseptor. Jika peristiwa ini tidak dikenali dan ditanggapi, maka proses *signaling* akan berakhir.

Src Homologi-2 (SH2) dan domain phosphotyrosine binding (PTB) mengenali urutan pendek peptida yang mengandung residu fosfotirosin. Domain SH2 adalah modul pengenalan prototypic. Terdiri dari sekitar 100 residu asam amino, dan ditemukan pada protein yang dirakit dan dibongkar di sekitar membran plasma sebagai tanggapan terhadap auto dan fosforilasi silang residu tirosin di bagian sitoplasma transmembran molekul reseptor. Ini adalah yang pertama ditemukan dan keluarga terbesar dari modul yang mengenali tirosin terfosforilasi. Domain sh2 mengenali tirosin terfosforilasi dan specific flanking urutan tiga sampai enam residu asam amino terletak segera C-terminal untuk pY. Phosphotyrosine binding (PTB) domain juga mengenali urutan pendek peptida yang mengandung fosfotirosin, tetapi, berbeda dengan domain SH2, asam amino residu N-terminal dan tidak C-terminal untuk pY milik sekuen pengenalan. Domain PTB mengenali struktur turn-*loop* dan, khususnya, lima residu asam amino hidrofobik untuk delapan residu terletak N-terminal pY.

Protein 14-3-3 adalah protein kecil, dalam ukuran 28-30kDa. Ada setidaknya tujuh *isoform* protein 14-3-3 mamalia; mereka berlimpah dan terdapat dalam semua sel-sel eukariotik lainnya. Domain 14-3-3 tidak tertanam dalam protein

yang lebih besar tetapi ada sebagai unit independen yang membentuk *homodimers*. Protein ini mengikat dengan afinitas tinggi urutan peptida yang mengandung residu *fosfoserin* yang diikuti oleh *prolin* dua posisi terhadap C-terminal. Sebagai dimer, mereka mampu mengikat untuk menandakan molekul seperti Raf-1 yang mengandung tandem berulang dari motif fosfoserin. Protein 14-3-3 menempatkan ikatan mereka dalam kompartemen sitoplasma dan menjaga mereka dipisahkan dari inti dan membran. Protein ini bekerja di jalur pertumbuhan dan apoptosis dan kontrol siklus sel.

Forkhead-associated (FHA) *domains* adalah urutan 55-75 residu asam amino. Sedangkan domain SH2 dan PTB mengenali urutan yang mengandung tirosin terfosforilasi, domain FHA dapat mengenali urutan peptida yang berisi treonin terfosforilasi, serin terfosforilasi, dan tirosin terfosforilasi. Mereka ditemukan di *kinase*, *fosfatase*, protein yang mengikat RNA, dan terutama di protein inti seperti faktor-faktor transkripsi dan protein yang terlibat dalam mendeteksi dan memperbaiki kerusakan DNA.

Adenilil siklase dan fosfodiesterase kunci signaling second messenger

Terdapat sembilan jenis *adenilil siklase*. *Isoforms* ini ditetapkan sebagai tipe I-IX. Semua *isoform* ini dapat dirangsang oleh subunit Gs. Namun, ini bukan kasus subunit Gi. *Adenilil siklase isoforms* I, V, dan VI adalah satu-satunya yang dihambat oleh subunit Gi; yang lainnya tidak terpengaruh. *Isoforms* juga berbeda dalam tanggapan mereka terhadap subunit G $\beta\gamma$ dan konsentrasi Ca²⁺ intraseluler. Sifat respons diringkas dalam tabel 12. Dapat dilihat di tabel 12. lima *isoform* AC dapat diatur oleh kalsium. Dengan demikian, dua sistem second messenger utama saling berhubungan erat satu sama lain. Kopling ini dapat menghasilkan berbagai efek termasuk disinkronisasi osilasi di cAMP intrasel dan konsentrasi Ca²⁺

Besar dan durasi *signaling* siklik nukleotida *second messenger* diatur oleh nukleotida *phosphodiesterases* (IPOL). Ingat bahwa cAMP memiliki grup fosfat melekat pada karbon 3' dan karbon 5' dari gula ribosa. PDEs adalah enzim yang mengkatalisasi ikatan hidrolitik 3' phosphodiester yang terikat pada cAMP mengakibatkan degradasi ke bentuk inert 5' AMP. Mereka juga melaksanakan aksi yang sama di cGMP untuk menghasilkan inert 5' GMP, dengan demikian mengakhiri signaling second messenger. Mereka memodulasi sinyal-sinyal ini dengan mengaitkan amplitudo dan durasi mereka, dan melalui degradasi yang membatasi penyebaran mereka ke kompartemen lain dalam sel.

Tabel 12. Respon yang dimiliki oleh adenilil siklase terhadap regulator yang berbeda. Tanda (+) untuk efek pemicuan dan tanda (-) untuk efek penghambatan(Beckerman, M. 2005)

Isoform AC	Gs	Gi	Gβγ	Ca ²⁺
I	+	-	-	+
II	+		+	
III	+			-
IV	+		+	
V	+	-		-
VI	+	-		-
VII	+		++	
VIII	+			+
IX	+			

Kelenjar pengirim dan penerima hormon

Hipotalamus, kelenjar hipofisis anterior, kelenjar adrenal, dan pankreas endokrin mengirim dan menerima hormon. Hormon polipeptida menghantarkan sinyal melalui reseptor tirosin kinase. Sedangkan hormon *nonlipofilik* lain yang disekresikan oleh sel-sel di hipotalamus, hipofisis anterior, kelenjar adrenal dan endokrin pankreas menghantarkan sinyal melalui GPCRs.

Hipotalamus. Hipotalamus mengontrol pelepasan hormon oleh hipofisis anterior. Hipotalamus menghasilkan dua hormon yang menghambat pelepasan hormon oleh hipofisis, dan lima hormon yang merangsang pelepasan hormon hipofisis. Salah satu dari lima ini, dopamin, adalah katekolamin, sebuah molekul yang terdiri dari bagian aromatik (*catechol*), yaitu, sebuah cincin benzena ditambah dua kelompok hidroksil dan bagian amina. Hormon lain adalah peptida yang bervariasi dalam panjang dari 3 asam amino (TRH) sampai 44 residu asam amino (GHRH). Neurohormon ini semua mengikat GPCRs pada sel-sel dari hipofisis anterior.

Hipofisis anterior. Hipofisis *anterior* memproduksi hormon yang mengontrol Pelepasan hormon di tempat lain dalam tubuh. Lima jenis sel mengeluarkan hormon hipofisis anterior. Sel-sel somatotrophic mengeluarkan hormon pertumbuhan dan *lactotrophic cells produce prolaktin*. Hormon pertumbuhan dan prolaktin terikat dengan rantai tunggal reseptor sitokin, dan bukan oleh GPCRs. Hormon pertumbuhan beredar melalui tubuh dan mempengaruhi semua jenis sel. Prolaktin mempengaruhi perkembangan kelenjar susu. Sel-sel *corticotrophic mengeluarkan corticotropin* dan melanocyte–stimulating hormon (MSH). Corticotropin mempengaruhi kelenjar *adrenal* sementara MSH pada melanosit, sel-sel kulit yang mengandung melanin. Pelepasan ACTH dan MSH keduanya berasal dari molekul awal, *pro-opiomelanocortin* (POMC). Molekul lain yang berasal dari POMC adalah *neuromodulator beta-endorphin*. Sel-sel *gonadotrophic* mengeluarkan hormon perangsang folikel (FSH) dan hormon *lutening* (LH), dan sel-sel *thyrotrophic* menghasilkan hormon perangsang-tiroid (TSH). TSH, FSH dan LH adalah glikoprotein yang besar. Penambahan kelompok karbohidrat untuk hormon ini memperpanjang hidup mereka dengan melindungi

mereka dari degradasi. Gonadotropin merangsang berbagai tanggapan pada pria dan wanita termasuk pengembangan sperma, pelepasan androgen, sintesis estrogen dan ovulasi. Hormon hipofisis ini kecuali GH dan PRL semua mengikat GPCRs yang diekspresikan oleh sel-sel yang disebutkan di atas. Sumber-sumber hormon dan akronim diringkas dalam tabel 13.

Kelenjar adrenal. Menghasilkan sel-sel *Chromaffin* di kelenjar adrenal menghasilkan dua katekolamin-adrenalin (*epinephrin*) dan noradrenaline (*norepinephrin*). Hormon ini, dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap stres yang ekstrim, memicu aliran darah meningkatkan dan reaksi fisiologis lainnya "*fight or flight*". Mereka berasal dari tirosin dan mengikat adrenoreseptor, Adrenergik GPCRs didistribusikan di otot polos vaskular sistem pencernaan, jaringan adiposa, otot jantung, otot rangka, otak, dan paru-paru. Medula *adrenal* dikelilingi oleh korteks adrenal, struktur kedua yang berbeda di kelenjar *adrenal*. Korteks adrenal melepaskan sejumlah besar hormon steroid yang paling penting menjadi aldosteron dan kortisol yang membantu menjaga keseimbangan garam dan air homeostasis pada tubuh.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hormon steroid tidak mengikat reseptor pada permukaan sel tetapi sebaliknya melewati membran plasma dan mengikat reseptor intraseluler (inti). Hormon peptida merangsang sintesis dan pelepasan hormon ini. Angiotensin II dan III diproduksi di ginjal merangsang produksi aldosteron, ACTH merangsang produksi kortisol dan hormon glikoprotein. LH merangsang pelepasan hormon steroid *gonadotropin progesteron* dan *testosteron*.

Endokrin pankreas. Molekul insulin, seperti ACTH, dihasilkan dari molekul pendahulu, atau prohormon. Molekul insulin akhir, terdiri dari dua rantai untuk total panjang 51 asam amino, diproduksi oleh pembelahan dari rantai tunggal prekursor, proinsulin. Sekali disekresikan oleh sel-sel beta dari pulau *Langerhans* pankreas, insulin berikatan dengan reseptor tirosin kinase dengan target lemak, otot dan sel-sel darah merah. *Glucagon*, protein 29 asam amino, diproduksi oleh sel *alpha* pulau *langerhans* dan oleh sel-sel didistribusikan di sepanjang saluran pencernaan. Hormon ini kemudian mengikat GPCR. Hormon ketiga, somatostatin dihasilkan oleh sel-sel di pulau Langerhans dan sel-sel di hipotalamus. Ketiga hormon ini, insulin, *glucagon* dan *somatostatin*, mempengaruhi aliran nutrisi dalam tubuh, dan homeostasis glukosa dengan mengatur penyimpanan glukosa dan transportasi masuk dan keluar jaringan. Pelepasan insulin dirangsang oleh kadar gula darah yang tinggi dan memicu ambilan glukosa oleh sel target. Glukagon bekerja dalam arah yang berlawanan. Reseptor glukagon ditemukan di hati. Glukagon disekresikan oleh pankreas dalam menanggapi kadar gula darah yang rendah dan menyampaikan sinyal ke hati untuk mensekresikan glukosa.

Tabel 13. Hormon-hormon yang disekresikan oleh hipotalamus, adrenal, pituitari anterior, dan kelenjar endokrin pankreas. (Beckerman, M. 2005)

Hipotalamus	Pituitari anterior
<i>Corticotropin-releasing hormone (CRH)</i>	<i>Adrenocorticotropic hormone (ACTH)</i>
<i>Gonadotropin-releasing hormone (GRH)</i>	<i>Follicle-stimulating hormone (FSH)</i>
<i>Growth hormone-inhibiting hormone (GHIH)</i>	<i>Growth hormone (GH)</i>
<i>Growth hormone-releasing hormone (GHRH)</i>	<i>Lutenizing hormone (LH)</i>
<i>Prolactin-inhibiting hormone (PIH)</i>	<i>Melanocyte-stimulating hormone (MSH)</i>
<i>Prolactin-releasing hormone (PRH)</i>	<i>Prolactin (PRL)</i>
<i>Thyrotropin-releasing hormone (TRH)</i>	<i>Thyroid-stimulating hormone (TSH)</i>
Kelenjar adrenal	Endokrin pankreas
<i>Adrenaline (Epinephrin)</i>	<i>Glucagon</i>
<i>Noradrenaline (Norepinephrin)</i>	<i>Insulin</i>
<i>Steroid hormones</i>	<i>Somatostatin</i>

Tabel 14. Hormon menginduski respon yang diperantarai oleh cAMP

Kelenjar	Hormon	Respon
Hati	<i>Epinefrin dan glukagon</i>	Pemecahan glikogen, sintesis glukosa (gluconeogenesis), penghambatan sintesis glikogen
Otot rangka	<i>Epinefrin</i>	Pemecahan glikogen, penghambatan sintesis glikogen
Otot jantung	<i>Epinefrin</i>	Meningkatkan kontraktilitas
Adiposa	<i>Epinefrin, ACTH, dan glucagon</i>	Katabolisme trasilgliserol
Ginjal	<i>Vasopressin (ADH)</i>	Meningkatkan permeabilitas sel epitel terhadap air
Tiroid	<i>TSH</i>	Sekresi hormon tiroid
Tulang	<i>Hormon paratiroid</i>	Meningkatkan resorpsi kalsium
Ovarium	<i>LH</i>	Meningkatkan sekresi hormon tiroid
Korteks adrenal	<i>ACTH</i>	Meningkatkan sekresi glukokortikoid

Fungsi molekul *signaling*

Molekul *signaling* sering digunakan di lebih dari satu cara. Beberapa fungsi sebagai hormon dan juga sebagai neuromodulators, zat yang mengubah sifat-sifat listrik (eksitabilitas) neuron. Fungsi zat lainnya sebagai *neuromodulator* dan sebagai *neurotransmitter*. Perbedaan fungsi sebagai hormon atau sebagai *neurotransmitter* atau *neuromodulator* didasarkan pada bagaimana molekul sinyal digunakan daripada komposisi kimia yang dikandungnya.

Neurotransmitter dikeluarkan dalam cara yang sangat kompleks. Mereka dilepaskan dari terminal neuron pra-sinaptik dan menyebar di seluruh celah sinaptik menuju terminal post-sinaptik neuron di sebelahnya. Ada dua jenis reseptor dalam sistem saraf untuk *neurotransmitter*, *ionotropik* dan *metabotropik*. Reseptor *ionotropik* disebut juga sebagai kanal ion. Mereka merespon pengikatan dengan secara langsung membuka kanal, pori-pori air sepanjang membran plasma untuk melewatkan ion; biasanya Na^+ , K^+ , Ca^{2+} atau Cl^- , tergantung pada jenis neurotransmitter dan reseptor di dalam dan di luar sel. Jenis *signaling* ini cepat dan langsung. *Signaling* melalui reseptor *metabotropik*, istilah lain untuk GPCRs, adalah lebih lambat dan tidak langsung.

Beberapa *neurotransmitter* dapat menghantarkan sinyal melalui reseptor *ionotropik* dan *metabotropik*. Glutamat dan asam *g-aminobutyric* (GABA) adalah dua reseptor yang paling sering ditemui oleh *neurotransmitter* di otak. Ada reseptor glutamat *ionotropik* dan reseptor glutamat *metabotropik*. Demikian pula ada reseptor GABA *ionotropik* dan reseptor GABA *metabotropik*; reseptor GABA terdiri dari reseptor GABA_A dan sebagai reseptor GABA_B . *Neurotransmitter* lain yang paling banyak adalah asetilkolin. Neurotransmitter ini dapat mengikat reseptor (*nikotinic*) *ionotropik* dan G protein-coupled reseptor (*muskarinik*).

Empat neurotransmitter paling umum ditemukan di otak. Istilah *eksitatori* dan *inhibitori* mengacu pada *neurotransmitter* terhadap eksitabilitas membran. *Neurotransmitter inhibitori* mengikat kanal ion anionik dan mengurangi rangsangan, sementara *neurotransmitter eksitatori* mengikat kanal ion kationik dan meningkatkan eksitabilitas.

Neuromodulator dikeluarkan secara lebih luas daripada *neurotransmitter*, dan pelepasan semacam ini memungkinkan mereka untuk mempengaruhi sejumlah besar sel. Mereka mengikat GPCRs dan memodifikasi eksitabilitas sel target dengan mengatur aktivitas kanal ion mereka sebagian besar melalui mekanisme penghambatan. *Neuromodulator* bertindak melalui GPCRs.

Ada beberapa rute protein G meregulasi kanal ion. Rute pertama dimana subunit $\text{G}\alpha$ dan $\text{G}\beta\gamma$ langsung mengikat dan mengatur kanal ion, dan rute yang lain secara tidak langsung beraksi melalui *second messenger-activated protein kinase*. Rute langsung menyediakan pengaturan aktivitas listrik dalam sel-sel yang tereksitasi oleh *messenger* kimia ketika GPCRs, G protein, dan kanal ion saling terkait. Contoh regulasi ini adalah *gating* kanal kalium pada jantung oleh ubunit $\text{G}\beta\gamma$. Kanal K^+ yang meregulasi aktivitas ini dikenal sebagai G protein-linked *inward rectified K⁺ channels*

(GIRKs). Pengikatan pada *asetilkolin* pada *muskarinik (asetilkolin)* GPCR mengarah pada aktivasi GIRKs oleh subunit $G\beta\gamma$ dalam alat pacu sel-sel jantung yang memperlambat detak jantung. Proses ini tidak dibatasi pada jantung; GIRKs juga ditemukan di otak dan pankreas. Sebuah contoh klasik dari regulasi tidak langsung adalah fototransduksi oleh rhodopsin dan ligan retinalnya.

Bentuk yang paling umum dari neuromodulasi adalah melalui regulasi tidak langsung, messenger-mediated regulation of ion channels. Dalam proses, Gs, Gi, dan subunit Gq *alpha* merangsang atau menghambat second messenger dan second messenger-dependent kinase protein yang memfosforilasi saluran Ca^{2+} , Na^{+} dan K^{+} , sehingga menyebabkan perubahan dalam struktural kanal ion dan kinetik properti.

Neuromodulator mempengaruhi emosi, kognisi, rasa sakit dan perasaan baik

Neuromodulator menghasilkan perubahan-perubahan dalam rangsangan listrik neuron dan sirkuit saraf yang dapat berlangsung selama beberapa jam dan beberapa hari. Beberapa neuromodulator adalah peptida; sedangkan yang lain adalah *nukleotida* atau amina. Ketika beraksi dalam otak neuromodulator mempengaruhi kognisi dan emosi. Sejumlah neuromodulator paling menonjol yang beraksi di otak, yaitu *adenosin*, *serotonin* dan *dopamin*. *Serotonin* didistribusikan di banyak daerah di otak. Disintesis dari asam amino *L-tryptophan*, dan sering disebut sebagai 5-*hydroxytryptamine* (5 HT).

Endorfin dan *tachykinins* adalah contoh dari *neuromodulator peptida*. Endorfin-endogen; morfin-bersama dengan banyak opiat lain mempengaruhi persepsi rasa sakit dan senang. Zat ini mengikat keluarga *opioid* GPCRs yang diekspresikan pada permukaan *neuron* di otak dan sumsum tulang belakang. *Endorfin* memiliki sifat *analgesik*, dan juga terlibat dalam menjaga keseimbangan air dan fungsi endokrin lainnya. Anggota dari keluarga endorphin-like opiat meliputi *beta-endorphin*, *enkephalins* dan *dynorphins*. *Beta-endorphin* disintesis di hipofisis seperti disebutkan sebelumnya, dan *enkephalin* diproduksi di *medula adrenal* oleh sel-sel *chromaffin*. *Neuromodulators* ini bersama dengan *dynorphins* secara luas didistribusikan di beberapa area spesifik otak dan sumsum tulang belakang dimana mereka mengikat reseptor *opioid*. *Tachykinins* adalah keluarga lain neuromodulator yang terlibat dalam persepsi nyeri. Mamalia anggota keluarga ini, *neurokinins*, termasuk zat P (SP), yaitu *neurokinin* (NKA) dan *neurokinin B* (NKB).

Perubahan dalam jumlah *neuromodulators* di bagian sensitif dari tubuh menghasilkan sensasi yang mengarah ke perubahan perilaku. *Angiotensin* adalah keluarga regulator tekanan darah, volume darah dan fungsi pembuluh darah jantung. Produksi *angiotensin* dirangsang oleh *angiotensin converting enzim* (ACE) dan renin, sebuah hormon *glikoprotein* yang diproduksi oleh ginjal dan tempat lain di tubuh termasuk otak. Sebuah infus *angiotensin II*, *angiotensin* aktif utama, ke tes subjek otak mamalia memicu sensasi rasa haus dan keinginan untuk natrium (garam).

BAB 7

TRANSDUKSI SINYAL PADA SISTEM SARAF PUSAT

A. SIGNALING NYERI


Nyeri

"*Noxious stimuli*" adalah keadaan yang merusak atau mengancam kerusakan jaringan (misalnya, *stimulus* memotong, menghancurkan atau membakar) dan yang mengaktifkan ujung saraf sensorik khusus yang disebut *nosiseptor*. Pertama kali dijelaskan pada materi kulit oleh Sherrington pada tahun 1906, *nosiseptor* juga terdapat di otot, sendi dan visera. Sherrington menciptakan istilah "*nosiseptif*" untuk menggambarkan deteksi keadaan berbahaya oleh *nosiseptor*. *Nosiseptif* mewakili pengolahan informasi sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat tentang lingkungan internal atau eksternal yang dicetuskan oleh aktivasi *nosiseptor*. Informasi ini akan diproses pada tulang belakang dan supraspinal tingkat sistem saraf pusat, memberikan informasi detail mengenai keadaan alam, intensitas, lokasi, dan durasi keadaan yang berbahaya.

Nosiseptif adalah proses termal yang intens, mekanis atau rangsangan kimia terdeteksi oleh setiap sub-populasi serabut saraf *perifer*, disebut *nosiseptor*. Badan sel *nosiseptor* terletak di *ganglia* akar *dorsal* (DRG) untuk tubuh dan *ganglion trigeminal* untuk wajah, dan keduanya memiliki cabang *perifer* dan pusat *axonal* yang menginervasi masing-masing organ target mereka dan sumsum tulang belakang. *Nosiseptor* terstimulasi hanya ketika intensitas rangsangan mencapai kisaran yang berbahaya, yang menandakan bahwa mereka memiliki sifat biofisik dan molekul yang memungkinkan mereka untuk selektif mendeteksi dan menanggapi rangsangan yang berpotensi membahayakan. Ada dua kelas utama *nosiseptor*. Yang pertama meliputi diameter ber-*myelin* menengah ($A\delta$) *afere*n yang memperantarai nyeri akut, nyeri yang terlokalisasi atau nyeri yang cepat. *Neuron afere*n ber-*myelin* ini berbeda dari diameter yang lebih besar dan secara cepat menghantarkan konduktis pada serabut $A\beta$ yang menanggapi rangsangan mekanik yang tidak berbahaya (yaitu sentuhan ringan). Kelas kedua dari *nosiseptor* termasuk diameter kecil tidak ber-*myelin* serabut "C" yang menyampaikan nyeri terlokalisasi kedua atau nyeri lambat.

Nyeri berbeda dari sensasi lain, yaitu bahwa nyeri memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang salah, nyeri mendahului sinyal lain, dan nyeri berkaitan dengan perasaan tidak menyenangkan. Nyeri ternyata merupakan sensasi yang sangat rumit karena jika nyeri berkepanjangan dan jaringan rusak, jalur-jalur *nosiseptor* sentral mengalami fasilitasi dan reorganisasi.

Salah satu temuan baru adalah isolasi reseptor vaniloid-1 (VR-1). *Vanillin* adalah sekelompok senyawa, termasuk *kapsaisin*, yang menimbulkan nyeri. Temuan ini mengharuskan dilakukannya revisi terhadap konsep bahwa hanya terdapat satu jalur yang menyalurkan nyeri ke *korteks serebri*. Reseptor VR-1 berespon tidak saja terhadap bahan-bahan yang menimbulkan nyeri seperti *kapsaisin*, tetapi juga terhadap proton dan suhu yang berpotensi membahayakan di atas 43°C. Reseptor lain, VRL-1, yang berespon terhadap suhu di atas 50°C, tetapi tidak terhadap *kapsaisin*, telah dapat diisolasi dari serabut C. Mungkin terdapat beragam reseptor di sebuah ujung serabut C sehingga sebuah serabut dapat berespons terhadap berbagai rangsangan yang membahayakan. Namun, perbedaan sifat reseptor VR-1 dan VRL-1 menimbulkan kecenderungan bahwa mungkin juga terdapat banyak sistem serabut C *nosiseptor* yang berbeda-beda.



Gambar 21. Anatomi *nosiseptor*. A. *Neuron somatosensory* yang berlokasi di ganglia perifer. B. Sebagian besar *nosiseptor* adalah tidak bermyelin dengan diameter akson yang kecil (serabut-C). C. *Nosiseptor* serabut-A adalah bermyelin. (Dubin, 2010)

Respon *nosiseptor* terhadap rangsangan berbahaya

Dekat *ekstremitas distal* permukaan yang panas atau dingin, tekanan yang kuat atau bahan kimia yang mengiritasi, dapat mengakibatkan respon penarikan subsecond somatopic. Aktivasi *nosiseptor* memerlukan rangsangan yang cukup untuk mendepolarisasi terminal *perifer* (memproduksi potensial reseptor) dengan amplitudo dan durasi yang cukup. Hal ini memastikan bahwa meskipun terdapat perlambatan potensial reseptor oleh propagasi pasif antara daerah transduksi dan cetusan bangkitan potensial, informasi seperti intensitas stimulus akan dikodekan dalam kumpulan impuls yang dihasilkan. Secara teoritis, depolarisasi potensial reseptor dapat dicapai dengan beberapa perubahan aliran membran dan aktivitas *elektrogenic* pompa.

Jika *gradien* elektrokimia untuk natrium (Na^+), kalsium (Ca^{2+}), dan klorida (Cl^-) lebih positif daripada potensi membran istirahat di neuron, pembukaan kanal

ion yang permeabel terhadap ion-ion ini akan menyebabkan potensial membran bergeser ke arah positif (depolarisasi). Karena proton untuk kalium (K^+) lebih negatif daripada potensial istirahat, penutupan saluran aktif kalium tidak hanya mendepolarisasi potensial membran tetapi menguatkan fluktuasi tegangan arus yang disebabkan karena peningkatan yang dihasilkan oleh resistensi membran.

Aktivasi *nosiseptor* : panas

Penelitian psikofisik pada manusia telah menunjukkan bahwa ada pembatasan yang jelas dan reproduksi antara persepsi panas tidak berbahaya dan panas berbahaya, yang memungkinkan kita untuk mengenali dan menghindari suhu yang mampu menyebabkan kerusakan jaringan. Ambang nyeri ini, yang biasanya terletak sekitar $43^{\circ}C$, paralel sensitivitas panas dari *nosiseptor* C dan tipe II $A\delta$. *Neuron* yang telah dikultur dari ganglia dipisahkan akar dorsal menunjukkan kepekaan panas yang serupa. Sebagian besar menunjukkan $43^{\circ}C$, ambang batas dengan kelompok kecil yang diaktifkan oleh lebih panas yang lebih (ambang $>50^{\circ}C$). Pemahaman molekular proses sensasi panas berasal dari karakteristik kloning dan fungsional dari reseptor untuk *capsaicin*, bahan utama pedas dalam cabai. *Capsaicin* dan senyawa terkait *vanilloid* menghasilkan pembakaran sakit oleh depolarisasi bagian tertentu dari *nosiseptor* C dan $A\delta$ melalui aktivasi reseptor *capsaicin* (atau *vanilloid*), TRPV1, salah satu dari sekitar 30 anggota dari reseptor *transient receptor potential* (TRP) keluarga kanal ion). Kloning kanal TRPV1 juga diperantarai oleh peningkatan suhu, dengan aktivasi ambang termal ($\sim 43^{\circ}C$).

Beberapa kejadian mendukung hipotesis bahwa TRPV1 adalah *transduser endogen* panas berbahaya. Pertama, TRPV1 diekspresikan pada banyak *nosiseptor* peka panas. Kedua, *capsaicin* dan panas-membangkitkan arus adalah serupa, jika tidak sama, dalam hal sifat biofisik dan farmakologis, mengekspresikan kanal TRPV1. Ketiga, dan seperti yang dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini, TRPV1 membangkitkan respon yang sangat ditingkatkan oleh *pro-algesic* atau agen *pro-inflamasi* (seperti proton *ekstraseluler*, *neurotrophins*, atau *bradikinin*), yang menghasilkan hipersensitivitas untuk panas *in vivo*. Keempat, analisis tikus yang kekurangan saluran ion ini tidak hanya menunjukkan ketiadaan sensitivitas *capsaicin*, tetapi binatang ini juga menunjukkan penurunan yang signifikan dalam kemampuan mereka untuk mendeteksi dan menanggapi panas berbahaya. Studi ini juga menunjukkan peran penting kanal ini dalam proses dimana cedera jaringan dan peradangan mengarah ke hipersensitivitas panas, mencerminkan kemampuan TRPV1 untuk berperan sebagai integrator molekular rangsangan termal dan kimia.

Kontribusi dari TRPV1 untuk sensasi panas akut, bagaimanapun, telah ditentang oleh data yang dikumpulkan dari persiapan *ex vivo* di mana rekaman yang diperoleh dari soma DRG neuron dengan serat pusat dan tepi yang utuh. Dalam satu studi, tidak ada perbedaan yang diamati pada respon- yang dibangkitkan panas dari tipe *wild* pada hewan yang kekurangan TRPV1, tetapi analisis yang lebih baru dari kelompok ini menemukan bahwa tikus yang kekurangan TRPV1, kekurangan sebuah *neuron kohort* yang diaktifkan oleh panas berbahaya. Dari hasil yang dijelaskan di atas kita menyimpulkan bahwa TRPV1 tidak diragukan lagi

berkontribusi terhadap sensasi panas akut, tapi disetujui bahwa TRPV1 tidak bertanggung jawab sendiri untuk transduksi panas.

Sejumlah sub tipe kanal TRPV lainnya, termasuk TRPV2, 3 dan 4, telah muncul sebagai kandidat transduser panas yang berpotensi bisa menutupi deteksi rangsangan intensitas yang mengapit TRPV1, termasuk pada suhu sangat panas ($>50^{\circ}\text{C}$) dan hangat (30°C). Secara heterologi ekspresi kanal TRPV2 menampilkan aktivasi ambang suhu sekitar 52°C , sedangkan TRPV3 dan TRPV4 diaktifkan antara $25\text{-}35^{\circ}\text{C}$. Belum ada laporan yang diterbitkan yang menggambarkan fisiologis atau perilaku tes TRPV2 pada tikus.

Aktivasi *nosiseptor* dingin

Identifikasi mekanisme yang digunakan oleh *nosiseptors* untuk transduksi dingin berbahaya jauh tertinggal dibandingkan pemahaman mekanisme transduksi panas. Intensitas nyeri dingin pada manusia meningkat linear dengan rangsangan intensitas antara sekitar 20°C dan 0°C . Ambang batas untuk persepsi rasa sakit terhadap dingin jauh lebih tepat daripada panas, sekitar 15°C . Ada variabilitas yang luar biasa di ambang batas untuk kulit yang dicetuskan oleh aktivitas serat akibat suhu dingin yang diamati pada mamalia sebagian karena laju pendinginan (sekitar 30°C sampai -18°C). Proses homeostatik bergerak selama studi *in vivo* (misalnya, perubahan pembuluh darah) dan potensi kerusakan jaringan terjadi pada suhu sub-beku cenderung tidak langsung mempengaruhi responsif *nosiseptor*. Selain itu, mengukur perilaku *nocifensive* dingin hewan telah terbukti sebagai tantangan, mungkin karena waktu pemaparan dalam banyak uji

Pendinginan pada kulit 4°C mengaktifkan serabut A-C- dan *nosiseptor* sensitif dingin, konsisten dengan adanya dua populasi *neuron* sensitif-dingin yang diamati dalam kultur. *Non-nosisepti aferen* sensitif-dingin secara spontan aktif pada suhu kulit normal dan eksitabilitas mereka meningkat dengan penurunan suhu. *Menthol-activated NSC channel* TRPM8 bertanggung jawab untuk mendeteksi pendinginan tidak berbahaya pada tikus. Jarak efektif untuk TRPM8-dimediasi pengkodean dingin membentang dari tepat di bawah suhu kulit menjadi berbahaya (10°C - 15°C dan di bawah ini). Meskipun studi pada tikus telah menghasilkan hasil yang bertentangan mengenai persyaratan TRPM8 dalam perilaku tanggapan terhadap rangsangan yang berbahaya, penelitian lebih baru menggunakan sebuah *novel cold-plate assay* menunjukkan peran tikus TRPM8 di penginderaan dingin berbahaya. Selain itu, efek analgesik suhu dingin (17°C) hilang pada tikus yang kekurangan TRPM8 dalam konteks formalin yang menyebabkan peradangan. TRPM8-dimediasi analgesia apakah tergantung pada daerah perifer dan/atau pusat aksi tidak diketahui tetapi mungkin dibahas sekarang bahwa TRPM8 mengekspresikan *neuron* dan serat pusat dan perifer dapat divisualisasikan oleh ekspresi GFP yang didorong oleh promotor TRPM8. Studi penting pada manusia dan tikus mengungkapkan perbedaan spesies dalam jalur penginderaan dingin tidak berbahaya:

Rangsangan dingin berbahaya mengaktifkan arus NSC dan masuknya kalsium dan mengurangi aktivitas kanal K^+ dan fungsi $\text{Na}^+/\text{K}^+\text{-ATPase}$. Sementara

disosiasi kualitas sakit/sakit vs panas ke dingin berbahaya (3°C) menunjukkan perbedaan mendasar dalam mekanisme transduksi atau pemrosesan informasi. Saluran kation TRPA1 telah diusulkan memainkan peran dalam proses ini karena memiliki ambang dekat 17°C , dinyatakan dalam *nociceptors* bersama TRPV1, dan diperlukan untuk sensasi dingin pada tikus. Penelitian genetik manusia telah menyarankan TRPA1 berkontribusi variasi kepekaan dingin-sakit). Meskipun TRPA1 mungkin menanggapi dingin secara tidak langsung melalui pelepasan kalsium intraselular yang diinduksi dingin, suhu yang lambat dapat mengaktifkan TRPA1 dalam ketiadaan kalsium. Namun kontribusi TRPA1 pada sensasi panas masih menjadi perdebatan sejak aktivasi TRPA1 tidak dilakukan pada beragam ekspresi atau kultur *neuron* TG terhadap rangsangan dingin yang relatif singkat untuk penggunaan suhu 5°C .

Penting, bahan kimia endogen reaktif juga agonis yang efektif dari TRPA1. Bagaimana mengekspresikan *neuron* TRPA1 mungkin menengahi sensasi terbakar *hot mustard* (AITC) dapat dijelaskan oleh hasil anatomi dan psikofisik: AITC adalah aktivator kimia kuat subset TRPV1 mengekspresikan *neuron*, dan aktivitas di serabut perifer mentransmisikan informasi tentang rangsangan dingin dengan kehadiran serabut blok A- (agaknya serabut-C) membangkitkan sensasi membakar, sakit dan menusuk. Menariknya, aktivasi beberapa serabut dingin oleh panas yang berbahaya dapat menjadi dasar untuk sensasi dingin paradoks yang dirasakan oleh rangsangan titik-titik dingin dengan rangsangan panas berbahaya.

Aktivasi *nosiseptor*: mekanik

Sistem somatosensori mendeteksi rangsangan mekanik kuantitatif dan kualitatif yang beragam. Berbagai saraf mekanosensitif sub tipe khusus untuk mendeteksi beragam rangsangan mekanik dapat dikategorikan berdasarkan ambang sensitivitas. Ambang batas tinggi mekanoreseptor termasuk serabut C dan perlahan-lahan mengadaptasi serabut mekanoreseptor $\text{A}\delta$ (AM), baik yang berakhir sebagai ujung saraf bebas di kulit. Ambang rendah mekanoreseptor termasuk serabut $\text{A}\delta$ D yang berakhir pada ujung rambut di kulit dan mendeteksi sentuhan ringan. Akhirnya, serabut $\text{A}\beta$ yang menginervasi sel *Merkel*, sel-sel *Pacinian* dan folikel rambut mendeteksi tekstur, getaran dan cahaya tekanan.

Seperti dalam kasus rangsangan termal, sensitivitas mekanik telah diselidiki di sejumlah tingkatan, termasuk *neuron* yang dipisahkan pada kultur, perekaman serabut secara *ex-vivo*, serta perekaman dari tengah (yaitu *dorsal* tanduk *neuron*) dan pengukuran perilaku *output*. Perekaman kulit-saraf *ex vivo* telah banyak memberikan informasi stimulus yang tepat seperti intensitas, frekuensi, kecepatan, dan adaptasi untuk *sub tipe* serabut tertentu. Sebagai contoh, serabut $\text{A}\beta$ terutama berhubungan dengan kepekaan terhadap sentuhan ringan, sedangkan serabut C dan $\text{A}\delta$ terutama responsif terhadap rangsangan mekanik yang berbahaya.

Pada tingkat sel, tekanan dapat diberikan kepada badan-badan sel kultur *neuron somatosensori* menggunakan kaca *probe*, perubahan dalam kekuatan osmotik, atau peregangan melalui distensi permukaan elastis kultur, meskipun tidak jelas

stimulus yang terbaik meniru tekanan fisiologis. Tanggapan dapat dinilai dengan menggunakan electrophysiological atau metode pencitraan sel hidup. Konsensus dari studi tersebut adalah bahwa tekanan membuka kanal kation mechanosensitive untuk mendapatkan depolarisasi cepat. Namun, kelangkaan *probe* farmakologis tertentu dan penanda molekuler yang mencirikan respons ini atau label relevan subtype saraf telah menghambat percobaan untuk mencocokkan kegiatan selular dengan saraf anatomis atau fungsional. Keterbatasan ini juga telah menghambat analisis molekuler mekanosensasi dan identifikasi molekul yang merupakan mesin transduksi mekanik. Meskipun demikian, jumlah calon anggota telah muncul, sebagian besar didasarkan pada studi mekanosensasi dalam model genetik organisme.

Aktivasi *nosiseptor*: kimia

Kemo-nosiseptif adalah proses utama aferen neuron yang mendeteksi iritasi lingkungan dan faktor-faktor *endogen* yang dihasilkan oleh *stress* fisiologis. Dalam konteks nyeri akut, mekanisme *kemo-nosiseptif* memicu respon yang berlawanan ke berbagai iritasi lingkungan. Sekali lagi, di sini, kanal TRP memiliki peran utama, mengingat bahwa mereka berfungsi sebagai reseptor untuk iritan yang diturunkan dari tanaman, termasuk *capsaicin* (TRPV1), mentol (TRPM8), serta bahan tajam di tanaman *mustard* dan bawang putih, *isothiocyanates* dan *thiosulfonates* (TRPA1)

Sehubungan dengan iritasi lingkungan, TRPA1 telah muncul sebagai anggota grup yang sangat menarik. Hal ini karena TRPA1 merespon senyawa struktural beragam tetapi bersatu dalam kemampuan mereka untuk membentuk ikatan kovalen dengan kelompok-kelompok *thiol*. Sebagai contoh, *isothiocyanate* alil (dari *wasabi*) atau (bawang putih *allicin*) adalah elektrofilik permeabel membran yang mengaktifkan TRPA1 dengan berikatan kovalen dengan memodifikasi residu Sistein dalam domain sitoplasma kanal aminoterminal. Bagaimana ia mempromosikan saluran gating saat ini tidak diketahui. Salah satu contoh yang terkenal adalah acrolein (2-propenal), α sangat reaktif, β Aldehida tak jenuh hadir dalam gas air mata, knalpot kendaraan atau asap dari pembakaran vegetasi (yaitu kebakaran hutan dan Rokok). *Acrolein* dan iritasi *volatil* lain (seperti hipoklorit, hidrogen peroksida, formalin, dan *isocyanates*) mengaktifkan sensor *neuron* yang menginervasi mata dan jalan napas, menghasilkan rasa sakit dan peradangan. Tindakan ini dapat memiliki konsekuensi terutama untuk orang-orang yang menderita asma, batuk kronis atau gangguan paru lainnya. Tikus yang kekurangan TRPA1 menunjukkan kepekaan yang sangat kurang untuk agen-agen tersebut. Selain racun-racun lingkungan ini, TRPA1 ditargetkan oleh beberapa anestesi umum (seperti *isoflurane*) atau metabolik produk sampingan dari agen kemoterapi (seperti *siklofosfamid*), yang mungkin mendasari beberapa efek samping obat ini, termasuk nyeri akut dan inflamasi saraf yang kuat.

Akhirnya, iritasi kimia dan agen *pro-algesic* lain juga diproduksi secara *endogen* dalam menanggapi kerusakan jaringan atau stres fisiologis, termasuk stres oksidatif. Faktor tersebut dapat bertindak sendiri, atau dalam kombinasi, untuk *nosiseptor* peka terhadap rangsangan termal dan/atau mekanis, sehingga menurunkan ambang nyeri. Hasil dari tindakan ini adalah untuk meningkatkan refleks kewaspadaan dan


pelindung sebagai akibat dari cedera. Dengan demikian, kemo-nosiseptif mewakili sebuah antarmuka yang penting antara nyeri akut dan persisten, terutama dalam konteks cedera jaringan *perifer* dan peradangan

Bahan-bahan yang mengatur respon nyeri dan demam

Obat antiinflamasi *non steroid* (OAINS) telah diandalkan untuk mengurangi respon inflamasi termasuk nyeri dan demam selama 3500 tahun. Pengobatan awal berasal dari ekstrak kulit pohon *willow* yang mengawali produk aspirin komersial pertama seratus tahun yang lalu dan sejumlah lebih OAINS baru seperti *ibuprofen* dan *naproxen*. Semua OAINS bekerja dengan cara yang sama, mereka menghambat aktivitas katalitik serangkaian enzim yang disebut *endoperoxide H synthases* (PGHSs) atau *cyclo-oxygenases* (COX). Dua *isoforms* COX ditargetkan oleh antiinflamasi NSAID. Yang pertama adalah COX-1, secara konstitutif aktif dan ditemukan terutama di lambung dan ginjal. Kedua, COX-2, diinduksi pada jenis sel yang berbeda dalam menanggapi sinyal inflamasi yang disampaikan oleh *sitokin*, faktor pertumbuhan, dan hormon. Inhibisi enzim COX-1 dapat berbahaya dan tujuan dalam desain obat adalah menargetkan *isoform* COX-2.

Sel melepaskan *prostanoid* (prostaglandin) ketika terluka oleh agen-agen kimia, panas atau mekanik. *Prostanoid* adalah turunan asam lemak membran lipid. Seperti yang digambarkan dalam gambar 22. langkah pertama dalam produksi prostaglandin adalah hidrolisis dari *lipid* membran oleh *fosfolipase A2* (PLA2) mengakibatkan pelepasan asam *arakidonat* (AA). AA *intermediet* kemudian dikonversi ke *prostanoid* melalui aktivitas yang berurutan COX dan beberapa enzim lain. Aktivitas katalitik PLA2 meningkat dalam menanggapi *sitokin*, faktor pertumbuhan, dan sinyal hormon. Dalam respon sel menghasilkan dan kemudian mengeluarkan *prostanoid*. Selama respons *inflamasi* G reseptor *protein-coupled prostanoid* terekspresi pada *neuron perifer* mengikat *prostaglandin*. Sinyal dikirim ke *termoregulator* dalam otak memicu peningkatan suhu tubuh. Aspirin dan NSAID lain bertindak untuk suhu yang lebih rendah dan mengurangi rasa sakit dengan menghambat COX, sehingga mencegah pembentukan dan *signaling* oleh *prostanoid*. Sinyal *prostanoid* disampaikan dalam *mode parakrin* target selular mereka. Untuk alasan ini *prostanoid* dan hormon lain bertindak secara *parakrin* dan disebut " hormon lokal."

Bradikinin merupakan suatu peptida dengan sembilan residu asam amino diproduksi dengan cepat setelah cedera jaringan terjadi. *Bradikinin* adalah elemen sentral dalam respon *inflamasi*. *Bradikinin* terlibat dalam pengaturan aliran darah (*dilatasi* pembuluh darah), peningkatan permeabilitas vaskuler, kontraksi otot, merangsang pelepasan *prostaglandin* dan mediator *inflamasi*, dan sinyal rasa sakit. *Bradikinin* mengikat dua jenis reseptor, B1 dan B2. Reseptor B2 konstitutif *neuron* dan sel-sel otot polos; Reseptor B1, sebaliknya, yang dengan cepat diregulasi ketika ada cedera jaringan. Reseptor B1 dan B2 ditemukan di ujung saraf bebas dan langsung menanggapi sinyal rasa sakit.



Gambar 22. Pencetusan sinyal demam dan nyeri: Sinyal pro-inflamasi sinyal mengaktifkan fosfolipase A₂, yang menghidrolisis membran fosfolipid (di sini digambarkan sebagai fosfolipid dalam membran plasma) menghasilkan asam arakidonat. Urutan enzim, dimulai dengan COX, menghasilkan *prostanoid* dari asam arakidonat. *Prostanoid* memiliki waktu hidup yang pendek satu menit atau lebih dan segera dikeluarkan dari sel. Reseptor *prostanoid* pada ujung saraf perifer mengikat *prostanoid*, dan *neuron* menyampaikan sinyal nyeri dan demam ke otak. (Beckerman, M. 2005)

Adenosin, ATP dan ADP berfungsi sebagai *neurotransmitter* dan *neuromodulator* di sistem saraf pusat dan *perifer*. Ketika dilepaskan ke ruang ekstraseluler molekul-molekul ini mengikat reseptor *purin*. Reseptor *purin* dibagi ke dalam dua keluarga, P1 dan P2, masing-masing berisi sejumlah sub tipe *Adenosin* melekat pada reseptor P1 sementara ATP, ADP dan *pirimidin* UTP dan UDP berikatan dengan reseptor P2. *Adenosin* dan nukleotida lain melaksanakan sejumlah besar tugas *signaling* dalam tubuh. Dalam otot jantung, *adenosin* menurunkan denyut jantung dan menurunkan tekanan darah. *Adenosin* berkaitan dengan tidur; selama tidur terjadi kekurangan tingkat *adenosin* di otak. Ketika terikat reseptor *adenosin* di otak, *adenosin* mengurangi aktivitas saraf untuk tidur. *Kafein* secara struktural mirip dengan *adenosin*, dan merupakan *antagonis adenosine* yang beraksi pada reseptor *adenosin* A1 dan 2A. *Adenosin* dan ATP dilepaskan ke dalam ruang ekstraseluler selama cedera dan *inflammation*. Sel *Mast*, *neutrofil* dan ujung saraf bebas mengekspresikan reseptor P1 dan P2, dan *adenosin* membantu memperantarai komunikasi antara kekebalan tubuh dan sistem saraf, dan memberikan kontribusi untuk respon sakit.

B. SIGNALING PADA MOOD DAN DEPRESI

Efek kadar *dopamine* yang tidak tepat

Protein G reseptor dan *signaling* molekul yang mengaktifkan mereka terlibat dalam sejumlah gangguan *neurologis* dan menjadi target utama obat-obatan. *Neuron dopamergik* adalah *neuron* yang mensintesis dan mengeluarkan *dopamin*. Kadar *dopamin* yang tidak tepat berkontribusi pada penyakit *Parkinson*, ADHD, *skizofrenia* dan

gangguan lainnya. Ada tiga kelompok utama sel yang mensekresi *dopamin*: satu kelompok yang terletak di daerah otak tengah disebut *substansia nigra* (SN), yang kedua di daerah *tegmental ventral* (VTA), dan ketiga di hipotalamus inti. Sel-sel ini, bersama dengan beberapa kelompok-kelompok kecil sel lain mensekresi *dopamin*, dinamakan sebagai sistem *dopamin*. Sistem sel-sel ini terlibat dalam kecanduan narkoba, penyakit *Parkinson*, sindrom *Tourette*, *skizofrenia*, dan *attention-deficit hyperactivity disorder* (ADHD). Dalam penyakit *Parkinson*, sel-sel dalam SN yang mengeluarkan *dopamin* mati mengarah ke defisiensi *dopamin* di otak. Dalam *skizofrenia*, antagonis, obat yang menghambat sinyal *dopamin*, digunakan untuk menekan sistem *dopamin* yang terlalu aktif. Gambaran yang paling umum dari kecanduan narkoba adalah peningkatan *signaling dopamin*.

Sel-sel di tiga daerah mengirimkan sinyal *dopamergik* untuk sejumlah besar daerah otak. Sel-sel menerima sinyal yang mengekspresikan dua jenis reseptor *dopamin*. Reseptor jenis D1 (D1 dan D5) bertindak melalui subunit Gs untuk mengaktifkan *adenilil siklase*. Reseptor Tipe D2 (D2, D3, dan D4) beraksi melalui subunit Gi untuk menekan *adenilil siklase* dan mengaktifkan kanal kalium.

Anak-anak dan orang dewasa dengan ADHD menunjukkan perilaku yang hiperaktif, impulsif dan lalai. Dalam banyak pasien ada pengurangan dalam ukuran *ganglia basal* dan *lobus frontal* yang bertanggung jawab untuk mengendalikan respon perilaku seperti ini. Tampaknya bahwa tingkat sinyal *dopamin* terlalu rendah, baik karena adanya terlalu banyak *transporter dopamin* yang menghilangkan *dopamin* dari lingkungan *ekstraseluler*, atau karena jumlah yang memadai *dopamin* dilepaskan dari terminal *presinaps*. *Deficits* ini diatasi melalui penggunaan obat seperti *methylphenidate* [Ritalin®] yang mengakibatkan peningkatan kadar *dopamin* ekstraseluler di otak.

Kadar Serotonin yang tidak memadai mendasari gangguan Mood

Sistem *serotonergik*, inti penghasil *serotonin*, sel-sel di otak tengah dan *pons* dekat mana otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel yang memproduksi *serotonin* disusun dalam kelompok yang disebut *Raphe nuklei*. *Neuron* di *nuklei* besar dan mengirimkan aktivitas mereka hampir setiap lokal di otak. Reseptor *serotonin* dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kelas, ditunjuk sebagai 5-HT1 melalui 5-HT7. Semua tapi reseptor 5-HT3 adalah GPCRs. Reseptor 5-HT3 adalah kanal ion teraktivasi ligan. Kelas GPCR terbaik belajar adalah reseptor 5-HT1 dan 5-HT2. Anggota kelompok 5-HT1 beraksi melalui Gi dan G0 jenis G-protein subunit *alpha*. Mereka menghambat aktivitas adenilil siklase dan menstimulasi pembukaan *hiperpolarisasi*-membuka kanal kalium. Reseptor *serotonin* 5-HT2 bekerja melalui subunit Gq untuk meningkatkan tingkat kalsium intraseluler dan IP3, dan mendepolarisasi *neuron* dengan menutup kanal kalium.

Kadar *serotonin* tidak memadai bertanggung jawab dalam berbagai gangguan *mood*. Kadar *serotonin* yang meningkat dalam beberapa cara untuk mengobati depresi dan serangan panik serta gangguan kecemasan lainnya. Obat yang meningkatkan kadar *serotonin* dengan menghambat *re-uptake serotonin* sangat populer. Prozac® (*fluoxetine*) adalah *inhibitor* selektif *re-uptake serotonin* (SSRI), sebagai obat lain populer seperti Paxil® dan Zoloft®. *Serotonin* dan *noradrenalin* adalah *monoamin*. Kelas lain

obat-obatan yang meningkatkan kadar *serotonin* adalah *monoamin oksidase inhibitor*, atau MAOI. *Monoamin oksidase* adalah enzim-enzim yang mendegradasi *serotonin* dan *noradrenalin*. MAOI bekerja dengan menghambat aksi *monoamin oksidase*. Kelompok lain yang meningkatkan *serotonin* adalah obat *antidepresan trisiklik* (TCA). Obat ini juga mencegah *re-uptake serotonin*.


C. SIGNALING PADA ALZHEIMER

Penyakit Alzheimer (AD) adalah penyakit *neurodegeneratif* yang ditandai secara klinis dengan kerusakan *kognitif* yang *progresif* dan gejala *neuropsikiatrik*. AD adalah yang paling umum menyebabkan *demensia* pada orang tua yang saat ini mempengaruhi 25 juta orang-orang di seluruh dunia. Penyakit ini umumnya ditandai oleh kerusakan *kognitif* ringan pada tahap awal yang mungkin disebabkan oleh *disfungsi sinaptik* dalam struktur otak yang penting untuk *encoding* dan penyimpanan memori, seperti *hippocampus* dan *korteks entorhinal*. Akumulasi *plak amyloid* yang mengandung peptida β - β *amiloid* dan *neurofibril* oleh *fosforilasi tau* adalah lesi otak *neuropatologis* klasik. Awal akumulasi peptida β dan/atau *phosphorylated tau*, sebagai *disfungsi saraf*, terjadi ketika individu sebagian besar adalah *kognitif* normal. Akumulasi *progresif plak amyloid* dan *neurofibrilari* disertai dengan *neurodegenerasi* berkorelasi erat dengan tingkat keparahan klinis gejala. Namun, manifestasi klinis AD mendahului, selama beberapa tahun, perubahan *neuropatologis* pada manusia, sedangkan *disfungsi saraf* dan *defisit* memori lain biasanya muncul sebelum pengendapan *amiloid* di hewan coba AD.

Baru-baru ini, beberapa jalur *signaling* selular baru telah terlibat di patobiologi AD. Termasuk sinyal Wnt, 5' diaktifkan *adenosin monofosfat protein kinase* (AMPK). Peran Wnt *signaling* pada saraf *synaptogenesis* dan Wnt jalur *signaling* PD terlibat dalam beberapa kunci proses sel yang terkait dengan proliferasi sel, diferensiasi, adhesi, kelangsungan hidup, dan *apoptosis* dalam beberapa sel-sel katabolik dan anabolik, termasuk *neuron* dan sel *glial* sistem saraf pusat saraf (SSP). Protein NTB adalah keluarga *glikosilasi* kaya sistein yang mensekresi protein yang dinamai protein *Drosophila* "*winglessp*" dan *mouse* protein "Int-1". Saat ini, 19 dari 24 gen Wnt yang mengekspresikan protein Wnt telah diidentifikasi dalam manusia, sementara 80 Wnt gen target telah diidentifikasi dari kajian-kajian genetik pada manusia, tikus, *Drosophila*, *Xenopus*, dan populasi *Zebrafish*. NTB mengikat Frizzled (Fz) transmembran reseptor yang terletak pada permukaan sel yang mengarah ke induksi setidaknya tiga hilir jalur *signaling* yang berbeda. Yang pertama adalah dikenal sebagai jalur Wnt kanonik yang mengatur transkripsi gen melalui β -*catenin*, juga disebut Wnt/ β - *catenin*. Kedua, adalah jalur non-kanonik yang di *emodulasi* oleh pelepasan Ca^{2+} intraseluler, juga disebut Wnt Ca^{2+} , dan yang ketiga, polaritas sel NTB, di mana Jun N-terminal *kinase* (JNK) memainkan peran, juga disebut jalur NTB/PCP-JNK.

Bukti baru menunjukkan bahwa efek $A\beta$ *plastisitas sinapsis hipokampus*, memori dan sinaps diperantarai oleh jalur *signaling* CREB. Bukti ini berasal dari studi oleh Vitolo dan rekan-rekan yang menunjukkan bahwa $A\beta$ 42 mengurangi aktivitas PKA dan mengganggu LTP (*long-term potentiation*) di *hipokampus iris* (Vitolo et al., 2002). Saraf memperlihatkan kerusakan lain disebabkan oleh β 42 dikaitkan dengan

berkurangnya tingkat *phosphorylated* CREB, dengan mekanisme yang dapat melibatkan *endositosis* reseptor NMDA melalui *calcineurin*/STEP. $A\beta$ oligomer jenis $A\beta$ yang paling beracun, juga menghambat fosforilasi CREB di *neuron* utama oleh sebuah mekanisme yang melibatkan pengurangan reseptor NMDA. Pengurangan kadar cAMP dan perubahan dalam komposisi subunit katalis dan/atau peraturan dari PKA disebabkan oleh akumulasi $A\beta$ yang dikaitkan dengan penurunan *fosforilasi* CREB di *neuron* kultur dan otak PD. Meskipun sintesis $A\beta$ 42 mengurangi *fosforilasi* CREB yang diinduksi oleh depolarisasi dan glutamat dalam *neuron* utama, $A\beta$ 42 tidak mempengaruhi *fosforilasi* CREB di neuron dalam kondisi basal atau dirangsang *forskolin*.




Gambar 23. Jalur signaling regulasi transkripsi bergantung CREB di *neuron*. (Saura, 2010)

Komunikasi antara *sinaps*, sitoplasma dan inti sel dalam menanggapi beberapa rangsangan ekstraseluler memerlukan fungsi dan koordinasi beberapa protein sitoplasma dan inti sel. Perubahan tingkatan intraseluler dari *second messenger* kedua seperti Ca^{2+} dan cAMP bergabung ke dalam sitoplasma untuk terfosforilasi (Ser133). Aktivasi dan translokasi CREB ke inti sel (panah hijau). Beberapa *cross-talk* jalur *signaling neuron* untuk mengatur *signaling* CREB termasuk sinyal terkendali (panah merah). Aktivasi simultan dari jalur ini dapat berkontribusi pada CREB tergantung transkripsi yang diperlukan untuk memori jangka panjang. Pada penyakit Alzheimer, $A\beta$ dihasilkan oleh PS1/ γ -secretase-dependent memproses APP yang mengganggu jalur regulasi CREB meliputi reseptor NMDA, L-type VGCCs, PKA, dan *calcineurin*.

BAB 8

APOPTOSIS

Program kematian sel adalah komponen utama dari perkembangan normal, pemeliharaan homeostasis, dan penghapusan sel-sel yang rusak dalam organisme uniseluler dan multisel. Tergantung pada perubahan morfologi dan keterlibatan *caspase*, kematian sel dapat digolongkan ke dalam tipe yang berbeda: *apoptosis*, *autophagy*, *nekrosis*, *mitosis catastrophe*, *paraptosis*, dan kematian sel lambat.



Gambar 24. Berbagai macam kematian sel, menginduksi apoptosis dan nekrosis, bergantung pada pelepasan protein HMBG dengan stimulus kematian. Bentuk yang lain telah diketahui untuk menjelaskan jalur kematian tergantung-*caspase*: *paraptosis*, *autophagy*, *mitotic catastrophe*, dan kematian sel lambat. (Burz, C. 2009)


Mekanisme *apoptosis* sangat kompleks dan canggih, melibatkan sejumlah peristiwa molekuler energi-bergantung *caspase*. Sampai saat ini, penelitian menunjukkan bahwa ada dua jalur utama *apoptosis*: jalur reseptor ekstrinsik atau jalur kematian dan jalur intrinsik atau jalur mitokondria. Namun, sekarang ada bukti bahwa kedua jalur saling terkait dan bahwa molekul dalam satu jalur dapat mempengaruhi yang lainnya. Ada jalur tambahan yang melibatkan *sitotoksitas* dimediasi sel T dan *perforin-granzyme-dependent* sel. Jalur *perforin granzyme* dapat menginduksi *apoptosis* melalui baik *granzyme B* atau *granzyme A*. *Ekstrinsik*, *intrinsik*, dan jalur *granzyme B* berkumpul di jalur terminal yang sama, atau jalur eksekusi. Jalur ini dimulai dengan pengikatan oleh *caspase-3* yang menghasilkan fragmentasi DNA, *degradasi* protein *cytoskeletal* dan protein inti, pertautan silang protein, pembentukan badan *apoptosis*, ekspresi *ligan* untuk reseptor sel *fagosit* dan akhirnya pengambilan oleh sel *fagosit*. Jalur *granzyme A* mengaktifkan jalur secara paralel, jalur kematian sel *independen-caspase* melalui kerusakan DNA tunggal.

Caspase

Caspase (Sistein *Aspartat-spesific protease*) adalah keluarga protein intraseluler yang terlibat dalam inisiasi dan eksekusi *apoptosis*. Aktivasi eksekusi *caspase* sering

disebut sebagai titik komitmen *apoptosis*; yaitu, titik di *signaling cascade* dimana sel berkomitmen untuk mati.

Caspase diekspresikan pada banyak sel dalam bentuk proenzim aktif, dan ketika diaktifkan oleh proses proteolitik, pada gilirannya akan mengaktifkan *procaspases* lain sehingga memperkuat jalur *signaling apoptosis* dan menyebabkan kematian sel. Sejauh ini, 14 *caspases* telah diidentifikasi, 11 ditemukan pada mamalia. Mereka terbagi, tergantung pada aktivitas mereka, ke *pro-inflamasi* (*caspases* 1, 4, 5, 11, 12, 13 dan 14) dan *caspase proapoptosis*. Yang terakhir dikelompokkan sebagai *inisiator caspases* (2, 8, 9, 10) dan *efektor caspases* (3, 6, 7). Sedikit yang diketahui tentang beberapa *caspase pro-inflamasi* seperti *caspase-11*, yang telah dilaporkan mengatur *apoptosis* dan pematangan *sitokin* selama mengalami *shock septic*; *caspase-12*, yang memediasi *endoplasmic-spesifik apoptosis* pada mencit dan tikus; *caspase-13*, yang ditemukan hanya pada hewan ternak; dan *caspase-14*, yang terdapat dalam jaringan embrio.



Gambar 25. Jenis kematian sel (Ashe, 2003)

Jalur ekstrinsik

Jalur *signaling ekstrinsik* yang memulai *apoptosis* melibatkan interaksi yang dimediasi reseptor transmembran. Ini melibatkan reseptor kematian yang merupakan anggota dari superfamili gen reseptor *tumor nekrosis faktor* (TNF). Anggota keluarga reseptor TNF *domain* kaya sistein ekstraseluler dan memiliki domain sitoplasma sekitar 80 asam amino yang disebut "domain kematian (*death domain*)". Domain kematian ini memainkan peran penting dalam transmisi sinyal kematian dari permukaan sel untuk jalur signaling intraseluler. Sampai saat ini, ligan terbaik dan kematian terkait reseptor termasuk TNF- α /TNFR1, Apo3L DR3 FasL FasR, Apo2L / DR4 dan Apo2L/DR5.

Urutan peristiwa yang mendefinisikan tahap *ekstrinsik apoptosis* dicirikan dengan model FasL/FasR dan TNF- α /TNFR1. Dalam model ini, ada pengelompokan reseptor dan pengikatan dengan *ligan trimeric homolog*. Berdasarkan pengikatan *ligan*, *adaptor cytoplasmic* protein direkrut yang menunjukkan domain kematian sesuai yang berikatan dengan reseptor. Pengikatan Fas *ligan* ke Fas reseptor hasil dalam mengikat adaptor protein FADD dan pengikatan TNF *ligan*

TNF reseptor menghasilkan pengikatan adaptor protein TRADD dengan perekrutan FADD dan RIP. FADD kemudian berikatan dengan procaspase-8 melalui subsatuan domain efektor kematian.. Pada titik ini, kompleks kematian yang diinduksi-*signaling* (DISC) dibentuk, mengakibatkan aktivasi auto-katalitik *procaspase-8*.

Setelah *caspase-8* diaktifkan, tahap pelaksanaan dari apoptosis dimunculkan. *Death-receptor mediated apoptosis* dapat dihambat oleh protein yang disebut c-FLIP yang akan mengikat FADD dan caspase-8, membuat mereka tidak efektif. Poin lain dari potensi regulasi *apoptosis* adalah protein yang disebut Toso, yang telah menunjukkan penghambatan *Fas induced apoptosis* pada sel T melalui penghambatan pengolahan *caspase-8*.

Jalur perforin *granzyme*

Sitotoksitas yang dimediasi sel T varian adalah jenis dari hipersensitivitas tipe IV dimana CD8⁺ sel membunuh sel antigen. Sitotoksik limfosit T (CTLs) ini mampu membunuh sel target melalui jalur ekstrinsik dan interaksi FasL/FasR adalah metode predominan dari CTL-yang menginduksi *apoptosis*. Namun, mereka juga mampu memberikan efek sitotoksik pada sel-sel tumor dan sel-sel yang terinfeksi virus melalui jalur novel yang melibatkan sekresi *perforin* molekul transmembran membentuk pori-pori dengan pelepasan subsequent dari granul sitoplasma melalui pori-pori dan pada sel target. *Serin protease granzyme A* dan *granzyme B* adalah komponen yang paling penting dalam granul.

Granzyme B akan memecah protein di residu Aspartat dan karena itu akan mengaktifkan procaspase-10 dan dapat memecah faktor-faktor seperti ICAD (*Inhibitor* dari Caspase diaktifkan DNase). Penemuan terbaru juga telah menunjukkan bahwa *granzyme B* dapat memanfaatkan jalur mitokondria untuk amplifikasi sinyal kematian dengan pengikatan spesifik oleh Bid dan induksi pelepasan sitokrom c. Namun, *granzyme B* juga dapat langsung mengaktifkan *caspase-3*. Dengan cara ini, jalur *signaling* hulu dilewati dan terdapat induksi langsung dari tahap eksekusi dari *apoptosis*.

Telah disarankan bahwa kedua jalur mitokondria dan aktivasi langsung *caspase-3* sangat penting untuk *granzyme B*-yang menginduksi pembunuhan. Penemuan terbaru menunjukkan bahwa metode *sitotoksitas granzyme B* sangat penting sebagai mekanisme kontrol untuk perluasan sel T jenis sel T tipe 2 (Th2).

Disarankan bahwa kedua jalur mitokondria dan langsung aktivasi caspase-3 sangat penting untuk *granzyme B-induced* pembunuhan (Goping et al., 2003). Temuan baru menunjukkan bahwa metode *granzyme B cytotoxicity* kritis sebagai mekanisme kontrol untuk perluasan sel T pembantu 2 jenis sel T (Th2)

Selain itu, penemuan menunjukkan bahwa kematian reseptor maupun *caspases* yang terlibat dengan diinduksi reseptor sel T *apoptosis* sel Th2 diaktifkan karena menghalangi *ligan* mereka tidak berpengaruh pada *apoptosis*. Di sisi lain, Fas-Fas *ligan* interaksi, adaptor protein dengan kematian domain dan *caspases* semua terlibat dalam *apoptosis* dan peraturan sel penolong tipe 1 sitotoksik sedangkan *granzyme B* tidak berpengaruh.

Granzyme A ini juga penting dalam sel T *cytotoxic* diinduksi *apoptosis* dan mengaktifkan jalur *independen caspase*. Sekali di dalam sel, *granzyme A* mengaktifkan DNA *nicking* melalui DNase NM23-H1, produk gen *supresor* tumor. DNase ini

memiliki peran penting dalam pengawasan kekebalan untuk mencegah kanker melalui induksi *apoptosis* sel tumor. *Nucleosome* protein SET biasanya menghambat gen NM23-H1. *Granzyme A protease* memecah kompleks SET menyebabkan penghambatan NM23-H1, yang menghasilkan degradasi DNA *apoptosis*. Selain menghambat NM23-H1, SET kompleks memiliki fungsi penting dalam struktur kromatin dan reparasi DNA. Protein yang membentuk kompleks ini (SET, Ape1, pp32, dan HMG2) tampaknya bekerja sama untuk melindungi Kromatin dan struktur DNA. Oleh karena itu, inaktivasi kompleks ini oleh granzyme yang kemungkinan juga berkontribusi terhadap apoptosis dengan menghalangi pemeliharaan integritas struktur DNA dan kromatin.

Jalur Intrinsik

Jalur *signaling intrinsik* yang memulai apoptosis melibatkan beragam non-reseptor-dimediasi rangsangan yang menghasilkan sinyal intraselular yang bertindak secara langsung pada target dalam sel dan peristiwa-peristiwa yang dicetuskan oleh mitokondria. Rangsangan yang memulai jalur intrinsik menghasilkan sinyal intraselular yang dapat bertindak dalam bentuk positif atau negatif. Sinyal negatif melibatkan ketiadaan faktor pertumbuhan tertentu, hormon, dan sitokin yang dapat mengakibatkan kegagalan penekanan program kematian, sehingga memicu *apoptosis*. Dengan kata lain, terdapat faktor penarikan, hilangnya penekanan *apoptosis*, dan selanjutnya aktivasi *apoptosis*. Rangsangan lain bertindak dengan cara yang positif termasuk, tetapi tidak terbatas pada, radiasi, racun, hipoksia, hipertermia, infeksi dan radikal bebas.

Semua rangsangan ini menyebabkan perubahan dalam membran mitokondria yang mengakibatkan pembukaan transisi-permeabilitas-mitokondria (MPT), kehilangan potensi transmembran mitokondria dan pelepasan dua kelompok utama biasanya protein *pro-apoptosis* dari ruang intermembran ke sitosol. Kelompok pertama terdiri dari *sitokrom c*, Smac DIABLO dan *protease* serin HtrA2/Omi. Protein ini mengaktifkan jalur mitokondria dependen caspase. Sitokrom c mengikat dan mengaktifkan Apaf-1 serta *procaspase-9*, membentuk "*apoptosome*".

Pengelompokan *procaspase-9* dengan cara ini menyebabkan aktivasi *caspase-9*. SMAC DIABLO dan HtrA2 Omi dilaporkan mencetuskan apoptosis dengan menghambat aktivitas IAP (inhibitor protein *apoptosis*). Mitokondria protein juga telah diidentifikasi berinteraksi dengan menekan aksi IAP namun percobaan menyarankan bahwa pengikatan IAP sendiri mungkin tidak cukup sebagai bukti untuk menyebut protein mitokondria sebagai "*pro-apoptosis*".


Kelompok kedua protein *pro-apoptosis*, AIF, *endonuklease G* dan CAD, dilepaskan dari mitokondria selama *apoptosis*, tetapi ini adalah peristiwa akhir yang terjadi setelah sel telah berkomitmen untuk mati. AIF bertranslokasi ke inti dan menyebabkan DNA berfragmentasi ke potongan ~50-300 kb dan kondensasi *perifer* kromatin inti. Bentuk awal kondensasi inti dirujuk sebagai kondensasi "tahap 1". *Endonuklease G* juga bertranslokasi ke inti dimana ia memecah kromatin inti untuk menghasilkan fragmen DNA *oligonucleosomal*. AIF dan *endonuklease G* keduanya berfungsi secara *independen-caspase*. CAD kemudian dilepaskan dari mitokondria dan bertranslokasi ke inti dimana, setelah pembelahan oleh *caspase-3*, mengarah ke fragmentasi DNA *oligonucleosomal* kondensasi kromatin. Kondensasi Kromatin kemudian dan lebih jelas ini disebut sebagai kondensasi "tahap 2".

Kendali dan regulasi peristiwa mitokondria *apoptosis* terjadi melalui anggota keluarga protein Bcl-2. Protein supresor tumor P53 memiliki peran penting dalam regulasi dari keluarga protein Bcl-2, namun mekanisme yang tepat belum benar-benar terungkap. Keluarga protein Bcl-2 mengatur permeabilitas membran mitokondria dan dapat berupa *pro-apoptosis* atau *anti-apoptosis*. Sampai saat ini, total 25 gen telah diidentifikasi dalam keluarga Bcl-2. Beberapa protein *anti-apoptosis* termasuk Bcl-2, Bcl-x, Bcl-XL, Bcl-XS, Bcl-w, tas, dan beberapa protein yang *pro-apoptosis* Bcl-10, Bax, Bak, Bid, Bad, Bim, Bik, dan Blk. Protein ini memiliki arti penting khusus karena mereka dapat menentukan apakah sel berkomitmen untuk *apoptosis* atau menggagalkan proses. Diperkirakan bahwa mekanisme kerja dari keluarga protein Bcl-2 utama adalah peraturan pelepasan sitokrom c dari mitokondria melalui perubahan permeabilitas membran mitokondria.

Beberapa mekanisme yang mungkin telah dipelajari tetapi telah terbukti tidak definitif. Kerusakan mitokondria di jalur *Fas apoptosis* diperantarai oleh pengikatan *caspase-8* oleh Bid. Ini adalah salah satu contoh dari "*cross-talk*" antara jalur (ekstrinsik) reseptor kematian dan jalur (intrinsik) mitokondria. Fosforilasi Serin Bad ini dikaitkan dengan sekuen 14-3-3, anggota keluarga *phosphoserine* multifungsi yang mengikat molekul. Ketika Bad *terfosforilasi*, terperangkap oleh 14-3-3 dan dibawa di sitosol tapi ketika Bad *ter-unfosforilasi*, akan bertranslokasi ke mitokondria untuk melepaskan *sitokrom C*.

Bad juga dapat *heterodimer* dengan Bcl-XL atau Bcl-2, menetralkan efek pelindung mereka dan mempromosikan kematian sel. Ketika tidak dipindahkan oleh Bad, Bcl-2 dan Bcl-XL menghambat pelepasan sitokrom C dari mitokondria meskipun mekanismenya tidak dipahami dengan baik. Laporan menunjukkan bahwa Bcl-2 dan Bcl-XL menghambat kematian *apoptosis* terutama dengan mengendalikan aktivasi *caspase protease*. Protein tambahan Ruang Khusus "Aven" muncul pada pengikatan Bcl-XL dan Apaf-1, sehingga mencegah aktivasi *procaspase-9*. Terdapat bukti bahwa *overekspresi* dari baik Bcl-2 atau Bcl-XL akan menurunkan regulasi yang lain, yang menunjukkan regulasi timbal balik antara kedua protein.

Puma dan *Noxa* adalah dua anggota keluarga Bcl-2 yang juga terlibat dalam *pro-apoptosis*. *Puma* memainkan peran penting dalam p53-dimediasi *apoptosis*. Ini menunjukkan bahwa, secara *in vitro*, *overekspresi* dari *Puma* disertai dengan peningkatan ekspresi BAX, perubahan konformasi BAX, translokasi ke mitokondria, pelepasan *sitokrom C* dan pengurangan mitokondria potensial membran. *Noxa* juga merupakan mediator calon p53-diinduksi *apoptosis*. Studi menunjukkan bahwa protein ini dapat berelokasi ke mitokondria dan berinteraksi dengan *anti-apoptosis* anggota keluarga Bcl-2, mengakibatkan aktivasi *caspase-9*. Karena *Puma* dan *Noxa* diinduksi oleh p53, mereka mungkin memediasi *apoptosis* yang menimbulkan kerusakan *genotoksik* atau aktivasi *onkogen*. *Oncoprotein* Myc juga telah dilaporkan memperkuat *apoptosis* melalui mekanisme bergantung pada p53 maupun- mekanisme independen.



Gambar 26. Representasi skematis dari peristiwa apoptosis. Dengan dua jalur utama apoptosis ekstrinsik dan intrinsik serta jalur perforin granzyme. Masing-masing membutuhkan sinyal pemicu khusus untuk memulai kejadian molekuler energi-tergantungan-cascade. Masing-masing jalur mengaktifkan inisiator sendiri *caspase* (8, 9, 10) yang pada gilirannya akan mengaktifkan eksekutor sendiri *caspase*-3. Namun, *granzyme* A bekerja dalam mode *caspase-independent*. Jalur eksekusi mengakibatkan karakteristik tampilan morfologik sel termasuk penyusutan sel, kondensasi *kromatin*, pembentukan *blebbing* sitoplasma dan badan-badan *apoptosis* dan akhirnya fagositosis badan *apoptosis* oleh sel-sel *parenchymal* yang berdekatan, sel-sel *neoplastik* atau *makrofag*. (Elmore, Susan. 2007)

Jalur eksekusi


Jalur ekstrinsik dan intrinsik keduanya berakhir pada tahap eksekusi, yang dianggap sebagai jalur akhir *apoptosis*. Aktivasi eksekusi *caspase* memulai tahap *apoptosis*. Eksekusi *caspase* mengaktifkan sitoplasma *endonuklease*, yang memecah bahan inti, dan *protease* yang memecah protein inti dan *cytoskeletal*. *Caspase*-3, *caspase*-6, dan *caspase*-7 berfungsi sebagai efektor atau *caspases* "eksekutor", memecah berbagai substrat, termasuk *cytokeratins*, PARP, plasma membran *cytoskeletal* protein *alpha fodrin*, protein inti NuMA dan lain-lain, yang akhirnya menyebabkan perubahan morfologi dan biokimia yang terlihat dalam sel-sel *apoptosis*.

Caspase-3 dianggap yang paling penting dari *caspase* eksekutor dan diaktifkan oleh salah satu *caspase* inisiator (*caspase*-8, *caspase*-9 atau *caspase*-10). *Caspase*-3 khusus mengaktifkan *endonuklease* CAD. Dalam sel-sel yang sedang membelah CAD berada bersama kompleks inhibitorynya, ICAD. Dalam *apoptosis* sel, pengaktifan *caspase*-3 memecah ICAD melepaskan CAD. CAD kemudian mendegradasi kromosom DNA dalam inti dan menyebabkan kondensasi kromatin. *Caspase*-3 juga menginduksi disintegrasi sel ke dalam badan apoptosis dan reorganisasi *cytoskeletal*. *Gelsolin*, sebuah aktin yang mengikat protein, telah diidentifikasi sebagai salah satu kunci substrat pengaktifan *caspase*-3.

Gelsolin biasanya akan bertindak sebagai inti untuk polimerisasi aktin dan akan mengikat *phosphatidylinositol biphosphate*, menghubungkan organisasi aktin dan transduksi sinyal. *Caspase-3* akan memecah gelsolin dan fragmen gelsolin, pada gilirannya, membelah filamen aktin secara independen kalsium. Hal ini mengakibatkan gangguan *Sitoskeleton*, transportasi intraseluler, pembelahan sel, dan transduksi sinyal.

Pengambilan *fagositik* sel *apoptosis* adalah komponen terakhir dari *apoptosis*. Fosfolipid asimetri dan eksternalisasi *phosphatidylserine* pada permukaan sel-sel *apoptosis* dan fragmennya adalah ciri khas dari tahap ini. Meskipun mekanisme translokasi *phosphatidylserine* ke permukaan luar sel selama *apoptosis* tidak dipahami dengan baik, telah dikaitkan dengan hilangnya aktivitas translokasi *aminophospholipid* dan *flip-flop* nospesifik *fosfolipid* dari berbagai kelas. Penelitian menunjukkan bahwa Fas, *caspase-8*, dan *caspase-3* yang terlibat dalam regulasi eksternalisasi *phosphatidylserine* pada *stress oksidatif eritrosit*, bagaimanapun, paparan *phosphatidylserine caspase-independen* terjadi selama *apoptosis* utama limfosit T.

Munculnya *fosfatidilserin* di permukaan luar sel *apoptosis* kemudian memfasilitasi pengenalan *fagositik noninflamasi*, memungkinkan untuk pengambilan awal dan pembuangannya. Proses awal dan pengambilan yang efisien tanpa pelepasan konstituen selular, mengakibatkan tidak ada respons peradangan.



Gambar 27. Jalur *apoptosis* (A) jalur ekstrinsik. (B) Jalur intrinsik. (Karp, 2015)

BAB 9


KANKER

Kanker muncul dari kerusakan di lapisan kontrol sel yang mengarah ke *proliferasi* sel yang tidak diatur. Penyebab kanker adalah mutasi dan perubahan lain dalam DNA, pengkodean protein yang mempromosikan pertumbuhan atau yang menahan pertumbuhan, atau mesin *apoptosis* langsung atau bertanggung jawab untuk perbaikan kerusakan dan sinyal DNA, dan kromatin *remodeling*. Mutasi dapat diwariskan, mereka mungkin hadir dalam sel bakteri, atau dapat dihasilkan dalam sel-sel *somatik*.

DNA bisa rusak dalam beberapa cara. Proses hidrolitik dan produk sampingan oksidatif dari metabolisme seluler normal dapat merusak DNA. Radiasi pengion dari sinar kosmik dan dari bahan radioaktif di tanah, air, dan udara seperti uranium, torium dan radon dapat merusak DNA. Selain itu, ultraviolet radiasi (UV) dari sinar matahari dapat merusak DNA. Langkah utama yang mengarah ke kerusakan DNA oleh lingkungan dan rangsangan endogen adalah pencetusan radikal oksidatif dekat DNA. Radikal bebas adalah spesies molekul dengan elektron tidak berpasangan, yang membuat mereka sangat reaktif. Yang paling merusak dari jenis oksidatif reaktif (ROS) adalah radikal hidroksil. Ketika diproduksi di sekitar molekul DNA radikal hidroksil dan ROS lain menyerang gula dan basa menghasilkan rantai tunggal DNA, kehilangan basa, dan modifikasi basa. Selain mekanisme ROS ini, radiasi pengion seperti sinar X dan iradiasi gamma secara langsung dapat menghasilkan DNA ganda. Ketika sel yang rusak membelah tanpa perbaikan kerusakan akan menyebabkan terjadinya mutasi pada sel.

Pada *metastasis*, sel-sel kanker ganas melepaskan diri dari mana mereka bergerak, memasuki sistem peredaran darah, dan menyerang organ lain. Mereka membentuk koloni, atau tumor sekunder di lokasi baru dan menyebabkan kerusakan pada sel tetangga mereka dengan mengambil alih sumber nutrisi mereka. Kanker yang berasal dari sel-sel epitel adalah jenis kanker yang paling umum. Ketika rangka sel-sel epitel kanker akan melepaskan diri dari lokasi awal mereka, mereka harus melepaskan diri dari sel-sel epitel lain dan dari ECM. Untuk melakukannya mereka harus merusak ikatan sel epitelial lain yang dibentuk oleh E-cadherins, dan hubungan sel ke ECM yang dibentuk oleh *integrin*. Setelah mereka terlepas satu sama lain dan dari ECM, mereka harus melewati membran dasar untuk mencapai dan memasuki sistem peredaran darah. Hal ini dilakukan dengan membentuk *matrix metalloproteinase* untuk mendegradasi matriks protein. Sel-sel kanker membuat dan mengeluarkan sejumlah enzim *proteolitik* yang cukup untuk melemahkan membran dan memungkinkan bagian sel melalui itu ke dalam pembuluh darah.

Matriks metalloproteinase (MMPs) adalah keluarga dari lebih dari dua lusin sekresi enzim proteolitik yang (i) memecah komponen ECM, dan (ii) memecah *signaling* protein yang terkait dengan permukaan ECM dan sel yang mengakibatkan aktivasi dan kelarutan mereka. Enzim-enzim ini biasanya disintesis dalam jumlah kecil tapi produksinya meningkat dalam respon terhadap sitokin dan stres, dan diikuti transformasi dari sel normal menjadi sel kanker.



Gambar 28. Struktur *matriks metalloproteinase*: kebanyakan MMP berisi N-terminal sinyal peptida (tidak ditampilkan) yang menargetkan enzim untuk sekresi, diikuti oleh prodomain. Domain katalitik berisi domain-mengikat zink dan semua MMP kecuali MMP7 dan MMP26 mengandung domain Hemopexin C-terminal ke domain katalitik dan terpisah daerah penghubung. Kotak dengan tanda penghubung mewakili domain yang terdapat dalam beberapa MMP tetapi tidak yang lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah domain Furin-seperti, tipe II Fibronectin berulang, dan segmen transmembran + sitoplasma. (Beckerman, M. 2005)

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 28. MMP berisi prodomain, yang dipecah untuk mengaktifkan enzim, dan fibronektin, hemopexin, dan kolagen V (tidak ditampilkan) yang mempromosikan substrat dan mengikat inhibitor. Domain furin menyediakan lokasi pembelahan alternatif. Anggota keluarga empat protein disebut *inhibitor of metalloproteinases*, atau TIMPs, mengikat domain hemopexin MMP, membentuk kompleks MMP-TIMP yang mengatur aktivitas MMP. Zink-binding site terdapat pada daerah katalitik. Pengikatan zink (dimediasi oleh *trio* residu histidin) diperlukan, dan persyaratan ini menimbulkan nama "*metalloproteinase*."

Beberapa mutasi penting menghasilkan perubahan sel

Transformasi sel normal menjadi satu kanker adalah proses multistep. Mutasi terakumulasi dari waktu ke waktu dan sepanjang generasi sel, dan kerentanan terhadap kanker meningkat pesat dengan usia. Akumulasi mutasi berbagai genetik dihasilkan berbagai macam modifikasi genetik. Termasuk perubahan dalam jumlah kromosom (*aneuploidi*) yang melibatkan kehilangan atau mendapatkan seluruh kromosom, translokasi kromosom yang dapat menghasilkan gen baru oleh penggabungan dua gen yang berbeda, dan duplikasi gen (*gene amplification*). Satu atau lebih dari perubahan dramatis dalam kromosom adalah tumor pada manusia.

Target genetik mutasi yang mempromosikan pertumbuhan kanker dapat dikelompokkan ke dalam empat kelas fungsional. Pertama adalah gen yang menyandikan protein yang berfungsi di jalur *signaling* pertumbuhan. Produk gen ini mungkin menyampaikan sinyal *pro-growth* atau mencehah pertumbuhan. Bentuk

mutasi dari reseptor *tyrosin kinase*, *GTPase*, dan nonreseptor tirosin siklin terdapat di banyak jenis kanker.

Pengaturan kedua mutasi adalah gen yang menyandikan protein yang mengatur bunuh diri sel. Protein target ini memicu atau menghambat program apoptosis selular yang diaktifkan bila kondisi menyimpang terdeteksi. Kelompok ketiga mutasi yang penting adalah untuk gen yang menyandikan penjaga selular. Protein ini melaksanakan perbaikan DNA dan mempertahankan integritas kromosom. Kumpulan keempat dan terakhir adalah produk penting gen yang penting terdiri dari pusat regulator pertumbuhan, perbaikan, dan kematian. Produk gen ini dinamakan protein *controller*. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan perkembangan yang teratur melalui siklus sel, menghentikan atau kemajuan bila diperlukan dan *signaling* untuk mesin *apoptosis*. Beberapa anggota terkemuka dari masing-masing kelas protein tercantum dalam tabel 15.

Oncoprotein adalah protein yang telah diubah secara struktural oleh mutasi pada gen yang menyandikan mereka. Protein ini beraksi pada transduksi sinyal, integrasi, dan jalur regulasi yang terlibat dalam pertumbuhan sel, perbanyakan, diferensiasi, dan kematian sel. Sebagai hasil dari perubahan-perubahan struktural protein ini tidak berfungsi secara normal, tetapi sebaliknya diganti dengan perubahan dalam cara yang merangsang pertumbuhan sel yang tidak diatur dan proliferasi yang mempromosikan perkembangan kanker. Tumor *suppressor* mirip dengan *oncoprotein* kecuali bahwa mereka biasanya bertindak sebagai rem pada pertumbuhan.

Tabel 15. Protein dengan mutasi dan perubahan bentuk terkait kanker. (Beckerman, M. 2005)

Protein	Fungsi/jalur	Kelas	Berperan pada kanker
Ras	Pertumbuhan	O	Banyak kanker
Src	Pertumbuhan	O	<i>Sarcoma</i>
Abl	Pertumbuhan	O	<i>Leukemia</i>
APC	Pertumbuhan	Ts	Kanker kolon
b-catenin	Pertumbuhan	O	Kanker kolon
Myc	Pertumbuhan	O	Banyak kanker
Bax	<i>Apoptosis</i>	Ts	Banyak kanker
Bcl-2	<i>Apoptosis</i>	O	Banyak kanker
hMLH1	Perbaikan	C	Kanker kolon
hMSH2	Perbaikan	C	Kanker kolon
ATM	Perbaikan	C	<i>Ataxia telangiectasia</i>
NBS	Perbaikan	C	<i>Nijmegen syndrome breakage</i>
BRCA1,2	Perbaikan	C	Payudara/kanker rahim
p53	Pengontrol	Ts	Banyak kanker
pRb	Pengontrol	Ts	Banyak kanker

Kelompok pertama pada tabel 15. terdiri dari protein yang me-relay sinyal pertumbuhan dari membran plasma ke daerahtarget di dalam sel. Ras dan Src adalah

anggota utama dari kelompok ini. Src terlibat dalam sekitar 80% dari kanker kolon pada manusia. Ras *oncprotein* lebih luas dalam kejadian kanker. Mereka hadir dalam 30-40% dari kanker pada manusia. Tidak semua mutasi sama pentingnya. Ingat bahwa kodon adalah urutan tiga basa yang dikode asam amino. Pada mutasi Ras, kodon 12, 13 dan 61 berfungsi sebagai hot spot untuk aktivitas onkogen. Mutasi-mutasi yang terjadi pada daerah ini adalah titik mutasi-mutasi yang mengubah salah satu pasangan dasar dalam pengkodean *codon* glisin (12 dan 13) dan glutamin (61) ke dalam pengkodean asam amino yang berbeda.

Ras adalah sebuah penghantar penting yang beroperasi di jalur yang menyampaikan sinyal pertumbuhan ke hilir target. Fungsinya sebagai tombol penerus. Seperti semua GTPase yang diaktifkan oleh GEF dan dimatikan oleh GAP. Dalam ketiadaan sinyal pertumbuhan, tombol dalam posisi “mati”, tetapi “hidup” dalam menanggapi sinyal yang sesuai. Mutasi-mutasi yang mengarah ke kanker mengakibatkan tombol yang terjebak dalam posisi “hidup”, mampu dimatikan, dan secara terus-menerus mengirimkan sinyal ke dalam sel.

Gen Src pertama kali diidentifikasi dalam *retrovirus*. Merupakan virus yang menggunakan RNA sebagai pengkodean genetik mereka, bukan DNA. Ketika *retrovirus* menyerang sel virus, RNA berubah menjadi DNA dan masuk ke dalam genom inang. *Retrovirus* kadang-kadang mendapatkan gen dengan kemampuan *oncogenik* dari *host* awal dan akan menjadi tuan rumah berikutnya. Gen ini disebut onkogen virus. *Onkogen* Src pertama kali diidentifikasi dalam virus ayam Rous Kaposi, dan kemudian ditemukan onkogen virus dalam sel-sel normal di ayam dan kemudian pada manusia. Bentuk virus Src dan *onkogen* virus lainnya biasanya berbeda dalam beberapa cara dari kelompok selular mereka. Untuk alasan itu bentuk virus Src dilambangkan dengan v-Src sementara bentuk selular dilambangkan sebagai c-Src.

Overekspresi GFRs pada banyak kanker

Faktor pertumbuhan dan reseptor faktor pertumbuhan (GFRs) mendukung perkembangan tumor ganas dalam beberapa cara. Salah satu kontributor yang menonjol dengan *onset* keganasan adalah faktor pertumbuhan endotel vaskular (VEGF). Untuk membentuk tumor yang padat untuk berkembang dan bertumbuh, harus memiliki pasokan darah yang memadai. Dalam menanggapi kebutuhan ini untuk perluasan vaskular, tumor *angiogenesis* berlangsung. Ekspresi messenger RNA untuk ligan VEGF meningkat pada banyak sel-sel tumor pada manusia. Peningkatan VEGF mRNAs hadir pada pertumbuhan yang pesat dari *glioblastoma* tumor otak, dan kanker paru-paru, payudara, saluran pencernaan, organ reproduksi wanita, kelenjar tiroid, dan saluran kemih.

Dimerisasi reseptor faktor pertumbuhan adalah sebuah langkah penting dalam menyampaikan sinyal oleh faktor pertumbuhan polipeptida ke sel interior. Reseptor *tyrosin kinase* dibawa melalui pengikatan ligan, mengakibatkan pembentukan dimers reseptor atau *oligomer*. *Autofosforilasi* dalam lingkaran aktivasi terjadi yang berikutnya diikuti oleh perekrutan molekul signaling sitoplasma. Dalam ketiadaan ligan reseptor tidak mengalami dimerisasi dan tidak ada sinyal yang melintasi membran plasma.

Berbeda dengan situasi normal, dimerisasi spontan terjadi pada banyak kasus kanker. Pada situasi *abnormal* ini, reseptor mengalami dimerisasi dalam ketiadaan pengikatan *ligan*. *Ligan*-bebas dimerisasi dapat diproduksi dalam beberapa cara yang berbeda. Paling banyak dicetuskan melalui *overekspresi* reseptor yang timbul sebagai akibat dari amplifikasi gen. Juga dapat dihasilkan melalui mutasi titik dan penghapusan *ekson*.

Faktor pertumbuhan *Epidermal* reseptor (EGFRs) mengalami *dimerisasi* spontan di banyak kanker, termasuk payudara, paru-paru, kanker ovarium dan *glioma*, dan tumor otak asal *glial*. Amplifikasi gen EGFR (ErbB1) terjadi di sekitar 40% dari *glioma*, dan amplifikasi gen ErbB2 terjadi di sekitar 30% dari kanker payudara. Pada kebanyakan tumor otak, gen disusun ulang bersama amplifikasi gen dan perubahan sering melibatkan pemotongan bagian-bagian dari molekul. Efek utama dari *dimerisasi* spontan adalah pengaktifan jalur yang mengirimkan sinyal pertumbuhan/*proliferasi* yang tidak seharusnya ke dalam inti.

Perubahan pada campuran molekul adhesi sel terekspresi mengikuti perkembangan tumor. Bentuk perubahan ekspresi tidak hanya terjadi selama metastasis, tetapi juga selama pertumbuhan tumor padat. Kebanyakan kanker berkembang dari sel-sel epitel, dan hilangnya *E-cadherin* adalah kejadian biasa. Perlu diingat bahwa *E-cadherins* membantu menjaga perekat ketat ikatan dalam populasi sel-sel ini. Hilangnya perekat dan perubahan dalam organisasi *sitoskeleton* menyertai transformasi keganasan. Di antara perubahan-perubahan dalam pola ekspresi adalah upregulasi $\alpha V\beta 3$ dan $\alpha 6\beta 4$ integrin, dan perubahan dari *N-cadherin* ke *E-cadherin* dan kembali ketika perekat dibutuhkan lagi.

Integrin bersama *cadherin* dan Ig superfamili sel adhesi molekul membentuk kompleks dengan reseptor faktor pertumbuhan. Contoh kerjasama antara adhesi dan reseptor faktor pertumbuhan adalah $\alpha 6\beta 1$ dan $\alpha 6\beta 4$ dan EGFRs, NCAM, dan *N-cadherin* dengan FGFRs, dan *VE-cadherin* dengan reseptor VEGF. Salah satu hasil dari bentuk asosiasi adalah kemampuan *integrin* dan/atau reseptor faktor pertumbuhan untuk menyampaikan sinyal ke dalam sel tanpa harus melibatkan *ligan* alami mereka. Pengelompokan membawa reseptor menjadi dekat satu sama lain, dan mempromosikan *fosforilasi* dan perekrutan sitoplasma *transduser* sinyal, dengan demikian mengurangi kebutuhan untuk keterlibatan ligan.

Peran bentuk mutasi dari protein dalam perkembangan kanker

Kemungkinan untuk mendapatkan tumor *kolorektal* melebihi 50% pada umur 70. sebagian besar tumor ini tidak mengarah ke tingkatana mematikan, tetapi meskipun demikian tumor *kolorektal* adalah penyebab kedua kematian kanker di Amerika Serikat. Bentuk-bentuk mutasi pada beberapa produk gen berkontribusi pada *onset* tumor *kolorektal*.

Protein *adenomatosa* familial *coli* (APC) dan β -*catenin* berpartisipasi dalam jalur *signaling* Wnt. Sistem sinyal Wnt dianggap sebagai jalur perkembangan. APC diterjemahkan di kompartemen *basolateral* sel-sel epitel bersama dengan glikogen sintase kinase (GSK) yang mengatur aktivitas *signaling*. Tidak adanya sinyal Wnt,

GSK fosforilasi β -catenin menandai bahwa untuk dihancurkan. Kehadiran *signaling* Wnt GSK adalah antagonis dan bukan menandai β -catenin. Yang terakhir adalah stabil sebagai monomer sitoplasma dan kemudian bertranslokasi ke inti. APC membentuk kompleks dengan GSK dan β -catenin. Jika APC tidak ada atau bermutasi, β -catenin tidak dapat diatur dengan baik oleh GSK. Sebaliknya, tingkat β -catenin yang tinggi meniru efek sinyal Wnt aktif. Demikian pula, mutasi-mutasi tertentu untuk β -catenin membuat molekul yang sensitif terhadap regulasi APC/GSK mengarah ke hasil yang sama. Mutasi pada APC atau β -catenin ditemui dalam banyak tumor *kolorektal*.

Salah satu titik akhir utama dari sinyal melalui APC/GSK/ β -catenin adalah mesin transkripsi dalam inti sel. Berdasarkan translokasi ke inti, β -catenin berikatan dengan faktor transkripsi Tcf-4/LEF untuk membentuk kompleks dimer. Dengan demikian, program ekspresi gen berubah ketika β -catenin tidak diatur dengan baik. Titik akhir kedua *signaling* melalui APC adalah *sitoskeleton*. Selama pembelahan sel APC berinteraksi dengan protein di ujung *mikrotubulus* yang membentuk gelondongan *mitosis*. APC memberikan kontribusi untuk menghubungkan *mikrotubulus* untuk *kinetokor*, daerah lampiran pada kromosom, dan memberikan kontribusi ke sinyal bahwa lampiran benar dibuat. Sel-sel yang mengandung mutasi membentuk APC menunjukkan ketidakstabilan kromosom, sehingga mereka memiliki nomor kromosom yang salah.

Jalur Wnt bukan satu-satunya jalur yang berkontribusi untuk kanker. *Signaling* menyimpang pada jalur Hedgehog dan TGF β dapat mempromosikan kanker juga. Bentuk-bentuk yang bermutasi *Patch* dan *Smoothened*, dua reseptor yang beraksi di jalur *Hedgehog*, ditemui dalam sel basal karsinoma, kanker yang paling umum pada manusia. *Patch* membatasi efek pencetus pertumbuhan. Sehingga dikatakan sebagai tumor *supresor*, sementara *Smoothened*, yang menghantarkan sinyal pertumbuhan ke dalam sel, bertindak sebagai stimulator pertumbuhan. Faktor transkripsi Gli beraksi di hilir dari reseptor tersebut di jalur *Hedgehog* menyampaikan sinyal pertumbuhan ke inti. Peningkatan level aktivitas Gli ditemukan di kanker ini sebagai akibat dari mutasi Gli dan sifat menyimpang dari reseptor.

Smads, bertindak sebagai sinyal *transduser* hilir di jalur TGF- β , dapat merangsang atau menghambat pertumbuhan. Dalam kapasitas mereka sebagai penghambat pertumbuhan, mereka menghambat G1 *cyclin-dependent kinase* Cdk4 dan Cdk2 yang bertindak selama fase G1 siklus sel. *Smads* merangsang produksi p15Ink4b, protein yang mengikat dan menghambat *cdks*, dan mencegah perakitan kompleks *Cyclin D-cdk4* dan *siklin E-Cdk2*. Mutasi pada komponen dari jalur TGF β -ligan, reseptor, *Smads* (Smad2 atau Smad4) dan kofaktor yang muncul dalam sebagian besar kanker usus besar dan pankreas.

Anggota keluarga protein Bcl-2 adalah pusat regulator dari *apoptosis*. Ketika protein ini tidak diekspresikan di tingkat yang tepat, pilihan untuk memicu *apoptosis* untuk menghapus sel-sel yang rusak atau terinfeksi tumbuh di luar kontrol ini tidak mungkin lagi. Terdapat beberapa jenis protein Bcl-2. Beberapa mempromosikan *apoptosis* sementara yang lain menghambatannya. BCL-2 adalah anggota utama dari

kelompok *antiapoptosis*. Penyimpangan gen *bcl-2* hadir dalam 90% limfoma *folikular* atau B-sel *limfoma* sehingga dinamakan protein Bcl-2. Pada sel tersebut, translokasi telah terjadi. Gen yang mengkode Bcl-2 terletak pada kromosom 18 telah bertranslokasi menyatu dengan gen antibodi rantai berat (IgH) yang terletak pada kromosom 14. Hasil translokasi ini, secara simbolis dinyatakan sebagai t(14:18), adalah bahwa gen *bcl-2* diposisikan berikutnya untuk penambah bagi gen antibodi. Antibodi gen diekspresikan dan sebagai hasil dari translokasi gen Bcl-2 mengalami *overekspresi* secara terus-menerus.

Beberapa produk fusi lain memainkan peran menonjol dalam leukemia. *Burkitt's limfoma* dicirikan oleh translokasi t(8:14) dan berikutnya fusi gen *c-Myc* dengan gen IgH. *Leukemia myelogenous* kronis dan *leukemia limfositik* akut melibatkan translokasi gen *abl* dari kromosom 9 sampai kromosom 22, dimana dia melakukan fusi dengan gen BCR. Perubahan bentuk kromosom 22 dikenal sebagai kromosom *Philadelphia*. Semua contoh-contoh ini melibatkan gabungan gen dengan kemampuan onkogenik (Bcl-2, *c-Myc*, dan *Abl*) dengan gen yang diekspresikan dengan kuat (BCR dan IgH) menuju *overekspresi onkogen*.

Perbaikan kerusakan DNA

Perbaikan sistem DNA bertanggung jawab untuk menjaga integritas dari genom sepanjang hidup sel. Ada sekitar 130 gen yang dikenal menyandikan DNA perbaikan protein. Disusun ke dalam lima sistem perbaikan kerusakan DNA (tabel 16). Perbaikan eksisi basa (BER) dan perbaikan eksisi nukleotida (NER) perbaikan kerusakan untai tunggal. Yang lain, sistem perbaikan (MMR) ketidakcocokan, mengoreksi ketidaksesuaian pasangan basa yang dihasilkan selama replikasi dan rekombinasi DNA. Akhirnya, dua sistem *interlocking homologous recombination* (HR) dan *nonhomologous end joining sistem* (NHEJ), yang menangani pemutusan untai ganda. Masing-masing sistem berisi enzim *ensembel* dan molekul regulator yang memperbaiki dan menggabungkan kembali untai DNA melalui urutan aktivitas *kemomekanikal*.

Seperti tercantum dalam tabel 16, sistem perbaikan *eksisi* basa menghapus basa yang rusak oleh radiasi UV dan sinar-X, dan radikal oksigen endogen dan bahan kimia pengalkilasi. Sistem perbaikan nukleotida eksisi menangani besar lesi dan kerus besar DNA yang timbul dari agen-agen lingkungan seperti senyawa hidrokarbon *polisiklik aromatic* dalam asap rokok. Bagian dari kromosom yang menghubungkan gen yang aktif mengalami transkripsi mendapat perhatian NER yang lebih besar dibanding segmen DNA yang mengandung gen yang jarang ditranskripsi. Beberapa kelainan, termasuk kanker kulit dan sindrom *Cockayne's* dikaitkan dengan mutasi pada pengkodean gen anggota sistem NER.

Perbaikan ketidakcocokan sistem memonitor dan memperbaiki kerusakan yang terjadi selama replikasi DNA dan rekombinasi meiosis. Di antara kombinasi AGTC mengoreksi ketidakcocokan A-G dan T-C, serta urutan Insersi yang tidak layak dan penghapusan. Mutasi pada perbaikan sistem ini mengakibatkan peningkatan kadar mutasi dan perkembangan kanker. Mutasi pada dua anggota

sistem MMR, hMLH1 dan hMSH2, yang mencolok terkait dengan kanker *kolorektal* dan kanker lainnya.

Mesin untuk memperbaiki pemutusan untai ganda ini digunakan untuk beberapa tujuan di dalam sel. Pusatnya di V (D) J rekombinasi di limfosit. Replikasi DNA yang mengalami replikasi adalah subjek untuk kerusakan dan mesin untuk memperbaiki DNA yang berpartisipasi dalam perbaikan garpu replikasi yang rusak. Mesin ini terlibat dalam rekombinasi genetik, proses dimana segmen DNA dipertukarkan antara kromosom, dan terlibat dalam kedua rekombinasi *mitosis*, Rekombinasi *homolog* dan *nonhomolog end joining* bertanggung jawab memperbaiki pemutusan untai ganda DNA. HR memanfaatkan wilayah dari Homologi urutan DNA dari kromatid saudaranya untuk memperbaiki DNA yang rusak. NHEJ tidak menggunakan wilayah yang luas urutan *homologi* untuk efek perbaikan dan tidak selalu bebas dari kesalahan.

Pemutusan untai ganda (DSBs) dapat dihasilkan secara endogen oleh agen oksidatif dan lingkungan radiasi pengion. Bentuk kerusakan, meskipun tidak seperti bentuk-bentuk lain dari cedera DNA, bisa sangat berbahaya. DSBs dapat menyebabkan translokasi kromosom, penghapusan dan fragmentasi. Mutasi pada beberapa anggota mesin yang memperbaiki pemutusan untai ganda berhubungan dengan berbagai kanker yang berbeda.

Tabel 16. Empat Jenis Perbaikan DNA. (Beckerman, M. 2005)

Jenis Perbaikan Kerusakan	Sistem	Deskripsi
Perbaikan basa	BER	Menghilangkan kerusakan basa oleh UV, sinar-X, radikal oksigen, agen pengalkilasi
Perbaikan nukleotida	NER	Menghilangkan lesi DNA yang dibawa oleh bahan-bahan dari lingkungan
Perbaikan ketidakcocokan	MMR	Perbaikan kerusakan yang timbul selama replikasi DNA dan kombinasi meiosis
Perbaikan pemutusan untai ganda	HR, NHEJ	Perbaikan pemutusan untai ganda yang disebabkan oleh radiasi ionisasi, stress oksidatif, dan faktor lingkungan lainnya

Mesin perbaikan kerusakan untai

Protein milik DSB mesin perbaikan membentuk sejumlah kompleks perbaikan yang berbeda. Protein ini bertanggung jawab untuk memperbaiki dan menggabung kembali untai DNA yang rusak disusun menjadi beberapa kompleks, masing-masing terdiri dari protein yang datang ke dalam kontak fisik dengan satu sama lain untuk melaksanakan fungsi perbaikan mereka. Protein terdiri dari modul

telah dikelompokkan bersama di pada tabel 16. Salah satu kunci utama dalam studi perbaikan mesin DSB adalah bahwa beberapa protein sentral terlibat dalam sejumlah kelainan genetik yang langka, studi terdahulu yang mengungkapkan rincian penting. Peserta dalam perbaikan DSB diberi nama untuk gangguan di mana mereka ditemukan. Contoh penamaan ini termasuk *Ataxia-telangiectasia mutated* (ATM) dan *Nijmegen breakage syndrome* (NBS). Yang langka lainnya, terkait penyakit kanker yang melibatkan protein DSB adalah *anemia Fanconi* dan *Bloom syndrome*.


Entri pertama dalam tabel adalah ATM/ATR, dua protein yang berfungsi sebagai sensor dan elemen signaling yang menyampaikan kerusakan sinyal ke seluler *controller* p53 dan untuk unit regulasi perbaikan modul. Protein ATM/ATR adalah protein *kinase* yang menyampaikan sinyal mereka dengan mengkatalisis perpindahan grup *fosforil* ke substrat mereka. Tiga protein kompleks mengikuti *entri* ATM/ATR. Masing-masing kompleks terdiri dari protein, beberapa dengan fungsi regulasi dan yang lain dengan fungsi perbaikan. Modul-modul yang terdaftar dalam tabel 17. bekerja sinergis dan secara berurutan untuk menghasilkan perbaikan DNA. Langkah-langkah awal dalam pengoperasian sistem perbaikan ini digambarkan dalam gambar 29.

Modul pertama, yang disebut sebagai kompleks Mre11, terdiri dari protein Rad50, Mre11 dan NBS1. Modul ini berpartisipasi dalam *homologous recombination* dan *nonhomologous end joining* bersama dengan beberapa untai DNA lain memanipulasi keterlibatan dalam mitosis dan meiosis. Fungsi utama dari kompleks ini adalah membentuk jembatan *flexible* antara ujung untai DNA yang rusak. Protein Rad50 mengandung kait, yang bergabung menentang protein Rad50 yang menonjol dari ujung untai DNA yang rusak. Kait bergabung dengan pasangan protein Rad50 di tengah pemutusan sementara ujung Rad50s tetap melekat pada untai DNA melalui protein Mre11.

Tabel 17. Kerusakan Untai Ganda, Sensing, Repair, And Signaling. (Beckerman, M. 2005)

Komponen	Fungsi	Deskripsi
ATM/ATR	Signaling	Fosforilasi p53, NBS1, dan BRCA1 dalam respon terhadap DSBs
Rad50	HR, NHEJ	membentuk end-processing complex dengan Mre11 and NBS1
Mre11	HR, NHEJ	Aktivitas endonuclease
NBS1	HR, NHEJ	Regulatory
Rad51	HR	Pencarian untuk DNA homology; membentuk kompleks dengan Rad52, Rad 54 dan BRCA1,2
Rad52	HR	Stimulasi aktivitas Rad51
Rad54	HR	Kromatin remodeling
BRCA1,2	HR	Regulatory; kromatin remodeling
Ku70	NHEJ	Membentuk heterodimer dengan Ku80; merekrut and aktivasi DNA-PKcs
Ku80	NHEJ	KU70 dan KU80 mengikat bagian bebas dari DSB
DNA-PKcs	NHEJ	Regulatory; signals p53
XRCC4	NHEJ	Membentuk kompleks dengan DNA ligase IV
DNA ligase IV	NHEJ	Mengakhir reattachment

Modul berikutnya adalah kelompok Rad52. Keluarga protein Rad52 bertanggung jawab untuk rekombinasi homolog. Langkah pertama dalam HR adalah pelapisan untai DNA tunggal (ssDNA) dengan molekul protein replikasi (RPA). Pada langkah berikutnya, molekul Rad51 dan BRCA2 dimuat ke untai sehingga Rad51 membuat RPA tergesur. RPA maupun Rad51 menghapus struktur sekunder dari DNA untuk memfasilitasi pasangan dari *kromatid* saudara. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 17, Rad52 memfasilitasi penggantian RPA oleh Rad51. Protein Rad51 dan BRCA2 membentuk filamen *Nukleoprotein* — BRCA2 jangkar filamen untuk DNA dan protein Rad51 membentuk tubuh filament. Pemasangan *kromatid* saudara mengikuti pertumbuhan filamen.



Gambar 29. Onset Perbaikan Pemutusan Untai Ganda. (Beckerman, M. 2005)

Protein *nonhomologous end joining* (NHEJ) melengkapi daftar ini. Dua entri terakhir dalam tabel, XRCC4 dan DNA Ligase IV, diperlukan dalam akhir langkah-langkah perbaikan DSB. Protein ini, bekerja secara sinergis dengan anggota modul Ku, bergabung kedua ujung DNA untuk menyelesaikan rekombinasi V (D) J dan NHEJ.

Bagaimana protein kanker payudara (BRCA) berinteraksi dengan DNA

Mutasi *Ataxia-telangiectasia, syndrome*, dan protein kanker payudara milik dua keluarga protein yang bekerja mendeteksi kerusakan DNA, *checkpoint signaling* dan perbaikan. Salah satunya adalah keluarga besar protein yang bekerja pada signaling-kerusakan protein DNA, dan ditandai dengan adanya satu atau lebih BRCT berulang. Keluarga kedua ditandai dengan kehadiran terminal COOH *phosphoinositide-3 kinase*-(PI3K) mirip *domain*.

Protein BRCT ditandai dengan kehadiran motif yang terdiri dari sekitar 95 residu asam amino, kadang-kadang diulang beberapa kali. *Domain* ini mungkin dianggap terbaik sebagai modul adaptor yang memungkinkan anggota keluarga protein ini untuk berinteraksi dan berpartisipasi dengan berbagai protein lain dalam perbaikan dan rekombinasi DNA, regulasi transkripsi, dan kontrol siklus sel. Pertama kali ditemukan pada kanker payudara protein 1 (BRCA1), motif ini disebut

domain BRCA1 C-terminal (BRCT). Struktur sekundernya terdiri dari empat untaian beta ditambah dua *alpha heliks*.

BRCA1 (asam amino 1863) dan BRCA2 (asam amino 3418) bersama dengan anggota lain dari keluarga BRCT adalah protein *multidomain* besar. BRCA1 mengandung *domain RING finger*, sepasang inti yang melokalisasi *sekuen* sinyal, dan beberapa BRCT berulang dalam domain aktivasi transkripsional. BRCA2 memiliki beberapa BRC berulang, NLS dan domain aktivasi *transcriptional*. Daerah BRCT diikuti oleh daerah terminal COOH yang berisi beberapa untaian tunggal dan untaian ganda mengikat domain DNA. Domain menaranya adalah beberapa kanker-menginduksi mutasi.

Mewarisi mutasi pada gen BRCA2 BRCA1 dan mempengaruhi perempuan untuk terkena kanker payudara dan kanker ovarium. Sel-sel kanker yang memiliki cacat BRCA1 atau BRCA2 protein menunjukkan beberapa jenis ketidakstabilan kromosom. Mereka memiliki kromosom yang rusak dan jumlah kromosom yang salah dan *sentrosom abnormal*. Ketidakstabilan ini dihasilkan oleh cacat perbaikan *transcription-coupled DSB*, kegagalan dalam *checkpointing*, dan regulasi duplikasi sentrosom yang tidak tepat. Ketidakstabilan genetik kemudian mengarah pada mutasi dan pembentukan tumor.

Anggota superfamili PI3K mengenali kerusakan untaian ganda


ATM, ATR dan DNA-PKcs adalah anggota dari *superfamili kinase fosfatidilinositol-3 kinase* (PI3K) yang mengenali kerusakan untaian ganda DNA, dan terlibat dalam perbaikan mereka. Pengelompokan anggota ini, yang mencakup ATM, ATR dan DNA-PKcs, memiliki karakteristik *domain PI3K homolog* di daerah terminal COOH mereka. *Domain PI3K*-seperti molekul-molekul ini tidak tampak memiliki aktivitas *lipid kinase*. Untuk alasan itu protein ini disebut PIK terkait *kinase*. *Serin-treonin kinase* yang besar; produk gen ATM adalah protein 350-kDa, dan *DNA-dependent protein kinase* (DNA-PK) ini bahkan lebih besar. Molekul DNA-PK mengandung heterodimer Ku yang terdiri dari subunit 70-kDa dan 80-kDa Ku, ditambah subunit katalis 460kDa, subunit Ku dinamai dengan dua huruf pertama pasien yang ditemukan menderita gangguan *autoimun* yang terkait dengan protein Ku.

DNA-PKcs dan ATM secara struktural mirip, dan kedua molekul mampu mengikat DNA. DNA-PK tidak hanya berpartisipasi dalam perbaikan DSBs yang disebabkan oleh radiasi pengion tetapi juga terlibat dalam V (D) J rekombinasi yang digunakan untuk menghasilkan keragaman dalam sel-sel sistem kekebalan tubuh. Mutasi di domain kinase menghasilkan berat gabungan *immunodeficiency* (Scid) pada tikus dan cacat menyebabkan hipersensitivitas radiasi pengion pada manusia. ATM dan ATR ditemukan pada kromosom *meiotic* dan memiliki peran dalam pengolahan kerusakan untaian ganda yang dihasilkan selama proses tersebut. Molekul-molekul ini berfungsi sebagai sensor radiasi pengion yang dihasilkan DSBs. Tidak hanya berfungsi sebagai sensor kerusakan tetapi juga sebagai molekul signaling yang *relay* sinyal kerusakan terhadap protein regulator yang menghentikan kemajuan siklus sel sementara perbaikan yang dibuat.

Fungsi protein ATM sebagai sensor dari kerusakan untai ganda DNA dengan cara berikut. Dalam ketiadaan DSBs, protein ATM terdapat sebagai *dimer* yang tidak aktif. Kerusakan untai ganda dihasilkan oleh, misalnya, radiasi pengion, yang menginduksi perubahan dalam struktur romatin. Perubahan dalam struktur kromatin memicu disosiasi *dimer* ATM yang mengakibatkan *autofosforilasi* dan aktivasi. Setelah diaktifkan, ATM bermigrasi ke p53, NBS1 dan BRCA1, dan protein siklus sel *checkpoint* dan memfosforilasi mereka pada satu atau lebih tempat.

Checkpoint mengatur transisi peristiwa dalam jaringan

Siklus pertumbuhan dan divisi sel melewati empat tahap (gambar 30). Pertama dari tahap ini (G1) adalah tahap pertumbuhan sel yang mempersiapkan cara yang baik untuk masuk ke dalam serangkaian tahap pembelahan sel (S, G2, dan M) atau *growth arrest* (G0), atau *apoptosis*. Sel-sel yang tidak mengalami *growth arrest* atau *apoptosis* memasuki tahap sintesis (S) dimana DNA direplikasi dalam persiapan untuk mitosis. Tahap ini diikuti lebih lanjut oleh tahap persiapan mitosis (G2) mana RNA dan protein yang dibutuhkan untuk mitosis disintesis. Akhirnya, sel masuk ke mitosis (M) dimana sel membelah menghasilkan dua keturunan. Tiga tahap sebelumnya mitosis secara kolektif disebut sebagai *interfase*.



Gambar 30. Siklus Sel: Terbagi ke dalam empat tahap. Garis miring yang ditempatkan di akhir fase G1 menandakan titik pembatasan (R) dan garis miring kedua yang ditempatkan di mitosis mewakili tempat pemeriksaan *spindle*. Tiga tahap nonmitosis sering disebut sebagai *interfase*. (Beckerman, M. 2005)

Checkpoint adalah jalur yang memastikan bahwa proses tidak dimulai sebelum proses sebelumnya selesai. Mereka mengontrol urutan dan waktu transisi peristiwa dalam jaringan. *Checkpoint* kerusakan DNA, misalnya, tanda kerusakan, menghasilkan sinyal yang menghentikan perkembangan melalui siklus sel sementara kerusakan tersebut diperbaiki, dan merangsang transkripsi gen repair untuk menghadapinya. Siklus sel mencakup beberapa *checkpoint*. Keputusan untuk mengalami pembelahan sel atau tidak terjadi di akhir fase G1. Titik ini disebut G1/S *checkpoint*, atau sebagai alternatif. Kondisi pertumbuhan ditandai oleh penerimaan sinyal pertumbuhan (*mitogenik*) dari di luar sel dievaluasi, DNA diperiksa terhadap kerusakan, dan keputusan apakah akan melanjutkan melalui pembelahan siklus sel dibuat. Kedua menghentikan *checkpointing* terjadi selama fase S dan ketiga berlangsung di akhir fase G2 dan dikenal sebagai G2 *checkpoint*. *Checkpointing* juga

berlangsung selama mitosis. *Checkpoint* berhenti spindle rusak atau jika kromosom tidak melekat dengan tepat ke *mikrotubulus*.

***Kinase dependent siklin* membentuk inti dari sistem kontrol siklus sel**

Waktu dan *durasi* peristiwa-peristiwa yang terjadi selama siklus sel diatur secara ketat oleh sebuah sistem kontrol yang pada intinya mengandung keluarga *serin/treonin siklin* disebut *kinase dependen siklin* (cdks) dan satu set subunit regulator disebut *siklin*. *Kinase dependen siklin* terdapat di seluruh siklus sel tetapi harus berikatan dengan regulator kinasenya untuk menjadi aktif. Ada beberapa jenis *kinase dependen siklin*, masing-masing jenis ini dikaitkan dengan subunit *kinase* tertentu.

Konsentrasi dari *siklin* yang berbeda dan *kinase dependen siklin* beresilasi dengan siklus sel, dan pasang *siklin-cdk* yang berbeda aktif di waktu yang berbeda dalam siklus sel. *Siklin dependen kinase* melaksanakan peran regulasi mereka dengan memfosforilasi protein pRb kanker mata, yang bersama dengan p53 terletak di jantung sel sistem kontrol.

pRb mengatur siklus sel dalam menanggapi sinyal *mitogenic*


Dalam organisme *multisel*, sel-sel tetangga mengirim sinyal mitogenic yang mengkoordinasikan *diferensiasi* selama perkembangan dan memicu pertumbuhan dan perkembangan. Peristiwa ini harus dikoordinasikan pada sel-sel untuk bekerja sama dalam jaringan atau organ. Protein *retinoblastoma*, pRb, berfungsi dalam *checkpoint* dengan menghambat aktivasi penyusunan faktor transkripsi, secara kolektif dinamakan sebagai E2Fs, diperlukan untuk kemajuan siklus sel. pRb membuat gerbang menutup pada *checkpoint* G1 dimana sebagian besar keputusan yang dibuat apakah akan melanjutkan ke mitosis. Penjaga gerbang pRb mengintegrasikan berbagai sinyal positif dan negatif *mitogenic* yang disampaikan sebagai peristiwa *fosforilasi* dan jika kondisi menguntungkan pintu gerbang akan terbuka dan memungkinkan siklus untuk maju ke tahap mitosis.

Protein *retinoblastoma* berikatan dengan anggota keluarga E2F dari faktor transkripsi. Selama tahap siklus sel G0 dan G1, E2Fs dikelola dalam keadaan tidak aktif dengan pengikatan mereka pada pRb. Selama waktu ini, pRb dalam keadaan *underfosforilasi* (*bipofosforilasi*), dan mampu membentuk kompleks yang stabil dengan faktor-faktor transkripsi. Keadaan terfosforilasi mengubah ikatan di dekat batas G1/S ketika protein menjadi terhiperfosforilasi. *Siklin* dan *asosiasi siklin dependent kinase* memainkan peran kunci dalam menginaktivasi pRb. *Fosforilasi* pRb oleh regulator siklus sel ini dan oleh *growth factor-activated kinases* membebaskan E2Fs dari inhibisi pRb dan mereka kemudian dapat melaksanakan aktivitas siklus sel mereka.

Tabel 18. Siklin Dan Siklin Dependen Kinase. (Beckerman, M. 2005)

Siklin	Protein siklin	Fase siklus sel
Siklin D1 to D3	Cdk4, Cdk6	Fase G1akhir
Siklin E	Cdk2	Fase G1/S transisi
Siklin A	Cdk2	Fase S
Siklin A	Cdk1 (Cdc2)	Fase S, Fase G2
Siklin B	Cdk1 (Cdc2)	Fase G2, fase M

Dua *domain noncontiguous*, disebut sebagai *domain A* dan *B*, secara kolektif membentuk *lokus mengikat* yang dikenal sebagai *A/B pocket* yang mengikat banyak protein pRb. Untuk alasan itu, pRb dan anggota lain dari keluarga yang dikenal sebagai *A/B pocket* protein. Pentingnya interaksi ini memanifestasikan dirinya oleh terjadinya kanker disebabkan oleh mutasi pada residu terletak di *pocket A/B*. Regulator siklus sel siklin adalah protein kunci yang mengikat ke *pocket A/B*. *Siklin*, terutama *siklin D* dan *E*, merekrut *siklin dependen siklin* ke *pocket A/B* dan lokasi *docking* terletak di ujung C terminal.



Gambar 31. Stimulasi Sinyal Pertumbuhan Transisi Dari Fase G1 ke S: Aktivasi Cdk4s dan Cdk6s bersama dengan *kinase* diaktifkan oleh *hiperfosforilasi* sinyal pertumbuhan protein *retinoblastoma* (pRb). Sebagai tanggapan, E2Fs terlepas dari pRb dan merangsang transkripsi gen yang diperlukan untuk aktivasi fase S. Aktivasi *siklin E* terkait dengan bagian fase S dari fase G1. Transkripsi *siklin E* bersama dengan *siklin A* dan DNA *polimerase* dirangsang oleh E2Fs. Tindakan ini dihentikan ketika *kinase A-Cdk2* meningkat dan menghentikan aktivitas *transcriptional* E2Fs. (Beckerman, M. 2005)

p53 menghentikan siklus sel sementara perbaikan DNA dibuat


Integrasi jalur *checkpoint* kerusakan DNA G1/S ke siklus sel terjadi dengan cara berikut. Kerusakan DNA dirasakan oleh ATM/ATR dan Rad3 terkait (ATR) *kinase*. Ketika mereka mendeteksi kerusakan DNA mereka *memfosforilasi* sepasang *siklin* yang disebut *checkpoint 1* (Chk1) dan *checkpoint 2* (Chk2). Chk1 dan Chk2 *kinase* memfosforilasi protein *fosfatase* yang dikenal sebagai siklus pembelahan sel 25 (Cdc25). Cdc25 protein *fosfatase* adalah aktivator cdk *siklin*, yang aktif bila dalam keadaan terdefosforilasi dan inaktif jika terfosforilasi. Fosforilasi Cdc25 oleh siklin

checkpoint inactivates fosfatase dan tanda untuk menghambat proteolitik, menyebabkan fosforilasi dan inaktivasi *siklin*-cdks melalui aksi lain protein kinase yang disebut Wee1.

Ketika kerusakan DNA selular dirasakan, ATM, ATR, dan juga DNAPKcs menyampaikan informasi tersebut kepada p53 dengan memfosforilasi molekul di situs spesifik dengan jenis kerusakan yang dirasakan. Dalam menanggapi sinyal-sinyal ini, p53 yang bertindak sebagai faktor transkripsi dan meng-*up*-regulasi sejumlah protein. Salah satu dari ini, p21, menghentikan perkembangan melalui siklus sel sampai perbaikan DNA dapat dilakukan. Protein P21 diregulasi oleh p53 subunit regulator universal dari siklin-cdks. Ketika p21 diaktifkan, ia berikatan dengan kompleks siklin E/Cdk2, mengakibatkan inaktivasi Cdk2. Cdk2 tidak memfosforilasi pRb, yang kemudian menjadi hipofosforilasi dan menghambat E2Fs sehingga menciptakan perkembangan dari G1 ke S. Jika kerusakan dianggap yang tidak dapat diperbaiki, fungsi p53 adalah dengan cara berbeda yang kedua. Memicu sebuah sirkuit *apoptosis* yang menargetkan sel untuk bunuh diri.


Pusat controller p53 dan pRb untuk program pencegahan kanker *Metazoan*

P53, pRb, dan protein yang menghubungkan *signaling* regulator kunci lain membentuk sebuah sirkuit yang mengatur perkembangan melalui siklus sel. Operasi yang tepat dari sirkuit ini disebut pusat program pencegahan sel kanker. Mutasi di p53 atau pRb menyebabkan malfungsi di sirkuit ditemukan pada banyak kanker pada manusia. *Simplified* representasi dari sirkuit ini menyoroti beberapa interaksi protein-protein yang paling penting. INK4a, Ras, dan c-Myc menyampaikan sinyal *mitogenic* (pertumbuhan dan *proliferasi*). Sinyal ini berkumpul berdasarkan ARF yang terletak hanya hulu p53. Apabila ia diaktifkan, ARF merangsang aktivitas p53. Ia melakukannya dengan mengganggu mdm2's penghambatan p53. Karena lokasi kunci, mutasi-mutasi ARF ditemui dalam sejumlah kanker pada manusia. Gen terkemuka lain yang ditemui dalam banyak kanker adalah gen adenovirus region awal 1A (E1A). Produk gen ini berinteraksi dengan berbagai protein kontrol termasuk pRb. Ketika E1A mengikat pRb, mengganggu pembentukan pRb-E2F heterodimer dan dengan demikian mempromosikan pembentukan siklus sel kanker yang sama yang dihasilkan oleh mutasi pada pRb itu sendiri.



Gambar 32. Siklus Sel *Arrest* Yang Dicituskan Oleh Kerusakan DNA *Checkpoint* Signals: ATR and ATM memfosforilasi Chk1 and Chk2, yang kemudian memfosforilasi protein *phosphatase* Cdc25 kemudian menginaktivasinya. Cdk2 is

difosforilasi oleh protein *kinase* Wee1 dan aksinya arrested. Signal ATM melalui p53 untuk mengaktifkan p21, yang *arrests* ke dalam fase S dengan menghambat faktor transkripsi dari E2Fs. (Beckerman, M. 2005)



Gambar 33. Sirkuit *Controller* Yang Mengkoordinasi Aktivitas p53 dan pRB: Signal Mitogenic signal yang disampaikan ke dalam sel melalui Ras, Ink4a dan c-Myc. Tanda panah menunjukkan pengaruh stimulasi dan panah datar menunjukkan pengaruh *repressive*. (Beckerman, M. 2005)

pRb dan p53 bekerja secara bersama. Pada awal siklus sel, pRb menghambat E2Fs, dan Mdm2 membuat rendah tingkat aktivitas p53. Ketika pRb menjadi hiperfosforilasi ia memblok E2F, ARF distimulasi dan, pada gilirannya, menstimulasi p53 sehingga sel memasuki fase S, kegiatan *surveilans* p53 meningkat. Jika p53 mendeteksi kerusakan DNA sinyal p21, yang memblok kompleks siklin cdk dari hiperfosforilasi pRb. Protein *retinoblastoma* kemudian menghambat E2Fs sementara perbaikan DNA dilakukan.

Protein ATM/ATR dan DNA-PKcs mengaktifkan p53 dengan merangsang penghambatan *proteolitik inhibitor* Mdm2. Dalam kondisi normal selular, Mdm2 protein *represses checkpointing* dan *apoptosis* mempromosikan aktivitas p53. Protein Mdm2 bertindak sebagai p53-*specific*, E3 *ubiquitin ligase*. Menekan tindakan transkripsional p53 dengan penandaan untuk penghancuran *proteolitik* dan menjaga tingkat ekspresi yang rendah. Salah satu gen yang diaktifkan oleh p53 adalah gen Mdm2. Kegiatan ini mengarah pada pembentukan *autoregulatory loop* di p53 yang mengatur Mdm2 pada tingkat transkripsi, dan Mdm2 mengatur p53 di tingkat aktivitas. Sistem Mdm2p53 diseimbangkan melalui saling ketergantungan ini sehingga sinyal yang sesuai dapat mengaktifkan p53. Sinyal ini mengusir Mdm2 dari p53, mengarah ke aktivasi *transcriptional* p53.

Struktur p53 mendukung perannya sebagai kontroler Central

Seperti mungkin diharapkan dari sebutan "pengontrol", protein p53 dan pRb menerima sinyal input dari banyak protein dan dalam mengubah pengaruh banyak protein lain. Pertama, p53, berfungsi sebagai faktor transkripsi sementara protein kedua, pRb, bertindak melalui keluarga E2F faktor-faktor transkripsi. Dalam bahasa jaringan, p53 dan pRb beroperasi sebagai node yang saling terhubung, dan karena itu hal ini tidak mengherankan bahwa menonaktifkan protein ini melalui mutasi

memiliki konsekuensi negatif. Sinyal konvergen berdasarkan p53 membentuk fosforilasi dan asetilasi dari residu spesifik.

Fleksibilitas di rantai yang menghubungkan unit inti ke *domain* mengikat DNA memungkinkan molekul p53 untuk berkontak dengan DNA dalam beberapa cara. Terdapat tiga *domain* mengikat DNA, masing-masing dengan cara yang sedikit berbeda. Mutasi-mutasi yang paling sering di p53 yang ditemukan di sel-sel kanker semua terletak dalam DNA-binding *domain*. Dari jumlah tersebut, lima melibatkan residu arginin dan satu residu glisin. Mutasi terkemuka adalah Arg248, yang memediasi pengikatan langsung molekul p53 ke alur kecil DNA. Residu mutasi lainnya, Arg273, membuat kontak dengan fosfat. Residu lainnya membantu menstabilkan antarmuka antara permukaan p53 dan DNA.

Telomerase produksi di sel-sel kanker

Ujung kromosom ditutup oleh *telomer*, serangkaian TTAGGG berulang dan protein yang terkait, dan diakhiri pada akhir oleh struktur yang disebut *T-loop*. *Telomere* adalah perpendekan sekitar 100 pasang basa setiap pembelahan sel. Ketika struktur lainnya rusak mesin perbaikan DNA mampu merasakan ujung molekul DNA dan menafsirkan ujung sebagai untai berganda yang rusak. Jika sel terus membagi beberapa hasil negatif menjadi mungkin. Termasuk degradasi, rekombinasi kromosom yang menyebabkan hilangnya informasi genetik, penyusunan ulang kromosom yang menyimpang, dan ketidakstabilan *genom*. Untuk menghindari situasi berbahaya sel berhenti membagi setelah beberapa kilo pasang basa *telomer* hilang dan memasuki tahap *nondividing* yang disebut *senescence*.

Beberapa protein berasosiasi dengan *telomer*. Salah satunya adalah *human telomerase reverse transcriptase* (hTERT), yang mengkatalisis penambahan beberapa TTAGGG berulang di ujung kromosom dan melindungi mereka dari mesin perbaikan DSB. Di antara yang lain adalah dua protein, bernama *telomeric repeat binding factors* 1 dan 2 (TRF1 dan TRF2), yang mengikat TTAGGG berulang. Selain itu, sejumlah protein untai ganda perbaikan membentuk kompleks dengan TRFs dan komponen *telomerase* (subunit katalis hTERT dan *human telomerase RNA* (hTR) yang berisi template untuk menambahkan *telomeric* berulang. Pengelompokan ini termasuk anggota kompleks perbaikan untai ganda Rad50/Mre11/NBS1, dan Ku86 dan DNA-PKcs terlibat dalam NHEJ. Anggota kompleks ini dianggap menyampaikan sinyal *prosenescence* ke sirkuit p53 ketika telomer menjadi pendek.

Sinyal yang dikirimkan melalui p53 dan pRb memastikan bahwa sel berhenti membelah. Dalam menanggapi kritis pemendekan *telomer*, produksi regulator p53 dan pRb aktivitas ARF, seperti p21 dan Ink4a meningkat. Protein PRb menjadi hipofosforilasi dan mengikat E2F sehingga menekan *proliferasi*. Secara lebih detil ARF menekan Mdm2 mengarah ke pelepasan p53 dari inhibisi Mdm2; p53 merangsang p21, yang memberikan kontribusi untuk hipofosforilasi PRB. Protein Ink4a berkontribusi terhadap hipofosforilasi pRb dengan menekan penghambatan Ckd4/6 pRb.

Sel-sel kanker menghindari penuaan dengan meningkatkan produksi enzim *telomerase* kromosom-*capping*. Aktivitas ini untuk memperluas jumlah pembelahan sel, secara efektif sel menjadi immortal.

BAB 10

INTEGRASI SINYAL DALAM BELAJAR DAN MEMORI

Proses pembentukan pembelajaran dan memori dilakukan oleh siput dan invertebrata lainnya pasti lebih sederhana daripada manusia, namun keduanya mirip. Masing-masing melibatkan perubahan respon perilaku terhadap rangsangan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar adalah proses yang adaptif dimana perubahan dalam perilaku dibujuk dalam respon untuk pengalaman. Memori adalah catatan, atau jejak, yang mendasari perubahan perilaku. Catatan dalam semua organisme, siput dan tikus, lalat dan manusia, disimpan dalam pola-pola hubungan antara *neuron*. Selama pembentukan pembelajaran dan memori beberapa koneksi diperkuat sementara yang lain yang melemah. Sebagai contoh, dalam kasus sensitisasi, hubungan antara neuron diperkuat. Hal ini menyebabkan perubahan perilaku. Siput mampu menanggapi dengan peningkatan kecepatan rangsangan berbahaya.

Istilah *efficiency transmisi sinaptik* mengacu pada besarnya respon yang dihasilkan di *neuron postsinaptik* ketika potensial aksi dihasilkan di *neuron presinaps*. Dalam banyak situasi, efisiensi transmisi tidak *difiksasi* tetapi bervariasi dalam cara yang bergantung pada penggunaan. Perubahan dalam efisiensi dapat bersifat sementara, yang berlangsung selama beberapa milidetik, atau bisa permanen, berlangsung untuk seumur hidup. Koneksi dapat diperkuat atau dilemahkan atau hilang sama sekali. *Plastisitas sinapsik* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketergantungan-penggunaan, atau adaptif, perubahan dalam efisiensi transmisi sinaptik antara sel *pra* dan *pascaynaptic*.

Kemampuan untuk memvariasikan kekuatan koneksi adalah hal yang penting. Ini memungkinkan sistem saraf untuk membentuk koneksi dan sirkuit neural yang tepat selama pengembangan, sehingga menimbulkan kepribadian yang unik untuk setiap individu; dan itu memungkinkan belajar sepanjang hidup. Sirkuit kortikal berkembang dari waktu ke waktu dalam beberapa tahap. Tahap pertama dari pengembangan sirkuit melibatkan pertumbuhan neurit, pertumbuhan jalur kerucut dan kemudian *synaptogenesis*. Ketika sirkuit menjadi fungsional dan dapat merespon input sinaptik, koneksi yang tidak efektif dan tidak tepat dipangkas, dan neuron yang tidak lagi diperlukan mati melalui kematian sel terprogram. Proses berbagai kekuatan koneksi sinaptik terus berlanjut sepanjang hidup. Ini mendasari pengembangan keterampilan motorik sederhana serta gerakan mata dan tangan yang sangat terkoordinasi. Hal ini memungkinkan asosiasi dibuat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup (misalnya, pemandangan, suara, sentuhan dan bau yang menunjukkan bahaya), dan memungkinkan belajar serta mengingat dan melupakan.

Struktur kompleks protein dan jembatan *signaling* di sepanjang celah sinaps


Komunikasi terjadi ketika *neurotransmitter* dilepaskan dari terminal *presinaptik* berdifusi melintasi celah *sinaptik* dan berikatan dengan reseptor pada sisi *postsinaps*. Sebelum komunikasi ini dapat terjadi, seperangkat komponen molekuler minimal harus dirakit menjadi unit fungsional, sinaps. Zona aktif pada sisi *presinaptik* yang berisi mesin untuk pelepasan *neurotransmitter* harus sejajar dengan kepadatan *pascasinaps* (PSD) pada sisi *postsinaps* yang mengandung reseptor untuk *neurotransmitter*. Kegiatan ini harus terjadi ketika dua bagian dari unit pemberi sinyal terbentuk.

Bagian *pre*-dan *postsinaptik* sinaps ini diselaraskan dan distabilkan oleh protein yang membentuk jembatan dari satu sisi celah ke sisi lainnya. Beberapa pasangan *bridging* yang paling menonjol-*Neurexins-to-Neuroligins*, *SynCAMs-to-SynCAMs* dan *EphB2s-to-EphrinBs* digambarkan pada Gambar 13. *Neurexins* adalah protein permukaan sel spesifik otak yang mengandung satu atau lebih LNS (*laminin, neurexin, sex hormone-binding globulin*) *domain*. Domain LNS, sekitar 190 residu asam amino, bertindak sebagai modul pengenalan permukaan sel. Mereka ditemukan dalam berbagai protein *matriks ekstraseluler* dan reseptor permukaan sel, biasanya dalam kombinasi dengan beberapa pengulangan EGF. *Neuroligin* bertindak sebagai *ligan* untuk *Neurexins*. Mereka adalah protein transmembran, tunggal lulus, otak yang ditemukan di permukaan yang berlawanan dengan *neurexins*. *Neurexin-Neuroligin* sel-sel adhesi kompleks membentuk jembatan antara terminal *pra* dan *pascaynaptik*. *Neurexin* berinteraksi dengan CASK pada sisi *presinaptik*, dan *neuroligin* berikatan dengan protein PSD95 pada sisi *postsinaps*. Interaksi satu sama lain dan dengan protein CASK dan PSD-95 menstabilkan dan mempertahankan keselarasan antara zona aktif pada sisi *presinaptik* dan kepadatan *postsynaptic* di terminal *postsinaptik*.

Lebih dari satu jenis sinyal kompleks ikatan bersama zona aktif di sisi *presinaps* dan PSD di *postsynaptic* terminal. Anggota *superfamily* antibodi sel adhesi molekuler yang disebut "synCAMs" menetapkan *homophilic* kontak antara protein yang dinyatakan pada dua permukaan yang berlawanan. Seperti halnya untuk protein lain yang melakukan peran struktural menengahi permukaan adhesi, synCAMs juga memiliki peran *signaling*. Mereka muncul untuk memasok sinyal memberitahukan terminal *presinaps* yang baru lahir untuk berdifrensiasi menjadi bentuk sinyal dewasa. Kompleks *neurexinneuroligin* melayani peran sinyal yang sama. Ini juga menginstruksikan sel untuk membentuk terminal *presinaptik* yang berbeda. Beberapa keluarga molekuler adhesi sel berpartisipasi dalam tindakan menjembatani. Kader-kader spesifik neuron juga membentuk kompleks yang menjembatani. Protein-protein ini berlabuh di kedua sisi celah *sinaptik* ke *b-catenin*.

Keluarga protein lain yang memiliki peran penting dalam pembentukan *sinaps* adalah reseptor *tirosin kinase* EphB dan ligan Ephrin mereka. Sinyal reseptor EphB2 melalui Rho GEF kirilin ke *actin cytoskeleton*, sehingga membantu dalam *morfogenesis dendritik* tulang belakang. Dalam sinapsis sinyal yang menggunakan glutamat, reseptor N-metil-D-aspartat (NMDA) adalah penghuni awal kepadatan *pascasinaps*.

Kirilin membantu membentuk agregat reseptor NMDA pada sinaps yang baru dibuat.




Gambar 34. Interaksi Protein–Protein Transsinaptik: Pasangan protein membentuk jembatan yang secara fisik menghubungkan terminal *pre-* dan *postsinaptik*. (Beckerman, M. 2005)

Terminal *presinaps* dan sekresi molekul *signaling*

Ketika potensi aksi tiba di terminal *presinaptik*, saluran kalsium bervoltase terbuka dan ion kalsium mengalir ke terminal. Ion kalsium berikatan dengan sensor kalsium yang melekat pada vesikula yang terkandung pada *neurotransmitter*. Pengikatan kalsium ke sensor memicu perubahan konformasi yang mengarah ke *fusi vesikel* dan pelepasan isi. Setelah dilepaskan, *neurotransmitter* berdifusi melintasi celah *sinaptik* dan mengikat reseptor yang tertanam di membran *postsinaptik*. Set langkah-langkah ini digambarkan secara skematik pada Gambar 35.

Jumlah *neurotransmitter* yang dilepaskan pada terminal *presinaptik* tergantung pada beberapa faktor. *Sinapsis* dalam sistem saraf pusat, secara umum, jumlahnya kecil. Jumlah *neurotransmitter* yang dilepaskan pada satu waktu tidak hanya kecil tetapi juga bisa sangat bervariasi. Jumlah *neurotransmitter* yang dilepaskan dapat, misalnya, tergantung pada waktu. Jika *pulsa* yang tiba di terminal *presinaptik* dalam waktu singkat besar, simpanan vesikel *neurotransmitter* yang tersedia dapat habis. Pelepasan *neurotransmitter* karena itu akan monoton menurun dengan setiap potensial aksi yang akan datang. *Sinapsis* dengan vesikel besar akan melepaskan lebih banyak *neurotransmitter* daripada *sinapsis* dengan vesikel kecil. Istilah "zona aktif" mengacu pada daerah yang tepat di sepanjang terminal *presinaptik* di mana vesikel menyatu dan melepaskan *neurotransmitter*. Jumlah pelepasan *neurotransmitter* akan tergantung pada jumlah daerah aktif per terminal dan pada jumlah dan ukuran vesikel.



Gambar 35. Pelepasan *Neurotransmitter* Dari Terminal *Presinaptik*: Sebagai respon terhadap potensial aksi yang datang, kalsium masuk ke dalam sel melalui kanal *voltage-gated* Ca^{2+} (VGCCs) dan mencetuskan fusi dan pelepasan *neurotransmitter* dari tempat penyimpanannya di vesikel *sinaptik*. *Neurotransmitter* berdifusi celah *sinaptik* dan berikatan pada reseptor pada terminal membran sel *post-sinaptik*. (Beckerman, M. 2005)

Beberapa kompleks protein mengatur gerakan vesikel dan pelepasan *neurotransmitter* di terminal presinaptik. Ini telah diorganisasikan di bawah tiga judul pada Tabel 19. Kumpulan pertama dari elemen pensinyalan dalam tabel adalah kelompok saluran kalsium saluran-tegangan yang mengubah depolarisasi membran menjadi sinyal kalsium. Termasuk di bawah judul ini adalah sejumlah protein pensinyalan yang memungkinkan neuromodulator untuk mempengaruhi kekuatan sinyal kalsium dan dengan demikian sejumlah *neurotransmitter* dilepaskan ke celah.

Pengelompokan kedua berisi regulator vesikel seperti kompleks protein reseptor NSF terlarut (SNARE) kompleks. Protein SNARE yang mengatur tingkat akhir pelepasan *neurotransmitter-docking* dan *fusi* vesikel dengan membran plasma yang menghasilkan pelepasan isi vesikel ke dalam celah sinaptik. Ada dua kelas protein SNARE - mereka yang mengikat ke permukaan vesikel (v-SNAREs) dan yang menempel pada membran plasma (t-SNAREs). Interaksi antara dua jenis SNAREs mengatur pelepasan *neurotransmitter*. Salah satu v-SNAREs, *synaptotagmin*, mengandung *domain* C2 yang mengikat kalsium dan berfungsi sebagai sensor kalsium. Perubahan konformasi yang disebabkan oleh pengikatan kalsium disampaikan ke t-SNAREs yang berinteraksi untuk mendorong pelepasan dan pelepasan isi vesikel.

Kompleks sinyal lain dalam pengelompokan regulator vesikel membantu menuntun vesikel ke terminal *presinaptik* dan ke membran plasma, dan kemudian mengatur *fusi* membran. Vesikel yang berisi *neurotransmitter* diangkut sepanjang sitoskeleton ke terminal presinaptik. Setelah tiba di terminal, vesikel ditargetkan ke membran plasma oleh beberapa kompleks subunit protein yang disebut Sec6/8. Kumpulan protein lainnya, Sec1/Munc18, bertindak baik sebagai regulator positif

dan negatif dari SNARE-dimediasi *fusi* melalui interaksi dengan *Syntaxin*. Satu set molekul, NSF dan α -SNAP, mengarahkan disosiasi SNAREs yang memungkinkan penggunaan kembali mereka.

Kelompok ketiga yang disajikan dalam Tabel 19 meliputi protein perancah dan jangkar. Protein ini membantu mengatur kompleks di terminal *presinaps*. Seperti halnya di setiap sel, protein ini memberikan lampiran situs mana protein yang harus bekerja bersama-sama dapat mengikat di dekat satu sama lain.


Tabel 19. Komponen Utama Terminal Presinaptik Di Sinaps Sistem Saraf Pusat. (Beckerman, M. 2005)

Komponen Terminal Presinaptik	Fungsi
Kanal dan modulornya Kanal ion bergerbang voltase	Kanal Kalsium tipe N dan P/Q : memungkinkan kalsium masuk ke dalam sel sebagai respon terhadap depolarisasi membran
GPCRs	Subunit G $\beta\gamma$ secara negative meregulasi kanal tipe N
Protein kinase C Regulator vesikel	Secara positif meregulasi kanal tipe N
v-SNARES	Sinaptovibrin dan sinaptotagmin memperantarai docking dan fusi vesikel. Sinaptotagmin berfungsi sebagai sensor kalsium
t-SNARES	Syntaxin dan SNAP-25 memperantarai docking dan fusi
Sec6/8 complex	Menargetkan vesikel ke membrane plasma
Sec1/Munc18	Regulator syntaxin
NSF, α-SNAP	Disosiasi dari kompleks SNARE
Scaffolds dan adapter	
CASK	Berikatan pada kanal tipe N dan P/Q dan mint1; menyelaraskan vesikel
Mint1	Berikatan pada CASK dan kanal tipe N dan P/Q
Veli	Anggota CASK, mint1, kompleks adapter Veli

Daerah PSD sangat diperkaya dalam molekul signalling

Daerah tepat di bawah membran *postsynaptic* adalah kepadatan *postsynaptic* (PSD). PSD adalah struktur *dislike* yang duduk berlawanan dengan zona aktif di terminal *presinaptik* (Gambar 36). Daerah ini sangat diperkaya dalam struktur (*sitoskeleton*) dan regulator (*reseptor, ion channel, scaffolding, signaling*) protein. Beberapa jenis protein pengatur telah ditempatkan ke dalam tiga kelompok dalam Tabel 20. Kelompok pertama mengandung reseptor untuk *neurotransmitter*. Glutamat adalah

neurotransmitter yang *dominan* pada *sinapsis eksitatori* dalam sistem saraf pusat. Beberapa jenis reseptor *glutamergik* yang berbeda ditemukan dalam *sinapsis eksitatori* PSD di CNS. Beberapa reseptor glutamergik adalah saluran ion (*ionotropik*) sementara yang lain adalah reseptor G protein (metabotropik). Dua jenis reseptor glutamat *ionotropik*-reseptor *a-amino-3-hidroksi-5-methyl-4-isoxazolepropionate* (AMPA) dan reseptor *N-methyl-daspartate* (NMDA) -terkait erat dengan *plastisitas sinaptik*. Dari daftar sejumlah besar reseptor pada tabel, hanya tiga kelas utama reseptor *glutamergik* yang telah dimasukkan dalam tabel. Ini adalah reseptor utama yang terlibat dalam pembelajaran dan pembentukan ingatan.



Gambar 36. Post Sinaptik Density: menunjukkan beberapa tipe protein *signaling* yang ditemukan di *post sinaptik density* pada *sinaps eksitatori* di system saraf pusat. Glutamat dilepaskan yang berdifusi di sepanjang celah sinaptik dan berikatan pada reseptor NMDA dan AMPA menyebabkan depolarisasi membran, influx kalsium, perubahan populasi reseptor AMPA dan ekspresi gen. efek jangka pendek dimediasi oleh GPCRs seperti mGluR5, menyebabkan pengikatan protein G dan *second messenger* pada kanal ion, dan fosforilasi kanal ion oleh protein *kinase*. (Beckerman, M. 2005)

Kelompok kedua dalam tabel terdiri dari beberapa jenis serin/treonin *kinase* dan *fosfatase* yang merupakan elemen pensinyalan sentral dalam kepadatan *pascasinaps*. Pengelompokan ketiga mengandung agen penghubung dan pendukung seperti GTPases berfungsi sebagai *adaptor* molekuler, dan penahan dan perancah protein yang membantu mengatur kompleks sinyal. Elemen-elemen pemberi sinyal ini membentuk matriks dalam PSD yang memungkinkan saluran ion untuk mengelompok bersama-sama di dekat utusan kedua dan elemen sinyal hilir. Kepadatan pascasinaps diperkaya pada protein sitoskeleton, terutama dalam aktin dan komponen sitoskeleton aktin dan aktin.

Tabel 20. Komponen Utama Dari PSD Pada Sinaps Excitatory Glutamergic. (Beckerman, M. 2005)


Komponen PSD	Fungsi
Reseptor	
Reseptor AMPA	
Reseptor NMDA	
Reseptor Metabotropik	
Kinase dan Fosfatase	
aCaMKII and CaMKIV	
Protein kinase A	
Isoform Protein kinase C b,g	
ERK2 type MAPKs	
Protein phosphatase1	
Anchors, scaffolds, and adapters	
AKAP79	
PSD-95	
SynGAP	
GKAP	
Shank	
Homer	

Berbagai bentuk pembelajaran dan memori

Ada beberapa jenis pembelajaran yang berbeda. Stimulasi berulang rangsangan berbahaya menghasilkan sensitisasi sementara eksposur berulang ke rangsangan tidak berbahaya menyebabkan pembiasaan, respon yang berkurang. Bentuk-bentuk pembelajaran ini tidak memerlukan stimulus pasangan kedua untuk memperoleh perubahan perilaku

Pembelajaran asosiatif, sebaliknya, melibatkan pasangan rangsangan. Contoh paling awal dan paling terkenal dari pembelajaran asosiatif adalah eksperimen anjing Pavlov. Dalam eksperimen ini dan yang serupa, peristiwa awal yang tidak berbahaya, yang disebut stimulus terkondisi (CS), dipasangkan berulang kali dengan peristiwa yang secara biologis sangat penting (berpotensi berbahaya) yang disebut stimulus terkondisi (AS). Seiring waktu, hubungan antara CS dan AS dipelajari; yaitu, respon perilaku beradaptasi dalam menanggapi pengalaman. Dalam percobaan laboratorium yang khas, tikus diberi nada, CS netral yang tidak berbahaya, yang dipasangkan dengan kejutan listrik, AS yang berbahaya. Setelah sesedikit satu atau dua paparan, nada akan menimbulkan sejumlah adaptasi fisiologis dan perilaku. Tikus akan membeku di tempat dan menunjukkan tindakan refleksi. Tingkat dan tekanan darah akan berubah, dan hormon stres akan dilepaskan. Di Aplysia, mitra pembelajaran asosiatif disebut panjang fasilitasi jangka panjang. Dalam proses ini, kejutan listrik ke ekor berfungsi sebagai AS, dan sentuhan lemah untuk fungsi siphon sebagai CS. Siput belajar untuk mengasosiasikan dua rangsangan dan, karena asosiasi dengan kejutan listrik, mengubah respon perilaku untuk sentuhan lemah seiring waktu.

Akson dari *neuron sensorik* yang menyampaikan sinyal sentuhan kontak dendrit pada *neuron motorik*. *Neuron sensorik* yang menyampaikan sinyal-sinyal sengatan listrik juga membuat kontak dengan *neuron motorik*. Seperti ditunjukkan pada gambar *neuron* memiliki koneksi sinaptik dengan *interneuron* yang melepaskan *serotonin* dari terminal aksonnya. *Serotonin* berdifusi melintasi celah *sinaptik* ke terminal akson dari *neuron sensorik* sentuhan di mana dua set sinyal berkumpul.




Gambar 37. Tiga jenis *neuron* yang berbeda membentuk sirkuit-*neuron sensoris* yang mendeteksi dan menanggapi kejutan listrik (SN1) dan menyentuh (SN2), sebuah *interneuron pelotonin-releasing* (INT), dan *neuron motorik* (MN). (Beckerman, M. 2005)

Sama seperti ada beberapa jenis pembelajaran, ada beberapa jenis memori. Memori jangka pendek mengacu pada ingatan yang labil (responsif terhadap perubahan dalam kondisi di mana mereka diciptakan) dan hanya terbentuk secara sementara. Mereka hilang jika tidak diubah menjadi jejak memori stabil. Memori labil jangka pendek melibatkan perubahan seluar yang memanfaatkan sumber daya seluler yang sudah tersedia dan bersifat lokal untuk sinapsis atau sinapsis yang mengalami modifikasi. Sebaliknya, jejak memori stabil jangka panjang biasanya melibatkan ekspresi gen dan sintesis protein yang mengarah ke modifikasi arsitektur yang menghasilkan perubahan abadi dalam *transmisi sinaptik*.

Peristiwa ini dirangsang oleh pelepasan *serotonin* yang digambarkan pada Gambar 38. Ini termasuk *stimulasi adenilil siklase* yang mengarah ke produksi cAMP dan aktivasi berikutnya dari subunit katalitik protein kinase A. Protein *kinase A* memfosforilasi saluran kalium di dekatnya dan, sebagai hasilnya, arus melalui saluran kalium berkurang. Depolarisasi yang menyertai kedatangan potensial aksi di terminal akson berlangsung lebih lama. Lebih banyak kalsium yang bisa masuk ke terminal menghasilkan pelepasan *neurotransmitter* yang lebih besar. Dua rute diilustrasikan dalam gambar. Salah satu rute mengarah ke modifikasi saluran ion, jejak memori jangka pendek. Rute lain mengarah ke nukleus dan menghasilkan perubahan dalam pola ekspresi gen, menghasilkan jejak memori yang lebih tahan lama.

Integrasi sinyal dalam belajar dan pembentukan memori

Sinapsis pertama kali dideskripsikan oleh Ramón y Cajal pada tahun 1890. Butuh beberapa tahun bagi gagasan untuk diterima bahwa sel-sel saraf tidak terprogram satu sama lain, tetapi berkomunikasi dengan menggunakan pengantar kimia yang menyebar di celah sempit antara pra- dan terminal *postsinaptik*. Efisiensi proses transmisi tergantung pada kedua faktor *presinaptik* dan *postsinaptik*. Pertama, itu tergantung pada jumlah pelepasan neurotransmitter dari terminal presinaptik untuk depolarisasi yang diberikan atau potensial aksi. Kedua, itu tergantung pada seberapa kuat respon yang dilepaskan memunculkan di sisi postsinaptik. Kekuatan sinyal *presinaptik* dan respon *postsinaptik* tergantung pada campuran saluran ion dan reseptor sinyal dan pada keadaan biofisik mereka.



Gambar 38. Signalling Dalam Jalur di *Aplysia*: Serotonin merangsang peningkatan produksi cAMP oleh adenilil siklase melalui tindakan GPCRs dan subunit G α . Fasilitasi sementara dari respon sinyal dihasilkan oleh fosforilasi saluran ion oleh subunit katalitik (PKAC) protein kinase A. Modifikasi ini mengubah sifat biofisik dari saluran ion. Respon jangka panjang yang ditimbulkan oleh sinyal serotonin berkelanjutan menghasilkan transkripsi gen dan perubahan morfologi pada terminal sinaptik. (Beckerman, M. 2005)

Dalam kasus fasilitasi jangka pendek di *Aplysia*, peningkatan efisiensi dalam transmisi sinaptik diimplementasikan pada sisi prasinaps pada celah. Kalsium influks yang dihasilkan dari depolarisasi membran dan sinyal protein G yang diinduksi serotonin berkumpul pada adenyl cyclase, yang merespon dengan meningkatkan produksi cAMP yang mengarah ke perubahan jumlah neurotransmitter yang dilepaskan dari terminal. Adenilil siklase bertindak sebagai integrator sinyal, berfungsi sebagai perangkat molekuler untuk mendeteksi kebetulan temporal kejutan listrik dan rangsangan sentuhan lemah.

Reseptor NMDA melakukan fungsi yang serupa, tetapi, alih-alih bertindak di sisi celah *presinaptik*, reseptor NMDA bekerja di terminal *postsinaptik*. Properti biofisik kunci dari reseptor ini adalah bahwa keduanya bergantung pada tegangan dan bergantung pada glutamat sehingga memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan sinyal dan mengevaluasi kerjasamanya. Reseptor ini bekerja dengan cara berikut: Pada potensial istirahat membran, kanal ion reseptor NMDA dalam keadaan tertutup-itu secara fisik dihambat oleh ion Mg $^{2+}$ yang duduk di dalam pembukaan dan memblokir pori-pori. Ketika selaput ini sudah cukup mencukupi,


blok Mg^{2+} menjadi bebas, dan sekali glutamat terikat, ion kalsium dapat melewati saluran dan memasuki sel. Ketergantungan tegangan adalah sumber dari properti integratif reseptor. Tidak ada sinapsis tunggal yang dengan sendirinya dapat mendepolarisasi membran postsinaptik yang cukup untuk menghidupkan kembali blok magnesium. Sebaliknya, banyak input sinaptik yang bertindak dalam jarak dekat dan temporal dekat satu sama lain diperlukan untuk cukup mendepolarisasi membran. Ketika depolarisasi dan pengikatan ligan terjadi dalam jendela waktu yang tepat, saluran NMDA akan terbuka. Dengan demikian, reseptor NMDA memberikan sinapsis dengan cara menentukan apakah kondisi associativity untuk modifikasi sinaptik telah terpenuhi atau tidak.

Salah satu cara bahwa kedua efisiensi *transmisi sinaptik* dan kemampuan untuk mengubah sifat ini dapat dikontrol adalah melalui keseimbangan antara reseptor AMPA dan NMDA. Pada banyak terminal postsinaptik hanya reseptor NMDA yang aktif selama pengembangan. *Sinapsis* ini tetap diam pada potensial istirahat karena blok Mg^{2+} , tetapi mampu mengirimkan sinyal ketika membran terdepolarisasi oleh satu cara atau yang lain. Sebagai tanggapan terhadap masuknya kalsium ke terminal melalui reseptor NMDA, reseptor AMPA menjadi aktif. Kehadiran reseptor AMPA aktif memungkinkan sinapsis untuk merespon cepat terhadap glutamat dan menghasilkan respons yang lebih kuat di terminal *postsinapsis* untuk pelepasan glutamat. Reseptor AMPA dan jejak reseptor AMPA memiliki peran yang menonjol dalam pembelajaran dan pembentukan ingatan dan untuk alasan itu dijelaskan pada Gambar 36.

***Hippocampal LTP* adalah model *eksperimental* pembelajaran dan memori**

Hippocampus adalah struktur berbentuk tapal kuda milik sistem *limbik*. *Hippocampus* menerima input dari sejumlah area pemrosesan informasi sensorik. *Hippocampal*, bersama dengan struktur sekitarnya, korteks *entorhinal*, korteks *perirhinal*, dan wilayah *parahippocampal*, diyakini sebagai tempat di mana memori jangka pendek disimpan dan kemudian dikirim ke jangka panjang, lokasi penyimpanan memori yang lebih permanen melalui proses yang disebut konsolidasi memori. Sistem *hippocampal* dianggap bertanggung jawab untuk mengingat hubungan spasial antara objek di lingkungan dan untuk navigasi spasial.

Potensiasi jangka panjang *Hippocampal* (LTP) adalah bentuk mamalia yang banyak dipelajari dari *plastisitas sinaptik*. Proses ini diperoleh di laboratorium dalam irisan otak yang dibuat dari bagian *hippocampus* pengerat yang disebut daerah CA1 dan CA3. Arsitektur umum *hippocampus* yang menunjukkan lokasi wilayah CA1 dan CA3 disajikan pada Gambar 39. Dua set koneksi dicatat dalam gambar-koneksi berulang antara sel-sel di CA3, dan koneksi dari CA3 ke CA1. Di sirkuit mana pun, ketika stimulus tetanik (yaitu, kereta pulsa frekuensi tinggi) dikirim ke sel *presinaptik*, atau sebagai alternatif serangkaian pulsa pada frekuensi rendah disampaikan dan acara dipasangkan dengan depolarisasi yang dipasok laboratorium dari membran *postsinapsis*, efisiensi transmisi sinaptik meningkat. Peningkatan, atau potensiasi, dari efisiensi sinaptik dapat dihasilkan dalam milidetik, namun itu berlangsung selama beberapa menit atau bahkan jam.




Gambar 39. Sirkuit Hippocampal Pada Hewan Pengerat Yang Digunakan Dalam Studi LTP. (Beckerman, M. 2005)

Inisiasi dan fase konsolidasi LTP

Fase inisiasi LTP diikuti oleh fase konsolidasi yang melibatkan ekspresi gen. Transisi dari bentuk formasi memori singkat menjadi yang lebih permanen yang berlangsung selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan bahkan bertahun-tahun adalah melalui proses konsolidasi memori. Ekspresi gen diperlukan selama fase pembentukan memori. Jalur siklik AMP (cAMP) diaktifkan di mana protein *kinase A* dan *kinase MAP* hilir berinteraksi dengan faktor respons protein pengikat elemen cAMP (CREB) yang mengikat elemen respon cAMP (CRE) di promotor. Jalur ini dapat diaktifkan dengan beberapa cara. Ini dapat diaktifkan melalui pengaturan kalsium *adenilat siklase*, dan oleh *neuromodulator* seperti *serotonin* dan *dopamin* yang mengikat GPCRs, yang bertindak melalui protein G *heterotrimerik* untuk merangsang AC untuk memproduksi cAMP.

Rute MAP *kinase* dan PKA disoroti pada Gambar 40. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, masuknya kalsium baik melalui reseptor NMDA atau melalui saluran kalsium tipe L mengarah pada aktivasi sejumlah *serin/treonin kinase*-protein *kinase A*, protein *kinase C*, *kinase MAP*, dan protein yang bergantung pada kalsium/*calmodulin kinase* II dan IV (CaMKII dan CaMKIV), tidak semuanya ditunjukkan pada gambar. Beberapa tindakan yang berbeda dapat terjadi tergantung pada *durasi* pensinyalan sinaptik. Tindakan jangka pendek dapat terjadi di lingkungan reseptor menggunakan sumber yang sudah tersedia. Jika pensinyalan sinaptik dipertahankan dari waktu ke waktu, perubahan jangka panjang dapat terjadi yang melibatkan perubahan dalam ekspresi gen.




Gambar 40. Signalling dalam jalur pembelajaran di neuron *hippocampal* yang mengarah ke konsolidasi LTP: Kalsium masuk ke dalam sel melalui reseptor NMDA dan saluran kalsium tipe L menyebabkan aktivasi kinase *serine/threonin* kerja hilir. Kunci pensinyalan *intermediet* termasuk Ras GTPases, dan Rap1. Ini diaktifkan dengan cara Ca^{2+} dan *cAMP-dependent*, masing-masing, dengan demikian memadukan dan merute sinyal dari pembawa *second messenger* ini ke nukleus melalui kompleks Raf-MEKERK MAP *kinase*. (Beckerman, M. 2005)

CREB adalah titik kontrol di terminus jalur pembelajaran

Jalur pembelajaran berakhir ketika *serin/threonin kinase* tiba di nukleus dan memfosforilasi protein pengikat elemen respon cAMP (CREB) pada Ser133. Secara lebih rinci, sejumlah *kinase* mentranslokasi ke *situs promoter* dalam nukleus yang mengandung elemen respons cAMP (CREs). Kinase yang terlibat termasuk protein *kinase A*, protein *kinase C*, *kinase MAP*, dan *kinase CaM IV*. Anggota keluarga CREB faktor transkripsi mengikat ke situs ini. Protein CREB tetap tidak aktif jika tidak terfosforilasi pada Ser133. Fosforilasi pada Ser133 oleh *kinase* seperti hasil PKA di pengikatan oleh protein pengikat p300/CREB (CBP). Seperti dicatat sebelumnya, ini adalah *asetilase histone* (HAT) yang bekerja sama dengan basal mesin transkripsi untuk memulai program transkripsi yang mengarah ke pembentukan sinapsis baru dan perubahan morfologis ke yang lama (Gambar 41). Seperti halnya untuk titik kontrol transkripsional lainnya, berbagai faktor bertindak secara positif dan negatif mengatur transkripsi yang diperantarai CREB.

Transkripsi berlangsung dalam beberapa tahap, dimulai dengan gen awal yang segera dan berakhir dengan gen yang terlambat. Sebagai contoh, di antara gen-gen pertama yang akan ditranskripsikan dalam fasilitasi yang dimediasi oleh serotonin di *Aplysia* adalah mereka yang produknya memperpanjang durasi penandaan PKA. Tahap ini diikuti oleh transkripsi dan sintesis faktor transkripsi seperti C/EBP, yang mengarah ke penciptaan koneksi sinaptik baru. Seting aktivitas sinyal yang sama ini diamati dalam bentuk lain dari pembelajaran dan ingatan, dan pada hewan uji lainnya, sehingga ada keluarga mekanisme yang meluas melintasi filum dari *Aplysia* ke lalat ke tikus.



Gambar 41. Peristiwa Pensinyalan Hilir Yang Mengarah Ke Konsolidasi Ingatan.
(Beckerman, M. 2005)

DAFTAR PUSTAKA

- Ashe, paula. 2003. Apoptotic signaling cascades. *Progree in neuro-physyopharmacology & Biological Psychiatry* 27. 199-214
- Beckerman, M. 2005. *Molecular and Cellular Signaling*. AIP Press. New York.
- Burz, C. 2009. Apoptosis in Cancer: Key Molecular Signaling Pathways and Therapy Target. *Journal of Acta Oncologia*. Vol.48. Issue 6.
- Duman, R., Voleti, B. 2012. Signaling Pathway Underlying the Pathophysiology and Treatment of Deppression: Novel Mechanism for Rapid-Acting Agents. *NIH Public Access Journal*. 35(1): 47–56.doi: 10.1016/j.tins.2011.11.004.
- Ikawati, Z. 2013. *Farmakologi Molekuler: Target Aksi Obat dan Mekanisme Molekulernya*. UGM Press. Yogyakarta.
- Syamsudin. 2015. *Farmakologi Molekuler*. Penerbit Buku Kedokteran. EGC. Jakarta.
- Kelly, Laurie. 2005. *Essential of Human Physiology for Pharmacy*. CRC Press. USA.
- Ganong, William. G. 2002. *Fisiologi Kedokteran (Review of Medical Physiology)*. Penerbit Buku Kedokteran. EGC. Jakarta.
- Resende, et al. 2013. Nucleoplasmic calcium signaling and cell proliferation: calcium signaling in the nucleus. *Cell Communication and Signaling*. 11:14
- Igney FH, Krammer PH. Death and anti-death: tumour resistance to apoptosis. *Nat Rev Cancer*. ;2:277–88.
- Martinvalet D, Zhu P, Lieberman J. Granzyme A induces caspase- independent mitochondrial damage, a required first step for apoptosis. *Immunity*. 22:355–70. Elmore, Susan. 2007. Apoptosis: A Review of Programmed Cell Death. *Toxicol Patbol*. 35(4): 495–516.
- Vander, et al. 2001. *Human physiology: The mechanism of body function*. The McGraw Hill-Companies. USA

- The Cell: A Molecular Approach. 2nd edition. Structure of the plasma membrane. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9898/figure/A1970/?report=objectonly>. Diakses 20 Oktober 2018
- Committee on Recognition and Alleviation of Pain in Laboratory Animals, National Research Council. 2009. *Recognition and Alleviation of Pain in Laboratory Animals*. National academy of science. Washington DC.
- Dubin, Adrienne. E. 2010. Nociceptors: the sensors of the pain pathway. *The journal of clinical investigation*. Volume 120. No:11.
- Basbaum, Allan I. 2009. Cellular and Molecular Mechanisms of Pain. *Cell*. 139(2): 267–284. doi:10.1016/j.cell.2009.09.028.
- Basbaum, AI.; Jessell, T. *The Perception of Pain*. In: Kandel, ER.; Schwartz, J.; Jessell, T., editors. Principles of Neuroscience. New York: Appleton and Lange; p. 472-491.
- Elmore, Susan. 2007. Apoptosis: A Review of Programmed Cell Death. *Toxicol Pathol*. 2007 ; 35(4): 495–516.NIH
- Gawad, Jineetkumar, et al. 2015. Overview of cell signaling and cell communication. *Journal of pharmaceutical biology*. 5(2). 104-107.
- Karp, Gerald. et al. 2015. *Cell and molecular biology: concept and experiment*. 8th edition. Wiley. New York. USA.
- Jacob, Nilan T. 2017. Drug targets: ligand and voltage gated ion channels. *International Journal of Basic & Clinical Pharmacology*. Vol 6 | Issue 2. ISSN: 2319-2003.
- Godoy et al. 2014. Signaling pathway cross talk in Alzheimer’s disease. *Cell Communication and Signaling*. 12:23
- Jack, Knopman. et al. 2010. Hypothetical model of dynamic biomarkers of the Alzheimer’s pathological cascade. *Lancet Neurol*. 9(1).
- Saura, Valero. 2011. The role of CREB signaling in Alzheimer’s disease and other cognitive disorders. *Reviews in the neurosciences*. Vol. 22(2): 153–169
- Leffler A, Linte RM, Nau C, Reeh P, Babes A. A high-threshold heat-activated channel in cultured rat dorsal root ganglion neurons resembles TRPV2 and is blocked by gadolinium. *Eur J Neurosci* 2007;26:12–22.
- Caterina MJ, Leffler A, Malmberg AB, Martin WJ, Trafton J, Petersen-Zeitze KR, Koltzenburg M, Basbaum AI, Julius D. Impaired nociception and pain sensation in mice lacking the capsaicin receptor. *Science* 2000;288:306–313.

- Caceres AI, Brackmann M, Elia MD, Bessac BF, del Camino D, D'Amours M, Witek JS, Fanger CM, Chong JA, Hayward NJ, et al. A sensory neuronal ion channel essential for airway inflammation and hyperreactivity in asthma. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2009
- Vitolo, O.V., Sant' Angelo, A., Costanzo, V., Battaglia, F., Arancio, O., and Shelanski, M. 2002. Amyloid β -peptide inhibition of the PKA/CREB pathway and long-term potentiation: reversibility by drugs that enhance cAMP signaling. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 99, 13217 – 13221.
- Ma, Q.L., Harris-White, M.E., Ubeda, O.J., Simmons, M., Beech, W., Lim, G.P., Teter, B., Frautschy, S.A., and Cole, G.M. (2007). Evidence of A β - and transgene-dependent defects in ERK-CREB signaling in Alzheimer ' s models. *J. Neurochem.* 103, 1594 – 1607.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Afrisusnawati Rauf. Lahir pada tanggal 20 Januari 1986. Anak pertama dari pasangan Drs. Abdul Rauf, HS dan Hj. Megawati SpD.I. Menamatkan jenjang studi sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin pada tahun 2008. Setelah menamatkan pendidikan jenjang sarjana, penulis kemudian melanjutkan studi Profesi Apoteker pada tahun 2009 di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Pada tahun 2010 penulis melanjutkan studi kembali di Universitas yang sama pada program studi magister Ilmu Farmasi dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2012. Disamping menjalani tugas perkuliahan magister, penulis dipercaya menjadi dosen luar biasa pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di tahun 2010 dan pada tahun 2014-sekarang penulis telah berstatus sebagai dosen tetap dengan mengampu beberapa mata kuliah diantaranya: Anatomi Fisiologi Manusia, Farmakologi Molekuler, Farmakogenomik, Immunologi, Nutrasetikal, Farmakologi Toksikologi. Penulis juga aktif melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan aktif menulis jurnal di “Jurnal Farmasi” yang diterbitkan oleh Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.



RINGKASAN ISI BUKU

Buku dengan judul transduksi sinyal biologis membahas sistem dan jalur-jalur penghantaran sinyal pada tubuh manusia.

Bagian pertama buku ini membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi antar sel dengan menjelaskan secara detail jenis komunikasi yang digunakan serta bahan-bahan yang turut berpartisipasi dalam komunikasi.

Bab kedua membahas tentang kanal ion yang disertai penjelasan tentang potensial membran, potensial aksi, keluarga kanal ion, pembukaan dan penutupan kanal ion, perakitan kanal ion, serta desain dan fungsi kanal ion.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang sistem transduksi sinyal yang meliputi reseptor, klasifikasi reseptor disertai dengan mekanisme kerja dari masing-masing reseptor.

Bab keempat adalah pembahasan tentang transduksi sinyal oleh lipid, kalsium, cAMP, kalmodulin. Pembahasan dilengkapi dengan struktur membrane biologis dan peranan bahan-bahan tersebut dalam penghantaran sinyal.

Bab kelima berisi materi tentang transduksi sinyal pada system imun yang melibatkan sel-sel system imun spesifik dan non spesifik.

Bab keenam membahas tentang transduksi sinyal pada system endokrin yang meliputi kerja berbagai hormone di dalam tubuh.

Bab ketujuh adalah pembahasan tentang transduksi sinyal pada system saraf yang terdiri dari mekanisme penghantaran sinyal pada nyeri dan demam, penghantaran sinyal pada mood dan depresi, serta penghantaran sinyal pada penyakit Alzheimer.

Bab kedelapan memuat materi tentang apoptosis yaitu program kematian sel dengan jalur-jalur yang menyertainya serta bahan-bahan yang berperan dalam aktivitas apoptosis.

Bab kesembilan adalah pembahasan tentang kanker. Jalur penghantaran sinyal dan aktivasi berbagai macam reseptor yang terlibat dalam kejadian kanker.

Bab terakhir membahas tentang integrasi sinyal dalam belajar dan memori, protein-protein atau bahan-bahan dan jalur-jalur signaling yang terlibat dalam belajar dan memori.