

Rosdianah

SISTEM NEUROPERSEPSI

(Bagi Mahasiswa Jurusan Keperawatan)



ROSDIANAH

SISTEM NEUROPERSEPSI

(Bagi Mahasiswa Jurusan Keperawatan)



Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

SISTEM NEUROPERSEPSI
(Bagi Mahasiswa Jurusan Keperawatan)

Penulis:
Rosdianah

Editor:
Eny Sutria

Cetakan: I 2014
x + 149 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978-602-328-030-8

Alauddin University Press
Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa

SAMBUTAN REKTOR

Jika engkau ingin meng"abadi", maka tinggalkanlah "Legacy"

Ungkapan di atas memberi gambaran bahwa setiap manusia hendaknya selalu melahirkan karya terbaiknya untuk dipersembahkan kepada umat. Karya itu akan menjadi sebuah *legacy* yang akan selalu diingat dan dikenang, bahkan diabadikan dalam catatan sejarah peradaban anak manusia. Jutaan bahkan milyaran anak manusia telah dan akan lahir di permukaan dunia ini, namun tidak semua mampu mencatatkan dirinya dalam kelindan sejarah yang "menyejarah". Hanya sebagian kecil anak manusia yang mampu menghadirkan dan meng"abadi"kan dirinya dalam garis lingkaran lintasan sejarah.

Dalam bingkai dan konstruksi emosional, manusia pada hakikatnya ingin abadi. Itulah sebabnya manusia ingin selalu mengabadikan momentum penting dalam ruang dan waktu yang senantiasa berubah. Mereka membuat gambar, foto, lukisan, dan sejenisnya yang seakan-akan berkeinginan menyetop waktu yang senantiasa berubah. Demikian pula aktivitas manusia membangun monumen bersejarah tidak lain tujuannya untuk mengabadikan sebuah peristiwa penting dalam sejarah peradaban manusia, bahkan Khairil Anwar berkata: *"Aku ingin hidup seribu tahun lagi"*.

Karya akademik pada hakikatnya merupakan sebuah monumen penting dalam kehidupan yang dapat menjadi *legacy*. Karya itu dapat dinikmati oleh siapa saja yang cinta terhadap pengetahuan. Karya akademik bukan sekadar sebuah tulisan yang menjadi hiasan di dalam rak, lemari atau ruang baca, tetapi dia mampu melahirkan perubahan dan memberikan pencerahan kepada manusia. Terlebih

dalam perspektif eskatologis, karya akademik dapat menjadi amal jariah di "alam sana".

Atas dasar kesadaran itulah, maka program Gerakan Seribu Buku (GSB) ini dilaksanakan, dengan harapan setiap dosen mampu melahirkan "*legacy*" dalam catatan kehidupannya berupa karya tulis yang dipublikasikan. Gerakan ini diharapkan menjadi "trigger" untuk melahirkan karya-karya berikutnya.

Saya merasa gembira bahwa dosen UIN Alauddin tidak saja mampu berorasi di atas mimbar, tetapi juga dapat menuangkan gagasan, ide, dan pikirannya dalam bentuk tulisan. Hingga periode akhir masa jabatan saya sebagai Rektor, program GSB ini telah tuntas dilaksanakan. Itu artinya, hingga saat ini tidak kurang dari 1000 buah karya akademik telah dipublikasikan oleh para dosen UIN Alauddin Makassar. Fakta ini harus diapresiasi dan menjadi catatan penting bagi pejabat (Rektor) berikutnya.

Karya tulis merupakan perbendaharaan terbesar di dunia akademik. Hanya dengan budaya menulis dan membaca, maka dunia akademik menjadi hidup, bahkan al-Quran mengisyaratkan bahwa lahir dan hadirnya pengetahuan serta peradaban harus diawali dengan budaya "*iqra/baca*" dan "*al-qalam/pena*". Karena itulah, UIN sebagai kampus peradaban harus menjadi pioneer dari tradisi literasi ini, sebab rendahnya budaya "baca-tulis" pada suatu bangsa atau sebuah kampus mengindikasikan lemahnya kesadaran terhadap eksistensi diri, alam, dan Tuhan.

Samata, 2 Oktober 2014
Rektor,

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, MS

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan Taslim atas junjungan Nabi Muhammad Saw, Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Nabi yang telah membawa ummat dari alam jahiliyah ke alam yang berperadaban, juga pada keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk menambah referensi bagi mahasiswa jurusan keperawatan tentang sistem neurompersepsi, salah satu sistem dalam tubuh manusia. Buku ini disusun sebagai bentuk partisipasi kami sebagai dosen dalam Gerakan Seribu Buku (GSB) tahap IV yang menjadi program unggulan Universitas Islam Negeri Alauddin.

Buku ini terdiri dari 5 bab, menguraikan tentang sistem neurompersepsi, mulai dari anatomi fisiologi, pemeriksaan fungsi dan pemeriksaan khusus penglihatan dan pendengaran,, patofisiologi penyakit dan prinsip-prinsip terapi, perawatan dan pencegahan penyakit ini. Pada akhir bab, diberikan latihan kasus penanganan penyakit neurompersepsi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kami senantiasa mengharapkan masukan yang berarti demi perbaikan buku ini. Begitupula disadari bahwa dalam menyusun buku ini, penulis mendapat banyak bantuan baik berupa materi maupun non materi dari berbagai pihak, untuk itu lewat kesempatan ini, kami mengucapkan terima

kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian buku ini.

Terakhir semoga penulisan buku yang sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca.Amiin.

Gowa, September 2014
Penulis,

DAFTAR ISI

SAMBUTA REKTOR	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB I ANATOMI DAN FISILOGI SISTEM

NEUROPERSEPSI

- A. Anatomi dan Fisiologi Penglihatan..... 1
- B. Anatomi dan Fisiologi Pendengaran 17

BAB II PEMERIKSAAN FUNGSI

SISTEM NEUROPERSEPSI.....

- A. Pemeriksaan Fisis..... 45
- B. Pemeriksaan Khusus..... 50
- C. Pemeriksaan Penunjang..... 63

BAB III PATOFISIOLOGI PENYAKIT 69

- A. Penyakit Infeksi..... 69
- B. Penyakit Autoimun dan Genetik 97
- C. Penyakit Keganasan 108
- D. Penyakit Degeneratif..... 127

BAB IV PRINSIP-PRINSIP TERAPI, PERAWATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT SARAF	
A. Prinsip-prinsip Terapi.....	137
B. Prinsip-prinsip Perawatan.....	139
C. Prinsip-prinsip Pencegahan	143
DAFTAR PUSTAKA.....	147
RIWAYAT HIDUP.....	147

DAFTAR GAMBAR

1. Lapisan-Lapisan Bola Mata	4
2. Anatomi Mata	5
3. Bagian-Bagian Mata yang dilewati Cahaya	6
4. Telinga Luar, Tengah dan Dalam.....	17
5. Telinga Bagian Dalam.....	20
6. Anatomi Telinga.....	21
7. Organ Corti	32
8. Lintasan vestibuler	34
9. Lintasan jalannya gelombang bunyi.....	35
10 Hubungan Vestibuler dengan Sistem Saraf	40
11. Fisiologi Pendengaran	43
12. Pemeriksaan sistem pendengaran.....	61
13. Massa berukuran 3,5x2,5 cm di Daun Telinga	115
14. Berbagai Macam Lesi telinga	120
15. <i>Morphea type</i> dari Karsinoma Sel Basal Daun Telinga.....	121
16. Adenoma Daun Telinga.....	121
17. <i>Vestibular Schwannoma</i>	122

BAB I ANATOMI DAN FISILOGI SISTEM NEUROPERSEPSI

A. Anatomi Dan Fisiologi Penglihatan

1. Anatomi Kelopak Mata

Kelopak atau palpebra mempunyai fungsi melindungi bola mata, serta mengeluarkan sekresi kelenjarnya yang membentuk film air mata di depan kornea.

Kelopak mempunyai lapisan kulit yang tipis pada bagian depan sedang dibagian belakang ditutupi selaput lendir tarsus yang disebut konjungtiva tarsal.

Gangguan penutupan kelopak akan mengakibatkan keringnya permukaan mata sehingga terjadi keratitis et lagoftamus.

Pada kelopak terdapat bagian-bagian :

- a. Kelenjar seperti : kelenjar sebacea, kelenjar Moll atau kelenjar keringat, kelenjar Zeis pada pangkal rambut, kelenjar Meibom pada tarsus.
- b. Otot seperti : M.orbikularis okuli yang berjalan melingkar di dalam kelopak atas dan bawah, dan terletak di bawah kulit kelopak. Pada dekat tepi margo palpebra terdapat otot orbikularis okuli yang disebut sebagai M.Rioland. M.orbikularis berfungsi menutup bola mata yang dipersarafi N. fasialis. M levator palpebra, yang berorigo pada anulus foramen orbita dan berinsersi pada tarsus atas dengan sebagian menembus M.orbikularis okuli menuju kulit kelopak bagian tengah. Bagian kulit tempat insersi M.levator palpebra terlihat sebagai sulkus (lipatan palpebra). Otot ini dipersarafi oleh N.III yang berfungsi untuk mengangkat kelopak mata atau membuka mata.
- c. Didalam kelopak mata terdapat tarsus yang merupakan

jaringan ikat dengan kelenjar meibom didalamnya yang bermuara pada margo palpebra.

- d. Septum orbita yang merupakan pembatas isi orbita dengan kelopak depan
- e. Tarsus ditahan oleh septum orbita yang melekat pada rima orbita pada seluruh lingkaran pembukaan rongga orbita. Tarsus (terdiri atas jaringan ikat yang merupakan jaringan penyokong kelopak dengan kelenjar meibom (40 buah di kelopak atas dan 20 pada kelopak bawah)
- f. Pembuluh darah yang memperdarahi adalah a.palpebra
- g. Persarafan sensorik kelopak mata atas didapatkan dari ramus frontal N.V, sedang kelopak bawah oleh cabang II saraf ke V.

Konjungtiva tarsal yang terletak di belakang kelopak hanya dapat dilihat dengan melakukan eversi kelopak. Konjungtiva tarsal melalui forniks menutupi bulbus okuli. Konjungtiva merupakan membran mukosa yang mempunyai sel goblet yang menghasilkan musin.

2. Anatomi Sistem Lakrimal

Sistem lakrimal terdiri atas 2 bagian. Yaitu :

- a. Sistem produksi atau glandula lakrimal. Glandula lakrimal terletak di temporo antero superior rongga orbita.
- b. Sistem ekskresi, yang terdiri atas puntum lakrimal, kanalikuli lakrimal terletak dibagian nasal depan rongga. Air mata dari duktus lakrimal akan mengalir ke dalam rongga hidung di dalam meatus inferior

Film air mata sangat berguna untuk kesehatan mata. Air mata akan masuk kedalam sakus lakrimal melalui puntum lakrimal. Bila puntum lakrimal tidak menyinggung bola mata, maka air mata akan keluar melalui margo palpebra yang disebut epifora. Epifora juga akan terjadi akibat pengeluaran air mata yang berlebihan dari kelenjar lakrimal.

Untuk melihat adanya sumbatan pada duktus nasolakrimal, maka sebaiknya dilakukan penekanan pada sakus lakrimal. Bila terdapat penyumbatan yang disertai dakriosistis, maka cairan berlendir kental akan keluar melalui pungtum lakrimal.

3. Anatomi Konjungtiva

Konjungtiva merupakan membran yang menutupi sklera dan kelopak bagian belakang. Berbagai macam obat mata dapat diserap melalui konjungtiva ini. Konjungtiva mengandung kelenjar musin yang dihasilkan oleh sel Goblet. Mucin bersifat membasahi bola mata terutama kornea.

Konjungtiva terdiri atas tiga bagian, yaitu:

- a. Konjungtiva tarsal yang menutupi tarsus, konjungtiva tarsal sukar digerakkan dari tarsus.
- b. Konjungtiva bulbi menutupi sklera dan mudah digerakkan dari sklera dibawahnya.
- c. Konjungtiva fornises atau forniks konjungtiva yang merupakan tempat peralihan konjungtiva tarsal dengan konjungtiva bulbi.

Konjungtiva bulbi dan forniks berhubungan sangat longgar dengan jaringan dibawahnya sehingga bola mata mudah bergerak.

4. Anatomi Bola Mata

Bola mata berbentuk bulat dengan panjang maksimal 24 mm. Bola mata dibungkus oleh 3 lapis jaringan yaitu:


- a. Sklera merupakan jaringan ikat yang kenyal dan memberikan bentuk pada mata, merupakan bagian terluar yang melindungi bola mata. Bagian terdepan sklera disebut kornea yang bersifat transparan yang memudahkan sinar masuk ke dalam bola mata. Kelengkungan kornea lebih besar dibanding sklera.
- b. Jaringan uvea merupakan jaringan vaskular. Jaringan

sklera dan uvea dibatasi oleh ruang yang potensial mudah dimasuki darah bila terjadi perdarahan pada ruda paksa yang disebut perdarahan suprakoroid.

Jaringan uvea ini terdiri atas iris, badan siliar, dan koroid. Pada iris didapatkan pupil yang oleh 3 susunan otot dapat mengatur jumlah sinar masuk ke dalam bola mata. Otot dilatator dipersarafi oleh saraf simpatis, sedang sfingter iris dan otot siliar dipersarafi oleh parasimpatis. Otot siliar yang terletak di badan siliar mengatur bentuk lensa untuk kebutuhan akomodasi.

Badan siliar yang terletak di belakang iris menghasilkan cairan bilik mata (akuos humor), yang dikeluarkan melalui trabekulum yang terletak pada pangkal iris di batas kornea dan sklera.

- c. Lapis ketiga bola mata adalah retina yang terletak paling dalam dan mempunyai susunan lapis sebanyak 10 lapis yang merupakan lapis membran neurosensoris yang akan merubah sinar menjadi rangsangan pada saraf optik dan diteruskan ke otak. Terdapat rongga yang potensial antara retina dan koroid sehingga retina dapat terlepas dari koroid yang disebut ablasi retina.



Gambar 1.1. Lapisan-lapisan bola mata


Badan kaca mengisi rongga di dalam bola mata dan bersifat gelatin yang hanya menempel pada papil saraf optik, makula, dan pars plana. Bila terdapat jaringan ikat di dalam badan kaca disertai dengan tarikan pada retina akan robek dan terjadi ablasi retina.

Lensa terletak dibelakang pupil yang dipegang di daerah ekuatornya pada badan siliar melalui Zonula Zinn. Lensa mata mempunyai peranan pada akomodasi atau melihat dekat sehingga sinar dapat difokuskan di daerah makula lutea.


Terdapat 6 otot penggerak bola mata, dan terdapat kelenjar lakrimal yang terletak didaerah temporal atas di dalam rongga orbita.

Sistem sekresi air mata atau lakrimal terletak di daerah temporal bola mata. Sistem ekskresi mulai pada pungtum lakrimal, kanalikuli lakrimal, saku lakrimal, duktus nasolakrimal, meatus inferior.

Berikut adalah gambar anatomi mata :



Gambar. 1.2.a. Anatomi mata (tampak depan)
b. Anatomi mata (potongan sagital)



Gambar 1.3. Bagian-bagian mata yang dilewati cahaya

5. Anatomi Kornea

Kornea (latin *cornum* = seperti tanduk) adalah selaput bening mata, bagian selaput mata yang tembus cahaya, merupakan lapis jaringan yang menutup bola mata sebelah depan dan terdiri atas lapis :

a. Epitel

- 1) Tebalnya 50 um, terdiri atas 5 lapis sel epitel tidak bertanduk yang saling tumpang tindih; satu lapis sel basal, sel poligonal dan sel gepeng, berasal dari ektoderm permukaan.
- 2) Pada sel basal sering terlihat mitosis sel, dan sel muda ini terdorong ke depan menjadi lapis sel sayap dan semakin maju ke depan menjadi sel gepeng, sel basal berikatan erat dengan sel basal disampingnya dan sel poligonal di depannya melalui desmosom dan makula okluden; ikatan ini menghambat pengaliran air, elektrolit, dan glukosa yang merupakan barrier.
- 3) Sel basal menghasilkan membran basal yang melekat

erat kepadanya. Bila terjadi gangguan akan mengakibatkan erosi rekuren.

b. Membrana bowman

- 1) Terletak di bawah membran basal epitel kornea yang merupakan kolagen yang tersusun tidak teratur seperti stroma dan berasal dari bagian depan stroma.
- 2) Lapis ini tidak mempunyai daya regenerasi

c. Stroma

Terdiri atas lamel yang merupakan susunan kolagen yang sejajar satu dengan lainnya, pada permukaan terlihat anyaman yang teratur sedang di bagian perifer serat kolagen ini bercabang; terbentuknya kembali serat kolagen memakan waktu lama yang kadang-kadang sampai 15 bulan. Keratosit merupakan sel stroma kornea yang merupakan fibroblas terletak di antara serat kolagen stroma. Diduga keratosit membentuk bahan dasar dan serat kolagen dalam perkembangan embrio atau sesudah trauma.

d. Membran Descemet

- 1) Merupakan membran aselular dan merupakan batas belakang stroma kornea yang dihasilkan sel endotel dan merupakan membran basalnya.
- 2) Bersifat sangat elastik dan berkembang terus seumur hidup, mempunyai tebal 40 um.

e. Endotel

Berasal dari mesotelium, berlapis satu, bentuk heksagonal, besar 20-40 um. Endotel melekat pada membran descemet melalui hemideamosom dan zonula okluden.

Kornea dipersarafi oleh banyak saraf sensoris terutama berasal dari saraf siliar longus, saraf nasosiliar, saraf ke V saraf siliar longus berjalan suprakoroid, masuk ke dalam stroma kornea, menembus membrana bowman melepaskan

selubung Schwannya. Seluruh lapis epitel dipersarafi sampai pada kedua lapis terdepan tanpa ada akhir saraf. Bulbus Krause untuk sensasi dingin ditemukan didaerah limbus. Daya regenerasi saraf sesudah dipotong di daerah limbus terjadi dalam waktu 3 bulan.

Trauma atau penyakit yang merusak endotel akan mengakibatkan sistem pompa endotel terganggu sehingga dekompensasi endotel dan terjadi edema kornea. Endotel tidak mempunyai daya regenerasi.

Kornea merupakan bagian mata yang tembus cahaya dan menutup bola mata disebelah depan. Pembiasan sinar terkuat dilakukan oleh kornea, dimana 40 dioptri dari 50 dioptri pembiasan sinar masuk dilakukan oleh kornea.

6. Anatomi Uvea

Merupakan lapis vaskular di dalam bola mata yang terdiri atas, badan siliar dan koroid. Perdarahan uvea dibedakan antara bagian anterior yang diperdarahi oleh 2 buah arteri siliar posterior longus yang masuk menembus sklera di temporal dan nasal dekat tempat masuk saraf optik dan 7 buah arteri siliar anterior, yang terdapat pada setiap otot superior, medial, inferior dan satu pada otot rektus lateral. Arteri siliar anterior dan posterior ini bergabung menjadi satu membentuk arteri sirkularis mayor pada badan siliar. Uvea posterior mendapat perdarahan dari 15-20 buah arteri siliar posterior brevis yang menembus sklera di sekitar tempat masuk saraf optik.

Persarafan uvea didapatkan dari ganglion siliar yang terletak antara bola mata dengan otot rektus lateral, 1 cm di depan foramen optik, yang menerima 3 akar saraf dibagian posterior yaitu:

- a. Saraf sensoris, yang berasal dari saraf nasosiliar yang mengandung serabut sensoris untuk kornea, iris dan

badan siliar.

- b. Saraf simpatis yang membuat pupil berdilatasi, yang berasal dari saraf simpatis yang melingkari arteri karotis; mempersarafi pembuluh darah uvea dan untuk dilatasi pupil.
- c. Akar saraf motor yang akan memberikan saraf parasimpatis untuk mengecilkan pupil

Pada ganglion siliar hanya saraf parasimpatis yang melakukan sinaps. Iris terdiri atas bagian pupil dan bagian tepi siliar, dan badan siliar terletak antara iris dan koroid. Batas antara korneosklera dengan badan siliar belakang adalah 8 mm temporal dan 7 mm nasal. Didalam badan siliar terdapat 3 otot akomodasi yaitu longitudinal, radier dan sirkular.

Iris mempunyai kemampuan mengatur secara otomatis masuknya sinar kedalam bola mata. Reaksi pupil ini merupakan juga indikator untuk fungsi simpatis (midriasis) dan parasimpatis (miosis) pupil. Badan siliar merupakan susunan otot melingkar dan mempunyai sistem ekskresi di belakang limbus. Radang badan siliar akan mengakibatkan melebarnya pembuluh darah didaerah limbus, yang akan mengakibatkan mata merah yang merupakan gambaran karakteristik peradangan intraokular.

Otot longitudinal badan siliar yang berinsersi didaerah baji sklera bila berkontraksi akan membuka anyaman trabekula dan mempercepat pengaliran cairan mata melalui sudut bilik mata.

Otot melingkar bila siliar berkontraksi pada akomodasi akan mengakibatkan mengendornya zonula zinn sehingga terjadi pencembungan lensa.

Kedua otot ini dipersarafi oleh saraf parasimpatis dan bereaksi baik terhadap obat parasimpatomimetik.

7. Pupil

Pupil anak-anak berukuran kecil akibat belum berkembangnya saraf simpatis. Orang dewasa ukuran pupil adalah sedang dan orang tua pupil mengecil akibat rasa silau yang dibangkitkan oleh lensa yang sklerosis.

Pada waktu tidur ukuran pupil kecil, hal ini dipakai sebagai ukuran tidur, simulasi, koma dan tidur sesungguhnya. Pupil kecil waktu tidur akibat dari berkurangnya rangsang simpatis dan kurang rangsangan hambatan miosis

Bila subkorteks bekerja sempurna maka terjadi miosis. Di waktu bangun korteks menghambat pusat subkorteks sehingga terjadi midriasis. Waktu tidur hambatan subkorteks hilang sehingga terjadi kerja subkorteks yang sempurna yang akan menjadikan miosis.

Fungsi mengecilnya pupil untuk mencegah aberasi kromatis pada akomodasi dan untuk memperdalam fokus seperti pada kamera foto yang diafragmanya dkecilkan.

8. Sudut bilik mata depan

Sudut bilik mata yang dibentuk jaringan korneosklera dengan pangkal iris. Pada bagian ini terjadi hambatan pengaliran keluar cairan bilik mata. Bila terdapat hambatan pengaliran keluar cairan air mata maka akan terjadi penimbunan cairan bilik mata didalam bola mata sehingga tekanan bola mata meninggi atau glaukoma.

Sudut filtrasi berbatas dengan akar iris berhubungan dengan sklera kornea dan disini ditemukan sklera spur yang membuat cincin melingkar 360 derajat dan merupakan batas belakang sudut filtrasi serta tempat insersi otot siliar longitudinal. Anyaman trabekula mengisi kelengkungan sudut filtrasi yang mempunyai dua komponen yaitu badan siliar dan uvea.

Pada sudut filtrasi terdapat garis Schwalbe yang merupakan akhir perifer endotel dan membran descemet, dan kanal Schlem yang menampung cairan mata keluar ke salurannya.

Sudut bilik mata mata depan sempit terdapat pada mata berbakat glaukoma sudut tertutup, hipermetrop, blokade pupil, katarak intumesen, dan sinekia posterior perifer.

9. Lensa mata

Jaringan ini berasal dari ektoderm permukaan yang berbentuk lensa di dalam mata dan bersifat bening. Lensa didalam bola mata terletak di belakang iris yang terdiri dari zat tembus cahaya berbentuk seperti cakram yang dapat menebal dan menipis pada saat terjadinya akomodasi.

Lensa berbentuk lempeng cakram bikonveks dan terletak di dalam bilik mata belakang. Lensa akan dibentuk oleh sel epitel lensa akan membentuk serat lensa terus menerus sehingga mengakibatkan memadatnya serat lensa yang paling dahulu dibentuk atau serat lensa yang tertua di dalam kapsul lensa. Di dalam lensa dapat dibedakan nukleus embrional, fetal dan dewasa. Di bagian luar nukleus ini terdapat serat lensa yang lebih muda dan disebut sebagai korteks lensa. Korteks yang terletak di sebelah depan nukleus lensa disebut sebagai korteks anterior, sedang dibelakangnya korteks posterior. Nukleus lensa mempunyai konsistensi lebih keras dibanding korteks lensa yang lebih muda. Di bagian perifer kapsul lensa terdapat zonula zinn yang menggantungkan lensa diseluruh ekuatornya pada badan siliar.

Secara fisiologik lensa mempunyai sifat tertentu, yaitu:

- a. Kenyal atau lentur karena memegang peranan terpenting dalam akomodasi untuk menjadi cembung.
- b. Jernih atau transparan karena diperlukan sebagai media penglihatan.
- c. Terletak di tempatnya.

Keadaan patologik lensa ini dapat berupa :

- a. Tidak kenyal pada orang dewasa yang akan mengakibatkan presbiopia
- b. Keruh atau disebut katarak
- c. Tidak berada ditempat atau subluksasi dan dislokasi.

Lensa orang dewasa di dalam perjalanan hidupnya akan menjadi bertambah besar dan berat.

10. Anatomi Badan Kaca

Badan kaca merupakan suatu jaringan seperti kaca bening yang terletak antara lensa dengan retina. Badan kaca bersifat semi cair di dalam bola mata. Mengandung air sebanyak 90% sehingga tidak dapat lagi menyerap air. Sesungguhnya fungsi badan kaca sama dengan fungsi cairan mata yaitu mempertahankan bola mata agar tetap bulat. Perannya mengisi ruang untuk meneruskan sinar dari lensa ke retina. Badan kaca melekat pada bagian tertentu jaringan bola mata. Perlekatan itu terdapat pada bagian yang disebut ora serata, pars plana dan papil saraf optik. Kebeningan badan kaca disebabkan tidak terdapatnya pembuluh darah dan sel. Pada pemeriksaan tidak terdapatnya kekeruhan badan kaca akan memudahkan melihat bagian retina pada pemeriksaan oftalmoskop.

11. Anatomi Retina

Retina atau selaput jala merupakan bagian mata yang mengandung reseptor yang menerima rangsangan cahaya. Retina berbatasan dengan koroid dengan sel pigmen epitel retina dan terdiri atas lapisan :

- a. Lapisan fotoreseptor, merupakan lapis terluar retina terdiri atas sel batang yang mempunyai bentuk ramping dan sel kerucut.
- b. Membran limitan eksterna yang merupakan membran ilusi.
- c. Lapis nukleus luar, merupakan susunan lapis nukleus sel kerucut dan batang. Ketiga lapis diatas avaskuler dan mendapat metabolisme dari kapiler koroid.
- d. Lapis pleksiform luar, merupakan lapis aseluler dan merupakan tempat sinaps sel fotoreseptor dengan sel bipolar dan sel horisontal.
- e. Lapis nukleus dalam, merupakan tubuh sel bipolar, sel horisontal dan sel Muller. Lapis ini mendapat metabolisme dari arteri retina sentral.
- f. Lapis pleksiform dalam, merupakan lapis aseluler merupakan tempat sinaps sel bipolar, sel amakrin dengan sel ganglion.
- g. Lapis sel ganglion yang merupakan lapis badan sel daripada neuron kedua.
- h. Lapis serabut saraf, merupakan lapis akson sel ganglion menuju ke arah saraf optik. Di dalam lapisan-lapisan ini terletak sebagian besar pembuluh darah retina.
- i. Membran limitan interna merupakan membran hialin antara retina dan badan kaca.

Warna retina biasanya jingga dan kadang-kadang pucat pada anemia dan iskemia dan merah pada hiperemia. Pembuluh darah di dalam retina merupakan cabang arteri oftalmika, arteri retina sentral masuk retina melalui papil

saraf optik yang akan memberikan nutrisi pada retina dalam.

Lapisan luar retina atau sel kerucut dan batang mendapat nutrisi dari koroid. Untuk melihat fungsi retina maka dilakukan pemeriksaan subyektif retina seperti tajam penglihatan, penglihatan warna, dan lapangan pandang. Pemeriksaan objektif adalah elektoretino-gram (ERG), elektrokulogram (EOG) dan visual evoked respons (VER).

12. Anatomi Saraf Optik

Saraf optik yang keluar dari polus posterior bola mata membawa 2 jenis serabut saraf yaitu saraf penglihatan dan serabut pupilomotor. Kelainan saraf optik menggambarkan gangguan yang diakibatkan tekanan langsung atau tidak langsung terhadap saraf optik ataupun perubahan toksik dan anoksik yang mempengaruhi penyaluran aliran listrik.

13. Anatomi Sklera

Bagian putih bola mata yang bersama-sama dengan kornea merupakan pembungkus dan pelindung isi bola mata. Sklera berjalan dari papil saraf optik sampai kornea. Sklera anterior ditutupi oleh 3 lapis jaringan ikat vaskuler. Sklera mempunyai kekakuan tertentu sehingga mempengaruhi pengukuran tekanan bola mata. Walaupun sklera kaku dan tipisnya 1 mm ia masih tahan terhadap kontusi trauma tumpul. Kekakuan sklera dapat meninggi pada pasien diabetes melitus atau merendah pada eksoftalmos goiter, miotika dan meminum air banyak.

14. Rongga Orbita

Rongga orbita adalah rongga yang berisi bola mata dan terdapat 7 tulang yang membentuk dinding orbita

yaitu : lakrimal, etmoid, sfenoid, frontal dan dasar orbita yang terutama terdiri atas tulang maksila, bersama-sama tulang palatinum dan zigomatikus.

Rongga orbita yang berbentuk piramid ini terletak pada kedua sisi rongga hidung. Dinding lateral orbita membentuk sudut 45° dengan dinding medialnya.

Dinding orbita terdiri atas tulang- tulang ;

- 1). Atas atau superior : os frontal
- 2). Lateral ; os frontal, os zigomatik, ala magna os sfenoid
- 3). Inferior : os zigomatik, os maksila, os palatina
- 4). Nasal : os maksila, os lakrimal, os etmoid.

Foramen optik terletak pada apeks rongga orbita, dilalui oleh saraf optik, arteri, vena dan saraf simpatik yang berasal dari pleksus karotid. Fissura orbita superior di sudut orbita atas temporal dilalui oleh saraf lakrimal (V), saraf frontal (V), saraf troklear (IV), saraf okulomotor (III), saraf nasosiliar (V), abduzens (VI) dan arteri vena oftalmik.

Fissura orbita inferior terletak di dasar tengah temporal orbita dilalui oleh saraf infra orbita dan zigomatik dan arteri infraorbita. Fossa lakrimal terletak di sebelah temporal atas tempat duduknya kelenjar lakrimal.

15.Otot Penggerak Mata

Otot ini menggerakkan mata dengan fungsi ganda dan untuk pergerakan mata tergantung pada letak dan sumbu penglihatan sewaktu aksi otot.

Otot penggerak mata terdiri atas 6 otot yaitu :

- a. Otot Oblik inferior, aksi primer berupa ekstorsi dalam abduksi, sedangkan aksi sekunder berupa elevasi dalam adduksi dan abduksi dalam elevasi. Otot obliq inferior mempunyai origo pada fosa lakrimal tulang lakrimal, berinsersi pada sklera posterior 2 mm dari kedudukan

- makula, dipersarafi saraf okulomotor bekerja untuk menggerakkan mata ke atas, abduksi dan eksiklotorsi.
- b. Obliq superior, aksi primer : intorsi pada abduksi, aksi sekunder berupa depresi dalam adduksi dan abduksi dalam depresi. Obliq superior berorigo pada anulus Zinn dan ala parva tulang sfenoidi diatas foramen optik, berjalan menuju troklea dan dikatrol balik dan kemudian berjalan di atas otot rektus superior yang kemudian berinsersi pada sklera dibagian temporal belakang bola mata. Obliq superior dipersarafi saraf ke IV atau saraf troklear yang keluar dari bagian dorsal susunan saraf pusat. Mempunyai aksi pergerakan miring dari troklea pada bola mata dengan kerja utama terjadi bila sumbu aksi dan sumbu penglihatan searah atau mata melihat ke arah nasal. Berfungsi menggerakkan bola mata untuk depresi terutama bila mata melihat ke nasal, abduksi dan insiklotorsi. Obliq superior merupakan otot penggerak mata yang terpanjang dan tertipis.
 - c. Rektus inferior, aksi primer berupa depresi pada abduksi dan sekunder berupa ekstorsi pada abduksi dan adduksi pada depresi. Rektus inferior mempunyai origo pada anulus Zinn, berjalan antara obliq inferior dan bola mata atau sklera dan insersi 6 mm dibelakang limbus yang pada persilangan dengan obliq inferior diikat kuat oleh ligamen Lockwood.
 - d. Rektus lateral, aksi berupa abduksi. Rektus lateral mempunyai origo pada anulus Zinn diatas dan di bawah foramen optik, rektus lateral dipersarafi oleh n.VI dengan pekerjaan menggerakkan mata terutama abduksi.
 - e. Rektus medialis aksi adduksi, mempunyai origo pada anulus Zinn dan pembungkus dura saraf optik yang


sering memberikan rasa sakit pada pergerakan mata bila terdapat neuritis retrobulbar dan berinsersi 5 mm dibelakang limbus. Rektus medius merupakan otot mata yang paling tebal dengan tendon terpendek.

- 6). Rektus superior, aksi primer berupa elevasi dalam abduksi dan sekunder berupa intorsi dalam adduksi dan adduksi dalam elevasi. Mempunyai origo pada anulus Zinn dekat fisura.

Rektus superior beserta lapis dura saraf optik yang akan memberikan rasa sakit pada pergerakan bola mata bila terdapat neuritis retrobulbar. Otot ini berinsersi 7 mm di belakang limbus dan dipersarafi cabang superior N.III.

B. Anatomi dan Fisiologi Sistem Pendengaran

Telinga dibagi atas telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam.



Gambar 1.4. Telinga luar, telinga tengah, telinga dalam.
(Potongan Frontal Telinga)

1. Telinga Luar

Telinga luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga sampai membran timpani. Daun telinga terdiri dari tulang rawan elastin dan kulit. Liang telinga berbentuk huruf S, dengan rangka tulang rawan pada sepertiga bagian luar, sedangkan dua pertiga bagian dalam rangkanya terdiri dari tulang. Panjangnya kira-kira $2\frac{1}{2}$ - 3 cm.

Di sepertiga bagian luar kulit liang telinga terdapat banyak kelenjar serumen (modifikasi kelenjar keringat = kelenjar cerumenosa) dan rambut. Kelenjar keringat terdapat pada seluruh kulit liang telinga. Pada dua pertiga bagian dalam hanya sedikit dijumpai kelenjar serumen.

Liang telinga dan daun telinga merupakan pintu gerbang dan lintasan udara yang membawakan gelombang suara/bunyi.

2. Telinga Tengah

Telinga tengah berbentuk kubus dengan batas luar adalah membran timpani, batas depan dengan tuba eustachius, batas bawah vena jugularis (bulbus jugularis), batas belakang dengan aditus ad antrum, kanalis facialis pars vertikalis. Batas atas adalah segmen timpani (meningen/otak), kemudian berturut-turut dari atas ke bawah kanalis semisirkularis horisontal, kanalis fasialis, tingkap lonjong (oval window), tingkap bundar (round window) dan promontorium merupakan batas dalam dari telinga tengah.

Membran timpani berbentuk bundar dan cekung bila dilihat dari arah liang telinga dan terlihat oblik terhadap sumbu liang telinga. Bagian atas disebut pars flaksida (membran Shrapnell), sedangkan bagian bawah pars tensa (membran propria). Pars flaksida hanya berlapis dua yaitu bagian luar ialah lanjutan epitel kulit liang telinga dan

bagian dalam dilapisi oleh sel kubus bersilia, seperti epitel mukosa saluran napas. Pars tensa mempunyai satu lapis lagi ditengah yaitu lapisan yang terdiri dari serat kolagen dan sedikit serat elastin yang berjalan secara radier di bagian luar dan sirkuler pada bagian dalam.

Bayangan penonjolan bagian bawah maleus pada membran timpani disebut sebagai umbo. Dari umbo bermula suatu refleks cahaya (cone of light) ke arah bawah yaitu pada jam 7 untuk membran timpani kiri dan jam 5 untuk membran timpani kanan. Refleks cahaya (cone of light) ialah cahaya dari luar yang dipantulkan oleh membran timpani. Pada membran timpani terdapat 2 macam serabut, sirkuler dan radier. Serabut inilah yang menyebabkan timbulnya refleks cahaya yang berupa kerucut itu. Secara klinis refleks cahaya ini dinilai, misalnya bila letak refleks cahaya mendatar, berarti terdapat gangguan pada tuba eustachius.

Membran timpani dibagi dalam 4 kuadran, dengan menarik garis searah dengan processus longus maleus dan garis yang tegak lurus pada garis itu di umbo, sehingga didapatkan bagian atas-depan, atas-belakang, bawah-depan serta bawah-belakang untuk menyatakan letak perforasi membran timpani.

Bila melakukan miringotomi atau parasentesis, dibuat inisiasi di bagian bawah belakang membran timpani, sesuai dengan arah serabut membran timpani. Di daerah ini tidak terdapat tulang pendengaran. Di dalam telinga tengah terdapat tulang-tulang pendengaran yang tersusun dari luar ke dalam yaitu maleus, inkus dan stapes.


Tulang pendengaran di dalam telinga tengah saling berhubungan. Prosesus longus maleus melekat pada membran timpani, maleus melekat pada inkus dan inkus melekat pada stapes. Stapes terletak pada tingkap lonjong

yang berhubungan dengan koklea. Hubungan antara tulang-tulang pendengaran merupakan persendian.

Pada pars flaksida terdapat daerah yang disebut atik. Di tempat ini terdapat aditus ad antrum yaitu lubang yang menghubungkan daerah nasofaring dengan telinga tengah.

3. Telinga Dalam


Pengertian telinga dalam mencakup labirintus oseus dan membraneseus. Letaknya di pars petrosa os temporale diperlihatkan pada gambar di bawah.



Gambar 1.5. Telinga bagian dalam

Labirintus oseus terdiri atas 3 bagian yaitu vestibulum, kanalis semisirkularis dan koklea. Bagian-bagian tersebut adalah rongga-rongga di dalam bangunan yang dibentuk oleh tulang. Rongga-rongga itu seluruhnya dilapisi oleh periosteum dan berisi perilimfe. Didalam cairan itu terdapat labirintus membraneseus, yang dalam garis besarnya serupa dengan labirintus oseus, namun ukuran labirintus membraneseus sudah barang tentu jauh lebih kecil. Labirintus oseus itu suatu bangunan yang dibentuk dari tulang, terbukti pada kualitas tulangnya yang lebih keras dan padat, ketimbang tulang disekitarnya yang termasuk pars petrosa os temporale. Labirintus oseus pada

tengkorak dari neonatus mudah tercupas dari os temporalnya. Berikut gambar bagian-bagian telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam secara lebih terinci.



Gambar 1.6. Anatomi telinga

Bagian pusat dari labirinthus oseus dinamakan vestibulum. Terhadap kavum timpani ia berada pada sisi medialnya. Bagian anterior labirinthus oseus ialah koklea dan bagian posteriornya ialah kanalis semisirkularis. Pada dinding lateralnya terdapat jendela yang dinamakan fenestra vestibuli. Telapak stapes menutupi jendela tersebut yang secara rapat diperperkuat oleh ligametum anulare. Pada bagian anterior dari dinding medial vestibulum terdapat suatu tempat yang berlekuk (= *resesus sferikus vestibuli*) dan berlubang-lubang halus (= *makula kribrosa media*). Lekuk ini ditempati oleh sakulus dan merupakan bagian vestibulum terendah yang menjadi lantai meatus akustikus internus.

Makula kribrosa media itu merupakan tempat serabut-serabut saraf yang berasal dari sakulus menembus tulang untuk ikut menyusun nervus vestibulokoklearis.

Pada vestibulum terdapat dua lekuk lagi yakni resesus eliptikus vestibuli, yang besar dan resesus koklearis yang kecil sekali. Diantara resesus sferikus dan eliptikus terdapat galur yang dinamakan impresio kristae vestibuli, oleh karena dibaliknya, disisi rongga vestibular terdapat selereng penonjolan tulang yang dinamakan krista vestibuli. Resesus eliptikus diduduki utrikulus. Di lekuk itu dan bagian piramis dari vestibulum terdapat lubang-lubang halus, yang merupakan tempat penembusan serabut-serabut saraf yang berasal dari makula utrikuli dan ampula dari kanalis semisirkularis superior dan lateralis. Bagian tulang disekitar resesus eliptikus yang berlubang-lubang halus itu dikenal sebagai makula kribrosa superior. Resesus koklearis berporasi juga dan merupakan tempat penembusan serabut-serabut nervus vestibulokoklearis yang berasal dari duktus koklearis.

Di sebelah ventral resesus eliptikus vestibuli terdapat orifisium dari akuaduktus vestibuli yang mengandung duktus endolimfatikus. Bangunan ini menghubungkan sakus endolimfatikus dengan sakulus dan duktus utrikulosakularis. Di sisi posterior dari vestibulum terdapat 5 lubang yang dinamakan orifisium kanalis semisirkularis. Pada dinding anterior, vestibulum memperlihatkan lubang besar yang merupakan pintu masuk ke dalam skala vestibuli.

Kanalis semisirkularis

Jumlah kanalis semisirkularis ialah tiga yaitu semisirkularis superior (anterior), posterior dan lateralis. Setiap terowongan itu mencakup dua pertiga bunderan; ukuran panjangnya berbeda-beda, namun diameternya

praktis sama yaitu 0,8 mm. Ketiga terowongan itu terletak posterosuperior terhadap vestibulum.

Setiap kanalis semisirkularis menunjukkan pembengkakan pada salah satu ujungnya. Itulah bagian terowongan yang dinamakan ampula. Ujung terowongan yang mempunyai ampula dinamakan krus ampularis dan ujung tanpa ampula dikenal sebagai krus simpleks. Ketika kanalis semisirkularis bermuara di vestibulum dan lubang pada vestibulum untuk masuk ke kanalis semisirkularis itu dinamakan orifisium kanalis semisirkularis. Bila setiap ujung dari kanalis semisirkularis bermuara, maka jumlah lubang muara harus berjumlah enam.

Pada kenyataannya orifisium kanalis semisirkularis berjumlah lima oleh karena krus simpleks kanalis semisirkularis lateralis dan superior tergabung menjadi satu dan dikenal sebagai krus komune.

Kanalis semisirkularis superior (anterior) berorientasi vertikal dan berada di bidang yang tegak lurus terhadap poros pars petrosa os temporale. Krus simpleksnya bergabung dengan krus simpleks kanalis semisirkularis posterior dan bermuara di bagian medial vestibulum.

Kanalis semisirkularis posterior berorientasi vertikal juga, namun letaknya dalam bidang sejajar dengan poros pars petrosa os temporale. Ukuran panjangnya paling besar di antara ketiga kanalis semisirkularis itu, yakni 18 sampai 22 mm. Krus ampularisnya bermuara di bagian ventral dari vestibulum. Di situ tampak beberapa lubang dari makula kribrosa inferior, tempat penembusan serabut saraf dari ampula untuk bergabung dengan nervus vestibulokoklearis.

Kanalis semisirkularis lateralis atau horisontalis berada dalam bidang horisontal yang berorientasi tegak lurus terhadap kedua kanalis semisirkularis lainnya. Krus ampularisnya berada pada ujung anterior dan bermuara di

bagian dorsolateral vestibulum, tepat dorsal terhadap penestra vestibuli. Krus simpleksnya bermuara dibagian vestibulum tepat disisi ventral dari orifisium krus komune.

Kanalis semisirkularis horisontalis kanan dan kiri terletak di bidang horisontal yang sama. Kanalis semisirkularis anterior (superior) salah satu sisi dan kanalis semisirkularis posterior sisi lain masing-masing terletak dibidang yang berorientasi paralel satu terhadap yang lain.

Koklea

Bangunan yang dikenal sebagai koklea itu tampaknya seperti rumah kosong biasa. Ia merupakan bagian anterior dari labirintus. Ukuran dari basis sampai apeksnya ialah 5 mm dan lebarnya pada basis adalah 9 mm. Puncaknya atau apeks disebut juga kupula mengarah kebagian laterodorsal dari dinding medial kavum timpani. Basisnya menghadap pada lantai meatus akustikus internus yang memperlihatkan lubang-lubang halus, tempat penembusan sebut-serabut nervus koklearis.

Koklea terdiri atas tiang pusat atau sumbu yang berbentuk seperti kerucut dan dinamakan modiolus. Lalu bagian-bagian lainnya ialah kanalis spiralis koklea dan lamina spiralis osea. Yang tersebut terakhir adalah selembur tulang tipis yang menonjol dari modiolus ke kanalis spiralis koklea, sehingga membagi kanalis tersebut dalam dua bagian. Pembagian itu tidak dilakukan oleh lamina spiralis osea sendiri, oleh karena ia tidak sampai ke dinding kanalis spiralis koklea.

Suatu membran melengkapkan pembagian rongga terowongan menjadi dua bagian. Membran itu dikenal sebagai membran basilaris. Kedua rongga didalam kanalis spiralis koklea berkomunikasi satu dengan lain melalui satu lubang kecil di kupula. Lubang kecil itu dikenal sebagai helikotrema (lihat gambar 1.7). Kedua bagian dari kanalis

spiralis koklea dinamakan skala vestibuli dan skala timpani. Yang tersebut pertama adalah bagian atas dan yang tersebut terakhir adalah bagian bawahnya.

Labirintus Membraneseus

Labirintus membraneseus merupakan suatu kista yang terkandung dalam labirintus osesus. Isinya adalah cairan yang dinamakan endolimfa, sedangkan diluar labirintus membraneseus terdapat cairan perilimfa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa labirintus membraneseus bersandar pada dan dilindungi oleh bantalan perilimfe. Walaupun demikian, diberbagai tempat labirintus membraneseus terikat pada periosteum yang melapisi labirintus osseus.

Organ yang seperti kista itu terdiri dari bagian-bagian spesifik yang memiliki bentuk dan arsitektur histologik sendiri. Adapun bagian-bagian itu ialah (a) utrikulus dan sakulus, dua bangunan seperti kantong yang menempati vestibulum; (b) tiga duktus semisirkularis yang menempati kanalis semisirkularis dan (c) duktus kokleris yang terkandung di dalam kanalis spiralis koklea.

Utrikulus

Dari kedua kantong yang terkandung didalam vestibulum, utrikulus adalah yang paling besar. Ia menempati bagian posterosuperior dari vestibulum. Bentuknya lonjong, tapi tidak rata. Bagian yang menempati resesus eliptikus vestibuli memperlihatkan pengembangan. Dinding lateral dari pengembangan pada utrikulus itu lebih tebal dari bagian lainnya. Kawasan yang tebal dari bagian lainnya. Kawasan yang agak tebal itu adalah makula utrikuli yang mendapat serabut-serabut saraf dari sel-sel yang membentuk ganglion vestibulare. Ampula dari duktus

semisirkularis anterior dan lateralis bermuara dibagian lateral dari utrikulus.

Ampula dari duktus semisirkularis posterior, krus kommune dan krus simpleks dari duktus semisirkularis lateral bermuara dibagian medial utrikulus. Dari bagian anteromedial utrikulus terdapat suatu terusan yang bersambung dengan duktus endolimfatikus. Terusan yang pendek itu dikenal sebagai duktus utrikulosakularis.

Sakulus

Sakulus adalah kantong yang menduduki resesus sferikus vestibuli. Di dekatnya terdapat orifisium skala vestibuli. Di dinding anteriornya terdapat tempat yang berbentuk lonjong dan lebih tebal dari sekitarnya. Itulah makula sakuli, tempat yang disarafi oleh serabut-serabut ganglion vestibulare.

Orientasi makula sakuli terhadap makula utrikuli adalah tegak lurus satu dengan yang lain. Sakulus berkomunikasi dengan utrikulus melalui terusan yang berbentuk Y, yakni bagian duktus endolimfatikus dengan cabang yang menghubungkan utrikulus dan dinamakan duktus utrikulosakularis. Hubungan komunikatif antara sakulus dan duktus koklearis dibentuk oleh duktus reuniens.

Duktus Semisirkularis

Duktus semisirkularis berdiameter seperempatnya diameter kanalis semisirkularis, namun bentuknya tidak berbeda. Setiap duktus memiliki ampula, yang terkandung dalam ampula dari kanalis semisirkularis. Ketiga duktus semisirkularis bermuara di utrikulus pada 5 orifisium yang sudah terurai pada pembahasan utrikulus.

Pada setiap ampula dari duktus semisirkularis terdapat penebalan jaringan yang menonjol kedalam rongga

duktus. Disitu terdapat krista ampularis yang akan dibahas dibawah ini.

Struktur Utrikulus, Sakulus dan Duktus Semisirkularis

Walaupun bentuk utrikulus, sakulus dan duktus semisirkularis berbeda, namun strukturnya memperlihatkan struktur organisasi yang sama. Ketiga bagian dari labintus membranasea terdiri dari 3 lapisan. Lapisan luar disusun oleh jaringan berserabut yang mengandung beberapa pembuluh darah. Serabut-serabut superfisialnya ditutupi oleh sel-sel perilymfatik yang gepeng. Pada beberapa tempat lapisan luar ini melekat pada endostium dari labirintus osseus.

Lapisan tengah labirintus membranaseus merupakan jaringan pengikat vaskular yang rumit struktur organisasinya. Pada permukaan dalamnya, terutama di duktus semisirkularis terdapat penebalan yang berbentuk papil-papil. Lapisan dalamnya pada umumnya dibentuk oleh selapis sel epitelium yang dapat berbentuk gepeng atau kubik sampai silindrik.

Sederet sel itu bersandar pada membrana basalis. Pada krista ampularis dari duktus semisirkularis dan pada makula dari utrikulus dan sakulus lapisan dalam memperlihatkan penataan yang istimewa. Lapisan tengah juga menebal dan diapit oleh tanggul yang berangsur mendatar dan dikenal sebagai planum semilunatum. Krista ampularis dan makula merupakan bagian labirintus membranaseus yang spesifik.

Pada krista ampularis epiteliumnya terdiri dari sel siliar dan sel penyanggah. Sel siliar adalah sel sensorik, yang memperlihatkan 2 jenis. Yang satu terdiri atas sel-sel yang berbentuk seperti buah per. Kecuali bagian atas yang bebas itu, seluruh sel terpendam dalam ujung serabut saraf yang

berbentuk kaliks. Tipe I sel siliar itu dapat dianggap sebagai alat reseptor keseimbangan yang bersifat diskriminatif. Kaliks itu merupakan ujung serabut saraf vestibular yang besar diameternya, yang berarti bahwa daya untuk menghantarkan impulsnya cepat.

Jenis kedua sel siliar tidak memperlihatkan bintik-bintik *bouton terminaux* pada bagian sel, yang kebanyakan berbentuk silindrik. Tipe II ini adalah alat reseptor keseimbangan yang disarafi oleh serabut saraf yang berdiameter kecil. Bagian apikal kedua jenis sel itu adalah sama. Setiap sel memiliki 40-100 silia, yang tepatnya disebut sterosilia. Mereka tidak bergerak, namun sebagian dari stereosilia dapat bergerak. Inilah sterosilium yang diubah dan dinamakan kinosilium. Di ampula dari duktus semisirkularis lateralis, kinosilium mengarah ke rongga utrikular.

Ampula dari duktus semisirkularis lateralais, kinosilium mengarah ke rongga utrikulus. Sebaliknya di ampula dari duktus semisirkularis anterior dan posterior kinosilium berorientasi seolah terbawa oleh arus yang berasal dari rongga utrikular. Arah kinosilium di sakulus dan utrikulus menunjukkan polarisasi juga. Garis pemisah deretan kinosilium yang arah orientasinya berlawanan ditemukan pada makula sakulus dan utrikulus masing-masing. Sel penyanggah berbentuk panjang dan berdiri diatas lamina basalis. Intinya terletak di bagian basal, sedangkan bagian apikalnya dilengkapi dengan mikrovilli. Juluran-juluran sel siliar dan sel penyanggah tergabung dalam suatu zat protein polisakarida yang dikenal sebagai kupula.

Sel-sel epitelium yang menyusun planum semilunatum merupakan penghasil sel endolimfa. Di sakulus dan utrikulus tidak terdapat kupula, melainkan

semacam membran yang melindungi sel siliar dan sel penyanggah. Itulah yang dikenal sebagai membrana otolitik atau membrana statikoniorum, oleh karena mengandung banyak biji-biji kristal yang disebut otolit atau otokonia ataupun statokonia.

Krista ampularis dan makula utrikuli dan sakuli merupakan alat keseimbangan yang mempengaruhi gerakan reflektoris bola mata pada perubahan posisi kepala/leher. Pada keadaan itu kegiatan otot pun dipengaruhi. Makula utrikuli dan sakuli dapat dianggap sebagai alat untuk keseimbangan statik, sedangkan krista ampularis dapat dinamakan alat untuk keseimbangan kinetik. Sejalan dengan itu krista ampularis mengalami perangsangan akibat gerakan atau perubahan tekanan di endolimfa yang disebabkan oleh akselerasi angular kepala, sehingga kupula mengalami deviasi. Di pihak lain, makula utrikuli dan sakuli dapat terlibat dalam akselerasi linear dari kepala. Istilah-istilah statik dan kinetik yang digunakan diatas sudah barang tentu digunakan untuk menyederhanakan keadaan sebenarnya. Status keseimbangan yang telah dipelajari dengan metode elektrofisiologik ternyata ditentukan oleh posisi steriosilia dan kinosilia pada duktus semisirkularis kanan dan kiri.

Penempatan posisi kinosilia dan steriosilia di ampula adalah sedemikian rupa sehingga menghasilkan kompresi di ampula kanan dan dekompresi di ampula lateralis kiri.

Duktus dan Sakus Endolimfatikus

Sepanjang duktus endolimfatikus, strukturnya seperti bagian non spesifik dari labirintus membranaseus. Duktus endolimfatikus berlanjut ke kantong yang buntu, yang disebut sakus endolimfatikus. Endolimfa menyerupai cairan intraselular, sedangkan perilimfa dalam

komposisinya hampir sama dengan cairan serebrospinalis. Jaringan yang memproduksi endolimfa adalah sel-sel silindrik di planum semilunatum, lalu sel sel piknotik dari utrikulus dan duktus semisirkularis berikut sel-sel epitelium khusus di duktus koklearis serta jaringan vaskularnya. Dari tempat pembuatannya endolimfa bersirkulasi dan akhirnya disampaikan ke duktus endolimfatikus untuk disingkirkan melalui epitelium sakus endolimfatikus yang secara khusus ditugaskan untuk itu. Sel-sel epitelium itu dilengkapi dengan plexus vaskular. Mungkin juga ada tempat pembuangan endolimfa di bagian lain dari labirintus membranaseus, namun kini masih belum disebut-sebut.

Duktus Koklearis

Duktus koklearis terdiri dari terusan yang melilit di dalam kanalis koklearis dan terletak sepanjang dinding luarnya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, lamina spiralis osea berpangkal pada modiulus dan menonjol ke arah dinding luar koklea, namun tidak sampai bersambung. Yang menyambung tepi bebas lamina spiralis osea dengan dinding luar koklea ialah membrana basilaris. Dengan demikian ia membentuk juga atap dari skala timpani. Endostium dari dinding luar koklea menebal sehingga menyusun ligamentum spirale koklea itu. Dari modiulus, di dekat limbus laminae spiralis, terbentang pula sehelai membran pada bagian tepi dari ligamentum spirale koklea. Membran itu dinamakan membrana vestibularis. Dengan adanya membrana basilaris dan vestibularis maka kanalis spiralis koklea dibagi dalam skala timpani, skala vestibuli dan bagian yang diapit kedua terusan itu ialah duktus koklearis.

Puncaknya buntu dan dinamakan lagaena yang melekat pada kupula. Ujung basalnya melengkung ke

medial sambil menyempit dan meneruskan dirinya ke duktus reuniens yang menghubungkan duktus koklearis dengan sakulus.


Membrana vestibularis atau membrana dari Reissner terdiri atas 2 lapis epitelium gepeng yang terpisah oleh sekelumit jaringan pengikat. Dinding luar duktus koklearis berfungsi sebagai stria vaskularis untuk produktus endolimfa. Disitu epiteliumnya kuboid yang mengandung banyak mitokondria.

Organ dari Corti

Organ dari Corti atau organ spiral terdiri atas sel-sel khusus yang bertugas sebagai penyanggah dan sel-sel sensorik untuk mengalihkan rangsang mekanik ke peristiwa ionik dan elektrik, yang mewujudkan impuls saraf.

Sel sel penyanggah yang mengandung berkas-berkas tonofibril dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu sel tiang dan sel jari. Sel tiang berbaris di sebelah dalam dan luar terowongan dari Corti. Diberisan luar terdapat kira-kira 5000 sel tiang, sedangkan jumlah sel tersebut di barisan dalam adalah lebih besar. Setiap sel itu terdiri atas seberkas tonofibril yang padat, yang berdiri di atas membrana basilaris dan meluas sampai di permukaan organ dari Corti.

Sel jari memberikan penyangga kepada sel sensorik. Disebelah dalam dari barisan sel tiang dalam terdapat hanya sederet sel jari, sedangkan di sebelah luar dari barisan sel tiang luar, terdapat 3 sampai 5 deret sel jari. Jumlah deretan sel dari luar itu meningkat dari basis ke apeks. Bentuknya seperti botol dan berdiri di atas membrana basalis.



Gambar. 1.7. Organ Corti

Tonofibrilnya halus dan meluas sampai permukaan organ dari corti. Beberapa tonofibril sel jari menopang basis sel sensorik, sedangkan yang lain melewati sel sensorik dari sampingnya. Di permukaan organ dari corti tonofibril dari sel tiang dan jari membentuk retikulum yang merupakan sehelai jaringan yang berlubang-lubang halus, yang memberikan tempat bagi ujung ujung sel sensorik. Organ dari corti dilengkapi oleh sederet sel pinggir pada sisi dalamnya dan lapisan sel dari Hensen pada sisi luarnya.


Lintasan Vestibular

Untuk memelihara keseimbangan, susunan saraf memperoleh informasi keseimbangan dari 3 sumber yaitu, mata, ujung-ujung serabut sensorik proprioseptif dan bagian vestibular dari telinga dalam. Peran alat vestibular sangat erat berkaitan dengan peran penglihatan dalam mengurus keseimbangan tubuh. Seorang dengan kerusakan pada alat vestibulernya masih dapat memelihara keseimbangan tubuh

dengan bantuan penglihatannya. Tetapi jika bantuan visual itu hilang, seperti pada keadaan gelap, keseimbangan tubuh tidak dapat terpelihara lagi. Dipihak lain impuls-impuls vestibuler yang dibangkitkan oleh gerakan dari kepala ikut menentukan gerakan bola mata yang sesuai agar dapat menatapkan pandangannya pada objek di medan penglihatan. Untuk fungsi itu diperlukan pembagian impuls-impuls vestibuler ke motor neuron di trunkus serebri dan medulla spinalis berikut dengan proyeksi pada serebellum dan korteks serebri.

Utrikulus dan sakulus merupakan alat keseimbangan statik memonitor secara sinambung posisi kepala terhadap gravitasi, sedangkan kanalis semisirkularis, yang merupakan alat keseimbangan kinetik memonitor segenap gerakan kepala. Alat penangkap rangsang keseimbangan itu adalah bagian spesifik pada utrikulus, sakulus dan kanalis semisirkularis yang dikenal sebagai makula utrikuli/sakuli dan krista ampularis dari kanalis semisirkularis. Kesatuan dari reseptor tersebut adalah sel siliar yang menyusun bagian spesifik itu. Eksitasi dari sel siliar terjadi apabila arus endolimfe mengarah dari ampula ke orifisium utrikuli ke ampula.

Potensial aksi yang dibangkitkan di sel siliar disampaikan ke serabut-serabut dendritik dari ganglion vestibular, yang mengadakan hubungan sinaptik dengan bagian basal sel-sel siliar.



Gambar 251*
Potongan sagital melalui modiolus dari koklea. Kanalis koklearis meliisi 2/3 kati.

Gambar 1.8. Lintasan Vestibuler

Inti-Inti Vestibular

Akson dari sel-sel yang menyusun ganglion vestibular menyusun komponen vestibulokoklearis. Setelah memasuki batang otak dikawasan peralihan dari medulla oblongata ke pons, serabut-serabut dari ganglion vestibular sebagian besar berakhir dikompleks inti vestibular dan sisanya melintasi korpus restiforme untuk berakhir di sakulus. Inti-inti vestibular terletak di kawasan lateral di tegmentum yang merupakan lantai ventrikel IV (gambar 1.9). Berdasarkan sitoarsitekturnya kompleks inti vestibular dapat dibagi dalam 4 kelompok. Nukleus vestibularis lateralis atau inti dari deiters terdiri atas neuron-neuron multipolar yang besar; pohon dendritnya luas, aksonnya panjang dan substansi Nisslnya kasar dan jelas, sehingga menyerupai motoneuron. Nukleus vestibularis superior,

serabutnya tampak disebelah dorsal dari nukleus olivarius asesoris dorsalis. Dalam perjalanannya menuju medulla spinalis ia mendekati garis tengah di sisi ventral fasciculus longitudinalis medialis. Bersama dengan berkas itu ia menyusun fasciculus ventralis medulla oblongata. Terminalnya dapat dijumpai pada motoneuron gamma dan alfa terutama di tingkat intumesensia servikalis dan lumbalis. Lintasan ini menghantarkan impuls yang menentukan tonus otot-otot yang memelihara keseimbangan tubuh.

Fasikulus longitudinalis medialis sebagian besar dibentuk oleh serabut-serabut vestibular. Bagian rostralnya dibentuk oleh akson-akson inti vestibular yang menghubungkan inti-inti saraf otak okular. Sebagian besar dari serabut asendens itu berasal dari nukleus vestibularis medialis dan superior. Bagian fasikulus longitudinalis medialis yang bersifat descendens ialah dari nukleus n.abdusens ke kaudal. Mayoritasnya terdiri atas serabut-serabut retikulospinalis, hanya sebagian kecil adalah serabut-serabut vestibulospinalis tak menyilang. Sejumlah besar serabut vestibulospinal berkelompok terpisah diluar kawasan fasikulus longitudinalis medialis. Mereka itulah yang menyusun traktus vestibulospinalis yang telah disebut di atas.

Hubungan vestibuloserebellar ada dua macam. Serabut vestibular primer sebagian besar berakhir di kompleks inti vestibular. Hanya beberapa dari mereka langsung menuju dan berakhir di arkiserebellum. Segenap hubungan vestibuloserebellar lainnya adalah hubungan antara inti-inti vestibular dan arkiserebellum. Lobus flokulonodularis, uvula dan nukleus fastigii, yang merupakan komponen-komponen arkiserebellum menerima proyeksi dari nukleus vestibularis superior, medialis dan

inferior. Demikian juga inti-inti vestibular tersebut menerima proyeksi dari arkiserebellum. Peranan dari arkiserebellum dalam pemeliharaan keseimbangan dilakukan melalui lintasan-lintasan serebeloretikular dan retikulospinal di lain pihak.

Hubungan dengan korteks serebri

Walaupun susunan vestibular berfungsi terutama di trunkus serebri, serebellum dan medulla spinalis, namun demikian tidak boleh disangkal bahwa korteks serebri juga menerima proyeksi inti-inti vestibular. Potensial-potensial yang dibangkitkan di inti vestibular ternyata dapat direkam di korteks lobus parietalis, terutama di kort somatosensorik primer dekat kawasan kepala.

Stimulasi daerah ini dapat membangkitkan perasaan berputar-putarnya tubuh. Daerah vestibular kortikal tersebut mungkin menyumbangkan suatu data untuk mengatur motorik dan orientasi spasial. Lintasan ascendens dari inti-inti vestibular melintasi kawasan lemniscus medialis kontralateral dan kemudian berjalan membujur di dekat lemniscus medialis.

Inti talamik yang akan meneruskan proyeksi vestibular ke kawasan somatosensorik kortikal adalah nukleus ventralis posterior, didekat bagian inti tersebut yang menerima impuls sensorik dari daerah antara kepala dan bagian tubuh lainnya. Pernah dinyatakan bahwa area vestibular serebri terletak di girus temporalis superior di sebelah anterior dari area auditorik. Anggapan ini didasarkan atas hasil rangsangan terhadap daerah tersebut pada orang dalam keadaan sadar. Karena alat vestibuler secara anatomik berdekatan sekali dengan duktus koklearis berikut dengan organ korti, maka proyeksi kedua komponen nervus oktavus itu pada korteks serebri seyogyanya

berdekatan satu dengan yang lain juga. Namun demikian, tidak boleh dilupakan bahwa susunan vestibuler adalah proprioseptif dalam fungsinya, sehingga proyeksinya dikorteks lobus parietal sangat mungkin.

Lintasan Sentral koklea

Nervus koklearis menghantarkan impuls pendengaran (auditorik) yang dicetuskan di organ dari corti ke inti-inti koklear yang menghibahkannya ke lintasan sentral untuk di sampaikan ke area auditorik terdiri dari telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam, nervus koklearis dan lintasan sentralnya. Daun telinga dengan bentuknya yang khas itu sesuai dengan perannya selaku penadah gelombang suara/bunyi, sehingga mudah meneruskan perjalanannya di meatus akustikus eksternus yang menjadi buntu karena adanya membrana timpani. Dengan diterjangnya membrana timpani oleh arus gelombang suara-bunyi, maka timbul getaran atau vibrasi pada membran itu.

Di dalam kavum timpani getaran itu diteruskan melalui tulang tulang yang terbentang antara membrana timpani dan fenestra vestibuli. Adapun tulang-tulang itu adalah maleus, inkus dan stapes (gbr 1.10). Bentuk tulang-tulang itu sedemikian rupa sehingga tenaga vibrasi yang diteruskan kepada fenestra vestibuli adalah 15 kali ketimbang tenaga vibrasi yang menerjang membrana timpani. Pencegahan agar vibrasi berjalan mulus dan tidak berlebihan dilakukan oleh m. Tensor timpani.

Gelombang suara/bunyi dihibahkan melalui telapak stapes kepada perilimfe didalam vestibulum, yang berlanjut ke skala vestibuli (gbr 1.10). Skala vestibuli berkomunikasi dengan skala timpani melalui helikotrema. Melalui lubang komunikatif itulah perilimfe di dalam skala timpani

menerima gelombang suara/bunyi, yang kemudian akan menggetarkan membrana basilaris organ dari corti. Walaupun anggapan tersebut diatas tampaknya tepat, seyogyanya jangan dilupakan bahwa helikotrema terlampau kecil untuk memungkinkan penghibahan gelombang suara/bunyi tanpa mengakibatkan penyusutan energi dan frekuensi. Oleh karena itu, maka kini penghibahan gelombang suara/bunyi dari telinga tengah ke telinga dalam dianggap berjalan sebagai berikut. Telapak stapes meneruskan gelombang suara/bunyi kepada perilymfa vestibuler dan selanjutnya kepada perilymfa skala vestibular dan perilymfa skala timpani. Sebagai kelanjutan dari kejadian itu, maka endolimfa dari duktus koklearis menerima penghibahan gelombang suara/bunyi. Dan akibat itu berulah membrana basilaris organ dari Corti bergetar.

Ganglion koklear atau ganglion spirale terdiri atas sel-sel bipolar yang berlokasi di bagian tepi dari modiulus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sel-sel bipolar itu berkelompok dalam konfigurasi spiral. Oleh karena itu dinamakan juga ganglion spirale. Dalam pada itu ganglion sama dengan modiulus dan juga duktus koklearis melilit $2\frac{1}{2}$ kali. Dendrit ganglion itu mencapai organ dari Corti melalui lubang di lamina spiralis osea. (gbr 1.10)


Akson-akson ganglion spirale melintasi terowongan-terowongan di dalam modiulus dan tiba di basis koklea untuk memasuki meatus akustikus internus dan bergabung dengan akson-akson ganglion vestibular untuk bersama dengan mereka membentuk nervus vestibulokoklearis.

Nervus koklearis menuju ke bagian rostral medula oblongata di tepi luar korpus restiforme, dimana ia bercabang dua. Satu cabang berakhir di nukleus koklearis ventralis dan yang lainnya di nukleus koklearis dorsalis. Kedua inti koklear itu berbeda dalam organisasi selularnya

dan pola terminalis di nukleus koklearis dorsalis kurang memperlihatkan penataan tonotopik ketimbang d nukleus koklearis ventralis. Maka dari itu, sangat mungkin kedua inti tersebut berbeda pula dalam fungsi penghantaran sentral.

Lintasan sentral nervus koklearis membentuk kawasan masa alba yang dikenal sebagai korpus trapezoides dan lemniscus lateralis. Inti-inti yang berhubungan erat dengan lintasan auditorik sentral itu ialah nukleus korporis trapezoidea, inti-inti dari lemniscus lateralis, nukleus olivaris superior dan kolikulus inferior. Impuls auditorik yang dihantarkan oleh serabut-serabut lemniscus lateralis disampaikan kepada kolikulus inferior dengan atau tanpa bersinaps dulu di inti dari lemniscus lateralis. Akson-akson dari kolikulus inferior berakhir di korpus genikulatum medial ipsilateral, melalui brakium kolikuli inferior. Data auditorik yang diterima

Gambar 1.10.. Hubungan Vestibuler dengan sistem saraf oleh korpus genikulatum medial diproyeksikan kepada korteks auditorik. Lintasan terakhir itu dikenal sebagai



*M. E. Ross. The Human Nervous System Harper International Edition, 1979

radiasio akustika.

Dengan bantuan gambar diatas dapat diringkaskan sebagai berikut. Inti koklear ventralis menjulurkan serabut-serabut itu melintasi kawasan lemniscus medialis secara transversal dan dikenal sebagai korpus trapezoides. Setelah tiba dibagian lateral dari tegmentum pontis, mereka membelok ke rostral dan berjalan membujur. Mereka membentuk lemniscus lateralis. Inti-inti kompleks oliva superior dan inti-inti lemniscus lateralis berada di kawasan trapezoides.

Serabut-serabut dari nukleus koklearis dorsalis membentuk stria akustika dorsalis. Ia melewati basis dari korpus restiforme dan kemudian melengkung ke ventral, lalu melintasi formasio retikularis pontis untuk bergabung dengan lemniscus lateralis disisi kontralateral dan akhirnya berhenti dioliva superior. Lemniscus lateralis berjalan di samping lateral dari lemniscus medialis sepanjang pons dan mesencephalon sampai kolikulus inferior. Sebagian besar dari serabut-serabut lemniscus lateralis berakhir di kolikulus inferior. data auditorik yang disampaikan kepadanya kemudian dikirim ke korpus geniculatum mediale melalui brakium kolikuli inferior. Selanjutnya kedua kolikulus inferior dihubungkan satu dengan yang lain oleh serabut-serabut komisural.

Trayek terakhir dari lintasan auditorik sentral dikenal sebagai radiasio akustika, yang menghubungkan korpus geniculatum medial dengan giri temporales transversa dari Heschl. Dalam menempuh perjalanan itu serabut-serabut radiasio akustika menuju ke lateral sambil melintasi bagian sublentikular dari kapsula interna.

Area auditorik di korteks serebri itu sesuai dengan area 41 dan 42 dari broadman. Disitu terdapat penataan tonotopik juga ; serabut-serabut untuk penghataran suara/

bunyi dengan frekuensi rendah berakhir dibagian anterolateral, sedangkan serabut-serabut penghantar gelombang suara/bunyi berfrekuensi tinggi berakhir di bagian posteromedial.

Area 41 dan 42 dari broadmann itu merupakan area auditorik primer. Daerah asosiasinya terletak di kawasan Wernicke. Perkembangan bahasa selalu terjadi melalui pendengaran, sehingga tuli sejak dilahirkan menghasilkan hilangnya daya untuk berbahasa.


Fisiologi Pendengaran

Seseorang dapat mendengar melalui getaran yang dialirkan melalui udara atau tulang langsung ke koklea. Aliran suara melalui udara lebih baik dibandingkan dengan aliran suara melalui tulang.

Getaran suara ditangkap oleh daun telinga yang dialirkan ke liang telinga dan mengenai membran timpani, sehingga membran timpani bergetar. Getaran ini diteruskan ke tulang-tulang pendengaran yang berhubungan satu sama lain. Selanjutnya stapes menggerakkan tingkap lonjong yang juga menggerakkan perilimf dalam skala vestibuli. Selanjutnya getaran diteruskan melalui membrana reisner yang mendorong endolimf dan membran basal ke arah bawah. Perilimf dalam skala timpani akan bergerak sehingga tingkap bundar terdorong ke arah luar.

Skala media yang menjadi cembung mendesak endolimf dan mendorong membran basal, sehingga menjadi cembung ke bawah dan menggerakkan perilimf pada skala timpani. Pada waktu istirahat ujung sel rambut berkelok-kelok dan dengan berubahnya membran basal ujung sel rambut itu menjadi lurus. Rangsangan fisik tadi diubah oleh adanya perbedaan ion kalium dan ion natrium menjadi aliran listrik yang diteruskan ke cabang-cabang n.VIII, yang kemudian meneruskan rangsangan itu ke pusat sensorik

pendengaran di otak (area 39-40) melalui saraf pusat yang ada di lobus temporalis.



Copyright © Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

Gambar 1.11. Fisiologi Pendengaran

BAB II

PEMERIKSAAN FUNGSI SISTEM NEUROPERSEPSI

A. Pemeriksaan fisik sistem penglihatan dan pendengaran

1. Pemeriksaan Fisik Sistem Penglihatan

Pengamatan atau pemeriksaan terhadap pasien dilakukan sejak pasien mulai masuk ke dalam kamar pemeriksaan dokter. Pemeriksaan dapat dibedakan dalam:

- a. Pengamatan
- b. Pemeriksaan
- c. Gejala penyakit atau kelainan.

Pengamatan dilakukan saat pasien masuk dilihat apakah dibimbing keluarga, atau masuk dengan memegang satu sisi kepala atau mata berdarah. Pengamatan terhadap pasien ini dapat menolong dokter untuk mengarahkan diagnosis penyakit.

Pasien yang diantar dengan dibimbing masuk ke dalam kamar periksa dokter mungkin sekali akibat penglihatannya terganggu, lapang pandangan sempit atau sudah tua. Penglihatan terganggu merupakan suatu akibat kelainan bola mata sehingga fungsinya menjadi tidak normal.

Lapang pandang yang sempit dapat disebabkan oleh penyakit tertentu seperti glaukoma, retinitis pigmentosa dan penyakit kelainan saraf . berbagai penyakit dapat memberikan keadaan penderita merasa sakit pada kepala akan tetapi bila keadaan ini disertai dengan memegang kepala yang sakit, maka harus dipikirkan mungkin sedang menderita glaukoma kongestif akut.

Bila pada mata keluar darah maka mungkin sekali mata telah mengalami cedera sehingga terjadi luka. Pada

kongjektivitis hiperakut seperti pada kongjektivitis gonore dapat terjadi; perdarahan dari kongjunktiva disertai sekret. Pemeriksaan tajam penglihatan merupakan bagian terpenting pada pemeriksaan fungsi mata

Pemeriksaan Inspeksi

Pemeriksaan ini tidak memerlukan alat, pemeriksa melihat langsung ke mata penderita dalam ruangan yang cukup iluminasi.

Struktur mata yang dievaluasi meliputi :

1). Palpebra :

- a). Supersilia, silia kulit, fissura, plica, kantus kongjunktiva (palpebra harus dieversi dahulu).
- b). Bandingkan mata kanan dan kiri.

2). Segmen anterior bola mata

- a). Kongjunktiva bulbi : injeksi kongjunktiva, injeksi perikornea, hiperemis, kmeosis, hemoragik, laserasi benda asing.
- b). Sklera : warna, penipisan, penonjolan, intak
- c). Kornea : diameter, kurvatur, jernih, intak
- d). Bilik mata depan : isi, dalamnya
- e). Iris : warna
- f). Pupil : bentuk, letak, warna, pinggir, jumlah
- g). Lensa : kejernihan, posisi lensa.

Pada inspeksi dapat dievaluasi : posisi bola mata dan gerakan mata.

Pemeriksaan palpasi

Pemeriksaan palpasi dilakukan tanpa alat kecuali menggunakan jari-jari tangan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai apakah terdapat massa tumor, pembesaran kelenjar, nyeri tekan dan finger tension.

Massa tumor

Dengan jari-jari dapat dilakukan palpasi massa tumor untuk menilai konsistensi, nyeri tekan, adanya pulsasi.

Pembesaran kelenjar (kelenjar preaurikuler)

Pada kasus metastase, tumor ganas dapat diraba adanya adenopati kelenjar regional. Pada infeksi mata kausa virus dapat ditemukan adenopati kelenjar preaurikuler. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara meraba dengan menggunakan jari-jari pada daerah 1 cm di depan tragus.

TIO Palpasi

Pemeriksaan ini dilakukan dengan menempatkan jari-jari tangan (2 jari telunjuk) di palpebra superior 1 cm dari silia. Dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan dari tekanan intraokuler atau tidak. Hasilnya ditulis dan terdapat 5 kemungkinan berikut :

Tn = TIO normal

T- = TIO rendah

T-- = TIO sangat rendah

T+ = TIO tinggi

T++ = TIO sangat tinggi

2. Pemeriksaan fisik sistem pendengaran

Untuk dapat menegakkan diagnosis suatu kelainan atau penyakit dbidang telinga, diperlukan kemampuan dan keterampilan melakukan anamnesa dan pemeriksaan organ-organ tersebut. Kemampuan ini merupakan bagian dari pemeriksaan fisik yang merupakan syarat bila terdapat keluhan atau gejala yang berhubungan dengan kepala dan leher. Banyak penyakit sistemis yang bermanifestasi didaerah telinga demikian juga sebaliknya. Untuk

mendapatkan kemampuan dan keterampilan ini, perlu latihan yang berulang.

Pemeriksaan sebaiknya dilakukan dalam ruangan yang tenang, dimana tersedia satu meja tulis dan kursi pemeriksa, satu kursi pasien yang dapat berputar dan dinaik turunkan tingginya, sebuah meja kecil tempat meletakkan alat-alat pemeriksaan dan obat-obatan.

Anamnesis yang terarah diperlukan untuk menggali lebih dalam dan lebih luas keluhan utama pasien. Keluhan telinga dapat berupa 1) gangguan pendengaran / pekak (tuli), 2) suara berdenging/ berdengung (tinitus), 3) rasa pusing yang berputar (vertigo), 4) rasa nyeri didalam telinga (otalgia) dan 5) keluar cairan dari telinga (otore).

Keluhan-keluhan yang mengarah pada penyakit telinga relatif sedikit, dan terdiri dari perubahan pendengaran, tinitus, vertigo dan nyeri. Pemeriksaan penyaring mencakup inspeksi anatomi telinga, pemeriksaan otoskopik, pemeriksaan ketajaman pendengaran di sisi tempat tidur dan kalau perlu pemeriksaan weber dan rinne untuk menentukan gangguan-gangguan pendengaran.

Gangguan pendengaran mungkin lebih banyak menimbulkan keluhan pada keluarga atau teman pasien daripada diri pasien itu sendiri. Kalau melakukan anamnesis kearah gangguan pendengaran, sebaiknya diajukan pertanyaan kepada anggota keluarga pasien. Pasien sendiri mungkin menceritakan kecenderungannya untuk memakai salah satu telinga kalau sedang menelepon. Pertanyaan yang cermat dapat mengungkapkan batas-batas frekuensi bunyi yang tidak dapat didengar. Pasien mungkin mengakui bahwa ia mendengar suara pria lebih baik dari wanita lebih baik dari anak-anak. Jadi menunjukkan gangguan pendengaran pada frekuensi tinggi.

Bila ada keluhan gangguan pendengaran, perlu ditanyakan apakah keluhan tersebut pada satu atau kedua telinga, timbul tiba-tiba atau bertambah secara bertahap dan sudah berapa lama diderita. Apakah ada riwayat trauma kepala, telinga tertampar, trauma akustik atau pemakaian obat ototoksik sebelumnya. Apakah sebelumnya pernah menderita penyakit infeksi virus seperti parotitis, influenza berat dan meningitis. Apakah gangguan pendegaran ini diderita sejak bayi sehingga terdapat juga gangguan bicara dan komunikasi. Pada orang dewasa perlu ditanyakan apakah gangguan ini lebih terasa di tempat yang bisung atau ditempat yang lebih tenang.

Tinitus adalah suara, bunyi ceklekan, atau suara berdering yang didengar oleh pasien. Suara tersebut dapat timbul secara terus menerus atau terputus-putus, unilateral atau bilateral. Tinitus disebabkan oleh kelainan yang letaknya proksimal terhadap foramen ovale dan mempunyai banyak penyebab.

Bila ada keluhan nyeri di dalam telinga (otalgia) perlu ditanyakan apakah pada telinga kiri atau kanan dan sudah berapa lama. Nyeri alih ke telinga dapat berasal dari rasa nyeri di gigi molar, sendi mulut, tonsil atau tulang servical karena telinga dipersarafi oleh saraf sensoris yang berasal dari organ-organ tersebut.

Sekret yang keluar dari liang telinga disebut otore. Apakah sekret ini keluar dari satu atau kedua telinga, disertai rasa sakit atau tidak dan sudah berapa lama. Sekret yang sedikit biasanya berasal dari infeksi telinga luar dan sekret yang banyak dan bersifat mukoid umumnya berasal dari telinga tengah. Bila berbau busuk menandakan adanya kolesteatoma. Bila bercampur darah harus dicurigai adanya infeksi berat atau tumor. Bila cairan yang keluar seperti air jernih harus waspada adanya cairan likuor serebrospinalis.

Nyeri telinga menyebabkan pasien segera pergi ke dokter. Nyeri yang timbul pada waktu manipulasi tragus berarti peradangan kanalis eksterna. Nyeri yang dibelakang telinga menunjukkan peradangan mastoid. Nyeri yang terasa jauh di dalam telinga, yang diperberat dengan membungkuk, disebabkan oleh penyakit telinga tengah. Kalau tuba eustakhii tertutup oleh edema, telinga tengah sebenarnya menjadi visera berongga yang tersumbat. Distensi dengan udara atau pus yang bertekanan menimbulkan nyeri hebat. Pengeluaran sekret kronis dari telinga paling sering berasal dari kanalis eksterna. Pengeluaran cairan secara tiba-tiba yang diikuti dengan hilangnya nyeri biasanya kalau gendang telinga pecah dengan spontan. Nyeri karena penyakit pada tuba atau peradangan telinga tengah dapat dialihkan ke leher, tepat dibawa angulus mandibula.

Keluhan penyerta pada penyakit telinga sangat penting. Apakah gejala-gejala otitis media disertai gejala-gejala abses otak?, apakah vertigo disertai dengan gangguan pendengaran dengan perkataan lain apakah kedua fungsi N.III terganggu? Apakah pasien dengan gangguan pendengaran sedang meminum obat-obatan? Salisilat dosis tinggi dapat menyebabkan tinitus karena tercapainya batas toksik pada orang dewasa.

B. Pemeriksaan khusus Sistem Penglihatan dan Sistem Pendengaran

1. Pemeriksaan khusus sistem penglihatan

Pemeriksaan tajam penglihatan merupakan bagian penting pada pemeriksaan fungsi mata. Selanjutnya untuk membuat diagnosa penyakit mata digunakan alat-alat tertentu. Setiap alat bertujuan untuk menilai keadaan

mata. Berikut adalah pemeriksaan yang rutin dilakukan untuk menilai keadaan mata:

Pemeriksaan Visus

Visual acuity adalah kemampuan mata untuk melihat obyek secara detail. Berdasarkan jarak baca maka visus pada dasarnya dibagi atas tiga yaitu :

- a. Visus jauh, visus pada jarak minimal 20 feet (5 meter).
- b. Visus jarak intermediet sedang, visus pada jarak antara visus jauh dan visus dekat.
- c. Visus dekat, visus dengan jarak baca 1/3 meter.

Pemeriksaan visus jauh

Sinonim : visus sentral

Alat yang digunakan :

1. Reading / objek baca seperti Snellen card, E card (bentuk huruf E biasa digunakan pada orang yang buta huruf), dan Allen card (bentuk gambar benda mati, benda hidup yang mudah dikenali. Adanya variasi objek bacaan ini supaya mudah disesuaikan dengan kepintaran pasien.
2. Jarak baca minimal 5 meter yaitu jarak antara mata pasien dengan objek bacaan.
3. Iluminasi ruangan yang cukup.

Ciri-ciri reading card:

- a) Tulisan hitam dan latar belakang putih supaya kontras dan bisa buat orang yang defisiensi warna.
- b) Tulisan tersusun dalam garis horisontal, tulisan yang terbesar letaknya di atas dan yang paling kecil letaknya pada garis paling bawah.
- c) Tiap baris horisontal tulisan mempunyai standar baca (angka dalam satuan feet atau meter) yang

terletak disisi kiri atau kanan tulisan. Tiap baris mengandung tulisan yang bervariasi jumlahnya bisa 1,2,3,4,5,6, dst.

Teknik pemeriksaan :

- 1) Pasien duduk menghadap lurus ke objek bacaan pada jarak 20 feet (5 meter), tingginya mata setinggi objek bacaan.
- 2) Bila diperiksa mata kanan, tutup mata kiri dan sebaliknya.
- 3) Perintahkan pasien tiap baris horizontal tulisan, mulai baris paling atas kemudian baris di bawahnya sampai barisan tulisan terkecil yang diinginkan.
- 4) Baris bacaan terkecil yang bisa dibaca pasien dan tulis nilai baca yang sesuai baris tulisan tersebut.

Hasil pemeriksaan visus jauh dapat ditulis dalam dua cara yaitu dalam bentuk angka pecahan, dimana hasil baca sebagai penyebut dan jarak baca sebagai pembilang dan dalam bentuk angka desimal.

Pemeriksaan visus dekat

Pemeriksaan visus dekat menggunakan reading card atau objek bacaan yang bisa menggunakan American Standard Card (AS), jingger, Lebenssohn Card, Labensohn Pocket Vision Screener. Jarak baca $\frac{1}{3}$ meter (30 cm atau 35 cm) dengan iluminasi ruangan yang cukup.

Teknik pemeriksaan :

- a. Pasien duduk dengan koreksi refraksi visus jauh tetap terpasang bila ada (jangan dicabut pada frame).
- b. Pegang reading card dengan jarak $\frac{1}{3}$ meter di depan mata pasien.
- c. Perintahkan pasien membaca huruf mulai yang besar sampai huruf terkecil yang diinginkan.

d. Catat nilai huruf yang mampu dibaca pasien.

Pemeriksaan visus atau pemeriksaan refraksi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat gangguan refraksi seperti miop, hipermetrop, presbiop dan lain lain.

Loupe dengan sentolop

Loupe merupakan alat untuk melihat benda menjadi lebih besar dibanding ukuran normalnya. Loupe mempunyai kekuatan 4-6 dioptri. Untuk melihat benda dengan loupe yang berkekuatan 5,0 dioptri maka benda yang dilihat harus terletak 20 cm (100/5) atau pada titik api lensa loupe. Dengan jarak ini mata tanpa akomodasi akan melihat benda lebih besar. Bila benda yang dilihat disinari sentolop, maka benda yang dilihat akan lebih tegas. Hal ini dipergunakan sebagai pengganti slitlamp, karena cara kerjanya hampir sama. Pemeriksaan dengan loupe akan lebih sempurna bila dilakukan di dalam kamar yang digelapkan.

Tonometer

Tonometri adalah suatu tindakan untuk melakukan pemeriksaan tekanan intraokuler dengan alat yang disebut tonometer. Tindakan ini dapat dilakukan oleh dokter umum dan spesialis lainnya. Pengukuran tekanan bola mata sebaiknya dilakukan pada setiap orang berusia diatas 20 tahun pada saat pemeriksaan disik medik secara rutin maupun umum.

Tekanan intraokuler diketahui dengan 2 cara pengukuran :

Cara pengukuran langsung (direk) dan tidak langsung (indirek)

1. Cara pengukuran langsung

Teknik : masukkan alat kanula ke dalam BMD yang kemudian kanula ini dihubungkan ke suatu alat manometer (pengukuran ini prinsipnya seperti pengukuran langsung tekanan darah lewat a.jugularis).

2. Cara pengukuran tidak langsung

Yaitu cara pengukuran tekanan intraokuler secara tidak langsung dengan menilai kemampuan tekanan bola mata.

Cara ini dikerjakan dengan 2 macam metode :

- a. Tanpa alat tonometer
- b. Dengan alat tonometer.

Alat tonometer terdapat 2 tipe :

a. Tipe kontak

Alat ini digunakan akan menyentuh/kontak dengan kornea pasien. Contohnya tonometer Shiotz, tonometer Mackay-Marg, tonometer Aplanasi Goldman dan tonometer Drager

b. Tipe non kontak

Alat ini dipakai tidak menyentuh kornea, memberikan pendataran kornea melalui perantara

Oftalmoskop

Merupakan alat untuk melihat bagian dalam mata atau fundus okuli. Pemeriksaan dengan oftalmoskop dinamakan oftalmoskopi. Oftalmoskopi dibedakan dalam oftalmoskopi langsung dan tidak langsung. Pemeriksaan dengan kedua jenis oftalmoskop ini adalah bertujuan menyinari bagian fundus okuli kemudian bagian yang terang di dalam fundus okuli dilihat dengan satu mata melalui celah alat pada oftalmoskopi langsung dengan kedua mata dengan oftalmoskopi tidak langsung. Perbedaan antara oftalmoskopi langsung adalah pada oftalmoskopi langsung daerah yang dilihat, paling perifer sampai daerah ekuator, tidak stereoskopis, tegak atau tidak terbalik dan pembesaran 15 kali.

Dengan oftalmoskopi tidak langsung akan terlihat daerah ora serata, karena dilihat dengan 2 mata maka terdapat efek seteroskopik dan dengan pembesaran 2-4 kali. pemeriksaan dengan oftalmoskopi dilakukan di kamar gelap.

Oftalmoskopi langsung

Oftalmoskopi langsung memberikan gambaran normal atau tidak terbalik pada fundus okuli. Pemeriksaan dilakukan di kamar gelap dengan pasien duduk dan dokter berdiri di sebelah mata yang diperiksa. Mata kanan diperiksa dengan mata kanan demikian pula sebaliknya.

Oftalmoskopi tak langsung

Oftalmoskopi tidak langsung memberikan bayangan terbalik dan kecil, serta lapangan penglihatan yang luas didalam fundus okuli pasien. Jarak periksa adalah 50 cm atau sejarak panjang lengan. Selain dipergunakan oftalmoskop tidak langsung juga dipergunakan lensa 15-20 dioptri yang diletakkan 10 cm dari mata sehingga letak fundus berada di titik api lensa. Sama dengan oftalmoskop langsung pasien dapat tanda diminta untuk melihat ke berbagai jurusan untuk dapat diperiksa bagian-bagian retina.

Kampimeter dan Perimeter

Keduanya merupakan alat pengukur atau pemetaan lapang pandang terutama daerah sentral atau parasentral. Lapang pandangan adalah bagian ruangan yang terlihat oleh satu mata dalam sikap diam memandangi lurus ke depan. Pemeriksaan lapang pandangan diperlukan untuk mengetahui adanya penyakit tertentu ataupun untuk menilai progresivitas penyakit. Pemeriksaan lapang pandangan dapat dilakukan dengan :

1. Pemeriksaan konfrontasi yaitu pemeriksaan dengan melakukan perbandingan lapang pandang pasien dengan pemeriksa sendiri.
2. Pemeriksaan perimeter
3. Pemeriksaan tangent screen

Lapang pandangan normal adalah 90 derajat temporal, 50 derajat atas, 50 derajat nasal dan 65 derajat ke bawah.

Fluoresein

Fluoresein adalah bahan yang berwarna jingga merah yang bila disinari gelombang biru akan memberikan gelombang hijau. Bahan larutan ini dipakai untuk melihat terdapatnya defek epitel kornea, fistel kornea atau disuntikkan intravena untuk dibuat foto pembuluh darah retina.

Uji Anel

Dominique anel adalah seorang ahli bedah Perancis yang melakukan pemeriksaan fungsi ekskresi lakrimal.

Eksoftalmometer Hertel

Eksoftalmometer adalah tindakan mengukur penonjolan bola mata dengan alat Hertel. Dengan alat Hertel terlihat tingginya eksoftalmus. Bila terdapat tanda penonjolan bola mata (eksoftalmus) atau masuknya bola mata (endoftalmus), maka dilakukan pemeriksaan Hertel. Dengan alat ini dapat diketahui derajat penonjolan bola mata. Penonjolan bola mata dapat ditemukan pada tumor retrobulbar dan tirotoksikosis.

Penderita disuruh melihat ke depan dan melihat mata pemeriksa. Diletakkan alat Hertel yang bersandar pada tepi orbita lateral kedua mata. Pemeriksa mengintip permukaan depan kornea melalui cermin berskala pada alat

Hertel. Tinggi penonjolan bola mata ditentukan oleh derajat skala dalam mm pada alat Hertel tersebut.

Nilai penonjolan mata normal 12-20 mm dan beda penonjolan lebih dari 2 mm antara kedua mata dinyatakan sebagai mata menonjol patologik atau eksoftalmus.

Penonjolan :

Kurang dari 20 mm : mata normal

21 – 23 mm : ringan

23 – 27 mm : sedang

Lebih 28 mm : berat

Uji Ishihara atau Buta Warna

Kartu ishihara atau kartu Pseudoisokromatik adalah kartu dengan titik-titik berwarna yang kecerahannya dan bayangannya membentuk angka, huruf atau lainnya. Kartu ini dipergunakan untuk menguji pisah warna mata penderita yang diuji atas kemungkinan adanya buta warna.

Dengan uji ini dapat diketahui adanya defek penglihatan warna, didasarkan pada menentukan angka atau pola yang ada pada kartu dengan berbagai ragam warna. Uji buta warna merupakan pemeriksaan untuk penglihatan warna dengan memakai satu seri titik bola kecil dengan warna dan besar berbeda, sehingga dalam keseluruhan terlihat warna pucat dan menyukarkan pasien dengan kelainan penglihatan warna. Penderita buta warna atau dengan kelainan penglihatan warna dapat melihat sebagian ataupun sama sekali tidak dapat melihat gambaran yang diperlihatkan.

Pada pemeriksaan pasien diminta melihat dan mengenali tanda gambar yang diperlihatkan dalam waktu 10 detik. Pada penyakit tertentu dapat terjadi gangguan penglihatan warna seperti buta merah dan hijau pada atrofi saraf optik, optik neuropati toksik dengan pengecualian

neuropati iskemia, glaukoma dengan atrofi optik yang memberikan gangguan penglihatan biru kuning.

Amsler Grid, uji kisi-kisi Amsler

Merupakan kartu pemeriksaan untuk mengetahui fungsi penglihatan sentral makula. Pemeriksaan didasarkan bila terdapat gangguan kuantitatif sel kerucut pada makula maka akan terjadi metamorfopsia.

Papan Placido

Papan Placido merupakan papan yang mempunyai gambaran garis hitam melingkar konsentris dengan lobang kecil pada bagian sentralnya. Bila pada kornea pasien yang membelakangi sumber sinar atau jendela, diproyeksikan sinar gambaran lingkaran plasido yang berasal dari papan lempeng Plasido, maka akan terlihat keadaan permukaan kornea.

Gonioskopi

Dengan lensa gonioskopi dapat dilihat keadaan sudut bilik mata yang dapat menimbulkan glaukoma. Penentuan gambaran sudut bilik mata dilakukan pada setiap kasus yang dicurigai adanya glaukoma. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meletakkan lensa sudut.

Pemeriksaan Khusus Sistem Pendengaran

Untuk memeriksa pendengaran diperlukan pemeriksaan hantaran melalui udara dan melalui tulang dengan memakai garpu tala atau audiometer nada murni. Kelainan hantaran melalui udara menyebabkan tuli konduktif, berarti ada kelainan di telinga luar atau telinga tengah, seperti atresia liang telinga, eksostosis liang telinga, serumen, sumbatan tuba eustachius serta radang telinga tengah.

Kelainan di telinga dalam menyebabkan tuli saraf atau retrokoklea. Secara fisiologik telinga dapat mendengar nada antara 20 sampai 18.000 Hz. Untuk pendengaran

sehari-hari yang paling efektif antara 500-2000 Hz. Oleh karena itu memeriksa pendengaran dipakai garpu tala 512, 1024, dan 2048 Hz. Penggunaan ketiga garpu tala ini penting untuk pemeriksaan secara kualitatif. Bila salah satu frekuensi ini terganggu penderita akan sadar adanya gangguan pendengaran. Bila tidak mungkin menggunakan ketiga garpu tala ini tidak terlalu dipengaruhi oleh suara bising disekitarnya.

Pemeriksaan pendengaran dilakukan secara kualitatif dengan mempergunakan garpu tala dan kuantitatif dengan menggunakan audimeter.

Tes Penala

Pemeriksaan ini merupakan tes kualitatif. Terdapat berbagai macam tes penala seperti tes rinne, tes weber, tes schwabach, tes bing dan tes Stenger.

Tes Rinne. ialah tes untuk membandingkan hantaran suara melalui udara dan hantaran melalui tulang pada telinga yang diperiksa. Cara pemeriksaan ; penala digetarkan, tangkainya diletakkan di prosesus mastoid, setelah tidak terdengar penala dipegang didepan telinga kira-kira 2 ½ cm. Bila masih terdengar disebut rinne positif (+). Bila tidak terdengar disebut rinne negatif.

Test weber ialah tes pendengaran untuk membandingkan hantaran tulang telinga kiri dan telinga kanan. Cara pemeriksaan; penala digetarkan dan tangkai penala diletakkan di garis tengah kepala (di verteks, dahi, pangkal hidung, ditengah-tengah gigi seri atau di dagu). Apabila bunyi penala terdengar lebih keras pada salah satu telinga disebut weber lateralisasi ke telinga tersebut. Bila tidak dapat dibedakan ke arah telinga mana bunyi terdengar lebih keras disebut weber tidak ada lateraliasi.

Tes Schwabach. Membandingkan hantaran suara orang yang diperiksa dengan pemeriksa yang

pendengarannya normal. Cara pemeriksaan; penala digetarkan pada prosesus mastodeus sampai tidak terdengar bunyi. Kemudian pangkal penala segera dipindahkan pada prosesus mastoideus telinga pemeriksa yang pendengarannya normal. Bila pemeriksa masih dapat mendengar disebut schwabach memendek, bila pemeriksa tidak dapat mendengar, pemeriksaan diulang dengan cara sebaliknya yaitu penala diletakkan pada prosesus mastoideus pemeriksa lebih dulu. Bila pasien masih dapat mendengar bunyi disebut schwabach memanjang dan bila pasien dan pemeriksa kira-kira sama-sama mendengarnya disebut dengan Schwabach sama dengan pemeriksa.

Tes Bing (tes oklusi). Cara pemeriksaan : tragus telinga yang diperiksa ditekan sampai menutup liang telinga, sehingga suara yang dapat didengar oleh pasien hanya kira-kira 30 dB. Penala digetarkan dan diletakkan pada pertengahan kepala (seperti pada tes Weber). Penilaian ; bila terdapat lateralisasi ke telinga yang ditutup, berarti telinga tersebut normal atau tuli saraf. Bila bunyi pada telinga yang ditutup tidak bertambah keras, berarti telinga tersebut menderita tuli konduktif.

Tes Stenger. Digunakan pada pemeriksaan tuli organik (simulasi atau pura-pura tuli). Cara pemeriksaan dengan menggunakan prinsip masking. Misalnya seseorang yang berpura-pura tuli pada telinga kiri. Dua buah penala yang identik digetarkan dan masing-masing diletakkan di depan telinga kiri dan kanan, dengan cara tidak kelihatan oleh yang diperiksa. Penala pertama digetarkan dan diletakkan di depan telinga kanan (yang normal) sehingga jelas terdengar. Kemudian penala yang kedua digetarkan lebih keras dan diletakkan di depan telinga kiri (yang pura-pura tuli). Apabila kedua telinga normal karena efek masking, hanya telinga kiri yang mendengar bunyi; jadi

telinga kanan tidak akan mendengar bunyi. Tetapi bila telinga kiri tuli, telinga kanan tetap mendengar bunyi.

Test berbisik. Pemeriksaan ini bersifat semi kualitatif. Menentukan derajat ketulian secara kasar. Hal yang perlu diperhatikan ialah ruangan cukup tenang dengan panjang minimal 6 meter. Pada nilai normal tes berbisik ; 5/6 - 6/6.

7



Menggetarkan pena



Uji Rinne : hantaran tulang



Uji Rinne : hantaran udara



Uji Weber



Ruangan pemeriksaan THT



Pemeriksaan membran timpani



Menggunakan spekulum telinga



Menggunakan otoskop

C. Pemeriksaan penunjang sistem penglihatan dan pendengaran

Pemeriksaan Penunjang Sistem Penglihatan

1. Uji Ultrasonografi

Ultrasonografi dipakai untuk melihat struktur abnormal pada mata dengan kepadatan kekeruhan media dimana tidak memungkinkan melihat jaringan dalam mata secara langsung. Sinar ultrasonik direkam yang akan memberikan kesan keadaan jaringan yang memantulkan getaran yang berbeda-beda.

2. Sken B Ultrasonografi

USG merupakan tindakan melihat dan memotret suatu alat atau jaringan dalam mata dengan menggunakan gelombang tidak terdengar. Alat ini sangat penting untuk melihat susunan jaringan intraokuler. Bila USG normal dan terdapat defek aferen pupil maka operasi walaupun mudah, tetap akan memberikan ketajaman penglihatan yang kurang. Kelainan USG dapat disertai kelainan makula.

USG juga merupakan pemeriksaan khusus untuk katarak terutama monokular dimana akan terlihat kelainan badan kaca seperti perdarahan, peradangan, ablasi retina dan kelainan kongenital ataupun adanya tumor intraokular.

3. Elektroretinografi

Retina akan memperlihatkan gelombang listrik bila terpajan sinar. Rekaman gelombang listrik retina yang terjadi pada perubahan sinar dinamakan elektroretinografi.

ERG berguna untuk menilai kerusakan luas pada retina. Pada ERG dikenal gelombang-gelombang :

- a : respons negatif permulaan setelah periode laten rangsangan (lapis sel fotoreseptor)
- b : defleksi positif (sel bipolar)
- c : defleksi positif ringan
- d : potensi positif yang terjadi bila sinar dihilangkan.

4. Visual Evoked Response

Rangsangan pada mata akan menimbulkan rangsangan pada jalur penglihatan hingga korteks oksipital. Bila dibandingkan kedua mata maka akan dapat diketahui adanya perbedaan rangsangan yang sampai pada korteks sehingga dapat diketahui adanya rangsangan atau penglihatan pada seseorang.

5. Ct Scan dan alat radiologi lainnya juga dapat digunakan untuk mengetahui adanya massa pada sistem penglihatan.

Pemeriksaan penunjang sistem pendengaran

Untuk membedakan tuli koklea dan tuli retrokoklea diperlukan pemeriksaan audiologi khusus yang terdiri dari audiometri khusus, audiometri objektif, pemeriksaan tuli anorganik dan pemeriksaan audiometri anak.

Audimetri khusus

Untuk mempelajari audiometri khusus diperlukan pemahaman istilah rekrutmen dan kelelahan (decay/fatigue). Recruitment ialah suatu fenomena, terjadi peningkatan sensitifitas pendengaran yang berlebihan di atas ambang dengar. Keadaan ini khas pada tuli koklea. Pada kelainan koklea pasien dapat membedakan bunyi 1 dB, sedangkan orang normal baru dapat membedakan bunyi 5 dB. Misalnya pada seorang yang tuli 30 dB, ia dapat membedakan bunyi 31 dB. Pada orang tua bila mendengar suara perlahan, ia tidak dapat mendengar, sedangkan bila mendengar suara keras dirasakannya nyeri di telinga.

Kelelahan merupakan adaptasi abnormal, merupakan tanda khas pada tuli retrokoklea. Saraf pendengaran cepat lelah bila dirangsang terus menerus. Bila diberi istirahat, maka akan pulih kembali.

Fenomena tersebut dapat dilacak pada penderita tuli saraf dengan melakukan pemeriksaan khusus, yaitu :

Tes SISI (Short increment sensitivity indeks)

Tes ABLB (alternate binaural loudness balans test)

Tes kelelahan (tone decay)

Audiometri tutur (speech audiometri)

Audiometri Bekesay

Tes SISI

Tes ini khas untuk mengetahui adanya kelainan koklea dengan memakai fenomena rekrutment yaitu keadaan koklea yang dapat mengadaptasi secara berlebihan peninggian intensitas yang kecil, sehingga pasien dapat membedakan selisih intensitas yang kecil itu (sampai 1 dB).

Cara pemeriksaan itu ialah dengan menentukan ambang dengar pasien terlebih dahulu, misalnya 30 dB. Kemudian diberikan rangsangan 20 dB diatas ambang rangsang, jadi 50 dB. Setelah itu diberikan tambahan rangsang 5 dB, lalu diturunkan 4 dB lalu 3 dB, 2 dB, terakhir 1 dB. Bila pasien dapat membedakannya berarti tes SISI positif.

Cara lain ialah tiap lima detik dinaikkan 1 dB sampai 20 kali, kemudian dihitung berapa kali pasien itu dapat membedakan perbedaan itu, bila 20 kali benar berarti 100 %, jadi khas . Bila yang benar sebanyak 10 kali berarti 50 % benar. Dikatakan rekrutment positif bila skor 70-100 %. Bila terdapat skor antara 0-70%, berarti tidak khas. Mungkin pendengaran normal atau tuli perseptif lain.

Tes ABLB (Alternate Binaural Loudness Balance)

Pada tes ABLB diberikan intensitas bunyi tertentu pada frekuensi yang sama pada kedua telinga, sampai ke dua telinga mencapai persepsi yang sama, yang disebut balans negatif. Bila balans tercapai, terdapat rekrutment positif.

Pada MLB (monoaural loudness balance test). Prinsipnya sama dengan ABLB. Pemeriksaan ini dilakukan bila terdapat tuli perseptif bilateral. Tes ini lebih sulit, karena

yang dibandingkan 2 frekuensi yang berbeda pada satu telinga, sedangkan pada frekuensi turun yang normal.

Tes Kelelahan

Terjadinya kelelahan saraf oleh karena perangsangan terus menerus. Jadi kalau telinga yang diperiksa dirangsang terus menerus maka terjadi kelelahan. Tandanya adalah pasien tidak dapat mendengar dengan telinga yang diperiksa.

Audiometri tutur

Pada tes ini dipakai kata-kata yang sudah disusun dalam silabus (suku kata). Kata-kata itu disusun dalam suatu daftar yang disebut PB.UST (phonetically balance word LBT). Pasien diminta mengulangi kata-kata yang didengar melalui kaset tape recorder. Pada tuli perseptif koklea, pasien sulit untuk membedakan bunyi S, R, N, C, H, CH, sedangkan pada tuli retrokoklea lebih sulit lagi. Apabila kata yang betul : speech discrimination score

90 - 100 % : berarti pendengaran normal

75 - 90 % : tuli ringan

60 - 75 % : tuli sedang

50 - 60 % : kesukaran mengikuti pembicaraan sehari-hari.

< 50 % ; tuli berat.

Guna pemeriksaan ini untuk menilai kemampuan pasien dalam pembicaraan sehari-hari, dan untuk menilai pemberian alat bantu dengar.

Audiometri Bekesy

Macam audiometri ini otomatis dapat menilai ambang pendengaran seseorang. Prinsip pemeriksaan ini ialah dengan nada terputus dan nada terus menerus. Bila ada suara masuk, maka pasien memencet tombol. Akan didapatkan grafik seperti gigi gergaji, garis yang menaik adalah periode suara yang dapat didengar, sedangkan garis

yang turun ialah suara yang tidak terdengar. Pada telinga normal, amplitudo 10 dB. Pada rekrutment amplitudo lebih kecil.

Audiometri objektif

Pada pemeriksaan ini pasien tidak harus bereaksi. Terdapat 3 cara pemeriksaan yaitu audiometri impedans, elektrokokleografi, evoke response audiometry.

Audimetri Impedans

Pada pemeriksaan ini diperiksa kelenturan membran timpani dengan tekanan tertentu pada meatus akustikus eksterna. Pada lesi dikoklea, ambang rangsang refleks stapedius menurun, sedangkan pada lesi retrokoklea ambang itu naik.

Elektrokokleografi

Pemeriksaan ini digunakan untuk merekan gelombang-gelombang yang khas dari evoke elektropotential coclea.

Caranya ialah dengan elektroda jarum, membran timpani ditusuk sampai promontorium, kemudian dilihat grafiknya. Pengembangan pemeriksaan ini yang lebih lanjut dengan elektroda permukaan, disebut BERA (brain evoked respons audiometry).

Evoke Respons Audiometry

Pada pemeriksaan ini dipakai elektroda permukaan kemudian direkam gelombang-gelombang yang datang dari batang otak. Terdapat 5 macam gelombang :

- Gelombang I : datang dari koklea
- Gelombang II : datang dari nukleus koklea
- Gelombang III : datang dari nukleus oliva superior
- Gelombang IV : datang dari lemniscus lateralis.
- Gelombang V : datang dari folikuluss inferior.

CT scan

CT scan dengan kontras merupakan uji diagnostik yang paling bermanfaat.

Angiografi dan Venografi

Pada beberapa kasus perlu dilakukan angiografi dan venografi jugular retrograde untuk menegakkan diagnosis dan menentukan suplai darah dan derajat tumor.

BAB III

PATOFISIOLOGI PENYAKIT YANG BERHUBUNGAN DENGAN SISTEM NEUROPERSEPSI

A. Penyakit infeksi

Penyakit infeksi pada sistem penglihatan

Konjungtivitis

Konjungtivitis merupakan radang konjungtiva atau radang selaput lendir yang menutupi belakang kelopak dan bola mata. Konjungtivitis dibedakan bentuk akut dan kronis. Konjungtivitis dapat disebabkan oleh bentuk akut dan kronis. Konjungtivitis dapat disebabkan oleh bakteri seperti konjungtivitis gonokok, klamidia, alergi, toksik dan moluscum contagiosum.

Gambaran klinis yang terlihat pada konjungtivitis dapat berupa hiperemi konjungtiva bulbi (infeksi konjungtiva), lakrimasi, eksudat dengan sekret yang lebih nyata di pagi hari, pseudoptosis akibat kelopak membengkak, kemosis, hipertropi papil, folikel, mebran, pseudomembran, granulasi, flikten, mata merasa seperti adanya benda asing dan adenopati preaurikuler.

Biasanya sebagai reaksi konjungtivitis akibat virus berupa terbentuknya folikel pada konjungtiva.

Konjungtivitis Bakteri

Suatu konjungtivitis yang disebabkan oleh bakteri dapat saja akibat infeksi gonokok, meningokok, staphylococ aureus, streptococcus pneumonie, hemophilus influenza dan escherichia coli.

Memberikan gejala sekret mukopurulen dan purulen, kemosis konjungtiva, edema kelopak, kadang-kadang disertai keratitis dan blefaritis. Terdapat papil pada

konjungtiva dan mata merah. Konjungtivitis bakteri ini mudah menular.

Konjungtivitis Bakteri Akut

Konjungtivitis bakteri akut disebabkan *Streptococcus*, *Corynebacterium diphterica*, *Pseudomonas*, *Neisseria* dan *hemophilus*. Gambaran klinis konjungtivitis mukopurulen dan konjungtivitis purulen. Perjalanan penyakit akut yang dapat berjalan kronis. Dengan tanda hiperemi konjungtiva, edema kelopak, papil dengan dan dengan kornea jernih.

Pengobatan kadang-kadang diberikan sebelum pemeriksaan mikrobiologik dengan antibiotik tunggal seperti neosporin, basitrasin, gentamisin, kloramfenikol, polimiksin, tobramisin, eritromisin dan sulfa. Bila pengobatan tidak memberikan hasil dengan antibiotik setelah 3-5 hari maka pengobatan dihentikan dan ditunggu hasil pemeriksaan mikrobiologik.

Bila terjadi penyulit pada kornea maka diberikan sikloplegik. Pada konjungtivitis bakteri sebaiknya dimintakan pemeriksaan sediaan langsung dan bila ditemukan kumannya, maka pengobatan disesuaikan.

Apabila tidak ditemukan kuman dalam sediaan langsung, maka diberikan antibiotik spektrum luas dalam bentuk tetes mata tiap jam atau salep mata 4 sampai 5 kali sehari. Apabila dipakai tetes mata, sebaiknya sebelum tidur diberi salep mata (sulfasetamid 10-15% atau khloramfenicol). Apabila tidak sembuh dalam 1 minggu bila mungkin dilakukan pemeriksaan resistensi, kemungkinan defisiensi air mata atau kemungkinan obstruksi duktus nasolakrimal.

Konjungtivitis Gonore

Konjungtivitis gonore merupakan radang konjungtiva akut dan hebat yang disertai dengan sekret

purulen. Gonokok merupakan kuman yang sangat patogen, virulen dan bersifat invasif sehingga reaksi radang terhadap kuman ini sangat berat.

Penyakit kelamin yang disebabkan oleh gonore merupakan penyakit yang tersebar luas di seluruh dunia secara endemik. Pada neonatus infeksi konjungtiva terjadi pada saat berada pada jalan kelahiran, sedang pada bayi penyakit ini ditularkan oleh ibu yang sedang menderita penyakit tersebut. Pada orang dewasa penyakit ini didapatkan dari penularan penyakit kelamin sendiri.

Di klinik kita akan melihat penyakit ini dalam bentuk oftalmia neonatorum (bayi berusia 1-3 hari), konjungtivitis gonore infantum (usia lebih 10 hari) dan konjungtivitis gonore adultorum. Terutama mengenai golongan muda dan bayi yang ditularkan ibunya. Merupakan penyebab utama oftalmia neonatorum.

Memberikan sekret purulen padat dengan masa inkubasi antar 12 jam hingga 5 hari, disertai perdarahan subkonjungtiva dan konjungtiva kemotik. Pada orang dewasa terdapat 3 stadium penyakit infiltratif, supuratif dan penyembuhan.

Pada stadium infiltratif ditemukan kelopak dan konjungtiva yang kaku disertai rasa sakit pada perabaan. Kelopak mata membengkak dan kaku sehingga sukar dibuka. Terdapat pseudomembran pada konjungtiva tarsal superior sedang konjungtiva bulbi merah, kemotik dan menebal. Pada orang dewasa selaput konjungtiva lebih bengkak dan lebih menonjol dengan gambaran hipertrofi papilar yang besar. Gambaran ini adalah gambaran spesiik gonore dewasa. Pada orang dewasa terdapat perasaan sakit pada mata yang dapat disertai dengan tanda-tanda infeksi umum. Pada umumnya menyerang satu mata terlebih

dahulu dan biasanya kelainan ini pada laki-laki di dahului pada mata kanannya.

Pada stadium supuratif terdapat sekret yang kental. Pada bayi biasanya mengenai kedua mata dengan sekret kuning kental. Kadang-kadang bila sangat dini sekret dapat serous yang kemudian menjadi kental dan purulen. Berbeda dengan oftalmia neonatorum, pada orang dewasa sekret tidak kental sekali.

Terdapat pseudomembran yang merupakan kondensasi fibrin pada permukaan konjungtiva. Pada orang dewasa penyakit ini berlangsung selama 6 minggu dan tidak jarang ditemukan pembesaran disertai rasa sakit kelenjar preaurikuler. Diagnosis pasti penyakit ini adalah pemeriksaan sekret dengan pewarnaan metilen biru dimana akan terlihat diplokok di dalam sel leukosit. Dengan pewarnaan Gram akan terdapat sel intraseluler atau ekstraseluler dengan sifat Gram negatif.

Pengobatan segera dimulai bila terlihat pada pewarnaan gram positif diplokok batang intraseluler dan sangat dicurigai konjungtivitis gonoroe. Pasien dirawat dan diberi pengobatan dengan penisilin salep dan suntikan, pada bayi diberikan 50.000 U/kgBB selama 7 hari.

Sekret dibersihkan dengan kapas yang dibasahi air bersih (direbus) atau dengan garam fisiologik setiap $\frac{1}{4}$ jam. Kemudian diberi salep Penisilin setiap $\frac{1}{4}$ jam. Penisilin tetes mata dapat diberikan dalam bentuk larutan Penisilin G 10.000 - 20.000 unit

Penyakit infeksi pada sistem pend/ml setiap 1 menit sampai 30 menit. Kemudian salep diberikan setiap 5 menit selama 30 menit. Disusul pemberian salep penisilin setiap 1 jam selama 3 hari.

Antibiotika sistemik diberikan sesuai dengan pengobatan gonokok. Pada stadium penyembuhan semua

gejala sangat berkurang. Pengobatan dihentikan bila pada pemeriksaan mikroskopik yang dibuat setiap hari menghasilkan 3 kali berturut-turut negatif.

Penyulit yang dapat terjadi adalah tukak kornea marginal terutama di bagian atas. Tukak ini mudah perforasi akibat adanya daya lisis kuman gonokok ini. Pada anak-anak sering terjadi perforasi kornea. Pada orang dewasa tukak yang terjadi sering terletak marginal dan sering berbentuk cincin.

Perforasi kornea dapat mengakibatkan endoftalmitis dan panoftalmitis sehingga terjadi kebutaan total.

Tipe dewasa disebabkan infeksi sendiri dengan gejala mendadak, dengan purulensi berat yang dapat memberikan penyulit keratitis, tukak kornea, sepsis, artritis dan dakriodentis.

Pencegahan : cara yang lebih aman ialah membersihkan mata bayi segera setelah lahir dengan larutan berisi dan memberikan salep kloramfenikol. Bayi sebaiknya dibedakan dengan oftalmia neonatorum lainnya seperti klamidia konjungtivitis, infeksi bakteri lain, virus dan jamur.

Saat terlihat penyakit, gambaran klinis serta hasil pemeriksaan hapus akan membantu untuk menentukan kausa. Pemeriksaan laboratorium akan memberikan gambaran yang khusus untuk jenis infeksi yang akan memperlihatkan tanda-tanda infeksi virus, jamur dan bakteri pada pemeriksaan sitologik.

Pengobatan biasanya dengan perawatan di rumah sakit dengan terisolasi, dibersihkan dengan garam fisiologik, penisilin sodium G 100.000 unit/ml, eritromisin topikal dan penisilin 4,8 juta unit dibagi 2 kali sistemik.

Oftalmia Neonatorum

Oftalmia neonatorum merupakan konjungtivitis yang terjadi pada bayi dibawah usia 1 bulan, dapat disebabkan oleh berbagai sebab :

- a. Konjungtivitis kimia seperti nitras argenti, terjadi dalam 24 jam sesudah penetasan nitras argenti propilaktik untuk gonore.
Pengobatan dengan pembilasan sisa obat dan bahan penyokong.
Konjungtivitis stapyloccus, masa inkubasi lebih dari 5 hari. Diobati dengan antibiotika topikal. Tobramisin untuk pseudomonas.
- b. Konjungtivitis inklusi (kalmidia), masa inkubasi 5-10 hari. Pengobatan dengan tetrasiklin atau eritromisin (Gram +) dan tobramisin (Gram -)
- c. Konjungtivitis Neiseria, masa inkubasi 2-5 hari. Diobati dengan penisilin topikal dan parenteral.
- d. Konjungtivitis virus, dapat dibawa langsung setelah lahir atau dengan masa inkubasi 1-2 minggu setelah lahir. Diobati dengan trilourotimidin.
- e. Konjungtivitis jamur, diobati dengan obat anti jamur.

Konjungtivitis Angular

Konjungtivitis angular terutama di dapatkan didaerah kantung interpalpebra, disertai ekskoriasi kulit disekitar daerah meradang. Konjungtivitis angular disebabkan basil *Moraxella axenfeld*. Pada konjungtivitis angular terdapat sekret mukopurulen dan pasien sering mengedip.

Pengobatan yang sering diberikan adalah tetrasiklin atau basitrasin. Dapat juga diberi sulfas zincii yang bekerja mencegah proteolisis. Dapat memberikan penyulit blefaritis.

Konjungtivitis Mukopurulen

Konjungtivitis mukopurulen merupakan konjungtivitis dengan gejala umum konjungtivitis kataral mukoid. Penyebabnya adalah staphylococcus atau basil Koch Weeks. Terdapat hiperemia konjungtiva dengan sekret berlendir yang mengakibatkan kedua kelopak melekat terutama pada waktu bangun pagi. Sering ada keluhan seperti adanya halo atau gambaran pelangi yang sebaiknya dibedakan dengan halo glaukoma. Gejala penyakit terberat terjadi pada hari ketiga dan bila tidak diobati akan menjadi kronis. Pengobatan dengan membersihkan konjungtiva dan antibiotik yang sesuai. Penyulit yang dapat timbul adalah tukak kataral marginal pada kornea atau keratitis superfisial.

Konjungtivitis Virus Akut Demam faringokonjungtiva

Konjungtivitis demam faringokonjungtiva disebabkan oleh infeksi virus. Kelainan ini akan memberikan gejala demam, faringitis, sekret berair, dan sedikit yang mengenai satu atau kedua mata. Biasanya disebabkan adenovirustipe 3 dan 7, terutama mengenai remaja yang disebarkan melalui droplet atau kolam renang. Masa inkubasi 5-12 hari yang menularkan selama 12 hari dan bersifat epidemik. Mengenai satu mata yang akan mengenai mata lainnya dalam minggu berikutnya.

Berjalan akut dengan gejala penyakit hiperemia konjungtiva, folikel pada konjungtiva, sekret serous, kelopak bengkak dengan pseudomembran. Pada kornea dapat terjadi gejala keratitis superfisial dan atau subepitel dengan pembesaran kelenjar limfe preurikel.

Pengobatannya hanya suportif karena dapat sembuh sendiri. Diberikan kompres, astrigen, lubrikasi, pada kasus

yang berat dapat diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder.

Keratitis

Radang kornea biasanya diklasifikasikan dalam lapis kornea yang terkena, seperti keratitis superfisial dan yang interstisial atau profunda.

Keratitis dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti kurangnya air mata, keracunan obat, reaksi alergi terhadap yang diberi topikal, dan reaksi terhadap yang diberi topikal dan reaksi terhadap konjungtivitis menahun.

Keratitis akan memberikan gejala mata merah, rasa silau dan merasa kelilipan. Pengobatan dapat diberikan antibiotika, air mata buatan, dan sikloplegik.

Keratitis Pungtata

Keratitis yang terkumpul di daerah membran Bowman dengan infiltral berbentuk bercak-bercak halus. Keratitis Pungtata (KP) disebabkan oleh hal yang tidak spesifik dan dapat terjadi pada moluskum kontangiosum, akne rosasea, herpes simpleks, herpes zoster, blefaritis, keratitis neuroparalitik, infeksi virus, vaksinia, trakoma, dan trauma radiasi, dry eyes, trauma, lagoftamus, keracunan obat seperti neomisin, tobramisin dan bahan pengawet lainnya.

Kelainan ini dapat berupa keratitis pungtata epitel, keratitis pungtata, konjungtivitis vernal dan konjungtivitis atopik ditemukan bersama-sama papil raksasa. Pada trakhoma, pemfigoid, sindrom Steven Johnson dan pasca pengobatan radiasi dapat ditemukan bersama-sama dengan jaringan parut konjungtiva.

Keratitis pungtata superfisial

Keratitis pungtata superfisial membuktikan gambaran seperti infiltral halus bertitik-titik pada

permukaan kornea. Merupakan cacat halus kornea superfisial berwarna hijau bila diwarnai fluorescein.

Keratitis pungtata superfisial dapat disebabkan sindrom dry eye, blefaritis, kratopati lagofthalmus, keracunan obat topikal, sinar ultraviolet, trauma kimia ringan dan pemakaian lensa kontak. Pasien akan mengeluh sakit, silau, mata merah dan rasa kelilipan, pasien diberi air mata buatan, tobramisin tetes mata dan sikloplegik.

Infeksi kelopak atau blefaritis

Radang yang sering terjadi pada kelopak merupakan radang kelopak dan tepi kelopak. Radang bertukak atau tidak pada tepi kelopak biasanya melibatkan folikel dan kelenjar rambut.

Blefaritis dapat disebabkan infeksi dan alergi yang biasanya berjalan kronis atau menahun. Blefaritis alergi dapat terjadi akibat debu, asap, bahan kimia iritatif dan bahan kosmetik. Infeksi kelopak dapat disebabkan kuman streptococcus alfa atau beta, pneumococcus dan psudomonas. Dikenal bentuk blefaritis adalah kelopak mata merah, bengkak, sakit, eksudat lengket dan epifora.

Blefaritis sering disertai dengan konjungtivitis dan keratitis. Biasanya blefaritis sebelum diobati dibersihkannya dengan garam fisiologik hangat dan kemudian diberi antibiotik yang sesuai. Penyulit blefaritis yang dapat timbul adalah konjungtivitis, keratitis, hordeolum, kalazion dan madarosis.

Hordeolum

Hordeolum merupakan peradangan supuratif kelenjar kelopak mata. Hordeolum biasanya merupakan infeksi staphylococcus pada kelenjar sebacea kelopak biasanya sembuh sendiri dan dapat diberi kompres hangat.

Dikenal bentuk hordeolum internum dan eksternum. **Hordeolum eksternum** merupakan infeksi pada kelenjar

Zeiss atau Moll. Hordeolum internum merupakan infeksi kelenjar meibom yang terletak dalam tarsus.

Hordeolum merupakan suatu abses di dalam kelenjar tersebut. Gejalanya berupa kelopak yang bengkak dengan rasa sakit dan mengganjal, merah dan nyeri jika di tekan.

Hordeolum eksternum atau radang kelenjar Zeis atau Moll akan menunjukkan penonjolan terutama ke daerah kulit kelopak. Pada hordeolum eksternum nanah dapat keluar dari pangkal rambut.

Hordeolum eksternum atau radang kelenjar meibom memberikan ke daerah konjungtiva tarsal. Hordeolum internum biasanya berukuran lebih besar dibanding hordeolum eksternum.

Adanya pseudoptosis atau ptosis terjadi akibat beratnya kelopak sehingga sukar diangkat. Pada pasien dengan hordeolum kelenjar preaurikel biasanya turut membesar. Sering hordeolum ini membentuk abses dan pecah dengan sendirinya.

Untuk mempercepat peradangan kelenjar dapat diberikan kompres hangat, 3 kali sehari selama 10 menit sampai nanah keluar.

Pengangkat bulu mata dapat memberikan jalan untuk drainase nanah. Diberi antibiotik lokal terutama bila berbakat untuk rekuren atau terjadinya pembesaran kelenjar preaurikel.

Antibiotik sistemik yang diberikan eritromisin, golongan dikloksasilin, dapat juga diberi tetrasiklin. Bila terdapat infeksi staphylococcus di bagian tubuh lain maka sebaiknya diobati juga bersama-sama.

Pada nanah dari kantung nanah yang tidak dapat keluar dilakukan insisi. Pada hordeolum internum dan

eksternum kadang-kadang perlu dilakukan insisi pada daerah abses dengan fluktuasi terbesar.

Penyulit hordeolum dapat berupa selulitis palpebra yang merupakan radang jaringan ikat jarang palpebra di depan septum orbita dan abses palpebra. Diagnosa banding adalah selulitis preseptal, konjungtivitis adenovirus dan granuloma pyogenik.

Kalazion

Kalazion merupakan peradangan granulomatosa kelenjar meibom yang tersumbat. Pada kalazion terjadi penyumbatan kelenjar meibom dengan infeksi ringan yang mengakibatkan peradangan kronis kelenjar tersebut.

Kalazion akan memberikan gejala adanya benjolan pada kelopak, tidak hiperemi, tidak ada nyeri tekan dan adanya pseudoptosis. Kelenjar preaurikel tidak membesar. Kadang-kadang mengakibatkan perubahan bentuk bola mata akibat tekanannya sehingga terjadi kelainan refraksi pada mata tersebut.

Kadang-kadang kalazion sembuh atau hilang dengan sendirinya akibat diabsorpsi.

Pengobatan pada kalazion adalah dengan memberikan kompres hangat, antibiotik setempat dan sistemik.

Endoftalmitis

Endoftalmitis merupakan peradangan berat dalam bola mata, biasanya akibat infeksi setelah trauma atau bedah, atau endogen akibat sepsis.

Berbentuk radang supuratif di dalam bola mata dan struktur didalamnya. Peradangan supuratif didalam bola mata akan memberikan abses di dalam badan kaca. Penyebab endoftalmitis supuratif adalah kuman dan jamur yang masuk bersama trauma tembus atau sistemik melalui peredaran darah.

Endoftalmitis eksogen dapat terjadi akibat trauma tembus atau infeksi sekunder pada tindakan pembedahan yang membuka bola mata. Endoftalmitis endogen terjadi akibat penyebaran bakteri, jamur, ataupun parasit dari fokus infeksi di dalam tubuh.

Bakteri yang sering merupakan penyebab adalah stafilococ, streptococ, pneumococ, pseudomonas aerogenosa dan basil subtilis.

Jamur yang sering mengakibatkan endoftalmitis supuratif adalah aktinomises, aspergillus, fitomikosis, sporttrikum dan kokidiodes.

Endoftalmitis merupakan penyakit yang memerlukan perhatian pada tahun-tahun terakhir ini karena dapat memberikan penyulit yang gawat akibat suatu trauma tembus atau akibat pembedahan mata intraokuler.

Peradangan yang disebabkan bakteri akan memberikan gambaran klinik rasa sakit yang sangat, kelopak merah dan bengkak, kelopak sukar dibuka, konjungtiva kemotik dan merah, kornea keruh, bilik mata depan keruh yang kadang-kadang disertai hipopion.

Kekeruhan ataupun abses didalam badan kaca, keadaan ini akan memberikan refleks pupil berwarna putih sehingga gambaran seperti retinoblastoma atau pseudoretinoblastoma.

Bila sudah terlihat hipopion keadaan sudah lanjut sehingga prognosis lebih buruk. Karena itu diagnosis dini dan cepat harus dibuat untuk mencegah berakhirnya dengan kebutaan pada mata.

Endoftalmitis akibat kuman kurang virulen tidak terlihat seminggu atau beberapa minggu sesudah trauma atau pembedahan. Demikian pula infeksi jamur dapat tidak terlihat sesudah beberapa hari atau minggu. Endoftalmitis yang disebabkan jamur masa inkubasi lambat kadang-

kadang sampai 14 hari setelah infeksi dengan gejala mata merah dan sakit.

Didalam badan kaca ditemukan masa abu-abu, hipopion ringan, bentuk abses satelit didalam badan kaca dengan proyeksi sinar yang baik.

Endoftalmitis diobati dengan antibiotika melalui periokular atau subkonjungtiva. Antibiotik topikal dan sistemik disesuaikan dengan kausa .

Sikloplegik diberikan 3 kali sehari tetes mata. Kortikosteroid dapat diberikan dengan hati-hati. Apabila pengobatan gagal dilakukan eviserasi. Enukleasi dilakukan bila mata telah tenang atau ptisis bulbi.

Penyulit endoftalmitis adalah bila proses peradangan mengenai ketiga lapisan mata dan badan kaca maka akan mengakibatkan panoftalmitis. Prognosis endoftalmitis dan panoftalmitis sangat buruk terutama bila disebabkan jamur atau parasit.

Uveitis

Radang uvea dapat mengenai hanya bagian depan jaringan uvea atau selaput pelangi (iris) dan keadaan ini disebut sebagai siklitis.

Biasanya iritis akan disertai dengan siklitis yang disebut sebagai uveitis anterior. Uveitis anterior atau iridosiklitis merupakan penyakit yang mendadak yang biasanya berjalan selama 6-8 minggu, dan pada stadium dini biasanya dapat sembuh dengan tetes mata saja.

Bila mengenai selaput hitam bagian belakang mata maka disebut koroiditis.

Uveitis anterior

Uveitis anterior disebut juga sebagai iridosiklitis. Dibedakan dalam bentuk granulomatosa akut-kronis dan non granulomatosa akut-kronis.

Penyebab dari iritis tidak dapat diketahui dengan melihat gambaran kliniknya saja. Iritis dan iridosiklitis dapat merupakan manifestasi klinik reaksi imunologik terlambat, dini atau sel mediated terhadap jaringan uvea anterior. Pada kekambuhan atau rekuren terjadi reaksi imunologik humoral.

Penyebab uveitis anterior akut non granulomatosa dapat oleh trauma, diare kronis, penyakit goiter, herpes simpleks, sindrom Bechet, sindrom Posner Schlosman, pasca bedah, infeksi adenovirus, parotitis, influenza, dan klamidia. Non granulomatosa uveitis anterior kronis disebabkan oleh artritis reumatoid dan Fuchs heterokromik iridosiklitis.

Granulomatosa akut terjadi akibat sarkoiditis, sifilis, tuberkulosis, virus, jamur, atau parasit.

Uveitis dapat terjadi akut atau mendadak berupa mata merah dan sakit ringan dengan penglihatan turun perlahan-lahan.

Iridosiklitis kronis merupakan episode rekuren dengan gejala akut yang ringan atau sedikit. Keluhan pasien dengan uveitis anterior akut mata sakit, merah, fotofobia, penglihatan turun ringan dengan mata berair, dan mata merah. Keluhan sukar melihat dekat pada pasien uveitis akibat ikut meradanganya otot-otot akomodasi.

Pupil kecil akibat rangsangan proses peradangan pada otot sfingter pupil dan terdapatnya edema iris. Pada proses radang akut terjadi miopisasi akibat rangsangan badan siliar dan edema lensa.

Terdapat flek atau efek tyndal di dalam bilik mata depan dan bila peradangan sangat akut maka akan terlihat hifema atau hipopion. Pada nongranulomatosa terdapat presipitat halus pada dataran belakang kornea.

Pada iridosiklitis granulomatosa terdapat presipitat besar atau mutton fat deposit, benjolan Koeppe (penimbunan sel pada tepi pupil).

Terbentuk sinekia posterior, miosis pupil, tekanan bola mata yang turun akibat hipofungsi badan siliar, tekanan bola mata meningkat, melebarnya pembuluh siliar dan perilimbus.

Pada yang akut dapat berbentuk hipopion di bilik depan, sedang pada yang kronis terlihat edema makula dan kadang-kadang katarak.

Tekanan bola mata dapat rendah akibat gangguan fungsi pembentukan cairan mata oleh badan siliar. Bila tekanan bola mata tinggi, hal ini menunjukkan terjadinya gangguan pengaliran keluar cairan mata oleh sel radang atau perleketaan yang terjadi pada sudut bilik mata.

Perjalanan penyakit iritis adalah sangat khas yaitu penyakit berlangsung hanya antara 2-4 minggu. Kadang-kadang penyakit ini memperlihatkan gejala-gejala kekambuhan atau menjadi menahun.

Diperlukan pengobatan segera untuk mencegah kebutaan. Pengobatan pada uveitis anterior adalah dengan steroid yang diberikan pada siang hari bentuk tetes dan malam hari bentuk salep.

Steroid sistemik bila perlu diberikan dalam dosis tunggal selang sehari yang tinggi dan kemudian diturunkan sampai dosis efektif. Steroid dapat juga diberikan subkonjungtiva dan peribulbar.

Pemberian steroid untuk jangka lama dapat mengakibatkan timbulnya katarak, glaukoma dan midriasis pada pupil.

Sikloplegik diberikan untuk mengurangi rasa sakit, melepas sinekia yang terjadi, memberi istirahat pada iris yang meradang.

Pengobatan spesifik diberikan bila kuman penyebab diketahui. Bila terdapat glaukoma sekunder diberi asetozolamid.

Penyulit uveitis anterior adalah terbentuknya sinekia posterior dan sinekia anterior perifer yang akan mengakibatkan glaukoma sekunder.

Glaukoma sekunder sering terjadi pada uveitis akibat tertutupnya tuberkulum oleh sel radang atau sel sisa radang, kelainan sudut dapat dilihat dengan pemeriksaan gonioskopi.

Radang pada satu mata dapat mengakibatkan peradangan yang berat pada mata sebelahnya atau terjadi suatu keadaan yang disebut uveitis simpatis.

Patofisiologi penyakit infeksi pada sistem pendengaran Otitis Eksterna

Yang dimaksud dengan otitis eksterna ialah radang telinga akut maupun kronis yang disebabkan oleh bakteri. Diklinik seringkali sukar dibedakan peradangan yang disebabkan oleh penyebab lain seperti jamur, alergi (eksim) atau virus, sebab seringkali timbul bersama-sama. Faktor yang mempermudah radang telinga luar ialah pH diliang telinga. Biasanya normal atau asam. Bila pH menjadi basa, proteksi terhadap infeksi menurun.

Pada keadaan udara yang hangat dan lembab, kuman dan jamur mudah tumbuh. Hal lain ialah trauma ringan (ketika mengorek telinga) atau karena berenang yang menyebabkan perubahan kulit karena kena air.

Terdapat 2 kemungkinan otitis eksterna akut yaitu otitis eksterna sirkumskripta dan otitis eksterna difus.

Otitis Eksterna Sirkumskripta

Oleh karena kulit di sepertiga luar liang telinga mengandung adneksa kulit, seperti folikel rambut, kelenjar

sebasa dan kelenjar serumen, maka ditempat itu dapat terjadi infeksi sehingga membentuk furunkel.

Kuman penyebabnya biasanya staphylococcus aureus atau staphylococcus albus. Gejalanya ialah nyeri yang hebat, tidak sesuai dengan besar bisul. Hal ini dapat disebabkan kulit, liang telinga tidak mengandung jaringan longgar dibawahnya, sehingga rasa nyeri timbul pada penekanan perikondrium. Rasa nyeri dapat timbul spontan pada waktu membuka mulut (sendi temporomandibula). Selain itu terdapat juga gangguan pendengaran, bila furunkel besar dan menyumbat liang telinga.

Terapinya tergantung pada keadaan furunkel. Bila sudah menjadi abses, di aspirasi secara steril untuk mengeluarkan nanahnya. Lokal diberikan antibiotik dalam bentuk salep, seperti polymixin B atau bacitracin atau antiseptik.

Kalau dinding furunkel tebal, dilakukan insisi, kemudian dipasang salir untuk mengalirkan nanahnya. Biasanya tidak perlu diberikan antibiotik secara sistemik, hanya diberikan obat simptomatik seperti analgetik dan obat penenang.

Otitis Eksterna Difus

Biasanya mengenai kulit liang telinga dua pertiga dalam. Tampak kulit liang telinga hiperemis dan edema dengan tidak jelas batasnya, serta tidak terdapat furunkel.

Kuman penyebabnya biasanya golongan pseudomonas. Kuman lain yang dapat sebagai penyebab ialah staphylococcus albus, eschericia coli dan sebagainya. Otitis eksterna difus dapat juga terjadi sekunder pada otitis media supuratif kronis.

Gejalanya sama dengan otitis eksterna sirkumskripta. Kadang-kadang terdapat sekret yang berbau. Sekret ini tidak mengandung lendir seperti sekret yang keluar dari kavum timpani pada otitis media. Pengobatannya ialah dengan memasukkan tampon yang mengandung antibiotik keliang

telinga supaya terdapat kontak yang baik antara obat dengan kulit yang meradang. Kadang-kadang diperlukan obat antibiotik sistemik.

1. Otomikosis

Infeksi jamur di liang telinga dipermudah oleh kelembaban yang tinggi di daerah tersebut. Yang tersering ialah jamur *aspergillus*. Kadang-kadang ditemukan juga kandida albicans atau jamur.

Gejalanya biasanya berupa rasa gatal dan rasa penuh di liang telinga tapi sering pula tanpa keluhan. Pengobatannya ialah dengan membersihkan liang telinga. Larutan asam asetat 2-5% dalam alkohol yang diteteskan ke liang telinga biasanya dapat menyembuhkan. Kadang-kadang diperlukan juga obat anti-jamur yang diberikan secara topikal.

Infeksi Kronis Liang Telinga

Infeksi bakteri maupun infeksi jamur yang tidak diobati dengan baik, trauma berulang, adanya benda penggunaan cetakan pada alat bantu dengar dapat menyebabkan radang kronis. Akibatnya, terjadi penyempitan liang telinga oleh pembentukan jaringan parut. Pengobatannya memerlukan operasi rekonstruksi liang telinga.

Otitis Media

Otitis media adalah peradangan sebagian atau seluruh mukosa telinga tengah, tuba eustachius, antrum mastoid dan sel-sel mastoid. Otitis media terbagi atas otitis media supuratif dan otitis media non supuratif. Masing-masing golongan mempunyai bentuk akut dan kronis yaitu otitis media supuratif akut (otitis media akut = OMA) dan otitis media supuratif kronik (OMSK). Begitu pula otitis media serosa terbagi menjadi otitis media serosa akut dan otitis media serosa kronis. Selain itu terdapat juga otitis media

spesifik, seperti otitis media tuberkulosa atau otitis media sifilitika. Otitis media yang lain ialah otitis media adhesiva. Telinga tengah biasanya steril, meskipun terdapat mikroba di nasofaring dan faring. Secara fisiologik terdapat mekanisme pencegahan masuknya mikroba ke dalam telinga oleh silia mukosa tuba eustachius, enzim dan antibodi.

Otitis media akut terjadi karena faktor pertahanan tubuh ini terganggu. Sumbatan tuba eustachius merupakan faktor penyebab utama dari otitis media. Karena fungsi tuba eustachius terganggu, pencegahan invasi kuman ke dalam telinga tengah dan terjadi peradangan. Dikatakan juga pencetus terjadinya OMA ialah infeksi saluran nafas atas.

Patologi OMA

Penyebab utama OMA adalah bakteri piogenik, seperti streptococcus hemolitikus, stafilococcus aureus, pneumococcus, selain itu kadang-kadang ditemukan juga hemofilus influenza, escherichia coli, streptococcus anhemolitikus, proteus vulgaris dan pseudomonas aerogenosa.

Stadium OMA

Perubahan mukosa telinga tengah sebagai akibat infeksi dapat dibagi atas 5 stadium yaitu : (1) stadium oklusi tuba eustachius, (2) stadium hiperemis, (3) stadium supurasi, (4) stadium perforasi dan (5) stadium resolusi. Keadaan ini berdasarkan pada gambaran membran timpani yang diamati melalui liang telinga luar.

Stadium Oklusi Tuba Eustachius

Tanda adanya oklusi tuba eustachius ialah adanya gambaran retraksi membran timpani akibat tekanan negatif di dalam telinga tengah, karena adanya absorpsi udara. Kadang-kadang membran timpani tampak normal atau berwarna keruh pucat. Efusi mungkin telah terjadi, tetapi

tidak dapat di deteksi. Stadium ini sukar dibedakan dengan otitis media serosa yang disebabkan oleh virus atau alergi.

Stadium Hiperemis

Tampak pembuluh darah yang melebar di membran timpani atau seluruh membran timpani tampak hiperemis serta edem. Sekret yang telah terbentuk mungkin masih bersifat eksudat yang serosa sehingga sukar terlihat.

Stadium Supurasi

Edema yang hebat pada mukosa telinga tengah dan hancurnya sel epitel superficial, serta terbentuknya eksudat yang purulen di kavum timpani, menyebabkan membran timpani menonjol ke arah liang telinga luar.

Pada keadaan ini pasien tampak sangat sakit, nadi dan suhu meningkat serta rasa nyeri di telinga bertambah hebat.

Apabila tekanan nanah di kavum timpani tidak berkurang maka terjadi iskemik akibat tekanan pada kapiler-kapiler, serta timbul tromboflebitis pada vena-vena kecil dan nekrosis mukosa dan submukosa. Nekrosis ini pada membran timpani terlihat sebagai daerah yang lebih lembek dan berwarna kekuningan. Di tempat ini akan terjadi ruptur. Bila tidak dilakukan insisi membran timpani (miringotomi) pada stadium ini, maka kemungkinan besar membran timpani akan ruptur dan nanah keluar ke liang telinga luar.

Dengan melakukan miringotomi, luka insisi akan menutup kembali, sedangkan apabila terjadi ruptur, maka lubang tempat ruptur tidak menutup kembali.

Stadium Perforasi

Karena beberapa sebab seperti terlambatnya pemberian antibiotika atau virulensi kuman yang tinggi, maka dapat terjadi ruptur membran timpani dan nanah keluar mengalir dari telinga tengah ke liang telinga luar. Anak yang tadinya gelisah sekarang menjadi tenang, suhu badan turun dan anak dapat tertidur nyenyak.

Stadium Resolusi

Bila membran timpani tetap utuh maka keadaan membran timpani perlahan-lahan akan normal kembali. Bila sudah terjadi perforasi, maka sekret akan berkurang dan akhirnya kering. Bila daya tanpa pengobatan, OMA berubah menjadi OMSK bila perforasi menetap dengan sekret yang keluar terus menerus atau hilang timbul. OMA dapat menimbulkan gejala sisa berupa otitis media serosa bila sekret menetap di kavum timpani tanpa terjadinya perforasi.

Gejala Klinik OMA

Gejala klinik OMA tergantung pada stadium penyakit serta umur pasien. Pada anak yang sudah dapat berbicara keluhan utama adalah rasa nyeri di dalam telinga, keluhan disamping suhu tubuh yang tinggi. Biasanya terdapat riwayat batuk pilek sebelumnya.

Pada anak yang lebih besar atau orang dewasa, di samping rasa nyeri terdapat pula gangguan pendengaran berupa rasa penuh di telinga atau rasa kurang dengar. Pada bayi dan anak kecil gejala khas OMA adalah suhu tubuh tinggi dapat sampai $39,5^{\circ}\text{C}$ (pada stadium supurasi), anak gelisah dan sukar tidur, tiba-tiba anak menjerit waktu tidur, diare, kejang-kejang dan kadang-kadang anak memegang telinga yang sakit. Bila terjadi ruptur membran timpani, maka sekret mengalir ke liang telinga, suhu tubuh turun dan anak tertidur tenang.

Terapi

Pengobatan OMA tergantung pada stadium penyakitnya. Pada stadium oklusi pengobatannya tertama bertujuan untuk membuka tuba, sehingga tekanan negatif di telinga tengah hilang. Untuk ini diberikan obat tetes hidung. HCL efedrin 0,5% dalam larutan fisiologis (anak kurang 12 tahun)

atau HCL efedrin 1% dalam larutan fisiologik untuk yang berumur 12 tahun atau orang dewasa.

Di samping itu sumber infeksi (infeksi lokal) harus diobati. Antibiotika diberikan apabila penyebab penyakit adalah kuman, bukan oleh virus atau alergi.

Terapi pada stadium presupurasi ialah antibiotika, obat tetes hidung dan analgetika. Jika membran timpani sudah terlihat hiperemi difus sebaiknya dilakukan miringotomi.

Antibiotika yang dianjurkan dari golongan penisilin atau ampisilin. Terapi awal diberikan penisilin intramuskular agar didapatkan konsentrasi yang adekuat di dalam darah, sehingga tidak terjadi mastoiditis yang terselubung, gangguan pendengaran sebagai gejala sisa dan kekambuhan. Pemberian antibiotika dianjurkan selama 7 hari. Bila pasien alergi terhadap penisilin maka diberikan eritromisin.

Pada stadium supurasi disamping diberikan antibiotika, idealnya harus disertai dengan miringotomi, bila membran timpani masih utuh. Dengan miringotomi gejala-gejala klinis lebih cepat hilang dan ruptur dapat dihindari.

Pada stadium perforasi sering terlihat sekret banyak keluar dan kadang terlihat keluarnya sekret secara berdenyut. Pengobatannya dengan obat cuci telinga H₂O₂ 3% selama 3-5 hari serta antibiotika yang kuat.

Pada stadium resolusi, maka membran timpani berangsur normal kembali, sekret tidak ada lagi dan perforasi membran timpani menutup. Bila tidak terjadi resolusi biasanya akan tampak sekret mengalir di liang telinga luar melalui perforasi di membran timpani. Keadaan ini dapat disebabkan oleh karena berlanjutnya edema mukosa telinga tengah. Pada keadaan demikian antibiotika dapat dilanjutkan sampai 3 minggu setelah pengobatan sekret tetap masih banyak, kemungkinan telah terjadi mastoiditis.

Bila OMA berlanjut dengan keluarnya sekret dari telinga tengah lebih dari 3 minggu, maka keadaan ini disebut otitis media supuratif subakut. Bila perforasi menetap dan sekret tetap keluar lebih dari satu setengah bulan atau 2 bulan maka keadaan ini disebut otitis media supuratif kronik atau OMSK.

Komplikasi

Sebelum ada antibiotika, OMA dapat menimbulkan komplikasi yaitu abses subperiosteal sampai komplikasi yang berat (meningitis atau abses otak). Sekarang setelah ada antibiotika, semua jenis komplikasi itu biasanya didapatkan sebagai komplikasi dari OMSK.

Otitis Media Supuratif Kronik

Otitis media supuratif kronis (OMSK) dahulu disebut otitis media perforata atau dalam sebut sehari-hari : congek. Yang disebut otitis media supuratif kronik ialah infeksi kronis di telinga tengah dengan perforasi membran timpani dan sekret yang keluar dari telinga tengah terus menerus atau hilang timbul. Sekret mungkin encer atau kental, bening atau berupa nanah.

Perjalanan Penyakit

Otitis media akut dengan perforasi membran timpani menjadi otitis media supuratif kronis apabila prosesnya sudah lebih dari 2 bulan. Bila proses infeksi kurang dari 2 bulan, disebut otitis media supuratif subakut.

Beberapa faktor yang menyebabkan OMA menjadi OMSK ialah terapi yang terlambat diberikan, tetapi yang tidak adekuat, virulensi kuman tinggi, daya tahan tubuh pasien rendah (gizi kurang) atau higiene buruk.

Letak perforasi di membran timpani penting untuk menentukan tipe atau jenis OMSK. Perforasi membran timpani dapat ditemukan di daerah sentral, marginal atau

atik. Oleh karena itu disebut perforasi sentral, marginal atau atik.

Pada perforasi sentral, perforasi terdapat di pars tensa, sedangkan di seluruh tepi perforasi masih ada sisa membran timpani. Pada perforasi marginal sebagian tepi perforasi langsung berhubungan dengan anulus atau sulkus timpanikum. Perforasi atik ialah perforasi yang terletak di pars flaksida.

Jenis OMSK

OMSK dapat dibagi atas 2 jenis yaitu (1) OMSK tipe benigna (tipe mukosa=tipe aman) dan (2) OMSK tipe maligna (tipe tulang=tipe bahaya). Berdasarkan aktivitas sekret yang keluar dikenal juga OMSK aktif dan OMSK tenang. OMSK aktif ialah OMSK dengan sekret yang keluar dari kavum timpani secara aktif, sedangkan OMSK tenang ialah keadaan kavum timpaninya terlihat basah atau kering.

Proses peradangan pada OMSK tipe benigna terbatas pada mukosa saja dan biasanya tidak mengenai tulang. Perforasi terletak di sentral. Umumnya OMSK tipe benigna jarang menimbulkan komplikasi yang berbahaya. Pada OMSK tipe benigna tidak terdapat kolesteatom.

Yang dimaksud dengan OMSK tipe maligna adalah OMSK yang disertai dengan kolesteatom. OMSK ini dikenal juga dengan OMSK tipe bahaya atau tipe tulang. Perforasi pada OMSK tipe maligna letaknya marginal atau atik, kadang-kadang terdapat juga kolesteatom pada OMSK dengan perforasi subtotal. Sebagian besar komplikasi yang berbahaya atau fatal timbul pada OMSK tipe maligna.

Tanda klinik OMSK tipe maligna

Mengingat OMSK tipe maligna seringkali menimbulkan komplikasi yang berbahaya, maka perlu ditegakkan diagnosa dini. Walaupun diagnosa pasti sudah dapat ditegakkan di kamar operasi, namun beberapa tanda klinik

dapat menjadi pedoman akan adanya OMSK tipe maligna yaitu perforasi pada marginal atau pada atik. Tanda ini biasanya merupakan tanda dini dari OMSK tipe maligna, sedangkan pada kasus yang sudah lanjut dapat terlihat abses atau fistel retro-aurikuler belakang telinga), polip atau jaringan granulasi diliaing telinga luar yang berasal dari dalam telinga tengah, terlihat kolestetom pada telinga tengah, sekret berbentuk nanah dan yang berbau khas (aroma kolesteatom) atau terlihat bayangan kolesteatom pada foto rontgen mastoid.

Terapi OMSK

Terapi OMSK tidak jarang memerlukan waktu lama serta harus berulang-ulang. Sekret yang keluar tidak cepat kering atau selalu kambuh lagi. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh satu atau beberapa keadaan yaitu (1) adanya perforasi membran timpani yang permanen sehingga telinga tengah berhubungan dengan dunia luar, (2) terdapat sumber infeksi di faring, nasofaring, hidung dan sinus paranasalis, (3) sudah terbentuk jaringan patologik yang ireversibel dalam rongga mastoid dan (4) gizi dan hiegena yang kurang.

Prinsip terapi pada OMSK tipe benigna adalah konservatif atau dengan medikamentosa. Bila sekret yang keluar terus menerus maka diberikan obat pencuci telinga selama 3-5 hari. Setelah sekret berkurang, maka terapi dilanjutkan dengan memberikan obat tetes telinga yang mengandung antibiotika dan kortikosteroid. Banyak ahli berpendapat bahwa semua obat tetes yang dijual dipasaran saat ini mengandung antibiotika yang bersifat ototoksik. Oleh sebab itu penulis menganjurkan agar obat tetes telinga jangan diberikan secara terus menerus lebih dari 1 atau 2 minggu atau pada OMSK yang sudah tenang.

Secara oral diberikan antibiotika dari golongan ampicilin atau eritromisin, sebelum hasil tes resistensi di terima. Pada

infeksi yang dicurigai karena penyebabnya telah resisten terhadap ampisilin dapat diberikan ampisilin asam klavulanat.

Bila sekret telah kering, tetapi perforasi masih ada setelah diobservasi selama 2 bulan, maka idealnya dilakukan miringoplasti atau timpanoplasti. Operasi ini bertujuan untuk menghentikan infeksi secara permanen, memperbaiki membran timpani yang perforasi, mencegah terjadinya komplikasi atau kerusakan pendengaran yang lebih berat, serta memperbaiki pendengaran.

Bila terdapat sumber infeksi yang menyebabkan sekret tetap ada, atau terjadinya infeksi berulang, maka sumber infeksi itu harus diobati terlebih dahulu, mungkin juga perlu melakukan pembedahan misalnya adenoidektomi dan tonsilektomi.

Prinsip terapi OMSK tipe maligna ialah pembedahan yaitu mastoidektomi. Jadi bila terdapat OMSK tipe maligna, maka terapi yang tepat ialah dengan melakukan mastoidektomi dengan atau tanpa timpanoplasti. Terapi konservatif dengan medikamentosa hanyalah merupakan terapi sementara sebelum dilakukan pembedahan. Bila terdapat abses subperiosteal retroaurikuler, maka insisi abses sebaiknya dilakukan tersendiri sebelum kemudian dilakukan mastoidektomi.

Tuli Mendadak

Tuli mendadak ialah tuli yang terjadi secara tiba-tiba. Jenis ketuliannya adalah sensorineural, penyebabnya adalah sensorineural, penyebabnya tidak dapat langsung diketahui, biasanya terjadi pada satu telinga.

Oleh karena kerusakannya terutama di koklea dan biasanya bersifat permanen, kelainan ini dimasukkan kedalam keadaan darurat otologi.

Tuli mendadak dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain oleh iskemia koklea, infeksi virus, trauma kepala, trauma bising yang keras, perubahan tekanan atmosfer, obat ototoksik, penyakit meniere dan neuronoma akustik. Tetapi yang biasanya dianggap sebagai etiologi dan sesuai dengan definisi diatas adalah iskemia koklea dan infeksi virus.

Iskemia koklea merupakan penyebab utama tuli mendadak. Keadaan ini dapat disebabkan oleh karena spasme, trombosis atau perdarahan arteri auditoria interna. Pembuluh darah ini merupakan arteri ujung sehingga bila terjadi gangguan pada pembuluh darah ini koklea sangat mudah mengalami kerusakan. Iskemia mengakibatkan degenerasi luas pada sel-sel ganglion stria vaskularis dan ligamen spiralis.

Kemudian diikuti oleh pembentukan jaringan ikat dan pengulangan. Kerusakan sel-sel rambut tidak luas dan membran basal jarang terkena.

Beberapa virus seperti virus parotis, virus campak, virus influenza B dan mononukleosis menyebabkan kerusakan pada organ korti, membran tektoria dan selubung mielin saraf akustik. Ketulian yang terjadi biasanya berat, terutama pada frekuensi sedang dan tinggi.

Gejala

Timbulnya tuli pada iskemia koklea dapat bersifat mendadak atau menahun secara tidak jelas. Kadang-kadang bersifat sementara atau berulang dalam serangan, tetapi biasanya menetap. Tuli yang bersifat sementara biasanya tidak berat dan tidak berlangsung lama. Kemungkinan sebagai pegangan harus diingat bahwa perubahan yang menetap akan terjadi sangat cepat. Tuli dapat unilateral atau bilateral, dapat disertai dengan tinitus dan vertigo.

Pada infeksi virus, timbulnya tuli mendadak biasanya pada satu telinga, dapat disertai dengan tinitus dan vertigo.

Kemungkinan ada gejala dan tanda penyakit virus seperti parotis, varisela, variola atau pada anamnesa baru sembuh dari penyakit virus tersebut. Pada pemeriksaan klinis tidak terdapat kelainan telinga.

Pada pemeriksaan pendengaran dilakukan tes penala, audiometri nada murni, tes SISI, Tes tone decay, audiometri tutur dan audiometri impedans.

Tes keseimbangan ENG mungkin terdapat paresis kanal. Pasien dirujuk pada sub bagian hematologi penyakit dalam dan kardiologi untuk mengetahui adanya kelainan darah dan hal-hal yang mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Selain itu dikonsulkan juga ke bagian radiologi untuk pembuatan foto rontgen tulang temporal. Bila diduga kemungkinan adanya neuroma akustik, pasien dikonsulkan ke bagian saraf.

Penatalaksanaan

- f. Tirah baring sempurna, istirahat fisik dan mental selama 2 minggu untuk menghilangkan atau mengurangi stres yang besar pengaruhnya pada kegagalan neurovaskular.
- g. Vasodilatansia yang cukup kuat.
- h. Kortikosteroid
- i. Vitamin C dan neuroborantia
- j. Diet rendah garam dan rendah kolesterol.
- k. Inhalasi oksigen.

Evaluasi fungsi pendengaran dilakukan tiap minggu selama satu bulan. Bila gangguan pendengaran tidak sembuh dengan pengobatan diatas, dapat dipertimbangkan pemasangan alat bantu dengar. Apabila dengan alat bantu dengar juga masih belum dapat berkomunikasi secara adekuat perlu dilakukan psikoterapi dengan tujuan agar penderita dapat menerima keadaan.

Rehabilitasi pendengaran agar dengan sisa pendengaran yang ada dapat digunakan secara maksimal bila memakai alat bantu dengar dan rehabilitasi suara agar dapat mengendalikan volume, nada dan intonasi oleh karena pendengarannya tidak cukup untuk mengontrol hal tersebut.

Prognosis

Pada umumnya makin cepat diberikan pengobatan makin besar kemungkinan untuk sembuh, bila sudah lebih dari 2 minggu kemungkinan sembuh menjadi lebih kecil.

Penyembuhan dapat sebagian atau lengkap tetapi dapat juga tidak sembuh, hal ini disebabkan oleh karena faktor konstitusi penderita seperti penderita yang pernah mendapat pengobatan ototoksik yang cukup lama, penderita diabetes melitus, penderita dengan kadar lemak tinggi, penderita dengan viskositas darah yang tinggi dan sebagainya, walaupun pengobatan diberikan sedini mungkin.

B. Penyakit autoimun dan genetik

Sistem Penglihatan

Katarak kongenital

Katarak kongenital adalah katarak yang mulai terjadi sebelum atau segera setelah lahir dan bayi berusia kurang dari 1 tahun. Katarak kongenital merupakan penyebab kebutaan pada bayi yang cukup berarti terutama akibat penanganannya yang kurang tepat.

Katarak kongenital digolongkan dalam katarak :

1. Kapsulolentikular dimana pada golongan ini termasuk katarak kapsular dan katarak polaris.

2. Katarak lentikular termasuk dalam golongan ini katarak yang mengenai korteks atau nukleus lensa.

Dalam kategori ini termasuk kekeruhan lensa yang timbul sebagai kejadian primer atau berhubungan dengan penyakit ibu dan janin lokal atau umum. Untuk mengetahui penyebab katarak kongenital diperlukan pemeriksaan riwayat prenatal infeksi ibu seperti rubela pada kehamilan trimester pertama dan pemakaian obat selama kehamilan. Kadang-kadang pada ibu hamil terdapat riwayat kejang, tetani, ikterus atau hepatosplenomegali. Bila katarak disertai dengan uji reduksi pada urine yang positif, mungkin katarak ini terjadi akibat galaktosemia. Sering katarak kongenital ditemukan pada bayi prematur dan gangguan sistem saraf seperti retardasi mental.

Pemeriksaan darah pada katarak kongenital perlu dilakukan karena ada hubungan katarak kongenital dengan diabetes melitus. Kalsium dan fosfor. Hampir 50% dari katarak kongenital adalah sporadik dan tidak diketahui penyebabnya.

Penanganan tergantung pada unilateral dan bilateral, adanya kelaian mata lain, dan saat terjadinya katarak. Katarak kongenital prognosisnya kurang memuaskan karena bergantung pada bentuk katarak dan mungkin sekali pada mata tersebut akan terjadi ambliopia. Bila terdapat nistagmus maka keadaan ini menunjukkan hal yang buruk pada katarak kongenital.

Dikenal bentuk-bentuk katarak kongenital :

- a. Katarak piramidalis atau polaris anterior
- b. Katarak piramidalis atau polaris posterior
- c. Katarak zonularis atau lamelaris
- d. Katarak pungtata dan lain-lain.

Pada pupil mata bayi yang menderita katarak kongenital akan terlihat bercak putih atau suatu leukokoria. Pada setiap leukokoria diperlukan pemeriksaan yang lebih teliti untuk menyingkirkan diagnosis banding lainnya. Pemeriksaan leukokoria dilakukan dengan melebarkan pupil.

Pada katarak kongenital total penyulit yang dapat terjadi adalah makula lutea yang tidak cukup mendapat rangsangan. Makula ini tidak akan berkembang sempurna hingga walaupun dilakukan ekstraksi katarak maka visus biasanya tidak akan mencapai 5/5. Hal ini disebut amblyopia sensoris (*amblyopia ex anopsia*). Katarak kongenital dapat menimbulkan komplikasi lain berupa nistagnus dan strabismus.

Katarak kongenital sering ditemukan pada bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang menderita penyakit rubella, galaktosemia, homosistenuria, diabetes melitus, hipoparatiroidism, toksoplasmosis, inklusi sitomegalik dan histolasmosis. Penyakit lain yang menyertai katarak kongenital biasanya merupakan penyakit-penyakit herediter seperti mikroftalmus, aniridia, koloboma iris, karatokonius, iris heterokromia, lensa ektopik, displasia retina dan megalokornea.

Kekeruhan pada katarak kongenital dapat dijumpai dalam berbagai bentuk dan gambaran morfologik. Tindakan pengobatan pada katarak kongenital adalah operasi. Operasi katarak kongenital dilakukan bila refleksi fundus tidak tampak. Biasanya bila katarak bersifat total, operasi dapat dilakukan pada usia 2 bulan atau lebih muda bila telah dapat dilakukan pembiusan.

Tindakan bedah pada katarak kongenital yang umum dikenal adalah disisiio lensa, ekstraksi liniar, ekstraksi dengan aspirasi.

Pengobatan katarak kongenital bergantung pada :

1. Katarak total bilateral, dimana sebaiknya dilakukan pembedahan secepatnya segera katarak terlihat.
2. Katarak total unilateral, yang biasanya diakibatkan trauma, dilakukan pembedahan 6 bulan sesudah terlihat atau segera sebelum terjadinya juling; bila terlalu mudah terjadi ambliopia sebaiknya dilakukan sebaik-baiknya.
3. Katarak total atau kongenital unilateral, mempunyai prognosis yang buruk, karena mudah sekali terjadinya ambliopia; karena itu sebaiknya dilakukan pembedahan secepat mungkin, dan diberikan kacamata segera dengan latihan bebat mata.
4. Katarak bilateral partial, biasanya pengobatan lebih konservatif sehingga sementara dapat di coba dengan kacamata atau midriatika, bila terjadi kekeruhan yang progres disertai dengan mulainya tanda-tanda juling dan ambliopia maka dilakukan pembedahan, biasanya mempunyai prognosis yang lebih baik.

Katarak juvenil

Katarak yang lembek dan terdapat pada orang muda, yang mulai terbentuknya pada usia kurang dari 9 tahun dan lebih dari 3 bulan . Katarak juvenil biasanya merupakan kelanjutan katarak kongenital

Katarak juvenil biasanya merupakan penyulit sistemik ataupun metabolik dan penyakit lainnya seperti :

1. Katarak metabolik
 - a. Katarak diabetik dan galaktosemik
 - b. Katarak defisiensi gizi
 - c. Katarak hipokalsemia
 - d. Katarak aminosiduria
 - e. Penyakit wilson

- f. Katarak berhubungan dengan kelainan metabolik lain
- 2. Otot.
 - Distroi miotonik (umur 20 sampai 30 tahun)
- 3. Katarak traumatik
- 4. Katarak komplikata
 - a. Kelainan kongenital dan herediter (siklopia, kolobomo, mikroftamia, aniridia, pembuluh hialoid persisten, heterokromia iridis)
 - b. Katarak degeneratif seperti Wagner dan retinitis pigmentosa, dan neoplasma
 - c. Katarak anoksik
 - d. Toksik
 - e. Lain-lain kelainan kongenital, sindrom tertentu, disertai kelainan kulit (sindermati), tulang (distosis kraniofasial, osteogenesis imferpekta, khonrodistropia kalsifikans kongenita pungtata) dan kromosom.
 - f. Katarak radiasi.

Keratokonjungtivis flikten

Keratokonjungtivitis flikten merupakan radang kornea dan konjungtiva yang merupakan reaksi imun yang mungkin sel mediated pada jaringan yang sudah sensitif terhadap antigen.

Dahulu diduga disebabkan oleh alergi terhadap tuberkuloprotein. Sekarang diduga juga alergi terhadap kuman lain. Untuk mengetahui penyebab alerginya.

Pada benjolan akan terjadi penimbunan sel limfoid. Secara histopatologik ditemukan sel eosinofil dan tidak pernah ditemukan basil tuberkulosis. Terdapat daerah yang

berwarna keputihan yang merupakan degenerasi hialin. Terjadi pengelupasan lapis sel tanduk epitel kornea.

Mata akan memberikan gejala lakrimasi dan fotofobia disertai rasa sakit. Bentuk keratitis dengan gambaran yang bermacam-macam dengan ditemukannya infiltrat dan neovaskularisasi pada kornea.

Gambaran karakteristiknya adalah dengan terbentuknya papul atau pustula pada kornea atau konjungtiva. Pada mata terdapat flikten pada kornea berupa benjolan berbatas tegas berwarna putih keabuan, dengan atau tanpa neovaskularisasi yang menuju kearah benjolan tersebut.

Biasanya bersifat bilateral yang dimulai dari limbus. Pada gambaran klinik akan terlihat suatu keadaan sebagai hiperemia konjungtiva, kurangnya air mata, menebalnya epitel kornea, perasaan panas disertai gatal dan tajam penglihatan yang berkurang.

Pada limbus didapatkan benjolan putih kemerahan dikelilingi daerah konjungtiva yang hiperemia. Bila terjadi penyembuhan akan terjadi jaringan parut dengan neovaskularisasi pada kornea.

Pengobatan dengan steroid dapat diberikan dengan berhati-hati. Pada anak-anak keratitis flikten disertai gizi buruk dapat berkembang menjadi tukak kornea karena infeksi sekunder.

Sistem Pendengaran

Tuna rungu

Penyebab gangguan pendengaran pada anak dibedakan menjadi penyebab pada masa prenatal, perinatal dan postnatal.

Masa Prenatal

e. Genetik

- f. Non genetik herediter seperti gangguan/ kelainan pada masa kehamilan, kelainan struktur anatomik dan kekurangan zat gizi (misalnya defisiensi yodium).

Dalam periode kehamilan masa yang paling penting adalah trimester pertama, setiap gangguan atau kelainan yang terjadi pada masa tersebut dapat menyebabkan ketulian pada anak. Infeksi bakterial maupun virus yang seringkali berakibat buruk pada bayi yang akan dilahirkan adalah toksoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes dan sifilis (TORCHS). Selain itu infeksi virus lainnya seperti campak dan parotitis dapat juga menyebabkan ketulian.

Beberapa jenis obat ototoksik dan teratogenik berpotensi mengganggu proses organogenesis dan merusak sel-sel rambut koklea seperti salisilat, kina, neomisin, dihidrostreptomisin, gentamisin, thalidomide, barbiturat dll. Malformasi struktur anatomi telinga yang dikenal sebagai penyebab ketulian antara lain atresia liang telinga dan aplasia koklea.

Masa Perinatal

Beberapa keadaan yang dialami bayi pada saat lahir juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya gangguan pendengaran/ketulian seperti prematuritas, berat badan lahir rendah, tindakan dengan alat pada proses kelahiran, hiperbilirubinemia, asfiksia dan anoksia otak.

Biasanya jenis ketulian yang terjadi akibat faktor prenatal dan perinatal ini adalah tuli saraf dengan derajat ketulian umumnya berat atau sangat berat terjadi pada kedua telinga.

Masa Postnatal

Adanya infeksi bakteri/virus seperti rubella, campak, parotis, infeksi otak, perdarahan pada telinga tengah,

trauma temporal dapat menyebabkan tuli saraf atau tuli konduktif.

Untuk dapat melakukan deteksi dini pada seluruh bayi dan anak relatif sulit, karena akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Program skrining sebaiknya diprioritaskan pada bayi dan anak-anak yang mempunyai resiko tinggi terhadap gangguan pendengaran. Untuk maksud tersebut diatas Joint Committe on Infant Hearing (1990) menetapkan pedoman registrasi risiko tinggi terhadap ketulian sebagai berikut:

- a. Riwayat keluarga dengan gangguan pendengaran bawaan.
- b. Riwayat infeksi prenatal (infeksi TORCHS)
- c. Kelainan anatomi telinga
- d. Lahir prematur (< 37 minggu)
- e. Berat badan rendah (<1500 mg)
- f. Persalinan dengan tindakan
- g. Hiperbilirubinemia
- h. Asfiksia berat, nilai apgar rendah (0- 3).

Bayi yang mempunyai 3 macam faktor resiko tersebut diatas, mempunyai kecenderungan menderita ketulian 63 kali lebih besar dibandingkan bayi yang tidak mempunyai faktor resiko.

Pada bayi baru lahir yang dirawat di ruangan intensif resiko untuk mengalami ketulian 10 kali lipat dibandingkan dengan bayi normal.

Kelainan kongenital

Kelainan kongenital dan telinga luar adalah sebagai akibat gangguan perkembangan arkus brakhial pertama dan kedua. Dapat ditemukan berbagai macam kelainan ringan. Kelainan yang paling sering terjadi adalah yang disebut lop ear (bat's ear) yaitu daun telinga yang bentuknya lebih lebar

dan lebih berdiri. Kelainan ini tidak menimbulkan gangguan pendengaran. Teknik bedah untuk memperbaikinya tidak begitu mudah. Untuk itu telah diciptakan berbagai variasi teknik operasi.

Kelainan-kelainan yang berhubungan dengan gangguan perkembangan arkus brakial pertama dan kedua adalah mikrotia yang biasanya disertai dengan atresia liang telinga dan fistula preaurikuler, kelainan tersebut akan dibahas dibawah ini.

Atresia Liang Telinga dan Mikrotia

Selain dari liang telinga yang tidak terbentuk, juga biasanya disertai dengan kelainan daun telinga dan tulang pendengaran. Kelainan ini jarang disertai kelainan telinga dalam, karena perkembangan embriologik yang berbeda antara telinga dalam dengan telinga luar dan telinga tengah. Atresia telinga kongenital merupakan kelainan yang jarang ditemukan. Penyebab kelainan ini belum diketahui dengan jelas, diduga oleh faktor genetik seperti infeksi virus atau intoksikasi bahan kimia pada kehamilan muda misalnya talidomida.

Diagnosa atresia telinga kongenital hanya dengan melihat daun telinga yang tidak tumbuh dan liang telinga yang atresia saja, keadaan telinga tengahnya tidak mudah dievaluasi. Sebagai indikator untuk meramalkan keadaan telinga tengah ialah dengan melihat keadaan daun telinganya. Makin buruk keadaan daun telinga, makin buruk pula keadaan telinga tengah.

Pemeriksaan audiometri dan radiologik sangat membantu dalam menentukan kemungkinan berhasilnya rekonstruksi kelainan di telinga luar dan telinga tengah.

Atresia liang telinga dapat unilateral atau bilateral. Tujuan operasi rekonstruksi ialah selain dari memperbaiki fungsi

pendengaran, juga untuk kosmetik. Pada atresia liang telinga bilateral masalah utama ialah gangguan pendengaran. Setelah diagnosa ditegakkan sebaiknya pada pasien dipasang alat bantu dengar, baru setelah berusia 5-7 tahun dilakukan operasi pada sebelah telinga. Pada atresia liang telinga unilateral, operasi sebaiknya dilakukan setelah pasien dewasa, yaitu pada umur 15-17 tahun. Operasi dilakukan dengan bedah mikro telinga.

Fistula Preaurikuler

Fistula preaurikuler terjadi ketika pembentukan daun telinga dalam masa embrio. Kelainan ini berupa gangguan embrional pada arkus brakhial 1 dan 2. Sering ditemukan pada suku bangsa Asia dan Afrika dan merupakan kelainan herediter yang dominan.

Fistel dapat ditemukan di depan tragus atau disekitarnya, dan sering terinfeksi. Pada keadaan tenang tampak muara fistel berbentuk bulat atau lonjong, berukuran seujung pensil. Dari muara fistel sering keluar sekret yang berasal dari kelenjar sebacea.

Biasanya pasien datang berobat oleh karena terdapat obstruksi dan infeksi fistel, sehingga terjadi pioderma atau selulitis fasial. Dengan memasukkan biru-metilen ke dalam fistel dapat diduga panjang fistel. Cara ini dipakai pada waktu melakukan operasi. Cara lain ialah dengan fistulografi yaitu dengan memasukkan zat kontras ke dalam muara fistel, lalu dilakukan pemeriksaan radiologik.

Bila tidak ada keluhan, operasi tidak perlu dilakukan. Akan tetapi apabila terdapat abses berulang dan pembentukan sekret kronis, maka perlu dilakukan pengangkatan fistel itu seluruhnya, oleh karena bila tidak bersih akan menyebabkan kekambuhan.

Lop Ear (Bat's Ear)

Kelainan ini merupakan kelainan kongenital yaitu bentuk abnormal daun telinga. Tampak daun telinga lebih lebar dan lebih berdiri. Secara fisiologik tidak terdapat gangguan pendengaran, tetapi dapat menyebabkan gangguan psikis karena estetik.

Otosklerosis

Otosklerosis merupakan penyakit pada kapsul tulang labirin yang mengalami spongiosis di daerah kaki stapes, sehingga stapes tidak dapat menghantarkan getaran suara ke labirin dengan baik.

Manifestasi klinik baru timbul bila penyakit sudah cukup luas mengenai ligamen anulus kaki stapes. Pada awal penyakit akan timbul tuli konduktif dan dapat menjadi tuli campur atau tuli saraf bila penyakit telah menyebar ke koklea.

Penyebab penyakit ini belum dapat dipastikan. Diperkirakan beberapa faktor ikut sebagai penyebab seperti faktor keturunan dan gangguan perdarahan pada stapes.

Insiden penyakit ini paling tinggi pada bangsa kulit putih 8-10%, 1 % pada bangsa jepang dan 1% pada bangsa kulit hitam.

Angka insiden di Indonesia belum pernah dilaporkan. Penyakit ini pada bangsa kulit putih mempunyai faktor herediter tetapi dari pasien-pasien yang ada di Indonesia belum pernah ditemukan.

Gejala dan Tanda klinik

Pendengaran terasa berkurang secara progresif. Keluhan lain yang paling sering adalah tinitus dan kadang vertigo.

Dari pengamatan sebagian besar pasien yang datang berobat, terutama disebabkan oleh gangguan tinitus dan

ketulian telah mencapai 30-40 dB. Penyakit ini lebih banyak dari laki-laki umur antara 11-45 tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan membran timpani utuh, normal atau dalam batas-batas normal. Tuba biasanya paten dan tidak terdapat riwayat penyakit telinga atau trauma kepala sebelumnya.

Diagnosis diperkuat dengan pemeriksaan audiometri nada murni dan pemeriksaan impedans.

Pengobatan

Pengobatan penyakit ini adalah operasi stapedektomi atau stapedotomi di mana stapes diganti dengan bahan protesa. Operasi ini merupakan salah satu operasi mikro yang sangat rumit dibidang THT.

Pada kasus yang tidak dapat dilakukan tindakan operasi, alat bantu dengar dapat sementara membantu pendengaran.

C. Penyakit keganasan

Penyakit Keganasan pada sistem penglihatan

Tumor-Tumor Orbita

Tumor-tumor yang membesar secara bertahap akan menyebabkan pergeseran posisi bola mata. Arah pergeseran posisi bola mata menentukan lokalisasi tumor, misalnya tumor yang letaknya posterior (tumor saraf optik) akan menggeser posisi bola mata ke anterior, tumor glad. lakrimal akan menggeser posisi bola mata ke inferior

Pergeseran yang hebat akan menghambat keluhan diplopia. Eksoftalmus yang hebat akan menghambat aliran darah ke retina dan saraf optik sehingga visus menurun. Karena eksoftalmus juga menyebabkan kegagalan penutupan bola mata sehingga terjadi eksposur keratitis. Ct-Scan dan USG sangat membantu eksplorasi tumor orbita.

Kalsifikasi

- a. Tumor orbita primer
 1. Karsinoma : kista dermoid, kista epidermal, teratoma.
 2. Hematoma : hemangioma, neurofibroma
 3. Mesenkymal:
 - g. Adiposa : lipoma, liposarkoma
 - h. Fibrosa : fibrosarkoma, fibroma
 - i. Myomatosa : rhamdomyosarkoma
 - j. Kartilaginosa : khondroma, khondrosarkoma
 - k. Osseus : osteoma, osteosarkoma
 4. Neural : neurofibromatosa, neuroleninoma
 5. Epitelial : tumor glandula lakrimal
 6. Tumor limfoid : limfoma, hiperplasia limfoid, granuloma.
- b. Tumor orbita sekunder dari jaringan sekitarnya
 1. Intraokuler : melanoma maligna, Ca. Epidermoid
 2. Kornea dan konjungtiva : melanoma maligna, Ca.epidermoid.
 3. Palpebra dan muka : karsinoma sel basal
 4. Traktus respiratorius atas : Ca.epitel, sarkoma
 5. Kranial : Meningioma, tumor-tumor intrakranial.
- c. Metastasis dari tempat jauh : karsinoma, sarkoma, neuroblastoma.
- d. Bentuk lain
 1. Retikuloendoteliosis : xantogranuloma juvenil
 2. Penyakit metabolik : eksoftalmus tiroid
 3. Fakomatosis : penyakit Racklinghausen

Melanoma Maligna

Tumor ganas traktus uvea penderita kulit putih berumur 50 tahun. Umumnya unilateral, 85% terlihat di koroid, 9% pada korpus siliar dan 6% pada iris. Lokalisasi pada koroid di sisi temporal dan iris di setengah inferior.

Melanoma maligna koroid mula-mula terlihat pada lapisan luar yang kemudian bertambah ke membrana bruch sampai terjadi ruptur retina. Tetapi dapat juga terjadi eksudasi cairan mengisi celah potensial retina sehingga terjadi ablasi retina. Pada keadaan ini nutrisi lensa terganggu sehingga menjadi katarak.

Secara klinis terdapat 4 stadium :

1. Stadium tenang
2. Stadium glaukoma
3. Stadium ekstensi ekstraokuler
4. Stadium metastasis

Glaukoma sekunder kadangkala akut pada stadium dini atau setelah ekstensi ekstraokuler. Metastasis dapat terjadi pada semua stadium.

Penyebab glaukoma belum jelas. Beberapa kasus disebabkan terdorongnya lensa dan iris. Akibatnya terjadi bendungan bilik mata depan atau terjadi infiltrasi sel-sel neoplasma. Beberapa kasus terjadi pada stadium yang lebih dini oleh penekanan tumor pada aliran vena.

Tumor biasanya tumbuh berpigmen tetapi kadang kala tanpa pigmen. Pigmen berupa melanin, tetapi dapat juga pigmentasi darah setelah terjadi perdarahan.

Bentuk sel yang biasanya spindel, dapat pula silinder atau palisade yang dikelilingi pembuluh darah atau endotel. Penanganan berupa enukleasi melanoma maligna koroid. Tumor yang lebih kecil dapat diradioterapi kobalt. Melanoma iris yang kecil dapat diiridektomi. Pada iris atau korpus siliaris dilakukan iridosiklektomi.

Retinoblastoma

Tumor yang jarang terjadi tetapi mengenai anak kecil 2/3 kasus akan terlihat pada anak sebelum mencapai

umur 3 tahun, dan sangat jarang pada anak yang lebih besar. 30% kasus adalah bilateral. Keadaan ini oleh karena adanya mutasi satu gen autosomal dominan pada 94% kasus, sedangkan 6% terjadi secara familial yang dapat diturunkan 50% pada anaknya.

Stadium retinoblastoma :

1. Stadium tenang, kurang dari 6 bulan sampai 1 tahun. Biasanya terlihat massa besar yang dikelilingi satelit berbentuk punggat. Secara mikroskopik pertumbuhannya dapat kearah koroid atau ke vitreus.
2. Stadium glaukoma, biasanya disertai pembesaran bola mata. Pada stadium ini terasa sakit yang hebat.
3. Stadium ekstensi ekstraokuler. Rasa sakit hilang oleh karena ruptur oleh pertumbuhan yang dengan cepat bertumbuh. Ekstensi langsung sering pada saraf optik atau otak.
4. Stadium metastase pertama terkenal adalah kelenjar limfe preaurikuler regional, selanjutnya kranium dan tulang-tulang lainnya, metastase ke hepar jarang. Secara mikroskopis tampak sel-sel kecil, bulat, poligonal dalam kantong-kantong kecil dengan nukleus besar dan berwarna gelap dan sedikit sitoplasma.

Penanganan

Eksisi tumor dengan memotong saraf optik sejauh mungkin jika terjadi ekstensi ke konjungtiva dan orbita maka diindikasikan eksenterasi.

Pemberian radiasi berupa kobalt dengan dosis 4000 rad dalam 1 minggu. kadangkala diperlukan kemoterapi, cryoterapi atau photocoagulation.

Meduloepiteliom korpus Siliaris

Meduloepitelioma jinak maupun ganas merupakan tumor epitel korpus siliaris yang jarang. Terdapat satu atau lebih elemen heteroplastik seperti kartilago hialin, jaringan otak atau rhabdomyoblast sehingga disebut sebagai meduloepitelioma teratoid. Terlihat pada bayi baru lahir dan menginfiltrasi daerah sekitar lensa sehingga terlihat sebagai refleksi pupil.

Penyakit keganasan pada sistem pendengaran

Tumor ganas telinga manifestasinya dapat berbagai bentuk, mulai dari lesi kecil di kulit daun telinga, massa atau granulasi di liang telinga sampai dengan tumor yang sudah meluas, sehingga merusak sebagian besar atau seluruh tulang temporal. Histologinya pun bermacam - macam, sebab tumor dapat berasal dari kulit, tulang rawan, jaringan subkutis, tulang dan sebagainya.

Tumor ganas telinga masih merupakan masalah yang sangat sulit dihadapi oleh ahli bedah kepala dan leher. Tumor ini tumbuh berdekatan dengan a. karotis interna, lobus temporal otak, serebellum, basis crania, sinus lateralis dan sinus sigmoid, sinus petrosus superior dan saraf otak seperti n. fasial, n. akustikus, n. glosofaringeus, n. vagus, n. asesorius dan n. hipoglosus. Juga sangat berdekatan dengan sendi temporo-mandibular.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa tumor ini mengancam nyawa, menyebabkan paresis fasial, gangguan pendengaran dan keseimbangan, serta menyebabkan deformitas yang sangat mengganggu estetis, bukan saja dari penyakitnya sendiri tetapi juga dari tindakan operasi yang diperlukan untuk menanggulangi penyakitnya, sehingga diperlukan tindakan rekonstruksi luka operasi, usaha

penyambungan saraf yang terpaksa harus dipotong waktu membuang tumor dan kalau perlu penggunaan prosthesis.

Tidak ada satupun metode tunggal yang dapat mengobati kelainan yang penuh variasi proses biologi ini, sehingga diperlukan dua atau lebih metode pengobatan, seperti bedah maupun radioterapi.

Epidemiologi

Tumor ganas telinga jarang ditemukan dengan perbandingan antara 1 : 5000 sampai 1 : 20000 dari pasien dengan kelainan telinga. Lodge dan kawan - kawan memperkirakan 0,006% dari populasi. Mattick menemukan 10 kasus tumor ganas telinga dari 35000 kasus tumor yang diselidikinya.

Etiologi

Penyebab yang pasti belum jelas benar. Tersebut sebagai faktor penyebab antara lain iritasi kronik seperti sinar matahari, infeksi kronik dan sebagainya. Faktor herediter dan usia juga berperan penting.

Patologi

Lewis mengelompokkan jenis tumor telinga berdasarkan asalnya sebagai berikut:

A. Tumor epitel

1. Tumor ganas epitel permukaan

a. Karsinoma sel skuamosa

Karsinoma sel skuamosa merupakan tumor telinga yang paling sering ditemukan. Predileksi utamanya adalah di liang telinga. Lewis mendapatkan 11 % dari tumor ini telah bermetastasis ke kelenjar leher pada saat pertama kali pasien datang.

b. Karsinoma sel basal

Karsinoma sel basal merupakan karsinoma yang paling sering ditemukan di daun telinga. Tumor

ini bisa meluas dari daun telinga ke telinga tengah, mastoid dan bagian skuamosa tulang temporal.

2. Tumor ganas epitel kelenjar

Adenokarsinoma

Adenokarsinoma dapat berasal dari kelenjar sebacea atau kelenjar serumen di liang telinga ataupun merupakan penyebaran dari tumor parotis.

B. Tumor mesenkim

Sarkoma

Sarkoma merupakan tumor telinga yang jarang sekali terjadi, lebih sering ditemukan pada usia muda. Tumor ini bersifat invasive secara lokal, cepat membesar, metastasis jauh melalui aliran darah dan aliran limfe, tetapi tidak mengenai kelenjar limfe regional.

C. Tumor ganas yang asalnya susah diketahui

Melanoma maligna

Tumor ini bisa merupakan tumor primer di daun telinga, liang telinga ataupun di telinga tengah. Pada kebanyakan pasien sudah ditemukan pembesaran kelenjar limfe regional walaupun tumornya masih kecil.

Pola Penyebaran

a. Telinga luar

Karsinoma sel basal liang telinga luar biasanya mulai dari 1/3 luar liang telinga, kemudian berkembang secara cepat ke perikondrium, akhirnya merusak kartilago menyebar kearah telinga tengah dan mastoid. Karsinoma sel skuamosa liang telinga luar dapat tampak seperti massa polipoid berwarna merah. Tumor bisa berinvasi ke tulang rawan atau tulang atau

menembus membran timpani ke telinga tengah, mastoid dan kanalis fasialis.



Gambaran Massa berukuran 3,5 x 2,5 cm di daun telinga; secara histopatologi adalah karsinoma sel basal

- b. Telinga tengah (kavum timpani, mastoid dan tuba Eustachius)

Berbagai jenis tumor jinak dan ganas, dapat berasal dari telinga tengah mastoid dan daerah sekitarnya, terutama pada liang telinga. Tumor ini dapat dianggap primer, menunjukkan asalnya dari tulang temporal, atau sekunder yang menunjukkan metastase ke tulang temporal dari suatu tempat yang jauh, atau menginvasi telinga dari daerah sekitarnya, biasanya kelenjar parotis.

Tumor Primer

Dari jenis tumor primer, tumor glomus jugularis timpanikum merupakan yang paling lazim dan paling penting. Tumor berasal dari badan glomus dekat

bulbus jugularis pada dasar telinga tengah atau berasal dari penyebaran saraf di manapun dalam telinga tengah. Secara histologist tumor serupa dengan tumor korpus karotis atau kemodektoma. Suatu varian ganas telah dilaporkan namun sangat jarang. Dengan ekspansinya tumor dapat merusak jaringan di sekitarnya dan menyebabkan gangguan pendengaran dan rasa penuh pada telinga dan pada beberapa kasus dapat meluas ke basis cranium, menimbulkan komplikasi saraf kranialis dan intrakranialis. Tumor ini sangat vascular, dan seringkali dapat terlihat sebagai suatu massa keunguan di dasar telinga tengah lewat membrane timpani yang semitransparan. Kepucatan yang timbul pada penekanan dengan otoskop pnemotik di sebut tanda Brown. Tumor jinak lain termasuk neurofibroma saraf fasialis, hemangioma dan osteoma.

Tumor ganas primer pada rongga telinga tengah antara lain : karsinoma sel skuamosa, rabdomiosarkoma, karsinoma kistik adenoid dan adenokarsinoma. Tumor dapat pula meluas ke anterior lewat fisura - fisura menuju kelenjar parotis dan fossa pterigomaxillaris. Tumor ganas telinga tengah yang paling umum pada dewasa adalah karsinoma kistik adenoid dan adenokarsinoma. Tumor ganas yang paling sering meluas dari liang telinga ke telinga tengah adalah karsinoma sel skuamosa. Tumor lain yang berasal dari liang telinga dan meluas ke telinga tengah (lebih jarang) adalah karsinoma kistik adenoid, melanoma maligna dan sel basal karsinoma yang ditelantarkan.

Tumor sekunder

Tumor yang berasal dari fokus primer yang jauh dan bermetastasis ke telinga tengah, mastoid dan tulang temporal termasuk adenokarsinoma prostat, karsinoma payudara, hipernefroma atau karsinoma ginjal, karsinoma bronkus, saluran cerna dan melanoma.

Disamping itu, telinga tengah dan mastoid dapat diinvasi oleh tumor dari daerah sekitar seperti meningioma, neuroma akustik, glioma, neurilemoma, karsinoma kistik adenoid dan mukoepidermoid dari kelenjar parotis dan kanker nasofaring yang meluas hingga ke tuba Eustachius. Keganasan hematologis seperti limfoma maligna dan leukemia sering menyebabkan tulang temporal hampir selalu memperlihatkan sumsum tulang apeks petrosa dan juga menginfiltrasi telinga tengah dan tuba Eustachius, menimbulkan gangguan pendengaran konduktif dan terbentuknya efusi. Pada leukemia berat atau terminal dapat terjadi perdarahan telinga dalam yang menyebabkan tuli berat mendadak dan gejala - gejala vestibular.

Gejala Klinis

Gejala klinis berupa nyeri, rasa penuh dalam telinga, gangguan pendengaran, dan vertigo bila labirin vestibular terlibat. Saraf fasialis menjadi lumpuh bila tumor mengerosi dinding kanalis posterior dan melibatkan saraf tersebut, namun dalam hal ini biasanya terjadi pada akhir perjalanan penyakit.

Tumor ganas daun telinga dapat berupa tumor superficial dengan atau tanpa ulserasi

tergantung jenis tumornya, sehingga mudah dideteksi secara dini. Tumor ganas liang telinga dan telinga tengah sering terlambat diketahui oleh karena tidak cepat dapat terlihat dan gejalanya seringkali hanya menyerupai penyakit infeksi oleh karena biasanya penyakit ini timbul pada telinga yang sebelumnya telah menderita otitis media supuratif kronik.

Pada keadaan ini otorea yang biasanya purulen berubah menjadi hemorhagik. Nyeri yang hebat bisa disebabkan oleh otitis eksterna atau otitis media, tetapi bila tumor ganas telinga disertai nyeri hebat, sangat mungkin disebabkan oleh invasi tumor ke tulang. Paresis fasial perifer sering terjadi di samping gangguan pendengaran dan gangguan keseimbangan. Terkenanya N. IX, X, XI dan XII menandakan penyebaran ke basis fosa kranii media dan menandakan penyakit yang *incurable*.

c. Telinga dalam

Tumor terpenting dari sistem vestibular adalah *schwannoma (acoustic neuroma)*. Tumor ini tidak selalu menginvasi vestibulum, tapi dapat juga terjadi pada kasus neurofibromatosis. *Vestibular schwannoma* sebagian besar berasal dari *glial-neurilemmal junction* dari saraf kranial ke delapan, yang umumnya terletak di antara meatus auditorius interna. Metastase tumor dapat terjadi ke telinga tengah, namun hal tersebut jarang terjadi.

Klasifikasi

Klasifikasi tumor ganas telinga tidak ditemukan di dalam klasifikasi TNM dari UICC tahun 1987. Goodwin membagi pasien berdasarkan penyebaran ke

arah medial menjadi 3 golongan yang kelihatannya praktis untuk penggunaan klinik:

- 1 .Golongan 1: tumor yang mengenai konka daun telinga dan / atau bagian tulang rawan liang telinga.
- 2 .Golongan 2: tumor mengenai bagian superfisial tulang temporal yaitu bagian tulang dari liang telinga dan korteks mastoid.
2. Golongan 3: tumor sudah mengenai struktur dalam tulang temporal, telinga tengah, kanalis fasial, basis kranii atau sel mastoid. Ada atau tidaknya pembesaran kelenjar limfe regional harus diperhatikan secara terpisah.

Panel: Lesions of the ear

Non-neoplastic and benign neoplastic lesions of the external ear

Developmental anomalies (including accessory tragus and hamartomas)

Epidermal cyst

Keloid

Eczema

Infection (malignant otitis externa)

Lobular capillary haemangioma (pyogenic granuloma)

Gouty tophus

Cystic chondromatosis

Relapsing polychondritis

Melanocytic naevus

Benign adnexal tumours (including ceruminous adenoma and pleomorphic adenoma)

Squamous papilloma

Seborrheic keratosis

Chondroma

Osteoma

Haemangioma

Keratocystoma

Atypical fibroxanthoma

Malignant neoplasms of the external ear

Squamous carcinoma

Basal-cell carcinoma

Malignant melanoma

Merkel-cell carcinoma

Angiosarcoma (including both conventional angiosarcoma and Kaposi's sarcoma)

Adnexal carcinoma (including ceruminous adenocarcinoma and adenoid cystic carcinoma)

Lymphoma

Non-neoplastic and benign neoplastic lesions of the middle and inner ear

Otitis media (including aural polyp formation)

Cholesteatoma

Heterotopias (including heterotopic neural tissue and salivary glandular tissue)

Developmental anomalies (including teratomas and choristomas)

Adenoma

Inverted papilloma

Paraganglioma

Carcinoid tumour

Meningioma

Acoustic neuroma (vestibular schwannoma)

Eosinophilic granuloma

Malignant neoplasms of the middle and inner ear

Metastatic carcinoma

Endolymphatic-sac tumour (aggressive papillary tumour)

Primary squamous carcinoma

Adenocarcinoma


Rhabdomyosarcoma

Lymphoma, multiple myeloma, and plasmacytoma


Gambar Berbagai macam lesi telinga

Diagnosis

Bila mungkin secepatnya dilakukan biopsi dari liang telinga atau dari leher. Otitis eksterna kronik yang menetap merupakan indikasi pasti untuk biopsi liang telinga.



Morphea type dari karsinoma sel basal daun telinga



Adenoma telinga tengah



*Vestibular Schwannoma*¹⁶

Pemeriksaan radiologik memegang peranan yang sangat penting untuk melihat lokasi tumor dan perluasannya dengan tepat. Tanpa bantuan gambaran radiologi rencana pembedahan dan radioterapi tidak dapat dibuat dengan baik. Politomografi dan CT scan dengan bidang aksial dan koronal akan dapat membantu diagnosis yang lebih dini dan lebih memperlihatkan perluasan tumor. Tomogram lateral penting untuk memperlihatkan erosi dinding liang telinga.

Erosi di dinding tulang yang membatasi telinga tengah dapat dilihat pada potongan koronal tomogram.

Lokasi dan perluasan tumor (jaringan lunak) ke fosa infra temporal dapat dilihat dengan CT Scan. Venojugulogram dan arteriografi a. karotis kadang - kadang diperlukan untuk melihat apakah ada infiltrasi tumor ke sinus lateralis dan bulbus jugularis atau ke a. karotis interna. Ada kalanya terutama bila ada infeksi penunjang, tumor dapat menimbulkan gejala pengeluaran secret, khususnya secret berdarah.

CT scan

CT scan dengan kontras merupakan uji diagnostik yang paling bermanfaat.

Angiografi dan Venografi

Pada beberapa kasus perlu dilakukan angiografi dan venografi jugular retrograde untuk menegakkan diagnosis dan menentukan suplai darah dan derajat tumor.

Pengobatan

Beberapa penulis menganjurkan terapi radiasi untuk tumor ganas telinga, tetapi kondritis yang disebabkan oleh radiasi dan nekrosis tulang yang terkena radiasi sering kali merupakan komplikasi yang serius yang sukar untuk diatasi. Disamping itu radiasi juga akan menimbulkan kesulitan untuk menentukan batas perluasan tumor. Cara pengobatan terbaik menurut kebanyakan ahli adalah terapi operatif dengan eksisi luas secara lengkap dan utuh ("intoto"). Bila perlu dapat diiringi radioterapi.

Bila tumor ditemukan dini, pasien memiliki lebih banyak kesempatan untuk sembuh dibandingkan bila tumor telah lanjut sehingga memerlukan reseksi tulang temporal, dengan kemungkinan kelangsungan hidup lebih sempit. Rhabdomyosarkoma menyerang anak - anak kecil. Penyakit ini pernah dianggap fatal namun dalam tahun - tahun terakhir telah dilaporkan kesembuhan dengan kombinasi radioterapi dan kemoterapi.

Tindakan Operasi

Suatu diagnosis jaringan sudah tentu memerlukan eksplorasi bedah pada tempat tersebut dan pembedahan merupakan bentuk pengobatan yang lebih disukai pada kebanyakan kasus. Bila tumor luas sering terdapat indikasi gabungan pembedahan dan radioterapi.

Oleh karena kompleksnya teknik operasi dan letak tumor, serta sulitnya melakukan rekonstruksi luka operasi, kadang - kadang reseksi yang adekuat dari luas operasi harus dikompromikan.

1. Tumor ganas daun telinga

Tumor ganas yang masih terbatas pada daun telinga dapat diangkat dengan berbagai macam cara insisi dilanjutkan dengan operasi rekonstruksi daun telinga.

2. Tumor ganas liang telinga

Tindakan operasi tumor ganas liang telinga lebih rumit oleh karena letak anatominya yang berdekatan dengan koklea dan labirin, N. VII serta kaput mandibula.

Tumor ganas liang telinga yang masih terbatas pada bagian membrane (1/3 luar) memerlukan eksisi luas jaringan lunak diikuti dengan tandur kulit. Tumor ganas yang mengenai bagian tulang liang telinga (2/3 dalam) memerlukan ekstirpasi luas mencakup seluruh liang telinga beserta membrane timpani dengan memperhatikan usaha untuk mencegah trauma n. VII. Teknik operasinya disebut reseksi partial tulang temporal.

Cara reseksi partial tulang temporal ialah dengan melakukan mastoidektomi simple untuk mengidentifikasi n. VII. Kemudian mengangkat seluruh liang telinga dan membrane timpani secara utuh. Untuk tindakan ini pendekatan dilakukan dari dua arah. Yang pertama di sebelah atas liang telinga melalui epitimpanum dan ramus zigoma ke arah rongga sendi temporomandibula. Pendekatan kedua dilakukan dengan membuat lubang - lubang kecil di sebelah depan kanalis fasialis dengan bor kecil ke arah resesus fasialis di kavum timpani untuk mencegah paresis fasial waktu pengangkatan seluruh liang telinga secara luas. Sisa perlekatan setelah kedua pendekatan operasi itu dilakukan dilepaskan dengan bantuan osteotom.

Jika pneumatisasi mastoid buruk maka dilakukan pengangkatan liang telinga sedikit demi sedikit ("*piecemeal removal*"). Pasca operasi diberikan radiasi, terutama bila diduga ada sisa - sisa tumor yang tertinggal.

3. Tumor ganas telinga tengah dan mastoid

Bila tumor ganas sudah mengenai telinga tengah dan tulang temporal maka dilakukan reseksi tulang temporal subtotal. Pada operasi ini dilakukan pengangkatan seluruh tulang temporal di sebelah lateral dari meatus akustikus internus, sehingga hanya apeks petrosus yang tertinggal. Pendekatan dilakukan melalui tiga arah. Pendekatan dari arah superior dengan membuang sebagian besar tulang skuamosa sehingga tampak dura di daerah itu, kemudian tulang petrosus dicapai.

Pendekatan dari arah posterior dengan melakukan insisi tulang pada garis vertikal tepat di belakang tulang mastoid untuk membebaskan sinus sigmoid dan sinus lateral. Pendekatan dari arah anterior dilakukan dengan melakukan insisi pada prosessus zigomatikus, prosessus kondiloideus mandibula, kemudian ke fosa glenoidea sehingga hampir mencapai a. karotis dan tampak tuba Eustachius. Kemudian basis prosessus stiloideus dipotong. Jaringan dapat dilepaskan dengan menempatkan pahat di sebelah medial alur digastrik lalu memotong tulang ke arah atas.

Bila tumor telah mencapai apeks petrosus, maka dapat dilakukan reseksi total tulang temporal. Untuk membuang apeks petrosus diperlukan diseksi a. karotis dan melepaskan apeks petrosus dari dasar tengkorak. Tindakan ini penuh risiko terjadinya trauma a. karotis dan kebocoran cairan otak yang akan lebih sukar diatasi. Oleh karena tindakan ini mempunyai komplikasi berbahaya yang tinggi sekali dan prognosinya tidak lebih baik dari reseksi subtotal, hanya sedikit ahli yang melakukannya. Kebanyakan ahli berpendapat bahwa bila tumor telah mengenai apeks petrosus maka tumor sudah tidak mungkin di operasi lagi.

Radioterapi

Para radioterapis pada umumnya sependapat bahwa segala jenis radioterapi untuk karsinoma yang telah menginvasi tulang sedikit sekali gunanya. Radioterapi pre-operatif diindikasikan untuk tumor yang telah menyebar luas dimana telah terjadi penyebaran ke dura. Dosis radiasi pre operatif tidak melebihi 4000 rad.

Radioterapi pasca operatif diindikasikan untuk pasien yang telah menjalani operasi sebelum tindakan reseksi tulang temporal. Juga untuk kasus yang pada saat operasi tidak jelas batas tumornya sehingga tidak bisa terangkat semuanya ataupun pada tumor yang besar walaupun tepi operasi dianggap bebas tumor. Pemberian radiasi dianjurkan 4 - 6 minggu setelah tindakan operasi dengan dosis yang tidak melebihi 4500 rad.

Radioterapi paliatif diberikan pada kasus yang sangat lanjut atau kasus yang kambuh setelah tindakan operasi dengan tujuan untuk mengatasi otore yang banyak, nyeri dan perdarahan. Tumor yang tidak lagi dapat direseksi memperlihatkan respon dengan radioterapi.

Komplikasi Operasi

Tindakan operasi sering kali harus meninggalkan defek yang luas yang memerlukan tindakan rekonstruksi yang sulit. Nervus fasial dan telinga sering kali harus dikorbankan sehingga pasca operasi terjadi paresis fasial dan tuli saraf yang menetap serta vertigo untuk beberapa minggu. Komplikasi operasi yang paling serius adalah kebocoran cairan otak yang dapat berlanjut ke arah terjadinya meningitis dan abses otak.

Operasi tulang temporal banyak menimbulkan perdarahan. Perdarahan yang hebat dapat terjadi bila

terdapat trauma pada sinus otak ataupun dari a. karotis interna. Bila terjadi thrombosis a. karotis interna dapat terjadi hemiplegia. Infeksi pasca operasi sering kali terjadi terutama akibat lamanya tindakan operasi. Tindakan operasi yang berat ini juga dapat menimbulkan kematian. Conley mendapatkan angka kematian 27 % akibat tindakan operasi dan komplikasi pasca operasi.

Prognosis

Prognosis tumor ganas telinga masih buruk. Kemajuan dalam teknik operasi dan radioterapi belum banyak memperbaiki prognosis. Angka bertahan hidup 5 tahun yang dilaporkan oleh kebanyakan penyelidik ternyata masih rendah, Lewis 27 %, Conley dan Goodwin 41 %, John 18 % serta Wang 48 %.

D. Penyakit degeneratif

Penyakit Degenaratif Pada Sistem Penglihatan

1. Pterigium

Pterigium merupakan suatu pertumbuhan fibrovaskular konjungtiva yang bersifat degeneratif dan invasif. Pertumbuhan ini biasanya terletak pada celah kelopak bagian nasal ataupun temporal konjungtiva yang meluas ke daerah kornea. Pterigium berbentuk segitiga dengan puncak di bagian sentral atau didaerah kornea. Pterigium mudah meradang dan bila terjadi iritasi maka bagian pterigium akan berwarna merah. Pterigium dapat mengenai kedua mata.

Pterigium diduga disebabkan iritasi kronis akibat debu, cahaya sinar matahari dan udara yang panas. Etiologi tidak diketahui dengan jelas dan diduga merupakan suatu neoplasma, radang dan degenerasi.

Pterigium dapat tidak memberikan keluhan atau akan memberikan keluhan mata iritatif, merah dan mungkin

menimbulkan astigmatisme yang akan memberikan keluhan gangguan penglihatan. Pterigium dapat disertai dengan keratitis pungtata dan dellen, dan garis besi yang terletak di ujung pterigium.

Diagnosis banding pterigium adalah pseodpterigium, pannus, dan kista dermoid.

Pengobatan tidak diperlukan sering bersifat rekuren, terutama pada pasien yang masih muda. Bila pterigium meradang dapat diberikan steroid atau suatu tetes mata dekongestan.

Pengobatan pterigium adalah dengan sikap konservatif dilakukan pembedahan bila terjadi gangguan penglihatan akibat terjadinya astigmatisme ireguler atau pterigium yang telah menutupi media penglihatan.

Lindungi mata dengan pterigium dari sinar matahari, debu dan udara kering dengan kacamata pelindung. Bila terdapat tanda radang beri air mata buatan dan bila perlu dapat diberi steroid. Bila terdapat delen (lekukan kornea) beri airmata buatan dalam bentuk salep. Bila diberi kontriktor maka perlu kontrol dalam 2 minggu dan bila telah terdapat perbaikan pengobatan dihentikan.

Tindakan pembedahan adalah suatu tindak bedah plastik dilakukan bila pterigium telah mengganggu penglihatan. Pterigium dapat tumbuh menutupi seluruh permukaan kornea atau bola mta.

2. Pinguekula

Pinguekula merupakan benjolan pada konjungtiva bulbi yang umum ditemukan pada orang tua, terutama yang matanya sering mendapat rangsangan sinar matahari, debu dan angin panas. Letak bercak ini pada celah kelopak mata terutama dibagian bagian nasal.

Pinguela merupakan degenerasi hialin jaringan submukosa konjungtiva. Pembuluh darah tidak masuk ke

dalam pinguekula akan tetapi bila meradang atau terjadi iritasi, maka sekitar bercak degenerasi ini akan terlihat pembuluh darah yang melebar.

3. Katarak senil

Katarak senil adalah kekeruhan lensa yang terdapat pada usia lanjut yaitu diatas 50 tahun ke atas. Penyebabnya sampai sekarang tidak diketahui secara pasti.

Konsep penuaan :

- a. Teori putaran biologik ("A biologic clock")
- b. Jaringan embrio manusia dapat membelah diri 50 kali hingga mati
- c. Immunologis; dengan bertambah usia akan bertambah cacat imunologik yang mengakibatkan kerusakan sel.
- d. Teori mutasi spontan
- e. Teori "A free radical"
 - 1) Free radical terbentuk bila terjadi reaksi intermediate reaktif akut.
 - 2) Free radical dengan molekul normal mengakibatkan degenerasi
 - 3) Free radical dapat dinetralisir oleh antioksidan dan vit .E.
 - 4) Teori "Across-link"

Ahli biokimia mengatakan terjadi pengikatan bersilang asam nukleat dan molekul protein sehingga mengganggu fungsi.

Perubahan lensa pada usia lanjut :

1. Kapsul ;
 - a. Menebal dan kurang elastis (1/4 dibanding anak)
 - b. Mulai presbiopia
 - c. Bentuk lamel kapsul berkurang atau kabur
 - d. Terlihat bahan granular
 - e. Epitel - makin tipis

- f. Sel epitel pada equator bertambah besar dan berat
- g. Bengkak dan vakuolisasi mitokondria yang nyata
- h. Serat lensa
- i. Lebih ireguler
- j. korteks jelas kerusakan serat sel.
- k. Brown sklerotik nukleus, sinar ultraviolet lama ke lamaan merubah protein nukleus lensa, sedang warna coklat protein lensa nukleus mengandung sedikit histidin dan triftopan dibanding normal.
- l. Korteks tidak berwarna, karena :
- m. Kadar a. askorbat tinggi dan menghalangi fotooksidasi
- n. Sinar tidak banyak mengubah protein pada serat muda.

Kekeruhan lensa dengan nukleus yang mengeras akibat usia lanjut yang biasanya mulai terjadi pada usia lebih 60 tahun.

Pada katarak senil sebaiknya singkirkan penyakit mata lokal dan penyakit sistemik seperti diabetes melitus yang dapat menimbulkan katarak komplikata.

Katarak senil secara klinik dikenal dalam 4 stadium yaitu insipien, imatur, matur, hiper matur dan morgagni.

Katarak insipien

Pada stadium ini akan terlihat hal-hal berikut :kekeruhan mulai dari tepi ekuator berbentuk jeriji menuju korteks anterior dan posterior (katarak kortikal). Vakuol mulai terlihat di dalam korteks.

Katarak subkapsular posterior, kekeruhan mulai terlihat anterior subkapsular posterior, celah terbentuk

antara serat lensa dan korteks berisi jaringan degeneratif pada insipiens.

Kekeruhan ini dapat menimbulkan poliopia oleh karena indeks refraksi yang tidak sama pada semua bagian lensa. Bentuk ini kadang-kadang menetap untuk waktu yang lama.

Katarak intumesen

Kekeruhan lensa disertai pembengkakan lensa akibat lensa yang degeneratif menyerap air. Masuknya air kedalam celah lensa mengakibatkan lensa menjadi bengkak dan besar yang akan mendorong iris sehingga bilik mata menjadi dangkal dibanding keadaan normal. Pencembungan lensa ini aksi dapat memberikan penyulit glaukoma.

Katarak intumesen biasanya terjadi pada katarak yang berjalan cepat dan mengakibatkan miopia lentikuler. Pada keadaan ini dapat terjadi hidrasi korteks hingga lensa akan mencembung dan daya biasanya akan bertambah, yang memberikan miopisasi. Pada pemeriksaan slitlamp terlihat vakuol pada lensa disertai peregangan jarak lamel serat lensa.

Katarak imatur.

Sebagian lensa keruh atau katarak. Katarak yang belum mengenai seluruh lapis lensa. Pada katarak imatur akan dapat bertambah volume lensa akibat meningkatnya tekanan osmotik bahan lensa yang degeneratif. Pada keadaan lensa yang mencembung akan dapat menimbulkan hambatan pupil, sehingga terjadi glaukoma sekunder.

Katarak matur

Pada katarak matur, kekeruhan lensa telah mengenai seluruh masa lensa. Kekeruhan ini bisa terjadi akibat deposisi ion Ca yang menyeluruh. Bila katarak imatur dan intumesen tidak dikeluarkan maka cairan lensa akan keluar, sehingga lensa kembali pada yang normal. Akan terjadi

kekeruhan lensa yang bila lama kelamaan akan mengakibatkan kalsifikasi lensa. Bilik mata depan akan berukuran kedalaman norma kembali. Tidak terdapat bayangan iris pada lensa yang keruh. Sehingga uji bayangan iris negatif.

Katarak matur

Katarak yang mengalami proses degenerasi lanjut. Dapat menjadi keras atau lembek dan mencair. Masa lensa yang berdegenerasi keluar dari kapsul lensa sehingga lensa menjadi mengecil, berwarna kuning dan kering. Pada pemeriksaan terlihat bilik mata dalam dan lipatan kapsul lensa.

Kadang-kadang pengkerutan berjalan terus sehingga hubungan dengan zonula zinn menjadi kendur. Bila proses berjalan lanjut disertai dengan kapsul yang tebal maka korteks yang berdegenerasi dan cair tidak dapat keluar, maka korteks akan memperlihatkan bentuk sebagai sekantong susu disertai dengan nukleus yang terbenam di dalam korteks lensa karena lebih berat. Keadaan ini disebut sebagai katarak Morgagni.

Penyakit Degeneratif pada Sistem Pendengaran

1. Tuli Konduktif Pada Geriatri

Perubahan patologik pada organ auditori akibat proses degenerasi pada geriatri menyebabkan gangguan pendengaran. Jenis ketulian yang terjadi pada kelompok geriatri umumnya tuli saraf, namun dapat juga berupa tuli konduktif atau tuli campuran.

Pada liang telinga tengah proses degenerasi dapat menyebabkan perubahan atau kelainan berupa (1) berkurangnya elastisitas dan bertambah besarnya ukuran daun telinga (pinna), (2) atrofi dan bertambah kakunya liang telinga, (3) penumpukan serumen, (4) membran timpani

bertambah tebal dan kaku, (5) kekakuan sendi tulang-tulang pendengaran.

Pada geriatri kelenjar-kelenjar serumen mengalami atrofi, sehingga produksi kelenjar serumen berkurang dan menyebabkan serumen menjadi lebih kering, sehingga sering terjadi gumpalan serumen (serumen prop) yang akan mengakibatkan tuli konduktif. Membran timpani yang bertambah kaku dan tebal juga akan menyebabkan gangguan konduksi demikian pula halnya dengan kekakuan yang terjadi pada persendian tulang-tulang pendengaran akan mengakibatkan tuli konduktif.

2. Tuli Saraf Pada Geriatri (Presbikusis)

Presbikusis adalah tuli saraf sensorineural frekuensi tinggi, terjadi pada usia lanjut, simetris kiri dan kanan. Presbikusis dapat mulai pada frekuensi 100 Hz atau lebih.

Etiologi umumnya diketahui bahwa presbikusis merupakan akibat dari proses degenerasi. Diduga kejadian presbikusis mempunyai hubungan dengan faktor-faktor herediter, pola makanan, metabolisme, aterosklerosis, infeksi, bising, gaya hidup atau bersifat multifaktor. Menurunnya fungsi pendengaran secara berangsur merupakan efek kumulatif dari pengaruh faktor-faktor tersebut diatas.

Biasanya terjadi pada usia lebih dari 60 tahun. Progresifitas penurunan pendengaran dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin pada laki-laki lebih cepat dibanding perempuan. Proses degenerasi menyebabkan perubahan struktur koklea dan N.VIII. Pada koklea perubahan yang mencolok ialah atrofi dan degenerasi sel-sel rambut penunjang pada organ corti. Proses atrofi disertai dengan perubahan vaskular juga terjadi pada stria vaskularis. Selain itu terdapat pula perubahan berupa berkurangnya jumlah

dan ukuran sel ganglion dan saraf. Hal yang sama terjadi juga pada myelin dan akson saraf.

Berdasarkan perubahan patologik yang terjadi, presbikusis digolongkan menjadi 4 jenis yaitu (1) sensorik, (2) neural, (3) metabolik (strial presbikusis), (4) mekanik (coclear presbikusis).

Gejala klinik berupa berkurangnya pendengaran secara perlahan dan progresif, simetris pada kedua telinga. Kapan berkurangnya pendengaran tidak diketahui secara pasti.

Keluhan lainnya adalah telinga berdenging (tinitus nada tinggi). Penderita dapat mendengar suara percakapan, tetapi sulit untuk memahaminya, terutama bila diucapkan dengan cepat di tempat dengan latar belakang yang riuh. Bila intensitas suara ditinggikan akan timbul rasa nyeri di telinga, hal ini disebabkan oleh faktor kelelahan (recruitment).

Dengan pemeriksaan otoskopi; tampak membran timpani suram, mobilitasnya kurang. Pada tes penala didapatkan tuli sensorineural. Pemeriksaan audiometri nada murni menunjukkan suatu tuli saraf nada tinggi, bilateral dan simetris.

Pada tahap awal terdapat penurunan yang tajam (sloping) setelah frekuensi 2000 Hz. Gambaran ini khas pada presbikusis jenis sensorik dan neural. Kedua jenis presbikusis ini paling sering di temukan. Garis ambang dengar pada audiogram jenis metabolik dan mekanik lebih mendatar, kemudian pada tahap berikutnya berangsur angsur terjadi penurunan. Pada semua jenis presbikusis tahap lanjut juga terjadi penurunan frekuensi yang lebih rendah.

Pemeriksaan audiometri tutur menunjukkan adanya gangguan diskriminasi wicara. Keadaan ini jelas terlihat pada presbikusis jenis neural dan koklear.

Penatalaksanaan berupa rehabilitasi sebagai upaya mengembalikan fungsi pendengran dilakukan dengan pemasangan alat bantu dengar (hearing aid). Pemasangan alat bantu dengar hasilnya akan lebih memuaskan bila dikombinasikan dengan latihan membaca ujaran (speech reading) dan latihan mendengar (auditory training), prosedur pelatihan tersebut dilakukan bersama ahli terapi wicara.

Bab IV

Prinsip prinsip terapi, perawatan pencegahan penyakit pada sistem neuropersepsi

A. PRINSIP-PRINSIP TERAPI

Dalam penanganan kasus-kasus neurologi yang sering dilakukan adalah pemberian farmakoterapi, terapi operatif dan fisioterapi. Oleh karena jendela terapi , evaluasi dan diagnosis klinik harus dilakukan dengan cepat, sistematis dan cermat, maka sebaiknya sebelum melakukan terapi dilakukan terlebih dahulu evaluasi dan gejala klinik yang meliputi :

1. Anamnesis, terutama gejala awal awitan, apakah terjadi tiba-tiba, apakah ada nyeri, mual, muntah, rasa berputar, kejang, penurunan visual sampai kesadaran menurun dan gejala -gejala motorik, sensorik dan otonom yang dideritanya.
2. Pemeriksaan fisik, meliputi ABC, nadi, oksimetri, dan suhu tubuh. Pemeriksaan fisis dari kepala, leher, thoraks, jantung, kulit dan ekstremitas.
3. Pemeriksaan neurologik khusus meliputi status kesadaran, fungsi luhur, rangsang meningeal, nervus kranialis, sistem motorik, sensibilitas, dan otonom

Setelah melakukan evaluasi dan gejala klinik diatas, ditambah lagi dengan melakukan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi maka ditegakkanlah diagnosa penyakit. Setelah ditegakkan diagnosa maka dilakukan penanganan yang meliputi:

1. Penanganan farmakaterapi

Dalam klinik neurologi banyak dijumpai berbagai penyakit atau kelainan yang tidak secara langsung menimpa sistem saraf, misalnya pada kasus stroke, HNP, spondilosis, trauma dll. Penyakit infeksi juga dapat menyerang sistem saraf, sehingga mengharuskan dokter untuk mengetahui berbagai aspek anti infeksi antibiotika. Obat-obat yang digunakan pada kasus-kasus tersebut bukan hanya obat-obatan yang langsung berperan dan bertitik tangkap pada sistem saraf.

Obat dapat digunakan untuk :

- a. Menyembuhkan penyakit
- b. Menekan penyakit atau simptom
- c. Mencegah penyakit.

Untuk pengobatan jangka panjang misalnya pada hipertensi dan epilepsi, kepatuhan pasien harus dipelihara. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak patuhnya pasien yaitu:

- a. Pasien tidak puas pada dokter, hubungan dokter-pasien jelek
- b. Motivasi rendah
- c. Lupa
- d. Kesengajaan
- e. Informasi kurang
- f. Frekuensi dan kompleksitas aturan minum

Pilihan yang rasional dalam pengobatan meliputi :

- a. Diagnosis yang tepat
 - b. Pengetahuan yang berhubungan dengan patofisiologi penyakit
 - c. Kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu dalam praktek
 - d. Tindakan yang beralasan dalam menghubungkan patofisiologi dan farmakologi hingga dapat hasil pengobatan yang dikehendaki
 - e. Rencana untuk melakukan evaluasi dan pengukuran spesifik yang dapat menggambarkan daya guna dan toksisitas serta merancang terapi.
 - f. Penanganan kausal lainnya meliputi tindakan operatif, kemoterapi dan radioterapi.
2. Penanganan non framaka
- a. Fisioterapi
 - b. Edukasi
 - c. Intervensi lingkungan
 - d. Penanganan prilaku

B. PRINSIP-PRINSIP PERAWATAN

Masalah-masalah neurologis dapat mengakibatkan perubahan dalam kognitif, sensorik dan fungsi neuromuskular dan dapat merugikan citra diri seseorang. Sehingga perawat dan tim pelayanan kesehatan yang memberikan pengobatan, harus memberikan perawatan esensial, memberikan berbagai solusi untuk masalah yang ada, membantu klien meningkatkan kontrol dan menggali

sumber pendidikan dan pendukung yang ada dalam komunitas untuk memberikan bantuan. Sasarannya adalah untuk mencapai tingkat fungsi setinggi mungkin dan meningkatkan kualitas hidup bagi klien dan keluarga.

Bila penyakit bertambah parah, maka biasanya menyebabkan banyak rasa sakit, mengganggu kehidupan normal serta membuat ketidaknyamanan pasien. Modern Hospital Guangzhou (Stem Cell Research & Treatment Center) menunjukkan bahwa program pengobatan yang tepat adalah kunci untuk keberhasilan, namun perawatan yang tepat memiliki peran penting untuk meningkatkan efektivitas pengobatan. Perawatan yang tepat pada saat yang sama meningkatkan efektivitas, dan juga dapat membantu untuk mengurangi penderitaan pasien, meningkatkan keterampilan hidup pasien, dan meningkatkan kualitas hidup. Sehingga perawatan sangat penting diperhatikan .

Aplikasi pada proses keperawatan memerlukan bermacam-macam keterampilan perawatan, antara lain:

- Hubungan interpersonal meliputi komunikasi, mendengar, memberikan perhatian terbaru, pengetahuan dan informasi.
- Keterampilan tehnik ditunjang dengan penggunaan peralatan dalam pelaksanaan prosedur.
- Keterampilan intelektual yaitu problem solving, pemikir dan pendapat.

اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
 فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠٠﴾

Terjemahannya :

Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; Maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.

Secara psikologis, orang tidur dan orang mati adalah dua fenomena yang sama, yaitu dimana ruh terpisah dari jasad. Bedanya pada orang tidur, ruh dengan kekuasaan Allah dapat kembali kepada jasad saat orang itu terjaga, sedangkan pada orang mati tidak.

Ayat itu merupakan penjelasan atas orang yang mengalami koma. Secara fisik, orang yang koma tak ada bedanya dengan orang mati. Tapi ia tak dapat dinyatakan mati, karena secara psikis ada suatu kesadaran yang masih hidup. Pada saat orang koma, maka perawat juga tetap menjalankan fungsinya dengan memberikan terapi dan perawatan hingga akhirnya terbangun dari komanya.

Perawatan penyakit Sistem neuromotor perlu memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. Perawatan Pola Makan

Pola makan pasien dengan penyakit syaraf harus mengikuti prinsip-prinsip makanan cair yang lembut. Jika pasien memiliki gangguan menelan dan menyebabkan nafsu makan hilang, maka keluarga harus memberikan pasien makan bubur kental, sereal, kulit pangsit, telur kukus dan makanan lainnya; jika pasien tidak bisa makan, dapat menggunakan selang nasogastrik melalui hidung untuk membantu pasien memasukkan suplemen nutrisi. Perlu ditekankan, apakah makan semi cair atau makanan cair harus makanan yang lebih kecil, hal ini akan menghindari gangguan pencernaan, tetapi juga untuk memastikan asupan gizi yang memadai.

2. Perawatan psikologis

Penyakit syaraf jangka waktu lama, efek pengobatan konvensional lambat, dapat mempengaruhi fungsi syaraf pasien secara serius, mengakibatkan penurunan pada daya hidup pasien, memberikan tekanan besar bagi psikologis pasien, sampai tidak suka berbicara, emosi, sangat pemarah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, meningkatkan perawatan psikologis pasien merupakan bagian penting dari siklus penyakit syaraf. Dalam kehidupan sehari-hari, perawat perlu ngobrol-ngobrol dengan pasien, para perawat harus mengambil inisiatif untuk mendorong pasien untuk mempertahankan sikap optimis dan menjalankan pengobatan secara aktif.

3. Perawatan sehari-hari

Pasien dengan penyakit syaraf perlu mengenakan pakaian yang lembut, menyerap keringat, longgar hangat dan tepat. Juga harus memperhatikan perubahan iklim setiap harinya, membantu pasien mengganti pakaian, menghindari penyakit yang bertambah parah. Secara bersamaan juga harus mengatur jadwal kerja yang cukup, tidak begadang sepanjang malam, menjaga tetap hangat.

Pada pasien dengan atrofi otot yang mempengaruhi kegiatan sehari-hari, kita harus mencoba untuk menggunakan perlindungan atau alat bantu untuk mencegah cedera. Perawat atau anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari, harus membantu pasien untuk pijat, menghindari memperburuk kondisi atrofi otot.

4. Latihan yang tepat

Terlalu banyak bekerja membuat pasien sakit, tapi latihan yang tepat adalah salah satu langkah penting untuk rehabilitasi penyakit syaraf apalagi yang berhubungan dengan gangguan motorik. Latihan yang sederhana, seperti tai chi, senam kesehatan medis, Qigong, berjalan dan kegiatan lainnya, dapat membantu pasien untuk meningkatkan kebugaran fisik, mencegah eksaserbasi.

C. PRINSIP-PRINSIP PENCEGAHAN PENYAKIT NEUROPERSEPSI

Dalam Q.S. Surah Al Baqarah (2) ayat 155, dijelaskan bahwa penyakit yang diberikan oleh Allah adalah merupakan cobaan, sehingga bila ingin lulus dari

cobaan haruslah bersabar. Apalagi penyakit saraf bukanlah penyakit yang dapat sembuh dalam waktu singkat.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالسَّمَرَاتِ ۗ وَشِيرَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٦﴾

Terjemahannya

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

Pencegahan penyakit saraf pada umumnya sama dengan penyakit lainnya yang meliputi, perbaikan gaya hidup dan mengatasi berbagai faktor risiko. Upaya ini ditujukan pada orang sehat maupun kelompok resiko tinggi untuk terkena penyakit saraf, yaitu dengan :

a. Mengatur pola makan

Konsumsi makanan tinggi lemak dan kolesterol dapat meningkatkan resiko terkena serangan penyakit vaskular seperti stroke. Sebaliknya mengkomsumsi makanan rendah lemak jenuh dan kolesterol dapat mencegah terjadinya stroke. Beberapa jenis makanan yang dianjurkan untuk pencegahan yang bisa menurunkan kadar kolesterol yaitu serat larut yang banyak terdapat dalam biji-bijian, beta glukon, kacang kedele, kacang mede dapat menurunkan kolesterol.

Makanan yang kaya akan vitamin dan antioksidan yang terdapat dalam buah-buahan, sayuran dan biji-bijian.

b. Melakukan olah raga teratur

Melakukan aktivitas fisik yang mempunyai nilai aerobik, jalan cepat, bersepeda, berenang dan lain-lain secara teratur minimal 30 menit dan minimal 3 kali perminggu akan dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kadar kolesterol HDL.

- c. Menghentikan merokok
 - Merokok menyebabkan peninggian koagabilitas, viskositas darah, meninggikan kadar fibrinogen, meninggikan tekanan darah, menurunkan HDL, meningkatkan LDL dan menungkatkan hematokrit..
 - Perokok pasif resiko juga sama dengan perokok aktif
- d. Menghindari minum alkohol dan penyalahgunaan obat
- e. Memelihara berat badan layak
- f. Pemakaian kontrasepsi oral
- g. Penanganan stres dan istirahat yang cukup
- h. Pemeriksaan kesehatan teratur dan taat advis dokter dalam hal diet dan olahraga.

DAFTAR PUSTAKA

- Brunner, C, Suddarth, P. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*, Jakarta:EGC. 2010.
- Effendi, J. *Pesan-pesan Al-Qur'an*. Jakarta: Serambi. 2012.
- Epstein, Owen, dkk. *Clinical Examination*, Third Edition,. Toronto: Mosby. 2003
- Faiz O., Moffat D. *At a Glance Anatomy*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.
- Ganiswarna, S. *Farmakologi dan Terapi*. Jakarta: FKUI. 1995
- Gleadle, J. *At a Glance Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik*. Alih Bahasa dr Annisa Rahmalia; Erlangga, 2003.
- Glynn, TJ, Burnside, JW. *Diagnosis Fisik*. Penerjemah dr. Henny Lukmanto, Edisi 17, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran (EGC), 1995.
- Kaharuddin, T. *Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia*, Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Lang, A.E., Marsden, C.D. *Eye Movement Disorder in Basal Ganglia Diseases*. Disunting oleh F.C.Rose. London: Chapman and Hall London. 1983.
- Lumbangtobing, SM. *Neurologi Klinik, Pemeriksaan Fisik dan Mental*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Price S, Wilson L. *Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit*. Edisi 4. Jakarta: EGC. 1992.

- Saladin, Kenneth, S. *Human Anatomy*, third edition, Mc. Graw-Hill, 2011.
- Setiawati, S, Dermawan AC. *Panduan Praktis Pengkajian Fisik Keperawatan*, Edisi ketiga, Jakarta: Trans Info Media, 2008.
- Sidharta P, Dewanto. *Anatomi Susunan Saraf Pusat Manusia*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.1986.
- Sidharta, Priguna. *Tata Pemeriksaan Klinis*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Siregar, H, dkk. *Neuro Fisiologi*, Edisi Ketiga, Bagian Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Unhas, 1994.
- Sosialisman, Helmi. *Buku Ajar Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorokan, Kepala dan Leher*. Edisi V. Jakarta: FKUI. 2001.
- Swartz, MH. *Intisari Buku Ajar Diagnostik Fisik*, Alih bahasa dr. Ferdian Endrawan Pratama, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran (EGC), 1997.
- Thaller, SR, Granick MS. *Diagram Diagnostik Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan*, Alih bahasa Dr. Petrus Andrianto, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran (EGC), 1993.
- Tim Pengajar Bagian THT FKUI. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Telinga Hidung Tenggorokan*. Edisi ketiga, FKUI Jakarta, 1997.

RIWAYAT HIDUP



Rosdianah, lahir di Donggala, salah satu kota di Sulawesi Tengah pada tanggal 8 Juni 1971. Gelar Dokter diperoleh dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1996. Gelar Master dalam bidang Kesehatan diperoleh di Universitas yang sama pada tahun 2004. Sebelum menjadi Dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bertugas di Puskesmas Lampasio Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah sebagai Kepala Puskesmas sejak tahun 1997 sampai tahun 2009. Pada tahun 2008, mendapat penghargaan sebagai dokter teladan tingkat nasional. Saat ini, selain sebagai Dosen juga dipercayakan menjadi ketua Poliklinik UIN Alauddin Makassar.

SISTEM NEUROPERSEPSI
(Bagi Mahasiswa Jurusan Keperawatan)

Rosdianah



ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS