



# JURNAL FARMASI

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR



**PENERBIT : JURUSAN FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**JURNAL FARMASI**  
**FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**ISSN : 2355-9217**

**Jurnal Farmasi diterbitkan oleh Jurusan Farmasi  
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar**

**Penanggung Jawab : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc**

**Ketua Penyunting  
Hurria, S.Farm., M.Sc. Apt**

**Sekretaris Penyunting  
Khaerani, S.Farm., M.Klin., Apt**

**Tata Usaha dan Distribusi  
Zahabuddin**

**Mitra Bestari**

**Prof. Dr.H. Natsir Djide, M.S, Apt  
Prof.Dr. H. Tadjuddin Naid, M.Sc, Apt**

**Alamat Redaksi**

**Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar Jalan H. Yasin Limpo No.63 Samata-Gowa**

# DAFTAR ISI

Jurnal Farmasi UIN Alauddin Makassar  
ISSN : 2355-9217

Volume 4 No. 4  
Tahun 2016

- STUDI HUBUNGAN KUANTITATIF STRUKTUR-AKTIFITAS (HKSA), DOCKING MOLEKUL, PENELUSURAN FARMAKOFOR, VIRTUAL SCREENING, UJI TOKSISITAS, DAN PROFIL FARMAKOKINETIK SENYAWA TURUNAN 4-AMINOQUINOLIN PIRIMIDIN SEBAGAI ANTIMALARIA SECARA IN SILICO** 119-129  
*Afrisusnawati Rauf, Nursalam Hamzah, Ariwanti*
- UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DARI BEBERAPA EKSTRAK KULIT BATANG JAMBLANG (*Syzygium cumini*) MENGGUNAKAN METODE PEREDAMAN RADIKAL 2,2-DIPHENYL-1-PICRYLHYDRAZYL (DPPH)** 130-137  
*Fitriyanti Jumaetri Sami, Syamsu Nur, Sukriani Kursia, Sahibuddin A.Gani, Trito Reski Sidupa*
- UJI EFEK AFRODISIACA DARI EKSTRAK BAWANG PUTIH (*Allium sativum*) PADA HEWAN COBA MENCIT (*Mus musculus*)** 138-144  
*Maulita Indrisari, St. Rahimah, Abd Halim Umar, Ade Putri Allya*
- POTENSI PEMANFAATAN EKSTRAK SABUT KELAPA (*Cocos nucifera* Linn.) SEBAGAI ANTISEPTIK DALAM BENTUK SEDIAAN GEL** 145-151  
*Isriany Ismail, Haeria, Fitriani Fajri Ahmad*
- SUMBER ALTERNATIF BAHAN BAKU OBAT DIABETES MELLITUS DARI FUNGI ENDOFIT TANAMAN MAHONI (*Swietenia mahagoni* Jacq) DAN UJI AKTIVITAS INHIBITOR  $\alpha$ -GLUKOSIDASE** 152-157  
*Muthmainnah B*
- PREPARASI FITOSOM EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH KAKAO (*Theobroma cacao* L.) MENGGUNAKAN VARIASI KONSENTRASI FOSFATIDILKOLIN** 158-163  
*Karlina Amir Tahir, Sartini, Agnes Lidjaja*
- ANALISIS LOGAM BERAT KADMIUM (Cd) DALAM KERANG YANG BEREDAR DI PASAR TRADISIONAL DI KOTA MAKASSAR** 164-168  
*Syamsuri Syakri*
- FORMULASI DAN UJI STABILITAS FISIK KRIM SUSU KUDA SUMBAWA DENGAN EMULGATOR NONIONIK DAN ANIONIK** 169-178  
*Faridha Yenny Nonci, Nurshalati Tahar, Qoriatul Aini*
- FORMULASI DAN EVALUASI FISIK KRIM BODY SCRUB DARI EKSTRAK TEH HITAM (*Camellia sinensis*), VARIASI KONSENTRASI EMULGATOR SPAN-TWEEN 60** 179-185  
*Maria Ulfa, Nur Khairi, Fadillah Maryam*
- STUDI KEMAMPUAN PATI BIJI ALPUKAT (*Persea americana* Mill) PREGELATINASI SEBAGAI BAHAN PENGHANCUR PADA TABLET PARACETAMOL KEMPA LANGSUNG** 186-193  
*Surya Ningsi, Dwi Wahyuni Leboe, Karlina Amir Tahir, Qurratul Aen*



**STUDI HUBUNGAN KUANTITATIF STRUKTUR-AKTIFITAS (HKSA), DOCKING MOLEKUL, PENELUSURAN FARMAKOFOR, VIRTUAL SCREENING, UJI TOKSISITAS, DAN PROFIL FARMAKOKINETIK SENYAWA TURUNAN 4-AMINOQUINOLIN PIRIMIDIN SEBAGAI ANTIMALARIA SECARA IN SILICO**

**Afrisusnawati Rauf, Nursalam Hamzah, Ariwanti**

Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin,  
Makassar

**ABSTRACT**

A research of quantitative structure-activity relationship (QSAR), molecular docking, searching pharmacophore, virtual screening, toxicity test, and Pharmacokinetic Profile of 4-Aminoquinoline Pyrimidine Derivative Compounds as Plasmeprin enzyme inhibitor as Antimalarial by in silico has been conducted. This study aims to find the QSAR model equation of 4-Aminoquinoline Pyrimidine derivative compounds, to find pharmacophore features of compounds that responsible for inhibition activity of Plasmeprin enzyme in Plasmodium falciparum, as well as to select compounds from virtual screening results then determine the pharmacocinetic profile, and the toxicity of metabolites for malaria treatment. The procedure begins with the modelling and ab initio geometry optimization of the molecular structure by HyperChem 8.0. QSAR descriptors calculation, pharmacophore feature determination and molecular docking are done by using MOE 2009. Furthermore, toxicity testing by Toxtree and AdmetSAR, as well as pharmacokinetic profile determination by using PreADME done to 150.000 natural product compounds from zinc database. From the experiments, the equation obtained:  $1/IC_{50} = 5.3757 + (0.7514 AM1\_HOMO) + (-0.3100 \log P (o/w)) + (0.0065 vdw\_vol)$ , where  $r^2 = 0.9282$  dan  $q^2 = 0.9282$ , beside that molecular docking results for protein code 2IGX compound 13 showed better results with the value of docking score (S) is -129.7491. As for the compounds of zinc database, the result is a compound with code ZINC32501354 and ZINC32501366 are choosen compound among 150.000 compounds in terms of suitability of the pharmacophore query, docking by pharmacophore method, bioavailibility prediction using Lipinski rule of five and from the prediction of ADME/T

**Keywords** : QSAR, molecular docking, pharmacophore, antimalarial, Plasmeprin enzym

**PENDAHULUAN**

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan tidak ditularkan oleh nyamuk Anopheles (Lukman Hakim. 2011: 1). Malaria merupakan penyakit yang sampai saat ini masih menjadi masalah utama kesehatan penduduk dunia. Selama 100 tahun, dunia belum dapatmemberikan kontribusi yang jelas terhadap penyakit tersebut tidak

hanya menyerang daerah tropis, tetapi juga menyerang daerah subtropis di seluruh dunia Hal tersebut didukung oleh pernyataan Reisberg (1994) yang mengatakan bahwa kematian banyak terjadi pada negara-negara yang menjadi daerah endemik malaria, antara lain Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, India, Meksiko, Haiti, Amerika Tengah, dan



negara-negara Afrika (Hutomo *et al.* 2005 : 1).

Terapi golongan 4-aminoquinoline tetap menjadi garis depan obat pilihan untuk memerangi malaria bahkan setelah beberapa decade upaya pengembangan obat. Keberhasilan farmakofor antimalaria ini didasarkan pada kemanjurannya sangat baik secara klinis, kemudahan administrasi, toksisitas rendah, dan sintesis murah (Manohar (inhibisi). Senyawa-senyawa berbasis pirimidin terkenal dengan berbagai aktivitas biologisnya seperti fungisida, herbisida, analgesik, anti-inflamasi, antitumor, dan aktivitas antimalaria terlepas dari peran mereka dalam sintesis asam nukleat.

Pirimetamin, analog pirimidin, telah digunakan untuk pengobatan malaria dengan keberhasilan yang terbatas. Sebuah review penelitian oleh Manohar, *et al* (2012) yang mengembangkan perancah molekul struktural jenis baru untuk pengobatan malaria, mereka mengusulkan untuk menghubungkan 4-aminoquinoline dan pirimidin bersama-sama melalui penghubung diaminoalkane-linear yang tersambung secara fleksibel, sehingga molekul memiliki fleksibilitas yang cukup untuk muat pada situs pengikatan target, dan sebagai hasilnya, jenis molekul hibrida dapat menunjukkan aktivitas antimalaria yang lebih baik. Hal ini penting untuk

disebutkan di sini bahwa Chauhan *et al.* melaporkan sintesis konjugat 4-aminoquinoline pyrimidine dimana 4-aminoquinoline dan gugus pirimidin dihubungkan melalui cincin aromatik, dan beberapa senyawa ini telah menunjukkan aktivitas moderat (Manohar *et al.* 2012: 3).

Manohar, dkk (2012) juga telah melakukan studi SAR (*Structure Activity Relationship*) senyawa-senyawa turunan 4-aminoquinolin pirimidin tersebut terhadap aktivitasnya sebagai inhibitor *Plasmodium falciparum* berdasarkan afinitas pengikatan reseptornya yang sangat baik melalui radiometric assays sehingga dihasilkan aktivitas transkripsional antagonis (inhibisi) *Plasmodium f.* berupa IC<sub>50</sub> hasil evaluasi secara in vitro yaitu *HepG2 cell reporter Gene assays* terhadap satu seri senyawa turunan 4-aminoquinolin pirimidin.

Pada penelitian ini akan dilakukan studi HKSA *docking* molekuler penelusuran farmakofor, *virtual screening*, uji toksisitas, dan profil farmakokinetik terhadap senyawa turunan 4-aminoquinolin pirimidin. Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas (HKSA), dalam artian yang paling sederhana, adalah metode untuk membangun model komputasi atau matematika yang mencoba untuk menemukan korelasi yang signifikan secara statistik antara struktur dan fungsi menggunakan

teknik *chemometric* (Jitender Verma, 2010).

*Docking* molekuler adalah penggunaan komputisasi dalam memasang suatu molekul kecil pada reseptor (bagian ini sering didefinisikan sebagai sisi aktif dari enzim) melalui representasi yang dihasilkan komputisasi, yang diikuti oleh evaluasi struktur molekul dalam hal ini yaitu bentuk dan karakteristiknya seperti parameter elektrostatis (Gao, 2007; Abraham, 2003; Nadendla, 2004). *Searching* farmakofor secara hipotetik digambarkan sebagai *pharmacophore query*, yaitu seperangkat fitur *query* yang biasanya dibuat dari titik anotasi ligan.

## METODOLOGI PENELITIAN


### Bahan dan Alat

Pada penelitian ini digunakan base struktur molekul dan aktivitas inhibitor (IC<sub>50</sub>) hasil eksperimen secara *in vitro* dari 20 senyawa turunan 4-aminoquinolin pirimidin dari penelitian Sunny Manohar *et al* (2012). Data ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 0-1. Data aktivitas inhibisi (IC<sub>50</sub>) senyawa turunan 4-aminoquinolin pirimidin terhadap *Plasmodium falciparum* (Manohar, *et al*, 2012: 2)

Nama Senyawa	IC <sub>50</sub>	Log <sub>10</sub> IC <sub>50</sub>
6a	0.16	0.79579997
6b	0.33000001	0.48140001
6c	0.12	1.9208
6d	0.44	0.35600001
7a	0.20999999	0.67760003
7b	0.23999999	0.61900002
7c	0.17	0.76950002
7d	0.14	0.85360003
8b	0.02	1.6989
8c	0.02	1.6989
8d	0.05999999	1.2218
8e	0.02	1.6989
8f	0.02	1.6989
8h	0.02999999	1.5228
8i	0.005	2.3010001
8j	0.007	2.1547999
8k	0.02	1.6989
8l	0.007	2.1547999
8m	0.006	2.2218001
8n	0.02	1.6989

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat keras berupa satu buah komputer jinjing (notebook) dengan spesifikasi : Processor Intel® Pentium® Dual Core T4300 @ 2.1 GHz 2.1 GHz, RAM 2,00 GB dan harddisk 160 GB, yang memiliki perangkat lunak berupa sistem operasi Windows™ 8.1, Hyperchem® release 8.0, Molecular Operating Environment (MOE) release 2009.10 dan SPSS 17.0 for Windows.



Gambar 1. Struktur dasar 4-aminoquinolin pirimidin



## Prosedur Kerja

### **Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas**

Studi HKSA diawali dengan pemodelan struktur senyawa turunan 4-aminoquinolin-pirimidin menggunakan program HyperChem. Selanjutnya struktur senyawa dioptimasi menggunakan metode *Ab initio* dengan parameter basis set *small*

Setelah itu dilakukan kalkulasi descriptor menggunakan program MOE. Deskriptor yang dihitung adalah AM1\_E, AM1\_Eele, AM1\_HOMO, AM1\_LUMO, AM1\_dipole, AM1\_HF, log P (o/w), log S, glob, ASA\_H, ASA\_P, mr, vol, vdw\_vol dan VSA. Selanjutnya dilakukan perhitungan statistik. Semua variable dianalisis menggunakan regresi multilinear metode *backward*. Selanjutnya model-model yang terpilih divalidasi silang dengan metode *Leave One Out*. Persamaan HKSA yang terpilih adalah persamaan dengan nilai kriteria statistic terbaik dan memenuhi kriteria validasi yaitu  $q^2 \geq 0.5$  dan memiliki jumlah signifikansi tinggi pada analisis korelasi *pearson*.

### **Docking Molekuler**

Pada docking molekuler setelah ligan dalam bentuk struktur tiga dimensi dioptimasi dengan metode *Ab initio*, struktur diprotonasi dengan Protonasi 3D. Selanjutnya protein diunduh dari situs *RSCB.PDB* dengan kode 1G50 dan 3ERT. Molekul air kemudian dihapus dari struktur. Protein kemudian diprotonasi dengan langkah yang sama

pada preparasi ligan. Setelah itu dilakukan simulasi docking. Posisi *docking* terbaik dipilih berdasarkan nilai *rmsd* ( $\leq 2$ ) dan nilai *scoring* terendah.

### **Penelusuran Farmakofor**

Penentuan Sidik Jari Interaksi Ligan Protein (Protein-Ligand Interaction Fingerprint/PLIF): Sidik jari interaksi protein dengan ligan dibuat dengan menggunakan struktur-struktur protein reseptor yang diunduh dari situs *RCSB.PDB*. Seluruh struktur kemudian dibuka pada Jendela MOE dan disejajarkan sehingga rantai memiliki struktur yang sama yang akan bergerak bersama-sama sebagai satu unit. Dengan cara ini kompleks protein-ligan dapat disejajarkan. File kemudian disimpan sebagai database

Searching fitur farmakofor : Skema anotasi farmakofor otomatis membuat *query pharmacophore*, sehingga pada Jendela MOE akan terlihat fitur-fitur farmakofor yang terdapat pada senyawa penuntun. Kemudian dijalankan *pharmacophore search*, dan perbaikan *query*. Setelah itu penyelarasan (*alignment*) senyawa-senyawa dalam database konformasi. Virtual skrining dengan mendownload terlebih dahulu beberapa ribu senyawa dari zinc12 database. Senyawa-senyawa yang telah didownload kemudian disimpan sebagai database.

### **Studi bioavailabilitas**

Senyawa yang memiliki kelarutan dan permeabilitas yang buruk dapat diprediksi menggunakan rule of 5 lipinski.

Pada rule of 5 lipinski menyatakan bahwa absorbs dan permeasi yang kurang baik ketika suatu senyawa memiliki lebih dari lima donor ikatan hidrogen (ditunjukkan dengan jumlah OH dan NH), berat molekul lebih dari 500, Log P lebih dari 5 (atau MLogP lebih dari 4.15), terdapat lebih dari 10 akseptor ikatan H (ditunjukkan oleh jumlah N dan O).

### Uji toksistas

Prediksi ini dilakukan dengan menginput file struktur dalam bentuk \*.mol. Selanjutnya memilih metode penentuan kriteria toksistas pada senyawa. Estimasi dilakukan untuk melihat penentuan kriteria toksistas suatu senyawa berdasarkan toxtre. Sebelum melakukan estimasi maka dipilih *verbose explanation* untuk menentukan tingkatan dan detail dari hasil yang didapatkan. Selain Toxtree, digunakan juga admetSAR untuk mengetahui nilai toksistas.

### Studi farmakokinetik

Prediksi ini dilakukan dengan bantuan dari situs preadmet.bmdrc.org yang merupakan aplikasi berbasis web untuk memprediksi data ADME dan membangun sifat sifat *drug-like* menggunakan metode in siliko

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas

Dari sepuluh kombinasi tiga descriptor yang digunakan, persamaan yang dipilih berdasarkan

kriteria-kriteria statistik yaitu adalah persamaan pertama (Tabel 2) yaitu,  $\log 1/IC_{50} = 5.3757 + (0.7514 AM1\_HOMO) + (-0.3100 \log P (o/w)) + (0.0065 vdw\_vol)$ . Regresi multilinear terbaik yang berisi tiga deskriptor ini menghasilkan korelasi yang baik dengan hasil eksperimen ( $r^2 = 0.9282$ ) dan validasi silang LOO  $q^2$  0.9282.

Tabel 2. Kombinasi deskriptor dengan nilai kriteria statistik, validasi Leave One Out ( $q^2$ ), dan jumlah signifikansi pearson


No	Model	Statistik	Validasi	Jumlah
1	AM1_HOMO	0.9282	0.9282	1
2	AM1_HOMO, log P (o/w)	0.9282	0.9282	2
3	AM1_HOMO, log P (o/w), vdw_vol	0.9282	0.9282	3
4	AM1_HOMO, log P (o/w), vdw_vol, TPSA	0.9282	0.9282	4
5	AM1_HOMO, log P (o/w), vdw_vol, TPSA, MW	0.9282	0.9282	5
6	AM1_HOMO, log P (o/w), vdw_vol, TPSA, MW, HBD	0.9282	0.9282	6
7	AM1_HOMO, log P (o/w), vdw_vol, TPSA, MW, HBD, HBA	0.9282	0.9282	7
8	AM1_HOMO, log P (o/w), vdw_vol, TPSA, MW, HBD, HBA, HBD	0.9282	0.9282	8
9	AM1_HOMO, log P (o/w), vdw_vol, TPSA, MW, HBD, HBA, HBD, HBA	0.9282	0.9282	9
10	AM1_HOMO, log P (o/w), vdw_vol, TPSA, MW, HBD, HBA, HBD, HBA, HBD	0.9282	0.9282	10

Dari model persamaan yang terpilih, aktivitas senyawa turunan OBHS dipengaruhi oleh descriptor deskriptor yaitu AM1\_HOMO, log P (o/w), dan vdw\_vol, yang artinya dapat diusulkan untuk meningkatkan aktivitas senyawa turunan 4-aminoquinolin pirimidin



Tabel 3. perbandingan aktivitas IC<sub>50</sub> eksperimen dan aktivitas IC<sub>50</sub> prediksi

Nama Senyawa	IC <sub>50</sub> (Eksperimen)	IC <sub>50</sub> (Prediksi)
6a	0.16	0.186884
6b	0.33000001	0.195053
6c	0.12	0.314977
6d	0.44	0.175835
7a	0.20999999	0.173908
7b	0.23999999	0.262849
7c	0.17	0.279185
7d	0.14	0.0232
8a	0.02	0.040282
8c	0.02	0.041427
8d	0.03999999	0.016427
8e	0.02	0.01654
8f	0.02	0.028508
8h	0.02999999	0.009211
8i	0.005	0.007712
8j	0.007	0.014031
8k	0.02	0.007047
8l	0.007	0.007502
8m	0.006	0.01167
8n	0.02	0.186884



Gambar 2. Kurva hubungan aktivitas IC<sub>50</sub> eksperimen dan aktivitas IC<sub>50</sub> prediksi model persamaan terbaik

**Docking Molekuler**

Tabel 4 menunjukkan bahwa senyawa turunan 4-aminoquinolin pirimidin dapat mengikat Trp41, Phe111, Asp214 dan Asp34 pada protein kode 2IGX. Dari percobaan yang dilakukan diperoleh hasil dimana senyawa 13 memiliki interaksi dengan ligan protein 2IGX yang kuat dibandingkan senyawa lain dengan docking score (S) -129.7491. Kecocokan interaksi dari senyawa dan


ligan protein dapat dilihat pada interaksi ligan protein 2IGX dimana jika hasil dari docking senyawa memiliki interaksi yang sama dengan interaksi ligan protein 2IGX maka dapat diperkirakan senyawa tersebut memiliki efek yang sesuai berdasarkan kecocokan pengikatan asam amino.

Tabel 4. Hasil docking senyawa turunan 4-aminoquinolin pirimidin dengan protein 2IGX

No	Senyawa	Docking Score (S)	Interaksi	Residu	Interaksi	Residu	Interaksi	Residu	Interaksi
1	6a	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
2	6b	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
3	6c	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
4	6d	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
5	7a	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
6	7b	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
7	7c	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
8	7d	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
9	8a	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
10	8c	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
11	8d	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
12	8e	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
13	8f	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
14	8h	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
15	8i	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
16	8j	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
17	8k	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
18	8l	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
19	8m	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen
20	8n	-129.7491	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen	Trp41	Hydrogen




Gambar 3. Validasi Ligan asli 2IGX




Gambar 4. Interaksi senyawa 13 terhadap protein 2IGX

### Penelusuran Farmakofor


Terdapat 28 struktur protein Plasmepsin yang telah dilaporkan dan dapat di download dari situs RCSB PDB ([www.rcsb.org](http://www.rcsb.org)), tetapi hanya 8 struktur kompleks plasmepsin yang mengikat ligan yaitu dengan kode 1LEE, 1LF2, 1LF3, 1WH6, 2ANL, 2BJU, 2IGX dan 2IGY. Terlihat bahwa Tyr192A (pusat aromatik), Tyr17A (akseptor ikatan hidrogen), Asp214 (akseptor ikatan hydrogen), Asp3 (atom kationik dan donor ikatan hydrogen) merupakan asam amino yang penting dalam pengikatan antara ligand an enzim plasmepsin.



Gambar 5. Query Farmakofor



Gambar 6. jarak fitur farmakofor dalam query farmakofor



Gambar 7. Sidik jari interaksi ligan-protein

### Studi Bioavailabilitas

Dari 28 senyawa hasil virtual screening yang selanjutnya di docking dan didapatkan hasil docking dengan metode farmakofor diperoleh 4 senyawa dan 2 senyawa dengan angka Lipinski yang sama dengan 0, artinya tidak ada satupun aturan Lipinski yang dilanggar dan 2 senyawa tidak



mengikuti aturan Lipinski. Dengan demikian 2 senyawa yang sesuai tersebut dapat dikatakan memiliki bioavailabilitas yang baik sehingga jika dikonsumsi peroral dapat diabsorpsi dengan baik secara sistemik.

Tabel 5. Aturan Lipinski dari 10 senyawa hits terbaik

No	Senyawa	Log P	BB	Aturan Lipinski
1	ZINC32501354	1.12	112.11	1
2	ZINC32501354	1.03	141.49	0
3	ZINC32501354	1.10	141.49	0
4	ZINC32501366	1.42	155.15	1
5	ZINC34613455	1.42	155.15	1

Keterangan:

Aturan lipinski:

0 = Tidak ada masalah terdeteksi

1 = Kemungkinan memiliki absorpsi dan permeasi yang buruk

### Uji Toksisitas

Berdasarkan toxtree secara umum, kedua senyawa hits terbaik hasil virtual screening masuk dalam kelas 3 yaitu memiliki risiko toksisitas yang tinggi menurut aturan Kramer. Menurut Benigni/Bossa Rulebase, tidak ada senyawa yang bersifat genotoksik

karsinogenik. Berdasarkan prediksi Kroes TTC, ketiga senyawa memiliki risiko yang tinggi. Secara umum, 2 senyawa hits terbaik hasil virtual screening dapat dimetabolisme pada sitokrom P450. Ditinjau dari LD50 pada tikus, berikut urutan LD50 2 senyawa hits terbaik hasil virtual screening dari yang tertinggi hingga yang terendah yaitu ZINC32501354, ZINC32501354. Ditinjau dari pLC50 toksisitas pada ikan dengan urutan toksisitas tertinggi hingga terendah ZINC32501366, ZINC32501354. Nilai dari masing-masing LD50, pLC50, dan pIGC50 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil prediksi toksisitas dengan menggunakan toxtree dan AdmetSAR

No	Senyawa	Oral Rate	Benigni/Bossa Rulebase	CYPs	Kroes TTC	LC50 fish (mg/L)	LD50 rat (mg/kg)	IGC50 fish (mg/L)
1	ZINC32501354	1	1	1,2,3,4	1	2.140	0.870	0.173
2	ZINC32501366	1	1	1,2,3,4	1	2.781	0.267	0.180

Keterangan :

\* Micronucleous assay in rodent

\*\* The Benigni / Bossa rulebase for mutagenicity and carcinogenicity

\*\*\*Cytochrome P450-mediated drug metabolism

- = Baik                   √ = Kurang baik

### Prediksi Farmakokinetik



Berdasarkan prediksi farmakokinetik, 2 senyawa hits hasil virtual screening terbaik memiliki persentase penyerapan usus pada manusia berkisar antara 70-100% yang menandakan bahwa senyawa tersebut

dapat diserap dengan baik. Sedangkan seluruh senyawa memperlihatkan permeabilitas yang sedang pada sel Caco-2. Sel Caco-2 merupakan turunan dari kolon adenokarsinoma manusia memiliki berbagai jalur transport obat melalui epitel usus.

Senyawa ZINC32501354 dan ZINC32501366 menunjukkan angka masing-masing 0.195999 dan 0.254946 yang berarti kedua senyawa ini memiliki absorpsi yang sedang pada sistem saraf pusat.

Senyawa Senyawa ZINC32501354 dan ZINC32501366 menunjukkan pengikatan dibawah 90% yang menandakan bahwa kedua senyawa tersebut secara kimia terikat lemah pada protein plasma.

Tabel 7. Hasil prediksi farmakokinetik menggunakan PreADMET

No	Senyawa	BBB (Blood Brain Barrier) Permeability*	HI (Human Intestinal Absorption) (%)**	Plasma Protein Binding (%)***	Stm Permeability (cm sec)****	Caco-2 cell permeability (cm sec)****	MOE
1	 ZINC32501354	0.195999	94.877619	81.643336	-3.98114	32.1478	0.246868
2	 ZINC32501366	0.254946	94.876543	83.783826	-3.88187	29.8371	0.144899

\* Blood Brain Barriers, lebih dari 2.0 high absorption to CNS, 2.0 ~ 0.1 middle absorption to CNS, kurang dari 0.1 low absorption to CNS  
\*\* Human Intestinal Absorption, 0-20% poorly absorbed compounds, 20 ~ 70% moderately absorbed compounds, 70 ~ 100% well absorbed compounds

\*\*\* Plasma Protein Binding, lebih dari 90% chemicals strongly bound, kurang dari 90% chemicals weakly bounds

\*\*\*\* Caco-2 cell permeability, kurang dari 4 low permeability, 4 ~ 70 middle permeability, lebih dari 70 high permeability

## KESIMPULAN

1. Hubungan kuantitatif struktur-aktivitas senyawa turunan Benzimidazole sebagai inhibitor enzim psmepsin menunjukkan bahwa deskriptor yang berpengaruh terhadap aktivitas senyawa sebagaimana ditunjukkan dengan persamaan HKSA terbaik:  $\log 1/IC50 = 5.3757 + (0.7514 AM1\_HOMO) + (-0.3100 \log P (o/w)) + (0.0065 vdw\_vol)$ .
2. Senyawa turunan 4-Aminoquinolin Pirimidin dapat mengikat Trp41, Phe111, Asp214 dan Asp34 pada protein 2IGX. Interaksi yang terjadi antara senyawa-senyawa turunan 4-Aminoquinolin Pirimidin dengan reseptor ditunjukkan dengan nilai docking score (S), makin rendah nilai S maka interaksi antara keduanya makin kuat. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dimana pada protein kode 2IGX senyawa 13 menunjukkan hasil yang lebih baik dengan nilai docking score (S) - 129.7491.
3. Asam amino yang penting dalam interaksi reseptor dengan beberapa senyawa inhibitor enzim plasmepsin adalah Tyr192A (pusat aromatik), Tyr 17A (akseptor ikatan hidrogen), Asp214 (akseptor ikatan hidrogen), Asp34 (atom kationik dan donor ikatan hidrogen) merupakan



asam amino yang penting dalam pengikatan antara ligan dan enzim plasmepsin.

4. Hasil virtual screening menggunakan 150.000 senyawa natural product dari zinc database menunjukkan senyawa dengan kode ZINC32501354 dan ZINC32501366 merupakan senyawa yang terpilih diantara 150.000 senyawa dilihat dari sisi kecocokan pada query farmakofor, docking dengan metode farmakofor, prediksi bioavailabilitas menggunakan rule of 5 Lipinski, dan prediksi ADME/T.

#### KEPUSTAKAAN

- Abraham DJ, Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery. 6th ed. Volume 1. New York Willey Interscience. 2003 : h. 289
- Dluwzewski A.R., Mitchell G.H., Fryer P.R., Griffiths S., Wilson R.J.M, and Gratzer W. B., 1992. Origin of the Parasitoporous Vacuole membran of the malaria parasite *Plasmodium falciparum*, in human red blod cells. *journal of the Cell Science* 102: 527-532
- Dinakaran Murugesan, Alka Mital, Marcel Kaiser, David M. Shackleford, Julia Morizzi, Kasiram Katneni, Michael Campbell, Alan Hudson, Susan A. Charman, Clive Yeates, Ian H. Gilbert. *Discovery and Structure-Activity Relationships of Pyrrolone Antimalarials. Medicinal Chemistry.* 2013, 56: 2975-2990
- Dorta Simamora, Loeki Enggar Fitri. *Antimalarial Drug Resistance: Mechanism and The Role of Drug Combination in Preventing It.* *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, Vol. XXIII, No. 2, 2007: 82-91.
- Gao H, Nishida J, Saito S dan Kawabata J. *Inhibitory Effect of 5,6,7-Trihydroxyflavones on Tyrosinase.* *Molecules.* 2007 : h. 12, 90.
- Jitender Verma, Vijay M. Khedkar, Evans C. Coutinho. *3D-QSAR in Drug Design- A Review.* *Medicinal Chemistry.* 2010. 10: h. 95-115.
- Jo-Anne Chan, Katherine B. Howell, Linda Reiling, Ricardo Ataide, Claire L. Mackintosh, Freya J.I.Fowkes, Michaela Petter, Joanne M. Chesson, Christine Langer, George M. Warimwe, Michael F. Duffy, Stephen J. Rogerson, Peter C. Bull, Alan F. Cowman, Kevin Marsh, and James G. Beeson. *Targets of antibodies against Plasmodium falciparum-infected erythrocytes in malaria immunity. The Journal of Clinical Investigation*, 122 (9). 2012: 3227-3238.
- Jong Yeon Hwang, Takashi Kawasuji, David J. Lowes, Julie A. Clark, Michele C. Connelly, Fangyi Zhu, W. Armand Guiguemde, Martina S. Sigal, Emily B. Wilson, Joseph L. DeRisi, and R. Kiplin Guy. *Synthesis and evaluation of 7-substituted 4-aminoquinoline analogs for antimalarial activity. J. Med Chem.* 2011; 54(20): 7084-7093
- Lukman Hakim. *Malaria: Epidemiologi dan Diagnosis.* *Aspirator Vol. 3 No. 2 Tahun 2011* : 107-116.
- M. Rudrapal & D. Chetia. *Novel 4-aminoquinoline analogues as antimalarial agents: A review.* *Der Pharmacia Lettre*, 2011, 3(3): 29-36.

- Nadendla RR. Molecular Modelling : A powerfull Tool for Drug Design and Molecular Docking. J. Resonance. 9(5). 2004 : h. 51-60.
- Olliaro PL and Bloland PB. Clinical and public health implications of antimalarial drug resistance. In Antimalarial Chemotherapy: Mechanisms of Action, Resistance, and New Directions in Drug Discovery (ed. P. J. Rosenthal) Totowa, NJ: Humana Press. 2001; 65-83.
- Rahadi Hutomo, Sutarno, Wien Winarno, Kusmardi. 2005. Uji Antimalaria Ekstrak Buah Morinda citrifolia dan Aktivitas Makrofag pada Mencit (*Mus musculus*) setelah Diinfeksi *Plasmodium berghei*. *Biofarmasi*. 2005, 3 (2): 61-69
- Sardjono T.W., dan Fitri L.E. 2007. Malaria, Mekanisme terjadinya Penyakit dan Pedoman Penanganannya. Malang: Lab Parasit FKUB.
- Shikha S. Chauhan, Moni Sharma, Prem M. S. Chauhan. Trioxaquinones: hybrid molecules for the treatment of malaria. *Drug News & Perspective*, 23(10), 2010: 632-646.
- Siswandono dan Soekardjo Bambang. 2000. Kimia Medisinal. Airlangga University Press: Surabaya.
- Sunny Manohar, U. Chinna Rajesh, Shabana I. Khan, Babu L. Tekwani, Diwan S. Rawat. Novel 4-Aminoquinoline-Pyrimidine Based Hybrids with Improved in Vitro and in Vivo Antimalarial Activity. *Medicinal Chemistry*. 2012, 3: 555-559
- Talisuna AO, Bloland P and Alessandro AB. History. Dynamics, and Public Health Importance of Malaria Parasite Resistance. *Am. Soc. For Micro*. 2004; (17) 1: 235-254.
- Teun Bousema and Chris Drakeley. Epidemiology and Infectivity of *Plasmodium falciparum* and *Plasmodium vivax* Gametocytes in Relation to Malaria Control and Elimination. *Clinical Microbiology Reviews*, 2011: 377-410.
- Wellem TE & Plowe CV. Chloroquine Resistant Malaria. *J. Infect. Dis*. 2001; 184: 770-776.
- White NJ. Delaying Antimalarial Drug Resistance with Combination Chemotherapy. *Parasitologia* 1999; 41: 301-308.
- White NJ. Antimalarial Drug Resistance. *The Journal of Clin. Inves*. 2004; 113: 1084-1092.



# UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DARI BEBERAPA EKSTRAK KULIT BATANG JAMBLANG (*Syzygium cumini*) MENGGUNAKAN METODE PEREDAMAN RADIKAL 2,2-DIPHENYL-1-PICRYLHYDRAZYL (DPPH)

Fitriyanti Jumaetri Sami<sup>1</sup>, Syamsu Nur<sup>2</sup>, Sukriani Kursia<sup>1</sup>, Sahibuddin A.Gani<sup>1</sup>, Trito Residupa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar

<sup>2</sup>Akademi Farmasi Kebangsaan Makassar

## ABSTRAK

Jamblang (*Syzygium cumini*) merupakan salah satu buah lokal Indonesia. Semua bagian tanaman ini dapat digunakan untuk pengobatan salah satunya sebagai antioksidan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan potensi antioksidan dari beberapa ekstrak kulit batang jamblang dengan menggunakan kuarsetin sebagai pembanding. Kulit batang jamblang diekstraksi secara refluks dengan menggunakan pelarut etanol, etil asetat, dan n-heksan kemudian diuji potensi antioksidannya. Hasil penelitian diperoleh nilai  $IC_{50}$  ekstrak etanol kulit batang jamblang sebesar 164,3 ppm, ekstrak etil asetat kulit batang jamblang sebesar 237,7 ppm, ekstrak n-heksan kulit batang jamblang sebesar 5235,6 ppm. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol kulit batang jamblang memberikan aktivitas antioksidan yang lebih kuat dibandingkan dengan ekstrak lainnya. Namun hasil tersebut masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kuarsetin dengan nilai  $IC_{50}$  4,57 ppm.

**Kata Kunci :** Antioksidan, Kulit batang jamblang, DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhidrazyl)

## PENDAHULUAN

*Oxidative stres* merupakan salah satu penyebab dari beberapa penyakit seperti kanker, diabetes melitus, aterosklerosis, penyakit jantung, penuaan dan penyakit inflamasi. Proses tersebut disebabkan oleh radikal bebas yang mencari stabilitas melalui pasangan elektron dengan makromolekul biologis seperti protein, lipid, dan DNA dalam sel manusia yang sehat dan menyebabkan kerusakan pada protein dan DNA bersama dengan peroksidasi lipid (Ghosh, 2013).

Penelitian untuk mendapatkan antioksidan yang aman dari sumber alami yang ditemukan dalam sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta kacang-kacangan telah banyak dilakukan. Flavonoid, tanin,

polifenol, vitamin C, vitamin E, karotenoid merupakan golongan senyawa dari bahan alam yang berpotensi sebagai antioksidan (Prior, 2003).

Jamblang (*Syzygium cumini* (L.) Skoer) merupakan salah satu tanaman yang banyak mengandung golongan senyawa tersebut. Jamblang (*S. cumini*) merupakan salah satu buah lokal Indonesia. Buah jamblang memiliki rasa sepat asam dan berwarna ungu jika telah matang (Dzolimarta, 2003, Depkes RI, 1995).



Jamblang adalah pohon tropis hijau, sangat banyak tumbuh di Pakistan, India, Bangladesh dan Indonesia. Semua bagian tanaman ini digunakan untuk tujuan pengobatan. Studi praklinis menunjukkan bahwa batang, daun dan buah dari tanaman jamblang memiliki aktivitas sebagai antioksidan, anti inflamasi, obat cacing, antikanker, antibakteri, dan antidiabetes (Haroon, 2015). Pemanfaatan *S.cumini* secara empiris telah banyak digunakan dalam pengobatan secara tradisional. Beberapa penelitian melaporkan secara ilmiah bahwa bagian tanaman seperti daun dan buah dilaporkan memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Dimana hasil penelitian yang sudah ada menyatakan bahwa nilai IC<sub>50</sub> daun jamblang sebesar 12,84 ppm dan buah jamblang sebesar 319,89. Aktivitas antioksidan sangat kuat ditunjukkan oleh daun jamblang sehingga berpotensi dikembangkan sebagai antioksidan (Marliani et al, 2014). Aktivitas sebagai antioksidan diduga karena adanya senyawa flavonoid dan polifenol pada tanaman tersebut ( Shankara, et al, 2014 dan Azima, et al, 2013 ).

Data ilmiah dari daun dan buah *S.cumini* sebagai antioksidan telah banyak dilakukan. Tetapi belum banyak penelitian untuk bagian-bagian lain dari tanaman ini contohnya seperti kulit batang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan uji aktivitas antioksidan dari ekstrak kulit batang

jamblang (*Syzygium cumini*) dengan menggunakan metode DPPH.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Alat dan Bahan**

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah batang pengaduk, cawan porselin, gelas kimia, gelas ukur, labu ukur, seperangkat alat refluks, spektrofotometer UV-Vis, timbangan analitik, dan vial.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah Aquadest, DPPH, etanol 96%, etanol p.a, etil asetat, n-heksan, kulit batang jamblang (*Syzygium cumini*), larutan FeCl<sub>3</sub> 1%, HCl P., HCl 2 N, Kuarsetin, dan serbuk Mg.

### **Pengambilan sampel**

Sampel (*Syzygium cumini*) dikumpulkan dari Kelurahan Banyorang Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Pengolahan sampel**

Kulit batang jamblang (*Syzygium cumini*) yang telah dikumpulkan, disortasi basah dan dicuci dengan air mengalir, kemudian dirajang (dipotong kecil-kecil) lalu dikeringkan dalam lemari pengering, disortasi kering dan dilakukan proses ekstraksi.

### **Pembuatan Ekstrak**

Simplisia kulit batang sebanyak 400 gram diekstraksi dengan metode refluks. Simplisia dimasukkan dalam labu ekstraksi, kemudian ditambahkan dengan pelarut dan direfluks selama 3 jam. Ekstraksi sampel dilakukan masing-

masing dengan menggunakan 3 macam pelarut dengan kepolaran meningkat yaitu pelarut non-polar (*n*-heksana) dilanjutkan dengan pelarut yang kepolarannya sedang (etil asetat) dan terakhir menggunakan pelarut polar (etanol), sehingga diperoleh masing-masing ekstrak dengan pelarut berbeda. Kemudian sampel diuapkan sampai didapatkan ekstrak kental.

#### **a. Identifikasi Senyawa dengan Uji Pendahuluan**

##### ***Uji Flavonoid***

Ekstrak 0,1 gram dalam cawan ditambahkan 2 mL etanol kemudian diaduk, ditambahkan serbuk Mg 0,1 g dan 3 tetes HCL pekat. Terbentuknya warna jingga sampai merah menunjukkan adanya flavon, merah sampai merah padam menunjukkan flavanol, merah padam sampai merah keunguan menunjukkan flavanon (Mojab et al, 2003).

##### ***Uji Saponin***

Ekstrak 0,1 gram dalam tabung reaksi ditambahkan 2 mL etanol kemudian diaduk, ditambahkan dengan 10 mL aquadest dan dikocok kemudian didiamkan selama 15-20 menit. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya busa (Mojab et al, 2003).

##### ***Uji Polifenol***

Ekstrak 0,1 gram dalam cawan ditambahkan dengan 1 mL larutan FeCl<sub>3</sub> 1%. Jika terbentuk warna biru tua, biru kehitaman atau hitam kehijauan. Menunjukkan adanya senyawa polifenol (Jones dan Kinghorn, 2006)

#### ***Uji Tanin***

Ekstrak 0,1 gram dalam cawan ditambahkan 2 mL etanol kemudian diaduk, ditambahkan FeCl<sub>3</sub> sebanyak 3 tetes, jika menghasilkan biru karakteristik, biru-hitam, hijau atau biru-hijau endapan (Mojab et al, 2003).

#### **b. Uji Aktivitas Antioksidan**

##### ***Pembuatan Larutan DPPH***

Serbuk DPPH 4 mg dilarutkan dalam etanol p.a hingga 50 mL dalam labu ukur, sehingga diperoleh larutan DPPH 0,2 mM

##### ***Pembuatan Larutan Sampel***

Masing-masing sampel ditimbang 100 mg dan dilarutkan dengan 1 mL DMSO, dan dicukupkan volumenya dengan etanol p.a 10 mL diperoleh 1000 ppm. Kemudian diencerkan menjadi 100 ppm dengan memipet sebanyak 5 mL larutan stok dan dicukupkan volumenya dengan etanol p.a sampai 50 mL. Lalu dibuat seri konsentrasi dari 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, dan 250 ppm. Dengan cara memipet sebanyak 0,5 mL; 1 mL; 1,5 mL; 2 mL; dan 2,5 mL dan dicukupkan volumenya dengan etanol p.a sampai 10 mL untuk ekstrak etanol dari etil asetat kulit batang jambang. Untuk ekstrak *n*-Heksan dari 10000 ppm tersebut langsung dibuat seri konsentrasi 1000 ppm, 2000 ppm, 4000 ppm, 5000 ppm, dan 6000 ppm. Dengan cara memipet larutan stok sebanyak 1 mL; 2 mL; 4 mL; 5 mL; dan 6 mL dan dicukupkan volumenya dengan etanol p.a sampai 10 mL. Kemudian diukur absorbansinya.



### **Pembuatan Larutan Kontrol Positif (Kuarsetin)**

Ditimbang serbuk kuarsetin sebanyak 25 mg dalam 25 mL (1000 ppm). Diencerkan menjadi 100 ppm dengan memipet 1 mL larutan stok dan dicukupkan volumenya sampai 10 mL. Lalu dibuat seri konsentrasi 5 ppm; 7,5 ppm; 10 ppm; 12,5 ppm; dan 15 ppm. Dengan cara memipet larutan stok sebanyak 0,5 mL, 0,75 mL, 1 mL, 1,25 mL, dan 1,5 mL dan dicukupkan volumenya dengan etanol p.a sampai 10 mL. Kemudian diukur absorbansinya.

### **Pengukuran Serapan Larutan Blanko DPPH**

Larutan DPPH 0,2 mM di pipet sebanyak 1 mL dan ditambahkan etanol p.a sebanyak 4 mL dalam labu ukur. Larutan ini kemudian dihomogenkan dan didiamkan selama 30 menit. Selanjutnya dilakukan pengukuran serapan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 500 – 550 nm hingga diperoleh panjang gelombang maksimum 515 nm.

### **Pengukuran Aktivitas Antioksidan Sampel Dengan DPPH**

Pengujian dilakukan dengan memipet masing – masing konsentrasi dari ekstrak etanol, etil asetat, dan n-Heksan sebanyak 1 mL. Kemudian ditambahkan 1 mL larutan DPPH dan dicukupkan dengan etanol p.a sampai 5 mL lalu dihomogenkan. Sampel di inkubasi ditempat gelap selama 30 menit. Selanjutnya serapan diukur dengan

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm.

### **Pengukuran Aktivitas Antioksidan Kuarsetin Dengan DPPH**

Pengujian dilakukan dengan memipet masing – masing konsentrasi dari kuarsetin sebanyak 1 mL. Kemudian ditambahkan 1 mL larutan DPPH dan dicukupkan dengan etanol p.a sampai 5 mL lalu dihomogenkan. Sampel di inkubasi ditempat gelap selama 30 menit. Selanjutnya serapan diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm.

### **Analisis Data**

Data diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dari pengukuran potensi antioksidan ekstrak kulit batang jambang, dimana presentase pengikatan DPPH yang dihasilkan oleh masing-masing konsentrasi uji kemudian ditabulasi dan dihitung nilai  $IC_{50}$  berdasarkan konsentrasi dan absorbansi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil uji pendahuluan dari beberapa ekstrak kulit batang jambang (*Syzygium cumini*) yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. Hasil uji pendahuluan dari beberapa ekstrak kulit batang jamblang (*Syzygium cumini*)**

Golongan Senyawa	Hasil Pemeriksaan		
	Ekstrak Etanol	Ekstrak Etil Asetat	Ekstrak N-Heksan
Flavonoid	+	-	-
Polifenol	+	-	-
Saponin	+	+	-
Tanin	+	-	-

Keterangan :

(+) = Mengandung senyawa yang diuji

(-) = Tidak mengandung senyawa yang diuji

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa pada ekstrak etanol kulit batang jamblang mengandung senyawa flavonoid, polifenol, saponin, dan tanin. Sedangkan pada ekstrak etil asetat dan ekstrak n-heksan kulit batang jamblang tidak mengandung senyawa yang diujikan.

Berdasarkan hasil uji aktivitas antioksidan secara kuantitatif dari beberapa ekstrak kulit batang jamblang (*Syzygium cumini*) yang dilakukan dengan beberapa variasi pelarut dan seri konsentrasi dengan metode DPPH dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2. Hasil uji aktivitas antiosida secara kuantitatif dari beberapa ekstrak kulit batang jamblang (*Syzygium cumini*)**

Sampel	Konsentrasi (ppm)	Rata-rata % inhibisi	Nilai IC <sub>50</sub>
Ekstrak Etanol	25	19,11	164,3 ppm
	50	25,75	
	100	39,21	
	150	49,08	
	200	61,31	
	250	83,13	
	500	92,30	
Ekstrak Etil Asetat	25	18,51	237,7 ppm
	50	19,07	
	100	24,94	
	150	36,54	
	200	43,28	
	250	60,19	
Ekstrak N-Heksan	500	9,94	5235,6 ppm
	1000	23,78	
	2000	30,07	
	4000	42,71	
	5000	49,96	
	6000	58,64	
Kuarsetin	5	51,96	4,57 ppm
	7,5	77,23	
	10	86,19	
	12,5	86,68	
	15	89,14	

Metode DPPH merupakan salah satu cara untuk menentukan aktivitas antioksidan berdasarkan pada kemampuan antioksidan untuk menghambat radikal bebas dengan mendonorkan atom hidrogen. Keuntungan dari metode ini yaitu mudah digunakan, mempunyai tingkat sensitivitas yang



tinggi, dan dapat menganalisis sejumlah besar sampel dalam jangka waktu yang singkat. Panjang gelombang yang digunakan adalah panjang gelombang yang memiliki absorbansi maksimal. Pemilihan panjang gelombang maksimal dilakukan untuk untuk meminimalkan kesalahan pada saat pengukuran sehingga data yang didapat akurat. Hasil pengukuran panjang gelombang DPPH adalah 515 nm dengan absorbansi 0,948.

Tiap konsentrasi yang diperoleh kemudian diukur pada spektrofotometer UV-Vis dengan kuarsetin sebagai pembanding (kontrol positif). Kuarsetin adalah golongan senyawa flavonoid yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Mekanisme kuarsetin sebagai antioksidan sekunder adalah dengan cara memotong reaksi oksidasi berantai radikal bebas atau dengan cara menangkapnya (Winarsi, 2007). Penggunaan kuarsetin sebagai pembanding untuk mengetahui seberapa kuat potensi antioksidan yang ada pada ekstrak kulit batang jambang jika dibandingkan dengan kuarsetin yang merupakan senyawa murni. Aktivitas antiradikal bebas ditunjukkan dengan nilai  $IC_{50}$ . Nilai  $IC_{50}$  merupakan nilai konsentrasi antioksidan untuk meredam 50% aktivitas radikal bebas. Tingkat kekuatan antioksidan dengan metode DPPH dikatakan sangat aktif apabila memiliki nilai  $IC_{50} < 50$  ppm, aktif 50 – 100 ppm, sedang 101 – 250 ppm, lemah 250-500 ppm, dan tidak aktif  $> 500$  ppm (Jun et al, 2003).

Berdasarkan hasil pengujian aktivitas antioksidan dengan metode DPPH menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit batang jambang mempunyai nilai  $IC_{50}$  sebesar 164,3 ppm, sedangkan ekstrak etil asetat kulit batang jambang mempunyai nilai  $IC_{50}$  sebesar 237,7 ppm, lalu ekstrak n-heksan kulit batang jambang mempunyai nilai  $IC_{50}$  sebesar 5235,6 ppm dan kuarsetin mempunyai nilai  $IC_{50}$  sebesar 4,57 ppm. Jadi dapat diketahui bahwa ekstrak etanol kulit batang jambang memiliki aktivitas peredaman radikal bebas yang sedang dan lebih baik dari ekstrak etil asetat dan ekstrak n-heksan kulit batang jambang. Sedangkan ekstrak etil asetat kulit batang jambang memiliki aktivitas peredaman radikal bebas yang lemah, lalu ekstrak n-heksan kulit batang jambang tidak memiliki aktivitas peredaman radikal bebas. Hal ini disebabkan karena tingkat kepolaran dari pelarut yang digunakan dimana etanol adalah pelarut polar sehingga dapat menarik banyak senyawa. Hal ini juga didukung oleh uji pendahuluan yang dilakukan dimana ekstrak etanol positif memiliki kandungan senyawa flavonoid, polifenol, saponin dan tanin. Menurut Prior (2003), senyawa - senyawa tersebut merupakan senyawa metabolit sekunder dari alam yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Sedangkan pada ekstrak n-heksan tidak memiliki aktivitas antioksidan, dikarenakan n-heksan merupakan pelarut senyawa non polar

sehingga hanya dapat menarik senyawa tertentu yang juga bersifat non polar.

Hasil pengukuran nilai  $IC_{50}$  dari ekstrak etanol, ekstrak etil asetat, dan ekstrak n-heksan juga menunjukkan bahwa lebih besar jika dibandingkan dengan kuarsetin yaitu sebesar 4,57 ppm yang artinya kuarsetin memiliki aktivitas peredaman radikal bebas yang sangat aktif. Hal ini menunjukkan bahwa daya antioksidan dari ketiga ekstrak tersebut memiliki aktivitas antioksidan yang lebih kecil dibanding daya antioksidan dari kuarsetin dengan metode DPPH. Hal ini disebabkan karena ekstrak etanol, ekstrak etil asetat, dan ekstrak n-heksan kulit batang jamblang masih merupakan ekstrak kasar bukan senyawa murni atau isolat. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi hasil tersebut adalah pemilihan metode ekstraksi. Dimana metode ekstraksi yang dipilih adalah metode refluks yang karena adanya pemanasan selama 3-4 jam sehingga bisa jadi ada senyawa yang rusak akibat adanya proses pemanasan tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai  $IC_{50}$  ekstrak etanol kulit batang jamblang sebesar 164,3 ppm, ekstrak etil asetat kulit batang jamblang sebesar 237,7 ppm, dan ekstrak n-heksan kulit batang jamblang sebesar 5235,6 ppm. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol kulit batang jamblang memberikan aktivitas

antioksidan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan ekstrak lainnya. Namun hasil tersebut masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kuarsetin dengan nilai  $IC_{50}$  4,57 ppm.

## KEPUSTAKAAN

- Armala, M. *Daya Antioksidan Fraksi A Ekstrak Herba Kenikir (Cosmos caudatus H.B.K) dan Profil KLT*. Skripsi: Fakultas Farmasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2009. 39.
- Dalimartha, S. *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*. Jilid 3. Trubus Agrıwidyaa Jakarta. 2003.
- Gandjar, Ibnu G dan Abdul R. *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta Pustaka pelajar. 2007.
- Ghosh, S. *Phytochemical Analysis and Free Radical Scavenging Activity of Medicinal Plants Gnidia glauca and Dioscorea bulbifera*. India : Institute of Bioinformatics and Biotechnology University of Pune. 2013.
- Haroon, R., Jelani, S., Arshad, F.K. *Comparative analysis of antioxidant profiles of bark, leaves dan seeds of syzigium cumini (Indian blacberry)*. Vol 3. IJRG. 2015.
- Hasty, S. *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Rimpang Kencur (Kaempferia galangal) dengan metode DPPH*. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2009.
- Jacinto. *Determining the Antioxidant Property of Plant Extracts : A Laboratory Exercise*. Vol 5. Asian Journal of Biology Education. 2011.



- Jones, W.P. dan Kinghorn, A.D. *Extraction of Plant Secondary Metabolites*, In: Sarker, S.D., Latif, Z. dan Gray, A.I., eds. *Natural Products Isolation*. 2nd Ed. Humana Press. New Jersey. 2006.
- Jun, M.H.Y., Fong, X., Wan C.S, Yang, C.T. and Ho. *Comparison of antioxidant Activities of Isoflavones from kudzu root (Pueraria Labata Ohwi)*. *J Food Sci. Institute Of Tecnology*. 2003. 68 : 2117-2122.
- Marliani, L., Kusriani, H., dan Indah Sari, N. *Aktivitas Antioksidan Daun dan Buah Jamblang (Syzygium cumini L.)* Skeel. Sekolah tinggi Ilmu Farmasi Bandung. 2014.
- Mojab, F., Kamalmejad, M., Ghaderi, N., & Vahidipour, H. R. *Phytochemical Screening Of Some Species Of Iranian Plants*. *Iranian Journal Of Pharmaceutical Research*. 2004. Pp.77-82.
- Molyneux, P. *The Use Of The Stable Frss Radical Diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) For Estimating Antioxidant Activity*. *Songklanakarinn J.,Sci, Technol*. 2004. 26.
- Prior R L. *Fruits and Vegetables in The Prevention of Cellular Oxidative Damage*. *Am J Clin Nutr*. 2003. 78, 570.
- Shankara.,R et al. *Antioxidant activity of Syzygium cumini leaf gall extracts*. *BiolImpacts*.4(2).<http://bi.tbzmed.ac.ir> . 2014. 101-107.
- Sudarsono, Didik G., Subagus W., Imono A.D., Purnomo. *Tumbuhan Obat II*. UGM Press. Yogyakarta. 2002.
- Suhartono. *Peran Rebusan Daun Tapak Darah (Catharunthus roseus L) Sebagai Antioksidan Dalam Menghambat Fotooksidasi Cairan Nutrisi Parenteral Glukosa*. Vol 9. *Majalah Obat Tradisional*. 2004.
- Trilaksani, W. *Jenis, Sumber, Mekanisme Kerja Antioksidan dan Peran Terhadap Kesehatan*. Institut Pertanian Bogor. 2003.
- Widyastuti, N. *Pengukuran Aktivitas Antioksidn dengan Metode CUPRAC, DPPH, dan FRAP serta Korelasinya dengan Fenol dan Flavonoid pada Enam Tanaman*. Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. 2010.
- Widyaningrum, H dan Tim Solusi Alternatif. *Kitab Tanaman Obat Nusantara*. MedPress. Yogyakarta. 2011.
- Winarsi, H. *Antioksidan Alami dan Radikal Bebas..* Biro Pusat Statistik. (1992). *Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia, Tahun 1976-1990*. Jakarta: BPS. Kanisius. Yogyakarta. 2007.
- Youngson, Robert. *Antioksidan Manfaat Vitamin C & E Bagi Kesehatan*. Arcan. Jakarta. 2005.

# UJI EFEK AFRODISIACA DARI EKSTRAK BAWANG PUTIH (*Allium sativum*) PADA HE COBA MENCIT (*Mus musculus*)

Maulita Indrisari<sup>1</sup>, St. Rahimah<sup>2</sup>, Abd Halim Umar<sup>1</sup>, Ade Putri Allyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Akademi Farmasi Kebangsaan

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi

## ABSTRACT

Garlic (*Allium sativum*) empirically used as a stamina enhancer, potential afrodisiaca. The purpose of this study was to determine whether the ethanol extract of the effect as an aphrodisiac in male mice as animals models and used ICC (Introd, Climbing, and Coitus) as parameters by treated with Garlic extracted Garlic was extracted, maceration with ethanol 70 %. Animal tests were used 15 male mice and 15 female mice divided into five treatment groups. Each group consists of 3 males and 3 females. The group was given with Na.CMC 1 % as a negative control, the second group was Pasak bumi as a positive control, a group III were given ethanol extract of garlic 150 mg/kg, group IV were given ethanol extract of garlic 200 mg/kgBB and group 5 was given ethanol the garlic 300 mg/kg BB.As The results showed ethanol extract of the garlic 300 Mg/kg can act as aphrodisiac in experimental animals male mice (*Mus musculus*).

**Keywords** : Garlic (*Allium sativum*), Aphrodisiac, ICC parameters (Introducing, Climbing, Coitus)

## PENDAHULUAN

Kebutuhan biologis manusia tidak terlepas dari aktivitas seksual yaitu untuk mendapatkan keturunan. Aktivitas seksual yang baik sangat dibutuhkan dalam suatu hubungan agar mencapai keharmonisan rumah tangga yang baik. Namun difungsi seksual kerap menghampiri beberapa pasangan dan membuat ketidak nyamanan salah satu pihak (Hidayat, 2012).

Difungsi seksual merupakan suatu keadaan dimana mengalami kesulitan dalam berhubungan seksual. Disfungsi seksual meliputi difungsi ereksi, impotensi, ejakulasi dini dan gangguan hasrat (libido). Penyebab difungsi seksual dapat dibagi menjadi dua, yaitu gangguan yang

disebabkan oleh faktor fisik dan psikis (Harmusyanto, 2013). Gangguan yang disebabkan faktor fisik adalah gangguan seksual akibat keseh kebiasaan merokok, kurang olahraga faktor genetika. Gangguan yang disebabkan oleh faktor psikis disebabkan oleh gangguan akibat stress, depresi, rasa khawatir berlebihan (Arisandi, 2006)

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk menangani disfungsi seksual yaitu dengan cara mengkonsumsi obat kimia yang mana biasanya kimia menimbulkan beberapa efek tidak diinginkan, oleh karena itu masyarakat biasanya lebih tertarik menggunakan





bumi sebanyak 49,32 mg, dilarutkan di aquadest sebanyak 10 ml, kemudian dipanaskan sampai mendidih dan disaring

- c. Ekstrak etanol bawang putih 150 mg/kg BB : Ditimbang ekstrak bawang putih sebanyak 471 mg, kemudian dilarutkan di Na-CMC 1 %, diaduk hingga homogen.
- d. Ekstrak etanol bawang putih 200 mg/kg BB : ditimbang ekstrak etanol bawang putih sebanyak 693 mg, kemudian dilarutkan di Na-CMC 1 %, diaduk hingga homogen.
- e. Ekstrak etanol bawang putih 300 mg/kg BB : ditimbang ekstrak etanol bawang putih sebanyak 990 mg, kemudian dilarutkan di Na-CMC 1 % diaduk hingga homogen.

#### Penyiapan Hewan Uji

Hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan dan betina dengan bobot 20-30 g sebanyak 15 ekor, masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor jantan dan betina dengan pembagian kelompok sebagai berikut :

1. Kelompok I diberi Suspensi Na-CMC 1 % sebagai kontrol Negatif
2. Kelompok II diberi Sediaan Pasak Bumi sebagai kontrol positif
3. Kelompok III diberi ekstrak etanol bawang putih (*Allium sativum*) dengan dosis 150 mg/kg BB
4. Kelompok III diberi ekstrak etanol bawang putih (*Allium sativum*) dengan dosis 200 mg/kg BB

5. Kelompok III diberi ekstrak bawang putih (*Allium sativum*) dengan dosis 300 mg/kg BB

#### Perlakuan Hewan Uji

Mencit jantan terlebih dahulu dipuaskan selama 8 jam, kemudian diberikan sediaan secara oral, volume pemberian sesuai dengan badan mencit. Setelah itu, mencit dimasukkan dalam kandang yang tersedia mencit betina. Dimana kandang berisi 1 ekor mencit dan betina. Dilakukan pengamatan selama 2 jam setiap hari selama berturut-turut, yaitu dengan cara mengamati :

1. *Introducing* yaitu interval waktu perkenalan pada hewan betina saat tunggangan pertama oleh jantan
2. *Climbing* yaitu jumlah tunggangan dilakukan oleh mencit jantan sel ejakulasi dalam waktu 2 jam setelah pemberian sediaan, selama 5 hari
3. *Coitus*, yaitu interval waktu saat sekali tunggangan yang dilakukan mencit jantan



## SIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Pengamatan Parameter ICC pada hewan coba mencit setelah diberi ekstrak etanol bawang putih


Perlakuan	Replikasi	Pengamatan		
		Introducing (Detik)	Climbing (Kali)	Coitus (Detik)
Kontrol (-)	I	3110	0	0
	II	3130	1	12
	III	3010	0	0
Na-CMC	Rata-Rata	3083	0,3	4
Kontrol (+)	I	3130	2	29
	II	3810	2	40
	III	3240	2	50
Jamu Pasak Bumi	Rata-Rata	3393	2	39,6
Ekstrak bawang putih 150 mg/kg BB	I	3101	0	0
	II	2940	1	20
	III	3230	1	22
	Rata-Rata	3090	0,6	
Ekstrak bawang putih 200 mg/kg BB	I	3310	2	30
	II	3350	1	20
	III	3120	0	0
	Rata-Rata	3260	1	16,6
Ekstrak bawang putih 300 mg/kg	I	4270	2	40
	II	3510	1	30
	III	3010	2	45
	Rata-Rata	3596	1,6	38,3

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah bawang putih. Dimana ekstrak etanol bawang putih (*Allium sativum*) diduga memiliki kandungan senyawa seperti Flavonoid, alkaloid, dan saponin yang berkhasiat

sebagai afrodisiaka. Pada penelitian ini digunakan parameter ICC (*Introducing, Climbing, dan Coitus*) dilakukan selama 5 hari pengamatan dalam rentang waktu 2 jam. Ekstrak dibagi dalam 3 kelompok perlakuan yaitu ekstrak etanol bawang putih (*Allium sativum*) dengan dosis 150 mg/kg BB, 200 mg/kg BB dan 300 mg/kg BB.

Hasil penelitian efek ekstrak etanol bawang putih (*Allium sativum*) sebagai afrodisiaka pada mencit jantan dengan parameter ICC (*Introducing, Climbing, dan Coitus*) didapatkan hasil sebagai berikut :

### 1. Introducing



Gambar 1. Grafik rata-rata Introducing pada aktifitas seksual mencit jantan


*Introducing* yaitu waktu dimana hewan coba mencit jantan mulai mendekati mencit betina sampai terjadi tunggangan pertama sebagai penggambaran libido. Aktivitas *Introducing* pada mencit jantan dimulai 5-10 menit setelah mencit diberikan sediaan, hal ini tidak berbeda dengan hasil Penelitian Nurjanna (2010), yang mengatakan bahwa sediaan mulai bekerja 4-6 menit setelah mencit jantan diberikan sediaan.

Berdasarkan diagram pada gambar 1, dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata

*introducing* mencit jantan yang diberikan dosis ekstrak bawang putih 150 mg/kgBB menunjukkan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan kontrol positif jamu pasak bumi

Menurut penelitian Prita 2010, waktu *introduction* yang relatif lama (onset) dapat meningkatkan libido atau hasrat seksual seseorang sehingga dengan meningkatnya libido maka akan timbul dorongan seksual yang kuat.

## 2. Climbing




**Gambar 2. Grafik rata-rata Climbing pada aktifitas seksual mencit jantan**

Aktivitas *Climbing* adalah jumlah tunggangan yang dilakukan oleh mencit jantan sebelum ejakulasi dalam waktu 2 jam. Berdasarkan pada tabel 1 dan gambar grafik 2, menunjukkan bahwa tidak semua perlakuan melakukan aktivitas *climbing*. Pada dosis ekstrak 300 mg/kg BB terjadi aktifitas *climbing* sebanyak 1-2 kali, sedangkan kontrol positif jamu pasak bumi jumlah *climbing* 2. Aktivitas *climbing* pada mencit jantan terus meningkat seiring dengan peningkatan dosis ekstrak bawang putih. Hal ini tidak berbeda dengan hasil penelitian

Nining (2011), yang menunjukkan pemberian ramuan cabe jawa pegas temulawak pada mencit sebagai afrodizak yang menunjukkan aktivitas *climbing*, mencit meningkat seiring dengan pemberian dosis ramuan cabe jawa

Menurut penelitian Maulana yang menunjukkan bahwa aktivitas mencit jantan berupa *Climbing* terjadi 1-2 kali per 2 jam dalam masa kawin jantan.

## 3. Coitus



**Gambar 3. Grafik rata-rata Coitus pada aktifitas seksual mencit jantan**

Pengamatan *Coitus* dapat dilihat lama tunggangan yang dilakukan oleh jantan, pada pemberian ekstrak bawang putih dengan dosis ekstrak 150 mg/kg BB dan 300 mg/kg BB menunjukkan peningkatan waktu tunggangan berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh, semakin meningkat dosis ekstrak pemberian

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa perlakuan tidak jauh berbeda, dimana rata-rata lama tunggangan yang dilakukan oleh mencit jantan berkisar antara



detik. Hal ini tidak berbeda dengan penelitian dari Alam (2013) yang menunjukkan bahwa aktivitas seksual mencit berupa *Coitus* biasanya terjadi sekitar 30-120 detik.

Berdasarkan parameter ICC (*Introducing, Climbing, Coitus*) dosis ekstrak etanol bawang putih 300 mg/kgBB memiliki efek afrodisiaka yang paling efektif karena mempunyai hasil yang tidak berbeda jauh dengan kontrol positif jamu pasak bumi.

Senyawa yang diduga memiliki aktivitas afrodisiaka pada bawang putih adalah saponin, flavonoid, dan alkaloid. Senyawa saponin meningkatkan libido melalui mekanisme kerja langsung pada sistem saraf pusat dan jaringan gonat. Saponin berperan dalam biosintesis DHEA (Dehydroepiandrosteron) sehingga meningkatkan kadar testoteron dalam tubuh dan memacu libido. Flavonoid memiliki peran dalam meningkatkan hormon testoteron dan mendorong perilaku seksual pada pria. Serta alkaloid memiliki aksi perifer, yaitu dengan membantu relaksasi otot polos yang memicu terjadinya ereksi. Alkaloid diketahui memiliki peranan dalam menginduksi vasodilatasi sehingga menimbulkan ereksi dan meningkatkan dilatasi pembuluh darah pada alat kelamin pria. Melalui berbagai mekanisme inilah, senyawa aktif dalam bawang putih menimbulkan peningkatan libido sehingga mampu mendorong perilaku seksual dan disebut dengan efek afrodisiaka.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian uji efektivitas ekstrak etanol bawang putih (*Allium sativum*) sebagai afrodisiaka pada hewan coba mencit jantan (*Mus musculus*) dengan parameter ICC (*Introducing, Climbing, Coitus*) maka dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak etanol bawang putih (*Allium sativum*) dengan dosis 300 mg/kg BB dapat berkhasiat sebagai afrodisiaka.

## KEPUSTAKAAN

- Alam, G. *Aktivitas Afrodisiaka Beberapa Ekstrak Daun Sanrego (Lunasia amara Blanco) pada Mencit Jantan*. Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, Makassar. 2013.
- Arisandi, Y. *Difungsi Seksual*, Garda: Semarang. 2008.
- BPOM. *Informatorium Obat Nasional Indonesia Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia*. Jakarta. 2008.
- Departemen Kesehatan RI. *Farmakope Indonesia*. Edisi III. Jakarta. 1979.
- Departemen Kesehatan RI. *Acuan Sediaan Herbal Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan*. Jakarta. 2010.
- Dipiro, J, T, et al. *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach*. Seventh Edition. Mc-Graw Hill. USA. 2008.
- Fratiwi Yolanda. *The Potential Of Guava Leaf (Psidium guajava L) for Diarrhea*, Faculty Of Medicine. Lampung University. 2015.

Hidayat, A. *Kebutuhan Dasar Manusia*. Health Books Publishing. Surabaya. 2012.

*Putih (Allium sativum) Dalam R*  
Institut Pertanian Bogor.

Hadi Suwano. *Sistem Reproduksi Manusia*. Fakultas Ilmu MIPA Universitas Negeri Malang. 2011.

Jeana Salima. *Antibacterial Activity of Garlic (Allium sativum)*. Faculty Of Medicine University. Lampung. 2015.

Katria Yuniastuti. *Ekstraksi dan Identifikasi Komponen Sulfida Pada Bawang Putih*. Universitas Negeri Malang. 2006.

Malole M, B M. *Penanganan Hewan Hewan Percobaan ITB*. Bandung. 1989.

Nurjanna S, Sa'id EG, Syamsul K, Suprihatin. *Pengaruh Ekstrak Steroid Teripang Pasir (Holothuria scabra) terhadap perilaku seksual dan kadar testosteron darah mencit (Mus musculus)*. Jurnal Bionatura. 2010.

Pallavi., et.al. *Aphrodisiac: Agents from Medical Plants Review Department of pharmacology & Toxicology*. india. 2011.

Prita, D. *Uji Afrodisiaka Infusa Kuncup Bunga Cengkeh (Syrgyzum aromaticum) Terhadap Libido Tikus Jantan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 2010.

Sumiati. *Sistem Reproduksi Manusia*. FKIP Universitas Mataram. 2013.

Singh, et al. 2010, *Pharmacological Sciences*. Shobhit University. Meerut India. 2010.

Weki Y A. *Produksi Mencit Putih (Mus musculus) Dengan Substitusi Bawang*



# POTENSI PEMANFAATAN EKSTRAK SABUT KELAPA (*Cocos nucifera* Linn.) SEBAGAI ANTISEPTIK DALAM BENTUK SEDIAAN GEL

Isriany Ismail, Haeria, Fitriani Fajri Ahmad

Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar  
Email: isriany.ismail@uin-alauddin.ac.id

## ABSTRAK

Limbah sabut kelapa yang selama ini lebih dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tali, memiliki nilai jual yang mulai menurun. Sebagai bagian dari produk alami, komponen dalam sabut kelapa juga mengandung banyak senyawa metabolit sekunder yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk-produk kesehatan alami. Sebagai upaya untuk memperkaya sumber bahan baku produk antiseptik alami, telah dilakukan penelitian tentang potensi pemanfaatan ekstrak sabut kelapa (*Cocos nucifera*) sebagai antiseptik dalam bentuk sediaan gel. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi optimum ekstrak sabut kelapa (*Cocos nucifera*) dalam berbagai formulasi gel yang efektif menghambat bakteri *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thypi*, *Shigella dysenteriae*, *Staphylococcus aureus*, *Vibrio sp.* Ekstrak sabut kelapa diperoleh dengan teknik maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Konsentrasi optimum ekstrak sabut kelapa yang dapat menghambat bakteri *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thypi*, *Shigella dysenteriae*, *Staphylococcus aureus*, dan *Vibrio sp.* dilakukan dengan metode difusi agar. Formulasi gel antiseptik dengan menggunakan basis karbopol 940 dengan konsentrasi 0,5 sd 2%. Uji karakteristik sediaan ditentukan berdasarkan parameter organoleptik, pH, dan viskositas. Uji efektifitas antiseptik sediaan gel menggunakan metode replika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sediaan gel dengan gelling agent Karbopol 940 1,5% dan mengandung ekstrak sabut kelapa 1,6% efektif menghambat bakteri *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thypi*, *Shigella dysenteriae*, *Staphylococcus aureus*, dan *Vibrio sp.*

**Kata Kunci :** Antiseptik, Gel Antiseptik, Sabut Kelapa

## PENDAHULUAN

Mikroorganisme dapat menyebabkan banyak bahaya dan kerusakan terutama pada kesehatan yang nampak dari kemampuannya menginfeksi manusia, hewan, serta tanaman dan menimbulkan penyakit mulai dari infeksi hingga kematian. Mikroorganisme dapat mencemari makanan dan menimbulkan perubahan-perubahan kimiawi, sehingga makanan menjadi rusak bahkan beracun, hingga tidak layak dikonsumsi. Pertumbuhan dan kontaminasi

oleh mikroba perlu dikendalikan dengan menghambat, membasmi, atau menghilangkan mikroorganisme pada berbagai produk atau memutus jalur kontaminasinya dengan menggunakan bahan kimia antara lain antimikroba yang dapat berfungsi sebagai pengawet atau antiseptik (Pelczar, 2008: 447). Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat atau mematikan mikroorganisme pada jaringan hidup, yang

mempunyai efek membatasi dan mencegah infeksi agar tidak menjadi parah (Djide, 2008: 349). Pemakaian antiseptik tangan (hand sanitizer) dalam bentuk sediaan gel di kalangan masyarakat sudah menjadi suatu gaya hidup. Respon positif terhadap penggunaan antiseptik tangan berkaitan dengan paradigma bersih itu sehat, serta pemakaiannya yang praktis karena tidak memerlukan air seperti mencuci tangan memicu upaya-upaya pengembangan sediaan farmasi terkait (Sari, 2006: 2). Meningkatnya keinginan masyarakat untuk menggunakan bahan alam "back to nature" dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan kecantikan terbukti dengan banyaknya produk-produk topikal berbahan aktif bagian tanaman digunakan untuk perawatan kesehatan, kosmetik dan pencegahan penyakit, meskipun sediaan paten antiseptik tangan berbahan dasar senyawa antiseptik sintesis banyak dijumpai di pasaran. Beberapa penelitian terkait pemanfaatan bahan alam sebagai bahan baku sediaan telah banyak dilaporkan, antara lain dilaporkan oleh Retno Sari dan Dewi Isdiartuti bahwa sediaan gel *Hand sanitizer* dari ekstrak daun sirih (*Piper betle* Linn.) memiliki efektifitas sama dengan gel *Hand sanitizer* berbahan aktif etanol dan triklosan (Sari, 2006: 2).

Kelapa (*Cocos nucifera*) adalah tanaman keluarga *Palmae* yang sangat lazim ditemukan di daerah tropis. Kelapa sangat populer di masyarakat karena memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

Beragam manfaat tersebut diperoleh daging buah, air, sabut, tempurung, dan batangnya (Syah, 2005: 10; Suwanto, 2005; Marline dalam penelitian Dalimunthe, 2006: 1). Dalimunthe menyebutkan bahwa sabut kelapa digunakan sebagai obat karena mengandung tannin yang merupakan senyawa kompleks dan terdiri dari beberapa senyawa polifenol (Dalimunthe, 2006: 1).

Ekstrak etanol sabut kelapa (*Cocos nucifera* Linn) dilaporkan dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* dan *Shigella dysenteriae*. Kadar maksimum (KHM) terhadap kedua bakteri tersebut adalah sebesar 10 mg/ml (Dalimunthe, 2006: 4). Selain itu ekstrak metanol sabut kelapa muda dapat menghambat bakteri *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thypi*, *Staphylococcus epidermidis* dan *Streptococcus mutans*. Fraksi larut etil asetatnya dapat menghambat bakteri *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thypi*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans* dan *Staphylococcus aureus*. Fraksi larut metanol etil asetatnya dapat menghambat bakteri *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thypi*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, dan *Vibrio sp* (Mahmudah, 2006: 47).

Kemampuan ekstrak polar dari sabut kelapa dalam menghambat beberapa bakteri yang patogen dalam saluran pencernaan berpotensi diformulasi sebagai sediaan farmasi.



nitizer untuk menghambat jalur masuk bakteri ke dalam saluran cerna. Ekstrak tersebut juga belum pernah dibuat dalam sediaan gel antiseptik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian mengenai potensi pemanfaatan ekstrak sabut kelapa (*Cocos nucifera*) sebagai antiseptik dalam bentuk sediaan gel.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Persiapan dan pengolahan sampel

(Mahmudah, 2011: 39; Rukmana, 2004: 64)

Sabut kelapa (*Cocos nucifera* Linn) diperoleh dari Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Sabut diambil dari buah yang diambil adalah buah yang masih muda. Sabut yang telah terpisah dikeringkan dengan sinar matahari langsung, selanjutnya diserbukkan dan diekstraksi.

Ekstraksi sampel dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Ekstrak yang diperoleh diuapkan hingga diperoleh ekstrak kental.

### Uji Daya Hambat

Uji aktivitas antimikroba dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan medium *Glucose Nutrient Agar* (GNA). *Seed layer* mengandung 1,0 mL suspensi mikroba uji *Bacillus subtilis* (Bs), *Escherichia coli* (Ec), *Pseudomonas aeruginosa* (Pa), *Salmonella thypi* (St), *Staphylococcus epidermidis* (Se),

*Streptococcus mutans* (Sm), *Shigella disenteriae* (Sd) dan *Vibrio sp* (Vb) masing-masing diinokulasikan dalam 10 ml medium GNA. *Paper disc* yang telah dijenuhkan dengan larutan sampel konsentrasi masing-masing 0.05%, 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.8%, dan 1.6% ditempelkan pada *seed layer*. Inkubasi dilakukan selama 1 x 24 jam pada suhu 37<sup>0</sup> C., selanjutnya diukur daerah hambatan yang terbentuk.

### Pembuatan Sediaan Gel

#### Rancangan Formula .

Tabel 1. Rancangan sediaan gel antiseptik ekstrak etanol sabut kelapa

No.	Bahan	Formula (%)				
		I	II	III	IV	V
1	Ekstrak	1,6	1,6	1,6	1,6	0
2	Karbopol	0,5	1	1,5	2	2
3	TEA	1	1	1	1	1
4	Metil Paraben	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
5	Gliserin	30	30	30	30	30
6	Air suling (g)	100	100	100	100	100

### Pembuatan Formula

Sediaan gel dikerjakan sesuai dengan metode pencampuran salep dan pengembangan basis gel Carbopol (Anonim, 1979; Rowe. R. C. dkk, 2009; Voight, 1995; Lachman, 2007) Konsentrasi ekstrak yang digunakan adalah yang efektif menghambat mikroba uji.

### Uji Karakteristik Sediaan Gel

Karakteristik sediaan ditentukan berdasarkan parameter organoleptik, pH, dan viskositas

### Uji Efektifitas Sediaan Gel

#### Uji Daya Antiseptik

Formula dengan karakteristik gel antiseptik pasaran dilanjutkan pengujian efektifitasnya masing yaitu 1,6%. Metode yang digunakan adalah metode replika (Lund, 1994: 599)

#### Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode Statistik Rancangan Acak Lengkap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas penghambatan terhadap bakteri uji ditunjukkan oleh konsentrasi ekstrak 0.8%.

Tabel 2. Aktivitas penghambatan ekstrak sabut kelapa pada bakteri uji

Ekstrak (%)	diameter daerah hambatan (mm)					
	Bakteri uji					
	St	Sa	Ec	Pa	Vb	Sd
0,4	0	0	0	0	8,01	9,66
0,8	11,56	9,26	8,85	9,45	10,06	9,6
1,6	11,45	9,42	9,42	11,56	11,76	10,03

#### Karakteristik fisik sediaan gel antiseptik ekstrak sabut kelapa

Warna dan bau mengikuti bau dan warna ekstrak yang ditambahkan.

Konsistensi gel cair untuk konsentrasi karbopol 0.5%.

Tabel 3. Karakteristik fisik sediaan gel antiseptik ekstrak sabut kelapa

Formula	Pengamatan			
	Organoleptik			pH
	Warna	Bau	Bentuk	
I	Coklat	Khas ekstrak	Cair	6
II	Coklat	Khas ekstrak	Semi padat	5
III	Coklat	Khas ekstrak	Semi padat	5
IV	Coklat	Khas ekstrak	Semi padat	5
V	Putih bening	Tidak berbau	Semi padat	5
Pembandingan	Transparan	Tidak berbau	Semi padat	5

#### Efektifitas sediaan gel antiseptik ekstrak sabut kelapa

Tabel 4. Efektifitas sediaan gel antiseptik ekstrak sabut kelapa

Formula	Rata-Rata Penurunan (%)
I	66,31
II	92,73
III	98,22
IV	90,74

Allah swt. telah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk dipergunakan oleh manusia dan makhluk lainnya secara bersama atau menjadikannya sebagai rahmat kehidupan antara mereka. Tanaman kelapa secara keseluruhan bagian-bagiannya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan baik sebagai bahan untuk alat pembantu maupun untuk pemeliharaan kesehatan. Sungguh Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 191 yang artinya "Ya Tu



kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka". Manusia diberi akal dan melalui ilmu pengetahuan semua ciptaan Allah swt dapat dimanfaatkan bagi kebaikan umat manusia

Dalam memformulasi suatu sediaan *hand sanitizer* dengan bahan aktif alami, diperlukan penentuan konsentrasi efektif ekstrak dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen pencernaan, disamping itu, efektifitas penghambatan terhadap bakteri perlu juga diamati setelah ekstrak telah diformulasi dalam bentuk sediaan.

Aktivitas penghambatan yang efektif ditunjukkan oleh konsentrasi ekstrak sabut kelapa 0.8% tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 1.6% pada taraf kepercayaan 99%. Pada kondisi ini, dapat dinyatakan bahwa konsentrasi 0.8% memiliki kemampuan menghambat sama efektifnya dengan konsentrasi 1.6% dalam bentuk ekstrak.

Ekstrak yang diformulasi menjadi suatu sediaan farmasi, terkadang memerlukan konsentrasi yang lebih tinggi (2 sampai 10 kali lipat) dari konsentrasi hambat dalam bentuk ekstrak, tergantung bentuk sediaan yang akan disiapkan. Pada penelitian ini, konsentrasi ekstrak sabut kelapa yang digunakan dalam formula sediaan gel adalah konsentrasi 1.6% yang secara statistik masih merupakan konsentrasi efektif ekstrak sabut kelapa dalam menghambat mikroba uji. Hal ini dimaksudkan agar konsentrasi ini mendukung tercapainya kadar senyawa aktif

yang mampu melewati basis sediaan menuju sel bakteri dan memberi efek penghambatan dalam pelepasan awalnya. Kecepatan mendapatkan kadar efektif penghambatan dan konsistensi sediaan yang baik perlu diatur terutama dalam pemilihan bahan pembentuk basisnya.

Penggunaan karbopol bersama dengan bahan aktif bersifat netral secara umum menggunakan kadar 1%, akan tetapi dengan berbahan aktif ekstrak dengan kandungan bahan kimia yang kompleks dapat memberi pengaruh pada konsistensi sediaan. Sediaan gel dengan gelling agent Karbopol memerlukan keberadaan senyawa basa untuk menghasilkan produk gel yang baik. Keberadaan asam akan menurunkan konsistensi gel menjadi lebih cair. Pada formula gel ekstrak sabut kelapa, kadar karbopol 1% dapat membentuk konsistensi gel yang tidak berbeda dengan produk yang telah beredar dipasaran pada tingkat kepercayaan 99%. Keasaman sediaan yang berkisar pada pH 5-6 tidak sangat mempengaruhi konsistensi gel. Basis yang digunakan pada pembuatan gel *hand sanitizer* dari ekstrak sabut kelapa (*Cocos nucifera*) adalah karbopol 940. Basis ini tergolong ke dalam kelompok senyawa asam poliakrilat. Basis ini tidak beracun dan dapat diterima dengan baik di kulit.

Formulasi dan pemilihan basis yang tepat pada pembuatan sediaan gel akan mempengaruhi jumlah dan kecepatan zat aktif yang akan diabsorpsi, begitu pula dengan daya sebar dan pH. Secara ideal,

basis dan pembawa harus mudah diaplikasikan pada kulit, tidak mengiritasi dan nyaman digunakan pada kulit. Bahan alam memiliki karakteristik yang khas sehingga pada formulasinya perlu pemilihan basis yang paling efektif untuk menghasilkan sediaan gel yang baik. Sediaan gel apabila telah kering akan meninggalkan lapisan tipis tembus pandang, elastik dengan daya lekat tinggi, yang tidak menyumbat pori kulit, sehingga pernafasan kulit tidak dipengaruhi dan mudah dicuci dengan air.

Hasil pengamatan organoleptis terhadap gel yang mengandung ekstrak sabut kelapa (*Cocos nucifera*) menunjukkan bahwa gel yang dihasilkan berbau khas ekstrak dan berwarna coklat, serta berbentuk semipadat pada konsentrasi karbopol 1-2% dan bentuk cair pada konsentrasi 0,5%.

Ekstrak sabut kelapa mengandung tannin dan beberapa senyawa polifenol. Bau khas ekstrak pada sediaan gel antiseptik berasal dari kumpulan senyawa yang terkandung di dalam ekstrak tersebut. Begitupun dengan warna coklat tersebut, berasal dari warna senyawa-senyawa yang terkandung dalam ekstrak sabut kelapa yang berkumpul sehingga memberi warna yang tampak kecoklatan. Sediaan gel antiseptik ekstrak sabut kelapa memiliki pH sekitar 5 hingga 6, keasaman sediaan ini memungkinkan untuk penggunaan di kulit. Kulit memiliki mantel asam dengan pH berkisar 4,5- 6,5. Keasaman produk kulit yang tidak sesuai dengan keasaman kulit dapat menyebabkan iritasi hingga infeksi

mikroorganisme. Oleh karena itu, pH sediaan antiseptik sabut kelapa diusahakan sesuai dengan pH fisiologis kulit yaitu 6,5.

Sediaan antiseptik gel Dettol<sup>®</sup> sebagai pembanding viskositas sediaan diformulasi. Penerimaan konsumen terhadap produk dipasaran membantu formulasi dalam merancang produk baru. Analisis statistik dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap menunjukkan bahwa viskositas tiap formulasi memiliki perbedaan yang nyata, dengan hitung  $> F$  tabel pada taraf signifikansi 5%. Uji beda nyata jujur menunjukkan bahwa konsentrasi karbopol 0,5 dan 1% memiliki nilai viskositas yang sama dengan sediaan gel antiseptik Dettol<sup>®</sup> yang beredar dipasaran. Hasil statistik menentukan bahwa konsentrasi basis 1% dengan Beda Terkecil (BNJ) yang digunakan sebagai konsentrasi karbopol yang baik sebagai sediaan antiseptik gel ekstrak sabut kelapa.

Pengujian efektifitas sediaan menggunakan metode replika, menunjukkan bahwa sediaan gel antiseptik ekstrak kelapa dengan konsentrasi 1,5% mampu mengurangi mikroorganisme sebesar 98,22%. Walaupun konsistensi sediaan konsentrasi 1,5% tidak sama dengan sediaan gel antiseptik yang digunakan sebagai pembanding, namun beberapa pengujian menunjukkan bahwa dengan nilai viskositas 41,333 poise masih dapat diterima sebagai sediaan gel.



## ESIMPULAN

Ekstrak etanol sabut kelapa dapat menghambat beberapa bakteri patogen saluran cerna pada konsentrasi 0,8%.

Ekstrak etanol sabut kelapa dapat diformulasi menjadi sediaan gel antiseptik menggunakan basis karbopol 940 dengan konsentrasi 1,5% memiliki konsistensi yang baik dan dapat mengurangi jumlah bakteri patogen pencernaan sebesar 98,22%.

## PUSTAKAAN

- Ansel, C., Howard. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Universitas Indonesia. Jakarta. 2005.
- Jalimunthe, Aminah, Marline Nainggolan. *Pengujian Ekstrak Etanol Sabut Kelapa (Cocos nucifera Linn) Terhadap Bakteri Escherichia coli dan Shigella dysenteriae*. FMIPA Universitas Sumatra Utara. Medan. 2006. diakses pada tanggal 25 November 2011.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an Terjemahan*. Sygma. Bandung. 2007.
- Djide, M. Natsir, Sartini, " *Dasar- Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Lembaga Penerbitan Unhas. Makassar. 2008.
- Garrity, G. M., Bell, J. A. and Lilburn. T.G. *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey's Manual of Systematic Bacteriology*. 2th Edition. United States of America. Springer. New York Berlin Heidelberg. 2004.
- Lachman L. Liberman HA & Kaning JL. *Teori dan Praktek Farmasi Industri*. Edisi Ketiga. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. 2007.
- Lund, Walter. *The Pharmaceutical Codex*. 12<sup>th</sup> edition. The Pharmaceutical Press. London. 1994.
- Mahmudah, Rifa'atul. *Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Larut Etil Asetat Sabut Kelapa (Cocos Nucifera Linn) dengan Metode KLT- Bioautografi*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. Makassar. 2011.
- Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Terj.Hadioetomo, Ratna sari dkk. Universitas Indonesia. Jakarta. 2008.
- Rowe. Raymond C, Paul J Sheskey dan Marian E Quinn. *Handbook of Pharmaceutical Excipients*. 6<sup>th</sup> edition. Pharmaceutical Press. Chicago. 2009.
- Sari Retno, Isadiartuti Dewi. *Studi Efektifitas Sediaan Gel Antiseptik Tangan Ekstrak Daun Sirih (Piper betle Linn)*. Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Surabaya. 2006. Diakses pada tanggal 25 November 2011.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishba*. Jilid 6-7. Lentera Hati. Jakarta. 2002
- Suwanto, dan Octavianty, Yuke. *Budi Daya Tanaman Perkebunan Unggul*. Cetakan 1. Penebar Swadaya. Jakarta. 2010.
- Tranggono, R.I, Fatma Latifah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2007.
- Voight, Rudolf. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1995.

# SUMBER ALTERNATIF BAHAN BAKU OBAT DIABETES MELLITUS DARI FUNGI ENDOFIT TANAMAN MAHONI (*Swietenia mahagoni* Jacq) DAN UJI AKTIVITAS INHIBITOR $\alpha$ -GLUKOSIDASE

Muthmainnah B<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Farmasi, STIKES Nani Hasanuddin Makassar  
Email: innabaharuddin@gmail.com

## ABSTRAK

Eksplorasi terhadap tanaman telah dilakukan sejak ribuan tahun dalam rangka pencarian bahan baku obat. Pencegahan eksploitasi berlebihan dapat dilakukan dengan cara pengembangan sistem fungi endofit. Mikroorganisme dalam hal ini endofit perlu digali dan dikembangkan, mengingat kebutuhan bahan baku obat yang semakin meningkat baik jumlah maupun macamnya. Fungi endofit yang hidup dalam tanaman dapat menghasilkan senyawa metabolit sekunder sama dengan yang dihasilkan inangnya akibat adanya pertukaran genetik dan hubungan evolusi yang panjang. Hasil penelusuran dari beberapa tanaman yang berkhasiat sebagai obat antidiabetes salah satunya adalah mahoni. Salah satu cara kerja obat antidiabetes adalah menghambat pencernaan karbohidrat kompleks (amilum) menjadi glukosa sehingga asupan glukosa dari usus ke dalam darah dapat dikurangi. Senyawa aktif yang memiliki aktivitas seperti ini misalnya inhibitor  $\alpha$ -glukosidase. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh isolat fungi endofit dari tanaman mahoni (*Swietenia mahagoni* Jacq) yang mampu menghasilkan senyawa metabolit yang memiliki aktivitas inhibitor  $\alpha$ -glukosidase. Isolat fungi endofit diperoleh melalui tahapan isolasi fungi endofit, pemurnian, produksi metabolit sekunder, ekstraksi metabolit sekunder sedangkan pada pengujian inhibisi  $\alpha$ -glukosidase dengan membandingkan dengan obat paten dengan metode spektrofotometri.

**Kata Kunci :** Fungi endofit, mahoni (*Swietenia mahagoni* Jacq), inhibitor  $\alpha$ -glukosidase

## PENDAHULUAN

Suatu tanaman dikatakan berkhasiat sebagai obat karena di dalamnya terkandung suatu zat yang efektif dalam pencegahan maupun pengobatan suatu penyakit. Seperempat dari obat modern beredar di dunia berasal dari bahan aktif yang diisolasi dan dikembangkan dari tanaman (Radji, M., 2005). Eksploitasi terhadap tanaman tersebut telah dilakukan sejak ribuan tahun dalam rangka pencarian bahan baku obat (Strobel, 2004).

Pencegahan eksploitasi berlebihan dapat dilakukan dengan cara pengembangan sistem fungi endofit. Khususnya mikroorganisme dalam hal ini endofit perlu digali dan dikembangkan mengingat kebutuhan bahan baku obat yang semakin meningkat baik jumlah maupun macamnya (Sugijanto, 2004). Fungi endofit yang hidup dalam tanaman dapat menghasilkan senyawa metabolit sekunder sama dengan yang dihasilkan inangnya akibat adanya pertukaran



genetis dan hubungan evolusi yang panjang (Tan and Zou, 2001; Radji, 2005).

Metabolit sekunder adalah senyawa-senyawa hasil biosintetik turunan dari metabolit primer yang umumnya diproduksi oleh organisme yang berguna untuk pertahanan diri dari lingkungan maupun dari serangan organisme lain. Sedangkan substansi yang dihasilkan oleh organisme melalui metabolisme dasar, digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme yang bersangkutan disebut dengan metabolit primer. Hasil penelusuran dari beberapa tanaman yang berkhasiat sebagai obat antidiabetes salah satunya adalah mahoni (*Swietenia mahagoni* Jacq) yang mengandung saponin dan flavonoid. Pengobatan DM secara tradisional adalah dengan memanfaatkan berbagai jenis tanaman obat yang memiliki kandungan bahan aktif yang dapat menurunkan kadar gula darah.

Salah satu cara kerja obat antidiabetes adalah menghambat pencernaan karbohidrat kompleks (amilum) menjadi glukosa sehingga asupan glukosa dari usus ke dalam darah dapat dikurangi. Senyawa aktif yang memiliki aktivitas seperti ini misalnya inhibitor alpha glukosidase. Senyawa inhibitor alpha glukosidase dapat dihasilkan oleh mikroba. Sebagai contoh adalah acarbose, suatu inhibitor alpha glukosidase yang dihasilkan oleh *Actinoplanes* sp., suatu mikroba yang

diisolasi dari daerah di Kenya (McGown, 2006).

Telah dilakukan penelitian pada tanaman mahoni yaitu pada biji yang telah diteliti secara ilmiah mampu menghambat aktivitas  $\alpha$ -glukosidase dengan nilai  $IC_{50}$  7,03 bpj (Maya Masitha, 2011).

## **METODE PENELITIAN**

### ***Lokasi dan Rancangan Penelitian***

Penelitian akan dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) NANI Hasanuddin Makassar, Laboratorium Kimia Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) NANI Hasanuddin Makassar, Laboratorium Farmakognosi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) NANI Hasanuddin Makassar.

### ***Instrumen Penelitian***

Alat-alat yang telah digunakan adalah Spektrofotometri UV, Cawan Petri, Penangas air, Neraca analitik, Shaker, Corong pisah, Mikropipet, Peralatan gelas, Erlenmeyer, magnetic stirer.

### ***Sampel Penelitian***

Isolat fungi endofit dari daun mahoni (*Swietenia mahagoni* Jacq).

### ***Pengumpulan Data***

Pengumpulan dan pengolahan data didasarkan aktifitas penghambatan  $\alpha$ -glukosidase metabolit sekunder yang dihasilkan dari proses fermentasi fungi endofit dari daun dan ranting mahoni.

## **Analisis Data**

Analisis data digunakan adalah persen inhibisi, perhitungan  $IC_{50}$ .

## **HASIL**

Pada penelitian ini dilakukan uji aktivitas penghambatan  $\alpha$ -glukosidase dari metabolit sekunder yang dihasilkan oleh fungi endofit dari daun mahoni (*Swietenia mahagoni* Jacq.) yang secara empiris khususnya digunakan untuk mengobati berbagai penyakit salah satunya sebagai antidiabetes.

### **Produksi Metabolit Sekunder Fungi Endofit**

Sistem fermentasi yang digunakan adalah sistem *batch*. Sistem ini merupakan sistem yang paling sederhana dan sering digunakan di laboratorium untuk mendapatkan produk sel atau metabolitnya. Fermentasi sistem *batch* adalah sistem tertutup, artinya semua nutrisi yang dibutuhkan mikroba selama pertumbuhan dan pembentukan produk berada di dalam satu fermentor. Jadi tidak ada penambahan bahan atau pengambilan hasil selama fermentasi berlangsung. Keuntungan sistem ini adalah mudah, sederhana, dan kecil kemungkinan adanya kontaminasi. Pemilihan waktu panen setelah 12 hari dikarenakan beberapa penelitian telah menunjukkan hari ke-12 merupakan waktu fermentasi yang menghasilkan pertumbuhan dan produksi metabolit maksimum.

## **Pengujian dan penghitungan IC<sub>50</sub> Partisi A**

Ekstrak metabolit isolate fungi endofit dari daun mahoni sebagai ekstrak aktif kemudian dilakukan pengujian untuk menghitung  $IC_{50}$ nya.  $IC_{50}$  merupakan konsentrasi yang dibutuhkan untuk suatu senyawa untuk menginhibisi sebesar 50%. Pada pengujian ini dilakukan dengan menggunakan lima variasi konsentrasi yaitu 80 ppm, 40 ppm, 20 ppm, 10 ppm, dan 5 ppm. Hasil uji pada penghambatan aktivitas  $\alpha$ -glukosidase pada sampel FeDM dan FeRM1 dengan konsentrasi 40 bpj diperoleh sebanyak 66,57% dan 70,80% dengan nilai  $IC_{50}$  14,97 bpj dan 11,70 bpj. Hasil Pengujian dapat dilihat pada tabel 1 dan analisis regresinya pada gambar 1.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini memperlihatkan aktivitas penghambatan  $\alpha$ -glukosidase pada ekstrak metabolit isolate fungi endofit dari daun mahoni merupakan partisi aktif dengan persentase inhibisi pada konsentrasi 40 bpj sebesar 66,57% dan 70,80 %.

Produksi metabolit sekunder dari isolat fungi endofit daun mahoni dilakukan dengan metode fermentasi. Sebelum dilakukan fermentasi isolat fungi tersebut diremajakan terlebih dahulu pada medium PDA selama 3 hari pada suhu 25<sup>o</sup>C.

Hasil peremajaan fungi kemudian diteruskan untuk pembuatan starter koloni yang tumbuh di medium PDA



kemudian dipindahkan ke medium PDY dan diinkubasi selama 3 hari pada suhu 25°C. Tujuan pembuatan starter yaitu untuk memperbanyak jumlah miselia dan sebagai salah satu tahap adaptasi. Fungi dari medium starter selanjutnya akan dipindahkan ke medium PDY dan diinkubasi selama 12 hari sambil dikocok setiap hari. Fermentasi dengan pengocokan (*shaker culture*) merupakan metode pemanfaatan medium oleh mikroorganisme yang hasilnya lebih efisien, mempercepat pertumbuhan, dan pertumbuhannya lebih homogen (Fardiaz, 1988).

Fermentasi dilakukan selama 12 hari dan diperoleh hasil fermentasi berwarna coklat dan miselia fungi endofit tumbuh menyebar di dalam medium hasil fermentasi. Perubahan warna yang lebih pekat pada saat inkubasi menunjukkan adanya proses fermentasi yang dilakukan oleh isolat fungi endofit dimana perubahan ini menunjukkan metabolit sekunder telah diproduksi di dalam medium. Pemilihan waktu panen setelah 12 hari dikarenakan beberapa penelitian telah menunjukkan hari ke-12 merupakan waktu fermentasi yang menghasilkan pertumbuhan dan produksi metabolit maksimum (Haniah, 2008; Bhattacharyya, 2011).

Sistem fermentasi yang digunakan adalah sistem *batch*. Sistem ini merupakan sistem yang paling sederhana dan sering digunakan di laboratorium untuk mendapatkan produk sel atau metabolitnya. Fermentasi sistem *batch*

adalah sistem tertutup, artinya semua nutrisi yang dibutuhkan mikroba selama pertumbuhan dan pembentukan produk berada di dalam satu fermentor. Jadi tidak ada penambahan bahan atau pengambilan hasil selama fermentasi berlangsung. Keuntungan sistem ini adalah mudah, sederhana dan kecil kemungkinan adanya kontaminasi.

Ekstrak metabolit isolat fungi endofit dari daun mahoni sebagai ekstrak aktif kemudian dilakukan pengujian untuk menghitung  $IC_{50}$ nya.  $IC_{50}$  merupakan konsentrasi yang dibutuhkan untuk suatu senyawa untuk menginhibisi sebesar 50%. Pada pengujian ini dilakukan dengan menggunakan lima variasi konsentrasi yaitu 40 bpj, 20 bpj, 10 bpj, 5 bpj, dan 2,5 bpj. Hasil Pengujian dapat dilihat pada tabel 1 dan analisis regresinya pada gambar 1 dan 2.

Pada Pengujian diketahui bahwa konsentrasi ekstrak metabolit dari daun mahoni berbanding lurus dengan aktivitas penghambatan  $\alpha$ -glukosidase. Persentase inhibisi Ekstrak isolat fungi endofit dari daun mahoni berturut-turut untuk konsentrasi 40 bpj, 20 bpj, 10 bpj, 5 bpj, dan 2,5 bpj adalah 66,57%, 56,64%, 50,73%, 42,64% dan 35,47%. Konsentrasi inhibisi terbesar yaitu pada konsentrasi 40 bpj (70,80%) yang terbukti lebih efektif jika dibandingkan glucobay® dengan persentase inhibisi pada konsentrasi 40 bpj sebesar 60,28%. Konsentrasi 40 bpj memperlihatkan aktivitas penghambatan

yang lebih bagus dibanding dengan glucobay®.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian aktifitas inhibitor  $\alpha$ -glukosidase Ekstrak isolat fungi endofit dari daun mahoni yang diisolasi dari tanaman mahoni (*Swietenia mahagoni* Jacq.), maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Dari sampel daun yang telah diperoleh isolat fungi endofit dari tanaman mahoni (*Swietenia mahagoni* Jacq.) yang mampu menghasilkan senyawa metabolit yang memiliki aktifitas inhibitor  $\alpha$ -glukosidase.

## KEPUSTAKAAN

Annurakkung, N.J., Bhandari, M.R., dan Kawabata, J.  *$\alpha$ -Glucosidase Inhibitors From Devil Tree (*Alstonia Scholaris*)*. Food Chemistry. 103, 1319-1323. 2006.

Bhattacharyya PN. & Jha DK. *Optimization of cultural conditions affecting growth and improved bioactive metabolite production by a surface *Aspergillus* strain TSF 146*. International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology. 2 (4). 2011. Hal 7.

Bösenberg, L.H. *The mechanism of action of oral antidiabetic drugs: a review of recent literature*. The Journal of Endocrinology, Metabolism and Diabetes of South Africa. 2008.13, 3, 80-88.

Fardiaz, S. *Fisiologi Fermentasi*. Lembaga Sumber Daya Informasi - IPB Bogor. 1998. Hal. 79, 105-107.

Goldsmith, E.J., Fletterick, R.J., & Withers, S.G. *The Three dimensional Structure of Acarboxylated Bound to Glycogen Phosphorylase*. The Journal of Biological Chemistry. 1987. 262, 1449-1455.

Haniah, M. *Isolasi Jamur Endofit dari Daun Sirih (*Piper betle* L.) Sebagai Antimikroba Terhadap *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* dan *Candida albicans**. Skripsi Jurusan Biologi. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Malang. Malang. 2008.

Mashita Maya. *Skrining Aktivitas Penghambatan Enzim Glukosidase dan Penapisan Fitokimia dari beberapa Tanaman Obat yang Digunakan Sebagai anti diabetes di Indonesia*. Jurnal Jurusan Farmasi FMIPA UIN Ar-Raniry Jakarta. 2011.

Radji, M. *Peranan Bioteknologi dalam Mikrobiologi Endofit dalam Pengembangan Obat Herbal*. Majalah Ilmu Kefarmasian. 2008. Vol 11 No 3. 113-126.

Slagle, M. *Alpha-glucosidase inhibitor*. Southern Medical Journal. 2009. <http://static.highbeam.com/s/southmedicaljournal/01/01/2009>.

Strobel, G. *Natural Products From Endophytic Microorganism*. J. Nat. Prod. Vol 67. 2004. 257-268.

Sugijanto, N.E, Indrayanto, E. & Zailani, N.C. *Isolasi dan Determinasi Berbagai Jamur Endofit dari Tanaman *Aglaia Elliptica*, *Aglaia Eusideroxylon*, *Aglaia Odorata**



- *Aglaia Odoratissima*. Jurnal penelitian Medika Eksakta. Vol 5 No 2. 2004. 132,137-138.

Tan, RX and Zou, WX. *Endophytes : a rich Source of Functional Metabolites*. Nat Prod. Rep. 2001. 18 : 448-45.


## LAMPIRAN

**Tabel 1. Hasil IC<sub>50</sub> dari Uji Aktifitas Inhibitor α-Glukosidase dari Ekstrak Metabolit Isolat Fungi Endofit Daun dan Ranting Mahoni (FeDM dan FeRM1).**


No	Sampel	Konsentrasi (ppm)	Rata-rata (%)	IC <sub>50</sub> (µg/ml)
1	Blangko	-	-	-
		2,5	35,47	
		5	42,64	
2	FeDM	10	50,73	14,97
		20	56,64	
		40	66,57	
		2,5	38,36	
		5	43,44	
3	FeRM1	10	52,95	11,70
		20	59,95	
		40	70,80	

### Keterangan :

FeDM = Ekstrak isolat fungi endofit dari daun mahoni  
 FeRM1 = Ekstrak isolat fungi endofit dari daun mahoni



**Gambar 1. Analisis regresi ekstrak isolat fungi endofit daun mahoni (FeDM)**



**Gambar 2. Analisis regresi ekstrak isolat fungi endofit daun mahoni (FeRM1)**

# PREPARASI FITOSOM EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH KAKAO (*Theobroma cacao*) MENGUNAKAN VARIASI KONSENTRASI FOSFATIDILKOLIN

Karlina Amir Tahir<sup>1</sup>, Sartini<sup>2</sup>, Agnes Lidjaja<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>2</sup>Fakultas Farmasi, Universitas Hasanuddin Makassar  
Email : karlina.amir@uin-alaud.ac.id

## ABSTRAK

Kulit buah Kakao diketahui memiliki kandungan senyawa bioaktif flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan, akan tetapi senyawa ini bersifat polar dan merupakan makromolekul yang tidak dapat berpenetrasi dengan baik ke dalam stratum korneum. Penelitian ini bertujuan untuk membuat *Drug Delivery System* nanopartikel dengan sistem vesikular yaitu fitosom dari ekstrak kulit buah kakao menggunakan dua perbandingan konsentrasi fosfatidilkolin. Fitosom dibuat dari ekstrak etanol buah kakao dengan metode dispersi mekanik dan penguapan pelarut. Digunakan fosfatidilkolin sebagai polimer dengan perbandingan 0,5 dan 0,75 (g) terhadap 1 gram sampel ekstrak kulit buah kakao. Pengukuran nanopartikel ini menggunakan Alat *Particle Size Analyzer* (PSA). Hasil penelitian ini, diperoleh bahwa, dengan perbandingan fosfatidilkolin dan ekstrak kulit buah kakao 0,5 : 1 (g) dan 0,75 : 1 (g) secara berturut-turut menghasilkan ukuran nanopartikel dengan efisiensi penjerapan sebesar 184,99 nm 95,597% dan 199,97 nm 99,182%. Disimpulkan bahwa kulit buah kakao dapat dibuat dalam bentuk sistem vesikular yaitu fitosom.

**Kata kunci :** kulit buah kakao, fitosom, metode dispersi polimer dan penguapan pelarut, *particle size analyzer* (PSA)

## PENDAHULUAN

Tanaman kakao mengandung teobromin 0,4% b/b, kalium 3-4% b/b, polisakarida yang meliputi pektin, gum, dan selulosa, serta senyawa-senyawa polifenol, antara lain: katekin, epikatekin, antosianin, proantosianidin, asam-asam fenolat, tanin terkondensasi, dan flavonoid-flavonoid lainnya (Arlorio, 2005; Marsaban, 2007).

Polifenol merupakan senyawa polar dan umumnya larut dalam pelarut polar. Molekul yang polar dan besar tidak dapat berpenetrasi dengan baik ke dalam stratum korneum.

Untuk bioavailabilitas yang baik, produk alami harus memiliki keseimbangan yang baik antara sifat hidrofilik (untuk melarut ke dalam saluran pencernaan) dan sifat lipofilik (untuk menyeberangi biomembran lipid). Beberapa bahan-bahan alam seperti polifenol memiliki kelarutan yang baik dalam air, tetapi, bagaimanapun, sulit diabsorpsi (Manach *et al.*, 2004)

Sistem pembawa (*Drug Delivery System*) dari generasi terbaru memiliki keuntungan untuk meningkatkan penetrasi pada kulit. Perkembangan



terbaru dalam bidang nanoteknologi telah memungkinkan pembuatan partikel berukuran nano digunakan untuk berbagai aplikasi biomedis (Papakostas *et al.*, 2011).

Nanopartikel dapat dibuat dengan berbagai metode. Hingga saat ini, ada enam metode pembuatan nanopartikel yang sering digunakan yaitu metode penguapan pelarut, metode emulsifikasi spontan atau difusi pelarut, *salting out*/ metode emulsifikasi-difusi, teknologi fluida superkritis, metode polimerisasi, dan polimer hidrofilik (Kumaresh *et al.*, 2001).

Salah satu perkembangan *Drug Delivery System* dalam penghantaran transdermal yaitu sistem vesikular, salah satunya dikenal sebagai fitosom. Fitosom merupakan gabungan fosfolipid salah satunya fosfatidilkolin dalam pelarut non-polar seperti aseton. Menurut Khan (2013), penyusun fitosom yaitu yang merupakan struktur misel kompleks bahan alam – fosfolipid, dapat dilihat pada gambar (1). Menurut Jain *et al* (2010), dan Kidd (2005), bahwa komposisi phytosom bersifat aman dan komponennya diterima untuk penggunaan dalam bidang farmasi, serta absorpsi dan bioavailabilitas dari bahan alam yang larut air meningkat. Hal ini menghasilkan efek terapi yang lebih baik.

Tujuan penelitian ini untuk untuk membuat *Drug Delivery System* nanopartikel dengan sistem vesikular yaitu fitosom dari ekstrak kulit buah kakao

dengan menggunakan dua perbandingan fosfatidilkolin.

## METODOLOGI PENELITIAN

### 1. *Pengolahan sampel*

Buah kakao (*Theobroma cacao* L.) yang matang dipisahkan antara buah dan kulit buahnya, diambil kulit buah, dicuci dan dipotong kecil-kecil

### 2. *Ekstraksi polifenol dari kulit buah kakao*

Kulit buah kakao disonikasi dan dimaserasi dengan etanol 50% selama 1x24 jam, kemudian diremaseasi dengan etanol 50% selama 2 hari, dilakukan pengadukan sekali-kali. Filtrat yang diperoleh diuapkan dengan rotavapor dan diliofilisasi hingga diperoleh ekstrak kental dan dihitung rendamennya. Rendamen ekstrak dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rendemen} = \frac{\text{Berat ekstrak kental} \times 100\%}{\text{Berat kulit buah kakao}}$$

### 3. *Pengukuran total polifenol ekstrak kulit buah kakao*

Ekstrak yang diperoleh kemudian dilakukan uji kuantitatif total polifenol menggunakan spektrofotometer UV-VIS dengan menggunakan asam gallat sebagai baku pembanding.

### 4. *Pembuatan Fitosom*

Dilakukan pembuatan fitosom yaitu fosfatidilkolin didispersikan dalam aseton 50 ml di dalam wadah tertutup. Ekstrak kulit buah kakao dimasukkan ke dalam fase lipid dan dihomogenkan dengan pengaduk magnetik pada kecepatan 750

rpm selama 15 menit dan membentuk sistem koloidal.

## 5. Karakterisasi Fitosom

### a. Penyiapan Sampel

Suspensi vesikel fitosom disimpan dalam lemari pendingin selama satu malam. Disentrifugasi dengan kecepatan 15.000 rpm selama 2 jam. Supernatannya diambil untuk mengukur kadar total polifenol dalam fitosom Ekstrak Kulit Buah Kakao yang tidak terperap.

### b. Perhitungan Efisiensi Penjerapan (Sentjerc, 1999)

Persentase penjerapan total polifenol dihitung dari rumus berikut:

$$EE = \frac{Q_t - Q_s}{Q_t} \times 100\%$$

EE adalah efisiensi penjerapan (*entrapment efficiency*),  $Q_t$  adalah jumlah total polifenol dalam Ekstrak kulit buah kakao yang ditambahkan, dan  $Q_s$  adalah jumlah polifenol yang terdeteksi di supernatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari ekstraksi kulit buah kakao menghasilkan rendamen sebesar 4,719% dengan kadar total polifenol sebesar 7,9% (Tabel 1). Untuk fitosom dari pembuatan nanopartikel ekstrak kulit buah kakao, diukur menggunakan *Particle Size*

*Analyzer* (PSA) (Gambar 1 dan diperoleh ukuran dan efisiensi penjerapan pada perbandingan 0,5 : 1 (g) dan 0,75 : 1 (g) yaitu 184,99 nm EE 95,597% dan 199,97 nm EE 99,182% secara berturut-turut (Tabel 2).

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit buah kakao dapat dibuat dengan sistem fitosom. Dari nanopartikel fitosom ini, dari komparasi perbandingan variasi konsentrasi, diperoleh ukuran yang paling kecil secara berturut-turut yaitu 184,99 nm dan 199,97 nm pada perbandingan fosfatidilkolin ekstrak 0,5 : 1 (g) dan 0,75 : 1 (g). Ukuran nanopartikel ini termasuk dalam partikel halus. Menurut Tiwari (2009) bahwa unit struktural dan fungsional nanoteknologi dikenal sebagai nanopartikel. Partikel kasar kisaran ukurannya antara 2.500 – 10.000 nanometer, partikel halus kisaran ukurannya antara 100 – 2.500 nanometer dan partikel ultra-fine kisarannya antara 1 – 100 nanometer.

Menurut Arlorio *et al* (2005), bahwa *Theobroma cacao* L. (Sterculiaceae) merupakan turunan produk kakao merupakan makanan yang kaya fenolat, produk tersebut sebagian besar telah dipelajari karena sifat antioksidan dan antiradikal secara *in vitro* dari konstituen fenoliknya.

Sampel yang digunakan adalah sampel segar kulit buah kakao yang telah matang dengan berat 776 gram. Kulit buah kakao dicuci untuk menghilangkan kotoran yang tertinggal, lalu dipotong



kecil-kecil. Setelah itu sampel dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dan dilakukan sonikasi selama 15 menit. Sampel kemudian diekstraksi dengan pelarut polar Etanol 50% karena senyawa polifenol yang akan ditarik bersifat polar dan diaduk sering-sering agar proses penarikan senyawa lebih baik, ampas hasil maserasi lalu dimaserasi kembali (remaserasi) selama 2x24 jam dan dilakukan pengadukan. Hasil remaserasi lalu di rotavapor untuk menghilangkan sisa pelarut dan dilanjutkan dengan proses liofilisasi untuk memperoleh ekstrak kental yang terbebas dari pelarut.

Ekstrak kental yang diperoleh lalu ditimbang dan dihitung rendamennya. Dari hasil ekstraksi diperoleh 36,149 gram menghasilkan rendamen sebesar 4,719% dan kadar total polifenol sebesar 7,9%. Pengukuran kadar total polifenol sebelumnya juga telah dilakukan oleh Yuliana (2013), hasil yang diperoleh sebesar 6,22% menggunakan metode dan konsentrasi cairan penyari yang sama yaitu etanol 50%. Perbedaan ini mungkin dikarenakan jenis dan tempat tumbuh kakao yang digunakan berbeda. Penelitian oleh Yuliana (2013), menggunakan kakao jenis *Forastero* dengan kulit buah berwarna kuning, sementara dalam penelitian ini menggunakan *Forastero* kulit buah berwarna ungu. Jadi, kemungkinan bisa terjadi perbedaan kandungan kadar polifenolnya.

Proses berikutnya pembuatan nanopartikel. Metode yang digunakan

dalam pembuatan nanopartikel adalah metode dispersi mekanik dan penguapan pelarut. Bahan yang digunakan yaitu fosfatidilkolin yang berasal dari golongan fosfolipid yang didispersikan dalam pelarut aseton yang dikenal dengan istilah fitosom. Fosfatidilkolin juga bersifat stabil dan aman.

Menurut Jain *et al* (2010), dan Kidd *et al* (2005), bahwa fitosom memiliki stabilitas yang lebih baik dari liposom. Hal ini karena fitosom terdiri dari ikatan kimia yang tidak terdapat pada liposom. Komposisi fitosom bersifat aman dan komponennya diterima untuk penggunaan dalam bidang farmasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol kulit buah kakao dapat dibuat nanopartikel dengan sistem vesikular fitosom, dengan perbandingan fosfatidilkolin dan ekstrak kulit buah kakao 0,5 : 1 (g) dan 0,75 : 1 (g) secara berturut-turut menghasilkan ukuran nanopartikel dan efisiensi penjerapan sebesar 184,99 nm 95,597% dan 199,97 nm 99,182%. Melihat potensi ini, diharapkan hasil pembuatan nanopartikel ini dapat dilanjutkan dengan formulasi sediaan kosmetik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih Kepada Bakrie Centre Foundation atas beasiswa penyelesaian studi termasuk penelitian ini melalui Bakrie Graduation Fellowship.

## KEPUSTAKAAN

- Arlorio M., Coisson, J.D., Travaglia F., Varsaldi F., Miglio G., *et al.* *Antioxidant and biological activity of phenolic pigments from Theobroma cacao hulls extracted with supercritical CO<sub>2</sub>* Journal Elsevier, Food Research International. 2005. 38: 1009–1014.
- Jain N., Gupta B.P., Thakur N., Jain R., Banweer J., Jain D., Jain S. *Phytosome: A Novel Drug Delivery System for Herbal Medicine.* International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research. 2010. 2:224-228.
- Kidd P.M. dan Head K. *A review of the bioavailability and clinical efficacy of milk thistle phytosome: a silybin–phosphatidylcholine complex*
- Khan, J., Alexander, A., Ajazuddin, Saraf, S., Saraf, S. *Review Recent advances and future prospects of phyto-phospholipid complexation technique for improving pharmacokinetic profile of plant actives.* Journal of Controlled Release. Elsevier, Science Direct. 2013. 50 – 60.
- Papakostas D., Rancan F., Sterry W., Peytavi U.B., Vogt A. Review Article : *Nanoparticles in Dermatology.* Archives of Dermatological Research. Springer-Verlag. Berlin, Germany. Vol 303. 2011. pp 533–550
- (Siliphos®). *Altern Med Rev.* 2010; 10: 193–203.
- Kumaresh S., Tejraj, M., Aminabhavi Anandrao R., Kulkarni Walter S. *Biodegradable polymeric nanoparticles as drug delivery devices.* Review Journal Controlled Release 2001. 1 – 20.
- Manach C., Scalbert A., Morand Rémésy C., Jiménez L. *Polyphenols in food sources and bioavailability.* J Clin Nutr. 2004.
- Marsaban. *Perbandingan Efektivitas Antibakterial Ekstrak Buah Kakao (Theobroma cacao L.) Pada Berbagai Konsentrasi Terhadap Streptococcus mutans.* Artikel Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Semarang. 2007. Pp 3.
- Padamwar M.N. dan Pokharkar V. *Development of vitamin loaded liposomal formulations using factor design approach: drug deposition and stability.* Int J Pharm. 2006. 323: 37 – 44
- Tiwari G. *Preparation and characterization of Ketoconazole Encapsulated Liposome and Ethosome: Comparative Study (Tesis).* National Institute of Technology. Rourkela India. 2013.
- Yuliana, B. *Ekstraksi Kulit Buah Kakao (Theobroma cacao L.) dan Pengaruh Konsentrasi Ekstrak dalam Sediaan Gel Sebagai Antiselulit.* Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana UNHAS. 2010.




**Tabel 1. Pengukuran Total Polifenol dari Ekstrak Etanol Kulit Buah Kakao**


Ekstrak	Berat (g)	Rendamen (%)	Total Polifenol (%)
Etanol	776	4,719	7,9

**Tabel 2. Pengukuran Nanopartikel dan Efisiensi Penjerapan**

Fosfatidilkolin (g) : Ekstrak Kulit buah Kakao (g)	Ukuran (nm)	EE (%)
0,5 : 1	184,99	95,597
0,75 : 1	199,97	99,182



**Gambar 1. Hasil pengukuran Particle Size Analyzer (PSA) 0,5 : 1 (g) (Fosfatidilkolin : Ekstrak Kulit Buah Kakao)**



**Gambar 2. Hasil pengukuran Particle Size Analyzer (PSA) 0,75 : 1 (g) (Fosfatidilkolin : Ekstrak Kulit Buah Kakao)**

## KEPUSTAKAAN

- Arlorio M., Coriasso, J.D., Travaglia F., Varsaldi F., Miglio G., *et al*. *Antioxidant and biological activity of phenolic pigments from Theobroma cacao hulls extracted with supercritical CO<sub>2</sub>*. Journal Elsevier, Food Research International. 2005. 38: 1009–1014.
- Jain N., Gupta B.P., Thakur N., Jain R., Banweer J., Jain D., Jain S. *Phytosome: A Novel Drug Delivery System for Herbal Medicine*. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research. 2010. 2:224-228.
- Kidd P.M. dan Head K. *A review of the bioavailability and clinical efficacy of milk thistle phytosome: a silybin–phosphatidylcholine complex* (Siliphos®). *Altern Med Rev.* 2005. 10: 193–203.
- Kumaresh S., Tejraj, M., Aminabhavi Anandrao R., Kulkarni Walter J. *Biodegradable polynanoparticles as drug delivery devices*. Review Journal Controlled Release 2001. 1 – 20.
- Manach C., Scalbert A., Morand Rémésy C., Jiménez L. *Polyphenol food sources and bioavailability*. J Clin Nutr. 2004.
- Marsaban. *Perbandingan Antibakterial Ekstrak Buah Kakao (Theobroma cacao L.) Terhadap Streptococcus mutans*. An. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Semarang. 2007. P 3.
- Padamwar M.N. dan Pokharkar V. *Development of vitamin E liposomal formulations using factorial design approach: drug deposition and stability*. Int J Pharm. 2006. 313: 37 – 44.
- Tiwari G. *Preparation and characterization of Ketoconazole Encapsulated Liposome and Ethosome: Comparative Study* (Tesis). Natic Institute of Technology. Rourkela, India. 2013.
- Yuliana, B. *Ekstraksi Kulit Buah Kakao (Theobroma cacao L.) dan Pengaruh Konsentrasi Ekstrak dalam Sediaan Gel Sebagai Antiselulit*. Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Prodi Pascasarjana UNHAS. 2010.
- Papakostas D., Rancan F., Sterry W., Peytavi U.B., Vogt A. Review Article : *Nanoparticles in Dermatology*. Archives of Dermatological Research. Springer-Verlag. Berlin, Germany. Vol 303. 2011. pp 533–550.




**Tabel 1. Pengukuran Total Polifenol dari Ekstrak Etanol Kulit Buah Kakao**


Ekstrak	Berat (g)	Rendamen (%)	Total Polifenol (%)
Etanol	776	4,719	7,9

**Tabel 2. Pengukuran Nanopartikel dan Efisiensi Penjerapan**

Fosfatidilkolin (g) : Ekstrak Kulit buah Kakao (g)	Ukuran (nm)	EE (%)
0,5 : 1	184,99	95,597
0,75 : 1	199,97	99,182



**Gambar 1. Hasil pengukuran Particle Size Analyzer (PSA) 0,5 : 1 (g) (Fosfatidilkolin : Ekstrak Kulit Buah Kakao)**



**Gambar 2. Hasil pengukuran Particle Size Analyzer (PSA) 0,75 : 1 (g) (Fosfatidilkolin : Ekstrak Kulit Buah Kakao)**

# ANALISIS LOGAM BERAT KADMIUM (Cd) DALAM KERANG YANG BEREDAR PASAR TRADISIONAL DI KOTA MAKASSAR

Syamsuri Syakri

Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## ABSTRAK

Kadmium (Cd) merupakan unsur pencemar lingkungan, logam kadmium berbahaya jika di konsumsi dalam skala besar. Telah dilakukan Penelitian mengenai kerang yang beredar dan diperjual belikan di pasar pa'baeng-baeng dan Pasar Katangka telah dilakukan analisis dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Konsentrasi logam kadmium dalam kerang yang berasal dari jalan pasar pa'baeng-baeng dan Pasar katangka masing-masing adalah 0,65 ppm dan 0,30 ppm. Hasil ini melampaui baku mutu berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia No. 03275/B/SK/1989 sebesar 1 ppm.

**Kata Kunci :** Kadmium (Cd), Kerang, Spektrofotometer Serapan Atom

## PENDAHULUAN

Kerang laut merupakan kelompok moluska yang hidup di daerah perairan laut dangkal dan juga ditemukan pada laut dalam. Kerang laut di kawasan pesisir sebagai penyusun komunitas makrozoobentos yaitu organisme yang menempati substrat dasar perairan, baik di atas maupun di dalam sedimen dasar perairan. Kerang tersebut memiliki keanekaragaman yang tinggi dibanding kerang yang hidup di perairantawar (Nurdin, dkk., 2008). Pemanfaatan kerang sebagai sumber bahan makanan cukup banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang hidup di sekitar pesisir Pantai. Bagian kerang yang dimakan adalah dagingnya termasuk alat pencernaan makanan. Kerang dimanfaatkan sebagai pengganti daging, unggas, telur, dan lain-lain (Jalaluddin dan Ambeng, 2005). Daging

kerang merupakan sumber protein yang bermutu tinggi, yang setaraf dengan sumber protein hewani lain (Piggot, 1990), dan telah berabad-abad dikonsumsi oleh manusia, meski kadang-kadang mengakibatkan penyakit atau bahkan mematikan. Kerang adalah organisme yang hidup dengan menyaring makanan, (filter feeder) terhadap material yang tersuspensi di perairan atau dari sedimen (Parker, 1984).

Apabila manusia mengkonsumsi kerang yang mengandung logam berat dalam jumlah yang cukup tinggi akan berdampak negatif terhadap kesehatan. Beberapa logam berat yang umum ditemukan dalam kerang adalah timbal (Pb), kadmium (Cd), tembaga (Cu), seng (Zn). Dalam tubuh manusia, logam berat akan bersenyawa dengan enzim



aktif menjadi enzim tidak aktif, sehingga sintesis butir darah merah (Hb) dapat dihambat, akibatnya dapat menimbulkan penyakit anemia (Sorensen, 1991).

Beberapa zat beracun yang telah mencemari perairan pantai sebagai akibat aktivitas antropogenik salah satunya adalah dari logam berat (Rahman, 2006). Kerang merupakan biota yang potensial terkontaminasi logam berat, karena hidupnya di dalam sedimen (lumpur) sehingga biota ini sering digunakan sebagai hewan uji dalam pemantauan tingkat akumulasi logam berat pada organisme laut (Suprapti, 2008).

Logam berat yang banyak mencemari perairan laut adalah logam Cd. Logam Cd merupakan salah satu jenis logam berat yang berbahaya karena elemen ini beresiko tinggi terhadap pembuluh darah. Kadmium berpengaruh terhadap manusia dalam jangka waktu panjang dan dapat terakumulasi pada tubuh khususnya hati dan ginjal (Noviak, 2011) Berdasarkan uraian di atas, maka dianggap perlu untuk menganalisis kandungan Logam kadmium (Cd) yang beredar di pasar tradisional kota Makassar

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### ***Bahan Penelitian***

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerang yang diambil di pasar tradisional kota Makassar, akuabidestillata, HNO<sub>3</sub> (Merck), NaOH (Merck), Cd(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Merck).

### ***Alat Penelitian***

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah spektrofotometer serapan atom (SSA) buck scientific 205, oven spn 150 sfd model spnisofd, neraca digital ohaus model No AP 110, hotplate maspion, kertas saring Whatmann 42, lumpang porselin, desikator dan alat-alat gelas yang umum digunakan di laboratorium.

### ***Waktu dan Tempat Penelitian***

Penelitian ini akan dimulai dilakukan pada bulan Juli 2014 yang meliputi pengambilan sampel, analisis sampel di laboratorium dan analisis data hasil penelitian. Sampel di peroleh di pasar tradisional Kota Makassar Makassar, sedangkan analisis sampel dan pengukuran SSA dilakukan di laboratorium Analitik jurusan Kimia FMIPA UNHAS.

### ***Prosedur***

#### ***Lokasi Pengambilan Sampel***

Lokasi pengambilan sampel berada di pasar tradisional di Kota Makassar, Pasar Pa'baeng-baeng dan Pasar Katangka.

### ***Kerang***

Dalam Penelitian ini digunakan sampel kerang yang diambil dari penjual kerang di pasar tradisional di kota Makassar dengan tiga kali waktu pengambilan. Setelah sampel kerang diperoleh diberi label untuk urutan pengambilan.

### **Pembuatan Larutan Baku Cd**

#### **Pembuatan larutan baku induk Cd 1000 ppm**

Serbuk Cd(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> sebanyak 0,5257 gram ditimbang dengan teliti lalu dilarutkan dengan akuades, selanjutnya dimasukkan dalam labu

ukur 250 mL dan volume larutan ditepatkan

dengan akuades. Larutan induk ini setara dengan 1000 ppm Cd.

#### **Pembuatan larutan baku intermediet Cd 100 ppm**

Larutan baku intermediet Cd 100 ppm, dibuat dengan cara memipet 10 mL larutan induk baku Cd 1000 ppm, kemudian diencerkan hingga tanda batas dalam labu takar.

#### **Pembuatan deret larutan baku kerja**

Deret larutan baku kerja logam Cd dibuat dengan pengenceran larutan baku intermediet Cd, dengan menggunakan rumus pengenceran, sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan. Dari larutan dibuat volume 100 mL. Larutan standar baku kerja dibuat dengan variasi konsentrasi sebagai berikut 0,04 ; 0,08 ; 0,16 ; 0,32 ppm.

#### **Preparasi Sampel Kerang**

Sampel kerang dipisahkan daging dari cangkangnya kemudian daging kerang dicuci dengan akuabides hingga bersih, kemudian ditiriskan selama beberapa jam. Homogenkan dengan menggunakan lumpang perselin.

#### **Penentuan Kadar air**

Daging kerang yang dihomogenkan ditimbang dengan sekitar 10,000 gram ke dalam cawan yang telah diketahui berat kosong. Kemudian dipanaskan dalam oven suhu 80-85<sup>o</sup>C selama 24 jam, didinginkan dalam desikator. Ditimbang dengan lalu diulangi sampai diperoleh bobot konstan.

$$\text{Kadar air} = \frac{\text{Berat basah} - \text{berat kering}}{\text{Berat basah}} \times 100$$

#### **Protokol Analisis**

Sampel yang telah dihomogenkan ditimbang dengan teliti sekitar 5,000 g. Ditambahkan 25 mL HNO<sub>3</sub> 6 M dipanaskan hingga larut sempurna. Disaring ke dalam labu ukur 100 mL dan dicuci dengan menggunakan akuades panas. Kemudian diatur pHnya sekitar 10 dengan menambahkan NaOH, dikocok. Sampel disimpan dalam botol plastik dan kemudian dianalisis dengan SSA.

#### **Analisis dengan Spektroskopi Serapan Atom**

Blanko, larutan baku kerja, larutan sampel diukur serapannya dengan menggunakan SSA. Data nilai absorbansi dan konsentrasi larutan baku kemudian dibuat grafik (kurva baku). Serapan larutan contoh kemudian diplotkan ke kurva larutan baku sehingga diperoleh konsentrasi logam yang dianalisis.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penentuan Kadar Air

Kadar air pada sampel kerang yang diambil di pasar pa'baeng-baeng dan Pasar Katangka ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Kadar air dalam sampel kerang Pengambilan Sampel Kadar air (%) Lokasi 1 Rata-rata

Penga- bilan Sampe	Kadar air (%)			
	Lokasi 1	Rata- rata	Lokasi 2	Rata- rata
I	79,08	80,59	78,19	79,72
II	79,56		79,21	
III	83,12		81,77	

Lokasi 1 : Pasar pa'bang-baeng

Lokasi 2 : Pasar Katangka

TT : Tidak terdeteksi

### Konsentrasi Kadmium (Cd) dalam Kerang

Kadar kadmium (Cd) dalam kerang seperti terlihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Kadar Logam Kadmium (Cd) dalam Kerang

Pengan- bilan	Kadar Logam Kadmium (Cd) (ppm)			
	Lokasi 1	Rata- rata	Lokasi 2	Rata- rata
I	0,39	0,65	0,42	0,30
II	1,12		0,37	
III	0,43		0,12	

Lokasi 1 : Pasar pa'baeng-baeng

Lokasi 2 : Pasar Katangka

Hasil analisis pada logam Cd dalam kerang yang diambil di Pasar pa'baeng-baeng dan Pasar Katangka Kota

Makassar pada Tabel 2, menunjukkan bahwa konsentrasi logam kadmium (Cd) pada kerang di pasar pa'baeng-baeng pada sampling I, II, dan III masing-masing adalah 0,39 ppm, 1,12 ppm dan 0,43 ppm dengan rata-rata sebesar 0,65 ppm sedangkan pada wilayah Pasar Katangka konsentrasi Cd adalah 0,42 ppm, 0,37 ppm dan 0,12 ppm dengan rata-rata sebesar 0,30 ppm. Besarnya kadar logam kadmium yang ditemukan di pasar pa'baeng-baeng karena kerang yang diambil sudah dewasa (ukuran tubuhnya lebih besar) sehingga kemampuan menyerap logam sudah sangat tinggi. Kadar Kadmium (Cd) dalam kerang di Pasar Katangka yang diperoleh cukup tinggi, hal ini disebabkan kerang yang dijual sudah terkontaminasi logam kadmium yang berasal dari aktivitas masyarakat. Sumber logam kadmium (Cd) yang berasal dari aktivitas manusia yang berada di sekitar pasar tersebut seperti limbah pasar dan limbah rumah tangga. Kadar kadmium (Cd) pada kerang yang ditemukan di pasar pa'baeng-baeng dan Pasar katangka, jika dibandingkan dengan standar baku mutu logam berat untuk biota konsumsi dari Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03725/B/SK/1989 sebesar 1 ppm. Maka dapat dikatakan bahwa kadar kadmium dalam tubuh kerang belum melebihi baku mutu.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kandungan logam berat timbal (Pb) dalam kerang yang dijual di pasar tradisional (0,05%) dan merkuri (0,05%) yang terkandung pada hasil analisis sebesar 0,05%.

## KEPUSTAKAAN

- Jalaluddin, MN, dan Ambeng. 2005. *Analisis Logam Berat (Pb, Cd, dan Cr) pada Kerang Laut (Hiatula chinensis, Anadara granosa, dan Marcia optima)*. Marina Chimica Acta. Noviak. 2011. 2(6): 17-20.
- Nurdin, J., dkk. *Distribusi Kerang Laut (Mollusca : Bivalvia) yang Dikonsumsi dan Berpotensi Ekonomi Di Pesisir Pantai Sumatera Barat*, Jurusan Biologi Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. 2008.
- Parsons, T.R., M. Takahashi., and., and Barry Hargrave. *Biological Oceanographic Processes*. Pigott, G.M.; and B. W., Tucker, 1990, *Seafood, Effects of Technology on Nutrition*. 3 rd edition. Pregamon Press. New York. 1984.
- Rahman, A. *Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada beberapa Jenis Krustasea Di Pantai Batakan dan Takisung Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan*. Program Studi Biologi FMIPA Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan Sorensen, E.M. 1991.
- Suprapti, N. H. *Kandungan Chromium pada Perairan, Sedimen dan Kerang Darah (Anadara granosa) di Wilayah Pantai Sekitar Muara*



# FORMULASI DAN UJI STABILITAS FISIK KRIM SUSU KUDA SUMBAWA DENGAN EMULGATOR NONIONIK DAN ANIONIK

Faridha Yenny Nonci, Nurshalati Tahar, Qoriatul Aini<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## ABSTRAK

Telah dilakukan formulasi, uji stabilitas fisik, dan aktivitas sediaan krim susu kuda Sumbawa dengan emulgator nonionik (kombinasi tween 60 dan span 60) dan anionik (kombinasi asam stearat dan TEA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan konsentrasi emulgator yang baik terhadap kestabilan fisik krim susu kuda Sumbawa. Uji stabilitas sediaan krim ditentukan berdasarkan pengamatan organoleptik, tipe emulsi, volume kriming, viskositas, tetes terdispersi, daya sebar dan pH pada kondisi sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat pada suhu 5°C dan 35°C. uji aktivitas pada krim susu kuda Sumbawa dengan emulgator anionik konsentrasi 2%, 3% dan 4% dan nonionik konsentrasi 2%, 3% dan 4%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula krim susu kuda Sumbawa yang menggunakan emulgator nonionik mengalami pemisahan fase setelah penyimpanan dipercepat. Kondisi penyimpanan dipercepat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap viskositas tiap krim. Emulgator anionik dengan konsentrasi 2%, 3%, dan 4% dapat membentuk krim dengan stabilitas fisik yang baik, dan diamati ketiga konsentrasi diperoleh stabilitas fisik yang baik pada emulgator anionik dengan konsentrasi 4% pada uji stabilitas fisik, organoleptik, pengenceran, dispersi zat warna, volume kriming, daya sebar, dan viskositas.

**Kata Kunci :** Krim, Susu kuda Sumbawa, Stabilitas, emulgator

## PENDAHULUAN

Emulgator sering dikombinasikan untuk menggunakan emulsi yang lebih baik yaitu emulgator dengan keseimbangan hidrofilik dan lipofilik yang diinginkan, melainkan kestabilan dan sifat kohesi dari lapisan antarmuka serta mempengaruhi konsistensi dan penampakan emulsi<sup>1</sup>.

Emulgator dengan nilai HLB dibawah 7 umumnya menghasilkan emulsi air dalam minyak (A/M), sedangkan emulgator dengan nilai HLB diatas 7 umumnya menghasilkan emulsi minyak dalam air. Tetapi sistem HLB tidak memberikan

indikasi tentang konsentrasi yang digunakan. Sebagai aturan, emulgator dengan konsentrasi 2% adalah jumlah yang cukup dalam suatu formula walaupun konsentrasi yang lebih kecil dapat memberikan hasil yang lebih baik. Jika konsentrasi emulgator lebih dari 5% maka emulgator akan menjadi bagian utama dari formula dan hal ini bukanlah tujuan dari penggunaan emulgator<sup>1</sup>.

Susu kuda Sumbawa merupakan salah satu susu murni hasil perahan kuda liar yang ditenak oleh petani organik di

pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia<sup>2</sup>.

Pemilihan krim sebagai bentuk sediaan karena krim memiliki sifat umum mampu melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu cukup lama sebelum sediaan tersebut dicuci atau dihilangkan<sup>3</sup>. Selain itu krim lebih mudah dioleskan dan tidak berlemak layaknya sediaan salep, dimana pada penderita jerawat sediaan berlemak dan berminyak sangat dihindari. Pada terapi jerawat umumnya menggunakan krim tipe o/w (minyak dalam air) karena tipe krim tersebut memperlambat proses pengeringan dan tidak mengiritasi kulit sehingga cocok digunakan untuk penderita kulit sensitif atau kering. Selain itu krim tipe o/w memiliki sifat penyebaran pada kulit yang baik, memiliki efek dingin, serta sifatnya lentur-lentur<sup>4</sup>. Komponen yang berpengaruh terhadap stabilitas fisik krim adalah emulgator, basis, dan tipe krim. Pemilihan jenis dan konsentrasi emulgator akan menentukan kestabilan emulsi yang terbentuk<sup>5</sup>. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan jenis emulgator terhadap stabilitas fisik sediaan krim susu kuda Sumbawa.

## METODOLOGI PENELITIAN

### *Pengolahan sampel*

Sampel yang digunakan adalah susu kuda Sumbawa, diambil pada pagi hari susu kuda sebanyak 1,2 liter dengan cara diperah, susu kuda kemudian dikumpul dan

disaring, setelah itu sampel Sumbawa dimasukkan kedalam

## **Pembuatan Sediaan Krim Emulgator Nonionik Dan Anionik**

### Rancangan Formula

Nama Bahan	Kegunaan	Formula		
		I <sub>A</sub>	II <sub>A</sub>	III <sub>A</sub>
Susu kuda Sumbawa	Zat Aktif	25	25	25
Asam stearat	Emulgator Anionik	5	10	15
Trietanolamin	Emulgator Anionik	2	3	4
Paraffin cair	Basis	25	25	25
Propil paraben	Pengawet	0,1	0,1	0,1
Metil paraben	Pengawet	0,05	0,05	0,05
Tween 60 dan Span 60	Emulgator Nonionik	-	-	-
Alfa tokoferol	Antioksidan	0,05	0,05	0,05
Adeps lanae	Basis	3	3	3
Gliserin		15	15	15
Aquadest		50 ml	50 ml	50 ml

Keterangan :

- I<sub>A</sub>= Formulasi krim susu kuda dengan anionik pada konsentrasi 2 %
- II<sub>A</sub>= Formulasi krim susu kuda dengan anionik pada konsentrasi 3 %
- III<sub>A</sub>= Formulasi krim susu kuda dengan anionik pada konsentrasi 4 %
- I<sub>N</sub>= Formulasi krim susu kuda dengan nonionik pada konsentrasi 2 %
- II<sub>N</sub>= Formulasi krim susu kuda dengan nonionik pada konsentrasi 3 %
- III<sub>N</sub>= Formulasi krim susu kuda dengan nonionik pada konsentrasi 4 %

### **Untuk emulgator nonionik**

Disiapkan alat dan bahan yang digunakan, fase minyak dibuat melebur berturut-turut asam stearat, adeps lanae, paraffin cair dan span 60 dalam porselin di atas *waterbath* sampai seluruhnya. Setelah fase minyak diturunkan dari *waterbath* lalu ditambahkan susu kuda, propil paraben dan alfa tokoferol ke dalamnya serta diaduk sampai



homogen. Menyiapkan fase air dengan mencampur air dalam beker glass, kemudian tambahkan metil paraben dan gliserin lalu aduk sampai homogen. Selanjutnya campuran ini dihangatkan sampai suhu 70°C. Selanjutnya ditambahkan tween 60 dan homogenkan. Fase minyak kemudian dimasukkan ke dalam mortir hangat, kemudian tambahkan fase air yang dihangatkan sebelumnya, dan diaduk sebentar sampai bentuk emulsi krim. Lalu dimasukkan ke dalam wadah krim.

#### **Metode emulgator anionik**

Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, fase minyak dibuat dengan melebur berturut-turut asam stearat, adeps stearae, dan paraffin cair dalam cawan porselin atas *waterbath* sampai melebur seluruhnya. Setelah basis minyak melebur, turunkan dari *waterbath* lalu ditambahkan susu kuda, propil paraben dan alfa tokoferol kedalamnya serta aduk sampai larut dan homogen. Menyiapkan fase air dengan mencampur air dalam beker glass, kemudian ditambahkan metil paraben dan gliserin lalu diaduk sampai homogen. Selanjutnya campuran ini dihangatkan sampai suhu 70°C. Dan selanjutnya ditambahkan trietanolamin dan homogenkan. Fase minyak kemudian dimasukkan ke dalam mortir hangat, kemudian tambahkan fase air yang dihangatkan sebelumnya, dan diaduk sebentar sampai terbentuk emulsi krim.

### **Evaluasi sediaan krim**

#### **Pemeriksaan organoleptis**

Pengamatan organoleptis dilakukan terhadap sediaan yang telah dibuat meliputi pengamatan warna, bau, bentuk. Pengamatan ini dilakukan sebelum dan sesudah emulsi diberi kondisi penyimpanan dipercepat.

#### **Evaluasi tipe emulsi**

##### **Metode pengenceran**

Emulsi yang telah dibuat dimasukkan ke dalam cawan, kemudian diencerkan dengan ditambahkan air. Jika emulsi dapat diencerkan maka emulsi adalah minyak dalam air.

##### **Metode dispersi larutan zat warna**

Emulsi yang telah dibuat dimasukkan dalam gelas piala, kemudian diteteskan beberapa tetes larutan metilen biru diatasnya. Jika warna biru segar terdispersi keseluruh emulsi maka tipe emulsinya tipe minyak dalam air.

#### **Uji Stabilitas Fisik**

##### **Pengukuran volume kriming**

Krim sebanyak 10 ml, dimasukkan dalam gelas ukur, kemudian diberi kondisi penyimpanan dipercepat yaitu penyimpanan suhu 5°C dan 35°C masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus.

##### **Pengukuran Viskositas (Kekentalan)**

Pengukuran kekentalan dilakukan terhadap sediaan krim yang telah dibuat sebelum dan setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat yaitu pada suhu 5°C dan 35°C masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus. Pengukuran kekentalan dilakukan dengan menggunakan viskometer.

### Pengukuran tetes dispersi

Sediaan dimasukkan ke dalam vial kemudian dilakukan pengukuran tetes terdispersi sebelum dan sesudah kondisi penyimpanan dipercepat yaitu pada suhu 5°C dan 35°C masing-masing 12 jam sebanyak 10 siklus. Pengamatan ukuran tetes dispersi dilakukan dengan menggunakan mikroskop. Dengan meneteskan krim pada objek gelas kemudian ditutup dengan dek gelas dan setelah diperoleh pembesaran yang sesuai maka diamati rentang ukuran partikel tetes terdispersinya.

### Daya sebar

Penentuannya dilakukan dengan perlakuan sampel krim dengan volume tertentu dilakukan dipusat antara lempeng gelas, dimana lempeng sebelah atas dalam interval waktu tertentu dibebani anak timbangan diatasnya. Permukaan penyebaran yang dihasilkan dengan meningkatkan beban, merupakan karakterisasi daya sebar.

### Uji pH

Uji pH digunakan untuk mengetahui pH krim apakah sesuai dengan pH kulit yang akan mempengaruhi kenyamanan dan keamanan penggunaannya. Selain itu pH dapat mempengaruhi difusi obat dari sediaan (Astuti dkk., 2012). Penentuannya dilakukan dengan menggunakan indikator universal, yakni indikator yang mempunyai warna standar yang berbeda untuk setiap nilai pH 1 – 14.

### Analisis Data

Data hasil pengamatan dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan

metode statistik Rancangan Acak (RAK)

## HASIL

### Evaluasi Sediaan Krim

#### Pengamatan Organoleptis

Krim	Organoleptis			
	Sebelum Penyimpanan Dipercepat			Setelah Penyimpanan Dipercepat
	Bau	Warna	Bentuk	Bau
Anionik 2 %	Khas	Putih	Semi padat	Khas
Anionik 3 %	Khas	Putih	Padat	Khas
Anionik 4 %	Khas	Putih	Padat	Khas
Nonionik 2 %	Khas	Putih	Padat	Khas
Nonionik 3 %	Khas	Putih	Padat	Khas
Nonionik 4 %	Khas	Putih	Padat	Khas

#### Penentuan Tipe Emulsi

Krim	Tipe Emulsi		
	Sebelum Penyimpanan		Setelah Penyimpanan
	Uji Pengenceran	Uji Dispersi Zat Warna	Uji Pengenceran
Anionik 2 %	M/A	M/A	M/A
Anionik 3 %	M/A	M/A	M/A
Anionik 4 %	M/A	M/A	M/A
Nonionik 2 %	M/A	M/A	M/A
Nonionik 3 %	M/A	M/A	M/A
Nonionik 4 %	M/A	M/A	M/A

Keterangan:

M/A = Emulsi tipe minyak dalam air  
A/M = Emulsi tipe air dalam minyak



## Uji Stabilitas Fisik % Volume Kriming

Krim	Daya Sebar (g)	
	Sebelum Penyimpanan Dipercepat	Setelah Penyimpanan Dipercepat
Anionik 2 %	0,9524	0,9854
Anionik 3 %	0,9856	0,9877
Anionik 4 %	0,9561	0,9969
Nonionik 2 %	0,4334	0,3308
Nonionik 3 %	0,9918	0,9877
Nonionik 4 %	0,9917	0,9796

## Uji Viskositas

Siklus	% Volume Kriming					
	I	II	III	IV	V	VI
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	2	0	0
6	0	0	0	3	2	3
7	0	0	0	3	3	4
8	0	0	0	4	4	4
9	0	0	0	5,2	4,8	4,6
10	0	0	0	5,2	5,2	5

Petjelasan:

- I = Krim dengan emulgator anionik 2%
- II = Krim dengan emulgator anionik 3%
- III = Krim dengan emulgator anionik 4%
- IV = Krim dengan emulgator nonionik 2%
- V = Krim dengan emulgator nonionik 3%
- VI = Krim dengan emulgator nonionik 4%

## Uji Ukuran Tetes Terdispersi

Pada pengamatan tetes terdispersi, seluruh krim memperlihatkan perubahan ukuran tetes terdispersi dari fase minyak membentuk ukuran partikel yang lebih besar setelah

penyimpanan dipercepat ketika diamati pada mikroskop.

## Uji Daya Sebar

Krim	Viskositas (poise)	
	Sebelum Penyimpanan Dipercepat	Setelah Penyimpanan Dipercepat
Anionik 2 %	10440	4160
Anionik 3 %	53840	26600
Anionik 4 %	5200	19360
Nonionik 2 %	6000	1200
Nonionik 3 %	7920	2360
Nonionik 4 %	62400	2710

## Uji pH

Krim	pH	
	Sebelum Penyimpanan Dipercepat	Setelah Penyimpanan Dipercepat
Anionik 2 %	7	7,2
Anionik 3 %	7	7,3
Anionik 4 %	6	7,6
Nonionik 2 %	5	5,4
Nonionik 3 %	7	5,3
Nonionik 4 %	5	5,3

## PEMBAHASAN

Di dalam penelitian ini, kedua jenis emulgator yang digunakan dalam formulasi ini yaitu asam stearat dan TEA sebagai emulgator anionik serta Tween 60 dan Span 60 sebagai emulgator nonionik. Pada dasarnya, ada tiga jenis emulgator yang dapat digunakan sebagai emulgator yaitu emulgator nonionik, anionik, dan kationik. Emulgator nonionik lebih banyak digunakan karena harganya murah, tetapi

dapat menyebabkan toksisitas jika digunakan untuk emulsi oral, sehingga hanya digunakan untuk pemakaian luar. Emulgator nonionik bersifat tidak terionisasi dalam air, memiliki rentang pH yang lebih baik (asam atau basa), biasanya untuk kombinasi bahan larut air dengan bahan larut minyak sehingga membentuk lapisan film. Emulgator kationik jarang digunakan dalam sediaan krim karena bersifat mengiritasi kulit. Oleh karena itu emulgator kationik tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pada formulasi krim dengan emulgator anionik, asam stearat dan TEA digunakan tiga variasi konsentrasi yakni TEA 2%, 3% dan 4% dan asam stearat 5%, 10% dan 15%. Kedua variasi tersebut memiliki nilai perbandingan TEA: asam stearat yang sama yaitu 1:5.

Formulasi krim dengan emulgator nonionik, Tween 60 dan Span 60 digunakan tiga variasi konsentrasi yakni 2%, 3%, dan 4%. Jumlah Tween 60 maupun Span 60 yang digunakan dalam tiap formula diperoleh dari perhitungan HLB berdasarkan konsentrasi.

Pada penelitian ini dilakukan uji penyimpanan dipercepat (*stress condition*) yaitu melakukan penyimpanan formula krim pada dua suhu berbeda yaitu 5°C dan 35°C selama 10 siklus. Tujuannya adalah untuk mengetahui kestabilan fisik dari krim yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu yang ekstrim pada periode waktu penyimpanan. Efek normal penyimpanan suatu emulsi pada suhu yang lebih tinggi adalah mempercepat koalesensi dan terjadinya kringing dan hal ini biasanya diikuti dengan perubahan kekentalan. Hal ini juga terlihat pada semua formula krim dimana

krim menjadi lebih encer pada penyimpanan 35°C dan menjadi lebih kental pada suhu penyimpanan 5°C. Pemberian *stress condition* ini menunjukkan ketidakstabilan krim nonionik terbentuknya kringing.

Hasil pengamatan organoleptik pada formula krim susu kuda Sumbawa variasi jenis dan konsentrasi emulsi menunjukkan perubahan warna setelah kondisi penyimpanan dipercepat ini dapat diartikan bahwa krim Sumbawa memiliki stabilitas yang baik penyimpanannya.

Pada pengujian tipe emulsi kuda Sumbawa sebelum pengujian memperlihatkan bahwa keenakan mempunyai tipe emulsi minyak dalam air (M/A), berbeda setelah kondisi penyimpanan dipercepat yang memperlihatkan tipe emulsi minyak dalam air (M/A) dan tiga formula krim (anionik) mempunyai tipe emulsi minyak dalam air (M/A) dan tiga formula krim (nonionik) mempunyai tipe emulsi minyak dalam air (M/A), baik dengan uji perbandingan dengan air, maupun uji dispersi dengan metilen blue. Kedua uji didasarkan pada kenyataan bahwa emulsi minyak dalam air (M/A) akan diencerkan. Hasil ini sesuai dengan formulasi awal yaitu memformulasi emulsi minyak dalam air (M/A). Hal ini disebabkan karena jumlah fase terdispersi (minyak) yang digunakan dalam krim lebih banyak dari fase pendispersi (fase air), sehingga minyak akan terdispersi merata ke dalam air dan membentuk emulsi minyak dalam air dengan bantuan emulgator.



Pengamatan volume kriming sebelum kondisi penyimpanan menunjukkan tidak terjadinya kriming pada keenam formula, dan dapat dilihat pada Sedangkan setelah kondisi penyimpanan dipercepat formula krim susu kuda Sumbawa FI, FII, dan FIII dengan emulgator anionik tidak menunjukkan kriming. Berbeda dengan formula krim susu kuda Sumbawa FIV, FV, dan FVI dengan emulgator anionik yang menunjukkan kriming. Hal tersebut menunjukkan bahwa formula krim susu kuda Sumbawa dengan emulgator anionik lebih stabil dengan tidak adanya kriming bahkan setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Menurut persamaan Stoke, laju sedimentasi dari fase terdispersi dari suatu emulsi dapat dihubungkan dengan faktor-faktor seperti ukuran partikel dari fase terdispersi, perbedaan dalam kerapatan antarfasa, dan viskositas fase luar.

Hasil pengukuran viskositas masing-masing krim sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat, menunjukkan adanya perubahan viskositas. Berdasarkan tabel, viskositas krim sebelum kondisi penyimpanan dipercepat dengan emulgator anionik 3% yaitu 53840 poise lebih tinggi daripada konsentrasi yang lain sedangkan krim dengan emulgator nonionik 4% yaitu 62400 poise lebih tinggi daripada konsentrasi yang lain. Namun, setelah kondisi penyimpanan dipercepat krim dengan emulgator anionik 2% memiliki penurunan viskositas sekitar 6280 poise, sedangkan anionik 3% memiliki penurunan sekitar 27240 poise, berbeda dengan anionik 4% yang memiliki kenaikan viskositas sekitar 14160 poise. Pada emulgator

nonionik 2% setelah penyimpanan dipercepat mengalami penurunan viskositas 4800 poise sedangkan nonionik 3% mengalami penurunan viskositas 5560 poise, dan nonionik 4% mengalami penurunan viskositas 59690 poise, berdasarkan hasil viskositas yang dilakukan sebelum penyimpanan dan sesudah penyimpanan dengan emulgator anionik dan nonionik dengan konsentrasi 2%, 3% dan 4% dapat disimpulkan nilai viskositas sebelum penyimpanan dipercepat memiliki nilai paling tinggi dengan emulgator anionik konsentrasi 3% yaitu 53840 poise, dan untuk emulgator nonionik konsentrasi 4% paling tinggi dengan nilai 62400. Sedangkan setelah penyimpanan dipercepat yang memiliki nilai viskositas yang tinggi emulgator anionik dengan konsentrasi 3% yaitu 26600 poise. Untuk emulgator nonionik setelah penyimpanan memiliki nilai paling tinggi yaitu konsentrasi 4% yaitu 2710 poise. Dapat disimpulkan dari kedua jenis emulgator dengan uji viskositas sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat memiliki nilai yang jauh berbeda pada emulgator nonionik nilai viskositas mengalami penurunan sebesar 59690 poise yang mengalami penurunannya sangat signifikan setelah penyimpanan. Sedangkan untuk emulgator anionik mengalami penurunan viskositas sebesar 60690 poise.

Hasil analisis statistik rancangan acak kelompok (RAK) viskositas krim susu kuda Sumbawa sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat menunjukkan terjadi pergeseran viskositas yang signifikan setelah penyimpanan dimana  $F_{hitung} < F_{tabel}$  5,05. Hal ini berarti bahwa sediaan krim susu kuda

Sumbawa tidak stabil pada penyimpanan suhu ekstrem sehingga kondisi penyimpanan krim harus diperhatikan, sebaiknya pada suhu kamar.

Hasil pengamatan tetes terdispersi menunjukkan adanya perbedaan ukuran sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat. Jika dilihat di bawah mikroskop dari pembesaran yang sama 10x10 terlihat bahwa tetes terdispersi krim sebelum penyimpanan terlihat sangat rapat dengan tingkat dispersitas yang baik, sedangkan setelah penyimpanan terlihat perbedaan kerapatan karena terdapat beberapa partikel minyak yang menyatu membentuk partikel yang lebih besar namun tidak sampai pada tahap pecahnya emulsi. Emulsi akan menunjukkan stabilitas dan tingkat dispersitas yang optimal jika lapisan tipis menyaluti batas antar permukaan secara total, yang menyalut bola-bola kecil menjadi semacam kulitnya atau sebagai lapisan yang kaku.

Pengujian daya sebar krim sebelum penyimpanan dipercepat menunjukkan bahwa krim dengan emulgator anionik 2%, 3%, dan 4%, serta nonionik 3% dan 4% memiliki daya sebar yang lebih besar yaitu 0,9 dibandingkan daya sebar pada formula krim dengan emulgator nonionik konsentrasi 2% yaitu hanya 0,4. Pada pengujian daya sebar setelah kondisi penyimpanan dipercepat tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dengan daya sebar saat pengujian sebelum penyimpanan dipercepat. Karena nilai regresi dari sediaan anionik 2%, 3% dan 4% dan nonionik 3% dan 4% masih 0,99 yang berarti memiliki nilai yang hampir mendekati satu, ini

menunjukkan penggunaan sediaan nyaman pada pengolesan seimbang berbeda dengan sediaan nonionik menunjukkan nilai regresi jauh dari 1 berarti penggunaan sediaan yang aman dan nyaman, dengan tes, meningkat maka luas sebaran meru-

Uji pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui keamanan sediaan yang digunakan. Hal ini karena sediaan yang merupakan sediaan topikal yang digunakan di kulit wajah sehingga mungkin memiliki pH yang mendekati wajah, yaitu 4,0-5,5.

Berdasarkan hasil pengukuran menunjukkan bahwa pH sediaan kondisi penyimpanan dipercepat formula I yaitu 7, formula II yaitu 7 yaitu 7, dan formula IV yaitu 5, formula 7 dan formula VI yaitu 5. Pada pengujian setelah kondisi penyimpanan menunjukkan bahwa pH sediaan formula I yaitu 7,2, formula II yaitu 7, formula III yaitu 7,6, dan formula IV yaitu 5,4 yaitu 5,4 dan formula VI yaitu 5,4. Karena pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi diluar kisaran pH kulit menyebabkan iritasi kulit. Keasaman ini disebabkan karena bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi umum atau sedikit asam. Dari data yang dapat diketahui bahwa formula krim Sumbawa dengan emulgator memenuhi syarat rentang pH kulit yaitu 5,5-6,5.



Berdasarkan uji stabilitas fisik krim susu kuda Sumbawa setelah diformulasi sediaan yang memiliki bentuk sediaan yang baik yaitu emulsi dengan emulgator anionik 4%. Untuk menganalisis emulsi, uji pengenceran dan uji dispersi zat warna sebelum penyimpanan dipercepat dan setelah penyimpanan dipercepat pada uji dispersi zat warna sebelum dan sesudah penyimpanan dapat perubahan tipe emulsi (A/M) dengan emulgator nonionik konsentrasi 2%, 3% dan 4%. Pada uji pengenceran menunjukkan tidak terjadi perubahan pada sediaan anionik konsentrasi 2%, 3%, dan 4% maupun nonionik konsentrasi 2%, 3%, dan 4%.

Evaluasi stabilitas fisik sendiri pada pengujian tetes terdispersi menggunakan mikroskop perbesaran 10x10 terjadi perubahan bahwa tetes terdispersi sebelum penyimpanan terlihat sangat rapat emulgator anionik 4%, sedangkan setelah penyimpanan terlihat perbedaan kerapatan, beberapa partikel minyak yang menyatu membentuk partikel yang lebih besar dengan emulgator anionik 2%. Penyimpanan suatu emulsi pada suhu yang lebih tinggi adalah mempercepat proses agregasi (membentuk partikel lebih besar) yang ini diikuti dengan perubahan kekentalan.

Pengujian volume kriming menunjukkan terjadi perubahan fisik pada sediaan dengan emulgator nonionik 2%, 3% dan 4%, akan tetapi perubahan yang sangat signifikan terjadi pada sediaan nonionik 2%. Ini menunjukkan sediaan nonionik 2% dipengaruhi oleh perubahan suhu yang ekstrim pada periode waktu penyimpanan, menjadi lebih kental pada suhu penyimpanan 5° C dan menjadi lebih

encer ketika suhu 35°C ini menjadikan ketidakstabilan krim nonionik terutama konsentrasi 2% dalam hal terbentuknya kriming. Terjadinya volume kriming pada siklus ke 6-10 dengan emulgator nonionik 2% yang sangat signifikan untuk nonionik konsentrasi 3% dan 4% tidak terjadi perubahan yang begitu besar yaitu sekitar 2 ml pada setiap emulgator nonionik. Untuk emulgator anionik konsentrasi 2%, 3% dan 4% tidak terjadi volume kriming dari siklus pertama hingga siklus 10.

Pengujian pH dengan perbedaan konsentrasi emulgator tidak menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan sebelum dan sesudah penyimpanan akan tetapi yang masuk dalam pH kulit yaitu emulgator nonionik 2% dan 4%.

Pengujian daya sebar dilakukan untuk mengetahui besar gaya yang diperlukan untuk menyebar di permukaan kulit. Berdasarkan sebelum penyimpanan dan sesudah penyimpanan yang tidak memiliki nilai regresi yang bagus terdapat pada dengan nilai regresi 0,4334 dan 0,3308 dengan emulgator nonionik 2%. Nilai regresi 0,99 yang artinya menunjukkan penggunaan sediaan yang amat nyaman pada pengolesan pada kulit.

## KESIMPULAN

Formula krim susu kuda Sumbawa dengan emulgator anionik menunjukkan stabilitas fisik yang baik dalam penyimpanannya; berdasarkan hasil pengamatan organoleptis, tipe emulsi, kriming, viskositas, daya sebar, dan pH dibandingkan

dengan emulgator nonionik yang kurang baik dalam penyimpanan.

Emulgator anionik dengan konsentrasi 2%, 3%, dan 4% dapat membentuk krim dengan stabilitas fisik yang baik, dan emulgator nonionik dengan konsentrasi 2%, 3%, dan 4% tidak dapat membentuk krim dengan stabilitas fisik yang baik, diamati kedua emulgator anionik dan nonionik dengan konsentrasi 2%, 3%, dan 4% diperoleh stabilitas fisik yang baik pada emulgator anionik dengan konsentrasi 4%. pada uji stabilitas fisik, organoleptik, pengenceran, dispersi zat warna, volume kriming, daya sebar, dan viskositas.

## KEPUSTAKAAN

Anief, Moh. *Sistem Dispersi Formulasi Suspensi Dan Emulsi*. Gadjamada University Press. Yogyakarta. 1999.

Fauzia Nur Laili. *Susu Kuda Sumbawa Khas Indonesia Bahan Kosmetik Antibakteri Jerawat (Staphylococcus Epidermidis)*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2014.

Lachman, Leon, dkk. *Teori dan Praktek Farmasi Industri*. UI-press. Jakarta. 1994.

Murini, T., *Obat Jerawat Topical dan Bentuk Sediaannya yang beredar di Indonesia*. Jurnal Kedokteran Yarsi. 2003.

Swarbrick, J., Rubino, J.T., & Rubino, O.P., Coarse Dispersion, dalam Gennaro, A.R., (Ed.), *Remington : The Science and Practice of Pharmacy*. 20th Ed., Vol. 1. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia. 2000. 317 – 333.



# FORMULASI DAN EVALUASI FISIK KRIM *BODY SCRUB* DARI EKSTRAK TEH HITAM (*Camellia sinensis*), VARIASI KONSENTRASI EMULGATOR SPAN-TWEEN 60

Marla Ulfa, Nur Khairi, Fadillah Maryam  
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi, Makassar, Indonesia

## ABSTRAK

Teh hitam mengandung theaflavin yang berfungsi sebagai antioksidan alami untuk menangkal radikal bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan formulasi krim *body scrub* yang stabil secara fisik, ekstrak teh hitam diformulasikan menjadi sediaan krim *body scrub* dengan menggunakan variasi konsentrasi emulgator span-tween 60. Krim *body scrub* selanjutnya di uji kestabilan fisiknya meliputi pengamatan organoleptis, pH, volume kriming, viskositas, dan ukuran tetes terdispersi serta inversi fase menggunakan metode penyimpanan dipercepat. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perubahan organoleptis, volume kriming, inversi fase, dan tetes terdispersi pada ketiga formula krim. Dari hasil evaluasi ketiga variasi konsentrasi emulgator tween-span 60 1%, 2%, dan 3% diperoleh krim *body scrub* ekstrak teh hitam yang paling stabil adalah formula 2 dengan konsentrasi tween-span 60 2%.

**Kata Kunci :** teh hitam, krim *body scrub*, kestabilan fisik

## PENDAHULUAN

Teh sebagian besar mengandung ikatan kimia yang disebut polifenol. Polifenol merupakan suatu kelompok antioksidan yang secara alami terdapat pada sayur-sayuran, buah-buahan, dan minuman seperti teh dan anggur (Pambudi, 2000). Theaflavin hanya terdapat pada teh hitam atau teh yang mengalami oksidasi, kekuatan theaflavin dianggap setara dengan katekin sebagai antioksidan alami yang sangat potensial sebagai penangkal radikal bebas (Winarsih, 2007 dan Turkoglu, 2007).

Penelitian (Widowati W *et al*, 2011) menunjukkan pemerangkapan DPPH memiliki aktivitas antioksidan tinggi sebesar 88,59-93,556%, didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanty S (2009) tentang aktivitas antioksidan ekstrak etanol teh hitam dengan metode DPPH (2,2-difenil-1-pikril

hidrazil) menunjukkan hasil bahwa ekstrak etanol teh hitam mempunyai nilai  $IC_{50}$  sebesar 14,0993  $\mu\text{g/ml}$  dan memiliki aktivitas antioksidan yang lebih baik daripada vitamin C. Salah satu upaya untuk perlindungan atau perawatan kulit, yaitu dengan menggunakan suatu bahan yang diformulasikan dalam sediaan kosmetik.

Kosmetik tersedia dalam berbagai sediaan salah satunya dalam sediaan krim *body scrub*. Krim *body scrub* merupakan produk kosmetik perawatan kulit yang mengandung bahan agak kasar atau biasa disebut kosmetik *abrasiver* (Alam M, 2009). Bahan-bahan dasar *scrub cream* sama dengan krim pembersih kulit pada umumnya yang mengandung lemak penyegar, *scrub cream* mengandung butiran-butiran kasar yang bersifat sebagai pengampelas (*abrasiver*) agar

bisa mengangkat sel-sel yang sudah mati dari epidermis. Sediaan krim *Body scrub* dari konsentrasi beberapa jenis bahan salah satunya adalah emulgator (Tanggana, 2007).

Emulgator adalah bahan aktif permukaan (surfaktan) yang mengurangi tegangan antarmuka antara minyak dan air dan mengedang tetesan-tetesan terdispersi dalam lapisan kuat yang mencegah koalesensi dan pemisahan fase terdispersi. Suatu krim dapat terbentuk dan stabil jika menggunakan emulgator yang tepat. Pemilihan basis didasarkan pada tujuan penggunaannya dan jenis bahan yang akan digunakan. Krim *body scrub* yang akan dibuat adalah krim dengan tipe M/A dengan menggunakan variasi konsentrasi emulgator nonionik, tipe emulsi ini dipilih karena lebih mudah dicuci dengan air dan tidak berminyak selain itu tingkat iritasinya rendah dan tidak dipengaruhi oleh pH (Lachman L, 1994).

## **METODE PENELITIAN**

### ***Alat dan bahan***

Alat yang digunakan yaitu alat gelas yang umum digunakan di laboratorium, alat maserasi, *climatic chamber*, *homogenizer (wids wiseStir®)*, pipet tetes, pH meter, termometer, *viscometer Brookfield (LV)*, *hot plate*,

Bahan yang digunakan yaitu aquadest, asam stearat, *adeps lanae*, beras, etanol 70%, propilenglikol, metil paraben, propil paraben, paraffin cair, setil alkohol, span 60, teh hitam, tween 60, vitamin C.

### ***Penyiapan sampel***

Teh hitam sebanyak diekstraksi dengan etanol 70% dan maserasi pada suhu kamar selama sambil sesekali diaduk, kemudian Ampasnya kemudian di rebus dan diuapkan hingga diperoleh ekstrak, selanjutnya di *freezer dryer* hingga ekstrak kering.

### ***Pembuatan Krim Body Scrub Hitam***

Fase minyak dibuat dengan berturut-turut *adeps lanae*, asam alkohol, dan span 60, kemudian propil paraben, suhu dipertahankan pada 70°C. Fase air dibuat dengan metil paraben dalam air yang telah dipanaskan, ditambahkan propilenglikol, kemudian ditambahkan tween 60 dan dipertahankan pada suhu 70°C. Kemudian dengan mencampurkan fase minyak dan air sambil diaduk dengan pengaduk selama 3 menit, kemudian dididihkan selama 20 detik lalu diaduk sampai homogen terbentuk krim dimasukkan ekstrak beras (mesh 60/40). Selanjutnya dilakukan uji stabilitas fisik.

Adapun rancangan formula krim ekstrak teh hitam dapat dilihat pada



**Tabel 1. Formulasi sediaan krim body scrub**

Komposisi Bahan	Formula krim body scrub (% b/b)		
	Formula I	Formula II	Formula III
	Ekstrak teh hitam	1	1
Beras putih	10	10	10
Asam stearat	5	5	5
Span-tween 60	1	2	3
Setil alkohol	3	3	3
propilenglikol	0,2	0,2	0,2
Paraffin cair	5	5	5
Adeps lanae	5	5	5
Metil paraben	0,1	0,1	0,1
Propil paraben	0,05	0,05	0,05
Aquadest ad	100	100	100

### Evaluasi Kestabilan Fisik

Semua parameter evaluasi kestabilan fisik dilakukan sebelum dan sesudah kondisi penyimpanan dipercepat (uji *Accelerate*).

### Jji Organoleptik

Pengamatan organoleptis yang dilakukan terhadap sediaan krim *body scrub* yang telah dibuat meliputi pengamatan perubahan warna, tekstur dan bau.

### Pengukuran pH

Pengukuran pH dilakukan terhadap sediaan krim *body scrub* yang telah dibuat dengan pH meter. Pengukuran ini dilakukan sebelum dan sesudah *accelerate* (Tranggono, 2007).

### Pengukuran Volume kriming

Krim sebanyak 25 ml, dimasukkan dalam gelas ukur kemudian diberi kondisi

penyimpanan dipercepat yaitu penyimpanan pada suhu 5°C dan 35°C masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus. Pengamatan volume kriming dihitung dalam % dengan rumus :

$$\text{Volum kriming} = \frac{H_u}{H_o} \times 100\%$$

Dimana;  $H_u$  = Volume emulsi yang kriming

$H_o$  = Volume total krim

### Pengukuran viskositas

Pengukuran kekentalan dilakukan terhadap sediaan krim yang telah dibuat sebelum dan setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat. Pengukuran kekentalan dilakukan dengan menggunakan *Viskometer Brookfield* pada 50 rotasi per menit (rpm) dengan menggunakan "spindle".

### Pengukuran tetes disperse

Sediaan dimasukkan dalam vial kemudian dilakukan pengukuran tetes dispersi sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Pengamatan ukuran tetes terdispersi dilakukan dengan menggunakan mikroskop mikrometer. Caranya dengan meneteskan krim pada objek gelas kemudian ditutup dengan dek gelas dan setelah diperoleh perbesaran dan perbandingan skala mikrometer okuler dan mikrometer obyektif yang sesuai maka diamati rentang ukuran partikel tetes terdispersinya.

### Inversi fase

Sediaan yang telah jadi diberi kondisi penyimpanan dipercepat kemudian diuji kembali tipe emulsinya dengan metode pengenceran dan metode dispersi zat warna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ekstraksi

Hasil proses ekstraksi yang dilakukan pada 500 g simplisia teh hitam, diperoleh ekstrak kering teh hitam sebesar 27,5986 g dengan karakteristik berwarna coklat kehitaman dan bau khas ekstrak teh dengan rendamen ekstrak sebesar 5,5197 %.

### Uji Organoleptik

**Tabel 2. Pengamatan organoleptis krim body scrub**

Krim	Tipe Emulsi			
	Sebelum accelerate		Setelah accelerate	
	Pengenceran	Dispersi Zat Warna	Pengenceran	Dispersi Zat Warna
	F1	M/A	M/A	M/A
F2	M/A	M/A	M/A	M/A
F3	M/A	M/A	M/A	M/A

#### Keterangan :

F1 : krim *body scrub* ekstrak teh hitam konsentrasi emulgator tween-span 60 1%

F2 : krim *body scrub* ekstrak teh hitam konsentrasi emulgator tween-span 60 2%

F3 : krim *body scrub* ekstrak teh hitam konsentrasi emulgator tween-span 60 3%

Hasil pengamatan organoleptis terhadap krim *body scrub* yang mengandung ekstrak teh hitam dengan pengaruh emulgator tween 60-span 60 dari konsentrasi 1%, 2%, dan 3%, tidak menunjukkan perubahan warna dan bau setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Berarti tidak ada pengaruh pengemulsi nonionik terhadap perubahan organoleptis untuk ketiga krim yang dibuat. Penggunaan emulgator tween-span 60 bersifat netral, tidak toksik, mudah bercampur dengan bahan lain

serta tidak dipengaruhi oleh perubahan adanya elektrolit (Lachman, 1994).

### Penentuan tipe emulsi

**Tabel 3. Pengamatan tipe emulsi**

Formula	Sebelum accelerate			Sesudah
	Warna	Tekstur	Bau	Warna
1	Coklat	Kental	Khas ekstrak	Coklat
2	Coklat	Kental	Khas ekstrak	Coklat
3	coklat	Kental	Khas ekstrak	coklat

#### Keterangan :

F1: krim *body scrub* ekstrak teh hitam emulgator tween-span 60 1%

F2: krim *body scrub* ekstrak teh hitam emulgator tween-span 60 2%

F3: krim *body scrub* ekstrak teh hitam emulgator tween-span 60 3%

Hasil pengujian tipe emulsi krim yang mengandung ekstrak teh hitam dan setelah accelerate memperlihatkan ketiga formula krim tidak mengalami fase. Krim mempunyai tipe M/A dapat dilihat pada uji pengenceran dispersi zat warna (metilen biru) disebabkan karena volume fase (fase minyak/lemak) yang digunakan krim lebih kecil dari fase pendispersi sehingga fase minyak akan terdispersi ke dalam fase air dan membentuk emulsi M/A. Selain itu sistem nilai HLB emulgator yang dibutuhkan adalah Emulgator dengan nilai HLB dibutuhkan akan terdistribusi dalam fase membentuk emulsi semakin tinggi



surfaktan maka semakin tinggi pula tahanan untuk terinversi (Liebermen, H.A 1988).

### Pengukuran pH

Tabel 4. Pengamatan pH

Formula	pH	
	Sebelum accelerate	Sesudah accelerate
I	5	5
II	5	5
III	4,8	5

#### Keterangan :

- F1: krim *body scrub* ekstrak teh hitam konsentrasi emulgator1 span-tween 60 1%
- 2: krim *body scrub* ekstrak teh hitam konsentrasi emulgator span-tween 60 2 %
- 3: krim *body scrub* ekstrak teh hitam konsentrasi emulgator span-tween 60 3 %

Pada hasil pengujian derajat keasaman dan kebasaaan (pH) menunjukkan bahwa pada kedua formula yaitu F1, F2, setelah accelerate pH tetap sedangkan pada F3 pH mengalami peningkatan. Hasil pengukuran pH dari ketiga sediaan baik sebelum maupun sesudah accelerate tetap berada dalam kisaran pH yang di harapkan untuk sediaan kulit (dermal). Apabila sediaan bersifat basa (tidak masuk dalam rentang pH 4,5-6,5) akan mengakibatkan kulit teras licin, cepat kering, dan dikhawatirkan akan mempengaruhi elastisitas kulit, namun apabila sediaan bersifat asam dengan rentang pH dibawah rentang pH kulit akan mengakibatkan kulit mudah teriritasi.

### Volume Kriming

Hasil pengamatan volume kriming menunjukkan tidak terdapat kriming pada semua krim *body scrub* berarti tidak ada

pengaruh pebedaan konsentrasi emulgator nonionik (tween 60 dan span 60) terhadap volume kriming. Kriming adalah perpindahan keatas dari tetesan terdispersi pada fase kontinyu. Hal ini terjadi karena ukuran partikel yang tidak seragam dan besar serta viskositas dari fase kontinyu yang kurang, dan juga kriming dapat terjadi jika fase terdispersi mempunyai densitas yang lebih kecil dibandingkan dengan fase pendispersi yaitu biasanya terjadi pada emulsi tipe M/A namun sebaliknya jika fase terdispersi memiliki densitas yang lebih besar dibandingkan fase pendispersi biasanya terjadi pada emulsi tipe A/M maka cenderung terbentuk endapan (Martin EL, 1971).

### Pengukuran Viskositas

Viskositas emulsi diukur menggunakan viskometer brookfield dengan "spindle" no 6. Hasil pengukuran viskositas masing-masing krim *body scrub* sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat, menunjukkan adanya perubahan viskositas. Viskositas sebelum dan setelah accelerate paling kecil adalah formula II. Pada sediaan cream mengalami penurunan viskositas pada ketiga konsentrasi seharusnya semakin besar konsentrasi emulgator maka, viskositanya pun akan naik pula. Pada pembuatan cream aquadest sangat berperan penting karena jika terlalu banyak penambahannya akan menyebabkan viskositas cream rendah, sedangkan jika penambahan aquadest terlalu sedikit akan membuat viskositas cream semakin tinggi.

**Tabel 5. Pengamatan viskositas**

Formula	Sebelum Kondisi Penyimpanan dipercepat	Setelah Kondisi Penyimpanan dipercepat
	41,5	33,5
F1	39	29,5
	40,5	28
<b>Rata-rata</b>	<b>40,3</b>	<b>30,3</b>
	34	33,5
F2	33	33
	34,5	28
<b>Rata-rata</b>	<b>33,8</b>	<b>31,5</b>
	42,5	29,5
F3	42	34
	41	34,5
<b>Rata-rata</b>	<b>41,8</b>	<b>32,6</b>

**Keterangan :**

F1 : krim *body scrub* ekstrak teh hitam konsentrasi emulgator tween-span 60 1 %

F2 : krim *body scrub* ekstrak teh hitam konsentrasi emulgator tween-span 60 2 %

F3 : krim *body scrub* ekstrak teh hitam konsentrasi emulgator tween-span 60 3 %

**Ukuran Tetes Terdispersi**

Berdasarkan tabel tersebut, krim *body scrub* yang menunjukkan tetes terdispersi sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat paling kecil adalah F3. Secara teori rata-rata ukuran tetes terdispersi krim yang memenuhi syarat yaitu antara 0,2-50  $\mu\text{m}$  (Parrot, 1974), dari data diatas F1 tidak memenuhi syarat dengan ukuran tetes terdispersi 60  $\mu\text{m}$

**Tabel 6. Pengamatan tetes dispersi**

Formula	Sebelum Kondisi Penyimpanan dipercepat ( $\mu\text{m}$ )
	94,2
F1	51,9
	52,0
<b>Rata-rata</b>	<b>66,0</b>
	45,5
F2	47,1
	39,0
<b>Rata-rata</b>	<b>43,9</b>
	48,7
F3	49,8
	34,1
<b>Rata-rata</b>	<b>44,2</b>

**Keterangan :**

F1 : krim *body scrub* ekstrak teh hitam emulgator 1 %

F2 : krim *body scrub* ekstrak teh hitam emulgator 2 %

F3 : krim *body scrub* ekstrak teh hitam emulgator 3 %

**KESIMPULAN**

Formula krim *body scrub* ekstrak teh hitam dengan variasi konsentrasi emulgator tween-60 yang paling stabil adalah formula 2 dengan konsentrasi tween 2%.



## KEPUSTAKAAN

- Pambudi, J. *Potensi Teh Sebagai Sumber Zat Gizi dan Perannya Dalam Kesehatan*. Prosiding Seminar Sehari Teh Untuk Kesehatan Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung. Bandung. 17 Oktober 2000.
- Winarsi, H. *Antioksidan Alami dan Radikal Bebas. Sebuah Tinjauan Ilmiah*. Kanisius. Yogyakarta. 2007.
- Turkoglu, M., Cigirgil, N. *Evaluataion of black tea gel and its protection potential against UV*. Vol 29. International Journal of Cosmetic Science. Istanbul, Turkey. 2007. 437 – 442.
- Widowati W, Tati H, Hana R, Tjandrawati M, Victor I. *Potency Of Antioxidant, Anticholesterol And Platelet Antiaggregation Of Black Tea (Camelia Sinensis )*. Bul. Littro. 2011. 22, 1: 74 – 83.
- Susanty, S. *Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Teh Hitam dengan Metode DPPH*. Karya Tulis Ilmiah AKFAR. Makassar. 2009.
- Alam , M. *Cosmetic Dermatology for Skin of Color*. The McGraw-Hill Companies Inc. United states. 2009.
- Tranggono Retno Iswari *et al. Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2007. P 6 – 10
- Lachman L. *Theory and Practice of Industrial Pharmacy*. Mack Publishing Company. Easton, pennsylvania. 1994. 299.
- Lierberman HA. *et al. Pharmaceutical Dosage form: Disperse systems*. Vol 1. Marcel Dekker, Inc. New York. 1988. p. 201.
- Martin EL. *Dispensing of medication*. 7<sup>th</sup> ed. Mack Publishing Company Easton Pennsylvania 1971 p 528-529
- Parrott E. *Pharmaceutical Technology*. Burgess Publishing Company University of Iowa Iowa City, Iowa 1974 pp 310, 313.
- Umiyah. *Pengujian Antiradikal Bebas DPPH Ekstrak Buah Kenitu dari Daerah Jember*. 2005.

# STUDI KEMAMPUAN PATI BIJI ALPUKAT (*Persea americana* Mill) PREGELATIN, SEBAGAI BAHAN PENGHANCUR PADA TABLET PARACETAMOL KEMPA LANGSUNG

Surya Ningsi, Dwi Wahyuni Leboe, Karlina Amir Tahir, Qurratul Aeni

Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : qurratulaeni416@gmail.com

## ABSTRACT

Researched about the study of the ability of pregelatinized avocado seeds (*Persea americana* Mill) starch as disintegrant by direct compression of paracetamol tablets. This Research suppose to know about the ability of pregelatinized avocado seeds starch as disintegrant and optimum concentration of pregelatinized avocado seeds starch as disintegrant on direct compression fulfill the qualification good tablets.

Pregelatinized starch produced by heating in its gelatinated temperature, then standardized its measure. Then, evaluated according to granul evaluation. Mixing tablets, Three formulas were made by disintegrants concentration different (pregelatinized avocado seeds starch) FI 5%, FII 10% dan FIII 15%. Next, evaluated. Tablets compression method and evaluated.

The evaluation results pregelatinized avocado seeds starch regularly have: bulk density 0,72 g/ml, angel of repose 22,76°, fluidity 7,40/det, density true 1,21g/ml, density bulk tapped 0,72 g/ml, porosity 40,84 %, compressibility index 3,77%, hausner's ratio 0,39%. The result show that pregelatinized avocado seeds starch has good compressibility and fluidity. Result test for tablets show all formulas fulfill the qualification at the weights uniformity, tablets size uniformity, FII dan FIII fulfill the qualification at the weights uniformity, regularity 4,51 kg; 6,39 kg; 4,23 kg, friability 1,4%; 0,07%, and 1,50% and disintegration time: 0,44 minute and 0,04 minute.

From this result can be concluded that the pregelatinized avocado seeds starch can be used as a disintegrant on direct compression and the optimum concentration of pregelatinized avocado seeds of the produce tablets fulfill the qualification good tablets is FII (10%).

**keywords:** Tablets, Paracetamol, pregelatinized avocado seeds starch, disintegrant, direct compression.

## PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi di bidang farmasi mendorong para farmasis untuk membuat suatu bentuk sediaan yang mudah diterima oleh masyarakat, selain ditinjau dari kualitas yang tetap harus dipenuhi. Salah satu bentuk sediaan yang paling banyak digunakan adalah tablet. Untuk dapat

menghasilkan efek terapi, tablet harus dapat melepaskan zat aktif ke dalam tubuh untuk dilarutkan dan terserap diabsorpsi. Bahan tambahan dalam pembuatan tablet yang mempengaruhi hancurnya atau pecahnya tablet berada dalam cairan saluran per



adalah bahan penghancur. Salah satu bahan penghancur yang sering digunakan yaitu pati/amilum.

Salah satu limbah tanaman yang mengandung pati adalah biji alpukat yang sampai saat ini hanya dibuang karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Padahal di dalam biji alpukat mengandung amilosa yang mempengaruhi kemampuan pati sebagai bahan penghancur sekitar 32,5% (Chel, Luis *et al.* 2015:10).

Pati memiliki keterbatasan dalam penggunaannya, karena tidak dapat dicetak dan laju alir kurang baik (The Departement of Health, 2009: 378), sehingga pati banyak dipakai dalam metode granulasi basah yang memerlukan waktu yang cukup lama sehingga untuk membuat tablet sebaiknya memilih metode kempa langsung yang lebih ekonomis serta bahan obat yang peka lembab dan panas dapat dibuat menjadi tablet dengan metode tersebut (Voight, 1995:169).

Agar pati biji alpukat alami dapat digunakan dalam formulasi kempa langsung maka dilakukan modifikasi menjadi bentuk pregelatinasi dengan cara pemanasan suspensi pati dalam air (Rowe, *et al.* 2009: 691). Pati pregelatinasi memiliki ukuran partikel yang lebih besar daripada bentuk serbuknya sehingga memiliki sifat alir yang lebih baik dan cocok untuk dikempa langsung.

Pati pregelatinasi dapat digunakan sebagai pengisi, penghancur, dan pengikat (Rowe, *et al.* 2009:692). Akan tetapi informasi tentang manfaatnya dalam tablet masih sangat terbatas, sehingga industri farmasi

masih jarang menggunakannya sebagai penghancur. Sebagai bahan penghancur yang disukai pada umumnya adalah derivat selulosa, Starch 1500, Explotab<sup>®</sup> dan lain-lainnya, semuanya masih merupakan komoditi impor dan umumnya harganya mahal.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan dan konsentrasi optimum dari pati biji alpukat pregelatinasi sebagai bahan penghancur pada proses pembuatan tablet paracetamol secara kempa langsung yang menghasilkan tablet yang memenuhi persyaratan tablet yang baik.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Pengambilan Sampel**

Sampel berupa biji alpukat diambil dari penjual jus di anjungan pantai losari. Hasil pengambilan sampel biji alpukat sebanyak 2,9 kg.

### **2. Pengolahan Sampel dan ekstraksi pati**

Sebanyak 2,9 kg biji alpukat dibersihkan dari kulit luarnya dan dicuci, kemudian di potong-potong kecil dan direndam dengan larutan  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$  2000 ppm selama 24 jam. Setelah direndam, kemudian dihaluskan. Hasilnya kemudian disaring dan didekantasi sebanyak 3x. Endapan pati yang diperoleh dikeringkan dalam oven dengan suhu  $60^\circ\text{C}$  selama 12 jam kemudian dihaluskan dan diayak dengan ayakan no.mesh 35. Pada ekstraksi pati diperoleh pati biji alpukat sebanyak 369,25 g.

### 3. Pembuatan Pati Pregelatinasi (Rowe et al, 2009: 693).

Pasta pati dibuat dengan konsentrasi 42% berdasarkan berat kering dengan air dan dipanaskan diatas suhu gelatinisasinya sambil diaduk secara perlahan-lahan hingga diperoleh massa kental, didinginkan dan dikeringkan di oven pada suhu 60°C selama 1 x 24 jam. Serpihan yang diperoleh dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ayakan mesh 100. Pada proses ini dihasilkan pati biji alpukat pregelatinasi sebanyak 164,626 gram.

### 4. Evaluasi Pati Pregelatinasi

#### a. Analisis ukuran partikel

Distribusi ukuran partikel dievaluasi dengan menggunakan *sieve shaker*. Satu seri dari delapan ayakan standar analyzer dengan nomor ayakan 5, 10, 18, 35, 120, 230, dan 325, pati pregelatinasi yang telah ditimbang ditempatkan dalam ayakan dan mesin pengayak dijalankan selama 20 menit dengan kecepatan 50 rpm. Kemudian, pati pregelatinasi yang tertahan di tiap diayakan ditimbang (Martin A, 1993: 1037).

#### b. Uji sudut istirahat

Pati pregelatinasi ditimbang sebanyak 25 gram, dimasukkan kedalam corong yang lubang bawahnya ditutup, kemudian diratakan permukaannya. Pada bagian bawah corong diberi alas. Tutup bawah corong dibuka sehingga pati pregelatinasi dapat mengalir ke atas meja yang telah dilapisi kertas grafik. Diukur tinggi (h) dan diameter (d) timbunan pati pregelatinasi yang terbentuk (USP, 2007: 643).

$$\tan \alpha = \frac{2h}{d}$$

#### c. Uji Laju alir

Pengujian dilakukan seperti pada pengujian sudut istirahat. Waktu alir ditentukan dengan menggunakan *stopwatch*, dihitung pada saat pati pregelatinasi mulai mengalir hingga berhenti mengalir. Laju alir dihitung dengan rumus (Aulton, 1988: 207):

$$\text{Laju alir} = \frac{\text{bobot granul (g)}}{\text{waktu alir (s)}}$$

#### d. Penetapan bobot jenis (Bj) sejati

Penetapan Bj sejati dilakukan dengan cara ditimbang piknometer 25 ml yang kosong (a), kemudian piknometer diisi dengan paraffin cair dan ditimbang kembali (b) (Voight, 1995; 159).

$$\text{Bj Parafin} = \frac{b-a}{25 \text{ (ml)}}$$

Pati sebanyak 1 gram diisikan kedalam piknometer kosong kemudian ditimbang (c), lalu paraffin cair dimasukkan kedalamnya hingga penuh, kemudian ditimbang kembali (d)

$$\text{Bj sejati} = \frac{(c-a) \times \text{Bj Parafin Cair}}{(c+b)-(a+d)}$$

#### e. Uji Bj nyata, Bj mampat, dan porositas

Sebanyak 25 gram pati pregelatinasi dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml dan dicatat volumenya (Bj nyata). Kemudian dilakukan pengetukan dengan alat dan dicatat volume ketukan ke 10, ke 50, dan ke 500 (Bj mampat), lalu dilakukan perhitungan sebagai berikut (Olowosulu, 2011: 40):

$$\text{Bj nyata} = \frac{\text{bobot pati pregelatinasi (g)}}{\text{volume pati pregelatinasi (ml)}}$$

$$\text{Bj mampat} = \frac{\text{bobot pati pregelatinasi (g)}}{\text{volume mampat pati pregel (g) (ml)}}$$

$$\text{Porositas} = 1 - \left[ \frac{\text{bobot pati pregelatinasi (g)}}{\text{Bj sejati patipregelatinasi (ml)}} \right] \times 100 \%$$



**f. Penentuan Indeks Kompresibilitas dan Rasio Hausner**

Ditimbang pati pregelatinasi sebanyak 25 gram, dimasukkan kedalam gelas ukur 100 ml dan dicatat volumenya ( $V_0$ ), kemudian dilakukan pengetukan dengan alat sebanyak 500 kali dan dicatat kembali volumenya ( $V$ ) kemudian dihitung indeks kompresibilitasnya (I) dengan rumus (USP, 2007: 1174):

$$I = \frac{V_0 - V}{V} \times 100\%$$
$$\text{Rasio Hausner} = \frac{V_0}{V}$$

**g. Penetapan LOD**

Susut saat pengeringan dinyatakan sebagai "Loss On Drying" (LOD) yaitu suatu pernyataan kadar kelembaban, dilakukan dengan menimbang pati pregelatinasi yang dikeringkan pada suhu 105°C hingga tercapai bobot konstan yang dihitung dengan rumus (Davies, 2013: 1185):

$$\% \text{LOD} = \frac{\text{Bobot pati pregel awal} - \text{bobot pati pregel kering}}{\text{bobot pati pregel awal}} \times 100\%$$

**5. Pembuatan Tablet**

**a. Pembuatan tablet**

Dibuat tiga formula tablet yang mengandung 500 mg paracetamol sebagai zat aktif, dan pati biji alpukat pregelatinasi sebagai penghancur dengan 3 konsentrasi yang berbeda FI (5%), FII (10%), dan FIII (15%), Avicel®PH 102 sebagai pengikat dan pengisi serta talk sebagai pelicin. Campuran siap dicetak dengan mesin pencetak tablet lalu dilakukan evaluasi tablet.

**b. Evaluasi Tablet**

**1) Penampilan fisik dan keseragaman bobot**

Pengamatan dilakukan secara organoleptis meliputi bentuk, warna, tekstur permukaan, dan bau. Keseragaman bobot dapat ditetapkan sebagai berikut: ditimbang 20 tablet, lalu dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Kemudian timbang tablet satu persatu, tidak boleh lebih dari 2 tablet bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari yang ditetapkan pada kolom A dan tidak boleh satu tablet pun bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari yang ditetapkan pada kolom B. Jika perlu gunakan 10 tablet yang lain dan tidak satu tablet yang bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan dalam kolom A maupun kolom B (Dirjen POM, 1979: 7).

**1) Uji keseragaman ukuran**

Diambil 20 tablet secara acak, kemudian masing-masing tablet diukur diameter dan tebalnya dengan menggunakan jangka sorong. Kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari  $1 \frac{1}{3}$  tebal tablet (Dirjen POM, 1976: 6).

**2) Uji kekerasan tablet**

Diambil 6 tablet secara acak, lalu dimasukkan satu per satu ke dalam alat *hardness tester* yang diset sesuai dengan jumlah tablet yang diuji dan alat dinyalakan. Saat tablet pecah, pada alat akan tertera kekerasan tablet yang dinyatakan dalam satuan newton (Parrot, 1971:82).

### 3) Uji kerapuhan tablet

Diambil 10 tablet secara acak kemudian dibersihkan, ditimbang bobotnya ( $W_1$ ) dan dimasukkan ke dalam alat *friability tester*. Alat dijalankan dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Tablet kemudian dikeluarkan, dibersihkan dari debu dan ditimbang kembali ( $W_2$ ) (Olowosulu, 2011: 41). Dihitung % kerapuhan tablet.

$$\% F = \frac{W_1 - W_2}{W_1} \times 100\%$$

Persyaratan kerapuhan tablet tidak boleh lebih dari 1%

### 4) Uji waktu hancur

Diambil enam buah tablet kemudian dimasukkan satu per satu ke dalam masing-masing tabung basket disusul dengan cakram penuntun. Basket dimasukkan kedalam gelas kimia yang diisi dengan air suling sebanyak 900 ml dengan suhu 36°C-38°C sebagai media. Kemudian basket dinaik turunkan secara teratur 30 kali tiap menit. Pengujian dilakukan sampai semua tablet keluar dari keranjang. Waktu yang dibutuhkan akan tertera pada alat. Persyaratan untuk waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari 15 menit (Depkes RI, 1995: 1087).

## HASIL PENELITIAN

### 1. Evaluasi Pati Biji Alpukat Pregelatinasi

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pati Pregelatinasi

No	Parameter pengukuran	Hasil	Persyaratan
1.	Analisis Ukuran Partikel ( $\mu\text{m}$ )	231,3	Tidak boleh < 149 dan lebih > 420 $\mu\text{m}$
2.	Uji Sudut Istirahat ( $^\circ$ )	22,76	$\leq 40$
3.	Uji Laju Alir (g/det)	7,40	4-10
4.	Bj Sejati (g/ml)	1,21	$\geq 1\text{g/ml}$
5.	Bj Nyata (g/ml)	0,68	-
6.	Bj Mampat (g/ml)	0,72	Tidak menyusut > 2 ml
7.	Porositas (%)	40,84	10-90
8.	Indeks Kompresibilitas (%)	3,77	$\leq 20$
9.	Rasio Hausner	1,03	$\leq 1,25$
10.	LOD (%)	0,39	< 15

### 2. Evaluasi Sifat Fisik Tablet

Tabel 2. Hasil Evaluasi Sifat Fisik Tablet

No	Parameter Uji	Hasil		
		FI	FII	FIII
1.	Organoleptis			
	Bentuk	Bulat pipih	Bulat pipih	Bulat pipih
	Warna	Putih	Putih Kecoklatan	Putih coklat
	Tekstur	Licin	Agak kasar	Kasar
	Bau	Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak berbau
2.	Keseragaman Ukuran (cm)			
	Diameter (cm)	1,22	1,22	1,22
	Tebal (cm)	0,51	0,42	0,52
3.	Keseragaman Bobot (g)	0,49	0,44	0,55
4.	Kekerasan (kg)	4,51	6,39	4,23
5.	Kerapuhan (%)	1,47	0,73	1,50
6.	Waktu Hancur (menit)	0,27	0,10	0,04



## PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengolah biji alpukat yang dimodifikasi menjadi pati pregelatinasi sebagai Bahan Penghancur dalam pembuatan tablet kempa langsung.

Dari hasil penelitian diperoleh suhu gelatinasi pati biji alpukat adalah 72°C. Pati pregelatinasi dibuat dengan metode pregelatinasi sempurna sehingga pati dipanaskan pada suhu diatas gelatinasinya yaitu 75°C karena pada suhu diatas suhu gelatinasinya setiap partikel pati akan mengalami degradasi yang akan menyebabkan komponen yang terdapat dalam granula keluar terutama amilosa dan amilopektin dan terjadi ikatan antar gugus hidrogen dari masing-masing komponen (Cui, 2005: 202).

Pati pregelatinasi dalam formulasi tablet dapat digunakan sebagai pengikat dan penghancur. Pati biji alpukat pregelatinasi yang dibuat dengan metode pregelatinasi sempurna mengandung 20-30% amilosa (Rowe, 2009:691) sehingga memiliki beberapa keuntungan sebagai eksipien tablet antara lain mempunyai kemampuan sebagai penghancur tablet, dan dapat mempercepat kecepatan pelepasan zat aktif yang sukar larut dalam air.

Berdasarkan hasil evaluasi pati biji alpukat pregelatinasi (tabel 1) menunjukkan bahwa pati biji alpukat memiliki fluiditas dan kompresibilitas yang baik karena memenuhi persyaratan. Sehingga, pati biji alpukat pregelatinasi dapat digunakan sebagai

eksipien tablet yaitu bahan penghancur pada kempa langsung

Hasil evaluasi tablet uji keseragaman ukuran pada setiap formula menunjukkan bahwa ukuran tablet memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari  $1\frac{1}{3}$  tebal tablet (Dirjen POM, 1979:6).

Hasil uji keseragaman bobot tablet pada semua formula menunjukkan bahwa FII dan FIII memenuhi persyaratan ketentuan keseragaman bobot tablet dimana tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang lebih dari 5% dan tidak boleh satupun tablet yang bobotnya menyimpang lebih dari 10% dari bobot rata-ratanya (Dirjen POM, 1979:7). Hal ini disebabkan karena salah satu faktor yang mempengaruhi keseragaman bobot adalah sifat alir. Sifat alir massa cetak FI masuk dalam rentang cukup baik (USP, 2009:643), tetapi perbedaan tekanan kompresi pada masing-masing tablet mempengaruhi pengisian pada ruang kompresi oleh *hopper* dengan volume konstan, sehingga akan diperoleh tablet dengan bobot yang tidak seragam.

Hasil uji kekerasan menunjukkan semua formula memenuhi syarat kekerasan tablet yang baik yaitu 4-8 kg (Parrot, 1971:82).

Pada uji kerapuhan, hanya FII yang memenuhi persyaratan kerapuhan tablet yang tidak lebih dari 1% yaitu 0,73% (Lachman, *et al.* 1994: 654). Hal ini disebabkan karena pada FIII konsentrasi bahan pengikat yang digunakan rendah

## PETUNJUK PENULISAN

1. **Jurnal Farmasi FIK UIN Alauddin Makassar** menerima tulisan ilmiah atau artikel tentang hasil penelitian dalam bidang farmasi, termasuk yang ada kaitannya dengan kefarmasian dan bahan alam.
2. Naskah diutamakan yang belum pernah diterbitkan di media lain, baik cetak maupun elektronik. Jika sudah pernah disampaikan dalam suatu pertemuan ilmiah hendaknya diberi keterangan yang jelas mengenai nama, tempat, dan tanggal berlangsungnya pertemuan tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia baku dengan huruf Arial 11, diketik dengan jarak baris 1,5 spasi pada kertas HVS A4 dengan margin atas 3 cm, bawah 2 cm, kiri 2 cm, dan kanan 2 cm, minimum 4 halaman, maksimum 10 halaman sudah termasuk gambar/foto atau tabel, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Judul tulis dengan huruf kapital, singkat dan jelas mencerminkan isi tulisan.
  - b. Nama penulis tanpa gelar, diikuti alamat instansinya masing-masing dan disebutkan alamat korespondensi kepada penulis lengkap dengan alamat e-mail (bila ada).
  - c. Abstrak dalam bahasa Inggris atau Indonesia, maksimum 200 kata, dilengkapi dengan kata kunci (*keywords*) 3 – 5 kata.
  - d. Isi/ Batang Tubuh:
    - 1) Untuk tulisan berupa laporan hasil penelitian, disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran.
    - 2) Sitasi/rujukan keustakaan dilakukan dengan sistem abjad yang diletakkan dalam tanda kurung. Contoh: Asam amino merupakan..... (Hamzah, 2014 :1)
    - 3) Kepustakaan ditulis sesuai urutan abjad, ditulis secara konsisten. Contoh Penulisan keustakaan sebagai berikut:

**Artikel dari jurnal**

      - a) Manggau, M.A. *Prospek Terapi Gen dan Terapi Antisense. Majalah Farmasi dan Farmakologi.* 7 (2). 2013

**Buku Teks**

      - b) Hamzah, N. *Teori dan aplikasi Kimia Medisinal.* Makassar : Alauddin University Press. 2014

**Makalah dalam prosiding**

      - c) Arieswati, B., Djide, M.N., & Wahyudin, E. Pengaruh konsentrasi Pati Jagung sebagai Substrat terhadap Produksi Siklodekstrin dari *Bacillus mecerans*. Di dalam Iskandar Sudirman, Elly Wahyudin, Ilham Makhmud, Gemini Alam, Burhanuddin Taebe., & latifah Rahman, editor. Prosiding Kongres Ilmiah XII Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Ujung Pandang. 1997

**Buku/Monografi dari Internet**

      - d) Donaldson, M.S., editor. Measuring the quality of health care [monograph on the internet], *National Academy Press*, Washington, [cited 2004 Oct 8]. Available from: <http://bmj.bmjournals.com/cgi/content/full/329/7470/825.1999>

**Rujukan dari Dokumen Resmi dengan Penulis/Lembaga**

      - e) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Pedoman penulisan laporan Penelitian.* Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1978
4. Tabel harus utuh, jelas terbaca, dibuat dengan format tabel pada Microsoft Words, tanpa garis pembatas kolom dan baris pada badan tabel, diletakkan simetris di tengah area pengetikan, diberi judul dan nomor tabel dengan angka arab (1,2,3,... dst).
5. Gambar dibuat dengan format JPG, JPEG, atau BMP, atau format Microsoft Excel/scatter plot untuk grafik, disisipkan langsung dalam naskah dengan keterangan yang jelas. Beri judul dan nomor dengan angka arab (1,2,3,....dst).
6. Naskah dikirim dalam bentuk cetakan (*hard copy*) ke alamat redaksi dan berkas elektronik (*Soft copy*) dapat dikirim melalui e-mail ke alamat [iifak9uinam@yahoo.co.id](mailto:iifak9uinam@yahoo.co.id)





Alamat Redaksi :  
Jurusan Farmasi  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Jalan H. M Yasin Limpo No. 63 Samata - Gowa

