

*Jurnal Kemiah*

# PHARMACY

- ❖ Aktivitas Polifenol Dari *Sargassum hystrix* Terhadap  $\alpha$ -Glukosidase Menggunakan Metode Mayur Agung Giri Samudra
- ❖ Sari Daging Buah Alpukat (*Persea americana L*) Untuk Formulasi Sediaan Lotion Pelembab Kulit. Densi Selpia Sopianti
- ❖ Analisa Bakteriologis Air Sumur Gali Dengan Beberapa Tahapan Penyaringan Rabel Marsa, Dini Syavani, Inayah Hayati
- ❖ Identifikasi Senyawa Alkaloid Ekstrak N-Heksan Daun Subang-Subang (*Scaevola taccada L.*) Nurfitri Ramadhani, Nurwani Purnama Aji, Titin Fitria Ningsih
- ❖ Ekstrak Etanol Biji Pinang (*Areca Catechu L*) Untuk Formulasi Gel Antioksidan Pada Wajah. Yuska Novi Yanty.
- ❖ Uji Daya Hambat Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Randu (*Celba Pentandra (L) Gaertn*) Pada Bakteri *Pseudomonas Aeruginosa* Setya Enti Rikomah, Mimma Karolina.
- ❖ Formulasi Sediaan Gel Ekstrak Etanol Daun Pegagan (*Centella Asiatica (L) Urban*) Dan Uji Aktivitas Terhadap *propionibacterium acne* penyebab jerawat Sri Widyastuti
- ❖ Uji Angka Kapang Dan Khamir Pada Sediaan Kosmetik Lulur Mandi Selanjutnya Satu Bulan Pemakaian Firni, Erin Masrik, Putri Dewi Sartika.
- ❖ Formulasi Dan Uji Efektivitas Sediaan Gel Antiseptik Hand Sanitizer Ekstrak Daun Botto-Botto (*Chromolaena Odorata L.*) Isriany Ismail, Munifah Wahyuddin, Ade Irmadwiarti Firmansyah
- ❖ Pembuatan vco (*virgin coconut oil*) dengan metode tradisional buah kelapa hijau "*cocos nucifera l*" dan kelapa gading "*cocos nucifera eburnea*" Elmitra
- ❖ Uji Aktivitas Antihiperqlikemik Ekstrak Karagenan dan Polifenol Alga Merah *Eucheuma denticulatum* Fathnur Sani K. Agung Giri Samudra
- ❖ Gambaran Tingkat Kejadian Interaksi Obat pada Pasien *Pneumonia* di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Zahira Amody, Herlina Rante, Irawaty Dhajaruddin

EKSTRAK  
N-HEKSAN  
SUBANG-SUBANG

Uji Steroid dan Terpenoid

- ❖ Studi Rekam Medik Pasien Epilepsi Pediatrik Di Beberapa Rumah Sakit. Asril Burhan, Abd.Halim Umar, Zulham, Mauizatul latifah

Uji Toksisitas Akut Ekstrak Air Daun Kerehau (*Callicarpa longifolia Lam.*) Terhadap Menek Putih (*Mus musculus*)

The Siswanto Syamsul, Spandano Supomo, Sib Wena

Formulasi Sediaan Ekstrak Kulit Rambutaran (*Nepenthes spathulifera L.*)

Beti Dewi, Purnamasari



AL-FATAH  
BENGKULU



**Penanggung Jawab**

Agung Giri Samudra, S.Farm.,M.Sc.,Apt

**Ketua Dewan Redaksi**

Densi Selpia Sopianti, M.Farm.,Apt.

Sekretaris Penyunting

Marsidi Amin,S.Kom

**Anggota Pelaksana**

Yuska Novi Yanti, M.Farm.,Apt

Elmitra,M.Farm.,Apt

Fathnur Sani K,M.Farm.,Apt

Nurfijrin Ramadhani,M.Sc.,Apt

Setya Enti Rikomah, M.Farm.,Apt

Elly Mulyani,M.Farm.,Apt

Sari Yanti, M.Farm.,Apt

Aina Fatkhil Haque,M.Farm.,Apt

Dewi Winni Fauziah, M.Farm.,Apt



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
AKADEMI FARMASI AL-FATAH BENGKULU**

Jl.Indra Giri Gang 3 Serangkai Padang Harapan Bengkulu Telp/Fax :  
0736-27508 Email : [info@akfar-alfatah.ac.id/](mailto:info@akfar-alfatah.ac.id/)

[lppmakfar\\_alfatah13@yahoo.com](mailto:lppmakfar_alfatah13@yahoo.com)

Website : [www.akfar-alfatah.ac.id/](http://www.akfar-alfatah.ac.id/) [pppm.akfar-alfatah.ac.id](http://pppm.akfar-alfatah.ac.id)



DAFTAR ISI	Hal
Aktivitas Polifenol Dari <i>Sargassum hystrix</i> Terhadap $\alpha$ -Glukosidase Menggunakan Metode Mayur <i>Agung Giri Samudra</i>	1-5
Sari Daging Buah Alpukat ( <i>Persea americana</i> L) Untuk Formulasi Sediaan <i>Lotion</i> Pelembab Kulit. <i>Densi Selpia Sopianti</i>	6-13
Analisa Bakteriologis Air Sumur Gali Dengan Beberapa Tahapan Penyaringan. <i>Rabel Marsa, Dini Syavani, Inayah Hayati</i>	14-26
Identifikasi Senyawa Alkaloid Ekstrak N-Heksan Daun Subang-Subang ( <i>Scaevola taccada</i> L.) <i>Nurfjirin Ramadhani, Nurwani Purnama Aji, Titin Fitria Ningsih</i>	27-34
Formulasi Gel Antioksidan Untuk Wajah Dari Ekstrak Biji Pinang ( <i>Areca Catechu</i> L) <i>Yuska Novi Yanty</i>	35-42
Uji Daya Hambat Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Randu ( <i>Ceiba Pentandra</i> (L) Gaertn) Pada Bakteri <i>Pseudomonas Aeruginosa</i> . <i>Setya Enti Rikomah, Mimma Karolina.</i>	43-51
Formulasi Sediaan Gel Ekstrak Etanol Daun Pegagan ( <i>Centella Asiatica</i> (L) Urban) Dan Uji Aktivitas Terhadap <i>Propionibacterium acne</i> Penyebab Jerawat <i>Sri Widyastuti</i>	52-64
Uji Angka Kapang Dan Khamir Pada Sediaan Kosmetik Lulur Mandi Selama Satu Bulan Pemakaian. <i>Firni, Erin Masrik, Putri Dewi Sartika.</i>	65-73
Formulasi Dan Uji Efektivitas Sediaan Gel Antiseptik Hand Sanitizer Ekstrak Daun Botto-Botto ( <i>Chromolaena Odorata</i> L). <i>Isriany Ismail, Munifah Wahyuddin, Ade Irmadwiarti Firmansyah</i>	74-84
Pembuatan VCO (virgin coconut oil) Dengan Metode Tradisional Buah Kelapa Hijau " <i>Cocos Nucifera</i> L" dan Kelapa Gading " <i>Cocos Nucifera Eburnea</i> " <i>Elmitra.</i>	85-92
Uji Aktivitas Antihiperlipidemik Ekstrak Karagenan dan Polifenol Alga Merah <i>Euclima denticulatum</i> <i>Fathmur Sani K.<sup>*1</sup>, Agung Giri Samudra<sup>1</sup></i>	93-106



**Gambaran Tingkat Kejadian Interaksi Obat pada Pasien Pneumonia di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.** 107-116  
*Zahira Amody, Herlina Rante, Irawaty Dhajaruddin*

**Studi Rekam Medik Pasien Epilepsi Pediatrik di Beberapa Rumah Sakit.** 117-129  
*Asril Burhan, Abd.Halim Umar, Zulham, Mauizatul Latifah*

**Uji Toksisitas Akut Ekstrak Air Daun Kerehau (*Callicarpa longifolia* Lam.) Terhadap Mencit Putih (*Mus musculus*)** 130-141  
*Eka Siswanto Syamsul, Soendarto, Supomo, Siti Nena*

**Formulasi Sirup Ekstrak Kulit Rambutan (*Nephelium lappaceum* L)** 142-149  
*Betna Dewi, Purnamasari*



# AKTIVITAS POLIFENOL DARI *Sargassum hystrix* TERHADAP $\alpha$ -GLUKOSIDASE MENGGUNAKAN METODE MAYUR

Agung Giri Samudra

Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu  
E-mail: agunggirisamudra@gmail.com

## ABSTRAK

Gangguan metabolisme karbohidrat dapat menyebabkan Diabetes mellitus. Karbohidrat dalam saluran cerna mengalami metabolisme menjadi glukosa yang sederhana kemudian diabsorpsi masuk kedalam peredaran darah serta mempengaruhi kadar glukosa dalam darah. Proses penyerapan ini dikatalisis enzim pemecah ikatan  $\alpha$ -1,6-glikosida yaitu  $\alpha$ -glukosidase yang terdapat pada sel usus. Penelitian ini untuk mengetahui kemampuan polifenol dari *Sargassum hystrix* terhadap karbohidrat enzim  $\alpha$ -glukosidase secara *in vitro*. Polifenol diekstraksi dengan 50% (v/v) metanol. Kandungan total fenol ekstrak ditentukan menurut metode Folin-Ciocalteu. Kemudian hasil ekstraksi diuji daya hambat aktivitas  $\alpha$ -glukosidase. Ekstrak polifenol mempunyai kemampuan menghambat aktivitas IC50  $\alpha$ -glukosidase yaitu 9,57 mg/mL.

**Kata Kunci:** *Sargassum hystrix*, polifenol,  $\alpha$ -glukosidase.

## ABSTRACT

Disorders of carbohydrate metabolism can lead to diabetes mellitus. Carbohydrates are metabolized in the gastrointestinal tract into simple glucose and absorbed into the bloodstream and affected blood glucose levels. The absorption process is catalyzed by  $\alpha$ -1,6- glycoside breaking bond enzyme, namely  $\alpha$ -glucosidase. They are found in the intestinal cells. Polyphenols extract of *Sargassum hystrix* were tested for their ability to inhibit carbohydrate hydrolysis  $\alpha$ -glucoosidase enzymes in vitro methods. Polyphenols were extracted from both marine algae by using 50% (v/v). Total polyphenols contents from the extracts were determined according to the Folin-Ciocalteu method. Polyphenols extracts from *Sargassum hystrix* showed the ability to inhibit the activity of  $\alpha$ -glukosidase with an IC50 9,57 mg / mL.

**Keyword:** *Sargassum hystrix*, polyphenols,  $\alpha$ -glucoosidase

## PENDAHULUAN

Diabetes melitus merupakan suatu penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin, atau

keduanya. Salah satu tujuan utama terapi medis bagi pasien diabetes meliputi pengontrolan kadar glukosa darah mendekati normal dengan cara pemberian obat antidiabetik oral dan injeksi insulin. Namun, penggunaan obat antidiabetik masih memiliki efek samping, serta harga obat antidiabetik



oral dan insulin tergolong mahal dan kurang terjangkau oleh masyarakat. Alasan ini, peneliti melakukan penelitian pada penggunaan sumber alami yang berasal dari tumbuhan sebagai salah satu manajemen alternatif dalam menangani diabetes melitus.

Alga laut jenis *Sargassum hystrix* merupakan jenis-jenis yang banyak ditemukan dan cukup melimpah di Indonesia. Polifenol dapat menurunkan kadar glukosa darah pada hewan uji (Wikanta dkk., 2008; Nwosu dkk., 2011). Hingga saat ini, belum ditemukan sumber informasi penelitian tentang senyawa polifenol dari alga laut *Sargassum hystrix* yang berkhasiat sebagai penurun kadar glukosa darah dengan mekanisme menghambat kerja enzim  $\alpha$ -glukosidase Berdasarkan hal ini menarik dilakukan penelitian uji daya inhibisi terhadap enzim  $\alpha$ -glukosidase terhadap senyawa polifenol alga laut *Sargassum hystrix* yang diperoleh dari Gunung Kidul Yogyakarta sebagai khasiat penurun kadar glukosa darah.

## METODE PENELITIAN.

### Ekstraksi polifenol.

Alga laut *Sargassum hystrix* diekstrak dalam metanol 50%. Metanol diuapkan

dengan menggunakan evaporator rotari vakum (Zhang dkk., 2006).

### Pengukuran kandungan total polifenol.

Pengujian ini menggunakan reagen Folin-Ciocalteu's dan pereaksi natrium karbonat 7,5%. Larutan standar dan sampel masing-masing diambil 100  $\mu$ L letakkan pada tabung reaksi. Larutan ditambahkan reagent folin-ciocalteu's sebanyak 500  $\mu$ L dan diinkubasi selama 5 menit. Larutan ditambahkan natrium karbonat sebanyak 400  $\mu$ L dan diinkubasi selama 2 jam pada tempat yang gelap. Pembacaan absorbansi menggunakan spektrofotometri dengan panjang gelombang 750 nm (Zhang dkk., 2006).

### Uji daya inhibisi terhadap enzim $\alpha$ -glukosidase

Masing-masing ekstrak dibuat seri kadar 1,25; 2,5; 5; 10 dan 20 mg/ml. Setiap larutan seri kadar ekstrak di ambil 10  $\mu$ L ditambahkan kedalam 25  $\mu$ L mengandung  $\alpha$ -glukosidase dengan konsentrasi 0,2U/mL dalam 0,1 M bufer fosfat pH 7. Larutan tersebut ditambahkan 25  $\mu$ L yang mengandung 0,5 mM Paranitrofenil- $\alpha$ -D-glukopiranoside sebagai susbtrat dan diinkubasi selama 30 menit pada suhu



37oC. Reaksi dihentikan dengan penambahan 100 µL yang mengandung 0,2 M larutan natrium karbonat. Larutan diukur absorbansinya pada panjang gelombang (405nm) (Mayur dkk., 2010).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Ekstraksi polifenol**

Ekstraksi polifenol dari alga laut *Sargassum hystrix* diekstrak menggunakan metode maserasi. Pelarut ekstraksi yang digunakan yaitu metanol, karena mempunyai kemampuan yang paling baik mengekstrak polifenol. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian Aryudhani (2007) mengekstrak polifenol alga laut *Caulerpa racemosa* menggunakan pelarut metanol sebagai pelarut polar menunjukkan nilai rendemen polifenol tertinggi sebesar 40,47% dibandingkan pelarut etil asetat sebagai pelarut semipolar sebesar 2,74% dan n-heksan sebagai pelarut nonpolar sebesar 1,07%. Pelarut metanol terbukti dapat mengekstrak kandungan fenol total alga *Sargassum swartzii* dengan hasil yang paling baik sebesar 12,00 dibandingkan pelarut etanol; kloroform; n-heksan berturut-turut sebesar 0,81; 11,05; 6,41 (mg asam

galat/ 100g sampel kering) (Sadati dkk., 2011). Rendemen polifenol *Sargassum hystrix* (alga laut coklat) sebesar 18%.

**Kadar Fenol Total dan *Sargassum hystrix***


Nilai ekuivalen asam galat ekstrak polifenol *Sargassum hystrix*. Kandungan polifenol total dalam ekstrak polifenol *Sargassum hystrix*. Nilai kandungan polifenol total dari alga laut coklat *Sargassum hystrix* (18,17 µg asam galat ekuivalen/ mg ekstrak).

**Daya inhibisi α-glukosidase**

Hasil uji aktivitas daya inhibisi *Sargassum hystrix* terhadap enzim α-glukosidase dapat dilihat pada Gambar 1. Ekstrak dari alga laut *Sargassum hystrix* yaitu alginat dan polifenol mempunyai kemampuan menghambat aktivitas α-glukosidase. Polifenol ekstrak mempunyai kemampuan hambat dengan nilai IC<sub>50</sub> 9,57mg/mL. Jika polifenol dari alga laut *Sargassum hystrix* dibandingkan dengan kontrol positif glukobay (akarbose) nilai IC<sub>50</sub> tidak berbeda signifikan (p>0,05), artinya kemampuan hambat aktivitas enzim α-amilase ekstrak alga laut



*Sargassum hystrix* dapat menyamai dari pada glukobay (akarbose).



Gambar 1. Uji aktivitas inhibisi α-glukosidase secara in vitro

Tabel I. Nilai IC<sub>50</sub> inhibisi aktivitas enzim α-glukosidase in vitro

Senyawa Uji	IC <sub>50</sub> α-glukosidase (mg/mL)
Kontrol Positif (akarbose)	6,66±0,15 <sup>a</sup>
Polifenol <i>Sargassum hystrix</i>	9,57±0,33 <sup>a</sup>

Keterangan: Nilai yang tertera berupa purata ± SEM (n=3). tanda notasi huruf menunjukkan adanya perbedaan signifikan (p<0,05).

Penelitian yang dilakukan oleh Kumar dan Sudha., (2012) bahwa ekstrak aqueous alga laut coklat *Sargassum polycystum* memiliki daya inhibisi α-glukosidase yang lebih tinggi (IC<sub>50</sub> 50 µg/mL) dibandingkan ekstrak aqueous dari alga laut merah *Gracillaria corticata* (IC<sub>50</sub> 87 µg/mL). Ekstrak metanol (polifenol) dari alga laut *S.hystrix* pada konsentrasi 20 mg/mL mempunyai daya hambat aktivitas enzim α-glukosidase sebesar 70% yang hampir setara dari ekstrak metanol dari

*Costus pictus* pada konsentrasi 50mg/mL (Jayasari dkk., 2009).

Polifenol memiliki kemampuan sebagai anti-inflamasi, antioksidan, kemopreventif dan polifenol juga dapat mempengaruhi laju glukosa darah. Polifenol dapat mempengaruhi pencernaan, absorpsi, dan metabolisme karbohidrat (pati dan sukrosa) menjadi monosakarida. Polifenol mampu sebagai inhibitor alami dalam menghidrolisis karbohidrat dari enzim sehingga dapat membantu menghambat peningkatan kadar glukosa darah (Mayur dkk., 2010).

Polifenol memiliki efek penghambatan terhadap enzim α-glukosidase melalui ikatan hidrosilasi dan substitusi pada cincin β. Prinsip penghambatan ini serupa dengan akarbose, yaitu menghasilkan penundaan hidrolisis karbohidrat dan absorpsi glukosa serta menghambat metabolisme sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa (Ho dan Bray 1999). Kandungan fenol memiliki efek penghambatan terhadap enzim α-glukosidase melalui ikatan hidrosilasi dan substitusi pada cincin β. Prinsip penghambatan ini serupa dengan akarbose, yaitu dengan menghasilkan penundaan hidrolisis karbohidrat dan disakarida dan absorpsi glukosa serta



menghambat metabolisme sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa (Yudhaningrum, 2012). Penghambatan pada enzim  $\alpha$ -glukosidase oleh kandungan fenol ini mengakibatkan gagalnya proses pemecahan karbohidrat menjadi bentuk monosakarida. Hal inilah yang menjelaskan efek kandungan fenol dalam menurunkan kadar glukosa darah.

### KESIMPULAN

Nilai IC<sub>50</sub> yang diperoleh dari hasil uji aktivitas enzim maka polifenol *Sargassum hystrix* mempunyai kemampuan aktivitas yang sama dengan akarbose.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aryudhani, N. 2007. Kandungan senyawa fenol rumput laut *Caulerpa racemosa* dan aktivitas antioksidannya. [Skripsi]. Bogor: Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor
- Ho, E., Bray, T.M. 1999. Antioxidants, NF $\kappa$ B activation, and diabetogenesis. *Proceeding of The Society for Experimental Biology and Medicine*, 222: 205-213.
- Jayasri, M. A., Radha, A., Mathew, T.L. 2009.  $\alpha$ -Amylase And  $\alpha$ -Glucosidase' Inhibitory Activity of *Costus pictus* D. Don In The Management of Diabetes. *Journal of Herbal Medicine and Toxicology* 3 (1): 91-94
- Kumar, P.S. and Sudha, S. 2012, Evaluation of Alpha-Amylase and Alpha- Glucosidase Inhibitor Selected Seaweeds From Gulf of Mannar, *International Research Journal Of Pharmacy* 3(8): 128-130
- Mayur, B., Sandesh, S., Shruti, S., and Sung-Yum, S., 2010, Antioxidant and  $\alpha$ -glucosidase inhibitory properties of *Carpesium abrotanoides* L., *Journal of Medicinal Plants Research*, 4 (15): 1547-1553.
- Nwosu, F., Morris, J., Victoria, A.L., Stewart, D., Heather, A.R., Gordon, J.M, 2011, Anti-Proliferative and Potential Anti-Diabetic Effects of Phenolic- Rich Extracts from Edible Marine Algae, *Food Chemistry*, 126:1006-1012.
- Sadati, N., Khanavi, M., Mahrokh, A., Nabavi, SMB., Sohrabipour, J., Hadjiakhoondi, A. 2011, Comparison Of Antioxidant Activity And Total Phenolic Contents Of Some Persian Gulf Marine Algae, *Journal of Medicinal Plants Volume 10, No. 37:73-79.*
- Wikanta, T., Kurniawan, R., Rahayu, L., 2005, Pengaruh Pemberian  $\beta$ -Karaginan dan  $\epsilon$ -Karaginan Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah dan Histopatologi Usus Kelinci, *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 11 (8) :1-10.
- You, Q., Chen, F., Wang, X., Jiang, Y. and Lin, S. 2012, Anti-diabetic activities of phenolic compounds in muscadine against alpha-glucosidase and pancreatic lipase, *LWT - Food Science and Technology*, 46: 164-168.
- Zhang, Q., Zhang, J., Shen, J., Silva, A., Dennis, D., Barrow, C., 2006, A Simple 96-Well Microplate Method for Estimation of Total Polyphenol Content in Seaweeds, *Journal of Applied Phycology*, 18: 445-450.



## SARI DAGING BUAH ALPUKAT (*Persea americana* L) UNTUK FORMULASI SEDIAAN *LOTION* PELEMBAB KULIT

Densi Selpia Sopianti

Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu  
dselpias@gmail.com

### ABSTRAK

Buah alpukat (*Persea americana*) merupakan buah yang mempunyai potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai *lotion* agar dapat menjaga kelembaban kulit, mengurangi kerut dan kekeringan, serta untuk mengantarkan zat lain seperti tabir surya yang bermanfaat untuk kulit terutama kulit kering. Selain itu, alpukat yang banyak mengandung vitamin A dan klorofil dimana di dalam lemaknya tersimpan banyak vitamin E dapat digunakan sebagai antioksidan yang dapat menjaga kulit tampak segar.

Pada pembuatan *lotion* sari daging buah alpukat, formulasi dalam pembuatan *lotion* ini menggunakan variasi PEG-6000. Setelah proses pembuatan *lotion* dengan variasi PEG 6000 selesai, maka dilakukan evaluasi dari uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, dan uji iritasi.

Dari ketiga formula I, II, dan III menunjukkan bentuk sediaan *lotion* yang kental dan wangi. Susunan sediaan *lotion* yang dihasilkan homogen. Uji pH *lotion* pelembab yang didapat F1 7,60, F2 7,66, dan F3 7,67. Uji iritasi pada kulit tidak menunjukkan adanya iritasi dari penggunaan *lotion*, sehingga dapat disimpulkan sari daging buah alpukat dapat dibuat sediaan *lotion* pelembab kulit yang memenuhi syarat.

**Kata Kunci** : *Lotion*, Buah Alpukat (*Persea americana*), Uji Fisik *Lotion*

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki iklim tropis dengan aneka ragam flora yang tersebar di berbagai daerah yang sering digunakan untuk keperluan sehari-hari atau bahkan untuk kecantikan dan pengobatan.

Penampilan kulit sehat dapat dilihat dari struktur fisik kulit berupa warna, konsistensi kelembaban,

kelenturan, tebal, dan tekstur kulit.

Perawatan kulit diperlukan seseorang untuk memelihara agar kulit tetap sehat, bersih, dan sedap dipandang mata. Maksud dan tujuan perawatan kulit bermacam-macam, misalnya pembersih, pelembab, penipis, dan proteksi. Metode perawatan kulit yang baik dan benar ternyata berbeda bergantung dari ahli perawatan yang melaksanakannya dan produk



kosmetika yang dipakai (Anief, Moh, 1997).

Pada kondisi kulit tertentu kelembaban diperlukan oleh kulit untuk mempertahankan struktur dan fungsinya. Berbagai faktor eksternal maupun internal dapat mempengaruhi struktur dan fungsi kulit tersebut, misalnya karena faktor lingkungan, pola makan, dan berbagai penyakit kulit lainnya. Oleh pengaruh faktor-faktor tersebut kulit dapat menjadi lebih kering akibat kehilangan air oleh penguapan yang tidak dirasakan (Wasitaatmadja, 1997).

Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu dibutuhkan perlindungan tambahan yaitu dengan memberikan kosmetika pelembab kulit. Berbagai bahan pangan alami seperti wortel, tomat, timun, bengkuang, dan alpukat telah banyak digunakan dalam formulasi produk-produk kecantikan seperti masker, krim, *body lotion*, pelembab dan sebagainya (Anonim, 2009). Akhir-akhir ini banyak sekali produk kecantikan khususnya kosmetik yang dibuat dari bahan alami seperti alpukat dan sebagainya dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk

"*back to nature*" dan meminimalkan efek samping dari obat-obat kimia.

Buah Alpukat (*Persea americana* L) mempunyai potensi besar bukan hanya untuk penghilang dahaga tetapi juga bermanfaat sebagai *lotion* agar dapat menjaga kelembaban kulit, mengurangi kerut dan kekeringan, menghaluskan kulit, serta untuk mengantarkan zat lain seperti tabir surya, yang bermanfaat untuk kulit terutama kulit kering, sehingga mencegah timbulnya penyakit dan menunda proses penuaan pada wajah.

Alpukat (*Persea americana* L) merupakan buah yang kaya lemak. Lemak alpukat terdiri dari asam lemak tak jenuh tunggal oleat yang bersifat antioksidan kuat. Kemampuan ini diperkuat oleh kandungan betakaroten, klorofil, vitamin E, dan vitamin B kompleks yang banyak terdapat di dalam alpukat. Alpukat kaya mineral kalium, tetapi rendah kandungan natriumnya. Perbandingan ini mendorong suasana basa di dalam tubuh kita, sedangkan vitamin E dikenal sebagai vitamin yang berguna untuk menghaluskan kulit (Anonim, 2008).



Alpukat yang banyak mengandung vitamin A dan klorofil dimana di dalam lemaknya tersimpan banyak vitamin E dikombinasi dengan vitamin A dan klorofil, sehingga dapat digunakan sebagai antioksidan yang terbukti menjaga kulit tampak kenyal dan segar. Kandungan kaliumnya yang tinggi menjadikan alpukat buah pembentuk basa (Rismunandar, 1986).

Berdasarkan latar belakang itulah, bertujuan dari penelitin membuat sari daging buah alpukat (*Persea americana* L) untuk formulasi sediaan *lotion* pelembab kulit.

**METODE PENELITIAN**

**Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmasetika Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu.

**Alat**

*Handscoon (sensi), masker (sensi), stamper, mortir, cawan penguap, alat-alat gelas (pyrex), sendok tanduk, sudip, pipet tetes, timbangan analitik digital, kertas perkamen, batang pengaduk, dan blender.*

**Bahan**

Sari daging buah alpukat, gliserin, PEG-6000, etanol 90 %, nipagin,

minyak zaitun, asam. stearat, cetyl alkohol, TEA, dan aquadest.

**Prosedur Kerja Penelitian**

1. Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buah alpukat yang setengah matang yang diambil dari daerah Kepahiang.

2. Penghalusan Daging Buah Alpukat

Buah alpukat yang masih setengah matang dibelah lalu dikupas kulitnya dan dibuang bijinya, dipotong kecil-kecil kemudian diblender sampai halus. Masukkan dalam wadah, kemudian timbang sebanyak 5 gr untuk masing-masing formula.

3. Rancangan Formula *Lotion* dari Sari Daging Buah Alpukat


Dalam penelitian ini rancangan formula dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1. Formula *Lotion* Sari Daging Buah Alpukat**

Komposisi	F1	F2	F3
Sari daging buah alpukat	5	5	5
Gliserin	5	5	5
PEG-6000	0,25	0,5	0,75
Etanol 90 %	10 ml	10 ml	10 ml
Nivagin	0,2	0,2	0,2
Minyak zaitun	2	2	2
As. stearat	2,5	2,5	2,5
Cetyl alcohol	1	1	1
TEA	1	1	1
Aqua dest ad	60 ml	60 ml	60 ml
Parfum Jambu	qs	qs	qs



4. Pembuatan *Lotion*



Gambar 1. Skema Pembuatan *Lotion*

5. Evaluasi

a. Pemeriksaan Organoleptis

Pemeriksaan organoleptis meliputi bentuk, warna, dan bau yang diamati secara visual.

b. Pemeriksaan Homogenitas

Oleskan sediaan pada sekeping kaca transparan, sediaan menunjukkan susunan homogen. Jika tidak ada butiran atau partikel,

maka sediaan dinyatakan telah homogen.

c. Pemeriksaan pH

Menggunakan alat pH meter. Sediaan dimasukkan dalam wadah, kemudian celupkan elektroda ke dalam wadah tersebut, bandingkan dengan larutan baku. Angka yang ditunjukkan pH meter merupakan nilai pH *lotion* (Mardiana, Poppy, 2011).



d. Uji Iritasi Pada Kulit

Pengujian ini dilakukan dengan cara uji terbuka yang dilakukan selama 1 hari pada 10 panelis, dengan cara lotion dioleskan ke kulit dengan pemakaian selama 3 jam. Kemudian setelah 3 jam, dicuci. Amati reaksi kulit yang terjadi. Apabila tidak terjadi iritasi seperti rasa gatal dan kemerahan, maka sediaan dinyatakan memenuhi persyaratan pengujian (Wasitaatmadja, M.S, 1997).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian didapatkan sediaan lotion dari sari daging buah alpukat (*Persea americana* L) kemudian dievaluasi yang meliputi : organoleptis, uji homogenitas, uji pH, dan uji iritasi.

Uji Organoleptis Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2. Hasil Organoleptis Lotion Sari Daging Buah Alpukat

Formula	Organoleptis	Penyimpanan selama 1 minggu
I	Bentuk Warna Bau	Lotion kental Coklat Wangi
II	Bentuk Warna Bau	Lotion kental Coklat Wangi
III	Bentuk Warna Bau	Lotion kental Coklat Wangi

Dari tabel 2 hasil evaluasi organoleptis sediaan lotion sari daging buah alpukat (*Persea americana* L) pada formula I, II, dan III menunjukkan bentuk lotion yang kental, baunya wangi jambu, secara fisik tidak memperlihatkan adanya perubahan setelah penyimpanan beberapa hari, sehingga dapat disimpulkan dengan adanya variasi formula tidak mempengaruhi organoleptis sediaan lotion, sedangkan warna dari ketiga formula mengalami perubahan dari putih kehijauan menjadi coklat. Perubahan warna dari ketiga formula dikarenakan sari daging buah alpukat mengandung vitamin C, dimana vitamin C pada udara terbuka sangat mudah sekali mengalami oksidasi



dengan menunjukkan perubahan warna menjadi coklat.

2. Uji Homogenitas

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas Lotion Sari Daging Buah Alpukat**

Formula	Homogen	Tidak Homogen
I	✓	-
II	✓	-
III	✓	-

Dari tabel 3 hasil uji homogenitas sediaan lotion sari daging buah alpukat (*Persea americana* L) pada formula I,


II, dan III menunjukkan bahwa masing-masing formula mempunyai susunan yang homogeny (penyebaran zat merata yang ditunjukkan warna yang sama) dan tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar dari komponen zat padat yang terdapat pada formula lotion.

3. Uji pH

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. Hasil Pengujian pH Lotion Sari Daging Buah Alpukat**

Formula	Pengujian					Rata-rata
	1	2	3	4	5	
I	7,57	7,62	7,57	7,60	7,64	7,60
II	7,67	7,63	7,64	7,69	7,67	7,66
III	7,63	7,75	7,68	7,70	7,59	7,67



**Gambar 2. Kurva Hasil Pengujian pH Lotion Sari Daging Buah Alpukat**



Dari tabel 4 hasil uji pH sediaan lotion sari daging buah alpukat (*Persea americana* L) pada formula I, II, dan III yang dilakukan selama 5 minggu, didapatkan pH basa. Hal ini terjadi karena salah satu bahan tambahan yang digunakan bersifat basa. Derajat keasaman atau pH merupakan parameter penting pada produk kosmetika karena pH yang sangat tinggi atau rendah dapat mengakibatkan kulit teriritasi. Oleh sebab itu, pH produk kosmetika sebaiknya dibuat sesuai dengan pH kulit, yaitu antara 4,5-7,5 (Wasitaatmadja 1997). Berdasarkan hasil analisis, pH *skin lotion* selama

Dari tabel 5 hasil uji iritasi yang diujikan kepada 10 audien pada kulit lengan bagian dalam dikarenakan bagian kulit ini jauh lebih sensitive setelah kulit muka dan kulit yang berada dibelakang telinga, mudah dan gampang dilakukan pengamatan, dan tidak mengganggu aktifitas audien pada saat pengujiannya. Dari ketiga formula I, II, dan III yang diujikan menunjukkan bahwa ketiga sediaan lotion tidak menimbulkan iritasi (pengamatan dilakukan dengan cara tidak menimbulkan ruam merah ataupun gatal pada kulit yang dilakukan pengujian) hal tersebut menandakan lotion yang dibuat

Formula	1	2	3
I	7,2	7,5	7,8
II	7,2	7,5	7,8
III	7,2	7,5	7,8

**KESIMPULAN**

Sari daging buah alpukat (*Persea americana* L) dapat diformula dalam bentuk sediaan lotion yang digunakan sebagai pelembab kulit.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anonim, 1979, *Farmakope Indonesia Edisi Ketiga*, Hal 57, 65, 96, 378, 458, 506, 570, 612, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.  
 Anonim, 1995, *Farmakope Indonesia Edisi Keempat*, Hal 413,

**4. Uji Iritasi**

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5. Hasil Uji Iritasi Lotion Sari Daging Buah Alpukat**

Formula	Persentase reaksi pada kulit	
	Iritasi	Tidak iritasi
I	0 %	100 %
II	0 %	100 %
III	0 %	100 %



Departemen Kesehatan Republik  
Indonesia, Jakarta.

Anonim, 1997, *Kodeks Kosmetika  
Indonesia edisi Kedua Volume II*,  
Hal 32, Departemen Kesehatan  
Republik Indonesia, Jakarta.

Anonim, 2008, *Buku Pintar Tanaman  
Obat*, Agromedia Pustaka, Jakarta.

Anonim, 2009, *Trubus Info Kit*, Hal  
99, PT. Trubus Swadaya, Bogor.

Anief, Moh, 1997, *Formulasi Obat  
Topikal Dengan Dasar  
Penyakit Kulit*,  
Hal 1-9, UGM, Yogyakarta.

Anief, Moh, 1999, *Sistem Dispersi,  
Formulasi Suspensi Dan Emulsi*,  
Hal 24, UGM,

Wasitaatmadja M. S, 1997, *Penuntun  
Ilmu Kosmetik Medik*, Hal 173-  
187, Universitas Indonesia,  
Jakarta.

Watson, Roger, 2002, *Anatomi Dan  
Fisiologi Untuk Perawat Edisi 10*,  
Hal 397, Penerbit Buku  
Kedokteran, Jakarta.

Williams D. F, 1992, *Chemistry And  
Technology Of The Cosmetics And  
Toiletries Industry*, Hal 123, Kluwer  
Academic Publishers, London.



## ANALISA BAKTERIOLOGIS AIR SUMUR GALI DENGAN BEBERAPA TAHAPAN PENYARINGAN

Rabel Marsa<sup>1</sup>, Dini Syavani<sup>2</sup>, Inayah Hayati<sup>3</sup>

Akademi Analisis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu  
Jalan Depati Payung Negara No 16 A Kota Bengkulu  
Email : dsyavani@gmail.com , naya1807@yahoo.co.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air sumur gali yang telah melalui beberapa tahapan penyaringan sederhana dan setelah diberi alat tambahan *LifeStraw*. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sampel air sumur gali dengan kriteria fisik yang keruh, berwarna coklat, berbau, berasa dan menimbulkan endapan. Dari hasil pengujian air sumur gali yang telah melalui proses penyaringan sederhana didapat hasil indeks MPN untuk *E.coli* 17/100 ml air dan *Coliform* 27/100 ml air. Hasil uji biokimia, setelah diidentifikasi bakteri yang terdapat pada sampel air sumur gali adalah bakteri *Escherichia coli*. Berdasarkan pemeriksaan bakteriologis setelah melalui proses penyaringan sederhana dengan penambahan alat *LifeStraw* didapat indeks MPN untuk *E.coli* dan *Coliform* 0/100 ml air.

**Kata kunci :** Penyaringan, *LifeStraw*, Sumur gali

### PENDAHULUAN

Dewasa ini air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang seksama dan cermat. Karena untuk mendapatkan air yang bersih, sesuai dengan standar tertentu, saat ini menjadi barang yang mahal karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari hasil kegiatan manusia, baik limbah dari kegiatan rumah tangga, limbah dari kegiatan industri dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ketergantungan manusia terhadap air pun semakin besar sejalan dengan perkembangan

penduduk yang semakin meningkat (Harmayani & Konsukartha, 2007).

Menurut laporan dari BLH provinsi Bengkulu (2015) keruhnya air di Sungai Bengkulu itu, bukan semata-mata disebabkan oleh limbah pabrik yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Tapi akibat kurang sadarnya masyarakat, dengan menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga". Air yang tercemar tidak akan dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, apa lagi untuk dikonsumsi langsung. Sehingga harus ada penanganan yang serius dari



pemerintah. Tapi pemerintah tidak akan bisa menangani pencemaran air tanpa adanya kesadaran dari masyarakat untuk berperilaku hidup bersih.

Di Kota Bengkulu rata-rata penduduk masih menggunakan air sumur sebagai air minum dan untuk kebutuhan sehari-hari. Potensi air tanah bervariasi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, sehingga kualitas dan kuantitas air yang satu dan yang lain pun tidak sama. Salah satu jenis sumber air bersih yang banyak digunakan adalah sumur gali. Pembuatannya relatif sederhana dengan menggali hingga kedalaman tertentu dan menemukan mata air. Kedalamannya berbeda-beda, sebab keberadaan air dalam tanah tidak sama di setiap daerah bergantung jenis daerah dan topografi wilayah (BLH, 2015). Untuk mengetahui apakah air layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari meliputi beberapa parameter kualitas air yaitu : Suhu air, pH, BOD, COD, DO, *Fecial Coliform*, total *coliform* dan beberapa logam berat.

Air yang kotor jika ditinjau dari segi bakteriologi adalah air yang mengandung bakteri serta mikroba

lainnya sehingga air terkontaminasi. Apabila air telah terkontaminasi berbagai macam bakteri yang patogen, maka akan sangat berbahaya bagi kesehatan serta kelangsungan hidup manusia. Air yang kotor dapat diolah sehingga menjadi air yang bersih dengan suatu sistem alat filtrasi konvensional atau alat filtrasi yang sudah modern. Air yang sudah bersih bukan berarti terbebas dari bakteri atau mikroba lainnya, oleh karena itu air bersih belum tentu bisa langsung diminum. (Soemarno, 2000)

Tingkat pencemaran air yang terjadi di kota sudah sangat tinggi, maka dibutuhkan alat atau metode yang efektif untuk membunuh kuman dan bakteri selain tawas dan kaporit. Dari dulu manusia telah melakukan penyaringan air secara alami, seperti menggunakan ijuk, pasir, batu gamping atau batu yang lainnya. Seiring perkembangan zaman, manusia mulai memikirkan suatu alat yang dapat dikombinasikan sehingga menjadi alat untuk menyaring air yang lebih baik dari alat yang sudah ada sebelumnya. Tetapi biasanya alat penyaring sederhana tersebut hanya menyaring air kotor menjadi air yang



bersih, namun belum bisa untuk dikonsumsi atau diminum langsung.

Pada penelitian ini ditambahkan suatu alat yang menerapkan metode nano filtering dengan skala 0,2 mikronano yang dapat menyaring semua bakteri dan parasit, sehingga air tersebut aman untuk diminum tanpa perlu dimasak. Alat tambahan tersebut adalah *LifeStraw*, alat yang mulai dikembangkan di tahun 2005 oleh Vestergaard Frandsen (Perusahaan Eropa berbasis Internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan). Alat tambahan tersebut dapat menghilangkan semua bakteri dan parasit. Namun jika air yang terlalu kotor, alat tersebut masih meninggalkan rasa serta bau dari air yang disaring. Maka dari itu penulis mencoba menggabungkan *LifeStraw* dengan alat filtrasi sederhana, sehingga alat tersebut sempurna dan air yang disaring bisa langsung untuk dikonsumsi atau diminum langsung tanpa harus dimasak terlebih dahulu.

Adapun cara kerja *LifeStraw* sehingga mengubah air yang kotor menjadi air minum yaitu, air akan memasuki *LifeStraw* melewati pra-penyaringan berbahan tekstil yang berdiameter 100 mikron, lalu melewati

penyaringan berbahan poliester yang diameternya berukuran 15 mikron, kemudian air akan memasuki suatu ruangan kecil dalam sedotan yang jenuh dengan iodeine. Iodine dapat membunuh parasit serta 99,3% bakteri dan virus.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kualitas air sumur gali secara bakteriologis yang telah melalui beberapa tahapan penyaringan sederhana dan setelah diberi alat tambahan *LifeStraw*.

## METODE PENELITIAN

### Tempat dan Waktu Penelitian

Pemeriksaan kualitas air secara bakteriologis dengan melalui tahapan penyaringan sederhana dan penambahan alat *LifeStraw* telah dilakukan di Laboratorium Bakteriologi Akademi Analisis Kesehatan Harapan Bengkulu (AAK-HB) Kota Bengkulu pada bulan Juni - Juli 2016.

### Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian, yaitu lalu pipet ukur (10 ml, 1 ml dan 0,1 ml), vacuum ball, lampu spritus, rak tabung reaksi, rak pewarnaan, object glass, pipet tetes,



korek api, tabung reaksi, tabung durham, cawan petridis, gelas ukur 10 ml, inkubator, autoclave, hotplate, magnetic stirrer, ose bulat, ose jarum, mikroskop, tissue, label, alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, handscoon dll). Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sampel air sumur gali, serta air setelah proses filtrasi, alkohol 70%, media cair (Lactosa Broth Triple Strenght/LBTS dan Lactosa Broth Single Strenght/LBSS), media Brilliant Green Lactosa Broth/BGLB (apabila hasil menunjukkan positif), aquadest steril, media Endo Agar, media Nutrient Agar/NA, media Gula-gula (Glukosa, Laktosa, Mannitol, Maltosa dan Sukrosa), media Triple Sugar Iron Agar/TSIA, media Simmon Indol Motility/SIM, media Simmon Citrate/SC, larutan pewarnaan gram (Carbol Gentian Violet, Lugol, Alkohol 96% dan Safranin), serta imercy oil pada saat identifikasi menggunakan mikroskop binokuler (Perbesaran 10x100).

#### **Prosedur Penelitian**

#### **Pengambilan Sampel Air yang Belum Diolah (Air Sumur) :**

Siapkan tempat penampungan sampel serta alat dan bahan yang akan dibutuhkan saat pengambilan sampel. Cuci tangan sebelum mengambil sampel. Pastikan tangan steril sebelum melakukan pengambilan sampel, agar sampel tidak terkontaminasi. Ambil botol sampel yang telah disterilkan (botol yang telah ditambahkan pemberat), buka tali pengikat dan pembungkus botol yang steril. Lalu buka penutup botol dengan tangan kiri dan botol dipegang dengan tangan kanan. Tutup botol dipegang dengan menghadap kebawah untuk mencegah masuknya debu. Kemudian sterilkan mulut botol sampel dengan lampu spiritus. Ambil sampel air dari sumur, ulurkan tali ke dalam sumur tanpa menyentuh dinding atau apapun dari sumur sampai kedalaman minimal 1 meter dari permukaan air. Angkat botol keatas dan tutup botol kembali dengan rapat dan dibungkus dengan kertas steril tadi serta diikat kembali. Beri label identitas sampel pada botol.

#### **Air yang Sudah Diolah :**

Siapkan tempat penampungan sampel serta alat dan bahan yang akan dibutuhkan saat pengambilan sampel. Cuci tangan sebelum mengambil



sampel. Pastikan tangan steril sebelum melakukan pengambilan sampel, agar sampel tidak terkontaminasi. Ambil 2 botol sampel yang telah disterilkan. Lalu buka penutup botol. Tutup botol dipegang dengan menghadap kebawah untuk mencegah masuknya debu. Kemudian sterilkan mulut botol sampel dengan lampu spiritus. Ambil masing-masing sampel air yang telah melalui proses filtrasi sederhana ditahap pertama dan ditahap kedua, masukkan kedalam botol sebanyak  $\frac{3}{4}$  bagian botol, agar dapat dihomogenkan sebelum diperiksa. Botol langsung ditutup kembali dengan kapas dan dibungkus dengan kertas steril, lalu diikat. Beri label identitas sampel pada botol.

#### **Pemeriksaan Sampel Ragam II (Air yang Belum Diolah) :**

##### **Tes Pendugaan (*Presumptif Test*) :**

Sterilkan tempat yang akan digunakan dengan alkohol 70%. Siapkan alat dan bahan. Campurkan secara aseptik, masing-masing :

- a. 5 tabung LBTS (5 ml) + 10 ml sampel
- b. 5 tabung LBSS (10 ml) + 1 ml sampel

- c. 5 tabung LBSS (10 ml) + 0,1 ml Sampel
- Kemudian inkubasi pada suhu 37 °C selama 48 jam.

##### **Tes Penegasan (*Confirmatif Test*) :**

Sterilkan tempat yang akan digunakan dengan alkohol 70%. Siapkan alat dan bahan. Dari tabung tes pendugaan yang positif, masing-masing dimasukkan 1-2 ose ke dalam tabung BGLB. Satu seri tabung BGLB diinkubasi pada suhu 37°C selama 48 jam (memastikan *Coliform*). Satu seri tabung BGLB diinkubasi pada suhu 44°C selama 24 jam (memastikan *Colifecal/E.coli*).

##### **Tes Pelengkap (*Completed Test*).**

Sterilkan tempat yang akan digunakan dengan alkohol 70%. Siapkan alat dan bahan. Inokulasi sampel pada Media Endo Agar secara zig-zag. Inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Sterilkan tempat yang akan digunakan dengan alkohol 70%. Siapkan alat dan bahan. Inokulasi sampel pada Media Nutrien Agar secara zig-zag. Inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Setelah 24 jam, lakukan inokulasi dengan ose bulat. Ambil 1 ose koloni pada media



Nutrien Agar, inokulasikan pada media Gula-gula dengan teknik perendamam secara berurutan (glukosa, laktosa, mannitol, maltosa dan sukrosa). Ambil 1 ose koloni pada media Nutrient Agar, inokulasikan pada media TSIA menggunakan ose jarum dengan teknik zig-zag dan tusuk. Ambil 1 ose koloni pada media Nutrient Agar, inokulasikan pada media SIM menggunakan ose jarum dengan teknik tusuk. Ambil 1 ose koloni pada media Nutrien Agar, inokulasikan pada media Simmon Citrate menggunakan ose bulat dengan teknik zig-zag. Proses inokulasi harus dilakukan secara benar. Inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam secara aerob. Setelah diinkubasi, amati hasil dan lakukan ke tahap pewarnaan untuk mengamati hasil secara mikroskopis. (Soemarno, 2000)

#### **Pemeriksaan air Ragam I (Air yang Sudah Diolah) :**

##### **1. Tes Pendugaan (*Presumptive Test*) :**

Sterilkan tempat yang akan digunakan dengan alkohol 70%. Siapkan alat dan bahan. Campurkan secara aseptik, masing-masing:

- a. 5 tabung LBTS (5 ml) + 10 ml sampel

- b. 1 tabung LBSS (10 ml) + 1 ml sampel

- c. 1 tabung LBSS (10 ml) + 0,1 ml Sampel

Kemudian inkubasi pada suhu 37°C selama 48 jam.

##### **2. Tes Penegasan (*Confirmatif Test*)**

Sterilkan tempat yang akan digunakan dengan alkohol 70%. Siapkan alat dan bahan. Dari tabung tes pendugaan yang positif, masing-masing dimasukkan 1-2 ose ke dalam tabung BGLB. Satu seri tabung BGLB diinkubasi pada suhu 37°C selama 48 jam (memastikan *Coliform*). Satu seri tabung BGLB diinkubasi pada suhu 44°C selama 24 jam (memastikan *Colifecal/Escherichia coli*).

##### **3. Tes Pelengkap (*Completed Test*)**

Sterilkan tempat yang akan digunakan dengan alkohol 70%. Siapkan alat dan bahan. Inokulasi sampel pada Media Endo Agar secara zig-zag. Inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Sterilkan tempat yang akan digunakan dengan alkohol 70%. Siapkan alat dan bahan. Inokulasi sampel pada Media Nutrient Agar secara zig-zag. Inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam.



Setelah 24 jam, lakukan inokulasi dengan ose bulat. Ambil 1 ose koloni pada media Nutrient Agar, inokulasikan pada Media Gula-gula dengan teknik perendaman secara berurutan (glukosa, laktosa, manitol, maltosa dan sukrosa). Ambil 1 ose koloni pada media Nutrient Agar, inokulasikan pada media TSIA menggunakan ose jarum dengan teknik zig-zag dan tusuk. Ambil 1 ose koloni pada media Nutrient Agar, inokulasikan pada media SIM menggunakan ose jarum dengan teknik tusuk. Ambil 1 ose koloni pada media Nutrient Agar, inokulasikan pada media Simmon Citrate menggunakan ose bulat dengan teknik zig-zag. Proses inokulasi harus dilakukan secara benar. Inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam secara aerob. Setelah diinkubasi, amati hasil dan lakukan ke tahap pewarnaan untuk mengamati hasil secara mikroskopis. (Bonang dan Koeswardono, 1982).

Sterilkan tempat yang akan digunakan dengan alkohol 70%. Siapkan alat dan bahan. Fiksasi object glass dengan lampu spiritus. Panaskan ose bulat dengan lampu pijar. Ambil 2 ose larutan NaCl (Natrium Clorida) fisiologis (0,9%), lalu letakkan di atas

object glass. Panaskan ose bulat dengan lampu spiritus sampai pijar. Ambil 1 ose koloni pada media Nutrient Agar, lalu homogenkan dengan larutan NaCl fisiologis (0,9%) di atas object glass berbentuk oval. Kemudian keringkan pada suhu ruangan.

Setelah kering, fiksasi kembali dengan lampu spiritus. Lakukan pewarnaan gram. Letakkan sediaan di atas rak pewarnaan. Teteskan larutan Carbol Gentian Violet (1 menit). Lalu bilas dengan air mengalir. Teteskan larutan Lugol Iodin (1 menit). Lalu bilas dengan air mengalir. Teteskan larutan Alkohol 96% (sampai semua warna hilang). Teteskan Safranin (30 detik). Lalu bilas dengan air mengalir, kemudian keringkan. Setelah kering, tetesi sediaan dengan imercy oil. Lalu amati sediaan menggunakan mikroskop binokuler dengan perbesaran 10x100 (Soemarno, 2000)

#### **Teknik Pengumpulan dan Analisa Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan air sumur (air yang belum diolah) dengan menggunakan metode MPN ragam II setelah itu dilakukan



pemeriksaan bakteriologis terhadap sampel air yang telah melalui proses penyaringan sederhana yang juga dimodifikasi dengan alat tambahan life Straw. Setelah dihitung jumlah tabung yang positif kemudian dicocokkan dengan tabel MPN ragam I dan II. Analisa data yang dilakukan secara deskriptif. Data yang telah didapat dicocokkan dengan tabel MPN. Sampel yang dinyatakan sebagai air bersih harus memenuhi *Persyaratan Air Bersih*, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 416/Menkes/Per/ IX/1990. Sampel yang dinyatakan sebagai air yang sudah siap untuk diminum harus memenuhi kriteria

sebagai air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang *Persyaratan Kualitas Air Minum* No. 492/Menkes/Per/ IV/2010.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel air sumur gali yang memiliki kriteria fisik yang keru, berwarna coklat, berbau, berasa dan terdapat endapan yang diambil di Perumahan Bumi Ayu Recident, Blok I 2 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu setelah dilakukan pemeriksaan tes pendugaan kualitas air didapatkan hasil sebagai pada tabel I berikut:

**Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Kualitas Air (Tes Pendugaan)**

SAMPEL (Air Sumur)	RAGAM	HASIL MPN			INDEKS MPN/ 100ml Air
Air sumur gali ( Belum Diolah)	Ragam II	5 tabung LBTS x 10 ml air	5 tabung LBSS x 1 ml air	5 tabung LBSS x 0,1 ml air	≥1898
Penyaringan Sederhana	Ragam I	5 tabung LBTS x 10 ml air	5 tabung LBSS x 1 ml air	5 tabung LBSS x 0,1 ml air	27
Penyaringan Sederhana + LifeStraw	Ragam I	5 tabung LBTS x 10 ml air	5 tabung LBSS x 1 ml air	5 tabung LBSS x 0,1 ml air	67

Sumber: Data Primer 2016



Sampel yang positif pada tes pendugaan diinokulasi ke media BGLB, satu seri untuk Indeks MPN *E.coli* dan satu seri untuk Indeks MPN *Coliform*. Seri untuk Indeks MPN *E.coli* akan diinkubasi pada inkubator pada suhu 44°C selama 1 x 24 jam, sedangkan seri untuk Indeks MPN *Coliform* akan diinkubasi pada inkubator pada suhu 37°C selama 2 x 24 jam. Hasil untuk tes penegasan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Kualitas Air (Tes Penegasan)

SAMPSEL (Air Sumur Gali)	Seri Tabung BGLB	HASIL MPN			INDEKS
					MPN/ 10ml Air
Air sumur Gali (Belum Diolah)	<i>E.coli</i> (44°C 1 x 24 jam)	5	5	5	≥1898
	<i>Coliform</i> (37°C 2 x 24 jam)	5	5	5	≥1898
Dengan Penyaringan Sederhana	<i>E.coli</i> (44°C 1 x 24 jam)	4	1	1	27
	<i>Coliform</i> (37°C 2 x 24 jam)	4	0	0	17
Dengan Penyaringan Sederhana+ Life Straw	<i>E.coli</i> (44°C 1 x 24 jam)	0	0	0	0
	<i>Coliform</i> (37°C 2 x 24 jam)	0	0	0	0

Pada tes pelengkap atau uji biokimia sampel yang diambil adalah dari sampel air sumur yang belum diolah karena pada tes penegasan bakteri yang tumbuh di media BGLB paling banyak tumbuh. Bakteri yang tumbuh tersebut diinokulasikan ke media Nutrient Agar sehingga dapat melakukan uji biokimia.

Table 3. Hasil Pemeriksaan Biokimia (Tes Pelengkap)

Nama Media	Hasil
NA	Tumbuh Koloni
Gula-Gula :	
Glukosa	(+)
Laktosa	(+), Warna Kuning
Mannitol	(+)
Maltosa	(+)
Sukrosa	(-)
TSIA :	
Lereng	Kuning
Dasar	Kuning

H <sub>2</sub> S	(-)
Gas	(-)
SIM :	
H <sub>2</sub> S	(-)
Motility	(-)
Indol	(+)
Gas	(+)
SC :	
Citrat	(-)
Pewarnaan Gram	Bakteri Gram (-) Basil

Permeriksaan kualitas air dengan menggunakan metode MPN (*Most Probable Number*) terbagi menjadi 2, yaitu Ragam I (Air yang Sudah Diolah) dan Ragam II (Air yang Belum Diolah). Perbedaan antara Ragam I dan Ragam II terdapat pada tabung yang digunakan. Pada Ragam I harus menggunakan media LBTS sebanyak 5 tabung dan media LBSS



sebanyak 2 tabung (5-1-1), sedangkan pada Ragam II harus menggunakan media LBTS sebanyak 5 tabung dan media LBSS sebanyak 10 tabung (5-5-5) atau media LBTS sebanyak 3 tabung dan media LBSS sebanyak 6 tabung (3-3-3). Setiap pemeriksaan Bakteri Air melalui tiga tahapan, yaitu Tes Pendugaan (*Presumptive Test*), Tes Penegasan (*Confirmation Test*) dan Tes Pelengkap (*Complate Test*).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada sampel air dari satu sumur gali di Perumahan Bumi Ayu Recident, Blok I 2 Kelurahan Betungan yang memiliki kriteria dari fisik telah terjadi pencemaran. Setelah dilakukan pemeriksaan bakteriologis dengan melalui tahapan uji kualitas air tes pendugaan dan penegasan diperoleh hasil index MPN  $\geq$  1898/100 ml. Jika dilihat angka kuman yang didapat ini cukup tinggi menunjukkan air sumur gali yang diperiksa sudah terkontaminasi dengan bakteri koliform, yang merupakan salah satu indikator pencemaran air. Menurut permenkes RI No 416/Menkes/Per/IX/1990 persyaratan kualitas air bersih untuk parameter mikrobiologi kadar maksimum yang

diperbolehkan 50 per 100 ml. Menurut Pelczar & Chan (2005) *E.coli* merupakan organisme indikator yang dipakai di dalam analisis air untuk menguji adanya pencemaran oleh tinja. Dari uji Biokimia (Tabel 3) terhadap sampel air sumur tersebut mengandung bakteri *E.coli* yang merupakan salah satu bakteri Gram negatif.

Air sumur gali yang kotor yang dijadikan sebagai sampel tersebut dilakukan proses penyaringan untuk mendapatkan air yang bersih. Untuk proses filtrasi menggunakan alat penyaringan sederhana yang biasanya digunakan masyarakat dengan menggunakan bahan antara lain: saringan aquarium, arang, ijuk dan batu zeolit. Air sumur gali yang kotor tadi setelah dilakukan proses penyaringan dan dilakukan pemeriksaan secara bakteriologis diperoleh angka kuman untuk tes pendugaan nilai indeks MPN 27/100 ml (Tabel 1). Menurut Sularso dalam Untari dkk (2015) Konsep dasar dari pengolahan air dengan cara penyaringan adalah memisahkan padatan dan koloid dari air dengan alat penyaring atau saringan. Salah satu faktor mempengaruhi filtrasi adalah



diameter media. Semakin halus butiran yang digunakan sebagai media penyaring, semakin baik air yang dihasilkan. Jika diameter butiran kecil maka akan meningkatkan penyaringan. Kemampuan zeolit sebagai ion exchanger dan digunakan sebagai penghilang polutan kimia. Dalam air zeolit juga ternyata mampu mengikat bakteri *E.coli*. Hal ini dikarenakan zeolit dapat berfungsi sebagai perisai penyaringan fisik untuk bakteri (Awalludin, 2007).

Berdasarkan tabel 2 dari hasil uji penegasan dapat dilihat ada perbedaan hasil angka kuman air sumur yang belum diolah dengan air sumur yang sudah melewati tahap penyaringan sederhana. Air sumur yang bersih dalam penelitian ini (air sumur yang sudah melalui alat filtrasi sederhana) adalah 4-1-1 dengan index MPN 27/100 ml untuk *E.coli*, sedangkan 4-0-0 dengan index MPN 17/100 ml untuk *Coliform* dan air minum (air sumur yang sudah melalui alat filtrasi sederhana yang sudah dimodifikasi dengan alat *life straw*) adalah 0-0-0 dengan indeks MPN 0/100 ml untuk *E.coli* dan *Coliform*. Indeks MPN pada air yang sudah dilakukan proses filtrasi dengan alat *life straw* tersebut

angka kuman 0/100 ml air dan jika dilihat dari PerMenKes RI No: 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Kualitas Air Minum air memnuhi standar air minum sesuai dengan parameter mikrobiologi kadar maksimum *E.coli/coliform* pada air 0/100 ml

Semua kotoran pada air sumur sudah tersaring pada penyaring sederhana sehingga didapatlah air yang bersih, bahkan bakteri yang terdapat pada air dapat terserap didalam alat filtrasi sederhana yang terdiri dari saringan aquarium, pasir silika, batu zeolit dan karbon aktif (arang). Saringan aquarium digunakan sebagai penyaring partikel-partikel yang cukup besar serta sebagai pembatas untuk bahan lainnya. Batu zeolit dan pasir silika berfungsi untuk memberikan rasa air yang alami sekaligus menyaring kotoran sehingga air akan menjadi bersih. Sedangkan arang (karbon aktif) berguna sebagai penjernih air yang akan difilter, karena karbon aktif merupakan material yang memiliki pori-pori yang sangat banyak dan luas. Pori-pori inilah yang berfungsi untuk menyerap setiap kontaminan yang melaluinya. Diperkirakan arang atau karbon aktif



sebanyak 450 gram dapat mengandung 40 hektar luas permukaan. Hal inilah yang mempengaruhi bersihnya air serta berkurangnya jumlah bakteri didalam air.

Meski secara fisik air yang sudah melewati alat penyaringan sederhana sudah jernih, tetapi masih terdapat bakteri sehingga air belum layak untuk dikonsumsi. Namun setelah alat dimodifikasi dengan tambahan alat *LifeStraw*, jumlah bakteri pada air menjadi 0/100 ml. Sedotan ini pada dasarnya adalah penyaring air dengan empat tahap penyaringan. Tahapan penyaringannya sebagai berikut : pra penyaringan, penyaringan pertama, penyaringan kedua, dan penyaringan ketiga. Pada tahap pra penyaringan, bahan penyaring yang digunakan adalah bahan penyaring dari tekstil dengan ukuran diameter lubang penyaringan adalah 100 mikron (seperjuta meter). Pra-penyaringan digunakan untuk menyaring benda-benda berukuran besar seperti kotoran dan endapan tanah. Kemudian air akan memasuki saringan pertama yang berukuran 15 mikron.

Penyaring pertama ini berbahan polyester, sejenis polimer yang dapat

digunakan untuk menyaring. Dengan ukuran diameter lubang penyaringan adalah 15 mikron beberapa jenis bakteri tidak dapat melewati penyaring pertama ini. Setelah itu air akan memasuki penyaring kedua. Penyaring kedua merupakan ruangan kecil pada sedotan yang jenuh dengan larutan iodine. Diketahui bahwa larutan iodine dapat membunuh parasite serta 99,3 % bakteri dan virus. Terakhir adalah penyaring ketiga yang berbentuk granula halus dari karbon aktif. Karbon aktif ini tidakhanya dapat meningkatkan aroma dan rasa air yang diminum, tetapi juga dapat membunuh mikroorganisme merugikan yang terdapat didalam air (Lestari, 2013).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil yang telah didapat, maka disimpulkan bahwa kualitas air sumur gali secara bakteriologis dari hasil pengujian yang telah melalui beberapa tahapan penyaringan sederhana hasil indeks MPN untuk *E.coli* 17/100 ml air dan *Coliform* 27/100 ml air. Dari asil uji biokimia, air sumur gali positif tercemar bakteri *Escherichia coli*. Setelah pemeriksaan bakteriologis yang telah melalui



proses penyaringan sederhana dengan penambahan alat *LifeStraw* didapat indeks MPN untuk *E.coli* dan *Coliform* 0/100 ml.

#### Saran

Dari hasil penelitian disarankan bagi masyarakat untuk menggunakan metode penyaringan sederhana dan dengan penambahan alat *LifeStraw* sebagai alternatif untuk memperoleh air sumur gali yang masuk kedalam kriteria air bersih dan air minum sehingga meminimalisir pencemaran air dan mencegah berbagai penyakit yang bersumber dari air.

#### Daftar Pustaka

Awaluddin. (2007). *Teknologi Pengolahan Air Tanah sebagai Sumber Air Minum pada Skala Rumah Tangga*. Jakarta.

Balai Lingkungan Hidup.(2015).[http://blhkotabengkulu.web.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=176:air](http://blhkotabengkulu.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=176:air). Menuju Bumiku Lestari. Pemantauan Kualitas Air Sumur Kota Bengkulu. Diakses 20 Februari 2016

Harmayani, K, D & Konsukartha, I,G,M. (2007). *Pencemaran air tanah akibat pembuangan limbah domestic di lingkungan kumuh studi kasus Banjar Ubung Sari kelurahan Ubung*. Jurnal pemukiman Tanah Vol. 5 No.2 Agustus 2007: 62-108.

(Online). Fakultas Teknik Universitas Udayana.

Lestari, Widia. (2013). *LifeStraw, Sedotan yang Tampak Sederhana, Mampu Menyelamatkan Dunia*.  
<http://duniasains.blogspot.co.id/2013/05/lifestraw-sedotan-yang-tampak-sederhana.html>

Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010. *Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*. Jakarta : Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Permenkes RI No. 416/MENKES/PER/IX/19 90. *Tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air*. Jakarta : Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pelczar, MJ dan Chan, E.C.S. (2005). *Dasar-dasar Mikrobiologi*. Penerbit UI Press.

Soemarno. (2000). *Isolasi dan Identifikasi Bakteri Klinik*. Akademi Analisis Kesehatan Yogyakarta. Departemen Kesehatan RI.

Untari, T dan Kusnadi, J. (2015). *Pemanfaatan Air Hujan Sebagai Air Layak Konsumsi*. Jurnal Pangan dan Agroindustri Vol. 3 No 4 p.1492-1502, September 2015 . Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, FTP Universitas Brawijaya Malang.



## IDENTIFIKASI SENYAWA ALKALOID EKSTRAK N-HEKSAN DAUN SUBANG-SUBANG (*Scaevola taccada* L.)

Nurfijrin Ramadhani, Nurwani Purnama Aji

Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu  
E-mail: [nurfijrin@gmail.com](mailto:nurfijrin@gmail.com)

### Abstrak

Keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini tak hanya digunakan sebagai bahan pangan ataupun untuk dinikmati keindahannya saja, tetapi dapat juga bermanfaat sebagai bahan untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Daun subang-subang merupakan bagian tumbuhan yang bermanfaat bagi kesehatan. Adapun kandungan dari tumbuhan subang-subang (*Scaevola taccada* L.) adalah kumarin, terpenoid, alkaloid dan flavonoid. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan senyawa alkaloid pada ekstrak N-Heksan daun subang-subang (*Scaevola taccada* L.).

Simplisia daun subang-subang diekstraksi dengan N-Heksan dengan metode maserasi. Hasil ekstraksi kemudian dikentalkan dengan alat *rotary evaporator*. Jumlah ekstrak kental dari ekstrak N-Heksan Daun Subang-subang (*Scaevola taccada* L.) yang didapat yaitu sebanyak 0,84 gram dengan rendemen sebesar 0,84 %. Kemudian ekstrak N-Heksan daun subang-subang (*Scaevola taccada* L.) dilakukan uji alkaloid dengan metode "Culvenore-Fitzgerald".

Pengujian menggunakan beberapa tetes pereaksi mayer menunjukkan tidak adanya kabut putih hingga gumpalan putih, pereaksi wagner menunjukkan tidak adanya endapan coklat, dan pereaksi dragendorof menunjukkan tidak adanya endapan orange. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak N-Heksan daun subang-subang (*Scaevola taccada* L.) tidak mengandung alkaloid.

**Kata Kunci :** Daun subang-subang, maserasi, n-heksan, "Culvenore-Fitzgerald".

### PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini tak hanya digunakan sebagai bahan pangan ataupun untuk dinikmati keindahannya saja, tetapi dapat juga bermanfaat sebagai bahan untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Indonesia memiliki kekayaan hayati yang beraneka ragam dan

memiliki manfaat bagi kehidupan (Supratman, 2008).

Tumbuhan yang ada di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai obat salah satunya adalah subang-subang. Tumbuhan subang-subang (*Scaevola taccada* L.) dapat ditemukan di beberapa garis pantai sebagian daerah Indonesia. Tumbuhan ini biasa



ditemukan di bagian tepi daratan dari hutan mangrove. Herba rendah/semak/pohon dengan ketinggian hingga 3 m. Daun melebar keatas. Berwarna hijau, kekuningan dan mengkilat, tepinya melengkung dan permukaan daun seperti berlapis lilin (Langeland, *et al*, 2008).

Di Hawaii, tanaman subang-subang ini biasa disebut *naupaka kahakai*. Tanaman ini biasa diminum untuk batuk, flu, sakit dan radang tenggorokan. Suku Aborigin biasa menggunakannya untuk racun ikan dan kadang-kadang meredakan sakit kepala. Di Indo-Cina digunakan sebagai obat mata (Gunawan, 2004). Di Malaysia, daun yang pahit dapat dimakan untuk menyembuhkan gangguan pencernaan. Di seluruh Asia Tenggara dan Australia, cairan daun atau cairan buah tumbuhan subang-subang digunakan untuk menjernihkan mata buram dan menyembuhkan infeksi mata (Alfaida dkk, 2013).

Senyawa metabolit sekunder yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah alkaloid. Alkaloid merupakan suatu golongan senyawa organik yang terbanyak ditemukan di alam. Hampir seluruh alkaloid berasal dari berbagai jenis tumbuhan. Semua

alkaloid mengandung atom nitrogen yang bersifat basa dan merupakan bagian dari cincin heterosiklik (Ahmad, 1986). Adapun kandungan dari tumbuhan subang-subang (*Scaevola taccada*L.) adalah kumarin, terpenoid, alkaloid dan flavonoid (Meijin, 2009).

Berdasarkan penelusuran literatur belum ditemukan secara pasti mengenai kandungan senyawa alkaloid pada tumbuhan subang-subang (*Scaevola taccada*L.) ini. Untuk itu saya merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul "Identifikasi Senyawa Alkaloid Ekstrak N-Heksan Daun Subang-subang (*Scaevola taccada*L.)".

## METODE PENELITIAN

### Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di laboratorium farmakognosi dan laboratorium kimia Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu. Waktu penelitian telah dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai Mei 2015.

### Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol kaca besar berwarna gelap, *rotary evaporator*, beaker glass, erlenmeyer, tabung reaksi, kaca arloji, batang pengaduk,



gelas ukur, pipet tetes, baskom, corong, kertas saring, waterbath, timbangan analitik, APD (masker dan sarung tangan).

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah simplisia dari daun subang-subang (*Scaevola taccada* L.), N-Heksan, pereaksi mayer, pereaksi dragendorof, pereaksi wagner, amoniak pekat, bouchardat, aquadest, serbuk Mg, HCl (P), asam klorida 2 N, kloroform, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 2 N, FeCl<sub>3</sub>, norit, asam asetat 5%, NH<sub>4</sub>OH 1%, asam asetat anhidrat, kloroform amoniak, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat.

#### Prosedur Penelitian

Sampel pada penelitian ini yaitu daun dari tanaman subang-subang (*Scaevola taccada* L.) yang masih dalam kondisi segar. Dimana lokasi pengambilan daun tanaman subang-subang (*Scaevola taccada* L.) ini bertempat di hutan tropis pasir putih Pantai Panjang Bengkulu.

Pengambilan dan pengumpulan sampel daun subang-subang (*Scaevola taccada* L.) yang masih segar sebanyak 1 kg. Sampel dirajang sekitar 1-2 cm kemudian dikeringkan. Disortasi kering, bagian daun yang kurang kering dan rusak dibuang. Simplisia kering disimpan dalam wadah yang bersih,

kering dan tertutup rapat. Simplisia kering siap untuk diekstrak.

#### Pembuatan Ekstrak N-Heksan Daun Subang-subang

Siapkan simplisia kedalam wadah botol berwarna gelap yang tertutup dan tambahkan cairan penyari atau pelarut yaitu N-Heksan sebanyak 1000 ml, ditutup dan dibiarkan selama 7 hari terlindung dari cahaya dan setiap harinya dilakukan pengadukan secara teratur selama 2,5 jam agar cairan penyari bisa masuk kedalam sel-sel yang terdapat didalam simplisia. Setelah 7 hari campuran tersebut disaring, maserat selanjutnya dikentalkan menggunakan rotary evaporator dengan tekanan 70 rpm dan suhu 70° C (Voight, 1994).

#### Pemeriksaan Ekstrak N-Heksan Daun Subang-subang (*Scaevola taccada* L)

##### Organoleptis

Pemeriksaan organoleptis dilakukan terhadap bentuk, warna, bau, dari ekstrak yang didapatkan.

##### Kelarutan

Untuk mengetahui apakah ekstrak dapat larut dalam air, etanol atau kloroform.

##### Pemeriksaan pH



Pengukuran pH dilakukan dengan cara : ambil 1 gr ekstrak dengan menggunakan pot obat, kemudian elektroda dicelupkan ke dalam wadah tersebut, kemudian angka membentuk yang ditunjukkan oleh pH meter merupakan pH ekstrak tersebut.

#### Rendemen

Rendemen merupakan persentase bagian bahan baku yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dengan total bahan baku.

$$\% \text{ Rendemen} =$$

$$\frac{\text{Berat Ekstrak yang diperoleh}}{\text{Berat Sampel yang digunakan}} \times 100 \%$$

#### Penetapan Susut Pengerinan

Susut pengeringan adalah persentase senyawa yang menghilang selama proses pemanasan (tidak hanya menggambarkan air yang hilang, tetapi juga senyawa menguap lain yang hilang). Tara krus porselen yang telah dikeringkan selama 30 menit didalam oven pada suhu  $105^{\circ}$  C. Ekstrak ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan kedalam krus porselen, lalu ditimbang. Kemudian dengan perlahan krus digoyang agar ekstrak merata. Krus dimasukkan kembali kedalam oven dengan membuka tutupnya dan membiarkan tutup tetap berada didalam oven. Krus berisi ekstrak dipanaskan pada suhu  $105^{\circ}$  C selama 1 jam.

Setelah itu dikeluarkan dan didinginkan didalam desikator lalu ditimbang sampai diperoleh berat yang konstan.

#### Penetapan Kadar Abu

Uji kadar abu dilakukan dengan cara timbang serbuk daun subang-subang kering sebanyak 2 gram, lalu masukkan ke dalam krus yang telah ditimbang dan ditara, kemudian dipijar atau dipanaskan dengan kompor listrik sampai menjadi abu, kemudian dinginkan, lalu timbang, dan hitung persentase kadar abunya.

$$\% \text{ Kadar Abu} = \frac{A-B}{A} \times 100 \%$$

Ket : A = berat simplisia sebelum dipijar

B = berat simplisia setelah dipijar

Dimana B = (berat krus + berat simplisia setelah dipijar) – berat krus

#### Pemeriksaan Kandungan Kimia

Ekstrak kental sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 5 ml aquadest dan 5 ml kloroform asetat, dibiarkan sampai terbentuk 2 lapisan air dan kloroform (Harborne, 1987).

- a. Uji Flavonoid (Metode "Sianidin Test")

Ambil lapisan air 1-2 tetes, teteskan pada plat tetes lalu



tambahkan serbuk Mg dan HCl (P), terbentuknya warna merah menandakan adanya flavonoid.

b. Uji Fenolik

Ambil lapisan air 1-2 tetes, teteskan pada plat tetes lalu tambahkan pereaksi  $\text{FeCl}_3$ , terbentuknya warna biru menandakan adanya kandungan fenolik.

c. Uji Saponin

Ambil lapisan air, kocok kuat-kuat dalam tabung reaksi, terbentuknya busa yang permanen ( $\pm$  15 menit) menunjukkan adanya saponin.

d. Uji Terpenoid dan Steroid (Metode "Simes")

Ambil sedikit lapisan kloroform tambahkan norit, tambahkan  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (P), tambahkan asam asetat anhidrat, terbentuknya warna biru ungu menandakan adanya steroid, sedangkan bila terbentuk warna merah menunjukkan adanya terpenoid.

e. Uji Alkaloid (Metode "Culvenore-Fitzgerald")

Ambil sedikit lapisan kloroform tambahkan 10 ml kloroform amoniak 0,05 N, aduk

perlahan tambahkan beberapa tetes  $\text{H}_2\text{SO}_4$  2 N kemudian dikocok perlahan, biarkan memisah. Lapisan asam diambil dan dibagi menjadi tiga bagian dan dilakukan pengujian menggunakan beberapa tetes pereaksi mayer, pereaksi wagner, dan pereaksi dragendorof. Reaksi positif alkaloid ditandai dengan adanya kabut putih hingga gumpalan putih dengan reaksi mayer. Terbentuknya endapan coklat dengan pereaksi wagner dan endapan orange dengan pereaksi dragendorof menunjukkan positif mengandung alkaloid.

**Evaluasi Hasil Ekstraksi Dari Ekstrak Alkaloid N-Heksan Dari Daun Subang-subang (*Scaevola taccada* L.)**

**Organoleptik**

Pemeriksaan organoleptis dilakukan terhadap bentuk, warna, bau, dari ekstrak yang didapatkan.

**Spektrofotometri Uv-Vis**

Pemeriksaan dengan spektrofotometri uv-vis "Phasmaspec 1700" (Shimadzu). Sebanyak 1 gram ekstrak dilarutkan dalam  $\text{H}_2\text{SO}_4$  0,1 M



kemudian diukur absorbannya pada panjang gelombang 200-400 nm.

#### Analisa Data

Data hasil disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif (Jeyabalan and Marimuthu, 2012).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah ekstrak kental dari ekstrak N-Heksan Daun Subang-subang (*Scaevola taccada* L.) yang didapat yaitu sebanyak 0,84 gram. Setelah didapatkan ekstrak kental, selanjutnya dilakukan pemeriksaan organoleptis dimana ekstrak N-Heksan daun subang-subang (*Scaevola taccada* L.) mempunyai warna hijau kecoklatan, bau yang khas, rasa yang pahit dan konsistensinya berupa ekstrak kental. Lalu dilakukan pemeriksaan kelarutan. Hasil uji kelarutan ekstrak N-Heksan Daun Subang-subang (*Scaevola*


*taccada* L.) larut dalam kloroform dan sukar larut dalam etanol 70 % dan juga sukar larut dalam air. Pada pengujian pH dilakukan dengan menggunakan alat pH meter. Adapun dari hasil pemeriksaannya Ekstrak N-Heksan Daun Subang-subang (*Scaevola taccada* L.) ini memiliki pH yaitu 5,45.

Hasil rendemen dari ekstrak N-Heksan Daun Subang-subang (*Scaevola taccada* L.) adalah sebesar 0,84 %. Selanjutnya dilakukan penetapan susut pengeringan. Menurut Voight (2005) range kadar air tergantung terhadap jenis ekstrak yaitu ekstrak kering kadar air <10%, ekstrak kental 5-30%, dan ekstrak cair >30 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekstrak N-Heksan daun subang-subang ini termasuk ke dalam range ekstrak kental dengan nilainya yang tidak melebihi dari 30%.

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Kandungan Kimia Ekstrak N-Heksan Daun Subang-subang (*Scaevola taccada* L.)

Pemeriksaan Kandungan Kimia	Pereaksi	Hasil Pengamatan
1. Alkaloid	a. Mayer	-
	b. Wagner	-
	c. Dragendroff	-
2. Flavonoid	Serbuk Mg & HCl (p)	-
3. Fenolik	FeCl <sub>3</sub>	-
4. Saponin	Aq. dest	-
5. Terpenoid	+ norit, + H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (p), + Asamasetatanhidrat	+
6. Steroid	+ norit, + H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (p), + Asamasetatanhidrat	-






**Gambar 1.** Hasil Pemeriksaan Kandungan Alkaloid Ekstrak N-Heksan Daun Subang-subang (*Scaevola taccada* L.)

Berdasarkan literatur, kandungan dari tumbuhan subang-subang (*Scaevola taccada* L.) adalah kumarin, terpenoid, alkaloid dan flavonoid (Meijin, 2009). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Chandran dan Arunachalam, 2013), skrining fitokimia ekstrak etanol dan ekstrak air dari daun *Scaevola taccada* menunjukkan adanya alkaloid, flavonoid, glikosida, terpenoid, lipid dan saponin.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. setelah dilakukan pemeriksaan kandungan kimia Ekstrak N-Heksan Daun Subang-subang (*Scaevola taccada* L.) ternyata tidak mengandung alkaloid, hal ini dikarenakan alkaloid yang terdapat pada Ekstrak N-Heksan Daun Subang-subang (*Scaevola taccada* L.) ini termasuk ke dalam sifat alkaloid yang dalam bentuk garamnya mudah larut dalam air (Soegihardjo, 2013),

dikarenakan pelarut yang digunakan adalah N-Heksan yang bersifat non polar maka senyawa alkaloid tidak dapat tertarik dalam Ekstrak N-Heksan Daun Subang-subang (*Scaevola taccada* L.).



**Gambar 2.** Hasil Pemeriksaan Kandungan Ekstrak N-Heksan Daun Subang-subang (*Scaevola taccada* L.)

Hasil pemeriksaan kandungan dari Ekstrak N-Heksan Daun Subang-subang (*Scaevola taccada* L.) hanya menunjukkan uji positif pada terpenoidnya saja, di karenakan yang terbentuk adalah warna merah, lihat Gambar 2. Karena Alkaloid tidak teridentifikasi dengan reaksi warna maka penelitian tidak dilanjutkan ke spektrofotometri uv.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak N-Heksan Daun



Subang-subang (*Scaevola taccada* L.) tidak mengandung alkaloid, tetapi hanya mengandung terpenoid.

#### Saran

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar bisa melakukan pemeriksaan kandungan kimia dari daun subang-subang (*Scaevola taccada* L.) dengan pelarut yang kepolarannya berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sjamsul. (1986). *Kimia Organik Bahan Alam*. Karunika Jakarta Universitas Terbuka. Jakarta.
- Alfaida, Samsurizal M. S, Musdalifah, N. (2013). *Jenis-Jenis Tumbuhan Pantai di Desa Pelawa Baru Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong dan Pemanfaatannya* - sebagai *Buku Saku*, E-Jipbiol, Vol. 1 : 19-32.
- Chandran, A., Arunachalam, G. (2013). *Study Of Anti-Inflammatory Activity Of Scaevola Taccada Roxb Leaf Extracts*. International Journal of Phytopharmacology. India.
- Gunawan, D. (2004). *Ilmu Obat Alam (Farmakognosi Jilid I)*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Harbone, J.B. (1987). *Metode Fitokimia Jilid II*. Penerbit ITB. Bandung.
- Jeyabalan, J. P. P. and J. Marimuthu. (2012). *Preliminary Phytochemical Analysis of Sargassum myriocystum J. Ag. and Turbinaria ornata (Turner) J. Ag. from The Southern Coast of Tamil Nadu, India*. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, : 1-4.
- Langeland, K.A, H.M. Cherry, C.M. McCormick, & K.A. Cradock Burks, et al. (2008). *Identification and biology of Nonnative Plants in Florida's Natural Areas*. 2nd ed. SP 257. Gainesville FL: University of Florida IFAS.
- Meijin, M.B. (2009). *Isolation Structural Elucidation And Antibacterial Activity of The Chemical Constituents Of Scaevola*. University Of adelaide. Australia
- Soegihardjo, C.J. (2013). *Farmakognosi*. PT. Citra Aji Parama. Yogyakarta
- Supratman, Unang. (2008). *Elusidasi Struktur Senyawa Organik*. Jurusan Kimia FMIPA, Universitas Padjajaran Bandung. Bandung.
- Voight. (1994). *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*, Edisi Kelima. Penerbit Gajah Mada University Press. Yogyakarta.



## EKSTRAK ETANOL BIJI PINANG (*Areca catechu* L) UNTUK FORMULASI GEL ANTIOKSIDAN PADA WAJAH

Yuska Novi Yanty  
Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu  
Email : [yuskanoviyanty@gmail.com](mailto:yuskanoviyanty@gmail.com)

### ABSTRAK

Biji pinang dipercayai dapat membuat wajah bersih dari jerawat karena memiliki senyawa alkaloid yang bersifat merangsang proses sintesis kolagen, hal tersebut sangat baik untuk kesehatan kulit. Karena kandungan senyawa yang ada dalam biji pinang inilah peneliti tertarik untuk membuat formulasi dalam bentuk gel. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sediaan gel antioksidan untuk wajah yang berasal dari ekstrak etanol biji pinang serta perbandingan fisik dengan variasi kadar. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah biji pinang yang di ekstraksi dengan cara maserasi kemudian diuap kan dengan water bath. Ekstrak dibuat dalam tiga formula (F1, F2, F3) dengan komposisi Na.CMC, nipagin, nipasol, glycerin, aquadest serta ekstrak etanol biji pinang dengan konsentrasi masing-masing 4%, 6%, 8%. Evaluasi gel yang dilakukan adalah uji organoleptis (bau, warna dan konsistensi), uji pH, uji daya sebar, uji iritasi, homogenitas. Hasil dari semua evaluasi yang dilakukan dari ke tiga formula adalah bahwa biji pinang dapat dibuat menjadi gel, dan formula ketiga lebih baik dari formula 1 dan formula 2.

**Kata kunci** : Formulasi gel, antioksidan, ekstrak etanol biji pinang.

### ABSTRAK

Betel nut is believed to make the face clear of acne because it has alkaloid compound that stimulates the synthesis of collagen , it is very good for skin health .Because the compounds are present in betel nut researcher is interested in making the formulation in gel form . The purpose of this study was to make preparations to face the antioxidant gel derived from the ethanol extract of betel nut and physical comparison with variations in levels .

Samples Used hearts Research Is The betel nut is extracted with How maceration then steamed with the bath water . Three hearts Extract Created formula ( F1 , F2 , F3 ) with Na.CMC composition , nipagin , nipasol , glycerin , ethanol extract aquadest well as betel nut with concentration of each - each 4 % , 6 % , 8 % . The gel evaluation is conducted organoleptic test ( odor , color and consistency ) , pH test, test Scatter Power, irritation test , homogeneity .

The results of all evaluations conducted of all three formulas is that betel nut can be made into a gel, and the third formula is better than formula 1 and formula 2 .

**Keywords** : gel formulation, antioxidant, ethanol extract of betel nut.



## PENDAHULUAN

Antioksidan adalah senyawa atau zat yang dapat menghambat, menunda, mencegah atau memperlambat reaksi oksidasi meskipun dalam konsentrasi yang kecil. Senyawa antioksidan dapat ditemui dalam berbagai jenis bahan pangan dan dari hasil sintesis reaksi kimia. Antioksidan banyak digunakan dalam dunia kesehatan dan teknologi makanan. Antioksidan selain dapat dikonsumsi dalam bentuk makanan juga di manfaatkan untuk bagian luar tubuh, yaitu sebagai kosmetik dalam perawatan kecantikan khususnya wajah (Hernani,2005).

Kosmetik adalah sediaan atau campuran bahan yang digunakan pada luar bagian dari badan untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit (Tranggono dan Latifah, 2007).

Salah satu tanaman biji-bijian yang mempunyai efektivitas sebagai antioksidan adalah biji pinang. Pinang (*Areca catechu* L) adalah jenis

palma yang tumbuh didaerah Pasifik, Asia dan Afrika bagian Timur. Jenis buah ini yang di dunia Barat dikenal dengan *betel nut*, terutama ditanam untuk dimanfaatkan bijinya. Biji pinang diperoleh dari buah pinang yang telah dikupas. Biji pinang dikenal sebagai salah satu campuran makan sirih (Hernani, 2005).

Sifat antimikroorganisme dan antioksidan yang terdapat pada buah pinang ini berkhasiat melindungi kulit wajah, mematikan jamurjuga mencegah pembentukan zat-zat radikal bebas, dan ekstrak pinang bermanfaat untuk merawat kekencangan kulit (Hariana, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membuat sediaan gel antioksidan untuk wajah dari biji pinang menggunakan basis *Natrium Carboxy Methyl Cellulosum* (Na.CMC). Dimana biji pinang di ekstraksi terlebih dulu dengan cara maserasi.

## METODELOGI PENELITIAN

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmakognosi dan Farmasetika Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu. Waktu penelitian



dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai Mei 2016.

**Alat dan Bahan**

Alat berupa gelas ukur (*pyrex*), beaker gelas (*pyrex*), alu dan lumpang, sendok tanduk, spatel, sudip, kaca arloji (*pyrex*), batang pengaduk kaca, wadah gel, penangas, pH meter, kain planel, pisau, timbangan digital, krus, oven, water bath. Bahan yang digunakan ekstrak biji pinang, Na.CMC, glycerin, nipagin, nipasol, etanol 70%, aquadest.

**Prosedur Kerja Penelitian**

**Pengumpulan bahan**

Pengambilan simplisia yang digunakan pada penelitian ini adalah biji pinang (*Areca catetchu L*) yang sudah matang atau siap panen di peroleh dikota Bengkulu.

**Pembuatan simplisia**

Pemilihan biji pinang yang baik pencucian biji pinang, pengelupasan kulit biji pinang, kemudian diambil bijinya dicuci untuk membersihkan

kotoran yang menempel kemudian dirajang dengan menggunakan pisau, biji buah pinang yang telah dirajang kemudian dikeringkan dengan diangin-anginkan ditempat yang teduh dan terlindung dari sinar matahari langsung kurang lebih selama 7 hari, selanjutnya disortasi kering untuk memisahkan benda-benda asing yang tidak diinginkan.

**Pembuatan Ekstrak Biji Pinang**

Biji yang sudah dikumpulkan, dicuci dengan air mengalir hingga bersih, dirajang kurang lebih 1-2 cm dan dikeringkan, kemudian di blender agak halus. Simplisia yang sudah halus dimasukkan kedalam botol kaca berwarna gelap, tambahkan etanol 70% sebagai larutan penyari. Lakukan perendaman selama 7 hari dengan beberapa kali pengocokan, hasil ekstraksi dipanaskan di atas *water bath* untuk memisahkan zat aktif dari pelarutnya hingga mengental.

**Rancangan Formula Gel Antioksidan untuk Wajah dari Ekstrak Etanol Biji Pinang(*Areca Catetchu L*).**

**Tabel 1. Rancangan bahan Gel biji pinang**

Bahan	Formula standar				Fungsi
	F0	F1	FII	FIII	
Ekstrak etanol biji pinang	-	4%	6%	8%	Zat aktif
Natrium CMC	6%	6%	6%	6%	Gellidan agent



Nipagin	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	Pengawet
Nipazol	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	Pengawet
Glycerin	10%	10%	10%	10%	Humektan
Aqua destila ad	100ml	100ml	100ml	100ml	Pelarut

Keterangan :

Total 100% = 20gram

#### Evaluasi Sediaan

Pemeriksaan organoleptis dilakukan dengan mengamati sediaan gel dari bentuk, bau dan warna sediaan. Pemeriksaan homogen dilakukan dengan sediaan gel pada bagian atas, bawah dan tangan diambil, kemudian diletakkan pada plat kaca transparan dan digosok (Anonim, 1979).

Uji pH dilakukan dengan menggunakan alat pH meter. Pengukuran pH meter dilakukan dengan elektroda dicelupkan dalam wadah yang telah berisi sediaan yang akan diuji pH. Angka yang ditunjukkan oleh pH merupakan nilai dari pH gel ekstrak biji pinang (Tranggono dan Latifa, 2007). Hasil uji pH pada ekstrak etanol biji pinang ini akan disesuaikan dengan pH wajah yang berkisar antara 4-5,5 (Anonim, 1985).

Uji daya sebar dilakukan dengan ditimbang gel sebanyak 1 gram pada lempeng kaca berskala dan di atasnya tutup dengan lempeng kaca yang lain

kemudian diberi beban 5 gram, diamkan selama 2 menit dan tambahkan lagi beban 5 gram. Amati dan ukur diameter sebarannya (Garg *et al*, 2002).

Uji iritasi sediaan gel biji pinang dilakukan pada 5 orang, yakni dengan cara ambil gel secukupnya oleskan pada kulit tangan dengan ukuran 3x3cm dengan pemakaian 5 jam. Setelah itu lihat gejala yang timbul dalam waktu 1 jam setelah dicuci. Jika timbul warna merah dan rasa gatal berarti panelis mengalami iritasi (Anonim, 1985).

#### Pengemasan Gel

Pengemasan gel yang sudah dibuat menggunakan pengemasan primer yang meliputi pot obat sebagai wadah gel dan pengemasan sekunder yang meliputi kotak luar dari gel yang dibuat sedemikian rupa dan semenarik mungkin serta etiket yang tertera pada wadah.



**Analisa Data**

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif berupa angka kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

B = Berat Krus + Sampel Sebelum Pemijaran

C = Berat Krus + Sampel Setelah Pemijaran.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

**Tabel Hasil ekstrak biji pinang**

Berat simplisia basa	Pelarut (Etanol 70%)	Hasil fraksinasi	Berat Ekstrak
300gram	3000ml	2500ml	29,07gram

Ekstrak biji pinang adalah hasil dari penyarian biji pinang dengan menggunakan pelarut etanol 70%, ekstrak yang didapat berbentuk cairan warna coklat dan bau khas. Kemudian ekstrak cair dikentalkan dengan water bath.

**Tabel Hasil Uji Rendemen ekstrak etanol biji pinang**

No	A	B	Hasil % Rendemen
1	300	29,07gram	9,69%

Keterangan :

A : Simplisia Awal

B : Hasil Ekstrak

**Tabel Hasil Uji Susut Pengeringan ekstrak etanol biji pinang**

Bahan	A	B	C	Hasil
Ekstrak etanol biji pinang	49,90	51,90	51,67	0,115 %

Keterangan :

A = Berat Krus Kosong

**Tabel Hasil Penetapan Kadar Abu ekstrak etanol biji pinang**

Berat Ekstrak	Alat	suhu	Waktu	Kadar abu
2gram	Krus, kompor listrik	600 <sup>o</sup> c	10 menit	0,42 %

**Tabel Uji Homogenitas Gel**

No.	Formulasi	Minggu ke		
		I	II	III
1	F0	TH	TH	TH
2	F1	TH	TH	TH
3	F2	TH	TH	TH
4	F3	TH	TH	TH

Keterangan :

F0 : Sediaan Gel tanpa ekstrak etanol biji pinang

F1 : Sediaan Gel dengan konsentrasi ekstrak etanol biji pinang 4%

F2 : Sediaan Gel dengan konsentrasi ekstrak etanol biji pinang 6%

F3 : Sediaan Gel dengan konsentrasi ekstrak etanol biji pinang 8%

TH : Tidak Homogen

**Tabel Hasil Uji pH**

No.	Formulasi	Minggu ke		
		I	II	III
1	F0	7,16	6,49	6,37
2	F1	7,82	6,30	5,39
3	F2	7,53	5,74	5,70



4	F3	5,39	5,67	5,53
---	----	------	------	------

Tabel Hasil Uji Daya Sebar

No	Formul a	Berat Beban (gr)	Daya Sebar (cm)
1	F0	0	1,2
		5	3,6
		10	4,3
2	F1	0	1,5
		5	3,7
		10	4,3
3	F2	0	1,5
		5	3,6
		10	4,3
4	F3	0	1,6
		5	3,8
		10	4,3

Tabel Hasil Uji Iritasi

No	For mula	Hasil pemeriksaan uji iritasi pada 5 fanelis			Hasil
		Hari I	Hari II	Hari III	
1	F0	TI	TI	TI	100
2	F1	TI	TI	TI	100
3	F2	TI	TI	TI	100
4	F3	TI	TI	TI	100

Keterangan :  
TI : Tidak Iritasi

## PEMBAHASAN

Proses pembuatan ekstrak meliputi pengumpulan biji pinang yang sudah matang dan masih segar. Kemudian dilakukan pencucian, perajangan dan pengeringan dengan suhu kamar (15-30° C) (Anonim, 1985). Simplisia yang sudah kering diambil sebanyak 300 gram dimaserasi dengan menggunakan pelarut etanol 70% selama 7 hari

dipekatkan dan diuapkan dengan alat *rotary evaporator* (Ditjen POM, 1995), akan tetapi pada penelitian kali ini ekstrak biji pinang diuapkan dengan *Waterbath*. Ekstrak biji pinang diperoleh dari hasil penguapan sebanyak 29,07 gram.

Pengamatan organoleptis terdiri dari warna, bau dan bentuk dari sediaan (Anonim, 1995). Karakteristik dari ekstrak etanol biji pinang berupa ekstrak kental, berwarna hitam coklat dan bau khas biji pinang.

Susut pengeringan dilakukan dengan cara timbang 1gram ekstrak masukkan kedalam krus, dipanaskan dalam oven dengan waktu selama 30 menit. Persentase susut pengeringan ekstrak kental yang baik adalah jika  $\leq 30\%$  (Voigt, 1984). Hasil yang diperoleh dari uji susut pengeringan adalah 0,115 % ini berarti hasil yang diperoleh dari uji pengeringan ini tidak melebihi kadar yang telah ditetapkan yaitu  $\leq 30$ .

Uji kadar abu dilakukan untuk mengetahui besarnya cemaran logam atau senyawa anorganik. Pengujian dilakukan dengan cara ambil 2gram ekstrak dan masukkan kedalam krus lalu ekstrak tersebut dipanaskan pada suhu 600°c hingga berubah menjadi



arang, kemudian didinginkan dan ditimbang. Hasil uji kadar abu ekstrak etanol biji pinang adalah 0,42% sedangkan standar mutu yang baik adalah tidak lebih dari 3,5%. sehingga Ekstrak etanol biji pinang ini memenuhi persyaratan uji kadar abu (Anonim,2008).

Pengujian homogen sediaan gel dilakukan dengan cara meletakan sedikit gel diantara dua kaca arloji dan kemudiaan kaca tersebut diarahkan ke cahaya. Sediaan yang homogen akan memberikan hasil yang baik karena ekstrak dan bahan obat terdispersi secara merata. Hasil pengujian homogenitas gel dari ekstrak etanol biji pinang menunjukkan bahwa gel tersebut tidak homogen dengan adanya butiran-butiran kasar pada kaca arloji hal ini disebabkan bisa saja karena kurang hati-hati pada saat penggerusan sediaan. Adapun syarat sediaan yang baik adalah jika dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, harus menunjukkan susunan yang homogen (Anonim, 1979).

Pemeriksaan pH dilakukan dengan cara mencelupkan elektroda kedalam 1 gram sediaan gel yang sudah diencerkan dengan aquadest hingga

10ml. Pengujian pH pada gel ekstrak etanol biji pinang ini dilakukan selama 3 minggu, dan untuk ekstrak etanol biji pinang sendiri dilihat hasil bahwa ekstrak ini kurang stabil untuk wajah, dimana pH wajah berkisar antara 4-5,5 (Anonim, 1985).

Uji daya sebar gel ekstrak biji pinang diletakan diantara dua kaca arloji, lalu letakan anak timbangan 5gram di atasnya amati dan ukur hasilnya menggunakan mistar, lalu tambahkan lagi anak timbangan 5gram 2menit kemudiaan amati dan ukur lagi hasilnya. Hasil yang didapat untuk F0, F1, F2, F3 tidak ada yang melebihi syarat yang telah ditentukan dimana persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5-7 cm (Garg *et al*, 2002).

Uji iritasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah sediaan tersebut dapat menimbulkan iritasi pada kulit atau tidak. Teknik uji tempel tertutup dilakukan dengan mengoleskan sediaan uji pada luas tertentu, biarkan tertutup selama lebih kurang 24 jam, amati reaksi kulit yang terjadi. Dikatakan sediaan yang baik adalah ketika ditempelkan pada kulit tidak menimbulkan rasa gatal dan bercak kemerahan (Anonim, 1985).



Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa tidak terjadi perubahan apapun pada kulit lengan tangan, ini menandakan bahwa sediaan gel ini tidak menyebabkan iritasi.

#### KESIMPULAN

Ekstrak etanol biji pinang (*Areca catetchu* L) dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan gel. Variasi konsentrasi Ekstrak etanol biji pinang (*Areca catetchu* L) dapat mempengaruhi sifat fisik gel (meliputi : Uji organoleptis, uji daya sebar, dan uji pH).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1985. *Cara Pembuatan Simplisia*. 2-22. Jakarta : Depkes RI.
- Anonim, 1989. *Materia Medika Indonesia Jilid V*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Anonim, 1995. *Farmakope Indonesia, Edisi IV*, Departemen Kesehatan Indonesia, Jakarta. .
- Ditjen POM, 1995. *Materia Medika Indonesia, Jilid VI*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Hal 103-113.
- Gard A.D, Anggrawal S. Gard and A.K Sigla, 2002. *Spreading Of Semisolid Formulation An Update Pharmaceutical Technology*
- Hernani dan Raharjo, M, 2005. *Tanaman Berkhasiat Antioksidan*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Hariana, Arief, 2013. *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Noerono, Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Tranggono R,I, Latifah F, 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, PT Gramedia, Jakarta.
- Voight, R, 1994. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*, Terjemahan Soedani



## UJI DAYA HAMBAT ANTI BAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN RANDU (*Ceiba pentandra* (L) Gaertn) PADA BAKTERI *Pseudomonas aeruginosa*

Setya Enti Rikomah<sup>1</sup>, Mimma Karolina<sup>2</sup>

Akademi Farmasi Yayasan Al-fatah Bengkulu  
Jl. Indragiri, Gang Serangkai Padang Harapan Kota Bengkulu  
Email: [setyaentirikomah@gmail.com](mailto:setyaentirikomah@gmail.com)

### ABSTRAK

Tumbuhan yang digunakan secara tradisional yang berpotensi untuk pengobatan infeksi bakteri adalah daun Randu (*Ceiba pentandra* (L.) Gaertn). Penggunaan daun randu secara tradisional digunakan sebagai obat luar untuk luka yang disebabkan infeksi. Tujuan penelitian untuk mengetahui adanya daya hambat ekstrak etanol daun randu pada bakteri *Pseudomonas aeruginosa*. Metode penelitian yang digunakan yaitu maserasi dengan menggunakan etanol 70%. Variasi dosis yang diambil secara acak adalah dimulai dari konsentrasi 10 mg/ml, 30 mg/ml, 60 mg/ml, 75 mg/ml, 95 mg/ml, kontrol positif yang digunakan adalah kloramfenikol 0,3% dan kontrol negatif DMSO 10%, pengujian dilakukan dengan menggunakan kertas cakram. Hasil analisa data secara statistik menyatakan bahwa seluruh dosis ekstrak etanol daun randu memiliki daya hambat antibakteri ( $p < 0,05$ ) dimana dosis yang paling efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* adalah dosis 5 dengan konsentrasi 95 mg/mL dan diameter zona hambat rata-rata 11,4 mm.

**Kata kunci** : *Pseudomonas aeruginosa*, Antibakteri, Daun Randu

### PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kelimpahan sumber daya alam yang memiliki keunggulan yang dapat dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat. Pemanfaatan tumbuhan obat biasanya dilakukan secara tradisional, Salah satu obat tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah tanaman herbal. Pemakaian obat tradisional banyak diminati karena efek samping yang ditimbulkan sangat kecil

dibandingkan dengan obat-obatan dari bahan kimia. Tetapi sampai saat ini khasiat obat herbal hanya didasarkan pada pengalaman empiris saja, oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian dalam pengembangan obat tradisional (Anonim,2000).

Tumbuhan yang digunakan secara tradisional yang berpotensi untuk pengobatan infeksi bakteri adalah tanaman Randu (*Ceiba pentandra* (L) Gaertn). Penggunaan



daun randu (*Ceiba pentandra* (L) Gaertn) untuk obat tradisional diantaranya sebagai obat luar dan obat dalam seperti untuk mengatasi demam, diare, diabetes, hipertensi, sakit kepala, obat luka. Cara pemakaiannya untuk obat yang diminum, tidak ada rekomendasi dosis. Sedangkan untuk pemakaian luar cukup haluskan 5 helai daun randu segar sampai halus, lalu gunakan untuk menurap panu, luka, luka bakar, memar dan demam tinggi (Whidhianti WD, 2011). Senyawa kimia yang terkandung pada daun randu (*Ceiba pentandra* (L) Gaertn) yaitu saponin, poliuronoid, polifenol, tanin, flavonoid (Pratiwi, 2012). Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa ekstrak daun dan kulit batang randu sangat efektif untuk pengobatan diabetes mellitus, malaria, dan penyembuhan luka (Pratiwi HR, 2008).

## METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini alat yang dibutuhkan dan digunakan adalah: Seperangkat alat *Rotary Evaporator* @IKA RV 10 basic, Botol kaca berwarna gelap, Inkubator @mimmert, Labu ukur 10 ml, Autoclaf @Geared Cauge, Lampu spritus, Kertas kering, Jarum ose, Pingset, Oven @mimmert,

Timbangan analitik @Lucky scale, Cawan petri, Paper disc, Jangka sorong.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah simplisia Daun Randu *Ceiba pentandra* (L) Gaertn, Etanol 70%, Nutrient Agar (NA), Nutrient broth (NB), biakan murni *Pseudomonas aeruginosa*, aquadest, kloramfenikol 0,3%, dimetil sulfoksida (DMSO) 10%, kapas dan aluminium foil.

## Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Randu dengan Metode Maserasi

Masukan 10 bagian simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok kedalam sebuah bejana, lalu dituangi 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya sambil sering diaduk lalu diserikai, diperas, dicuci ampasnya dengan cairan penyari secukupnya hingga diperoleh 100 bagian. Pindahkan kedalam bejana tertutup, biarkan ditempat sejuk terlindung dari cahaya selama 2 hari. Endapan dituang atau disaring. Kemudian filtrat hasil maserasi dikumpulkan dan diuapkan menggunakan *rotary vacuum evaporator*.



### Pemeriksaan Kandungan Kimia

#### Uji flavonoid (metode shinoda)

Uapkan hingga kering 1 ml larutan percobaan, basahkan sisa dengan aseton pekat tambahkan sedikit serbuk halus asam borat P dan serbuk halus asam oksalat P, panaskan hati-hati diatas tangkas air dan hidrasi pemanasan yang berlebihan. Campur sisa yang diperoleh dengan 10 ml eter. Amati dengan UV, larutan yang berfluoresis kuning intensif, menunjukkan adanya flavonoid (Harbone, 1994).

#### Uji Saponin

Ambil 1 ml ekstrak daun randu dan 1 ml etanol dituangkan kedalam tabung uji. Selanjutnya 20 ml air suling ditambahkan kedalamnya dan kocok kuat-kuat selama kurang lebih 15 menit. Adanya kandungan saponin ditandai dengan terbentuknya buih stabil setinggi lebih kurang 1 cm selama kurang lebih 20 menit (Roopashree dkk,2008).

#### Uji Tanin

Ambil sebanyak 2 ml ekstrak daun randu ditambahkan kedalam 2 ml air suling. Selanjutnya ditetesi dengan satu atau dua tetes larutan  $FeCl_3$  1% adanya

kandungan tanin ditandai dengan timbulnya warna hijau gelap atau hijau kebiruan (Marchaban dkk, 2011).

#### Pembuatan Larutan Uji

Penelitian tentang daun randu pada bakteri *Staphylococcus Epidermis* dan *Sihngella Dysentea*. konsentrasi dalam menghambat bakteri tersebut adalah dimulai dari 10 mg/ml Variasi dosis secara acak (Prasanty. A,2014). Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan variasi yaitu 10 mg/ml, 30 mg/ml, 60 mg/ml, 75 mg/ml, dan 95 mg/ml dalam pelarut DMSO 10%.

#### Sterilisasi Alat

Alat-alat yang tahan terhadap pemanasan tinggi distrerilkan kedalam autoclaf pada suhu  $121^{\circ}C$  selama 15 menit. Sedangkan alat yang tidak tahan terhadap pemanasan yang tinggi disterilkan dengan cara perendaman menggunakan etanol 70%.

#### Pembuatan Larutan Standar Mc.Farland

Dibuat dari 0,5ml Barium chloride dihidrat ( $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ ) 1,175% ditambah 99,5 mL asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) 1% lalu masukan kedalam tabung reaksi dan tutup supaya tidak terjadi



penguapan. Larutan ini digunakan sebagai standar atau pembanding tingkat kekeruhan dari suspensi bakteri.

### Suspensi Bakteri

Pembuatan suspensi bakteri dilakukan dengan cara ambil satu ose bakteri hasil peremajaan lalu disuspensikan kedalam NB sampai tingkat kekeruhannya sama dengan larutan standar. Kekeruhannya dilihat pada latar belakang kertas putih yang digaris dengan menggunakan spidol. Jika kurang keruh ditambah koloni bakteri dan apabila terlalu keruh maka ditambah media NB.

Satu ose hasil peremajaan biakan murni dibiarkan dalam 10 ml media cair NB dan di homogenkan. Larutan ini berfungsi sebagai biakan aktif.

### Media Nutrien Agar (NA)

Media dibuat dengan cara larutkan *Nutrient Agar* (NA) 5 gram dalam aquadest steril 250 ml dan ditutup dengan kapas. Kemudian dipanaskan hingga mendidih dan didinginkan pada suhu ruangan. Selanjutnya media tersebut disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit pada tekanan 2 atm.

### Media nutrien broth (NB)

Media cair dibuat dengan cara larutkan *Nutrient Broth* (NB) 1 gram dalam aquadest steril 125 ml dan ditutup dengan kapas. Kemudian dipanaskan hingga mendidih dan didinginkan pada suhu ruangan. Selanjutnya media tersebut disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit pada tekanan 2 atm.

### Peremajaan Bakteri

Peremajaan bakteri dilakukan dengan menggunakan metode gores. Biakkan murni bakteri *Pseudomonas aeruginosa* diambil satu ose kemudian di inokulasikan dengan cara digoreskan dengan media NA secara aseptik. Kemudian diinkubasi pada suhu 30°C selama 24 jam.

### Metode Difusi Agar (*Kirby & Bauer*)

Masukan lidi kapas steril kedalam suspensi bakteri, biarkan hingga meresap lalu lidi kapas diangkat dan diperas dengan menekankan pada dinding tabung bagian dalam sambil diputar-putar. Kemudian goreskan pada seluruh permukaan media agar padat dalam cawan petri. Diamkan diatas selama 5-15 menit supaya suspensi bakteri meresap kedalam agar.



Kemudian paper disc dicelupkan pada masing-masing larutan uji :

**Kontrol Negatif :** Larutan DMSO 10%

**Kontrol Positif :** Kloramfenikol 0,3%.

Ekstrak Etanol Daun Randu 10 mg/ml, 30 mg/ml, 60 mg/ml, 75 mg/ml, dan 95 mg/ml.

Penempelan *paper disc* pada media agar padat yang sudah ditanami bakteri dilakukan dengan menggunakan pinset secara aseptis dengan jarak minimal 15 mm.

Penempelan *paper disc* berisi larutan uji selanjutnya diinkubasi pada suhu 37°C selama 18-24 jam.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah daun Randu (*Ceiba Petandra* L) yang diambil di wilayah Pulau Bani Kota Bengkulu. Setelah pengambilan sampel dilakukan Verifikasi tanaman di Fakultas Biologi Universitas Bengkulu. Verifikasi

dilakukan bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan bahan baku yang akan digunakan pada uji aktivitas antibakteri.

Metode yang digunakan pada uji ini adalah metode difusi cakram yang berdasarkan diameter zona bening yang terbentuk disekitar kertas cakram. Kontrol positif yang digunakan adalah kloramfenikol karena antibiotik golongan ini berspektrum luas yaitu efektif untuk menghambat bakteri gram positif maupun gram negatif serta mikroorganisme lain (Mycek *et al*, 1992).

Kontrol negatif yang digunakan yaitu Dimethyl-sulfoxide (DMSO) merupakan salah satu pelarut dalam uji antibakteri maupun uji antifungal suatu ekstrak ataupun obat baru (Hastari, 2012). DMSO yang digunakan adalah DMSO 10%, konsentrasi ini dipilih karena DMSO <15% tidak berpengaruh pada pertumbuhan bakteri.

**Tabel 1. Hasil Uji Daya Hambat Ekstrak Daun Randu (*Ceiba Pentandra* (L) Gaertn) Terhadap Bakteri *Pseudomonas Aeruginosa***

No	Konsentrasi	Pencelupan (mm) 1	Pencelupan (mm) 2	Pencelupan (mm) 3	Rata-rata
1	Kontrol positif	19,5 mm	18 mm	17,2 mm	18,2 mm
2	Kontrol negatif	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
3	95 mg/ml	12,3 mm	11,3	10,6 mm	11,4 mm
4	75 mg/ml	10,1 mm	9,6	8,9 mm	9,5 mm
5	60 mg/ml	9,0 mm	9,6	7,9 mm	8,8 mm
6	30 mg/ml	8,7 mm	8,7	6,6 mm	8 mm
7	10 mg/ml	1,6 mm	1,6	1,3 mm	1,5 mm



Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada konsentrasi 10 mg/ml, memiliki daya hambat rendah, 30 mg/ml, 60 mg/ml, 75 mg/ml, 95 mg/ml, memiliki daya hambat sedang dan pada kontrol (+) yaitu kloramfenikol daya hambatnya kuat, dan pada kontrol (-) yaitu DMSO tidak ada zona bening.

**Tabel 2. Kategori Diameter Zona Hambat Ekstrak Daun Randu (*Ceiba Pentandra* (L) Gaertn) Terhadap Bakteri *Pseudomonas Aeruginosa*.**

Perlakuan (Kode)	Rata-Rata Daya Hambat	Kategori Daya Hambat
Kloramfenikol 0,3%	18,2 mm	Kuat
DMSO 10%	0 mm	Lemah
95 mg/ml	11,4 mm	Kuat
75 mg/ml	9,5 mm	Sedang
60 mg/ml	8,8 mm	Sedang
30 mg/ml	8 mm	Sedang
10 mg/ml	1,5 mm	Lemah

Penelitian tentang daun randu ini pengambilan dosis yang digunakan dalam penelitian berdasarkan penelitian sebelumnya tentang daun randu pada bakteri *Staphylococcus Epidermis* dan *Shigella Dysentea* konsentrasi yang menghambat bakteri tersebut adalah dimulai dari 10 mg/ml 30 mg/ml, 60 mg/ml, 75 mg/ml, dan 95 mg/ml. (Prasanty A, 2014). Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan variasi dosis secara acak yaitu 10 mg/ml, 30 mg/ml, 60 mg/ml, 75 mg/ml, dan 95 mg/ml dalam pelarut DMSO 10%. Ekstrak pada konsentrasi  $\leq 1000 \mu\text{g/ml}$  dianggap efektif dikembangkan sebagai agen antibakteri baru (Mitscher *et al.*, 1972).

Hasil pengujian skrining fitokimia yang telah dilakukan didapat hasil bahwa daun randu positif mengandung senyawa flavonoid ditandai larutan yang berfluoresis kuning intensif menunjukkan adanya kandungan flavonoid, Senyawa flavonoid merupakan senyawa fenol yang berfungsi sebagai antimikroba dengan cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstra seluler yang mengganggu integritas membran dan dinding sel. Flavonoid juga bersifat disinfektan dan bakteristatik yang bekerja dengan cara mendenaturasi protein yang dapat menyebabkan aktivitas metabolisme sel bakteri berhenti (Nurhanafi, 2012).



Pengujian saponin dilakukan dengan cara 1 ml ekstrak daun randu dan 1 ml etanol dituangkan kedalam tabung uji. Selanjutnya 20 ml air suling ditambahkan kedalamnya dan kocok kuat-kuat selama kurang lebih 15 menit. Kandungan saponin ditandai dengan terbentuknya buih stabil setinggi lebih kurang 1 cm selama kurang lebih 20 menit dan tanin. Senyawa saponin merupakan glikosida dengan berat molekul yang tinggi, yang dikarakteristikan dengan strukturnya mengandung steroid dengan satu atau lebih rantai gula. Saponin menunjukkan spektrum luas dalam aktivitas biologis dan digunakan dalam obat-obatan herbal. Senyawa saponin bekerja menekan pertumbuhan dari bakteri karena senyawa tersebut dapat menurunkan tekanan permukaan dinding sel dan apabila berinteraksi dengan dinding sel akan menipis atau pecah, sehingga senyawa tersebut masuk kedalam sel dan akan mengganggu metabolisme dari bakteri (Ganiswarna, 1995).

Pengujian tanin dengan menggunakan 2 ml ekstrak daun randu ditambahkan kedalam 2 ml air suling. Selanjutnya ditetesi dengan satu atau dua tetes larutan  $\text{FeCl}_3$  1% adanya

kandungan tanin ditandai dengan timbulnya warna hijau gelap atau hijau kebiruan. Tanin bekerja dengan mengikat salah satu protein adhesin bakteri yang dipakai sebagai reseptor permukaan bakteri, sehingga terjadi penurunan daya perlekatan bakteri serta penghambatan sintesis protein untuk pembentukan dinding sel. Selain itu, tanin dapat merusak membran sel, mengerutkan dinding sel, sehingga mengganggu permeabilitas yang mengarah pada kematian (Riska F dan Puguh S, 2014).

Hasil pengujian dengan metode difusi cakram menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun Randu (*Ceiba Petandra* L) mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* yang dapat dilihat dari besarnya diameter zona bening yang terbentuk disekitar kertas cakram. Peningkatan konsentrasi ekstrak daun randu menunjukkan semakin besar diameter zona hambat yang terbentuk terlihat seperti pada tabel I. Kontrol negatif tidak memiliki daya hambat yaitu 0 mm, hal ini membuktikan tidak adanya pengaruh DMSO 10% terhadap pertumbuhan bakteri *Pseudomonas aeruginosa*. Kontrol positif memiliki daya hambat paling baik dibandingkan



ekstrak uji, hal ini dapat dilihat dari besarnya diameter zona hambat yang terbentuk disekitar kertas cakram terlihat seperti pada tabel I.

Data hasil pengujian aktivitas ekstrak etanol daun Randu terhadap diameter daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dianalisa secara statistik menggunakan metode *One way ANOVA* dengan program *Statistical Product Services Solution (SPSS)* dengan taraf kepercayaan 95% atau  $\alpha = 0,05$ .

Hasil daya hambat yang diperoleh terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Dari hasil uji normalitas menggunakan uji didapatkan nilai signifikansi  $0,798 > p(0,05)$  yang artinya data terdistribusi normal. Menurut uji Duncan daya hambat yang paling besar pada kontrol positif, diikuti konsentrasi ekstrak 10 mg/ml, 30 mg/ml, 60 mg/ml, 75 mg/ml, 95 mg/ml dan kontrol negatif.

Berdasarkan uji *one way ANOVA*, diketahui bahwa variabel terikat diameter zona hambat pada bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dengan nilai sig  $(0,53) < p(0,05)$  yang berarti terdapat perbedaan yang bermakna atau ada pengaruh perlakuan

konsentrasi ekstrak etanol daun Randu terhadap diameter zona hambat pada bakteri

Perbedaan yang bermakna pada diameter zona hambat ekstrak etanol daun randu terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* pada kontrol negatif, kontrol positif dan 5 konsentrasi pada Uji *Post Hoc LSD*. di ketahui data kontrol positif kloramfenikol memiliki nilai signifikansi  $0,000 (p < 0,05)$  terhadap semua kontrol uji. Hal ini menunjukkan bahwa kloramfenikol memiliki kemampuan hambat paling baik terhadap pertumbuhan bakteri *Pseudomonas aeruginosa*. Konsentrasi sampel uji berbanding lurus dengan diameter daya hambat. Ekstrak etanol daun Randu konsentrasi 10 mg/ml memiliki kemampuan daya hambat yang sama (tidak berbeda signifikan).

## KESIMPULAN

Ekstrak etanol daun tanaman randu (*Ceiba petandra L*) mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Pseudomonas aeruginosa*. Dengan Konsentrasi terbaik yaitu 95 mg/ml.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim, (2000), *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*,



- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Jakarta.
- Ganiswarna.G.S.(1995). *farmakologi Dan Terapi*. Edisi Keempat. Universitas Indonseia. Jakarta.
- Harborne, JB., (1994). *Metode Fitokimia. Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*, Terjemahan: Padmawinata K Dan Soediro I, ITB Press, Bandung.
- Marchaban, Soegihardjo CJ, & Kumarawati, FE., (2011). *Uji Aktivitas Sari Randu (Ceiba Pentandra Gaertn.) Sebagai Penumbuh Rambut*. Laporan Penelitian. UGM. Yogyakarta.
- Mitscher, L. A., Leu, R. P., Bathala, M. S., Wu, W. & Beal J. L.,(1972), *Antimicrobial Agents from Higher Plants*. I. Introduction, Rationale, and Methodology, Lloydia. Yogyakarta.
- Mycek, M.J., R.A Harvey,, and P.C. Champe., (1992), *Inhibitor of Cell Wall Synthesis*, p.297-310, In: *Pharmacology*. 2nd ed.: Lippincott Williams & Wikins, Philadelphia.
- Nurhanafi. F. (2012). *Perbandingan Potensi Antimikroba Ekstrak N-Heksana Daun Kelor (Moringa Oleifera). Jambu Mete (Anacardium Occidentale). Dengan Kulit Biji (PeriCarp). Terhadap Bakteri Pseudomonas Aeruginosa Secara In Vitro*. Program Kedokteran Hewan, Universitas Brawijaya. Malang.
- Pratiwi HR., (2008). *Mikrobiologi Farmasi*, Erlangga, Jakarta.
- Pratiwi.,(2012). *Potensi Kapuk Randu (Ceiba Pentandra (L.)Gaertn) Dalam Penyesiaan Obat Herbal*. Program Studi Pendidikan Biologi. Fakultas Teknik Matematika Dan Ipa. Universitas Indraprasta Pgri.
- Prasanty,A., (2014). *Uji Efektifitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Randu Ceiba Pentandra (L.) Terhadap Bakteri Staphylococcus Epidermis Dan Sihgella Dysentea*.Fakultas Farmasi Universitas sebelas Maret.
- Roopshree,T.S.Dang.R Rani.R.H.S and Narendra. C (2008). *Antibacterial Activity Of Antipsoriatic Herbs : Cassia Tara Momordica Charantia An Chalendula Officinalis* *Internasional JurnalOf Applied Research In Natural Products*. 20-28. Surabaya
- Riska F, Puguh S, Sarwiyono, (2014), *Inhibition Activityof Moringa oleifera LeafJuice to Growth of Streptococcus agalactiae and Streptococcus uberis Bacteris Caused Mstitisin Dairy Cows*, Jurnal, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang.
- Widhianti WD. (2011). *Pembuatan Arang Aktif dari Biji Kapuk (Ceiba Pentandra L).sebagai Absorben Zat Warna Rhodomin B*. Universitas Airlangga: surabaya.



# FORMULASI SEDIAAN GEL EKSTRAK ETANOL DAUN PEGAGAN (*Centella Asiatica* (L) URBAN) DAN UJI AKTIVITAS TERHADAP *Propionibacterium Acne* PENYEBAB JERAWAT

Sri Widyastuti

Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Timur  
Email : sriwidyastutiwidya@gmail.com

## ABSTRAK

Telah dilakukan uji aktivitas dan uji fisik Formulasi sediaan Gel ekstrak etanol daun pegagan dengan konsentrasi 6% b/b, 8% b/b dan 10% b/b, terhadap pertumbuhan *Propionibacterium acne*. Pengujian Formulasi Gel dilakukan dengan uji organoleptis, pH, uji homogenitas, uji kecepatan mengering, uji daya menyebar dan uji iritasi, menunjukkan formulasi sediaan gel memenuhi standar kelayakan sebagai sediaan topikal yang baik dan dilakukan uji aktivitas antibakteri dengan menggunakan metode difusi agar untuk menentukan diameter hambatan terhadap *Propionibacterium Acne* dengan menggunakan paperdisc pada medium Muller Hilton Agar (MHA). Setelah masa inkubasi 2 x 24 jam didapatkan rata-rata zona hambatan dengan konsentrasi 6% b/b sebesar 20,50 mm, konsentrasi 8% b/b sebesar 21,57 dan konsentrasi 10% b/b sebesar 22,64 mm. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun Pegagan dapat dibuat dalam formulasi sediaan Gel, serta aktif dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acne*.

**Kata Kunci** : Daun Pegagan, Sediaan Gel, *Propionibacterium acne*

## PENDAHULUAN

Tanaman pegagan (*Centella asiatica* (L) urban) memiliki berbagai khasiat membersihkan darah, mengatasi demam, antibakteri, antiinflamasi, antialergi, insectisida dan stimulant (Bayyinatul, 2011).

Tanaman pegagan memiliki banyak kandungan kimia yang bermanfaat bagi manusia antara lain triterpenoid, yang terdiri dari *asiaticoside*, *madecoside*, dan *asiatic*

*acid*, *alkaloid*, *glikosida*, *tanin*, *steroid*, *madasiatic acid*, dan *brachnicacid* (Ullah et al, 2009). Senyawa triterpenoid, saponin, minyak atsiri, dan flavanoid dari pegagan diklaim berpotensi sebagai antibakteri, antijamur, yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara, mendenaturasi protein sel bakteri. Akibat terdenaturasinya protein sel bakteri maka semua aktivitas



metabolisme sel bakteri terhenti. (Arumugam et al, 2011).

Tanaman pegagan dapat pula digunakan untuk pengobatan jerawat. Jerawat merupakan suatu proses peradangan kronik kelenjar-kelenjar *polisebasea* yang ditandai dengan adanya komedo, papul, pustul dan nodul. Penyebaran jerawat terdapat pada muka, dada punggung yang mengandung kelenjar *sebaseus* (Harper, 2007)

Pada masa pubertas terjadi ketidakseimbangan hormon, beberapa jenis hormon menyebabkan glandula *sebacea* yang menghasilkan minyak pada kulit wajah menjadi lebih aktif, akibatnya produksi *sebum* (minyak) pada wajah juga meningkat. Banyaknya minyak pada wajah ini berpotensi mengikat debu, kotoran, dan bakteri penyebab jerawat, yang menyumbat pori-pori kelenjar minyak (Biologimedia, 2010)

Pada saat pori-pori tersumbat, maka tumbuh dan berkembang *Propionibacterium acne* yang merupakan bakteri penyebab jerawat, yang merupakan flora normal kulit. *P. Acne* merupakan jenis bakteri yang hidup tanpa memerlukan adanya oksigen atau bisa disebut sebagai

bakteri anaerobik (Wikipedia, 2010). Bakteri jenis ini banyak dijumpai pada daerah berminyak, sedangkan daerah lembab yaitu *Corynebacterium*, dan daerah kering merupakan jenis bakteri *Staphylococcus* (Greenwood D, dkk 2012).

Untuk mengatasi jerawat, dibutuhkan suatu sediaan yang mempunyai daya penetrasi yang baik dan kontak yang cukup lama untuk mengurangi/mengobati jerawat diantaranya ialah sediaan gel yang mempunyai kadar air yang tinggi sehingga dapat menghidrasi *stratum corneum* dan mengurangi resiko timbulnya peradangan lebih lanjut akibat menumpuknya minyak dalam pori-pori (Ahmad, G.S, 2011).

Untuk itu ekstrak etanol daun pegagan pada penelitian ini diformulasikan dalam sediaan bentuk gel, karena sediaan dalam bentuk gel memiliki keuntungan yaitu kemampuan penyebarannya baik pada kulit, memberikan efek dingin yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit, tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis, kemudahan pencuciannya dengan air yang baik, serta pelepasan obatnya baik



Telah dilakukan Penelitian sebelumnya oleh Vivin Sulistiana Putri. tahun 2013 dengan menggunakan Formulasi krim Ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica* (L.) Urban) konsentrasi 6% dan 10% dengan basis *clod cream* dan *vanishing cream* serta uji aktivitas terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*.

Berdasarkan uraian diatas maka, permasalahan pada penelitian ini yaitu, apakah ekstrak etanol daun pegagan (*Centella asiatica* (L) Urban) dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan gel, dan pada konsentrasi berapa sediaan gel ekstrak etanol daun pegagan memiliki aktivitas antibakteri terhadap *Propionibacterium acne*.

Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk memformulasikan ekstrak etanol daun pegagan (*Centella asiatica* (L) Urban) dalam bentuk sediaan gel dan untuk menentukan konsentrasi sediaan gel ekstrak etanol daun pegagan yang memiliki aktivitas anti bakteri terhadap *Propionibacterium acne*.

Manfaat dari penelitian ini adalah mendapatkan data ilmiah tentang bahan alam yang dapat dijadikan sebagai sediaan dalam bentuk gel anti jerawat khususnya tanaman pegagan dan sebagai wujud pengimplementasian

ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dalam memperluas ilmu pengetahuan didunia pendidikan khususnya dalam bidang farmasi.

## METODE PENELITIAN

### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Laboratorium Fitokimia, Laboratorium Tehnologi farmasi, dan Laboratorium Mikrobiologi farmasi Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Timur pada tanggal 07-30 September 2016.

### Alat dan Bahan

#### Alat

Alat Maserasi, Batang Pengaduk, cawan petri, Cawan Porselin, Erlenmeyer, Gelas Kimia, Gelas Ukur, Inkubator, Labu Ukur, Lemari Pendingin, Mixer, Oven, Ose bulat, Penangas Air, pH meter, Pipet Volume, Pipet Tetes, Pingset, dan Timbangan Analitik.

#### Bahan

Aquadest, air mawar, Biakan Bakteri *Propionibacterium acne*, Ekstrak pegagan, etanol 96%, Gliserin, HPMC, Metil paraben, Medium Nutrient Agar (NA), veril acne (kontrol positif).

### Prosedur Kerja

#### 1. Pengambilan Sampel



Sampel yang akan digunakan adalah sampel daun Pegagan yang tumbuh di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

2. Pengolahan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun pegagan dimana daun pegagan diambil pada pagi hari kisaran waktu pkl 07.00 - pkl 11.00 yaitu daun segar kemudian dikumpulkan lalu dibersihkan dengan air mengalir, sampel dipotong - potong dengan ukuran yang lebih kecil agar lebih cepat proses pengeringannya sesudah itu sampel dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dan dibuat dalam bentuk serbuk.

3. Pembuatan Ekstrak Pegagan Dengan Maserasi

Serbuk daun pegagan ditimbang 500 gram dan diekstraksi dengan metode maserasi. Yaitu dengan

merendam simplisia dengan cairan penyari yaitu etanol 96 % hingga seluruh sampel terendam, kemudian tutup dan simpan selama 5 hari sambil sesekali diaduk selanjutnya disaring ampasnya dimasukan kembali ke dalam alat maserasi dan dilakukan seperti semula sampai cairan penyari tak berwarna. Hasil ekstraksi dipekatkan dengan rotavapor kemudian diuapkan di atas penangas air hingga diperoleh ekstrak kentalnya.

4. Pembuatan Air Mawar

Diisi air suling kedalam botol kaca sebanyak 240 ml, kemudian dimasukkan 12 tetes minyak esensial mawar, kemudian ditutup rapat dan dikocok botol tersebut.

5. Penyiapan dan Pembuatan Sediaan Gel

a. Rancangan Formula

6. Tiap 20 gram mengandung :

Tabel 1. Rancangan Formula Sediaan Gel

Bahan	Fk1 % b/b	Fk2 % b/b	Fk3 % b/b	Fk4% b/b	Kontrol positif
Ekstrak etanol daun pegagan	0	1,2 g	1,6 g	2 g	@ V E R I L
HPMC	1,6 g	1,6 g	1,6 g	1,6 g	
Gliserin	2 g	2 g	2 g	2 g	
Metil paraben	0,03g	0,03 g	0,03 g	0,03 g	
Air mawar	2 tetes	2 tetes	2 tetes	2 tetes	
Aquadest	16,37 g	15,17 g	14,77 g	14,37 g	

(Sumber : Handbook of pharmaceutical Excipients. 2009 )

Keterangan :

Fk1 : Formula gel kontrol negatif

Fk2 : Formula gel konsentrasi 6%



Fk3 : Formula gel konsentrasi 8%

Fk4 : Formula gel konsentrasi 10%

Komposisi veril acne gel : Asam salisilat 0,5 %, Asam borat 1 %, Resorsinol 2 %, Allantoin 0,1 %, triklosan 0,1 %, alkohol 25 %.

a. Pembuatan Gel anti jerawat ekstrak etanol daun pegagan

Metil paraben dilarutkan dalam air panas secukupnya (suhu 70<sup>0</sup> C). HPMC dicampurkan ke dalam larutan metil paraben kemudian diaduk pelan lalu ditambahkan gliserin. Setelah itu diaduk hingga larut dan terbentuk massa gel yang baik dan jernih kemudian ditambahkan air mawar sebanyak 2 tetes dan ditambahkan dengan aquadest 16,37 gram, lalu diaduk kembali hingga homogen, gel disimpan dalam wadah tertutup rapat (formula 1).

Dibuat formula gel anti jerawat ekstrak etanol daun pegagan dengan konsentrasi 6 %, Metil paraben dilarutkan dalam air panas secukupnya (suhu 70<sup>0</sup> C). HPMC dicampurkan diatas larutan metil paraben kemudian diaduk pelan lalu ditambahkan gliserin. Setelah itu diaduk hingga larut dan terbentuk massa gel yang baik dan jernih. Disisi lain ekstrak diencerkan dengan air lalu dimasukkan kedalam adonan gel, kemudian ditambahkan air mawar 2 tetes diaduk hingga homogen dan ditambahkan dengan aquadest

15,17 gram, lalu diaduk kembali hingga homogen. Gel disimpan dalam wadah tertutup rapat. Diulangi perlakuan yang sama sesuai dengan konsentrasi ekstrak etanol daun pegagan 8 % dan 10 %.

7. Uji fisik Sediaan Gel Anti Jerawat Ekstrak Etanol Daun Pegagan

a. Uji Organoleptis

Pemeriksaan organoleptis meliputi bentuk, warna, dan bau yang diamati secara visual (Dirjen POM, 1995).

b. Pemeriksaan Homogenitas

Dengan cara yaitu diambil sedikit sampel sediaan formula gel ekstrak etanol daun pegagan dan diletakkan sedikit gel pada kaca objek. Kemudian diamati susunan partikel kasar atau ketidakhomogenan, lalu dicatat. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar.

c. Uji pH

Pemeriksaan pH menggunakan pH meter dengan mencelupkan pH meter kedalam sediaan gel anti jerawat ekstrak daun pegagan. pH kulit (4,5-6,5) (Naibaho et al; 2013).



d. Uji Daya Menyebar

Dengan cara yaitu sebanyak 1 gram gel diletakkan diatas kertas grafik yang telah dilapisi plastiktransparan dan ditutupi dengan plastik transparan lainnya kemudian diukur diameternya dari 5 titik sudut. Setelah itu beban 19 gram diletakkan diatas lapisan gel dan didiamkan selama 1 menit dan dilihat diameter gel yang menyebar. Kemudian ditambahkan lagi beban 20 gram diatasnya, didiamkan selama 1 menit dan dilihat diameter menyebarnya. Begitupun selanjutnya hingga beban diatasnya berjumlah 99 gram. Dan setiap penambahan didiamkan 1 menit dan dicatat diameter menyebarnya lalu dibuat grafik hubungan antara beban dan luas gel yang menyebar. Daya sebar gel yang baik yaitu antara 5 – 7 cm (Naibaho et al; 2013)

e. Waktu Kecepatan Meringing

Dengan cara yaitu diambil 1 gram gel, dioleskan pada kulit lengan, lalu dihitung kecepatan mengering gel dengan menggunakan stopwatch. Waktu kering gel yang baik yaitu antara 15– 30 menit.

f. Uji Iritasi

Dengan cara yaitu diambil sedikit sampel sediaan formula gel ekstrak

daun pegagan, lalu dioleskan pada kulit dengan diameter 2 cm selama 30 menit. Kemudian diamati adanya reaksi iritasi berupa panas, gatal, ataupun perih, lalu dicatat. Reaksi iritasi positif ditandai oleh adanya kemerahan, gatal-gatal, atau bengkak pada kulit yang diberikan perlakuan. Untuk setiap keadaan kulit diberi nilai sebagai berikut (Draize, 1959) :

1. Eritema

- a. Tidak ada eritema = 0
- b. Eritema sangat ringan = 1
- c. Eritema ringan = 2
- d. Eritema sedang = 3
- e. Eritema berat = 4

2. Edema

- a. Tidak ada edema = 0
- b. Edema sangat ringan = 1
- c. Edema ringan = 2
- d. Edema sedang = 3
- e. Edema berat = 4

Pemberian sampel iritan kemudian dibagi menjadi 4 penilaian iritasinya yaitu sebagai berikut :

- 0,00 = Tidak iritasi
- 0,04 – 0,99 = Sedikit iritasi
- 1,00 – 2,99 = Iritasi ringan
- 3,00 – 5,99 = Iritasi sedang
- 6,00 – 1,00 = iritasi berat



## 8. Penyiapan Bakteri Uji

### a. Peremajaan Bakteri Uji

Bakteri uji yang digunakan adalah bakteri jenis *Propionibacterium Acne*. Dari stok murni diambil 1 ose dan diinokulasi dengan cara digoreskan secara zig zag dan aseptik/steril ke dalam medium NA miring, kemudian diinkubasi dalam inkubator pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam.

### b. Pembuatan suspensi bakteri

Bakteri uji hasil peremajaan yang telah diinkubasi dibuat suspensi bakteri dengan larutan NaCl 0,9%.

### c. Pengujian Gel

Disiapkan medium *Muller Hilton Agar* dan dituang secara aseptik ke dalam cawan petri steril sebanyak 15 ml kemudian ditambahkan suspensi bakteri, kemudian dicampur dengan baik supaya bakteri terdistribusi secara merata. Kemudian Paperdiscs dicelupkan ke dalam masing-masing sampel uji sediaan gel dengan konsentrasi 6%, 8%, dan 10%, dan kontrol negatif dan positif (veril). Paperdiscs yang telah dicelupkan ke dalam masing-masing sampel uji

diletakkan pada permukaan media yang telah memadat secara aseptis dengan menggunakan pinset steril, dengan jarak 2-3 cm dari pinggir cawan petri, diinkubasi pada suhu 37°C selama 2 x 24 jam. Daerah hambatan yang terbentuk diukur dengan mistar sorong. Perlakuan ini dilakukan sebanyak 3 kali dan diambil rata-ratanya.

## Pengamatan Dan Pengukuran Zona Hambatan

Pengamatan dan pengukuran diameter hambatan dilakukan setelah masa inkubasi 2 x 24 jam. Zona hambatan yang terbentuk diukur dengan menggunakan jangka sorong.

## Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari pengukuran diameter hambatan ditabulasi kemudian dirata-ratakan lalu di analisis menggunakan metode analisis varian (ANAVA).

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:



**Tabel 2. Hasil Uji Organoleptis dan Homogenitas serta uji pH dan Kecepatan Mengering**

Formula	Organoleptis			Homogenitas	pH	Kecepatan Mengering (Menit)
	warna	Aroma	Bentuk			
1	Putih	Khas mawar	Gel	Homogen	6,3	17,28
2	Hijau pekat	Khas mawar	Gel	Homogen	5,7	19,43
3	Hiju pekat	Khas mawar	Gel	Homogen	5,7	19,57
4	Hijau pekat	Khas mawar	Gel	Homogen	5,5	20,38

**Tabel 3. Hasil uji Daya Menyebar**

Daya sebar (cm)	Beban (g)				Rata-rata
	10	30	50	100	
1	3,5 cm	4,7 cm	6,5 cm	7,0 cm	5,425
2	4 cm	5 cm	6,2 cm	6,5 cm	5,425
3	4,5 Cm	5 Cm	5,8 Cm	6,6 Cm	5,475
4	3,5 cm	4,5 Cm	6,3 Cm	6,5 Cm	5,2

**Tabel 4. Hasil Uji Iritasi**

Formula	HASIL									
	Edema (Kategori)					Eritema (Kategori)				
	TA	SR	R	S	B	TA	SR	R	S	B
1	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-
2	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-
3	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-
4	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-

Keterangan :

TA (Tidak ada) = 0,00

SR (Sangat ringan) = 0,04-0,99

B (Berat) = 6,00-1,00

R (Ringan) = 1,00-2,99

S (Sedang) = 3,00-5,99

**Tabel 5. Hasil Pengukuran Diameter Zona Hambatan (mm) formulasi sediaan Gel ekstrak daun pegagan terhadap bakteri *Propionibacterium acne***

Replikasi	Diameter Zona Hambatan (mm)					Total
	Kelompok					
	(-)	6%	8%	10%	(+)	
1	6,28	20,10	20,99	22,5	18,82	88,24
2	8,56	20,57	21,80	22,86	19,07	92,86
3	8,81	20,84	21,93	23,02	20,08	94,68
<b>Jumlah (Σ)</b>	<b>23,65</b>	<b>61,51</b>	<b>64,72</b>	<b>67,93</b>	<b>57,97</b>	<b>275,78</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>7,88</b>	<b>20,50</b>	<b>21,57</b>	<b>22,64</b>	<b>19,32</b>	<b>-</b>

Sumber Data: Laboratorium Mikrobiologi Farmasi UIT Makassar

**PEMBAHASAN**

Sediaan gel yang dibuat dari ekstrak daun pegagan menggunakan jernih dan kompatibel dengan bahan basis gel HPMC, pemilihan basis ini dikarenakan penampakan gel



bahan lain serta dapat mengembang terbatas dalam air sehingga merupakan bahan pembentuk hidrogel yang baik. Formula dibuat dengan konsentrasi ekstrak yang berbeda yaitu 0%, 6%, 8%, dan 10%. Dimana 0% atau sediaan tanpa ekstrak sebagai kontrol negatifnya dan veril acne sebagai produk jadi sebagai kontrol positifnya. Parameter yang digunakan berupa uji evaluasi fisik sediaan dan luas zona hambat terhadap bakteri *Propionibakterium acne*.

Hasil uji organoleptik meliputi bentuk, warna dan aroma serta uji homogenitas sediaan. Hasil yang diperoleh bahwa formula 1 memiliki warna putih, aroma khas mawar serta bersifat homogen sedangkan formula ke 2, 3, dan 4 memiliki warna hijau pekat, aroma khas mawar serta menunjukkan susunan yang homogen, karena pada bagian atas, tengah dan bawah sediaan terdapat penyebaran partikel secara merata. Adapun syarat sediaan yang baik adalah homogen (SNI, 1996). Sediaan homogen akan memberikan hasil yang baik karena bahan obat terdispersi dalam bahan dasarnya secara merata sehingga dalam setiap bagian sediaan mengandung bahan obat yang jumlahnya sama. Jika

bahan obat tidak terdispersi merata dalam bahan dasarnya maka obat tersebut tidak akan mencapai efek terapi yang diinginkan.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan tabel hasil pengukuran pH dan kecepatan mengering yang didapatkan yaitu formula 1,2,3, dan 4 telah memenuhi persyaratan pH sediaan topikal yang baik yaitu antara 4,5 - 6,5, menunjukkan bahwa masih dalam range pH normal kulit, ini dikarenakan sifat dari HPMC yang netral, tahan terhadap pengaruh asam dan basa sehingga dapat menjaga kestabilan pH gel. Untuk kecepatan mengering semua sediaan memenuhi syarat sebagai sediaan topikal yang baik dengan melihat waktu mengering sediaan gel yang baik yaitu antara 15-30 menit.

Hasil uji daya menyebar sediaan gel dengan variasi beban yang diletakkan diatas sediaan pada permukaan kertas grafik dengan variasi beban yaitu 10 gram, 30 gram, 50 gram dan 100 gram untuk masing-masing formula menunjukkan daya sebar yang baik sebagai sediaan topikal dengan nilai daya sebar 6,5 - 7,0. Persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5 - 7 cm, ini dikarenakan



HPMC memiliki konsentrasi yang sama untuk semua formula, jika konsentrasi HPMC semakin tinggi maka luas penyebarannya semakin menurun. Hal ini disebabkan seiring dengan peningkatan basis, kadar air yang terkandung dalam formula menjadi sedikit, yang menyebabkan daya menyebar menjadi turun. Daya sebar yang baik menyebabkan kontak antara obat dengan kulit menjadi luas, sehingga absorpsi obat ke kulit berlangsung cepat.

Hasil uji iritasi untuk semua formula dengan melihat kategori penilaian adanya edema dan eritema, tidak menunjukkan adanya iritasi. Untuk itu, maka semua sediaan topikal memenuhi syarat standar penilaian sebagai sediaan topikal yang baik. Sediaan topikal yang ideal adalah tidak mengiritasi kulit. Kemungkinan iritasi kulit akan sangat besar apabila sediaan terlalu asam atau terlalu basa.

Pengujian aktivitas terhadap pertumbuhan bakteri dilakukan dengan metode difusi agar sebelum dilakukan pengujian terlebih dahulu bakteri diinokulasi pada medium Nutrien, Agar (NA) miring dalam tabung reaksi untuk meremajakan kultur bakteri murni agar pertumbuhan dalam media uji optimal.

Bakteri yang diremajakan disuspensikan kedalam NaCl 0,9% b/v steril. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi fisiologis bakteri uji.

Hasil penelitian yang diperoleh dari pengujian, bahwa sediaan gel Ekstrak Daun pegagan menghasilkan rata - rata diameter zona hambatan terhadap *Propionibacterium acne*. Penghambatan yang paling besar terdapat pada konsentrasi 10% jika dibandingkan dengan konsentrasi 6% dan 8%. Sedangkan untuk kontrol positifnya justru memiliki zona hambat dibawah dari ke tiga konsentrasi tersebut.

Pada sediaan gel dengan konsentrasi ekstrak 0% sebagai kontrol negatifnya juga memiliki penghambatan terhadap bakteri uji, dikarenakan komposisi sediaan mengandung pengawet metil paraben dengan konsentrasi 0,03% namun terbilang kecil, jika dibandingkan dengan sediaan gel dengan konsentrasi ekstrak 6%, 8% dan 10%.

Dari hasil penelitian dengan pengolahan data secara statistik menunjukkan bahwa pada sediaan gel ekstrak daun pegagan dengan konsentrasi ekstrak 6%, 8% dan 10% di dapatkan hasil yang signifikan.



Untuk mengetahui ada/tidaknya perbedaan yang signifikan antar kelompok (perlakuan), maka dilakukan analisis statistik dengan menggunakan Analisis Varians (ANOVA). Berdasarkan Analisis Varians diperoleh nilai Fhitung sebesar 15422,85 lebih besar daripada Ftabel itu menandakan adanya perbedaan efek (signifikan) dalam menghambat pertumbuhan *Propionibacterium acne* pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.

Hasil dengan menggunakan Analisis Varians menunjukkan adanya perbedaan diameter zona hambat yang signifikan antara semua kelompok, maka dilakukan analisis lebih lanjut dengan uji newman-keuls untuk mengetahui adanya perbedaan bermakna diantara setiap kelompok perlakuan. Hasil uji statistik lanjutan menggunakan Newman-keuls menunjukkan bahwa masing - masing konsentrasi Formula Gel ekstrak etanol daun pegagan memiliki efek yang tidak berbeda nyata (non signifikan) dengan kontrol (+) veril acne.

## KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak etanol daun pegagan dapat dibuat menjadi formulasi sediaan gel dengan melihat beberapa hasil pengujian kelayakan sediaan yaitu uji organoleptis, uji homogenitas, pH, uji daya menyebar dan uji iritasi.
2. Sediaan gel ekstrak etanol daun pegagan memiliki aktivitas penghambatan terhadap *Propionibacterium acne* pada konsentrasi 6% b/b, 8% b/b dan 10% b/b.

## Saran

Kami mengharapkan untuk penelitian selanjutnya, dapat membuat sediaan yang berbeda pada tanaman pegagan dan melakukan pengujian tidak hanya pada bakteri, melainkan untuk stimulant atau peningkatan kecerdasan dengan menggunakan konsentrasi yang sama pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, G.S., (2011). Formulasi sediaan gel anti oksidan ekstrak etanol bawang sabrang (*Eleutherine palmifolia* (L) Merr.) berbasis HPMC. Skripsi Farmasi USU. Medan



- Ansel H.C, (2011). Pengantar bentuk sediaan farmasi, edisi IV. Penerbit Universitas Indonesia. Hal 390-393
- Arumugam, T., Ayyanar, M., Pillai, Y., & Sekar, T., (2011). Phytochemical Screening and Antibacterial Activity of leaf and Callus Extracts of *Centella asiatica*, Bangladesh J. Pharmacol, 58-59.
- Biologi Media, (2010). Bakteri Penyebab Jerawat (online), (<http://Biologimediacentre/bakteri-penyebab-jerawat>), diakses 3 april 2016
- Bayyinatul, Muchtaromah (2011). Pengaruh Pemberiaan ekstrak Daun Pegagan (*Centella asiatica* (L) Urban) Terhadap Jumlah Korpus Luteum Dan Kebuntingan Mencit Betina
- Ditjen POM RI, (1986). Sediaan Galenika, Departemen Kesehatan RI. Jakarta
- Ditjen POM RI, (1986). Materi Medika Edisi V, Departemen Kesehatan RI. Jakarta
- Ditjen. POM. R.I, (2000), Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta
- Ditjen. POM. R.I., (2003), Farmakope Indonesia Edisi V, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Djuanda, A, (2007), Ilmu penyakit kulit dan kelamin. Fakultas kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta
- Draize, J.H. (1959). Dermaltoxicity. The asosiation of Food and Drug Officials of the united STATES, Bureau of Food and Drugs, Austin, TX. Pp. 46-49. Available as PDF file
- Greenwood D, Slack R, Peuttherer J, Barer M, (2012). Medical Microbiology, 18th Edition, Churchill Livingstone.
- Harper, J.C. (2007). *Cne Vulgari*. Birmington: Departement of dermatology, University of Albama
- Jagtap, N., Khadabadi, S., & Banarase, N., (2009), Antimicrobial and Antifungal Activity of *Centella asiatica* (L.) Urban, Umbeliferae, Research J. Pharm and Tech, 2(2), 329.
- Januwati Mariam dan M.Yusron, (2005). Budidaya Tanaman Pegagan. (sirkular no 11) Badan Pemeliharaan dan Pengembangan Pertanian. Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatika
- Lachman, L., (2012). Teori dan Praktek Farmasi Industri Edisi III. UI Perss. Jakarta.
- Lachman, L., (1994). Teori dan Praktek Farmasi Industri Edisi II. UI Perss. Jakarta
- Lasmadiwati, E., (2003), Pegagan meningkatkan daya ingat, membuat awet muda, menurunkan gejala stres,



meningkatkan stamina. Penebar swadaya, jakarta

Naibaho, D.H., Yamkan, V.Y., Weni, Wiyono., (2013). Pengaruh Basis salep Terhadap formulasi Sediaan Salep ekstrak Daun Kemangi (*Ocimum sanctum* L.) Pada kulit punggung kelinci yang dibuat infeksi *Staphylococcus aureus*, Jurnal ilmiah farmasi - UNSRAT, Vol.2 NO.02

Pearce Evelyn C, (2011). "Anatomi Dan Fisiologi Untuk Paramedis". PT. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta .

Rowe, R.C., dkk., (2009). Handbook of Pharmaceutical Excipients Sixth Edition. Lexi-Comp. American Pharmaceutical Association, Inc. Hal 110, 213, 442, 754

Rowe, R.C., dkk., (2006). Handbook of Pharmaceutical Excipients Sixth Edition. Lexi-Comp. American Pharmaceutical Association, Inc. Hal 466, 794

Tjitrosoepomo, G. (2013). Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta). UGM Press: Yogyakarta.

Utami P dan Puspaningtyas DE. (2013). *The Miracle of Herbs*. Agromedia Pustaka: Jakarta

Waluyo, Lud, (2007). Mikrobiologi Umum. UMM : Malang



## UJI ANGKA KAPANG DAN KHAMIR PADA SEDIAAN KOSMETIK LULUR MANDI SELAMA SATU BULAN PEMAKAIAN

Firni<sup>1</sup>, Erin Masrika<sup>2</sup>, Putri Dewi Sartika<sup>3</sup>

1. Dosen Akademi Farmasi Yayasan Al-Fatah Bengkulu

2. Mahasiswa Akademi Farmasi Yayasan Al-Fatah Bengkulu

3. Dosen Akademi Farmasi Yayasan Al-Fatah Bengkulu

Jl. Indragiri Gg. 3 Serangkai Padang Harapan Kota Bengkulu

Email: erinmasrika15@gmail.com

### ABSTRAK

Pentingnya menjaga kulit tetap halus dan lembab, berbagai cara bisa ditempuh mulai dari perawatan di salon kecantikan bahkan perawatan sendiri di rumah seperti menggunakan kosmetik lulur mandi. Perlu untuk memastikan bahwa produk terbebas dari cemaran mikroba setelah terbuka dan tertutupnya kemasan produk karena penggunaan. Cemaran mikroba dapat terjadi karena adanya kontaminasi udara ataupun pengguna yang mengakibatkan kerusakan pada produk. Pencemaran mikroba yang mungkin terjadi yakni pertumbuhan jamur seperti Kapang dan Khamir. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel sediaan kosmetik lulur mandi sebanyak tiga sampel yang teregistrasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sampel diuji untuk mengetahui jumlah Angka Kapang dan Khamir hari ke 0,15 dan 30 pemakaian dan batas aman cemaran mikroba dengan metode cawan sebar.

Hasil pengujian sediaan kosmetik lulur mandi merek A dan B pada hari ke 0,15 dan 30 pemakaian tidak terdapat pertumbuhan Kapang dan Khamir. Sedangkan hasil pengujian sampel merek C pada hari ke 30 pemakaian terdapat pertumbuhan Kapang  $5,0 \times 10^{-1}$  kol/gr pada pengenceran  $10^{-1}$  dan  $2,0 \times 10^{-1}$  pada pengenceran  $10^{-2}$  yang masih dalam batas aman ( $<10^3$  koloni/gr). Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat.

**Kata kunci** : Lulur mandi, Angka Kapang dan Khamir

### ABSTRACT

*To maintain the human skin be smooth and moist is important. From regular care in beauty salon until home treatment using bath scrubs, there are various ways to achieve it. Due to intermittent exposure to free air of bath scrubs packages, it is necessary to ensure that the product is free from microbial contamination. Microbial contamination can occur due to air or damage per human use and one of possible indication is growth of fungi such as Fungus and Yeast. Experiment has been conducted using three samples of bath scrubs cosmetics. All products have been legally certified by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). Using Spread Plate Method, the samples were tested within 0, 15 and 30 day(s) of utilization and data collected regarding growth of microbes is analyzed to determine safe limit for the bath scrubs usage.*



Results show both in bath scrubs brand A and B there is no significant growth of either Fungus or Yeast within 0, 15 and 30 day(s) of use. Meanwhile, there is growth of Fungus in brand C on day-30 stated at rate of  $5.0 \times 10^{-1}$  colony per gram at dilution of  $10^{-1}$  and  $2.0 \times 10^{-1}$  colony per gram at  $10^{-2}$  dilution. Both of the rates are still within safe limits ( $<10^3$  koloni / g). The results of this study are expected to be useful for researchers and the public.

Keywords : Scrub shower , Figures Fungus and yeast

## PENDAHULUAN

Kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati dan menyembuhkan suatu penyakit ( Permenkes RI no 445/MenKes/Per/V/1998). Salah satu sediaan kosmetik yang digunakan untuk perawatan badan , khususnya kulit adalah sediaan Lulur.

Lulur merupakan sediaan kosmetik tradisional yang dibuat dari bunga-bunga dan bahan lain yang sangat bermanfaat untuk menjaga kecantikan dan kehalusan kulit. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa lulur adalah tradisi para putri karaton sejak abad 17, untuk mengelupas kulit mati ditubuh mereka sehingga kulit menjadi halus dan berkilau (Kasmita, 2014).

Menggunakan lulur bagi wanita sesuai tujuannya adalah untuk menjaga agar kulit tetap halus dan lembut serta bercahaya. Pemilihan lulur dalam kegiatan luluran selain dimaksudkan untuk memanjakan diri, penggunaannya yang mudah karena dapat dilakukan sendiri di rumah, juga menjadi pertimbangan. Menjaga produk setelah penggunaan agar tidak rusak adalah hal penting, namun tidak menjadi perhatian bagi para pengguna. Lulai setelah digunakan seperti lupa dalam menutupnya dan meletakkannya ditempat yang mudah tercemar. Kondisi lingkungan yang tidak bersih dan tidak higienis adalah sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba sehingga mikroba dapat tumbuh dan berkembang (Hajoeningtjas, 2012). Adanya pencemaran mikroba (jamur) menjadi indikasi yang penting karena kosmetik digunakan terus menerus dan dalam jangka waktu yang relatif lama (Raini dkk, 2004).

Salah satu penyebab kerusakan kosmetik adalah pencemaran



mikroba. Pencemaran ini dapat berasal dari air, bahan baku yang digunakan, ruangan tempat pembuatan, tempat penyimpanan, dan kemasan yang tidak memadai dari kosmetik itu sendiri. Pencemaran mikroba yang sering terjadi adalah pencemaran jamur. Pencemaran jamur bisa terjadi karena mengingot kosmetik digunakan terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu Indonesia memiliki iklim tropis dengan kelembaban tinggi sehingga memungkinkan jamur untuk tumbuh dan berkembang biak (Mariana dkk, 2004).

Pertumbuhan mikroba dalam sediaan kosmetik membahayakan pengguna kosmetik. Hal ini disebabkan karena, pada umumnya semua sediaan kosmetik langsung kontak dengan kulit. Untuk produk kosmetik dan perawatan pribadi, penting untuk memastikan bahwa produk terbebas dari cemaran mikroba dan aman untuk digunakan konsumen, karena kosmetik digunakan terus menerus dan dalam waktu yang lama.

Penelitian yang hampir serupa telah dilakukan oleh Juningsi Sri Wulandari tentang pengaruh lama

pemakaian sediaan kosmetik eye liner terhadap cemara mikroba (*Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*, dan *taphylococcus aureus*) dan hasil yang didapat negatif.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mencoba melakukan uji Angka Kapang dan Khamir (AKK) dalam sediaan kosmetik lulur pada hari ke 0, 15 dan 30 pemakaian

## METODOLOGI PENELITIAN

### Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dilakukan penelitian di Laboratorium Mikrobiologi BPOM di Bengkulu pada bulan Maret - Mei 2016.

### Prosedur Kerja Penelitian

#### Alat

Alat yang digunakan pada penilitian ini yaitu: erlenmeyer (*pyrex*), pipet volume (*pyrex*), vortex mixer, waterbath, *Laminar Air Flow* (LAF), electrical pipeter, inkubator, timbangan analitik, stomacker ,stomacker mixer, tabung reaksi (*pyrex*), cawan petri (*pyrex*), autoklaf dan lampu spritus.

#### Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu: kloramfenikol, *Modified Letheen Broth* (MLB), *Potato Dextrose Agar* (PDA), alkohol 70%



dan sampel *shampoo* merek A, B, dan C.

Media pertumbuhan, *Potato Dextrose Agar* (PDA) Komposisi: *Potato infusion* 4.0 gram, glukosa 20 gram, agar 15 gram. *Modified Letheen Broth* (MLB) Komposisi: *peptone, extrac deviande, ekstrak delevure, chlorure dosodium, lerithine de soja, hidrogen de sulfite de sodium.*

### Prosedur Penelitian

Pengambilan sampel berdasarkan teknik *purpose* sampling. Sampel Lulur dibeli di minimarket kota Bengkulu dengan merek A, B dan C. Variabel yang digunakan adalah waktu 0, 15 dan 30 hari pemakaian. Parameter uji penelitian ini adalah Nilai Angka Kapang dan Khamir (AKK) dengan metoda analisa BPOM. di lakukan pengujian AKK pada sediaan kosmetik lulur mandi merk A, B dan C. Kemudian sampel di berikan kepada 3 orang berbeda untuk digunakan. Pada hari ke 15 dan 30 pemakaian sampel di uji kembali.

### Pengujian AKK

Sampel ditimbang 10 gr + 90 ml MLB kemudian homogenkan (pengenceran ke  $10^{-1}$ ). Dipipet 1 ml dimasukkan dalam cawan petri yang berisi media PDA yang telah dibuat

duplo kemudian di sebar merata pada permukaan media PDA. Dari pengenceran  $10^{-1}$  dipipet 1 ml kedalam tabung reaksi yang berisi MLB 9 ml (pengenceran  $10^{-2}$ ) homogenkan. Dari pengenceran  $10^{-2}$  dipiter 1ml dimasukkan dalam cawan petri yang berisi media PDA yang telah dibuat duplo. Dan dipipet 1 ml kedalam tabung reaksi yang berisi MLB 9 ml (pengenceran  $10^{-3}$ ). Dari pengenceran  $10^{-3}$  dipipet 1 ml kedalam cawan petri yang berisi media PDA yang telah dibuat duplo kemudian diinkubasi selama 7 hari. Pada hari ke 3, 5 dan 7 dilakukan pengamatan pertumbuhan Kapang dan Khamir.

### Perhitungan

1. Jika tidak satupun koloni dalam cawan maka AKK dinyatakan sebagai  $\leq 10$  kol/g
2. Jika dari satu pengenceran yang menunjukkan jumlah koloni antara 15-150 koloni, perhitungan menggunakan rumus:

$$N = m / (V \times d)$$

- N : perkiraan jumlah kapang dan khamir dalam sampel
- m : rata-rata hitungan yang diperoleh dari duplo



- V : faktor pengenceran dari suspensi awal
  - D : volume cuplikan
3. Bila hanya satu diantara kedua cawan petri atau keduanya menunjukkan jumlah kurang dari 15 koloni, maka perhitungannya mengikuti cara pertama
  4. Bila terdapat cawan-cawan dari dua tingkat pengenceran yang berurutan menunjukkan jumlah koloni antara 15- 150 koloni, maka me  $N = x / (V \times d)$ 
    - N : perkiraan jumlah kapang dan khamir dalam sampel
    - x : adalah rata-rata dari koloni yang dihitung dari dua pengenceran yang berturut-turut
    - V : faktor pengenceran dari suspensi awal
    - D : volume cuplikan
    - $\sum c$  : jumlah koloni terhitung pada semua cawan yang

diperoleh dari dua pengenceran berturut-turut.

- n1: jumlah cawan untuk suspensi pengenceran yang lebih rendah.
- n2: jumlah cawan untuk suspensi pengenceran yang lebih tinggi

Cara mencari x adalah

$$x = \frac{\sum c}{n1 + 0.1 n2}$$

**Analisa Data**

Analisa data dibuat dalam bentuk tabel dan deskriptif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Bengkulu pada taggal 26 Maret 2016 sampai 10 mei 2016, dapat dilihat berdasarkan table berikut:

**Tabel I. Hasil Uji Angka Kapang dan Khamir Sampel A**

Hari Pengu jian	Pengen ceran	AKK	Rerata AKK	Ket
Hari 0	Kontrol	0	0	-
	A <sup>-1</sup>	0	0	MS
	A <sup>-1</sup>	0		
	A <sup>-2</sup>	0	0	MS
	A <sup>-2</sup>	0		
	A <sup>-3</sup>	0	0	MS



Hari 15	A <sup>-3</sup>	0	0	MS
	kontrol	0		
	A <sup>-1</sup>	0		
	A <sup>-1</sup>	0		
	A <sup>-2</sup>	0		
	A <sup>-2</sup>	0		
Hari 30	A <sup>-3</sup>	0	0	MS
	kontrol	0		
	A <sup>-1</sup>	0		
	A <sup>-1</sup>	0		
	A <sup>-2</sup>	2		
	A <sup>-2</sup>	0		
Hari 30	A <sup>-3</sup>	0	0	MS
	A <sup>-3</sup>	0		
	A <sup>-3</sup>	0		
	A <sup>-3</sup>	0		

Tabel II. Hasil Uji Angka Kapang dan Khamir Sampel B

Hari Pengujian	Pengenceran	AKK	Rerata AKK	Ket
Hari 0	Kontrol	0	-	-
	B <sup>-1</sup>	0	0	MS
	B <sup>-1</sup>	0		
	B <sup>-2</sup>	0	0	MS
	B <sup>-2</sup>	0		
	B <sup>-3</sup>	0	0	MS
B <sup>-3</sup>	0			
Hari 15	kontrol	0	-	MS
	B <sup>-1</sup>	0	0	MS
	B <sup>-1</sup>	0		
	B <sup>-2</sup>	0	0	MS
	B <sup>-2</sup>	0		
	B <sup>-3</sup>	0	0	MS
B <sup>-3</sup>	0			
Hari 30	Kontrol	0	-	MS
	B <sup>-1</sup>	0	0	MS
	B <sup>-1</sup>	0		
	B <sup>-2</sup>	0	0	MS
	B <sup>-2</sup>	0		
	B <sup>-3</sup>	0	0	MS
B <sup>-3</sup>	0			

Tabel III. Hasil uji Angka Kapang dan Khamir Sampel C

Hari Pengujian	Pengenceran	AKK	Rerata AKK	Ket
Hari 0	Kontrol	0	-	-
	C <sup>-1</sup>	0	0	MS
	C <sup>-1</sup>	0		



	C <sup>-2</sup>	0	0	MS
	C <sup>-2</sup>	0		
	C <sup>-3</sup>	0	0	MS
	C <sup>-3</sup>	0		
Hari 15	Kontrol	0	-	MS
	C <sup>-1</sup>	0	0	MS
	C <sup>-1</sup>	0		
	C <sup>-2</sup>	0	0	MS
	C <sup>-2</sup>	0		
	C <sup>-3</sup>	0	0	MS
C <sup>-3</sup>	0			
Hari 30	Kontrol	0	-	MS
	C <sup>-1</sup>	5	5,0x 10 <sup>1</sup> kol/g	MS
	C <sup>-1</sup>	0		
	C <sup>-2</sup>	2	2,0 x 10 <sup>1</sup> kol/g	MS
	C <sup>-2</sup>	0		
	C <sup>-3</sup>	0	0	MS
C <sup>-3</sup>	0			

**Keterangan:**

**Ket** =Keterangan

**AKK**= Angka Kapang dan Khamir

**MS** = Memenuhi Standar

**Pembahasan**

Lulur adalah kosmetik tradisional yang dibuat dari bunga-bunga dan bahan lain yang sangat bermanfaat untuk menjaga kecantikan dan kehalusan kulit. .

Adanya mikroba dalam sediaan kosmetik dapat membahayakan pengguna kosmetik. Kontaminasi mikroorganisme juga dapat menurunkan kualitas sediaan kosmetik seperti perubahan rasa, warna, bau spesifik, kekeruhan warna, pH dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pengujian sediaan kosmetik lulur mandi merek

A dan B pada hari ke 0,15 dan 30 pemakaian tidak terdapat pertumbuhan kapang dan khamir. Sedangkan hasil pengujian sediaan kosmetik lulur mandi merek C pada hari ke 30 pemakaian terdapat pertumbuhan kapang yang berbentuk bulat berwarna abu-abu dengan permukaan kasar seperti kapas.

Pada sediaan kosmetik A dan B tidak ada pertumbuhan kapang dan khamir setelah 30 hari pemakaian Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pengguna kosmetik termasuk orang yang rapi



dan bisa menyimpan sediaan kosmetik yang digunakan dengan baik. Berbeda dengan sampel kosmetik B yang tidak mengandung bahan pengawet, pada sediaan kosmetik A mengandung bahan pengawet yang dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti Kapang dan Khamir. Pengawet diperlukan untuk melindungi produk-produk kosmetik yang sudah diformulasikan dan tuntutan dari pemerintah seperti CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik).

Sediaan Kosmetik C, mengandung bahan pengawet, namun masih ditemukan pertumbuhan Kapang dan Khamir pada sampel C setelah 30 hari pemakaian. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena si pengguna kurang cermat dalam pemeliharaan dan penyimpanan sediaan kosmetik yang digunakan dan faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, ketersediaan oksigen, pH yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme pada kosmetik yang digunakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama satu bulan pemakaian 3 Lulur mandi dapat disimpulkan bahwa Pengujian hari ke 0,15 dan 30 pemakaian sampel merk A dan B tidak ada pertumbuhan kapang dan khamir, sedangkan sampel merk C ada pertumbuhan Kapang kapang  $5,0 \times 10^{-1}$  kol/gr pada pengenceran  $10^{-1}$  dan  $2,0 \times 10^{-1}$  dipengenceran  $10^{-2}$  pada hari ke 30 tetapi masih dalam batas aman (memenuhi standar). Sampel merk A,B dan C aman digunakan selama satu bulan pemakaian

### Saran

Diharapkan kepada peneliti lanjutan untuk melakukan penelitian uji Angka Kapang dan Khamir pada sediaan kosmetik lulur mandi dengan lama pemakaian lebih dari satu bulan dan dapat melakukan uji cemaran mikroba seperti *Candida albicans* dan *Staphylococcus aureus* pada sampel dan lama waktu pemakaian yang sama.

Bagi masyarakat agar lebih cermat dalam menjaga sediaan kosmetik agar terhindar dari cemaran mikroba.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010 . *Tentang Persyaratan Cemaran Mikroba Dan Logam Berat Dalam Kosmetik*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Anonim. 1998 . *Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya Pada Kosmetik, Meteri Kesehatan Republik Indonesia*
- Kasmita, Y. 2014. *Formulasi Sediaan Lulur Sari Buah Jambu Biji Merah*, Yayasan Al-FATAH Bengkulu. Bengkulu
- Angraini, L. 2015. *Pengaruh Pemanfaatan Lulur Papaya (Carica Papaya L) Terhadap Pencerahan Kulit Badan*. Program Studi Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan Jurusan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Padang
- Irianto, K. 2013 . *Parasitologi Medis*. Alfabeta. Bandung
- Harti, A, S, 2015. *Mikrobiologi Kesehatan; Peran Mikrobiologi Dalam Bidang Kesehatan*, CV.Andi Offset, Yogyakarta.
- Marliati, N. 2013. *Pengaruh Sumber AHA Berbahan Dasar Alami Dan Persentase Terhadap Hasil Kosmetik Lulur*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta
- Wasitaatmadja, S.M. 1997. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. UI-pres. Jakarta
- Wulandari, J. S. 2011. *Pengaruh Lama Pemakaian Sediaan Kosmetik Eye Liner Terhadap Cemaran Mikroba*. Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Kebangsaan. Makasar.



## FORMULASI DAN UJI EFEKTIVITAS SEDIAAN GEL ANTISEPTIK HAND SANITIZER EKSTRAK DAUN BOTTO-BOTTO (*Chromolaena odorata* L.)

Isriany Ismail, Munifah Wahyuddin, Ade Irmadwiarti Firmansyah

Program Studi Farmasi, FKIK, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
E-mail : khansa\_fah@yahoo.com

### ABSTRAK

Tanaman Botto-botto (*Chromolaenaodorata* .L) merupakan tanaman yang memiliki manfaat sebagai antioksidan, anti-inflamasi, analgesik, anti-mikroba. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasi dan menguji efek gel ekstrak daun botto-botto-botto sebagai antiseptic tangan. Formulasi sediaan gel ekstrak daun botto-botto (*Chromolaenaodorata* .L) dibuat dengan konsentrasi ekstrak 5% yang dapat menghambat beberapa bakteri patogen ditangan dan Karbopol 940 sebagai basisnya. Untuk control negative digunakan Karbopol 940 dan control positif digunakan Hand Sanitizer Dettol<sup>®</sup>. Pengujian fisik meliputi: organoleptik, viskositas dan pH. Pengujian antiseptik gel dilakukan dengan menggunakan uji replica dengan hasil yang menunjukkan penurunan mikroorganisme setelah pemakaian gel ekstrak daun botto-botto (*Chromolaenaodorata* .L) sebesar 95.14%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gel ekstrak daun botto-botto memenuhi parameter kualitas gel secara organoleptik, pH dan viskositas.

**Kata kunci:** Ekstrak etanol daun Botto'-Botto (*ChormolaenaOdorata* L.), Gel, Hand Sanitizer, Antiseptik, Metode replica

### PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan. Memelihara kebersihan tangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya kebersihan tangan masih kurang. Masyarakat tidak sadar bahwa dalam beraktivitas tangan

seringkali terkontaminasi dengan mikroba (Radji, 2010).

Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat atau mematikan mikroorganisme pada jaringan hidup, yang mempunyai efek membatasi dan mencegah infeksi agar tidak menjadi parah (Djide, 2008).

Meningkatnya keinginan masyarakat untuk menggunakan bahan



alam atau "back to nature" terbukti dengan banyaknya produk-produk topikal berbahan aktif tanaman untuk perawatan kesehatan, kosmetik dan pencegahan penyakit. Seperti yang telah dilakukan oleh Retno Sari dan Dewi Isadiartuti dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya yang melakukan penelitian tentang sediaan gel Hand sanitizer dari ekstrak daun sirih (*Piper betle* Linn.) dengan efektifitas sama dengan gel Hand sanitizer berbahan aktif etanol dan triklosan (Sari, 2006).

Dalam pengobatan tradisional, botto'-botto' (*Chromolaena odorata* .L) digunakan sebagai bahan alam yang berkhasiat antipasmodik, antiprotozoa, antibakteria, antifungi, antihipertensi, antiinflamasi, astringen, antitripanosoma, diuretic dan bahan hepatotropik (Ngozi,2009). Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat formulasi dan menguji efek sediaan gel ekstrak etanol dari daun botto-botto sebagai antiseptik tangan.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan adalah Alat-alat gelas (Iwaki Pyrex<sup>®</sup>), autoklaf (Hirayama<sup>®</sup>), batang

pengaduk, cawan petri (Iwaki Pyrex<sup>®</sup>), cotton bud, gunting, incubator (Memmert<sup>®</sup>), jangka sorong (ATS<sup>®</sup>), kertas saring, lampu spiritus, Laminar Air Flow (Esco<sup>®</sup>), lumpang dan stamper, magnetik stirrer (Heidolph<sup>®</sup>), oven (Memmert<sup>®</sup>), pinset, pipet tetes, pisau, rotavapor (heidolph<sup>®</sup>), sendok tanduk, sendok besi, spoit, termometer, timbangan analitik (mettler toledo<sup>®</sup>) dan viskometer Brookfield model RVT.

Bahan yang digunakan adalah Air suling, Dettol<sup>®</sup> gel antiseptik, etanol 70%, etil asetat, kapas, karbopol 940, gliserin, kertas pH universal (nesco<sup>®</sup>), medium nutrient agar, metil paraben, sampel daun botto-botto, trietanolamin.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan eksperimen laboratorium.

### Pembuatan Formula Sediaan Gel

Sediaan gel dikerjakan dengan cara basis karbopol ditambahkan dengan air suling suhu 70°C sebanyak 20 ml dalam gelas kimia, didiamkan hingga mengembang selama 1 x 24 jam. Ditambahkan metil paraben yang sebelumnya telah dilarutkan dengan 15 ml air suling panas suhu 90°C



dihomogenkan. Dilarutkan ekstrak etanol daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) ke dalam gliserin, lalu dimasukkan basis ke dalam larutan ekstrak sedikit demi sedikit, dihomogenkan. Kemudian TEA dicampurkan terakhir lalu dihomogenkan. Ditambahkan sisa air lalu dihomogenkan.

Tabel 1. Formula Sediaan Gel

No	Nama bahan	Kegunaan	Formula			
			I	II	IV	Kontrol (-)
1	Ekstrak daun Botto-botto	Zat Aktif	5	5	5	0
2	Karbopol 940 (%)	Basis	0,25	0,5	1	1
3	TEA (%)	Pengalkali	0,5	0,5	0,5	0,5
4	Metil Paraben (%)	Pengawet	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375
5	Gliserin (%)	Pelembab	15	15	15	15
6	Air Suling (ad)	Pelarut	50	50	50	50

### Uji Karakteristik Sediaan Gel

#### 1. Uji organoleptik

Uji dilakukan dengan mengamati perubahan bentuk, warna, dan bau dari sediaan gel ekstrak etanol daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) yang diberi basis karbopol 940.

#### 2. pH

Pengukuran pH dilakukan dengan mencelupkan kertas pH universal ke dalam sediaan gel yang telah dibuat. pH yang diinginkan harus sesuai dengan pH kulit yaitu 5-6,5.

#### 3. Uji viskositas

Pengukuran viskositas dilakukan terhadap sediaan gel dengan menggunakan viskometer *Brookfield*. Hal ini dilakukan

dengan cara mencelupkan spindle ke dalam sediaan gel kemudian dilihat viskositasnya.

### Uji Efektifitas Sediaan Gel

#### 1. Uji daya antiseptik

Setelah diperoleh konsentrasi karbopol 940 yang sesuai karakteristik gel antiseptik pada umumnya, maka dilanjutkan pengujian efektifitas sediaan ekstrak daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) dengan konsentrasi hambat terbaik. Metode yang digunakan adalah metode replika (Lund, 1994:599).

##### a. Kontrol Positif



Telapak tangan di teteskan sediaan *Hand Sanitizer Dettol*<sup>®</sup>, kemudian diratakan dan didiamkan selama satu menit. Selanjutnya sidik ibu jari ditempelkan pada media padat nutrient agar dalam cawan petri. Media ini diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Setelah diinkubasi jumlah koloni dihitung.

b. Kontrol Negatif

Telapak tangan ditetaskan gel yang tidak mengandung zat aktif kemudian diratakan dan didiamkan selama satu menit. Selanjutnya sidik ibu jari ditempelkan pada media padat nutrient agar dalam cawan petri. Media ini diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Setelah diinkubasi jumlah koloni dihitung.

c. Sediaan uji

Telapak tangan ditetaskan gel yang mengandung ekstrak daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) kemudian diratakan dan didiamkan selama 1 menit. Selanjutnya sidik ibu jari ditempelkan pada media padat nutrient agar dalam cawan petri. Media ini diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Setelah diinkubasi jumlah koloni dihitung

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sediaan terdiri dari sepuluh formula gel dengan jenis dan konsentrasi basis yang berbeda namun sama-sama menggunakan jenis ekstrak daun Botto'-Botto' dengan konsentrasi 5 %. Hasil uji karakteristik sediaan gel yang meliputi pengamatan pH, organoleptik, viskositas dan uji daya antiseptic.

**Tabel 2. Hasil pengujian organoleptik Ekstrak daun botto'-botto**

Formula		Pengamatan		
		Bentuk	Warna	Bau
F1 (Karbopol 2%)	A	Setengah padat kental	Coklat Kehitaman	Aroma Khas Ekstrak Daun Botto-Botto
	B	Setengah padat kental	Coklat Kehitaman	Aroma Khas Ekstrak Daun Botto-Botto
	C	Setengah padat kental	Coklat Kehitaman	Aroma Khas Ekstrak Daun Botto-Botto



FII (Karbopol 1 %)	A	Setengah padat kental	Coklat Kehitaman	Aroma Khas Ekstrak Daun Botto-Botto
	B	Setengah padat kental	Coklat Kehitaman	Aroma Khas Ekstrak Daun Botto-Botto
	C	Setengah padat kental	Coklat Kehitaman	Aroma Khas Ekstrak Daun Botto-Botto
FIII (Karbopol 0,5 %)	A	Setengah padat	Coklat Tua	Aroma Khas Ekstrak Daun Botto-Botto
	B	Setengah padat	Coklat Tua	Aroma Khas Ekstrak Daun Botto-Botto
	C	Setengah padat	Coklat Tua	Aroma Khas Ekstrak Daun Botto-Botto
Kontrol (Karbopol 2 %)		Setengah padat kental	Bening	Tidak ada bau khas

Tabel 3. Hasil pengamatan pH

Formula		pH
FI (Karbopol 2 %)	A	6
	B	5
	C	5
FII (Karbopol 1%)	A	5
	B	5
	C	5
FIII (Karbopol 0,5 %)	A	6
	B	5
	C	5
Kontrol (Karbopol 2%)		5

Nilai standar pH kulit 4,5-6,5 (Tranggono, 2007)



**Tabel 4. Hasil pengamatan Viskositas sediaan Gel.**

Formula		Viskositas		
		R1	R2	R3
F I (Karbopol 2%)	A	47600	46850	46660
	B	46900	46760	46240
	C	46800	46570	46340
F II (Karbopol 1%)	A	31040	31050	30900
	B	31520	31490	31490
	C	31520	31370	31395
F III (Karbopol 0,5%)	A	7440	7390	7401
	B	7600	7610	7605
	C	7680	7570	7545
Kontrol (-)Karbopol 2%		59840	59520	58640
Kontrol (+) Dettol <sup>®</sup>		5470	5720	5620

Nilai standar Viskositas antiseptik 4000-8000 cps (Reckitt Benckiser,2008)

**Tabel 5. Hasil uji efektivitas sediaan gel antiseptik ekstrak daun botto-botto**

Formula	Replika			Rata-Rata	Sisa Mikroorganisme	Penurunan Jumlah Mikroorganisme
	I	II	III			
IA	1	1	1	1	4.85%	95.14%
IB	1	1	1	1	4.85%	95.14%
IC	1	1	1	1	4.85%	95.14%
IIA	1	1	1	1	4.85%	95.14%
IIB	1	1	3	1.3	6.3%	93.68%
IIC	1	1	1	1	4.85%	95.14%
IIIA	1	1	1	1	4.85%	95.14%
IIIB	1	2	1	1.3	6.3%	93.68%
IIIC	1	5	2	2.6	12.62%	87.3%
Kontrol (-)	8	4	7	6.3	30.5%	69.4%
Kontrol (+)	0	0	0	0	0	100%
Kontrol Tanpa Sediaan	31	4	27	20.6	100%	0%

Nilai Standar penurunan mikroorganisme sebanyak 99,9% atau lebih (Minister of Public Works and Government Services Canada 2007)



## PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dilakukan formulasi ekstrak daun botto-botto dalam bentuk sediaan gel. Pembuatan ekstrak daun botto-botto dilakukan dengan cara maserasi menggunakan etanol 70%. Daun botto-botto mengandung senyawa tanin yang bersifat polar, sehingga digunakan etanol 70% untuk menyari senyawa tanin tersebut. Pelarut etanol adalah pelarut organik yang bersifat polar dan kepolarannya meningkat dengan meningkatnya kandungan air. Untuk membuat suatu sediaan hand sanitizer maka diperlukan ekstrak dengan konsentrasi yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen saluran cerna. Pengujian aktivitas penghambatan ekstrak daun botto-botto telah dilakukan uji sebelumnya terhadap beberapa bakteri uji dan dilakukan dengan metode difusi agar.

Dari penelitian sebelumnya, menyatakan bahwa konsentrasi optimum yang menghambat bakteri uji dari variasi konsentrasi yang diujikan adalah konsentrasi 10%. Konsentrasi inilah yang akan dijadikan dasar pembuatan formulasi sediaan gel hand sanitizer daun botto-botto. Konsentrasi

ini diharapkan dapat mengurangi pengaruh hambatan difusi bahan melewati basis menuju sel mikroba.

Formulasi dan pemilihan basis yang tepat pada pembuatan sediaan gel akan mempengaruhi jumlah dan kecepatan zat aktif yang akan diabsorpsi, begitu pula dengan daya sebar dan pH. Secara ideal, basis dan pembawa harus mudah diaplikasi pada kulit, tidak mengiritasi dan nyaman digunakan pada kulit. Bahan alam memiliki karakteristik yang khas sehingga pada formulasinya perlu pemilihan basis yang paling efektif untuk menghasilkan sediaan gel yang baik.

Basis yang digunakan pada pembuatan gel hand sanitizer dari ekstrak daun botto-botto (*Chromolaena odorata* .L) adalah karbopol 940. Basis ini tergolong ke dalam kelompok senyawa asam poliakrilat.

Setelah melakukan pembuatan formulasi gel hand sanitizer dengan variasi karbopol 2%, 1%, dan 0,5% maka dilakukan uji karakteristik yang terdiri dari uji organoleptik, pH, Viskositas dan selanjutnya dilakukan uji efektivitas dari sediaan gel yang telah dibuat. Adapun hasil pengamatan



organoleptis terhadap gel yang mengandung ekstrak daun botto-botto (*Chromolaena odorata* .L) menunjukkan bahwa gel yang dihasilkan berbau seperti daun botto-botto dan berwarna coklat kehitaman dan coklat tua tergantung dari konsentrasi karbopol. Bau khas pada sediaan gel hand sanitizer berasal dari kumpulan warna senyawa yang terkandung didalam ekstrak tersebut. Begitupun dengan warna coklat kehitaman berasal dari warna senyawa-senyawa yang terkandung dalam ekstrak daun botto-botto yang berkumpul memberi warna yang terkesan coklat kehitaman. Sediaan gel ekstrak daun botto-botto berbentuk semipadat kental pada konsentrasi 1 dan 2%, berbentuk semipadat pada konsentrasi 0,5%.

Pada sediaan gel antiseptik ekstrak daun botto-botto dengan konsentrasi karbopol 1 dan 2% memiliki pH sekitar 5 dan pH 5 pada sediaan tanpa ekstrak daun botto-botto dengan konsentrasi karbopol 2%. Kulit memiliki mantel asam yang merupakan perlindungan pertama pada kulit. Mantel asam ini memiliki pH berkisar 4,5-6,5. Jika semakin alkalis atau semakin asam suatu bahan yang akan

mengenai kulit, maka semakin sulit untuk menetralsirnya dan kulit akan semakin lelah karenanya. Kulit akan dapat menjadi pecah-pecah, kering sensitif dan mudah terinfeksi (Tranggono, 2007). Oleh karena itu, pH sediaan antiseptik daun botto-botto diusahakan harus sesuai dengan pH fisiologis kulit yaitu 4,5-6,5.

Pada uji viskositas digunakan Dettol<sup>®</sup> antiseptik gel sebagai pembanding viskositas. Sediaan antiseptik gel Dettol<sup>®</sup> dipilih sebagai pembanding viskositas sebab memiliki viskositas yang nyaman digunakan oleh masyarakat. Hasil analisis dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) menunjukkan bahwa viskositas tiap formula memiliki perbedaan yang nyata, dengan F hitung > F tabel pada taraf signifikan 5%. Uji beda nyata jujur menunjukkan bahwa konsentrasi karbopol 0,5% memiliki nilai viskositas yang sama dengan sediaan gel antiseptik yang beredar dipasaran yakni Dettol<sup>®</sup> yang memiliki viskositas 4000-8000 cps (Reckitt Benckiser, 2008) sehingga dipilih sebagai konsentrasi karbopol yang baik untuk sediaan antiseptik daun botto-botto.



Pengujian daya antiseptik (efektivitas) sediaan gel yaitu dengan menggunakan metode replika, dengan cara meneteskan sediaan ke tangan secara merata kemudian didiamkan 1 menit lalu sidik jari ditempelkan pada medium. Setelah itu diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam, kemudian dihitung jumlah koloninya. Adapun hasil presentasi menunjukkan pada sediaan gel hand sanitizer ekstrak daun botto-botto dengan konsentrasi 5% mampu mengurangi mikroorganisme sebesar 95.14%, adapun beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan nilai viskositas 7537 poise pada konsentrasi karbopol 0,5% masih dapat diterima sebagai sediaan gel.

### KESIMPULAN

Ekstrak etanol daun botto-botto (*Chromolaena odorata* .L) memiliki konsistensi viskositas yang baik pada formula sediaan gel antiseptik hand sanitizer dengan menggunakan basis karbopol 940 dengan konsentrasi 0,5%. Sediaan gel antiseptik hand sanitizer ekstrak etanol daun botto-botto (*Chromolaena odorata* .L) mampu menghambat pertumbuhan bakteri

mikroorganisme sebesar 95.14% ditangan.

### DAFTAR PUSTAKA.

- Anonim. (2011). *Nuclear Precise News Letter edisi 81*. Jakarta: PT Nucleus Precise
- Akinmoladun, Afolabi C., Ibukun, E.O., Dan-Ologe, I.A. (2007). *Phytochemical Constituents and Antioxidant Properties of Extracts from the Leaves Of Chromolaena odorata*, scientific Research and Essay Volume 2.
- Ayyanar M, And Ignacimuthu S (2009). *Herbal medicines for wound healing among tribal people in Southern India: Ethnobotanical and Scientific evidences*. International Journal of Applied Research in Natural Products 2009; 2(3): 29-42.
- Departemen of Natural Resources, Mines and Water, 2006, *Siam Weed Declared no.1 Natural Mines and Water*, pp1-4, Queensland ,Australia: Pesr Series
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 1995.
- Djide, M. Natsir, Sartini. 2008. *Dasar-dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: lembaga penerbitan UNHAS.
- Dryer, D. L., Gerenraich, B. K., dan Wadhams, S. P. 1998. *Testing a New Alcohol Free Had Sanitizer to Combat Infection*. AORN



- Journal. Vol. 68, No. 4, p. 239 – 251.
- Dwyana Zarasawati, 2006. *Diklat Kuliah Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Garrity. G. M., bell. J. A. And Lilburn. T.G. 2004. *Taxonomic Outline of The Prokaryotes bergey's Manual of Systematic Bacteriologi*, 2th Edition. United States of America: New York Berlin Hendelberg.
- Irianto, Koes. 2006. *Mikrobiologi menguak dunia mikroorganisme*, cetakan pertama. Bandung: Yrama Widya.
- Jutono. *Pedoman Praktikum Mikrobiologi Umum (untuk perguruan tinggi)*. Yogyakarta: Departemen Mikrobiologi fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, 1980.
- Lachman I. Luberman HA & Kaning JL. 2008. *Teori dan Praktek Farmasi Industri*, Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Lund, Walter. 1994. *The Parmaceutical Codex, 12th edition*. London: The Pharmaceutical Press.
- Martin A., Swarbrick J., Cammarata A. *Phisical Pharmacy, PhisicalChemical Principles in The Pharmaceutical Science*, 3<sup>th</sup>ed, Lea and Febinger, Philadelphia, 399-499. 1983
- Minister of Public Works and Government Services Canada 2007, Revised Date : 2007/08/15.
- M.N. Vaisakh and Anima Pandey, (2011)“*The invasive weed with healing properties: A review on Chromolaena odorata*”, International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, Vol. 3, Pg.80-83
- Ngozi, Igboh M., Jude, Ikwuchi C. and Catherine, Ikwuchi C.(2009). *Chemical Profile of Chromolaena odorata L. (King and Robinson) Leaves*. Pakistan Journal of Nutrition 8.
- Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S. 2008. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*, Terjemahan oleh Hadioetomo, ratna sari dkk, Jakarta: Universitas Indonesia
- Pietsch, H. 2001. *Hand Antiseptics: Rubs Versus Scrubs, Alcoholic Solutions Versus Alcoholic Gels*. Journal of Hospital Infection. S33-S36.
- Pratiwi, Sylvia T. 2008. *Mikrobiologi Farmasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Prawiradiputra, Bambang R. 2006.*Ki Rinvuh (Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Robinson): Gulma Padang Rumput Yang Merugikan*. Bogor: Balai Penelitian Ternak.
- Radji, M. 2010. *Buku Ajar Mikrobiologi : Panduan Mahasiswa Farmasi dan Kedokteran*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta.



Sari Retno, Isadiartuti Dewi. 2006. *Studi Efektifitas Sediaan Gel Antiseptik Tangan Ekstrak Daun Sirih (Paper betle Linn.)*. Surabaya: Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Diakses pada tanggal 25 Januari 2013.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah* Jilid 6-7, Jakarta: Lentera hati, 2002.

S. L. Sukanya, J. Sudisha, H. S. Prakash and S. K. Fathima, "Isolation and characterization of antimicrobial compound from *Chromolaena odorata*", Journal

of Phytology, ISSN: 2075-6240, Vol. 3, No.10, pp.: 26-32, 201.

Rowe, Raymond C., Paul JS, Marian EQ. 2009. *Handbook of Pharmaceutical Excipients Sixth Edition*. The Pharmaceutical Press. USA.

Voight, Rudolf. 1995. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press



**PEMBUATAN VCO (VIRGIN COCONUT OIL) DENGAN  
METODE TRADISIONAL BUAH KELAPA HIJAU  
"COCOS NUCIFERA L" DAN KELAPA GADING  
"COCOS NUCIFERA EBURNEA"**

**Elmitra**

**Akademi Farmasi Yayasan Al-Fatah Bengkulu  
Jl. Indragiri, gg. Tiga Serangkai Padang Harapan Kota Bengkulu  
email : elmitrasahman@gmail.com**

**ABSTRAK**

Minyak kelapa murni atau *Virgin Coconut Oil* (VCO) merupakan salah satu produk olahan dari tanaman kelapa yang berbentuk cair. VCO memiliki sifat minyak yang berwarna kuning kecoklatan, berbau tidak harum dan mudah tengik sehingga daya simpannya tidak lama. Pengolahan VCO dilakukan dengan metode tradisional. Daging kelapa yang telah diparut ditambahkan air untuk diambil santannya, Dari proses tersebut didapatkan hasil minyak dan berupa blondo (ampas). Minyak yang dihasilkan kemudian disaring dengan kertas saring. Kemudian hasil minyak tersebut dibawah ke Laboratorium Kimia Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu, untuk dilakukan pengujian Kadar Asam Lemak Bebas dan juga Bobot Jenisnya. Penelitian ini diperoleh hasil yang mana menunjukkan bahwa minyak kelapa hijau berupa cairan kuning kecoklatan dengan bau yang khas, rasa yang hambar dengan hasil uji asam lemak bebas 0,418%, dan bobot jenisnya 0,33128 g/ml dengan massa pH 6-7 sedangkan minyak kelapa kuning/gading berupa cairan kuning jernih berbau khas, rasa yang hambar dengan nilai asam lemak bebasnya 0,468%, dan bobot jenisnya 0,30508 g/ml dengan massa pH 5-6, dan dapat dibandingkan bahwa minyak kelapa hijau lebih baik dari pada minyak kelapa gading/kuning.

**Kata Kunci : Minyak Kelapa Murni (*Virgin Coconut Oil*), Kelapa Hijau, Kelapa Kuning/Gading**

**PENDAHULUAN**

Kelapa (*Cocos nucifera*) adalah satu jenis tumbuhan dari suku aren-arcnan atau *Arecaceae* dan adalah anggota tunggal dalam marga *Cocos*. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan

serba guna, khususnya bagi masyarakat pesisir, (Palungun, 1992).

Minyak kelapa murni (*Virgin Coconut Oil/ VCO*) merupakan salah satu hasil olahan buah kelapa (*Cocos nucifera* L). Tanaman kelapa banyak tumbuh didaerah tropis sehingga minyaknya juga disebut minyak tropis



(*tropical oil*). Sejak zaman dahulu, minyak kelapa sudah sering digunakan. Namun, dalam dekade 90-an, minyak kelapa mulai ditinggalkan oleh masyarakat (Hartin dan Surtami, 2005).

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari minyak kelapa murni seperti: obat penyakit jantung dan kanker, Minyak ini juga dapat meningkatkan ketahanan tubuh, dapat membantu mencegah infeksi virus, mendukung sistem kekebalan tubuh, menyediakan sumber energi dengan cepat, menyediakan nutrisi penting bagi tubuh, membantu kelembutan kulit, tidak menaikkan kolesterol dan tidak menyebabkan kegemukan. Minyak kelapa murni juga dimanfaatkan sebagai industri farmasi, kosmetika dan susu formula. Pada saat ini minyak kelapa murni digunakan sebagai produk *shampoo*, detergen, minyak telon, dan minyak rambut (siswono, 2006).

Minyak kelapa murni merupakan hasil olahan kelapa yang bebas dari *trans fatty acid* (TFA) atau asam lemak-trans. Asam lemak trans ini dapat terjadi akibat proses hidrogenasi. Agar tidak mengalami proses

hidrogenasi, maka ekstraksi minyak kelapa ini dilakukan dengan proses dingin. Misalnya, secara fermentasi, pancingan, sentrifugasi, pemanasan terkendali, pengeringan parutan kelapa secara cepat dan lain-lain (Darmoyuwono, 2006).

## BAHAN DAN METODE

### Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini meliputi Beker gelas (Pyrex), Erlenmeyer (Pyrex), Spatula, Kertas saring, Gelas ukur (Pyrex), Hot plate, Labu ukur (Pyrex), Klem dan statif, Pipet tetes, Buret (Pyrex), Timbangan analitik, kertas pH universal, Toples plastik, Piknometer.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buah kelapa yang cukup tua dengan jenis kelapa hijau dan kelapa gading, dan bahan pembantunya adalah Aquadest, NaOH, Etanol/Alkohol, Indikator PP.

### METODE

#### Pembuatan VCO (*Virgin Coconut Oil*) Kelapa Hijau Dan Gading

##### Metode Pemanasan :

Daging buah kelapa yang bersih diparut kemudian diambil santannya,



santan tersebut dipanaskan pada suhu yang tinggi. Sehingga ada kemungkinan komposisi kimia dari minyak kelapa murni ini menjadi berubah. Selain itu, kandungan asam laurat pada VCO akan menguap kemudian minyak di saring agar minyak tidak tercampur dengan ampas (Edahwati, 2011).

**Uji Sifat Fisik VCO (Rindengan dan Novarianto, 2004).**

Analisis sifat fisik Dilakukan dengan cara visual yaitu dengan melihat warna, bentuk dan bau dari VCO.

**Uji Bobot Jenis (Ketaren, 1986)**

Piknometer dibersihkan dan dikeringkan, pikno ditimbang dengan tutupnya dalam keadaan kosong. Kemudian pikno diisi VCO sampai tanda batas dan ditimbang beratnya catat hasil. Pada suhu 25°C dengan rumus sebagai berikut;

$$b \text{ 敦} = \frac{(\text{berat pikno} + \text{vco}(g)) - (\text{berat pikn } \text{kosong}(g))}{\text{volume pada suhu } 25^{\circ} \text{ C}(ml)}$$

**Pembuatan larutan Pembakuan NaOH 0,1 N**


Ditimbang seksama lebih kurang 400 mg kalium biftalat yang sebelumnya telah dihaluskan dan dikeringkan pada suhu 120°C selama 2 jam, dan di tambahkan 25 ml air bebas karbondioksida P. Ditambahkan 2-3 tetes *fenolftalein P* dan titrasi dengan larutan natrium hidroksida hingga terjadi warna merah muda yang mantap.

**Uji Asam Lemak Bebas (Mehlenbacher dalam Sudarmadji dkk, 1981)**

Sampel ditimbang sebanyak 5 g dalam erlenmeyer 250 ml. Ke dalam sampel ditambahkan 50 ml etanol 96 % netral, dan 2-3 tetes indikator pp. Sampel dititrasi dengan larutan 0,1 N NaOH yang telah distandarisasi sampai warna merah jambu tercapai dan tidak hilang selama 30 menit. Asam lemak bebas dinyatakan sebagai % FFA.

$$\% \text{FFA} = \frac{\text{mlNaOH} \times \text{N} \times \text{B. M Asam Lemak}(palmitat)}{\text{Berat Sampel} \times 1000} \times 100\%$$





Keterangan : BM asampalmitat

**Uji pH VCO**

Menggunakan pH universal, untuk pengukuran pH dari VCO dengan cara, ambil hasil VCO 1ml lalu celupkan pH universal kedalam VCO kemudian dilakukan pengecekan pH dari varietas VCO kelapa hijau dan kelapa gading, lihat hasilnya untuk mengetahui pH dari masing-masing sampel.

**Analisis Data Kualitas Virgin Coconut Oil (VCO)**

Analisis yang dilakukan yaitu secara deskriptif berupa pebandingan dan nilai rata-rata

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini di lakukan pada bulan April 2016 di Laboratorium Farmakognosi dan Laboratorium Kimia Farmasi Al-Fatah Bengkulu.

**Organoleptis**

Kelapa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelapa dengan varietas kelapa hijau "Cocos nucifera L" dan kelapa gading "Cocos Nucifera Eburnea"(VCO).

**Tabel 1. Hasil Uji Organoleptis**

Sampel	Uji organoleptis		
	Warna	Bau	Rasa
Minyak	Cairan	khas	Hambar

kelapa kuning/gading (A)	kuning jernih		
Minyak kelapa hijau (B)	Cairan kuning kecoklatan	khas	Hambar

**Uji Asam Lemak Bebas(ALB%)**

Yaitu dengan cara minyak dari kedua sampel tersebut dilakukan pentitrasiian seperti prosedur Asam Lemak Bebas (% FFA), dandiperoleh hasil rata-rata 0,468% untuk minyak kelapa kuning dan 0,418% untuk minyak kelapa hijau.

**Tabel 2. Hasil Asam Lemak Bebas (ALB%) pada kedua sampel**

Sampel	Titration ml	Kadar ALB %
Minyak kelapa kuning/gading (A)	0,9	0,452%
	0,9	0,452%
	1	0,502%
	Rata-rata	0,468%
Minyak Kelapa Hijau (B)	0,8	0,401%
	0,8	0,401%
	0,9	0,452%
	Rata-rata	0,418%

**Bobot Jenis**

Dalam pengukuran bj dari sampel VCO didapatkan hasil 0,33128 g/ml untuk sampel minyak kelapa gading/kuning dan 0,30508 g/ml untuk sampel minyak kelapa hijau.



Tabel 3. Hasil Bobot Jenis Dari Kedua Sampel

Minyak kelapa kuning/gading (A)	Minyak kelapa hijau (B)
0,33128 g/ml	0,30508 g/ml

### pH VCO

Dalam uji pH tidaklah sulit karena dalam penelitian ini dilakukan uji pH dengan menggunakan pH Universal saja dengan hasil pH dari minyak kelapa kuning 5-6 sedangkan minyak kelapa hijau 6-7.

### PEMBAHASAN

Pengujian minyak kelapa / VCO dari 2 varietas ini bermula dari kelapa yang sudah tua, kemudian dilakukan proses pengambilan daging buah kelapa, dilakukan pematangan dari varietas kelapa tersebut yaitu kelapa hijau dan kelapa gading/kuning. Dari varietas kelapa yang telah diparut masing-masing ditimbang sebanyak 500 g dan ditambahkan air dengan perbandingan 1:3.

Langkah selanjutnya dilakukan peremasan untuk menghasilkan air santan dan dilakukan pengendapan selama 1-2 jam untuk memisahkan air dan krim dari santan tersebut untuk diolah menjadi minyak dengan cara krim yang didapatkan tadi dimasak

pada kompor dengan perapian yang setabil dan bersuhu 100<sup>0</sup>C sehingga krim dari santan tersebut membentuk minyak dan blondo. Kemudian dilakukanlah penyaringan yang bertujuan untuk memisahkan minyak dengan blondo tersebut sehingga minyak menjadi bersih dan mendapatkan hasil minyak kelapa murni yang terbebas dari kotoran/ampas blondonya.

Setelah mendapatkan minyak kelapa murni (*Virgin Coconut Oil*), dilakukanlah uji organoleptis yang mana sampel minyak/VCO berupa cairan kuning kecoklatan dengan bau khas dan rasa hambar pada varietas kelapa hijau dan untuk kelapa gading berupa cairan kuning jernih berbau khas dan rasa yang hambar.

Kemudian dilakukan uji ALB untuk membandingkan kadar Asam Lemak Bebas pada kedua sampel, hal yang pertama dilakukan ialah membuat larutan NaOH 0,1 N terlebih dahulu dengan cara timbang NaOH sebanyak 2 gram kemudian dimasukkan kedalam labu ukur 500ml dan distandarisasi setelah itu buat larutan baku dengan cara ditimbang 400mg kalium biftalat masukan kedalam erlenmeyer 250ml



tambahkan air 25ml kemudian tambahkan indikator pp 2-3 tetes, lanjutkan dengan titrasi NaOH 0,1 N yang telah dibuat sebelumnya sampai mencapai warna merah mudah mantap. Barulah dilakukan pemeriksaan kadar Asam Lemak Bebas dengan cara timbang masing-masing sampel sebanyak 5 gram tambahkan alkohol 96% sebanyak 50 ml dan tambahkan indikator pp 2-3 tetes (sekitar 2 ml) kemudian dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai mencapai perubahan warnanya dan catat hasil titrasi untuk dilanjutkan perhitungan sehingga didapatkanlah hasil dari masing-masing sampel yaitu untuk kelapa hijau didapatkan rata-ratanya 0,418% sedangkan untuk kelapa gading/kuning yaitu rata-ratanya 0,468% sehingga dapat disimpulkan bahwa minyak kelapa kuning lebih tinggi dibandingkan dengan minyak kelapa hijau.

Kedua jenis minyak kelapa tersebut baik minyak kelapa hijau dan minyak kelapa kuning kadar asam lemak bebasnya, telah memenuhi standar mutu SNI 01-2901-2006 yaitu kurang dari 0,5% sehingga kedua jenis minyak kelapa tersebut layak untuk dikonsumsi.

Kemudian dilakukan uji bobot jenis pada masing-masing sampel dengan menggunakan piknometer dengan cara timbang piknometer kosong, dan timbang piknometer berisi VCO lalu hitung bobot jenisnya dengan rumus pikno yang berisi VCO dikurang dengan pikno kosong dibagi dengan volume dan didapatkanlah hasil 0,33128 g/ml untuk sampel minyak kelapa gading/kuning dan 0,30508 g/ml untuk sampel minyak kelapa hijau.

Penelitian sampel minyak kelapa murni ini dilakukan 1 kali. Hanya saja dalam perlakuan titrasi dilakukan sebanyak 3 kali agar data yang didapatkan lebih akurat dan memperkecil kesalahan oleh faktor human error (kesalahan manusia)

## KESIMPULAN

Uji sifat fisik menunjukkan bahwa sampel minyak/VCO berupa cairan kuning kecoklatan dengan bau khas dan rasa hambar pada varietas kelapa hijau dan untuk kelapa gading berupa cairan kuning jernih berbau khas dan rasa yang hambar.

Uji kualitatif yang telah dilakukan yakni dapat dibandingkan bahwa minyak kelapa hijau lebih baik



dari pada minyak kelapa gading/kuning karena hasil penelitian menunjukkan kadar Asam Lemak Bebasnya (lampiran. 1). kelapa hijau didapatkan rata-ratanya 0,418% sedangkan untuk kelapa gading/kuning yaitu rata-ratanya 0,468% sehingga dapat disimpulkan bahwa minyak kelapa kuning lebih tinggi dibandingkan dengan minyak kelapa hijau. Dan juga minyak kelapa murni/VCO sudah memenuhi standar mutu SNI 01-2901-2006 yaitu kurang dari 0,5%.

#### SARAN

Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengujikan lebih detail. syarat mutu dari minyak kelapa seperti kadar air dan kotoran dari minyak kelapa tersebut sehingga mutu dari syarat yang telah ditetapkan oleh SNI benar sesuai.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anonymous, 2005. VCO (*Virgin coconut oil*). dapertemen kesehatan RI. Jakarta.

Darmoyuwono, 2006. *Olahan Minyak Kelapa Murni*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Darmoyuwono, 2006. *Kandungan Kimia Buah Kelapa*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Hartin dan Surtami, 2005. *Minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil/ VCO) Seri Agrisehat*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Penebar Swadaya.

Hartin dan Sutarmi, 2005. *Komponen utama minyak kelapa murni*.

Ketaren, 1986. *Khasiat dan Farmakologi VCO dalam Teknologi Minyak dan Lemak Pangan*. Jakarta: UI Press. Hal. 152.

Ketaren, 1986. *Menghitung bobot jenis dan kerapatan dari suatu zat cair*. Jakarta: UI Press

krisnapati, A 2012. *Jurnal pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO)*. Jakarta : Mehlenbacher dalam Sudarmadji dkk, 1981 *Asam Lemak Bebas*

POM. 1995. *jurnal Pembuatan larutan baku Ditjen Universitas Sumatera Utara palungkun, 1992. Morfologi buah kelapa dan habitan penyebaran kelapa*. Jakarta :

Rindengan dan Novarianto, 2004. *Sifat Fisika dan Kimia Minyak Kelapa Murni*. Jakarta.

Rindengan, B dan Novarianto, H. (2005). *Pembuatan Dan Pemanfaatan Minyak Kelapa Murni*. Seri Agritekno. Cetakan Keempat. Jakarta: Penebar Swadaya.



Siswono, 2006. *Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari minyak kelapa murni seperti: obat.*

Warisno, 1998. *Habitat Penyebarannya dan Budi Daya Kelapa Kopyor.* Cetakan kesatu. Kanisus: Yogyakarta



## UJI AKTIVITAS ANTIHIPERGLIKEMIK EKSTRAK KARAGENAN DAN POLIFENOL ALGA MERAH *EUCHEUMA DENTICULATUM*

Fathnur Sani K.<sup>\*1</sup>, Agung Giri Samudra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu

Email: [fathnursani19@gmail.com](mailto:fathnursani19@gmail.com)

### ABSTRAK

*Eucheuma denticulatum* merupakan salah satu sumber daya alam yang penting laut di perairan Indonesia yang digunakan sebagai zat aditif dalam industri farmasi, kosmetik, kertas, cat dan makanan. Beberapa tahun terakhir, produk alga telah menerima perhatian khusus sebagai sumber antioksidan alami, beberapa dari mereka memiliki aktivitas biologis potensial nilai obat dan berperan dalam mencegah sejumlah penyakit kronis seperti diabetes. Uji in vivo antihyperglycemic pada penelitian ini menggunakan metode standar yaitu metode *Oral Glucose Tolerance Test* (OGTT). Dimana hewan percobaan di bagi menjadi 6 kelompok yaitu control negative, control positif (Akarbose 0,364 mg/20 gram BB Mencit), dan ekstrak zat aktif dari *Eucheuma denticulatum* yaitu Karagenan Dosis I (1.25 mg/20 gram BB mencit), Karagenan Dosis II (2,5 mg/20 gram BB Mencit), Polifenol Dosis I (1,25 mg/20 gram BB Mencit) dan Polifenol Dosis II (2.5 mg/20 gram BB Mencit). Seluruh perlakuan diinduksi dengan sukrosa 180mg/20gram BB Mencit. Kemudian gula darah diukur dengan glukometer yang darahnya diambil melalui ekor mencit. Data yang diperoleh diolah dengan uji ANOVA dua Arah. Hasil uji anova memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok akarbosa, zat uji dan kontrol negatif ( $P < 0,05$ ). Dimana efek terbaik dimiliki oleh Karagenan dosis I dengan efek hampir sama dengan akarbosa secara statistik ( $P > 0,05$ ). Kesimpulannya adalah karagenan dan polifenol dari alga laut *Eucheuma denticulatum* memiliki efek sebagai agen antihyperglycemic yang baik dan dapat dikembangkan sebagai obat alternatif baru untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus.

**Kata Kunci:** antihyperglycemic, *Eucheuma denticulatum*, karagenan, polifenol, anova dua arah.

### 1. PENDAHULUAN

Perubahan gaya hidup dan sosial ekonomi akibat urbanisasi dan modernisasi terutama masyarakat di kota-kota besar menjadi penyebab meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif dan disinyalir menjadi penyebab utama kematian. Salah satu yang harus diwaspadai adalah diabetes mellitus (Sudoyo, dkk., 2007). Penyakit diabetes mellitus merupakan salah satu jenis penyakit yang berbahaya yang ada didunia. Angka kejadian penyakit inipun selalu mengalami peningkatan. Menurut WHO (2016) angka kejadian penyakit



diabetes saat ini sudah mengalami kenaikan 4 kali lipat jika dibandingkan dengan angka kejadian pada tahun 1980. Pada tahun 2012 angka kejadian diabetes sudah terdata sebanyak 1,5 juta kematian yang disertai dengan komplikasi gagal ginjal, kebutaan, stroke dan amputasi (WHO, 2016; Yeh, et al., 2003). Hiperglikemia adalah suatu keadaan abnormal dimana kadar glukosa dalam darah > 200 mg/dl. Hiperglikemia ditandai dengan poliuria, polidipsia, polifagia, kelelahan yang parah (*fatigue*), dan pandangan kabur. Kondisi ini dapat memperburuk gangguan-gangguan kesehatan seperti gastroparesis, disfungsi ereksi, dan infeksi jamur pada vagina. Jika kejadian yang berlangsung lama dapat berkembang menjadi keadaan gangguan metabolisme yang berbahaya membawa kematian atau dikenal dengan penyakit DM (Ravi, et al., 2005).

Beberapa tanaman obat telah dilaporkan memiliki manfaat dalam mengobati penyakit diabetes secara global dan digunakan secara empiris dimasyarakat sebagai obat antidiabetes. Aktivitas antihiperglikemik yang terdapat pada tanaman tersebut muncul karena kemampuannya untuk memperbaiki fungsi jaringan pancreas

dengan cara meningkatkan produksi insulin atau menghambatan penyerapan glukosa di usus atau meningkatkan sensitifitas insulin (Haddad, 2012; Patel, 2012). Menurut literature india kuno melaporkan lebih dari 800 tanaman yang memiliki efek sebagai antidiabetes, sedangkan menurut hasil survey ethnopharmacological menunjukkan lebih dari 1200 jenis tanaman yang memiliki efek sebagai antidiabetes (Mishra, et.al., 2010). Sebagian besar tanaman mengandung glikosida, alkaloid, terpenoid, flavonoid, karotenoid, dll, yang biasa terlibat sebagai memiliki efek hipoglikemik (Salihu et al., 2015). Salah satu tanaman yang digunakan secara tradisional untuk pengobatan diabetes adalah alga laut (Wikanta, et al., 2002).

Alga merupakan sumber potensial dengan metabolit sekunder tinggi yang mulai dikembangkan sebagai agen farmasi baru. Alga laut memiliki senyawa polifenol yang banyak ditemukan pada beberapa family Alariaceae, Fucaceae dan Sargassaceae yang memiliki kemampuan menangkap radikal bebas (Sing & Rajmi, 2004; Petti & Crispian, 2009). Selain senyawa metabolit sekunder alga juga memiliki



senyawa metabolit primer salah satunya adalah senyawa polisakarida karagenan yang banyak terdapat pada alga laut *Eucheuma* sp yang juga memiliki banyak manfaat untuk pengembangan obat baru. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Wikanta (2005) karagenan merupakan salah satu jenis serat makanan yang terbukti memiliki efek penurunan kadar glukosa darah dengan cara menghambat penyerapan glukosa di proksimal usus halus sehingga dapat mengurangi kadar glukosa post prandial.

Alga laut *Eucheuma* sp merupakan salah satu jenis alga laut yang banyak ditemukan dan cukup melimpah di Indonesia. Kandungan dari alga laut diantaranya polisakarida, polifenol, protein, peptida, asam amino, lipid, mineral, dan beberapa vitamin (Holdt dan Kraan, 2011). Karagenan dan polifenol merupakan kandungan yang paling banyak memiliki manfaat dalam bidang pengobatan dibandingkan dengan lainnya. Salah satu spesies jenis dari alga laut *Eucheuma* sp adalah spesies *Eucheuma denticulatum* (Aḡmadja, 1996).

Penelitian tentang aktivitas karagenan dan polifenol sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Dimana

karagenan dan polifenol telah terbukti dapat berperan sebagai agen antihiperqlikemik (Wikanta, 2005; Marianne, et.al., 2011). Namun berdasarkan penelusuran literature belum ditemukan informasi tentang uji aktivitas antihiperqlikemik Ekstrak Carrageenan dan Polifenol yang terdapat pada alga merah terutama spesies *Eucheuma denticulatum* yang diperoleh dari gunung kidul Yogyakarta yang diharapkan nanti dapat dijadikan sebagai alternative dalam pengobatan diabetes.

## 2. MATERIALS AND METHOD

### 2.1 Material Tanaman

*Eucheuma denticulatum* diambil di Gubung Kidul Yogyakarta, Indonesia dan di disahkan oleh Drs. Heri Sujatmiko, M.Si., Kepala Laboratorium Botani, Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Voucher Spesimen (Acc. No.0447) yang akan di tempatkan diherbarium untuk menjadi koleksi dimasa mendatang

### 2.2 Hewan Percobaan

Kriteria hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan  $\pm 2$



bulan dengan bobot 20-30 g yang ditempatkan di dalam kandang.

### 2.3 Ekstraksi Polifenol

Alga laut kering *E.denticulatum* direndam dalam air selama 12 jam. Alga dipotong kecil kemudian dihaluskan dengan blender dan dikeringkan dalam oven suhu 40°C selama 24 jam. Serbuk alga laut yang telah kering ditimbang 10 gram dan diekstrak dalam metanol 50% sebanyak 200 mL. Ekstraksi dilakukan selama 1 jam pada suhu kamar, menggunakan shaker dengan kecepatan 150 rpm. Setelah diekstraksi, lakukan sentrifugasi pada suhu 4°C selama 20 menit dengan kecepatan 7000 rpm. Metanol diuapkan dengan menggunakan evaporator rotari vakum (Zhang dkk., 2006).

### 2.4 Ekstraksi Karagenan

Alga laut kering *E.denticulatum* direndam dalam air selama 12 jam. Alga dipotong kecil kemudian dihaluskan dengan blender dan dikeringkan dalam oven suhu 40°C selama 24 jam. Serbuk alga laut yang telah kering dilakukan pengayakan dengan saringan 90 mesh. Serbuk alga laut yang lolos

saringan 90 mesh ditimbang 200 gram dan diekstraksi menggunakan larutan KOH 0,5% pada suhu 90°C selama 1 jam dengan perbandingan pelarut dan bahan baku 20 mL : 1 gr. Setelah proses ekstraksi, karagenan yang masih terkandung dalam larutan alkali tersebut disaring menggunakan kain kasa dan diambil filtratnya. Filtrat ditambahkan HCl hingga pH 7, lalu dicuci dengan menggunakan etanol, dan didiamkan selama 15 menit. Endapan disaring kemudian dikeringkan di dalam oven dengan suhu 50°C selama 24 jam (Ramalingam et.al., 2003).

### 2.5 Uji Aktivitas in vivo antigiperglikemik

Uji aktivitas dilakukan dengan membagi hewan diuji menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 3 ekor mencit untuk setiap percobaan, kemudian diadaptasi dan dipuasakan selama 8-10 jam, tetapi mereka masih diberi minum ad libitum sebelum perawatan. Metode pengujian efek in vivo dilakukan dengan menggunakan metode Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) yang merupakan metode standar dalam pengujian efek antihiperglikemik (Uddin, et.al., 2014).



Induksi hiperglikemik pada penelitian ini menggunakan Sukrosa 180mg/20gram BB Mencit. Semua mencit dibagi menjadi 6 kelompok perlakuan yaitu:

- Kelompok I: Kontrol negative
- Kelompok II: Kontrol Positif (Akarbose 0.364 mg/20 gr BB Mencit)
- Kelompok III: Karagenan Dosis I 1,25 mg/20 gram BB Mencit
- Kelompok IV: Karagenan Dosis II 2.5 mg/20 gram BB Mencit
- Kelompok III: Polifenol Dosis I 1,25 mg/20 gram BB Mencit
- Kelompok IV: Polifenol Dosis II 2,5 mg/20 gram BB Mencit

Selanjutnya induksi sukrosa dan zat uji diberikan secara bersamaan dengan cara menginduksi sukrosa terlebih dahulu kemudian segera diikuti dengan induksi zat aktif. Pengukuran efek antihiperglikemik dimulai dari menit ke 15. Pengukuran dilakukan pada menit 0, 15, 30, 60, 90 dan 120. Pengukuran kadar glukosa pada penelitian ini menggunakan alat glucometer dengan bantuan strip tes gula darah (Easy Touch Strip Glucose) dengan cara meneteskan sampel darah yang telah diambil dari ekor mencit percobaan.

Persentase Penurunan Glukosa darah =

$$\frac{AUC\ GL0min - AUC\ GLn-min}{AUC\ GL0min} \times 100\%$$

100%

AUC GL0min

Keterangan:

AUC GL0min= nilai AUC glukosa darah menit ke 0

AUC GLn-min = nilai AUC glukosa

darah menit ke-n

### 2.6 Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji statistik anova dua arah dengan program SPSS 18. Kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan dan LSD dengan tingkat kepercayaan 95%.

### 3. HASIL

Hasil Extract Carrageenan dan polifenol yang diperoleh dari Eucheuma denticulatum berturut-turut adalah 46,84 and 24%.


**Tabel 1.** Efek Antihiperglikemik ekstrak Carrageenan dan polifenol dari Eucheuma denticulatum pada berat badan Mencit Putih

Jantan:




Grup	Waktu (Menit)					
	T.0	T.15	T.30	T.60	T.90	T.120
K. Negatif	61 ± 6,81	82 ± 6,17	128 ± 10,26	148 ± 7,51	131 ± 11,02	94 ± 4,67
K. Positif	59 ± 2,91	64,5 ± 2,33	70,5 ± 7,51	85,5 ± 6,69	78 ± 4,04	72 ± 10,40
Karagenan 1,25 mg	60 ± 5,67	72,5 ± 1,53	75 ± 8,74	106 ± 6,67	73 ± 7,42	59,5 ± 4,04
Karagenan 2,5 mg	64,5 ± 3,78	90 ± 5,24	112,5 ± 10,37	113,5 ± 13,86	97 ± 7,57	82,5 ± 10,97
Polifenol 1,25 mg	55 ± 2,00	91,5 ± 14,45	100,5 ± 13,72	95,5 ± 13,54	104,5 ± 4,33	87 ± 4,36
Polifenol 2,5 mg	57,5 ± 2,65	72,5 ± 35,46	122 ± 16,05	112 ± 5,61	105,5 ± 8,25	82 ± 17,06

Catatan: Nilai tingkat glukosa darah (mg / dL) adalah mean ± SEM.



Gambar 1. Grafik Persentase Efek Antihiperglikemik Ekstrak Karagenan dan Polifenol dari *Eucheuma denticulatum*



Gambar 2. Kurva Efek Antihiperglikemik Ekstrak Karagenan dan Polifenol dari *Eucheuma denticulatum*



Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak karagenan dan polifenol dari *Eucheuma denticulatum* memiliki efek sebagai antihiperqlikemik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan glukosa darah yang signifikan setiap menit pengukuran (Menit ke 0; 15; 30; 60; 90; 120). Dimana menurut hasil uji ANOVA dua arah di dapatkan bahwa adanya perbedaan yang bermakna yang terdapat pada tiap menit pengukuran ( $p < 0,05$ ). Efek penurunan kadar glukosa selama perlakuan dapat terlihat bahwa nilai tertinggi hingga nilai terendah yaitu Akarbose (37,40%), Karagenan I (33,87%), Polifenol I (20,88%), Polifenol II (16,94%), dan Karagenan II (16,23%) (Gambar 1). Dimana secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan untuk tiap perlakuan ( $P < 0,05$ ). Hasil ini juga memperlihatkan bahwa efek terbaik diberikan dosis terendah yaitu Karagenan I 1,25 mg/20 gram BB dan Polifenol I 1,25 mg/gram BB (Gambar 1 dan 2). Efek penurunan kadar Glukosa Darah terjadi mulai dari menit ke-30 (Tabel 1 dan Gambar 2).

#### 4. PEMBAHASAN

Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu kelainan metabolik yang bersifat kronik dimana terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah sebagai akibat kurangnya jumlah insulin, kerja insulin maupun keduanya (Shaw, et al., 2010). Penyakit ini ditandai dengan keadaan hiperglikemik. Hiperglikemia adalah suatu keadaan abnormal dimana kadar glukosa dalam darah  $> 200$  mg/dl. Hiperglikemia ditandai dengan poliuria, polidipsia, polifagia, kelelahan yang parah (*fatigue*), dan pandangan kabur. Kondisi ini dapat memperburuk gangguan-gangguan kesehatan seperti gastroparesis, disfungsi ereksi, dan infeksi jamur pada vagina. Jika kejadian yang berlangsung lama dapat berkembang menjadi keadaan gangguan metabolisme yang berbahaya membawa kematian (Capes, 2005).

Penginduksi hiperglikemia pada penelitian ini digunakan Sukrosa. Hal ini karena sukrosa dapat bekerja meningkatkan kadar glukosa darah dengan cara menghidrolisis zat tersebut dengan enzim sukrose yang ada pada sel epitel usus halus menghasilkan glukosa dan fruktosa. Pada usus halus terjadinya penyerapan glukosa dan



masuk ke peredaran darah, sehingga meningkatkan kadar glukosa darah (Nelson & Cox, 2005). Selain itu pada penelitian ini juga merupakan lanjutan dari uji in vitro dimana zat aktif dari *Eucheuma denticulatum* memiliki kemampuan untuk menghambat kerja enzim pada usus agar tidak terjadi pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Sehingga penelitian ini sejalan jika induksi yang digunakan adalah sukrosa. Sedangkan sebagai kontrol positif pada penelitian ini digunakan acarbose. Adapun mekanisme kerja dari acarbose adalah dengan cara menghambat aktivitas  $\alpha$ -glukosidase, menginterfensi proses hidrolisis karbohidrat, menghambat penyerapan glukosa dan monosakarida-monosakarida yang lainnya. Obat golongan ini bekerja di usus, menghambat enzim di saluran cerna, sehingga pemecahan karbohidrat menjadi glukosa atau pencernaan karbohidrat di usus menjadi berkurang. Hasil akhir dari pemakaian obat ini adalah penyerapan glukosa ke darah menjadi lambat, dan glukosa darah sesudah makan tidak cepat naik (Manaf, 2010).

Hasil penelitian untuk zat aktif dari *Eucheuma denticulatum* yaitu karagenan dan polifenol menunjukkan bahwa mereka memiliki efek antihyperglikemia. Adapun dosis yang digunakan pada penelitian ini merupakan hasil lanjutan dari uji invitro yaitu dosis 1,25 mg/20gram BB mencit dan dosis 2,5mg/20 gram BB mencit.

Efek antihyperglikemi pada penelitian ini di tunjukkan pada Tabel 1, Gambar 1 dan Gambar 2. Dimana efek terbaik yaitu karagenan dosis 1,25 mg/20 gram BB. Bahkan berdasarkan hasil pengolahan statistic diperoleh bahwa karagenan dosis I dan sukrosa memiliki efek yang sama ( $P>0,05$ ), namun tidak menyamai efek sukrosa. Kemudian diikuti oleh polifenol dosis I 1,25 mg/20 gram BB, Polifenol dosis II 2,5 mg/20gram BB, dan Karagenan II 2,5 mg/20 gram BB. Berdasarkan hasil uji statistic anova dua arah juga memperlihatkan bahwa Polifenol Dosis I, Polifenol Dosis II dan Karagenan Dosis II tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna dalam menghambat kadar gula darah pada mencit ( $P>0,05$ ). Perbedaan hasil yang diperoleh ini diduga karena faktor metabolik dan



hormonal hewan uji mencit pada kelompok tersebut yang tidak dapat diprediksi oleh peneliti. Proses pengaturan kadar glukosa darah merupakan salah satu mekanisme homeostasis yang diatur paling halus. Hati, jaringan ekstra hepatic, dan beberapa hormone turut berperan dalam mengatur kadar glukosa dalam darah. Berbagai kondisi individual (ketakutan, kegembiraan, stress, perdarahan, hipoglikemi, hipoksia, kerja fisik berat, dll) dapat mempengaruhi konsentrasi glukosa dalam darah. Dalam kondisi stress, hormon epinefrin disekresikan oleh medula adrenal. Hormon epinefrin memiliki efek yang kuat dalam memacu terjadinya glikogenolisis (pemecahan glikogen menjadi glukosa) dalam hati sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah (Masharani, 2004).

*Eucheuma denticulatum* merupakan salah satu kelompok alga *karaginofit* yaitu rumput laut yang mengandung senyawa metabolik primer dalam jumlah yang besar yaitu karagenan. Dimana hasil ini ditunjukkan pada hasil ekstrak karagenan yang diperoleh yaitu

sebanyak 46, 84%. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Basmal, dkk. (2003) dan Widyaastuti (2010).

Pada penelitian ini terlihat bahwa karagenan memberikan efek yang sangat baik dalam menghambat kadar glukosa darah postprandial. Dimana secara uji statistic memiliki efek yang hampir sama dengan control positif yaitu akarbosa ( $P > 0,05$ ). Adapun dosis terbaik yaitu dosis I 1,25 mg/20gram BB mencit. Karagenan merupakan senyawa polisakarida yang tersusun dari ester kalium, natrium, magnesium dan kalium sulfat dengan galaktosa-3,6-anhidrogallaktosa kopolimer. Struktur dasar karagenan terdiri dari tiga tipe karagenan yaitu  $\kappa$ -,  $\iota$ - dan  $\lambda$ -karagenan. Struktur dasar  $\kappa$ -karagenan tersusun dari  $\alpha$ -(1,3)-D-galaktosa-4-sulfat dan  $\beta$ -(1,4)-3,6-anhidro-D-galaktosa. Beberapa tahun terakhir para ilmuan tertarik untuk melakukan penelitian tentang adanya potensi dari senyawa karagenan dalam mengurangi aktivitas enzim didalam sel manusia (Yang, et al., 2012; Bhattacharyya et al., 2012). Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah



dilakukan oleh Panlasigui, et.al., (2003) dan Dumelod, et.al., (1999). Pada penelitian lainnya disebutkan bahwa senyawa ini merupakan polisakarida yang memiliki kemampuan membentuk gel, terjadi suatu pengikatan silang rantai-rantai polimer sehingga terbentuk suatu jala. Jala ini mampu menangkap air di dalamnya dan membentuk struktur yang kuat dan kaku. Enzim  $\alpha$ -amilase dan enzim  $\alpha$ -glukosidase terlarut air terjebak pada struktur gel dari karagenan (Sankalia dkk., 2006; Sankalia dkk., 2007). Sehingga kemampuan enzim  $\alpha$ -amilase dan enzim  $\alpha$ -glukosidase dalam memecah karbohidrat menjadi bentuk monosakarida akan terhambat. Selain itu karagenan juga merupakan serat makanan pengikat kation (*binding of cations*) yang akan mengubah pH intestinum dengan cara mempengaruhi sekresi asam dan basa lewat pengaruh hormon dan enzim. Efek ini mempengaruhi proses pemecahan karbohidrat (disakarida) didalam intestinum yang akhirnya juga akan mempengaruhi proses penyerapan monosakarida, sehingga dapat menahan laju peningkatan kadar glukosa darah post-prandial (Wikanta dkk., 2008).

Selain metabolit primer senyawa penting yang terdapat pada alga merah *Eucheuma denticulatum* adalah senyawa polifenol. Senyawa ini merupakan senyawa yang terdapat dalam kelompok besar dan juga tersebar banyak pada tumbuhan-tumbuhan, seperti teh, kopi, biji-bijian sereal, sayuran, buah-buahan. Struktur fenol beragam dari yang sederhana (satu-fenol hidroksibenzoat dan hidroksisinnamid) dan makromolekul polimer (proanthosianidins dan ellagitannin). Polifenol memiliki kemampuan sebagai anti-inflamasi, antioksidan, kemopreventif dan polifenol juga dapat mempengaruhi laju glukosa darah (Hanhineva dkk., 2010). Namun didunia farmasi senyawa polifenol merupakan senyawa yang dikenal memiliki efek sebagai antioksidan alami (Holdt dan Kraan, 2011). Polifenol terdapat dalam jumlah yang cukup besar pada tanaman ini. Hal ini ditunjukkan dengan hasil persentase polifenol yang didapat yaitu sebanyak 24%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryudhani (2007) dan Sadati, et al., (2011).



Pada penelitian ini juga terlihat bahwa polifenol juga memperlihatkan efeknya sebagai agen antihyperglikemik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nwosu, et.al., (2010) dan Lee, et.al., (2010) dimana hasil penelitiannya menunjukkan adanya efek antihyperglycemic dari polifenol yang dihasilkan oleh beberapa jenis alga laut. Efek antihyperglikemik muncul karena adanya kemampuan dari senyawa polifenol dalam mengurangi stress oksidatif dari efek penginduksian glukosa berlebih, serta adanya kemampuan menghambat enzim alpha amylase dan alpha glukosidase yang ada pada system pencernaan melalui ikatan hidroksi dan substitusi pada cincin  $\beta$ . Prinsip penghambatan ini serupa dengan akarbosa, yaitu menghasilkan penundaan hidrolisis senyawa karbohidrat dan disakarida dan absorpsi glukosa serta menghambat metabolisme sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa (Lee, et.al., 2008; You et.al., 2012). Penghambatan inilah yang berakibat pada gagalnya proses pemecahan karbohidrat menjadi bentuk monosakarida.

Sehingga dari hasil penelitian ini dapat memperlihatkan bahwa *Eucheuma denticulatum* merupakan salah satu jenis alga laut yang dapat dikembangkan menjadi obat alternative dalam mengatasi penyakit diabetes mellitus dengan cara menghambat penyerapan glukosa post prandial. Dimana zat aktif yang bertanggung jawab untuk efek ini adalah karagenan dan polyphenol.

#### KESIMPULAN

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa karagenan dan polifenol dari alga merah *eucheuma denticulatum* efektif sebagai agen antihyperglikemik yang dapat dikembangkan menjadi alternatif pengobatan diabetes melitus.

#### REFERENCE

- Aryudhani, N. 2007. *Kandungan senyawa fenol rumput laut Caulerpa racemosa dan aktivitas antioksidannya*. [Skripsi]. Bogor: Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- Atmadja, W.S., 1996. *Pengenalan Jenis Alga Merah (Rhodophyta)*. Pengenalan jenis-jenis rumput laut



- Indonesia. Puslitbang Oseanologi LIPI.
- Basmal, J., Syarifudin., Ma'ruf, W.F. 2003, Konsentrasi Larutan Potasium Hidroksida Terhadap Mutu Kappa-Karaginan Yang Diekstraksi dari *Eucheuma cottonii*, *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 9 (5): 95-103.
- Bhattacharyya S, O-Sullivan I, Katyal S, Unterman T and Tobacman JK (2012) Exposure to the common food additive carrageenan leads to glucose intolerance, insulin resistance and inhibition of insulin signaling in HepG2 cells and C57BL/6J mice. *Diabetologia*. 55(1): 194-203.
- Capes SE, Hunt D, Malmberg K, Gerstein HC. 2000. Stress hyperglycemia and increased risk of death after myocardial infarction in patients with and without diabetes: a systematic overview. *Lancet*. 355:773-778.
- Dumelod BD, Ramirez RPB, Tiangson CLP, Barrios EB, and Panlasigui LN. 1999. Carbohydrate availability of arroz caldo with lambda-carrageenan. *International Journal of Food Sciences and Nutrition*. 50: 283-9.
- Haddad PS, Musallam L, Martineau LC, Harris C, Lavoie L, Arnason JT. 2012. Comprehensive evidence-based assessment and prioritization of potential antidiabetic medicinal plants: A case study from Canadian eastern James Bay Cree traditional medicine. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, ECAM*. 10:1155/893426.
- Hanhineva, K., Törrönen. R., Bondia-Pons. I., Pekkinen, I., Kolehmainen, M., Mykkänen, H. 2010, Impact of Dietary Polyphenols on Carbohydrate Metabolism, *International Journal of Molecular Sciences*, 2: 1365-1402.
- Holdt, S.L., and Kraan, S. 2011. Bioactive compounds in seaweed: functional food applications and legislation. *Journal of Applied Phycology*. 23: 543-597.
- Lee, S.-H., Han, J.-S., Heo, S.-J., Hwang, J.-Y., & Jeon, Y.-J. 2010. Protective effects of dieckol isolated from *Ecklonia cava* against high glucose-induced oxidative stress in human umbilical endothelial cells. *Toxicology In Vitro*. 24, 375-381.
- Lee, S.-H., Li, Y., Karadeniz, F., Kim, M.-M., & Kim, S.-K. 2008. alpha-Glucosidase and alpha-amylase inhibitory activities of phloroglucinol derivatives from edible marine brown alga, *Ecklonia cava*. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 89, 1552-1558
- Manaf, A., 2010. *Use of Acarbose to Control Postprandial Hyperglycemic in Reducing Macrovascular Complication*. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang.
- Marianne, Yuandani, and Rosnani, 2011. Antidiabetic Activity from Ethanol Extract of Kluwih's Leaf (*Artocarpus camansi*). *Jurnal Natural*. 11, 64-68.



- Masharani U, Karam JH, and German MS. 2004. *Pancreatic hormones and diabetes mellitus*. In: Greenspan FS, Gardner DG, eds. *Basic and clinical endocrinology*. 7<sup>th</sup> edition. New York : MC Graw Hill Lange Medical Books. 658-721
- Nelson, D.L. and Cox. 2005. *Lehninger Principles of Biochemistry*. 4<sup>th</sup> ed. W H. Freeman.
- Nwosu, F., Jennifer M., Victoria A.L., Derek S., Heather A.R. and Gordon J. 2011. Anti-proliferative and potential anti-diabetic effect of phenolic-rich extracts from edible marine algae. *Food Chemistry*. (126): 1006-1012.
- Panlasigui LN, Baello OQ, Dimatungal JM, and Dumelod BD. 2003. Blood Cholesterol and lipid lowering effects of carrageenan on human volunteers. *Asia Pacific J Clin Nutr*. 12 (2) : 209-14
- Patel D, Prasad S, Kumar R, and Hemalatha S. 2012. An overview on antidiabetic medicinal plants having insulin mimetic property. *Asian Pac. J. Trop. Biomed*. 2(4):320-330.
- Petti, S. dan S. Crispian. 2009. A Review : Polyphenols, Oral Health and Disease. *Journal of Dentistry* 37 : 413-423.
- Ramalingan, J.R., Kaliaperumal, N., and Kalimuthu, S., 2003. Commercial scale production of carragenan from red algae. *Seaweed Res. Utiln*. 25, 37-46
- Ravi K, Rajasekaran S, and Subramanian S., 2005. Antihyperlipidemic effect of Eugenia jambolana seed kernel on streptozotocin induced diabetes in rats. *Food Chem. Toxic*. 43, 1433 –1439.
- Sadati, N., Khanavi, M., Mahrokh, A., Nabavi, SMB., Sohrabipour, J., and Hadjiakhoondi, A. 2011, Comparison Of Antioxidant Activity And Total Phenolic Contents Of Some Persian Gulf Marine Algae, *Journal of Medicinal Plants*. 10 (37) :73-79.
- Sankalia, M.G., Mashru, R. C., Sankalia, J.M., Sutariya, V.B. 2007, Reversed chitosan-alginate polyelectrolyte complex for stability improvement of alpha-amylase: Optimization and physicochemical characterization, *Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*, 65:215–232
- Sankalia, M.G., Mashru, R.C., Sankalia, J.M., Sutariya, V.B. 2006, Stability improvement of alpha-amylase entrapped in kappa-carrageenan beads: physicochemical characterization and optimization using composite index, *International Journal of Pharmaceutics*, 312:1–14.
- Shaw, J.E.; Sicree, R.A.; Zimmet, P.Z. 2010. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. *Diabetes Res. Clin. Pract*. 87, 4–14
- Singh, N. dan Rajini, P.S. 2004. Free Radical Scavenging Activity of an Aqueous Extract of Potato Peel. *Food Chemistry* 85: 611-616.
- Sudoyo, A.W., B. Setiyohadi, I. Alwi, K.M. Simadibrata dan S. Setiati. 2007. *Buku Ajar Ilmu*



- Penyakit Dalam Edisi Keempat Jilid Ketiga. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta.
- Uddin, N., Rakib H., Monir H., Arjyabrata S., Nazmul H., Mahmudul I., et.al., 2014. In vitro  $\alpha$ -amylase inhibitory activity and in-vivo hypoglycemic effect of methanol extract of *Citrus macroptera* Montr. fruit
- WHO, 2016. Global report on diabetes <http://www.who.int/diabetes/global-report/en/>; 2016 (Accessed 22.10.16).
- Widyastuti, S. 2010, Sifat Fisik dan Kimiawi Karagenan yang Diekstrak dari Rumput Laut *Eucheuma cottonii* Dan *E. spinosum* Pada Umur Panen yang Berbeda, *Agroteksos*, 20 (1): 41-50.
- Wikanta, T., Khaeroni, dan Rahayu. L. 2002. Pengaruh pemberian natrium alginat terhadap penurunan kadar glukosa darah tikus. *J. Penel. Perik. Indonesia*. 8(6): 21-32.
- Wikanta, T., Kurniawan, R., dan Rahayu, L. 2005. Pengaruh Pemberian i-karagenan dan k-karagenan terhadap penurunan kadar glukosa darah dan histopatologi usus kelinci. *J. Penel. Perik. Indonesia II*(8):57-68.
- Wikanta, T., Kurniawan, R., Rahayu, L. 2008. Pengaruh Pemberian K-Karagenan dan I-Karagenan Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Tikus hiperglikemia, *Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan*, 3 (2): 131-138.
- Yang B, Bhattacharyya S, Linhardt R and Tobacman JK. 2012. Exposure to common food additive carrageenan leads to reduced sulfatase activity and increase in sulfated glycosaminoglycans in human epithelial cells. *Biochimie*. 94(6): 1309-16.3
- Yeh GY, Eisenberg DM, Kaptchuk TJ, and Phillips RS., 2003. A systematic review of herbs and dietary supplements for glycemic control in diabetes. *Diabetes Care*. 26, 1277-1294
- You, Q., Chen, F., Wang, X., Jiang, Y. and Lin, S. 2012, Anti-diabetic activities of phenolic compounds in muscadine against alpha-glucosidase and pancreatic lipase, *LWT - Food Science and Technology*, 46: 164-168.
- Zhang, Q., Zhang J., Shen J., Silva A., Dennis D., and Barrow C., 2006. A simple 96-well microplate method for estimation of total polyphenol content in seaweeds, *Journal of Applied Phycology*. 18, 445-450.



**GAMBARAN TINGKAT KEJADIAN INTERAKSI OBAT PADA PASIEN PNEUMONIA DI RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR**

**DESCRIPTION OF INCIDENT LEVEL OF DRUG INTERACTIONS ON PATIENTS WITH PNEUMONIA AT RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODOMAKASSAR**

Zahira Amody, Herlina Rante, Irawaty Dhajaruddin  
 Bagian Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar  
 Email: [zahira.alamudi@gmail.com](mailto:zahira.alamudi@gmail.com)

**Abstrak**

Pneumonia merupakan penyebab utama kematian pada pasien dewasa terutama pasien geriatri dan pasien penyakit kronis yang memerlukan penggunaan obat-obat lain sehingga dapat meningkatkan peluang terjadinya *Drug Related Problems* (DRP) salah satunya adalah interaksi obat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan jumlah kejadian kasus interaksi obat pada pasien pneumonia berdasarkan *drug interaction facts* dengan mengetahui *onset*, *severity* dan mekanisme interaksi obat. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo. Penelitian bersifat retrospektif karena data yang diambil merupakan data pengobatan pada rekam medis pasien pneumonia. Data diambil selama setahun yaitu dari bulan Oktober 2014 - September 2015. Pasien pneumonia yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 59 pasien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penderita pneumonia yang paling banyak berjenis kelamin laki-laki yaitu 45 orang (76,3%). Penggunaan antibiotik untuk terapi pneumonia yang paling banyak digunakan yaitu ceftriaxone sebanyak 41,38%. Gambaran kejadian interaksi Obat berdasarkan Tatro yang paling banyak terjadi adalah pada tingkat signifikansi 2 sebesar 25 kasus (31,25%), *onset* tertunda sebesar 75 kasus (93,75%), dan *severity* sedang sebesar 47 kasus (58,75%). Mekanisme interaksi obat yang paling banyak adalah farmakokinetik sebesar 63 kasus (78,75%).

**Kata kunci :** interaksi obat, pneumonia.

**PENDAHULUAN**

Pneumonia adalah penyakit yang umum terjadi pada semua umur, terutama pada anak-anak dan pada populasi geriatri. Sekitar 1% dari seluruh penduduk yaitu 0,1 -1,5% dari populasi geriatri terkena pneumonia pertahun.

Kejadian *Community acquired pneumonia* (CAP) dua sampai empat kali lebih tinggi pada orang berusia di atas 60 tahun dibandingkan pada mereka yang berusia 50 tahun (Dhar, 2012).

Rerata insiden tahunan di Amerika adalah 6/1000 pada kelompok



umur 18-39 tahun dan meningkat menjadi 34/1000 pada kelompok umur diatas 75 tahun. Sekitar 20-40% pasien pneumonia komunitas memerlukan perawatan rumah sakit dan sekitar 5-10% memerlukan perawatan intensif. Pneumonia termasuk dalam 10 besar penyakit rawat inap rumah sakit di Indonesia dengan proporsi kasus 53,95% laki-laki dan 46,05% perempuan, dengan *crude fatality rate* (CFR) 7,6%, paling tinggi bila dibandingkan penyakit lainnya (PDPI,2014).

Pemilihan dan penggunaan terapi antibiotika yang tepat dan rasional akan menentukan keberhasilan pengobatan untuk menghindari terjadinya resistensi bakteri, selain itu tidak tertutup kemungkinan penggunaan obat-obat yang lain dapat meningkatkan peluang terjadinya Drug Related Problems (DRP) (Suharjono, 2009).

Sejumlah besar obat baru yang dilepas di pasar setiap tahunnya menyebabkan munculnya interaksi baru antar obat akan semakin sering terjadi (Gitawati, 2008). Pemberian antibiotik secara bersamaan dengan antibiotik lain, obat lain atau akan dapat menimbulkan efek yang tidak

diharapkan. Efek dari interaksi yang dapat terjadi cukup beragam mulai dari yang ringan seperti penurunan absorpsi obat atau penundaan absorpsi hingga meningkatkan efek toksik obat lainnya (Kemenkes RI, 2011).

Seseorang mengalami risiko efek samping karena interaksi obat, dan seberapa jauh risiko efek samping dapat dikurangi diperlukan jika akan mengganti obat yang berinteraksi dengan obat alternatif. Pengetahuan tentang bagaimana mekanisme interaksi antar obat akan membantu memperkirakan kemungkinan reaksi obat yang tidak dikehendaki yang akan terjadi dan melakukan antisipasi terhadap reaksi tersebut (Gitawati, 2008).

Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo adalah Rumah Sakit Regional tipe A yang berfungsi sebagai Rumah Sakit rujukan utama di Indonesia Timur. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi terjadinya interaksi obat antara obat pneumonia dan obat non pneumonia dan antara obat-obat lain selain obat pneumonia yang diberikan pada pasien pneumonia di RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.



## METODE PENELITIAN

### Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada periode bulan Agustus hingga Oktober 2015 dan lokasi penelitian di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

### Alat dan Bahan Penelitian

Bahan penelitian untuk mengidentifikasi interaksi obat pada pasien pneumonia berupa data pasien meliputi informasi umum pasien (usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan), regimen terapi (jenis obat, dosis pemberian dan aturan pemakaian) dan rekam medik serta data penunjang lainnya.

Alat penelitian untuk mengidentifikasi potensi interaksi obat pada pasien pneumonia digunakan standar acuan yaitu: *Pharmaceutical Care Untuk penyakit infeksi saluran pernapasan, Pneumonia komuniti : pedoman Diagnosis Dan Penatalaksanaan Di Indonesia, Infectious diseases society of america/American Thoracic society consensus guidelines on the Management of community-acquired pneumonia In adults* sebagai paduan pengobatan pneumonia. *Drug Information*

*Handbook* volume 1 dan 2 dan *Handbook of antimicrobial therapy* yang digunakan untuk menganalisis khasiat obat-obat yang digunakan, *Drug Interaction Facts* oleh David S. Tatro dan *Drug interactions in infectious diseases* untuk menganalisis interaksi obat berdasarkan level signifikansi interaksi obat. Parameter penelitian untuk mengidentifikasi interaksi obat pada pasien pneumonia antara lain: karakteristik pasien, jenis obat pneumonia, obat non pneumonia yang diterima pasien.

### Prosedur penelitian

#### 1. Pengajuan proposal penelitian

Berdasarkan kajian literatur dan studi pustaka maka proposal berjudul Identifikasi Interaksi Obat terhadap Pasien pneumonia di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ini disusun dan diajukan.

#### 2. Pengajuan izin etika penelitian (ethical clearance)

Penelitian dilakukan melibatkan sampel penelitian berupa pasien pneumonia untuk mendapat data sesuai tujuan penelitian diperlukan pengajuan



izin etika penelitian kepada Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.

Adapun nomor izin etika penelitian yang telah dikeluarkan untuk penelitian ini yaitu 1551/H4.8.4.5.31/PP36-KOMETIK/2015 (Lampiran 1).

### 3. Pengajuan izin penelitian di Rumah Sakit Umum Pusat

Rencana penelitian akan dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Untuk mendapatkan ijin penelitian, dibuat surat permohonan izin penelitian kepada Direktur melalui bagian Pendidikan dan Penelitian (Diklit) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

### 4. Penetapan sampel yang akan di evaluasi

Sampel adalah pasien dengan kriteria inklusi pasien pneumonia rawat inap

### 5. Pengambilan Data

#### a. Pencatatan rekam medis pasien

Jenis data yang dikumpulkan selama penelitian meliputi karakteristik pasien (nama,

nomor rekam medis, usia, jenis kelamin, tinggi badan, bobot badan) serta kondisi klinis pasien.

#### b. Data profil pengobatan

Jenis data profil pengobatan pasien yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi interaksi obat meliputi regimen terapi (jenis obat, jumlah obat, dosis pemberian, dan aturan pemakaian) serta data pelengkap sesuai rekam medis pasien, antara lain hasil diagnosis, hasil laboratorium, dan foto *rontgen* dada.

### Analisis Data

Data pengobatan pasien (rekam medis) dikumpulkan kemudian dilakukan sampling menggunakan *proportionate stratified random sampling*. Pasien dikelompokkan berdasarkan karakteristik pasien, meliputi jenis kelamin dan kelompok umur. Sejumlah rekam medis yang diambil datanya kemudian dimasukkan dalam lembar pengumpulan data untuk setiap rekam medis pasien dan dilakukan identifikasi apakah memenuhi kriteria



inklusi dan eksklusi. Evaluasi interaksi obat dilakukan secara teoritik berdasarkan studi literatur (berdasarkan standar *Drug Interaction Facts*). Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif. Potensi interaksi dikategorikan menurut level signifikansi interaksi obat dan selanjutnya ditentukan persentase terjadinya interaksi obat antibiotik pneumonia dengan obat non pneumonia (berdasarkan kategori signifikansi potensi interaksi). Persentase mekanisme interaksi obat baik yang meliputi mekanisme interaksi farmakokinetik maupun farmakodinamik. Data yang didapatkan kemudian disusun dan dikelompokkan berdasarkan analisis yang akan dilakukan.

**HASIL dan PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil kajian interaksi obat pada pasien pneumonia di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, maka kejadian interaksi obat terangkum sebagaimana tabel 1 dan tabel 2. Setelah data penelitian mengenai interaksi obat secara teoritis berdasarkan taraf signifikansi, *onset*, dan potensi keparahan interaksi obat menurut Tatro (2009) dievaluasi, diperoleh hasil bahwa interaksi obat pada pasien pneumonia yang paling banyak terjadi adalah pada taraf signifikansi 2 yaitu antara obat pneumonia dan obat non pneumonia sebesar 25 kasus (31,25%). *Onset* tertund yaitu sebesar 75 kasus (93,75%), dan *severity* atau potensi keparahan interaksi obat yaitu sedang sebesar 47 kasus (58,75%) dari total 80 kejadian yang mengalami interaksi obat.

Tingkat Signifikansi	Total Kasus Tingkat Signifikansi	Persentase (%)
Signifikansi 1	5	6,25
Signifikansi 2	25	31,25
Signifikansi 3	5	6,25
Signifikansi 4	23	28,75
Signifikansi 5	22	27,5
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>

*Tabel 1. Total kasus interaksi obat berdasarkan tingkat signifikansi*



Tingkat Signifikansi	Onset		Potensi Keparahan Interaksi Obat		
	Cepat	Tertunda	Berat	Sedang	Ringan
1	1	4	5	-	-
2	3	22	-	24	1
3	-	5	-	-	5
4	1	22	-	23	-
5	-	22	11	-	11
Jumlah Kasus	5	75	16	47	17
Total	80		80		
Persentase (%)	6,25	93,75	20,00	58,75	21,25
Total	100%		100%		

Tabel 2. Total kejadian interaksi obat berdasarkan onset dan potensi keparahan interaksi obat

Dari penelitian ini didapat kejadian. Data mekanisme interaksi obat interaksi farmakokinetik sebesar 63 dapat dilihat pada tabel 3 yang kasus (78,75%). interaksi menunjukkan bahwa interaksi obat farmakodinamik sebesar 9 kasus terbanyak ada pada mekanisme (11,25%). dan belum diketahui farmakokinetik sebesar 79,27%. mekanisme interaksinya sebesar 8 kasus (10,00%) dari total kasus sebesar 80

Mekanisme Interaksi	Jumlah Kasus	Persentase (%)
Farmakokinetik	63	78,75
Farmakodinamik	9	11,25
Belum Diketahui	8	10,00

Tabel 3. Data mekanisme interaksi obat

Potensi interaksi obat adalah potensi aksi suatu obat diubah atau dipengaruhi oleh obat lain yang diberikan bersamaan. Potensi interaksi obat kategori signifikansi 1 diketahui

kemungkinan besar terjadi interaksi yang berat dan mengancam jiwa berupa peningkatan lama waktu tinggal di rumah sakit bahkan kematian sehingga memerlukan perhatian khusus



dibandingkan dengan kategori signifikansi 2, 3, 4 dan 5 (Sari, 2012).

Manifestasi antibiotik dalam interaksi obat memiliki tingkat keparahan yang berbeda dengan mekanisme interaksi yang berbeda yaitu interaksi yang melibatkan aspek farmakokinetik obat dan interaksi yang mempengaruhi respon farmakodinamik obat. Dokter dan apoteker terlibat dalam hal tinjauan obat, pemantauan terapi obat (PTO), atau konsultasi pada pilihan obat atau dosis untuk meminimalkan terjadinya interaksi antara obat antimikroba dengan obat lain untuk menghindari toksisitas, efek samping, atau pengobatan yang tidak sesuai. Interaksi paling banyak terjadi adalah interaksi farmakokinetik, interaksi farmakokinetik ini dapat diatur dengan penyesuaian dosis dan dengan pemantauan terapi obat (PTO) atau tanda-tanda vital (Bolhuis, 2011).

Beberapa kejadian interaksi obat sebenarnya dapat diprediksi sebelumnya dengan mengetahui efek farmakodinamik serta mekanisme farmakokinetika obat-obat tersebut. Pengetahuan mengenai hal ini akan bermanfaat dalam melakukan upaya pencegahan terhadap efek merugikan

yang dapat ditimbulkan akibat interaksi obat. Beberapa langkah dapat diambil untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya interaksi. Penatalaksanaan interaksi obat yang dapat dilakukan antara lain adalah menghindari kombinasi obat dengan memilih obat pengganti yang tidak berinteraksi, penyesuaian dosis obat, penyesuaian interval pemberian obat, perubahan pada rute pemberian obat, pemantauan pasien atau meneruskan pengobatan seperti sebelumnya jika kombinasi obat yang berinteraksi tersebut merupakan pengobatan yang optimal atau bila interaksi tersebut tidak bermakna secara klinis (Piscitelli & Masur, 2005).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Gambaran tingkat kejadian interaksi obat pada pasien pneumonia di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang paling banyak terjadi adalah pada tingkat signifikansi 2 yaitu interaksi obat yang memiliki tingkat keparahan moderat (sedang) dengan onset tertunda (tidak langsung terjadi), dan mempunyai level kejadian interaksi obat suspected (interaksi obat diduga terjadi) sebesar 25 kasus (31,25%),



onset tertundasebesar 75 kasus (93,75%), dan severity atau potensi keparahan interaksi obat yaitu sedangsebesar 47 kasus (58,75%). Mekanisme interaksi obat yang paling banyak adalah farmakokinetik sebesar 63 kasus (78,75%).

#### Saran

1. Sebaiknya perlu ditingkatkan komunikasi antara apoteker dengan dokter dalam menentukan terapi untuk mencegah terjadinya interaksi obat.
2. Hendaknya dilakukan penelitian dengan metode prospektif agar diketahui efek samping obat pada potensi interaksi obat tertentu utamanya yang efeknya berat dan mengancam jiwa berupa peningkatan lama waktu tinggal di Rumah Sakit bahkan kematian yang ditimbulkan akibat interaksi obat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adusumulli, P.K and Adepu R.(2014). Drug Related Problems : An Over View of Various Classification Systems Vol 7. Issue 4, 7

Bente, F., Tina, B., et al. (2012). Prevalence of Drug-Related

Problems in Self-Medication in Danish Community Pharmacies. Department of Medicine, Center for Drug Information and Pharmacy Practice (ZAPP), ABDA-Federal Union of German Associations of Pharmacists, Berlin, Germany .Vol. 3, No. 4. 1.

Bolhuis, M., Panday, P. N., Pranger, A. D and Kosterink, J.G., (2011). Pharmacokinetic Drug Interactions of Antimicrobial Drugs: A Systematic Review on Oxazolidinones, Rifamycines, Macrolides, Fluoroquinolones, And Beta-Lactams. Pharmaceutics Journal. 3, 865 - 866

Caballero, J., Rello, J. (2011). Combination Antibiotic Therapy for Community acquired Pneumonia. Annals of Intensive Care Journal. 48, 1

Chelmow, D., Geibel J., Grimm L., Harris, J.E., Maron, D.J., Meyers, A.D. Drug Interaction Checker, Medscape (online), (<http://reference.medscape.com/drug-interaction-checker>, diakses 12 Desember 2015)

Cipolle, R.J., Strand L.M., and Morley P.C..(2007). Pharmaceutical Care Practice. The McGraw-Hill Companies, New York.

Dhar, R. (2012). Pneumonia.: Review of Guidelines. . Supplement to JapiJournal . Vol. 60, 25



- Gitawati.,R. (2008). Interaksi Obat dan Beberapa Implikasinya. Media Litbang Kesehatan Volume XVIII Nomor 4.
- Himansu, R., Vinay, K., Sharadamma, KC., Radhakrishna., PM. (2012). Comparative Study of Antimicrobial Activity of Ceftriaxone in Combination With Sulbactam and Tazobactam Using Disc Diffusion Method. International Research Journal of Pharmacy 3 (5), 331
- Jeremy. P.T., Jane. W. (2008) . At a Glance : Sistem Respirasi edisi kedua. Penerbit Erlangga: Jakarta , 76. 77, 78
- Kemenkes. (2011). Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 2406/menkes/per/xii/2011. Jakarta, 9 - 10
- Kyung, H., Ah, Jeong, K., and Inja, S. (2010). Risk Factors of Drug Interaction between Warfarin and Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs in Practical Setting. Journal Korean Medicine Sci. 25, 337- 339
- Marsono, Yuda. (2015). Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia Dengan Metode Gyssens di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Moewardi. Surakarta. Fakultas farmasi UMS
- Mutalik, M. and Sanghavi, D. (2014). Review of Drug Interactions: A Comprehensive Update. British Journal of Pharmaceutical Research 4(8), 962 – 968
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. (2014). Pneumonia komuniti : pedoman Diagnosis Dan Penatalaksanaan di Indonesia. Jakarta, 3 – 32
- PCNE. (2010). Classification for Drug related problems (revised 14-01-2010) V6.2. Pharmaceutical Care Network Europe Foundation.
- Peto, L. (2014). The Bacterial Aetiology of Adult Community-Acquired Pneumonia in Asia: A Systematic Review. Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene Journal 108, 326
- Rab, Tabrani. (2010). Ilmu Penyakit Paru. Trans Info Media. Jakarta, 143 – 146
- Sari, A.dkk. (2012). Identification of potential drug Interactions in ward patients at margono Soekarjo purwokerto's hospital : A retrospective observational study in November 2009 - january 2010. Jurnal Ilmiah Kefarmasian, Vol. 2, No. 2.Yogyakarta.
- Slyvia., A. (2014). Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit Edisi 6 Volume 2 . Penerbit : EGC.



Sudoyo, W. Dkk. (2009). Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam jilid III edisi V. Interna Publishing Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit Dalam di Ponegoro 71 : Jakarta Pusat, 2196 – 2205

Tatro, D.S. (2009). Drug Interaction Facts. Facts and Comparisons Publishing Group. San Carlos. California

Tatjana p., et al. (2011). Prognostic Mortality Factors of

CommunityAquired Pneumonia in the Elderly. Acta facultatis medicae naissensis journal. Vol 28, no 2, 72

Udupa, A., Gupta, P. (2011). Antibiotic Therapy in Pneumonia : a Comparative Study of Oral Antibiotics in a Rural Healthcare Centre. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Vol 3, 156



## STUDI REKAM MEDIK PASIEN EPILEPSI PEDIATRIK DI BEBERAPA RUMAH SAKIT

Asril Burhan, Abd.Halim Umar, Zulham, Mauizatul latifah

Akademi Farmasi Kebangsaan Makassar  
asrilburhan@gmail.com

### ABSTRAK

Angka penderita epilepsi di dunia masih sangat tinggi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Insiden epilepsi tertinggi terjadi pada anak-anak dan merupakan penyakit neurologis utama pada kelompok usia tersebut. Pengobatan dengan obat antikonvulsan merupakan terapi pasien epilepsi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jumlah pasien epilepsi pediatrik berdasarkan jenis kelamin, range umur dan penggunaan obat antikonvulsan pada pasien epilepsi pediatrik di RSUD Islam Faisal, RSUD Kota Makassar dan RSUD Salewangan Maros. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode purposive sampling. Penelitian ini dilakukan dengan mendata rekam medik rawat inap pasien epilepsi pediatrik pada periode Januari-Desember 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Islam Faisal, RSUD Kota Makassar dan RSUD Salewangan Maros, masing-masing berjumlah 6 pasien, 4 pasien dan 6 pasien. Jumlah pasien epilepsi pediatrik di tiga rumah sakit berjumlah 16 orang, perempuan 7 orang dan laki-laki 9 orang. Pasien dengan range usia 1-3 tahun berjumlah 4 orang, 4-6 tahun berjumlah 4 orang, 7-9 tahun berjumlah 1 orang, 10-12 tahun berjumlah 2 orang, 13-15 tahun berjumlah 3 orang dan 16-18 tahun berjumlah 2 orang. Jenis obat antikonvulsan yang sering diberikan pada pasien epilepsi pediatrik yaitu fenitoin (golongan hidantoin), fenobarbital (golongan barbiturat), karbamazepin, diazepam dan klobazam (golongan benzodiazepin) dan valproat.

**Kata kunci:** Rekam medik, antikonvulsan, epilepsi.

### PENDAHULUAN

Angka penderita epilepsi di dunia masih sangat tinggi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Insiden epilepsi tertinggi terjadi pada anak-anak dan merupakan penyakit neurologis utama pada kelompok usia tersebut.

Pengobatan dengan obat antikonvulsan merupakan terapi epilepsi yang digunakan pada pasien epilepsi. Epilepsi yang terjadi pada anak-anak harus mendapat perhatian khusus. Sebab, penggunaan antikonvulsan untuk terapi epilepsi membutuhkan waktu yang lama



dan seringkali memerlukan lebih dari satu obat.

Pada prinsipnya, obat antikonvulsan pada terapi epilepsi bekerja untuk menghambat proses inisiasi dan penyebaran kejang. Namun, umumnya obat antiepilepsi lebih cenderung bersifat membatasi proses penyebaran kejang dari pada mencegah proses inisiasi. Dengan demikian, ada dua mekanisme kerja obat antikonvulsan yaitu peningkatan inhibisi (GABA-ergik) dan penurunan eksitasi yang kemudian memodifikasi konduksi ion  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{K}^+$ , dan  $\text{Cl}^-$  (Mardjono, 2012).

Obat-obat antikonvulsan yang digunakan dalam terapi epilepsi yaitu: golongan hidantoin (fenitoin), golongan barbiturat (fenobarbital, primidon), golongan oksazolidindion (trimetadion), golongan suksinimid (etosuksimid, metsuksimid dan fensuksimid), karbamazepin, golongan benzodiazepin (diazepam, klonazepam, nitrazepam), asam valproat, dan antikonvulsan lainnya (fenasemid, asetazolamid, vigabatrin, lamotrigin, gabapentin, tiagabin, zonisamid, levetirasetam, topiramet) (Mardjono, 2012).

### Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang diteliti antara lain :

1. Berapakah jumlah pasien epilepsi pediatrik rawat inap di RSUD Islam Faisal, RSUD Kota Makassar dan RSUD Salewangan Maros ?
2. Berapakah jumlah pasien epilepsi pediatrik berdasarkan jenis kelamin dan range usia di RSUD Islam Faisal, RSUD Kota Makassar dan RSUD Salewangan Maros ?
3. Obat antikonvulsan apa saja yang diresepkan pada pasien pediatrik di RSUD Islam Faisal, RSUD Kota Makassar dan RSUD Salewangan Maros?

### Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui jumlah pasien epilepsi pediatrik berdasarkan jenis kelamin, range umur dan penggunaan obat antikonvulsan pada pasien epilepsi pediatrik di RSUD Islam Faisal, RSUD Kota Makassar dan RSUD Salewangan Maros.

### Manfaat Penelitian



1. Untuk mengembangkan kemampuan setelah memperoleh ilmu baik secara teori maupun praktik.
2. Dapat memberikan tambahan wawasan tentang penggunaan obat antikonvulsan pada pasien pediatrik.
3. Dapat memberikan tambahan informasi tentang penyakit epilepsi, khususnya dalam pola penggunaan obat antikonvulsan pada pasien pediatrik.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisa dengan pendekatan kuantitatif, suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sampai selesai di beberapa rumah sakit yang dipilih secara purposive sampling yaitu Rumah Sakit Umum Islam Faisal, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Maros.

### Definisi Operasional

Studi rekam medik data penelitian adalah studi terkait dengan jenis obat antikonvulsan, jenis kelamin pasien, range umur pasien, kombinasi obat dan bentuk peresepan obat antikonvulsan.

### Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah semua rekam medik untuk pasien epilepsi pada pediatrik di rumah sakit tempat penelitian.

Sampel yang digunakan yaitu rekam medik untuk pasien epilepsi pada pediatrik di bulan Januari-Desember 2015 di rumah sakit tempat penelitian.

### Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas : Rumah Sakit
2. Variabel terikat : Obat Antikonvulsan Pasien Pediatrik

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data rekam medik yang diambil secara retrospektif dan



dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang didapat langsung dari rumah sakit saat penelitian berlangsung. Data ini diperoleh dari rekam medik yang ada di rumah sakit berdasarkan penggunaan obat antikonvulsan pada pasien pediatrik di rumah sakit tempat penelitian.

**Analisis Data**


Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deksriptif secara kuantitatif. Pada lembar pengumpulan data dibuat rekapitulasi data-data yang diperoleh ke

dalam sebuah tabel induk yang memuat umur, jenis kelamin, jenis bangkitan/kejang, riwayat penyakit, terapi antikonvulsan dan kombinasi obat yang diberikan, rute pemakaian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Epilepsi ditandai dengan kejang berulang yang disebabkan oleh pelapasan sinkron berulang, abnormal dan berlebihan dari neuron otak. jumlah kasus epilepsi di Indonesia sulit diperkirakan, karena kondisi tanpa serangan, pasien terlihat normal (Ikawati, 2011).

**Jumlah Pasien Epilepsi Pediatrik (Anak) di Tiga Rumah Sakit Periode Januari- Desember 2015**



**Gambar 1. Jumlah Pasien Di Tiga Rumah Sakit**


Berdasarkan Gambar 1. Dapat dilihat jumlah pasien epilepsi pediatrik pada periode Januari-Desember 2015 di beberapa rumah sakit yang telah diteliti. Data pasien tersebut diambil dari rekam medik pasien rawat inap

setiap rumah sakit. RSUD Kota Makassar dipilih sebagai rumah sakit tempat penelitian karena rumah sakit ini merupakan rumah sakit pemerintah tipe B yang dekat dengan pasar tradisional dan terletak di pemukiman padat



penduduk. Populasi pasien epilepsi pediatrik di RSUD Kota Makassar berjumlah 4 pasien. RSUD Islam Faisal sebagai rumah sakit tempat penelitian karena rumah sakit ini merupakan rumah sakit swasta tipe B, peneliti ingin membandingkan penggunaan obat yang diberikan pada pasien epilepsi pediatrik di rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah. Pasien epilepsi pediatrik di RSUD Islam Faisal berjumlah 6 orang. Rumah sakit tepat

penelitian terakhir yaitu RSUD Salewangan Maros. Pemilihan rumah sakit ini sebagai tempat penelitian karena rumah sakit ini berada diluar Kota Makassar, RSUD Salewangan Maros merupakan rumah sakit negeri tipe C. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui seberapa banyak pasien epilepsi pediatrik dan penggunaan obat antikonvulsan di rumah sakit tersebut. Pasien epilepsi pediatrik di RSUD Salewangan Maros berjumlah 6 orang.



**Gambar 2. Perbandingan Pasien Berdasarkan Jenis kelamin**

Berdasarkan Gambar 2. Hasil penelitian dari beberapa rumah sakit, jumlah pasien epilepsi pada pediatrik lebih dominan pada jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan. Menurut Tammase (2013) anak laki-laki lebih dominan, dengan ratio laki-laki dan perempuan adalah perbandingan 3:2.

Dari data yang diperoleh jumlah penderita pasien epilepsi pediatrik berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9 orang sedangkan pasien epilepsi pediatrik berjumlah 7 orang. Beberapa artikel mengatakan faktor sering terjadinya kejang demam pada anak laki-laki dari pada anak perempuan disebabkan oleh maturasi



serebral atau perkembangan otak anak perempuan lebih cepat dibandingkan

anak laki-laki.

Jumlah Pasien Berdasarkan Range Usia



Gambar 3. Jumlah Pasien Berdasarkan Usia

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 Ayat :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Ikawati (2011) sebuah studi melaporkan bahwa prevalensi epilepsi di Indonesia berkisar 0,5% sampai 2% dari jumlah penduduk. Insiden paling tinggi pada usia 20 tahun pertama, epilepsi terjadi sebelum usia 18 tahun pertama. Dari data yang didapat melalui rekam medik dari rumah sakit tempat penelitian, pasien yang berusia antara 1 sampai 3 tahun berjumlah 4 orang,

pasien yang berusia 4 sampai 6 tahun berjumlah 4 pasien, selanjutnya pasien yang berusia 7 sampai 9 tahun berjumlah 1 pasien, pasien yang berusia 10 sampai 12 tahun berjumlah 2 pasien, pasien yang berusia 13 sampai 15 tahun berjumlah 3 orang, sedangkan pasien yang berusia 16 sampai 18 tahun berjumlah 2 pasien.


Data hasil penelitian menunjukkan usia yang paling banyak mengalami serangan epilepsi/kejang pada usia 1-3 tahun yang disebabkan pasien mengalami kejang dengan tipe *infantile spasms*. Menurut Ikawati (2011) *Infantile spasme* mulai terjadi pada



usia antara 3 sampai 12 bulan dan umumnya berhenti pada usia 2 sampai 4 tahun. Selain itu pada usia 4-6 tahun, ada 4 pasien yang mengalami konvulsi. Kejang demam terjadi pada 2-4% anak berumur 6 bulan - 5 tahun. Anak yang pernah mengalami kejang tanpa demam, kemudian kejang demam kembali tidak termasuk dalam kejang demam. Kejang disertai demam pada bayi berumur kurang dari 6 bulan atau lebih dari 5 tahun mengalami kejang didahului demam, pikirkan kemungkinan lain misalnya infeksi SSP atau epilepsi yang kebutulan terjadi bersamaan dengan demam. Selain dari usia 4-6 tahun, pasien

yang berusia 13-15 tahun juga sering mengalami epilepsy BCECTS. Menurut Tammase (2013) BCECTS (*Benign Childhood Epilepsy With Centrotemporal Spikes*) merupakan sindrom epilepsi terbanyak pada anak. Sindrom epilepsi ini ditandai dengan bangkitan parsial sederhana dan bangkitan motorik hemifasial yang berlangsung singkat dan berhubungan dengan gejala somato serta dapat berkembang menjadi bangkitan umum tonik- klonik. Dilaporkan insidensi penyakit ini antara 7,1-21 per 100.000 pada anak di bawah 15 tahun (Tammase 2013).

**Jumlah Pasien Berdasarkan Peresepan Obat Antikonvulsan**




**Gambar 4. Bentuk Peresepan Obat Antikonvulsan**



Berdasarkan Gambar 4. diatas dapat dilihat bahwa pasien yang mengalami epilepsi lebih banyak mendapatkan peresepan kombinasi. Peresepan kombinasi yang dimaksud yaitu resep yang mengandung 2 komponen obat antikonvulsan yang digunakan pada satu pasien. Data yang diperoleh dari rekam medik pada rumah sakit tempat penelitian, peresepan obat antikonvulsan dalam bentuk tunggal berjumlah 6 pasien, sedangkan peresepan obat antikonvulsan dalam bentuk kombinasi berjumlah 10 pasien. Menurut Ikawati (2011) Farmakoterapi epilepsi sangat individual dan membutuhkan dosis yang tepat untuk mengoptimisasi terapi obat antikonvulsan (maksimal dalam mengontrol kejang dengan efek samping yang minimal). Menurut Sukandar (2009) pengobatan dengan monoterapi, sekitar 50- 70% dapat

diobati dengan satu macam obat antikonvulsan, tetapi tidak semua bebas kejang. Lebih dari 60% pasien dengan epilepsi tidak patuh menggunakan batnya, dan hal ini merupakan alasan utama kegagalan pengobatan. Oleh karena itu, pengobatan kombinasi obat antikonvulsan juga diperlukan, dengan syarat bila obat telah melebihi kadar terapi sedangkan efek terapi belum tercapai atau efek toksik telah muncul maka penggunaan obat pengganti merupakan keharusan. Obat pertama harus diturunkan secara bertahap untuk menghindari status epileptikus. Bilamana dianggap perlu terapi kombinasi juga dibenarkan. (Mardjono, 2012). Peresepan kombinasi dilakukan pada pasien yang telah mengalami tipe eplepsi seperti tonik-klonik (*Grand Mal*), epilepsi petit mal dan status epileptikus





Berdasarkan Gambar 5. Obat antikonvulsan yang sering diberikan kepada pasien epilepsi pediatrik yaitu fenitoin, fenobarbital, karbamazepin, valproat, diazepam dan klobazam. Namun, dari beberapa obat antikonvulsan yang paling sering digunakan yaitu fenitoin, valproat dan diazepam dengan sediaan suppositoria.

Pada penggunaan obat yang fenitoin yang merupakan terapi lini pertama hampir semua jenis epilepsi, kecuali bangkitan lena (*petit mal*). Fenitoin merupakan obat antikonvulsan. obat fenitoin dapat meningkatkan inaktivasi kanal  $\text{Na}^+$  memiliki mekanisme aksi menurunkan kemampuan syaraf untuk menghantarkan muatan listrik (Ikawati, 2011).

Penggunaan diazepam dalam bentuk sediaan suppositoria banyak digunakan pada pasien epilepsi, terutama pasien yang kehilangan kesadaran. Menurut Murdjono (2012) Diazepam terutama digunakan untuk terapi konvulsi, misalnya status epileptikus. Obat ini juga bermanfaat untuk bangkitan parsial sederhana, misalnya bangkitan klonik fokal. Untuk

mengatasi bangkitan epileptikus pada orang dewasa diazepam IV dengan dosis 0,2 mg/kgBB, sedangkan pada anak-anak dapat diberikan diazepam intravena dengan dosis 0,15-0,3 mg/kgBB. Diazepam dapat mengendalikan kejang sekitar 80- 90%. Pemberian per rektal dengan dosis 0,5-1mg/kgBB diazepam untuk bayi dan anak dibawah 11 tahun. Efek samping berat dan berbahaya yang menggunakan diazepam IV ialah obstruksi saluran nafas oleh lidah akibat relaksasi otot, selain itu juga dapat terjadi depresi nafas sampai henti nafas, hipotensi, henti jantung dan kantuk (Murdjono, 2012). Diazepam merupakan obat agonis reseptor GABA bekerja dengan meningkatkan transmisi inhibitori dengan mengaktifkan kerja reseptor GABA (Ikawati, 2011).

Penggunaan valproat sebagai obat antikonvulsan saat ini sangat berguna terutama untuk bangkitan lena/absence maupun kombinasi lena dengan tonik-klonik. Valproat merupakan obat yang menginaktivasi kanal  $\text{Na}^+$  memiliki mekanisme aksi menurunkan kemampuan syaraf




untuk menghantarkan muatan listrik (Ikawati, 2011).

Fenobarbital diketahui memiliki efek antikonvulsi spesifik, yang berarti efek anti konvulsinya tidak berkaitan langsung dengan efek hipnotiknya. Di Indonesia fenobarbital masih banyak digunakan (Murdjono, 2012). Fenobarbital merupakan agonis reseptor GABA bekerja dengan meningkatkan transmisi inhibitori dengan mengaktifkan kerja reseptor GABA (Ikawati, 2011).

Penggunaan karbamazepin merupakan salah satu obat antikonvulsan yang saat ini sering digunakan, karbamazepin biasa

digunakan untuk bangkitan parsial sederhana maupun kompleks (Mardjono, 2012). Mekanisme kerja karbamazepin yaitu meningkatkan inaktivasi kanal Na<sup>+</sup> pada membran sel akson sehingga memiliki mekanisme aksi menurunkan kemampuan syaraf untuk menghantarkan muatan listrik (Ikawati, 2011). yang bekerja dengan meningkatkan transmisi inhibitori dengan mengaktifkan kerja reseptor GABA Penggunaan klobazam yang merupakan obat terapi lini kedua, klobazam merupakan golongan obat benzodiazepin. Klobazam merupakan obat agonis resptor (Ikawati, 2012).



Gambar 6. Penggunaan Kombinasi Obat



Pada Gambar 6. Hasil penelitian golongan obat yang sering digunakan pada pasien epilepsi pediatrik yaitu peresepan analgetik-antipiretik yang sering diberikan kepada pasien yaitu paracetamol dan tramadol. Golongan antihistamin seperti ranitidin dan cetirizin. Golongan obat lambung seperti antasida, omeprazole dan lansoprazole. Vitamin seperti B6, B12, asam folat, calnik, imbost, dan zamel. Obat antiemetikum seperti ondansetran. Golongan antibiotik seperti cefadroxil, ceftriaxone, gentamicin, cefotaxime, ampicilin, oxytetrasiklin dan amoxicilin. Golongan antiinflamasi yaitu dexametasone dan metil prednisolon. Cairan elektrolit yaitu ringer laktat, asering, NaCl 0,9% dan dextrosa 5%. Golongan neurotransmitter yaitu dopamin dan epinefrin. Golongan neurotropik yaitu piracetam, sedangkan untuk obat mukolitik yaitu ambroxol

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Populasi pasien epilepsi pediatrik (anak) pada periode

Januari-Desember 2015 di RSUD Kota Makassar berjumlah 4 orang, RSUD Salewangan Maros berjumlah 6 orang dan RSU Islam Faisal berjumlah 6 orang.

2. Jumlah pasien epilepsi

pediatrik (anak) di tiga rumah sakit berjumlah 16 orang, perempuan 7 orang dan laki-laki 9 orang. Pasien dengan range usia 1-3 tahun berjumlah 4 orang, 4-6 tahun berjumlah 4 orang, 7-9 tahun berjumlah 1 orang, 10-12 tahun berjumlah 2 orang, 13-15 tahun berjumlah 3 orang dan 16-18 tahun berjumlah 2 orang.

3. Penggunaan obat antikonvulsan yang sering digunakan pada pasien pediatrik (anak) di RSU Islam Faisal, RSUD Kota Makassar dan RSUD Salewangan Maros yaitu: golongan hidantoin (fenitoin), golongan barbiturat (fenobarbital), karbamazepin, golongan benzodiazepin (diazepam dan klobazam) dan valproat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Allredge, BK, *et al.*, 2001, *A comparison of Lorazepam, Diazepam, and Placebo for The Treatment of Out of Hospital Status Epilepticus*, N Eng J med. 345:631-7.
- Bough, KJ and Rho, JM., 2007, *Anticonvulsant Mechanisms of the ketogenic Diet Epilepsia*. 48(1):43-58.
- Corwin J. E., 2009, *Buku Saku Patofisiologi Edisi 3*. Penerbit Buku Kedokteran EGC; Jakarta.
- Dapartemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002, *Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak*; Jakarta.
- Dapartemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Undang-undang Nomor 44 Tentang Rumah Sakit*; Jakarta.
- Devinsky, O., 2004, *Tonic Seizure*, [http://www.epilepsy.com/epilepsy/seizure\\_tonic](http://www.epilepsy.com/epilepsy/seizure_tonic), diakses Oktober 2010.
- Harvey, AR dan Champe, PC., 2013, *Farmakologi Ulasan Bergambar*, Penerbit Buku Kedokteran EGC; Jakarta.
- Holmes, GL, 2006, *Infantiel Spasms*, [http://www.epilepsy.com/epilepsy/epilepsy\\_infantiel\\_spasms](http://www.epilepsy.com/epilepsy/epilepsy_infantiel_spasms), diakses Oktober 2010.
- Ikawati, Z., 2011, *Farmakoterapi Penyakit Sistem Syaraf Pusat*, Bursa Ilmu; Yogyakarta.
- Karch M. A., 2010, *Buku Ajar Farmakologi Keperawatan Edisi 2*, Penerbit Buku Kedokteran EGC; Jakarta.
- Katzung, BG., 2002, *Farmakologi Dasar dan Klinis Ed 8<sup>th</sup>*, Salemba Medika; Jakarta.
- Mudjono, M., 2012, *Farmakologi Dan Terapi*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58, 2014, *Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*; Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340, 2010, *Tentang Rumah Sakit*; Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269, 2008, *Tentang Rekam Medis*; Jakarta.
- Pratsvinas, JM., 2004, *Benign Partial Epilepsy with Rolandic*



- Spikes, Jaime Campos Editor; Spanyol.
- Pellock, JM, et al., 2008, *Pediatric Epilepsy, Diagnosis and Therapy* 3<sup>rd</sup> ed, Demos Medical Publishing; New York.
- Sukandar, EY, dkk., 2009, *ISO Farmakoterapi*, PT. ISFI Penerbitan; Jakarta.
- Siregar, JP Charles., 2003, *Farmasi dan Rumah Sakit*, Penerbit Buku Kedokteran ECG, Jakarta.
- Siregar, JP Charles dan Amalia, L., 2004, *Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan*, Penerbit Buku Kedokteran ECG, Jakarta.
- Sander, JW dan Shorvon, SD., 1996, *Epidemiology of the epilepsies*, J neurol Neurosurg Psychiatry. 61:433-43
- Scottish Intercollegiate Guidelines Network., 2013, *Diagnosis and Management of Epilepsy in Adults*, A national Clinical Guideline.
- Shorvon, SD., 1994, *Status Epilepticus: Its Clinical Features and Treatment In Children and Adults*, Cambridge University Press; Cambridge.
- Tammase, J., 2013, *Epilepsi Klinik Diagnostik dan Terapi*, Masagena Press; Makassar.
- Tierney, LM, et al., 2006, *Current Medical Diagnosis and Treatment*, ed 45<sup>th</sup>, Mc Grawhill; California.
- Wheless, J., 2006, *Vagus Nerve Stimulation Therapy*, In Wyllie E, ed, *The Treatment of Epilepsy*. ed 4<sup>th</sup>, Lippicott Williams & Wilkins; Philadelphia.
- Walker, R and Edwards, C., 2003, *Clinical Pharmacy and Therapeutics Ed 3<sup>th</sup>*, Churchill Living Stone; New York.



UJI TOKSISITAS AKUT EKSTRAK AIR DAUN KEREHAU (*Callicarpa longifolia* Lam.) TERHADAP MENCIT PUTIH (*Mus musculus*)

Eka Siswanto Syamsul, Soendarto, Supomo, Siti Nena  
Akademi Farmasi Samarinda  
Jl. A.Wahab Sjahranie No.226 Samarinda, Kalimantan Timur  
\*Koresponden email: [eka8382@gmail.com](mailto:eka8382@gmail.com)

ABSTRAK

Kerehau (*Callicarpa longifolia* Lam.) adalah salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional. Bagian yang digunakan adalah daunnya, yaitu untuk mengobati penyakit malaria, ulkus, diare, demam dan pengobatan setelah persalinan. Pengobatan dilakukan dengan cara diminum air rebusannya. Tumbuhan ini umum ditemukan di Kalimantan. Informasi mengenai penggunaan dan keamanan daun kerehau ini masih sangat sedikit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi ketoksikan akut dengan penentuan nilai LD<sub>50</sub> (*Lethal Dose 50*) dalam 4 tingkat dosis yaitu dosis I, II, III, dan IV dari ekstrak air daun kerehau terhadap mencit putih.

Penelitian ini merupakan jenis eksperimental dengan metode rancangan acak lengkap pola searah dalam pemilihan hewan uji. Hewan uji yang digunakan adalah mencit putih betina sebanyak 25 ekor yang dibagi menjadi 5 kelompok dengan jumlah 5 mencit tiap kelompok. Gejala-gejala fisik umum sebagai tanda keracunan dan jumlah hewan coba yang mati diamati selama 4 jam pertama kemudian setiap 24 jam selama 7 hari untuk menentukan nilai LD<sub>50</sub> (*Lethal Dose 50*) dari ekstrak air daun kerehau.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan 4 tingkat dosis yang digunakan, yaitu dosiskelompok I = 16g/kgBB, Kelompok II = 8g/kgBB, Kelompok III = 4g/kgBB dan kelompok IV = 2g/kgBB serta kelompok kontrol = aquades, tidak menimbulkan gejala-gejala umum sebagai tanda keracunan (prilaku, syaraf otot syaraf otonom, pernafasan, gastrointestinal dan kulit) dan kematian terhadap hewan uji yang diberi ekstrak air daun kerehau. Nilai LD<sub>50</sub> yang diperoleh dinyatakan dengan nilai LD<sub>50</sub> semu (16g/kgBB) yang termasuk dalam kategori praktis tidak toksik (>15g/kgBB).

Kata kunci : *Callicarpa longifolia*, toksisitas, mencit putih, LD<sub>50</sub>

PENDAHULUAN

Tumbuhan obat yang digunakan sebagai pengobatan malaria, ulkus, diare, demam oleh suku Dayak di Kalimantan Timur dan pengobatan setelah persalinan salah satunya adalah tumbuhan kerehau (Quattrocchi, 2012). Penggunaan daun kerehau sebagai obat secara empiris, (Setyowati, 2010). Tumbuhan kerehau dengan cara direbus beberapa helai daun dalam hal ini daunnya digunakan untuk tua atau secukupnya sampai airnya



mendidih kemudian didinginkan dan diminum 3 kali sehari.

Penggunaan obat tanpa takaran kemungkinan besar menimbulkan kesalahan dosis karena dosis berada pada sub terapi atau diatas maksimum yang dapat menyebabkan toksik. Skrining fitokimia terhadap fraksi metanolekstrak daun kereha menunjukkan adanya metabolit sekunder alkaloid, flavonoid, saponin dan tanin (Semiawan dkk, 2015).

Untuk mengetahui keamanan penggunaan suatu obat, maka diperlukan uji toksisitas. Uji toksisitas dibedakan menjadi uji toksisitas akut, subkronik, dan kronik. Uji toksisitas akut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang gejala keracunan, penyebab kematian, urutan proses kematian dan rentang dosis yang mematikan hewan uji (*Lethal dose 50* atau disingkat  $LD_{50}$ ) suatu bahan. Parameter toksisitas akut yang digunakan untuk melihat keamanan suatu obat dalam pengobatan adalah nilai  $LD_{50}$  (Fanani, 2009).

Penelitian uji toksisitas akut ekstrak air daun kerehau (*Callicarpa longifolia* Lam.) terhadap mencit putih perlu dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui nilai  $LD_{50}$  dan potensi ketoksikan akut sehingga dapat diperoleh gambaran keamanan sediaan ekstrak air daun kerehau yang biasa digunakan sebagai obat tradisional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental yaitu percobaan yang bertujuan untuk mengetahui suatu gejala atau pengaruh yang timbul akibat dari adanya perlakuan tertentu. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap pola searah dalam pemilihan hewan uji yaitu mencit. Penelitian yang dilakukan mengenai pengujian toksisitas akut ekstrak air daun kerehau dengan konsentrasi dosis bertingkat I, II, III, dan IV serta tanpa ekstrak sebagai kontrol negatif. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Terpadu III Akademi Farmasi Samarinda.

### A. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel yang digunakan adalah daun tua pada tumbuhan kerehau (*Callicarpa longifolia* Lam.) yang tumbuh liar di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.



## B. Alat dan Bahan

### 1. Alat

Seperangkat alat infus, alat-alat gelas (Pyrex, Iwaki), blender (Miyako), kompor gas (Rinnai), sonde, neraca digital, batang pengaduk, termometer, gunting, cawan porselen, penjepit tabung, tabung reaksi (Pyrex), kertas label, kandang mencit, pinset, dan ayakan mesh 60.

### 2. Bahan

Aquades, simplisia daun kerehau, mencit putih betina, pangan mencit, koran, alumunium foil, pereaksi mayer, dragendorf, bouchardat, liebermann-burchard (asam anhidrat asetat  $((CH_3CO)_2O$ ) dan asam sulfat pekat ( $H_2SO_4$ )), Sianidin test (magnesium (Mg) dan asam klorida pekat (HCl) pekat, amil alkohol ( $C_5H_{11}OH$ ), besi (III) klorida ( $FeCl_3$ ) 1%, *n*-heksan, dan asam klorida (HCl) 2N.

## C. Prosedur Penelitian

a. Pengambilan Sampel dan Determinasi Tumbuhan  
Pengambilan sampel, sampel berupa daun tua tumbuhan kerehau diambil pada sore hari kemudian

diproses menjadi simplisia. Determinasi dilakukan di Laboratorium Fisiologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Samarinda.

### b. Ekstraksi Sampel

Simplisia dibuat serbuk untuk dilakukan penelitian dengan cara menggunakan alat blender agar lebih mudah dalam penghalusan, kemudian diayak dengan pengayak mesh 60. Ditimbang serbuk sampel sebanyak 200 g, diekstraksi menggunakan metode infundasi, yaitu dimasukkan serbuk sampel kedalam bejana yang terdiri dari dua panci yang ditumpuk, panci pertama diberi air secukupnya kemudian dimasukkan panci kedua. Panci tersebut berisi serbuk sampel dan aquades secukupnya hingga seluruh bahan terendam yaitu sebanyak 900 ml, kemudian dipanaskan dengan suhu  $90^{\circ}C$  selama 15 menit sambil sesekali diaduk lalu dikerai dengan kain flanel. Ekstrak air yang diperoleh diuapkan di *Water bath*. Dihitung rendemennya.

### c. Skrining Fitokimia



Skrining fitokimia dilakukan terhadap simplisia dan ekstrak daun kerehau yang meliputi; pemeriksaan senyawa kimia golongan alkaloid, flavonoid, saponin, tanin dan steroid/terpenoid.

#### 1) Pemeriksaan Alkaloid

Diambil 3 tabung reaksi, lalu masing-masing dimasukkan 0,5 ml ekstrak. Pada masing-masing tabung reaksi ditambahkan 2 tetes pereaksi mayer, bouchardat, dan dragendorff. Alkaloid positif jika terjadi endapan atau kekeruhan. Bila sedikitnya 2 dari 3 pereaksi di atas positif maka sampel mengandung alkaloid.

#### 2) Pemeriksaan Flavonoid

Ekstrak diambil 5 ml lalu ditambahkan 0,1 g serbuk Mg dan 1ml HCl pekat dan 2 ml amil alkohol, dikocok dan dibiarkan memisah.. Bila terbentuk warna kuning, orange atau merah pada lapisan amil alkohol menunjukkan adanya flavonoid.

#### 3) Pemeriksaan Saponin

Masukkan ekstrak kedalam tabung reaksi, ditambahkan 10

ml air panas, didinginkan dan kemudian dikocok kuat-kuat selama

10 detik. Jika terbentuk buih yang banyak selama tidak kurang dari

10 menit, setinggi 1 cm sampai 10 cm dan tidak hilang dengan penambahan 1 tetes asam klorida 2 N menunjukkan adanya saponin.

#### 4) Pemeriksaan Tanin

Ekstrak diencerkan sampai hampir tidak berwarna, lalu ditambahkan 1-2 tetes pereaksi besi (III) klorida, jika terjadi warna biru kehitaman atau hijau kehitaman menunjukkan adanya tanin.

#### 5) Pemeriksaan Steroid/Terpenoid

Ekstrak ditambahkan dengan 20 ml *n*-heksan, dikocok kemudian diuapkan dan sisanya ditambahkan pereaksi Lieberman-Burchard. Jika terbentuk warna ungu atau merah yang berubah menjadi biru ungu atau biru kehijauan menunjukkan adanya triterpenoid/steroid bebas.

#### d. Penentuan Dosis dari Ekstrak



Dosis ekstrak daun kerehau (*Callicarpa longifolia* Lam.) dibuat dalam dosis bertingkat I, II, III, dan IV. Larutan stok dibuat dengan membuat ekstrak sebanyak 5 ml, ditimbang 6,4 g ekstrak lalu dimasukkan dalam erlenmeyer, kemudian diaduk sambil ditambahkan sedikit demi sedikit aquades hingga larut dan homogen.

Larutan diencerkan sesuai dengan dosis bertingkat yang diperlukan, yaitu pengenceran ke-1 dengan dosis 3,2 g, pengenceran ke-2 dengan dosis 1,6 g dan pengenceran ke-3 dengan dosis 0,08 g. Kelompok kontrol diberi aquades 0,5 ml sebagai perlakuan pembanding.

e. Perlakuan Pada Hewan Uji

Hewan uji diberi larutan ekstrak air secara oral sebanyak 0,5 ml/ 40g berat badan dengan tingkat dosis I, II, III, dan dosis IV serta konsentrasi tanpa ekstrak.

f. Pengamatan

Pengamatan setelah ,diberi perlakuan yaitu pengamatan potensi ketoksikan akut, pengamatan ini dilakukan dengan melihat gejala-gejala fisik umum sebagai tanda keracunan

yang timbul setelah pemberian larutan ekstrak air daun kerehau (*Callicarpa longifolia* Lam.) yang dibandingkan dengan kontrol. Waktu pengamatan adalah menit ke 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 dan 240 (4 jam). Pengamatan Nilai LD<sub>50</sub> dilakukan terhadap mencit yang mati dan yang masih hidup setiap 24 jam selama 7 hari setelah pemberian ekstrak air daun kerehau.

Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menentukan nilai LD<sub>50</sub> dan potensi ketoksikan akut dari mencit yang mati dan hidup dari setiap kelompok adalah Metode Grafik Probit, Weil CS dan Metode Farmakope Indonesia III. Data variasi bobot mencit yang diperoleh dari semua kelompok sampel diolah dengan program komputer *microsoft office excel 2007*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Determinasi Daun Kerehau (*Callicarpa longifolia* Lam.)

Berdasarkan hasil determinasi yang dilakukan oleh Laboratorium Fisiologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman bahwa sampel tersebut adalah spesies *Callicarpa longifolia*



Lam. yang termasuk famili Lamiaceae dengan nama lokal 'Kerehau'.

#### B. Ekstraksi Daun Kerehau (*Callicarpa longifolia* Lam.)

Ekstraksi yang digunakan adalah metode infundasi. Infundasi merupakan metode penyarian dengan cara menyari simplisia dalam air pada suhu 90°C selama 15 menit. Infundasi merupakan penyarian yang umum dilakukan untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Infundasi merupakan metode ekstraksi yang menggunakan alat sederhana, waktu yang singkat dan menggunakan biaya operasional relatif rendah (Depkes RI, 1986).

Proses pemekatan ekstrak menggunakan *Water bath* dengan suhu 40-45°C, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan

senyawa aktif yang terkandung didalam ekstrak. Berat ekstrak kental yang diperoleh dari 200 g simplisia daun kerehau adalah 25,19 g. Ekstrak kental yang diperoleh berwarna kuning kecoklatan, beraroma khas daun kerehau, memiliki rasa yang sepat dan tidak pahit. Ekstrak kental yang diperoleh kemudian disimpan pada wadah yang sesuai dan disimpan dalam lemari pendingin untuk mencegah tumbuhnya kapang.

#### C. Skrining Fitokimia

Fitokimia atau kimia tumbuhan mempelajari aneka ragam senyawa organik yang dibentuk dan ditimbun oleh tumbuhan yaitu mengenai struktur kimianya, biosintesisnya, perubahan serta metabolismenya, penyebarannya secara alamiah serta fungsi biologinya (Harborne, 1996). Hasil skrining fitokimia ekstrak air disajikan pada tabel 1.



Tabel 1. Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Air Daun Kerehau

No.	Metabolit Sekunder	Pereaksi	Pengamatan	Hasil
1.	Alkaloid	Meyer	Larutan kecoklatan	(-)
		Bouchardat	Larutan kecoklatan	(-)
		Dragendorf	Endapan kecoklatan	(+)
2.	Flavonoid	Sianidin test	Warna jingga pada amil alkohol	(+)
3.	Tannin	FeCl <sub>3</sub>	Warna hijau kecoklatan	(+)
4.	Saponin	H <sub>2</sub> O	Terbentuk busa	(+)
5.	Steroid	Lieberman-burchad	Larutan kecoklatan	(-)
6.	Triterpenoid	Lieberman-burchad	Larutan kecoklatan	(-)

Keterangan : (+) = ada metabolit sekunder, (-) = tidak ada metabolit sekunder

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 1, dapat dilihat bahwa pada ekstrak air daun kerehau mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin dan tanin. Metabolit sekunder ini dapat terekstraksi karena bersifat polar sehingga dapat ditarik oleh pelarut air, sedangkan Alkaloid, steroid dan triterpenoid tidak bersifat polar sehingga tidak tertarik oleh pelarut air yang bersifat polar.

Alkaloid dengan pengujian menggunakan pereaksi mayer dan bouchardat negatif mengandung alkaloid, sedangkan dengan pereaksi dragendorf positif mengandung alkaloid. Zat uji mengandung alkaloid jika dua dari uji tersebut positif


sehingga dalam penelitian ini zat uji yaitu ekstrak air daun kerehau tidak mengandung alkaloid (Harborne, 1996).

#### D. Pengujian Nilai LD<sub>50</sub> dan Potensi Ketoksikan

Pada penelitian ini, hewan uji yang digunakan adalah mencit putih betina karena dalam penelitian toksisitas akut yang menggunakan waktu singkat, tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin yang harus memiliki hormon stabil. Hewan uji dibagi 5 kelompok dan ditempatkan dalam 5 kandang yang memiliki luas dan ukuran yang sama. Aklimatisasi selama 14 hari dilakukan dengan tujuan agar semua kelompok menerima keadaan dan situasi yang



sama dalam proses penyesuaian terhadap lingkungan. Hari ke-7 sampai hari ke-14 semua hewan uji ditimbang untuk mengetahui kesehatan dengan melihat bobot pada mencit



. Gambar 1. Grafik Penimbangan Bobot Mencit

Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan bobot mencit setiap harinya, dengan SEM (*Standart Errorr of Mean*) yaitu varian bobot mencit dalam 1 kelompok, menunjukkan selisih yang kecil (< 0,5) atau tidak jauh berbeda dalam 1 kelompok sehingga disimpulkan bobot mencit termasuk homogen. Kenaikan bobot mencit merupakan salah satu hal yang dapat menunjukkan bahwa mencit tersebut dalam keadaan sehat dan dapat digunakan sebagai hewan percobaan.

Pemilihan dosis yang digunakan diperoleh dari hasil orientasi, yaitu dengan memberikan dosis maksimum yang masih dapat diberikan secara teknis pada hewan uji (16g/kgBB) dengan mengacu pada tabel klasifikasi toksisitas menurut Lu (1995) atau sekitar 64 kali dosis terapi ekstrak daun kerehau (250mg/kgBB) sebagai obat anti inflamasi pada mencit (Semiawan dkk., 2015). Pengamatan potensi ketoksikan akut dilakukan dengan melihat adanya gejala umum sebagai tanda keracunan maupun ada tidaknya



kematian hewan uji dari masing-masing kelompok perlakuan (data kuantitatif). Pengamatan dilakukan selama 4 jam pada menit ke-5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 dan 240 setelah pemberian ekstrak uji (Supriningrum dkk., 2014).

**Tabel 2.** Gejala-Gejala Umum yang Muncul Sebagai Tanda Keracunan Setelah Pemberian Ekstrak Air Daun Kerehau

Kelompok	Perlakuan	Jumlah Sampel	Gejala Keracunan
Kontrol	Aquades	5	Tidak ada
Kelompok I	Dosis 16g/kgBB	5	Tidak ada
Kelompok II	Dosis 8g/kgBB	5	Tidak ada
Kelompok III	Dosis 4g/kgBB	5	Tidak ada
Kelompok IV	Dosis 2g/kgBB	5	Tidak ada

Pada pengamatan setelah pemberian ekstrak air daun kerehau, gejala keracunan yang diamati tersebut adalah ciri-ciri yang mempengaruhi prilaku, syaraf otot, syaraf otonom, pernafasan, gastrointestinal, dan kulit. Perlakuan pada kelompok I sampai IV terjadi gejala yang mempengaruhi prilaku (menunduk, menggaruk-garuk dan ketakutan) dan syaraf otot (ekor membengkok), tetapi gejala tersebut juga terjadi pada kelompok kontrol sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai gejala tanda keracunan.

Uji LD<sub>50</sub> terhadap ekstrak air daun kerehau dilakukan untuk mengetahui pada dosis berapa ekstrak air daun kerehau dapat memberikan efek toksik. Efek tersebut ditandai dengan adanya kematian pada mencit yang telah diberikan ekstrak air daun kerehau, yang diamati selama 4 jam untuk mengetahui gejala keracunan dan dilanjutkan pengamatan setiap 24 jam untuk melihat adanya kematian. Kematian dapat terjadi sesudah 24 jam pertama karena proses keracunan dapat berjalan lambat, oleh karena itu



pengamatan kematian hewan uji dilakukan selama 7 hari.

**Tabel 3.** Jumlah Kematian Hewan Uji Setelah Pemberian Ekstrak Air Daun Kerehau.

Kelompok	Perlakuan	Jumlah Sampel	Jumlah Mencit yang Mati
Kontrol	Aquades	5	0
Kelompok I	Dosis 16 g/kgBB	5	0
Kelompok II	Dosis 8 g/kgBB	5	0
Kelompok III	Dosis 4 g/kgBB	5	0
Kelompok IV	Dosis 2 g/kgBB	5	0

Dosis maksimum yang tidak menimbulkan kematian pada hewan uji dinyatakan dengan nilai LD<sub>50</sub> semu. Dosis tertinggi (16 g/kgBB) yang telah diberikan tidak menimbulkan kematian maka termasuk dalam kategori praktis tidak toksik. Hal ini sesuai dengan Lu (1995), apabila dosis tertinggi yang diberikan lebih besar dari 15 g/kgBB tidak menimbulkan kematian maka dikategorikan praktis tidak toksik.

Nilai LD<sub>50</sub> yang dinyatakan semu dengan potensi ketoksikan kategori praktis tidak toksik dari hasil penelitian ini dapat dihubungkan

dengan nilai IC<sub>50</sub> (*Inhibition Consentration*). Hasil penelitian Fazriannur (2015), menyatakan bahwa ekstrak daun kerehau memiliki nilai IC<sub>50</sub> sebesar 63,02 ppm yang termasuk dalam kategori senyawa antioksidan kuat. Nilai IC<sub>50</sub> yaitu konsentrasi senyawa antioksidan yang menyebabkan hilangnya 50% aktivitas radikal bebas (Moylyneux, 2004).

Pada penelitian tumbuhan lain yang memiliki khasiat sebagai antioksidan, salah satunya yaitu kulit manggis memiliki nilai IC<sub>50</sub> sebesar 72 ppm (Wijana dkk., 2015) yang termasuk kategori antioksidan kuat



dan juga tidak menimbulkan efek toksik, baik gejala keracunan maupun kematian pada hewan uji. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan tertentu yang bersifat antioksidan kuat tidak menimbulkan toksik. Kandungan antioksidan kuat dalam daun kerehau yang diberikan pada mencit kemungkinan dapat menetralsir radikal bebas yang dapat bersifat racun sehingga tidak menyebabkan timbulnya gejala keracunan dan kematian pada hewan uji. Hasil penelitian ini menunjukkan ekstrak air daun kerehau berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan obat yang dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan farmasi, karena memiliki manfaat yang besar dan memiliki keamanan tinggi dalam penggunaannya.

#### SIMPULAN

1. Gejala-gejala umum sebagai tanda keracunan (prilaku, syaraf otot syaraf otonom, pernafasan, gastrointestinal dan kulit) tidak timbul pada hewan uji yang diberi ekstrak air daun kerehau.
2. Nilai LD<sub>50</sub> semu (16 g/kgBB) dengan potensi ketoksikan kategori praktis tidak toksik (>15 g/kgBB).

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Akademi Farmasi Samarinda atas bantuan fasilitas dan Kementrian Ristek Dikti atas hibah Penelitian Dosen pemula tahun 2016.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fazriannur. 2015. Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kerehau (*Callicarpa longifolia* Lam.) Metode DPPH. KTI. Samarinda : Akademi Farmasi.
- Fanani, R. 2009. Uji Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Daun Dewandaru (*Eugenia Uniflora* L.) Per Oral pada Tikus Galur Sprague Dawley. Skripsi. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Harborne, J.B. 1996. *Metode Fitokimia*. Edisi ke-2. Terjemahan Kosasih Padmawinata. Bandung : ITB Press. Terjemahan dari: *Phytochemical Methods*.
- Lu, F.C. 1995. *Toksikologi Dasar : Asas, Organ, Sasaran, dan Penilaian Risiko*. Edisi II. Jakarta: UI.
- Molyneux, P. 2004. The Use Of The Stable Free Radical Diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) For Estimating Antioxidant Activity. *Journ. Sci. Technol.* XXVI (2) Thailand : Songkla University
- Quattrocchi, U. 2012. *CRC World Dictionary Of Medicinal And Poisonous Plants: Common Names, Scientific Names, Eponyms, Synonyms, And Etymology*. London : CRC Press.
- Semiawan, F., Ahmad, Islamudin dan Masruhim, M.A. 2015. Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Daun



Kerehau(*Callicarpa longifolia* L.).  
*Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Farmaka Tropis.*  
Samarinda :UNMUL

Setyawati, A.,F.D. Suyatna dan Sulistia.  
2007. *Pengantar Farmakologi : farmakologi dan terapi*, Edisi V.  
Jakarta : UI.

Supriningrum, R. Siti, J dan Sapri.  
2014.Uji Toksisitas Akut Ekstrak Akar Tabar Kedayan (*Aristolochia Foveolata* Merr.). *Jurnal Media Sains* VII (2)

Setyowati, F.M.2010.  
Etnofarmakologidan Pemakaian Tanaman Obat SukuDayak Tunjung di Kalimantan Timur.*Artikel Media Litbang Kesehatan* XX (3) Bogor : Media Litbang Kesehatan.

Wijana, S. Sucipto. dan Lia, M.K.  
2015. Pengaruh Suhu Dan Waktu Pengeringan Terhadap Aktivitas AntioksidanPada Bubuk Kulit Manggis (*Garcinia Mangostana* L.). *Jurnal.* Universitas Brawijaya : Teknologi Pertanian



# LAMPIRAN



## **INFORMASI UNTUK PENULIS**

Jurnal Ilmiah Pharmacy menerima tulisan ilmiah berupa laporan hasil penelitian di bidang ilmu Farmasi, Kedokteran, Kimia, Biologi, Fisika, Kebidanan, Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, Gizi dengan frekuensi terbit 2 kali setahun (Maret dan Oktober).

Naskah yang diajukan adalah naskah yang belum pernah diterbitkan di media lain, baik cetak maupun elektronik. Jika sudah pernah disajikan dalam suatu pertemuan ilmiah hendaknya diberi keterangan yang jelas mengenai nama, tempat, dan tanggal berlangsungnya pertemuan tersebut.

Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia baku atau Bahasa Inggris dengan huruf *Times New Roman* (TNR), disusun dengan sistematika sebagaimana yang disarankan di bawah ini.

### **Sistematika penulisan judul, penulis dan abstrak:**

#### o **Judul :**

Judul penelitian bersifat informative, singkat dan jelas mencerminkan isi tulisan dan tidak melebihi 18 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia dengan *UPPERCASE* (Huruf besar semua terkecuali nama ilmiah menggunakan *Title Case*), *Font* TNR 14, *Bold*, 1 spasi, *Center* (pyramid terbalik).

Contoh :

**UJI EFEKTIVITAS ANTIHIPERGLIKEMIA AIR REBUSAN KULIT BUAH JENGKOL (*Pithecellobium jiringa* (Jack) Prain) PADA MENCIT PUTIH JANTAN YANG DIINDUKSI SUKROSA**

#### o **Nama dan Lembaga Penulis**

Masing-masing nama penulis ditulis dengan lengkap tanpa gelar dan diakhiri dengan nomor *superscript* (jika semua penulis tidak berasal dari institusi yang sama), diikuti dengan afiliasi/institusi masing-masing dan alamat korespondensi penulis utama yang dilengkapi dengan alamat surat elektronik (*email*), *Font* TNR 12, *Bold*, *Center*, 1 spasi. Jarak antara nama dengan lembaga penulis yaitu enter 2 spasi

Contoh :

**Ananda Rahayu Mardia<sup>1</sup>, Sindiana Sari<sup>2</sup>, Cahaya Romadon<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu

<sup>2</sup>Universitas Terbuka Bengkulu

E-mail : [anandarahayumardia@gmail.com](mailto:anandarahayumardia@gmail.com)

#### o **Abstrak**

Ditulis dalam bahasa Indonesia, maksimum 200 kata dengan ukuran huruf TNR 12, 1 spasi, memuat komponen latar belakang, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan. dilengkapi dengan kata kunci dengan jumlah 3-5 kata, *Bold*.



### **Sistematika penulisan isi dan kepustakaan:**

- o Isi tulisan disusun dengan sistematika: Pendahuluan, Metode Penelitian (meliputi Tempat dan Waktu Penelitian, Alat dan Bahan Penelitian, Prosedur Penelitian, Analisa Data); Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, Ucapan Terima Kasih (jika diperlukan), Daftar Pustaka.

**Penulisan** : *UPPERCASE* (Huruf besar semua) dan untuk Sub Judul : *Title Case* (Huruf besar pada huruf awal setiap kata selanjutnya huruf kecil semua terkecuali kata penghubung), *Font* TNR 12, **Bold**. Semua tulisan dibuat dengan spasi 1,5 TNR 12.

### **PENDAHULUAN**

Pendahuluan memuat latar belakang penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan gejala/konsep/dugaan atau menerangkan pada satu tujuan, memberikan argument pentingnya penelitian dilakukan. Setiap paragraph harus disertakan catatan kaki (Rujukan kepustakaan dilakukan dengan sistem nama dan tahun. Contoh : (Atmajaya. N, 2016).

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menguraikan tentang Tempat dan Waktu Penelitian, Alat dan Bahan Penelitian, Prosedur Penelitian dan Analisa Data.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menguraikan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan kemudian dibuat pembahasannya berdasarkan analisa dan perbandingan data yang telah ada.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Saran, berisi saran untuk langkah penulis selanjutnya yang mengacu manfaat penelitian (bila ada)

### **UCAPAN TERIMA KASIH** (jika diperlukan bila mendapatkan dana hibah)

### **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka hendaknya mengacu kepada sumber pustaka 10 tahun terakhir. Daftar pustaka ditulis berurutan berdasarkan alfabetis dan ditulis secara konsisten menurut ketentuan *APA (American Psychological Association) Citation Style*, Spasi 1 berdasarkan alfabetis dengan contoh sebagai berikut :

Kesehatan, M., Volume, F., & Sgot, K. (2015). Effect of Propolis Extract on SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase) and SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase) Level of Wistar Rats ( *Rattus norvegicus* ) with High Fat Diet, 2(September), 120-126.



## Teknik penulisan isi, tabel, dan gambar:

- o Naskah dibuat pada dokumen Microsoft Office Word dengan format DOC; diketik 1,5 spasi terkecuali judul, *superscript*, abstrak dan daftar pustaka 1 spasi,
- o Format paper berukuran A4 (210 x 297 mm) dengan margin kiri 4 cm, atas 3 cm, kanan 2.5 cm, bawah 2.5 cm, dengan jumlah halaman 8-10 halaman.
- o Tabel harus utuh, jelas terbaca, diberi judul dengan nomor urut tabel berupa angka (Tabel 1, 2, 3 dan seterusnya, *bold, Center, 1 spasi, 10 font TNR*).
- o Gambar dibuat dengan format JPG/JPEG atau PNG, diberi keterangan pada bagian bawahnya dengan nomor urut gambar berupa angka (Gambar 1, 2, 3 dan seterusnya, *bold, Center, 1 spasi, 10 font*).

Naskah dikirim dalam bentuk berkas elektronik ke alamat email [lppmakfar\\_alfatah13@yahoo.com](mailto:lppmakfar_alfatah13@yahoo.com) atau dapat mengikuti panduan yang tersedia pada website di [www.pppm.akfar-alfatah.ac.id](http://www.pppm.akfar-alfatah.ac.id). Format pengiriman email :

Judul email : “[Submission] – empat kata pertama dari judul tulisan – nama penulis”,

contoh: [Submission] – Evaluasi Penggunaan Antibiotik Fluoroquinolon – Densi Selpia

Isi email : Harus mencantumkan nama dan afiliasi/asal institusi pengirim beserta judul artikel yang diajukan.

Attachment (lampiran) email: artikel berupa dokumen Microsoft Office Word 97-2003 (format DOC) yang diberi nama “[nama penulis]-[empat kata pertama dari judul tulisan] – JIP”,

contoh: Densi Selpia-Evaluasi Penggunaan Antibiotic Fluoroquinolon-JIP

Naskah yang masuk ke meja redaksi akan disaring oleh editor, kemudian direview. Apabila diperlukan, naskah akan diberi catatan dan dikembalikan kepada penulis untuk direvisi, untuk selanjutnya dikirimkan kembali secara utuh kepada redaksi untuk diterbitkan.

Setiap artikel yang dinyatakan diterima untuk diterbitkan dikenakan biaya penerbitan sebesar Rp Rp. 75.000,- *Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah* dimana penulis akan menerima 1 eksemplar jurnal pada nomor tersebut. Penambahan eksemplar akan dikenakan biaya yang sama per eksemplarnya. Biaya tersebut dapat ditransfer ke rekening AKADEMI FARMASI ALFATAH BENGKULU di Bank Syariah Mandiri Cabang : KC Bengkulu No. Reg 7080825597 setelah artikel dinyatakan diterima untuk diterbitkan dan setelah dilakukan revisi sesuai ketentuan.

**Ka. P3M AKFAR AF**

ttd

**Densi Selpia Sopiani, M.Farm., Apt**  
**NIDN. 0214128501**

Ctt :

Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan diberitahukan secara langsung kepada penulis.







**LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)**

**Kepada Yth Bpk/Ibu/Sdr**

.....

**Di**

**Tempat**

Dengan ini kami sampaikan bahwa artikel dengan rincian berikut dinyatakan diterima untuk diterbitkan di dalam Jurnal Ilmiah Pharmacy Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu, Volume (...) Nomor (...) (Bulan Tahun Terbit)

**Judul** : .....

**Penulis** : .....

**\*Email** : .....

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

**Bengkulu, .....**  
**Dewan Editor Jurnal Ilmiah Pharmacy**  
**Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu**

**Ka. P3M AKFAR AF**

**Editor P3M AKFAR AF**

-----

-----



ISSN 2406-8071



2406-8071