

PEMERIKSAAN FISIK DIAGNOSTIK

ROSDIANAH



ROSDIANAHAH

PEMERIKSAAN
FISIK DIAGNOSTIK

ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

PEMERIKSAAN FISIK DIAGNOSTIK

Penulis:
ROSDIANAH

Editor:
ISRIANY ISMAIL

Cetakan: I 2012
xii - 249 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978 602 237 473 2

Alauddin University Press
Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa

SAMBUTAN REKTOR

Tidakkah engkau malu pergi ke laut, sementara pulang hanya membawa sekendi air, padahal di dalam laut terdapat begitu banyak mutiara yang terpendam... demikian nasihat puitis Jalauddin Rumi dalam buku *The Sufi Book of Life*.

Syair inspiratif ini memberikan dorongan bagi siapa saja yang mengabdikan dirinya di dunia pendidikan apalagi di perguruan tinggi untuk menghasilkan dan melahirkan karya-karya akademik yang dapat memberikan pencerahan kepada siapapun. Sebuah ironi, jika orang-orang yang bergelut di dunia perguruan tinggi, ternyata hanya membawa sekendi "air" pengetahuan untuk mengobati dahaga masyarakat, padahal begitu banyak mutiara yang terpendam di dalamnya yang dapat memberi "sinar" kehidupan. Atas dasar inilah, ikhtiar untuk menjadikan kampus UIN Alauddin sebagai kampus peradaban harus terus digulirkan, sebab hanya kampus yang menjadikan orientasi "Peradaban" sebagai basis aktivitas dan tradisi keilmuannya yang akan mampu membawa semangat perubahan di tengah masyarakat menuju masyarakat madani.

Kampus peradaban yang dicita-citakan hanya bisa terwujud jika pengembangan kultur dan *mindset* akademik lebih relevan dengan suasana dan wadah yang bernama universitas Islam. Sebaliknya, jika orientasi peradaban hanya sebatas jargon dan simbol, maka status "universitas" dan "Islam" akan menjadi beban bagi kita maupun masyarakat. Di satu sisi, UIN akan menjadi universitas pinggiran, sementara di sisi lain, karakter keislaman menjadi hilang. Karena itu,

diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk mengawal UIN Alauddin mencapai visi dan misinya untuk menjadi *world class university* yang berperadaban.

Untuk mencapai visi itu, maka program GSB (Gerakan Seribu Buku) ini menjadi salah satu langkah strategis memacu sivitas akademika untuk tidak sekadar meneguk "air" pengetahuan di perguruan tinggi, tetapi dapat membawa ribuan bahkan jutaan kendi "air dan mutiara" pengetahuan ke tengah masyarakat. Orang bijak berkata "*Buku adalah pengusung peradaban, tanpa buku sejarah menjadi sunyi, ilmu pengetahuan menjadi mati, dan kehidupan bisa kehilangan arti.*"

Oleh karena itu, saya sangat bersyukur kepada Allah swt, atas terselenggaranya program GSB ini, baik tahun I maupun tahun II. Program GSB telah membuktikan kepada publik bahwa UIN Alauddin memiliki kekuatan dan potensi yang cukup besar untuk mewujudkan dan menghantarkan kampus ini menuju kampus peradaban melalui maha karya para civitas akademika. Melalui program GSB ini, potensi sumber daya UIN Alauddin akan terus digali, diapresiasi dan dihargai sehingga melahirkan kreasi, ide dan prestasi.

Selaku Rektor, saya senantiasa berharap agar *tagline* "Peradaban" yang selama ini digulirkan harus menjadi visi dan misi bersama yang tertanam dalam sebuah bingkai kesadaran kolektif bagi seluruh sivitas akademik untuk mewujudkan UIN Alauddin sebagai universitas yang kompetitif dan berkarakter. Untuk itu, tiga agenda besar; *pencerdasan, pencerahan dan prestasi* harus menjadi fokus perhatian utama bagi sivitas akademika UIN Alauddin. Ketiga agenda ini dirancang sebagai sebuah strategi untuk menjadikan UIN Alauddin lebih terbuka, dan menjadi pusat kepeloporan

pengembangan nilai dan akhlak serta keunggulan akademik-intelektual yang dipadukan dengan pengembangan teknologi untuk membangun sebuah masyarakat yang berperadaban.

Akhirnya, perkenankan saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya dalam menghasilkan karya akademik ini. Semoga gagasan yang dituangkan di dalam buku ini mampu menjadi "air" penyejuk dan pengobat dahaga bagi masyarakat yang haus akan pencerahan, dan dapat menjadi "mutiara" yang memberikan cahaya bagi peradaban.

Samata, 1 Nopember 2012
Rektor

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, MS

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan Taslim atas junjungan Nabi Muhammad Saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Nabi yang telah membawa ummat dari alam jahiliyah ke alam yang ber peradaban, juga pada keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk menambah referensi tentang tehnik pemeriksaan fisik diagnostik bagi para profesional kesehatan dan mahasiswa calon profesional kesehatan. Buku ini disusun sebagai bentuk partisipasi kami sebagai dosen dalam Gerakan Seribu Buku (GSB) tahap II yang menjadi program unggulan Universitas Islam Negeri Alauddin.

Buku ini terdiri dari 11 bab, menguraikan tehnik-tehnik pemeriksaan fisik yang disusun menurut sistem yang ada dalam tubuh manusia diurutkan dari kepala hingga kaki (*head to toe*). Pada bab I diuraikan beberapa hal yang harus diketahui sebelum melakukan pemeriksaan fisik yang terdiri dari tehnik-tehnik anamnesis (wawancara) kepada pasien, prinsip-prinsip umum dalam pemeriksaan fisik, tehnik pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan serta rekam medik sebagai catatan mengenai hasil wawancara, hasil pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang telah diterima oleh pasien. Pada Bab II hingga Bab XI, diuraikan tehnik pemeriksaan fisik dari sistem tubuh, dengan terlebih dahulu mengulas anatomi dan fisiologi organ dalam sistem tersebut sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan fisik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kami senantiasa mengharapkan masukan yang berarti demi perbaikan buku ini. Begitu pula disadari bahwa dalam menyusun buku ini, penulis mendapat banyak bantuan baik berupa materi maupun non materi dari berbagai pihak, untuk itu lewat kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian buku ini.

Terakhir semoga penulisan buku yang sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca. Amiin.

Gowa, Oktober 2012

Penulis,

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Teknik Anamnesis Pasien	3
B. Prinsip-Prinsip Umum Pemeriksaan Fisik .	10
C. Pemeriksaan Fisik Umum	17
D. Rekam Medis	26
BAB II PEMERIKSAAN FISIK SISTEM	
INTEGUMEN	31
A. Anatomi Fisiologi Kulit, Rambut Dan Kuku.....	31
B. Pemeriksaan Fisik Kulit	38
C. Pemeriksaan Fisik Rambut	47
D. Pemeriksaan Fisik Kuku	48
BAB III PEMERIKSAAN FISIK KEPALA DAN	
LEHER	49
A. Anatomi Fisiologi Kepala Dan Leher	49
B. Pemeriksaan Fisik Kepala Dan Leher	58
C. Perubahan Anatomi dan Gangguan Fungsi	64
BAB IV PEMERIKSAAN FISIK SISTEM	
LIMFATIK	95
A. Anatomi Fisiologi Sistem Limfatik	95
B. Pemeriksaan Fisik Sistem Limfatik	99

BAB V PEMERIKSAAN FISIK DADA (SISTEM PERNAPASAN)	103
A. Anatomi Fisiologi Sistem Pernapasan.....	103
B. Pemeriksaan Fisik Dada (Thoraks)	110
 BAB VI PEMERIKSAAN FISIK JANTUNG (SISTEM KARDIOVASKULER)	 123
A. Anatomi Fisiologi Jantung (Kardiovaskuler)	 123
B. Pemeriksaan Fisik Jantung	129
 BAB VII PEMERIKSAAN FISIK ABDOMEN	 149
A. Anatomi Fisiologi Abdomen	149
B. Pemeriksaan Fisik Abdomen	158
 BAB VIII PEMERIKSAAN FISIK SISTEM MUSKULOSKELETAL	 173
A. Anatomi Fisiologi Sistem Muskuloskeletal	 173
B. Pemeriksaan Fisik Sistem Muskuloskeletal	 178
 BAB IX PEMERIKSAAN FISIK SISTEM PERSARAFAN	 205
A. Anatomi Fisiologi Sistem Persarafan	205
B. Pemeriksaan Fisik Sistem Persarafan	214
 BAB X PEMERIKSAAN FISIK SISTEM GENITALIA	 225
A. Anatomi Fisiologi Sistem Genitalia	225
B. Pemeriksaan Fisik Sistem Genitalia	230

BAB XI PEMERIKSAAN FISIK SISTEM	
REKTOSIGMOID	241
A. Anatomi Fisiologi Sistem Rektosigmoid...	241
B. Pemeriksaan Fisik Sistem Rektosigmoid..	242
DAFTAR PUSTAKA	247
BIODATA PENULIS	249

BAB I

PENDAHULUAN

Keberhasilan seorang dokter, perawat, atau bidan (selanjutnya disebut profesional kesehatan) dalam membantu pasien mengatasi masalah klinis yang dihadapi sangat ditentukan oleh kemampuan profesional kesehatan tersebut menegakkan diagnosis baik diagnosis klinis maupun diagnosis keperawatan, karena diagnosis inilah kemudian yang digunakan untuk merencanakan terapi dan perawatan selanjutnya bagi pasien.

Untuk menegakkan sebuah diagnosis, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data pasien. Pengumpulan data bisa berupa data subjektif (pernyataan klien, keluarga, atau tim medis lainnya) yang kita peroleh dengan melakukan *anamnesis* pada pasien. Data lain dapat berupa data objektif, yang didapat melalui pemeriksaan fisik berupa pengamatan (inspeksi), perabaan (palpasi), pengetukan (perkusi), dan pendengaran (*auskultasi*).

Walaupun telah banyak kemajuan dalam pemeriksaan diagnostik modern seperti *rontgen*, *USG*, dan laboratorium canggih yang membantu profesional kesehatan dalam menegakkan diagnosis namun *anamnesis* dan pemeriksaan fisik diagnostik masih merupakan keterampilan paling esensial bagi seorang

profesional kesehatan. Selain itu, *anamnesis* dan pemeriksaan fisik juga memungkinkan profesional kesehatan mengenal pasiennya (dan begitu pula sebaliknya) serta memahami masalah medis dalam konteks kepribadian dan latar belakang sosial pasien.

Tidaklah mudah untuk menguasai keterampilan ini, perlu penguasaan teori dan latihan yang terus menerus. Profesional kesehatan yang berpengalaman pun tidak hanya menanyakan daftar pertanyaan yang sama kepada setiap pasien, tetapi perlu memodifikasi gaya dalam melakukan *anamnesis* untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang relevan. Mereka juga perlu memberi penekanan yang berbeda pada tingkat kepentingan dan reliabilitas dari temuan klinis yang berbeda. *Anamnesis* dan pemeriksaan fisik yang efektif tergantung pada kemampuan mengingat kembali dan menerapkan beberapa konsep sederhana dalam bidang anatomi, fisiologi dan patofisiologi.

Buku ini lebih menitikberatkan pada pembahasan cara-cara pemeriksaan fisik diagnostik dengan tidak melupakan hal pendukung dalam pemeriksaan fisik tersebut yaitu *anamnesis* dan rekam medis. Olehnya itu pada bab awal ini akan dibahas tentang teknik-teknik *anamnesis* dan cara-cara pembuatan rekam medis.

Buku ini juga dirancang untuk digunakan sambil pengguna melatih keterampilan komunikasi dan pemeriksaan fisik pada pasien sebanyak mungkin, sehingga kemampuan esensial tersebut semakin terasah dan berkembang. Untuk memudahkan pemahaman terutama bagi mahasiswa pemula, maka buku ini dibagi menurut sistem tubuh, diawali dengan memaparkan anatomi dan fisiologi sistem tersebut sebagai pengingat

akan konsep-konsep sederhana yang telah dipelajari di perkuliahan. Lalu dipaparkan teknik-teknik pemeriksaan yang dilakukan pada sistem tersebut untuk mengarah ke sebuah diagnosis kerja dan diagnosis banding sesuai gejala klinis yang ditemukan pada *anamnesis*. Pemaparan disertai dengan gambar untuk membantu memudahkan pemahaman akan konsep dan cara-cara pemeriksaan yang dipaparkan.

A. Teknik Anamnesis Pasien

Langkah awal yang dilakukan sebelum pemeriksaan fisik adalah melakukan anamnesis pada pasien. Tujuan utama suatu anamnesis adalah untuk mengumpulkan semua informasi dasar yang berkaitan dengan penyakit atau keluhan pasien baik secara langsung dari pasien maupun secara tidak langsung dari keluarga pasien. Seorang profesional kesehatan yang baik harus memikirkan semua aspek presentasi pasien kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk yang kelihatannya perlu mendapat perhatian yang terbesar. Profesional kesehatan juga harus menyadari pengaruh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam memahami masalah pasien.

Dalam proses anamnesis, profesional kesehatan juga harus mampu memisahkan gejala dan tanda yang berkaitan dengan penyakit tertentu. Kata *gejala* berarti apa yang dirasakan pasien, dipakai oleh pasien untuk melukiskan sifat penyakitnya. Gejala-gejala tidak bersifat mutlak, sangat dipengaruhi oleh budaya, intelegensi, dan latar belakang sosio-ekonomi. Misalnya gejala nyeri: pasien mempunyai ambang rasa nyeri yang berbeda-beda, sehingga nyeri yang dirasakan dan dilukiskan pasien juga bisa berbeda-beda pada penyakit yang sama.

Sedangkan kata *tanda* menunjuk pada apa yang ditemukan pemeriksa. Tanda dapat diamati dan diukur.

Gejala biasanya didapatkan pada proses *anamnesis* sedangkan tanda didapat melalui pemeriksaan fisik. Gejala dan tanda yang ditemukan sangat membantu dalam proses diagnostik selanjutnya.

Proses diagnostik telah dimulai pada saat pertemuan pertama dengan pasien. Pertemuan pertama ini sangat menentukan interaksi selanjutnya dengan pasien. Pasien harus merasa nyaman dan yakin bahwa kehadiran profesional kesehatan disampingnya dapat membantunya keluar dari masalah kesehatan yang dialami. Bisa jadi pertemuan pertama ini justru mengacaukan proses diagnostik bila pasien tidak merasa aman dan nyaman. Oleh karena itu seorang profesional harus menguasai teknik-teknik *anamnesis* sebagai langkah awal menciptakan hubungan dengan pasien.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada proses *anamnesis* adalah :

1. Persiapan

Persiapan ini meliputi :

a. Persiapan diri profesional kesehatan sebagai pemeriksa

Sebelum berhadapan dengan pasien, seorang pemeriksa perlu mengumpulkan catatan dan informasi yang berhubungan dengan keadaan akhir pasien, bisa melalui rekam medik (bila ada), menanyakan kepada keluarga pasien, atau pada perawat dan dokter yang pernah menangani sebelumnya. Informasi ini perlu untuk membantu pemeriksa dalam memahami masalah yang dihadapi pasien dan menyiapkan daftar pertanyaan yang diajukan dalam

anamnesis. Sehingga pada saat interaksi kita dapat mendengarkan dengan seksama dan memusatkan perhatian sepenuhnya pada pasien tanpa harus membagi perhatian memikirkan apa yang harus ditanyakan selanjutnya. Dengan demikian, pasien akan merasa menjadi pusat perhatian dan menjadi orang terpenting dalam ruangan.

b. Persiapan pasien

Pasien mungkin merasa cemas, tidak enak, malu, takut, atau kesakitan saat berhadapan dengan pemeriksa. Untuk mengatasi hal ini, tanyakan pada pasien siapa saja yang menemaninya, apa hubungannya dengan pasien, dan apakah pasien menginginkan mereka berada dalam ruangan selama konsultasi. Kemudian pastikan adanya privasi (hal ini tidak selalu mudah didapatkan pada bangsal rumah sakit yang ramai; pastikan bahwa tirai tertutup rapat; lihat apakah ruang pemeriksaan kosong).

Biarkan pasien memilih sendiri posisi nyaman yang diinginkan, dapat duduk di kursi atau berbaring di tempat tidur. Bila kacamata, alat bantu dengar, atau gigi palsu sudah dilepaskan, tanyakan apakah pasien ingin memakainya. Ini akan membuat pasien merasa lebih nyaman.

2. Perkenalan

Saat bertemu pasien, dapatkan identitas pasien tanpa ragu-ragu (tanyakan nama lengkap, cocokkan dengan label nama, tanyakan tanggal lahir, alamat, dan sebagainya) dan pastikan bahwa setiap rekam medis, catatan, hasil tes, dan sebagainya memang milik pasien tersebut. Bila memungkinkan jabatlah

tangan pasien dengan erat, sambil menatap matanya, dan tersenyum sambil memperkenalkan diri. Sebutkan nama, gelar, dan pekerjaan serta apa yang akan kita lakukan. Misalnya:

“Nama saya dr Nina, saya adalah konsulen yang khusus menangani penyakit ginjal dan saya diminta mencoba mencari tahu mengapa ginjal anda tidak bekerja dengan baik, Saya membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk berbincang-bincang mengenai masalah medis anda, setelah itu akan saya lakukan pemeriksaan lengkap..”

Dalam melakukan perkenalan ini, lakukan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa dengan senyum dan sikap berdiri yang seimbang. Sikap ramah dan sopan santun harus dijaga namun jangan meninggalkan sikap profesional.

3. Proses *Anamnesis*

Setelah perkenalan dilakukan, *anamnesis* dapat dimulai dengan menanyakan pertanyaan terbuka yang sangat umum, seperti: “Masalah apa yang membuat anda dirawat di rumah sakit?”. Kata-kata pembukaan ini membuat pasien berbicara pada kesempatan pertama. Pemeriksa kemudian dapat menentukan keluhan utama pasien dari keterangan yang diberikan. Kalau pasien memakai istilah-istilah seperti “agak”, “sedikit”, “cukup”, “kadang-kadang”, “jarang” atau “rata-rata”, pemeriksa harus bertanya meminta penjelasannya, karena kata-kata ini mempunyai arti yang cukup luas.

Selama *anamnesis*, pemeriksa yang bertindak sebagai pewawancara harus selalu waspada memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada baik verbal maupun non verbal.

Beberapa hal yang harus diperhatikan selama proses *anamnesis*, yaitu :

- a. Gunakan pertanyaan berujung terbuka (*open-ended*) untuk mendapatkan informasi dan mendorong pasien untuk melukiskan kejadian-kejadian sesuai dengan persepsi mereka (seperti: "Masalah apa yang menyebabkan anda datang ke rumah sakit?")
- b. Gunakan pertanyaan tertutup (*closed ended*) untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan rincian tertentu (seperti: "Di mana yang sakit?")
- c. Batasi penggunaan pertanyaan langsung dan tertutup, pakailah lebih banyak pertanyaan tidak langsung dan terbuka.
- d. Berikan pertanyaan peralihan bila pasien terlalu bertele-tele dalam memberikan keterangan. Ini merupakan pertanyaan interupsi untuk memperjelas informasi yang diberikan (seperti: "Maaf, ambulans dipanggil, tetapi mengapa ambulans dipanggil?; "apa yang anda rasakan?")
- e. Mintalah izin pasien untuk menyelidiki persoalan-persoalan yang sensitif, misalnya riwayat seksual atau percekcoakan pribadi.
- f. Hindari memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi. Berikan kesempatan kepada pasien untuk memberikan respon pada setiap pertanyaan.
- g. Bila pasien berhenti merespon (hening), analisislah petunjuk-petunjuk verbal dan non

verbal yang diperlihatkan. Jangan biarkan pasien memperlihatkan emosi yang tidak terarah.

- h. Kalau pasien mengajukan pertanyaan, berikanlah kesempatan untuk menjelaskan pertanyaannya. Bahkan dapat ditanyakan kembali mengapa mereka menanyakan hal tersebut.

Informasi yang diperoleh pemeriksa disusun menjadi pernyataan yang komprehensif mengenai kesehatan pasien menurut urutan-urutan sebagai berikut :

- a. Sumber dan Reliabilitas

Sumber informasi biasanya adalah pasien. Jika pasien menggunakan penerjemah, sumbernya adalah pasien dan penerjemah. Jika anggota keluarga membantu dalam *anamnesis* ini, namanya harus dicantumkan. Reliabilitas *anamnesis* harus dinilai.

- b. Keluhan Utama

Keluhan utama adalah pernyataan singkat pasien yang menjelaskan mengapa ia mencari bantuan medis. Ini adalah jawaban terhadap pertanyaan: "Masalah apa yang menyebabkan anda datang ke rumah sakit?".

- c. Riwayat Penyakit Sekarang

Riwayat penyakit sekarang merujuk pada perubahan kesehatan akhir-akhir ini yang menyebabkan pasien mencari pengobatan medis sekarang ini. Riwayat ini menguraikan informasi yang relevan dengan keluhan utama.

- d. Riwayat Medis Yang Lalu

Riwayat medis yang lalu berarti penilaian menyeluruh dari kesehatan pasien sebelum penyakit sekarang. Meliputi keadaan umum

kesehatan di masa lampau, penyakit-penyakit di masa lampau, cedera, kecelakaan, perawatan di rumah sakit, pembedahan, alergi, imunisasi, penyalahgunaan obat-obatan, diet, pola tidur, dan obat-obatan yang digunakan.

e. Riwayat Pekerjaan dan Lingkungan

Riwayat pekerjaan dan lingkungan mempertimbangkan pemaparan dengan zat-zat tertentu dan lingkungan yang potensial menimbulkan penyakit.

f. Informasi Biografi

Informasi ini terdiri dari tanggal dan tempat lahir, jenis kelamin, ras, dan latar belakang etnis.

g. Riwayat Keluarga, Riwayat Psikososial, Riwayat Ginekologi, Reproduksi, dan Seksual

Riwayat keluarga dapat memberikan informasi tentang kesehatan seluruh keluarga, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Terdiri dari umur dan kesehatan serta penyakit yang diderita dalam keluarga.

Riwayat psikososial mencakup informasi pendidikan, pengalaman hidup, dan hubungan pribadi pasien.

Riwayat Ginekologi, reproduksi, dan seksual memberi informasi tentang riwayat ginekologi (jika diperlukan), reproduksi, dan orientasi seksual yang dimiliki pasien.

4. Mengakhiri *anamnesis*

Pada saat akan mengakhiri *anamnesis*, paparkan ringkasan tentang segi-segi penting riwayat penyakit seperti yang anda pahami dari wawancara tersebut. Berikanlah kesempatan kepada pasien untuk menambahkan keterangan atau memberikan rincian

yang mungkin terabaikan. Berikan instruksi kepada pasien tentang pemeriksaan fisik yang akan anda lakukan dan mintalah kerjasama pasien.

B. Prinsip-Prinsip Umum Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik merupakan tindakan berkelanjutan dalam mengidentifikasi pasien untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pemeriksa. Pengumpulan data pada pemeriksaan fisik didapat melalui pengamatan (inspeksi), perabaan (palpasi), pengetukan (perkusi), dan pendengaran (*auskultasi*). Teknik pemeriksaan fisik ini bisa digunakan secara keseluruhan ataupun tidak, tergantung bagian tubuh yang dilakukan pemeriksaan.

Prinsip-prinsip pengkajian fisik umum meliputi: pengaturan posisi, tindakan pencegahan universal, metode pemeriksaan fisik, pengkajian terfokus, dan teknik pemeriksaan fisik yang konsisten.

1. Pengaturan posisi

Pengaturan posisi saat pemeriksaan fisik sangatlah penting artinya dalam mencapai keberhasilan pengumpulan data selama pemeriksaan dilakukan, sehingga pengaturan posisi harus dikuasai oleh pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan fisik selanjutnya. Pemeriksa perlu memberikan penjelasan terhadap klien akan adanya beberapa perubahan posisi selama pemeriksaan fisik dilakukan, penjelasan ini selain untuk memberikan kenyamanan juga untuk mempermudah si pemeriksa saat melakukan pemeriksaan fisik.

2. Tindakan pencegahan universal

Untuk mencegah dan meminimalkan perpindahan patogen yang tidak teridentifikasi khususnya patogen yang hidup dalam darah, maka pemeriksa perlu melakukan tindakan pencegahan seperti: mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, menggunakan sarung tangan bila akan menyentuh darah atau cairan tubuh, menggunakan pelindung masker atau pelindung mata untuk melindungi membran mukosa mulut, hidung dan mata selama menjalankan prosedur pemeriksaan.

3. Metode pemeriksaan fisik

Metode yang digunakan saat pemeriksaan fisik yaitu metode "*head to toe*" dan metode ROS (*Review of System*) atau sistem tubuh, kombinasi dari kedua metode tersebut dalam pemeriksaan fisik akan lebih lengkap dan menyeluruh.

Metode "*head to toe*" adalah pengkajian yang dilakukan mulai dari kepala dan secara berurutan sampai ke kaki. Mulai dari: keadaan umum, tanda-tanda vital, kepala, wajah, mata, telinga, hidung, mulut dan tenggorokan, leher, dada, paru, jantung, abdomen, ginjal, punggung, genitalia, rectum, ekstremitas.

Metode ROS (*Review of System*/sistem tubuh) adalah pengkajian yang dilakukan mencakup seluruh sistem tubuh, yaitu: keadaan umum, tanda vital, sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, sistem persyarafan, sistem perkemihan, sistem pencernaan, sistem muskuloskeletal dan integumen, dan sistem reproduksi. Informasi yang didapat membantu pemeriksa untuk menentukan

- sistem tubuh mana yang perlu mendapat perhatian khusus.
4. Pengkajian terfokus
Pengkajian terfokus adalah suatu teknik pengkajian yang difokuskan terhadap organ, sistem organ, atau daerah tertentu pada tubuh, biasanya dikarenakan adanya keluhan terhadap perubahan status kesehatan pasien. Contohnya keluhan nyeri yang dirasakan pasien pada pergelangan tangan maka fokus pengkajian pemeriksaan diarahkan pada nyeri pergelangan tangan.
 5. Teknik pemeriksaan fisik yang konsisten
Teknik pemeriksaan fisik meliputi: inspeksi, palpasi, perkusi, dan *auskultasi* harus digunakan secara konsisten dalam melakukan pemeriksaan fisik. Keempat teknik pemeriksaan fisik tersebut digunakan secara sistematis pada semua bagian tubuh kecuali abdomen. Pemeriksaan fisik abdomen, teknik inspeksi, dan *auskultasi* dilakukan terlebih dahulu sebelum teknik perkusi dan palpasi.

Prinsip-prinsip dasar pemeriksaan fisik :

1. Jelaskan prosedur pemeriksaan fisik yang akan dilakukan pada pasien (untuk keperluan tanggung gugat dan tanggungjawab).
2. Gunakan pendekatan pemeriksaan fisik berupa "head to toe" atau dengan pemeriksaan sistem tubuh.
3. Gunakan pendekatan pemeriksaan fisik mulai dari arah luar tubuh ke arah dalam tubuh.

4. Gunakan pendekatan pemeriksaan fisik dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang dimulai dari daerah yang mengalami kelainan (abnormal) ke daerah yang tidak mengalami kelainan (normal).
5. Lakukan pengamatan terhadap kesimetrisan pada daerah-daerah yang dilakukan pemeriksaan fisik.
6. Pada saat melakukan pemeriksaan fisik, biasakan pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien.
7. Perhatikan pencahayaan yang tepat, suhu, dan suasana ruangan yang nyaman, bagian tubuh yang sedang diperiksa tidak tertutup baju dan selimut, serta jaga privasi pasien.
8. Lakukanlah dokumentasi yang tepat setelah melakukan pemeriksaan.

Alat-alat pemeriksaan fisik

Alat-alat yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan fisik yaitu :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| - Sarung tangan | - Meteran |
| - Masker | - Sudip lidah |
| - Kapas lidi | - Peniti steril |
| - Penggarisan | - Timbangan |
| - Penlight | - Stetoskop |
| - Snellen chart | - Spigmomanometer |
| - Gelas specimen | - Palu (hammer) |
| - Otoskop | - Oftalmoskop |
| - Cairan lubrikan | - Nasal speculum |
| - Disposable | - Vagina speculum |

Teknik pemeriksaan fisik

Ada empat teknik pemeriksaan fisik yang dapat digunakan yaitu: inspeksi, palpasi, perkusi dan *auskultasi*.

1. Inspeksi
Merupakan teknik pemeriksaan fisik yang mengutamakan kemampuan pengamatan pemeriksa. Data didapatkan atas hasil pengamatan dengan melihat kesimetrisan suatu area tubuh, perubahan warna, adanya lesi sampai luka atau perubahan-perubahan yang bersifat patologis pada daerah tubuh yang diperiksa.

Contoh : Nona N, 18 tahun dibawa ke IGD dengan intoksikasi cairan insektisida (merek "X") karena tidak lulus UAN. Saat dilakukan pemeriksaan fisik dengan teknik inspeksi: keadaan umum lemah, kesadaran somnolent, pernafasan cuping hidung, mukosa bibir kering, mulut berbusa, bibir sianosis terlihat menggunakan otot bantu pernafasan.

2. Palpasi

Palpasi merupakan teknik pemeriksaan fisik yang mengandalkan kepekaan tangan pemeriksa terhadap daerah pemeriksaan. Kedua telapak tangan pemeriksa secara anatomi fisiologi memiliki persarafan yang sangat banyak (peka) dan membantu saat pemeriksaan dengan teknik palpasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencapai keberhasilan dalam penggunaan teknik palpasi yaitu:

- a. Untuk mengetahui tekstur kulit sebaiknya pemeriksa menggunakan ujung-ujung jari
- b. Untuk menentukan letak dan posisi suatu organ dapat dilakukan dengan menggunakan dua tangan. Satu tangan untuk merasakan bagian yang dipalpasi dan tangan lainnya melakukan penekanan ke bawah (bimanual).

c. Untuk mengetahui temperatur tubuh, pemeriksa sebaiknya menggunakan kepekaan punggung tangan.

Data yang bisa didapat dengan teknik palpasi antara lain: krepitasi (pada dada), temperatur tubuh, vibrasi (pada punggung dan dada), kelembaban kulit, tekstur kulit, dan elastisitas kulit.

Contoh hasil pemeriksaan fisik dengan teknik palpasi:

Tn. K, 45 tahun, dengan diagnosa medis emfisema subkutan, pasien mengeluh sesak, nyeri saat bernafas, dan mengeluh tidak nyaman didadanya. Hasil pemeriksaan fisik dengan teknik palpasi: krepitasi (+) pada pulmo dekstra lateral, vibrasi lebih kuat pada dada sebelah kanan.

3. Perkusi

Perkusi merupakan tindakan pemeriksaan fisik yang mengandalkan kemampuan dalam membedakan suara hasil ketukan tangan pemeriksa pada daerah pemeriksaan. Melalui teknik perkusi akan dihasilkan bunyi yang berbeda-beda, secara spesifik menunjukkan kondisi organ pada saat dilakukan pengetukan. Teknik perkusi yang dilakukan adalah teknik perkusi langsung dan tidak langsung.

Perkusi langsung adalah teknik perkusi dengan cara menggunakan tangan pemeriksa tanpa menggunakan bantalan. Perkusi jenis ini dilakukan pada pemeriksaan sinus dan daerah wajah (frontal, sphenoidalis, maksilaris, dan etmoidalis).

Perkusi tidak langsung adalah teknik yang dilakukan dengan tangan dominan pemeriksa

sebagai pengetuk dan tangan non dominan sebagai bantalan. Pemeriksaan jenis ini sering kali dilakukan saat pemeriksaan fisik pada daerah dada, punggung, hepar, dan abdomen. Bunyi yang dihasilkan melalui perkusi ini antara lain: resonan (intensitas sedang), hiperresonan (intensitas tinggi atau nyaring) pada daerah paru, timpani (nyaring seperti suara drum) dan dullness (intensitas sedang) pada daerah abdomen.

Contoh hasil pemeriksaan fisik dengan teknik perkusi:

Ny. M, 34 tahun, dengan diagnosa medis gastroenteritis (GE), saat dilakukan pengkajian klien mengeluh kembung. Hasil pemeriksaan fisik dengan teknik perkusi: timpani (+), kuadran kanan bawah, *dullness* (+) kuadran kanan atas.

4. *Auskultasi*

Auskultasi adalah teknik pemeriksaan fisik dengan mengandalkan kepekaan mendengar bunyi yang dihasilkan organ dalam, dengan menggunakan bantuan alat pemeriksaan fisik stetoskop. Data yang bisa didapat dengan menggunakan teknik *auskultasi* adalah:

Daerah paru yaitu *ronchi*, *krakels*, *wheezing*, *vesikuler*, *bronkovesikuler*, dan *bronchial*

Daerah jantung yaitu *gallops*, *murmur*

Daerah abdomen yaitu *bising usus*.

Contoh hasil pemeriksaan fisik dengan teknik *auskultasi*:

Tn. P, 24 tahun, dengan diagnosa medis TB paru, pasien mengeluh sering batuk tapi dahak sulit dikeluarkan. Hasil pemeriksaan fisik dengan teknik *auskultasi* : *ronchi* (+) pada daerah *pulmo*

dextra medial, krakel (+) pada daerah lobus pulmo sinistra lateral.

C. Pemeriksaan Fisik Umum

Pemeriksaan fisik umum merupakan tahapan awal dari pemeriksaan fisik secara keseluruhan. Pemeriksaan ini bertujuan mengumpulkan data tentang status kesehatan pasien dan tanda-tanda vital yang meliputi tingkat kesadaran, tekanan darah, nadi, suhu, dan frekuensi pernapasan.

Pemeriksaan fisik umum meliputi:

1. Menilai keadaan sakit pasien dari hasil inspeksi umum terhadap penderita.

Keadaan sakit pasien dilaporkan sebagai:

- a. Pasien tampak sakit berat.
- b. Pasien tampak sakit sedang.
- c. Pasien tampak sakit ringan.
- d. Pasien tampak tidak sakit.

Penilaian ini dilengkapi dengan data-data obyektif dari hasil pengamatan (inspeksi) umum seperti pasien menggunakan oksigen, pasien menggunakan N.G.T, pasien menggunakan respirator, pasien menggunakan cairan infus, pasien sangat sesak, pasien harus pada posisi ortopnea, pasien bisa makan sendiri, pasien bisa jalan-jalan, pasien tampak gembira, dan sebagainya. Apapun yang didapat menjadi bahan pertimbangan untuk memberi penilaian apakah ia sakit berat, sedang, ringan, atau tampak tidak sakit.

2. Menilai tanda-tanda vital

a. Tingkat kesadaran

Kesadaran adalah derajat hubungan antara *Hemispherium Cerebri* dengan *Reticular Activating System*.

Secara umum penilaian kualitatif tingkat kesadaran, adalah :

- 1) *Composmentis*: kesadaran baik/sempurna, pasien mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik.
- 2) *Apatis*: pasien acuh tak acuh dan segan berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, perhatian berkurang.
- 3) *Somnolens*: mudah tertidur walaupun sedang diajak bicara, dapat dibangunkan dengan rangsang nyeri namun tertidur kembali.
- 4) *Delirium*: Pasien memberontak, berteriak-teriak, dan tidak sadar
- 5) *Sopor*: dengan rangsangan kuat masih memberi respon gerakan
- 6) *Comatous*: kesadaran hilang tidak dapat dibangunkan dengan rangsangan apapun.

Pada tahun 1974, Teasdale G dan Jennett B mempublikasikan penilaian kuantitatif tingkat kesadaran dengan menggunakan Skala Coma Glasgow (*Glasgow Coma Scale*) dengan menilai tiga hal, yaitu: respon motorik, respon bicara, dan pembukaan mata. Masing-masing hal di atas diberi poin yang bila dijumlahkan akan menjadi skor. Total skor dari ketiga respon adalah 15. Skor yang < 7 disebut *coma* dan skor

yang > 7 disebut tidak *coma*. Secara rinci, *Glascow Coma Scale* terdiri dari:

Respon motorik

Nilai 6 : Mampu mengikuti perintah sederhana seperti mengangkat tangan, menunjukkan jumlah jari-jari dari angka yang disebut oleh pemeriksa, melepaskan genggaman.

Nilai 5 : Mampu menunjuk tepat tempat rangsang nyeri yang diberikan seperti tekanan pada *sternum*, cubitan pada *m. trapezius*.

Nilai 4 : Fleksi menjauh dari rangsang nyeri yang diberikan tapi tidak mampu menunjuk lokasi/tempat rangsang dengan tangannya.

Nilai 3 : Fleksi abnormal, bahu *adduksi*, fleksi dan pronasi lengan bawah, fleksi pergelangan tangan dan tinju mengempal bila diberi rangsang nyeri (disebut *Decorticate rigidity*).

Nilai 2 : Ekstensi abnormal, bahu *adduksi* dan rotasi interna, ekstensi lengan bawah, fleksi pergelangan tangan dan tinju mengempal, bila diberi rangsang nyeri.

Nilai 1 : Sama sekali tidak ada respon.

Catatan : rangsang nyeri yang diberikan harus kuat.

Tidak ada trauma spinal, bila hal ini ada, hasilnya akan selalu negatif.

Respon verbal/bicara

Respon verbal diperiksa pada saat pasien terjaga (bangun) dan tidak berlaku bila pasien *dysphasia/aphasia*, mengalami trauma mulut, dipasang intubasi *trachea* (ETT)

Nilai 5 : Pasien orientasi penuh/baik dan mampu berbicara. Orientasi waktu, tempat, orang, siapa dirinya, berada dimana, tanggal, hari.

Nilai 4 : Pasien *confuse* --- tidak orientasi penuh.

Nilai 3 : Bisa bicara, kata-kata yang diucapkan jelas dan baik, tapi tidak nyambung dengan apa yang sedang dibicarakan.

Nilai 2 : Bisa bersuara tetapi tidak dapat ditangkap jelas apa artinya, suara-suara tidak dapat dikenali makna katanya.

Nilai 1 : Tidak bersuara apapun walau diberikan rangsang nyeri.

Respon Membuka Mata

Periksalah rangsang minimum apa yang bisa membuka 1 - 2 matanya.

Catatan : mata tidak dalam keadaan terbalut ataupun *oedema* kelopak mata. Apabila hal ini ada maka skor akhir diberi huruf E yang berarti pembukaan mata tidak dinilai.

Nilai 4 : Mata membuka spontan, misalnya sesudah disentuh.

Nilai 3 : Mata baru membuka kalau diajak bicara atau dipanggil nama atau diperintahkan membuka mata.

Nilai 2 : Mata membuka hanya kalau dirangsang kuat/nyeri.

Nilai 1 : Tidak membuka mata walaupun diberikan rangsang nyeri.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diberikan skor dengan cara nilai yang didapat dari pemeriksaan respon motorik, respon verbal, respon membuka mata dijumlahkan, lalu diinterpretasi tingkat kesadaran dari skor yang diperoleh.

b. Mengukur tekanan darah

Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1) *Metode Palpasi (Metode Riva Rocci)*

Manset dipasang ketat dan sempurna pada lengan atas. Saluran karet dari manset kemudian dihubungkan dengan manometer. Sekarang rabalah arteri radialis pada pergelangan tangan dan naikkan tekanan dalam manset dengan memompa sampai denyut nadi (*arteri radialis*) tidak teraba lagi. Tekanan dalam manset kemudian diturunkan perlahan-lahan dengan memutar tombol pada pompa dengan kecepatan kira-kira 3 mm/detik. Saat dimana denyut arteri radialis teraba kembali menunjukkan tekanan darah sistolis. Metode palpasi harus dilakukan sebelum melakukan metode *auskultasi* untuk menentukan tinggi tekanan yang diharapkan.

2) *Metode Auskultasi*

Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang dokter Rusia yaitu *Korotkoff* pada tahun 1905. Tekanan sistolis dan diastolis

dapat diukur dengan metode ini yaitu dengan mendengar (*auskultasi*) bunyi yang timbul pada arteri brachialis yang disebut bunyi *korotkoff*. Bunyi ini timbul akibat timbulnya aliran turbulen dalam arteri yang disebabkan oleh penekanan manset pada arteri tersebut. Dalam cara *auskultasi* ini, harus diperhatikan jarak antara manset dan tempat meletakkan stetoskop, paling kurang 5 cm. Mula-mula rabalah arteri brachialis untuk menentukan tempat meletakkan stetoskop. Kemudian pompalah manset sehingga tekanannya melebihi tekanan sistolis (yang telah diketahui dari metode palpasi). Turunkan tekanan manset perlahan-lahan sambil meletakkan stetoskop di atas arteri brachialis pada siku. Mula-mula tidak terdengar bunyi kemudian akan terdengar bunyi mengetuk yaitu ketika darah mulai melewati arteri yang tertekan oleh manset sehingga terjadilah turbulensi. Bunyi yang terdengar disebut bunyi *Korotkoff* dan dapat dibagi dalam lima fase yang berbeda :

Fase I : Timbulnya dengan tiba-tiba suatu bunyi mengetuk yang jelas dan makin lama makin keras sewaktu tekanan menurun 10 - 14 mmHg berikutnya. Ini disebut pula nada letupan

Fase II : Bunyi berubah kualitasnya menjadi bising selama penurunan tekanan 15 - 20 mmHg

Fase III : Bunyi sedikit berubah dalam kualitas tetapi menjadi lebih jelas dan keras selama penurunan tekanan 5 - 7 mmHg berikutnya.

Fase IV : Bunyi meredam (melemah) selama penurunan 5 - 6 mmHg berikutnya. Setelah itu bunyi menghilang.

Fase V : Titik dimana bunyi menghilang

- Permulaan dari fase I yaitu dimana bunyi mula-mula terdengar merupakan tekanan sistolis.
- Permulaan fase IV atau fase V merupakan tekanan diastolis, dengan perbedaan sebagai berikut : Fase IV terjadi pada tekanan 7 - 10 mmHg lebih tinggi daripada tekanan diastolis intra arterial yang diukur secara langsung.
- Fase V terjadi pada tekanan yang sangat mendekati tekanan diastolis intra arterial pada keadaan istirahat. Pada keadaan latihan otot atau keadaan yang meningkatkan aliran darah, maka fase V jauh lebih rendah dari tekanan diastolis yang sebenarnya. Pada anak-anak, fase IV lebih tepat digunakan sebagai indeks tekanan diastolis.

Hasil pengukuran tekanan darah adalah sistolik dan diastolik. Nilai sistolik diambil dari *korotkoff* fase I, nilai diastolik diambil dari *korotkoff* fase V. Kecuali pada anak kecil dan

pada keadaan terus terdengarnya bunyi walaupun permukaan air raksa sudah nol. Pada dua keadaan ini, dapat digunakan korotkoff fase IV untuk pencatatan nilai diastolik.

Menurut standar WHO, seorang dikatakan menderita tekanan darah tinggi (hipertensi) bila diukur dalam keadaan istirahat cukup dan kondisi tenang diperoleh tekanan sistolik >160 mmHg dan diastolik >90 mmHg.

c. Menghitung denyut nadi

Denyut nadi adalah detak gelombang darah yang diakibatkan oleh kontraksi ventrikel kiri jantung. Denyut nadi dapat dibedakan menjadi dua yaitu nadi apikal dan nadi perifer.

Denyut nadi apikal adalah denyut nadi yang dirasakan pada apeks jantung

Denyut nadi perifer adalah denyut nadi yang dirasakan di perifer tubuh seperti pada kepala, leher, pergelangan tangan, paha, dan kaki.

Pada pasien yang sehat, denyut nadi apikal dan denyut nadi perifer sama. Lokasi untuk yaitu a. temporal, a. karotis, a. brakialis, a. radialis, a. femoralis, a. popliteal, a. tibialis posterior, dan a. dorsalis pedis. Yang paling umum digunakan adalah denyut nadi pada a. radialis. Denyut nadi dihitung selama satu menit penuh dengan meletakkan ujung jari pada pergelangan tangan sepanjang tulang radius. Hilangkan kebiasaan menghitung dalam tiga puluh detik dikali dua atau dalam 15 detik dikali empat.

Tiga komponen yang harus dilaporkan pada pemeriksaan nadi adalah :

1) Frekuensi

Frekuensi denyut nadi normal adalah 60-80 x/menit. Bila frekuensi denyut nadi kurang dari 60 x/menit disebut bradikardi sedangkan frekuensi lebih dari 80 x/menit disebut takikardi. Frekuensi nadi perlu dibandingkan dengan frekuensi jantung (*heart rate*) pada saat yang bersamaan. Bila ada perbedaan disebut *pulsus deficit* yang didapatkan pada *atrium fibrilasi*.

2) Irama

Pada orang sehat, irama denyut nadi relatif konstan dengan interval yang teratur

3) Kekuatan

Kekuatan denyutan diukur saat melakukan palpasi dengan skala 0 = tidak kuat ; skala 1 = lemah dan sulit dirasakan ; skala 2 = normal; dan skala 3 = kuat.

d. Menghitung pernapasan

Kegiatan bernapas adalah masuknya O_2 Dan keluarnya CO_2 . Pernapasan pasien dihitung dalam satu menit penuh. Yang perlu diperhatikan adalah :

1) *Respiratory rate*

Standar pernapasan normal adalah 16-20 x/menit. Bila lebih dari 24 x/menit disebut takipneu, bila pernapasan lambat kurang dari 10 x/menit disebut bradipneu, bila pernapasan terhenti disebut apneu.

2) Kedalaman pernapasan

Dinilai ada tidaknya pernapasan dalam atau dangkal.

- 3) Irama pernafasan
Diperhatikan keteraturan ekspirasi dan inspirasi.
- e. Mengukur suhu tubuh
Suhu permukaan tubuh (kulit, jaringan subkutan, dan lemak) berfluktuasi sebagai respon terhadap faktor lingkungan. Pengukuran suhu tubuh dapat menggunakan termometer air raksa atau termometer digital. Pengukuran suhu tubuh dapat dilakukan secara oral, rektal, atau aksila. Waktu pengukurannya bervariasi, bila menggunakan termometer digital dalam kondisi baik hasil pengukuran lebih akurat dalam waktu 20-60 detik. Pengukuran secara oral dilakukan selama 3-4 menit dan secara rektal dilakukan selama 2-3 menit dan secara aksila dilakukan selama 5-10 menit.
Ada empat kategori hasil pengukuran suhu tubuh yaitu :

- 1) Suhu tubuh normal 36-37 °C
- 2) Hipotermia adalah keadaan menurunnya suhu tubuh, yaitu < 35 °C
- 3) Pireksia adalah keadaan suhu tubuh 38-40 °C
- 4) Hipertermia adalah keadaan meningkatnya suhu tubuh hingga 41-42 °C

D. Rekam Medis

Hasil *anamnesis* dan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh seorang profesional kesehatan harus dicatat dalam sebuah rekam medis sesuai dengan UU RI No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 46 ayat 1, yang berbunyi "Setiap dokter atau dokter gigi

dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis”

Rekam Medis menurut Lampiran SK PB IDI No 315/PB/A.4/88 adalah rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medis/esehatan kepada seorang pasien. Rekam medis harus ada untuk mempertahankan kualitas pelayanan profesional, untuk melengkapi kebutuhan informasi, untuk kepentingan dokter pengganti yang meneruskan perawatan pasien, untuk referensi masa datang, serta diperlukan karena adanya hak untuk melihat dari pasien.

Berdasarkan Permenkes No 749 tahun 1989 pasal 70, berkas rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien, tetapi hanya diberikan fotokopi *resume* bilamana diperlukan.

Semua instruksi dokter, catatan perawat, laporan dari tindakan, data medikasi, radiologi, dan hasil laboratorium, serta tanda tanda vital dan informasi lain yang diperlukan untuk memonitor keadaan pasien harus di dokumentasikan dalam Rekam Medis, termasuk catatan pemulangan pasien dengan hasil masuk rawat, catatan kasus, dan catatan pemberian perawatan *follow up*. Tidak lupa cantumkan diagnosis akhir/Ringkasan Pulang dengan melengkapi Rekam Medis dalam waktu 30 hari sesudah pemulangan pasien.

Rekam medis digunakan sebagai pedoman atau perlindungan hukum yang mengikat karena di dalamnya terdapat segala catatan tentang tindakan,

pelayanan, terapi, waktu terapi, tanda tangan dokter yang merawat, tanda tangan pasien yang bersangkutan, dan lain-lain. Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada Rekam Medis, dapat dilakukan pembetulan. Pembetulan hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa penghapusan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan (Pasal 5 Ayat 5 dan 6 Permenkes Nomor 269/Menkes/PER/III/2008).

Dengan kata lain, rekam medis dapat memberikan gambaran tentang standar mutu pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan maupun oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Berkas rekam medis juga menyediakan data untuk membantu melindungi kepentingan hukum pasien, dokter, dan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan. Catatan ini juga menyediakan data yang dapat melindungi kepentingan hukum pasien dalam kasus-kasus kompensasi pekerja, kecelakaan pribadi, atau malpraktek.

Sayangnya UU Praktik Kedokteran tidak menyebutkan sampai kapan Rekam Medis ini harus disimpan dalam arsip seorang dokter atau dokter gigi, apalagi penyimpanan arsip seringkali memerlukan penanganan khusus yang tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Tetapi dalam Permenkes No. 269/Menkes / Per / III / 2008 Pasal 8 dicantumkan Rekam Medis pasien rawat inap RS wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk 5 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. Sesudah jangka waktu 5 tahun dilampaui, Rekam Medis tersebut dapat dimusnahkan kecuali Ringkasan Pulang dan *Informed Consent*, yang masih harus disimpan untuk jangka waktu

10 tahun, dihitung tanggal dibuatnya ringkasan tersebut. Rekam Medis pada sarana pelayanan kesehatan non RS wajib disimpan sekurang kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun dihitung dari tanggal terakhir pasien tersebut berobat.

Rekam medis terdiri dari dua bagian, yaitu identitas dan pemeriksaan klinik. Identitas berisi data pribadi (nama, nomor KTP, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat sekarang, keluarga terdekat, pekerjaan, nama dokter, dan keterangan yang diperlukan untuk identifikasi lainnya), data finansial (Nama/alamat majikan/perusahaan, perusahaan asuransi yang menanggung, tipe asuransi, nomor polis, dan sebagainya) dan data sosial (kewarganegaraan/ kebangsaan, hubungan keluarga, agama, penghidupan, kegiatan masyarakat, dan data data lain mengenai kedudukan sosial pasien). Pemeriksaan klinik berisi data klinis yang mengisahkan secara kronologis kegiatan pelayanan medis yang diterima pasien selama berada di rumah sakit.

Rekam medis akan bernilai guna bagi unsur administratif, hukum, keuangan, riset, edukasi, dan pendokumentasian, apabila memenuhi unsur akreditasi, yaitu rekam medis memiliki:

1. Identitas dan formulir persetujuan-persetujuan tindakan yang telah ditandatangani oleh pasien atau keluarga (*Informed Consent*).
2. Riwayat penyakit pasien secara lengkap.
3. Laporan pemeriksaan fisik.
4. Instruksi diagnostik dan teraupetik dengan tanda tangan dan nama terang tenaga kesehatan yang berwenang. Instruksi per telepon dapat diterima oleh perawat dan dicatat tetapi dalam waktu 24 jam

- instruksi tersebut harus segera ditandatangani oleh dokter yang bertanggungjawab.
5. Observasi, segala laporan observasi termasuk laporan konsultasi.
 6. Laporan tindakan dan penemuan, termasuk yang berasal dari penunjang medik, yaitu laboratorium, radiologi, laporan operasi serta tanda tangan pasien, dokter, dan sebagainya. Untuk laporan operasi harus memuat informasi lengkap mengenai penemuan, cara operasi, benda yang dikeluarkan dan diagnosis pasca bedah.

Syarat rekam medis yang bermutu adalah:

1. Akurat, menggambarkan proses dan hasil akhir pelayanan yang diukur secara benar.
2. Lengkap, mencakup seluruh kekhususan pasien dan sistem yang dibutuhkan dalam analisis hasil ukuran.
3. Terpercaya, dapat digunakan dalam berbagai kepentingan.
4. Valid atau sah sesuai dengan gambaran proses atau produk hasil akhir yang diukur.
5. Tepat waktu, dikaitkan dengan episode pelayanan yang terjadi.
6. Dapat digunakan untuk kajian, analisis, dan pengambilan keputusan.
7. Seragam, batasan sebutan tentang elemen data yang dibakukan dan konsisten penggunaannya di dalam maupun di luar organisasi.
8. Dapat dibandingkan dengan standar yang disepakati untuk diterapkan.
9. Terjamin kerahasiaannya.
10. Mudah diperoleh melalui sistem komunikasi antar yang berwenang.

BAB II


PEMERIKSAAN FISIK SISTEM INTEGUMEN

A. Anatomi Fisiologi Kulit, Rambut Dan Kuku

1. Anatomi Fisiologi Kulit

Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh, sekitar 17 kg kulit yang menutupi permukaan tubuh yang luasnya sekitar 1-3 m². Secara fungsional, kulit melakukan tugas-tugas yang luar biasa. Kulit merupakan interface kita dengan lingkungan, memberi perlindungan terhadap serangan dari luar, dan mempertahankan keutuhan jaringan di dalam tubuh. Kulit bersifat permeabel secara selektif. Sebagai suatu mekanisme homeostatik, kulit mengatur suhu tubuh dalam batas-batas yang sempit meskipun suhu sekitar terlalu ekstrim. Kulit melakukan sekresi, ekskresi, absorpsi, sintesis, dan fungsi merasa, semuanya ini memerlukan substruktur dan modifikasi khusus.

Sebagai gambaran, penampang lintang dan visualisasi struktur lapisan kulit tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1. Penampang dan Lapisan Kulit

Struktur kulit terdiri dari tiga lapisan yaitu epidermis sebagai lapisan yang paling luar, dermis, hipodermis (kutis dan sub kutis).

a. Epidermis

Epidermis merupakan bagian kulit yang paling luar. Ketebalannya berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh. Yang paling tebal berukuran 1 milimeter misalnya pada telapak tangan dan telapak kaki, dan yang paling tipis berukuran 0,1 milimeter terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Epidermis melekat erat pada dermis karena secara fungsional epidermis memperoleh zat-zat makanan dan cairan antar sel dari plasma yang merembes melalui dinding-dinding kapiler dermis ke dalam epidermis.


Epidermis dibedakan atas lima lapisan kulit, yaitu :

- 1) *Stratum corneum*, merupakan lapisan epidermis yang paling atas, sebagian besar terdiri atas keratin. Lapisan ini dikenal dengan lapisan *horny*, terdiri dari milyaran sel pipih yang mudah terlepas dan digantikan oleh sel yang baru setiap

4 minggu. Pada saat terlepas, kondisi kulit akan terasa sedikit kasar sampai muncul lapisan baru. Proses pembaruan lapisan tanduk terus berlangsung sepanjang hidup, menjadikan kulit ari memiliki *self repairing capacity* atau kemampuan memperbaiki diri. Bertambahnya usia dapat menyebabkan proses keratinisasi berjalan lebih lambat. Ketika usia mencapai sekitar 60 tahunan proses keratinisasi membutuhkan waktu sekitar 45-50 hari, akibatnya lapisan tanduk menjadi lebih kasar, lebih kering, lebih tebal, timbul bercak-bercak putih karena melanosit lambat bekerja dan penyebaran tidak lagi merata.

- 2) *Stratum lucidum*, disebut juga lapisan *barrier*, terletak tepat dibawah lapisan tanduk. Lapisan ini terdiri dari protoplasma sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis, dan bersifat translusen sehingga dapat dilewati sinar (tembus cahaya). Lapisan ini sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Pada kulit tipis lapisan ini tidak ada.
- 3) *Stratum granulosum*, tersusun oleh sel-sel keratinosit yang mengandung butir-butir didalam protoplasmanya. Proses keratinisasi dimulai pada lapisan ini. Lapisan ini sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki.
- 4) *Stratum spinosum* disebut juga lapisan *malphigi* yang terdiri dari 8-10 lapis sel yang berbentuk tidak teratur (polyhedral). Sel pada lapisan ini kaya akan RNA yang menginisiasi sintesis protein untuk produksi keratin.

- 5) *Stratum basale*, merupakan lapisan terbawah epidermis, terdiri dari satu lapis sel kolumnar yang dapat mengalami mitosis, sel berpindah dari lapisan terbawah ke paling atas, akhirnya menjadi sel tanduk. Pengaruh lapisan ini cukup besar terhadap pengaturan metabolisme demodermal dan fungsi-fungsi vital kulit. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.2. Lima Lapisan pada Epidermis

b. Dermis

Dermis menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah, getah bening, dan otot penegak rambut (*musculus erector vili*). Dermis sering disebut kulit sebenarnya dan 95% dermis membentuk ketebalan kulit. Ketebalan rata-rata dermis diperkirakan antara 1-2 mm.

Keberadaan saraf perasa memungkinkan kulit membedakan berbagai rangsangan dari luar. Masing-masing saraf perasa memiliki fungsi tertentu, saraf dengan fungsi mendeteksi rasa sakit, sentuhan, tekanan, panas, dan dingin.

Kelenjar minyak yang menempel di kandung rambut memproduksi minyak untuk melumasi

permukaan kulit dan batang rambut. Kelenjar keringat menghasilkan cairan keringat yang dikeluarkan ke permukaan kulit melalui pori-pori kulit. Di permukaan kulit, minyak dan keringat membentuk lapisan pelindung yang disebut *acid mantel* atau sawar asam dengan nilai pH sekitar 5,5. Sawar asam merupakan penghalang alami yang efektif dalam menangkai berkembang biaknya jamur, bakteri, dan berbagai jasad renik lainnya.

Perlu diperhatikan bahwa luka yang terjadi di lapisan dermis dapat menimbulkan cacat permanen, karena tidak memiliki kemampuan memperbaiki diri sendiri seperti yang dimiliki kulit ari.

c. Hipodermis


Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh, dan sebagai cadangan makanan. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi sepanjang kontur tubuh, paling tebal di daerah pantat dan paling tipis terdapat di kelopak mata. Jika usia menjadi tua, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah kulit juga menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemak, lemaknya berkurang sehingga kulit akan mengendur serta makin kehilangan kontur.

2. Anatomi Fisiologi Rambut

Rambut dibentuk oleh invaginasi sel epidermal dan dermal. Terdiri dari akar rambut, batang rambut, dan folikel rambut. Folikel rambut menghasilkan keratin saat rambut sudah matang. Kulit kepala yang

ditumbuhi folikel rambut hanya sekitar 90% dari keseluruhan. Pertumbuhan rambut dipengaruhi oleh ras, jenis kelamin, nutrisi, lokasi, dan faktor hormonal. Pertumbuhan rambut pada daerah aksila dan pubis sangat dipengaruhi oleh kerja hormonal tetapi rambut yang di kulit kepala, alis mata, dan ekstremitas tidak dipengaruhi kerja hormonal. Kerontokan rambut bisa diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain kerusakan materi rambut, medikasi, gangguan metabolik, dan karakteristik genetik.

Rambut mempunyai hubungan erat dengan kelenjar sebacea, karena kelenjar sebacea bermuara di folikel rambut. Seperti tampak pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.3. Anatomi Rambut

Ada dua tipe rambut yaitu lanugo (rambut halus) dan rambut terminal yang dapat memanjang. Penampang rambut dari luar ke dalam, terdiri dari bagian-bagian : kutikula, korteks, dan medula.

Pertumbuhan rambut berbeda-beda tergantung dari lokalisasinya, pada kepala 0,35 mm/hari. Dalam kondisi normal, rambut gugur setiap hari 20-100


lembar. Berbagai macam penyakit sistemik mempengaruhi pertumbuhan dan struktur rambut. antara lain penyakit dengan panas tinggi misalnya pada demam tifoid. Gugurnya rambut secara temporer juga bisa terdapat pada bayi baru lahir, *post partum*, penyakit malnutrisi, dan emotional stres.

Rambut juga mempunyai hubungan erat dengan hormon seks, misalnya hormon testosteron pada laki-laki yang dapat menstimulir tumbuhnya kumis, janggut, alis, pubis, dan lain-lain.

3. Anatomi Fisiologi Kuku

Kuku adalah bagian terminal lapisan korneum yang menebal. Bagian kuku yang terbenam dalam kulit disebut akar kuku (*nail root*), bagian yang terbuka di atas dasar jaringan lunak kulit pada ujung jari disebut badan kuku (*nail plate*) dan yang paling ujung adalah bagian kuku yang bebas.

Kuku tumbuh dari akar kuku ke luar dengan kecepatan tumbuh kira-kira 1 mm per minggu. Bagian-bagian kuku secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.4. Bagian-Bagian Kuku

B. Pemeriksaan Fisik Kulit

Variasi gangguan fungsi yang dapat ditemukan pada kulit banyak sekali. Salah satu dari empat keluhan utama ini biasanya mendorong pasien untuk mencari pengobatan, yaitu: nyeri, disfungsi kulit, lesi asimtomatik, atau perubahan dari keadaan normal. Di samping menggali keluhan-keluhan ini, *anamnesis* harus menyelidiki tujuh ciri lesi kulit yang bisa membantu dalam membuat diagnosis. Ini meliputi lokasi anatomis, gejala-gejala, dan riwayat penyakit yang berhubungan, urutan waktu, perkembangan lesi, riwayat pemaparan dan pemakaian obat-obat, efek terpapar sinar matahari, dan bahan lain. Saat memeriksa lesi kulit individual, pusatkanlah perhatian pada sejumlah kecil ciri-ciri fisik yang akan membantu memahami sifat dasar penyakit kulit. Tanyakanlah pada pasien beberapa pertanyaan terarah selama *anamnesis* dan saat memeriksa tiap lesi.

Tabel 2.1. Pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan selama *anamnesis*

No.	Pertanyaan
1	Apakah lesi tersebut nyeri atau gatal ?
2	Jenis disfungsi apa yang terjadi ?
3	Bagaimana pasien menemukan lesi tersebut ?
4	Dimana lesi tersebut pertama kali terlihat ?
5	Apakah ada gejala-gejala lain pada waktu itu ?
6	Kapan lesi tersebut pertama kali terlihat ?
7	Apakah pasien makan obat atau ada paparan yang berkaitan ?
8	Apa yang terjadi jika lesi tersebut terpapar sinar matahari ?

Setelah melakukan *anamnesis*, lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan fisik pada kulit dengan memperhatikan perubahan kulit secara menyeluruh dan perubahan kulit setempat dimana gangguan kulit berada. Ada tujuh ciri fisik kulit yang harus diperhatikan pada saat pemeriksaan fisik yaitu :

1. Perubahan menyeluruh

a. Turgor kulit.

Turgor kulit umumnya mencerminkan keadaan hidrasi. Pada dehidrasi dan usia lanjut kulit kelihatan kering seperti kertas perkamen. Pada pasien lanjut usia, hal ini mencerminkan hilangnya elastisitas kulit dan juga keadaan kekurangan air ekstrasel. Turgor paling baik dinilai dengan menjepit kulit (*tenting the skin*) dahi dengan ibu jari dan jari telunjuk, lepaskan dengan cepat dan perhatikanlah kecepatan kembalinya sampai datar kembali. Hidrasi juga dapat diperiksa dengan merasakan kelembaban aksila. Kombinasi penurunan turgor kulit, mata yang lunak, dan cekung, dan tidak adanya keringat aksila merupakan tanda diagnostik untuk dehidrasi berat.

2. Tekstur kulit

Tekstur kulit berubah-ubah di bawah pengaruh banyak variabel. Tekstur kulit dapat kasar, kering, atau halus atau mungkin dilukiskan dengan istilah lain yang serupa.

3. Warna kulit

Warna kulit juga dipengaruhi oleh banyak variabel dan dapat ditemukan beberapa kelainan yaitu :

- Gangguan pada melanin dapat menyeluruh atau setempat dan menyebabkan kulit menjadi gelap. Tidak adanya pigmentasi sama sekali terjadi pada

albino. Peningkatan pigmentasi melanin terjadi pada beberapa penyakit sistemik.

- Pigmen kulit abnormal terlihat pada hemokromatosis, diabetes melitus, dan sirosis, ditandai oleh pigmentasi warna merah tua pada kulit. Ketiga keadaan tersebut merupakan akibat dari penumpukan zat besi di dalam jaringan dan reaksi selanjutnya terhadap zat besi tersebut.
- Argiria adalah istilah yang dipakai untuk keracunan perak. Pada argiria, kulit berwarna abu-abu kebiruan karena penumpukan perak di dalam kulit. Penyebab umum adalah penyalahgunaan obat tetes hidung yang mengandung perak nitrat secara kronis.
- Sianosis adalah perubahan warna kulit menjadi kebiruan yang paling jelas terlihat pada ujung jari dan bibir. Sianosis ini disebabkan oleh desaturasi hemoglobin.
- Ikterus adalah warna kulit yang kuning yang disebabkan oleh endapan pigmen empedu di dalam kulit sekunder terhadap penyakit hati atau hemolisis sel darah merah.

4. Perubahan setempat

a. Distribusi Lesi

Lesi yang timbul hanya pada daerah tertentu menyarankan bahwa penyakit tersebut berkaitan dengan keistimewaan susunan kulit daerah tersebut. Daerah kulit yang lembab dimana permukaan kulit bergesekan dan mengalami maserasi, mudah terinfeksi jamur superfisial atau intertrigo. Dermatitis yang terbatas pada daerah-daerah ini, aksila, lipatan paha, lipatan bokong, dan lipatan di bawah kelenjar mammae mengarah pada kemungkinan ini.

Daerah-daerah kulit lainnya kaya akan keratinisasi, seperti siku, lutut dan kulit kepala, mungkin paling terlibat dalam penyakit yang mengganggu keratinisasi. Misalnya proriasis, yang sering terlihat sebagai plak bersisik yang paling menonjol pada siku, lutut, dan kulit kepala.

Distribusi lesi pada daerah yang terpapar sinar matahari dapat dihubungkan dengan pengaruh sinar ultraviolet yang punya efek destruktif jangka panjang.

Lesi lain ditandai oleh predileksinya untuk tempat anatomik tertentu. Endapan hiperlipidemia seringkali terlihat pada permukaan tendo siku, atau jari tangan, lipatan telapak tangan, dan lipatan kelopak mata. Kelainan kronik lain seperti dishidrosis, secara selektif menyerang telapak tangan dan telapak kaki dengan lesi kecil, melepuh dan bersisik. Dua penyakit infeksi, sifilis sekunder dan *rocky moutain spotted fever* secara khas mencakup lesi pada telapak tangan. Patofisiologi distribusi ini tidak diketahui. Petekiae, yaitu bintik merah kecil karena ekstrasvasasi darah ke dalam kulit, kemungkinan besar timbul untuk pertama kalinya di tungkai bawah. Alasannya adalah bahwa tekanan hidrostatik dalam percabangan pembuluh darah adalah paling besar pada bagian tubuh yang paling rendah. Defisiensi trombosit atau kelemahan dinding pembuluh darah akan terlihat untuk pertama kalinya di tungkai bawah meskipun kelainan tersebut bersifat menyeluruh.

Dermatitis yang terbatas pada pergelangan tangan yang biasanya memakai gelang menyarankan kemungkinan alergi terhadap nikel. Dermatitis yang

terbatas pada daerah ikat pinggang elastik atau daerah yang dibalut selama pengobatan, memberi kesan hipersensitivitas terhadap ikat pinggang elastik atau plester.

b. Susunan lesi

Lesi kulit dengan distribusi sepanjang suatu dermatom menunjukkan adanya penyakit neurogenik. Contohnya adalah penyakit *herpes zoster* (Gambar 6.7), di sini, lesi vesikuler timbul tepat pada daerah distribusi serabut yang terinfeksi. Kalau proses penyakitnya hanya menyerang lapisan epidermis saja, lesi tersebut sering kali berderet sepanjang aksis lipatan kulit yang halus, misalnya pada *pitiriasis rosea*.

Linearitas merupakan observasi yang penting. Lesi yang berbentuk garis sepanjang sumbu panjang suatu anggota tubuh dapat mempunyai arti: 1. Garukan pasien: merupakan penyebab tersering untuk lesi linear; 2. Erupsi karena *poison ivy*, suatu dermatitis kontak, berbentuk linear, karena iritannya disebarkan oleh garukan yang bergerak naik-turun; 3. Pembuluh darah atau pembuluh limfe biasanya tersusun sepanjang sumbu panjang anggota tubuh. Peradangan pembuluh darah atau pembuluh limfe dapat menyebabkan lesi linear merah; 4. Akhirnya, parasit skabies dapat membuat liang-liang pendek (1 cm) terutama pada kulit di antara jari-jari tangan.

Lesi satelit yaitu lesi sentral yang besar yang dikelilingi oleh dua atau lebih lesi serupa tetapi lebih kecil, menunjukkan asal lesi dan penyebaran darinya, seperti yang dijumpai pada *melanoma malignum* atau infeksi jamur. Lesi yang berkelompok mempunyai

arti yang sama, kecuali bahwa tidak ada lesi utama dibagian sentral.

c. Jenis lesi


Ada beberapa jenis lesi yang biasa ditemukan, yaitu :

- Papula; adalah lesi yang padat dan menonjol. Biasanya berdiameter kurang dari satu sentimeter dan dapat disebabkan oleh hiperplasia salah satu unsur kulit normal, atau infiltrasi unsur asing. Kalau suatu lesi papuler terdiri dari banyak tonjolan kecil, ia disebut vegetasi. *Kutil filiformis* yang khas adalah suatu vegetasi.
- Plak; adalah tonjolan yang lebih besar daripada papula dan meluas lebih dalam ke dalam dermis, dan dapat mempunyai tepi yang landai. Plak dapat disebabkan oleh persatuan banyak papula.
- Likenifikasi; adalah istilah yang menunjukkan penebalan kulit dengan aksentuasi garis-garis kulit yang normal dan tekstur kulit pada umumnya kasar.
- Nodulus; berbeda dari papula karena mereka masuk lebih dalam ke dermis. Bentuknya dapat bulat, oval. atau elips. Suatu nodulus dapat berasal dari dalam jaringan subkutis dan hanya secara sekunder mengangkat kulit normal di atasnya. Nodulus harus ditangani secara serius, karena dapat menunjukkan penyakit sistemik.
- Bidur; adalah penonjolan kulit khusus yang disebabkan oleh cairan edema didalam lapisan dermis atas. Warnanya merah pucat

- dan cepat menghilang. Ukurannya dapat kecil atau besar dan seringkali gatal, seperti pada gigitan serangga.
- Vesikel dan bula; adalah tonjolan berisi cairan dan berbatas tegas. Cairan di dalamnya dapat berupa limfe, darah, atau serum. Bula adalah vesikel besar dan secara arbitrer ditentukan diameternya di atas 0,5 cm. Vesikel dan bula mudah pecah.
 - Gambaran lesi yang tidak beratap atau menyembuh harus diperhatikan. Kalau dasarnya terdiri dari lapisan basal epidermis, ia disebut erosi. Erosi mengeluarkan cairan jernih dan tidak membentuk parut. Lesi yang lebih dalam ke dalam papila dermis dan dibawahnya disebut ulkus. Ulkus dapat berdarah dan membentuk parut.
 - Pustula; adalah suatu vesikel yang berisi *debris purulen*. Warna pustula biasanya krem tetapi dapat hijau atau kuning. Setiap lesi vesikuler dapat mengalami infeksi sekunder sehingga membentuk pustula.
 - Makula; yang disebabkan oleh gangguan melanosit lazim dijumpai pada pemeriksaan fisik. Bintik-bintik coklat muda dan nevus adalah penambahan jumlah melanosit setempat atau jumlah granula melanin yang terdapat di dalam melanosit. Tidak adanya melanosit pada suatu daerah tertentu juga menimbulkan makula yaitu makula putih. Vitiligo adalah istilah yang dipakai pada daerah kulit amelanotik yang tersebar luas dan bercak-bercak. Vitiligo, yang dapat

diturunkan, dijumpai pada banyak penyakit autoimun seperti pada hipoparatiroidisme idiopatik, penyakit addison, hipertiroidisme, dan anemia pernisiiosa.

- Petekia atau pupura; merupakan kelainan pembuluh darah dimana darah keluar dari pembuluh darah dan masuk kedalam kulit. Petekia adalah kelainan yang berukuran kecil dan berdiri sendiri-sendiri sedangkan purpura berukuran besar dan lebih tersebar.



Gambar. 2.5. Jenis-jenis lesi pada kulit

Teknik pemeriksaan kulit

Evaluasi lesi kulit terbatas pada inspeksi yang cermat dan palpasi. Pemeriksaan kulit belum lengkap kalau kita belum memeriksa semuanya. Bahkan walaupun kelainannya terbatas, seluruh kulit harus diperiksa dengan teliti, sebaiknya dengan membuka seluruh pakaian pasien. Teknik pemeriksaan yang efektif memberikan penekanan pada pemeriksaan lesi, pemeriksaan membran mukosa, pemakaian kaca pembesar yang tepat, pencahayaan khusus untuk memvisualisasikan lesi secara optimal, diaskopi,

pemeriksaan kerokan lesi dengan mikroskop, dan biopsi kulit.

Alat pemeriksaan terpenting yang siap pakai adalah penglihatan kita. Pencahayaan alamiah yang terang akan sangat membantu. Periksa kulit dengan cermat seperti ketika anda memeriksa sebuah slide dibawah mikroskop, mulai dengan pembesaran kecil sampai pembesaran kuat. Mula-mula lakukan pemeriksaan umum tentang distribusi lesi, kemudian tentukan susunan lesi, dan akhirnya analisislah lesi secara individual.

Perhatikanlah keadaan struktur-struktur di dekatnya dan berbagai macam komponen kulit. Misalnya ada atau tidak adanya kehilangan rambut membantu membedakan berbagai macam penyakit. Limfadenopati di dekat lesi kulit dapat disebabkan oleh infeksi, penyakit lapisan dermis profunda, atau tumor. Keadaan kelenjar sebacea dan eksokrin memberikan informasi yang sangat berharga.

Pemeriksaan kulit dapat diperluas dengan menggunakan beberapa teknik sederhana, yaitu:

1. Menggunakan kaca pembesar dapat membantu melihat lesi yang kecil.
2. Manipulasi cahaya dengan menggunakan lampu biasa atau *lampu wood* yang bila diarahkan ke lesi akan timbul fluoresensi khas, misalnya *pseudomonas* akan memperlihatkan warna hijau metalik yang khas.
3. Diaskopi adalah teknik menekan lesi dengan sebuah objek gelas, bilamana lesi menghilang kemungkinan besar disebabkan oleh dilatasi pembuluh darah, bilamana tidak menghilang berarti terjadi extravasasi darah ke dalam kulit.

4. Pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop untuk memeriksa kerokan kulit yang dicampur dengan kalium hidoksida 10% atau pemeriksaan cairan vesikel dengan pewarnaan Gram atau Giemsa.
5. Biopsi, merupakan diagnosa pasti jenis lesi, caranya dengan mengambil tepi lesi dengan biopsi dan difiksasi segera, lalu diamati di bawah mikroskop.

C. Pemeriksaan Fisik Rambut

Beberapa faktor genetik dan hormonal mempengaruhi rambut kepala. Resesi frontal garis rambut terjadi karena pengaruh testosteron. Hal ini sangat membantu dalam membedakan *virilisasi* dengan *hirsutisme* biasa. *Virilisasi* pada wanita menyebabkan bertambahnya pertumbuhan rambut atau *hirsutisme*, resesi temporal garis rambut, dan pembesaran klitoris. *Hirsutisme* menyebabkan bertambahnya jumlah rambut tanpa ciri-ciri lainnya. Banyak kelainan genetik juga menyebabkan garis rambut yang rendah di bagian posterior. Kebotakan adalah suatu sifat yang diturunkan dan dapat terjadi pada wanita. Bila kebotakan terjadi dengan pola yang tidak umum atau karena suatu penyakit disebut *alopesia*. Sejumlah besar penyakit, obat, dan toksin dapat menyebabkan kerusakan folikel rambut dan menimbulkan *alopesia*.

Teknik pemeriksaan rambut

1. Inspeksi rambut

Inspeksi distribusi rambut di sekitar kulit kepala, leher, wajah, hidung, telinga, aksila, anterior dan posterior, bokong dan sekitar puting susu. Adanya penyimpangan menunjukkan adanya gangguan pada sistem endokrin. Inspeksi jumlah rambut.

2. Inspeksi warna rambut
Warna rambut mulai warna terang hingga warna hitam. Perubahan warna rambut terjadi pada pasien dengan anemia dan malnutrisi.
5. Palpasi tekstur rambut
Palpasi tekstur rambut pada area pubis dan aksila terasa kasar, sedangkan rambut di kepala terasa tipis. Tekstur rambut pada umumnya dapat berubah setelah mendapatkan perawatan kecantikan. Tekstur rambut dapat mengalami kelainan pada pasien dengan penyakit sistemik.

D. Pemeriksaan Fisik Kuku

Pemeriksaan fisik kuku dapat dilakukan dengan inspeksi dan palpasi.

- Inspeksi warna kuku; pada kuku yang normal memiliki bantalan kuku dengan warna merah muda.
- Inspeksi kurvatura (kelengkungan); biasanya kuku yang normal membentuk kurvatura dengan sudut 160°
- Palpasi kurvatura kuku; *clubbing* (sudut kuku $> 180^\circ$) biasanya dialami pasien dengan masalah respirasi dan kardiovaskuler.


BAB III

PEMERIKSAAN FISIK KEPALA DAN LEHER

A. Anatomi Fisiologi Kepala Dan Leher

Daerah kepala merupakan daerah dimana beberapa sistem tubuh penting berada yaitu panca indera (penglihatan, penciuman, pengecapan, pendengaran, dan sensasi). Pada daerah kepala juga terdapat susunan saraf pusat yang terdiri dari otak besar, otak kecil, dan batang otak. Saraf kranial yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang memegang peranan penting dalam pengaturan motorik dan sensorik tubuh juga terdapat di kepala.


Gambar di bawah ini melukiskan tempat-tempat anatomik penting pada kepala yang perlu diperhatikan selama pemeriksaan fisik.



Gambar. 3. 1. Anatomi Kepala

Daerah leher juga memiliki beberapa organ yang terkait dengan sistem tubuh yaitu pencernaan dan pernapasan. Di daerah leher juga banyak terdapat pembuluh-pembuluh darah besar misalnya a.carotis dan vena jugularis. Organ lain selain pembuluh darah yang terdapat di leher adalah kelenjar getah bening yang bisa ditemukan mulai belakang telinga menjalar ke bagian sub mandibula dan leher. Di daerah leher juga terdapat sistem persarafan yaitu saraf servikalis.


Leher dibagi dalam empat segitiga untuk pencatatan dan interpretasi penemuan. Garis tengah dibatasi oleh *insisura kartilago tiroidea* dan *insisura suprasternal*. *Trigonum submandibulare* dibatasi oleh mandibula dan kedua venter *m. digastricus*. *M. Sternocleidomastoideus* yang menonjol membatasi tepi lateral *trigonum servikalis anterior*. Fossa *supraklavikularis* ditemukan di antara klavikula, *insersio m.sternocleidomastoideus* dan *insersio m. trapezius* pada klavikula bagian lateral. Di superior, ruang ini menjadi *trigonum servikalis posterior* dengan *m. trapezius* dan *m. sternocleidomastoideus* sebagai batas utamanya. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.2. Anatomi Leher

Pada bab ini akan dibahas cara pemeriksaan fisik pada leher, mata, telinga, hidung, dan tenggorokan sebagai sistem indera yang ada pada kepala dan leher, tentu saja dengan terlebih dahulu menguraikan anatomi dan fisiologi organ tersebut. Sedangkan sistem pernapasan, pencernaan, dan kelenjar limfe akan dibahas pada bab-bab tersendiri.

1. Anatomi dan Fisiologi Mata



Gambar 3. 3. Anatomi mata

Mata terdapat dalam rongga orbita merupakan struktur sferis berisi cairan yang dibungkus oleh tiga lapisan yaitu :

- a. Sklera; membentuk bagian putih mata dan di bagian depan membentuk kornea sebagai tempat lewatnya berkas cahaya ke interior mata.
- b. Koroid; mengandung pembuluh darah untuk memberi makan retina, badan siliaris dan iris
- c. Retina; terdiri lapisan berpigmen disebelah luar dan lapisan sebelah dalam terdiri dari lapisan jaringan saraf. Retina mengandung sel batang dan sel kerucut yang berfungsi sebagai fotoreseptor yang mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf.

Pada bagian dalam mata terdapat dua rongga berisi cairan yang dipisahkan oleh sebuah lensa yang memungkinkan cahaya lewat menembus mata dari kornea ke retina. Rongga anterior berada antara kornea dan lensa berisi *aqueous humor*, mengandung zat gizi untuk kornea dan lensa. Sedang rongga posterior berada antara lensa dan retina berisi *vitreous humor* membentuk bola mata yang sferis.

Kornea, *aqueous humor*, lensa, dan *vitreous humor* disebut sebagai media refraksi, merupakan tempat yang akan dilewati cahaya dan membantu membiaskan dan memfokuskan berkas cahaya agar jatuh tepat pada retina sehingga dapat ditangkap sebagai suatu bayangan.

Pada mata juga terdapat organ okuli aksesoria yang terdiri dari alis mata, palpebra (kelopak mata), konjungtiva, kelenjar air mata, dan otot-otot mata. Organ okuli aksesoria ini membantu mata menjalankan fungsinya sebagai indera penglihatan.


Alis mata (*supercilium*) adalah dua potong kulit tebal yang melengkung di atas mata, ditumbuhi rambut dan berfungsi melindungi mata dan kecantikan.

Kelopak mata (*palpebra*) merupakan alat penutup mata yang berguna untuk melindungi bola mata terhadap trauma, sinar matahari, dan pengeringan bola mata. Kelopak mata juga mengeluarkan sekresi kelenjar yang membentuk film air mata di depan kornea. Proses pembasahan dan pelicinan seluruh permukaan bola mata terjadi karena pemerataan air mata dan sekresi berbagai kelenjar sebagai akibat gerakan buka tutup kelopak mata. Pada kelopak mata terdapat kelenjar sebacea, kelenjar keringat (kelenjar Moll), kelenjar Zeis pada pangkal rambut, dan kelenjar Meibom pada tarsus.

Konjungtiva merupakan membran yang menutupi sklera dan kelopak bagian belakang, mengandung kelenjar musin yang dihasilkan oleh sel goblet yang bersifat membasahi bola mata terutama kornea. Membran ini mencegah benda-benda asing di dalam mata seperti bulu mata atau lensa kontak, agar tidak tergelincir ke belakang mata, juga berperan bersama kelenjar air mata menjaga agar kornea tidak kering. Konjungtiva terdiri dari konjungtiva tarsal, konjungtiva bulbi, dan konjungtiva fornises.

Air mata dihasilkan oleh kelenjar air mata yang terletak pada daerah temporal bola mata. Sistem ekskresinya dimulai pada daerah pungtum lakrimalis, kanalikuli lakrimal, sakus lakrimal, ductus nasolakrimal hingga akhirnya bermuara pada meatus nasi inferior.

Otot-otot mata merupakan otot-otot yang berfungsi menggerakkan bola mata terdiri dari m. obliquus inferior, m. obliquus superior, m. rectus inferior, m. rectus medius, m. rectus lateral dan m. rectus superior. Otot-otot ini dipersarafi oleh nervus III, IV, dan VI dengan fungsi yang berbeda-beda dalam pergerakan bola mata. Kelumpuhan atau ketidakseimbangan pada satu otot akan mengakibatkan gangguan gerakan otot yang dikenal dengan istilah juling atau *strabismus*. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3. 4. Otot-otot mata dan persarafannya

Proses penglihatan

Manusia dapat melihat karena ada rangsang berupa cahaya yang diterima oleh reseptor pada mata. Cahaya yang masuk ke mata melewati media refraksi, kemudian jatuh pada retina, diubah menjadi impuls. Impuls yang timbul dalam conus atau basillus berjalan melalui neuritnya menuju ke neuron yang berbentuk sel bipolar dan akhirnya berpindah ke neuron yang berbentuk multipolar. Neurit sel-sel multipolar meninggalkan retina dan membentuk nervus optikus. Kedua nervus optikus di bawah hipotalamus saling bersilangan sehingga membentuk chiasma nervus optikus. Kemudian impuls diteruskan ke traktus optikus yang kemudian meneruskannya ke pusat penglihatan pada *lobus occipitalis*.

2. Anatomi dan Fisiologi Telinga

Telinga terbagi atas tiga bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga bagian luar terdiri dari aurikula (daun telinga), meatus akustikus eksternus (liang telinga), dan membran timpani. Telinga bagian tengah terdiri dari ossikula auditiva, tuba auditiva, dan antrum timpani. Sedangkan telinga dalam terdiri dari labirin osseus dan labirin membranousus. Labirin osseus terdiri dari vestibulum, koklea, dan kanalis semisirkularis, sedangkan labirin membranousus terdiri dari utrikulus, sakulus, dan duktus semisirkularis. Di dalamnya terdapatnya cairan yang disebut cairan perilimfe.


Bunyi dapat didengar oleh seseorang melalui getaran yang dialirkan melalui udara atau tulang langsung ke koklea. Aliran bunyi melalui udara lebih baik dibandingkan aliran suara melalui tulang. Sampai

tingkat tertentu, aurikula adalah suatu "pengumpul" suara sementara liang telinga karena bentuk dan dimensinya dapat sangat memperbesar suara dalam rentang 2-4 kHz.

Proses pendengaran

Getaran bunyi ditangkap oleh daun telinga lalu dialirkan ke liang telinga dan mengenai membran timpani, membuat membran timpani bergetar. Getaran ini diteruskan ke ossikula auditiva yang berhubungan satu sama lain. Selanjutnya stapes menggerakkan tingkap lonjong (*foramen ovale*) yang juga menggerakkan perilimfe dalam skala vestibuli. Selanjutnya getaran suara diteruskan melalui membran *Reissner* yang mendorong endolimfe dan membran basal ke arah bawah. Perilimfe dalam skala timpani akan bergerak sehingga tingkap bundar (*foramen rotundum*) terdorong ke arah luar.

Skala media yang menjadi cembung mendesak endolimfe dan mendorong membran basal sehingga menjadi cembung ke bawah dan menggerakkan perilimfe pada skala timpani. Pada waktu istirahat, ujung sel rambut berkelok-kelok dan dengan berubahnya sel basal ujung sel rambut itu menjadi lurus. Rangsangan fisik tadi diubah oleh adanya perbedaan ion Kalium dan ion Natrium menjadi aliran listrik yang diteruskan ke cabang-cabang Nervus VIII yang kemudian meneruskan rangsangan itu ke pusat sensorik pendengaran di otak melalui saraf pusat yang ada di lobus temporalis.



Gambar 3.5. Anatomi telinga

3. Anatomi dan Fisiologi Hidung dan Tenggorokan

Hidung merupakan bagian yang paling menonjol pada wajah. Fungsinya sebagai jalan napas, alat pengatur kondisi udara (air condition), penyaring dan pembersih udara, indera pembau, resonansi suara, membantu proses bicara, dan refleksi nasal. Hidung juga merupakan tempat bermuaranya sinus paranasalis dan saluran air mata.


Hidung luar berbentuk seperti piramid, terdiri dari pangkal hidung, dorsum nasi, puncak hidung, ala nasi, kolumela, dan lubang hidung (*nares anterior*). Hidung luar dibentuk oleh kerangka tulang dan tulang rawan yang dilapisi kulit, jaringan ikat, dan beberapa otot kecil. Kerja otot ini membuat hidung dapat melebar dan menyempit.

Rongga hidung berbentuk terowongan dari depan ke belakang. Dilapisi oleh dua jenis mukosa yaitu mukosa olfaktori dan mukosa respiratori. Rongga hidung tersusun dari *nares anterior* (*nostril*), vestibulum nasi, dan *nares posterior* (*choanae*).

Di sepanjang atap dan bagian lateral rongga hidung terdapat sinus paranasalis yang terdiri dari sinus maksilaris, sinus etmoidalis, sinus frontalis, dan sinus sphenoidalis. Muara sinus ini terdapat pada meatus nasi superior dan meatus nasi medius.

Proses penciuman

Fungsi penciuman pada hidung terjadi karena adanya mukosa olfaktorius yang terdapat pada atap rongga hidung, konka nasi superior, dan sepertiga bagian atas septum. Partikel bau dapat mencapai daerah ini dengan cara difusi dengan lendir atau bila menarik napas kuat. Pada saat zat kimia berupa gas akan dihirup masuk ke dalam rongga hidung, maka sumber bau pada zat kimia tersebut akan dilarutkan oleh selaput lendir kemudian akan merangsang rambut-rambut halus pada sel pembau. Sel pembau akan meneruskan rangsangan ini ke otak pada lobus temporalis melalui nervus olfaktorius dan mengolahnya sehingga kita dapat membedakan jenis bau dari zat kimia tersebut.



Gambar 3.6. Anatomi Hidung dan Tenggorokan

Tenggorokan merupakan pertemuan jalan napas dan jalan makanan. Nampak jelas terlihat pada saat pasien membuka mulut. Struktur yang ada pada bagian ini adalah palatum molle, uvula, dan tonsil. Palatum molle dan uvula ikut membantu proses pengunyahan makanan dan proses menelan sedangkan tonsil berperan dalam proses kekebalan tubuh melawan kuman penyakit (imun).

B. Pemeriksaan Fisik Kepala Dan Leher

1. Pemeriksaan Fisik Kepala

Pemeriksaan kepala dimulai dengan inspeksi lalu dilanjutkan dengan palpasi untuk memastikan penemuan. Perhatikanlah tujuh ciri berikut ini: konfigurasi umum, simetri, penonjolan tulang, distribusi rambut, ciri-ciri kulit, ekspresi muka, dan kontak mata. Secara singkat periksalah tekstur rambut dan turgor kulit seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada keadaan klinis tertentu, palpasi arteri temporalis dan kelenjar parotis serta kelenjar submandibularis dan perkusi sinus-sinus akan memberikan informasi yang berguna.

Penemuan Umum

Perkembangan otak, pembentukan tulang, dan faktor-faktor lain menentukan bentuk tengkorak. Hidrosefalus dan mikrosefalus adalah salah satu contoh respon tengkorak terhadap pertumbuhan otak. Hidrosefalus pada masa anak-anak menyebabkan lempeng-lempeng tulang tengkorak saling terpisah jauh dan penutupan sutura mungkin tidak pernah terjadi. Wajah normal sampai telinga, di atas telinga kepala mungkin membesar secara aneh. Bila hidrosefalusnya

berat, mata pasien terdorong ke bawah sehingga ia kelihatan seperti sedang melihat ke lantai. Suatu cahaya terang yang ditempelkan ke kepala dalam ruangan gelap akan menimbulkan transiluminasi kranium. Perkusi dengan ujung jari tengah pada sisi tengkorak akan menimbulkan bunyi seperti "pot retak". Sedangkan mikrosefalus terjadi bilamana otak tidak berkembang sehingga tengkorak tidak membesar.

Proporsi tengkorak normal tergantung pada urutan penutupan sutura yang tepat. Bila suatu sutura menutup secara prematur, akan terjadi *kraniosinostosis*, suatu bentuk kepala abnormal yang asimetris. Pertumbuhan selalu terjadi dalam arah tegak lurus garis sutura. Bila satu sutura menutup, terjadi pertumbuhan kompensatoris pada sutura yang masih terbuka. Bila sutura sagitalis menutup secara prematur, pertumbuhan lateral berhenti dan ini dikompensasi oleh pertumbuhan anteroposterior menghasilkan kepala yang kecil panjang, *skafosefali*. Seandainya sutura koronaria menutup, pertumbuhan anteroposterior berhenti dan tengkorak menjadi pendek, lebar, seperti kerucut dan disebut *akrosefali*. Bila separuh sutura koronaria menutup secara prematur, sisi tersebut akan menjadi datar dan orbita pada sisi tersebut meninggi, disebut *plagiosefali*.

Frontal bossing adalah menonjolnya tulang-tulang frontal. Ini menyebabkan dahi terlihat menonjol dan garis rambut terlihat lebih ke belakang. Hal ini terlihat pada pasien lanjut usia dengan penyakit *Paget* stadium lanjut dan pertumbuhan tulang yang berlebihan. Pada anak-anak, penonjolan tulang ini disebabkan oleh periostitis pada sifilis kongenital atau ricket. Banyaknya aliran darah pada tulang-tulang penderita penyakit *paget* kadang-kadang menimbulkan bising (*bruit*) yang

terdengar pada *auskultasi* tengkorak. Demikian pula bunyi napas mungkin dapat didengar pada tengkorak penderita penyakit *paget*.

Palpasilah selalu tengkorak bila pasien mengeluh sakit kepala, terutama bila ada pembengkakan yang berdiri sendiri. Kulit kepala dan tulang tengkorak merupakan tempat umum penyakit metastatik. Nodul arteri temporalis yang nyeri tekan kadang-kadang ditemukan pada pasien-pasien lanjut usia dengan arteritis temporalis stadium lanjut.

Perhatikan juga ekspresi wajah dan kontak mata karena dapat memberikan petunjuk tentang keadaan emosional pasien. Jangan mengabaikan penemuan-penemuan penting ini.

2. Pemeriksaan Fisik Mata

Riwayat penyakit mata dipusatkan pada empat masalah: nyeri, perubahan penglihatan, perubahan anatomis, dan gangguan fungsi.

a. Nyeri Mata

Empat proses penyebab nyeri mata: pandangan, peningkatan tekanan mata, gangguan fungsi korpus siliaris, dan kelainan fokus.

Iritis atau *iridosiklitis*, peradangan kamera okuli anterior, umumnya nyeri dan menyebabkan peradangan mata. *Konjungtivitis*, penyebab lain peradangan mata, biasanya tidak menyebabkan nyeri. Dari keduanya, iritis jauh lebih berbahaya. *Abrasi kornea* yang kecil sekalipun, karena memiliki banyak persarafan, menimbulkan rasa nyeri hebat dan mungkin tidak berkaitan dengan peradangan mata. Mata juga menjadi nyeri bila diregangkan. *Glaukoma* adalah peningkatan tekanan bola

mata secara abnormal sekunder terhadap penyumbatan aliran keluar cairan mata. Bila tekanan meningkat secara mendadak, seperti pada *glaukoma akut*, rasa nyerinya dapat sangat hebat sehingga terjadi mual dan muntah.

Fotofobia adalah keengganan melihat cahaya, biasanya karena cahaya tersebut menyebabkan rasa nyeri. Cahaya yang sangat kuat akan menimbulkan rasa nyeri pada orang normal. Orang-orang albino, yang kekurangan pigmen penyaring protektif pada iris dan retinanya, akan menghindari cahaya. Infeksi sistemis terutama penyakit virus dan riketsia, mungkin berkaitan dengan fotofobia. Di sini, nyerinya berupa mialgia korpus siliaris. Posisi istirahat iris adalah bila ia berdilatasi. Cahaya memaksa otot-otot korpus siliaris untuk berkontraksi dan hal ini menimbulkan nyeri.

Astenopia atau ketegangan mata adalah kelemahan mata atau mata mudah merasa lelah. Kesulitan melihat dengan jelas, nyeri mata, dan sakit kepala menjadi gejala utama. Kelainan tersebut disebabkan oleh banyak sebab seperti gangguan refraksi, *miopia* (gangguan melihat jauh) atau *hiperopia* (gangguan melihat dekat), *astigmatisme* (perbedaan dalam kelengkungan kornea), dan *phoria* (ketidakseimbangan otot).

b. Perubahan Penglihatan

Perubahan kemampuan melihat menakutkan bagi banyak pasien sehingga mereka segera datang berobat. Bila gangguan penglihatannya parsial seperti hilangnya sebagian penglihatan atau *skotoma* (bintik buta) atau unilateral mungkin tidak diperhatikan. Kehilangan daya penglihatan menunjukkan adanya gangguan antara kornea dan lobus oksipitalis otak. Empat ciri khas perubahan penglihatan seringkali

memungkinkan ditegakkannya suatu diagnosis sebelum pemeriksaan dilakukan. Ciri-ciri tersebut mencakup: kehilangan daya penglihatan yang bersifat khusus, mula terjadinya, lama sakit, dan masalah-masalah yang berkaitan.

Diplopia (penglihatan ganda) terjadi bila bayangan yang jatuh pada kedua retina bila bersesuaian. Koordinasi yang rumit pada kedua tidak ekstraokuler dapat terganggu oleh penyakit-penyakit otot orbita atau nervus kranial. Tentukalah apakah timbulnya secara berangsur-angsur atau mendadak, arah pandangan dimana diplopia tersebut paling jelas dan paling ringan, dan apakah kedua bayangan tersebut terletak berdampingan atau atas-bawah. Tentukanlah apakah masalah tersebut hilang-timbul atau terus-menerus. Tanyakanlah penyakit-penyakit yang berkaitan. Misalnya, diabetes biasanya menyebabkan diplopia sementara sekunder terhadap *neuropati nervus kranialis* setempat. *Miastenia gravis*, yang disebabkan oleh gangguan fungsi biokimiawi pada sinaps antara saraf dan otot, dapat menyebabkan diplopia yang hilang-timbul.

Adanya bintik di depan mata sering menjadi keluhan pasien. Setiap benda asing di antara kornea dan retina yang merintang cahaya dinyatakan sebagai bintik. Riwayat penyakit dapat menjadi petunjuk tempat rintangan tersebut sebelum memeriksa pasien. Benda asing di depan lensa bergerak searah dengan pandangan, yaitu kalau pasien melihat ke kiri maka bintik tersebut juga bergerak ke kiri. Kalau rintangan tersebut di belakang lensa, gerakannya berlawanan, yaitu kalau pasien melihat ke kiri, bintik tersebut bergerak ke kanan. Debris yang melayang-layang

dengan bebas di dalam cairan mata cenderung untuk keluar masuk lapangan penglihatan. Debris ini biasanya tidak berbahaya tapi menyusahkan pasien. Sebaliknya, suatu bintik yang menetap biasanya merupakan suatu cacat tetap seperti kekeruhan kornea.

Kehilangan sebagian lapangan penglihatan disebut defek lapangan penglihatan. Pasien melaporkan kehilangan penglihatan secara tiba-tiba atau berangsur-angsur dalam beberapa detik atau sampai beberapa menit pada satu atau dua mata. Hal ini sering dilukiskan sebagai tirai gelap yang menutupi penglihatan pasien atau ketidakmampuan untuk melihat bagian-bagian lapangan penglihatan yang normal sehingga harus mengatasinya dengan memalingkan kepalanya. Serangan iskemia sepintas dapat menyebabkan defek lapangan penglihatan yang sementara dan remiten. *Cerebrovascular accident* dapat menyebabkan defek lengkap atau parsial yang menetap. Tumor otak menyebabkan defek progresif.

Kalau keutuhan retina tiba-tiba terganggu, kerusakan retina dirasakan sebagai kilasan cahaya terang yang tiba-tiba, yang diikuti dengan gangguan penglihatan. Kalau timbul keluhan seperti ini, curigailah terjadinya perdarahan korpus vitreum atau sobekan retina.

Katarak menimbulkan penglihatan kabur yang progresif lambat. Pasien sering mengeluh bahwa cahaya yang datang pada waktu malam menimbulkan masalah khusus. Cahaya tersebut menjadi sangat menyilaukan, suatu efek serupa dengan yang timbul kalau melihat cahaya yang datang melalui kaca depan mobil selama hujan lebat. Penglihatan kabur juga disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan perubahan bentuk

lensa, seperti hiperglikemia pada diabetes. Gambaran berkabut pada penglihatan dapat disebabkan oleh glaukoma, melihat warna kuning dalam lapangan penglihatan mungkin menjadi keluhan pasien yang menderita intoksikasi obat yang lazim terjadi yaitu *overdosis* digitalis. Defisiensi vitamin A dapat menimbulkan rabun senja. Pasien mengeluh tentang berkurangnya penglihatan di malam hari, sedangkan penglihatan di siang hari masih baik.

c. Perubahan Anatomi dan Gangguan Fungsi

Mata merah dapat disebabkan oleh peradangan konjungtiva, iris, atau uvea atau perdarahan subkonjungtiva. Batuk atau bersin juga dapat menyebabkan perdarahan subkonjungtiva, namun sering terlupakan.

Pada kelopak mata yang bengkak harus ditanyakan tentang gatal konjungtiva dan tanda-tanda keadaan alergi lainnya. Kelopak mata yang bengkak dan edema dorsum pedis mengarah pada penyakit ginjal atau penyakit lain yang menyebabkan kehilangan protein. Edema periorbital dapat terjadi pada hipotiroidisme.

Eksoftalmus adalah penonjolan abnormal bola mata dari orbita. Hipertiroidisme, tumor di dalam orbita, dan fistula arteriovenosa dapat menyebabkan eksoftalmus. Eksoftalmus unilateral biasanya berarti penyakit lokal, tetapi kadang-kadang pasien hipertiroidisme menderita perubahan unilateral.

Pemeriksaan Mata


Inspeksi dan penilaian fungsi mata merupakan dua unsur penting tiap pemeriksaan mata. Unsur-unsur utama pemeriksaan diuraikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pemeriksaan Mata

Inspeksi
Alis mata, orbita, letak mata,
Kelopak mata, apparatus lakrimalis
Kornea, sklera, iris
Pemeriksaan
Fungsi otot ekstraokuler
Refleks pupil

- a. Inspeksi Orbita dan Letak Mata
- Perhatikanlah alis mata. Hilangnya sepertiga lateral alis mata kadang-kadang dijumpai pada miksedema, suatu keadaan yang disebabkan oleh kekurangan hormon tiroid.
 - Perhatikan letak bola mata di dalam orbita. Kadang-kadang kita perlu memastikan dengan mengukur letak mata, bahkan tidak jarang kita harus melakukan *auskultasi* bola mata. Bola mata dibatasi oleh tulang-tulang orbita. Dikelilingi oleh otot-otot ekstraokuler pada sisi-sisinya, nervus optikus, dan bantalan lemak di bagian posterior, konjungtiva di bagian anterior. Kelainan salah satu struktur ini dapat mengubah

posisi bola mata di dalam orbita. Posisi ini dapat diukur. Letakkan sebuah penggaris pada ujung lateral sudut orbita dan lihatlah dari sisi di seberang pinggir depan kornea. Pasien menderita eksoftalmus jika jarak dari sudut tersebut ke pinggir anterior kornea melebihi 16 mm. Kadang-kadang pada *auskultasi* bola mata dapat terdengar bising kontinyu yang khas yang disebabkan oleh fistula arteriovenosa sampai sejauh arteri karotis. Untuk mendengar bising pada bola mata ini, mintalah pasien untuk menutup kelopak matanya, kemudian hati-hati dan ringan letakkanlah bel stetoskop pada mata. Lihat gambar 3.7. dan 3.8.




Gambar 3.7. Mengukur penonjolan bola mata
Gambar 3. 8. *Auskultasi* mata

b. Inspeksi Kelopak Mata

Biasanya inspeksi biasa sudah cukup, namun kadang-kadang kita perlu memeriksa permukaan dalam kelopak mata atas. Letakkan lidi kira-kira pada sepertiga bawah kelopak mata atas. Tariklah bulu mata ke bawah dan ke luar dan balikkanlah kelopak mata pada lidi

tersebut untuk memperlihatkan konjungtiva palpebra. Seperti gambar dibawah ini :



Gambar 3.9. Eversi kelopak mata untuk melihat konjungtiva palpebra

Sudut yang terbentuk di bagian medial dan lateral oleh pertemuan kelopak mata atas dan bawah disebut kanthus. Lipatan kulit tambahan yang menutupi sudut ini disebut lipatan epikanthus. Jarak antara kedua kanthus interna tidak lebih dari 40 mm, antara kedua pupil tidak lebih dari 75 mm dan antara kedua kanthus eksterna tidak lebih dari 95 mm. Bila batas-batas ini dilampaui, terjadi hipertelorisme okuler, biasanya ditemukan pada penyakit kongenital.

Perhatikan posisi kelopak mata relatif terhadap mata. Ini ditentukan oleh tiga kumpulan otot : m. orbikularis okuli yang dipersarafi oleh N. VII, m. levator palpebra yang dipersarafi oleh N. III, dan otot polos Muller yang dipersarafi oleh saraf-saraf simpatis dan parasimpatis. Biasanya kelopak mata atas melewati kornea pada ketinggian yang tepat menyentuh iris.

c. Aparatus lakrimalis

Keadaan apparatus lakrimalis dapat diperiksa dengan tes Schirmer. Pakailah sepotong kertas penyaring dengan lebar 5 mm dan panjang 2 cm.

Lipatlah kertas ini beberapa mm dan letakkanlah di dalam sakus konjungtiva pada kelopak mata bawah. Setelah 5 menit, kelenjar lakrimalis normal akan menghasilkan air mata yang cukup untuk membasahi potongan kertas penyaring sepanjang 15 mm atau lebih.

d. Inspeksi Iris, Sklera, dan Kornea

Pada inspeksi iris, perhatikan bentuk dan posisinya. Iris normal harus bulat dan simetris. Periksalah sklera untuk melihat peradangan dan perubahan warna (*ikterus*). Kornea dapat diperiksa secara langsung atau dengan bantuan oftalmoskop. Kornea tidak mengandung pembuluh darah sama sekali dan mempunyai banyak persarafan. Epitel kornea yang halus mudah rusak yang menimbulkan akibat-akibat yang serius. Untuk membantu diagnosis gangguan pada epitel kornea, pakailah kertas penyaring yang diimpregnasi dengan fluoresein. Ujung kertas tersebut dengan hati-hati diletakkan pada konjungtiva kelopak mata bawah. Fluoresein akan berdifusi dengan cepat di permukaan bola mata dan akan menimbulkan warna yang terang pada setiap kerusakan epitel.

e. Periksa ukuran pupil.

Perubahan ukuran pupil terjadi melalui pengaruh saraf simpatis dan parasimpatis yang terdapat dalam N. III. Reaksi pupil harus diperiksa dalam beberapa cara. Pertama, sinarilah dengan cepat dan langsung ke dalam salah satu mata dan perhatikanlah kontraksi yang normal. Peganglah senter 15 cm dari bagian lateral orbita, kemudian gerakkan dengan cepat di depan mata. Biasanya terjadi reaksi berlebihan untuk waktu singkat yang diikuti dengan dilatasi ringan. Kemudian, sinarilah salah satu mata dan perhatikan reaksi pada mata lainnya, *refleks konsensual*. Kedua

tindakan ini membuktikan keutuhan busur dari reseptor ke efektor baik pada mata yang diperiksa maupun pada mata kontralateral. Kontraksi terjadi pula kalau mata berakomodasi untuk melihat dekat. Mintalah pasien untuk memusatkan penglihatannya pada benda yang jauh kemudian dengan cepat memusatkan penglihatannya pada jari anda yang terletak 20-30 cm di depan matanya. Perhatikan kontraksi pupil.

f. Pemeriksaan Otot-otot Ekstraokuler

Fungsi motorik ekstraokuler diperiksa dengan *tes konfrontasi*. Mintalah pasien untuk memusatkan pandangannya pada jari anda. Jarak jari tangan dengan hidungnya 45 cm. Mintalah pasien untuk mengikuti gerakan jari tangan anda dengan matanya, tanpa menggerakkan kepalanya. Gerakkan jari anda ke kanan dan kemudian ke kiri dari posisi semula. Kemudian gerakkanlah jari anda ke atas dan ke bawah dan kembali keposisi semula. Ketika pasien mengikuti jari anda dengan matanya, gerakkanlah jari anda mendekati pasien dan sentuhlah hidungnya. Ketidakmampuan untuk menggerakkan mata dalam arah tertentu menunjukkan inkompetensi otot, baik karena penyakit otot tersebut maupun karena penyakit pada persarafannya.

Pastikanlah adanya kelemahan otot yang hampir tidak kentara dengan *tes penutup*. Pasien menatap ke suatu sumber cahaya, lalu tutuplah salah satu mata dan kemudian mata lainnya. Mata yang sedang ditutup akan menyimpang ke posisi istirahat ketika penutup tersebut dipindahkan ke mata lain, perhatikanlah gerakan mata yang baru saja dilepaskan penutupnya itu. Mata yang tadinya sedang istirahat akan terfiksasi kembali dan bergerak ke arah sentral. Pada eksoforia, mata bergerak

ke lateral kalau beristirahat di bawah penutup. Mata tersebut akan bergerak ke medial kalau penutupnya dibuka.

Strabismus atau juling adalah penyimpangan mata yang tidak dapat diatasi oleh pasien. Kedua mata tidak mempunyai arah pandangan yang sama, sehingga terjadi diplopia. Untuk mendeteksi *strabismus* yang tidak kentara, arahkanlah sinar sebuah lampu senter kecil ke pasien, dengan jarak beberapa kaki. Sinar yang dipantulkan harus muncul sedikit ke arah nasal dari pusat dan pada tempat yang sama di tiap bola mata. Tes penutup juga berguna. Jika mata yang memfiksasi ditutup, mata yang menyimpang akan terfiksasi dan bergerak ke arah sentral.

g. Pemeriksaan Tajam Penglihatan dan Lapangan Penglihatan

Tajam penglihatan (*Visus*) dapat diukur dengan menggunakan *Tes Snellen*. Dalam keadaan normal, mata manusia mendeteksi benda-benda yang membentuk sudut 5 menit. Kartu Snellen terdiri dari huruf-huruf dengan ukuran yang makin mengecil. Angka pada tiap deret huruf menunjukkan jarak (dalam kaki) di mana huruf-huruf tadi akan berada dalam sudut 5 menit, jadi "200" berarti bahwa pada jarak 200 kaki huruf-huruf tadi masih dapat dibaca oleh mata normal. Pemeriksaan dilakukan pada jarak 20 kaki. Tajam penglihatan ditentukan sebagai berikut :

- Jarak pasien dari kartu tes
- Jarak di mana orang normal dapat membaca huruf tersebut
- Jika seorang pasien dapat melihat huruf 20 yang berukuran besar pada 20 kaki, tajam penglihatannya dinyatakan sebagai 20/200.

Ingatlah untuk memeriksa tiap mata secara individual dengan menutup mata yang lainnya. Kemudian periksalah tajam penglihatan mata tanpa memakai kaca mata, jika pasien tersebut berkaca mata. Akhirnya, jika tajam penglihatan berkurang, ulangilah pemeriksaan dengan pasien melihat melalui lubang kecil (*pinhole*). Tes terakhir ini memperbaiki kesalahan refraksi.

Pakailah *kartu ishihara* untuk memeriksa penglihatan warna. Tiap kartu mempunyai latarbelakang yang terdiri dari titik-titik berwarna. Dan pada latar belakang inilah terdapat angka yang dibentuk oleh titik-titik berwarna yang mungkin dikelirukan dengan latar belakangnya. Orang yang penglihatan warna normal akan dapat melihat angka tersebut, sedangkan pasien buta warna tidak dapat.

Lapangan penglihatan diperiksa dengan *tes konfrontasi*. Anda menyesuaikan lapangan penglihatan pasien dengan lapangan penglihatan anda, dengan mengandaikan bahwa lapangan penglihatan anda normal. Duduklah berhadap-hadapan dengan pasien, dengan kepala anda sama tingginya dengan kepala pasien, kira-kira berjarak 1 m. Pasien menutup mata kanannya dan anda menutup mata kiri anda. Anda melihat kepada pasien dan demikian juga sebaliknya. Sekarang ambillah sebuah kapas lidi dan gerakkanlah ke dalam lapangan penglihatan anda. Gerakkanlah ujung kapas lidi tersebut ke dalam bintik buta anda. Ini biasanya akan ditemukan dengan menggerakkan ujung kapas lidi tersebut ke jam 9,15 cm jauhnya dari garis yang menghubungkan mata anda dengan mata pasien. Ujung kapas lidi tersebut akan menghilang. Gerakkanlah benda tersebut bolak balik di antara anda dan pasien

sampai ia juga berada di dalam bintik buta pasien. Sekarang anda mengetahui bahwa benda tersebut sama jauhnya dari anda berdua. Selanjutnya, gerakkanlah ujung benda tersebut ke dalam berbagai kuadran lapangan penglihatan. Carilah titik-titik paling tepi yang tidak dapat dilihat lagi oleh pasien. Ulangilah pemeriksaan ini dengan menutup mata lainnya. Lubang pada lapangan penglihatan kalau dipetakan dengan seksama dapat dipakai untuk menentukan dengan anatomik lesi karena serabut-serabut N. II mempunyai perjalanan yang tepat ke dalam otak.

h. Pemeriksaan Oftalmoskopik

Oftalmoskop adalah sumber cahaya yang mempunyai serangkaian lensa yang dapat difokuskan pada jarak yang berbeda-beda. Kebanyakan oftalmoskop dikalibrasikan dalam dua skala, hitam untuk dioptri (satuan ukuran untuk panjang fokus) positif dan merah untuk dioptri negatif. Pada angka hitam yang besar, benda-benda dekat berada di titik fokus. Makin besar angka merah, makin jauh letak benda-benda yang berada dalam titik fokus. Mulailah melihat benda-benda yang dekat dengan anda, dengan angka hitam yang besar, kemudian putarlah skala ke arah 0 kemudian ke angka merah ketika anda melihat benda-benda yang makin jauh. Misalnya kornea, paling baik dilihat dengan lensa hitam 15 atau 10. Lensa mata sebaiknya diperiksa dengan lensa hitam 6, dan retina dengan lensa merah 1 sampai 3.

Banyak oftalmoskop dilengkapi dengan berbagai macam lensa pada sumber cahayanya. Lensa-lensa ini akan menimbulkan bintik putih bulat, bintik putih dengan kisi-kisi, bintik hijau bulat, atau celah cahaya

longitudinal. Pemakaian sumber cahaya yang berbeda-beda ini akan dibicarakan di bawah ini. Pakailah oftalmoskop di ruang gelap untuk membuat pupil berdilatasi maksimal. Aturilah posisi pasien, posisi anda sendiri, dan pakailah beberapa teknik dan intruksi sederhana untuk memeriksa seluruh fundus. Mintalah pasien untuk memandangi benda 8-12 kaki jauhnya. Untuk memeriksa retina anda harus melihat melalui lensa pasien yang dapat mengubah-ubah fokus anda.

Mengatur posisi pasien. Pasien sebaiknya duduk di pinggir tempat tidur. Untuk memeriksa mata kanan, naikkan tempat tidur tersebut sampai lutut kanan anda tepat lateral terhadap kanan pasien. Mintalah pasien untuk melihat melalui bahu kanan anda dan memusatkan pandangannya pada sebuah benda yang jaraknya kira-kira 12 kaki di atas dan di belakang bahu anda. Kalau pasien sudah memusatkan pandangannya, miringkanlah kepala pasien ke belakang sampai iris berada di tengah orbita (Gambar 3.10).



Gambar 3. 10. Posisi pasien diatur dengan memiringkan kepala ke belakang sampai iris terlihat.



Gambar 3. 11. Stabilkan tangan saat memegang oftalmoskop dengan meletakkan jari tengah pada pipi pasien.

Posisi dokter. Pemeriksaan anda akan berjalan terputus-putus jika posisi anda tidak enak. Pasien sebaiknya duduk di pinggir tempat tidur dengan sedikit memiringkan tubuhnya ke depan, dan tungkai bawahnya berjantai lurus ke bawah. Kalau anda memiringkan tubuh ke depan untuk memeriksa pasien, punggung anda tidak boleh membentuk sudut lebih dari 20° . Jika anda merasa tidak enak, ubahlah posisi pasien. Stabilkanlah tangan anda, peganglah oftalmoskop dengan mengekstensikan dua jari terakhir dan letakkan permukaan dorsalnya secara ringan pada pipi pasien (Gambar 3.11).

Intruksi kepada pasien. Beritahukanlah kepada pasien hal-hal yang akan anda lakukan dan hal-hal yang harus dikerjakan untuk membantu anda. Berikanlah intruksi sebelum anda mulai memeriksa. Anda harus meminta pasien untuk menggerakkan matanya agar dapat memeriksa seluruh retina. Mula-mula mintalah pasien memusatkan pandangannya. Beritahukan bahwa cahaya lampu senter anda akan mengaburkan penglihatannya, tetapi pandangannya harus tetap terpusatkan. Pastikanlah bahwa ruangan tersebut gelap dan tidak ada pantulan kornea yang berarti. Kedua, beritahukanlah pasien bahwa ia harus menggerakkan matanya untuk pemeriksaan ini. Perhatikan bagaimana anda akan mengetuk dengan perlahan-lahan pada pelipis kanan, puncak dahi, dan pelipis kirinya. Mintalah pasien anda untuk melihat pada tempat yang anda ketuk tiap kali tanpa menggerakkan kepalanya. Selanjutnya, suruhlah pasien untuk "melihat ke bawah". Beritahukan pasien bahwa anda akan memegang ujung kelopak mata atasnya dengan hati-hati ketika ia melihat ke bawah. Ini akan membuat anda dapat melihat daerah retina bawah.

Perintah terakhir anda adalah melihat langsung ke sumber cahaya. Anda akan menyelesaikan pemeriksaan dengan memeriksa *fovea*.

Untuk memeriksa mata kanan, peganglah oftalmoskop dengan tangan kanan anda dan lihatlah dengan mata kanan anda. Jari telunjuk tangan kanan anda terletak pada tombol fokus. Peganglah alat ini sedemikian rupa sehingga sinarnya jatuh pada pupil dan anda dapat melihat refleks merah, pantulan merah terang dari retina. Sekarang gerakkanlah alat ini ke arah mata sampai buku jari tengah anda menyentuh arkus zigomatikus. Lihat melalui peneropong, dimulai dengan lensa hitam (+) 15 untuk memusatkan pemeriksaan pada kornea, kemudian kamera anterior, lensa, korpusvitreous, dan akhirnya retina dengan mengubah-ubah kekuatan lensa ke angka hitam yang lebih rendah, 0, dan kemudian ke skala merah.

i. Pemeriksaan Lensa.

Lensa hitam (+) 6 pada oftalmoskop akan membuat lensa mata berada di dalam fokus. Lensa mata yang normal jernih.

j. Pemeriksaan Retina.

Pemeriksaan retina akan memberi gambaran tentang saraf kranial dan arteriol akhir secara langsung. A. sentralis retina adalah cabang a. oftalmika yang dipercabangkan oleh a. karotis interna. Lensa 0 sampai merah (-) 6 membuat retina berada di dalam fokus. A. sentralis retina memasuki fundus di bagian tengah diskus optikus dan segera bercabang menjadi a. papilaris superior dan inferior. Pada tepi diskus, masing-masing arteri ini bercabang lagi menjadi cabang nasal dan temporal. Vena-vena retina mempertahankan hubungan yang erat. Biasanya pembuluh-pembuluh ini sangat

halus dan tembus cahaya. Yang terlihat dengan oftalmoskop adalah kolom darah yang terlihat sebagai garis merah. Dindingnya sendiri hanya terlihat sebagai garis pantulan cahaya yang tipis dan terang. Lebar seluruh arteriol dibandingkan dengan lebar garis putih tersebut merupakan indikator penyakit yang penting.

3. Pemeriksaan Fisik Telinga

Seperti halnya pada pemeriksaan mata, sebelum melakukan pemeriksaan telinga sangat penting untuk melakukan anamnesa yang terarah pada keluhan-keluhan khusus yang berhubungan dengan gangguan telinga untuk mendapatkan gambaran penekanan-penekanan penting yang harus dilakukan pada saat pemeriksaan fisik. Keluhan pasien dapat berupa gangguan pendengaran, nyeri telinga, tinnitus, dan vertigo.

Keluhan-keluhan penyerta pada penyakit telinga sangat penting. Apakah gejala-gejala otitis media disertai oleh gejala-gejala abses otak? Apakah vertigo tersebut disertai dengan gangguan pendengaran dengan perkataan lain apakah kedua fungsi N. VIII terganggu? Apakah pasien dengan gangguan pendengaran sedang meminum obat-obatan?

Gangguan pendengaran mungkin lebih banyak menimbulkan keluhan pada keluarga atau pasien daripada pada diri pasien itu sendiri. Kalau melakukan *anamnesis* ke arah gangguan pendengaran, sebaiknya diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anggota keluarga pasien. Pertanyaan yang cermat dapat mengungkapkan batas-batas frekwensi bunyi yang tidak dapat didengar. Pasien mungkin mengakui bahwa ia mendengar suara pria lebih baik daripada wanita, dan suara wanita lebih baik daripada anak-anak, jadi

menunjukkan gangguan pendengaran pada frekwensi tinggi.

Tinitus adalah suara mendengung, bunyi ceklekan atau suara mendering yang didengar oleh pasien. Suara tersebut dapat timbul secara terus menerus atau terputus-putus, unilateral atau bilateral. Tinitus disebabkan oleh kelainan yang letaknya proksimal terhadap foramen ovale dan mempunyai banyak penyebab.

Nyeri telinga menyebabkan pasien segera pergi ke dokter. Nyeri yang timbul pada waktu manipulasi tragus berarti peradangan kanalis eksterna. Nyeri di belakang telinga menunjukkan peradangan mastoid. Nyeri yang terasa jauh di dalam telinga, yang diperberat dengan membungkuk, disebabkan oleh penyakit telinga tengah. Kalau tuba eustakhi tertutup edema, telinga tengah sebenarnya menjadi visera berongga yang tersumbat. Distensi dengan udara atau pus yang bertekanan menimbulkan nyeri hebat. Pengeluaran sekret kronis dari telinga paling sering berasal dari kanalis eksterna. Pengeluaran cairan secara tiba-tiba yang diikuti dengan hilangnya nyeri biasanya terjadi kalau gendang telinga pecah dengan spontan. Nyeri karena penyakit pada tuba eustakhi atau peradangan telinga tengah dapat dialihkan ke leher, tepat di bawa angulus mandibula.

Vertigo adalah semacam pusing yang khusus. Pasien dengan vertigo sejati melukiskan perasaan bahwa kamar berputar di sekitarnya. Banyak kelainan menyebabkan fenomena iritatif pada mekanisme labirin ini.

Pemeriksaan Telinga

1. Inspeksi dan palpasi.

Perhatikan posisi telinga di kepala. Pangkal heliks harus berada pada garis horizontal dengan sudut mata. Telinga yang terletak rendah sering menyertai kelainan kongenital di tempat lain. Inspeksi dan palpasilah dengan singkat tulang rawan telinga, yang seharusnya keras tetapi tidak kaku. Inspeksi dan palpasilah prosesus mastoideus.

2. Pemeriksaan Otoskopik.

Otoskop adalah suatu sumber cahaya biasa yang diletakkan pada spekulum yang mempunyai kaca pembesar. Tersedia spekulum dengan berbagai ukuran untuk dipakai pada anak-anak dan orang dewasa. Tutup yang dapat dibuang mencegah terjadinya kontaminasi silang. Kebanyakan alat juga dilengkapi untuk pemasangan pipa karet dan pompanya untuk insuflasi udara.

Kulit kanalis auditorius eksternus melekat erat pada tulang. Ia relatif tidak mengeluarkan sekret dan menimbulkan nyeri kalau mengalami trauma. Nervus Arnold, suatu cabang N.X., mempersarafi kanalis eksternus. Iritasi N. Arnold menyebabkan timbulnya batuk yang terjadi pada sebagian pasien kalau anda memasukkan spekulum ke dalam kanalis eksternus.

Kanalis eksternus pada anak-anak lurus. Kanalis eksterna pada orang dewasa membentuk sudut, sehingga daun telinga perlu ditarik ke atas dan ke belakang untuk memvisualisasikan gendang telinga. Untuk memeriksa telinga kanan, letakkan daun telinga di antara ibu jari dan jari telunjuk kiri dan rentangkan jari-jarilainnya di atas oksiput. Dengan demikian anda

akan dapat mempertahankan tarikan untuk meluruskan kanalis tersebut dan menggerakkan kepala pada saat yang sama sementara memegang otoskop dengan tangan lainnya. Pada pemeriksaan kanalis eksterna, periksalah apakah ada eritema, debris, benda asing, sekret, dan keutuhannya. Miringkan kepala pasien. Luruskan kanalis auditorius seperti diuraikan di atas dan dengan hati-hati masukkanlah otoskop yang digerakkan sepanjang dinding bawah kanalis tersebut. Stabilkanlah tangan yang memegang otoskop dengan meletakkan 2 jari terakhir pada pipi pasien. Jangan membungkukkan punggung anda lebih dari 20-30°, jika perlu ubahlah posisi pasien.

Periksalah membrana timpani (gendang telinga). Tentukanlah bagian-bagian atau catatlah kalau tidak ada. Membrana timpani membentuk sudut, sehingga bagian atas lebih dekat dengan anda daripada bagian bawah. Membrana timpani yang normal berwarna abu-abu seperti mutiara dan cekung. Pantulan cahaya terang berbentuk segitiga timbul dengan apeks menuju ke bagian tengah membrana timpani dan basisnya menuju ke arah rahang. Tonjolan setempat di dekat apeks cahaya ini adalah ujung maleus. Lengan maleus berjalan ke atas dan ke depan ke arah mata ke prosesus brevis. Dari prosesus brevis tersebar dua lipatan membrana timpani yang berjalan ke depan dan ke belakang.

Secara ringkas, pemeriksaan telinga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Pemeriksaan Telinga

Inspeksi dan palpasi

Daun telinga dan prosesus mastoideus

Teknik pemeriksaan otoskopik

- Tarik daun telinga ke atas dan ke belakang.
- Stabilkan tangan, gerakkan spekulum sepanjang batas bawah
- Periksalah membrana timpani, ujung maleus, prosesus brevis

Pemeriksaan pendengaran

Uji Rinne, Weber, Schwabach

Pemeriksaan Pendengaran


Gangguan pendengaran biasanya dibagi menjadi dua jenis yang mempunyai etiologi dan terapi yang berbeda. Tuli konduktif disebabkan oleh gangguan hantaran getaran udara ke telinga dalam. Tuli sensorineural disebabkan oleh penyakit yang timbul di mana saja antara organ corti dengan otak. Kombinasi gangguan ini lazim ditemukan. Kedua jenis tuli ini dapat dibedakan dengan tes garpu tala, meskipun untuk menentukan kelainan yang pasti diperlukan pemeriksaan audiometrik.

Tes Rinne mendeteksi tuli konduktif. Dalam keadaan normal, hantaran suara melalui udara lebih baik daripada hantaran suara melalui tulang. Jika penyakit menghalangi hantaran gelombang suara yang normal, maka hantaran melalui tulang akan mengatasi kesulitan ini. Beethoven memanfaatkan fenomena ini ketika pendengarannya mulai berkurang. Ia menempelkan

giginya pada piano sementara bermain untuk "mendengar" gubahan musiknya.

Untuk melakukan tes Rinne, getarkanlah garpu tala dan pasanglah tangkainya pada prosesus mastoideus. Garpu tala dengan 512 getaran/detik adalah yang paling tepat. Kalau pasien menunjukkan bahwa ia tidak dapat mendengar suara itu lagi, segera letakkanlah kepala garpu tala yang sedang bergetar tersebut di dekat kanalis eksternus. Biasanya bunyi tersebut terdengar lagi dan hasil tes ini positif. Hasil tes yang negatif berarti bahwa pasien menderita tuli konduktif pada telinga yang diperiksa (Gambar 3.12).

Tes Weber memastikan adanya tuli konduktif atau menunjukkan adanya tuli sensorineural. Getarkanlah garpu tala dan pasanglah pada puncak kepala. Tanyakanlah kepada pasien apakah ia mendengar lebih jelas pada satu telinga daripada pada telinga lainnya. Biasanya, bunyi tersebut terdengar berasal dari garis tengah. Jika ada tuli konduktif pada satu telinga, suara akan terdengar lebih keras pada telinga itu. Alasannya adalah bahwa efek peredam yang berasal dari suara gaduh normal di latar belakang menjadi berkurang pada telinga tersebut karena adanya gangguan hantaran. Jika ada tuli saraf pada satu telinga, bunyi tersebut akan terdengar lebih jelas pada telinga normal. Pada tuli saraf, hantaran bunyi melalui udara dan tulang tidak diteruskan ke Susunan Saraf Pusat (Gambar 3.13).




Gambar 3. 12. Tes Rinne Gambar 3. 13. Tes Weber

Tes Schwabach memastikan adanya tuli sensorineural dengan membandingkan pendengaran pasien dengan pemeriksa yang normal. Getarkanlah garpu tala dan pasanglah pada mastoid pasien. Kalau suara tersebut sudah tidak terdengar lagi, pindahkanlah garpu ke mastoid anda sendiri. Jika anda dapat mendengar getaran tersebut, ini berarti bahwa pasien menderita gangguan sensorineural. Jika anda tidak dapat mendengar getaran tersebut, mintalah rekan anda untuk memeriksa anda.

- a. Dengan ketiga tes ini, dua macam gangguan pendengaran dan berbagai macam kombinasinya dapat didiagnosis dengan cukup tepat.

Hidung sebaiknya diperiksa dengan spekulum hidung dan sumber cahaya yang kuat yang diarahkan dengancermine kepala. Untuk pemeriksaan di sisi tempat tidur, spekulum besar pendek pada otoskop sudah cukup memadai. Ingatlah bahwa sumbu saluran hidung tegak lurus dengan muka, tidak sejajar dengan batang hidung. Untuk mendapatkan visualisasi yang

baik, miringkan kepala pasien ke belakang 45° , angkat ujung hidung dengan ibu jari anda. Masukkan spekulum, dengan digerakkan di atas tepi inferior saluran hidung. Periksa apakah membran mukosa hidung berwarna normal-merah muda sampai merah atau tidak.



Gambar 3. 14. Posisi pasien saat pemeriksa memasukkan spekulum hidung

Gambar 3. 15. Transiluminasi Sinus frontalis

Arahkan sinar ke lateral, beberapa struktur bulat akan terlihat. Di bagian bawah terlihat ujung anterior konka inferior yang bulat dan halus. Di atasnya terlihat ujung anterior konka media. Celah seperti celah di antara kedua konka ini adalah meatus media. Konka superior tidak dapat dilihat dari depan. Meatus di antara konka yang berdekatan adalah tempat pengurasan sinus. Sekret purulen yang keluar dari meatus menunjukkan sinusitis. Celah gelap sempit di antara konka media dan septum adalah sulkus olfaktorius. Periksa lesi yang berbentuk massa, perubahan membrana mukosa, ulserasi, perforasi, dan polip.

Sinus frontalis dan maksilaris dapat diperiksa secara tidak langsung. Dalam ruang gelap, minta pasien

untuk memasukkan sumber cahaya yang terang ke dalam mulutnya untuk transiluminasi sinus maksilaris. Sebuah lampu senter yang terang sudah mencukupi. Sinus normal yang berisi udara akan terang secara simetris. Jika suatu sinus mengandung pus, sekresi atau udara, ia akan terlihat lebih gelap daripada pasangannya. Demikian pula, tekankan lampu senter kecil (*penlight*) yang terang di bawah daerah orbita superior untuk transiluminasi sinus frontalis. (Gambar 3.15). Perkusi langsung pada sinus yang mengalami radang akut akan menimbulkan nyeri hebat. Pasien yang menderita sinusitis akut biasanya hanya tahan satu kali perkusi.

b. Pemeriksaan mulut dan tenggorokan

Pemeriksaan rutin mulut mencakup inspeksi gusi, gigi dan lidah, visualisasi farings posterior dan tonsil, dan pemeriksaan refleks muntah (*gag reflex*), fonasi, dan gerakan lidah. Palpasi akan melengkapi inspeksi.

Periksalah bibir untuk melihat adanya fisura, tremor, pigmentasi, dan problem setempat. Eversikan bibir untuk melihat forniks di sekitar mandibula dan maksila. Jika pasien memakai gigi palsu, mintalah ia agar melepaskannya. Iritasi kronis yang disebabkan oleh gigi palsu sering menjadi prekursor leukoplakia dan granuloma dentis. Yang terakhir ini adalah benjolan yang keras, berwarna merah muda; seperti daging, yang ditutupi oleh mukosa normal. Periksalah gigi-gigi yang utuh dengan cermat untuk mencari sumber infeksi yang tersembunyi. Periksalah oklusi.


Lidah sebagai organ berotot dilapisi oleh mukosa yang memberikan kemampuan untuk mengecap. Mula-mula periksalah lidah dalam posisi relaksasi pada dasar

mulut. Mintalah pasien untuk menggerakkan lidahnya dari sisi ke sisi. Periksalah permukaan lidah. Ukuran papil berbeda-beda, yang berkisar dari filiformis yang sangat halus di bagian depan, papil berbentuk kerucut di bagian tengah dan papil sirkumvalata yang besar di bagian belakang. Papil sirkumvalata membentuk hutuf V dengan apeks di bagian posterior, yang mengarah ke foramen sekum, yang merupakan sisa duktus tiroglosus. Kadang-kadang pulau tiroid lingual dapat dijumpai di dalam foramen ini.

Mintalah pasien untuk menyentuh langit-langit mulutnya dengan ujung lidah dan periksalah permukaan bawahnya. Frenulum yang seperti selaput harus kendur dan lentur. Pada kedua sisi di dasar frenulum terdapat duktus kelenjar ludah sublingual. Kelenjar ini dapat dipalpasi dengan mudah dengan jari telunjuk yang memakai sarung tangan di bawah lidah dan tangan lainnya menekan ke atas dari bawah rahang. Konsistensinya harus lobuler keras dan sama.

Batas posterolateral lidah di bawah tiang-tiang tonsil dapat dipalpasi juga. Untuk memeriksa daerah ini, yang sering menjadi tempat neoplasia, pegang lidah dengan kasa dan tarik keluar ke arah yang berlawanan.

Seperti telah diuraikan di atas, ada banyak indikasi untuk memasukkan jari pemeriksa ke dalam mulut. Untuk melindungi pemeriksa, doronglah lipatan pipi pasien ke dalam di antara gigi-gigi dengan tangan lainnya. Ini sangat bermanfaat pada anak-anak dan pada pasien dengan refleks muntah yang hiperaktif.



Gambar 3. 16. Palpasi dasar mulut

Tonsil terletak di antara dua lipatan jaringan, arkus glosopalatinus, dan faringopalatinus. Daerah ini tidak dapat divisualisasi secara memadai, kecuali kalau lidah diektensikan sepenuhnya dan spatula lidah dimasukkan dalam-dalam. Tonsil biasanya membesar sampai umur 7 tahun dan kemudian mengecil, kecuali kalau mengalami peradangan kronis.

Secara berurutan, sentuhlah dengan ringan farings yang terletak di belakang arkus faringopalatinus pada kedua sisi. Jangan menekan farings dengan spatula lidah. Anda dapat merangsang terjadinya muntah. Perhatikanlah timbulnya refleks muntah yang disebabkan oleh rangsang minimal. Secara ringkas, pemeriksaan mulut dan tenggorokan dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4. Pemeriksaan Mulut

Inspeksi
- Bibir dan mukosa pipi
- Gusi, gigi, duktus kelenjar ludah
- Permukaan lidah dan frenulum
- Arkus glosopalatinus dan faringopalatinus dan tonsil
Pemeriksaan
- Gerakkan lidah
- Refleks muntah dan fonasi
Palpasi
Kalau perlu

4. Pemeriksaan Fisik Leher

Pemeriksaan leher terdiri atas inspeksi, palpasi, dan *auskultasi* selektif dari anatomi normal dan penemuan abnormal. Tindakan ini dilakukan secara berurutan terhadap empat struktur : anatomi muskuloskeletal, trakea dan tiroid, jaringan vaskular dan limfatik, anomali dan jaringan abnormal. Penilaian fungsional struktur muskuloskeletal juga merupakan bagian dari pemeriksaan dasar. Pemeriksaan ini dimulai dari depan ke belakang dan dari garis tengah bagian anterior ke garis tengah bagian posterior.

Pemeriksaan Dasar

a. Inspeksi dan Rentang Gerakan

Inspeksilah leher untuk melihat adanya benjolan yang nyata. Benjolan ini kadang-kadang lebih baik dilihat daripada diraba. Suruh pasien menelan dan perhatikan gerakan kartilago tiroidea dan ada atau tidak

adanya gerakan massa yang dapat ditemukan. Perhatikan cara pasien menyangga kepalanya dan bila perlu perhatikan pula Mm. Paraspinosus. Spasme otot-otot leher memaksa pasien memiringkan kepala dan memfiksasinya sehingga otot atau sekelompok otot yang terganggu teregang minimal. Pasien seperti ini yang memutar badannya untuk mengubah lapangan penglihatannya. Kelompok otot yang spastis mungkin kelihatan sedikit lebih menonjol dibandingkan dengan kelompok otot sisi lainnya. Osteoarthritis berat pada vertebra servikalis juga menyebabkan pasien memutar pada bahu bukan pada leher.

Vertebra servikalis menyebabkan banyak penderitaan pada banyak orang, terutama orang tua. Periksalah semua gerakan leher. Fleksi dan rotasi kepala terutama melibatkan artikulasio atlanto-oksipitalis. Laterofleksi ke masing-masing sisi memerlukan pergerakan bebas bagian tengah vertebra servikalis, sedangkan fleksi dan ekstensi memerlukan kerja vertebra servikalis bagian bawah.

Untuk memeriksa rentang gerakan leher, mintalah pasien anda menyentuh dagunya ke bahu kanan kemudian ke bahu kiri. Mintalah dia menyentuh dagunya ke sternum. Kemudian, letakkan telapak tangan anda pada sisi kepala pasien dan suruh dia memutar kepalanya melawan tahanan, pertama pada salah satu sisi dan kemudian pada sisi lainnya. Akhirnya, mintalah pasien "melihat langit-langit" dan mengekstensikan lehernya semaksimal mungkin.

Terakhir, periksalah vena-vena leher dengan kepala pada tempat tidur yang ditinggikan 45° . Periksalah vena jugularis eksterna yang berjalan ke media dari pertengahan klavikula, melewati m.

sternocleidomastoideus, menuju ke angulus mandibula. Hentikanlah aliran darah vena dari kepala dengan jari anda. Dengan jari lainnya, kosongkan vena dibawa jari anda yang menekan tersebut dan perhatikan pengisian vena jugularis dari bawah. Pakailah baterai kecil untuk menerangi leher dari sudut tangensial. Tindakan ini akan menimbulkan bayangan yang akan membantu anda untuk melihat fluktuasi dalam kolom darah pada vena jugularis.

b. Palpasi

Palpasilah suatu massa untuk menentukan letak, konsistensi, ukuran, dan mobilitasnya. Kelenjar limfe dapat terpisah-pisah atau menyatu seperti karet atau keras seperti batu, bebas atau melekat, tidak nyeri atau nyeri tekan. Pembesaran fisiologi kelenjar limfe sebagai respon terhadap fungsi penyaring yang aktif biasanya menyebabkan pembesaran yang tersendiri, kenyal, tidak melekat. Bila kelenjar limfe mengandung leukosit polimorfonuklear (limfadenitis), terdapat nyeri tekan. Penyakit metastatis biasanya memberi kesan keras seperti batu pada jari yang meraba. Penyakit limfomatosus biasanya menyebabkan kelenjar limfeteraba seperti karet. Limfoma dan kadang-kadang karsinoma, menyebabkan kelenjar limfe bersatu karena biasanya terjadi perluasan penyakit keperikapsular. Sedikit banyaknya fluktuasi massa kistik pada leher, tergantung pada tebal dinding kista, viskositas cairan di dalamnya, dan tekanan dalam kista. Demikian pula transiluminasi memberikan hasil yang berbeda-beda pula.

Palpasi dilakukan baik dari depan maupun dari belakang pasien. Dari depan, pertama-tama palpasilah ruang servikalis posterior. Mulailah pada prosesus mastoideus, kemudian geserlah jari anda ke bawah


sepanjang pinggir m. trapezius. Rantai kelenjar limfe terdapat di sini, yang mengalirkan limfe dari kulit kepala posterior dan ruang retrofaringeal. Kelenjar limfe ini mungkin membesar secara selektif pada "German measles" dan sering terserang pada mononukleosis infeksiosa dan penyakit virus lainnya. Tepat di depan rantai kelenjar limfe ini, anda dapat menemukan prosesus lateralis vertebra servikalis dan kemudia tepi posterior m. Sternocleidomastoideus.

Kartilago tiroidea merupakan struktur yang paling menonjol di garis tengah. Ia dapat digerakkan dengan bebas ke kanan dan ke kiri tetapi tidak bisa ke atas dan ke bawah. Bila digerakkan ke lateral teraba krepitasi sewaktu ia menggeser melewati bagian anterior vertebra servikalis. Tidak adanya krepitasi seperti itu mungkin menunjukkan adanya suatu massa pada ruang retrofaringeal.

Kartilago hiodea terletak di atas kartilago tiroidea. Pada orang tua, kornu lateral kartilago hiodea mungkin mengalami osifikasi dan teraba seperti kelenjar limfe yang keras seperti batu. Kedua kartilago ini terangkat pada waktu menelan. Tarikan trakea kadang-kadang dapat dirasakan pada pasien dengan aneurisma aorta torakalis. Untuk menemukan tanda ini, suruh pasien menelan dan tekanlah kartilago tiroidea dengan kuat. Peganglah kartilago tiroidea pada tempat kenaikan tertinggi untuk meregangkan seluruh trakea. Aorta yang melebar ketika melengkung melewati bronkus utama kiri sekarang akan menghantarkan denyutannya melalui trakea ke jari anda.

Selanjutnya, palpasi arteri karotis. Letakkan tiga jari anda di sisi kartilago tiroidea. Dengan hati-hati geserlah m. sternocleidomastoideus ke lateral dan


kartilago tiroidea ke medial. Gunakan tangan kanan untuk meraba a. karotis kiri dan demikian pula sebaliknya. Rabalah dengan hati-hati dan hanya pada satu sisi pada satu saat untuk menghindari perangsangan sinus karotikus dan refleks bradikardia (Gambar 3.17).



Gambar 3. 17. Palpasi a.karotis

Selain arteri karotis, trigonum servikalis anterior juga mengandung deretan kelenjar limfe yang penting. Berusahalah meraba kelenjar limfe ini. Biasanya kelenjar limfe ini tidak teraba.

Periksalah kelenjar tiroid dari depan pasien dan rabalah dari depan dan dari belakang. Pembesaran tiroid dapat bersifat difus atau asimetrus. Mula-mula, lakukan palpasi dengan jari menyilang trakea, kemudian tentukanlah garis bentuk lobus lateral. Letakkan ujung jari anda pada pinggir lateral m. sternocleidomastoideus dan ujung ibu jari anda pada garis tengah tepat di atas insisura sternalis. Suruh pasien menelan. Bila kelenjar tiroid membesar, waktu menelan ia akan teraba sebagai jaringan yang berjalan ke atas di bawah jari anda. Tiroid normal tidak mudah teraba. Kelenjar yang teraba minimal mungkin normal pada individu yang mempunyai leher tipis, wanita hamil, dan lain-lain. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3. 18.



Gambar 3. 18. Palpasi tiroid, jari-jari terletak lobus kanan di bawah m. Sternocleido mastoideus

Gambar 3. 19. Palpasi tiroid, jari-jari menjebak Medial terhadap m. sternocleidomastoideus

Bila anda pindah ke belakang pasien anda, sekali lagi rabalah kelenjar tiroid yang membesar. Mula-mula mintalah pasien melakukan sedikit fleksi leher dan letakkan jari-jari anda medial terhadap m. sternocleidomastoideus. Dalam posisi ini, kedua tangan dapat melakukan palpasi dengan serentak. (Gambar 3.19)

c. *Auskultasi*

Bila pasien berusia lebih dari 50 tahun, dengarkan di atas tiap sinus karotikus kemungkinan adanya aliran turbulen pada pembuluh darah atau bising karotis (*carotid bruit*) (Gambar 3.20). Pada arteri karotis sering sekali terjadi proses aterosklerosis. Bahan ateromatosa yang menonjol ke lumen mengganggu aliran lamelar dan menimbulkan arus turbulen yang terdengar sebagai bising sistolik. Bunyi ini, yang nyaring (*highpitched*) paling jelas didengar dengan diafragma stetoskop ketika pasien menahan napas. Adanya penemuan ini bersama-sama dengan gangguan

neurologis akut pada daerah distribusi karotis pada sisi yang sama menyarankan adanya lesi yang mungkin berespons terhadap pembedahan. Bising karotis asimtomatik yang tidak disertai oleh gejala-gejala neurologis tidak mempunyai arti klinis. Bising ini menunjukkan adanya gangguan atau distorsi aliran.



Gambar 3. 20. *Auskultasi a. karotis*

Setiap kali menemukan pembesaran tiroid, lakukan *auskultasi* pada kelenjar tersebut. Bising tiroid menyarankan adanya hipervaskularitas pada kelenjar dan keadaan hipertiroid. Bising sistolis dan diastolis, ditemukan secara kebetulan, karena dengung vena (*venous hum*) dapat didengar pada dasar leher dan insisura suprasternalis. Bising yang disebabkan oleh penyakit katup jantung dapat pula didengar di atas arteri karotis pada dasar leher.

Tabel 3.5. Pemeriksaan Leher

Inspeksi

- Sikap kepala, spasme otot
- Rentang gerakan leher
- Trakea, tiroid, vena-vena leher, massa

Palpasi

- Trakea dan laring
- Tiroid dari anterior dan posterior
- Kelenjar limfe dan arteri karotis
- Vertebra dan otot-otot

Auskultasi

- Bila diperlukan
- Tiroid, trakea, dan arteri karotis

Tes


- Rentang gerakan
- Pengisian vena

BAB IV

PEMERIKSAAN FISIK SISTEM LIMFATIK

A. Anatomi Fisiologi Sistem Limfatik

Sistem limfatik (*lymphatic system*) atau sistem getah bening memegang peranan penting dalam transport antar sel. Sistem ini membawa cairan dan protein yang hilang kembali ke darah. Cairan memasuki sistem ini dengan cara berdifusi ke dalam kapiler limfe kecil yang terjalin di antara kapiler-kapiler sistem kardiovaskuler. Apabila sudah berada dalam sistem limfatik, cairan itu disebut limfe (*lymph*) atau getah bening, komposisinya kira-kira sama dengan komposisi cairan interstisial. Sistem limfatik mengalirkan isinya ke dalam sistem sirkulasi di dekat persambungan vena cava dengan atrium kanan. Sistem ini terdiri dari pembuluh limfe, nodus limfatik, organ limfatik, nodul limfatik, sel limfatik.



Gambar 4. 1. Sistem Limfatik

Pembuluh limfe merupakan muara kapiler limfe, menyerupai vena kecil yang terdiri atas 3 lapis dan mempunyai katup pada lumen yang mencegah cairan limfe kembali ke jaringan. Kontraksi otot yang berdekatan juga mencegah limfe keluar dari pembuluh. Di sepanjang pembuluh limfe terdapat organ yang disebut nodus limfe (*lymph node*) atau nodus getah bening yang menyaring limfe. Di dalam nodus limfe terdapat jaringan ikat yang berbentuk seperti sarang lebah dengan ruang-ruang yang penuh dengan sel darah putih. Sel-sel darah putih tersebut berfungsi untuk mematikan virus dan bakteri yang masuk dalam sirkulasi.

Nodus limfatikus terdapat di sepanjang jalur pembuluh limfe berupa benda oval atau bulat yang kecil. Ditemukan berkelompok dan menerima limfe dari bagian tubuh. Fungsi utama nodus limfatikus untuk menyaring antigen dari limfe dan menginisiasi respon imun.

Organ-organ limfe yang ada dalam tubuh kita antara lain kelenjar getah bening (limfonodus), tonsil, thymus, limpa (*spleen* atau *lien*), limfonodus. Tonsil merupakan kelompok sel limfatik dan matriks ekstraseluler yang dibungkus oleh kapsul jaringan penyambung, tapi tidak lengkap. Terdiri atas bagian tengah (*germinal center*) dan kriпти. Tonsil terdiri dari :

- tonsil pharyngeal (adenoid), terletak dibagian posterior naso pharynx.
- tonsil palatina, terletak di bagian postero lateral cavum oral.
- tonsil lingualis, sepanjang 1/3 posterior lidah.

Timus terletak di mediastinum anterior berupa 2 lobus. Pada bayi dan anak-anak, timus agak besar dan

sampai ke mediastinum superior. Timus terus berkembang sampai pubertas mencapai berat 30 -50 gr. Kemudian mengalami regresi dan digantikan oleh jaringan lemak. Pada orang dewasa timus mengalami atrofi dan hampir tidak berfungsi.

Limpa terletak di kuadran atas kiri abdomen, di inferior diaphragma yang memanjang dari iga 9 - 11, terletak dilateralis ginjal dan posterolateral gaster. Fungsi limpa yaitu menginisiasi respon imun bila ada antigen di dalam darah, reservoir eritrosit dan platelet, memfagosit eritrosit dan platelet yang defektif, fagosit bakteri, dan benda asing lainnya.

Secara garis besar, sistem limfatik mempunyai 3 fungsi :

1. Aliran Cairan Interstitial

Cairan interstitial yang menggenangi jaringan secara terus menerus yang diambil oleh kapiler-kapiler limfatik disebut dengan limfe. Limfe mengalir melalui sistem pembuluh yang akhirnya kembali ke sistem sirkulasi. Dimulai dari sistem kapiler limfatik yang menyerap cairan dalam jaringan yang kemudian dibawa ke pembuluh limfatik dan kemudian ke kelenjar getah bening. Beberapa pembuluh limfe memiliki nodul limfatik (Nn LL) yang terdapat pada organ. Pembuluh limfe aferen membawa limfe ke Nn LL yang menyaringnya dari benda asing. Setelah disaring, limfe dikeluarkan melalui pembuluh limfe eferen, kemudian berkumpul pada trunkus limfatikus. Aliran trunkus limfatikus bermuara pada duktus limfatikus yang kemudian mengalirkan kembali limfe ke sistem sirkulasi.

2. Mencegah infeksi

Saat sistem limfatik mengumpulkan cairan interstitial, ikut terbawa juga virus dan bakteri yang akhirnya mencapai kelenjar limfae yang telah dirancang untuk menghancurkan virus dan bakteri dengan menggunakan berbagai metode. Pertama, sel makrofag menelan bakteri, ini dikenal sebagai fagositosis. Kedua, sel limfosit menghasilkan antibodi, yang dikenal sebagai respon kekebalan tubuh. Proses ini diharapkan dapat mengatasi semua infeksi yang berjalan melalui sistem limfatik dan juga infeksi yang terdapat pada jaringan lain, karena beberapa sel Limfosit akan meninggalkan node mengikuti perjalanan cairan limfe dan memasuki darah ketika sistem limfatik bergabung kembali dengan sirkulasi. Ini bukan satu-satunya daerah dimana perlawanan berlangsung, limpa juga menyaring darah dengan cara yang sama seperti sebuah nodus yang menyaring cairan limfe. Sel B dan sel T yang bermigrasi dari sumsum tulang merah dan Timus dapat mengenali patogen yang telah memasuki tubuh sebelumnya karena adanya sel memori yang dimiliki oleh sel T dan dapat menangani mereka dengan lebih cepat. Sel T lainnya disebut *T helper* dan sitotoksik yang melaksanakan fungsi kekebalan, sedangkan sel makrofag limpa menghancurkan sel-sel darah patogen yang dilakukan oleh fagositosis. Lalu ada nodul limfatik seperti amandel dan timus yang menjaga terhadap infeksi bakteri dengan menggunakan sel limfosit.


3. Pengangkutan Lipid

Jaringan kapiler dan pembuluh limfe juga mengangkut lipid dan vitamin yang larut lemak A, D,

E, dan K ke dalam darah dan menyebabkan cairan limfe berubah warna menjadi krem. Lipid dan vitamin yang diserap dari saluran pencernaan dikumpulkan oleh cairan limfe untuk dibawa ke darah.

B. Pemeriksaan Fisik Sistem Limfatik

Ada beberapa kelenjar limfe regional yang mudah diperiksa. Ini meliputi kelenjar limfe pada leher, aksila, dan inguinal. Kelenjar limfe yang kecil, tidak terfiksasi, lunak biasanya ditemukan pada trigonum-trigonum leher dan pada hampir setiap inguinal orang dewasa. Kedua daerah ini mengalirkan limfe dari struktur-struktur yang sering terinfeksi atau bertanggung jawab untuk mengalirkan limfe dari jaringan yang merupakan sasaran berbagai pemaparan dan perangsangan.



Gambar 4. 2. Kelenjar Limfe di daerah Leher

Kelenjar limfe supratroklearis perlu dicari. Untuk menemukannya, rabalah kondilus medialis humerus di antara ibu jari dan jari telunjuk anda. Kemudian bergeraklah ke atas (proksimal) dari tempat tersebut.

Bila kelenjar ini membesar, ia akan teraba di dalam jaringan pada 5 cm pertama dari kondilus medialis humerus.

Tempat lain yang kelenjar limfena kadang-kadang membesar adalah pada artikulasi sakroiliaka. Empat atau lima kelenjar limfe kadang-kadang teraba pada kedua sisi.

Tabel 4. 1. Pemeriksaan Sistem Limfatik

Inspeksi

Leher, ruang supraklavikular, aksila.

Palpasi

Submandibula.

Rantai kelenjar servikal anterior dan posterior.

Aksila.

Kelenjar limfe inguinal dan lien.

Perhatikan dan hubungkan

Fiksasi, tekstur.

Kelainan yang berhubungan.

Tanda-tanda tumor, pendarahan, atau infeksi.

Perbedaan antara kelenjar limfe yang membesar tetapi fungsinya normal dan yang membesar akibat suatu kelainan, sulit diuraikan. Pada umumnya kelenjar limfe yang nyeri berisi sel leukosit polimorfonuklear pada infeksi. Kelenjar limfe yang keras seperti batu disebabkan oleh infiltrasi sel-sel ganas. Kelenjar limfe yang keras seperti karet dan bersatu biasanya dijumpai pada limfoma.

Pembuluh limfe dimana saja dalam tubuh dapat terserang penyakit. Seluruh kulit mengandung pembuluh limfe, jika meradang terlihat sebagai garis

merah terang. Garis ini biasanya memanjang dan akan paralel dengan ekstremitas atau mengikuti pola aliran limfe yang jelas. Garis ini terasa panas bila diraba dan sangat nyeri pada limfadenitis. Bila saluran utamanya tersumbat, cairan jaringan berkumpul sampai tempat sumbatan sebagai edema yang jelas. Jika akut akan terasa agak nyeri. Jika kronis, tidak nyeri.

Harus diingat saat memeriksa pasien, pembuluh limfe adalah merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan, sehingga walaupun ditemukan hanya satu bagian saja yang mengalami masalah, maka periksalah semua daerah yang mengandung kelenjar limfe, lien dan daerah-daerah dimana manifestasi gangguan leukosit, trombosit dan eritrosit paling sering dijumpai. Ingatlah, bahwa kelenjar limfe merupakan bagian sistem hematopoietik dan retikuloendotelial. Gangguan sistem retikuloendotelial dan hematopoietik seringkali menyebabkan komplikasi perdarahan, infeksi, anemia, atau masalah masalah lain yang berhubungan dengan gangguan fungsi eritrosit, leukosit dan trombosit. Bila disertai limfadenopati, pikirkanlah adanya gangguan diatas. Periksalah kulit dan daerah-daerah lain untuk mencari tanda-tanda keterlibatan langsung atau komplikasi infeksi termasuk kemungkinan adanya splenomegali.

BAB V

PEMERIKSAAN FISIK DADA (SISTEM PERNAPASAN)


A. Anatomi Fisiologi Sistem Pernapasan

1. Anatomi Dada

Tiga tempat dipermukaan tubuh dan dua konvensi mempermudah diagnosis fisik dan pencatatan tanda-tanda yang ditemukan pada pemeriksaan fisik dada. Di bagian anterior, angulus sternal yang menonjol menandai pertemuan manubrium, sternum dan iga kedua. Sela iga mudah dihitung mulai dari tempat ini. Puting susu tidak dapat dipakai sebagai pedoman. Di bagian posterior, vertebra-vertebra dipakai sebagai titik pedoman, di mana vertebra C-7 yang menonjol dan sela iga ketujuh yang terletak tepat di bawah ujung skapula berfungsi sebagai pedoman yang dapat diandalkan.


Garis yang ditarik tegak lurus dari pertengahan klavikula disebut garis midklavikula. Garis tegak lurus serupa yang ditarik dari lipatan muskulus pektoralis dan deltoid adalah garis aksila anterior. Garis midaksila adalah garis tegak lurus dari pertengahan aksila dan garis aksila posterior ditarik dari lipatan posterior (Gambar 5.1). Kalau memerlukan ketepatan, pengukuran

harus dilakukan dalam sentimeter dari titik tertentu pada sternum atau vertebra.




Gambar 5.1. Garis-garis Pedoman pada Dada

Proyeksi paru-paru pada permukaan thoraks membantu pemeriksaan dalam menentukan lokasi kelainan di dalam thoraks. Lobus-lobus yang terletak di bagian bawah adalah lobus posterior dan proyeksinya adalah dari midskapula sampai ke diafragma dibagian posterior. Mereka yang menempati bagian terendah di thoraks anterior. Sebaliknya, lobus-lobus yang terletak di bagian atas terutama terdapat di bagian anterior. Di bagian depan, lobus media kanan terletak di antara lobus superior dan inferior. Ia berhubungan erat dengan jantung dan tidak diproyeksikan sama sekali ke dada posterior. Karena posisi jantung, paru-paru kiri tidak dapat terletak dekat dengan sternum seperti pada paru-paru kanan. (Gambar 5.2).



Gambar 5.2. Proyeksi Organ Dalam pada Dada

Tulang-tulang iga melengkung ke bawah ketika berjalan dari posterior ke anterior. Dada anak-anak kurang lebih berbentuk seperti silinder, tetapi selama proses pertumbuhan, dimensi lateral melebihi dimensi anteroposterior. Pada orang lanjut usia, proporsi seperti pada anak-anak terlihat lagi. Pengembangan volume rongga dada dicapai dengan peninggian iga-iga ke anterior dan pendataran diafragma. Dalam keadaan istirahat normal, pada perkusi diafragma, terletak setinggi iga atau sela iga ke sembilan, pada garis midskapula. Pada inspirasi dalam, penurunan diafragma normal dengan perkusi adalah 5 cm (Gambar 5.3).



Gambar 5.3 . Dinamika pernapasan


2. Anatomi Fisiologi Sistem Pernapasan

Pengertian pernafasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbondioksida hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas mengambil oksigen dalam udara bebas dan membuang karbondioksida ke lingkungan. Pernapasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walau dalam keadaan tertidur sekalipun karena sistem pernapasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom.

Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu :

- ✚ Respirasi luar yang merupakan pertukaran antara O₂ dan CO₂ antara darah dan udara.
- ✚ Respirasi dalam yang merupakan pertukaran O₂ dan CO₂ dari aliran darah ke sel-sel tubuh.

Normalnya manusia butuh kurang lebih 300 liter oksigen perhari. Dalam keadaan tubuh bekerja berat maka oksigen atau O₂ yang diperlukan pun menjadi berlipat-lipat kali dan bisa sampai 10 hingga 15 kalilipat. Ketika oksigen menembus selaput alveolus, hemoglobin akan mengikat oksigen yang banyaknya akan disesuaikan dengan besar kecilnya tekanan udara.



Gambar 5.4. Alat-alat Pernapasan pada Manusia

Alat-alat pernapasan pada manusia terdiri dari :

a. Hidung

Hidung terdiri dari lubang hidung, rongga hidung dan ujung rongga hidung. Rongga hidung banyak memiliki kapiler darah dan selalu lembab dengan adanya lendir yang dihasilkan oleh mukosa. Didalam hidung udara disaring dari benda-benda asing yang tidak berupa gas agar tidak masuk ke paru-paru. Selain itu udara juga disesuaikan suhunya agar sesuai dengan suhu tubuh.

b. Faring

Faring merupakan ruang dibelakang rongga hidung, yang merupakan jalan masuknya udara dari rongga hidung. Pada ruang tersebut terdapat klep (epiglotis) yang bertugas mengatur pergantian perjalanan udara pernapasan dan makanan.

c. Laring

Laring terdiri atas tulang rawan, yaitu jakun, epiglotis, (tulang rawan penutup) dan tulang rawan krikoid (cincin stempel) yang letaknya paling bawah. Pita suara terletak di dinding laring bagian dalam.

d. Trakea

Trakea atau batang tenggorokan merupakan pita yang tersusun atas otot polos dan tulang rawan yang berbentuk huruf 'C' pada jarak yang sangat teratur. Dinding trakea tersusun atas tiga lapisan jaringan epitel yang dapat menghasilkan lendir yang berguna untuk menangkap dan mengembalikan benda-benda asing ke hulu saluran pernapasan sebelum masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan.

e. Bronkus

Merupakan cabang batang tenggorokan yang jumlahnya sepasang, yang satu menuju ke paru-paru kiri

dan yang satunya menuju paru-paru kanan. Dinding bronkus terdiri atas lapisan jaringan ikat, lapisan jaringan epitel, otot polos dan cincin tulang rawan. Kedudukan bronkus yang menuju ke kiri lebih mendatar dari pada ke kanan. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa paru-paru kanan lebih mudah terserang penyakit

f. Bronkiolus

Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus, dindingnya lebih tipis dan salurannya lebih tipis. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi bagian yang lebih halus.

g. Alveoli

Alveoli merupakan saluran akhir dari saluran pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Dinding alveolus sangat tipis hanya terdiri dari selapis sel, lembab dan berdekatan dengan kapiler-kapiler darah. Adanya alveolus memungkinkan luasnya daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas. Pada bagian alveolus inilah terjadi pertukaran gas-gas O₂ dari udara bebas ke sel-sel darah dan pertukaran CO₂ dari sel-sel tubuh ke udara bebas.

h. Paru-paru

Paru-paru terletak dalam rongga dada dibatasi oleh otot dada dan tulang rusuk, pada bagian bawah dibatasi oleh otot diafragma yang kuat. Paru-paru merupakan kumpulan dari bronkiolus, saccus alveolaris dan alveolus. Paru-paru dibungkus oleh sebuah selaput yang disebut pleura, yang terdiri dari pleura parietalis yang melekat pada iga, diafragma dan columna vertebralis dan pleura visceralis yang melekat langsung pada paru-paru. Diantara selaput dan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi

paru-paru pada saat mengembang dan mengempis. Mengembang dan mengempisnya paru-paru disebabkan karena adanya perubahan tekanan rongga dada.

Mekanisme Pernapasan Manusia.

Pernapasan pada manusia dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

a. Pernapasan dada

Pada pernapasan dada, otot yang berperan penting adalah m. intercostalis. M. Intercostalis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu m. intercostalis eksternus yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan m. intercostalis internus yang berfungsi menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Bila m. intercostalis eksternus berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada bertambah besar. Bertambah besarnya akan menyebabkan tekanan dalam rongga dada lebih kecil dari pada tekanan rongga dada luar. Karena tekanan udara kecil pada rongga dada menyebabkan aliran udara mengalir dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh, proses ini disebut proses 'inspirasi'.

Sedangkan pada proses ekspirasi terjadi apabila m. intercostalis internus berkontraksi kembali ke posisi semula dan menyebabkan tekanan udara didalam tubuh meningkat. Sehingga udara dalam paru-paru tertekan dalam rongga dada dan aliran udara terdorong ke luar tubuh, proses ini disebut 'ekspirasi'.

b. Pernapasan perut

Pada pernafasan ini otot yang berperan aktif adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Bila otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Hal itu menyebabkan volume rongga dada

bertambah besar sehingga tekanan udaranya semakin kecil. Penurunan tekanan udara menyebabkan mengembangnya paru-paru, sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru (inspirasi).

B. Pemeriksaan Fisik Dada (Thoraks)

Struktur-struktur thoraks dapat diserang oleh berbagai macam penyakit. Tujuh gejala umum penyakit thoraks adalah : batuk, produksi sputum, hemoptisis, nyeri, dispnea, wheezing, dan stridor. Lima proses patofisiologik yang menyebabkan timbulnya tanda-tanda utama penyakit paru-paru adalah : cairan intraalveolar; penimbunan cairan intra-pleural; konsolidasi jaringan karena inflamasi, tumor atau infiltrat seluler lainnya; perubahan volume paru-paru atau anatomi thoraks; dan perubahan dinamika pernapasan dan aliran udara.

1. Inspeksi

Kalau sedang memeriksa pasien, berikanlah perhatian terhadap hal-hal kecil. Pertama, tentukanlah dimensi statik dada, yaitu diameter lateral dan anteroposterior. Kemudian, perhatikan kesimetrisannya. Dada yang asimetris dapat disebabkan oleh kelainan pada struktur tulang atau isi thoraks. Perhatikanlah apakah sela iga sama dan bandingkanlah satu sisi dengan sisi lainnya. Perhatikanlah ruang supraklavikula, apakah simetris atau tidak. Periksa tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Di bagian posterior, tulang belakang yang menonjol adalah vertebra servikal ketujuh, kemudian ada lengkungan ke luar yang halus (*kifosis*), yang bertemu dengan lengkungan ke dalam yang normal di daerah lumbal (*lordosis*). Di bagian anterior, sternum relatif lurus di bawah angulus sternal.

Kadang-kadang dijumpai dua penemuan secara kebetulan. Penonjolan sternum yang jelas, disebut *pektus karinatus* (dada burung) dan *pektus ekskavatum* yaitu sternum yang cekung ke dalam.

Sekarang periksalah dinamika pernapasan. Inspirasi biasanya dilakukan secara aktif, sedangkan ekspirasi pasif. Pada pernapasan tenang yang normal, pendataran diafragma dan peninggian iga-iga anterior memperbesar volume rongga dada. Peninggian ini menyebabkan tekanan intrapleura menjadi lebih negatif, sehingga menyebabkan masuknya udara (berdasarkan perbedaan tekanan tersebut). Inspirasi maksimum yang dilakukan oleh orang normal mempergunakan otot-otot tambahan di leher yang mengangkat iga pertama dan kedua dan sedikit mengangkat klavikula.

Pada emfisema lanjut, dada terus menerus mengalami hiperinflasi yang disebabkan oleh udara yang tidak terpakai karena terperangkapnya udara di dalam paru-paru. Untuk menukar udara tersebut, otot-otot tambahan dipakai, bahkan pada pernapasan tenang. Otot-otot ini menonjol hingga mudah ditemukan pada inspeksi.

Pasien dengan penyakit yang sudah lanjut seringkali mempunyai sikap tubuh yang khas. Mereka duduk di kursi dengan tubuh agak dimiringkan ke depan dengan siku atau tangan pada lutut untuk memperkuat inspirasi maksimum.

Ekspirasi yang biasanya pasif menjadi aktif kalau ada obstruksi. Otot-otot perut dapat terpakai untuk meningkatkan tekanan intra abdomen, sehingga mendorong diafragma ke atas. Retraksi sela iga juga dapat ditemukan Selama inspirasi yang menunjukkan berkurangnya daya kembang paru-paru.

Dengarkanlah suara pasien. Pasien dengan paralisis pita suara mungkin datang dengan suara mendesah. Pasien dengan kapasitas vital yang sangat berkurang mungkin berhenti beberapa kali selama mengucapkan suatu kalimat seakan-akan ia mengucapkannya dengan susah-payah. Akhirnya, jika ia mengeluarkan sputum, periksalah secara makroskopis dan kemudian di bawah mikroskop.


2. Palpasi

Pada umumnya, palpasi memberikan penegasan tentang penemuan-penemuan yang diperoleh pada inspeksi. Dengan palpasi dapat ditentukan daerah-daerah yang harus diperiksa dengan cermat pada auskultasi. Rabalah bentuk yang asimetris dan kontur abnormal untuk menilai kontur dan konsistensinya yang tepat. Palpasi jantung dibicarakan pada bab khusus.


Sekarang palpasilah peristiwa-peristiwa dinamika pada proses pernapasan. Letakkan satu tangan pada tiap sisi dada. Mintalah pasien untuk bernapas dalam-dalam. Apakah gerakan tiap sisi berjalan secara sinkron baik dari segi waktu maupun perluasannya? Mulailah dengan menempatkan ujung kedua ibu jari pada prosesus xifoideus dengan jari-jari tangan dan tangan terentang pada kedua bidang bawah anterior paru-paru. Ulangilah ini di bagian posterior dan superior.

Suara tambahan bernada rendah dapat diperiksa secara lebih baik dengan palpasi ketimbang dengan auskultasi. Suara yang diucapkan secara normal menimbulkan resonansi yang dapat dipalpasi - *fremitus raba*. Pakailah sisi ulnar jari ke lima atau telapak tangan anda pada tempat yang sama di atas tiap paru-paru dan mintalah pasien untuk mengucapkan "sembilan puluh sembilan" (Gambar 5.5). Penyimpangan dari suara-suara

ini mengikuti prinsip-prinsip yang sama seperti yang diuraikan dalam bab mengenai *auskultasi*. *Fremitus* lebih jelas pada pria ketimbang pada wanita karena suara bernada rendah lebih mendekati resonansi alamiah dada. *Fremitus* pada anak-anak menonjol karena dada anak-anak mempunyai frekuensi alamiah yang lebih tinggi, mendekati suara anak-anak yang berfrekuensi lebih tinggi.



Gambar 5.5. *Fremitus* vocal diperiksa dengan sisi ulnar tangan, bandingkan kedua sisi



Gambar 5. 6. Perkusi dinding dada, pada sela iga, anterior dan posterior, bandingkan kedua sisi

Sekali lagi, palpasilah trakea selama inspirasi dalam. Pada waktu inspirasi, trakea elastis yang normal akan teregang ke bawah. *Incisura sternal* juga naik ketika iga-iga anterior bergerak ke atas dan ke luar. Trakea dapat mengalami deviasi yang terus menerus atau hanya selama inspirasi. Kalau perlu, ukurlah pengembangan dada dengan pita pengukur. Ukurlah lingkaran dada

pada inspirasi dan ekspirasi penuh. Pita tersebut harus diletakkan tepat di bawah puting susu pria dan di bawah dasar payudara wanita.

3. Perkusi

Tujuan perkusi adalah untuk memperlihatkan keadaan pekak pada tempat-tempat dimana seharusnya ada resonansi. Nada perkusi ini hanya menembus sedalam 4-6 cm dan resonansi nada ini merupakan fungsi kepadatan jaringan. Jaringan yang mengandung udara lebih resonan ketimbang jaringan padat. Nada resonansi jaringan paru-paru normal hanya dapat dipelajari dengan latihan. Nada tersebut mungkin berbeda-beda dari orang ke orang, tetapi harus sama di kedua sisi dada yang sama dari seorang pasien. Dinding dada yang tebal memberikan nada yang lebih pekak ketimbang dada seorang anak. Nada perkusi menjadi pekak jika ruang pleura berisi cairan (*efusi pleura*). Jika efusinya unilateral, nada perkusi sisi dada yang satu akan berbeda dengan sisi dada lainnya. Demikian pula, paru-paru yang mengalami konsolidasi karena berisi cairan atau infiltrat seluler tidak mengandung udara dan memberikan nada pekak.

Dalam melakukan perkusi pada lapangan paru-paru, pakailah garis khayal sebagai pedoman dalam menempatkan jari flektor pada tiap sisi. Perkusi dilakukan pada sela iga. Mulailah pada apeks. Kalau anda melakukan perkusi thoraks posterior dari atas ke bawah pada garis midskapula dan kemudian garis aksila posterior, bandingkanlah satu sisi dengan sisi lainnya. Ubahlah sisi yang anda perkusi bolak-balik untuk membandingkan sisi kiri dengan sisi kanan. Di bagian anterior, mulailah dari apeks sampai ke diafragma. Pakailah garis aksila anterior dan midklavikula dalam

membandingkan nada perkusi pada satu sisi dengan lainnya. (Gambar 5. 6).

Pada paru-paru normal dapat terdengar berbagai macam nada perkusi. Di bagian anterior, di daerah dada kiri bawah, anda dapat mendengar nada timpani yang disebabkan oleh gelembung gas di dalam lambung. Sedikit di bagian lateralnya, dapat dijumpai daerah pekak limpa, pada garis midaksila iga ke delapan sampai ke sepuluh. Jantung yang terletak di dada kiri menimbulkan nada pekak yang makin bertambah di sekitar garis midklavikula ketika anda melakukan perkusi ke arah sternum. Pekak hati ditemukan pada kira-kira sela iga ke enam di bagian kanan. Batas hati penting untuk ditentukan dengan cara ini, sehingga anda dapat mengukur rentangnya secara keseluruhan - biasanya kira-kira 10 cm (range : 8-12 cm). Di bagian posterior, tiap paru-paru mempunyai daerah resonansi di bahu (*ismus Kronig*), yang menggambarkan apeks paru-paru. Lebar ismus ini harus sama pada kedua paru-paru. Penyempitan unilateral atau tidak adanya resonansi ini mungkin menunjukkan fibrosis atau konsolidasi di daerah apeks seperti pada tuberkulosis atau tumor apeks.

Diafragma menentukan batas bawah paru-paru sebagai perubahan dari resonansi ke pekak di bagian posterior. Jika diafragma bergerak dengan normal, batas ini akan berubah selama respirasi. Periksalah perbedaan ini dengan memperkusi batas ini pada akhir inspirasi dan kemudian pada akhir ekspirasi, dan ukurlah perbedaan ini sebagai ekskursi diafragma. Perkusilah daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah karena pemeriksaan dari daerah resonansi ke daerah pekak paling efektif. Ekskursi rata-rata adalah 5 cm, dengan diafragma istirahat normal pada sel iga ke sembilan di garis midskapula.


Miringkanlah tubuh anda mendekati tubuh pasien dan dengarkanlah satu-dua perkusi sebelum anda memindahkan jari-jari tangan anda. Ada dua kesalahan umum: melakukan perkusi berulang-ulang tanpa mendengarkan, dan melakukan perkusi terlalu keras. Suatu nada perkusi yang tepat tidak dapat didengar di luar ruang pemeriksaan.

4. *Auskultasi*


Pada dinding dada dapat terdengar suara yang berasal dari berbagai macam sumber. Gerakan udara melalui bronkus dan alvelolus menimbulkan getaran suara. Suara yang diucapkan atau dibisikkan memancarkan gelombang suara melalui paru-paru. Adanya kelainan di dalam paru-paru mengubah suara-suara yang timbul secara alamiah atau penghantaran suara-suara yang diucapkan.

Empat prinsip penghantaran suara perlu diperhatikan. Jarak antara sumber suara dan stetoskop jelas mempengaruhi intensitas suara tersebut. Alveolus bertindak sebagai suatu seri serangkaian sekat yang banyak persamaannya dengan lempang akustik. Bunyi bronkus dipecahkan dan diperlemah ketika dihantarkan ke bagian perifer. Faktor lainnya adalah jumlah antar permukaan dengan densitas yang berbeda yang harus dilalui oleh suara tersebut. Makin banyak antar permukaan, makin sedikit hantaran suaranya. Sifat media transmisi akan mempengaruhi intensitas dan secara selektif akan membantu penghantaran frekuensi atau titik nada tertentu. Makin padat medianya, makin baik penghantaran suaranya, misalnya cairan penghantaran suara lebih baik daripada udara. Frekuensi dasar dada kira-kira 110 siklus/detik. Suara-suara yang mendekati frekuensi dasar ini akan dihantarkan secara selektif.

Dalam melakukan *auskultasi* pada dada pakailah cara pendekatan pada perkusi. Pakailah diafragma stetoskop dan mintalah pasien untuk menarik napas dan mengeluarkan napas secara berlahan-lahan melalui mulutnya. Pernapasan melalui mulut sangat meningkatkan intensitas suara yang akan anda dengar. Mulailah di bagian anterior dan di bagian atas dada. Bandingkanlah satu sisi dengan sisi lainnya ketika anda bergerak menuruni dada tersebut. Lakukanlah *auskultasi* di bagian posterior dada dan terutama perhatikanlah basis paru-paru. Basis paru-paru merupakan tempat yang paling mungkin untuk menimbulkan akumulasi cairan dalam jumlah kecil dalam alveolus. Ronki basah menyarankan adanya cairan di dalam alveolus, seringkali karena payah jantung kiri yang ringan, atelektasi, atau mungkin stadium dini pneumonia. Pada pasien geriatrik tidak jarang ditemukan beberapa ronki basah di tempat ini (Gambar 5.7) Ronki basah dapat terdengar sepanjang siklus pernapasan atau selama satu fase saja.



Gambar 5.7. Urutan *auskultasi* dan perkusi menggunakan garis khayal



Gambar 5.8. Bunyi Pernapasan

Biasanya terdengar tiga bunyi pernapasan normal. Bunyi pernapasan vesikuler timbul karena berpusarnya udara di dalam alveolus dan merupakan bunyi pernapasan normal. Bunyi ini bernada rendah, halus dan terdengar paling jelas di bagian perifer paru-paru karena memang timbul di dekatnya. Karena disebabkan oleh masuknya udara ke dalam alveolus, bunyi ini terdengar pada waktu inspirasi. Sebagai contoh, anda dapat mendengarkannya di basis paru-paru di bagian posterior.

Bunyi penafasan bronkial timbul karena turbulensi udara di dalam bronkus kartilaginosa. Bunyi ini lebih kasar dan nadanya lebih tinggi daripada bunyi vesikuler. Bunyi penafasan bronkial hampir hilang seluruhnya ketika mereka melintasi sekat alveolus. Sebagai akibatnya, mereka biasanya tidak dapat didengar di bagian perifer paru-paru normal. Bunyi ini dapat mempunyai komponen inspirasi dan ekspirasi. Sebagai contoh bunyi pernapasan bronkial, lakukanlah *auskultasi* di daerah trakea (Gambar 5.8).

Bunyi pernapasan bronkovesikuler merupakan campuran kedua unsur ini. Bunyi ini dapat di dengar pada tempat-tempat di mana ada bronkiolus besar yang menutupi satu lapisan tipis alveolus. Misalnya, bunyi ini dapat didengar di daerah infraklavikuler kanan di dekat sternum (Gambar 5.8).

Daerah anatomis tempat anda melakukan *auskultasi* mempengaruhi persepsi anda tentang inspirasi dan ekspirasi. Kalau anda mendengarkan di daerah bronkus besar, pernapasan bronkial dan komponen bronkial pernapasan bronkonvesikuler terdengar di seluruh siklus pernapasan. Karena bunyi pernapasan vesikuler merupakan bunyi inspirasi, pernapasan

vesikuler membuat inspirasi kelihatan jauh lebih lama daripada ekspirasi. Ketika komponen bronkial tambahan ditambahkan pada apa yang anda dengar, ekspirasi kelihatannya menjadi lebih panjang dan lama kedua fase tersebut kira-kira menjadi sama.

Fremitus vokal dipakai untuk memastikan terjadinya perubahan dalam densitas paru-paru. Untuk memeriksa media penghantar suara - paru-paru - dengarkanlah suara yang diucapkan dan dibisikkan. Mintalah pasien anda untuk membisikkan berulang-ulang. "satu, dua, tiga" atau "sembilan puluh sembilan" ketika anda sedang mendengarkan. Suara yang diucapkan menjadi tidak jelas dan melemah pada saat ia mencapai bagian perifer paru-paru. Biasanya, suara yang dibisikkan tidak dapat didengar di bagian perifer. Kalau anda mendengarkan di daerah bunyi pernafasan bronkovesikuler, suara yang diucapkan menjadi lebih keras dan suara yang dibisikkan menjadi dapat didengar. Kalau anda mencapai daerah bunyi pernafasan bronkial, suara yang diucapkan menjadi sangat keras dan dapat diartikan. Suara yang dibisikkan menjadi dapat dibedakan, paling tidak dalam jumlah suku kata yang diucapkan. Konsolidasi paru-paru dengan cairan peradangan mengubah fremitus vokal, dengan menghantarkan nada-nada yang dibisikkan (berfrekuensi rendah) sampai ke bagian perifer.

Faktor tunggal terpenting yang menimbulkan bunyi abnormal di dalam paru-paru adalah cairan. Cairannya dapat berupa transudat edema, eksudat purulen atau mukus dalam jumlah abnormal.

Cairan yang sangat kecil jumlahnya dideteksi sebagai ronki basah post-tusif. Untuk mendengarkannya, mintalah pasien untuk melakukan

ekspirasi penuh dan pada akhir ekspirasi tersebut, batuk. Kemudian ketika ia melakukan inspirasi berikutnya, kita akan mendengar banyak gemericik halus (*crackle*). Batuk pada akhir ekspirasi menyebabkan kolapsnya beberapa alveolus yang basah sehingga mengeluarkan bunyi gemericik kalau terbuka kembali selama inspirasi. Tanda ini, kalau ditemukan di seluruh apeks paru-paru, menjadi tanda khas tuberkulosis.

Ronki adalah akibat turbulensi udara di sekitar mucus atau debris cairan lain di dalam saluran pernapasan yang besar. Bunyinya kasar, terus-menerus dan dapat bervariasi dari pernapasan satu ke pernapasan berikutnya. Ronki dapat pula disebabkan oleh benda padat yang sebagian menyumbat bronkus, misalnya tumor atau benda asing.

Wheezing menunjukkan penyempitan saluran pernapasan. Wheezing adalah bunyi seperti bersiul yang bernada tinggi karena adanya akselerasi udara melalui lumen yang mengalami penyempitan patologis, misalnya pada asma. Wheezing timbul sepanjang siklus pernapasan atau selama inspirasi atau ekspirasi saja.

Tabel 5.1. Ringkasan Pemeriksaan Dasar pada Thoraks

Inspeksi

- Posisi trakea.
- Dimensi statik dan kesimetrisan dada.
- Dinamika inspirasi/ekspirasi.
- Pemakaian otot-otot tambahan, berbicara.

Palpasi

- Gerakan trakea.
- Anatomi thoraks, dinamika pernapasan.
- Fremitus taktil (kalau perlu).

Perkusi

- Perkusi resonan sampai pekak.
- Di bagian anterior - batas paru-paru, jantung dan hati.
- Di bagian posterior - paru-paru, ekskursi diafragma.
- Carilah pekak abnormal.

Auskultasi

- Semua lapangan paru-paru.
- Bunyi normal - bronkial, bronkonvesikuler, vesikuler.
- Bunyi obstruksi - wheeze, ronki, stridor.
- Bunyi cairan - ronki basah (cairan intraalveolaer), berkurangnya bunyi pernafasan (intrapleura).
- Fremitus vokal - egofoni dan bronkofoni pada konsolidasi (periksalah kalau perlu).

BAB VI

PEMERIKSAAN FISIK JANTUNG (SISTEM KARDIOVASKULER)

A. Anatomi Fisiologi Jantung (Kardiovaskuler)

Jantung terletak didalam rongga mediastinum dari rongga dada (thoraks) diantara kedua paru-paru. Dibungkus oleh sebuah selaput yang disebut perikardium yang terdiri atas 2 lapisan:


- Perikardium parietalis, yaitu lapisan luar yang melekat pada tulang dada dan selaput paru.
- Perikardium viseralis, yaitu lapisan permukaan dari jantung itu sendiri yang juga disebut epikardium.

Diantara kedua lapisan tersebut terdapat cairan perikardium sebagai pelumas yang berfungsi mengurangi gesekan akibat gerak jantung saat memompa.

Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan:

1. Lapisan luar disebut epikardium atau perikardium.
2. Lapisan tengah merupakan lapisan berotot, disebut miokardium.
3. Lapisan dalam disebut endokardium.

Jantung terdiri dari 4 ruang yaitu dua ruang yang ber dinding tipis disebut atrium (serambi) dan 2 ruang yang ber dinding tebal disebut ventrikel (bilik).



Gambar. 6.1. Anatomi Jantung

Jantung memiliki 4 katup, yaitu :

1. Katup Atrioventrikuler

Merupakan katup yang terletak diantara atrium dan ventrikel. Katup antara atrium kanan dan ventrikel kanan mempunyai tiga buah daun katup disebut *katup trikuspidalis*. Sedangkan katup yang terletak diantara atrium kiri dan ventrikel kiri mempunyai dua buah daun katup disebut *katup bikuspidalis* atau *katup mitral*.

Katup AV memungkinkan darah mengalir dari masing-masing atrium ke ventrikel pada waktu diastol ventrikel, serta mencegah aliran balik ke atrium pada saat sistol ventrikel.

2. Katup Semilunar

Katup semilunar terdiri dari katup pulmonal dan katup aorta. Katup pulmonal terletak antara arteri

pulmonalis dan ventrikel kanan. Katup aorta, terletak antara ventrikel kiri dan aorta.

Kedua katup semilunar terdiri dari 3 daun katup. Adanya katup semilunar memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistol ventrikel, dan mencegah aliran balik ke ventrikel sewaktu diastol ventrikel.

Keseluruhan sistem peredaran (*sistem kardiovaskuler*) terdiri dari arteri, arteriola, kapiler, venula dan vena. Arteri berfungsi untuk transportasi darah dengan tekanan yang tinggi ke seluruh jaringan tubuh. Dinding arteri kuat dan elastis (lentur), kelenturannya membantu mempertahankan tekanan darah diantara denyut jantung. Dinding arteri banyak mengandung jaringan elastis yang dapat teregang saat sistol dan mengadakan rekoil saat diastol.

Arteriolen merupakan cabang paling ujung dari sistem arteri, berfungsi sebagai katup pengontrol untuk mengatur pengaliran darah ke kapiler. Arteriolen mempunyai dinding yang kuat sehingga mampu kontriksi atau dilatasi beberapa kali ukuran normal, sehingga dapat mengatur aliran darah ke kapiler. Otot arteriolen dipersarafi oleh serabut saraf kolinergik yang berfungsi vasodilatasi. Arteriolen merupakan penentu utama resistensi/tahanan aliran darah, perubahan pada diameternya menyebabkan perubahan besar pada resistensi.


Kapiler merupakan pembuluh darah yang halus dan berdinding sangat tipis, yang berfungsi sebagai jembatan diantara arteri (membawa darah dari jantung) dan vena (membawa darah kembali ke jantung). Kapiler memungkinkan oksigen dan zat makanan berpindah

dari darah ke dalam jaringan dan memungkinkan hasil metabolisme berpindah dari jaringan ke dalam darah. Dari kapiler darah mengalir ke dalam vena lalu bergabung dengan venul-venul lain ke dalam vena, yang akan membawa darah kembali ke jantung.

Vena memiliki dinding yang tipis, tetapi biasanya diameternya lebih besar daripada arteri, sehingga vena dapat mengangkut darah dalam volume yang sama tetapi dengan kecepatan yang lebih rendah dan tidak terlalu dibawah tekanan. Karena tekanan dalam sistem vena rendah maka memungkinkan vena berkontraksi sehingga mempunyai kemampuan untuk menyimpan atau menampung darah sesuai kebutuhan tubuh.

Sirkulasi Jantung

Lingkaran sirkulasi jantung dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Namun demikian terdapat juga sirkulasi koroner yang juga berperan sangat penting bagi sirkulasi jantung. (Gambar 6. 2).



Gambar 6.2. Sirkulasi Darah Manusia

Sirkulasi Sistemik

1. Mengalirkan darah ke berbagai organ tubuh.
2. Memenuhi kebutuhan organ yang berbeda.
3. Memerlukan tekanan permulaan yang besar.
4. Banyak mengalami tahanan.
5. Kolom hidrostatik panjang.

Sirkulasi Pulmonal

1. Hanya mengalirkan darah ke paru-paru.
2. Hanya berfungsi untuk paru-paru.
3. Mempunyai tekanan permulaan yang rendah.
4. Hanya sedikit mengalami tahanan.
5. Kolom hidrostatiknya pendek.

Sirkulasi Koroner

Efisiensi jantung sebagai pompa tergantung dari nutrisi dan oksigenasi yang cukup pada otot jantung itu sendiri. Sirkulasi koroner meliputi seluruh permukaan jantung dan membawa oksigen untuk miokardium melalui cabang-cabang intramiokardial yang kecil-kecil. Aliran darah koroner meningkat pada peningkatan aktifitas jantung dan adanya rangsang sistem saraf simpatis.

Tekanan Darah

Tekanan darah (*blood pressure*) adalah tenaga yang diupayakan oleh darah untuk melewati setiap unit atau daerah dari dinding pembuluh darah. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah adalah: curah jantung, tahanan pembuluh darah perifer, aliran, dan volume darah.

Aliran Darah

Aliran darah pada orang dewasa saat istirahat adalah 5 L/menit, yang disebut sebagai curah jantung

(*cardiac output*). Aliran darah melalui pembuluh darah dipengaruhi oleh dua factor :

- Perbedaan Tekanan, merupakan penyebab terdorongnya darah melalui pembuluh.
- Hambatan terhadap aliran darah sepanjang pembuluh, disebut juga sebagai "*vascular resistance*" atau tahanan pembuluh.

SIKLUS JANTUNG

Setiap siklus jantung terdiri dari urutan peristiwa listrik dan mekanik yang saling terkait. Rangsang listrik dihasilkan dari beda potensial ion antar sel yang selanjutnya akan merangsang otot untuk berkontraksi dan relaksasi. Kelistrikan jantung merupakan hasil dari aktivitas ion-ion yang melewati membran sel jantung. Aktivitas ion tersebut disebut sebagai **potensial aksi**. Mekanisme potensial aksi terdiri dari fase depolarisasi dan repolarisasi:

- Depolarisasi
Merupakan rangsang listrik yang menimbulkan kontraksi otot. Respon mekanik dari fase depolarisasi otot jantung adalah adanya sistolik.
- Repolarisasi
Merupakan fase istirahat/relaksasi otot, respon mekanik depolarisasi otot jantung adalah diastolik.

Fase Siklus Jantung

1. Mid Diastol

Merupakan fase pengisian lambat ventrikel dimana atrium dan ventrikel dalam keadaan istirahat. Darah mengalir secara pasif dari atrium ke ventrikel melalui katup atrioventrikuler, pada saat ini katup semilunaris tertutup dan terdengar sebagai bunyi jantung kedua.


2. Diastol Lanjut
Gelombang depolarisasi menyebar melalui atrium berhenti pada nodus atrioventrikuler (nodus AV). Otot atrium berkontraksi memberikan 20%-30% pada isi ventrikel.
3. Sistol Awal
Depolarisasi menyebar dari sinus AV menuju miokardium ventrikel. Ventrikel berkontraksi menyebabkan tekanan dalam ventrikel lebih tinggi dari tekanan atrium sehingga menyebabkan katup atrioventrikuler menutup yang terdengar sebagai bunyi jantung satu. Dalam keadaan ini tekanan dalam aorta dan arteri pulmo tetap lebih besar, sehingga katup semilunar tetap tertutup. Kontraksi ventrikel ini disebut sebagai kontraksi isovolumetrik.
4. Sistol Lanjut
Tekanan ventrikel meningkat melebihi tekanan pembuluh darah sehingga menyebabkan katup semilunaris membuka. Setelah katup semilunar terbuka, terjadi ejsi isi ventrikel kedalam sirkulasi pulmoner dan sistemik.
5. Diastol Awal
Gelombang repolarisasi menyebar ke ventrikel sehingga ventrikel menjadi relaksasi. Tekanan ventrikel turun melebihi tekanan atrium sehingga katup AV membuka. Dengan terbukanya katup AV maka ventrikel akan terisi dengan cepat, 70%-80% pengisian ventrikel terjadi dalam fase ini

B. Pemeriksaan Fisik Jantung

Berhasilnya suatu pemeriksaan fisik jantung tergantung pada lengkapnya riwayat penyakit, pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan pola yang baik

dan interpretasi penemuan yang didasarkan pada patofisiologi. Jangan tergesa-gesa untuk melakukan *auskultasi* jantung. Bunyi terpenting yang akan anda dengarkan adalah kata-kata pasien ketika ia menceritakan riwayat penyakitnya.

Jantung adalah suatu pompa beruang empat yang merupakan suatu komponen dari tiga kompartemen unit fungsional. Kompartemen sistem kardiovaskuler, jantung, arteri (*afterload*) dan vena (*preload*), selalu diperiksa dalam tiap evaluasi jantung. Kelainan dalam satu kompartemen menimbulkan respons fisiologis dan anatomis pada bagian-bagian lainnya dari sistem ini. Kelainan primer suatu penyakit mungkin menyerang satu kompartemen saja, tetapi manifestasi penyakitnya dapat ditemukan pada kompartemen-kompartemen lainnya dari sistem ini. Penemuan perifer membuat penemuan jantung dapat diinterpretasikan. "Pemeriksaan jantung" yang efektif memerlukan kolerasi penemuan jantung dengan informasi yang diperoleh dari tanda-tanda vital, fundus optik, vena-vena leher, denyut perifer, paru-paru, hati, limpa, kulit, dan ekstremitas.



Gambar 6. 3. Tiga Kompartemen Sistem Kardiovaskuler

Pemeriksaan jantung dan kardiovaskuler mencakup dicarinya tanda-tanda perubahan anatomis, gangguan fungsi fisiologis, dan perubahan patologis yang berkaitan dengan berbagai macam penyakit jantung. Korelasi tiga macam bukti ini memberi diagnosis yang tepat. Gambar 6. 3. melukiskan tiga kompartemen sistem kardiovaskuler dan sumber informasi anatomik utama tentang gangguanfungsi kardiovaskuler.

Mula-mula, berpikirlah secara anatomis. Apakah riwayat penyakit atau penemuan fisik menunjukkan problem pada sisi kanan jantung, sisi kiri atau bilateral? Katup atau ruang spesifik mana yang menimbulkan penemuan fisik tersebut? Kemudian, interprestasikanlah penemuan-penemuan secara fisiologis. Apakah penemuan-penemuan tersebut menunjukkan gangguan tekanan primer dengan hipertrofi ruang jantung atau gangguan volume dengan dilatasi bilik? Apakah penemuan-penemuan tersebut menunjukkan penyakit dini atau lanjut? Akhirnya, berpikirlah secara patofisiologis. Riwayat penyakit dan penemuan fisik mengarah kepada penyakit primer jantung yang mana atau komplikasi sekunder apa?

Untuk menganalisis gejala dan tanda, kita harus menguasai manifestasi utama penyakit jantung yang lazim ditemukan dan komplikasi penyakit jantung. Tujuh penyakit primer jantung yang lazim ditemukan adalah : penyakit jantung kongenital, iskemik, hipertensif, valvuler dan pulmoner, penyakit primer otot jantung (miokardiopati) dan penyakit perikardial. Enam komplikasi yang lazim terjadi pada penyakit jantung primer mencakup : gagal jantungkongestif, aritmia,


embolus sistemik, endokarditis, perikarditis, dan tamponade perikardial.

Ringkasnya, susunlah evaluasi dan interpretasi penemuan di sekitar empat prinsip :


1. Selalu hubungkan penemuan-penemuan jantung dengan penemuan-penemuan perifer
2. Tentukanlah sisi jantung, ruangnya, dan katup yang terserang oleh penyakit primer jantung.
3. Pertimbangkanlah setiap penemuan sebagai bukti yang menyokong atau menentang tujuh penyakit primer jantung yang lazim ditemukan dan enam komplikasi lazim.
4. Tentukanlah apakah pemeriksaan mengarah kepada penyakit dini atau komplikasi lanjut.

Beberapa hubungan anatomik penting.

Ventrikel kanan terletak di bagian anterior, sedangkan ventrikel kiri terletak di posterior. Apeks jantung terutama terdiri dari ventrikel kiri dan septum interventrikel berada dalam bidang yang membentuk sudut dengan dada. Demikian pula, katup pulmoner dan a. pulmonalis terletak di bagian anterior dan katup aorta dan aorta terletak di bagian posterior. Hubungan ini mempengaruhi apa yang anda raba dan dengar dan yang terlihat pada foto thoraks. Hal-hal ini dilukiskan dalam Gambar 6.4.



Gambar. 6. 4. Septum membentuk sudut dengandinding dada (panah).




Gambar 6.5. Proyeksi ruang-ruang jantung pada dada anterior.

Gambaran ruang-ruang jantung pada dada anterior penting untuk divisualisasikan. Ini akan membantu anda dalam diagnosis fisik dan kalau sedang membaca foto thoraks. Dari atas ke bawah, di sisi kanan jantung, tonjolannya adalah vena kava superior, aorta ascendens dan atrium kanan. Di sisi kiri, tonjolannya dibentuk oleh vena subklavia kiri, "aortic knob", arteri pulmonalis, appendage atrium kiri dan ventrikel kiri (Lihat gambar 6. 5)

Angulus sternum menandai sela iga kedua tepat di lateral dan di bawahnya. Sela iga kanan kedua merupakan daerah aorta di mana peristiwa-peristiwa yang terjadi pada penutupan aorta dapat di palpasi dan diauskultasi dengan sebaik-baiknya. Sela iga kiri kedua merupakan daerah pulmoner di mana peristiwa-peristiwa yang terjadi pada penutupan katup pulmoner dapat diperiksa dengan sebaik-baiknya. Proyeksi katup

trikuspid adalah pada sela iga kiri kelima, di garis parasternal, dan proyeksi katup mitral adalah pada sela iga kiri kelima, kira-kira di garis midklavikula. Posisi anatomik katup-katup ini agak berbeda dengan daerah-daerah di mana peristiwa-peristiwa yang melibatkan katup-katup ini dapat didengar paling baik pada *auskultasi*. Gambar 6.6 dan 6.7 melukiskan hubungan ini.



Gambar 6.6. Posisi anatomis katup-katup jantung

Gambar 6.7. Daerah untuk *auskultasi* katup Jantung.

Kalau menginterpretasikan penemuan-penemuan kardiak, pertimbangkanlah dua respons fisiologis jantung terhadap penyakit. Kalau ventrikel harus memompa darah melawan tekanan yang sangat tinggi, ventrikel tersebut mengalami hipertrofi atau peningkatan massa otot, sehingga mengubah anatomi normal. Kalau suatu bilik jantung menyesuaikan diri terhadap peningkatan volume atau aliran, ia berdilatasi dalam usaha kompensasi untuk meningkatkan daya kontraksi otot. Perubahan dalam sifat dan ukuran bilik

jantung ini menyebabkan penemuan-penemuan yang khas yang dapat diamati, diperkusi, dipalpasi, dan diauskultasi.

Aliran darah, perubahan tekanan, pembukaan dan penutupan katup menimbulkan berbagai macam getaran yang dapat didengarkan. Untuk menginterpretasikan penemuan-penemuan auskultatoris, anda harus mengingat dasar-dasar fisiologis bunyi jantung normal dan bising (murmur) jantung.

Bising (murmur) jantung adalah suara yang timbul karena aliran darah turbulen. Aliran turbulen disebabkan oleh faktor-faktor anatomik, seperti stenosis katup jantung dan oleh aliran darah aberan, seperti pada katup yang inkompeten. Lokasi, waktu, dan penyebaran bising jantung memberikan petunjuk pertama tentang sumbernya.

Lokasi di mana bising jantung terdengar paling jelas dipengaruhi oleh pembesaran atau dilatasi bilik. Bising jantung seringkali terdengar paling jelas di atas kelainan anatomiknya dan di atas perjalanan anatomik aliran aberan atau turbulen. Kualitas atau intensitas bising jantung dapat diubah untuk waktu singkat dengan mengubah tekanan dan aliran di dalam jantung kanan atau kiri melalui manuver fisiologik seperti berjongkok atau manuver valsava (ekshalasi dengan glottis tertutup).

Bising sistolik terjadi selama kontraksi ventrikel. Bising ini disebabkan oleh stenosis katup aorta atau pulmoner, karena inkompetensi katup mitral atau trikuspid atau karena cacat septum. Tidak semua bising sistolik menunjukkan kelainan jantung. Peningkatan volume dan aliran darah, seperti pada kehamilan dan anemia, dapat menimbulkan turbulensi dalam aliran

darah dan menyebabkan bising fisiologis yang hanya mempunyai sedikit arti klinis. Karena frekuensinya tergantung pada perbedaan tekanan dan lamanya tergantung pada lama perbedaan tekanan tersebut, maka sifat-sifat bising tersebut dapat diramalkan.

Bising diastolik terjadi selama relaksasi ventrikel. Bising ini disebabkan oleh insufisiensi katup aorta atau pulmoner dan oleh stenosis katup mitral atau trikuspid. Bising diastolis selalu menunjukkan adanya kelainan penting.

Bising juga dicirikan dengan penyebaran atau penjarannya. Faktor yang paling mempengaruhi penyebaran adalah intensitas. Bising yang keras dihantarkan lebih jauh daripada yang lemah. Bising berubah pada penjaran. Frekuensi tinggi diredam oleh jaringan, dan frekuensi rendah dihantarkan secara selektif. Oleh karena itu, perubahan-perubahan dalam penyebaran suatu bising perlu ditelusuri agar kita jangan beranggapan bahwa ada dua bising. Kalau ada bising sistolik, selalu *auskultasi* dasar leher dan dada lateral kiri. Bising pada stenosis aorta menyebar ke leher, sedangkan bising pada insufisiensi mitral menyebar ke dada lateral di bawah aksila.

Vibrasi auditoris bising mempunyai lima sifat : intensitas, konfigurasi, frekuensi, kualitas dan lamanya. Sifat-sifat ini, bersama-sama dengan lokasi, waktu dan penyebaran tiap bising, dianalisis dan direkam selama pemeriksaan pasien.

Intensitas suatu bising berkorelasi dengan kekerasan suaranya. Skala subyektif yang baku adalah 1-6. Bising derajat 1 adalah bising yang hampir-hampir tidak terdengar, sedangkan bising derajat 6 dapat didengar dengan stetoskop yang baru dilepaskan dari

dinding dada. Intensitas ini tidak mencerminkan beratnya lesi, meskipun bising derajat 6 kemungkinan besar lebih serius daripada bising derajat 1.

Konfigurasi atau bentuk suatu bising disebabkan oleh perubahan dalam intensitas. Bising dekresendo kehilangan intensitasnya sepanjang lamanya, sedangkan bising kresendo menjadi lebih keras. Bising kresendo - dekresendo atau berbentuk wajik mencapai intensitas puncak dan kemudian berkurang lagi. Intensitas bising tetap konstan pada bising plateau.

Frekuensi vibrasi menentukan tingginya nada bising tersebut. Bising bernada tinggi pada umumnya berhubungan dengan aliran berkecepatan tinggi yang disebabkan oleh perbedaan tekanan yang besar. Misalnya, bising pada insufisiensi aorta bernada tinggi karena darah mengalir dengan deras dari tekanan rata-rata aorta yang mungkin sebesar 100 mmHg ke dalam ventrikel kiri yang bertekanan 5 mmHg selama diastol. Sebaliknya, bising pada stenosis mitral bernada rendah karena atrium menghasilkan tekanan mungkin sebesar 20 mmHg dibandingkan dengan tekanan diastolik ventrikel kiri sebesar 5 mmHg.

Kualitas bising berkaitan dengan deskripsi tentang kemurnian nadanya. Bising yang bernada murni mempunyai kualitas seperti musik, sedangkan bising dengan banyak frekuensi dan nada-nada tambahan kelihatannya kasar. Dapat pula dipakai banyak istilah deskriptif lainnya.

Lama berkaitan dengan lamanya bising dalam satu fase siklus jantung. Bising yang lama menempati hampir seluruh salah satu fase. Bising kontinu adalah bising apa pun yang berlangsung sampai fase siklus jantung berikutnya. Bising midsistolik berlangsung

singkat. Ia dimulai setelah bunyi jantung pertama dan berakhir sebelum bunyi jantung kedua. Bising holosistolik dimulai dengan bunyi pertama dan terus berlangsung sampai bunyi jantung kedua. Lokasi bising adalah tempat di mana bising tersebut terdengar paling jelas.

Pemeriksaan Dasar


Inspeksi, palpasi dan *auskultasi* mencakup dua daerah - leher dan dada. Seringkali berguna untuk mengulangi semua bagian pemeriksaan dengan pasien duduk dan kemudian telentang. Penemuan-penemuan yang tidak kentara seringkali menjadi lebih jelas dengan memiringkan tubuh pasien ke depan dan ke kiri untuk membuat ventrikel ke atas pada dinding dada.

1. Inspeksi

Vena-vena leher. Mulailah dengan inspeksi vena-vena servikal. Periksalah tingkat distensi vena leher dan fluktuasi tekanan vena. Kolom darah didalam vena jugularis interna dan eksterna tidak terganggu oleh katup vena. Mereka berfungsi sebagai manometer tekanan atrium kanan. Makin tinggi kolom ini, makin besar tekanan di dalam atrium kanan. Puncak kolom ini dapat diperlihatkan pada setiap orang normal, meskipun untuk melakukannya anda mungkin harus membaringkan tubuh sebagian pasien sejajar dengan lantai. Fluktuasi tinggi darah di dalam vena ini memberikan ukuran tentang perubahan tekanan di dalam rongga atrium.

Aturlah posisi pasien anda pada meja atau tempat pemeriksaan yang dapat dimiringkan ke atas pada pinggangnya. Mulailah dengan punggung lurus dan ditinggikan kira-kira 30° dari garis horizontal. Sinarilah sisi kanan leher dengan membentuk sudut dengan


lampu senter anda. Tekanlah basis leher dengan jari tangan anda untuk mendistensikan dan mengamati vena jugularis. Kalau v. jugularis eksterna terdistensi, ia terlihat sebagaipembuluh yang berjalan sendirian di atas m. stemokleidomastoid. Sumbatlah alir balik vena dengan jari tangan anda di bagian atas. Kosongkan vena dengan mengurutnya dengan jari tangan anda danperhatikanlah apakah terjadi pengisian dari bawah. Perhatikan gambar berikut :



Gambar 6. 8. Inspeksi vena-vena leher. Ukurlah dari puncak kolom darah sampai angulus sternum dan tambahkanlah 5 cm untuk menentukan tekanan vena

Seringkali, v.jugularis eksterna tidak dapat dilihat dan anda harus tergantung pada sistemjugularis interna. Vena-vena ini tidak terlihat sebagai pembuluh-pembuluh yang berdiri sendiri, sebaliknya, gelombang tekanan terlihat sebagai penonjolan atau distensi lateral pada jaringan lunak di sekitarnya. Jika pasien mempunyai leher yang kurus, pulsasi karotis di bawahnya dapat dianggap sebagai pulsasi vena. Suatu tes yang sederhana dilakukan dengan menekan pangkal vena tepat di atas klavikula. Ini akan menghilangkan

denyut vena tetapi tidak menghilangkan denyut karotis. Ingatlah juga bahwa pulsasi vena tidak dapat diraba.



Gambar 6.9. Menentukan lokasi v. jugularis dengan tekanan

Jika pulsasi tidak terlihat pada pasien yang diletakkan dalam posisi 30° , turunkanlah sudut tersebut sampai pasien berbaring rata. Jika tekanan vena sangat rendah, seperti pada dehidrasi, pulsasi tersebut akan terlihat. Jika masih belum terlihat, mungkin karena tekanan vena sangat tinggi. Oleh karena itu, secara perlahan-lahan tinggikan tempat tidur kembali mulai dari 30° sampai 90° .

Perhatikan bahwa puncak kolom darah berfluktuasi selama siklus jantung. Tinggi maksimum yang dipertahankan adalah tekanan venanya. Ukurlah ini dengan suatu pertanda horizontal ke posisi di atas dada anterior dan turunkan tegak lurus ke tingkat atrium kanan (Gambar 6.8). (sebagian pemeriksa lebih

suka memakai angulus sternum dan kemudian menambah 5 cm). Tinggi garis tegak lurus ini merupakan tekanan vena yang diukur dalam cm darah. Bentuk pengukuran ini menghindari kedwiantian. Kalau anda memakai garis horizontal dan vertikal, sudut posisi pasien tidak penting. Pengukuran absolutnya akan selalu sama.

Sekarang setelah mengukur tekanan vena, perhatikanlah fluktuasi tekanan vena pernapasan. Pada inspirasi tekanan vena akan turun dan pada ekspirasi akan meningkat. Kalau pasien menarik napas, tekanan intrathoraks turun dan volume darah yang terdapat di dalam jaringan pembuluh pulmoner meningkat; oleh karena itu tekanan vena turun. Pada ekspirasi terjadi hal yang sebaliknya.

Sekarang inspeksilah prekordium. Perhatikanlah kesimetrisan dada. Penyakit jantung kongenital dengan pembesaran ventrikel dapat mengubah bentuk dada sehingga prekordium anterior kiri menonjol ke depan. Jika pasien mempunyai payudara pendulum, angkatlah payudara kiri untuk menginspeksi denyut apeks, yang merupakan pulsasi yang paling lateral. Lihatlah dada dari sudut tangensial. Jika apeks tidak dapat dilihat, mintalah pasien untuk sedikit menggulingkan tubuhnya ke kiri sehingga apeks bersentuhan dengan dinding dada kiri. Sistol ventrikel dimulai dengan pulsasi keluar yang diikuti dengan retraksi. Apeks biasanya terlihat pada sel iga keempat atau kelima kira-kira di garis midklavikula.

2. Palpasi

Denyut Arteri. Palpasilah denyut karotis untuk menilai ejeksi ventrikel kiri. Kontur dan volume pulsasi di dalam arteri karotis mencerminkan kejadian-kejadian

di dalam jantung dan ventrikel kiri. Pulsasi tersebut teredam dan diubah pada waktu mencapai pembuluh-pembuluh yang lebih lateral.

Pusatkan perhatian pada ciri-ciri tiap denyut nadi. Biasanya upstroke karotis terjadi kira-kira 0,04 detik setelah bunyi jantung pertama. Letakkanlah tiga jari pertama anda pada arteri karotis dan perhatikanlah bahwa intensitas pulsasi meningkat secara mantap dan turun secara tiba-tiba. Pada banyak orang normal, dapat dirasakan bahwa penurunan ini sedikit tertunda ketika katup aorta menutup (*takik dikrotik*). Ada dua bentuk kelainan. Pertama, laju implus mungkin menjadi lebih cepat atau lebih lambat; kedua, volumenya mungkin meningkat atau menurun.

Prekordium. Palpasi dilakukan dengan pasien duduk atau telentang. Mulailah dengan meletakkan telapak tangan anda dan jari-jarinya di daerah di mana terlihat denyut apeks pada waktu inspeksi. Biasanya, apeks teraba sebagai pulsasi yang berukuran kira-kira setengah mata uang dolar di tangan anda. Pembentukan denyut apeks rumit. Ventrikel kanan mempunyai aktivitas seperti puputan dan tidak benar-benar memegang peranan pada apa yang anda rasakan. Ventrikel kiri berotasi ke anterior dan ke kanan selama sistol, sehingga mendorong apeksnya ke luar pada dinding dada. Ini adalah apa yang anda rasakan. Denyut apeks teraba paling jelas pada satu atau dua sela iga. Catatlah posisinya dengan tepat, yaitu dalam sela iga ke berapadan jaraknya dari sternum, misalnya, "apeks teraba pada sela iga keempat, 8 cm dari garis midsternal"

Sekarang letakkan bantalan dua atau tigajari tangan di atas tempat denyut apeks dan perhatikanlah

ketukan dan tarikan yang cepat. Pada saat yang bersamaan, palpasilah a. karotis dan apeks untuk mengetahui waktu ejeksi, perbedaan waktu antara kedua impuls ini.


Anda mungkin harus memalpasi pasien gemuk yang memiringkan tubuhnya jauh ke depan atau dalam posisi dekubitus lateral kiri (berbaring pada sisi kiri tubuhnya). Jika anda tidak dapat meraba apeks, cobalah beberapa posisi. Periksalah prekordium kanan untuk mencapai dekstrokardia. Juga, palpasilah dengan cermat pada akhir ekspirasi paksa untuk menggerakkan paru-paru yang berisi udara dari antara jantung dan dinding dada. Tidak adanya denyut apeks selalu berarti penyakit. Meskipun demikian, ingatlah bahwa kalau anda menggulingkan tubuh pasien ke salah satu sisi apeks akan berpindah ke arah sisi yang lebih rendah sehingga lokasinya yang tepat mungkin tidak dapat ditentukan.

Dua macam perubahan ventrikel mengubah denyut apeks - hipertrofi dan dilatasi. Ventrikel kiri mengalami hipertrofi karena beban tekanan yang berlebihan dan berdilatasi karena beban volume yang berlebihan. Hipertensi dan stenosis aorta merupakan contoh beban tekanan berlebihan. Ventrikel yang mengalami hipertrofi memukul dada dengan kuat, tetapi dalam suatu daerah kecil pada posisi yang diharapkan. Ketukan atau angkatan ini, mudah diraba dan dilihat.

Dilatasi ventrikel pada insufisiensi aorta atau mitral membesar ke lateral dan apeks mungkin jauh dari garis midsternal. Daerah impuls menjadi sangat luas dan seluruh prekordium kiri mungkin menyembul/menggelombang (*heave*) di bawah tangan anda.

Apeks dan titik impuls maksimum biasanya sama. Pada pasien normal ini biasanya ditemukan di dekat garis midklavikula di dalam sela iga keempat kiri. Meskipun demikian, istilahnya tidak boleh dipertukarkan. Apkes merupakan pulsasi prekordium yang paling lateral, dan titik impuls maksimum (PMI) merupakan tempat di mana ditemukan impuls maksimum. Ia dapat ditemukan di mana saja.

Penyakit ventrikel kanan yang sudah lanjut menimbulkan perbedaan antara PMI dan denyut apeks. Hipertrofi bilik ini menimbulkan gerakan menggelombang prekordial yang teraba tepat di kiri sternum, sedangkan apeks tetap terlihat dan teraba di sebelah lateralnya (Gambar 6.10). Paru-paru yang mengalami hiperinflasi pada penyakit kronis paru-paru dapat juga memindahkan denyut apeks dan PMI sehingga teraba di bawah xifoid. Pada keadaan-keadaan ini ventrikel kanan teraba dengan memasukkan jari tangan ke atas xifoid dan menekannya ke dalam dan ke atas (Gambar 6.11).



Gambar 6. 10. (atas) Palpasi parasternal

Gambar 6. 11 (bawah) Palpasi subxifoid

Gambar 6.12. (atas) Palpasi takik suprasternal

Gambar 6. 13. (bawah) Palpasi daerah aorta

Sekarang, palpasilah sendi klavikulasternum dan takik suprasternal. Biasanya, hanya dapat dideteksi sedikit sekali pulsasi. Palpasi sela iga kedua kanan (daerah aorta) dan sela iga ke dua kiri (daerah pulmoner). Normal ditemukan daerah yang sunyi (Gambar 6. 12 dan 6. 13). Aktivitas yang terdeteksi memberikan petunjuk khusus tentang sifat penyakit jantung dan bilik atau katup yang terlibat. Palpasilah tiap sela iga parasternal, apeks dan ke dalam garis midaksila. Gerakkanlah jari tangan anda secara sistematis. Mulailah pada basis (sela iga ke dua), kemudian bergeraklah ke bawah pada tiap sela iga kanan. Lanjutkanlah palpasi sampai ke apeks dan ke garis midaksila. Kemudian palpasilah tiap sela iga kiri dan gerakkan tangan anda kembali ke basis jantung yang terletak di bawah sela iga ke dua.

3. Perkusi


Dibandingkan dengan inspeksi dan palpasi jantung, perkusi hanya sedikit bermanfaat. Perkusi menentukan batas-batas garis bentuk statis tetapi tidak memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa dinamis. Foto thoraks untuk sebagian besar telah menggantikan teknik ini. Meskipun demikian, perkusi murah dan mudah dibawa (Gambar 6. 14).

Mulailah pada tiap sela iga jauh ke lateral ke arah aksila. Perkusilah ke arah sternum. Tandailah tempat di mana nada perkusi berubah dari resonan ke pekak (pekak relatif). Biasanya ini terjadi kira-kira 2 cm dari sternum di dalam sela iga ketiga pada sisi kanan dan kira-kira 4 cm pada sisi kiri. Batasnya terdeteksi kira-kira 8 cm ke lateral di ruang sela iga kelima kiri. Gerakkanlah jari anda dari titik ini ke sternum, pekak menjadi makin

bertambah kira-kira 4 cm dari sternum, daerah pekak jantung absolut. Ini adalah tempat di mana jantung berhubungan langsung dengan dinding anterior dada. Daerah pekak absolute membesar secara tidak proporsional kalau efusi perkardium mendorong batas anterior jantung ke dinding dada.



Gambar 6.14. Perkusi batas-batas jantung nada-nada yang ditemukan




Gambar 6.15. Garis bentuk pada perkusi dan pada dada normal

4. *Auskultasi*

Pada pemeriksaan ini dibutuhkan suasana yang santai antara pemeriksa dan pasien, ruangan yang sunyi dan stetoskop yang baik.

Dengan hati-hati, letakkan jari tangan anda pada karotis. (Gambar 6.16). Pakailah *upstroke* untuk menentukan permulaan sistol dan bunyi jantung pertama yang berkaitan (S1). Identifikasi dan dengarkanlah bunyi jantung pertama, kemudian dengarkanlah bunyi jantung kedua. Selanjutnya dengarkanlah interval di antara bunyi jantung pertama

dan kedua (bunyi sistolik). Akhirnya, dengarkanlah interval di antara bunyi jantung kedua dan pertama. Tentukanlah waktu bunyi-bunyi tersebut dengan *upstroke* karotis dan dengarkanlah komponen siklus jantung.



Gambar. 6. 16. *Auskultasi* jantung

*Auskultasi*lah seluruh prekordium. Empat daerah penting mencerminkan bunyi dari empat katup (Gambar 6. 6). Dada lateral (garis aksila anterior di sela iga keempat dan kelima) dan karotis di daerah leher juga perlu diauskultasi, jika ada bising sistolik.

Manuver tertentu dapat mengubah bunyi jantung. Bunyi apeks dapat menjadi lebih jelas dengan menggulingkan tubuh pasien ke dalam posisi dekubitus lateral kiri. Bunyi-bunyi dari basis daerah aorta dan pulmoner terdengar lebih jelas kalau pasien memiringkan tubuhnya ke depan atau berdiri di atas keempat anggota tubuhnya. Pada akhir ekspirasi, jantung lebih dekat dengan dinding dada dan suara-suara yang sebelumnya tidak terdengar dapat muncul. Dengan inspirasi dalam, sirkulasi pulmoner memerlukan

lebih banyak darah dan ventrikel kanan mengejeksikan lebih banyak darah. Untuk itu, diperlukan waktu yang relatif lebih lama. Sebaliknya, dengan tindakan valsava (ekspirasi paksa dengan glottis tertutup), menghambat pengisian ventrikel kanan. Ventrikel tersebut mengejeksikan volume yang lebih kecil dengan lebih cepat. Tindakan-tindakan ini, akan membedakan bunyi-bunyi yang berasal dari sisi kanan jantung dengan sisi kiri jantung.

BAB VII

PEMERIKSAAN FISIK ABDOMEN

A. Anatomi Fisiologi Abdomen


Pada rongga abdomen terdapat organ-organ viscera yang memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan dan sistem perkemihan. Organ-organ penting yang dimaksud adalah hati, lambung, usus, limpa dan ginjal. Berikut ini akan diuraikan satu persatu mengenai anatomi, fisiologi dan pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan pada organ tersebut.

1. Anatomi dan fisiologi hati

Hati merupakan kelenjar terbesar pada tubuh manusia. Berwarna kemerahan, konsistensinya lunak dengan berat sekitar 1,5 kg. Hati terletak di cavum abdomen pada regio hipokondrium dextra, epigastrium dan dapat mencapai hipokondrium sinistra. Hati merupakan organ intraperitoneal yang hampir seluruh bagian nya ditutupi oleh peritoneum visceralis, kecuali pada bagian area nuda, porta hepatis, fossa vesica fellea dan sulcus vena cava.

Hati terletak di bawah diafragma dan dilindungi oleh iga-iga bawah. Kubah diafragma dimulai kira-kira pada sela iga keenam pada garis midklavikularis. Tepi bawah hati dengan lebar normal 8-12 cm dapat dipalpasi

pada sebagian orang normal yang melakukan inspirasi dalam. Kandung empedu dan porta hepaticus terletak di bawah hipokondrium kanan.



Gambar 7.1. Anatomi Hati


Pembagian lobus hati secara anatomis, membagi hati menjadi lobus hepatis dextra dan lobus hepatis sinistra yang dibatasi oleh fissura sagitalis sinistra. Sehingga lobus caudatus dan lobus quadratus menjadi milik bagian lobus hepatis dextra. Sedangkan pembagian hepar secara fisiologis, hepar dibagi menjadi lobus hepatis dextra dan lobus hepatis sinistra yang dibatasi oleh fossa sagitalis dextra. Pembagian ini didasarkan pada pembagian vaskularisasi, innervasi, aliran limfe dan distribusi duktus hepatis nya. Sehingga secara fisiologis, lobus quadratus dan lobus caudatus menjadi bagian lobus hepatis sinistra.

Fungsi hati

- Pembentukan dan ekskresi empedu : untuk absorpsi lemak dan vitamin larut lemak, metabolisme bilirubin (pigmen empedu).
- Metabolisme karbohidrat : glikogenesis, glikogenolisis, glukoneogenesis.
- Mempertahankan kadar glukosa darah normal, menyediakan energi untuk tubuh sehingga glukosa berlebih dapat disimpan di hepar.
- Metabolisme protein : sintesis albumin dan globulin, deaminasi as. Amino, pembentukan urea dari amonia.
- Metabolisme lemak: ketogenesis, sintesis kolesterol, penimbunan lemak.
- Penimbunan vitamin dan mineral : vitamin larut lemak (A, D, E, K) dan vit B12, Cu, Fe. Pembentukan faktor koagulasi darah : I, II, V, VII, IX, X, dependent vit K. Metabolisme steroid : inaktif dan sekresi hormon aldosteron, glukokortikoid, estrogen, testosteron, rogesteron.
- Detoksifikasi.
Gudang darah dan filtrasi : sinusoid merupakan depot darah, sel kuppfer berfungsi membuang bakteri dan debris pada darah.

2. Anatomi dan Fisiologi Lambung

Lambung sering disebut juga gaster merupakan organ berongga berbentuk seperti huruf J, di dalamnya memiliki rugae. Gaster merupakan salah satu organ pencernaan yang menghubungkan esophagus dengan duodenum. Gaster terletak pada cavum abdomen pada regio hipokondrium/hipokondriaka sinistra. Gaster juga merupakan salah satu organ intraperitoneal.



Gambar 7.2. Anatomi Lambung

Gaster memiliki 2 lubang yaitu ostium cardiacum yang menghubungkan esofagus dengan gaster dan ostium pyloricum yang menghubungkan gaster dengan duodenum pars superior. Masing-masing lubang ini berfungsi sebagai sphincter yang berfungsi untuk mengatur pengeluaran isi gaster. Ostium cardiacum berfungsi sebagai sphincter fisiologis, yang berarti secara anatomis (kasat mata) tidak nampak adanya sebuah sphincter, namun pada ostium cardiacum berfungsi sebagai sphincter yang berfungsi untuk mencegah adanya refluks isi gaster kembali ke dalam esofagus. Sedangkan pada ostium pyloricum merupakan sphincter anatomis dari gaster yang berfungsi untuk mengatur pengeluaran isi gaster ke duodenum.

Gaster berfungsi untuk menyimpan makanan, mencampur makanan dengan getah lambung untuk merubah bolus menjadikimus dan mengatur kecepatan pengiriman kimus ke duodenum. HCl dalam gaster yang dihasilkan oleh sel chief berfungsi untuk membunuh kuman dan menurunkan pH makanan menjadi asam,


selain itu juga berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsinogen yang dihasilkan oleh sel parietal yang masih dalam bentuk zymogen menjadi pepsin. Pepsin itu sendiri berfungsi untuk mengubah protein menjadi proteosa, polipeptida dan pepton. Pada gaster juga dihasilkan enzim pencernaan berupa enzim lipase yang berfungsi untuk memecah Triasilgliserol (TAG) menjadi Diasilgliserol (DAG). Selain itu, pada bayi terdapat yang namanya enzim renin yang berfungsi untuk menggumpalkan protein susu.

3. Anatomi dan Fisiologi Limpa

Limpa merupakan organ RES (*Reticuloendothelial system*) yang terletak di cavum abdomen pada regio hipokondrium/ hipokondriaka sinistra. Limpa terletak sepanjang costa IX, X, dan XI sinistra dan ekstremitas inferiornya berjalan ke depan sampai sejauh linea aksillaris media. Limpa juga merupakan organ intra peritoneal.

Limpa memiliki 2 facies, facies diafragmatica yang berbentuk konveks dan facies visceralis yang berbentuk lebih datar. Facies diafragmatica limpa berhadapan dengan diafragma dan costa IX- XI sinistra. Sedangkan facies visceralis nya memiliki 3 facies, yaitu facies renalis yang berhadapan dengan ren sinistra, facies gastrik yang berhadapan dengan gaster dan facies colica yang berhadapan dengan fleksura coli sinistra. Ketiga facies tersebut bertemu pada hilus lienalis, dimana hilus lienalis merupakan tempat keluar dan masuknya dari vasa. N. lienalis. Pada hilus lienalis, juga merupakan tempat menggantungnya cauda pankreas. Limpa memiliki 2 margo yaitu margo anterior dan margo posterior. Selain itu, limpa juga memiliki 2

ekstremitas yaitu ekstremitas superior dan ekstremitas inferior.



Gambar 7.3. Anatomi Limpa


Fungsi Limpa :

- Organ limfoid terbesar.
- Tempat pembentukan sel darah saat foetus.
- Tempat perombakan Hb.

4. Anatomi dan fisiologi Usus

Usus manusia terdiri dari usus halus dan usus besar. Pada bagian ini akan diuraikan tentang usus halus sedang usus besar akan dibahas tersendiri pada bab pemeriksaan rektosigmoid.

Usus halus terbagi menjadi tiga bagian yaitu *duodenum*, *jejenum* dan *ileum*. Pada manusia dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2-8 meter. *Duodenum* merupakan tempat pencernaan makanan secara sempurna menjadi partikel-partikel sari makanan yang siap diserap oleh mukosa usus. *Jejunum* dan *Ileum* merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan.



Gambar 7. 4. Bagian-bagian usus halus

a. Duodenum

Disebut juga usus dua belas jari, merupakan bagian dari usus halus yang terpendek, terletak setelah lambung dan bersambung dengan *jejunum*. Pada mukosa *duodenum* terdapat kelenjar *Brunneri* yang berperan menghasilkan lendir. Pada *duodenum* terdapat muara dari saluran empedu (*ductus biliaris communis*) dan saluran pancreas (*ductus pankreatikus*).

Permukaan *duodenum* membentuk lipatan-lipatan yang disebut jonjot usus, diantara lipatan tersebut terdapat sel-sel *Kripta Lieberkulin* yang berperan menghasilkan enzim enterokinase. Enterokinase berperan mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin.

Sel sekretori mukosa usus halus mengsekresikan cairan yang mengandung enzim pencernaan yaitu disakarida yang berperan dalam hidrolisis disakarida menjadi monosakarida, peptidase yang berperan dalam hidrolisis polipeptida dan dipeptida menjadi asam amino serta lipase usus, berperan menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol.

Pada mukosa usus halus ini juga banyak ditemukan kelenjar limfe (nodus limfatikus) untuk pertahanan tubuh yang disebut *Peyer's patches*.

b. *Jejunum*

Adalah bagian kedua dari usus halus yang terletak di antara *duodenum* dan *ileum*. Pada manusia dewasa, panjang *jejunum* kurang lebih sekitar 1-2 meter. Permukaan dalam *jejunum* berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus yang memperluas permukaan usus untuk membantu penyerapan sari-sari makanan.

c. *Ileum*

Ileum adalah bagian terakhir dari usus halus. Pada manusia dewasa, panjangnya sekitar 2-4 meter. *Ileum* memiliki keasaman (pH) antara 7 dan 8 (netral atau sedikit basa) dan berfungsi menyerap vitamin B₁₂ dan garam-garam empedu. *Jejunum* dan *ileum* merupakan tempat absorpsi zat-zat makanan.

5. Anatomi dan Fisiologi Ginjal

Ginjal merupakan organ penyaring darah sehingga zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun dan tak berguna dapat dikeluarkan dari dalam tubuh melalui urine. Zat-zat tersebut harus dikeluarkan karena dapat mengganggu kesehatan. Selain itu, ginjal juga berperan menjaga keseimbangan air dan tekanan osmotik cairan tubuh sehingga perannya sangat penting dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap seimbang dan dinamis (homeostasis).

Ginjal ada dua buah, terletak di sebelah kiri dan kanan kolumna vertebralis. Berbentuk seperti kacang merah dengan ukuran panjang 11 cm, lebar 6 cm dan


tebal 3 cm. Ukuran berat kira-kira 135-150 gram, berwarna agak kecoklat-coklatan.

Secara makroskopik, ginjal dibagi menjadi saluran sekretoris pada bagian dalam (medial) dan parenkim ginjal pada bagian luar mengelilingi saluran sekretoris. Saluran sekretoris terdiri dari calyces mayor, calyces minor, pelvis renalis dan ureter, sedangkan parenkim ginjal terdiri dari korteks dan medulla.

Unit struktural dan fungsional dasar ginjal dalam pembentukan urine adalah nefron. Setiap satu buah ginjal manusia dewasa normal memiliki 1-4 juta unit nefron. Setiap satu nefron terdiri dari glomerulus, tubulus proksimalis, loop of henle dan tubulus distalis.

Proses pembentukan urine terdiri dari tiga proses utama, yaitu :

- Filtrasi glomerulus : Proses penyaringan plasma dari kapiler glomerulus ke dalam kapsula bowman.
- Reabsorpsi tubulus : Perpindahan zat dari lumen tubulus menuju plasma kapiler peritubulus.
- Sekresi tubulus : Perpindahan zat dari plasma kapiler menuju lumen tubulus.




Gambar 7. 5. Struktur makroskopis dan mikroskopis ginjal

B. Pemeriksaan Fisik Abdomen

Gejala-Gejala abdomen yang menyebabkan pasien datang ke dokter adalah nyeri, gangguan fungsi, perdarahan gastrointestinalis, gejala sistemik, tanda-tanda dekompensasi organ, obstruksi organ berongga dan iritasi peritoneum. Jika kita dapat memahami tanda dan gejala mekanisme dasar, maka kita dapat menafsirkan keluhan dan penemuan pada kelainan abdomen. Pemeriksaan fisik abdomen relatif mudah untuk dipahami.

Untuk memudahkan pemahaman pada pemeriksaan, perhatikan proyeksi organ-organ abdomen pada dinding abdomen dapat dilihat pada gambar 7. 6.



Gambar 7. 6. Proyeksi organ di dinding abdomen

1. Inspeksi

Saat melakukan inspeksi, pakaian pasien harus dibuka dari puting susu sampai simfisis dengan pencahayaan yang memadai untuk melakukan inspeksi. Periksa kesimetrisan abdomen. Perhatikan lokasi penemuan-penemuan berikut ini, apakah tersebar luas atau setempat, distensi, massa dan kelainan kulit atau pembuluh darah. Mintalah pasien untuk berbatuk atau mengangkat kepalanya untuk mendapatkan informasi tambahan tentang sifat kelainan tersebut dengan

menegangkan abdomen. Hernia menonjol kalau abdomen ditegangkan.

Distensi harus dibedakan dari lemak. Tentukanlah apakah pembengkakan tersebut meliputi seluruh abdomen atau setempat saja. Jika setempat, perhatikanlah daerah anatomiknya. Jika ditemukan di daerah suprapubis, mungkin disebabkan oleh distensi kandung kemih atau pembesaran uterus. Di daerah iliaka, ovarium, sekum atau sigmoid mungkin abnormal. Ginjal, limpa, atau hati mungkin menyebabkan distensi pinggang sedangkan aorta, lambung atau pankreas dapat menimbulkan pembengkakan epigastrium. Kelainan hati dan limpa dapat menimbulkan pembengkakan di daerah hipokondrium.

Scaphoid abdomen adalah abdomen di mana konturnya menyerupai lunas perahu yang turun secara tiba-tiba dari prosesus xifoideus. Keadaan ini disebabkan oleh emiasiasi dan di sini pulsasi aorta abdominal terlihat sangat menonjol.

Kulit abdomen perlu diperhatikan secara khusus. Ia merupakan tempat kelainan-kelainan yang khusus. Perdarahan abdominal, pelvis atau retroperitoneal dapat bermanifestasi sebagai ekimosis setempat di daerah pinggang atau di sekitar umbilicus. Stria karena baru saja mengalami perubahan berat badan dan stria berpigmen pada sindrom Cushing terlihat dengan jelas pada dinding abdomen. Linea nigra, garis hiperpigmentasi yang berjalan dari umbilikus sampai simfisis, menunjukkan bahwa wanita tersebut pernah hamil. Distensi vena terjadi pada obstruksi vena profunda, terutama sumbatan pada vena kava inferior. Vena abdomen mengalami distensi untuk memberikan aliran kolateral di sekitar tempat obstruksi.

Caput medusae adalah lingkaran vena-vena yang berdilatasi yang menyebar dari umbilikus dan merupakan aliran kolateral vena pada sirosis dan hipertensi portal. Kadang-kadang, pada keadaan ini darah akan mengalir ke arah bawah untuk memintasi obstruksi pada vena kava superior.

Jaringan parut bekas operasi memberikan petunjuk tentang kelainan abdomen. Periksa apakah pasien anda mempunyai jaringan parut dan tanyakanlah riwayat penyakit yang berkaitan. Hernia kadang-kadang dapat didiagnosis dengan inspeksi saja. Diastasis recti adalah suatu tonjolan di garis tengah yang dapat diperlihatkan dengan meminta pasien mengangkat kepalanya. Kelainan ini sering ditemukan dan menunjukkan kelemahan dan terpisahnya muskulus rektus. Gelombang peristaltik kadang-kadang dapat dilihat pada pasien normal dengan abdomen yang tipis. Adanya gelombang peristalsis ini menyarankan terjadinya obstruksi mekanis pada pasien lain. Otot-otot abdomen mungkin jelas terpa pada penyakit paru-paru yang berat.

2. Palpasi


Informasi yang diperoleh dengan palpasi berbeda-beda tergantung pada perhatian dan ketelitian yang dicurahkan. Periksa abdomen dengan hati-hati, lemah lembut dan tidak tergesa-gesa. Palpasi yang dilakukan dengan tergesa-gesa, tangan yang dingin atau pemeriksaan yang dilakukan secara sepintas lalu tidak akan berhasil.

Jika ada alasan untuk mencurigai kelainan atau nyeri di suatu daerah, palpasilah daerah tersebut pada saat terakhir. Dengan memakai bantalan jari-jari dan tangan yang sejajar dengan abdomen, mula-mula

palpasilah tiap sector secara perlahan-lahan dan dengan lemah lembut. Seorang pasien yang tegang dapat menjadi lebih santai jika sendi panggul dan sendi lututnya difleksikan dan hanya tumitnya yang berada pada meja pemeriksa. Pada tiap daerah pemeriksaan, secara perlahan-lahan tingkatkanlah tekanan tangan yang memeriksa sampai anda puas dengan hasilnya. Jika anda menganggap perlu memeriksa lebih dalam lagi, letakkan tangan lainnya pada tangan yang melakukan palpasi untuk menambah tekanan. Untuk membantu mencapai bagian dalam abdomen, mintalah pasien untuk bernapas perlahan-lahan dan dalam. Pada tiap ekspirasi, abdomen turun dan posisi ini dipertahankan sampai ekspirasi berikutnya, dimana tangan dimasukkan lebih dalam lagi.

Pemeriksa yang telah berpengalaman akan mengalihkan perhatian pasien selama pemeriksaan dengan membicarakan hal-hal ringan. Perhatikan wajah pasien untuk melihat tanda-tanda perasaan tidak enak selama palpasi.

Palpasi bimanual yang sebenarnya bermanfaat untuk mengetahui garis bentuk organ, struktur vaskuler, atau massa dengan memalpasi kedua sisi berlawanan struktur tersebut. Ini dilakukan dari depan ke belakang melalui pinggang atau dengan menekan kedua sisi struktur tersebut di bagian anterior. (Gambar 7.7).




Gambar. 7.7. Palpasi ginjal, perhatikan kedua tangan melakukan Tekanan dalam

Gambar 7.8. Posisi tangan dan jari-jari untuk memeriksa balotemen

Balotemen bermanfaat terutama kalau abdomen tersebut besar atau penuh dengan cairan. Cara ini dapat memperlihatkan adanya massa atau pembesaran organ yang tidak dapat diketahui dengan palpasi biasa. Ujung jari tangan ditekan dengan gerak menusuk yang cepat ke dalam abdomen, yang untuk sementara memindahkan cairan yang berada di atasnya. (Gambar 7.8).

Palpasi abdomen yang menggelembung membantu dalam membedakan dilatasi usus, cairan, dan lemak. Diantara ketiga keadaan ini, hanya cairan yang akan menghantarkan gelombang tekanan. Mintalah asisten atau teman anda untuk menekan garis tengah dengan pinggir tangannya. Letakkan salah satu tangan anda di pinggang dan ketuklah pinggang yang berlawanan dengan ujung jari tangan anda. Jika ada cairan bebas, tangan yang melakukan palpasi akan merasakan adanya benturan gelombang cairan.




Gambar 7.9. Pemeriksaan adanya gelombang cairan.

Nyeri tekan pantulan adalah suatu tanda penting untuk adanya iritasi peritoneum. Tangan yang melakukan palpasi secara perlahan-lahan dan lemah lembut ditekan dalam-dalam ke dalam abdomen dan kemudian secara tiba-tiba dilepaskan. Ketika peritoneum kembali ke posisi semula, pasien dapat menggerenyit atau berteriak. Jika demikian, tanyakanlah dengan segera tempat iritasi maksimum. Kadang-kadang letaknya jauh sekali dari jari-jari anda yang melakukan palpasi. Penarikan umbilikus kadang-kadang dapat dipakai untuk memperlihatkan peradangan peritoneum (Gambar 7. 10).

Gelombang peristaltik dapat teraba di mana saja dalam abdomen dan biasanya menunjukkan obstruksi mekanis, baik parsial maupun hampir lengkap.

Pada palpasi yang dilakukan di daerah hipokondrium kanan mungkin ditemukan pembesaran hati atau kandung empedu. Tetapi hati mungkin dapat diraba pada orang normal. Kalau teraba, lebarnya harus ditentukan dengan perkusi. Pada palpasi hati, letakkan tangan kiri anda pada iga kanan bawah dan arahkanlah jari-jari tangan kanan anda ke arah bawah kanan dan lakukanlah penekanan. Mintalah pasien untuk menarik napas dalam. Tepi hati akan terasa menyentuh ujung jari

tangan anda ketika ia turun pada waktu inspirasi. Secara progresif, lakukanlah palpasi lebih rendah sampai anda mencapai krista iliaka. Hati yang sangat membesar lebih sering tidak ditemukan ketimbang hati yang sedikit membesar. (Gambar 7. 11).



Gambar 7. 10. Penarikan umbilicus untuk memperlihatkan adanya peradangan peritoneum


Gambar 7. 11. Palpasi hati

Sebagai teknik alternatif, anda dapat meletakkan tumit tangan kiri anda pada margo kosta dan melengkungkan jari tangan anda di atas tepi hati ketika pasien sedang menarik nafas. Pembesaran lobus kiri hati dapat melintasi garis tengah dan sampai ke hipokondrium kiri. Kalau hati teraba, perhatikanlah apakah tepinya tidak nyeri, nyeri tekan, tajam atau tumpul. Yang terakhir ini merupakan tanda pembengkakan yang merata.

Kalau timbul kecurigaan bahwa pasien menderita penyakit akut pada kandung empedu, nyeri tekan pada kuadran kanan atas dapat memberikan petunjuk yang bermanfaat. Tanda Murphy diperoleh

dengan meletakkan tangan kiri pada iga kanan pasien dan menyangkutkan ibu jari anda di atas margo kosta. (Gambar 7. 12). Mintalah pasien untuk menarik napas dengan dalam ketika anda berusaha menjepit kandung empedu yang sedang meradang di antara ibu jari anda dan margo kosta. Pasien akan tersendat-sendat ketika ia menarik napas dalam dan ia akan mengalami nyeri kalau anda memalpasi kandung empedu tersebut. Demikian pula, nyeri tekan dapat diperlihatkan dengan palpasi dalam secara langsung dengan jari tangan anda ketika pasien sedang menarik napas dalam. Anda dapat menggetarkan hati dengan melakukan perkusi dengan telapak tangan anda pada iga dan memperlihatkan nyeri tekan di daerah hati tersebut.

Palpasi dalam pada epigastrium biasanya menimbulkan nyeri tekan pada pasien normal. Lobus kiri hati dapat membesar dan mencapai daerah ini dan ditemukan sebagai suatu massa yang teraba pada palpasi. Pankreas bersilangan dengan tulang belakang di daerah ini dan lambung terletak di antaranya dan jari-jari yang melakukan palpasi.



Gambar.7.12. Tanda Murphy

Gambar 7.13.Palpasi limpa

Gambar 7.14. Palpasi limpa

Hipokondrium kiri mengandung fundus lambung, limpa dan ginjal kiri. Pembesaran limpa paling tidak dideteksi dengan palpasi yang dilakukan dengan cara yang sama seperti palpasi hati. Sokonglah margo kosta dengan tangan kiri anda dan masukkanlah secara perlahan-lahan jari-jari tangan kanan anda ke dalam daerah subkosta ketika pasien menarik napas secara perlahan-lahan dan dalam-dalam. (Gambar 7. 13). Jika anda merasa tidak pasti tentang pembesaran limpa, gulingkanlah tubuh pasien ke arah anda sehingga berada dalam posisi dekubitus lateral kanan untuk mendorong organ tersebut lebih ke arah superior dan anterior. (Gambar 7. 14). Mungkin sangat sulit untuk membedakan limpa yang besar dengan ginjal yang besar.

Yang terakhir ini biasanya akan turun menjauhi jari-jari tangan anda ketika anda berusaha mendekati margo kosta. Juga, ginjal tidak bergerak pada waktu inspirasi. Pinggang mengandung ginjal. Pada palpasi bimanual, satu tangan terletak di belakang dan satu lagi di depan, sering kali anda dapat meraba ginjal kanan pada orang kurus dan, kadang-kadang, kutub bawah ginjal kiri. Daerah umbilikus perlu mendapat perhatian khusus. Umbilikus lazim menjadi tempat hernia. Tekankanlah jari tangan anda ke dalam pusat. Pada hernia, anda akan meraba suatu cincin fasia yang berbatas tegas di sekitar suatu depresi lunak di bagian tengah. Keganasan intraabdomen dapat menjalar ke daerah ini sebagai '*sister Mary Joseph node*'. Aorta abdominal terletak di bawah dan sedikit di atas dan di sebelah kiri umbilicus.

Palpasi secara bimanual pada kedua sisi aorta untuk mengetahui diameter lateralnya. Palpasi lateral

merupakan tanda bahwa anda memang memegang kedua sisi pembuluh darah ini dan tidak di atasnya. Pada orang yang berusia lanjut, ektasia mungkin sulit dibedakan dari aneurisma sejati. Tepat di bawah umbilikus, aorta bercabang di atas promontorium sakrum. Lordosis yang menonjol dan abdomen yang tipis dapat membuat promontorium ini jelas kelihatan. Daerah iliaka kanan mengandung titik Mc Burney-daerah dengan nyeri tekan maksimum pada apendisitis. Kira-kira di pertengahan antara umbilicus dengan spina iliaka anterior superior. Di daerah iliaka kanan sering ditemukan dilatasi sekum. Ia akan teraba seperti massa berbentuk sosis lunak dan mungkin nyeri tekan kalau diguling-gulingkan di antara ujung-ujung jari tangan. Tepat di sebelah medialnya terdapat ovarium kanan, yang dapat dipalpasi kalau mengalami pembesaran patologik, meskipun untuk kepastiannya perlu dilakukan pemeriksaan pelvis. Demikian pula disebelah kiri, sigmoid atau ovarium kiri dapat ditemukan di daerah fossa iliaka kiri.

Hipogastrium mengandung kandung kemih dan uterus, yang kalau membesar dapat ditentukan garis bentuknya dengan palpasi.

3. Perkusi abdomen

Seperti di tempat-tempat lainnya, perkusi menggambarkan batas-batas statik antara jaringan-jaringan dengan kepadatan yang berbeda-beda. Tekniknya sama seperti pada perkusi thoraks. Jari pasif yang diletakkan dengan hati-hati di abdomen ditekuk oleh jari pleksor dengan ketukan stakato, dan bunyi serta resistensinya diperhatikan.

Jika tepi hati telah teraba di hipokondrium kanan, anda harus menentukan apakah ia benar-benar

membesar atau hanya terdorong ke bawah. Lakukanlah perkusi pada paru-paru anterior yang resonan dan bergeraklah ke bawah sampai pekak hati menunjukkan batas atas. Lebarnya berbeda-beda dari pasien ke pasien, tetapi ukuran yang melebihi 12 cm mungkin abnormal. Perkusi di daerah epigastrium dan hipokondrium kiri menimbulkan bunyi timpani karena adanya gelembung gas di dalam lambung.

Pekak limpa sering kali ditemukan di antara sela iga kesembilan dan kesebelas, di garis aksila anterior. Pembesaran limpa yang ringan bermanifestasi sebagai perubahan timpani menjadi pekak ketika sela iga terbawah diperkusi dan pasiennya menarik napas dalam (tanda perkusi limpa). Pembesaran limpa dan ginjal dapat lebih dibedakan dengan bantuan perkusi. Ingatlah bahwa fleksura lienika kolon bukan terletak di belakang limpa tetapi di depan ginjal. Seringkali terisi dengan udara, ada atau tidak adanya timpani, bersama-sama dengan massa yang dapat dipalpasi, memberikan petunjuk yang jelas. Adanya massatanpa timpani di kuadran kanan atas mengarah pada pembesaran limpa. Massadengan timpani menunjukkan pembesaran ginjal.


Timpani menunjukkan udara. Udaratersebut mungkin berada di dalam gelung usus yang mengalami distensi atau terdapat bebas di dalam abdomen. Bersama-sama dengan cara-cara lainnya, lokasi timpani ini dapat menentukan tempat obstruksi.

Perkusi memastikan dan memperjelas banyak penemuan pada palpasi. Nyeritekan pantulan dapat diperoleh dengan perkusi dan juga dengan palpasi. Pekak yang berpindah menunjukkan asites. Cairan bebas menyebabkan usus yang mengandung udara terapung-apung di bagian paling atas dan kenyataan ini

dimanfaatkan dengan perkusi. Pada pasien yang berbaring, mulailah perkusi di garis tengah dan bergeraklah ke kedua pinggang. Tandailah dengan pena anda tempat di mana resonansi berubah menjadi pekak. Gulingkanlah tubuh pasien ke salah satu sisi dan ulangilah prosedur itu pada sisi yang lebih rendah. Gulingkanlah tubuh pasien ke sisi lainnya dan ulangi. Jarak antara garis-garis yang dibuat ketika pasien telentang dan ketika tubuhnya digulingkan menunjukkan jumlah cairan karena permukaan cairan akan selalu rata.

Ada dua sumber kesalahan potensial. Kadang-kadang perpindahan usus yang relatif tidak mengandung udara akan memberikan hasil positif palsu dan cairan peritoneal yang terlokalisasi akan memberikan hasil negatif palsu. Contoh khas keadaan yang terakhir ini adalah kista ovarium. Kista ini dapat berukuran besar sekali dan terlihat sebagai distensi abdomen yang sangat menyolok. Meskipun demikian, cairannya terdapat di dalam suatu ruang tertentu. Pada keadaan ini dijumpai dua petunjuk: pertama, umbilikus tidak menonjol keluar; dan kedua, pekak cairan tetap terdapat di bagian anterior pada pasien yang berada dalam posisi berbaring dan usus yang resonan terdorong ke bawah dan lateral – tepat kebalikan asites bebas.

Pada kasus asites yang meragukan, berusaha lah menemukan *puddle sign* (tanda genangan). Suruhlah pasien untuk berdiri di atas keempat anggota tubuhnya. Sekarang cairan akan tergenang di umbilikus, di mana anda akan dapat menemukan daerah yang pekak. Lihat gambar 7.15.



Gambar. 7.15. *Puddle Sign* (Tanda genangan)
 Gambar 7. 16. Tes Garuk

4. *Auskultasi*

Banyak ahli diagnostik lebih suka melakukan *auskultasi* abdomen sebelum palpasi atau perkusi agar tidak merangsang timbulnya peristaltik. Seperti ditempat lainnya, *auskultasi* memberikan informasi tentang kejadian dinamik. Sumber suara abdomen mencakup peristaltik dan suara-suara dari struktur vaskuler atau membrana serosa.

Aktivitas peristaltik memancarkan berbagai macam suara berdeguk dan bergelembung ketika permukaan antara air dan udara berubah dengan adanya gelombang kontraksi. Perubahannya adalah dalam hal intensitas, frekuensi dan nadanya. Intensitasnya berkaitan dengan kekuatan peristaltik, frekuensi berkaitan dengan kecepatan gelombang dan nada berdeguk sampai letupan yang lembut per menit. Setelah makan, biasanya ditemukan suara yang nyaring, berdeguk, berderu, setiap beberapa detik. **Suara-suara vaskuler**

Seperti di tempat lain, menunjukkan aliran turbulendi dalam pembuluh darah yang berdilatasi, menyempit atau berkelok-kelok. Setiap arteri besar di dalam abdomen dapat menjadi sumber bising. Aorta palingbaik didengar tepat di atas pembuluh darah ini di epigastrium, arteri hepatica di hipokondrium kanan dan

arteri liena di hipokondrium kiri. Bising arterirenalis penting, karena pada pasien dengan hipertensi, etiologinya mungkin adalah stenosis arteri renalis. Dengan memakai stetoskop, tekanlah ke dalam abdomen sampai anda mendengar bunyi jantung. Dengarkanlah selama 1 menit penuh pada tiap sisi aorta sebelum anda berhenti. Bising ini terdengar di daerah umbilikus atau pinggang dan kadang-kadang di sudut kostovertebral di bagian posterior. Aorta bercabang menjadi arteri iliaka tepat di bawah umbilikus – suatu tempat di mana lazim terjadi pembentukan ateroma, aliran turbulen, dan oleh karena itu akan timbul bising.

Bising abdomen mungkin sulit dibedakan dengan desiran (*murmur*) jantung yang dihantarkan ke sana. Dengan cermat palpasilah apeks jantung atau arteri karotis sementara mendengarkan di atas abdomen. Desiran yang dihantarkan akan sinkron dengan impuls tersebut, sedangkan bising setempat akan timbul beberapa waktu kemudian.

Derum vena yang kontinu, lemah, bernada rendah, terdengar pada banyak orang normal dan agaknya berasal dari vena kava dan percabangannya. Vena umbilikal yang mengalami rekanulasi karena hipertensi portal juga akan menimbulkan bunyi deruman, seperti juga pada hemangioma intra abdomen yang berukuran besar.

Suatu manipulasi dengan stetoskop membantu menentukan batas statik. Tidak jarang anda menjumpai bahwa hati kelihatannya membesar, tetapi tidak dapat menentukan batas bawahnya. Letakkanlah bel stetoskop anda di atas hati tepat di bawah margo kosta dan garuklah dinding abdomen dengan kuku jari kelingking anda. Lakukanlah hal ini pada beberapa tempat yang

membentuk setengah lingkaran dan berjarak sama dari stetoskop tersebut. Ketika anda menggaruk di atas hati, bunyi tersebut akan terdengar sangat keras, tetapi segera setelah anda melewati tepi hati bunyi tersebut tiba-tiba berkurang – tes garuk (Gambar 7.16).

Selain untuk *auskultasi*, stetoskop dapat pula dipakai untuk palpasi. Pasien yang gelisah atau pura-pura sakit mengetahui bahwa alat ini dipakai untuk pemeriksaan *auskultasi*. Ia tidak menyangka bahwa anda dapat melakukan palpasi dengan stetoskop. Dengan hati-hati letakkanlah bel stetoskop dan dengan perlahan-lahan dan kontinu tekanlah ke dinding abdomen. Daerah yang sangat nyeri kalau ditekan dengan jari tangan anda mungkin akan mentolerir eksplorasi yang sangat dalam dengan cara ini.

Tabel 7. 1. Ringkasan Pemeriksaan Abdomen

<p><i>Inspeksi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Kesimetrisan. Distensi, massa. Vena dan umbilicus. Pulsasi dan peristalsis. 	<p><i>Auskultasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sebelum perkusi dan palpasi. Kalau perlu 1 menit pada tiap kuadran. Bunyi usus dan vaskuler.
<p><i>Perkusi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Ukuran hati dan limpa. Massa. Pemeriksaan pindahnya pekak kalau perlu. 	<p><i>Palpasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Tepi hati, ujung limpa, dan semua massa. Perhatikan nyeri tekan, nyeri pantulan atau <i>defense musculare</i>. Pemeriksaan untuk gelombang cairan kalau perlu.

BAB VIII

PEMERIKSAAN FISIK SISTEM MUSKULOSKELETAL

A. Anatomi Fisiologi Sistem Muskuloskeletal

Muskuloskeletal terdiri atas :

- Muskuler/otot : Otot, tendon, dan ligamen
- Skeletal/rangka : Tulang dan sendi

1. Muskuler/Otot

a. Otot

Sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit.

Fungsi sistem muskuler/otot:

- Pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh.
- Penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan

- tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi.
- Produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal.

Ciri-ciri sistem muskuler/otot:

- Kontraktilitas. Serabut otot berkontraksi dan menegang yang dapat atau tidak melibatkan pemendekkan otot.
- Eksitabilitas. Serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf.
- Ekstensibilitas. Serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks.
- Elastisitas. Serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang.

Jenis-jenis otot

1) Otot rangka, merupakan otot lurik, volunter, dan melekat pada rangka.

- Serabut otot sangat panjang sampai 30 cm berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron.
- Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer.
- Kontraksinya sangat cepat dan kuat.


2) Otot Polos merupakan otot tidak berlurik dan involunter. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah.

- Serabut otot berbentuk spindle dengan nukleus sentral.

- Serabut ini berukuran kecil berkisar antara 20 mikron (melapisi pembuluh darah) sampai 0,5 mm pada uterus wanita hamil.
- Kontraksinya kuat dan lamban.

3) Otot Jantung

- Merupakan otot lurik
- Disebut juga otot seran lintang involunter
- Otot ini hanya terdapat pada jantung
- Bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut.




Otot Rangka

Otot Polos Otot Jantung

Gambar 8.1. Jenis-jenis Otot

b. Tendon

Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat, bersifat fleksibel, terbuat dari fibrous protein (kolagen). Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot.




Gambar 8. 2. Tendon

c. Ligamen

Ligamen adalah pembalut/selubung yang sangat kuat, merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi.

Beberapa tipe ligamen :

- Ligamen Tipis
Ligamen pembungkus tulang dan kartilago. Merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya pergerakan.
- Ligamen jaringan elastik kuning.
Merupakan ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi, seperti pada tulang bahu dengan tulang lengan atas.



Gambar 8.3. Ligamen

2. Skeletal

a. Tulang/ Rangka

Skeletal disebut juga sistem rangka yang tersusun atas tulang-tulang. Tubuh kita memiliki 206 tulang yang membentuk rangka. Bagian terpenting adalah tulang belakang.

Fungsi Sistem Skeletal :

- 1) Memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis.
- 2) Membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang.
- 3) Melekat pada tulang
- 4) Berisi dan melindungi sum-sum tulang merah yang merupakan salah satu jaringan pembentuk darah.
- 5) Merupakan tempat penyimpanan bagimineral seperti calcium dari dalam darah.
- 6) Hemopoesis

Struktur Tulang

Tulang terdiri dari sel hidup yang tersebar diantara material tidak hidup (matriks). Matriks tersusun atas osteoblas (sel pembentuk tulang). Osteoblas membuat dan mensekresi protein kolagen dan garam mineral. Jika pembentukan tulang baru dibutuhkan, osteoblas baru akan dibentuk.

Jika tulang telah dibentuk, osteoblas akan berubah menjadi osteosit (sel tulang dewasa). Sel tulang yang telah mati akan dirusak oleh osteoklas (sel perusakan tulang).


b. Sendi

Persendian adalah hubungan antar dua tulang sedemikian rupa sehingga memudahkan terjadinya gerakan. Terdiri dari :

- 1) *Synarthrosis* (suture)

Hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan, strukturnya terdiri atas fibrosa. Contoh: Hubungan antara tulang di tengkorak.

- 2) *Amphiarthrosis*
 Hubungan antara dua tulang yang sedikit dapat digerakkan, strukturnya adalah kartilago. Contoh: Tulang belakang
- 3) *Diarthrosis*
 Hubungan antara dua tulang yang memungkinkan pergerakan yang terdiri dari struktur sinovial. Contoh: sendi peluru (tangan dengan bahu), sendi engsel (siku), sendi putar (kepala dan leher), dan sendi pelana (jempol/ibu jari).



Gambar 8.4. Sendi dan Tipe hubungan sendi

B. Pemeriksaan Fisik Sistem Muskuloskeletal

Tulang, sendi, dan otot ikut terserang pada banyak penyakit sistemik dan juga pada kelainan setempat. Biasanya, gangguan yang ditemukan di banyak tempat menunjukkan adanya penyakit sistemik. Tetapi, sebaliknya tidak selalu benar. Gejala-gejala dan

penemuan-penemuan setempat dapat merupakan manifestasi paling dini atau primer dari penyakit sistemik dan letaknya jauh. Tanyakanlah selalu gejala-gejala yang berkaitan dan lakukanlah pemeriksaan sistem-sistem tubuh dengan cermat.

Evaluasi tiap sendi mencakup pemeriksaan anatomis dan fungsional. Inspeksi dan palpasi memberikan banyak sekali informasi. Untuk dapat melakukan pemeriksaan secara efektif, pemeriksa harus dapat menentukan tempat bagian-bagian tulang yang penting, memvisualisasikan anatomi dan persendian yang normal dan mengingat rentang gerakan aktif dan pasif yang normal untuk tiap sendi. Selama evaluasi tiap sendi, pemeriksa mencari dan memperhatikan: nyeri tekan, pembengkakan yang disebabkan oleh cairan atau peradangan jaringan lunak, perubahan warna dan suhu kulit, perubahan anatomi tulang atau jaringan lunak, deformitas, kelemahan, dan perubahan rentang gerakan.

Pemeriksaan ini harus dilakukan secara teratur. Mula-mula lakukanlah pemeriksaan tangan, kemudian ke lengan, bergerak ke atas dan kemudian menuruni rangka tubuh, dan akhirnya pada kedua tungkai bawah.

Dengan hati-hati palpasilah anatomi dan rabalah komponen-komponen yang anda bayangkan ketika anda memeriksai setiap sendi. Untuk sendi yang diduga nyeri, mula-mula palpasilah secara ringan. Palpasilah dengan kekuatan secukupnya saja yang diperlukan untuk memeriksa bagian-bagian anatomis yang penting yang dapat dikenali pada sendi normal. Lakukanlah gerakan pasif pada tiap sendi, mula-mula dalam rentang gerakan parsial kemudian dalam rentang gerakan penuh. Pakailah teknik yang sama ini untuk tiap sendi.


Akhirnya, mintalah pasien untuk memperlihatkan rentang gerakan aktif untuk tiap sendi.

1. Pemeriksaan Tulang Belakang

Lakukanlah inspeksi dengan pasien berdiri. Perhatikanlah lengkungan keluar thoraks normal yang dimulai dari *vertebra prominens*. Ini diikuti dengan lengkungan lumbal ke dalam yang halus dan kemudian ayunan sakrum ke luar.

Kifosis adalah ponok (lengkungan keluar) abnormal vertebra thorakal. Lordosis adalah lengkungan ke dalam yang berlebihan pada vertebra lumbalis. Skoliosis adalah lengkungan tulang belakang ke lateral, yang paling jelas dilihat dengan melihat langsung ke punggung (Gambar 8.5).


Palpasilah tonjolan-tonjolan dan bagian-bagian tulang yang diperlihatkan pada gambar 8.5. Palpasilah prosesus spinosus untuk melihat adanya nyeri tekan. Kalau menemukan nyeri tekan, tentukanlah lokasi tiap vertebra dengan jari anda dan ketuklah jari anda dengan paluperkusi. Perkusi dapat menentukan vertebra yang terganggu. Pakailah tes menunjuk untuk mengkonfirmasi keluhan yang konsisten. Mintalah pasien anda untuk menunjukkan tempat yang tepat di mana rasa nyeri terasa paling hebat. Tandailah tempat tersebut dengan pena anda. Lanjutkanlah pemeriksaan anda untuk sementara waktu dan kemudian mintalah pasien untuk menunjukkankembali tempat yang paling nyeri.



Gambar 8. 5. Tulang belakang dan lekukannya


Palpasilah kelompok otot pada kedua sisi. Palpasilah spasme otot atau perbedaan tonus otot. Periksalah dengancermat adanya nodulus subkutan, lipoma, atau neuroma. Mintalah pasien anda untuk meletakkan satu kakinya pada bangku meja periksa. Palpasilah tuberositas iskiadikus, sulkus iskiadikus, dan trokanter mayor. Palpasilah dalam-dalam sulkus iskiadikus yang terletak di antaratuberositas iskiadikus dengan trokanter. Nyeri yang timbul padapalpasi sulkus iskiadikusmenunjukkaniritasi nervus iskiadikus.

Gerakkanlah sendi-sendi pasien dalam suatu rentang gerakan (Gambar 8.6).Untuk mengevaluasi rotasi, anda harusmenstabilkan pinggul dengan tangananda atau menyuruh pasien duduk dimeja. Mintalah pasien untuk duduk dimeja periksa untuk melengkapi evaluasianda. Periksalah refleks patela danachilles dan ekstensi ibu jarikaki, eversi, dan inversi kaki.



Gambar 8. 6. Rentang gerakan tulang belakang

Lima pemeriksaan memperjelas penyebab nyeri punggung (Tabel 8.1). Pertama, mintalah pasien untuk berbaring telentang dan melakukan tes mengangkat tungkai lurus-lurus. Dengan satu tangan di belakang pergelangan kaki dan lutut diekstensikan, angkatlah seluruh ekstremitas tersebut secara perlahan-lahan sampai pasien merasakan nyeri. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara pasif tanpa bantuan dari pasien. Catatlah sudut yang tepat di mana nyeri mulai timbul. Ulangilah tes ini sampai titik tepat sebelum timbulnya nyeri dan dorsifleksikanlah kaki. Ini menyebabkan traksi pada nervus iskiadikus. Adanya nyeri memastikan iritasi nervus iskiadikus (Gambar 8.7). Nyeri iskiadikus paling sering timbul pada elevasi 40-60°. Nyeri sakroiliaka jika ada, hanya timbul pada elevasi penuh.



Gambar 8.7. Tes untuk memastikan iritasi n. iskiadika

Tes kedua memperlihatkan gangguansendi sakroiliaka. Letakkanlah satu tangan di bahu pasien. Dengan tangan lainnya, doronglah lutut yang difleksikan kearah bahu kontralateral. Tindakan ini meregangkan sendi sakroiliaka dan akan memperberat nyeri yang disebabkan oleh sakroiliitis.

Tes ketiga membedakan nyeri yang berasal dari vertebra. Letakkanlah lutut pasien pada dadanya dalam posisi fetal. Secara individual fleksikanlah tiap lutut dan pinggul dengan mendorong lutut ke dinding dada. Tindakan ini meregangkan sendi lumbosakral dan nyeri timbul pada penyakit di daerah ini. Pasien yang menderita nyeri karena penyakit lumbosakral sering menolak untuk berbaring telentang. Mereka berusaha untuk menghilangkan lordosis lumbal dengan memfleksikan lutut dan pinggul. Tetapi mengangkat tungkai lurus-lurus tidak menimbulkan nyeri.

Untuk tes keempat, mintalah pasien anda untuk menyilangkan kedua lengannya di dada, dan mulai melakukan *sit up*. Kadang-kadang anda dapat menentukan segmen muskulus rektus yang lemah yang disebabkan oleh gangguansaraf karena kelainan di punggung. Akhirnya, gulingkanlah tubuh pasien anda sehingga ia berada dalam posisi bertiarap. Angkatlah tiap paha dari meja sehingga tungkainya mengalami hiperekstensi. Hiperekstensi tungkai dapat memperberat nyeri yang disebabkan herniasi diskus, sakroiliitis, dan *sprain* lumbosakral. Nyeri yang timbul dapat menentukan dengan cukup tepat letak daerah yang sakit. Kalau gejala-gejala penyakit mengarah ke sana, lengkapilah pemeriksaan anda dengan pemeriksaan rektum dan pelvis.

Tabel 8.1. Pemeriksaan Tulang Belakang


<i>Inspeksi</i>
Gaya berjalan
Kesimetrisan
Spasme otot
<i>Perkusi</i>
Nyeri tekan vertebra
<i>Palpasi</i>
Vertebra
Bagian-bagian tulang punggung bawah yang penting
Kelompok-kelompok otot paraspinosus
<i>Pemeriksaan fungsi</i>
Rentang gerakan
Mengangkat tungkai lurus-lurus
Posisi fetal
Menekan lutut ke arah bahu kontralateral Memulai sit up
Hiperekstensi tungkai dari posisi bertiarap Refleks, fungsi motorik dan sensorik

2. Pemeriksaan Pelvis

Karena pelvis merupakan sendi yang menyokong berat badan, berdiri dan berjalan merupakan pemeriksaan fungsi. Perhatikanlah gaya berjalannya ketika pasien memasuki kamar periksa. Kelainan gaya berjalan seringkali menunjukkan penyakit pinggul. Suatu pinggul yang terfiksasi memaksa pasien untuk melakukan sirkumduksi dengan mengangkat pelvis yang sakit ke atas dan tungkainya ke arah luar dan memutar di depan. Gaya berjalan *Trendelenburg* menyebabkan tubuh miring ke sisi dislokasi pinggul ko-

ngenital. Kalau kelainannya bilateral, gaya berjalan pasien merupakan gaya bokong penari yang berlebihan. Ini disebabkan oleh kelemahan relatif muskulus gluteus medius. Kelemahan otot ini sering disebabkan oleh pemendekan kaput femoral atau keadaan lain yang menyebabkan origo otot ini lebih mendekati insersinya.

Dengan pasien dalam posisi berdiri, inspeksiilah pelvis. Dalam posisi berdiri, pasien dengan artritis pinggul akan menyokong sebagian terbesar berat badannya pada sisi yang tidak sakit. Carilah fleksi ringan lutut sisi yang sakit. Gluteus maksimus sisi yang sakit mungkin mengalami atrofi. Hadapilah pasien dan carilah kemiringan pelvis (*pelvic tilt*). Ini paling baik dilihat dengan meletakkan ibu jari tangan anda pada spina iliaca anterior superior dan jari tengah anda pada trokanter mayor femur. Jika spina iliaca lebih tinggi pada satu sisi dan trokanter mayor juga lebih tinggi, kemungkinannya adalah tungkai yang berlawanan lebih pendek atau ia mengalami kontraktur fleksi yang menetap. Jika spina anterior lebih rendah tetapi trokanter sejajar dengan trokanter sisi yang berlawanan, berarti terjadi pemendekan kaput femoral. Dalam keadaan seperti ini gluteus medius sisi yang sakit akan lemah, lunak, dan mudah ditekan sampai cekung.




Krista liaka
 Tuberkulum iliaka
 Spina iliaka Anterior
 Tuberkulum
 Trokanter mayor

Gambar 8. 8. Anatomi Pelvis

Sekarang palpasilahkeempat daerahanatomi tulang dan jaringan lunak. Hadapilah wajah pasien, letakkanlah ibujari tangan anda pada spina iliaka anteriorsuperior dan palpasilah tuberkulum iliaka dan krista iliaka. Gerakkanlah tangananda ke bawah dan palpasilah trokantermayor dengan ibu jari anda pada tuberkulum pubis.Bursatrokanter biasanya tidak dapat dipalpasi. Jika meradang, akan timbul nyeri tekan dan daerah tersebut mungkin terasa seperti berlumpur. Di bagian posterior, palpasilah spina iliaka posterior superior, prosesus spinosus, dan sakrum. Spina iliaka superior posterior terletak di bawahlesung Venustepatdi atas bokong. Rabalah otot-otot dan jaringan lunak dan juga anatomi tulangnya. Atrofi, hipertrofi, spasme otot, dan nyeri tekan menceritakan riwayat fungsional.

Mintalah pasien untuk berbaring pada sisi tubuhnya dengan kaki yang terletak di atas difleksikan pada pinggul dan lutut. Palpasilah tuberositas ishium. Di sebelah lateral tuberositas ini, palpasilah daerah nervus iskiadikus yang berjalan di antara tuberositas ishium dan trokanter mayor. Palpasilah otot-otot dan jaringan lunak di daerah trigonum femoral, trokanter mayor, nervus iskiadikus, krista iliaka, dan punggung bawah.

Mintalah pasien untuk berbaring telentang. Periksalah fleksi dengan mengangkai tungkai lurus-lurus. Jika keketatan otot-otot hamstring menimbulkan perasaan tidak enak, mintalah pasien untuk memfleksikan lututnya dan menarik lutut tersebut ke dadanya. Pahanya harus terletak di atas perutnya. Penyakit pinggul paling sering menyebabkan terjadinya kontraktur fleksi. Pasien mengimbanginya dengan memperbesar lordosis lumbal untuk memiringkan pelvis ke depan, sehingga kaki dapat berdiri mendatar. Tanda *Thomas* memperlihatkan dengan mudah adanya kontraktur fleksi. Mintalah pasien untuk menarik lutut sisi yang tidak sakit ke dadanya. Ini mendatarkan lordosis lumbal. Tungkai yang sakit sekarang akan naik di atas meja. Derajat kenaikannya menunjukkan besarnya kontraktur fleksi yang ada (Gambar 8.9).



Gambar 8. 9. Tanda *Thomas*

Gambar 8.10. Tanda *Tredelenberg*

Mintalah pasien untuk berdiri di atas satu tungkainya untuk melakukan tes *Trendelenburg*. Muskulus gluteus medius pada sisi yang disokong akan berkontraksi dan mempertahankan tinggi pelvis. Cekungan di atas spina iliaca posterior superior dapat ditandai dengan penaanda. Kalau gluteus berkontraksi biasanya ia akan menaikkan pelvis sisi yang tidak



disokong dan cekungan tersebut akan naik. Ini adalah hasil tes *Trendelenburg* yang negatif atau normal. Jika *gluteus medius* pada sisi yang disokong lemah atau tidak berfungsi, pelvis akan cekung pada sisi yang tidak disokong tetap pada ketinggian yang sama atau malah turun (Gambar 8.10).

Sekarang periksa rentang gerak pelvis (Gambar 8.11). Dengan tungkai diluruskan ke bawah, abduksikanlah tungkai tersebut ke lateral sehingga membentuk sudut kira-kira 45° , kemudian lakukanlah aduksi dengan jarak yang sama, sehingga total membentuk busur derajat 90° . Pada aduksi normal, sepertiga tengah paha yang berlawanan dapat disilangkan. Fleksi penuh membawa lutut ke dada.


Rotasi merupakan gerakan yang hilang untuk pertama kalinya pada artritis pinggul. Alasannya adalah bahwa kaput femoral tidak bulat lagi sehingga sendi tersebut akan bersifat seperti sendi engsel, bukannya struktur sendi peluru lagi. Ekstensi dan fleksi mungkin masih tetap dapat dilakukan sampai penyakitnya sudah lanjut sekali. Periksalah rotasi dengan meletakkan satu tangan di atas dan satu tangan di bawah lutut. Putarlah ekstremitas tersebut sehingga patelamula-mula menunjuk ke arah medial pada rotasi interna, kemudian ke lateral pada rotasi eksterna. Dalam keadaan normal rotasi interna adalah 35° dan rotasi eksterna 45° . Sebagai alternatif, fleksikanlah lutut dan gerakkanlah kaki keluar untuk memeriksa rotasi interna kemudian gerakkanlah kaki ke dalam untuk memeriksa rotasi eksterna. Pada tindakan ini, lutut harus dalam posisi yang tetap. Lakukanlah pemeriksaan rotasi kembali dengan tungkai yang diekstensikan sepenuhnya. Ingatlah bahwa kaput femoral dapat kehilangan kebulatannya secara tidak

merata. Oleh karenanya rotasi dapat terbatas pada satu posisidan tetap terjaga pada posisi lainnya.

Fleks



Netral



Gambar 8. 11. Gerakan-gerakan pinggul

Sekarang, gulingkanlah tubuh pasiensehingga menjadi bertiarap. Letakkanlahsatu tangan pada

bokong dan angkatlah tungkai untuk memeriksa ekstensibiasanya sekitar 40'. Jika menemukan kemiringan pelvis, periksa dan bandingkanlah panjang tungkai. Ukurlah dari spina iliaca anterior superior ke maleolus medialis. Agar tepat, tungkai tersebut harus berada dalam posisi yang sama. Lakukanlah palpasi sampai ke ligamentum inguinal sampai anda menyentuh tonjolan tulang pertama dan rentangkanlah pita pengukur tepat di bagian dalam patela sampai ke maleolus..

Tabel 8.2. Pemeriksaan Pinggul dan Pelvis

Inspeksi

- Gaya berjalan – gaya berjalan Trendelenberg
- Fleksi lutut pada sisi yang menderita penyakit
- Kemiringan pelvis

Palpasi

- Spina iliaca anterior, trokanter mayor, dan bursa
- Lesung venus, bagian-bagian tulang yang penting di posterior
- Sulkus iskiadikus

Pemeriksaan

- Rentang gerakan
- Rotasi interna 35°, rotasi eksterna 45° ekstensi 45°, aduksi 45°
- Aduksi 90°, fleksi 120°
- Mengangkat tungkai lurus-lurus
- Tes Thomas
- Tes Trendelenburg

3. Pemeriksaan Lutut

Mula-mula, analisislah gaya berjalan pasien ketika ia memasuki kamar periksa. Ayunan ekstensi/

fleksi lutut harus halus dan mantap. Perhatikanlah apakah ada pembengkakan bursa setempat, pembengkakan umum atau intra-artikuler. Perhatikanlah kontur otot, apakah simetris atau tidak dan mintalah pasien anda untuk berdiri tegak. Lutut yang sedikit difleksikan pada satu sisi mengarah kepada proses patologik pada sisi tersebut.

Lutut lebih mudah dipalpasi jika ia difleksikan 90°. Pasien yang harus berbaring telentang di tempat tidur harus memfleksikan lututnya 90°. Mintalah pasien lain untuk duduk di tepi meja periksa. Letakkanlah tangan anda pada lutut sehingga jari-jari tangan anda membentuk lengkungan di sekitar daerah poplitea posterior. Palpasilah jaringan lunak dan tulang di bagian anterior dengan kedua ibu jari tangan anda. Setelah mengenali patela dan tendo infrapatela, doronglah kedua ibu jari anda ke dalam cekungan jaringan lunak pada kedua sisi patela. Palpasilah *plateau* tibial medialis, tuberkulum tibia, kondilus femoral medial, tuberkulum aduktor, *plateau* tibial lateral, tuberkulum lateral, kondilus femoral lateral, dan epikondilus, dan kaput fibula. Selanjutnya, palpasi dan perhatikanlah otot-otot, tendo-tendo, dan daerah-daerah bursa. Di bagian anterior, palpasilah kuadriseps, tendo infrapatela, bursa infrapatela superfisial, bursa prepatela, dan bursa pes anserinus. Rotasikanlah kaki ke medial dan palpasilah meniskus medial dan ligamentum kolateral medial, tendo sartorius, gracilis dan semitendinosus (Gambar 8.12).


Fleksikanlah lutut sedikit saja dan palpasilah meniskus lateral, ligamentum kolateral lateral dan tendo biseps femoris. Di bagian posterior, palpasilah tendo biseps femoris sepanjang batas lateral superior fosa

poplitea. Palpasilah muskulus gastroknemius dan arteri poplitea. Lakukanlah penekanan lateral pada lutut dan palpasilah celah sendi, yang menunjukkan terganggunya ligamen kolateral.



Gambar 8. 12. Rotasi medial tibia

Meniskus medial mengalami lebih banyak trauma ketimbang meniskus lateral. Kalau terjadi robekan pada meniskus medial, akan timbul nyeri tekan pada garis sendi. Jika ligamentum kolateral medial terpisah, nyerinya akan ditemukan di daerah kondilus femoral. Tes Mc. Murray dapat dipakai untuk lebih mencirikan robekan meniskus. Fleksikanlah lutut dan dengan satu tangan palpasi garis sendi, peganglah tumit kaki dengan tangan lainnya dengan bola kaki pada pergelangan tangan anda. Rotasi lateral kaki memeriksa kornu posterior meniskus medial. Rotasi medial kaki memeriksa kornu posterior meniskus lateral. Tes ini positif kalau tindakan ini menimbulkan klik yang dapat dipalpasi.



Gambar 8.13.. Atas, Tanda tarikan anterior. Pemeriksa duduk di atas kaki pasien untuk menstabilkan pasien. Dengan tangan kanannya, ia menarik tungkai bawah ke depan. Jika ligamentum krusiatum anterior telah putus, akan terlihat pergerakan tungkai bawah ke depan secara abnormal. Bawah, tanda tarikan posterior. Pemeriksa menekan di bagian posterior untuk memeriksa keutuhan ligamentum krusiatum posterior.

Gambar 8.14. Tes McMurray untuk memeriksa robekan meniskus posterior. Pemeriksa meletakkan jari-jari tangan kirinya pada garis sendi. Kaki pasien terletak pada lengan bawah kanan pemeriksa. Rotasi lateral tungkai bawah memeriksa separuh bagian posterior meniskus medial. Sebaliknya, rotasi medial memeriksa segmen posterior meniskus lateral

Akhirnya, periksalah rentang gerakan aktif dan pasif. Mintalah pasien untuk berjongkok dan menekuk lutut dalam-dalam, kemudian mintalah pasien tersebut untuk duduk di atas meja periksa kembali dan

lakukanlah fleksi dan ekstensi tungkai. Carilah usaha menghentikan gerakan pada ekstensi 10° terakhir, suatu tanda gangguan sendi. Periksa rotasi interna dan eksterna seperti yang diuraikan di atas.

Tabel 8.3. Pemeriksaan Lutut

<p><i>Inspeksi</i></p> <p>Gaya berjalan Memikul berat badan dan duduk Bagian-bagian tulang yang penting, hipertrofi tulang dan perubahan anatomi Pembengkakan dan efusi sinovial dan jaringan lunak</p> <p><i>Palpasi</i></p> <p>Bagian-bagian tulang yang penting – tuberositas, patela Garis sendi, meniskus, ligamentum kolateral, bursa Kapsul sendi Kelompok otot dan ligamentum Pemeriksaan Rentang gerakan – Ekstensi 10°, fleksi 130° – Rotasi medial dan lateral 10° Keutuhan ligamentum krusiatum – tanda tarikan Tes McMurray</p>
--


4. Pemeriksaan Kaki

Perhatikanlah gaya berjalan pasien ketika ia memasuki kamar periksa. Periksa sepatu pasien dan perhatikanlah tempat-tempat yang aus. Biasanya tumit lateral aus lebih dahulu. Aus di bagian medial biasanya menunjukkan *pes planus* (kaki yang datar). Aus di daerah jari kaki mungkin menunjukkan *foot drop* karena

kelemahan kompartemen anterior. Ketidaksihesuaian aus antara satu sepatu dengan sepatu lainnya menunjukkan penyakit unilateral.

Lipatan sepatu yang miring bukannya lipatan sepatu transversal yang normal mengarah ke hallux yang kaku. Pada *pes planus*, kaput talus pindah ke medial dan ke arah plantar, sehingga menyebabkan hilangnya lengkung longitudinal medial. Kakinya datar, timbul kalus dibawah kaput talus, dan deformitas valgus pada pergelangan kaki menonjol. Tanda-tanda keausan sepatu memberikan kesan bahwa pasien berjalan dengan sisi medial sepatunya. Pada hallux valgus yang menonjol sebagian pasien mungkin terpaksa memotong bagian sepatu di daerah hallux untuk menampung jari kaki yang mengalami deformitas. Periksa kalus dengan hati-hati dan perhatikanlah ketebalan kuku, warna kulit dan distribusi rambut. *Claw toes* terfleksikan pada interfalang proksimal dan distal dan hiperekstensi pada sendi metatarsofalangeal. *Hammer toes* mengalami hiperekstensi pada sendi metatarsofalangeal dan interfalangeal distal dan terfleksikan pada sendi interfalangeal proksimal.

Palpasilah seluruh kaki, terutama disekitar maleolus dan ligamentum deltoideum, ligamentum pergelangan kaki lateral, kaput metatarsal, talus, kalkaneus, dan tendo Achilles. Periksa stabilitas pergelangan kaki dengan tanda tarikan anterior, dan periksa integritas ligamentum talofibular anterior dan kalkaneofibular (Gambar 8.15).



Gambar 8.15. Tanda tarikan anterior

Lakukanlah pemeriksaan empat gerakan. Ekstensikan lutut dan dorsifleksikanlah kaki ke arah pasien dan lakukanlah fleksi plantar menjauhi pasien. Inversi memutar telapak kaki kedalam dan eversi memutar telapak kakikeluar. Kedua tindakan terakhir ini harus dilakukan pada sendi subtalar, jangan dengan memutar metatarsal.

Lakukanlah serangkaian pemeriksaansingkat untuk mengenali keterbatasangerakan pergelangan kaki dan kaki dengan cepat. Berjalandi atas jari kakimeriksa fleksi plantar dan gerakan jarikaki, berjalan di atas tumit kaki memeriksa dorsifleksi. Berjalan dengan tepi lateral kaki memeriksa inversi, dan berjalan dengan tepi medial kaki memeriksaeversi. Untuk dapat menentukan gangguan fungsi dengan lebih tepat perlu dilakukan pemeriksaan rentang gerakan pasifsecara lebih formal.

Tabel 8. 4. Pemeriksaan kaki

Inspeksi

Anatomi tulang.
Tendo Achilles.
Kelengkungan kaki.

Palpasi

Bagian-bagian tulang yang penting .
Ligamentum pergelangan kaki.


Pemeriksaan

Rentang gerakan.
– Dorsifieksi/fleksi plantar 70°
– Inversi/eversi 15° Aduksi 20°, abduksi 10°
Keutuhan ligamentum pergelangan kaki – tanda tarikan, inversi, eversi.

5. Pemeriksaan Bahu

Lakukanlah inspeksi bahu dari depandan belakang. Bandingkanlah tiap daerah dengan sisi kontralateralnya. Perhatikanlah kesimetrisan bagian-bagian yang penting, dan pusatkanlah perhatian anda pada klavikula, sendi akromioklavikular dan klavikular-sternal, sulkus dan otot deltoid-pektoral, dan skapula. Perhatikanlah perubahan anatomik, massa otot, tonus, dan fungsi.

Lakukanlah palpasi anatomi bahu dari belakang pasien. Palpasilah klavikula, sendi sternoklavikular dan akromioklavikular, akromion dan ujung korakoid, muskulus deltoid, pektoralis dan trapezius, tuberositas mayor humanus, sulkus humerus, scapula, dan aksila.



Gambar 8. 16. Anatomi bahu

Gambar 8.17. Rotator cuff

Mintalah pasien anda untuk memfleksikan dan mengabduksikan bahunya beberapa kali ketika anda memeriksa sendi *akromioklavikular*. Anda akan merasakan gerakan sendi ini di bawah jari-jari tangan anda. Nyeri tekan dan krepitus pada sendi ini dapat timbul pada osteoarthritis dan dislokasi klavikula ke lateral.

Tuberositas mayor humerus dapat dipalpasi di bagian lateral dan inferior tepi akromion. Sulkus bisipital terletak di bagian anterior dan medial tuberositas mayor dan dibatasi di bagian posterior oleh tuberositas minor. Sulkus ini dapat dipalpasi dengan mudah jika lengan difleksikan dan dirotasikan ke medial dan lateral secara berulang-ulang sehingga anda dapat mengenali sulkus tersebut diantara kedua tuberositas. Rotasi eksternal menyebabkan sulkus tersebut berada dalam posisi yang lebih mudah untuk dipalpasi. Palpasi yang kuat mungkin diperlukan, tetapi hindarilah penekanan yang berlebihan karena akan menimbulkan nyeri dan membuat pasien anda takut (Gambar 8. 16).

Pemeriksaan rentang gerakan aktif dan pasif melengkapi pemeriksaan bahu. Untuk memeriksa abduksi, mintalah pasien untuk menggerakkan lengannya keluar dan ke atas atau "seperti burung

mengepak-ngepakkan sayapnya". Skapula mulai berotasi kira-kira pada sudut 30° . Fiksasilah skapula dengan tangandan ibu jari anda dan pasien harus dapat mengabduksikan bahu sampai kira-kira 90° .

Dari semua pemeriksaan rentang gerakan, abduksi lambat memberikan informasi yang paling berguna. Jika pasien dapat mengabduksikan bahunya sampai 90° dan kemudian mengangkat lengannya di atas kepala, pasti tidak ada cedera atau gangguan anatomik yang berat. Busur $30-60^\circ$ merupakan busur nyeri *rotator cuff* (Gambar 8.17). Cedera atau robekan *tendosupraspinatus*, *infraspinatus*, *subskapularis*, atau *teres minor* atau kapsul sendi bahu akan mengganggu abduksi dan menimbulkan nyeri pada abduksi bahu. Jika anda membantu pasien dengan cedera *rotator cuff* atau kapsul bahu dengan mengangkat lengan yang sedang melakukan gerakan abduksi sampai kira-kira 60° , maka ia akan dapat menyelesaikan gerakan mengangkat lengan tersebut dengan memakai deltoid dan merotasikan skapula. Sebaliknya, artritis bahu menimbulkan nyeri pada permulaan gerakan abduksi dan gerakan lainnya juga.

Lakukanlah aduksi bahu dengan meminta pasien meletakkan tangannya pada puncak bahu kontralateral. Siku harus terletak di atas sternum. Rotasi internal diperiksa dengan meminta pasien menggaruk punggungnya. Mintalah pasien untuk menggaruk di antara batas-batas bawah bahunya dengan ibu jarinya. Rotasi eksternal diperiksa dengan melakukan ayunan ke belakang untuk melakukan pukulan tenis dengan lengan bawah. Dengan siku difleksikan secara parsial, tangan didorong ke belakang sejauh mungkin.

Tabel 8.5. Pemeriksaan Bahu

Inspeksi

Kesimetrisan

Klavikula, sendi akromioklavikular, klavikulosternal, Sulkus deltopektoral, kelompok otot, skapula.

Palpasi

Periksalah dari belakang pasien

Akromion, puncak korakoid, muskulus deltoid.

Sendi akromioklavikular selama fleksi dan abduksi.

Tuberositas mayor dan minor

Sulkus bisipital selama rotasi internal dan eksternal.

Rotator cuff, bursa subdeltoid dan subakromial selama ekstensi bahu.

Skapula dan aksila.

Pemeriksaan

Abduksi – burung yang mengepak-gepakkan sayapnya.

Abduksi lambat, busur rotator 30-60° Tes Speed untuk tendonitis bisipital.

Aduksi, rotasi internal dan eksternal.


6. Pemeriksaan Siku

Inspeksilah sudut angkat dan bagian-bagian tulang siku. Mula-mula, ekstensikanlah lengan sepenuhnya di samping tubuh. Sudut angkat normal membuat sikudapat dimasukkan ke dalam cekungan pinggang di atas krista iliaka. Sudut normal pada pria adalah 5-10° dan pada wanita adalah 10-20° (Gambar 8.18).

Segitiga yang terbentuk oleh bagian-bagian tulang membantu orientasi anda pada sendi ini. *Kondilus humerus medial dan lateral* segaris, dan ujung olekranon

membentuk titik ketiga. Bandingkanlah segitiga ini dengan segitiga pada sisi kontralateral. Dislokasi secara dramatis mengubah segitiga ini, sedangkan fraktur suprakondilus tidak. Fleksi menggerakkan olekranon keluar dari fosanya dan membuat ketiga bagian tulang ini menjadi lebih menonjol. Lakukanlah inspeksi untuk melihat terjadinya pembengkakan, yang menghilangkan tonjolan-tonjolan anatomik dan batas-batas normal, mula-mula secara tidak kentara, kemudian secara jelas.

Selanjutnya, palpasilah bagian-bagian tulang dan struktur-struktur jaringan lunak siku (Gambar 8.19). Dengan satu tangan di sekitar biseps pasien, lakukanlah abduksi dan ekstensi lengan dan mintalah pasien untuk memfleksikan sikunya kira-kira 90°. Sekarang palpasilah dengan hati-hati epikondilus medial, linea suprakondilar medial pada humerus, olekranon, batas ulnar, fossa olekranon, epikondilus lateral, linea suprakondilar lateral pada humerus, dan kaput radius. Pembengkakan atau penebalan jaringan lunak sendi mempunyai tekstur seperti massa lumpur. Pelajarilah tekstur normal tiap daerah dengan memeriksa beberapa rekan anda. Kalau perlu, berikanlah stress pada ligamentum siku seperti yang diperlihatkan pada Gambar 8.20.



Gambar 8.18. Sudut angkat

Gambar 8.19. Palpasi siku

Gambar 8.20. Pemeriksaan siku integritas ligamen

Ujung olekranon merupakan tempat sebuah bursa kecil yang dapat berisi cairan sebagai kantong yang berfluktuasi. Biasanya tidak nyeri tetapi menakutkan pasien. Siku sering terserang pada *arthritis reumatoid*. Sinovium yang membengkak dan cairan sendi menghilangkan tonjolan-tonjolan tulang yang normal dan membatasi gerakan. Nodus pada *arthritis reumatoid* dapat diraba sepanjang tepi lateral ulna tepat di bawah siku. *Tofus gout* dan *xanthomatatuberosa* juga lebih sering ditemukan disini. Nodus epitrokhlear dapat dipalpasi tepat di atas *kondilus humerus medialis*. Pembesaran nodus ini paling sering disebabkan oleh penyakit infeksi.

Periksalah rentang gerakan aktif dan pasif secara singkat. Fleksi, sebagai respons terhadap perintah, "membuat otot menonjol", biasanya meninggalkan kira-kira 30° di antara lengan atas dan lengan bawah. Ekstensi penuh harus membuat lengan atas dan lengan bawah membentuk satu garis lurus. Busur total dari fleksi penuh sampai ekstensi penuh mencapai 160° .

Pronasi dan supinasi lengan bawah dapat dilakukan di siku atau di bahu dengan abduksi dan aduksi. Untuk memeriksa siku, anda harus memfiksasikannya pada sisi tubuh dan menyuruh pasien untuk melakukan pronasi dan supinasi pada lengan bawah, telapak tangan menghadap ke luar. Pronasi sedikit kurang dari 90° dan supinasi adalah 90° penuh.

Periksalah kekuatan otot pada empat gerakan dengan menyuruh pasien melakukan gerakan melawan tahanan tangan anda. Untuk memeriksa *ligamentum kolateral*, peganglah siku pasien dengan satu tangan yang membentuk seperti mangkuk dan peganglah pergelangan tangannya dengan tangan lainnya. Pasien memfleksikan sikunya beberapa derajat. Pakailah

tangani pergelangan tangan untuk mendorong lengan bawah ke lateral, sehingga menimbulkan *stress valgus* pada sisi medial sendi tersebut. Palpasi dan perhatikanlah sisi medial apakah timbul celah (jika tendon terputus). Sekarang ubahlah arah stres dan periksa ligamentum lateral.

Untuk meniru nyeri pada *tennis elbow* mintalah pasien anda untuk menggerakkan tinjunya dan menggerakkan pergelangan tangannya. Tekanlah dorsum tangan yang diekstensikan dan berusaha untuk mendorong pergelangan tangan menjadi fleksi. Jika pasien menderita *tennis elbow*, ia akan mengalami nyeri pada epikondilus lateral.

Tabel. 8.6. Pemeriksaan siku

Inspeksi

- Bagian-bagian tulang yang penting.
- Bursa olekranon.
- Sudut angkat.

Palpasi

- Bagian-bagian yang penting
 - Pemeriksaan Rentang gerakan Stres
 - ligamentum
-


BAB IX

PEMERIKSAAN FISIK SISTEM PERSARAFAN

A. Anatomi Fisiologi Sistem Persarafan

Sistem saraf mempunyai fungsi kontrol terhadap sebagian besar aktivitas otot dan kelenjar tubuh untuk mempertahankan homeostasis tubuh. Fungsi ini dijalankan oleh unit dasar sistem saraf yang disebut neuron. Terdapat berjuta-juta neuron dalam sistem saraf dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda tergantung fungsinya. Neuron dapat menghasilkan sinyal listrik dan biokimia dengan cepat. Neuron juga mengolah, memulai, mengkode, dan menghantarkan perubahan-perubahan pada potensial membrannya sebagai suatu cara untuk menyalurkan pesan dengan cepat.

Berdasarkan morfologisnya, neuron dapat dibedakan menjadi badan sel (somata), dendrit, akson dan, tombol ujung saraf (*terminal button*).



Gambar 9. 1. Struktur sel saraf

Somata merupakan bagian neuron yang berperan sebagai pengatur aktivitas sel saraf karena pada somata terdapat nukleus dan organel. Dendrit merupakan bagian neuron yang memiliki percabangan banyak (seperti pohon), lebih pendek, tidak memiliki akson hillock, dan jarang yang bermielin. Akson merupakan bagian dari neuron yang berupa serabut panjang, kebanyakan memiliki selubung myelin, memiliki akson hillock. Ujung akson membentuk suatu tombol ujung saraf (*terminal button*) yang berperan menghubungkan sel tersebut dengan sel lainnya misalnya menghubungkan satu sel saraf dengan sel saraf lainnya melalui sinapsis, menghubungkan sel saraf dengan sel otot melalui suatu *neuro-muscular junction*.

Berdasarkan fungsi konduksinya, neuron dapat dibedakan menjadi neuron sensoris, neuron motoris dan *interneuron* (antar neuron). Neuron sensoris (aferen) berperan menyalurkan impuls (aksi potensial) dari reseptor menuju ke saraf pusat dan saat menuju *medulla spinalis* melewati sisi atas (dorsal). Neuron motoris (eferen) berperan menyalurkan impuls dari saraf pusat menuju ke efektor dan meninggalkan *medulla spinalis*

melalui sisi bawah (ventral). *Interneuron* (antar neuron) berperan menghubungkan neuron satu dengan neuron lainnya.

Neuron merupakan sel eksitabel (dapat menyalurkan muatan listrik atau impuls) apabila ada rangsangan yang mengenainya. Pada neuron bermyelin penjalaran impuls meloncat dari satu *nodus Ranvier* ke *nodus Ranvier* berikutnya yang disebut *saltator*. Adanya rangsangan yang adekuat akan menyebabkan perubahan membran sel saraf yang berakibat terjadinya pertukaran ion dari luar ke dalam sel sehingga ion natrium masuk ke dalam sel dan sebaliknya ion kalium keluar dari sel sehingga menimbulkan perubahan beda potensial pada sel saraf tersebut yang dikenal sebagai depolarisasi.


Sistem saraf berdasarkan letak dan kedudukannya dapat dibedakan menjadi CNS (*central nervous system*) atau SSP (Susunan Saraf Pusat) dan *peripheral nervous system* atau SST (Susunan Saraf Tepi).

1. SSP terdiri atas otak dan medulla spinalis. Pada SSP terdapat cairan serebrospinalis yang terletak pada ventrikel otak dan kanalis medialis (sentralis). Cairan serebrospinalis berasal dari filtrasi darah oleh pleksus choroideus berfungsi memberi nutrisi sel-sel otak dan medulla spinalis, sebagai bantalan pelindung bagi otak, serta dapat digunakan sebagai alat diagnostik adanya kelainan pada sistem saraf melalui punksi lumbal. SSP juga dilindungi oleh suatu selubung kuat yang disebut *meninges*. *Meninges* tersusun atas 3 lapisan dari luar ke dalam sebagai berikut : *duramater*, *arachnoid*, *piamater*.

- a. Otak

Otak terdiri atas 3 bagian utama yaitu otak depan (*forebrain*), otak tengah (*midbrain*) dan otak


belakang (*hindbrain*). Otak depan meliputi : *thalamus*, kelenjar *pituitary*, korteks serebri, *bulbus olfactory* dan sistem *lymbic* (yang meliputi *hipothalamus* dan *hippocampus*). Otak tengah meliputi *tegmentum*, *colliculus superior* dan *colliculus inferior*. Otak belakang meliputi *medulla oblongata*, *pons varolli*, dan *cerebellum*. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 9. 2. Otak dan bagiannya

Bagian terbesar dari otak manusia adalah *cerebrum*(otak besar), merupakan bagian yang membedakan manusia dengan binatang. *Cerebrum* membuat manusia memiliki kemampuan berfikir, analisa, logika, bahasa, kesadaran, perencanaan, memori, dan kemampuan visual. Kecerdasan intelektual atau IQ juga ditentukan oleh kualitas bagian ini. Secara umum *cerebrum* terbagi atas 4 lobus yaitu *lobus frontalis*, *lobus parietalis*, *lobus temporalis*, dan *lobus occipitalis*. Keempat lobus ini masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda.

Lobus frontalis terletak pada bagian depan otak berhubungan dengan kemampuan membuat alasan, kemampuan gerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, memberi penilaian, kreativitas, kontrol perasaan, kontrol perilaku seksual, dan kemampuan bahasa secara umum. *Lobus parietalis* berada di tengah berhubungan dengan proses sensor perasaan seperti tekanan, sentuhan, dan rasa sakit. *Lobus temporal* berada dibagian bawah berhubungan dengan kemampuan pendengaran, pemaknaan informasi dan bahasa dalam bentuk suara. *Lobus occipitalis* berada pada bagian belakang berhubungan dengan rangsangan visual yang memungkinkan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata.



Gambar 9. 3. Fungsi-fungsi tertentu pada hemisfer kiri dan kanan

Cerebrum juga dibagi menjadi dua *hemisfer* (belahan) yaitu *hemisfer* kanan dan *hemisfer* kiri. Kedua *hemisfer* terhubung oleh kabel-kabel saraf di bagian bawahnya. *Hemisfer* kanan mengontrol sisi

kiri tubuh, terlibat dalam kreativitas dan kemampuan artistik. *Hemisfer* kiri mengontrol sisi kanan tubuh, untuk logika dan berfikir rasional.

Bagian otak lain yaitu *cerebellum* (otak kecil) terletak di bagian belakang kepala dekat dengan ujung leher bagian atas. Bagian ini mengontrol banyak fungsi otomatis otak, diantaranya mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot, dan gerakan tubuh. Otak kecil juga menyimpan dan melaksanakan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari seperti gerakan mengendarai mobil, gerakan tangan saat menulis, gerakan mengunci pintu, dan lain-lain.

Bagian otak yang mengatur fungsi dasar manusia termasuk pernapasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia adalah batang otak. Batang otak ini terdiri atas *Mesencephalon*, *Pons*, dan *Medulla Oblongata*.

Sistem Limbik yang terletak di bagian tengah otak membungkus batang otak ibarat kerah baju. Bagian ini terdiri dari *hypothalamus*, *thalamus*, *amigdala*, *hippocampus*, dan korteks *limbic*. Sistem ini berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostasis, rasa haus, lapar, dorongan seks, pusat rasa senang, metabolisme, dan juga memori jangka panjang.

b. *Medulla Spinalis*

Berdasarkan arah konduksinya, neuron pada *medulla spinalis* dapat dibedakan menjadi *neuron ascendes* dan *descendes*. *Neuron ascendes* bersifat afferent artinya menyalurkan impuls menuju otak. *Neuron descendes* bersifat efferent, menyalurkan

impuls dari otak ke efektor. Medulla spinalis ini terdapat di sepanjang tulang belakang (*columna vertebralis*) berfungsi mengendalikan aktivitas refleks. Setiap segmen memiliki neuron motoris dan sensoris yang menginervasi kulit, otot, dan atau organ dalam (*viscera*).

2. Susunan Saraf Tepi (SST), terdiri dari saraf kranial, saraf spinal, dan saraf otonom (simpatis dan parasimpatis).

a. Saraf Kranial

Merupakan serabut saraf yang berasal dari otak. Berperan menjalankan informasi sensoris dari reseptor yang ada di kepala ke otak dan menjalankan respon menuju ke efektor. Ada 12 pasang serabut saraf kranial yaitu :

- *Nervus Olfactorius* (N. I) : ke organ pembau.
- *Nervus Opticus* (N. II) : ke organ penglihatan.
- *Nervus Oculomotorius* (N.III) : rangsang dari otot mata
- *Nervus Trochlearis* (N. IV) : rangsang dari otot mata
- *Nervus Trigemimus* (N. V) : rangsang (sentuhan, nyeri) dari wajah, hidung, dan mulut
- *Nervus Abducens* (N. VI) : rangsang dari otot mata
- *Nervus Facialis* (N. VII) : rangsang dari wajah
- *Nervus Acusticus* (N. VIII) : rangsang dari organ pendengaran dan keseimbangan
- *Nervus Glossopharingeus* (N. IX) : rangsang dari pangkal lidah dan tenggorokan
- *Nervus Vagus* (N. X) : rangsang dari jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan.

- Nervus *Accesorius* (N. XI) : memberikan suplai motorik ke *m. trapezius* dan *m. sternocleidomastoideus*
- Nervus *Hypoglossus* (N. XII) : mengendalikan otot-otot lidah

b. Saraf Spinal

Saraf spinal merupakan serabut saraf yang berasal dari medulla spinalis. Saraf spinalis terdiri dari 31 segmen, terdiri dari 8 segmen pada daerah *cervikal*, 12 segmen pada daerah *thoracal*, 5 segmen pada daerah *lumbal*, 5 segmen pada daerah *sacral*, dan 1 segmen pada daerah *coccigeus*.

c. Sistem Saraf Otonom

Merupakan kelompok saraf yang mempunyai aktivitas otomatis (di luar pengaruh kesadaran) misalnya denyut jantung, tekanan darah, kecepatan respirasi, kecepatan pencernaan, keringat, dan lain-lain. Terdiri dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis yang memiliki perbedaan sebagai berikut :

Tabel 9. 1. Perbedaan Saraf Simpatis dan Parasimpatis

Simpatis	Parasimpatis
Asosiasi dengan saraf pada segmen <i>cervical</i> , <i>thoracal</i> dan <i>lumbal</i>	Berasal dari <i>Nervi Cranial</i> dan asosiasi dengan saraf pada segmen <i>sacral</i>
<i>Ganglia</i> terletak di samping vertebra	<i>Ganglia</i> terletak di dekat atau di dalam organ yang diinervasi
Bersifat katabolistik (memecah)	Bersifat anabolistik (menyimpan)

Neurotransmiternya berupa noradrenalin (norepinefrin)

Disebut saraf adrenergic

Berperan memacu kerja organ yang diinervasi, misalnya meningkatkan frekuensi denyut jantung dan frekuensi nafas.


Neurotransmiternya berupa asetikolin

Disebut saraf kolinergik

Berperan menghambat kerja organ yang diinervasi, misalnya menurunkan frekuensi denyut jantung dan frekuensi nafas.

Lengkung Refleks

Refleks adalah suatu jawaban terhadap suatu rangsangan. Gerakan yang timbul disebut gerakan reflekstorik. Semua gerakan reflekstorik merupakan gerakan yang bangkit untuk penyesuaian diri, baik untuk menjamin ketangkasan gerakan volunter maupun untuk membela diri. Proses yang terjadi pada refleks melalui lintasan tertentu yang disebut lengkung refleks merupakan unit fungsional tersederhana dari fungsi sistem saraf, terdiri atas beberapa komponen yaitu reseptor (penerima rangsang), neuron sensoris, neuron motoris, dan efektor (otot).



Gambar 9. 4. Lengkung refleks

Berdasarkan banyaknya sambungan neuron (*sinaps*) refleks dapat dibedakan menjadi refleks *monosinaptik* (satu sambungan neuron), *disinaptik* (dua sambungan neuron), dan *polisinaptik* (lebih dari dua sambungan neuron).

Berdasarkan kerjanya, refleks dapat dibedakan menjadi refleks somatik dan refleks *visceral*. Disebut refleks somatik jika mengenai anggota badan dan kulit, sebagian besar merupakan refleks *monosinaptik* yang berfungsi untuk menghindar dari keadaan bahaya misalnya percikan api atau benda tajam. Sedangkan refleks *viscera* adalah refleks yang berhubungan dengan organ-organ tubuh bagian dalam (*viscera*) biasanya merupakan refleks polisinaptik.

B. Pemeriksaan Fisik Sistem Persarafan

Pada pemeriksaan fisik ini digunakan pendekatan-pendekatan yang dapat mengarahkan kita untuk mengenali kelainan korteks serebri, batang otak, saraf-saraf otak, refleks-refleks muskuloskeletal, sistem motoris, dan sensoris serta fungsi-fungsi cerebellum.

Pemeriksaan dimulai dari fungsi tertinggi pada korteks serebri sampai yang paling dasar pada busur refleks spinal. Selama anamnesis, perhatikan keadaan jiwa (*afek*), penampilan, cara berbicara, dan kelakuan pasien.

1. Pemeriksaan fungsi-fungsi serebral

Dilakukan bilamana pemeriksa mencurigai adanya kelainan otak organik, dengan menggunakan penilaian kuantitatif. Jumlah nilai tertinggi adalah 25. Nilai dibawah 20 secara pasti membedakan pasien

normal dengan pasien yang menderita dementia, delirium, psikosis, dan gangguan afektif.

a. Evaluasi orientasi

Berikanlah pasien 1 angka untuk tiap jawaban yang benar ketika diminta menyebutkan tahun, musim, tanggal, hari, dan bulan. Berikanlah 1 angka untuk tiap jawaban benar terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang lokasi negara, propinsi, kabupaten, rumah sakit, dan lantai tempat pemeriksaan dilakukan.

b. Evaluasi daya ingat

Caranya, sebutkanlah tiga benda dan berikanlah pasien waktu 1 detik untuk mengatakan tiap-tiap benda tersebut. Berikanlah 1 angka untuk tiap jawaban benar. Kemudian ulangilah nama benda-benda tersebut sampai pasien sudah menghafalnya dan hitunglah jumlah percobaan sampai pasien dapat menghafal nama benda-benda tersebut.

c. Evaluasi perhatian dan perhitungan


Mintalah pasien untuk mengurangi 100 dengan 7 dan kemudian hasilnya dikurangi kembali dengan 7, demikian berturut-turut sampai lima jawaban. Ini adalah tes 7 serial. Tiap jawaban yang benar mendapat 1 angka. Bila pasien tidak menyukai matematika, sebagai alternative minta mengeja kata "dunia" mulai dari belakang. Berikanlah 1 angka untuk setiap huruf yang dinyatakan dengan urutan yang benar.

d. Evaluasi fungsi bahasa

Periksalah fungsi bahasa dengan menanyakan kepada pasien nama pensil, arloji, atau benda umum lainnya yang diperlihatkan padanya. Berikanlah 1 angka untuk jawaban yang benar. Mintalah pasien untuk mengulangi ungkapan yang anda sebutkan, misalnya "tidak jika,

dan, atau tetapi", dan berikanlah 1 angka untuk tiap ungkapan yang disebut dengan benar.

2. Pemeriksaan saraf-saraf otak
 - a. Pemeriksaan nervus Olfactorius (N.I) dilaksanakan dengan meminta pasien mengenali suatu bau apa saja, tidak perlu suatu bau tertentu. Periksalah lubang hidung secara terpisah dan mintalah pasien untuk mengenali bau tersebut. Untuk pasien histeri yang menyatakan tidak bisa mencium apa-apa dapat diberikan zat yang lebih berbahaya misalnya ammonia. Kehilangan kemampuan mencium bau unilateral lebih penting dari kehilangan bilateral. Kehilangan bilateral dapat disebabkan oleh penuaan.



Gambar 9. 5. Pemeriksaan nervus olfactorius
Mengenali bau dengan menutup mata

- b. Pemeriksaan nervus *Optikus* (N. II) dilaksanakan dengan memeriksa ketajaman penglihatan dengan kartu *Snellen*, dengan *pinhole* kalau ada strabismus dan tanpa *pinhole* untuk pasien normal. Periksalah juga lapang pandang dengan tes konfrontasi (caranya telah diuraikan pada Bab III)
 - c. Pemeriksaan nervus *Oculomotorius* (N.III), *trochlearis* (N. IV) dan *abducens* (N. VI), dilaksanakan dengan menyuruh pasien mempertahankan kepalanya tetap

tegak lurus sementara matanya mengikuti gerakan jari-jari anda. Bila pasien tidak dapat melihat ke bawah atau ke medial, mata tertarik ke lateral, palpebra ptosis dan pupil berdilatasi berarti terjadi paralisis N. III. Kerusakan N.IV ditandai dengan ketidakmampuan melihat ke medial dan kebawah. Paralisis N.VI menyebabkan kesulitan melihat ke lateral.

- d. Pemeriksaan nervus *trigeminus* (N.V). Untuk fungsi sensorik dilakukan dengan cara mata pasien ditutup, kemudian periksalah tiap bagian dari tiga trunkus sensoris yang menyebar di wajah. Secara ringan sentuhlah dahi, pipi, dan dagu pada tiap sisi dan mintalah pasien untuk mengenali setiap sentuhan. Fungsi motorik diperiksa dengan memalpasi muskulus maseter dan temporal ketika pasien menggertakan rahangnya. Kalau ada gangguan fungsi unilateral, rahang mungkin menyimpang kalau pasien membuka mulutnya. Dua refleks yaitu *refleks kornea* dan *sentakan rahang* juga melibatkan nervus *trigeminus*.

Refleks kornea.

Mintalah pasien untuk melihat ke satu sisi dan sedikit ke atas. Sentuhlah korneanya dengan aplikator kapas. Gerakkanlah aplikator tersebut kedalam dari arah samping untuk menimbulkan respon mengedip.



Gambar 9. 6. Refleksi kornea

Refleks sentakan rahang.

Dengan mulut pasien terbuka, secara ringan ketuklah mandibula di bawah mulut untuk menimbulkan sentakan rahang. Respon normal bila penutupan rahang dengan cepat.

- e. Pemeriksaan nervus *fasialis* (N.VII). Mintalah pasien untuk mengerutkan dahi, tersenyum, memperlihatkan giginya, atau mengangkat alisnya. Pada paresis, sisi yang terserang terlihat mendatar dan tidak memperlihatkan perubahan dan air liur dapat keluar dari sudut mulutnya. Untuk fungsi sensoriknya, dapat dilakukan pemeriksaan dengan meminta pasien menjulurkan lidahnya, kemudian taruhlah gula atau garam pada satu sisi. Jangan biarkan pasien menarik lidahnya kedalam hingga ia bisa mengenali rasanya.



Gambar 9. 7. Pemeriksaan n. fasialis

- f. Pemeriksaan nervus *acusticus* (N.VIII).Pemeriksaan fungsi pendengaran N. VIII dilakukan dengan *tes Weber* dan *tes Rinne* (telah dipaparkan pada Bab III). Untuk fungsi vestibulernya dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya *nistagmus* saat pasien diminta untuk melihat ke kiri dan kanan dengan gerakan yang cepat ke posisi lateral diselingi dengan gerak kembali yang lambat ke garis tengah.
- g. Pemeriksaan nervus *glossopharingeus* (N. IX) dan *vagus* (N.X) dapat dilakukan bersama-sama. Sentuhlah tiap sisi farings posterior dengan aplikator dan lihatlah adanya *gag refleks*. Selanjutnya sentuhlah setiap sisi palatum mole dekat uvula, tiap sisi harus terangkat kalau dirangsang. Nervus *vagus* dikatakan berfungsi normal jika pasien dapat menelan dan berbicara dengan jelas.
- h. Pemeriksaan nervus *acesorius* (N.XI), dilakukan dengan menilai kemampuan pasien mengangkat bahu dan memutar kepala. Bila terjadi lesi unilateral maka pasien tidak dapat memutar kepala ke sisi yang berlawanan.



Gambar 9. 8. Pemeriksaan N. Asesorius
 Gambar 9.9.Pemeriksaan N. Hipoglossus

- i. Pemeriksaan nervus *hipoglossus* (N. XII). Mintalah pasien untuk menjulurkan lidahnya
Jika ada paralisis, lidah akan menyimpang ke arah sisi lesi. Dapat juga dinilai dengan meminta pasien mendorong lidahnya ke tiap pipi. Periksalah kekuatannya dengan menekan pipi tersebut.

3. Pemeriksaan refleks

Dilakukan pemeriksaan refleks *biceps*, *triceps*, *patella*, *achilles*, *Babinski* dan *Hoffman*. Prinsip-prinsip pada pemeriksaan ini adalah selalu bandingkan sisi yang satu dengan sisi lainnya, perhatikan kualitas dan ada tidaknya refleks, bagian yang diperiksa harus lemas dan intensitas rangsang yang sama harus dipakai untuk kedua sisi.

Refleks Biceps


Peganglah lengan bawah dengan lengan anda. Letakkan ibu jari pada tendo untuk menentukan lokasinya dengan tepat, kemudian ketuklah ibu jari tersebut dengan palu refleks

Refleks Triceps.

Peganglah lengan pasien dengan lengan anda, ketuklah tendo triceps tepat di atas olekranon. Ini dapat dipermudah dengan menyuruh pasien meletakkan kedua tangannya pada krista iliaka, untuk melemaskan otot triceps sehingga refleksnya dapat timbul.

Refleks patella.


Diperiksa dengan mengetuk tendo patella pada lutut yang difleksikan. Mintalah pasien untuk saling menggenggam kedua tangannya dan menariknya ketika anda mengetuk tendo tersebut agar refleks dapat timbul.



Gambar 9. 10. Refleksi Patella

Refleksi Achilles

Mintalah pasien untuk berlutut diatas sebuah meja atau kursi yang nyaman, lalu ketuklah tendo achiles dengan palu refleks, maka akan terjadi gerakan plantar kaki.



Gambar 9. 11. Refleksi Achilles

Gambar 9. 12. Refleksi Babinski

Refleksi Babinski

Refleksi ini hanya ada pada penyakit traktus kortikospinal. Caranya, goreslah kuat-kuat dan cepat bagian lateral telapak kaki dari tumit ke arah jari kelingking. Pakailah benda keras seperti kunci. Refleksi babinski timbul jika ibu jari kaki melakukan dorsifleksi

dan jari-jari lainnya tersebar. Jika pasien menarik seluruh kakinya, ulangilah pemeriksaan ini dengan tekanan yang lebih ringan.

Refleks Hoffman

Angkatlah tangan dengan memegang jari tengah dan jari jari tergantung bebas. Jentiklah kuku jari tengah tersebut. Respon yang positif bila terjadi aposisi ibu jari dan jari telunjuk.

4. Pemeriksaan sistem motorik

Observasilah kesimetrisan dan perkembangan semua kelompok otot. Bandingkanlah satu sisi dengan sisi lainnya dan ekstremitas atas dengan ekstremitas bawah pada sisi yang sama. Perhatikan adanya gerakan involunter abnormal, misalnya sentakan-sentakan pada sekelompok otot atau gerakan tremor seperti yang ditemukan pada penderita Parkinson.

Periksalah fungsi dan kekuatan kelompok otot ekstensor, fleksor, *abductor*, dan aduktor dari tiap sendi utama. Perhatikanlah kekuatan dan tonus otot. Mintalah pasien menggerakkan tiap kelompok otot dengan melawan tahanan yang diberikan. Tentukanlah kekuatannya berdasarkan 5 skala kekuatan: 0 = tidak ada kontraksi sama sekali; 1 = gerakan kontraksi yang sangat lemah; 2 = mampu bergerak tapi tidak kuat melawan tahanan; 3 = cukup kuat untuk melawan tahanan; 4 = cukup kuat tetapi bukan kekuatan penuh; 5 = kekuatan kontraksi yang penuh.

Periksalah *tonus postural* tiap kelompok otot dengan melakukan ekstensi dan fleksi secara bergantian pada tiap sendi ekstremitas tanpa tahanan pasien. Peganglah ekstremitas pasien, minta pasien untuk santai, biasanya akan teraba tonus otot yang halus.

5. Pemeriksaan sistem sensoris

Sensasi nyeri.

Diperiksa dengan persepsi *tusukan peniti*. Pasien diminta menutup matanya sementara pemeriksa menusuk berbagai bagian tubuh pasien dengan peniti. Pakailah tekanan yang kurang lebih sama untuk setiap pemeriksaan dan bandingkanlah sisi yang satu dengan sisi lainnya. Tentukanlah dengan tepat batas-batas daerah dimana perasaannya berkurang dengan memeriksa secara berulang-ulang sisi yang terserang dengan tusukan-tusukan yang berjarak beberapa sentimeter.

Sentuhan.

Mintalah pasien menutup matanya, sentuhlah berbagai bagian tubuh pasien dengan lembut menggunakan segumpal kapas. Mintalah pasien untuk menunjuk bagian tubuhnya setiap kali disentuh.

Tes Diskriminasi Dua Titik

Tes ini digunakan untuk menilai keutuhan seluruh sistem saraf mulai dari korteks sampai ke thalamus dan traktus spinal. Caranya, sentuhlah pasien dengan alat berujung tajam yang berjarak $\frac{1}{4}$ sampai $\frac{1}{2}$ inci. Tanyakanlah pada pasien apakah ia sedang disentuh pada satu atau dua tempat. Bandingkanlah satu sisi dengan sisi lainnya. Dalam keadaan normal pasien dapat membedakan dua titik yang berjarak $\frac{1}{4}$ inci.

6. Pemeriksaan fungsi serebellum

Gaya berjalan.

Mintalah pasien untuk berjalan melintasi ruangan, perhatikan gaya berjalannya. Pada ataksia serebellar, selalu berusaha mempertahankan stabilitasnya dengan memperlebar jarak antara kedua kakinya kalau ia berjalan. Jatuh pada satu sisi secara berulang ulang di

saat berjalan dapat pula menjadi petunjuk adanya kelainan pada serebellum. Mintalah pasien berjalan dengan menempatkan tumitnya langsung di depan tungkai bawahnya setiap langkah. Perhatikan apakah pasien terhuyung-huyung dan terjatuh. Pasien dengan ataksia serebellar tidak dapat melakukan tes ini tanpa terjatuh beberapa kali.

Tes Rhombberg

Tes ini berguna untuk membedakan gangguan fungsi serebellum dari penyakit saraf aferen. Mintalah pasien untuk berdiri dengan kedua kaki dirapatkan. Bersiaplah untuk menangkap pasien kalau-kalau dia terjatuh. Jika ia menderita penyakit neuron aferen pada tungkainya, pasien dapat mengimbangnya dengan mempergunakan matanya untuk mengimbangi efek tidak adanya posisi. Dengan mata terbuka ia mempertahankan posisinya. Mintalah pasien untuk menutup matanya. Dengan mata tertutup ia akan segera terhuyung-huyung. Sedangkan lesi serebellum menyebabkan tingkat gangguan fungsi yang sama baik dengan mata terbuka maupun tertutup.

Tes jari ke hidung

Angkat tangan pemeriksa dengan posisi jari telunjuk tegak di depan pasien, sementara jari-jari lainnya dikepal. Mintalah pasien untuk menyentuh jari tangan pemeriksa dengan jari telunjuknya dan kemudian menyentuh hidungnya sendiri, lalu kembali menyentuh jari pemeriksa kembali dengan cara yang makin cepat.


BAB X

PEMERIKSAAN FISIK SISTEM GENITALIA

A. Anatomi Fisiologi Sistem Genitalia

1. Sistem Genitalia Pria

Organ genitalia pria (*masculina*) selain berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron, juga berfungsi untuk mengalirkan urine keluar melalui uretra. Terbagi menjadi organ genitalia interna dan eksterna. Organ genitalia eksterna terdiri atas penis, *uretra masculine*, dan *scrotum*. Organ genitalia interna terdiri dari *testis*, *epididymis*, *ductus deferens*, *vesicular seminalis*, *funiculus spermaticus*, *prostat*, dan *glandula bulbourethralis*. Secara lengkap, dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 10. 1. Organ Genitalia Masculina Interna dan Eksterna

Penis tersusun atas tiga lapisan jaringan erektil yang tergabung dalam jaringan fibrous berbentuk silinder dapat mengeras (ereksi) dan dipakai untuk melakukan kopulasi. Lipatan dorsolateral disebut korpus kavernosa berjumlah dua buah. Lipatan tengah yang berisikan uretra disebut korpus spongiosum. Bagian distal atau ujung penis disebut *glands* penis. *Glands* penis dibentuk oleh ekstensi dari korpus kavernosum dan korpus spongiosum. Pada saat ereksi, maka rongga-rongga ini akan terisi oleh darah karena adanya vasodilatasi *a. helicinae* sehingga menekan vena dan membuat penis ereksi.

Skrotum adalah sebuah kantong yang berisikan testis dan sperma. Kantong ini terbagi menjadi dua bagian yaitu kiri dan kanan yang dipisahkan oleh septum. Bagian kiri dari skrotum biasanya lebih rendah dari bagian kanan. Bentuk dan ukuran skrotum bervariasi antar individu dan berubah menurut kondisi. Pada waktu udara dingin *m. dartos* berkontraksi membuat kulit skrotum keriput. Sebaliknya pada udara panas kulit skrotum menjadi longgar. Keadaan ini berkaitan dengan fungsi skrotum untuk mempertahankan suhu yang optimal sehingga proses spermatogenesis dapat berlangsung dengan baik dan sempurna.


Testis berbentuk ovoid, berat 10-14 gram, mempunyai panjang 4 cm, ukuran antero-posterior 3 cm dan lebar 2,5 cm. Testis terdiri dari tiga lapisan yaitu *tunica vaginalis*, *tunica albuginea* dan *tunica vasculosa*. Testis berfungsi menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron.

Epididymis berbentuk suatu saluran yang berkelok-kelok sepanjang 5-6 m, merupakan tempat

terjadinya maturasi dan transmisi sperma. *Epididymis* berlanjut menjadi *ductus deferens*, sebagai saluran tempat mengalirnya spermatozoa dari testis hingga ke uretra. Dindingnya mempunyai lapisan otot yang tebal sedangkan lumennya sangat kecil.

Vesikula seminalis ada dua buah, terletak simetris antara *vesica urinaria* dan *rectum*. Berupa kantong dengan ukuran 5 cm, volume 1,5-5 cc. Vesicula yang kanan biasanya lebih besar daripada yang kiri. Sekret dari vesicula seminalis adalah cairan kental dan basa yang kaya akan fruktosa berfungsi untuk memberi nutrisi dan melindungi sperma.

Prostat terdiri dari kelenjar (50%) dan jaringan ikat fibromuscular (25% miofibril otot polos dan 25% jaringan ikat). Mempunyai bentuk seperti piramid terbalik dengan basis menghadap ke arah *collum vesica* dan *apex* menghadap ke arah diafragma urogenitalia. Mempunyai tiga lobus yaitu dua buah *lobus lateralis* dan sebuah *lobus medius*. Kedua *lobus lateralis* dihubungkan satu sama lain di sebelah *ventral uretra* oleh *isthmus prostat*. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 10. 2. Kelenjar Prostat

Prostat mengeluarkan cairan basa menyerupai susu yang menetralkan asiditas vagina selama kopulasi dan meningkatkan motilitas sperma yang akan optimum

pada pH 6,0-6,5. Kelenjar prostat membesar saat remaja dan mencapai ukuran optimalnya pada laki-laki di atas umur 20 tahun. Pada banyak laki-laki ukurannya terus bertambah seiring pertambahan usia. Saat berusia 70 tahun dua pertiga dari semua laki-laki mengalami hipertrofi lobus medius prostat yang dapat mengganggu pengeluaran urin.

2. Sistem Genitalia Wanita

Seperti halnya organ genitalia pria, organ genitalia wanita (feminina) juga terdiri dari organ genitalia interna dan organ genitalia eksterna. Organ genitalia interna terdiri dari ovarium, tuba uterine, uterus, dan vagina. Sedangkan organ genitalia eksterna terdiri dari mons pubis, labium majus, labium minus, vestibulum vagina, clitoris, bulbus vestibule, Glandula vestibularis major (kelenjar Bartholini), dan Glandula vestibularis minor (kelenjar Skene). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 10. 3. Organ Genitalia Feminina

Ovarium adalah suatu organ yang homolog dengan testis. Sebelum mengalami ovulasi pertama, permukaan ovarium halus dan berwarna pink. Setelah mengalami beberapa kali ovulasi, maka permukaannya

menjadi kasar oleh karena follikel terisi oleh jaringan ikat dan berwarna abu-abu. Ukuran panjang ovarium adalah kira-kira 4 cm, lebar 2 cm tebal 1 cm, berat 7 gram, dan dipengaruhi oleh usia dan siklus haid.

Tuba uterina terdiri atas dua saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya ovum dari ovarium menuju ke uterus. Proses fertilisasi terjadi di sini. Memiliki panjang kira-kira 10 cm dengan diameter 2 cm. Terbagi menjadi empat bagian yaitu *pars interstitialis*, *isthmus*, *ampulla*, dan *infundibulum*. Pada ujung *tuba uterina* terdapat *fimbria tubae*, berupa tonjolan-tonjolan kecil, irreguler berfungsi untuk menangkap ovum yang dikeluarkan ovarium.

Uterus adalah organ muscular, berdinding tebal, mempunyai bentuk seperti buah *peer*. Ukuran panjangnya 7,5 cm, lebar 5 cm, dan tebal 3-4 cm. Uterus terletak dalam rongga pelvis dengan posisi yang sangat bervariasi. Terbagi menjadi empat bagian yaitu fundus uteri, korpus uteri, *isthmus uteri*, dan serviks uteri.

Vagina adalah organ yang berfungsi sebagai jalan lahir, mengalirkan darah haid, dan juga untuk kopulasi. Vagina sangat elastis terutama bagian yang berada di sebelah cranial diafragma pelvis. Lumen vagina berbentuk huruf "H" pada penampang melintang. Pada *nullipara (virgin)* terdapat *hymen*, yaitu lipatan mukosa yang terdapat pada ujung vagina ketika bermuara ke dalam vestibulum vagina. Ada berbagai bentuk *hymen*, seperti cincin (*anularis*), *semilunaris*, *cribriformis*, *fimbriatus*, dan *imperforatus*. Apabila *hymen* robek pada coitus pertama, maka sisa-sisanya yang masih tertinggal disebut *caruncula hymenalis*.

Mons pubis adalah suatu penonjolan yang berada di sebelah ventral *symphysis os pubis*, dibentuk oleh

jaringan lemak. Pada usia pubertas, *mons pubis* ditumbuhi rambut yang kasar.

Labium majus terdiri atas dua buah *labia majora*, yang membatasi suatu celah yang disebut *rima pudendi*, dibentuk oleh lipatan kulit yang letaknya mengarah *caudal-dorsal*, mulai dari *mons pubis*.

Labium minus berbentuk dua buah lipatan kulit yang kecil terletak di sebelah medial *labium majus*, permukaannya licin, tidak mengandung jaringan lemak, berwarna merah muda.

Vestibulum vagina adalah suatu celah yang terdapat diantara kedua *labia minora* dan di tempat ini terdapat muara dari vagina (*orificium vagina*), *ostium uretra eksternum* dan muara dari *ductus ekskretorius glandula vestibularis*.

Clitoris homolog dengan penis, terdiri dari jaringan erektil sehingga dapat ereksi. Ukuran panjangnya 2,5 cm, dibentuk oleh dua buah *corpora cavernosa* dan ditutupi oleh kedua *labia minora*.

Glandula Bartholini terdiri dari dua buah kelenjar kecil berbentuk bundar, berada di sebelah dorsal *bulbus vestibuli*. Saluran keluar dari kelenjar ini bermuara pada celah yang terdapat di antara *labium minus* dan tepi *hymen*. Glandula ini homolog dengan *glandula bulbouretralis* pada pria. Kelenjar ini tertekan pada waktu *coitus* dan mengeluarkan sekresinya untuk membasahi (melicinkan) permukaan vagina di bagian *caudal*.

B. Pemeriksaan Fisik Sistem Genitalia

1. Pemeriksaan fisik genitalia pria (*masculina*)

Beberapa keluhan yang membawa pasien ke klinik atau rumah sakit adalah nyeri pada organ-organ genitalia, gangguan ereksi (*impoten*), atau gangguan

anatomik pada organ genitalia berupa *fimosi* atau *parafimosi*.

Pada pemeriksaan fisik organ genitalia perlu diperhatikan posisi pasien dan pemeriksa. Bila mungkin, pemeriksaan genitalia pria dilakukan pada pasien dengan posisi berdiri, tetapi tekniknya dapat diubah pada pemeriksaan pasien yang harus berbaring di tempat tidur. Sebelum melakukan pemeriksaan, jelaskan tiap-tiap bagian prosedur pemeriksaan dan berilah instruksi.


Untuk memeriksa pasien dalam posisi berdiri, posisi pemeriksa tepat di samping pasien, tidak berhadapan-hadapan muka. Ujung kaki pemeriksa tepat berada di lateral kaki pasien yang sama (kanan atau kiri). Posisi ini akan mempermudah pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan pandangan anatomi yang baik. Kedua kaki pasien sebaiknya terentang sejauh 45 cm. Siapkan sarung tangan, pelumas, dan alat periksa darah samar di tempat yang mudah dijangkau.

Mintalah pasien untuk membuka bajunya dan memperlihatkan genitalianya. Mula-mula, inspeksilah rambut pubis, lalu palpasi daerah lipat paha untuk mengetahui adanya pembengkakan yang ukurannya tetap atau yang dapat mengecil. Kelenjar limfe selalu dapat diraba pada orang dewasa. Bila teraba benjolan, cobalah untuk mengecilkannya dengan mendorong benjolan tersebut dengan hati-hati melalui dinding abdomen.

Mintalah pasien untuk menggulung *preputium* penis ke belakang dan memegang penis ke kanan dan ke kiri (Gambar 10. 4). Lakukan inspeksi pada seluruh bagian penis. Bila perlu, palpasilah *meatus uretra* dan

batang penis. Sediakanlah gelas objek yang bersih bila terdapat pergetahan pada penis. Pergetahan pada *uretritis gonore* khas berwarna hijau pucat, sedangkan *uretritis non spesifik* berwarna lebih jernih. Bila pergetahannya merupakan masalah, mintalah pasien untuk "memerah uretra" dengan tangannya.


Selanjutnya, lanjutkan pemeriksaan pada skrotum dan testis. Dengan hati-hati peganglah bagian bawah dan belakang skrotum dengan dua jari dan palpasilah testis diantara ibu jari dan dua jari lainnya. Dengan hati-hati gerakkan isi skrotum sedikit ke depan dan lanjutkan pemeriksaan dengan visualisasi langsung. Palpasilah setiap testis. Pastikan bahwa kedua testis turun ke dalam skrotum. Bila testis tidak berada dalam skrotum, palpasilah kanalis inguinalis. Bila testis berada dalam kanalis ini, usahakan menariknya ke dalam skrotum. *Undescensus testikularis* sejati tidak dapat dimasukkan dalam skrotum. Bandingkan kedua testis apakah ukurannya sama besar dan apakah ukurannya normal (Gambar 10.5).



Gambar 10. 4. Pasien menggulung preputium
Gambar 10.5. Raba skrotum, palpasi testis

Bila menemukan benjolan pada skrotum, tentukanlah terlebih dahulu apakah benjolan tersebut berasal dari skrotum atau berasal dari bagian tubuh yang lebih atas dan turun ke skrotum. Cobalah memegang puncak benjolan tersebut pada pangkal skrotum. Puncak *hernia* tidak dapat dipegang. Dapat dilakukan transiluminasi untuk memilah massa yang ada dalam skrotum. Gelapkan ruang pemeriksaan dan tekankan lampu senter pada massa tersebut. *Hidrokel sistik* dan *spermatokel* memberikan iluminasi yang cerah. Pada tumor, transiluminasinya negatif.

Pemeriksaan *hernia* perlu dilakukan pada pemeriksaan fisik ini. Beritahukan pada pasien terlebih dahulu bahwa kita akan melanjutkan pemeriksaan *hernia*. Palpasilah dan ikuti *korda spermatica* dengan jari kelingking dari epididimis ke arah dasar penis. Letakkan ujung jari kelingking anda melalui *annulus eksterna* ke puncak kantung skrotum. Ketika jari tersebut bergerak sepanjang *ramus pubis*, putarlah jari anda dan doronglah ke lateral sepanjang kanalis ke *annulus interna*. Sekarang jari anda terletak sejajar dengan *ligamentum inguinale* yang berjalan dari skrotum ke *spina iliaca anterior superior*. Jika tidak menemukan massa, mintalah pasien untuk batuk. *Hernia indirek* akan membentur jari anda pada sudut 90 derajat. *Hernia indirek* akan membentur ujung jari anda (Gambar 10.6).



Gambar 10.6. Pemeriksaan *hernia*
 (Atas) Bantalan jari kelingking diletakkan di *annulus inguinalis eksterna*
 (Bawah) Masukkan jari melalui *kanalis inguinalis* ke *annulus inguinalis eksterna*

Hernia femoralis tidak masuk dalam *skrotum*. Bila *hernia inguinalis* atau *femoralis* diduga sebagai penyebab benjolan, dengarkanlah bunyinya dengan stetoskop. Terdengarnya bising usus memastikan diagnosa.

Selanjutnya lakukan pemeriksaan prostat dengan terlebih dahulu memberitahukan pasien apa yang akan kita lakukan. Pakailah sarung tangan dan oleskan pelumas pada jari yang akan memeriksa. Masukkan jari dengan perlahan ke dalam anus. Dua *lobus lateral* pada kelenjar prostat dapat dibedakan karena adanya *sulkus* pemisah di garis tengah. Konsistensi yang normal seperti karet penghapus. Gerakkanlah jari anda sebanyak 360 derajat. Tanyakan pada pasien apakah ia merasa nyeri ketika kita meraba struktur-struktur di daerah lateral, anterior, dan posterior. Periksa adanya darah samar pada tinja yang ada di sarung tangan.

Berikanlah kertas *tissue* pada pasien dan mintalah pasien untuk berpakaian kembali. Jelaskan penemuan-

penemuan yang anda dapatkan tanyakan hal-hal yang berkaitan ketika anda memeriksa darah samar.

2. Pemeriksaan fisik genitalia wanita (*feminina*)

Beberapa keluhan yang membawa seorang pasien wanita ke klinik atau rumah sakit adalah nyeri ginekologis, berhubungan dengan haid (*dismenore*) ataupun nyeri pada saat koitus (*dispareunia*). Keluhan lain adalah adanya *amenore* baik primer maupun sekunder. *Amenore primer* berarti pasien tidak pernah mengalami haid, sedang *amenore sekunder*, pasien pernah haid tetapi sekarang tidak lagi, mungkin karena kehamilan atau sebab lain. Bercak perdarahan yang ditemukan di antara dua periode haid atau setelah koitus juga harus mendapat perhatian serius dari pemeriksa.

Pemeriksaan *pelvis* yang dilakukan oleh seorang dokter pria harus ditemani oleh asisten wanita. Usahakan pasien tetap santai saat pemeriksaan dengan memberitahunya tentang setiap bagian pemeriksaan dan mengajaknya bekerja sama sepanjang pemeriksaan dilakukan. Jelaskan tujuan pemeriksaan dan tanyakan tentang keluhan-keluhannya. Beritahukanlah pentingnya usaha merelaksasikan otot-otot perut. Perhatikanlah kepekaan anda terhadap perasaan malu pasien jika anda melihat tanda-tanda bahwa pasien enggan diperiksa.

Untuk memberikan pasien perasaan dapat mengendalikan pemeriksaan ini, mintalah pasien untuk menyesuaikan gaun dan posisinya sehingga kontak mata dapat dipertahankan. Mintalah pasien untuk bersantai dan memusatkan perhatian pada bernapas lambat. Bokong pasien harus berada tepat di atas ujung meja pemeriksaan. Sentuhlah pahanya sebelum anda memulai setiap rangkaian pemeriksaan sehingga pasien

mengetahui bahwa pemeriksaan akan dimulai. Pertahankanlah kecepatan pemeriksaan dan metode yang sama sepanjang melakukan pemeriksaan.

Posisi yang terbaik untuk melakukan pemeriksaan adalah posisi *litotomi* dan harus dipakai pada semua kasus, kecuali pada kasus-kasus yang luar biasa. Ingatkan pasien untuk buang air kecil sebelum pemeriksaan. Dengan tumit pasien pada tempat pijakan kaki yang bersudut 45° , mintalah pasien untuk membuka lututnya ke arah luar. Jelaskanlah kepada pasien bahwa rotasi eksternal lutut dapat membantu merelaksasikan otot-otot perut. Duduklah di atas sebuah kursi di antara kedua tungkai pasien dan lakukan pencahayaan yang kuat melalui bahu anda.

Mulailah melakukan inspeksi rambut *pubis*, *perineum*, dan *genitalia eksterna* untuk melihat adanya peradangan dan anatomi *abnormal*. Lalu bentangkanlah kedua labia majora. Di bagian anterior, periksalah klitoris yang ditutupi oleh kedua *labia majora* untuk melihat tanda-tanda iritasi, ulkus, atau pembesaran. Perhatikan *meatus uretra* yang terdapat di bawah klitoris untuk melihat peradangan atau pengeluaran sekret.

Selanjutnya bentangkan labia tersebut lebar-lebar dan minta pasien untuk mengejan sekuat-kuatnya. Hilangnya jaringan penyokong *pelvis* yang biasanya disebabkan oleh kehamilan multipel, dapat menyebabkan uretra atau kandung kemih menonjol ke dalam vagina sebagai *sistouretrikel*. Curigailah adanya lesi ini bila ada riwayat *stress incontinensia*. Di daerah posterior, fenomena ini menyebabkan rektum menonjol ke atas dan keluar vagina sebagai *rektokel*.

Periksalah *hymen*, kelenjar *parauretral*, kelenjar *bartolini* dan *vestibulum vagina*. Pada wanita yang

mempunyai kehidupan seksual yang aktif, struktur-struktur ini tidak dapat dilihat. Jika dapat dilihat membengkak dan nyeri tekan, kemungkinan besar disebabkan oleh infeksi.

Lanjutkan pemeriksaan inspeksi dengan menggunakan spekulum. Hangatkanlah spekulum tersebut dan masukkanlah ke dalam vagina dengan memakai air sebagai pelumas, karena *jelly* atau vaselin dapat mengganggu pemeriksaan sitologik. Masukkanlah spekulum dengan daun-daunnya dalam posisi vertikal. Perbesarlah *introitus vagina* dengan mendorong *perineum* ke arah *posterior*. Pada pasien muda, masukkanlah satu atau dua jari ke dalam vagina untuk membentangkan *introitus* dan untuk memberikan tekanan ke arah *posterior*. Jika anda meraba *serviks* dengan satu ujung jari maka spekulum dapat diarahkan hingga *serviks* dapat divisualisasikan. Hindarilah penekanan pada *uretra anterior* dan *klitoris*, karena struktur-struktur ini sangat sensitif terhadap tekanan. Bila spekulum telah dimasukkan, putarlah daun-daunnya berada dalam posisi horizontal dan bentangkanlah daun-daun tersebut sampai *serviks* terlihat di antara kedua daun. Dinding lateral vagina dapat dilihat dan harus berada dalam keadaan lembab dan bergelombang. *Serviks* mempunyai *orifisium* yang berbentuk garis "mulut ikan". Biasanya sekret *serviks* yang jernih dan encer dapat terlihat.

Pada saat membuka *serviks* dengan *spekulum* kita dapat melakukan pemeriksaan *Papanicolaou*, sebuah pemeriksaan yang sangat penting untuk mendeteksi dini adanya keganasan uterus. Biasanya diambil dua hapusan. Mula-mula spatula kayu yang dipotong secara khusus dimasukkan ke dalam *orifisium serviks* dan diputar 360° untuk mengerok daerah pertemuan antara

serviks dan *endoserviks*. Lalu dihapuskan pada sebuah gelas objek dan segera difiksasi. Kemudian dilakukan hapusan kedua pada bagian *forniks posterior* dan dihapuskan pada gelas objek lain. Setelah selesai tariklah *spekulum* keluar dari vagina dengan membiarkan kedua daunnya terbuka sebagian supaya tidak ada jaringan vagina yang terjepit.

Setelah itu lanjutkan dengan melakukan palpasi dengan tangan yang memakai sarung tangan dan berpelumas. Mula-mula rabalah kelenjar *bartolini*. Tempat ini sering terinfeksi dan menjadi tempat retensi kista. Lalu raba juga kelenjar *skene* yang terletak di daerah *periuretra*. Sisa-sisa *hymen* juga dapat dilihat dan diraba sebagai lipatan jaringan kecil yang tidak beraturan di sekitar *introitus*.

Jika memeriksa dengan tangan kanan, letakkanlah kaki kanan di atas palang kaki meja dan letakkan siku pada lutut anda. Kemudian masukkanlah jari telunjuk yang berpelumas ke dalam vagina dengan menekan ke arah *posterior* pada *perineum*. Kalau telah terjadi relaksasi, masukkan pula jari tengah anda. Dengan tangan lainnya, palpasilah abdomen, dimulai dari *umbilikus*. Gerakkanlah tangan yang melakukan palpasi ke arah bawah ke arah jari yang berada dalam vagina. Berusahalah untuk menangkap struktur *pelvis* di antara jari-jari tangan anda yang berada di dalam vagina dan di luar vagina. Pemeriksaan ini disebut pemeriksaan *bimanual*.

Rabalah uterus, yang memiliki konsistensi lunak seperti ujung hidung, dan selama kehamilan lebih teraba seperti daun telinga. Dengan *serviks* ditekan oleh jari-jari yang berada di dalam vagina, tangan lainnya mendorong uterus sehingga terletak di antara kedua

tangan tersebut. Saat meraba uterus perhatikan posisi, ukuran, tekstur, mobilitas, nyeri tekan, bentuk, dan iregularitas.

Lalu gerakkan jari-jari tangan ke salah satu sisi *serviks* dan tangan lainnya ke sisi yang sama di abdomen untuk meraba ovarium secara *bimanual*. Organ ini biasanya sulit diraba terutama kalau wanita tersebut gemuk atau tegang. Bila teraba, ukuran dan konsistensinya seperti tiram kecil dan cenderung untuk menggelincir di antara jari-jari tangan anda. Biasanya *tuba fallopii* tidak dapat diraba.


Lengkapilah pemeriksaan dengan palpasi *rektovaginal*. Gantilah sarung tangan dan masukkan jari telunjuk ke dalam vagina dan jari tengah ke dalam *rektum*. Dengan cara ini kantong *Douglas* dan semua kelainan yang sering menjalar ke kantong ini terletak di antara jari tangan kita. Pemeriksaan ini juga dapat dibantu dengan pemeriksaan *abdominal*.

BAB XI

PEMERIKSAAN FISIK SISTEM REKTOSIGMOID

A. Anatomi Fisiologi Sistem Rektosigmoid

Bagian akhir dari saluran pencernaan adalah usus besar. Usus besar terdiri dari caecum, rektum dan kolon. Kolon terbagi atas kolon ascenden, kolon transversal, kolon descendes dan kolon sigmoid. Rektum dan kolon kemudian akan berakhir pada anus (dubur). Sehingga bagian ini sering juga disebut sebagai rektosigmoid. (Gambar berikut)



Gambar. Saluran Pencernaan Manusia

Rektum merupakan kantung yang berfungsi menampung tinja (*faeces*). Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara tinja. Jika rektum telah penuh dengan tinja, maka akan menimbulkan rangsangan yang disebabkan oleh adanya peregangan pada dinding rektum sehingga timbul rasa ingin buang air besar (defekasi). Jika defekasi tidak terjadi, sering kali material akan dikembalikan ke usus besar, dimana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi dalam waktu yang lama, maka akan terjadi pengerasan tinja dan konstipasi.

Anus merupakan bagian akhir dari kolon yang panjangnya 2,5 - 4 cm menuju perineum. Saluran anus ini dikelilingi otot spingter eksternal dan spingter internal yang selalu tertutup kecuali saat flatus dan defekasi. Otot spingter eksternal bekerja berdasarkan kesadaran, sedangkan otot spingter internal bekerja di luar kesadaran. Terdapat jaringan epitel skuamosa yang tersusun sekitar anus, yang sangat memungkinkan terjadi infeksi karena melebar di sepanjang spingter. Sambungan ini ditandai dengan warna yang lebih gelap dan ditumbuhi rambut. Di bagian anus juga terdapat pleksus venosus yang hanya memiliki hubungan dengan zona hemoroidalis.

B. Pemeriksaan Fisik Sistem Rektosigmoid

Keluhan yang sering dirasakan pasien adalah nyeri rektum. Nyeri ini biasanya disebabkan oleh kelainan setempat dan jarang disebabkan oleh proses yang terjadi di tempat lain. Tenesmus rektum adalah rasa nyeri pada waktu mengejan (buang air besar). Ini seringkali disebabkan oleh kelainan setempat yang mengiritasi. Tenesmus dengan *faeces* normal

menunjukkan adanya hemoroid yang mengalami thrombosis. Timbulnya masalah yang sama berulang-ulang disertai pengeluaran darah secara tiba-tiba menunjukkan adanya hemoroid yang mengalami thrombosis. Pasien seperti ini khas duduk pada satu bokong sementara menceritakan penyakitnya.

Keluhan lain berupa gatal dan rasa terbakar, kemungkinan disebabkan oleh infeksi jamur pada pasien diabetes atau infeksi cacing.

Keluarnya darah merah segar dan melena sering juga ditemukan. Pasien mungkin mengeluh ada gumpalan di dalam rectum atau tonjolan keluar. Perhatikan pula ukuran *faeces*. Bila akhir-akhir ini *faeces* berubah menjadi seperti "pensil", curigailah adanya stenosis yang menetap. Bila *faeces* mengecil secara intermitten curiga adanya spasme.

Keluhan yang paling sering ditemukan adalah konstipasi dan diare. Obstruksi pada saluran dapat menyebabkan diare, bukan konstipasi. Dengan adanya penumpukan *faeces* dalam jumlah yang berarti, *faeces* yang cair mungkin merupakan bentuk satu-satunya yang dapat lewat. Sehingga mungkin akan ditemukan diare bukan konstipasi, karena usus akan berusaha mengencerkan *faeces* yang menumpuk tadi.

Setelah mengetahui riwayat penyakit pasien, maka siapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Ajarkan pasien untuk melakukan tehnik relaksasi dan tarik napas yang dalam yang akan digunakan saat pemeriksaan.

Mintalah pasien untuk berpaling atau memutar tubuhnya dan membungkuk di atas meja periksa. Posisi apa saja yang dapat memfleksikan finggul sebenarnya

cukup memadai untuk pemeriksaan rectum. Pada posisi **Sim**, pasien berbaring pada sisi tubuhnya dan menarik lutunya ke atas ke arah dada. Pada posisi *knee-chest*, lutut dan dada pasien menyentuh meja periksa dengan melipat pantatnya. Cara terbaik adalah meminta pasien berdiri dengan kedua kaki berjarak sekitar 45 cm, membungkuk pada pinggang sehingga dada menempel pada meja periksa. Pemeriksaan ini memang tidak menyenangkan, pasien akan selalu merasa tegang, menarik kedua bokongnya dan mengetatkan spingter rektumnya. Pada keadaan ini, ingatkan pasien untuk menarik napas dalam dan perlahan. Mulailah memeriksa dengan merentangkan kedua bokongnya, lalu lakukan inspeksi dengan cermat pada anus dan perineum. Perhatikan, kulit di sekitar anus akan berwarna lebih gelap dibanding daerah sekitarnya. Di daerah perineum yang terlihat lembab dengan ditumbuhi sedikit rambut, lihat dan amati adanya luka atau lecet, scar, inflamasi, abses perirektal, hemoroid eksternal, fistula, tumor atau bahkan infeksi.

Lakukan pemeriksaan digital seperti nampak pada gambar sebelumnya. Pakailah sarung tangan dan kemudian oleskan pelumas pada jari yang akan memeriksa. Letakkanlah bantalan, bukan ujung jari telunjuk pada anus dan mintalah pasien untuk mengejan seperti sedang buang air besar. Tekanlah dengan jari telunjuk tersebut dan gerakkan perlahan-lahan ke depan melalui spingter. Secara perlahan-lahan tetapi pasti, masukkan seluruh panjang jari telunjuk anda. Pemeriksaan dengan jari mampu mencapai kedalaman 6-10 cm. Palpasi bagian sub kutan dan spingter eksternal dengan memutar jari untuk memeriksa otot yang berbentuk cincin dan identifikasi adanya garis spingter.

Lakukan palpasi dalam dari spingter internal dengan melalui spingter eksternal dan jaringan sekitarnya untuk mengkaji otot levator ani, lalu palpasi bagian lateral dan bagian posterior dengan cara menyentuh dinding rektal yang satu dengan dinding rektal yang lain. Palpasi mukosa saluran anal, periksa adanya tumor dan polip. Lalu palpasi daerah koksigs dengan menggunakan pemeriksaan bimanual jari telunjuk dan ibu jari. Untuk palpasi dinding lateral rektum, putar jari telunjuk ke sisi rektum dimana tulang iskia dan sakrotuberus akan dapat diidentifikasi. Untuk mengidentifikasi prostat pada pasien laki-laki, lakukan palpasi dinding anterior dari rektum, lakukan hal yang sama untuk meraba serviks pada wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaronson, PI, Ward JPT. *At a Glance Sistem Kardiovaskuler*. Terjemahan dr. Juwalita Surapsari Edisi ketiga, Erlangga, 2010.
- Epstein, Owen, dkk. *Clinical Examination*, Third Edition,. Toronto: Mosby. 2003
- Faiz O., Moffat D. *At a Glance Anatomy*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.
- Gleadle, J. *At a Glance Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik*. Alih Bahasa dr Annisa Rahmalia; Erlangga, 2003.
- Glynn, TJ, Burnside, JW. *Diagnosis Fisik*. Penerjemah dr. Henny Lukmanto, Edisi 17, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran (EGC), 1995.
- Greenstein, B, Wood, DF. *At a glance Sistem Endokrin*. Terjemahan dr. Elizabeth yasmine, dr. Asri dwi rachmawati; Edisi kedua, Penerbit Erlangga, 2010.
- IDI, *Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia*, tp.tt.
- Jane, C, Melvyn, D. *Anatomi dan Fisiologi untuk Bidan*. Alih bahasa Brahm U. Pendit, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran (EGC), 2006.
- Kaharuddin, T. *Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia*, Cet.I, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Lampiran SK PB IDI No.315/PB/A.4/88 tentang Aturan Aturan Rekam Medik.


- Lumbangtobing, SM. *Neurologi Klinik, Pemeriksaan Fisik dan Mental*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Makatutu, A, dkk. *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*. Jilid I, Makassar: Perdoski, 2002.
- Saladin, Kenneth, S. *Human Anatomy*. third edition, Mc. Graw-Hill, 2011.
- Setiawati, S, Dermawan AC. *Panduan Praktis Pengkajian Fisik Keperawatan*, Edisi ketiga, Jakarta: Trans Info Media, 2008.
- Siregar, H, dkk. *Neuro Fisiologi*, Edisi Ketiga, Bagian Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Unhas, 1994.
- Swartz, MH. *Intisari Buku Ajar Diagnostik Fisik*, Alih bahasa dr. Ferdian Endrawan Pratama, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran (EGC), 1997.
- Thaller, SR, Granick MS. *Diagram Diagnostik Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan*, Alih bahasa Dr. Petrus Andrianto, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran (EGC), 1993.
- Tim Pengajar Bagian THT FKUI. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Telinga Hidung Tenggorokan*. Edisi ketiga, FKUI Jakarta, 1997.

BIODATA PENULIS



Rosdianah, lahir di Donggala, salah satu kota di Sulawesi Tengah pada tanggal 8 Juni 1971. Gelar Dokter diperoleh dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1996. Gelar Master dalam bidang Kesehatan diperoleh di Universitas yang sama pada tahun 2004. Sebelum menjadi Dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bertugas di Puskesmas Lampasio Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah sebagai Kepala Puskesmas sejak tahun 1997 sampai tahun 2009. Pada tahun 2008, mendapat penghargaan sebagai dokter teladan tingkat nasional. Saat ini, selain sebagai Dosen juga dipercayakan menjadi ketua Poliklinik UIN Alauddin Makassar.

PEMERIKSAAN FISIK
DIAGNOSTIK



ROSOTANAH



ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS
082348671117 - au_press@yphoo.com

