

# JURNAL KESEHATAN

## FAKULAS ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VOLUME V No. 2 | 2012

ISSN : 2086 - 2555

- Surya Ningsih* Analisis Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas (HKSA) Dari Senyawa Aktif Antibakteri Analog N-Alkil Imidazol Pada Bakteri *Escherichia coli* Dengan Parameter Elektronik Metode AMI
- Syisnawati* Hubungan Perawatan Payudara Dengan Kelancaran Asi Pada Ibu Masa Nifas Diruangan Nifas RSIA Siti Fatimah Makassar
- Rosdianah* Penilaian Kinerja Puskesmas Dengan *Balanced Scorecard*
- Darmawansyih Syakir* Pre eklampsia dan Eklampsia
- Azriful* Surveilans Puskesmas Menuju Target MDGs
- Isriany Ismail* Sediaan *Gastroretentive*; Memperbaiki Bioavailabilitas Obat Melalui Optimalisasi Absorpsi Pada Gastrointestinal
- Rini Fitriani* Gambaran Angka Kejadian Atoni Uteri di RSIA. Siti fatimah Makassar Tahun 2011
- M. Fais Satrianegara* Aplikasi Manajemen Sumber Daya Manusia terhadap Komitmen Pimpinan pada Kualitas Pelayanan Rumah Sakit
- Gemy Nastity Handayani* Interaksi Obat Asam Urat Dengan Makanan

JURNAL	VOL.	NO.	HALAMAN	MAKASSAR	ISSN
KESEHATAN	V	2	111 - 220	DESEMBER 2012	2086 - 2555

# JURNAL KESEHATAN

Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

ISSN : 2086 -2555

**Penanggungjawab**

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

**Penyunting Ahli/Mitra Bestari**

H. Rasyidin Abdullah

Heni Hadju

Gemini Alam

Ariyanti Saleh

**Ketua Penyunting**

M. Fais Satrianegara

**Wakil Ketua Penyunting**

Muhammad Anwar Hafid

**Sekretaris Penyunting**

Muhammad Fitrah

**Penyunting Pelaksana**

Fatmawaty Mallapiang

M. Arif Alim

Wahyudin G.

Andi Susilawaty

Nurhidayah

Gemy Nastity H.

Sitti Saleha

Andi St. Rahma

**Tata Usaha dan Distribusi**

Lina Sandol

Nurman Najib

Siti Fatimah

Suhartono

**Penyelaras Penyunting**

H. Abd. Said (Bhs. Inggris)

Muh. Saleh Syamsuri (Bhs. Arab)

**Alamat Redaksi**

Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata-Gowa Sulawesi Selatan

Telp. (0411) 424835 / Fax. (0411) 424836

Email : [jurnalfik@yahoo.co.id](mailto:jurnalfik@yahoo.co.id)

# JURNAL KESEHATAN

Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

## DAFTAR ISI

Analisis Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas (HKSA) Dari Senyawa Aktif Antibakteri Analog N-Alkil Imidazol Pada Bakteri <i>Escherichia coli</i> Dengan Parameter Elektronik Metode AM1..... <i>Surya Ningsih</i>	111
Hubungan Perawatan Payudara Dengan Kelancaran Asi Pada Ibu Masa Nifas Diruangan Nifas RSIA Siti Fatimah Makassar ..... <i>Syisnawati</i>	123
Penilaian Kinerja Puskesmas Dengan <i>Balanced Scorecard</i> ..... <i>Rosdianah</i>	130
Pre eklampsia dan Eklampsia ..... <i>Darmawansyih Syakir</i>	140
Surveilans Puskesmas Menuju Target MDGs ..... <i>Azriful</i>	150
Sediaan <i>Gastroretentive</i> ; Memperbaiki Bioavailabilitas Obat Melalui Optimalisasi Absorpsi Pada Gastrointestinal ..... <i>Isriany Ismail</i>	161
Gambaran Angka Kejadian Atoni Uteri di RSIA. Siti fatimah Makassar Tahun 2011 ..... <i>Rini Fitriani</i>	174
Aplikasi Manajemen Sumber Daya Manusia terhadap Komitmen Pimpinan pada Kualitas Pelayanan Rumah Sakit ..... <i>M. Fais Satrianegara</i>	183
Interaksi Obat Asam Urat dengan Makanan ..... <i>Gemy NastityHandayani</i>	195
Penyakit Arteri Perifer pada Penderita Diabetes Mellitus ..... <i>Asriani</i>	204
Efek Terapi Anti-Psikotik Tipikal ..... <i>Azizah Nurdin</i>	210

## ANALISIS HUBUNGAN KUANTITATIF STRUKTUR-AKTIVITAS (HKSA) DARI SENYAWA AKTIF ANTIBAKTERI ANALOG N-ALKIL IMIDAZOL PADA BAKTERI *Escherichia coli* DENGAN PARAMETER ELEKTRONIK METODE AM1

Surya Ningsih  
Program Studi Farmasi  
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

### ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah menentukan model persamaan matematis Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas dari senyawa aktif antibakteri analog N-alkil imidazol terhadap bakteri Escherichia coli dengan parameter elektronik menggunakan metode semiempiris AM1.*

*Telah dikaji Hubungan Kuantitatif Struktur Aktivitas (HKSA) pada seri senyawa analog N-alkil Imidazol menggunakan parameter elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model persamaan matematis HKSA dari senyawa aktif antibakteri N-alkil imidazol terhadap bakteri Escherichia coli dengan parameter elektronik menggunakan metode semiempiris AM1. Pemilihan model persamaan terbaik ditentukan dari analisis regresi multilinear dan dilanjutkan menggunakan metode validasi silang leave-one-out.*

*Alternatif model persamaan HKSA terbaik menunjukkan bahwa aktivitas merupakan fungsi linear dari muatan bersih atom N2 dan C3, momen dipol, dan panas pembentukan yang dinyatakan dalam persamaan:*

$$\text{Log}(1/C) = 70,318(\pm 38,243) - 967,741(\pm 240,622)qN_2 + 1868,876(\pm 453,406)qC_3 + 26,535(\pm 6,209)DP + 0,064(\pm 0,010)HF$$

*Hasil analisis validasi silang memberikan data parameter pengujian relatif minimal yaitu PRESS= 3,530 dan SEP= 0,542.*

*Untuk memprediksi harga aktivitas biologis senyawa aktif antibakteri analog N-alkil Imidazol hanya diperlukan muatan bersih atom dari atom pada posisi N<sub>2</sub> dan C<sub>3</sub>*

**Keywords:** HKSA, N-alkil Imidazol, parameter elektronik, validasi silang

### PENDAHULUAN

Hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas (HKSA) hadir dalam usaha menghubungkan struktur atau sifat deskriptor dari suatu senyawa obat dengan aktivitasnya. HKSA merupakan bagian penting rancangan obat dalam usaha mendapatkan suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, selektivitas yang lebih tinggi, toksisitas atau efek samping sekecil mungkin dan kenyamanan yang

lebih besar. Deskriptor-deskriptor fisikokimia ini, terdiri dari beberapa parameter yang digunakan untuk menghitung sifat elektronik yang ditentukan secara empiris atau lebih baru dengan menggunakan metode komputasi. Kimia komputasi adalah cabang dari ilmu kimia yang menggunakan komputer untuk membantu memecahkan masalah dalam bidang kimia. Kimia komputasi menggunakan hasil teori kimia dan memasukkannya ke dalam program komputer untuk menghitung struktur dan sifat dari suatu molekul atau zat. Ilmu ini digunakan secara luas untuk merancang obat baru.

Perkembangan kimia komputasi, terutama dalam penerapan perhitungan kimia kuantum yang berlangsung dengan pesat memungkinkan untuk dilakukannya pemodelan molekul dan eksplorasi sifat fisikokimia suatu struktur molekul. Metode kimia kuantum yang sering digunakan dalam perhitungan senyawa organik adalah metode AM 1, yang dapat digunakan untuk menentukan parameter dalam analisis hubungan struktur yaitu parameter muatan atom-atom dengan aktivitas biologis suatu senyawa. Metode ini juga sangat berguna untuk unsur-unsur yang telah diparameterisasi yaitu atom-atom pada periode kedua, atom-atom golongan halogen dan beberapa atom lainnya. Sifat fisikokimia yang dihitung dengan metode kimia kuantum semiempiris tersebut dapat diterapkan dalam analisis HKSA menggunakan model Hansch.

Penemuan bahan-bahan antibakteri baru ataupun pengembangan antibakteri yang telah ada menjadi suatu langkah yang sangat penting, karena resiko efek samping dan resistensi organisme terhadap obat yang ada. Resistensi bakteri patogen terhadap terapi antibiotik secara cepat menjadi masalah kesehatan yang besar di dunia. Sebagai contoh adalah bakteri *Escherichia coli* yang telah resisten terhadap beberapa jenis antibiotik yaitu streptomisin, ampisilin, neomisin, eritromisin, oksitetrasiklin, kanamisin, trimetoprim-sulfametoksazole, sulfonamide.

Dalam penelitian ini akan digambarkan hubungan antara parameter sifat fisikokimia dengan aktivitas antibakteri dari N-alkil imidazol ditinjau dari nilai Konsentrasi Hambat Minimum (KHN) yang mungkin dapat membantu dalam pengembangan bahan antibakteri yang poten.

Lingkup bahasan dari penelitian ini dibatasi pada analisis hubungan kuantitatif antara sifat struktur elektronik sebagai distribusi muatan atom-atom dengan aktifitas biologis dari senyawa aktif antibakteri analog N-alkil imidazol. Dengan melihat hubungan muatan bersih atom dan aktivitas biologis, dimana muatan atom dari inti akan berubah seiring dengan perubahan bentuk molekul, baik berupa pengurangan atau penambahan substituen.

## TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah menentukan model persamaan matematis Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas dari senyawa aktif antibakteri analog N-alkil imidazol terhadap bakteri *Escherichia coli* dengan parameter elektronik menggunakan metode semiempiris AM1.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Analisis Hubungan Kuantitatif Struktur Aktivitas (HKSA)

Kajian HKSA berkembang karena sangat banyak membantu para ahli dalam hal desain obat terutama dalam hal mengkaji alternatif riset eksperimental yang relatif lebih efisien serta dapat melakukan penghematan dana dan waktu riset eksperimental. Untuk mendesain senyawa obat baru, terdapat sejumlah besar kemungkinan senyawa yang dapat dipilih untuk program sintesis dan belum tentu memberikan hasil yang diinginkan. Penggunaan HKSA dapat dilakukan sebagai pendekatan awal untuk penyeleksian kemungkinan molekul dengan prediksi yang terbaik (1).

Tujuan analisis HKSA yang lain adalah membuat perkiraan dengan penalaran yang rasional, dapat memperkecil jumlah senyawa yang diselidiki, dalam upaya menemukan obat baru. Masalah di sekitar HKSA sangat berbelit-belit, tetapi dengan penalaran yang rasional dan diperhitungkan secara kuantitatif, masalah di sekitar HKSA itu dapat disederhanakan (2).

### 2. Analisis Hansch

Analisis ini merupakan pendekatan matematika yang paling populer terhadap HKSA. Corwin Hansch memperkenalkannya pada awal tahun 1960an.

Penambahan atau pengurangan atom, gugus, atau radikal senyawa induk menyebabkan perubahan sifat-sifat fisikakimia dan reaktivitas kimia senyawa hasil perubahan itu. Jika senyawa hasil modifikasi tersebut (obat) dimasukkan dalam sistem biologis, mungkin menyebabkan perubahan distribusi obat dalam sel dan jaringan, perjalanan obat ke loka aksi yang berupa reseptor atau enzim, laju reaksi dengan loka aksi, dan pola metabolisme dan ekskresi obat. Efek penambahan atau pengurangan substituen menghasilkan perubahan sifat fisikakimia utama, yaitu sifat hidrofobitas atau lipofilitas, elektronik, dan sterik (3).

Model Hanch mengasumsikan aktivitas biologis sebagai fungsi dari parameter-parameter hidrofobitas ( $\pi$ ), elektronik ( $\sigma$ ), dan sterik ( $E_s$ ) yang terdapat pada molekul, yang dapat dinyatakan secara matematis sebagai persamaan 1 berikut:

$$\text{Log } 1/C = a\pi + bE_s + c\sigma + d \quad (1)$$

C adalah kadar obat untuk mendapatkan efek hayati baku tertentu dan notasi  $a, b, c$  dan  $d$  menyatakan tetapan persamaan regresi. Notasi  $\pi$  adalah tetapan hidrofobitas substituen menurut Hansch-Fujita,  $\sigma$  adalah tetapan hammet yang menyatakan sifat elektronik, dan  $E_s$  adalah tetapan substituen sterik menurut Taft. Ketiga parameter tersebut diperoleh dari pendekatan ekstratermodinamika atau model kaitan linear energi bebas (*Linear Free Energy Relationship*), yaitu suatu model matematik yang dikembangkan dari hubungan reaktivitas kimia dengan parameter substituen yang dikemukakan oleh Hammet pada tahun 1938 (2,3).

Analisis Hansch kemudian dikembangkan dengan menggunakan parameter sifat fisikokimia dari struktur molekul atau menggunakan beberapa parameter teoritis. Parameter-parameter tersebut digunakan sebagai variabel bebas yang memberikan aktivitas biologis. Istilah "parameter" sebagai variabel bebas dalam analisis HKSA sering disebut prediktor atau deskriptor (4).

### 3. Deskriptor Kimia Kuantum

Deskriptor kimia kuantum diperoleh dari perhitungan berdasarkan mekanika kuantum terhadap struktur molekul. Metode kimia kuantum dan teknik pemodelan molekul memungkinkan untuk mengkarakterisasi sifat struktural. Ada

---

2 keuntungan yang dapat diambil dari penggunaan deskriptor kimia kuantum dalam studi HKSA, yaitu : (i) senyawa beserta substituen atau fragmennya dapat dikarakterisasi secara langsung hanya berdasar pada struktur molekulnya saja, dan (ii) dapat memperkirakan mekanisme aksi dari senyawa yang dipelajari (5).

#### 4. Perkembangan metode Semiempiris Austin model 1 (AM1)

Metode semiempiris AM1 adalah metode semiempiris generasi ketiga setelah NNDO dan MNDO, dimana kesalahan-kesalahan dalam metode semiempiris yang sebelumnya dapat dikoreksi secara benar. Dengan bantuan komputer, dapat mempercepat perhitungan numeriknya dan kegagalan pada metode sebelumnya dapat diatasi dengan baik, tepat dan benar. Selain itu metode ini dapat digunakan untuk menentukan parameter yang akan digunakan dalam analisis hubungan struktur yaitu parameter muatan atom-atom dan momen dwikutub dengan aktivitas biologis suatu senyawa. Metode AM1 sangat berguna untuk senyawa organik (C, H, O dan N) dan juga untuk unsur-unsur yang telah diparameterisasi yaitu atom-atom pada periode kedua (Li, Be, B, dan F) atom-atom golongan halogen (F, Cl, Br, I) dan atom-atom Al, Si, P, S, Sn, Hg dan Pb (6).

#### 5. Aktivitas Biologis Senyawa Aktif Antibakteri Analog N-alkil Imidazol

Turunan N-alkil imidazol telah diidentifikasi sebagai kandidat senyawa antibakteri yang potensial. Telah dilaporkan bahwa N-alkil imidazol dengan banyak variasi struktur yang sederhana memiliki efek penghambatan terhadap oksidasi mikrosomal dan aktivitas sitotoksik terhadap sel bakteri.


Aktivitas antibakteri senyawa analog N-alkil imidazol terhadap bakteri *Escherichia coli* ditinjau dari segi konsentrasi hambat minimumnya diperlihatkan dengan adanya hubungan antara aktivitas penghambatan dengan variasi substituen pada posisi R<sub>1</sub> pada molekul dan variabel indikator pada posisi R<sub>2</sub> (grup metil) dan posisi R<sub>3</sub> (grup nitro) (7).

## METODE PENELITIAN

### 1. Data yang digunakan

Berupa data set struktur dan aktifitas biologis senyawa aktif antibakteri analog N-alkil imidazol terhadap bakteri *Escherichia coli*.





Tabel 1 Aktifitas biologis senyawa aktif antibakteri analog N-alkil imidazol terhadap bakteri *Escherichia coli*

No.	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	n	Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dalam µg/ml
1	H	H	1	480
2	H	H	2	110
3	H	H	3	99
4	H	H	4	97
5	H	H	5	91
6	H	H	6	50
7	H	H	7	45
8	H	H	8	19
9	H	H	9	208
10	H	H	10	1110
11	H	H	11	14160
12	H	H	12	18750
13	H	H	13	21120
14	CH <sub>3</sub>	H	5	25
15	CH <sub>3</sub>	H	11	17500
16	CH <sub>3</sub>	NO <sub>2</sub>	3	18
17	CH <sub>3</sub>	NO <sub>2</sub>	7	31

## 2. Alat yang digunakan

Perangkat keras berupa satu set komputer yang mampu melakukan perhitungan kimia komputasi dengan spesifikasi :Harddisk 80 GB, perangkat lunak (software) sistem operasi Windows<sup>TM</sup> XP Profesional, perangkat lunak (software) HyperChem<sup>®</sup> 6.0, perangkat lunak (software) SPSS 12.0 for Windows, processor tipe Pentium 4- 2,6 GHz ( Intel<sup>®</sup>), RAM 256 MB.

## Prosedur Penelitian

### 1. Optimasi Geometri

Senyawa yang digunakan sebagai bahan penelitian dibuat struktur dua dimensi ( 2D ) menggunakan paket program HyperChem<sup>®</sup>. Selanjutnya dilakukan penambahan atom H untuk melengkapi strukturnya dan dibentuk menjadi struktur tiga dimensi ( 3D ).

Struktur yang terbentuk dioptimasi geometri menggunakan metode AM1 dengan algoritma Polak–Ribbiere. Struktur yang telah teroptimasi disimpan sebagai *file.hin*. (8).

### 2. Perhitungan Prediktor

Dilakukan perhitungan *single point* dengan menggunakan paket program *HyperChem*<sup>®</sup> pada struktur yang teroptimasi untuk memperoleh parameter elektronik ( $\sigma$ ) berupa muatan bersih atom ( $q$ ) yang terdapat pada molekul (8).

### 3. Analisis Statistik

Dilakukan analisis regresi multilinier dengan muatan bersih atom sebagai variabel bebas terhadap senyawa aktif antibakteri analog N –alkil imidazol yang dinyatakan sebagai  $\log(1/KHM)$  sebagai variabel tergantung.

Pemilihan model persamaan terbaik dilakukan dengan mempertimbangkan parameter statistik  $F$ ,  $R^2$ , SE dan *Predicted Sum Squares* (PRESS) (9). Validasi model persamaan terbaik dilakukan dengan metode validasi silang. Model persamaan terbaik yang diperoleh digunakan untuk memprediksi harga aktifitas antibakteri teoritif setiap senyawa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Dalam penelitian ini diperoleh hasil berupa model persamaan terbaik berdasarkan parameter PRESS sebesar 3,530;  $R^2_{vs}$  sebesar 0,969; SEP sebesar 0,542, dan  $F_{vs}$  sebesar 10,419 dengan persamaan:

$$\begin{aligned} \text{Log}(1/KHM) = & 70,318(\pm 38,243) - 967,741(\pm 240,622)qN_2 + \\ & 1868,876(\pm 453,406)qC_3 + 26,535(\pm 6,209)\mu + \\ & 0,064(\pm 0,010)\Delta H^{\circ}f \end{aligned}$$

## Pembahasan

### Perhitungan Parameter Elektronik

Tiap struktur senyawa analog N-alkil imidazol dilakukan proses optimasi geometri dengan menggunakan metode semiempiris AM1, yang bertujuan untuk menyeragamkan keadaan sistem sehingga struktur berada pada keadaan terstabil.

Metode semiempiris AM1 dipilih karena merupakan metode yang dapat digunakan dalam perhitungan senyawa organik untuk menentukan parameter dalam analisis hubungan struktur yaitu parameter muatan atom-atom dengan aktivitas biologis suatu senyawa. Penggunaan komputer dapat digunakan untuk menaikkan ketelitian hasil yang diinginkan dalam eksperimen.

Dari hasil optimasi geometri dilakukan perhitungan *single point* untuk menyimpan data perhitungan yang meliputi muatan peratom dan energi dari struktur elektronik setiap senyawa.

### Regresi Multilinier

Pada analisis regresi multilinier digunakan muatan bersih atom ( $q$ ) pada posisi C<sub>1</sub>, N<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>, C<sub>4</sub>, dan N<sub>5</sub>, energi panas pembentukan ( $\Delta H^{\circ}_f$ ), dan momen dipol ( $\mu$ ) sebagai variabel bebas terhadap senyawa aktif antibakteri analog N-alkil imidazol yang dinyatakan sebagai  $\log(1/\text{KHM})$  sebagai variabel tergantung untuk membentuk model persamaan HKSA.

Pemilihan variabel bebas ini didasarkan atas posisi C<sub>1</sub>, C<sub>3</sub>, dan N<sub>5</sub> merupakan posisi dimana terjadi substitusi, sedangkan posisi N<sub>2</sub> dan C<sub>4</sub> dipilih karena terdapat pada struktur induk. Energi panas pembentukan memberikan sumbangan berupa energi yang dibutuhkan senyawa untuk membentuk struktur pada keadaan stabil dan momen dipol memberikan gambaran kepolaran senyawa.

Pengolahan data untuk penentuan model persamaan terbaik dengan regresi multilinier digunakan SPSS for Window Ver. 12 dengan menggunakan metoda regresi multilinier stepwise, yaitu metoda regresi reduksi bertahap. Dengan menggunakan teknik pengujian data leave-one-out, dipilih model persamaan terbaik HKSA dengan nilai R atau R<sup>2</sup> mendekati 1 atau -1, nilai SE lebih kecil, jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel maka hipotesa dapat diterima.

Sebaliknya, jika F hitung sama atau lebih kecil dari F tabel maka hipotesa ditolak, nilai signifikansi lebih kecil ( $< 0,05$ ), nilai PRESS lebih kecil dan SEP lebih kecil.

### Penggunaan Parameter Elektronik

Hasil perhitungan elektronik senyawa aktif antibakteri analog N -alkil imidazol berupa data muatan bersih atom, panas pembentukan, dan momen dipol.

### Model Persamaan Terbaik

Dari perhitungan statistik analisis regresi multilinier, diperoleh persamaan Hubungan Kuantitatif Struktur Aktivitas senyawa aktif antibakteri analog N-alkil imidazol terhadap bakteri *Escherichia coli* dengan menggunakan parameter elektronik yang disajikan pada tabel 2.

Tabel 2 Model persamaan terpilih hasil regresi multilinier menggunakan Parameter elektronik metode AM1

Model	Deskriptor	n	m	R	R <sup>2</sup>	SE	F	Sig.
150	C <sub>1</sub> ,N <sub>2</sub> ,μ,ΔH <sup>of</sup>	17	4	0,908	0,824	0,544	14,034	0,000
166	C <sub>1</sub> ,LU,μ,ΔH <sup>of</sup>	17	4	0,900	0,810	0,565	12,797	0,000
176	C <sub>1</sub> ,C <sub>3</sub> ,μ,ΔH <sup>of</sup>	17	4	0,907	0,822	0,547	13,865	0,000
182	C <sub>1</sub> ,C <sub>4</sub> ,μ, ΔH <sup>of</sup>	171	4	0,898	0,807	0,570	12,5101	0,000
201	N <sub>2</sub> ,C <sub>3</sub> , μ, ΔH <sup>of</sup>	7	4	0,908	0,825	0,543	4,115	0,000
221	N <sub>2</sub> ,HO, μ, ΔH <sup>of</sup>	17	4	0,905	0,819	0,552	13,571	0,000
232	C <sub>3</sub> ,C <sub>4</sub> , μ, ΔH <sup>of</sup>	17	4	0,902	0,813	0,561	13,046	0,000
238	C <sub>3</sub> ,LU, μ, ΔH <sup>of</sup>	17	4	0,904	0,818	0,553	13,478	0,000
253	C <sub>4</sub> ,HO, μ, ΔH <sup>of</sup>	17	4	0,898	0,806	0,572	12,435	0,000
259	HO,LU, μ, ΔH <sup>of</sup>	17	4	0,900	0,809	0,566	12,744	0,000

n= jumlah data; m = jumlah variabel yang masuk dalam persamaan; R dan R<sup>2</sup> = koefisien korelasi; SE = standar Error; F = kriteria Fisher hasil analisis ANOVA; Sig. = signifikansi F pada 95%

Pada tabel IV.1 diperoleh sepuluh model persamaan terpilih dari sekitar 500 model hasil perhitungan dengan menggunakan metode AM1, dimana deskriptor yang masuk dalam persamaan sebanyak empat. Model persamaan yang diperkirakan sebagai model persamaan HKSA terbaik adalah model 201, dengan memperhatikan nilai-nilai parameternya yaitu R sebesar 0,908 dan nilai F hitung 14,115 lebih besar dari F tabel yaitu 3,37. Melihat model-model persamaan yang lain juga memiliki peluang yang cukup besar karena nilai parameter yang berdekatan, maka perlu dilakukan uji lebih lanjut .


Untuk menguji validitas model dalam kemampuan memprediksi aktivitas antibakteri senyawa lain diluar data *fitting* regresi, digunakan uji validasi silang (*cross validation test*). Uji validasi silang menggunakan teknik *leave-one-out* yaitu pada n buah data sebuah data dikeluarkan dari data *fitting*. Analisis regresi multilinier diulangi untuk data sebanyak (n-1) dengan menggunakan deskriptor yang masuk dalam model persamaan yang akan diuji. Persamaan regresi yang didapatkan digunakan untuk memprediksi harga aktivitas antibakteri dari data yang dikeluarkan tadi. Proses berulang sampai semua data terprediksi. Pada penelitian ini akan terjadi 17 kali proses perhitungan dari 17 buah data untuk masing-masing model. Nilai PRESS (*Predicted Residual Sum of Squares*) dan parameter statistik uji validasi silang yang lain ( $R^2_{cv}$ , SEP dan  $F_{cv}$ ) digunakan untuk menentukan model persamaan terbaik. Model yang mempunyai nilai PRESS terkecil,  $R^2_{cv}$  yang terbesar (mendekati 1), SEP yang terkecil dan  $F_{cv}$  yang terbesar merupakan model yang terbaik. Parameter statistik hasil uji validasi silang disajikan pada tabel 3.

Tabel 3 Parameter statistik hasil validasi silang *leave-one-out* persamaan HKSA terbaik

Model	PRESS	$R^2_{vs}$	SEP	$F_{vs}$
150	3,658	0,968	0,552	10,083
166	3,841	0,967	0,566	9,768
176	3,640	0,968	0,551	10,083
182	3,910	0,966	0,571	9,470
201	3,530	0,969	0,542	10,419
221	3,664	0,968	0,553	10,083
232	3,780	0,967	0,561	9,768
238	3,684	0,968	0,554	10,083
253	3,928	0,966	0,572	9,470
259	3,854	0,967	0,567	9,768

Dari tabel 3 diperoleh model 201 sebagai model terbaik dengan harga PRESS sebesar 3,530,  $R^2_{vs}$  sebesar 0,969, SEP sebesar 0,542, dan  $F_{vs}$  sebesar 10,419.

Pengujian terhadap aktivitas biologis diperoleh  $R= 0.908$  seperti ditampilkan pada grafik 1



Secara lengkap, model persamaan HKSA terbaik adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Log (1/KHM)} = & 70,318(\pm 38,243) - 967,741(\pm 240,622)qN_2 + \\ & 1868,876(\pm 453,406)qC_3 + 26,535(\pm 6,209)\mu + \\ & 0,064(\pm 0,010)\Delta H^{\circ}f \end{aligned}$$

Dengan nilai  $R = 0,908$ ,  $R^2 = 0,825$ ,  $SE = 0,543$ ,  $F = 14,115$ ,  $Sig = 0,000$ ,  $PRESS = 3,530$ , dan  $SEP = 0,542$ .

Dari persamaan, angka di dalam kurung pada setiap koefisien variabel adalah interval konfidensi 95% dari koefisien variabel tersebut, harga  $R^2 = 0,825$  yang berarti 82,5% variasi nilai data pada variabel tergantung dipengaruhi/ disebabkan karena hubungan keempat variabel tersebut. Harga  $F = 14,115$  dan signifikan  $F = 0,000$  jauh lebih besar dari harga  $F$  tabel = 3,37 dengan begitu harga persamaan prediksi ditolak dengan kemungkinan salah menerima persamaan = 0,00%.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan :

1. Persamaan HKSA terbaik pada senyawa aktif antibakteri analog N-alkil imidazol terhadap bakteri *Escherichia coli* adalah :

$$\text{Log (1/KHM)} = 70,318(\pm 38,243) - 967,741(\pm 240,622)qN_2 +$$

$$1868,876(\pm 453,406)qC_3 + 26,535(\pm 6,209)\mu + 0,064(\pm 0,010)\Delta H^{\circ f}$$

Dengan nilai  $R = 0,908$ ,  $R^2 = 0,825$ ,  $SE = 0,543$ ,  $F = 14,115$ ,  $Sig = 0,000$ ,  $PRESS = 3,530$ , dan  $SEP = 0,542$ .

2. Untuk memprediksi harga aktivitas biologis senyawa aktif antibakteri analog N-alkil Imidazol hanya diperlukan muatan bersih atom dari atom pada posisi  $N_2$  dan  $C_3$ .
3. **Saran**

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dari persamaan ini mengingat besarnya potensi yang terdapat pada senyawa aktif antibakteri analog N-alkil imidazol.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Siswandono. 1995. *Kimia Medisinal*. Airlangga University Press. Surabaya.
2. Sardjoko. 1993. *Rancangan Obat*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
3. Nogrady, T. 1992. *Kimia Medisinal, Pendekatan Secara Biokimia*. Penerbit ITB. Bandung.
4. Lee, K.W., Kwon, S.Y., Hwang, S., Lee, J.U., Kim, H. 1996. Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR) Study on C-7 Substituted Quinolone. *Bull. Korean Chem Soc.* 17, 147-152
5. Leach, A.R. 1996. *Molecular Modelling: Principles and Applications*. Longman. Singapore.
6. Istyastono, E.P., Martono, S. 2005. Hubungan Kuantitatif Struktur – Aktivitas Kurkumin dan Turunannya sebagai Inhibitor GST Kelas  $\mu$ . *Majalah Farmasi Indonesia* (hal. 204 – 213).
7. Nazneen, Khan, et.al. 2006. QSAR Analysis of N-Alkyl Imidazole Analogues as Antibacterial Agents. *Indian J Pharm Sci*, <http://www.ijpsonline.com/article.asp> diakses 4 Juni 2007
8. Anonim. 1999. *HyperCheme® Release 6.0 for Windows*. Hypercube Inc. Canada.
9. Sembiring, R.K. 1995. *Analisis Regresi*. Penerbit Institut Teknologi Bandung. Bandung.

## HUBUNGAN PERAWATAN PAYUDARA DENGAN KELANCARAN ASI PADA IBU MASA NIFAS DIRUANGAN NIFAS RSIA SITI FATIMAH MAKASSAR

Syisnawati  
Program Studi Keperawatan  
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

### ABSTRAK

*Latar belakang* pembangunan kesehatan di Indonesia yang memasuki periode pembangunan jangka panjang II ditandai oleh tingginya angka kematian ibu (AKI) yaitu 421/100.000 kelahiran hidup dengan merujuk pada data tahun 1992 (sebagai data terakhir). Angka tersebut sekitar 3-6 kali dari angka kematian ibu di negara-negara ASEAN dan lebih dari 50 kali angka kematian ibu di negara maju. Untuk Sulawesi Selatan sendiri angka kematian ibu hamil dan persalinan yang diperoleh dari survey Kamwil dan IBI 1986 adalah 390 / 100.000 kelahiran hidup.

*Metode* : Penelitian ini menggunakan teknik metode deskriptif analisis dengan pendekatan cross sectional, untuk melihat hubungan perawatan payudara dengan kelancaran ASI ibu masa nifas di ruang nifas RSIA Siti Fatimah Makassar

*Hasil* : Berdasarkan hasil penelitian dengan uji statistik Chi-Square ( Fisher's Exact tes ) dan dari hasil odds ratio diperoleh gambaran bahwa perawatan payudara mempunyai hubungan significance dengan kelancaran ASI

*Kata kunci* : ASI, Perawatan Payudara

### PENDAHULUAN

Pembangunan dibidang kesehatan seperti terdapat dalam GBHN 1993 yang ditujukan untuk meningkatkan sumberdaya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup manusia. Peningkatan kualitas kehidupan dan usia harapan hidup ini perlu dinilai sejak dini yaitu sejak masih berada dalam kandungan buah kehamilan yang sehat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mempertahankan kehidupan dan mengembangkan seluruh potensinya. Dewasa ini pembangunan kesehatan di Indonesia yang memasuki periode pembangunan jangka panjang II ditandai oleh tingginya angka kematian ibu (AKI) yaitu 421/100.000 kelahiran hidup dengan merujuk pada data tahun 1992 (sebagai data terakhir). Angka tersebut sekitar 3-6 kali dari angka kematian ibu di negara-negara ASEAN dan lebih dari 50 kali angka kematian ibu di negara



maju. Untuk Sulawesi Selatan sendiri angka kematian ibu hamil dan persalinan yang diperoleh dari survey Kanwil dan IBI 1986 adalah 390 / 100.000 kelahiran hidup.

Salah satu program dari 10 program untuk mencapai “ Indonesia sehat 2010 “ adalah program kesehatan keluarga, kesehatan produksi dan keluarga berencana. Dalam tatanan upaya kesehatan, kesehatan reproduksi menempati prioritas yang tinggi sejak dekade 80 an, dimana ditingkatkan upaya-upaya kesehatan ibu dan anak (KIA).

Rumah sakit ibu dan anak Siti Fatimah Makassar adalah rumah sakit yang melayani pelayanan kesehatan ibu dan anak, milik pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang banyak diminati oleh masyarakat. Rumah sakit ini memiliki ruang keperawatan nifas dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 51 tempat tidur. Selama tahun 2010 pasien yang rawat nginap diruang perawatan nifas berkisar 2.729 orang yang terinci sebagai berikut : Januari – Maret 600 orang, April – juni 769 orang, Juli – September 711 orang dan Oktober – Desember 649 orang. Berdasarkan angka tersebut diatas dilihat cukup tinggi maka peranan rumah sakit dalam hal ini memberi pelayanan kepada masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak perlu ditingkatkan ,diantaranya perawatan ibu post partum yang salah satunya adalah tentang perawatan payudara untuk kelancaran pengeluaran Asi. Mengingat ASI sangat penting bagi pertumbuhan bayi maka ibu nifas perlu melakukan perawatan payudara secara rutin dengan tehnik yang benar supaya pengeluaran ASI menjadi lancar dalam memenuhi kebutuhan bayi . Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul hubungan perawatan payudara dengan kelancaran Asi pada ibu masa nifas.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan perawatan payudara dengan kelancaran ASI pada ibu masa nifas diruangan nifas RSIA Siti Fatimah Makassar.

## **BAHAN DAN CARA PENELITIAN**

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan cross sectional, untuk melihat hubungan perawatan payudara dengan kelancaran Asi ibu masa nifas di ruang nifas RSIA Siti Fatimah Makassar.

### **Populasi.**

Semua ibu masa nifas dirumah sakit ibu dan anak Siti Fatima Makassar.

### **Sampel.**

Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah semua Ibu masa nifas yang rawat nginap diruang nifas RSIA Siti Fatimah Makassar. Tehnik pengambilan sampel adalah total sampel sebanyak 40 responden dengan alasan semua ibu masa nifas memerlukan perawatan payudara pada hari kedua dan ketiga dan waktu perawatan yang singkat dengan kriteria Ibu masa nifas yang rawat nginap diruang perawatan nifas dan bersedia diteliti.

### **Pengolahan data**

Pengumpulan data dilakukan diperawatan nifas RSIA St. Fatimah Makassar, dengan Mengidentifikasi tempat penelitian dan populasi target, Mengajukan surat permohonan izin untuk mengadakan penelitian dari institusi ke di Rektur RSIA St. Fatimah Makassar dan kepala ruangan perawatan nifas. Setelah mendapatkan persetujuan, peneliti melakukan pendekatan kepada calon responden untuk membaca dan menandatangani surat persetujuan responden Kemudian dilakukan pengisian kuesioner yang dilanjutkan dengan pengumpulan kuesioner kembali. Setelah data terkumpul kemudian peneliti mengadakan uji statistik dengan tingkat kemaknaan ( $\alpha$ ) = 0,05 uji statistik yang digunakan adalah Chi-Square dengan menggunakan kumputer program SPSS versi 13

## **HASIL**

### **I. Distribusi responden menurut perawatan payudara diruang nifas RSIA St Fatimah Makassar tahun 2010**

Tabel dibawah menunjukan bahwa yang melakukan perawatan payudara sebanyak 25 orang (62,5 %) sedangkan yang tidak melakukan 15 orang (37,5 %)

**Tabel 1. Distribusi responden menurut perawatan payudara diruang nifas RSIA St Fatimah Makassar tahun 2010**

No	Perawatan payudara	Jumlah	Prosentase
1	Melakukan	25	62,5 %
2	Tidak melakukan	15	37,5 %
	Total	40	100 %

**II. Distribusi responden menurut kelancaran ASI diruangan Nifas RSIA St. Fatimah Makassar tahun 2010**

Tabel dibawah ini menggambarkan bahwa sebanyak 27 orang ( 67,5 %) ASI sedangkan tidak lancar 13 orang (32,5 %).

**Tabel 2. Distribusi responden menurut kelancaran ASI diruangan Nifas RSIA St. Fatimah Makassar tahun 2010**

No	Kelancaran ASI	Jumlah	Prosentase
1	Lancar	27	67,5 %
2	Tidak lancar	13	32,5 %
	Jumlah	40	100 %

**III. Distribusi hubungan perawatan payudara dengan kelancaran ASI pada responden diruangan nifas RSIA St Fatimah Makassar tahun 2010.**

Tabel dibawah ini menunjukkan responden yang melakukan perawatan payudara sebagian besar 23 (92 %) menunjukan ASI lancar, dan hanya sebagian kecil yaitu 2 orang ( 8 %) Asi tidak lancar sedangkan responden yang tidak melakukan perawatan payudara 11 orang (73,3 %) menunjukan ASI tidak lancar dan sebagian kecil 4 orang ( 26,7 %) Asi lancar.

Hasil uji statistik Chi-Square (Fisher's Exact test) diperoleh nilai  $P=0,000$  ( $\alpha = 0,05$ ) berarti hipotesis nol ditolak atau ada hubungan yang bermakna antara perawatan payudara dengan kelancaran ASI dengan nilai odds ratio (OR)= 31,625 (95 % Ci 5,007-199,764) yang artinya yang melakukan perawatan payudara mempunyai peluang 32 kali untuk

kelancaran ASI dibandingkan dengan yang tidak melakukan perawatan payudara.

**Tabel 3. Distribusi hubungan perawatan payudara dengan kelancaran ASI pada responden diruangan nifas RSIA St Fatimah Makassar tahun 2010.**

No	Perawatan payudara	Kelancaran ASI		Total	P value	OR
		lancar	Tidak Lancar			
1	Melakukan	23 (92,0%)	2 (8,0%)	25 (100 %)	0,000	31,625 (5,007- 199,76 4)
2	Tidak Melakukan	4 (26,7%)	11 (73,3 %)	15 (100 %)		
	Total	27(67,5%)	13(32,5%)	40(100%)		

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji statistik Chi-Square ( Fisher's Exact tes ) dan dari hasil odds ratio diperoleh gambaran bahwa perawatan payudara mempunyai hubungan significance dengan kelancaran ASI hal ini didukung pendapat Bobak (2000) yang mengatakan bahwa perawatan payudara dengan masage kemudian disiram dengan air akan membantu produksi ASI, pendapat ini telah dibuktikan melalui hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari 25 responden yang melakukan perawatan payudara sebanyak 23 orang (92 %) menunjukkan ASI lancar sedangkan 2 orang menunjukkan ASI tidak lancar, dikarenakan papilla mammae yang masuk kedalam ,sehingga dapat menyebabkan kegagalan menyusui ( Depkes RI, 1998) hal ini diperkuat juga pendapat Saifuddin (2001) yang mengatakan bila ibu kurang percaya diri dalam kemampuan menyusui dan adanya rasa cemas dapat mempengaruhi kelancaran ASI. Selain itu ibu nifas meneteki bayinya secara dini dan frekwensinya sesuai kebutuhan bayi maka terjadi stimulus pada putting susu yang disebabkan oleh isapan mulut bayi sehingga menimbulkan ereksi niple yang membantu dalam dorongan air susu keluar melalui sinus-sinus laktiferous kearah lubang niple (Depkes RI,1998) hal

ini sesuai dengan penelitian Rosalinda (2002) yang menyatakan bahwa dari 30 responden yang melakukan perawatan putting susu sebanyak 29 orang produksi ASI lancar. Disisi lain pendapat Bobak (2002) mengatakan bila ibu menetek bayinya tetapi hanya pada satu / sebelah payudara akan mempengaruhi kurangnya rangsangan kesaluran susu sehingga suplay ASI berkurang hal ini sesuai hasil penelitian yang diperoleh dari 15 responden yang tidak melakukan perawatan payudara sebanyak 11 orang (73,3%) ASI tidak lancar disebabkan karena informasi yang kurang, kadang-kadang ibu keberatan untuk menyusui bayinya pada hari pertama dengan alasan ASI belum lancar dan tidak pernah melihat demonstrasi cara perawatan payudara ,umumnya yang tidak melakukan perawatan payudara adalah responden dengan primipara.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dan pendapat-pendapat yang dikemukakan diatas maka dapat dikatakan dengan melakukan perawatan payudara ( masage, perawatan putting susu dan menetek sedini mungkin akan membantu kelancaran ASI pada ibu masa nifas).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh nilai  $P= 0,000$  dan nilai odd ratio dengan tingkat kepercayaan 95 % adalah 31,625 ( 5,007 - 119,764) mengenai hubungan perawatan payudara dengan kelancaran ASI maka dapat disimpulkan bahwa “ ada hubungan yang bermakna antara perawatan payudara dengan kelancaran ASI”.

### **Saran - saran**

Pendidikan tentang perawatan payudara pada ibu masa nifas perlu mendapat perhatian Perawat / Bidan yang bertugas dan diberikan secara teratur dan merata sebagai persiapan perawatan payudara dirumah. Kepada peneliti yang lain diharapkan untuk meneliti lebih lanjut hubungan status gizi , psikologi ibu dengan kelancaran ASI ibu massa nifas.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Bobak . 2000. *Perawatan maternitas dan ginekologi*. EGC, Jakarta.
2. Cunningham, et al. 1995. *Obstetri williams*. EGC, Jakarta.
3. Depkes RI. 1988. *pelatihan para medik tingkat nasional dalam peningkatan penggunaan air susu ibu dan rawat gabung*, Perinasia, Jakarta .
4. Farrer H.2000. *Perawatan maternitas*. EGC, Jakarta.
5. Hamilton PM. 1995. *Dasar – dasar keperawatan maternitas*. EGC, Jakarta.
6. Ibrahim.1995. *Perawatan kebidanan jilid III*, Bratara, Jakarta.
7. Manuaba.1998. *Ilmu Kebidanan , Penyakit Kandungan Dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*. EGC, Jakarta.
8. Mochtar.1992. *Sinopsis Obstetri*. EGC, Jakarta.
9. Notoatmodjo. 1993. *Metodologi penelitian kesehatan*. Reneka Cipta, Jakarta.
10. Riadi S, dan Tjokronegoro A. 1998. *Apa yang ingin diketahui tentang Asi*. Gramedia, jakarta
11. Saifuddin. 2001. *Buku Acuan Nasional, Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Yayasan Bina pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta,.
12. Sugiyono. 2002 *Metode penelitian Administrasi*. Alfabet : Bandung
13. Wiknjosastro. 1999. *ilmu kebidanan*. Yayasan Prawiroharjo : Jakarta

## PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS DENGAN *BALANCED SCORECARD*

Rosdianah

Program Studi Keperawatan  
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

### ABSTRACT

*Puskesmas merupakan pusat kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Selama ini citra Puskesmas terpuruk dengan timbulnya banyak keluhan dari pasien maupun keluarganya sehingga Puskesmas harus memperbaiki diri, meningkatkan kinerja seiring dengan perkembangan era globalisasi agar dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya. Sejalan dengan konsep Puskesmas reformasi di era desentralisasi, maka Puskesmas memerlukan penilaian kinerja komprehensif yang dapat menggambarkan aspek input, aspek proses dan aspek output.*

*Balanced scorecard merupakan sekelompok tolok ukur kinerja yang terintegrasi yang berasal dari strategi perusahaan dan mendukung strategi di seluruh organisasi. Balanced scorecard sebagai suatu ukuran kinerja organisasi cocok untuk diadopsi dalam penilaian kinerja Puskesmas karena Balanced scorecard adalah suatu kumpulan ukuran kinerja yang terintegrasi dan komprehensif yang diturunkan dari strategi organisasi yang mendukung strategi organisasi secara keseluruhan. Juga dapat memungkinkan keseimbangan antara kinerja keuangan dan operasional, antara tolok ukur internal dan eksternal dan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang.*

*Penerapan penilaian kinerja Puskesmas dapat dilakukan dengan Balanced scorecard yang memiliki empat perspektif yaitu : 1) pembelajaran dan pertumbuhan, 2) proses bisnis internal, 3) kepuasan customer, 4) keuangan, dengan menjabarkan keempat perspektif tersebut kedalam kegiatan yang dilakukan di Puskesmas.*

**Kata kunci :** *Puskesmas, kinerja, balanced scorecard*

### PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia adalah terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang penduduknya hidup dalam lingkungan sehat dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Tujuan tersebut dapat tercapai dengan memaksimalkan fungsi unit pelayanan kesehatan terdepan yaitu Puskesmas yang dapat menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan masyarakat dan keluarga serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Dalam perkembangannya, Puskesmas telah berhasil memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun, tak sedikit permasalahan yang dihadapi, yang tidak saja berkaitan dengan beban kegiatan pokok yang terlalu banyak, tetapi juga masalah-masalah lain yang terkait dengan rendahnya kemampuan Puskesmas menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, yang membuat citra Puskesmas semakin terpuruk.

Dengan semakin meningkatnya proses globalisasi, adanya perubahan kebijakan sentralistik menjadi desentralistik dan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, maka Puskesmas harus "berganti wajah" termasuk "wajah" dalam pengelolaan yakni pengelolaan yang menekankan pada proses "bisnis", dalam arti lebih menekankan pada kualitas baik kualitas input, proses dan output.

Selama ini, kinerja Puskesmas diukur dengan menggunakan stratifikasi Puskesmas yang lebih berorientasi pada hasil kegiatan (output) dalam bentuk cakupan program dan tidak memperhatikan input dan proses untuk penciptaan dan penambahan nilai bagi kepuasan pasien sebagai penerima pelayanan.

*Balanced scorecard* sebagai suatu ukuran kinerja organisasi cocok untuk diadopsi dalam penilaian kinerja Puskesmas karena *Balanced scorecard* adalah suatu kumpulan ukuran kinerja yang terintegrasi dan komprehensif yang diturunkan dari strategi organisasi yang mendukung strategi organisasi secara keseluruhan. Juga dapat memungkinkan keseimbangan antara kinerja keuangan dan operasional, antara tolak ukur internal dan eksternal dan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang<sup>14</sup>.

#### A. Pengertian Kinerja



Menurut Ruky (2001) istilah kinerja sebenarnya adalah pengalihbahasaan dari kata Inggris "*performance*" yang menurut kamus *The New Webster Dictionary* memiliki tiga arti tergantung konteks kalimatnya yaitu "prestasi", "pertunjukan" dan "pelaksanaan tugas".

Menurut *The Scribner – Bantam English Dictionary*, istilah kinerja berasal dari akar kata "to perform" yang memiliki beberapa "*entries*" yaitu : 1) melakukan, menjalankan, melaksanakan, 2) memenuhi atau menjalankan suatu nazar, 3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab, d) melakukan sesuatu yang diharapkan orang atau mesin.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.<sup>6</sup>

Kinerja adalah penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas pada personel yang memangku jabatan fungsional atau struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personel dalam organisasi.<sup>3</sup>

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi**

Organisasi adalah wadah sekelompok orang yang mempunyai kegiatan terorganisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama<sup>6</sup>. Oleh karena yang mengisi wadah sekaligus melaksanakan rangkaian kegiatan sesuatu organisasi adalah manusia yang memiliki perilaku maka dengan sendirinya organisasi banyak bergantung pada perilaku manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut.

Menurut Gibson (1985), ada tiga variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu variabel individu (kemampuan dan keterampilan, latar belakang dan demografis), variabel psikologis (persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi) dan variabel organisasi (sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur

dan desain pekerjaan). Kemudian oleh Pudjirahardjo (2003) ditambahkan variabel lingkungan eksternal sebagai variabel yang turut mempengaruhi kinerja karyawan.

### C. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan personelnya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>10</sup>.

Penilaian kinerja adalah suatu proses dimana organisasi mengadakan evaluasi terhadap kinerja pekerjaan, yang merupakan umpan balik dan menjadi penuntun untuk memperbaiki kinerja masa depan sehingga organisasi memperoleh manfaat<sup>15</sup>. Tujuan penilaian kinerja ini adalah untuk memotivasi personel dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>10</sup>, memperbaiki kinerja, memberikan umpan balik tentang kualitas kinerja dan mempelajari kemajuan perbaikan yang dikehendaki dalam kinerja. Jadi penilaian kinerja ini dilakukan untuk member tahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain<sup>11</sup>.

Dengan demikian, penilaian kinerja mencakup faktor-faktor antara lain : 1) pengamatan, yang merupakan proses menilai dan menilik perilaku yang ditentukan oleh sistem pekerjaan, 2) ukuran, yang dipakai untuk mengukur prestasi kerja seorang personel dibandingkan dengan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan untuk personel tersebut, 3) pengembangan, yang bertujuan untuk memotivasi personel mengatasi kekurangannya dan mendorong yang bersangkutan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya<sup>3</sup>.

Menurut Sutanto (1997), yang terpenting dalam menyusun penilaian kinerja adalah *validitas* dan *reliabilitasnya*. *Reliabilitas* menggambarkan ke-*ajegan*-nya, *validitas* menjelaskan ketepatannya sebagai alat ukur. Ada dua hal penting berkenaan dengan *validitas* yaitu *validitas isi (content validity)* dan kesesuaiannya dengan landasan konseptualnya (*construct validity*). Hal ini penting karena tidak ada penilaian kinerja yang sempurna.

Model penilaian kinerja Puskesmas yang dikembangkan selama ini merupakan hasil pelaksanaan fungsi-fungsi Puskesmas terdiri dari empat kelompok variabel yaitu : 1) hasil kegiatan pokok Puskesmas, 2) hasil dan cara pelaksanaan manajemen Puskesmas, 3) sumber daya yang tersedia di Puskesmas, 4) keadaan lingkungan yang mempengaruhi pencapaian hasil kegiatan Puskesmas<sup>1</sup>.

#### **D. Puskesmas<sup>12</sup>**

Puskesmas adalah unit pelaksana pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan, disebut sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yakni unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis operasional.

Sebagai UPTD maka Puskesmas memiliki kriteria umum UPTD, terdiri dari : a) tidak melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan dan perizinan, b) mempunyai misi/tugas pokok yang jelas dan tidak berduplikasi atau tumpang tindih dengan unit organisasi lainnya, c) harus didukung oleh tiga factor yaitu sumber daya manusia, anggaran dan sarana/prasarana kerja, d) memiliki rencana, program dan kegiatan pengembangan yang berkelanjutan.

Visi yang akan diwujudkan oleh Puskesmas adalah Kecamatan Sehat. Sedangkan misi yang dimiliki Puskesmas yaitu : 1) menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, 2) memberdayakan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan, 3) memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, digunakan strategi yaitu : 1) mengembangkan dan menetapkan pendekatan kewilayahan yang mantap ditingkat kecamatan, agar pembangunan berwawasan kesehatan selalu diterapkan pada pembangunan di semua bidang, 2) mengembangkan dan menetapkan asas kemitraan serta pemberdayaan masyarakat dan keluarga antara lain melalui Badan Penyantun Puskesmas (BPP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan institusi masyarakat lainnya dalam wujud pembangunan kesehatan, 3) meningkatkan profesionalisme petugas, agar dapat diwujudkan pelayanan yang

efektif, efisien dan berkualitas, 4 ) mengembangkan kemandirian Puskesmas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan kesehatan.

#### **E. *Balance Scorecard***


Konsep *Balanced Scorecard* dikembangkan oleh Robert S.Kaplan dan David P. Norton pada tahun 1990 dari suatu proyek penelitian yang melibatkan seluruh perusahaan dalam upaya mengembangkan suatu model pengukuran kinerja yang baru<sup>4</sup>.

*Balanced scorecard* terdiri dari dua kata yaitu : 1) *scorecard* (kartu skor) dan 2) *Balanced* (berimbang). Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personel di masa depan. Melalui kartu skor, skor yang hendak diwujudkan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja personel yang bersangkutan. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personel diukur secara berimbang dari dua aspek, keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern<sup>10</sup>, antara hasil yang diinginkan dan pemicu kinerja dari hasil tersebut<sup>14</sup>.

*Balanced scorecard* merupakan sekelompok tolok ukur kinerja yang terintegrasi yang berasal dari strategi perusahaan dan mendukung strategi di seluruh organisasi<sup>13</sup>.

*Balanced scorecard* adalah sebuah konsep yang membantu menterjemahkan strategi kedalam aksi dan mendukung perencanaan strategik<sup>5</sup> (Mc. Cool, 2002). *Balanced scorecard* merupakan alat implementasi strategik. Untuk organisasi yang telah mempunyai suatu strategi yang eksplisit, *Balanced scorecard* dapat membantu perusahaan menerapkan strategi mereka lebih cepat dan lebih efektif, sedangkan organisasi tanpa suatu strategi yang eksplisit dapat menggunakan proses membangun *scorecard* sebagai mekanisme untuk mengembangkan strategi unit usaha, karena *scorecard* dapat merangsang suatu dialog manajemen yang intensif untuk mendefinisikan strategi<sup>14</sup>.

*Balanced scorecard* memberikan kerangka komprehensif untuk menerjemahkan visi ke dalam sasaran-sasaran strategik. Sasaran-sasaran yang komprehensif dapat dirumuskan karena *balanced scorecard* menggunakan empat perspektif yaitu perspektif finansial, perspektif *customer*, perspektif internal bisnis dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif finansial memberikan sasaran keuangan yang perlu dicapai oleh organisasi dalam mewujudkan visinya. Perspektif *customer* memberikan gambaran segmen pasar yang dituju dan *customer* beserta tuntutan dan kebutuhan yang dilayani oleh organisasi dalam upaya unruk mencapai sasaran keuangan tertentu. Perspektif bisnis internal memberikan gambaran proses yang harus dibangun untuk melayani *customer* dan untuk mencapai sasaran keuangan tertentu. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan pemacu untuk membangun kompetensi personel, prasarana sistem informasi dan suasana lingkungan kerja yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran keuangan, *customer* dan proses bisnis internal<sup>10</sup>.



Gambar : Penerjemahan Strategi kedalam kerangka operasional dengan *Balanced scorecard*<sup>4</sup>

### F. Penilaian kinerja Puskesmas dengan *balanced scorecard*

Dalam penilaian kinerja Puskesmas dengan *balanced scorecard*, maka keempat komponen *balanced scorecard* akan dijabarkan kedalam bentuk sasaran dan ukuran hasilnya (indikator hasil) sesuai tabel dibawah ini :

Tabel 1. Sasaran (*objectives*) dan ukuran hasil (*outcome measures*) empat perspektif *balanced scorecard*.

Sasaran ( <i>objectives</i> )	Ukuran hasil ( <i>outcome measures</i> )
1. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan	
a. Meningkatnya kualitas pegawai	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai.
b. Meningkatnya produktivitas	Cakupan program meningkat.
c. Meningkatnya komitmen pegawai	Menurunnya tingkat perputaran/mutasi pegawai
d. Meningkatnya kualitas organisasi	Jumlah personel yang dididik dan dilatih meningkat, meningkatnya pegawai yang akan diikutkan dalam pelatihan, meningkatnya kepuasan kerja, meningkatnya pendapatan.
e. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana	Peralatan medik dan non medik lengkap dan berfungsi baik.
f. Meningkatnya kualitas sistem informasi manajemen	Tersedia sistem pencatatan dan pelaporan yang memadai.
2. Perspektif proses bisnis internal	Penyediaan produk yang tepat
a. Meningkatnya pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan	Pemanfaatan Puskesmas meningkat
b. Bertambahnya produk dan jasa baru	Pengembangan produk dan jasa baru (produk entrepreneur) Puskesmas
c. Menurunnya tingkat kesalahan	Waktu penyelesaian layanan lebih cepat
3. Perspektif <i>customer</i>	
a. Meningkatnya kepercayaan pasien	Pasien lama tetap datang Bertambahnya kunjungan baru Berkurangnya komplain

b. Meningkatnya <i>value</i> yang diperoleh pasien	Ketaatan pasien kontrol Mutu Layanan ( <i>Responsiveness, Assurance, Tangible, Empathy, Reliability</i> ).
4. Perspektif keuangan	
a. Meningkatnya financial returns	Kenaikan pangsa pasar dan ROI ( <i>return on investment</i> )
b. Meningkatnya pendapatan penjualan	Pertumbuhan pendapatan
c. Menurunnya biaya	Penurunan biaya

### Penutup

1. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan terdepan, memerlukan usaha memperbaiki citra terus menerus agar dapat memberikan kepuasan kepada *customer/pasien* yang dilayani dan juga kepuasan kepada pemberi pelayanan/pegawai.
2. Agar dapat melakukan perbaikan, maka Puskesmas memerlukan penilaian kinerja, yang komprehensif yang sesuai dengan perkembangan zaman, yang dapat menggambarkan kinerja pada aspek input, aspek proses dan aspek output, serta dapat mengukur kinerja yang berimbang dari dua aspek yaitu : keuangan dan non keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, intern dan ekstern.
3. *Balanced scorecard* adalah penilaian kinerja yang komprehensif yang dapat diterapkan di Puskesmas, memiliki empat perspektif yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, proses bisnis internal, *customer*, dan keuangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Depkes, 1990. Pedoman Kerja Puskesmas, Jilid 3, Jakarta.
2. Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnely, J. H. Jr. 1985. Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses. Edisi V. Jilid I. Erlangga, Jakarta.
3. Ilyas Y. 2001. Kinerja : Teori, Penilaian dan Penelitian. Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan. FKM UI. Depok, Jakarta.
4. Kaplan, R. S., Norton, D. P. 2002. *Balanced Scorecard Menerapkan Strategi Menjadi Aksi*. Erlangga, Jakarta.
5. Mc. Cool, R. J. 2002. *Balanced Scorecard Translates a Company Mission and Strategy into Tangible Objective and Measure*, (online), (<http://balancedscorecard.com/>), diakses tanggal 14 Mei 2012).
6. Prawirosentono, S. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Kebijakan Kinerja Karyawan*. BPFE, Yogyakarta.
7. Pudjirahardjo. 2003 *Bahan Kuliah Manajemen Perilaku Organisasi*. Makassar.
8. Ruky, A. S. 2001. *Sistem Manajemen Kinerja*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
9. Sutanto, A. B. 1997. *Dinamika Manajemen*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
10. Setiawan, J., Mulyadi. 2001. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
11. Timpe, A. B. 1992. *Kinerja*. Edisi I. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
12. Tim Reformasi Puskesmas. 2001. *Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas di Era Desentralisasi*. Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Jakarta.
13. Tunggal, A. W. 2001. *Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard*. Penerbit Harvarindo, Jakarta.
14. Tunggal, A. W. 2002. *Memahami Konsep Balanced Scorecard*. Penerbit Harvarindo, Jakarta.
15. Werther, W. B. Jr., Davis, K. 1993. *Human Resources and Personal Management*. Edisi 4. Mc. Graw-Hill, Inc, Singapore.



## Pre eklampsia dan Eklampsia

Darmawansyih Syakir

Program Studi Kebidanan  
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin

### ABSTRACT

*Pre-eklampsia merupakan salah satu jenis hipertensi dalam kehamilan yang dapat berakibat fatal bagi ibu dan janin. Pada kasus dilapangan pre-eklampsia dapat ditemukan dalam bentuk pre-eklamsi ringan dan pre-eklampsia berat dan untuk kasus yang lebih lanjut berupa eklampsia.*

*Preeklampsia dan eklampsia merupakan salah satu gangguan kehamilan yang terbukti telah menjadi penyebab kedua terbanyak kematian ibu post partum, ditandai dengan hipertensi, proteinuria dan edema, yang penyebabnya diduga berhubungan erat dengan gangguan pembentukan plasenta. Pre-eklampsia dan eklampsia merupakan komplikasi berkelanjutan dengan penyebab yang sama. Oleh karena itu pemnecagahn dan diagnosis dini dapat mengurangi kejadian dan menurunkan angka kesakitan dan kematian.*

*Tujuan utama penatalaksanaan pre-eklamsi adalah untuk mencegah terjadinya pre-eklampsia berat dan eklamsia, melahirkan janin hidup, dan melahirkan janin dengan trauma sekecil-kecilnya.*

*Pengobatan Obstetrik semua kehamilan dengan eklampsia harus diakhiri tidak memandang usia kehamilan dan keadaan janin. Oleh karena itu diperlukan penilaian tertentu untuk menentukan tindakan yang tepat dalam penanganan pre-eklampsia*

**Keywords:** *Preeklampsia, post partum, eklamsia, pre-eklampsia,*

### PENDAHULUAN

Salah satu penyebab terbanyak kedua kematian ibu post partum setelah perdarahan adalah pre eklampsia dan eklampsia, keadaan ini menuntun kita untuk harus memberikan perhatian yang lebih pada masalah ini. Di USA insiden pre-eklampsia diperkirakan 2-6 % pada ibu hamil dan 10 % diantaranya terjadi pada usia kehamilan kurang dari 34 minggu. Sementara dinegara berkembang insidennya masih berkisar di level 4-18 %

Pre-eklampsia merupakan salah satu jenis hipertensi dalam kehamilan yang dapat berakibat fatal bagi ibu dan janin. Pada kasus dilapangan pre-eklampsia dapat ditemukan dalam bentuk pre-eklamsi ringan dan pre-eklampsia berat dan untuk kasus yang lebih lanjut berupa eklampsia.

## PEMBAHASAN

Pre-eklampsia merupakan suatu keadaan dimana terjadi malfungsi meluas dari endotel dan vasospasme vaskuler yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu dan dapat bertahan hingga 4-6 minggu postpartum, ditandai dengan adanya hipertensi yang disertai oleh proteinuria dengan atau tanpa edema patologik.

Pre-eklampsia ringan ditemukan pada 75 % kasus dan 25 % diantaranya menjadi preeklampsia berat. Pada keadaan preeklampsia berat dapat ditemukan adanya kegagalan hati dan ginjal, gangguan pembekuan darah (DIC), dan kelainan fungsi susunan saraf pusat. Jika preeklampsia disertai kejang maka status preeklampsia dikatakan telah berubah menjadi status eklampsia.

Preeklampsia ringan ditandai dengan adanya hipertensi (TD  $\geq$  140/90 mmHg) pada dua kali pengukuran dengan jeda waktu pengukuran 6 jam tanpa disertai kerusakan *end-organ*, sementara dikatakan Pre-eklampsia berat jika pada keadaan preeklampsia ditemukan salah satu tanda dan gejala berikut :

- Tekanan darah sistolik  $\geq$  160 mmHg atau tekanan darah diastolik  $\geq$  110 mmHg pada dua kali pengukuran dalam keadaan istirahat dengan jeda 6 jam
- Proteinuri  $\geq$  3+ pada dua sampel urin yang diambil secara random
- Udema pulmonal atau sianosis
- Oliguri ( urin  $<$  400 ml/24 jam )
- Nyeri kepala persisten
- Nyeri ulu hati dan atau kegagalan fungsi hati
- Trombositopeni
- Oligohidroamnion, gangguan pertumbuhan fetus atau abrupsia plasenta

Faktor predisposisi terjadinya pre-eklampsia:

- Nullipara
- Kehamilan ganda

- Usia < 20 atau > 35 tahun
- Riwayat pre-eklampsia, eklampsia pada kehamilan sebelumnya
- Riwayat dalam keluarga pernah mengalami pre-eklampsia
- Penyakit ginjal, hipertensi dan diabetes mellitus yang sudah ada sebelum kehamilan
- Obesitas

### **Patofisiologi pre-eklampsia**

Meskipun penyebab pasti hipertensi hingga kini belum jelas namun diduga pre-eklampsia dan eklampsia diawali dengan kegagalan pembentukan plasenta yang menyebabkan pembuluh darah yang mensuplai plasenta berdiameter terlalu sempit sehingga tidak dapat mempertahankan pertumbuhan selama trimester II dan III, hal ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin dan iskemik pada plasenta. Keadaan ini memicu reaksi plasenta berupa pelepasan sitokin yang mengaktifkan trombosit, menggalakkan koagulasi dan merusak sel-sel endotel maternal. Keadaan-keadaan tersebut akan memicu vasokonstriksi pembuluh darah. Vasospasme (vasokonstriksi) yang terus menerus menyebabkan kenaikan tekanan darah yang melampaui kapasitas autoregulasi yang dimiliki oleh pembuluh darah serebral yang akan menimbulkan kejang pada eklampsia.

### **Pencegahan insiden pre-eklampsia dan eklampsia**

Pre-eklampsia dan eklampsia merupakan komplikasi berkelanjutan dengan penyebab yang sama. Oleh karena itu pencegahan dan diagnosis dini dapat mengurangi kejadian dan menurunkan angka kesakitan dan kematian. Untuk dapat menegakkan diagnosis dini diperlukan pengawasan kehamilan atau *ante Natal care (ANC)* yang teratur dengan memperhatikan kenaikan berat badan, tekanan darah dan pemeriksaan untuk menentukan adanya proteinuria. Pemeriksaan ante natal yang teratur dan teliti dapat menemukan gejala-gejala dini pre-eklampsia. Para wanita hamil biasanya tidak mengemukakan keluhan dan

jarang memperhatikan tanda-tanda preeklampsia yang sudah terjadi, maka deteksi dini keadaan ini memerlukan pengamatan yang cermat dengan masa-masa interval yang tepat. Dengan adanya faktor-faktor predisposisi maka kita perlu lebih waspada dengan kemungkinan terjadinya pre-eklampsia. Walaupun preeklampsia tdk dapat dicegah dengan sepenuhnya, namun insidennya dapat dikurangi dengan pemberian pemahaman secukupnya dan pelaksanaan pengawasan yang baik pada wanita hamil, antara lain tentang :

1. Diet makanan

Makanan tinggi protein, tinggi karbohidrat, cukup vitamin, dan rendah lemak. Kurangi garam jika berta badan bertambah dan terjadi edema. Makan harus tetap berorientasi pada empat sehat lima sempurna.

2. Istirahat

Istirahat yang cukup pada usia kehamilan yang semakin tua dalam arti bekerja seperlunya yang disesuaikan dengan kemampuan

3. Ante natal care (ANC)

Pengawasan kehamilan yang teratur untuk menilai kondisi janin dalam rahim dan untuk uji kemungkinan pre-eklampsia.

**Penatalaksanaan pre-eklampsia**

a. Pre-eklampsia Ringan

Keberhasilan penanganan pre-eklampsia pada wanita hamil sangat tergantung pada usia kehamilan dan derajat pre-eklampsia. Prinsip penatalaksanaan pre-eklampsia adalah untuk menghindari komplikasi berkelanjutan berupa eklampsi dan untuk melakukan pertolongan kebidanan dengan melahirkan janin dalam keadaan optimal dengan trauma minimal. Secara umum penanganan pre-eklampsia terdiri atas pengobatan medik dan penangan obstetrik

Pasien dengan pre-eklampsia ringan penanganannya dapat dimulai dengan berobat jalan dibawah pengawasan dokter atau tenaga kesehatan dan terapi simptomatik. Tindakan yang dapat diberikan berupa: (1) istirahat yang cukup (2) pemberian obat sedativa tablet phenobarbital 3 x 30 mg atau diazepam 3 x 2 mg per oral selama 7 hari.(3) ANC yang teratur (Kunjungan ulang setiap 1 minggu,

Pemeriksaan laboratorium : hemoglobin, hematokrit, trombosit, urine lengkap, asam urat darah, fungsi hati, fungsi ginjal) (4) melakukan rujukan jika tekanan darah  $> 140/90$  mmHg, proteinuri +1 atau lebih, kenaikan berat badan 1,5 kg atau lebih selama seminggu, edema bertambah dengan mendadak, terdapat keluhan subyektif yang termasuk kedalam gejala pre-eklampsia berat. Bila setelah 1 minggu perawatan di atas tidak ada perbaikan maka pre-eklampsia ringan dianggap sebagai pre eklampsia berat. Bila dalam perawatan di rumah sakit sudah ada perbaikan sebelum 1 minggu dan kehamilan masih preterm maka penderita tetap dirawat selama 2 hari lagi baru dipulangkan. Perawatan lalu disesuaikan dengan perawatan rawat jalan.

Perawatan obstetri pasien pre eklampsia ringan :

1. Kehamilan preterm (kurang 37 minggu)
  - a. Bila tekanan darah mencapai normotensif selama perawatan, persalinan ditunggu sampai aterm.
  - b. Bila tekanan darah turun tetapi belum mencapai normotensif selama perawatan maka kehamilannya dapat diakhiri pada umur kehamilan 37
  - c. Bila tekanan darah tidak turun maka kehamilan dapat diterminasi sebelum usia kehamilan 37 minggu, untuk mengatasi ketidakmatangan paru karena fetus yang immatur, maka dilakukan pemberian kortikosteroid untuk mempercepat pematangan paru.
2. Kehamilan aterm (37 minggu atau lebih)

Dapat dilakukan induksi persalinan

Persalinan dapat dilakukan secara spontan. Bila perlu memperpendek kala II

#### **b. Pre-eklampsia Berat**

Pada kasus pre-eklampsia berat penatalaksanaannya dapat berupa penanganan konservatif dan penanganan aktif

##### **b.1. Perawatan Aktif**

Indikasi (salah satu atau lebih) :

##### **a. Ibu**

- Usia kehamilan 37 minggu atau lebih

- Adanya tanda-tanda atau gejala impending eklampsia, kegagalan terapi konservatif yaitu setelah 6 jam pengobatan meditasi terjadi kenaikan tekanan darah atau setelah 24 jam perawatan medisinal, ada gejala-gejala status quo (tidak ada perbaikan).

**b. Janin**

Hasil fetal assesment jelek (NST & USG)

**c. Laboratorium**

- Adanya "HELLP syndrome" (hemolisis dan peningkatan fungsi hepar, (rombositopenia).

Penanganan konservatif pasien pre eklampsia berat berupa:

1. Segera masuk rumah sakit
2. Tirah baring miring ke satu sisi disertai dengan pemeriksaan tanda vital setiap 30 menit, dan pemeriksaan refleks patella setiap jam.
3. Infus dextrose 5% dimana setiap 1 liter diselingi dengan infus RL (60-125 cc/jam) 500 cc.
4. Antasida
5. Diet cukup protein, rendah karbohidrat, lemak dan garam.
6. Pemberian obat anti kejang : magnesium sulfat
7. Diuretikum tidak dianjurkan kecuali bila ada tanda-tanda edema paru, payah jantung kongestif atau edema anasarka. Pada keadaan tersebut dapat diberikan furosemid injeksi 40 mg/im.
8. Antihipertensi diberikan bila Tekanan darah sistolis lebih 180 mmHg, diastolis lebih 110 mmHg atau MA P lebih 125 mmHg. Dengan dosis yang sama dengan dosis antihipertensi pada umumnya. Jika dibutuhkan penurunan tekanan darah dalam waktu yang singkat, dapat diberikan obat antihipertensi parenteral (tetesan kontinyud. Jika tidak tersedia antihipertensi parenteral dapat diberikan tablet antihipertensi secara sublingual diulang selang 1 jam, maksimal 4-5 kali. Bersama dengan awal pemberian sublingual maka obat yang sama mulai diberikan secara oral. (Syakib Bakri, 1997)
8. Pemberian Magnesium Sulfat  
Cara pemberian magnesium sulfat :

- a. Dosis awal sekitar 4 gram MgSO<sub>4</sub> IV (20 % dalam 20 cc) selama 1 gr/menit kemasan 20% dalam 25 cc larutan MgSO<sub>4</sub> (dalam 3-5 menit). Diikuti segera 4 gr di bokong kiri dan 4 gram di bokong kanan (40 % dalam 10 cc) dengan jarum no 21 panjang 3,7 cm. Untuk mengurangi nyeri dapat diberikan 1 cc xylocain 2% yang tidak mengandung adrenalin pada suntikan IM.(6)
- b. Dosis ulangan : diberikan 4 gram intramuskuler 40% setelah 6 jam pemberian  
dosis awal lalu dosis ulangan diberikan 4 gram IM setiap 6 jam dimana pemberian  
MgSO<sub>4</sub> tidak melebihi 2-3 hari.(3)
- c. Syarat-syarat pemberian MgSO<sub>4</sub>
  - Tersedia antidotum MgSO<sub>4</sub> yaitu calcium gluconas 10%, 1 gram (10% dalam 10 cc) diberikan intravenous dalam 3 menit.
  - Refleks patella positif kuat
  - Frekuensi pernapasan lebih 16 kali per menit.
  - Produksi urin lebih 100 cc dalam 4 jam sebelumnya (0,5 cc/kgBB/jam).
- d. MgSO<sub>4</sub> dihentikan bila :
  - Ada tanda-tanda keracunan yaitu kelemahan otot, hipotensi, refleks fisiologis menurun, fungsi jantung terganggu, depresi SSP, kelumpuhan dan selanjutnya dapat menyebabkan kematian karena kelumpuhan otot-otot pernapasan karena ada serum 10 U magnesium pada dosis adekuat adalah 4-7 mEq/liter. Refleks fisiologis menghilang pada kadar 8-10 mEq/liter. Kadar 12-15 mEq terjadi kelumpuhan otot-otot pernapasan dan lebih 15 mEq/liter terjadi kematian jantung.(3,7).

### **Pengobatan Obstetrik**

#### Cara Terminasi Kehamilan yang Belum Inpartu

1. Induksi persalinan
2. Seksio sesaria

#### Cara Terminasi Kehamilan yang Sudah Inpartu Kala I

1. Fase laten : 6 jam belum masuk fase aktif maka dilakukan seksio sesaria.
2. Fase aktif :

- Amniotomi saja
- Bila 6 jam setelah amniotomi belum terjadi pembukaan lengkap maka dilakukan seksio sesaria (bila perlu dilakukan tetesan oksitosin).

### Cara Terminasi Kehamilan yang Sudah Inpartu Kala II

Pada persalinan per vaginam maka kala II diselesaikan dengan partus buatan. Amniotomi dan tetesan oksitosin dilakukan sekurang-kurangnya 3 menit setelah pemberian pengobatan medisinal. Pada kehamilan 32 minggu atau kurang; bila keadaan memungkinkan, terminasi ditunda 2 kali 24 jam untuk memberikan kortikosteroid.

### b.2. Perawatan Konservatif

1. Indikasi : Bila kehamilan preterm kurang 37 minggu tanpa disertai tanda-tanda impending eklampsia dengan keadaan janin baik.
2. Pengobatan medisinal : Sama dengan perawatan medisinal pada pengelolaan aktif. Hanya loading dose  $MgSO_4$  tidak diberikan intravenous, cukup intramuskuler saja dimana 4 gram pada bokong kiri dan 4 gram pada bokong kanan.
3. Pengobatan obstetri :
  - a. Selama perawatan konservatif : observasi dan evaluasi sama seperti perawatan aktif hanya disini tidak dilakukan terminasi.
  - b.  $MgSO_4$  dihentikan bila ibu sudah mempunyai tanda-tanda pre eklampsia ringan, selambat-lambatnya dalam 24 jam.
  - c. Bila setelah 24 jam tidak ada perbaikan maka dianggap pengobatan medisinal gagal dan harus diterminasi.
  - d. Bila sebelum 24 jam hendak dilakukan tindakan maka diberi lebih dahulu  $MgSO_4$  20% 2 gram intravenous.
4. Penderita dipulangkan bila :
  - a. Penderita kembali ke gejala-gejala / tanda-tanda pre eklampsia ringan dan telah dirawat selama 3 hari.



- b. Bila selama 3 hari tetap berada dalam keadaan pre eklampsia ringan : penderita dapat dipulangkan dan dirawat sebagai pre eklampsia ringan (diperkirakan lama perawatan 1-2 minggu).

Pada kasus pre-eklampsia yang berlanjut ke eklampsia, maka penatalaksanaan konservatif sudah jarang dilakukan. Tujuan penatalaksanaan pada eklampsia adalah :

1. Untuk menghentikan dan mencegah kejang.
2. Mencegah dan mengatasi penyulit, khususnya hipertensi krisis
3. Sebagai penunjang untuk mencapai stabilisasi keadaan ibu seoptimal mungkin
4. Mengakhiri kehamilan dengan trauma ibu seminimal mungkin.

### **Pengobatan Medisinal**

Pengobatan farmakologik pada eklampsia secara umum seperti pengobatan farmakologik pada kasus pre eklampsia, kecuali jika timbul kejang berulang maka dapat diberikan MgSO<sub>4</sub> 2 gram intravenous selama 2 menit minimal 20 menit setelah pemberian terakhir. Dosis tambahan 2 gram hanya diberikan 1 kali saja. Bila setelah diberi dosis tambahan masih tetap kejang maka diberikan amobarbital / thiopental 3-5 mg/kgBB/IV perlahan-lahan. dalam penatalaksanaan eklampsia juga diperlukan perawatan bersama : konsul bagian saraf, penyakit dalam / jantung, mata, anestesi dan anak.

Pengobatan Obstetrik semua kehamilan dengan eklampsia harus diakhiri tidak memandang usia kehamilan dan keadaan janin. Tindakan ini dapat dilakukan jika sudah terjadi stabilisasi hemodinamik dan metabolisme ibu. Stabilisasi ibu dicapai dalam 4-8 jam setelah salah satu atau lebih keadaan dibawah :

- Setelah pemberian obat anti kejang terakhir.
- Setelah kejang terakhir
- Setelah pemberian obat-obat antihipertensi terakhir
- Penderita mulai sadar (responsif dan orientasi)

## KESIMPULAN

Pre-eklamptasia dan eklampsia yang merupakan penyebab kematian kedua ibu post partum perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius, mengingat penyebabnya yang belum pasti dan komplikasi yang dapat ditimbulkannya pada janin dan ibu.

Perlu penanganan yang cepat dan tepat untuk mencegah agar pre-eklamptasia tidak berkelanjutan menjadi eklampsia dan untuk melakukan pertolongan kebidanan dengan melahirkan janin dalam keadaan optimal dengan trauma minimal.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abadi A, Sukaputra B. Waspodo D, dkk. Pedoman Diagnosis dan Terapi RSUD Dr. Soetomo, 1994. Laboratorium / UPF Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soetomo Surabaya
2. Bakri S. Hipertensi pada Wanita Hamil. Dibacakan pada Simposium Penanganan Pre Eklampsia dan Eklampsia, Ujung Pandang, Desember 1996.
3. Bhalla AK, Dhall 61, Dhall K. A Safer and More Effective Treatment Regimen for Eclampsia. Aust NZ J Obstet Gynecol 1994.
4. Fields DH. Gestationally Induced Hypertention. In : Barber HRK, Fields DH, Kaufman SA, eds. Quick Deference to Obygn Procedure. Philadelphia : AB Lippincoti Company. 1990 .
5. Gant NF, Cunningham FG. Basic Gynecology and Obstetrics. Connecticut Appleton and Lange, 1993.
6. Handaya. Penanganan Pre Eklampsia Berat / Eklampsia. Dibacakan pada seminar dan lokakarya Penanganan Pre Eklampsia dan Eklampsia Berat. Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Januari 1993.
7. POGI. Standar Pelayanan Medik Obstetri dan Ginekologi Bag. 1. Cet. ke-2. Jakarta : Gaya baru. 1994.
8. Salgas Gestosis POGI. Panduan Pengelolaan Hipertensi dalam Kehamilan diIndonesia. Ed. 1985.
9. Sombolinggi A. Pengobatan Pre Eklampsia Berat / Eklampsia dengan Magnesium Sulfat dan Diazepam pada Beberapa Rumah Sakit Bersalin di Ujung Pandang. Skripsi Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Ujung Pandang. 1992.

## SURVEILANS PUSKESMAS MENUJU TARGET MDGs

**Azriful**

Program Studi Kesehatan Masyarakat  
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

### ABSTRACT

*Surveillance adalah pengumpulan data epidemiologi yang akan digunakan sebagai dasar dari kegiatan-kegiatan dalam bidang penanggulangan penyakit, yaitu (1) perencanaan program pemberantasan penyakit dengan mengenal epidemiologi penyakit berarti mengenal masalah yang kita hadapi; (2) Evaluasi program pemberantasan penyakit, (3) penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/ wabah. Suatu sistem surveilans yang efektif harus peka terhadap perubahan-perubahan pola penyakit di suatu daerah tertentu. Setiap kecenderungan peningkatan insidens, perlu secepatnya dapat diperkirakan dan setiap KLB secepatnya dapat diketahui. Dengan demikian suatu peningkatan insidens atau perluasan wilayah suatu KLB dapat dicegah.*

*Metode pencatatan dan pelaporan data/informasi berbasis bukti (evidence based) yang terintegrasi, salah satunya diperoleh melalui surveilans, sehingga pelaksanaan keempat fungsi puskesmas dapat bersinergi antara program puskesmas dengan pencapaian target MDGs*

*Sistem surveilans yang baik akan memberikan informasi awal perkembangan penyakit. Informasi yang terekam dalam pencatatan maupun pelaporan termasuk laporan KLB (W1) maupun laporan wabah (W2) akan menggambarkan kecenderungan menurun, stabil bahkan meningkat dari beberapa penyakit. Selanjutnya rekaman catatan ataupun laporan tersebut menjadi informasi untuk melakukan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam tingkat puskesmas untuk menekan, meredam bahkan memberantas laju penyakit sedini mungkin utamanya yang berhubungan dengan target pencapaian MDGs*

**Keywords:** *Surveillance, MDG's, Kejadian Luar Biasa, Wabah, Insidens*

### PENDAHULUAN

Anugrah kesehatan Allah SWT merupakan salah satu nikmat yang penting bagi kehidupan kita, karenanya menjadi kewajiban setiap individu, keluarga, populasi, masyarakat ataupun rakyat senantiasa memeliharanya. Masyarakat dalam konteks bangsa juga memerlukan perlindungan dari potensi beragam ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Mengandalkan Kementerian

Kesehatan saja, tidak lantas menuntaskan persoalan kesehatan, seharusnya penanganan masalah kesehatan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat.

Undang undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025 menyatakan, untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Derajat kesehatan merupakan pilar utama disamping pendidikan dan ekonomi dalam indikator *Human Development Index* yang sangat berhubungan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan kesehatan tahun 2005-2025 memberikan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain : ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin. Sementara itu, sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2014 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui percepatan pencapaian MDGs yang antara lain, yaitu 1) Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 72 tahun ; 2) Menurunnya angka kematian bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup; 3)Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup; dan 4) Menurunnya prevalensi gizi kurang (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita menjadi lebih kecil dari 15%. Di lain pihak Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2007 melaporkan dalam tiga dekade terakhir, berbagai indikator derajat kesehatan masyarakat di Indonesia menunjukkan adanya perbaikan.

*WHO Regional Meeting on Revitalizing Primary Health Care* pada Agustus 2008 di Jakarta menghasilkan rumusan tentang perlunya melakukan '*Primary Health Care Reforms*' meliputi reformasi '*universal coverage*'; '*service delivery*'; '*public policy*' dan '*leadership*'. Revitalisasi PHC tentunya akan berdampak pada Puskesmas. Untuk itu, penetapan fungsi Puskesmas yang dapat menjawab arah kebijakan pembangunan kesehatan yang mengutamakan promotif

dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Puskesmas mempunyai empat fungsi yang sejalan dengan fokus pembangunan kesehatan yaitu : sebagai pusat pembangunan wilayah berwawasan kesehatan; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer.

Penyediaan pelayanan kesehatan dasar diselenggarakan demi menjamin hak azasi semua orang untuk hidup sehat. Urgensi revitalisasi puskesmas menjadi penting karena merupakan sarana pelayanan kesehatan terdepan yang pendekatannya melalui *3 level of prevention* yaitu *health promotion and specific protection; early detection and prompt treatment; serta rehabilitation and disability limitation*. Penerapan level 1 dan 2 lebih dominan ditingkat puskesmas, sedangkan pada level 3 tetap dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan fungsi Puskesmas, sehingga dukungan pada tingkat rujukan atau pelayanan sekunder (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit) sangat diperlukan.

Sistem/jejaring rujukan dan pembinaan pelayanan kesehatan turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas puskesmas, sebab revitalisasi puskesmas tidak akan berkembang tanpa penguatan pada tingkat kabupaten/kota, baik dinas kesehatan maupun rumah sakit. Puskesmas sebagai UPT kabupaten/kota melaksanakan tugas sebagai realisasi pelimpahan kewenangan tugas dari kabupaten/kota, namun bukan berarti tugas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terutama upaya promotif dan preventif yang merupakan prioritas pertama Kemenkes di tahun 2012 telah selesai. Upaya ini seharusnya melibatkan inisiatif masyarakat dan inisiatif Pemda mulai tingkat provinsi hingga kabupten/kota.

Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan ke puskesmas tentunya dikembangkan sejalan dengan reformasi PHC dan fungsi puskesmas. Hal ini mengisyaratkan kita pada pentingnya upaya kesehatan yang diemban puskesmas. Penerapan upaya kesehatan selain memerlukan dukungan infra struktur yang kuat lintas institusi kesehatan juga membutuhkan penguatan di tingkat puskesmas sendiri. Penanggulangan/pemberantasan penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular memerlukan analisis yang didukung data/informasi berbasis bukti.

Metode pencatatan dan pelaporan data/informasi berbasis bukti (*evidence based*) yang terintegrasi, salah satunya diperoleh melalui surveilans, sehingga pelaksanaan keempat fungsi puskesmas dapat bersinergi antara program puskesmas dengan pencapaian target MDGs.

### Pengertian Surveilans

Istilah surveilans berasal dari bahasa Prancis, yaitu "*surveillance*", yang berarti "mengamati tentang sesuatu". Sedang kata "*surveillance*" dalam bahasa Inggris, berarti "mengawasi perorangan yang sedang dicurigai". Sebelum tahun 1950, surveilans memang diartikan sebagai upaya pengawasan secara ketat kepada penderita penyakit menular, sehingga penyakitnya dapat ditemukan sedini mungkin dan diisolasi secepatnya serta dapat diambil langkah-langkah pengendalian seawal mungkin. Selanjutnya, pengertian surveilans epidemiologi yaitu kegiatan untuk memonitor frekuensi dan distribusi penyakit di masyarakat.

Beberapa definisi surveilans, diantaranya adalah : *The Centers for Disease Control, surveilans kesehatan masyarakat adalah : The ongoing systematic collection, analysis and interpretation of health data essential to the planning, implementation, and evaluation of public health practice, closely integrated with the timely dissemination of these data to those who need to know. The final link of the surveillance chain is the application of these data to prevention and control.*

Menurut Karyadi (1994), surveilans epidemiologi adalah : "Pengumpulan data epidemiologi yang akan digunakan sebagai dasar dari kegiatan-kegiatan dalam bidang penanggulangan penyakit, yaitu :

1. Perencanaan program pemberantasan penyakit. Mengenal epidemiologi penyakit berarti mengenal masalah yang kita hadapi. Dengan demikian suatu perencanaan program dapat diharapkan akan berhasil dengan baik.
2. Evaluasi program pemberantasan penyakit. Bila kita tahu keadaan penyakit sebelum ada program pemberantasannya dan kita menentukan keadaan penyakit setelah program ini, maka kita dapat mengukur dengan angka-angka keberhasilan dari program pemberantasan penyakit tersebut.

3. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/ wabah. Suatu sistem surveilans yang efektif harus peka terhadap perubahan-perubahan pola penyakit di suatu daerah tertentu. Setiap kecenderungan peningkatan insidens, perlu secepatnya dapat diperkirakan dan setiap KLB secepatnya dapat diketahui. Dengan demikian suatu peningkatan insidens atau perluasan wilayah suatu KLB dapat dicegah”.

Menurut Nur Nasry Noor (1997), surveilans epidemiologi adalah : “Pengamatan secara teratur dan terus menerus terhadap semua aspek penyakit tertentu, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangannya”.

### **Tujuan Surveilans**

Tujuan surveilans bergantung pada penyakit ataupun masalah kesehatan antara lain:

1. Mendeteksi dan memprediksi secara dini epidemi suatu penyakit/masalah.
2. Identifikasi, investigasi dan penanggulangan kejadian luar biasa.
3. Identifikasi kelompok penduduk tertentu dengan risiko tinggi.
4. Untuk penentuan penyakit dan prioritas penanggulangan.
5. Memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki program pencegahan dan pengendalian penyakit.
6. Sebagai sumber informasi dan penentuan prioritas, pengambilan kebijakan, perencanaan, implementasi, dan alokasi sumber daya kesehatan.
7. Memonitori kecenderungan penyakit endemis dan mengestimasi dampak penyakit di masa mendatang.
8. Mengidentifikasi kebutuhan riset dan investigasi lebih lanjut.

### **Ruang Lingkup Surveilans**

Surveilans, secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

#### **1. Surveilans Pasif**

Surveilans pasif adalah pengumpulan data yang diperoleh dari laporan bulanan sarana pelayanan kesehatan di daerah. Dari data yang diperoleh, dapat

diketahui distribusi geografisnya tentang berbagai penyakit menular dan perubahan-perubahan yang terjadi serta kebutuhan tentang penelitian sebagai tindak lanjut.

Surveilans pasif atau disebut juga pengumpulan keterangan tentang kejadian suatu penyakit dalam masyarakat yang dilakukan oleh unit surveilans mulai tingkat Puskesmas sampai tingkat nasional.

## 2. Surveilans Aktif

Surveilans aktif adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk mempelajari penyakit tertentu dalam waktu yang relatif singkat (seminggu sekali atau 2 minggu sekali) yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk mencatat ada atau tidaknya kasus baru penyakit tertentu.

Surveilans aktif dilakukan bila:

- a. Ditemukan kasus baru
- b. Penelitian tentang cara penyebaran yang baru suatu penyakit tertentu
- c. Risiko tinggi terjadinya penyakit musiman
- d. Penyakit tertentu yang timbul didaerah baru atau akan menimbulkan pengaruh pada kelompok penduduk tertentu.

## Sasaran Surveilans

Adapun sasaran dalam melakukan kegiatan surveilans yaitu :

### 1. Individu

Pengamatan dilakukan terhadap individu yang terinfeksi dan mempunyai potensi untuk menularkan penyakit. Pengamatan ini dilakukan sampai individu tersebut tidak membahayakan dirinya maupun lingkungannya. Dalam pengamatan individu ini dilakukan pengelompokan/identifikasi mana yang merupakan penderita, karier, dan orang dengan risiko tinggi.

### 2. Populasi Lokal/ Kelompok Individu

Populasi lokal adalah kelompok penduduk yang terbatas pada orang-orang dengan risiko terkena suatu penyakit. Sasaran pengamatan populasi lokal dilakukan pada :



- a. Individu yang kontak dengan penderita/karier
  - b. Penjamu yang rentan
  - c. Orang yang menderita penyakit yang mudah selapse
  - d. Kelompok individu yang mempunyai peluang untuk kontak dengan penderita
3. Populasi Nasional

Pengamatan populasi nasional adalah pengamatan yang dilakukan pada semua penduduk secara nasional

4. Populasi internasional

Kegiatan ini berupa pengamatan terhadap penyakit yang dilakukan oleh berbagai negara secara bersama-sama, yang ditujukan pada penyakit-penyakit yang mudah menimbulkan epidemi atau pandemi, seperti ; pes, cacar, kolera dan influenza.

### **Manfaat Surveilans**

Beberapa manfaat dengan melakukan kegiatan surveilans sebagai berikut:

1. Dapat mendeteksi kecenderungan (trend) perubahan penyakit tertentu.
2. Dapat mendeteksi kejadian luar biasa.
3. Dapat memberikan perkiraan tentang besarnya morbiditas dan mortalitas sehubungan dengan masalah kesehatan yang menjalani surveilans tertentu.
4. Dapat merangsang dan mendorong diadakannya penelitian epidemiologis tentang adanya kemungkinan pencegahan dan penanggulangannya.
5. Dapat mengidentifikasi faktor risiko yang berkaitan dengan kejadian penyakit
6. Dapat memperhitungkan kemungkinan tentang adanya pengaruh atau efek upaya penanggulangan kejadian penyakit/ gangguan kesehatan.
7. Dapat memberikan perbaikan dibidang klinik bagi pelaksana pelayanan kesehatan.

### **Kegiatan Surveilans**

Kegiatan surveilans meliputi ;

1. Sistem Surveilans Terpadu
2. Sentinel Puskesmas

### 3. Surveilans Khusus

Bentuk kegiatan surveilans dapat bersifat rutin dan bersifat khusus. Terdapat 4 kegiatan pokok/utama dalam melakukan surveilans kesehatan sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan insidensi terhadap orang-orang yang dicurigai (*population at risk*) melalui kunjungan rumah (*active surveillance*) atau pencatatan insidensi berdasarkan laporan rutin dari sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, atau laporan dari petugas surveilans di lapangan dan laporan dari masyarakat serta petugas kesehatan lainnya (*passive surveillance*). Unsur yang diamati untuk pengumpulan data adalah :

- a. Data mortalitas
- b. Data morbiditas
- c. Data pemeriksaan laboratorium
- d. Laporan penyakit
- e. Penyelidikan peristiwa wabah
- f. Laporan wabah
- g. Laporan penyelidikan wabah
- h. Survey penyakit, vector dan reservoir
- i. Penggunaan obat, vaksin, dan serum
- j. Demografi dan lingkungan (Langmuir)

#### 2. Pengolahan Data

Pengolahan data biasanya dilakukan secara manual atau dengan komputerisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki.

#### 3. Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisa data dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

##### a. Analisa Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan berdasarkan variable orang, tempat, dan waktu sehingga diperoleh gambaran yang sistematis tentang penyakit yang sedang diamati. Visualisasi dalam bentuk grafik, tabel, diagram yang disertai uraian/penjelasan.

**b. Analisis Analitik**

Dilakukan dengan uji komparasi, korelasi dan regresi.

**4. Penyebaran Informasi**

Sasaran adalah instansi terkait baik secara vertical maupun horizontal. Dengan tujuan dapat memperoleh kesepakatan dan feedback dalam perumusan kebijakan sehingga mendapat respon dari instansi terkait sebagai feedback, tindak lanjut dan kesepahaman. Metode yang dilakukan secara tertulis dan deseminasi laporan, verbal dalam rapat, media cetak dan elektronik.

**Kriteria Surveilans**

Dalam melakukan surveilans perlu diperhatikan kriteria surveilans yaitu sebagai berikut:

**1. *Simplicity***

- a. Struktur yang sederhana dan mudah dioperasikan tetapi tetap dapat mencapai objektif
- b. Pihak yang terlibat dalam system bersedia memberikan data dan memonitori system.
- c. Data yang relevan untuk surveilans harus dapat diperoleh dengan mudah, format yang tidak berguna dibuang saja.

**2. *Flexibility/Acceptability***

- a. Dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan informasi yang dibutuhkan atau keadaan lapangan.
- b. Dapat diterapkan terhadap keadaan penyakit dan kesehatan yang baru, perubahan definisi kasus dan sumber pelaporan.
- c. Menjaga penerimaan dan komitmen pihak yang terlibat dalam system surveilans.

**3. *Sensitivity/akurat***

- a. Mampu mendeteksi semua insiden penyakit dan bukan penyakit yang sesungguhnya dalam populasi.
- b. Mampu meramalkan kecenderungan akan terjadinya atau tidak terjadinya insidensi penyakit yang akan datang.

- c. Akurasi dipengaruhi oleh infrastruktur laboratorium dan kemampuan petugas.

#### 4. *Representativeness*

- a. Dapat menguraikan dengan tepat kejadian peristiwa kesehatan sepanjang waktu.
- b. Memperhatikan keterwakilan dan kelengkapan data surveilans.

#### 5. *Timeliness*

- a. Ketepatan waktu yang penting
- b. Informasi yang diperoleh dengan cepat memungkinkan tindakan segera untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi.

### **Jenis Data Yang Dikumpulkan dalam Surveilans**

Beberapa jenis data yang biasa dikumpulkan dalam kegiatan surveilans yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya penyakit dan kejadian kesehatan
2. Data perilaku
3. Hubungan dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
4. Hubungan dengan pelayanan imunisasi
5. Hubungan dengan penyakit menular
6. Data lingkungan

Surveilans dilakukan dengan cara pengambilan data di Puskesmas. Data yang diperoleh adalah data Laporan Mingguan Wabah (W2) Puskesmas.

Sistem surveilans yang baik akan memberikan informasi awal perkembangan penyakit. Informasi yang terekam dalam pencatatan maupun pelaporan termasuk laporan KLB (W1) maupun laporan wabah (W2) akan menggambarkan kecenderungan menurun, stabil bahkan meningkat dari beberapa penyakit. Selanjutnya rekaman catatan ataupun laporan tersebut menjadi informasi untuk melakukan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam tingkat puskesmas untuk menekan, meredam bahkan memberantas laju penyakit sedini mungkin utamanya yang berhubungan dengan target pencapaian MDGs. Olehnya itu, sebaiknya perhatian dan kebijakan pemerintah lebih menekankan pada

---

penguatan sistem peringatan sedini mungkin melalui kegiatan surveilans untuk penanggulangan masalah kesehatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Beaglehole, et. al. 1993. *Basic Epidemiology*, Geneva : WHO.
2. Noor, Nur Nasry. 1997. *Epidemiologi*, Jakarta : Rineka Cipta.
3. Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, Jakarta : Rineka Cipta.
4. Subaris K.Heru, dkk. 2004. *Manajemen Epidemiologi*, Yogyakarta : Media Presindo.
5. Timmreck, Thomas. 2004. *Epidemiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : EGC.
6. Weraman, Pius. 2010. *Dasar Surveilans Kesehatan Masyarakat*, Jakarta : Gramata,.

## **SEDIAAN GASTRORETENTIVE; MEMPERBAIKI BIOAVAILABILITAS OBAT MELALUI OPTIMALISASI ABSORPSI PADA GASTROINTESTINAL**

**Isriany Ismail**  
Program Studi Farmasi  
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN AlauddinMakassar

### **ABSTRAK**

*Perkembangan teknologi sediaan farmasi telah mampu mengatasi masalah bioavailabilitas yang rendah dari obat-obatan dengan jendela absorpsi yang sempit dan memiliki permeabilitas pada sisi absorpsi yang rendah dengan memperpanjang waktu singgah di lambung (Gastric Retention Time) melalui suatu teknologi Gastroretentive Drugs Delivery System (GRDDS). Perpanjangan keberadaan obat di lambung memungkinkan absorpsi yang lengkap dan diperpanjang akibat pelepasan obat yang berlangsung lama, peningkatan kelarutan dan secara keseluruhan memperbaiki bioavailabilitas obat, aktivitas terapeutik, dan meningkatkan efisiensi penggunaan obat.*

*Bioavailabilitas obat adalah faktor utama yang menentukan efektivitas terapeutik. Salah satu parameter utama yang mempengaruhi bioavailabilitas adalah waktu kontak senyawa aktif pada sisi absorpsi. Sistem penghantaran obat (Drugs Delivery System; DDS) penggunaan oral berkembang pesat, terutama diperuntukkan bagi obat-obat dengan jendela absorpsi yang sempit, terabsorpsi hanya pada bagian atas saluran gastrointestinal, atau untuk obat-obat dengan stabilitas yang buruk di kolon. Saat ini, Gastroretentive Drugs Delivery System (GRDDS) telah didesain untuk mengembangkan sediaan farmasi dengan lama singgah yang diperpanjang di gastrik dan diformulasi dengan pendekatan high-density systems, low density systems), expandable systems, superporous hydrogel systems, mucoadhesive systems, dan magnetic systems. Pengontrolan waktu singgah sediaan oral menggunakan sediaan Gastroretentive dapat meningkatkan bioavailabilitas obat dengan mengoptimalkan absorpsi melalui perpanjangan waktu kontak obat pada sisi spesifik absorpsi obat.*

**Keywords :** GRDDS, Bioavailabilitas, Gastroretentive

### **PENDAHULUAN**

Dewasa ini penelitian dalam bidang farmasi salah satunya difokuskan pada upaya untuk meningkatkan efektifitas molekul fungsional yang digunakan, yakni dalam hal peningkatan disolusi untuk sediaan oral, absorpsi pada membran lipid bilayer, dan pelepasan obat yang diperpanjang, yang secara keseluruhan mengarah kepada perbaikan bioavailabilitas dari bahan aktif.

Sediaan farmasi konvensional telah menyisakan banyak masalah sehubungan dengan farmakokinetik dan efektivitas terapeutik senyawa obat yang dikandungnya. Pada penggunaannya, sediaan oral seperti tablet dan granul harus melalui beberapa tahapan seperti desintegrasi, dissolusi dan absorpsi untuk dapat berada di dalam darah dan mencapai konsentrasi efektif terapeutik.

Ketersediaan hayati (bioavailabilitas) obat dalam darah ditentukan oleh tahap ter"lambat" dari keseluruhan proses tersebut. Tablet atau granul konvensional yang lepas segera dengan absorpsi, metabolisme dan laju eliminasi yang cepat juga menjadi penyebab bioavailabilitas obat menjadi rendah dan hanya mampu memberikan kadar puncak tunggal dan sementara (*transient*). Efek farmakologi terlihat sepanjang jumlah obat berada dalam interval terapeutik dalam waktu yang singkat. Masalah muncul ketika konsentrasi puncak di bawah (tidak berefek) atau di atas interval terapeutik (reaksi toksik), khususnya untuk obat dengan jendela terapeutik yang sempit (Juntzen *et al*, 1996). Fluktuasi konsentrasi obat dalam plasma dan sisi aksi terjadi akibat pelepasan dosis dari sediaan konvensional yang berlangsung sangat cepat dan bersamaan, dan jika diikuti oleh laju eliminasi yang tinggi, maka akan mengakibatkan kesulitan untuk mempertahankan konsentrasi terapeutik yang konstan pada sisi aksi. Fluktuasi konsentrasi obat akibat penggunaan berulang dapat menimbulkan overdosis atau underdosis jika nilai  $C_{max}$  dan  $C_{min}$  melewati jendela terapeutik obat. Obat dengan  $t_{1/2}$  pendek memerlukan frekuensi pemberian yang lebih sering untuk mempertahankan konsentrasi obat dalam daerah terapeutik, kelalaian dalam pengulangan dosis untuk terapi penyakit tertentu dapat berakibat fatal.

Karena sifat kimianya, obat-obatan memiliki kemampuan terabsorpsi yang berbeda di sepanjang saluran cerna (gastrointestinal). Waktu singgah dilambung yang cepat menyebabkan penyerapan obat tidak optimal dibanding dosis yang tersedia, disamping itu jendela absorpsi yang sempit, stabilitas obat pada pH saluran cerna juga ikut andil dalam menentukan jumlah obat aktif yang terabsorpsi.

Perkembangan teknologi sediaan farmasi telah memungkinkan dirancangnya berbagai bentuk sediaan farmasi dengan waktu dan kecepatan

pelepasan zat aktif yang dimodifikasi, yang kemudian dikenal sebagai sediaan lepas terkendali (*Sustained Release*;SR). Teknologi pengendalian pelepasan zat aktif ini setidaknya telah mengatasi masalah kelalaian pengulangan dosis, pencapaian dosis obat optimal yang terabsorpsi sepanjang saluran cerna, serta efisiensi penggunaan bahan aktif. Salah satu teknologi sediaan farmasi oral yang menerapkan prinsip lepas terkendali adalah Sistem Penghantaran Obat *Gastroretentiv (Gastro Retentive Drugs Delivery System)*.

*Gastro Retentive Drugs Delivery System (GRDDS)* dapat memperpanjang waktu kontak obat pada sisi absorpsi, sehingga memberi kesempatan obat untuk terabsorpsi dalam waktu yang lebih lama dan menghasilkan konsentrasi obat dalam plasma yang lebih stabil.

#### **A. Bioavailabilitas Obat pada Penggunaan per-oral**

Bioavailabilitas (ketersediaan hayati) didefinisikan sebagai kecepatan dan jumlah (konsentrasi) obat aktif yang diabsorpsi dan mencapai sirkulasi sistemik dalam waktu tertentu (Shargel, L, 2005; Grassi, M, et.al., 2007). Bioavailabilitas suatu obat mempengaruhi daya terapeutik, aktivitas klinik dan aktivitas toksik obat. Beberapa parameter dapat digunakan untuk menilai bioavailabilitas suatu obat, antara lain melalui 1) data plasma yang meliputi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar (konsentrasi) obat dalam plasma (darah) mencapai puncak ( $t_{max}$ ), konsentrasi obat maksimum (puncak) dalam plasma ( $C_{p_{max}}$ ), area di bawah kurva kadar obat dalam plasma vs waktu (AUC); dan data urin yang meliputi jumlah kumulatif obat yang diekskresi dalam urin ( $D_u$ ), laju ekskresi obat dalam urin ( $dD_u/dt$ ), dan waktu yang diperlukan untuk terjadinya ekskresi obat maksimum dalam urin ( $t_{\sim}$ ).

Waktu yang diperlukan hingga tercapai konsentrasi obat dalam plasma mencapai puncak/maksimum ( $t_{max}$ ) menunjukkan absorpsi obat adalah terbesar dan laju absorpsi obat sama dengan laju eliminasi obat. Absorpsi masih berjalan setelah  $t_{max}$  tercapai, tetapi pada laju yang lebih lambat.

Konsentrasi plasma puncak ( $C_{p_{max}}$ ) menunjukkan konsentrasi obat maksimum dalam plasma setelah pemberian obat.  $C_{p_{max}}$  memberi suatu



petunjuk bahwa obat cukup diabsorpsi secara sistemik untuk memberikan suatu respon terapeutik dan juga petunjuk terhadap kemungkinan kadar toksik obat.

Area di bawah kurva kadar obat dalam plasma-waktu (AUC) merupakan ukuran dari jumlah bioavailabilitas suatu obat. AUC mencerminkan jumlah total obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik. AUC adalah area dibawah kurva kadar obat dalam plasma vs waktu dari  $t=0$  sampai  $t=\infty$ .

Absorpsi sistemik suatu obat dari sisi ekstrasvaskular dipengaruhi oleh sifat-sifat anatomik dan fisiologik tempat absorpsi, sifat-sifat fisikakimia obat, serta bentuk sediaanannya (Shargel, L, 2005; Grassi, M, et.al., 2007). Pengendalian variabel-variabel tersebut dapat dilakukan antara lain melalui rancangan suatu produk/bentuk sediaan obat dengan tujuan terapeutik tertentu. Umumnya bentuk sediaan obat berkorelasi dengan rute pemberiannya. Dengan memilih secara teliti rute pemberian obat dan rancangan secara tepat produk obat, maka bioavailabilitas obat aktif dapat diubah dari absorpsi yang sangat cepat dan lengkap menjadi lambat, kecepatan absorpsi yang diperlambat, atau bahkan sampai tidak terjadi absorpsi sama sekali (Shargel,L.,2005).

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat pada GIT**

#### **1. Kelarutan obat**

Obat-obatan yang digunakan melalui rute pemberian oral disiapkan dalam beberapa bentuk sediaan, yaitu tablet, kapsul, larutan, suspensi, dan emulsi. Untuk dapat terabsorpsi, obat dalam formulasi bentuk sediaan tersebut harus dapat terlarut (terdisolusi) secara molekuler dalam cairan gastrointestinal (pencernaan) sebagai tempat absorpsinya. Kecepatan disolusi dari bentuk sediaan padat oral (tablet dan kapsul) serta suspensi terkadang menjadi kecepatan pembatas (*rate-limiting step*) dalam tahapan proses absorpsi. Kecepatan pembatas pada tiap tahapan absorpsi akan mempengaruhi onset, durasi, dan intensitas respon, serta mengontrol keseluruhan bioavailabilitas obat dari suatu sediaan.

Kelemahan yang berasal dari rendahnya kecepatan disolusi dapat diperbaiki (ditingkatkan) dengan beberapa pendekatan, yakni dengan memperluas permukaan kontak bahan obat terhadap cairan disolusi, mengecilkan ukuran

partikel (particle size reduction), menggunakan bahan obat dalam bentuk garamnya, pembentukan kompleks, modifikasi bentuk fisik, dan dispersi padat (solid dispersion).

## 2. Permeabilitas obat

*Bioavailabilitas obat juga dapat dipengaruhi oleh sifat permeabilitas dari senyawa obat (bahan obat) aktif yang telah terdisolusi pada sisi absorpsi. Biopharmaceutics classification system (BCS), mengklasifikasikan kelarutan dan permeabilitas suatu obat menjadi 4 kelas, yaitu: (guidance)*

Class 1: High Solubility – High Permeability

Class 2: Low Solubility – High Permeability

Class 3: High Solubility – Low Permeability

Class 4: Low Solubility – Low Permeability

Obat-obat yang tergolong mudah larut (*high solubility*), maka *rate-limiting step* dari proses absorpsinya bukan pada tahap disolusinya. *Bioavailabilitas* obat selanjutnya ditentukan oleh tahapan ter"lambat" lainnya, misalnya tahapan absorpsi. Sifat permeabilitas obat yang rendah terhadap membran absorpsi menyebabkan obat memerlukan waktu yang lebih lambat untuk dapat terabsorpsi secara maksimal. Untuk mengatasi hal ini, maka formulasi bentuk sediaan dirancang untuk memberikan waktu yang cukup bagi obat untuk berada pada sisi absorpsi, sehingga jumlah obat yang terabsorpsi jauh lebih tinggi dibandingkan obat yang terekskresikan melalui GIT. Upaya untuk mempertahankan waktu singgah obat pada saluran cerna dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi sediaan yang memperlambat pelepasan obat (sustained release) serta memperpanjang keberadaan obat pada saluran cerna (Ranade, V, 2004).

## 3. Kecepatan Pengosongan Lambung

Kecepatan pengosongan lambung terhadap cairan (termasuk bahan yang terlarut di dalamnya) sesuai dengan volume cairan yang mengisi lambung. Volume cairan dalam lambung akan berkurang setengahnya setiap 10 menit ( $T_{1/2}$

10 menit). Hal ini berarti, meskipun obat segera terdisolusi dari bentuk sediaannya, tetapi jika permeabilitasnya rendah, maka kecepatan pengosongan lambung akan mempengaruhi waktu kontak obat pada sisi absorpsi, sehingga jumlah obat yang terabsorpsi rendah. Hal ini diperburuk dengan kondisi dimana jendela absorpsi obat yang sempit (hanya di bagian lambung atau usus saja).

Bahan yang dapat bertahan paling lama di lambung (*gastroretentive*) adalah bahan yang mampu berada pada permukaan cairan atau yang mengapung (*float*) tenggelam pada dasar lambung, melekat pada mukosa lambung ataupun bahan berukuran besar.

Pada manusia, partikel berukuran hingga 7 mm akan mudah meninggalkan lambung, sementara yang ukurannya lebih besar dapat bertahan di lambung hingga 12 jam (Grassi, M, et.al..(2007). Penundaan pelepasan obat dan waktu kontak obat yang lebih lama pada kondisi jendela absorpsi yang sempit pada salah satu bagian GIT akan meningkatkan jumlah obat yang terabsorpsi, yang secara keseluruhan akan meningkatkan bioavailabilitas obat.

Tabel 1. Waktu transit beberapa bentuk sediaan pada GIT (Chawla,G.,et.al, 2003)

Bentuk Sediaan	Waktu Transit (jam)		
	Lambung	Usus Halus	Total
Tablet	2,7 ± 1,5	3,1 ± 0,4	5,8
Pellet	1,2 ± 1,3	3,4 ± 1,0	4,6
Kapsul	0,8 ± 1,2	3,2 ± 0,8	4,0
Larutan	0,3 ± 0,07	4,1 ± 0,5	4,4

### B. *Gastroretentive Drug Delivery Systems* (GRDDS)

*Gastroretentive drug delivery systems* adalah sistem penghantaran obat yang mampu bertahan dalam lambung dalam waktu yang cukup lama. Sistem penghantaran obat *gastroretensif* merupakan suatu pendekatan untuk memperpanjang waktu tinggal sediaan obat di lambung (*Gastric Residence Time/GRT*), yang memungkinkan pelepasan obat pada sisi spesifik di dalam saluran gastrointestinal (GIT) diperpanjang, sehingga memungkinkan absorpsi

obat yang optimal (Nayak, A. K *et al*, 2010). Lokalisasi pelepasan obat pada daerah yang spesifik dari saluran gastrointestinal (GIT) memberikan banyak keuntungan khususnya untuk obat-obat dengan jendela absorpsi yang sempit (*Narrow Absorption Window*).

### **Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap retensi sediaan di dalam lambung**

Pengembangan sediaan gastroretensif harus mempertimbangkan anatomi dan fisiologi lambung. Agar obat tertahan untuk dapat melewati katup *pyloric* masuk ke dalam usus kecil, maka ukuran partikel harus berada dalam kisaran 1-2 mm (Nayak, A. K *et al*, 2010).

*Gastric Retention Time* (GRT) juga dipengaruhi oleh sediaan obat (densitas, ukuran dan bentuk sediaan), jumlah dan sifat makanan, kalori, postur, jenis kelamin, umur, tidur, *body mass index*, aktifitas fisik, keadaan penyakit setiap individu (diabetes), penggunaan obat-obatan misalnya antikolinergika (atropine, propantheline), opiat (codein), dan prokinetik agents (metoclopramide, cisapride), berat molekul, serta lipofilisitas obat.

#### **1. Densitas**

Densitas sediaan mempengaruhi kecepatan pengosongan lambung dan menentukan letak sediaan di dalam lambung. Sediaan dengan densitas yang lebih rendah dari pada isi lambung dapat mengapung diatas permukaan cairan lambung, sebaliknya densitas yang lebih tinggi akan tenggelam didasar lambung. Kedua posisi ini memungkinkan sediaan berada jauh dari pylorus. Densitas  $< 1,0 \text{ gm/cm}^3$  diperlukan untuk menunjukkan sifat *floating*.

#### **2. Ukuran dan Bentuk Sediaan**

*Gastric Residence Time* (GRT) sediaan non-floating berubah-ubah, tergantung pada bentuk dan ukurannya. Sediaan yang lebih besar (diameter lebih dari 7,5 mm) akan meningkatkan GRT karena tidak dapat melalui *pyloric antrum* ke dalam usus dengan cepat. *Ring-shaped* dan *tetrahedron-shaped* memiliki GRT yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk lainnya.

#### **3. Jumlah dan Sifat Makanan**

Jumlah, viskositas, volume, nilai kalori, dan frekwensi pemberian makanan mempengaruhi *Gastric Residence Time* (GRT) dari sediaan. Adanya makanan di dalam saluran gastrointestinal akan meningkatkan GRT dan dengan demikian, absorpsi obat akan meningkat. Peningkatan asam dan nilai kalori memperlihatkan penurunan *Gastric Emptying Time* (GET), sehingga dapat meningkatkan GRT dari sediaan.

#### 4. Jenis Kelamin, Postur dan Umur

Secara umum wanita memiliki kecepatan pengosongan lambung yang lebih lambat dari pada pria. Pada manula, kemampuan pengosongan lambung telah mengalami kemunduran. Pada posisi tubuh tegak, dan terjadi kontraksi peristaltik, maka sediaan floating akan berada jauh dari pylorus dan memperpanjang GRT, sementara sediaan non floating akan tetap dibagian bawah lambung dan mengalami pengosongan yang lebih cepat selama terjadi kontraksi peristaltik. Akan tetapi dalam keadaan terlentang sediaan floating dikeluarkan cepat daripada sediaan non-floating dengan ukuran yang sama (Garg, R *et al*, 2008; Nayak, A. K *et al*, 2010).

### C. Teknologi Sediaan *Gastroretensif*

Pengembangan teknologi bentuk sediaan farmasi yang meningkatkan lama singgah obat di lambung (*gastroretensif*) memanfaatkan sifat pengembangan (*floating*), pengembangan (*swelling*), pengendapan (*inflation*), dan perlekatan (*adhesion*) sediaan pada cairan dan mukosa lambung.

Pengontrolan terhadap *Gastric Residence Time* (GRT) suatu sediaan farmasi dengan teknologi *Gastroretentive Dosage Forms* (GRDFs) menyediakan beberapa pendekatan dalam rancangan bentuk sediaannya (Rajput, G. C *et al*, 2010). Beberapa pendekatan dalam merancang sediaan dengan sistem penghantaran obat *gastroretensif* adalah (Zate, S. U *et al*, 2010; Surana Anand. S *et al*. 2010):

#### 1. *High density (sinking) system*

Sistem ini mempunyai densitas sebesar  $\sim 3 \text{ g/cm}^3$ , tenggelam di dasar lambung dan mampu bertahan terhadap pergerakan peristaltik.

## 2. *Low density (floating) system*

*Floating system*, pertama kali diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1968, merupakan system dengan densitas yang kecil, yang memiliki kemampuan mengembang (swelling) kemudian mengapung (float) serta tinggal dilambung untuk beberapa waktu. Pada saat sediaan mengapung dilambung, obat dilepaskan perlahan pada kecepatan yang dapat ditentukan, hasil yang diperoleh adalah peningkatan *gastric residence time* (GRT) dan pengurangan fluktuasi konsentrasi obat dalam plasma (Chawla *et al.*, 2003). Sediaan *floating system* banyak diformulasi dengan menggunakan matriks-matriks hidrofilik dan dikenal dengan sebutan *hydrodynamically balanced system* (HBS), karena saat polimer mengalami hidrasi, densitasnya menurun akibat matrik yang mengembang, dan dapat membentuk gel penghalang dipermukaan bagian luar sediaan sehingga sediaan tidak terdesintegrasi dengan segera.

Formulasi sediaan floating ini dapat menerapkan sistem efferfescient (mengapung akibat produksi gas yang terperangkap dalam sediaan) dan non efferfescient (mengapung akibat pengembangan dan penurunan densitas sediaan).

## 3. *Expandable system*

Sediaan ini telah dirancang selama 3 dekade. Saat mencapai cairan lambung, sediaan akan mengembang dan mencapai ukuran yang lebih besar secara signifikan sehingga tidak dapat melalui *pylorus* dan bertahan di lambung dalam waktu yang lebih lama, sehingga memperpanjang GRT obat. Kekuatan sediaan dan gerakan peristaltik GIT membantu pelepasan obat secara perlahan.

## 4. *Mucoadhesive (bioadhesive) system*

Bioadhesi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua interaksi adhesif dengan substansi biologi, sementara mukoadhesi mendeskripsikan ikatan yang melibatkan mukus atau permukaan mukosa. Sistem ini dirancang untuk mengendalikan pelepasan dan absorpsi obat yang terlokalisasi pada sisi spesifik (mucus) serta memperpanjang waktu tinggal obat pada sisi pemberian. Bentuk sediaan mukoadhesif berpotensi untuk memperbaiki dan

meningkatkan bioavailabilitas obat, selain itu bentuk sediaan ini memunculkan interaksi yang kuat antara polimer pada sediaan dan lapisan mukus jaringan untuk membantu meningkatkan waktu kontak sediaan dan memungkinkan obat dapat dilepaskan dan diabsorpsi dalam waktu yang diperpanjang pula.

### **Keuntungan Sistem Penghantaran Obat Gastroretensif**

Sistem penghantaran obat gastroretensif menawarkan banyak keunggulan dibandingkan sediaan rute oral konvensional, antara lain (Zate, S. U *et al*, 2010):

1. Sistem penghantaran obat jenis ini utamanya digunakan untuk pengobatan terhadap gangguan yang berkaitan dengan lambung.
2. Perpanjangan waktu tinggal sediaan di lambung dapat meningkatkan bioavailabilitas, efisiensi penggunaan obat, dan memperbaiki kelarutan obat-obat.
3. Mendapatkan aktivitas terapi yang besar dari senyawa obat dengan waktu paruh yang singkat.
4. Bioavailabilitas agen terapeutik dapat ditingkatkan, khususnya untuk semua obat yang dimetabolisme pada saluran gastrointestinal (GIT) bagian atas
5. Mengatasi masalah *gastric retention time* maupun *gastric emptying time* dari sistem konvensional, misalnya sistem yang tetap mengapung diatas permukaan cairan lambung tanpa mempengaruhi kecepatan intrinsik dari pengosongan.
6. Memperpanjang waktu pelepasan bahan aktif sehingga pengobatan dengan dosis tunggal dapat berlangsung lama (*pro-long action*)
7. Pemeliharaan level terapeutik untuk jangka waktu yang panjang (mengurangi fluktuasi konsentrasi obat) sehingga meminimalkan efek toksik dan resistensi khusus untuk antibiotika misalnya; antibiotika  $\beta$ -laktam (penicillin dan cephalosporin).

### **Pertimbangan Pemilihan Senyawa aktif pada Sistem Penghantaran Obat Gastroretensif**

Karakteristik obat yang berpotensi untuk dikembangkan dalam bentuk sediaan gastroretensif antara lain (Garg, R *et al*, 2008; Nayak, A. K *et al*, 2010) :

1. Obat-obat yang diharapkan berefek lokal di lambung, misalnya; misoprostol, antasida dan lain-lain
2. Obat-obat dengan jendela absorpsi yang sempit (*narrow absorption window*) pada saluran gastrointestinal (GIT), misalnya; L-DOPA, para amino aminobenzoic acid, furosemid dan dan riboflavin riboflavin aminobenzoic acid, furosemid dan riboflavin
3. Obat-obat yang tidak stabil/rusak dalam lingkungan pH usus atau kolon, misalnya; kaptopril, ranitidine HCl, metronidazole.
4. Obat-obat yang mengganggu flora normal usus, misalnya; antibiotika-antibiotika yang melawan *Helicobacter pylori*, amoxicillin trihidrat
5. Obat-obat dengan kelarutan yang rendah pada pH tinggi, misalnya; diazepam, klordiazepoksida, verapamil HCl
6. Obat-obat yang diabsorpsi di lambung dan bagian atas saluran gastrointestinal (GIT), misalnya; suplemen kalsium, klordiazepoksid, dan cinnarazin

Karakteristik obat-obat yang tidak cocok untuk sistem penghantaran gastroretensif antara lain adalah (Nayak, A. K *et al*, 2010):

1. Obat-obat yang terbatas kelarutannya dalam pH asam, misalnya; fenitoin
2. Obat-obat yang tidak stabil dalam lingkungan asam lambung, misalnya; eritromisin
3. Obat-obat yang diharapkan pelepasannya di dalam usus besar, misalnya; 5-amino salicylic acid dan kortikosteroid.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Perkembangan teknologi sediaan farmasi telah mampu mengatasi masalah bioavailabilitas yang rendah dari obat-obatan dengan jendela absorpsi yang sempit dan memiliki permeabilitas pada sisi absorpsi yang rendah dengan memperpanjang waktu singgah di lambung (*Gastric Retention Time*) melalui suatu teknologi *Gastroretentive Drugs Delivery System* (GRDDS). Perpanjangan keberadaan obat di lambung memungkinkan absorpsi yang lengkap dan diperpanjang akibat



---

pelepasan obat yang berlangsung lama, peningkatan kelarutan dan secara keseluruhan memperbaiki bioavailabilitas obat, aktivitas terapeutik, dan meningkatkan efisiensi penggunaan obat.

Penerapan teknologi *Gastroretentive Drugs Delivery System* (GRDDS) dalam merancang suatu sediaan farmasi dapat dilakukan melalui pendekatan *floating* (pengembangan), *mucoadhesive* (pelekatan pada mukosa lambung), *swelling* (pengembangan), dan *high density* (tenggelam pada dasar lambung).

## B. SARAN


Sediaan gastroretentif dengan segala kelebihan yang ditawarkan hendaknya dapat senantiasa diteliti dan dikembangkan dengan menggunakan model obat-obatan yang berpotensi untuk diformulasi dengan teknologi ini.

## DAFTAR PUSTAKA


1. Chawla, G, Gupta P., Koradia V, and Bansal, Arvind K.,(2008), Gastroretention; A Means To Address Regional Variability In Intestinal Drug Absorption, *Trop J Pharm Res*, ; 7 (3) 1055-1066, Available online at <http://www.pharmatech.com>
2. Garg, R., Gupta, GD., (2008), *Progress in Controlled Gastroretentive Delivery*, Tropical Journal of Pharmaceutical Research, September 2008; 7 (3) 1055-1066, University of Benin, Benin City, Nigeria Available online at <http://www.tjpr.org>.
3. Grassi, Mario, et.al..(2007) *Understanding Drug Release and Absorption Mechanisms*, Taylor & Francis Group, London,35-52
4. Nayak, Amit Kumar et al. 2010. *Gastroretentive Drug Delivery Systems: A Review*. Asian Journal Of Pharmaceutical And Clinical Research, 3(1)
5. Klausner, Eytan A. et al. 2003. *Expandable Gastroretentive Dosage Forms*. Journal Of Controlled Release 90 (2003) 143-162.
6. Rajput, G.C. et al. 2010. *Stomach Specific Mucoadhesive Tablet As Controlled Drug Delivery Systems- A Review Work*. International Journal Of Pharmaceutical And Biological Research, vol 1(1), 2010, 30-41
7. Ranade, Vasant V and Hollinger, Manfred, (2004), *Drug Delivery System*, CRC Press
8. Sauzet, C et al. 2009. *An Innovative Floating Gastro Retentive Dosage Systems: Formulation And In Vitro Evaluation*. International Journal Of Pharmaceutics 378(2009) 23-29.
9. Shargel, Leon ( 2005 ), *Biofarmasetika dan Farmakokinetika Terapan*, (Terj), Airlangga University Press, Surabaya, 173-175

10. Surana, Anand S., Kotecha, Rakhee K., (2010, *An Overview On Various Approaches To Oral Controlled Drug Delivery System Via Gastroretention*, International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 2(2), 68-72, Available online at [www.globalresearchonline.net](http://www.globalresearchonline.net)
11. Zate, S.U., P.I., Mahale, Kothawade, Kapse, G.H., K.P., Anantwar, S.P., (2010), *Gastro Retentive Bioadhesive Drug Delivery System*, International Journal of PharmTech Research, 2 (2), 1227-1235, Coden (USA)

LAMPIRAN



Gambar 1. Absorpsi obat di GIT (a) sediaan konvensional (b) GRDDS



Gambar 2. Klasifikasi sistem penghantaran obat Gastroretensif (Chawla, G.et.al, 2003)

## GAMBARAN ANGKA KEJADIAN ATONI UTERI DI RSIA. SITI FATIMAH MAKASSAR TAHUN 2011

Rini Fitriani  
Program Studi Kebidanan  
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

### ABSTRACT

*Atonia uteri adalah kegagalan serabut-serabut otot miometrium uterus untuk berkontraksi dan memendek. Hal ini merupakan penyebab perdarahan post partum yang paling penting dan biasa terjadi segera setelah bayi lahir hingga 4 jam setelah persalinan. tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran angka kejadian Atonia Uteri Di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari 2009- Desember 2010.*

*Penelitian yang digunakan adalah penelitian survey dengan pendekatan deskriptif yang bermaksud mendapatkan gambaran tentang angka kejadian Atonia Uteri di RSIA Siti Fatimah Makassar dengan Sampel adalah semua ibu yang mengalami Atonia Uteri di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari 2009 - Desember 2010.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Usia Ibu, atonia uteri terbanyak pada usia 20-35 tahun sebanyak 71,7%. Berdasarkan Paritas ibu, atonia uteri terbanyak pada paritas  $\leq 3$  sebanyak 69,9%. Berdasarkan Jarak persalinan ibu, atonia uteri terbanyak pada jarak persalinan  $\geq 2$  tahun sebanyak 67,4%. Berdasarkan Anemia dalam kehamilan, atonia uteri terbanyak pada HB  $< 12$  gr% sebanyak 71,7%.*

**Keywords:** *atonia uteri, deskriptif.*

### PENDAHULUAN

Atonia uteri adalah kegagalan serabut-serabut otot miometrium uterus untuk berkontraksi dan memendek. Hal ini merupakan penyebab perdarahan post partum yang paling penting dan biasa terjadi segera setelah bayi lahir hingga 4 jam setelah persalinan (Nugroho,2010).

WHO (World Health Organisation), pada tahun 2007 berkisar 58.500 ibu meninggal akibat masalah kehamilan dan persalinan, bahkan dari separuh jumlah seluruh kematian terjadi dalam 24 jam setelah melahirkan, yang disebabkan karena perdarahan (40-50%), infeksi (20-30%) dan preklampsia (20-30%). (Ali,2009).

Rawannya kesehatan ibu menurut survey demografi kesehatan

Indonesia (2007) ditandai oleh tingginya angka kematian ibu di Indonesia tahun 2007 yaitu 228/100.000 kelahiran hidup . Penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan (40-60%), infeksi atau sepsis ( 20-30%) dan toksemia (20-30%) sisanya sekitar 5 % disebabkan penyakit lainnya yang memburuk resiko kematian ibu seperti umur terlalu muda atau terlalu tua, jumlah anaknya lebih dari 4, jarak antara kelahiran kurang dari 2 tahun. (Depkes RI,2007)

Data untuk provinsi Sulawesi Selatan, angka kematian ibu(AKI) dengan perdarahan sebanyak 60 orang ( 54,11%) pada tahun 2004 sebesar 110 per 100.000 kelahiran hidup. (Profil dinas kesehatan sul-sel).

Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007 jumlah kematian ibu tercatat 143 orang, untuk tahun 2008 jumlah kematian ibu maternal mengalami penurunan menjadi 121 orang dan pada tahun 2009 menurun lagi menjadi 118 orang. Kematian ibu maternal tersebut terdiri dari kematian ibu hamil (19%), kematian ibu bersalin (46%), dan kematian ibu nifas (35 %). (Depkes Sulsel, 2009)

Banyak faktor yang dapat menyebabkan atonia uteri, diantaranya umur ibu, paritas, jarak kehamilan, overdistensi uteri dan anemia dalam kehamilan. Umur yang beresiko terjadinya atonia uteri yaitu < 20 tahun dan > 35 tahun. Selain itu umumnya kejadian atonia uteri meningkat dengan meningkatnya paritas ibu. Untuk jarak kehamilan apabila terlalu pendek atau kurang dari 24 bulan akan sangat berbahaya, karena uterus terutama endometrium belum kembali ke kondisi sebelumnya sehingga pada saat persalinan dapat terjadi atonia uteri. (Wiknjosastro,2007).

Rumah sakit ibu dan anak Siti Fatimah adalah rumah sakit yang melayani rawat jalan dan rawat inap. Rawat inap khususnya melayani ibu bersalin dan lain-lain. Ibu bersalin biasanya ditolong oleh dokter dan bidan dengan mengantisipasi segala komplikasi yang mungkin terjadi. Apabila terjadi komplikasi dapat ditangani sesuai dengan protap yang ada, jika tidak dapat ditangani maka pasien dirujuk ke rumah sakit yang lebih memadai

## **BAHAN DAN METODE**

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah RSIA Siti Fatimah Makassar jalan Gunung merapi No.75 kelurahan Pisang Selatan kecamatan Ujung Pandang kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan. Dengan pertimbangan bahwa Rumah sakit tersebut rumah sakit pendidikan dengan fasilitas yang lengkap dan petugas profesional. Selain itu Rumah sakit tersebut adalah rumah sakit rujukan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

### **Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey dengan pendekatan Deskriptif yang bermaksud mendapatkan gambaran tentang angka kejadian Atonia Uteri di RSIA Siti Fatimah Makassar.

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah semua ibu yang mengalami atonia uteri di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari 2009 - Desember 2010.

Sampel adalah semua ibu yang mengalami Atonia Uteri di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari 2009 - Desember 2010.

#### **a. Inklusi**

- 1) Ibu yang mengalami Atonia Uteri Di RSIA Siti Fatimah Makassar yang mempunyai catatan medik lengkap.

#### **b. Eksklusi**

- 1) Ibu yang mengalami Atonia Uteri Di RSIA Siti Fatimah Makassar yang tidak memiliki catatan medik lengkap.
- 2) Ibu yang mengalami perdarahan postpartum selain atonia uteri.

### **Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari rekam medik RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari

2009 - Desember 2010. Dengan menggunakan Purposive Sampling berdasarkan sejumlah variable yang diteliti.

### **Analisis Data**

Data yang diperoleh dikumpul dan diolah secara manual dengan menggunakan kalkulator serta disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan – penjelasan berdasarkan tujuan penelitian. Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis secara deskriptif, dengan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

P : Persentase yang dicari

f : frekuensi

n : jumlah sampel

### **HASIL**

#### **a. Distribusi frekuensi kejadian atoni uteri berdasarkan usia ibu.**

Usia ibu dalam penelitian ini adalah lamanya, dihitung saat ibu dilahirkan sampai ibu meninggal.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dari 46 ibu yang mengalami atoni uteri didapatkan 13 ibu yang umurnya < 20 tahun dan ≥ 35 tahun (28,3%) dan 33 ibu yang berumur 20-35 tahun (71,7%).

#### **b. Distribusi frekuensi kejadian atoni uteri berdasarkan paritas ibu.**

Paritas ibu dalam penelitian ini adalah banyaknya kelahiran yang dialami oleh seorang wanita atau banyaknya anak yang dilahirkan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dari 46 ibu yang mengalami atoni uteri didapatkan 14 ibu yang melahirkan lebih dari 3 kali (30,40%) dan 32 ibu yang melahirkan tidak lebih atau sama dengan 3 kali (69,6%).

#### **c. Distribusi frekuensi kejadian atoni uteri berdasarkan jarak persalinan.**

Jarak persalinan dalam penelitian ini adalah suatu pertimbangan untuk menentukan persalinan yang pertama dengan persalinan berikutnya.

---

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 46 ibu yang mengalami atoni uteri didapatkan 15 ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun (32,6%) dan 31 ibu yang jarak kehamilannya 2 tahun atau lebih (67,4%).

**d. Distribusi frekuensi kejadian atoni uteri berdasarkan anemia dalam kehamilan.**

Anemia dalam penelitian ini adalah kondisi ibu dengan kadar haemoglobin (Hb) dalam darahnya kurang dari 12 gr% selama ibu hamil.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dari 46 ibu yang mengalami atoni uteri didapatkan 33 ibu yang Hb nya < 12 gr% (71,7%) dan 13 ibu yang Hb nya  $\geq$  12 gr% (28,3%).

## **PEMBAHASAN**

Usia 20-35 tahun merupakan usia reproduksi sehat karena alat-alat reproduksi bekerja secara maksimal sehingga Usia 20-35 tahun merupakan usia reproduksi sehat karena alat-alat reproduksi bekerja secara maksimal sehingga mengurangi risiko terjadinya perdarahan pasca persalinan. Namun pada usia tersebut masih dapat terjadi atonia uteri yang disebabkan ahun berisiko mengalami atoni uteri karena belum matangnya alat reproduksi untuk hamil dan melahirkan sehingga dapat menyebabkan komplikasi termasuk atonia uteri. Komplikasi maternal meningkat kembali setelah umur diatas 35 tahun dan cenderung terjadi atonia uteri. Hal ini disebabkan karena alat-alat reproduksi yang berperan dalam proses kehamilan dan persalinan tidak efektif lagi. Dalam hal ini, miometrium tidak mampu berkontraksi dengan baik sehingga terjadi atonia uteri.

Kelompok umur yang mempunyai risiko tinggi terjadinya Atonia Uteri, yaitu mereka yang melahirkan pada usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Perdarahan pascapersalinan yang mengakibatkan kematian maternal pada wanita hamil yang melahirkan pada usia dibawah 20 tahun 2-5 kali lebih tinggi dari pada perdarahan pascapersalinan yang terjadi pada usia 20-35 tahun. Perdarahan pascapersalinan meningkat kembali setelah usia 35tahun keatas. (Faisal,2010).

Atoni uteri juga dapat terjadi pada usia 20-35 tahun yang dapat disebabkan oleh faktor lain seperti apabila ibu tersebut adalah seorang multipara, sedangkan usianya baru sekitar 20-35 tahun karena salah satu faktor kejadian atoni uteri disebabkan paritas yang tinggi atau paritas  $> 3$ .

Terdapat kesenjangan antara teori dan hasil penelitian yang diperoleh, kemungkinan disebabkan karena keterbatasan sampel atau kurangnya sampel yang diperoleh oleh peneliti dan tidak sebanding dengan sampel yang diperoleh oleh peneliti-peneliti sebelumnya sehingga hasil penelitian yang didapatkan berbanding terbalik dengan teori yang ada.

Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut kematian maternal karena pada paritas tersebut kondisi miometrium dan tonus otot bekerja dengan baik sehingga tidak menimbulkan kegagalan kontraksi pembuluh darah pada tempat implantasi plasenta. Namun pada kondisi tersebut dapat pula terjadi atoni uteri yang disebabkan oleh faktor lain.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mely Andriani, 2008 yang berjudul "Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Atoni Uteri di RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun 2008", didapatkan hasil dari 70 ibu yang mengalami atoni uteri terdapat (51,4%) yang paritas  $\leq 3$  dan (48,6%) yang paritas  $> 3$ .

Teori dan kenyataan dalam penelitian ini terdapat suatu kesenjangan yang kemungkinan disebabkan karena keterbatasan sampel atau kurangnya sampel yang diperoleh dan tidak sebanding dengan sampel yang diperoleh dengan peneliti sebelumnya.

Jarak ideal persalinan sekurang-kurangnya 2 tahun, jarak persalinan yang terlalu dekat menyebabkan ibu mempunyai waktu singkat untuk memulihkan kondisi rahimnya agar bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Perhitungan 2 tahun ini atas dasar pertimbangan kembalinya organ-organ reproduksi baru kembali ke keadaan seperti semula, namun kondisi tersebut masih dapat menyebabkan atoni uteri akibat faktor lain. (Hamidah, 2009).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryani tahun 2007 di RSUD Dr. Pringadi Medan dengan hasil bahwa dari 36 ibu yang mengalami atoni uteri



---

terdapat 66,7% yang jarak persalinannya < 2 tahun dan 33,3% yang jarak kelahirannya  $\geq$  2 tahun.

Terdapat kesenjangan antara hasil penelitan ini dengan hasil penelitan terdahulu serta teori yang ada, kemungkinan disebabkan oleh karena adanya faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya atoni uteri, misalnya jumlah paritas, umur, atau anemia.

Setiap ibu hamil dengan anemia memiliki risiko untuk terjadi perdarahan postpartum. Salah satu penyebab perdarahan postpartum adalah karena atoni uteri. Anemia dalam kehamilan dapat berpengaruh buruk terutama saat kehamilan, persalinan dan nifas. Anemia menjadi salah satu pemicu terjadinya atoni uteri karena jumlah oksigen yang diikat dalam darah kurang sehingga jumlah oksigen yang dikirim ke uterus pun berkurang. Hal ini menyebabkan otot-otot uterus tidak berkontraksi dengan adekuat sehingga timbul atoni uteri.

Kondisi ibu dengan kadar haemoglobin di bawah 12 gr% pada saat hamil, bila terjadi anemia dan tidak tertangani hingga akhir kehamilan maka akan berpengaruh pada saat postpartum. Pada ibu dengan anemia, saat postpartum akan mengalami atoni uteri. Hal ini disebabkan karena oksigen yang dikirim ke uterus kurang. Jumlah oksigen dalam darah yang kurang menyebabkan otot-otot uterus tidak berkontraksi dengan adekuat sehingga timbul atoni uteri yang mengakibatkan perdarahan banyak (Wuryanti, 2010).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wuryanti, 2010 yang berjudul "Hubungan anemia dalam kehamilan dengan perdarahan post partum karena atonia uteri di RSUD Wonogiri 2010" bahwa  $p = 0,008 < 0,05$  maka dapat disimpulkan terdapat hubungan antara anemia dalam kehamilan dengan perdarahan postpartum karena atonia uteri.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian mengenai gambaran angka kejadian atonia uteri Di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari 2009- Desember 2010, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Usia Ibu, atonia uteri terbanyak pada usia 20-35 tahun

- sebanyak 71,7%.
2. Berdasarkan Paritas ibu, atonia uteri terbanyak pada paritas  $\leq 3$  sebanyak 69,9%.
  3. Berdasarkan Jarak persalinan ibu, atonia uteri terbanyak pada jarak persalinan  $\geq 2$  tahun sebanyak 67,4%.
  4. Berdasarkan Anemia dalam kehamilan, atonia uteri terbanyak pada HB  $< 12$  gr% sebanyak 71,7%.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ali,Fitriani. "Manajemen asuhan Kebidanan perdarahan postpartum karena Atonia Uteri Di RSIA Siti Fatimah" : fakultas ilmu kesehatan UIN Makassar, 2009.
2. Ambarwati, Eny Retna. 2009. *Asuhan Kebidanan Nifas*. Cet III. Yogyakarta : Mitra Cendekia Press.
3. Ambarwati, Eny Retna. 2009. *Asuhan Kebidanan Nifas*. Cet III. Yogyakarta : Mitra Cendekia Press.
4. Azmanurazizah.2010. *larangan-larangan masa nifas*. <http://asmanurazizah.blogspot.com/2010/11/aspek-sosial-budaya-pada-masa-nifas.html>, diakses tanggal 24 januari 2011.
5. Departemen Agama RI. 2005. *Al-Quran & Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J- ART.
6. Faisal, 2010. *perdarahan pasca persalinan*. <http://www.scribd.com>, iakses tanggal 14 januari 2011.
7. Hamidah, *Jarak persalinan*.<http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/103/jtptunimus-gdl-hamidahmei-5109-3-bab2.pdf>, diakses tanggal 14 februari 2011.
8. Hidayat, A., Aziz Alimul. 2007. *Metode Penelitian & Teknik Analisa Data*. Jakarta: Salemba Medika.
9. Hidayat , Afiyah. 2009. *askep atonia uteri*. <http://hidayat2.wordpress.com/2009/06/10/askep-atonia-uteri/> diakses tanggal 14 januari 2011.
10. [2009/06 / 10/askep-atonia-uteri/](http://hidayat2.wordpress.com/2009/06/10/askep-atonia-uteri/) diakses tanggal 14 januari 2011.
11. Ida Bagus Gde. 2003. *Pemuntun kepanitraan klinik Obstetri dan ginekologi*. Edisi 2. Cet I. Jakarta : EGC.
12. \_\_\_\_\_. 2001 . *Kapita Selekta Penatalaksanaan Rutin Obstetri*
13. *Ginekologi Dan KB*. Cet I. Jakarta : EGC
14. Nugroho, Taufan . 2010. *Kasus emergency Kebidanan*. Cet I . Yogyakarta : NuhaMedika.
15. Profil dinkes-sulsel , [www.dinkessulsel.go.id](http://www.dinkessulsel.go.id), Diakses tanggal 5 februari 2011.
16. Saifuddin, Abdul Bari . 2006. *Buku Acuan Nasional pelayanan Kesehatan*.

17. Wiknjosastro, Hanifa . 2007. *Ilmu Bedah Kebidanan*. Edisi I. Cet VII . Jakarta : YBP-SP.
18. Wuryanti, Ayu," *Hubungan Anemia dalam kehamilan dengan Atonia uteri di RSUD Wonogiri "*: Fakultas kedokteran Universitas Sebelas maret, 2010.

**Tabel 1.**  
**Distribusi Frekuensi Faktor Risiko Kejadian Atoni Uteri di RSIA Siti Fatimah makassar Januari 2009-Desember 2010.**

Variabel	Frekuensi (n)	Persentase(%)
<b>Kelompok Umur</b>		
- Risiko tinggi (<20 tahun dan >35 tahun)	13	28,3
- Risiko rendah (20-35 tahun).	33	71,7
<b>Paritas Ibu</b>		
- Risiko tinggi (>3 anak)	14	30
- Risiko rendah ( $\leq 3$ anak)	32	69
<b>Jarak Persalinan Ibu</b>		
Risiko tinggi (<2 tahun)	15	32,6
Risiko rendah ( $\geq 2$ tahun)	31	67,4
<b>Anemia dalam kehamilan ibu</b>		
Risiko tinggi (Hb < 12 gr%)	33	71,7
Risiko rendah (Hb $\geq 12$ gr%)	13	28,3
<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	<b>100.0</b>

**Sumber: Data Primer, 2011**

# APLIKASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KOMITMEN PIMPINAN PADA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI KESEHATAN

M. Fais Satrianegara  
Program Studi Kesehatan Masyarakat  
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

## ABSTRACT

Penelitian menunjukkan bahwa perbaikan kualitas pada rumah-rumah perawatan kurang diperhatikan oleh individu. Sebab itu top manajemen merupakan orang yang paling penting dalam menjelaskan peningkatan kualitas. Secara tradisional, tanggung jawab untuk memantau dan mempengaruhi sikap pegawai merupakan tanggung jawab manajer sumber daya manusia.

Pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dapat meningkatkan komitmen sumber daya manusia pada kualitas. Aplikasi pengelolaan SDM dalam praktek MSDM sangat dibutuhkan untuk mengembangkan komitmen pimpinan pada kualitas di sebuah organisasi termasuk organisasi kesehatan.

Aplikasi praktek MSDM dan pengaruhnya pada komitmen manajemen pada kualitas membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, dan dukungan sosial politik terhadap komitmen pimpinan pada kualitas, serta akses informasi teknis terhadap komitmen pimpinan pada kualitas pelayanan suatu perusahaan.

Praktek atau aplikasi Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM) sangat penting di dalam membangun komitmen pimpinan dalam upaya peningkatan kualitas layanan organisasi publik seperti rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya.

Konsep etika kerja Islam memiliki asal-usul dari Alqur'an dan perkataan serta perbuatan nabi Muhammad, yang bersabda bahwa kerja keras menyebabkan dosa terumpuni dan bahwa tidak ada seorangpun memakan makanan yang lebih baik dibanding makanan yang dihasilkan dari pekerjaannya. Islam telah memberikan bukti sejarah bahwa aplikasi MSDM sangat berperan dalam membentuk karakter kepemimpinan yang berkomitmen dan akan membangun suatu peradaban yang tentunya menjadi solusi bagi kebutuhan manajemen yang berorientasi pada kualitas pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.

**Keywords:** Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), dukungan sosial politik, komitmen, organisasi publik

## PENDAHULUAN

Perusahaan untuk memenangkan persaingan harus siap dengan barang, jasa dan sumber daya yang berkualitas. Sumber daya manusia merupakan aset strategis dalam menciptakan keunggulan bersaing secara berkelanjutan (Queleh dalam M. Wahyudin, 2000: 42).

Persaingan dalam pasar global dapat dimenangkan jika perusahaan selalu menyediakan pelayanan yang superior bagi konsumen, mengembangkan kapabilitas baru dan komitmen pada kualitas, mengembangkan inovasi, kreatifitas, inisiatif dan mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif (Walker, 1992:1).

Pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dapat meningkatkan komitmen sumber daya manusia pada kualitas. Tanpa komitmen pegawai terhadap kualitas, usaha perbaikan kualitas tidak akan berhasil. Suatu hal yang penting bahwa komitmen pegawai terhadap kualitas tergantung pada komitmen pimpinan akan kualitas. Ketika pegawai menerima kenyataan bahwa manajemen memiliki komitmen terhadap kualitas, mereka cenderung untuk lebih berkomitmen pada kualitas (Howard & Foster 1999: 5).

Komitmen terhadap kualitas sumberdaya manusia paling penting dan menentukan, karena sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya. Semua potensi sumber daya manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuannya. Betapapun majunya teknologi, berkembangnya informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, namun tanpa sumber daya manusia yang berkualitas maka akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berbagai penelitian yang pernah dilakukan menyatakan bahwa rendahnya kualitas di Rumah Sakit tersebut kemungkinan salah satunya adalah karena kurangnya komitmen pimpinan pada kualitas dan pemberdayaan pegawai. Hal ini sejalan dengan hasil temuan Mc. Laughlin & Kaluzni dalam Castle (1999: 5) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas (*quality improvement*) pada rumah-

rumah perawatan seperti yang dialami oleh industri rumah sakit di Amerika adalah karena peningkatan kualitas merupakan hal yang sulit dijangkau. Penelitian menunjukkan bahwa perbaikan kualitas pada rumah-rumah perawatan kurang diperhatikan oleh individu. Sebab itu top manajemen merupakan orang yang paling penting dalam menjelaskan peningkatan kualitas. Secara tradisional, tanggung jawab untuk memantau dan mempengaruhi sikap pegawai merupakan tanggung jawab manajer sumber daya manusia (Howard & Foster, 1999: 6). Dengan demikian praktek MSDM sangat dibutuhkan untuk mengembangkan komitmen pimpinan pada kualitas.

### PRAKTEK MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai praktek MSDM. Pada Howard dan Foster (1999) dapat ditemukan pendapat beberapa ahli seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Praktek MSDM Menurut Beberapa Ahli

Youndt et al,'96	US Dep. of labor'93	Preffer, '94	Schuler,1995
Seleksi	Seleksi	Seleksi	Pengarahan
Pelatihan	Rekrutmen	Pelatihan Keterampilan	Pelatihan
Rotasi Pekerjaan	Disain Pekerjaan	Disain Ulang Pekerjaan	Disain
Pekerjaan			
Partisipasi	Promosi	Promosi	Perencanaan
Karir			
Pemberdayaan	Partisipasi	Pemberdayaan	Kompensasi
Gaji & Upah	Informasi bersama	Informasi bersama	Peningkatan
Insentif	upah yang tinggi	Insentif	Kinerja

Dari tabel 1 dapat diidentifikasi kumpulan aktivitas dengan fungsi MSDM yang tradisional (Schuler dalam Howard & Foster, 1997:7). Huselid (dalam Howard & Foster 1997:7) menyarankan bahwa praktek MSDM yang

spesifik berbeda dengan istilah objek mereka. Beberapa pengaruh perkembangan ketrampilan pegawai, target motivasi, susunan struktur sistem organisasi, sebagai contoh rekrutmen, seleksi dan pelatihan dan lainnya merupakan praktek MSDM secara tradisional, namun lebih lanjut diperlukan lagi praktek yang dapat mewakili desain aktivitas secara spesial untuk kemahiran dan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam kelompok sumber daya manusia (Rynes & Tran dalam Howard & Foster, 1999:7).

Beberapa praktek MSDM termasuk perencanaan karir dan program penghargaan yang menciptakan struktur dalam sistem MSDM, menetapkan sebuah pondasi untuk mengetahui bentuk dan sikap pegawai (Riordan & Gatewod dalam Howard & Foster, 1999:7). Untuk itu diusulkan beberapa target pegawai dalam praktek MSDM untuk membentuk sikap pegawai dalam infrastruktur yang akan mendorong kualitas, secara umum yang mempertimbangkan persyaratan untuk menuju sukses (Howard & Foster, 1999:7).

### **Komitmen Pimpinan pada Kualitas**

Komitmen adalah tanggung jawab atau kemauan yang tinggi untuk menjalankan tugas atau pekerjaan (Elha Santoso & James Arifin, 1994:77). Sedangkan menurut FX Isbagyo Wiyono (1999: 34) komitmen adalah tekad bulat untuk melakukan sesuatu dengan niat yang sungguh-sungguh. Komitmen yang baik adalah komitmen yang dimulai dari pimpinan. Pada dasarnya kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Kepemimpinan adalah hubungan antara manusia, sehingga dengan demikian, maka baik -buruknya manajemen tergantung pada baik buruknya kepemimpinan.

Menurut Susilo Martoyo (1996: 165) pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin artinya kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Sedangkan kepemimpinan sendiri memiliki arti keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama. Jadi yang dimaksud pimpinan adalah

orang yang melakukan aktivitas dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Pimpinan harus mempunyai komitmen, sebab kalau tidak program akan mengalami kegagalan. Bila pimpinan puncak tidak komit lagi dengan program yang sudah berjalan, maka program tersebut sebaiknya dihentikan atau tidak dijalankan dahulu (Kaoru Isikawa, 1998: 44).

Komitmen merupakan konsep manajemen yang menempatkan sumber daya manusia sebagai figur sentral dalam organisasi usaha. Tanpa komitmen, sukar mengharapkan partisipasi aktif dan mendalam dari sumber daya manusia. Oleh sebab itu komitmen harus dipelihara agar tetap tumbuh dan eksis disanubari sumber daya manusia. Dengan cara dan teknik yang tepat pimpinan yang baik bisa menciptakan dan menumbuhkan komitmen. Arvan (1999:31) mengemukakan 5(lima) prinsip kunci dalam membangun komitmen yakni:

- 1) Memelihara atau meningkatkan harga diri. Artinya pimpinan harus pintar menjaga agar harga diri bawahan tidak rusak.
- 2) Memberikan tanggapan dengan empati.
- 3) Meminta bantuan dan mendorong keterlibatan. Artinya bawahan selain butuh dihargai juga ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
- 4) Mengungkapkan pikiran, perasaan dan rasional.
- 5) Memberikan dukungan tanpa mengambil alih tanggung jawab. Prinsip ini mencerminkan falsafah kepemimpinan-an dimana pimpinan menawarkan bantuan agar bawahan dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan perlu diingat bahwa fungsi pimpinan hanya membantu, tanggung jawab tetap ada pada masing-masing karyawan.

Menurut Fandy dan Anastasia (1996:4) kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Menurut Kotler (1994: 56), Quality is the totality of features and characteristics of product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. Komitmen pimpinan pada kualitas adalah kesungguhan yang diperlihatkan oleh pimpinan untuk menghasilkan produk atau jasa yang paling bernilai.



Dalam ajaran Islam, seorang pemimpin dituntut mampu menampilkan kepribadian yang ber-Akhlauqul Karimah (memiliki moralitas yang baik), Qona'ah (sederhana), dan Istiqomah (konsisten/tidak ambivalen). Sedangkan berdasarkan suri tauladan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah: *siddiq* artinya jujur, benar, berintegritas tinggi dan terjaga dari kesalahan. *Fathonah* artinya cerdas, memiliki intelektualitas tinggi dan profesional. *Amanah* artinya dapat dipercaya, memiliki legitimasi dan akuntabel. *Tabligh* artinya senantiasa menyampaikan risalah kebenaran, tidak pernah menyembunyikan apa yang wajib disampaikan, dan komunikatif. Integritas kepemimpinan yang baik akan mendorong semua orang yang dipimpinnya akan komitmen dengan semua aturan yang ditetapkan oleh pemimpinnya.

Hampir semua teori kepemimpinan terdapat pada diri Nabi Muhammad Saw. Misalnya, empat fungsi kepemimpinan (*the 4 roles of leadership*) yang dikembangkan oleh Stephen Covey. Konsep ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki empat fungsi kepemimpinan, yakni sebagai perintis (*pathfinding*), penyelaras (*aligning*), pemberdaya (*empowering*), dan panutan (*modeling*).

Dari berbagai konsep kepemimpinan, ada tiga aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pertama adalah kapabilitas (*capability*)-kemampuan; kedua, kredibilitas (*credibility*)-dapat dipercaya dan ketiga, integritas (*integrity*)-kejujuran. Bila ketiga faktor ini telah dimiliki oleh seorang pemimpin, maka orang ini sudah termasuk pemimpin yang berkepribadian mulia. Dia akan mampu membawa masyarakatnya kepada kebahagiaan dan kesejahteraan.

### Perencanaan dan Pengembangan Karir

Perencanaan karir adalah proses pencapaian tujuan yang ditetapkan secara individu dan mengidentifikasi cara mencapai tujuan tersebut. Perencanaan karir haruslah disesuaikan antara tujuan yang ditetapkan dengan kesempatan yang tersedia (Mondy & Noe, 1996: 93)

Perencanaan karir dapat pula didefinisikan sebagai proses pemilihan pekerjaan, organisasi dan jalur karir yang akan ditempuh oleh orang yang bersangkutan selama hidupnya (Sondang, 1994:139). Menurut Susilo Martoyo (1996: 12), perencanaan karir didefinisikan sebagai suatu perencanaan tentang kemungkinan seseorang karyawan atau anggota organisasi sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya.

Menurut Hani Handoko (1996: 201), perencanaan karir adalah proses melalui mana seseorang memiliki sasaran karir dan jalur karir ke sasaran tersebut. Dengan demikian suatu perencanaan karir harus dilandasi penyusunan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki seseorang guna mendukung peningkatan karirnya. Dalam perencanaan karir yang paling berkepentingan adalah para pegawai yang bersangkutan. Agar dapat menentukan jalur karir dan tujuan karir yang dapat mereka tempuh perlu mempertimbangkan 5 faktor (Sondang, 1994: 207) :

1. Perlakuan yang adil dalam berkarir. Perlakuan yang adil terwujud bila kriteria promosi didasarkan pada pertimbangan yang obyektif, rasional dan di-ketahui secara luas di kalangan pegawai.
2. Kepedulian para atasan langsung
3. Informasi tentang berbagai peluang promosi.
4. Minat untuk dipromosikan.
5. Tingkat kepuasan.

### **Penilaian prestasi Kerja**

Kegiatan yang paling penting untuk memajukan karir adalah prestasi kerja yang baik, karena hal ini mendasari semua kegiatan pengembangan karir lainnya. Kemajuan karir sangat tergantung pada prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam rangka melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya (Hani Handoko,1990:135). Menurut Hasibuan (1996:105), yang dimaksud prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. Penilaian

prestasi kerja menurut Hani Handoko (1996:135) dilakukan dengan cara mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Bagi karyawan, penilaian prestasi kerja atau kecakapan dapat menimbulkan rasa puas pada diri mereka. Dengan cara ini karyawan sadar bahwa hasil kerja mereka dinilai oleh perusahaan dengan sewajarnya.

Penilaian prestasi kerja menurut Mondy and Noe (1996:326) merupakan suatu sistem formal dengan cara mengevaluasi dan mereview secara berkala kinerja individual atau tim. Dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja Garry Dessler (1992) mengemukakan langkah dalam penilaian prestasi yaitu :

1. Mendefinisikan pekerjaan yaitu memastikan bahwa anda dan bawahan anda bersama-sama sepakat atas hal-hal yang anda harapkan tercapai oleh bawahan dan standar yang akan digunakan untuk menilai prestasinya
2. Menilai prestasi yaitu membandingkan antara prestasi aktual bawahan dengan standar yang ditetapkan dalam rangka pertama, yaitu menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya diharapkan untuk dikerjakan orang lain
3. Memberikan umpan balik yaitu mengharuskan pertemuan untuk memberikan umpan balik dimana dibicarakan prestasi dan kemajuan bawahan, merancang rencana pengembangan yang mungkin diperlukan.

Sistem penilaian prestasi kerja di atas akan membuat setiap karyawan yang bekerja menjadi profesional dan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan kinerja yang telah diberikan. Sehingga imbalan dalam bentuk insentif, kenaikan gaji, fasilitas, ataupun promosi sebagai penghargaan tidak diberikan atas dasar subjektif atau suka-tidak suka, tetapi berdasarkan kinerja yang terukur secara obyektif.

Menguatkan uraian diatas, Al-qur'an telah mengajarkan kepada kita agar mempekerjakan orang kuat (mengetahui pekerjaannya) dan dapat dipercaya. Allah Subhanahuwata'ala berfirman dalam surat Al-qashash (28) ayat 26 yang artinya adalah:

"...salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Dalam Konsep etika kerja Islam memiliki asal-usul dari Alqur'an dan perkataan serta perbuatan nabi Muhammad, yang bersabda bahwa kerja keras menyebabkan dosa terampuni dan bahwa tidak ada seorangpun memakan makanan yang lebih baik dibanding makanan yang dihasilkan dari pekerjaannya. Di dalam QS at-Taubah/9:105 Allah berfirman:

*"Katakanlah bekerjalah kamu, niscaya Allah akan melihat pekerjaanmu, serta rosulNya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu nyata, lalu diberitakanya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".*

Etika kerja Islam menganggap dedikasi pada pekerjaan sebagai suatu kebajikan. Usaha yang memadai harus diberikan pada pekerjaan seseorang, yang dianggap sebagi kewajiban bagi orang yang mampu.

### Akses Terhadap Informasi Teknis

Menurut Elha & James (1994: 10) akses adalah kecepatan atau kemudahan untuk memperoleh sesuatu. Menurut Bambang (1995:231) yang dimaksud dengan teknis adalah pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan pekerjaan yang bersifat mendasar atau fisik. Akses terhadap informasi teknis adalah kemudahan atau kecepatan dalam memperoleh data dan informasi yang bersifat mendasar terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai.

Manajemen puncak atau pimpinan harus dapat menjamin bahwa akses terhadap informasi teknis yang diperlukan oleh pegawai benar-benar terbuka. Artinya, ketika pegawai ingin memperoleh informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti manajemen fungsional dan manajemen teknikal serta bagian personalia maka harus terbuka jalan dan dengan mudah memperoleh informasi tersebut. Pimpinan juga menjamin bahwa sistem informasi teknis selalu mutakhir, akurat, dapat dipercaya dan mudah digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk perencanaan karir, rekrutmen pegawai, pembinaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia dan sebagainya (Sondang, 1994: 356)

## Dukungan Sosial Politik

Perilaku politik dalam organisasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang tidak diminta sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian dalam perusahaan (Robins, 1998:34). Para manajer dapat memotivasi karyawan dengan cara memenuhi kebutuhan sosial mereka dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna. Ini berarti kepuasan dalam bekerja karyawan harus ditingkatkan, antara lain dengan cara memberikan lebih banyak kebebasan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaan mereka. Disini ditumbuhkan kontak sosial atau hubungan kemanusiaan dengan karyawan yang lebih baik (Martoyo, 1996:103).

Dalam konsep kepemimpinan Islam, Nabi Muhammad SAW adalah contoh pemimpin sosial-politik yang telah menerapkan kebijakan Sosial-Politik pada periode Medinah. Langkah Politik pertama yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar. Persaudaraan ini bermakna upaya Nabi untuk melenyapkan fanatisme kesukuan a la jahiliyah, runtuhnya semua bentuk perbedaan yang didasarkan pada asal keturunan, warna kulit, dan asal-usul kedaerahan atau kebangsaan; dan maju mundurnya seseorang hanya tergantung pada kepribadiannya sendiri dan ketaqwaannya kepada Allah. (dalam buku Sirah Nabawiyah oleh Al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyyur-Rahman, 1998)

Langkah politik kedua beliau adalah membuat kesepakatan antar berbagai faksi yang ada di Medinah yang dikenal sebagai Shafifa al-Madinah (Piagam Medinah atau Konstitusi Medinah). Dokumen tersebut menetapkan prinsip-prinsip konstitusi negara modern, seperti kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, perlindungan terhadap harta dan jiwa anggota masyarakat, dan larangan melakukan kejahatan. Piagam ini telah membukakan pintu baru dalam kehidupan politik dan peradaban dunia masa itu.

Langkah lain yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka mendapatkan dukungan secara sosial dan politik adalah ketiga beliau adalah menjalankan strategi politik luar negeri melalui kesuksesan dalam perjanjian Hudaibiyah antara beliau dan kaum Quraisy. Kemudian Nabi membangun sarana-sarana sosial

untuk mengakomodasi dakwah dan pendidikan masyarakat dengan membangun Masjid yang berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu pengetahuan dan membuat kebijakan ekonomi fiskal untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran negara Medinah seperti; shadaqah, pengumpulan jizyah (pajak), Bayt al-Mal (kantor perbendaharaan publik) dan Zakat. Kebijakan ini telah menjadi masyarakat medinah secara sosial sejahtera dan damai.

Demikianlah konsep kepemimpinan yang mendapat dukungan secara sosial dan politik diperlukan untuk membangun komitmen yang kuat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

## **PENUTUP**

Penelitian yang pernah dilakukan Howard & Foster (1999: 5-22), mengenai aplikasi praktek MSDM dan pengaruhnya pada komitmen manajemen pada kualitas membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, dan dukungan sosial politik terhadap komitmen pimpinan pada kualitas, serta akses informasi teknis terhadap komitmen pimpinan pada kualitas pelayanan suatu perusahaan.

Pimpinan dapat menyusun perencanaan karir sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan komitmennya pada kualitas. Perencanaan karir ini dapat berupa sistem promosi yang baik yang berdasarkan prestasi kerja dan bukan semata-mata pada aturan, perlakuan adil dalam berkarir, kepedulian atasan kepada bawahan, informasi peluang informasi, adanya minat pegawai untuk dipromosikan dan tingkat kepuasan pegawai atas perencanaan karir yang telah disusun dan dilaksanakan.

Sejalan dengan konsep etika kerja dalam pandangan Islam, maka praktek atau aplikasi Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM) sangat penting di dalam membangun komitmen pimpinan dalam upaya peningkatan kualitas layanan organisasi publik seperti rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Arvan Pradiansyah. 1999. Lima Prinsip Pembangun Komitmen. Manajemen. Edisi No. 125 hal 31. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
2. Castel Nicholas G. 1999. Quality Improvement and Top Management in Nursing Homes. Journal of Quality Management. Volume 4. No. 1 Pg 95-109. Elsevier Science Inc. New York.
3. Dessler Gary. 1992. Manajemen Personalia. Edisi 3. Terjemahan. Erlangga. Jakarta.
4. Fandy Tjiptono & Anastasia Diana. 1996. Total Quality Management. Andi Offset. Jakarta.
5. FX. Isbagyo Wiyono. 1999. Menyamakan Persepsi tentang Komitmen. Manajemen. Edisi No. 126 hal. 34. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
6. Koaru Isikawa. 1998. Bapak Kendali Mutu. Manajemen. Edisi No. 119 hal. 44. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
7. Kotler Phillip. 1994. Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation and Control. 8th Edition. Prentice Hall Inc. New Jersey.
8. M. Wahyuddin. 2000. Reformasi and Profesionalisme Sumber Daya Manusia. Jurnal Manajemen Daya Saing. Volume 1. Nomor 1 hal. 42-47. Jakarta.
9. Robbins Stephen P. 1998. Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi. Terjemahan. Prenhallindo. Jakarta.
10. Sondang P. Siagian. 1994. MSDM. Bumi Aksara. Jakarta.

## INTERAKSI OBAT ASAM URAT DENGAN MAKANAN

Gemy Nastity Handayani  
Program Studi Farmasi  
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

### ABSTRAK

Asam urat merupakan sebutan orang awam untuk rematik gout (*gout/rthritis*). Penyakit ini merupakan gangguan metabolik yang disebabkan asam urat (*uric acid*) yang menumpuk dalam jaringan tubuh. Asam urat adalah zat yang merupakan hasil akhir dari metabolisme purin dalam tubuh yang kemudian dibuang melalui urin. Pada kondisi gout, terdapat timbunan atau defosit kristal asam urat di dalam persendian. Asam urat yang terbentuk dari hasil metabolisme purin akan difiltrasi secara bebas oleh glomerulus dan diresorpsi di tubulus proksimal ginjal. Sebagian kecil asam urat yang diresorpsi kemudian diekskresikan di nefron distal dan dikeluarkan melalui urin.

Purin sendiri adalah zat yang terdapat dalam setiap bahan makanan yang berasal dari tubuh makhluk hidup. Dengan kata lain, dalam tubuh makhluk hidup terdapat zat purin ini, lalu karena kita memakan makhluk hidup tersebut, maka zat purin tersebut berpindah ke dalam tubuh kita. Berbagai sayuran dan buah-buahan juga terdapat purin. Purin juga dihasilkan dari hasil perusakan sel-sel tubuh yang terjadi secara normal atau karena penyakit tertentu. Normalnya, asam urat ini akan dikeluarkan dalam tubuh melalui feses (*kotoran*) dan urin, tetapi karena ginjal tidak mampu mengeluarkan asam urat yang ada menyebabkan kadarnya meningkat dalam tubuh.

Interaksi obat dan makanan terjadi bila makanan yang Anda makan mempengaruhi bahan dalam obat yang Anda minum sehingga obat tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Interaksi ini dapat menyebabkan efek yang berbeda-beda, dari mulai peningkatan atau penurunan efektivitas obat sampai efek samping. Makanan juga dapat menunda, mengurangi atau meningkatkan penyerapan obat.

**Kata Kunci :** asam urat, purin, Metabolik, Interaksi obat

### Pendahuluan

Asam urat merupakan sebutan orang awam untuk rematik gout (*gout/rthritis*). Penyakit ini merupakan gangguan metabolik yang disebabkan asam urat (*uric acid*) yang menumpuk dalam jaringan tubuh. Asam urat adalah zat yang merupakan hasil akhir dari metabolisme purin dalam tubuh yang kemudian



dibuang melalui urin. Pada kondisi gout, terdapat timbunan atau defosit kristal asam urat di dalam persendian.

Mengapa di sendi? Sendi merupakan bagian yang paling mudah dihindari kristal-kristal asam urat selain juga pada bagian kulit dan ginjal yang merupakan akibat dari penambahan kadar asam urat dalam darah. Kristal-kristal tersebut akan menyebar ke dalam rongga-rongga sendi sehingga terjadilah, peradangan akut atau terjadi gout. Jika terjadi selama bertahun-tahun, deposit kristal asam urat dalam sendi tersebut dapat mengakibatkan kerusakan sendi secara permanen. Asam urat atau gout arthritis lebih sering menyerang laki-laki terutama yang berumur di atas usia 30 tahun, karena umumnya laki-laki sudah mempunyai kadar asam urat yang tinggi dalam darahnya. Sedangkan kadar asam urat pada wanita umumnya rendah dan baru meningkat setelah menopause.

Produk buangan termasuk asam urat dan garam-garam anorganik dibuang melalui saluran ginjal, kandung kemih dan saluran kemih dalam bentuk urin. Kegagalan ginjal dalam proses pembuangan asam urat dalam jumlah yang cukup banyak dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Hal tersebut juga dapat menimbulkan komplikasi lain yaitu pengendapan asam urat dalam ginjal yang akhirnya terjadi pembentukan batu ginjal dari kristal asam urat.

Purin sendiri adalah zat yang terdapat dalam setiap bahan makanan yang berasal dari tubuh makhluk hidup. Dengan kata lain, dalam tubuh makhluk hidup terdapat zat purin ini, lalu karena kita memakan makhluk hidup tersebut, maka zat purin tersebut berpindah ke dalam tubuh kita. Berbagai sayuran dan buah-buahan juga terdapat purin. Purin juga dihasilkan dari hasil perusakan sel-sel tubuh yang terjadi secara normal atau karena penyakit tertentu.

Normalnya, asam urat ini akan dikeluarkan dalam tubuh melalui feses (kotoran) dan urin, tetapi karena ginjal tidak mampu mengeluarkan asam urat yang ada menyebabkan kadarnya meningkat dalam tubuh. Hal lain yang dapat meningkatkan kadar asam urat adalah kita terlalu banyak mengonsumsi bahan makanan yang mengandung banyak purin. Asam urat yang berlebih selanjutnya akan terkumpul pada persendian sehingga menyebabkan rasa nyeri atau bengkak. Penderita asam urat setelah menjalani pengobatan yang tepat dapat diobati

sehingga kadar asam urat dalam tubuhnya kembali normal. Tapi karena dalam tubuhnya ada potensi penumpukan asam urat, maka disarankan agar mengontrol makanan yang dikonsumsi, sehingga dapat menghindari makanan yang banyak mengandung purin.

### **Pembahasan**

Serangan gout biasanya timbul secara mendadak/akut, kebanyakan menyerang pada malam hari. Jika gout menyerang, sendi-sendi yang terserang tampak merah, mengkilat, bengkak, kulit di atasnya terasa panas disertai rasa nyeri yang sangat hebat, dan persendian sulit digerakan. Serangan pertama gout pada umumnya berupa serangan akut yang terjadi pada pangkal ibu jari kaki, dan seringkali hanya satu sendi yang diserang. Namun gejala-gejala tersebut dapat juga terjadi pada sendi lain seperti pada tumit, lutut, siku dan lain-lain.

- Kesemutan dan linu
- Nyeri terutama malam hari atau pagi hari saat bangun tidur
- Sendi yang terkena asam urat terlihat bengkak, kemerahan, panas dan nyeri luar biasa pada malam dan pagi

Gejala asam urat sangat penting untuk dikenali karena penyakit ini sangat rentan terjadi kepada siapa saja. Asam urat adalah jenis penyakit yang sangat mengganggu bagi penderitanya karena menyebabkan nyeri di persendian yang bisa menyebabkan terhambatnya aktifitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali gejala asam urat agar tindakan pencegahan terhadap penyakit ini dapat segera dilakukan.

Gejala asam urat yang harus anda waspadai antara lain adalah meningkatnya kadar purin dalam tubuh baik yang berasal dari makanan dan yang berasal dari metabolisme. Gejala asam urat dapat dilihat juga dari segi fisik. Gejala asam urat pertama yang harus diwaspadai adalah munculnya nyeri yang hebat yang dirasakan penderita pada satu atau beberapa sendi. Hal ini dikarenakan asam urat yang berlebihan dalam tubuh menumpuk dalam persendian yang menyebabkan nyeri yang biasanya tidak tertahankan.

Gejala asam urat berupa nyeri pada persendian ini biasanya memburuk pada malam hari. Sendi yang mengandung asam urat tinggi akan membengkak

dan melepuh jika kadar asam sudah sangat tinggi. Gejala asam urat ini tampak juga dari kulit di daerah persendian yang terasa nyeri tersebut. Kulit akan tampak merah bahkan dalam kondisi yang parah akan berubah menjadi merah keunguan. Gejala asam urat juga mudah dikenali dari peningkatan suhu di kulit yang terasa nyeri. Kulit akan terasa panas dan terlihat mengkilat serta mengencang. Jika tersentuh, bagian yang bengkak ini akan terasa sangat sakit.

Sendi yang sering mengalami gangguan asam urat adalah sendi di bagian pangkal ibu jari kaki, pergelangan kaki, lutut, dan pergelangan tangan. Gejala asam urat berupa nyeri di persendian ini terjadi karena kristalisasi asam urat yang terbentuk dalam sendi-sendi perifer. Hal ini dikarenakan daerah persendian tersebut lebih dingin daripada di pusat tubuh. Dalam suhu yang dingin urat cenderung membeku. Gejala asam urat yang lain yang bisa terjadi akibat kristalisasi dalam persendian ini adalah rasa kesemutan yang sangat parah.

Selain itu, gejala asam urat juga bisa terlihat dari keadaan tubuh tidak sehat seperti demam, menggigil, dan rasa tidak enak badan. Gejala asam urat lain seperti denyut jantung yang sangat cepat bisa juga terjadi. Gejala asam urat umumnya akan muncul pada usia pertengahan untuk pria, sedangkan pada wanita gejala asam urat akan mulai muncul setelah menopause. Serangan asam urat berupa gejala awal yang terasa pada persendian biasanya akan berlangsung selama beberapa hari dan kemudian menghilang sampai dengan serangan berikutnya. Gejala asam urat harus benar-benar diwaspadai untuk menghindari serangan asam urat yang lebih parah.

#### **Patofisiologi :**

Gout arthritis, atau lebih dikenal dengan nama penyakit asam urat, adalah salah satu penyakit inflamasi yang menyerang persendian. Gout arthritis disebabkan oleh penimbunan asam urat (kristal mononatrium urat), suatu produk akhir metabolisme purin, dalam jumlah berlebihan di jaringan. Penyakit ini sering menyerang sendi metatarsophalangeal 1 dan prevalensinya lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Kadang-kadang terbentuk agregat kristal besar yang disebut sebagai tofi (*tophus*) dan menyebabkan deformitas.

Peningkatan kadar asam urat serum dapat disebabkan oleh pembentukan berlebihan atau penurunan ekskresi asam urat, ataupun keduanya. Asam urat adalah produk akhir metabolisme purin.

Sintesis purin melibatkan dua jalur, yaitu jalur *de novo* dan jalur penghematan (*salvage pathway*).

1. Jalur *de novo* melibatkan sintesis purin dan kemudian asam urat melalui prekursor nonpurin. Substrat awalnya adalah ribosa-5-fosfat, yang diubah melalui serangkaian zat antara menjadi nukleotida purin (asam inosinat, asam guanilat, asam adenilat). Jalur ini dikendalikan oleh serangkaian mekanisme yang kompleks, dan terdapat beberapa enzim yang mempercepat reaksi yaitu: 5-fosforibosilpirofosfat (PRPP) sintetase dan amidofosforibosiltransferase (amido-PRT). Terdapat suatu mekanisme inhibisi umpan balik oleh nukleotida purin yang terbentuk, yang fungsinya untuk mencegah pembentukan yang berlebihan.

2. Jalur penghematan adalah jalur pembentukan nukleotida purin melalui basa purin bebasnya, pemecahan asam nukleat, atau asupan makanan. Jalur ini tidak melalui zat-zat perantara seperti pada jalur *de novo*. Basa purin bebas (adenin, guanin, hipoxantin) berkondensasi dengan PRPP untuk membentuk prekursor nukleotida purin dari asam urat. Reaksi ini dikatalisis oleh dua enzim: hipoxantin guanin fosforibosiltransferase (HGPRT) dan adenin fosforibosiltransferase (APRT).

Asam urat yang terbentuk dari hasil metabolisme purin akan difiltrasi secara bebas oleh glomerulus dan diresorpsi di tubulus proksimal ginjal. Sebagian kecil asam urat yang diresorpsi kemudian diekskresikan di nefron distal dan dikeluarkan melalui urin.

Pada penyakit gout-arthritis, terdapat gangguan kesetimbangan metabolisme (pembentukan dan ekskresi) dari asam urat tersebut, meliputi:

1. Penurunan ekskresi asam urat secara idiopatik
2. Penurunan ekskresi asam urat sekunder, misalnya karena gagal ginjal

3. Peningkatan produksi asam urat, misalnya disebabkan oleh tumor (yang meningkatkan *cellular turnover*) atau peningkatan sintesis purin (karena defek enzim-enzim atau mekanisme umpan balik inhibisi yang berperan)
4. Peningkatan asupan makanan yang mengandung purin

Peningkatan produksi atau hambatan ekskresi akan meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Asam urat ini merupakan suatu zat yang kelarutannya sangat rendah sehingga cenderung membentuk kristal. Penimbunan asam urat paling banyak terdapat di sendi dalam bentuk kristal mononatrium urat. Mekanismenya hingga saat ini masih belum diketahui.

Adanya kristal mononatrium urat ini akan menyebabkan inflamasi melalui beberapa cara:

1. Kristal bersifat mengaktifkan sistem komplemen terutama C3a dan C5a. Komplemen ini bersifat kemotaktik dan akan merekrut neutrofil ke jaringan (sendi dan membran sinovium). Fagositosis terhadap kristal memicu pengeluaran radikal bebas toksik dan leukotrien, terutama leukotrien B. Kematian neutrofil menyebabkan keluarnya enzim lisosom yang destruktif.
2. Makrofag yang juga terekrut pada pengendapan kristal urat dalam sendi akan melakukan aktivitas fagositosis, dan juga mengeluarkan berbagai mediator proinflamasi seperti IL-1, IL-6, IL-8, dan TNF. Mediator-mediator ini akan memperkuat respons peradangan, di samping itu mengaktifkan sel sinovium dan sel tulang rawan untuk menghasilkan protease. Protease ini akan menyebabkan cedera jaringan.

Penimbunan kristal urat dan serangan yang berulang akan menyebabkan terbentuknya endapan seperti kapur putih yang disebut tofi/tofus (*tophus*) di tulang rawan dan kapsul sendi. Di tempat tersebut endapan akan memicu reaksi peradangan granulomatosa, yang ditandai dengan massa urat amorf (kristal) dikelilingi oleh makrofag, limfosit, fibroblas, dan sel raksasa benda asing. Peradangan kronis yang persisten dapat menyebabkan fibrosis sinovium, erosi tulang rawan, dan dapat diikuti oleh fusi sendi (ankilosis). Tofus dapat terbentuk di tempat lain (misalnya tendon, bursa, jaringan lunak). Pengendapan kristal asam urat dalam tubulus ginjal dapat mengakibatkan penyumbatan dan nefropati gout.

Penimbunan kristal urat dan serangan yang berulang akan menyebabkan terbentuknya endapan seperti kapur putih yang disebut tofi/tofus (*tophus*) di tulang rawan dan kapsul sendi. Di tempat tersebut endapan akan memicu reaksi peradangan granulomatosa, yang ditandai dengan massa urat amorf (kristal) dikelilingi oleh makrofag, limfosit, fibroblas, dan sel raksasa benda asing. Peradangan kronis yang persisten dapat menyebabkan fibrosis sinovium, erosi tulang rawan, dan dapat diikuti oleh fusi sendi (ankilosis). Tofus dapat terbentuk di tempat lain (misalnya tendon, bursa, jaringan lunak). Pengendapan kristal asam urat dalam tubulus ginjal dapat mengakibatkan penyumbatan dan nefropati gout

### **Interaksi Obat Dengan Makanan :**

Interaksi obat dan makanan terjadi bila makanan yang Anda makan mempengaruhi bahan dalam obat yang Anda minum sehingga obat tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Interaksi ini dapat menyebabkan efek yang berbeda-beda, dari mulai peningkatan atau penurunan efektivitas obat sampai efek samping. Makanan juga dapat menunda, mengurangi atau meningkatkan penyerapan obat.

Itulah sebabnya mengapa beberapa obat harus diminum pada waktu perut kosong (1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan) dan beberapa obat lain sebaiknya diambil bersamaan dengan makanan.

### **Contoh Makanan Yang mengandung banyak purin.**

- Lauk pauk seperti jeroan, hati, ginjal, limpa, babat, usus, paru dan otak.
- Makanan laut seperti udang, kerang, cumi, kepiting.
- Makanan kaleng seperti kornet dan sarden.
- Daging, telur, kaldu atau kuah daging yang kental.
- Kacang-kacangan seperti kacang kedelai (termasuk hasil olahannya seperti tempe, tauco, oncom, susu kedelai), kacang tanah, kacang hijau, tauge, melinjo, emping.
- Sayuran seperti daun bayam, kangkung, daun singkong, asparagus, kembang kol, buncis.
- Buah-buahan seperti durian, alpukat, nanas, air kelapa.

- Minuman dan makanan yang mengandung alkohol seperti bir, wiski, anggur, tape, tuak.

### Obat Untuk asam urat atau penyakit inflamasi rheumatoid :

Seperti yang kita ketahui bahwa gout arthritis merupakan inflamasi yang menyerang persendian. Gout arthritis disebabkan oleh penimbunan asam urat (kristal mononatrium urat), suatu produk akhir metabolisme purin, dalam jumlah berlebihan di jaringan. Oleh karena itu terapi yang biasa di gunakan adalah obat yang dapat menghentikan inflamasi atau mengurangi produksi produksi asam urat, golongan obat ini biasa di kenla dengan obat pirai.

Contoh obat yaitu :

Ada 2 kelompok obat pirai, yaitu obat yang menghentikan proses inflamasi akut misalnya kolkisin, fenilbutazon, oksifentabutazo dan indometasin dan obat yang mempengaruhi kadar asam urat misalnya probenesid, allopurinol, dan sulfinpirazon. Untuk keadaan akut di gunakan obat AINS.

#### 1. Kolkisin

Kolkisin merupakan suatu anti inflamasi yang unik yang terutama di indikasikan paa penyakit pirai, obat ini merupakan alkaloid *Cholchicum autumnale* sejenis bunga leli.

- Mempunyai anti inflamasi spesifik terhadap penyakit pirai
  - Tidak mempunyai efek analgesic
  - Paa penyakit pirai, kolkisin tidak meningkatkan ekskresi, sintesis atau kdara asam urat dalam darah.

Obat ini mengganggu metabolisme nucleoprotein sehingga terjadi depolarimisasi dan menghilangnya mikrotubulu fibrilar granulosit dan sel bergerak lain. Hal ini menyebabkan terjainya penghambatan migrasi granulosit ke tempat inflamasi sehingga pelepasan mediator inflamasi juga di hambat dan respon inflamasi di tekan. Peniliti lain juga memperlihatkan bahwa kolkisin mencegah pelepasan glikoprotein dan leukosit yang pada pederita gout menyebabkan nyeri dan inflamasi sendi.

## 2. Probenesid

Probenesid berfungsi mencegah serta mengurangi kerusakan sendi dan pembentukan tofi pada penderita pirai. Probenesid tidak efektif untuk serangan akut, probenesid juga berguna pada pengobatan hiperurisemia, probenesid tidak berguna jika laju filtrasi glomerulus kurang dari 30 ml permenit.

Efek samping : gangguan saluran cerna, nyeri kepala dan reaksi alergi.

## 3. Sulfinpirazon

Mencegah serta mengurangi kelainan sendi dan tofi pada penderita pirai kronis berdasarkan hambatan reabsorpsi tubular asam urat, sulfinpirazon kurang efektif dalam menurunkan kadar asam urat dibandingkan dengan alopurinol dan tidak berguna pada penderita pirai akut.

## KESIMPULAN

Asam urat merupakan penyakit yang terjadi akibat penimbunan purin yang terlalu tinggi didalam tubuh, oleh karena itu pola makan harus diatur dengan baik untuk mencegah terjadinya penimbunan purin penyebab asam urat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1995. Farmakologi dan Terapi. Jakarta
2. Browsing Internet melalui situs search engine [www.google.com](http://www.google.com)
3. Hand-out Kuliah Biomedik Farmakologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
4. Hand-out Kuliah Farmakologi Program Studi Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
5. Muhlis, Muhammad, S.Si, Apt. 2003. Diklat Kuliat . Yogyakarta: Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan
6. Undang-undang Bidang Kesehatan dan Farmasi.2003, Departemen Kesehatan Republik Indonesia



## PENYAKIT ARTERI PERIFER PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS

Asriani

Program Studi Kesehatan Masyarakat  
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

### ABSTRACT

*Diabetes mellitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Komplikasi kronik yang ditimbulkan dapat berupa makroangiopati pada pembuluh darah perifer. Penyakit arteri perifer (PAP) adalah manifestasi dari atherosklerosis dengan karakteristik adanya atherosclerotic occlusive disease pada ekstremitas bawah. Proses metabolisme yang abnormal pada penderita DM berkontribusi terhadap pembentukan atherosklerosis, di samping itu terjadi peningkatan inflamasi pembuluh darah dan perubahan pada berbagai tipe sel yang menyebabkan keluhan nyeri dan berkurangnya pulsasi arteri dorsalis pedis dan arteri tibialis posterior. Tujuan penatalaksanaan PAP adalah untuk modifikasi faktor risiko kardiovaskuler, untuk mengurangi gejala claudicatio intermittens, juga untuk memperbaiki kualitas hidup.*

*Proses metabolisme yang abnormal pada penderita DM berkontribusi terhadap pembentukan atherosklerosis, di samping itu terjadi peningkatan inflamasi pembuluh darah dan perubahan pada berbagai tipe sel.*

*Penegakan diagnosis PAP pada penderita DM penting untuk memulai terapi lebih cepat sehingga risiko kejadian atherothrombotic dapat diturunkan, memperbaiki kualitas hidup dan menghindari kecacatan.*

*Tujuan penatalaksanaan PAP adalah untuk modifikasi faktor risiko kardiovaskuler, untuk mengurangi gejala claudicatio intermittens, juga untuk memperbaiki kualitas hidup*

*Kata kunci : Penyakit arteri perifer, Diabetes Mellitus*

### I. PENDAHULUAN

Diabetes mellitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya.<sup>1</sup> Pada penderita DM terjadi berbagai macam perubahan biologis vaskuler. Perubahan tersebut meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi kronik, baik mikroangiopati (nefropati, retinopati) maupun makroangiopati (pembuluh darah jantung, pembuluh darah perifer).<sup>1,2</sup>

Penyakit arteri perifer (PAP) adalah manifestasi dari atherosklerosis dengan karakteristik adanya *atherosclerotic occlusive disease* pada ekstremitas bawah.<sup>3</sup> Proses atherosklerosis yang terjadi pada pembuluh darah akan meningkat sesuai dengan bertambahnya usia dan adanya penyakit metabolik. Faktor risiko untuk terjadinya PAP adalah DM, dislipidemia, hipertensi, obesitas, stress, aktivitas fisik yang kurang dan disfungsi endothel.<sup>4,5</sup>

Adler dkk,<sup>6</sup> menemukan bahwa hiperglikemia berhubungan erat dengan PAP. Diperkirakan peningkatan risiko PAP sebesar 28% tiap kenaikan 1% HbA<sub>1c</sub>, ekuivalen dengan penurunan risiko PAP sebesar 22% tiap 1% penurunan HbA<sub>1c</sub>.

## II. PATOFISIOLOGI

Proses metabolisme yang abnormal pada penderita DM berkontribusi terhadap pembentukan atherosklerosis, di samping itu terjadi peningkatan inflamasi pembuluh darah dan perubahan pada berbagai tipe sel.<sup>5</sup>

Inflamasi merupakan faktor risiko pembentukan atherosklerosis. Peningkatan kadar C-Reactive Protein (CRP) sangat kuat berhubungan dengan terjadinya PAP. Karena itu selain merupakan marker terhadap adanya atherosklerosis, peningkatan CRP juga merupakan faktor risiko PAP. Pada pasien dengan toleransi glukosa terganggu terjadi peningkatan kadar CRP. CRP memiliki efek prokoagulan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk meningkatkan ekspresi dari faktor jaringan. CRP juga menghambat sintesa Nitrogen Oksida (NO) di endotel hingga mengakibatkan regulasi tonus pembuluh darah yang abnormal dan meningkatkan produksi plasminogen activator inhibitor-1 yang akan menghambat pembentukan plasmin fibrinolitik dari plasminogen.<sup>5</sup>

Pada penderita DM, proses vasodilatasi yang diperantarai NO terganggu karena adanya hiperglikemia, asam lemak bebas yang berlebihan dan resistensi insulin. Efek dari disfungsi endotel ini menyebabkan kerentanan arteri terhadap atherosklerosis. Juga terjadi peningkatan produksi dari vasokonstriktor, seperti endothelin-1 yang meningkatkan tonus pembuluh darah dan pertumbuhan sel otot polos serta migrasinya. Hiperglikemia juga mengaktifkan protein kinase C dan

kappa B yang meningkatkan produksi dari oksigen reaktif yang mempercepat terbentuknya lesi atherosklerosis.<sup>5</sup>

Agregasi platelet meningkat pada pasien DM. Peningkatan kadar gula darah mengaktifkan protein kinase C dan meningkatkan stress oksidatif. Platelet meningkatkan ekspresi dari reseptor glikoprotein I b dan II b/III a, meningkatkan risiko trombolitiknya.<sup>5</sup>

Pada pasien DM, proses koagulasi bertambah dengan meningkatkan ekspresi dari faktor jaringan dan menurunkan kadar anti koagulan, seperti antitrombin III sehingga plak atherosklerosis lebih mudah ruptur dan membentuk trombus. Disamping itu, kecendrungan untuk terjadinya koagulasi pada penderita DM disertai dengan proses fibrinolisis yang terganggu.<sup>5</sup>

### III. DIAGNOSIS

Penegakan diagnosis PAP pada penderita DM penting untuk memulai terapi lebih cepat sehingga risiko kejadian *atherothrombotic* dapat diturunkan, memperbaiki kualitas hidup dan menghindari kecacatan.<sup>4,5</sup>

Anamnesis dan pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan awal yang penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor risiko PAP, keluhan penderita, gangguan fungsi organ dan juga untuk menyingkirkan penyebab nyeri tungkai yang lain. Anamnesis terutama untuk mengetahui onset dan durasi dari gejala klinis serta karakteristik nyeri. Nyeri biasanya berupa rasa kram atau kelelahan otot yang muncul saat berjalan dan hilang secara cepat saat beristirahat. Namun sebagian besar penderita PAP tidak menunjukkan gejala.<sup>4,5</sup>

Pemeriksaan fisik yang dilakukan termasuk memeriksa tekanan darah, palpasi pulsasi arteri perifer dan auskultasi terhadap pulsasinya. Tidak terabanya pulsasi arteri dorsalis pedis dan arteri tibialis posterior dapat mengatkan dugaan adanya PAP, namun harus didukung oleh pemeriksaan penunjang untuk mengkonfirmasi diagnosa.<sup>4,5</sup>

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosa PAP :

1. Ankle Brachial Index (ABI)
2. Pulse Volume Recordings (PVRs)

3. Duplex ultrasound
4. Magnetic Resonance Angiography (MRA)
5. Computed Tomography Angiography (CTA)
6. Angiography

Tabel 1 : Klasifikasi penyakit arteri perifer Fountaine's stage dan Rutherford's categories<sup>7</sup>

FONTAINE		RUTHERFORD		
Stage	Clinical	Grade	Categor y	Clinical
I	Asymptomatic	0	0	Asymptomatic
IIa	Mild claudication	I	1	Mild claudication
IIb	Moderate-severe claudication	I	2	Moderate claudication
		I	3	Severe claudication
III	Ischemic rest pain	II	4	Ischemic rest pain
IV	Ulceration or gangrene	III	5	Minor tissue loss
		IV	6	Ulceration or gangrene

#### IV. PENATALAKSANAAN

Tujuan penatalaksanaan PAP adalah untuk modifikasi faktor risiko kardiovaskuler, untuk mengurangi gejala claudicatio intermittens, juga untuk memperbaiki kualitas hidup.

##### 1. Obat-obat anti platelet

*American Diabetes Association (ADA)* merekomendasikan penggunaan aspirin pada pasien DM dan PAP, terutama pasien yang memiliki riwayat Infark Miokard. Dosis aspirin yang direkomendasikan ADA adalah 81-325 mg/hari (aspirin enteric coated).<sup>8</sup>

##### 2. Modifikasi faktor risiko atherosklerosis

- a. Merokok
- b. Menurunkan berat badan
- c. Hyperlipidemia
- d. Hipertensi
- e. Diabetes

### 3. Penatalaksanaan *Claudicatio Intermittent* (CI)

Untuk mengurangi gejala CI, guidelines dari ACA/AHA merekomendasikan program latihan yang diawasi selama 30-45 menit, tiga kali seminggu selama paling sedikit 12 minggu (Kelas I).<sup>9</sup>

Saat ini terdapat obat yang digunakan untuk terapi simptomatik CI : pentoxifylline dan cilostazol. Pantoxifillin oral 400 mg 3 kali sehari dapat dipertimbangkan sebagai terapi alternative pada pasien dengan simptomatik *claudicatio intermittens* (kelas IIb).<sup>9</sup> Pentoxifilline adalah derivat methylxanthine yang berfungsi sebagai vasodilator, antiplatelet dan mengurangi kekentalan darah.<sup>10</sup>

Cilostazol merupakan phosphodiesterase inhibitor yang menekan agregasi platelet dan bertindak sebagai direct arterial vasodilator. Cilostazol juga memiliki kelebihan dapat meningkatkan kadar HDL, menurunkan triglyserida dan mengurangi proliferasi sel otot polos pembuluh darah.<sup>10</sup> Dosis yang direkomendasikan 100 mg 2 kali sehari (kelas I).<sup>9</sup>

### 4. Revaskularisasi

Terdapat dua teknik yang umumnya dilakukan pada revaskularisasi : operasi dan percutaneous therapy. Indikasinya menurut guidelines *The Trans Atlantic Inter-Society Consensus II* (TASC II) adalah untuk individu dengan keterbatasan dalam melakukan aktivitas yang disebabkan oleh *claudicatio intermittens* dimana gejala klinis diperkirakan akan mengalami perbaikan jika intervensi dilakukan dan adanya respon yang tidak adekuat dengan terapi konservatif.<sup>9,10</sup>

## V. KESIMPULAN

Penyakit Arteri Perifer (PAP) adalah salah satu komplikasi makroangiopati pada pasien diabetes mellitus (DM). Tujuan penatalaksanaan PAP adalah untuk modifikasi faktor risiko kardiovaskuler, untuk mengurangi gejala *claudicatio intermittens*, juga untuk memperbaiki kualitas hidup.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, Konsensus pengelolaan dan Pencegahan Diabetes mellitus Tipe 2 di Indonesia. 2006;;4-5
2. Suyono S, Buku Ajar ilmu Penyakit Dalam: Diabetes Melitus di Indonesia. Sudoyo S et al. Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2006;1874 – 81
3. American Diabetes Association. Peripheral Arterial Disease in People with Diabetes. *Diabetes Care*. 2003;26:3333 – 41
4. Sontheimer DL. Peripheral Vascular disease; diagnosis and treatment. *American Family Physician*. 2006;11:1971 – 76
5. Marso SP, Hiatt WR. Peripheral Arterial Disease in Patients with Diabetes. *Jacc*. 2006;47;921 – 29
6. Adler AI, et al. UKPDS 59: Hyperglycemia and other Potentially Modifiable Risk Factors for Peripheral Vascular Disease in Type 2 Diabetes. *Diabetes Care*. 2002;25;894 – 99
7. TASC Document. TASC II: Inter-Society Consensus for the Management of PAD. 2007:S6 – S29
8. American Diabetes Association. Aspirin Therapy in diabetes. *Diabetes care*. 2003: 26;S87 – S88
9. American College of cardiology Foundation. American Heart Association. ACC/AHA Pocket Guideline: Management of patients with peripheral Arterial Disease (Lower Extremity, renal, mesenteric and abdominal). *Aortic*. 2006;8 – 29.
10. Helton TJ. *Manual of Cardiovascular Medicine: Peripheral Arterial Disease*. 3<sup>rd</sup> Edition. Griffin BP, Topol EJ (Eds). Lippincot Williams and Wilkins. 2009:415 - 22

## EFEK TERAPI ANTI-PSIKOTIK TIPIKAL

Azizah Nurdin  
Program Studi Keperawatan  
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

### ABSTRAK

Obat-Obatan antipsikotik dapat diklasifikasikan dalam kelompok tipikal dan atipikal. Antipsikotik tipikal merupakan golongan obat yang memblokir dopamin pada reseptor pasca-sinaptik neuron di otak, khususnya sistem limbik dan sistem ekstrapiramidal (dopamin D-2 reseptor antagonist) sedangkan antipsikotik atipikal merupakan golongan yang selain berafinitas terhadap Dopamin D-2 reseptor juga berafinitas terhadap 5 HT<sub>2</sub> Reseptor (Serotonin-dopamin antagonist) yang secara signifikan tidak memberikan efek samping gejala ekstrapiramidal bila diberikan dalam dosis klinis yang efektif.

Penggunaan antipsikotik tipikal memberikan efek eliminasi gejala-gejala positif dan gangguan organisasi isi pikir pasien pada 60-70% pasien skizofrenia maupun pasien psikotik dengan gangguan afek. Efek antipsikotik ini terlihat beberapa hari hingga beberapa minggu pemberian.

Pemberian obat antipsikotik tipikal umumnya pada pasien dengan gejala positif seperti halusinasi, delusi, gangguan isi pikir dan waham serta memiliki efek samping berupa sindrom ekstrapiramidal sedangkan untuk pasien psikotik dengan gejala negatif obat tipikal hanya memberikan sedikit perbaikan sehingga pemberian obat psikotik atipikal lebih dianjurkan karena obat atipikal memiliki kemampuan untuk meningkatkan aktivitas dopaminergik kortikal prefrontal sehingga dengan peningkatan aktivitas tersebut dapat memperbaiki fungsi kognitif dan gejala negatif yang ada.

Pemberian terapi antikolinergik merupakan terapi primer yang diberikan. Bila reaksi distonia akut berat harus mendapatkan penanganan cepat dan agresif. Umumnya diberikan Benztropin dengan jalur intravena atau difenhidramin intramuskuler.

**Keyword :** Antipsikotik tipikal, atipikal, sindrom ekstrapiramidal.

### A. PENDAHULUAN

Obat-Obatan Antipsikotik dapat diklasifikasikan dalam kelompok tipikal dan atipikal. Antipsikotik tipikal merupakan golongan obat yang memblokir dopamin pada reseptor pasca-sinaptik neuron di otak, khususnya sistem limbik dan sistem ekstrapiramidal (dopamin D-2 reseptor antagonist).<sup>1</sup>

Dopamine memiliki peran yang sangat penting dalam etiologi psikosis. Berdasarkan penelitian menggunakan amfetamin dan methamphetamine yang mengeksaserbasi delusi dan halusinasi pada pasien skizofrenia didapatkan bahwa dopamine merupakan peranan penting dalam etiologi halusinasi dan delusi tersebut.<sup>1</sup>

Obat-obat antipsikotik tipikal merupakan antagonis reseptor dopamine sehingga menahan terjadinya dopaminergik pada jalur mesolimbik dan mesokortikal.<sup>2</sup> Blokade reseptor D<sub>2</sub> dopamine dapat memberikan efek samping sindrom ekstrapiramidal.<sup>1</sup>

Sedangkan antipsikotik atipikal merupakan golongan yang selain berafinitas terhadap Dopamine D-2 receptor juga berafinitas terhadap 5 HT<sub>2</sub> Reseptor (*Serotonin-dopamine antagonist*). Secara signifikan tidak memberikan efek samping gejala ekstrapiramidal bila diberikan dalam dosis klinis yang efektif.<sup>1</sup>

Pemberian obat antipsikotik tipikal umumnya pada pasien dengan gejala positif seperti halusinasi, delusi, gangguan isi pikir dan waham. Sedangkan untuk pasien psikotik dengan gejala negatif obat tipikal hanya memberikan sedikit perbaikan. Sehingga pemberian obat psikotik atipikal lebih dianjurkan karena obat atipikal memiliki kemampuan untuk meningkatkan aktivitas dopaminergik kortikal prefrontal sehingga dengan peningkatan aktivitas tersebut dapat memperbaiki fungsi kognitif dan gejala negatif yang ada.<sup>1</sup>

## B. ANTIPSIKOTIK TIPIKAL

Penggunaan antipsikotik tipikal memberikan efek eliminasi gejala-gejala positif dan gangguan organisasi isi pikir pasien pada 60-70% pasien skizofrenia maupun pasien psikotik dengan gangguan afek. Efek antipsikotik ini terlihat beberapa hari hingga beberapa minggu pemberian.<sup>1</sup>

Metabolisme antipsikotik tipikal umumnya berlangsung di sitokrom P450, yang berlangsung di hepar melalui proses hidroksilasi dan demetilasi agar lebih larut dan mudah diekskresikan melalui ginjal. Dikarenakan oleh banyaknya metabolit aktif pada antipsikotik tipikal maka sulit untuk menemukan korelasi yang bermakna terhadap kadar metabolit dalam plasma dengan respon klinis.



Puncak konsentrasi didalam plasma umumnya 1-4 jam setelah dikonsumsi (obat oral) atau sekitar 30-60 menit (secara parenteral).<sup>2,6</sup>

Antipsikotik yang memiliki potensial rendah lebih memberikan efek sedatif, antikolinergik, dan lebih menyebabkan hipotensi postural. Sedangkan antipsikotik potensial tinggi memiliki kecenderungan untuk memberikan gejala ekstrapiramidal.<sup>2</sup>

Antipsikotik tipikal memiliki banyak pengaruh terhadap variabel fisiologis terkait dengan mekanisme antagonis pada beberapa sistem neurotransmitter. Pengaruh antipsikotik pada golongan tipikal ini terjadi melalui antagonisme di reseptor dopaminergik D-2 yang terdapat di traktus dopaminergik di otak yang meliputi mesokortikal, mesolimbik, tuberoinfundibular dan traktus nigrostriatal. Walaupun efek blokade reseptor dopamine D-2 di mesokortikal dan mesolimbik dipercaya sebagai terapi pada gangguan psikotik namun juga menjadi penyebab utama timbulnya berbagai efek samping gangguan kognitif dan perilaku.<sup>2</sup>

Antipsikotik tipikal terbagi menjadi 3 kelas yakni golongan phenothiazine, golongan butyrophenone, dan golongan diphenyl buthyl piperidine.

- Golongan phenothiazine terbagi menjadi tiga rantai yakni
  - Rantai aliphatic contohnya Chlorpromazine dan levomepromazine
  - Rantai piperazine contohnya Perphenazine, Trifluoperazine, dan Fluphenazine
  - Rantai piperidin contohnya Thioridazine.
- Golongan butyrophenone yakni Haloperidol
- Golongan diphenyl buthyl piperidine yakni Pimozide.

### C. EFEK ANTIPSIKOTIK TIPIKAL

#### a. Gejala Ekstrapiramidal (*Extrapyramidal syndrome*)

Gejala ekstrapiramidal (EPS) mengacu pada suatu gejala atau reaksi yang ditimbulkan oleh penggunaan jangka pendek atau panjang dari medikasi antipsikotik golongan tipikal. Obat antipsikotik tipikal yang paling sering memberikan efek samping gejala ekstrapiramidal yakni Haloperidol,

Trifluoperazine, Perphenazine, Fluphenazine, dan dapat pula oleh Chlorpromazine. Namun lebih sering diakibatkan oleh obat dengan potensial tinggi yang memiliki afinitas yang kuat pada reseptor muskarinik.<sup>1</sup> Gejala bermanifestasikan sebagai gerakan otot skelet, spasme atau rigitas, tetapi gejala-gejala itu diluar kendali traktus kortikospinal (piramidal).<sup>3</sup>

Gejala ekstrapiramidal sering di bagi dalam beberapa kategori yaitu reaksi distonia akut, *tardive* diskinesia, akatisia, dan sindrom Parkinson.<sup>3</sup>

- Reaksi distonia akut

Merupakan spasme atau kontraksi involunter satu atau lebih otot skelet yang timbul beberapa menit. Kelompok otot yang paling sering terlibat adalah otot wajah, leher, lidah atau otot ekstraokuler, bermanifestasi sebagai tortikolis, disastria bicara, krisis okulogirik, sikap badan yang tidak biasa hingga opistotonus (melibatkan keseluruhan otot tubuh). Hal ini akan mengganggu pasien, dapat menimbulkan nyeri hingga mengancam kehidupan seperti distonia laring atau diafragmatik. Reaksi distonia akut sering terjadi dalam satu atau dua hari setelah pengobatan dimulai, tetapi dapat terjadi kapan saja. Terjadi pada kira-kira 10% pasien, lebih lazim pada pria muda, dan lebih sering dengan neuroleptik dosis tinggi yang berpotensi tinggi, seperti haloperidol, trifluoperazine dan flufenazine.<sup>3</sup>

- Akatisia

Manifestasi berupa keadaan gelisah, gugup atau suatu keinginan untuk tetap bergerak, atau rasa gatal pada otot. Pasien dapat mengeluh karena anxietas atau kesukaran tidur yang dapat disalah tafsirkan sebagai gejala psikotik yang memburuk. Sebaliknya, akatisia dapat menyebabkan eksaserbasi gejala psikotik akibat perasaan tidak nyaman yang ekstrim. Agitasi, pemacuan yang nyata, atau manifestasi fisik lain dari akatisia hanya dapat ditemukan pada kasus yang berat.<sup>3</sup>

- Sindrom Parkinson

Terdiri dari akinesia, tremor, dan bradikinesia. Akinesia meliputi wajah topeng, jedaan dari gerakan spontan, penurunan ayunan lengan pada saat berjalan, penurunan kedipan, dan penurunan mengunyah yang dapat

menimbulkan pengeluaran air liur. Pada bentuk yang lebih ringan, akinesia hanya terbukti sebagai suatu status perilaku dengan jeda bicara, penurunan spontanitas, apati dan kesukaran untuk memulai aktifitas normal, kesemuanya dapat dikelirukan dengan gejala skizofrenia negatif. Tremor dapat diteukan pada saat istirahat dan dapat pula mengenai rahang. Gaya berjalan dengan langkah yang kecil dan menyeret kaki diakibatkan karena kekakuan otot.<sup>3</sup>

- **Tardive diskinesia**

Disebabkan oleh defisiensi kolinergik yang relatif akibat supersensitif reseptor dopamine di puntamen kaudatus. Merupakan manifestasi gerakan otot abnormal, involunter, menghentak, balistik, atau seperti tik yang mempengaruhi gaya berjalan, berbicara, bernapas, dan makan pasien dan kadang mengganggu. Faktor predisposisi dapat meliputi umur lanjut, jenis kelamin wanita, dan pengobatan berdosisi tinggi atau jangka panjang. Gejala hilang dengan tidur, dapat hilang timbul dengan berjalannya waktu.<sup>3</sup>

#### **b. Sindrom Neuroleptik Maligna**

Sindrom neuroleptik maligna merupakan gabungan dari hipertermia, rigiditas, dan disregulasi autonomik yang dapat terjadi sebagai komplikasi serius dari penggunaan obat antipsikotik. Sindrom ini pertama kali dikenal tahun 1960 setelah observasi pasien yang diberikan obat antipsikotik potensial tinggi.<sup>4</sup>

Mekanisme antipsikotik sehingga dapat menyebabkan SNM berhubungan dengan sifat antagonism obat terhadap reseptor D-2 dopamine. Blokade pusat reseptor D-2 pada hipotalamus, jalur nigrostriatal, dan di medulla spinalis menyebabkan terjadinya peningkatan rigiditas otot dan tremor berkaitan yang dengan jalur ekstrapiramidal. Blokade reseptor D2 hipotalamus juga menghasilkan peningkatan titik temperatur dan gangguan mekanisme pengaturan panas tubuh. Sementara itu efek antipsikotik di perifer tubuh menyebabkan peningkatan pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma sehingga terjadi peningkatan kontraktilitas yang juga dapat berkontribusi dalam terjadinya hipertermia, rigiditas, dan penghancuran sel otot.<sup>4</sup>

Semua golongan antipsikotik dapat menyebabkan sindrom neuroleptik maligna baik neuroleptik potensial rendah maupun potensial tinggi. Berdasarkan penelitian SNM lebih sering ditemukan pada pasien yang mengkonsumsi haloperidol dan chlorpromazine. Antipsikotik atipikal yang terbaru walaupun tidak diklasifikasikan secara akurat sebagai golongan neuroleptik juga dapat mengakibatkan sindrom ini. Contoh obat antipsikotik atipikal yang juga dapat menyebabkan sindrom neuroleptik maligna (SNM) seperti olanzapine, risperidone, ziprasidone, dan quetiapine.<sup>4</sup>

Faktor resiko yang berhubungan erat dengan kejadian SNM yakni penggunaan antipsikosis dosis tinggi, waktu yang singkat dalam menaikkan dosis pengobatan, penggunaan injeksi antipsikotik kerja lama, kondisi pasien yang mengalami dehidrasi, kelelahan, dan agitasi. Selain itu pada pasien yang telah mengalami SNM juga memiliki resiko tinggi untuk terjadi SNM rekurens.<sup>1,4</sup>

Secara epidemiologi belum terdapat adanya penelitian mengenai kejadian SNM yang berhubungan dengan suku. Namun penelitian di Cina menunjukkan terdapat insidens 0,12% dari pasien yang menggunakan obat neuroleptik sementara di India terdapat 0.14%. SNM dapat terjadi kapan pun dari waktu pengobatan dan resiko kejadian meningkat pada pasien yang berusia kurang dari 40 tahun. Namun 2/3 kasus terjadi pada minggu pertama setelah pemberian obat. Angka kematian sekitar 10-20% dan umumnya resiko kematian meningkat bila pasien telah mengalami nekrosis sel-sel otot yang menyebabkan rhabdomyolisis.<sup>4</sup>

Gambaran gejala klinis SNM dapat berupa :<sup>5</sup>

- Disfagia
- *Resting tremor*
- Inkontinensia
- Delirium yang berkelanjutan pada letargi, stupor hingga koma (level kesadaran yang fluktuatif)
- Tekanan darah yang labil/berubah-ubah
- Sesak nafas, takipnea
- Agitasi psikomotrik
- Takikardia dan hipertermia (demam tinggi)

#### - Rigiditas

Pemeriksaan laboratorium pada pasien dengan SNM memperlihatkan peningkatan Kreatinin kinase (CK) akibat penghancuran dan nekrosis sel-sel otot, peningkatan aminotransferase aspartat/GOT dan aminotransferase alanine/GPT), peningkatan Laktat dehidrogenase (LDH) yang juga menggambarkan terjadinya nekrosis dan dapat dengan cepat berkembang menjadi rhabdomyolisis yang memberikan hasil laboratorium hiperkalemia, hiperfosfatemia, hiperurisemia, dan hipokalsemia. Selain itu bila terdapat peningkatan kadar myoglobin dalam darah atau myoglobinuria merupakan tanda terjadinya kegagalan ginjal.<sup>1</sup>

#### c. Gangguan fungsi kognitif

Terdapat konsensus bahwa antipsikotik yang bersifat antimuskarinik kuat dapat mengganggu fungsi memori. Gangguan untuk memusatkan perhatian, menyimpan memori, dan memori semantik yang mungkin memang terdapat pada pasien skizofrenia di episode awal penyakit dapat menjadi lebih berat. Selain itu kemampuan memecahkan masalah sosial, keterampilan sosial juga memperlihatkan penurunan.<sup>1</sup>

#### d. Efek hormonal

Obat psikotik tipikal yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan peningkatan produksi hormon prolaktin terutama pada wanita.<sup>1</sup>

Blokade pada traktur tuberoinfundibular yang terproyeksikan ke hipotalamus dan kelenjar hipofisis mengakibatkan berbagai efek samping neuroendokrine, yakni peningkatan pelepasan hormone prolaktin.<sup>2</sup>

Prolaktin serum yang meningkat dapat mempengaruhi fungsi seksual pada wanita maupun pria yang dapat bermanifestasi sebagai galaktorrhea, amenorrhea dan pembesaran payudara pada wanita, gangguan fungsi ereksi dan pencapaian orgasme, gangguan libido, impotensi, dan ginekomasti pada pria.<sup>1,2</sup>

**e. Efek samping pada sistem lainnya**

- Efek lain antipsikotik tipikal seperti efek antikolinergik baik sentral maupun perifer melalui blokade reseptor muskarinik. Gejala pada efek sentral seperti agitasi yang berat, disorientasi waktu, tempat dan orang, halusinasi, dan dilatasi pupil. Sedangkan efek perifer antikolinergik berupa mulut dan hidung yang kering umumnya dilaporkan pada pasien dengan pengobatan antipsikotik tipikal potensi rendah, contohnya chlorpromazine dan mesoridazine. Efek antikolinergik autonomik lainnya seperti konstipasi. <sup>5,6</sup>
- Fotosensitivitas dapat terjadi pada pasien yang mengkonsumsi golongan potensi rendah seperti chlorpromazine sehingga pasien perlu diinstruksikan untuk berhati-hati ketika terpapar sinar matahari. Selain itu dermatitis alergi dapat terjadi di awal pengobatan. <sup>6</sup>
- Efek sedasi terjadi akibat mekanisme hambatan reseptor histamine H<sub>1</sub> yang mungkin akan berpengaruh dalam pekerjaan bila pasien merupakan orang yang masih aktif bekerja. <sup>1,2</sup> Akibat inhibisi psikomotorik menjadikan aktivitas psikomotorik menurun, kewaspadaan berkurang dan kemampuan kognitif menurun. <sup>1</sup>
- Efek autonomik yang muncul seperti hipotensi postural dimediasi oleh blokade adrenergik umumnya pada pengguna obat tipikal potensial rendah seperti chlorpromazine dan thioridazine. Sehingga penggunaan obat tipikal potensial rendah intramuscular memerlukan pemantauan tekanan darah (saat berbaring dan berdiri) untuk mencegah pasien pingsan ataupun jatuh saat berdiri. <sup>6</sup>
- Gangguan irama jantung merupakan efek antipsikotik yang mengganggu kontraktilitas jantung, menghancurkan enzim kontraktilitas sel-sel miokardium. <sup>1,6</sup>
- Antipsikotik tipikal mampu menurunkan ambang batas seseorang untuk mengalami kejang. Chlorpromazine dan thioridazine diperkirakan bersifat lebih epileptogenik sehingga resiko untuk kejang selama masa

pengobatan perlu dipertimbangkan dalam gangguan kejang atau lesi pada otak.<sup>2</sup>

- Selain itu efek yang mungkin timbul juga dapat berupa peningkatan berat badan yang kebanyakan terdapat pada pasien yang mengkonsumsi chlorpromazine dan thioridazine.<sup>1,2</sup>
- Efek hematologi dapat terjadi berupa leukopenia dengan sel darah putih  $3.500 \text{ sel/mm}^3$  merupakan masalah yang umum. Agranulositosis yang mampu mengancam kehidupan dapat terjadi pada 1 : 10.000 pasien yang dirawat dengan antipsikotik tipikal.<sup>6</sup>

#### D. PENATALAKSANAAN

##### a. Gejala Ekstrapiramidal (*Extrapyramidal syndrome*)

Pasien yang mengalami reaksi distonia akut harus segera ditangani. Penghentian obat-obatan psikotik yang sangat dicurigai sebagai penyebab reaksi harus dilakukan sesegera mungkin. Pemberian terapi antikolinergik merupakan terapi primer yang diberikan. Bila reaksi distonia akut berat harus mendapatkan penanganan cepat dan agresif. Umumnya diberikan Benztropin dengan jalur intravena atau difenhidramin intramuskuler.<sup>3</sup>

Penatalaksanaan akatisia dengan memberikan antikolinergik dan amantadin, dan pemberian proanolol dan benzodiazepine seperti klonazepam dan lorazepam<sup>2</sup>.

Untuk sindrom Parkinson diberikan agen antikolinergik. Sementara untuk *tardive* diskinesia ditangani dengan pemakaian obat neuroleptik secara bijaksana untuk dosis medikasinya. Penggunaan golongan Benzodiazepin dapat mengurangi efek gerakan involunter pada banyak pasien.<sup>3</sup>

##### b. Sindrom Neuroleptik Maligna (SNM)

Penanganan yang paling utama bila pasien mengalami SNM adalah penghentian terlebih dahulu konsumsi obat-obatan antipsikotik. Gejala akan berkurang dalam 1-2 minggu. Untuk mempertahankan fungsi organ-organ vital tubuh dan mencegah dari komplikasi yang lebih buruk perlu diperhatikan untuk menjaga kestabilan sirkulasi dan ventilasi pasien, temperatur yang meningkat

diatasi dengan pemberian antipiretik dan resusitasi cairan secara agresif dan mengontrol keseimbangan cairan bila terdapat tanda yang mengarahkan kemungkinan terjadi gagal ginjal. Terapi farmakologi yang diberikan yakni bromocriptine yang merupakan agonis dan prekursor reseptor dopamine.<sup>2,4,7</sup>

## E. KESIMPULAN

Obat-Obatan Antipsikotik dapat diklasifikasikan dalam kelompok tipikal dan atipikal. Dopamine memiliki peran yang sangat penting dalam etiologi psikosis. Antipsikotik tipikal merupakan golongan obat yang membloke dopamine pada reseptor pasca-sinaptik neuron di otak, khususnya sistem limbik dan sistem ekstrapiramidal (dopamine D-2 receptor antagonist). Walaupun efek blokade reseptor dopamine D-2 di mesokortikal dan mesolimbik dipercaya sebagai terapi pada gangguan psikotik namun juga menjadi penyebab utama timbulnya berbagai efek samping gangguan kognitif dan perilaku. Efek samping yang mungkin terjadi akibat penggunaan antipsikotik tipikal dapat berupa gangguan fungsi kognitif, efek sedatif yang mungkin tidak diharapkan pada pasien yang masih bisa aktif bekerja, dan efek antikolinergik berupa mulut kering dan hipotensi postural. Efek gangguan hormonal dapat berupa amenorrhea pada wanita, gangguan fungsi ereksi dan pencapaian orgasme pada pria, gangguan libido, impotensi, dan ginekomasti.

Untuk efek samping yang perlu diperhatikan yakni gangguan ekstrapiramidal (*extrapyramidal syndrome*) berupa reaksi distonia akut, *tardive dyskinesia*, akatisia, dan sindrom Parkinson. Sedangkan efek samping yang perlu diwaspadai dan memerlukan tindakan segera dan agresif yakni Sindrom Neuroleptik maligna yang bila tidak segera ditangani dapat menyebabkan kematian.



**DAFTAR PUSTAKA**

1. Meltzer Y. Herbert. Antipsychotic and anticholinergic drugs. Michael G. Gelder, Juan J. López-Ibor, Jr. and Nancy Andreasen in : New Oxford Textbook of Psychiatry. 2000. Chapter 6.2.5. Oxford University Press
2. Wilkatis John, Teresa M., Henry Nasarallah. Classic Antipsychotic Medications. Alan F. Scazberg, Charles B.N., eds. In Textbook of Psychopharmacology, 2004. American Psychiatric Publishing : England. Hal. 425-431
3. Anonym. Sindrom Ekstrapiramidal. [cited : 16 juni 2011] Available in : <http://medicafarma.blogspot.com/2009/03/efek-samping-ekstrapiramidal-obat.html>.
4. Joseph Tonkonogy, MD, PhD, Stephen Soreff, MD. Neuroleptic Malignant Syndrome Workup. [cited : 16 juni 2011]. Available in <http://emedicine.medscape.com/article/288482>
5. David Samuel Uretsky, PhD. Antipsychotic drugs. In : Gale Encyclopedia of Medicine 2. 2000  
Sadock Benjamin J., Virginia A. Sadock. Dopamine receptor antagonist: Typical Antipsychotics. In : Kaplan & Sadock's pocket handbook of Psychiatric Drug Treatment. 4<sup>th</sup> edition. 2006. Lipincott Williams & Wilkins: Philadelphia. Page 123-133.
6. George W. Arana, Jerrold F. Rosenbaum. Antipsychotic drugs. In : Handbook of Psychiatric Drug Therapy, 4<sup>th</sup> edition. 2000. Lipincott Williams & Wilkins: Philadelphia. Page 6-28

# PEDOMAN UNTUK PENULIS

## Petunjuk Umum

Jurnal Kesehatan adalah publikasi ilmiah yang terbit 6 bulan sekali, menerima naskah dalam bentuk *original article* atau *research paper*, tinjauan pustaka, laporan kasus, ceramah dan editorial yang relevan dengan bidang kesehatan masyarakat, kefarmasian, keperawatan, kebidanan dan ilmu kedokteran dasar. Naskah yang dikirim adalah naskah yang belum dipublikasikan. Semua naskah yang dikirim akan diseleksi dengan menggunakan sistem *peer review*.

## Pengiriman dan Persiapan Teknis Naskah

Naskah diketik dalam format doc./docx. (*microsoft office word*) pada kertas berukuran A4 dengan batas margin top 4 cm, left 4, right 3 cm, bottom 3cm, font time new roman, size 12, spasi 1 ½. Setiap bagian naskah dimulai pada halaman baru dengan urutan sebagai berikut: halaman judul, abstrak, kata kunci (*key words*), teks keseluruhan, ucapan terima kasih, daftar pustaka, tabel dan gambar (setiap tabel dan gambar (setiap tabel dan gambar pada halaman terpisah). Nomor halaman dicantumkan berurutan dimulai dari halaman judul pada bagian tengah bawah.

## Halaman Judul

Halaman judul mencakup : Judul dibuat singkat, spesifik dan informatif, ringkasan judul tidak lebih dari 40 karakter yang dicantumkan di bawah judul; nama dan alamat setiap penulis, nama lembaga afiliasi penulis; nama dan alamat korespondensi, nomor telepon, email dan facsimili.

## Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak ditulis tidak lebih dari 200 kata yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris. Abstrak dibuat singkat, informatif dengan menekankan aspek baru dan penting dari tulisan. Kata kunci dicantumkan pada halaman yang sama dengan abstrak sesuai dengan Uniform Requirements oleh International Committee of Journal Editor di Vancouver, British Columbia. Pilih 3-5 buah kata yang dapat membantu penyusunan indeks.

## Teks Makalah

Teks makalah disusun menurut sub judul yang sesuai yaitu Pendahuluan, Metode, Hasil dan Diskusi (Format IMRAD). Cantumkan ukuran dalam unit/satuan SI unit. Gunakan istilah yang baku. Buatlah singkatan sesuai anjuran style Manual for Biological Science misalnya kcal. Laporan sautan panjang, tinggi, berat dan isi dalam satuan metrik (meter, kilogram, atau liter).

## Metode Statistik

Jelaskan tentang metode statistik secara rinci pada bagian "metode". Metode yang tidak lazim ditulis secara rinci berikut rujukan metode tersebut.

## Tabel dan Gambar

Setiap tabel terima kasih judul singkat. Setiap kolom diberi subjudul singkat. Nomor tabel berurutan sesuai dengan penyebutan dalam teks. Jumlah tabel dan gambar maksimal 6 buah.

## Ucapan Terima Kasih

Batasi ucapan terima kasih pada para profesional, terutama ditujukan kepada 1) pihak yang memberi bantuan dana, 2) pihak dan lembaga yang memberi dukungan, 3) para profesional yang memberi kontribusi dalam penyusunan makalah. Naskah yang diterima redaksi akan dibahas oleh mitra bestari dan redaksi berhak memperbaiki susunan bahasa tanpa mengubah isinya. Usulan perbaikan naskah akan disampaikan kepada penulis yang bersangkutan

Naskah dikirimkan ke alamat redaksi:

Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar  
Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia  
Telp. (0411) 424 835/Fax. (0411) 424 836

