



STATISTIKA PARAMETRIK

(Konsep, Kasus dan Analisis Data dengan Software R)

ABDUL RAHMAN, S.Pd., M.Si



STATISTIKA PARAMETRIK

Konsep, Kasus dan Analisis Data dengan Software R

Abdul Rahman

Badan Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini kedalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Statistika Parametrik

Konsep, Kasus dan Analisis Data dengan Software R

Penulis:

Abdul Rahman

Editor Prof. Dr. Nursini, S.E., MA

Desain Sampul

Nurbayani

Cetakan I: 2021

vii + 178 hlm; 15,5 x 23 cm

ISBN 978-623-93540-2-2

Badan Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 63 Romangpolong

Samata, Kabupaten Gowa

BUKU INI SECARA SPESIAL KU PERSEMBAHKAN UNTUK

**Pujaan Hati Istriku
Nurbayani, SE., S.Pd., M.Si., CTA., ACPA**

**Kedua Bidadari Kecilku
Alifia Fatiya Nur Rezki Rahman
Aqila Zakiya Althafunnisa Rahman**

PENGANTAR PENULIS



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt yang memegang setiap kejadian, mengangkat setiap kemuliaan, penyempurna dari setiap kebahagiaan umat manusia, pelimpah rahmat dan karunia-Nya. Salam dan Salawat semoga senantiasa menyelimuti Baginda Rasulullah tercinta, keluarga, serta sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa bepegang teguh dan konsisten pada ajaran-Nya, sehingga penyusunan buku yang berjudul **“Statistika Parametrik: Konsep, Kasus dan Analisis Data dengan Software R”** dapat diselesaikan sesuai dengan target penulis tetapkan.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi tentunya merupakan tantangan tersendiri saat ini, namun memberikan kemudahan dalam menyelesaikan suatu permasalahan di berbagai permasalahan di berbagai bidang. Begitu juga dalam bidang penelitian (riset) dan statistika. Software statistika juga tersedia beragam perangkat lunak (*software*) yang sangat mempermudah pengolahan data statistik, seperti *Minitab*, *Statistical Package for Social Sciences*, (*SPSS*). *Statistical Analysis System* (*SAS*), *Sigmastat*, *Micro TSP*, *Sistat*, *Statistic*, *S Plus*, *MINITAB*, *Amos*, *LISREL*, *E-Views*, *STATA*, *R*, *R Studio*. Buku ini difokuskan pada penggunaan software R Studio, sampai saat ini, pengguna statistika di Indonesia masih belum banyak yang menggunakan R studio untuk kepentingan analisis data.

R merupakan sistem untuk analisis data yang termasuk kelompok software statistik open source yang tidak memerlukan lisensi atau gratis, yang dikenal dengan freeware. Sampai saat ini, pengguna statistika di Indonesia masih belum banyak yang menggunakan R untuk keperluan analisis data. Sebagian besar pengguna statistika di Indonesia masih menggunakan paket-paket statistik komersil, seperti *SPSS*, *MINITAB*, *S-plus*, *SAS*, atau *Eviews* lainnya.

Buku ini disusun agar memperoleh konsep yang matang dan mampu menerapkan teknik analisis data kuantitatif dalam proses penelitian baik secara manual sekaligus mampu mengolahnya melalui Software R (*Rstudio*) sehingga menghasilkan kesimpulan dan keputusan yang tepat dan akurat. Buku ini, selain memberikan konsep dan teori-teori terkait pengujian yang dilakukan di dalam statistika parametrik, dan disertai dengan kasus-kasus aplikasi penelitian dilapangan serta juga dilengkapi panduan langkah praktis

mengaplikasi teori-teori tersebut dengan kasus penelitian yang ada melalui software R (Rstudio).

Buku ini menyajikan Konsep Penelitian dan Statistika; Mengenal Software R (Rstudio); Manajemen data pada R; Statistik deskriptif menjelaskan bagaimana menyajikan data dalam gambar dan grafik; juga menjelaskan bagaimana menghitung ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data baik data tunggal maupun kelompok serta uji statistik digunakan statistika parametrik diantaranya Uji Beda Populasi (Uji Z maupun Uji t; Korelasi Pearson, ANOVA (One or Two ANOVA test) dan Analisis Regresi.

Buku ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang secara ikhlas memberikan sumbangsih berupa ide, pikiran, motivasi nasihat serta bimbingan. Dengan itu, penulis mengutarakan ucapan terima kasih dan penghargaan Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Abustani Ilyas Selaku Dekan; Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak., CA Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr. Hj. Rahmawati Muin., M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan; Dr. Amiruddin K, M.El selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Dr. Hasbiullah, S.E., M.Si dan Dr. Alim Syariati, S.E., M.Si Selaku ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Penulis mempersembahkan buku ini untuk sang pujaan hati istri tercinta Nurbayani, S.E., S.Pd., M.Si., CTA., CTPA dan ananda Alifiah Fatiya Nur Rezki Rahman dan Aqila Zakiya Althafunnisa Rahman serta seluruh keluarga besar atas dorongan, semangat, motivasi dorongannya selama penulis menyelesaikan penyusunan buku ini. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian buku ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa buku ini masih mengandung banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat berterima kasih apabila para pembaca bersedia memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan buku ini pada edisi berikutnya. Tidak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada penerbit yang telah bersedia menerbitkan buku ini. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan dalam perbaikan buku ini dapat dikirimkan kealamat email

Pengantar Penulis

abdul.rahman1582@uin-alauddin.ac.id

abdulrahman1582@gmail.com. Semoga bermanfaat.

atau

Makassar, Juni 2021

Penulis

Abdul Rahman

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I STATISTIKA DAN PENELITIAN	1
A. Mengapa Statistika dibutuhkan dalam Penelitian	1
B. Konsep Dasar Statistika	3
C. Sumber dan Jenis Data serta Pengukurannya	6
D. Relevansinya Belajar Statistika	12
E. Peran Komputer dalam Pengolahan Data Statistik	15
BAB II MENGENAL SOFTWARE R	17
A. Tentang R.....	17
B. Proses Instalasi R di Windows	18
C. Keunggulan Software R dalam Pengolahan Data	35
BAB III MANAJEMEN DATA R	43
A. Operator Arimatik	43
B. Proses Perhitungan Arimatik.....	45
C. Jenis Data R	47
D. Jenis Objek Data R	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DALAM GRAFIK	54
A. Pendahuluan.....	54
B. Scaterplot.....	55
C. Histogram	60
D. Q - Q (Quantile - Quantile)	61
E. Boxplot.....	62
BAB V UKURAN PEMUSATAN DAN PENYEBARAN DATA.....	65
A. Ukuran Pemusatan.....	65
B. Ukuran Penyebaran	72
BAB VI PENGUJIAN ASUMSI STATISTIK PARAMTERIK	83
A. Pengantar	83
B. Pengujian Asumsi Normalitas.....	84

C. Pengujian Asumsi Homogenitas.....	100
BAB VII ANALISIS KORELASI.....	114
A. Konsep Analisis Korelasi	114
B. Sifat-Sifat Koefisien Korelasi	116
C. Jenis Hubungan Korelasi.....	117
D. Koefisien Korelasi <i>Product Moment</i>	119
BAB VIII ANALISIS UJI BEDA POPULASI.....	126
A. Pengantar	126
B. Uji Beda Mean Satu Populasi	127
C. Uji Beda Mean Dua Populasi Saling Berpasangan dan Saling Berhubungan.....	130
D. Uji Beda Mean Dua Populasi Data Tidak Saling Berpasangan dan Tidak Saling Berhubungan dengan Asumsi Varians Sama.....	136
E. Uji Beda Mean Dua Populasi Data Tidak Saling Berpasangan dan Tidak Saling Berhubungan dengan Asumsi Varians Berbeda.....	143
BAB IX ANOVA (ANALISIS OF VARIANCE).....	147
A. Apa itu Anova?	147
B. <i>One Way Anova</i>	148
C. <i>Two Way Anova</i>	154
BAB X ANALISIS REGRESI	170
A. Pendahuluan.....	170
B. Model Regresi Linear Sederhana.....	171
C. Model Regresi Linear Berganda.....	175
DAFTAR PUSTAKA.....	185

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul	Halaman
1.1	Skala Pengukuran	10
1.2	Teknik Analisis Statistika Deskriptif	11
1.3	Teknik Analisis Statistika Inferensial.....	11
1.4	Pengguna Statistika	14
2.1	Daftar 20 Programming Language Besar Menurut Tiobe Index.....	36
3.1	Operator di R.....	45
3.2	Operator Arimatika R.....	47
3.3	Tipe Objek Data Pada R.....	49
4.1	Type Grafik R	55
4.2	Jenis Plot di R	63
5.1	Data Harga Jual Mobil.....	67
5.2	Tabel Distribusi Harga Mobil.....	68
5.3	Letak Kelas Median	70
5.4	Perhitungan Simpangan Rata-rata.....	73
5.5	Perhitungan Standar Deviasi dan Varians	74
5.6	Perhitungan Kemiringan	77
5.7	Perhitungan Nilai Kurtosis	78
6.1	Nilai Kritik Uji Liliefors	85
6.2	Perhitungan Pengujian Lililefors.....	88
6.3	Perhitungan Pengujian Kolmogorov-Smirnov	91
6.4	Kasus Uji Homogenitas Bartlett tes	102
6.5	Perhitungan Varians Kelompok	103
6.6	Perhitungan Uji Levene.....	107

Daftar Tabel

6.7	Perhitungan Z Homogenitas Levene.....	109
7.1	Kriteria Koefisien Korelasi Product Moment.....	120
8.1	Perbedaan Kasual Komparatif dan Eksperimental	126
8.2	Nilai Statistika Mahasiswa.....	131
8.3	Tabel Pembantu Uji Analisis Satu Arah	132
8.4	Data Nilai Ujian Mahasiswa Laki-laki dan Perempuan	137
8.5	Perhitungan Uji Beda Sampel Independent.....	138
9.1	Tabulasi <i>One Way Anova</i>	148
9.2	Data Permintaan Laptop Berdasarkan Merek.....	150
9.3	Klafikasi dua arah Tanpa Interaksi	155
9.4	Data Hasil Pengamatan Produksi, Umur mesin dan Jumlah Pekerja	156
9.5	Klafikasi dua arah dengan Interaksi.....	160
9.6	Data Hasil Pengamatan Jumlah Penonton.....	161
10.1	Data Produksi, Gaji dan Pengawasan Perusahaan "ABC"	180

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul	Halaman
1.1	Proses Penelitian Kuantitatif	2
2.1	CRAN.....	19
2.2	Download R Instaler.....	20
2.3	Dowloand R untuk Windows	20
2.4	Menu R	21
2.5	Tampilan R.....	21
2.6	Download RStudio.....	22
2.7	Operasi RStudio.....	22
2.8	Tampilan Antarmuka R RStudio.....	24
2.9	Tampilan Menur Bar	25
2.10	Tampilan Toolbar.....	26
2.11	Tampilan Proses Penyimpanan Dokumen Script.....	26
2.12	Tampilan Tampilan Tulisan di Console Windows	27
2.13	Tampilan Tampilan Tulisan di Sricpt Windows	27
2.14	Tampilan Kustomisasi RStudio	28
2.15	Tampilan Appearance	29
2.16	Tampilan Instal Packages.....	27
2.17	Tampilan Instal Packages melalui Tools	31
2.18	Tampilan CRAN.....	32
2.19	Tampilan Instal Packages di menu bar	32

2.20	Tampilan Instal Packages RPresence.....	33
2.21	Tampilan Package Archive	33
2.22	Tampilan Select Package Archive	34
2.23	Tampilan Lengkap Instal Rpresence.....	34
2.24	Potret software terpopuler di dunia	35
4.1	Plot Type “p”	56
4.2	Plot Type “l”	56
4.3	Plot Type “b”	57
4.4	Plot Type “O”	57
4.5	Plot Type “h”	58
4.6	Plot Type “s”	58
4.7	Plot Type “n”	59
4.8	Plot Type “p” Pertumbuhan Ekonomi.....	60
4.9	Histogram of Growth	61
4.10	Normal Q – Q Plot.....	62
4.11	Boxplot.....	63
5.1	Macam Model Ukuran Kemiringan	76
5.2	Model Keruncingan.....	78
6.1	Penentuan Nilai Chi Kuadrat	98
6.2	Pengujian Normalitas Q – Q Plot.....	101
7.1	Contoh Korelasi Positif.....	118
7.2	Contoh Korelasi Negatif	119
7.3	Plot Pendapatan dan Tabungan	125
8.1	Uji Normal Q – Q Plot.....	134

Daftar Gambar

9.1	Boxplot Permintaan Laptop.....	151
9.2	Histogram of Residuals	158
9.3	Boxplot Residuals	158
9.4	Histogram of Residuals	163
9.5	Boxplot Residuals	164
10.1	Model Regresi	171


Bab I

PENELITIAN DAN STATISTIKA

A. Mengapa Statistika dibutuhkan dalam Penelitian

Penelitian bukan sesuatu yang baru di dalam dunia pendidikan, sejak dahulu kala sampai saat ini dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian telah didefinisikan oleh beberapa ahli menurut sudut pandang yang berbeda-beda, secara garis besar, definisi penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh solusi terhadap suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi melalui langkah-langkah ilmiah. Senada dengan argumen yang dikemukakan Kerlinger (1995), bahwa penelitian adalah suatu penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris dan kritis. Hal yang sama dikemukakan Creswell (2002), penelitian adalah proses langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dalam meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau masalah. Sedarmayanti (2011) menjelaskan penelitian termasuk metode ilmiah adalah suatu cara mencari dan mengungkapkan kebenaran dengan ciri objektivitas, karena disini kebenaran akan diperoleh secara konseptual atau deduktif saja tidak cukup, tetapi harus diuji secara empiris.

Metode ilmiah (*scientific method*) merupakan proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Penelitian disebut sistematis bila mengikuti langkah-langkah atau tahapan yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah, menghubungkan masalah tersebut dengan teori-teori yang ada, mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasi data, menarik kesimpulan tersebut ke dalam jajaran khazanah pengetahuan. Empiris dimaksudkan bahwa masalah yang hendak ditemukan pemecahannya atau jawabannya itu harus tersedia datanya, yang diperoleh dari hasil pengukuran secara objektif. Untuk terkontrol dimaksudkan adalah, dalam berpikir secara ilmiah itu dilaksanakan secara sadar dan terjaga, jadi apabila ada orang lain yang juga ingin membuktikan kebenarannya dapat dilakukan seperti apa adanya.



Gambar 1..1 Proses Penelitian Kuantitatif

Penelitian dan statistik, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Meskipun secara umum tidak semua penelitian tidak membutuhkan peranan statistika terutama penelitian kualitatif, namun untuk dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang bersifat general terhadap sebuah populasi secara luas tetap dibutuhkan ilmu statistika. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif dengan paradigma positivistik, yaitu suatu fenomena itu adalah nyata jika bisa diukur, dilihat, dan diklasifikasikan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui proses ilmiah, sehingga melalui sebuah proses yang sistematis. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi adanya masalah. Masalah merupakan perbedaan (*gap*) antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Masalah yang akan diselesaikan seorang peneliti dengan melakukan proses penelitian. Pemecahan masalah berawal dari teori yang digunakan seorang peneliti. Penentuan sebuah teori bukanlah mudah atau sembarangan, harus didasari pada tinjauan empiris atau teori-teori yang sudah ada. Teori yang digunakan oleh peneliti inilah biasa disebut hipotesis, atau teori yang membutuhkan pengujian lebih lanjut atau jawaban sementara terhadap persoalan atau masalah yang akan diselesaikan oleh seorang peneliti. Proses penelitian berikutnya adalah mengumpulkan fakta-fakta di lapangan untuk

membuktikan (menguji) apakah teori baru yang diajukan peneliti tersebut benar atau salah.

Selanjutnya menentukan objek sasaran penelitian, umumnya adalah masyarakat secara umum. Karena anggota dari populasi masyarakat itu sangat banyak atau luas, maka seorang peneliti harus menentukan sampel yang reseptatif bisa mewakili dari keadaan populasi. Dengan menggunakan asumsi data yang dikumpulkan adalah sampel yang menggambarkan kondisi sebuah populasi, sehingga hasil pengujian sampel dapat digeneralisasikan ke populasi. Di dalam pengumpulan data juga dibutuhkan uji validitas dan reliabilitas. Setelah data terkumpul, peneliti melanjutkan pengolahan dan akan disajikan sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan. Dengan demikian disinilah dibutuhkan peran statistik dibutuhkan karena valid atau tidaknya hasil kesimpulan yang kita dapatkan tergantung bagaimana proses pengolahan data yang dilakukan. Terakhir, setelah hasil analisis statistiknya diketahui, dilanjutkan menulis laporan penelitian kita.

Menurut Sugiyono (2013), secara umum statistika dibutuhkan dalam empat tahap penelitian yakni:

1. Penentuan sampel. Statistik diperlukan untuk menghitung berapa jumlah sampel yang diperlukan agar merepresentasikan populasi.
2. Mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data diperlukan suatu instrumen yang valid dan reliabel. Statistik berperan dalam menguji apakah instrumen yang digunakan sudah valid dan reliabel
3. Menyajikan data. Dalam menyajikan data yang begitu banyak, diperlukan suatu teknik agar data tersebut lebih interaktif dan mudah dipahami oleh orang awam, misalnya dengan dibikin tabel atau diagram.
4. Analisis data. Tentu saja kegunaan utama statistik adalah untuk analisis data dalam menguji hipotesis. Dalam hal ini ada beberapa teknik yang digunakan, seperti regresi, anova, SEM, dan lain-lain.

B. Konsep Dasar Statistika

Kata *Statistika* berasal dari bahasa Latin "*status*" yang berarti keadaan politik. Awal mulanya statistika digunakan untuk melihat data tentang keadaan politik, data sensus, data militer, data fiskal. Sensus penduduk dan

kekayaan telah dilakukan oleh Raja Fir'aun di Mesir dan orang-orang Yahudi Kuno. Menurut sejarawan Yunani Herodatus, pada tahun 1400 sebelum masehi (SM), Raja Rameses II melakukan sensus diseluruh tanah Mesir untuk menetapkan daerah kekuasaannya. Hal ini juga ditemukan laporan yang sama untuk Cina kuno, Yunani dan Roma (Tiro, 2008). Tahun 1086, William seorang *Conqueror* dengan karyanya yang berjudul *Domesday Book* yang berisikan catatan mengenai nilai kepemilikan tanah di Inggris. Di Inggris, William dianggap sebagai orang yang menginisiasi adanya statistik.

Di dalam bahasa Inggris terjemahkan sebagai "State" yang artinya negara. Arti negara dapat dimaknai secara lebih luas antara lain sebagai keadaan atau data tentang bidang-bidang kehidupan dalam suatu negara, seperti keadaan pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, hukum, pertanian, militer dan lain-lain. Data tersebut dapat dikembangkan ke dalam beberapa bagian tertentu secara spesifik. Misalkan dalam bidang ekonomi, kita dapat melihat data tentang pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor ekonomi, investasi di masing-masing daerah.

Namun, istilah Statistik pertama kali diperkenalkan oleh Gottfried Achenwall (1719 – 1772), seorang profesor dari Marlborough dan Gottingen (Dencik, 2019). Statistik bersumber dari bahasa Italia, yakni "*Statista*" yang artinya pernyataan, di Inggris statistik di perkenalkan Dr. E. A. Zimmerman. Selanjut kata statistik dipopulerkan Sir Jhon Sinclair pada tahun 1791 – 1799 melalui karyanya *Statistical Account of Scotland*.

Secara mutakhir statistika didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mengumpulkan, mengoordinasikan, menyajikan dan menganalisis data serta menarik kesimpulan sahih dan mengambil keputusan layak berdasarkan analisis yang dilakukan (Tiro, 2008). Namun berbeda dengan statistik, yang menunjukkan keadaan sesuatu atau data ringkasan berbentuk angka (kuantitatif). Misalkan statistik penduduk, statistik kriminal, statistik pendidikan, statistik pertanian dan lain-lain.

Secara garis besarnya ragam statistika dapat digolongkan berdasarkan 1) orientasi pembahasan, 2) fase atau tujuan analisis, 3) asumsi distribusi dan 4) jumlah variabel terikat (Kadir, 2015), dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Berdasarkan orientasi pembahasan**, statistika dapat di bedahkan atas: statistika matematika dan statistika terapan. Statistika matematika (*mathematical statistics*) adalah statistika teoretis lebih

berorientasi kepada kepamahan model dan penurunan konsep dan rumus-rumus statistika secara matematis-teoretis, misalnya model dan penurunan rumus-rumus dalam analisis regresi, statistik uji-t, model stokastik, kemiringan, ketajaman, ekspentasi, galat, estimasi, dan lain-lain. Sedangkan statistika terapan (*applied statistics*) lebih berorientasi kepada kpemahaman konsep dan teknik-teknik statistika serta penggunaan atau terapanya dalam berbagai bidang, misalnya statistika pendidikan.

- b. **Berdasarkan fase atau tujuan analisisnya**, statistika dapat di bedakan atas statistika deskriptif dan statistika inferensial. Pertama ialah fase yang hanya berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyajian sebagian atau seluruh data (pengamatan) tanpa pengambilan kesimpulan. Fase ini disebut fase statistika deskriptif. Dengan demikian, fase atau teknik statistika deskriptif mereduksi data kuantitatif yang lebih besar menjadi bentuk yang lebih sederhana. Misalnya, rata-rata yang mewakili sekumpulan data adalah lebih sederhana daripada penyajiannya dan penjelasan data sat per satu. Tugas mencari kecenderungan data memusat, misalya rata-rata, median, modus dari sekumpulan bilangan itu termasuk kedalam fase statistika deskriptif. Fase kedua fase statistika yang berkenan dengan pengambilan kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data sampel yang lebih sedikit. Fase ini di sebut fase statistika inferensial atau induktif. Dengan demikian, fase atau teknik statistika inferensial ini membantu peneliti mengambil kesimpulan atau membuat generalisasi, prediski dari data yang sedikit (sampel) untuk data yang lebih banyak (populasi).
- c. **Dilihat dari asumsi distrbusi populasi data yang di analisis**, statistika dapat di bedakan menjadi statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik adalah statistika yang di dasarkan model distribusi normal sedangkan statistika non-parametrik adalah statistika dengan teknik analisis yang tidak mensyaratkan model distribusi normal atau beban distribusi. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis statistika parametrik maupun statistika non-parametrik digunakan untuk menguji hubungan (*assosistif*) dan menguji perbedaan (*comparative*).
- d. **Berdasarkan jumlah variabel terikat (*independent variabel*)**, statistika dapat dibedakan atas statistika univariat dan statistika

multivariat. Teknik analisis statistika yang melibatkan hanya satu variabel tidak bebas (*croterion variabel*) termasuk kedalam statistika univariat sedangkan teknik statistika yang melibatkan lebih dari satu variabel tak bebas termasuk ke dalam statistika multivariat.

C. Sumber dan Jenis Data Serta Pengukurannya

Data didefinisikan sebagai sesuatu yang diketahui atau dianggap. Data dapat memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atau persoalan. Data tentang sesuatu biasanya dikaitkan dengan lokasi atau tempat dan waktu. Contohnya Harga Telur di Kota Makassar, pada Bulan Ramadhan adalah Rp 2.000 per butir, hal ini penting menyebutkan tempat dan waktu sangat penting karena data harga telur akan mengalami fluktuasi dan juga berbeda antara lokasi.

Dalam memberikan gambaran tentang keadaan sosial ekonomi, pemerintah harus mengumpulkan data tentang kegiatan sosial (seperti pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan lain-lain) dan data mengenai kegiatan ekonomi (produksi, perdagangan, jasa, konsumsi, investasi, pendapatan, harga dan lain-lain).

Data dianggap sebagai sesuatu, walaupun data tidak semua data tersebut belum tentu kebenarannya, sebab masih merupakan suatu jawaban sementara atau biasa disebut hipotesis yang membutuhkan pengujian sehingga dibutuhkan sebuah asumsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, Data yang salah, apabila digunakan sebagai dasar bagi pembuatan keputusan, akan menghasilkan keputusan yang salah. Persyaratan data yang baik, antara lain, objektif, representatif (mewakili), memiliki kesalan baku yang kecil, tepat waktu, dan relevan (Supranto, 2016).

- a. **Objektif.** Data yang objektif berarti bahwa data harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (*at it is*). Misalnya produksi yang turun dilaporkan naik, ini tidak objektif; harga satu barang Rp 500,- dilaporkan Rp 750,- walaupun ada kuintasi, tetapi tidak objektif.
- b. **Representatif (mewakili).** Data harus mewakili objek yang diamati. Misalnya jika laporan produksi padi dari suatu daerah hanya didasarkan atas hasil sawah-sawah yang subur saja, ini jelas tidak

mewakili; laporan harga yang hanya didasarkan atas pasar-pasar yang murah saja tidak mewakili laporan konsumsi susu hanya dari golongan orang kaya saja juga tidak mewakili.

- c. **Kesalahan sampling (*sampling error*)** kecil suatu perkiraan estimate dikatakan baik (mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi) apabila kesalahan sampelnya kecil.
- d. **Tepat waktu.** Apabila data akan dipergunakan untuk melakukan pengendalian atau evaluasi, maka syarat tepat waktu ini penting sekali agar sempat dilakukan penyesuaian atau koreksi seperlunya kalau ada kesalahan atau penyimpangan yang terjadi di dalam implementasi suatu perencanaan.
- e. **Relevan.** Data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Misalnya, pemerintah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan produksi padi selama beberapa tahun terakhir.

Lebih lanjut, Supranto (2016), mengelompokkan menurut sifat, sumber, cara memperoleh, dan waktu pengumpulan.

- a. **Data menurut sifatnya.** Data menurut sifatnya dapat dibedakan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka (*nonnumeris*). Misalnya, produksi daging sapi meningkat, harga daging ayam mahal, penyaluran pupuk berjalan lancar, dan sebagainya. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Misalnya, produksi padi meningkat 10 persen, harga daging sapi per kilogram rata-rata adalah Rp 15.000, sebanyak 99 persen pupuk telah disalurkan, penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah 200 juta, dan sebagainya.
- b. **Data menurut sebenarnya.** Data menurut sebenarnya mengacu pada sumber perolehan data, yakni eksternal dan internal. Data internal adalah data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi atau kelompok. Misalnya, data penjualan dan data produksi suatu perusahaan. Data eksternal adalah data yang bersumber dari luar satu organisasi atau kelompok. Misalnya, suatu perusahaan mencari data mengenai daya beli konsumen dari kantor Badan pusat statistik setempat. Jumlah uang beredar atau inflasi bisa diperoleh dari Bank Indonesia.

- c. **Data menurut cara memperolehnya.** Berdasarkan cara memperolehnya, data dapat dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Misalnya suatu perusahaan ingin mengetahui konsumsi rata-rata penduduk di suatu daerah dengan cara melakukan wawancara langsung kepada penduduk setempat. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi (BPS, LIPI, KPU, BI).
- d. **Data menurut waktu pengumpulannya.** Berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibedakan sebagai data *cross section* dan data berkala (*time series*). Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Misalnya, hasil sensus penduduk tahun 2010 menggambarkan keadaan Indonesia pada tahun 2010 menurut umur, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu atau untuk melihat pembahasan yang terjadi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan yang terjadi. Misalnya perkembangan produksi padi selama lima tahun terakhir, perkembangan sembako selama 10 bulan terakhir, perkembangan penjualan produk suatu perusahaan selama lima tahun terakhir, dan sebagainya. Data ini sering juga disebut sebagai data historis. (sembako: sembilan bahan pokok). Untuk analisis statistika data *cross section* dan *time series*, bisa digabungkan disebut data panel (*panel data/pooled data*).
- Terkait dengan analisis statistika, jika data *cross section*, maka jumlah sampel atau observasi harus lebih dari 30 observasi ($n > 30$). Sedangkan, jika data *time series*, maka jumlah observasi minimal sebanyak 15 titik waktu ($t > 15$), dan ini merupakan syarat minimal untuk menguji, apakah terjadi otokorelasi atau tidak ada, pada analisis regresi. Salah satu cara untuk menyiasati data *time series* yang tidak cukup 15 titik waktu, adalah dengan menggunakan data panel, meskipun tidak berarti bahwa ini adalah analisis data panel, karena itu, tidak semua penggunaan data panel, merupakan analisis data panel. Kadang penggunaan data

panel hanya untuk mencukupkan jumlah observasi sebanyak 15 atau lebih (Madris, 2020).

Dilihat dari sifatnya data sebagai suatu variabel, dapat menggunakan 4 jenis skala pengukuran, sebagai berikut:

a. Skala Nominal

Skala nominal adalah skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Kategori bersifat *mutually exclusive*. Artinya jika satu indikator sudah masuk pada kategori maka tidak mungkin masuk ke kategori yang lain

Misalkan:

Jenis Kelamin (Laki-laki, perempuan); agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha), Status pekerjaan (formal, informal), status kawin (kawin, tidak kawin) dan sebagainya.

b. Skala Ordinal

Skala ordinal adalah skala pengukuran yang sudah digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, akan tetapi jarak antar interval antar tingkatan itu belum jelas. Skala ordinal memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibanding skala nominal karena tidak hanya menyatakan kategori saja tetapi sudah dapat untuk menyatakan peringkat.

Misalkan:

Tempat Tingkat (Kota Metropolitan, Kota sedang, kota kecil), tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi), pendapatan (tinggi, sedang, rendah) dan sebagainya.

c. Skala Interval

Skala interval adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas namun belum memiliki nilai 0 (nol) yang mutlak. Skala interval memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan skala ordinal karena tidak hanya menyatakan peringkat saja akan tetapi jarak antar tingkatan juga sudah jelas.

Misalkan:

Suhu ruangan, (pada satu ruangan suhunya 15°C, sedangkan ruangan lain memiliki suhu 30°C, hal ini dapat dikatakan bahwa selisih suhu antara satu ruangan dengan ruangan lain 15°C. akan tetapi bila suatu ruangan bersuhu 0°C tidak berarti ruangan

tersebut benar-benar tidak ada suhunya karena pada skala ini adalah nilai 0 bukan merupakan nilai mutlak; Jarak antara jam 01.00 sampai jam 05.00 adalah sama dengan jarak antara jam 05.00 sampai dengan 09.00, tetapi jam 00.00 tidak berarti waktunya kosong (tidak ada nilainya karena jam 00.00 sama dengan jam 12 malam

d. **Skala Rasio**

Skala rasio adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas, dan memiliki nilai 0 (nol) yang mutlak. Skala rasio memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan dengan skala interval karena disamping dapat meningkatkan peringkat, jarak, antar tingkatan sudah jelas, dan sudah memiliki nilai nol yang mutlak. Nilai nol mutlak berarti nilai nol berarti benar-benar menyatakan tidak ada.

Misalkan:

Pendapatan, pengeluaran, biaya, harga, berat, jarak, volume umur dan sebagainya.

Lebih jelasnya hal dibedakan skala pengukuran berdasarkan tabel 1.1, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tipe Pengukuran

Skala	Tipe Pengukuran			
	Kategori	Peringkat	Jarak	Perbandingan
Nominal	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Ordinal	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Interval	Ya	Ya	Ya	Tidak
Rasio	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber: Indriyantoro dan Supomo (2002)

Tipe skala pengukuran juga berkaitan erat dengan alat analisis data yang digunakan. Jika skala pengukuran yang digunakan adalah nominal dan ordinal maka alat analisis statistik yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Akan tetapi jika skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval dan rasio maka alat analisis statistik yang digunakan adalah alat statistik parametrik (Suliyanto, 2011).

Dari skala pengukuran tersebut membantu peneliti memilih jenis statistika yang tepat untuk menganalisis data penelitian yang diperoleh. Pemilihan teknik analisis deskriptif dan inferensial dalam penelitian didasarkan pada skala hasil pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Berikut analisis statistika deskriptif dan statistika dapat disajikan pada tabel 1.2 dan tabel 1.3, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Teknik Analisis Statistika Deskriptif

Skala Pengukuran	Teknik Statistik yang tepat digunakan
Nominal	Modus, Tabel frekuensi, persentase dan grafik
Ordinal	Minimum, Maksimum, Median, Tabel Frekuensi, Persentase, dan Grafik
Interval/Rasio	Rata-rata, Minimum, Maksimum, Range, Varians, Simpangan baku, Koefisien varians, Kemiringan, Ketajaman dan Grafik

Sumber: Kadir (2015)

Tabel 1.3 Teknik Analisis Statistika Inferensial

Skala	Penelitian Asosiatif dan Komparatif					
	Asosiatif (hubungan)	Deskriptif (1 variabel)	Komparatif (2 sampel)		Komparatif (> 2 sampel)	
			Tak bebas	Bebas	Tak bebas	Bebas
Nominal	Soumer's d (ddy) Koefisien kontingensi C, Gamma, Tau a, b, c	Binomial, X^2 utk -1 sampel	McNemar	Fisher Exact, X^2 utk -2 Sampel	X^2 utk -k Sampel, Cochran Q	X^2 utk -k Sampel
Ordinal	Korelasi peringkat Spearman, Kendall, Konkordasi	Uji Run	Uji Tanda, Uji Wilcoxon	Uji Median, Uji Mann-Whitney, Kolmogorov Smirnov	Freadman, ANOVA 2 Jalan	Uji Median, Kruskal Wallis, ANOVA-1 Jalan

Skala	Penelitian Asosiatif dan Komparatif					
	Asosiatif (hubungan)	Deskriptif (1 variabel)	Komparatif (2 sampel)		Komparatif (> 2 sampel)	
			Tak bebas	Bebas	Tak bebas	Bebas
Interval/ Rasio	Product moment Pearson, Korelasi Parsial, Regresi	Uji-t Uji-z	Uji-t Bebas (korelasi)	Uji-t bebas, Uji-z bebas	Uji F dgn Anova -1 jalan, Anova ≥ 2 Jalan	Uji F dgn Anova -1 jalan, Anova ≥ 2 Jalan

Sumber: (Kadir, 2015)

D. Relevansinya Belajar Statistika

Mata kuliah statistika dipandang sebagai mata kuliah yang sulit, membosankan, bukan bidangnya dan tidak relevan, waktu pertama kali belajar statistika bereaksi dan melihatnya sebagai suatu yang menakutkan dan menghadang di depannya, dan ia bertanya: *Apa Relevansinya belajar statistika?* Umumnya mata kuliah statistika karena diharuskan atau diwajibkan. Menurut Tiro (2008), secara filosofis, belajar sesuatu karena keharusan tidak benar, yang benar kalau kita belajar sesuatu karena menikmatinya. Bagaimana supaya kita dapat melihat dan merasakan bahwa belajar statistika itu suatu kenikmatan?

Lebih lanjut Tiro (2008), menjelaskan paling sedikit empat alasan sederhana mengapa mahasiswa diharuskan mengambil mata kuliah statistika dan mengembangkan penguasaan dalam subjek itu.

- Mahasiswa harus membaca literatur profesional dimana penggunaan statistika tidak dapat dihindari.
- Mahasiswa harus menguasai berbagai teknik statistika yang diperlukan dalam mata kuliah lanjutan.
- Statistika merupakan bagian yang perlu dan penting dalam pelatihan profesional.
- Statistika merupakan dasar dan alat dalam berbagai kegiatan penelitian.

Selanjutnya beberapa keuntungan pemikiran statistis dan pengguna statistika dalam penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Statistika memberikan deskripsi yang lebih eksak.
- b. Statistika mengarahkan pemikiran dan prosedur kerja menjadi lebih cepat dan eksak.
- c. Statistika memungkinkan kita merangkum hasil pengamatan dalam bentuk yang berarti dan menyenangkan.
- d. Statistika memungkinkan kita menggambarkan kesimpulan umum, dan poses mengambil kesimpulan umum dan proses mengambil kesimpulan yang di laksanakan sesuai aturan yang diterima secara ilmiah.
- e. Statistika memungkinkan kita menganalisis beberapa faktor penyebab penyebab suatu peristiwa kompleks.
- f. Statistika memungkinkan kita menganalisis berapa banyak hal yang akan terjadi dalam kondisi yang kita ketahui dan ukur.

Demikian beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan pemikiran statis dan penerapannya dalam penelitian. Karena itu, tujuan yang perlu dicapai mahasiswa dalam belajar statistika adalah:

- a. Menguasai perbendaharaan kata dan istilah statistika;
- b. Mendapatkan, melatih, dan mengembangkan keterampilan menghitung;
- c. Belajar menafsirkan hasil statistika dengan cara yang benar;
- d. Menangkap logika berfikir statistika;
- e. Mengetahui dimana dan kapan statistika dapat digunakan dan dimana dan kapan tidak di butuhkan.
- f. Memahami beberapa konsep matematis dan statistika.

Statistika juga dapat dijadikan sebagai suatu alat untuk (Madris, 2020):

- a. Mendeskripsikan sebuah fenomena tertentu, baik secara individu maupun kelompok.
- b. Menyederhanakan sebuah permasalahan yang rumit.
- c. Membandingkan antara dua atau lebih fenomena tertentu baik secara individu maupun kelompok.
- d. Memformulasi dan menguji hipotesis.
- e. Memprediksi sebuah kejadian yang akan datang.
- f. Memformulasi suatu kebijakan tertentu.

Tabel 1.4 Pengguna Statistika

Pengguna statistika	Masalah yang di hadapi	
Manajemen	1	Penentuan struktur gaji, pasangan, dan tunjangan karyawan
	2	Penentuan jumlah persediaan barang barang dalam proses, dan barang jadi.
	3	Evaluasi prodktif karyawan
	4	Evaluasi kinerja karyawan
Akuntansi	1	Penentuan standar adit barang dan jasa.
	2	Penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa.
	3	Analisis rasio keagan perusahaan
Pemasaran	1	Penelitian dan pengembangan produk.
	2	Analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar
	3	Ramalan penjualan.
	4	Efektivitas kegiatan promosi penjualan.
Keuangan	1	Potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksa dana.
	2	Tingkat pengembalian investasi berapa sektor ekonomi.
	3	Analisis pertumbuhan laba, cadangan usaha.
	4	Analisis resiko setiap usaha.
Ekonomi pembangunan	1	Analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga.
	2	Pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan.
	3	Indeks harga konsumen dan perdagangan besar.

Sumber: Suharyadi dan Purwanto (2016)

Statistika sebagai alat, sehingga Statistika dan matematika secara bersamaan dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu, misalnya Ilmu Ekonomi (Ekonometrika); Ilmu Hukum (Jurimetrika); Ilmu Sosiologi (Sosiometrika); Ilmu Psikologi (Psikometrika) dan sebagainya. Untuk ilmu

ekonomi sendiri statistika dipergunakan dalam bidang pemasaran, akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan.

Di balik penggunaan statistika, juga memiliki beberapa kelemahan, sebagai berikut:

- a. Statistika tidak dapat digunakan untuk pengukuran secara individu dalam sebuah kejadian tertentu.
- b. Statistika hanya dapat digunakan untuk karakteristik yang bersifat kuantitatif.
- c. Hasil analisis statistika hanya benar pada nilai rata-rata, tidak benar secara individu, dan tidak benar secara universal, dengan kata lain hanya benar pada kondisi tertentu.
- d. Statistika memiliki potensi kesalahan dalam menafsirkannya (*fallacious conclusion*).
- e. Statistika hanya satu metode untuk mempelajari suatu masalah.
- f. Karena rumitnya permasalahan yang diakibatkan semakin banyaknya kejadian yang bersinerji dengan kejadian lainnya, maka statistika tidak dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa keberadaan komputer.

E. Peran Komputer dalam Pengolahan Data Statistik

Di era digitalisasi sekarang ini, hampir tidak ada pekerjaan yang terlepas dari penggunaan komputer. Pada kenyataannya, komputer dapat secara efisien digunakan pada setiap operasi pengolahan yang memiliki satu atau lebih karakteristik berikut:

- a. **Jumlah masukan (input) yang besar.** Semakin besar jumlah data yang harus diolah untuk menghasilkan informasi yang diperlukan, pengolahan dengan komputer menjadi semakin ekonomis dibandingkan dengan metode-metode lainnya.
- b. **Proyek yang repetitif.** Sehubungan dengan biaya yang terlibat dalam menyiapkan tugas untuk pengolahan komputer, maka sering kali yang paling ekonomis ialah menggunakan komputer untuk proyek-proyek yang repetitif.
- c. **Diinginkan dan diperlukan kecepatan tinggi dalam pengolahan.** Semakin besar kebutuhan akan informasi yang tepat waktu,

semakin besar nilai komputer dibandingkan dengan metode-metode lainya (yang lebih lambat).

- d. **Diinginkan dan diperlukan ketepatan yang lebih besar.** Pengolahan komputer akan cukup tepat jika tugas yang harus dilaksanakan telah disiapkan dengan matang.
- e. **Mengolah hal-hal kompleks yang memerlukan bantuan elektronik.** Dalam beberapa situasi yang melibatkan sejumlah besar variabel yang berinteraksi, maka tidak ada alternatif lain selain komputer. Misalnya, pengambilan keputusan dengan alat statistik seperti pemrograman linear dan simulasi biasanya menggunakan komputer.

Untuk program statistika dan matematika juga tersedia beragam perangkat lunak (*software*) yang sangat mempermudah pengolahan data statistik, seperti *Minitab*, *Statistical Package for Social Sciences*, (*SPSS*). *Statistical Analysis System (SAS)*, *Sigmastat*, *Micro TSP*, *Sistat*, *Statistic*, *S Plus*, *MINITAB*, *Amos*, *LISREL*, *E-Views*, *STATA*, *R*, *R Studio*. Buku ini difokuskan pada penggunaan *software R Studio*, sampai saat ini, pengguna statistika di Indonesia masih belum banyak yang menggunakan *R studio* untuk kepentingan analisis data. Namun sebagian besar menggunakan *software* statistik yang komersil, seperti *SPSS*, *S-plus*, *MINITAB*, *SAS*, *Eviews* atau *STATA* atau lainnya. Buku ini difokskan pada penerapan *R* dalam analisis data penelitian. Lebih jelasnya tentang akan berkenalan *R* dan *R Studio* di bab berikutnya.

Bab II

MENGENAL SOFTWARE R

A. Tentang R



R merupakan sebuah bahasa pemrograman (*programming language*), yang dipakai untuk komputasi statistik dan grafik (R Core Team, 2020). Bahasa ini merupakan pengembangan dari bahasa S yang dikembangkan oleh **Rick Becker, John Chambers, dan Allan Wilks** dari **AT&T Bell Laboratories (1976)**. R didesain oleh dua tokoh yakni **Ross Ihaka**

dan **Robert Gentleman** di Universitas Auckland, Selandia Baru tahun 1993. Pada saat ini, source code kernel R dikembangkan terutama oleh R Core Team yang beranggotakan 17 orang statistisi dari berbagai penjuru dunia. Selain itu, para statistisi lain pengguna R di seluruh dunia juga memberikan kontribusi berupa kode, melaporkan bug, dan membuat dokumentasi untuk R.

Awalnya, R hanya digunakan oleh para akademisi, namun perkembangan R juga banyak digunakan oleh para praktisi di dunia bisnis. Hal inilah yang membuat R menjadi familiar dalam hal pengolahan data. Salah satu kelebihan R adalah memiliki komunitas besar yang include dalam satu mailing-list, para pengguna dapat mudah diakses dengan disertai dokumentasi, grup Stack Overflow yang sangat aktif, dan koleksi packages R lebih mudah dibagikan antar pengguna.

Dewasa ini, umumnya R lebih banyak dipakai untuk analisis data yang dilakukan pada server direktori masing-masing. Dengan dukungan jumlah packages test dan perangkat yang mudah disesuaikan R dapat digunakan menganalisis hampir semua tipe data yang akan dianalisis. Penggunaan fungsi perintah yang rumit dalam R juga mudah diatur.

Software R merupakan sistem untuk analisis data yang termasuk kelompok software statistik *open source* yang tidak memerlukan lisensi atau gratis, yang dikenal dengan *freeware*. Sampai saat ini, pengguna statistika di Indonesia masih belum banyak yang menggunakan R untuk keperluan analisis data. Sebagian besar pengguna statistika di Indonesia masih menggunakan paket-paket statistik komersil, seperti SPSS, MINITAB, S-plus, SAS, atau Eviews. Di bawah tim pengembangnya, R ini memiliki lisensi publik (*GNU General Public License*) yang artinya kita bisa ikut andil membangun software ini. Hal ini, merupakan pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan, bagaimana mau membangun software, mempelajari cara kerjanya saja baru di mulai saat ini. Perkembangan R di dunia cukup bisa diandalkan. Mengutip TechRepublic, per Agustus 2020, ia menduduki posisi 8 dalam daftar 10 besar bahasa pemrograman. Sistem skor bahasa ini dimiliki oleh komunitas programming, bahasa R dapat dipakai untuk implementasi *algoritma machine learning*. Selain itu, R juga sering digunakan dengan data science. Serta dapat digunakan untuk mengolah big data. Disamping itu, juga bisa berkomunikasi dengan bahasa lainnya seperti Python, Java, atau C++. Ada 7 jenis data utama yang bisa di baca di antaranya 1) daftar; 2) vektor; 3) array; 4) matriks; 5) dataframe; 6) tibble dan 7) factor

B. Proses Instalasi R di Windows

Sistem R bersifat multiplatform, bisa berjalan disegala jenis platform, misalnya LINUX, Windows ataupun MacOS. R bersifat open akses (gratis) melalui laman <https://www.r-project.org/> dengan Versi R terakhir adalah 4.0.2 (22-06-2020), R juga dilengkapi dengan banyak package yang dapat digunakan untuk statistik dan menggambarkan atau melukiskan data yang cukup lengkap serta banyak digunakan untuk data sains saat ini.

Untuk memudahkan penggunaan R, digunakan R Studio, yang bisa diakses secara gratis pula melalui www.cran.rstudio.com. RStudio adalah *integrated development environment* (IDE) untuk R. Ini mencakup konsol, editor penyorotan sintaks yang mendukung eksekusi kode langsung, serta alat untuk merencanakan, riwayat, debugging, dan manajemen ruang kerja.

Dengan demikian perbedaan R dengan RStudio adalah bahasa R adalah mesin sedangkan RStudio merupakan *interface*-nya. Rstudio memberikan kemudahan kita berkomunikasi dengan R, sehingga fungsi – fungsi statistika dan data science dapat dijalankan.

RStudio memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan R sehingga kita bisa menjalankan fungsi-fungsi statistika dan data science.


Beberapa alasan mengapa menggunakan RStudio:

- Antarmuka RStudio diatur sehingga pengguna dapat dengan jelas melihat grafik, tabel data, kode R, dan output semua pada waktu yang sama.
- Fitur seperti Import-Wizard yang memungkinkan pengguna untuk mengimpor file CSV, Excel, SAS (* .sas7bdat), SPSS (* .sav), dan Stata (* .dta) ke dalam R tanpa harus menulis kode ke lakukan itu.
- RStudio dan timnya telah berkontribusi banyak paket R (*tidyverse*, *shiny*, *rmarkdown*, dan lain-lain)
- Memiliki Addins yang berfungsi untuk menjalankan proses secara interaktif (*bookdown*, *colourpicker*, dan lain) (Hussein, 2021).

Proses menginstal R,

- Mengunjungi laman <https://www.r-project.org/>.
- Pilih link pengunduhan sesuai dengan sistem operasi komputer yang akan dipakai. Jika proses pengunduhan selesai, klik *double* (ganda) pada hasil unduhan untuk melaksanakan instalasi R pada komputer.


The Comprehensive R Archive Network



Gambar 2.1 CRAN


Jika, menggunakan OS lain maka bisa mengikuti petunjuk dengan membuka tautan yang sesuai.

- Klik Install R for the first time



Gambar 2.2 Download R Installer

d. Klik Download R x.x.x for Windows




Gambar 2.3 Download R untuk Windows

e. Menyimpan file installer dan menunggu sampai proses download selesai

f. Setelah proses download selesai, file R x.x.x.exe dijalankan


g. Selanjutnya klik **Next** dan **Finish**

Setelah proses penginstalan selesai R sudah bisa dijalankan dengan klik Start (*khusus untuk windows 2010*), mencari Folder R dan pilih R sesuai versi yang sudah diinstal



Gambar 2.4 Menu R


Sehingga akan muncul tampilan



Gambar 2.5 Tampilan R


Proses menginstal Rstudio

Jika proses penginstalan R selesai, dilanjutkan proses pengunduhan dan instalasi Rstudio. Diawali mengunjungi laman www.rstudio.com, lalu klik tombol Download. Proses pengunduhan bisa di pilih, bisa pada bagian kanan atas (bagian laman berjalan) atau bisa melalui tombol Download pada bagian kiri bawah.



Gambar 2.6 Download RStudio

Jendela baru akan terbuka. Geser ke bagian bawah laman, lalu pilih link sesuai dengan sistem operasi yang dipakai komputer.



Gambar 2.7 Operasi RStudio

Jika pengunduhan selesai, lakukan klik *double* pada hasil pengunduhan sehingga proses instalasi bisa dimulai. Selanjutnya, jika sudah berhasil melaksanakan proses instalasi R dan RStudio beberapa hal perlu dipahami lebih lanjut, adalah:

- a. Memahami dan mengerti tampilan antarmuka RStudio dan fungsinya
- b. Proses membuat dan menyimpan R skrip dokumen
- c. Kustomisasi tampilan RStudio

Pertama, Tampilan Antarmuka Rstudio dengan fungsinya

secara umum ada empat jendela utama yang terdapat pad Rstudio, sebagai berikut:

a. **Script Window**

Script Window adalah jendela kode tulis atau tempat script. Jendela ini dapat diakses melalui tiga cara, yaitu melalui:

- 1) Menu File > New File > R Script;
- 2) Toolbar New dan
- 3) Shortcut CTRL+SHIFT+N.

b. **Console**

Console menampilkan script yang telah dijalankan. Saat Console siap menerima perintah untuk menjalankan script, tanda prompt ">" (tanda lebih dari) akan muncul.


Saat script sedang diproses, tanda merah seperti rambu berhenti akan muncul (). Tanda ini dapat diklik untuk menghentikan proses yang sedang berjalan.

Console menampilkan apakah script berjalan dengan baik atau tidak, serta menunjukkan kesalahan script melalui error code. Script dapat langsung ditulis di Console.

Namun, hal ini tidak disarankan karena script yang terdapat di Console tidak dapat disimpan.

c. **Environment/ History**

Environment menunjukkan daftar "object" yang tersedia beserta yang telah kita buat. Pada tab History, ditampilkan rangkaian proses-proses yang telah dijalan secara urut.



Gambar 2.8 Tampilan Antarmuka Rstudio

- d. **File/ Plots/ Packages/ Help/ Viewer**, Jendela terakhir berisikan beberapa tab:
- 1) File dipakai untuk navigasi folder yang terdapat pada lokasi Home dari Rstudio.
 - 2) Plots menampilkan hasil plotting grafik atau gambar.
 - 3) Packages menunjukkan daftar packages yang dapat diinstal dan digunakan dalam analisis menggunakan Rstudio.
 - 4) Help digunakan untuk mencari dan menampilkan bantuan untuk memahami fungsi atau packages.
 - 5) Viewer berfungsi untuk melihat data frame dan data lain yang berstruktur rectangular.

Selain itu, seperti perangkat lunak lainnya, Rstudio juga memiliki

a. **Menu Bar**

Rstudio mempunyai pilihan menu standar yang memberi akses pengguna kepada fungsi-fungsi yang ada di dalamnya.

b. Toolbar


Toolbar dalam Rstudio sangat sederhana dengan tools-tools yang berfungsi untuk membuat dokumen baru, membuka dan menyimpan dokumen, mencetak dokumen, fungsi *Go to*, pengaturan *workspace* dan pengaturan *Add ins*. Toolbar dapat disembunyikan dan ditampilkan melalui Menu View.

Kedua, Membuat dan menyimpan R skrip dokumen.

Untuk membuat R dokumen baru, kita dapat menggunakan tiga cara: 1) Melalui Menu; 2) Melalui toolbar dan 3) Melalui *shortcut*. Dapat diuraikan sebagai berikut

Melalui Menu bar


Untuk membuat dokumen R baru melalui menu, pilih menu **File > New File > R Script**.



Gambar 2. 9 Tampilan Menu Bar

Melalui toolbar

Pilih toolbar **New > R Script**




Gambar 2. 10 Tampilan toolbar

Melalui shortcut


Untuk membuat dokumen R baru melalui shortcut, cukup tekan **CTRL+SHIFT+N** secara bersamaan.

Untuk menyimpan dokumen skrip, pilih Menu **File** lalu pilih **Save** atau **Save As**. Lalu tentukan tempat file yang diinginkan.




Gambar 2. 11 Tampilan Proses Penyimpanan Dokumen Script

Dapat pula dilaksanakan dengan menekan shortcut Ctrl+S. hal ini dapat dilakukan dengan cara yakni Menulis script di Rstudio. Untuk menuliskan script atau kode R di Rstudio melalui Console Window. Kita bisa menulis skrip di Console, hasil ketikan akan tersimpah di Global Environment, namun tidak terekam maka hal ini tidak rekomendasikan untuk menggunakan metode ini karena tidak akan dapat mereplikasi hasil ketika RStudio sudah diakhiri, kecuali hanya digunakan untuk sementara atau mencoba koding yang akan digunakan, supaya langsung kelihatan hasil pada saat telah di **Enter**.



Gambar 2. 12 Tampilan Tulisan di Console Window



Gambar 2. 13 Tampilan Tulisan Script Window


Selain di console Window, kita juga menulis Melalui script window. Dengan menulis beberapa kode dan bisa memilih mana yang akan kita jalankan.

Script yang telah diketik disimpan sehingga bisa dapat digunakan kembali jika dibutuhkan, dengan cara **ketik koding atau kode**, **Blok atau letakkan kursor di baris kode yang akan dipakai atau diinginkan**, **Klik Run atau tekan Ctrl+Enter** dan **outputnya akan keluar di Console**.

Ketiga, Kustomisasi tampilan Rstudio,


Kustomisasi tidak mutlak dilakukan. Hal ini dilakukan jika ingin menyesuaikan dengan style dan kemudahan atau kenyamanan kita akan sangat mendukung saat menulis dan eksekusi skrip. Ada beberapa hal yang biasa dikustomisasi sebagai berikut: 1) Tema Rstudio; 2) Tingkat Zoom; 3) Jenis dan ukuran font dan 4) Tema skrip editor

Proses kustomisasi dapat dilakukan dengan meng-klik menu **Tools** lalu pilih **Global Options**.



Gambar 2.14 Tampilan Kustomisasi RStudio

Lalu klik **Appearance**.



Gambar 2.15 Tampilan Appearance

Selanjutnya silakan sesuaikan tampilan RStudio, tingkat zoom, jenis dan ukuran font serta tema skrip editor.

Selanjutnya Menginstall Packages. Menurut Kurniawan dan Yuniarti (2018), *Packages* adalah suatu modul program yang berisi kumpulan perintah atau fungsi untuk melakukan suatu analisis tertentu menggunakan R. Saat ini jumlah packages yang ada di R mencapai kurang lebih 8000, yang terus mengalami perkembangan dan memiliki fungsi masing-masing (Rahman, 2020).

Proses instal packages ada 2, yaitu sebagai berikut:

a. Menulis script

Untuk menginstal packages di script, pastikan terhubung dengan koneksi jaringan internet, secara langsung melakukan instalasi R packages yang sudah ada di CRAN repository (mayoritas R package ada di sini) dengan menuliskan perintah `install.packages ("nama packages")` pada Script Windows atau di Console.

Misalkan, kita instal package `dplyr`.

```
install.packages ("dplyr")
```

Lihat hasilnya di jendela Console.

```
> install.packages("dplyr")
Installing package into 'C:/Users/WFH/Documents/R/win-library/3.6'
(as 'lib' is unspecified)
trying URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/3.6/dplyr_1.0.2.zip'
Content type 'application/zip' length 1528794 bytes (1.5 MB)
downloaded 1.5 MB

package 'dplyr' successfully unpacked and MD5 sums checked

The downloaded binary packages are in
  C:\Users\WFH\AppData\Local\Temp\Rtmpw58U5p\downloaded_packages
> |
```

Gambar 2.16 Tampilan Instal *Packages*

Dengan menggunakan cara yang sama, dapat menginstal beberapa packages sekaligus, dengan menuliskan nama-nama package yang mau diinstal dengan format seperti contoh dibawah ini.

```
install.packages(c("readr", "tidyr", "dplyr",
"ggplot2", "RMySQL"))
```

Jika packages sudah terinstal, kita dapat mengaktifkan dan memanggil kembali packages dengan menulis perintah `library(nama packages)`.

```
library(RMySQL)
```

```
library(readr)
```

```
library(tidyr)
```

```
library(dplyr)
```

```
library(ggplot2)
```

atau cukup memanggil

```
# library(tidyverse)
```

Kecuali packages RMySQL

Dari beberapa packages tersebut di atas, dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- 1) RMySQL digunakan untuk membuat koneksi antara R dan database MySQL.


- 2) `readr` berguna untuk import data dari tabular data file (csv, text file, dan lain-lain).
- 3) `tidyr` memiliki fungsi-fungsi untuk “merapihkan” data. Terutama yang sering digunakan adalah fungsi `gather()` dan `spread()`.
- 4) `dplyr` adalah package yang sangat berguna untuk melakukan manipulasi/transformatasi data menggunakan R.
- 5) `ggplot2` adalah salah satu package yang sangat banyak digunakan oleh pengguna R untuk kebutuhan visualisasi.
- 6) `tidyverse` menggunakan `tibble` sebagai pengganti `data.frame`. Menurut Golemund dan Wickham (2016), beberapa kelebihan `tibble` dibandingkan `data.frame` diantaranya adalah ketika menampilkan data, `tibble` tidak menampilkan semua baris dan kolom. Jika ada lebih dari 10 baris data, maka hanya akan ada 10 baris pertama yang ditampilkan dan beberapa variabel sesuai dengan lebar console R Anda.

b. Menur Bar

Bisa instal R package dari menu bar.


Pertama, klik menu Tools lalu pilih Install Packages...

Untuk menginstal packages di script, pastikan terhubung dengan koneksi jaringan internet




Gambar 2.17 Tampilan Instal *Packages* melalui Tools

Lalu kita pilih "Repository (CRAN)" pada kolom Install from dan menyetikkan nama package pada kolom Packages. Klik tombol **Install**.



Gambar 2.18 Tampilan CRAN

Melalui menu bar, dapat menginstal beberapa packages secara bersamaan seperti hanya dengan script, yaitu menuliskan nama-nama packages yang dipisahkan dengan spasi atau koma. Misalnya kita ingin instal package ggplot2 dan gganimate.




Gambar 2.19 Tampilan Instal Packages di menu bar

c. Instal dari file


Selain melalui instalasi langsung melalui CRAN maupun dari github, dapat dilakukan dengan copyan packagesnya dari pengembang langsung, yang biasa diperoleh dari sumber internet yang dapat dipercaya. File ini bisa berupa file terkompresi dengan format *.zip atau *.tar.gz. Misalnya kita mau instal packages *RPresence*

Diawali, klik menu **Tools** lalu pilih **Install Packages...**




Gambar 2.20 Tampilan Instal Packages RPresence

Kemudian pilih “Package Archive File” pada kolom Install from dan mengetikkan klik Browse... pada kolom Package Archive.




Gambar 2.21 Tampilan Package Archive

Kemudian arahkan dan pilih file R package yang sudah kita simpan sebelumnya.



Gambar 2.22 Tampilan Select Package Archive

Setelah semua benar, klik Install.



Gambar 2.23 Tampilan Lengkap Instal Rpresence

C. Keunggulan Software R dalam Pengolahan Data

Software R / Rstudio hampir sama dengan software lainnya seperti SPSS, E-Views, AMOS, Lisrel, STATA, MINITAB dan software lainnya yang dapat digunakan untuk olah data statistika. Di Mancanegara/luar negeri, R / R Studio ini sudah umum digunakan dalam pengolahan data. hal ini dibuktikan, secara Internasional, terhitung mulai tahun 2017 pemrograman R sudah menjadi bahasa terpopuler (sumber: IEEE Spectrum rank languages). IEEE merupakan salah satu jurnal Internasional yang memiliki reputasi sangat tinggi. Di samping itu pengguna R / Rstudio mempunyai internasional dan nasional (termasuk Indonesia).

Berbeda dengan software lain seperti SPSS, E-Views, AMOS dan lainnya yang sifatnya komersial, R / Rstudio bersifat software ini open akses (gratis). Di bawah tim pengembangnya, R ini memiliki lisensi publik atau *GNU General Public License* yang artinya kita bisa ikut andil membangun software ini. Perkembangan R di dunia cukup bisa diandalkan. Saat ini R sudah masuk ke dalam 10 software terpopuler di dunia. R sendiri berada di peringkat 7 persis di bawah PHP dan justru sudah melampaui JavaScript.

Language Rank	Types	Spectrum Ranking
1. Python	  	100.0
2. C++	  	99.7
3. Java	  	97.5
4. C	  	96.7
5. C#	  	89.4
6. PHP		84.9
7. R		82.9
8. JavaScript	 	82.6
9. Go	 	76.4
10. Assembly		74.1

Gambar 2.24 Potret software terpopuler di dunia

Sumber: Cass (2018)

Tabel 2.1 Daftar 20 Programming Language Besar Menurut Tiobe Index.

Jan-21	Jan-20	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	2	▲	C	17.38%	1.61%
2	1	▼	Java	11.96%	-4.93%
3	3		Python	11.72%	2.01%
4	4		C++	7.56%	1.99%
5	5		C#	3.95%	-1.40%
6	6		Visual Basic	3.84%	-1.44%
7	7		JavaScript	2.20%	-0.25%
8	8		PHP	1.99%	-0.41%
9	18	▲▲	R	1.90%	1.10%
10	23	▲▲	Groovy	1.84%	1.23%
11	15	▲▲	Assembly language	1.64%	0.76%
12	10	▼	SQL	1.61%	0.10%
13	9	▼▼	Swift	1.43%	-0.36%
14	14		Go	1.41%	0.51%
15	11	▼▼	Ruby	1.30%	0.24%
16	20	▲▲	MATLAB	1.15%	0.41%
17	19	▲	Perl	1.02%	0.27%
18	13	▼▼	Objective-C	1.00%	0.07%
19	12	▼▼	Delphi/Object Pascal	0.79%	-0.20%
20	16	▼▼▼	Classic Visual Basic	0.79%	-0.04%

Sumber: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Tahun 2018 - 2019, sempat mengalami penurunan jumlah penggunaannya, namun tahun 2020 kembali mengalami kenaikan popularitas penggunaan, diperkirakan karena adanya Pandemi Covid-19. Menurut Tiobe Index per

Januari 2021, R menempati urutan ke-8, naik dari urutan ke-18 pada bulan Januari 2020.

Bahasa R adalah bahasa pemrograman sumber terbuka dan paket perangkat lunak yang dikelola oleh tim pengembangan inti R. Selain itu, bahasa R digunakan untuk melakukan operasi statistik dan merupakan program yang digerakkan oleh baris perintah. Saat ini, R dianggap sebagai alat analisis paling populer di dunia jika kita membandingkan R, SAS, dan SPSS. Selanjutnya, diperkirakan penggunaannya berkisar antara 250000 hingga lebih dari 2 juta. R adalah pemenang telak jika kita melihat popularitas online-nya. Selain itu, R memiliki lebih banyak blog, grup diskusi, dan daftar email daripada alat lainnya termasuk SAS. Jadi, R sekali lagi menjadi pilihan teratas di sebagian besar survei.

Beberapa aplikasi penting Bahasa Pemrograman R dalam domain Ilmu Data adalah:

a. Keuangan

Ilmu Data paling banyak digunakan dalam industri keuangan. R adalah alat paling populer untuk peran ini. Ini karena R menyediakan rangkaian statistik lanjutan yang mampu melaksanakan semua tugas keuangan yang diperlukan. Dengan bantuan R, lembaga keuangan dapat melakukan pengukuran risiko penurunan, menyesuaikan kinerja risiko, dan memanfaatkan visualisasi seperti grafik kandil, plot kepadatan, plot penarikan, dan lain-lain. R juga menyediakan alat untuk rata-rata bergerak, autoregresi, dan analisis deret waktu yang membentuk inti dari aplikasi keuangan. R banyak digunakan untuk analisis risiko kredit di perusahaan seperti ANZ dan manajemen portofolio.

Industri keuangan juga memanfaatkan proses statistik time-series R, untuk memodelkan pergerakan pasar saham mereka dan memprediksi harga saham. R juga menyediakan fasilitas untuk financial data mining melalui paket-paketnya seperti `quantmod`, `pdfetch`, `TFX`, `pwt`, dll. R memudahkan Anda untuk mengekstrak data dari aset online. Dengan bantuan RShiny, Anda juga dapat mendemonstrasikan produk keuangan Anda melalui visualisasi yang jelas dan menarik.

b. Perbankan

Sama seperti lembaga keuangan, industri perbankan menggunakan R untuk pemodelan risiko kredit dan bentuk analisis risiko lainnya. Bank membuat banyak penggunaan Model Potongan Rambut Hipotek yang memungkinkan mereka untuk mengambil alih properti jika terjadi gagal bayar pinjaman. Pemodelan Potongan Rambut Hipotek melibatkan distribusi harga jual, volatilitas harga jual dan perhitungan kekurangan yang diharapkan. Untuk tujuan ini, R sering digunakan bersama alat berpemilik seperti SAS.

R juga digunakan bersama dengan Hadoop untuk memfasilitasi analisis kualitas pelanggan, segmentasi pelanggan, dan retensi. Bank of America menggunakan R untuk pelaporan keuangan. Dengan bantuan R, ilmuwan data di BOA dapat menganalisis kerugian finansial dan memanfaatkan alat visualisasi R.

c. Perawatan Kesehatan

Genetika, Bioinformatika, Penemuan Obat, Epidemiologi adalah beberapa bidang dalam perawatan kesehatan yang banyak menggunakan R. Dengan bantuan R, perusahaan-perusahaan ini dapat mengolah data dan memproses informasi, memberikan latar belakang penting untuk analisis dan pemrosesan data lebih lanjut.

Untuk pemrosesan yang lebih maju seperti penemuan obat, R paling banyak digunakan untuk melakukan uji praklinis dan menganalisis data keamanan obat. Ini juga menyediakan rangkaian untuk melakukan analisis data eksplorasi dan alat visualisasi yang jelas bagi penggunaannya. R juga populer dengan paket Biokonduktornya yang menyediakan berbagai fungsi untuk menganalisis data genomik. R juga digunakan untuk pemodelan statistik di bidang epidemiologi, di mana para ilmuwan data menganalisis dan memprediksi penyebaran penyakit.

d. Media Sosial

Bagi banyak pemula di Ilmu Data dan R, media sosial adalah tempat bermain data. Analisis Sentimen dan bentuk lain dari data mining media sosial adalah beberapa alat statistik penting yang digunakan dengan R. Media Sosial juga merupakan bidang yang menantang untuk Ilmu Data karena data yang lazim di situs web media sosial sebagian besar tidak terstruktur. R digunakan untuk analitik media sosial, untuk menyegmentasikan calon pelanggan dan menargetkan mereka untuk menjual produk Anda.

Selain itu, sentimen pengguna pertambangan adalah kategori populer lainnya dalam analitik media sosial. Dengan bantuan R, perusahaan dapat membuat model alat statistik yang menganalisis sentimen pengguna, memungkinkan mereka meningkatkan pengalaman mereka.

SocialMediaMineR adalah paket R populer yang dapat mengambil banyak URL dan mengubah popularitas jangkauannya di media sosial. Selanjutnya, perusahaan menggunakan R untuk menganalisis pasar media sosial dan menghasilkan arahan bagi pengguna.

e. E-Commerce

Industri e-commerce adalah salah satu sektor terpenting yang memanfaatkan Ilmu Data. R adalah salah satu alat standar yang digunakan dalam e-commerce. Karena perusahaan berbasis internet ini harus berurusan dengan berbagai bentuk data, terstruktur dan tidak terstruktur, serta dari berbagai sumber data seperti spreadsheet dan database (SQL & NoSQL), R terbukti menjadi pilihan yang efektif untuk industri ini.

Perusahaan e-niaga menggunakan R untuk menganalisis produk cross-selling kepada pelanggan mereka. Dalam penjualan silang, kami menyarankan produk tambahan kepada pelanggan, yang melengkapi pembelian awal mereka. Jenis saran dan rekomendasi ini paling baik dianalisis dengan bantuan R.

Berbagai prosedur statistik seperti pemodelan linier diperlukan untuk menganalisis pembelian yang dilakukan oleh pelanggan serta dalam memprediksi penjualan produk. Selanjutnya, perusahaan menggunakan R untuk melakukan analisis pengujian A / B di seluruh halaman produk mereka.

f. Manufaktur

Perusahaan manufaktur seperti Ford, Modelz, dan John Deere menggunakan R untuk menganalisis sentimen pelanggan. Ini membantu mereka mengoptimalkan produk mereka sesuai dengan minat konsumen yang sedang tren dan juga untuk menyesuaikan volume produksi mereka dengan permintaan pasar yang bervariasi. Mereka juga menggunakan R untuk meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan.

Beberapa Aplikasi Lainnya dari R

Ini adalah beberapa aplikasi R lainnya, yang dapat Anda gunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik:

- a. R terutama digunakan untuk statistik deskriptif. Statistik deskriptif meringkas fitur-fitur utama data. R digunakan untuk berbagai tujuan dalam statistik ringkasan seperti tendensi sentral, pengukuran variabilitas, menemukan kurtosis dan skewness.
- b. R paling banyak digunakan untuk analisis data eksplorasi. Paket R paling populer `ggplot2` dianggap sebagai salah satu pustaka visualisasi terbaik karena estetika dan interaktivitasnya.
- c. R juga digunakan untuk menganalisis distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Misalnya, menggunakan fungsi `ppois()`, Anda dapat menggambar distribusi Poisson. Demikian pula, dengan bantuan fungsi `dbinom()`, Anda dapat memplot distribusi binomial.
- d. R juga memungkinkan pengujian hipotesis untuk memvalidasi model statistik.
- e. Anda dapat menemukan korelasi antara variabel di R menggunakan fungsi `lm()` yang digunakan untuk membuat regresi linier serta regresi linier multivariabel.
- f. Dengan menggunakan R, Anda dapat menggunakan paket `tidyverse` yang digunakan untuk mengatur data dan pra-pemrosesan data.
- g. R juga menyediakan paket aplikasi web interaktif yang disebut `RShiny`. Dengan paket ini, Anda dapat mengembangkan visualisasi interaktif yang dapat disematkan di halaman web Anda.
- h. Selain itu, dengan bantuan R, Anda dapat mengembangkan model prediktif yang memanfaatkan algoritme pembelajaran mesin untuk menemukan kejadian di masa mendatang.
- i. Anda dapat mengintegrasikan R dengan Hadoop dan sistem file HDFS untuk memproses kumpulan data besar seperti data media sosial dengan cepat dan efisien.
- j. R juga berguna untuk mengembangkan paket perangkat lunak statistik dan untuk mengimplementasikan pemrosesan analitik dalam rangkaian perangkat lunak lain.

Dengan demikian muncul pertanyaan mengapa harus pakai Software R / RStudio untuk pengolahan statistika. Ada tiga alasan, sebagai berikut:

Pertama Software R / Rstudio memiliki 17 kelebihan/keunggulan, diantaranya 1) Efisien – penyimpanan data filenya kecil; 2) Powerful – Serba bisa / Fitur lengkap; 3) Valid – Terkenal di Luar Negeri; 4) Popular – Secara internasional; 5) Banyak tutorial – web atau pun video youtube; 6) *Cross platform* – Linux, Mac, dan Windows; 7) *User interface* (UI) menarik (R Studio); 8) UI bisa night mode (R Studio); 9) Banyak pengembang (*developer*); 10) memiliki forum tanya jawab R nasional (Indonesia); 11) memiliki forum tanya jawab R Internasional; 12) Bisa untuk Programming – Saingan python; 13) Visualisasi Keren – Analisis Eksploratif; 14) Visualisasi web interaktif – R Shiny; 15) Big Data Integrated – Hadoop & HDFS; 16) Reliabel – Sangat mudah direproduksi dengan pengiriman script/syntax; 17) Gratis – Opensource, halal tidak perlu bajak aplikasi olah data.

Kedua Meningkatkan kesempatan (peluang) untuk mendapatkan pekerjaan.

Terakhir R Basics bagian salah satu fasilitas R yang sedang populer dikalangan akademisi maupun praktisi didunia. Di samping terdapat beberapa perusahaan besar telah menggunakan software R menunjang kegiatan perusahaan, diantaranya:

- 1) **Facebook** - Facebook menggunakan R untuk memperbarui status dan grafik jejaring sosialnya. Ini juga digunakan untuk memprediksi interaksi kolega dengan R.
- 2) **Ford Motor Company - Ford** mengandalkan Hadoop. Ini juga bergantung pada R untuk analisis statistik serta melakukan dukungan berbasis data untuk pengambilan keputusan.
- 3) **Google** - Google menggunakan R untuk menghitung ROI pada kampanye iklan dan untuk memprediksi kegiatan ekonomi dan juga untuk meningkatkan efisiensi iklan online.
- 4) **Foursquare** - R adalah tumpukan penting di balik mesin rekomendasi Foursquare yang terkenal.
- 5) **John Deere** - Ahli statistik di John Deere menggunakan R untuk pemodelan deret waktu dan juga analisis geospasial dengan cara yang andal dan dapat direproduksi. Hasilnya kemudian diintegrasikan dengan Excel dan SAP.

- 6) **Microsoft** - Microsoft menggunakan R untuk layanan perjudohan Xbox dan juga sebagai mesin statistik dalam kerangka kerja Azure ML.
- 7) **Mozilla** - Ini adalah fondasi di balik browser web Firefox dan menggunakan R untuk memvisualisasikan aktivitas web.
- 8) **New York Times** - R digunakan dalam siklus berita di The New York Times untuk mengolah data dan menyiapkan grafik sebelum dicetak.
- 9) **Thomas Cook** - Thomas Cook menggunakan R untuk prediksi dan juga Sistem Logika Fuzzy untuk mengotomatiskan pengaturan harga penawaran menit terakhir mereka.
- 10) **National Weather Service** - National Weather Service menggunakan R di River Forecast Centres. Jadi, ini digunakan untuk menghasilkan grafik untuk prakiraan banjir.
- 11) **Twitter** - R adalah bagian dari kotak alat Ilmu Data Twitter untuk pemodelan statistik yang canggih.
- 12) **Trulia** - Trulia, situs web analisis real estat menggunakan R untuk memprediksi harga rumah dan tingkat kejahatan lokal.
- 13) **ANZ Bank** - ANZ, bank terbesar keempat di Australia menggunakan R untuk analisis risiko kreditnya.

Bab III

MANAJEMEN DATA R

A. Operator Arimatik

Manajemen Data R Dalam pengolahan data dalam R, hal yang mendasari harus dipahami bagaimana melakukan perhitungan dengan menggunakan R, sehingga ada 3 hal yang mendasar harus dipahami 1) Penggunaan Operator dan fungsi dasar pada R; 2) Jenis dan struktur data; 3) Vektor (cara membuat dan melakukan operasi matematika pada vektor) dan 4) Matriks (cara membuat dan melakukan operasi matematika pada matriks). Penggunaan Operator dan fungsi dasar pada R

1) Penggunaan Operator < (Lebih Kecil Dari)

Misalkan sebuah nilai 10 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, yakni 75, 80, 80, 95, 88, 85, 86, 70, 90, 92, 100, jika kita akan menampilkan nilai mahasiswa yang lebih kecil dari 80 yaitu: 70,75. di R kita membuat koding

```
Nilai[Nilai<80]

Nilai<-c(75,80,80,95,88,85,86,70,90,92,100)
Nilai
## [1] 75 80 80 95 88 85 86 70 90 92 100

Nilai[Nilai<80]
## [1] 75 70
```

2) Penggunaan Operator < (Lebih besar dari)

Misalkan sebuah nilai 10 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, yakni 75, 80, 80, 95, 88, 85, 86, 70, 90, 92, 100, jika kita akan menampilkan nilai mahasiswa

yang lebih besar dari 80 yaitu: 95,88,85,86,90,92,100. Di R kita membuat koding

```
Nilai[Nilai>80]
Nilai<-c(75,80,80,95,88,85,86,70,90,92,100)
Nilai
## [1] 75 80 80 95 88 85 86 70 90 92 100
Nilai[Nilai>80]
## [1] 95 88 85 86 90 92 100
```

- 3) Penggunaan Operator & (Dan) Misalkan sebuah nilai 10 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, yakni 75,80,80,95,88,85,86,70,90,92,100. Jika kita akan menampilkan nilai mahasiswa dengan syarat lebih besar 80 dan lebih kecil 90. Berikut digunakan koding di R.

```
Nilai[NILAI>80&NILAI<90]
Nilai<-c(75,80,80,95,88,85,86,70,90,92,100)
Nilai
## [1] 75 80 80 95 88 85 86 70 90 92 100
Nilai[Nilai>80&Nilai<90]
## [1] 88 85 86
```

- 4) Penggunaan Operator & (Dan) Misalkan sebuah nilai 10 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, yakni 75,80,80,95,88,85,86,70,90,92,100. Jika kita akan menampilkan nilai mahasiswa dengan syarat lebih besar 90 dan lebih kecil 80. Berikut digunakan koding di R.

```
Nilai[Nilai>90 | Nilai<70]
Nilai<-c(75,80,80,95,88,85,86,70,90,92,100)
Nilai
## [1] 75 80 80 95 88 85 86 70 90 92 100
```



```
Nilai[Nilai>90 | Nilai<70]
```

```
## [1] 95 92 100
```

Dengan demikian dapat dibuat ringkasan operator yang biasa digunakan di R

Tabel 3.1 Operator di R

Simbol	Uraian
">"	Lebih besar dari
"<"	Lebih kecil dari
"=="	Sama dengan
">="	Lebih besar sama dengan
"<="	Lebih kecil sama dengan
"!="	Tidak sama dengan

B. Proses Perhitungan Arimatik

Program R, kita bisa melakukan proses perhitungan dengan menggunakan fungsi khusus, akan akan terbaca secara berurutan, kecuali secara eksplisit menetapkan yang lain Misalkan

```
A=c(2, 3, 6)
```

```
B=c(4, 5, 7)
```

```
C=A+B
```

```
C
```

```
## [1] 6 8 13
```

```
A=c(2, 6, 7)
```

```
B=c(4, 8, 3)
```

```
C=4+A
```

```
C
```

```
## [1] 6 10 11

A=c(9,7,5)
B=c(7,6,3)
C=A-B
C

## [1] 2 1 2

A=c(10,8,4)
B=c(5,4,4)
C=A%%B
C

## [1] 0 0 0

A=c(9,7,5)
B=c(7,6,3)
C=A^B
C

## [1] 4782969 117649 125

A=c(10,8,4)
B=c(5,4,4)
C=A/B
C

## [1] 2 2 1
```

Berdasarkan contoh di atas dapat dijelaskan bahwa R bisa digunakan sebagai kalkulator. di samping itu, tanpa melakukan tidak menetapkan urutan perhitungan menggunakan tanda kurung, R akan secara otomatis akan menghitung terlebih dahulu perkalian atau pembagian. adapun Operator aritmatika yang tersedia di R dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 3.2 Operator Aritmatika R.

Simbol	Uraian
+	Addition, untuk operasi penjumlahan
-	Substraction, untuk operasi pengurangan
*	Multiplication, untuk operasi pembagian
/	Division, untuk operasi pembagian
^	Eksponeniation, untuk operasi pemangkatan
%%	Modulus, Untuk mencari sisa pembagian
%/%	<i>Integer</i> , Untuk mencari bilangan bulat hasil pembagian saja dan tanpa sisa pembagian

C. Jenis Data R

Jenis data Software R menyediakan 4 jenis data:

- Numeric atau angka, Data numerik biasa disebut data berupa angka. misalkan 1, 10, 100, 1000, 10000 dan seterusnya. untuk mengetahui jenis data digunakan pada menggunakan koding (mode). contohnya jika kita ingin mengetahui bahwa data 100 ini merupakan angka numeric pada R

```
mode(100)

## [1] "numeric"

simpan=c(100)
mode(simpan)

## [1] "numeric"
```

- Character atau karakter merupakan Data yang berupa karakter diapit dengan tanda petik ganda " ".

Misal contoh "Simpati", "AS", "XL", "AXIS", "HALO", dan seterusnya merupakan data berjenis karakter. Berikut merupakan perintah dalam R untuk mengetahui bahwa data "Simpati" tergolong sebagai tipe data karakter.

```
mode("Simpati")  
## [1] "character"  
  
simpan=c("Simpati")  
mode(simpan)  
## [1] "character"
```

- c. Logical atau logika Nilai dari sebuah data logika terdiri atas 2 nilai, yaitu Benar (TRUE) yang biasa disingkat dengan T dan Salah (FALSE) yang biasa disingkat dengan F. Contoh misalkan sebuah data disimpan dalam berbentuk logika, yaitu d=(F). Berikut merupakan kode dalam R untuk mengetahui bahwa nilai yang tersimpan dalam variabel d berjenis logika.

```
d=c(F)  
d  
  
## [1] FALSE  
  
a=c(F)  
mode(d)  
  
## [1] "logical"  
  
mode(a)  
  
## [1] "logical"
```

- d. Function atau fungsi, Data yang berjenis fungsi memiliki ciri menggunakan kata function. misalkan kode program R pembuatan fungsi kuadrat. kuadrat=function(x){print(x*x);} A=c(4) kuadrat(A) mode(kuadrat)

```

kuadrat=function(x) {print(x*x); }
A=c(4)
kuadrat(A)

## [1] 16

mode(kuadrat)

## [1] "function"

```

D. Jenis-Jenis Objek Data R

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan *overview* untuk tipe-tipe objek yang merepresentasikan data:

Tabel 3.3 Tipe Objek data pada R

Objek	Mode	Apakah suatu objek bisa memiliki lebih dari satu mode?
Vector	<i>Numeric, character, complex, atau, logical</i>	Tidak
factor	<i>Numeric atau character</i>	Tidak
Array	<i>Numeric, character, complex atau logical</i>	Tidak
matrix	<i>Numeric, character, complex, atau, logical</i>	Tidak
Data frame	<i>Numeric, character, complex, atau, logical</i>	Ya
Time series	<i>Numeric, character, complex, atau, logical</i>	Tidak
list	<i>Numeric, character, complex, logical, function, expression,...</i>	Ya

R bekerja menggunakan objek, di mana semua entitas R termasuk fungsi dan struktur data merupakan objek dalam R. objek-objek tersebut mempunyai karakteristik nama, konten, serta atribut yang menspesifikan tipe data yang direpsentasikan oleh objek tersebut

Semua objek memiliki dua atribut intrinsik, yaitu *mode* dan *length*. Mode menunjukkan tipe dasar dari elemen-elemen objek dan *length* menunjukkan banyaknya elemen dalam objek. Terdapat empat mode utama, yaitu *numeric*, *character*, *complex*, dan *logical*. Dalam R terdapat mode lainnya, tetapi mode tersebut tidak mempresentasikan data.

Vector

Vector merupakan suatu himpunan elemen (*bilangan*, *character*, atau *string*, *logical value*) suatu dimensi dan merupakan representasi dari suatu variabel yang umum dikenal. Vector merupakan objek paling dasar dikenal dalam R. pada data vector berlaku menggunakan mode tunggal, sehingga jika dua data atau lebih yang memiliki data berbeda maka R akan mengubah data ke mode yang lebih umum.

Untuk mengetahui mode suatu objek vector dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi atau *command mode*. Jumlah atau panjang data yang bertipe vector dapat diketahui dengan memanfaatkan fungsi *length*.

Factor

Factor merupakan representasi dari variabel kategorik. Factor tidak hanya mengandung nilai yang terkait variabel kategorinya, tapi juga kemungkinan setiap level yang ada dalam variabel level tersebut, meskipun level tidak muncul dalam kata. Kita juga bisa menambahkan label pada value level-nya.

Untuk membuat suatu factor digunakan fungsi factor berikut:

```
Factor(x, levels = sort(unique(x), na = TRUE) Labels = levels, exclude = NA, ordered = is.ordered(x))
```

Misalkan

Misalkan: diberikan data 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10

```
A=c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
factor(A)
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
## Levels: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

Misalkan data tingkat pendidikan

Tidak tamat SD, SD,SMP,SMA,Diploma, Sarjana, Magister, Doktoral

```
B=c("Tidak tamat SD", "SD", "SMP", "SMA", "Diploma", "M
agister", "Doktoral")
factor(B)

## [1] Tidak tamat SD SD SMP
SMA Diploma
## [6] Magister Doktoral
## Levels: Diploma Doktoral Magister SD SMA SMP Ti
dak tamat SD
```

Matrix

Array adalah suatu tabel yang tersusun dari vektor dengan k dimensi, sedangkan matrix adalah khusus khusus dari array si mana $k = 2$ (array 2 dimensi). Untuk membuat suatu matrix digunakan fungsi matrix berikut:

Matrix(data = NA, nrow = 1, ncol = 1, byro = FALSE, dimnames = NULL)

Misalkan

```
matrix(data = 10, nr=2, nc=2)

##      [,1] [,2]
## [1,]  10  10
## [2,]  10  10

matrix(1:20, 2, 4)

##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]   1   3   5   7
## [2,]   2   4   6   8

matrix(1:20, 2, 4, byrow=TRUE)

##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]   1   2   3   4
## [2,]   5   6   7   8
```

Data frame

Data frame adalah suatu tabel yang dibentuk dari satu atau lebih vektor dan atau dengan *length* yang sama tetapi dengan mode yang berbeda. Data frame biasa dibuat secara implisit menggunakan fungsi `read`. Tabel atau kita juga bisa menggunakan fungsi `data.frame`.

Misalkan:

```
x<-2:4;n<-16; M<-c(20,30);y<-2:4
data.frame(x,n)

##      x      n
##  1  2  16
##  2  3  16
##  3  4  16
```

Time-series

Time-series adalah objek yang berisi data runtun waktu. Fungsi `ts` digunakan untuk membuat objek time series dari suatu vektor(untuk single time series) ataupun dari matriks(untuk multivariate time series). Berikut adalah opsi penggunaan fungsi `ts`:

Ts(data = NA, start = 1, end = numeric(0), frequency = 1, Delta = 1 ts.eps = getOptions("ts.eps"), class, names)

Misalkan:

```
ts(1:10, start = 2010)

## Time Series:
## Start = 2010
## End = 2019
## Frequency = 1
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ts(1:46, frequency = 12, start = c(2010,2))

##      Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
## 2010      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
## 2011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
## 2012 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
## 2013 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
```


List

List adalah suatu vektor terurut dari sekumpulan komponen dapat berupa sembarang data objek, yaitu vektor, matrix, data frame, atau data lists sendiri. Tiap komponen pada data list dapat mempunyai length dan mode yang berbeda. Membentuk list menggunakan cara yang sama dengan membuat data frame, hanya fungsi yang digunakan adalah list.

Misalkan: Dari variabel *x* dan *y* yang didefinisikan pada contoh sebelumnya:

```
L1<-list(x, y);L2<-list(A=x, B=y)
```

```
L1
```

```
## [[1]]  
## [1] 2 3 4  
##  
## [[2]]  
## [1] 2 3 4
```

```
L2
```

```
## $A  
## [1] 2 3 4  
##  
## $B  
## [1] 2 3 4
```

```
names(L1)
```

```
## NULL
```

```
names(L2)
```

```
## [1] "A" "B"
```

Bab IV

PENYAJIAN DATA DALAM GRAFIK

A. Pendahuluan

Penyajian data dalam bentuk grafik (gambar) merupakan bagian yang urgen dalam mengkomunikasi hasil analisa data penelitian. Selain, sebagai bahan komunikasi juga membantu peneliti untuk memperoleh gambaran terkait data selama proses analisis data sehingga membantu peneliti memutuskan metode analisa apa yang dapat diterapkan pada data tersebut.

Software R dilengkapi dengan fasilitas untuk visualisasi statistik dalam bentuk grafik, baik statistik, kontur, map, dan lain-lain. Sistem grafik di R terdiri dari dua sistem: sistem (dasar/default) yang terdapat dalam paket `graphics` dan sistem `trellis` yang terdapat dalam paket `lattice`. Grafik di R dapat diatur sesuai keperluan. Untuk melihat lebih detil mengenai fitur grafik dalam R, pilih menu `Help` di menu `R` kemudian pilih `Manual` (dalam format pdf) atau `HTML help`. Untuk mendapatkan gambaran langsung tentang grafik dalam R, dapat dilihat dalam fungsi `demo()`, dengan menuliskan

```
> demo() # untuk melihat jenis-jenis demo
> demo(graphics) # atau
> demo(image) # atau
> demo(persp) # atau
> demo(lattice) # sebelumnya diperlukan load package
dan pilih lattice pada menu di windows R anda; atau
> demo(package = .packages(all.available = TRUE)) #
untuk melihat semua jenis demo yang tersedia
```

R mempunyai library visualisasi yang sangat bervariasi beragam, baik yang merupakan fungsi dasar pada R maupun dari sumber lain seperti `ggplot` dan `lattice`. Seluruh library visualisasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, pada bagian buku ini, hanya fokus pada fungsi visualisasi dasar bawaan dari software R.

B. Scaterplot

Penyajian grafik dalam bentuk scatterplot bisa menggunakan fungsi umum `plot()`, dengan format dasar sebagai berikut:

```
plot(x, y, type="p")
```

dimana `x` dan `y`: titik koordinat plot merupakan data jumlah observasinya sama. Fungsi plot ini merupakan opsional type "p".

Misalkan

```
>plot(x,y,type="l",xlab="label sumbu-x", ylab="label sb-y", main="Keterangan Grafik")
```

R menyediakan beberapa macam type grafik, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Type Grafik R

Type	Keterangan
type="p"	menyajikan plot titik atau scatterplot. merupakan default pada fungsi plot().
type="l"	menyajikan plot garis
type="b"	menyajikan plot titik yang terhubung dengan garis.
type="o"	menyajikan plot titik yang ditimpa oleh garis
type="h"	menyajikan plot garis vertikal dari titik ke garis $y=0$.
type="s"	menyajikan fungsi tangga
type="n"	tidak menyajikan grafik plot sama sekali, kecuali plot dari axis. Dapat digunakan untuk mengatur tampilan suatu plot utama yang diikuti oleh sekelompok plot tambahan.

Kasus 4.1

Seorang Peneliti memiliki data pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2019, sebagai berikut:

```
Tahun=c(2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019)
```

```
Tahun
```

```
## [1] 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
```


```
Growth=c(7.62,7.54,7.19,7.42,7.21,7.06,6.92)
```

```
Growth
```

```
## [1] 7.62 7.54 7.19 7.42 7.21 7.06 6.92
```


Berdasarkan data tabel bisa disajikan dalam bentuk grafik

```
plot(Tahun,Growth,type = "p")
```




Gambar 4.1 Plot Type "p"

```
plot(Tahun,Growth,type = "l")
```




Gambar 4.2 Plot Type "l"

```
plot (Tahun, Growth, type = "b")
```




Gambar 4.3 Plot Type "b"

```
plot (Tahun, Growth, type = "o")
```




Gambar 4.4 Plot Type "o"

```
plot(Tahun, Growth, type = "h")
```



Gambar 4.5 Plot Type "h"

```
plot(Tahun, Growth, type = "s")
```



Gambar 4.6 Plot Type "s"

```
plot (Tahun, Growth, type = "n")
```



Gambar 4.7 Plot Type "n"

Pada gambar (4.1 – 4.7), masih sangat standart, sehingga perlu di lengkapi dengan beberapa keterangan tambahan untuk mempermudah dan memperjelas menjelaskan makna dari grafik yang telah dibuat, sehingga hal ini dapat dilakukan untuk menambah fitur simbol atau warna dalam tampilan gambar (grafik). Hal ini semuanya bisa didapat fasilitas yang disediakan software R termasuk pewarnaan (yaitu dengan argumen col), simbol (dengan argumen pch), ukuran (dengan argumen cex), label/nama sumbu kordinat (dengan argumen xlab dan ylab), judul grafik (dengan argumen main). Untuk menemukan jenis warna yang disediakan R cukup menggunakan fungsi colours(), akan ditampilkan daftar warna warna yang bisa dipilih.

```
colours ()
```

```
## [1] "white" "aliceblue" "antiquewhite"  
## [4] "antiquewhite1" "antiquewhite2" "antiquewhite3"  
"  
## [655] "yellow3" "yellow4" "yellowgreen"
```


Untuk bilangan numeric menggunakan fungsi palette(), untuk menampilkan daftar warna yang tersedia

```
palette()
```

```
## [1] "black" "red" "green3" "blue" "cyan"  
"magenta" "yellow"  
## [8] "gray"
```

misalkan kita pilih type "p" dengan warna biru dan fungsi title untuk memberikan judul gambar, cukup menggunakan fungsi

```
plot(Tahun,Growth,type = "p",col="blue")  
title(main = "Pertumbuhan ekonomi",col.main="black",font.main  
="4")
```




Gambar 4.8 Plot Type "p" Pertumbuhan ekonomi

Selain warna, di R tersedia R yang dapat digunakan untuk menyajikan tanda plot

C. Histogram

Selain histogram, R juga tersedia plot yang fungsinya mirip histogram yaitu stem-and-leaf plot. untuk histogram menggunakan fungsi hist()

```
hist(Growth,col = "GREEN")
```

Gambar 4.9 Histogram of Growth


Selain, plot, bentuk grafis yang mudah digunakan untuk menyajikan sebaran data adalah histogram. R menyediakan fasilitas fungsi histogram yang dapat digunakan untuk mengetahui sebaran data penelitian. Sebelumnya dipahami penjelasan terkait dengan histogram yaitu: 1) histogram dipakai untuk mengestimasi fungsi distribusi probabilitas densitas; 2) histogram ditentukan pula oleh bin/lebar batang; 3) sumbu- y dalam histogram dapat berupa frekuensi kemunculan atau proporsi; 4) tidak ada estimasi statistik yang dapat dibaca langsung dari histogram, namun dengan histogram kita dapat menduga kemiringan, sifat/behavior pada tail atau ujung kurva, dan outlier data; 5) histogram dapat dibandingkan sebagai suatu distribusi analitik standar.

D. Q - Q (Quantile - Quantile)

Quantile - Quantile (Q-Q) plot. Q-Q plot dapat dipakai untuk memplot variabel secara lebih teliti berdasarkan nilai quantile data. Q-Q plot merupakan suatu *scatter plot* yang membandingkan distribusi empiris dengan *fitted distribution* dalam kaitannya dengan nilai dimensi suatu variabel. Q-Q plot dapat memplot dengan baik jika dataset diperoleh dari populasi yang sudah diketahui. Q-Q plot pada software R terbagi dua, yakni: 1) `qqnorm()` atau biasa disebut sebagai plot probabilitas normal, digunakan untuk menguji *goodness of fit* dari distribusi Gaussian. `qqnorm()` disebut juga sebagai plot probabilitas normal; 2) `qqplot` untuk mengetahui sebarang jenis distribusi.

Dengan melanjutkan data pertumbuhan ekonomi di atas Q - Q plot bisa digunakan, sebagai berikut:

```
par(pty="s") # digunakan untuk mengatur pembuatan
daerah gambar berbentuk kotak
qqnorm(Growth)
qqline(Growth)
```




Gambar 4.10 Normal Q - Q Plot

E. Boxplot

Boxplot digunakan untuk menggambarkan sebaran data, dimana memiliki fitur dasar biasa digunakan diantaranya 1) digunakan untuk membandingkan banyak grup/kelompok; 2) menggunakan tiga jenis summary (tiga quartil); 3) dapat menampilkan nilai rata-rata (mean) dengan mudah; 4) bisa diperluas untuk menampilkan persentil lainnya. Untuk menjelaskan penggunaan fungsi `boxplot()`, Dengan melanjutkan data pertumbuhan ekonomi, dapat penyajian boxplot dapat di sajikan:

```
boxplot(Growth, col = "green")
```



Gambar 4.11 Boxplot

Software R menyediakan beraneka ragam bentuk penyajian grafik plot. Adapun daftar plot grafik dasar yang tersedia di R (beberapa yang sudah terinstal dari awal, namun ada pula beberapa yang harus di download di CRAN):

Tabel 4.2 Jenis Plot pada R

Jenis Fungsi Plot	Keterangan
assocplot	Plot Asosiasi
barplot	Plot Batang (Bar)
boxplot	Plot Kotak (Box)
contour	Plot Contour
coplot	Plot Conditioning
dotchart	Plot Cleveland Dot
filled.contour	Plot Level (Contour)
forfoldplot	Plot Fourfold
hist	Histogram
image	Menampilkan suatu warga Image
matplot	Plot Kolom suatu matriks
mosaicplot	Plot Mosaic
pairs	Matriks Scatterplot

Jenis Fungsi Plot	Keterangan
<code>persp</code>	Matriks Perpektif
<code>plot</code>	Plot X-Y umum
<code>stars</code>	Plot Star (Spider/Radar)
<code>stem</code>	Plot stem-and-Leaf
<code>stripchart</code>	Plot Scatter 1-D
<code>sunlowerplot</code>	Plot Scatter Sunflower

Bab V

UKURAN PEMUSATAN DAN PENYEBARAN DATA

A. Ukuran Pemusatan

Ukuran pemusatan atau biasa disebut tendensi sentral merupakan suatu nilai tunggal yang mewakili karakteristik suatu kelompok data. Ukuran pemusatan suatu data dapat ditentukan berdasarkan nilai harapan, estimasi, prediksi terhadap nilai tertentu yang mewakili seluruh data. Menurut Smidth, R. K; dan Sanders (2000) menjelaskan tentang ukuran ukuran pusat:

“Anda tahu dari Bab 2 bahwa ada beberapa ukuran tendensi sentral. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk meringkas dalam satu nilai ukuran tipikal, properti tengah, atau lokasi pusat dari sekumpulan nilai. Ukuran yang paling umum dari tendensi sentral, tentu saja, rata-rata aritmatika, yang merupakan penjumlahan dari nilai-nilai sekelompok item dibagi dengan jumlah item-item tersebut. Tapi Anda juga melihat di Bab 2 bahwa median dan mode adalah ukuran lain dari tendensi sentral yang umum digunakan.”

Senada yang dikemukakan Spiegel, dan Stephens (2008)

“Rata-rata adalah nilai yang khas, atau representatif, dari sekumpulan data. Karena nilai-nilai tipikal tersebut cenderung terletak secara terpusat dalam sekumpulan data yang disusun menurut besarnya, rata-rata juga disebut ukuran tendensi sentral.

Beberapa jenis rata-rata dapat didefinisikan, yang paling umum adalah rata-rata aritmatika, median, mode, rata-rata geometri, dan rata-rata harmonik. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, bergantung pada data dan tujuan yang dimaksudkan.”

Ukuran ini bisa berbentuk data tunggal atau data berkelompok. Berikut ada tiga ukuran pemusatan data yaitu nilai rata-rata hitung, median dan modus.

1. Rata-rata hitung (*Mean*)

Rata-rata hitung diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai data dan membagi dengan jumlah data. Rata-rata hitung dibedakan antara populasi dan sampel. Untuk yang mewakili populasi disebut parameter, sedangkan yang mewakili sampel disebut statistik.

Rata-rata hitung populasi diperoleh dengan cara:

$$\mu = \frac{\sum x}{N} \quad (5.1)$$

Rata-rata hitung sampel diperoleh dengan cara

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n} \quad (5.2)$$

R dapat digunakan untuk menghitung nilai Rata-rata hitung dengan menggunakan function (`mean`), berikut kasus dapat dilihat sebagai berikut:

Kasus 5.1

Nilai ujian mata kuliah statistika 10 orang mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi yang diambil sebagai sampel dari sebuah populasi adalah 75, 80, 80, 95, 88, 85, 86, 70, 90, 92, 100. Tentukan rata-rata nilai ujian kelima orang mahasiswa tersebut.

```
data <- c(75, 80, 80, 95, 88, 85, 86, 70, 90, 92, 100)
mean(data)

## [1] 85.54545
```

Rata-rata Ukur (Geometrik)

Selain, rata-rata hitung juga ada dikenal rata-rata ukur, yaitu rata-rata dihitung dengan mengalikan seluruh nilai sampel, kemudian diakarkan dengan jumlah sampel tersebut. Adapun rumus yang bisa digunakan untuk menghitung rata-rata ukur, sebagai berikut:

$$G = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n} \quad (5.3)$$

Untuk menghitung nilai rata-rata ukur, tidak tersedia function di R, namun bisa dikembangkan sendiri pada R:

```
mean.geom <- function(data) {exp(mean(log(data)))}
data <- c(75, 80, 80, 95, 88, 85, 86, 70, 90, 92, 100)
mean.geom(data)

## [1] 85.12259
```

Rata-Rata Harmonis

$$H = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} \quad (5.4)$$

dimana H menunjukkan rata-rata harmonis, n adalah banyaknya data,

untuk mengitung nilai rata-rata harmonis, tidak tersedia function di R, namun bisa dikembangkan sendiri pada R:

```
mean.harm <- function(data) {1/(mean(1/data))}
data <- c(75, 80, 80, 95, 88, 85, 86, 70, 90, 92, 100)
mean.harm(data)

## [1] 84.69207
```

Kasus 5.2

Misalkan Produsen mobil Daihatsu di Indonesia mengeluarkan 53 jenis mobil dari harga mobil termurah Rp 113, 20 juta sampai dengan harga termahal Rp 209,90 Juta. Berikut daftar harga mobilnya

Tabel 5.1 Data Harga Jual Mobil

139.5	132.4	126.6	141.1	148.5	149.5	130.6	179.3	169	167.6
173	173.9	156.7	154.7	162.9	163.8	156.7	143.5	141.2	117
123.4	116.3	113.2	132.5	124.7	142.2	146.8	138	153.4	160.6
153.4	169.1	177.6	172.6	157.9	166.4	153	161.6	150.5	139.5
171.8	174.8	158	169.7	198	209.9	187	197	171.3	160.9
168.3	157.9	157.9							

Sumber: Suharyadi dan Purwanto (2016)

Berdasarkan Tabel 5.1, nilai rata-rata hitung dapat dihitung, sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{139,50 + 132,40 + 126,60 + \dots + 157,90}{53}$$

$$\bar{X} = 155,9$$

Atau data di atas bisa dikelompokkan untuk lebih proses penyelesaian karena data tergolong besar

Tabel 5.2 Tabel Distribusi Harga Jual Mobil

Interval	Frekuensi (f)	Nilai Tengah (xi)	f.xi
113,2 - 127,2	6	120.2	721.2
128,2 - 142,2	9	135.2	1216.8
143,2 - 157,2	11	150.2	1652.2
158,2 - 172,2	17	165.2	2808.4
173,2 - 187,2	7	180.2	1261.4
188,2 - 202,2	2	195.2	390.4
203,2 - 217,2	1	210.2	210.2
	53		8260.6

Dengan demikian, rata -rata hitung bisa dihitung:

$$\bar{X} = \frac{\sum f.xi}{n} \quad (5.5)$$

$$\bar{X} = \frac{8260,6}{53} = 155,9$$

- Median (Me) merupakan salah satu ukuran pemusatan, merupakan suatu nilai yang berada ditengah-tengah data, setelah data tersebut diurutkan. Untuk data tunggal (data yang belum dikelompokkan) nilai median dapat di cari dengan langkah-langkah 1) letak dari median dicari dengan menggunakan rumus $(n + 1) / 2$, jika nilai data jumlahnya ganjil, maka nilai media merupakan nilai

yang letaknya titik tengah data, dan jika data jumlahnya genap maka nilai media merupakan nilai rata-rata dari dua data yang letaknya berda ditengah.

Mengacu pada kasus Median R dapat digunakan untuk menghitung nilai median dengan menggunakan function (median)

```
data <- c(75, 80, 80, 95, 88, 85, 86, 70, 90, 92, 100)
median(data)
## [1] 86
```

Untuk kasus, nilai median dapat dicari, sebagai berikut:

- 1) Menentukan letak median yaitu $(n + 1) / 2$, jumlah data adalah 53, maka letak nilai median $(53 + 1) / 2 = 27$
- 2) Mengurutkan nilai harga jual
- 3) Nilai media terletak pada data 27 dengan tingkat harga jual 156,7 juta

Untuk data berkelompok nilai median dapat ditentukan, sebagai berikut:

$$M_e = b + p \left(\frac{\frac{1}{2}n - F}{f} \right) \quad (5.6)$$

Di mana:

Me = Median

b = Batas Bawah kelas Median

P = Panjang Kelas

n = banyaknya data

F = Jumlah Frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median

f = Frekuensi kelas median

letak median $n/2 = 53/2 = 26,5$, yaitu berada pada frekuensi kumulatif 47 yaitu 26. Dapat dilihat pada tabel berikut:

$$M_e = b + p \left(\frac{\frac{1}{2}n - F}{f} \right)$$

$$= 157,7 + 14 (53/2 - 15)/17$$

$$= 158,11$$

Jadi nilai median 158,11

Tabel 5.3 Letak Kelas Median

Interval	Frekuensi (f)	Frekuensi kumulatif
113,2 - 127,2	6	6
128, 2 - 142,2	9	15
143,2 - 157,2	11	26
158,2 - 172,2	17	43
173,2 - 187,2	7	50
188,2 - 202,2	2	52
203,2 - 217,2	1	53
Jumlah	53	

Mann dan Lacke (2011), menjelaskan bahwa

“Median menunjukkan pusat histogram, dengan separuh nilai data berada di kiri median dan separuh di kanan median. Keuntungan menggunakan median sebagai ukuran tendensi sentral adalah tidak dipengaruhi oleh pencilan. Akibatnya, median lebih disukai daripada mean sebagai ukuran tendensi sentral untuk kumpulan data yang berisi pencilan. Misalnya, ketika kumpulan data memiliki pencilan, daripada menggunakan mean, kita dapat menggunakan median atau median yang dipangkas sebagai ukuran tendensi sentral.”

3. Modus (*Mode*)

Modus dari suatu distribusi data adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan nilai frekuensi terbanyak

Untuk kasus nilai modus dapat ditentukan melalui R, sebagai berikut

```
mode <- function(data) {
  uqx <- unique(data)
  tab <- table(data)
  sort(uqx)[tab == max(tab)]
}
data <- c(75,80,80,95,88,85,86,70,90,92,100)
mode(data)

## [1] 80
```

data berkeompok dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$M_o = b + p \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) \quad (5.7)$$

Di mana:

M_o = Modus

b = Batas bawah kelas modus

p = Panjang kelas

d_1 = Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya

d_2 = Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya

$$\begin{aligned} M_o &= b + p \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) \\ &= 157,7 + 14 (6/10+6) \\ &= 162,95 \end{aligned}$$

Jadi, Nilai Modus = 162,95

$$\begin{aligned} &157,7+(6)/(10+6) \times (14) \\ &162.95 \end{aligned}$$

B. Ukuran Penyebaran

Ukuran penyebaran biasa juga disebut sebagai variabilitas yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana menyebarnya data atau terpecahnya data. Jika data memiliki pencaran yang besar menunjukkan nilai-nilai data cenderung terletak cukup jauh terhadap nilai rata-rata dari data tersebut. Dengan kata lain, data semakin bervariasi atau heterogen. Sejalan yang dikemukakan Mann dan Lacke (2011), sebagai berikut.

“Dua set data dengan mean yang sama mungkin memiliki penyebaran yang berbeda. Variasi di antara nilai observasi untuk satu kumpulan data mungkin lebih besar atau lebih kecil daripada untuk kumpulan data lainnya. (Perhatikan bahwa kata-kata dispersi, dan variasi memiliki arti yang sama).

Jadi, mean, median, atau mode dengan sendirinya bukanlah ukuran yang cukup untuk mengungkapkan bentuk distribusi kumpulan data. Kami juga membutuhkan ukuran yang dapat memberikan beberapa informasi tentang variasi antar nilai data. Ukuran yang membantu kita mempelajari penyebaran kumpulan data disebut ukuran dispersi. Ukuran tendensi sentral dan dispersi yang diambil bersama-sama memberikan gambaran yang lebih baik tentang kumpulan data daripada ukuran tendensi sentral saja. Bagian ini membahas tiga ukuran dispersi: rentang, varian, dan deviasi standar. ”

1. Rentang (Range)

Rentang (Range) adalah selisih data terbesar dengan data terkecil. Berdasarkan kasus Tabel maka nilai Rentang diperoleh $209,9 - 113,2 = 96,7$.

Range dengan menggunakan fungsi(range) nilai maksimum dan nilai minimum dapat dihitung melalui R

```
data <- c(75, 80, 80, 95, 88, 85, 86, 70, 90, 92, 100)
range(data)
```

```
## [1] 70 100
```

```
range.data <- function(data) {max(data) - min(data)}
range.data(data)
```

```
## [1] 30
```

Ukuran range sama seperti rata-rata hitung, mempunyai kelemahan ketika dalam suatu data mengandung *outlier*. Seperti yang dikemukakan Mann dan Lacke (2011):

“Rentang, seperti mean, memiliki kelemahan karena dipengaruhi oleh pencilan. Akibatnya, rentang tersebut bukanlah ukuran dispersi yang baik untuk digunakan untuk kumpulan data yang berisi pencilan.

Kerugian lain menggunakan rentang sebagai ukuran dispersi adalah bahwa kalkulasi hanya didasarkan pada dua nilai: yang terbesar dan terkecil. Semua nilai lain dalam kumpulan data diabaikan saat menghitung rentang. Jadi, kisaran tersebut bukanlah ukuran dispersi yang sangat memuaskan. ”

2. Simpangan Rata-rata

Simpangan rata-rata adalah jumlah harga mutlak dari jarak setiap data terhadap rata-rata dibagi banyaknya data, dapat dirumuskan sebagai berikut

Untuk data tunggal

$$RS = \frac{\sum |x_i - \bar{X}|}{N} \quad (5.8)$$

Untuk data berkelompok:

$$RS = \frac{\sum f[x_i - \bar{X}]}{N} \quad (5.9)$$

Dari contoh Tabel diselesaikan simpangan rata-rata dengan menggunakan tabel pembantu

Tabel 5.4 Perhitungan Simpangan Rata-rata

f	Nilai Tengah (xi)	Nilai Rata-rata (\bar{X})	$x_i - \bar{X}$	$(x_i - \bar{X})$	$F(x_i - \bar{X})$
6	120.2	155.9	-35.7	35.7	214.2
9	135.2	155.9	-20.7	20.7	186.3
11	150.2	155.9	-5.7	5.7	62.7
17	165.2	155.9	9.3	9.3	158.1

f	Nilai Tengah (xi)	Nilai Rata-rata (\bar{X})	$xi-\bar{X}$	$(xi-\bar{X})^2$	$F(xi-\bar{X})$
7	180.2	155.9	24.3	24.3	170.1
2	195.2	155.9	39.3	39.3	78.6
1	210.2	155.9	54.3	54.3	54.3
53					924.3

Sehingga simpangan rata-rata = $\frac{924,3}{53} = 17,44$

3. Standar Deviasi dan Varians (SD)

Standar deviasi untuk sampel diberi simbol s dan standar deviasi untuk populasi diberi simbol σ . Pangkat dua dari standar deviasi disebut varians sampel adalah s^2 dan populasi adalah σ^2 . Dengan demikian, s dan s^2 adalah merupakan statistik dan σ dan σ^2 adalah parameter untuk standar deviasi, sehingga dapat dirumuskan:

Untuk sampel

$$s = \sqrt{\frac{\sum f x_i^2 - (\sum f x_i)^2 / n}{n-1}} \quad (5.10)$$

Untuk populasi

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum f x_i^2 - (\sum f x_i)^2 / n}{n}} \quad (5.11)$$

Dari contoh Tabel diselesaikan standar deviasi dan varians dengan menggunakan tabel pembantu

Tabel 5.5 Perhitungan Standar Deviasi dan Varians

Frekuensi (fi)	Nilai Tengah (xi)	Xi^2	fixi	Fixi ²
6	120.2	14448.04	721.2	86688.24
9	135.2	18279.04	1216.8	164511.36
11	150.2	22560.04	1652.2	248160.44

Frekuensi (fi)	Nilai Tengah (xi)	Xi^2	fixi	Fixi ²
17	165.2	27291.04	2808.4	463947.68
7	180.2	32472.04	1261.4	227304.28
2	195.2	38103.04	390.4	76206.08
1	210.2	44184.04	210.2	44184.04
53			8260.6	1311002.12

Sehingga standar deviasi dan varians:

$$s = \sqrt{\frac{1311002,12 - (8260,6)^2/53}{53-1}} = \sqrt{451,96} = 21,26$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1311002,12 - (8260,6)^2/53}{53}} = \sqrt{443,43} = 21,06$$

4. Koefisien Varians

Koefisien varians digunakan untuk membandingkan variasi antara nilai-nilai kecil dengan besar. Koefisien varians dinyatakan dalam bentuk bentuk persen dengan rumus:

$$KV = \frac{\text{standar deviasi}}{\text{Rata-rata hitung}} \times 100\% \quad (5.12)$$

Sehingga tabel koefisien varians dapat dihitung sebagai berikut

Koefisien varians untuk sampel

$$KV_s = \frac{21,26}{155,9} \times 100\% = 13,63$$


Koefisien varians untuk sampel

$$KV_\sigma = \frac{21,06}{155,9} \times 100\% = 13,51$$

5. Ukuran Kemiringan

Ukuran kemiringan adalah ukuran yang dapat menyatakan model distribusi dari suatu populasi. Ukuran dibagi kedalam tiga model

kurva yaitu model positif, model negatif dan model simetris. Ukuran ketiga model kemiringan memiliki hubungan antara rata-rata hitung (mean), median (Me) dan Modus (Mo), sebagai berikut: 1) Jika model kurva positif, maka nilai mean > median < modus; 2) jika model negatif, maka nilai mean < median < modus; dan 3) jika model simetris, maka nilai mean = median = modus. Dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.1 Macam Model Ukuran Kemiringan

Untuk menghitung kemiringan sebuah data penelitian, dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kemiringan} = \frac{n}{(n-1)(n-2)} \left(\frac{\sum (X - \bar{X})^3}{s^3} \right)$$

Misalkan dengan menggunakan data Tabel

Dengan menggunakan tabel pembantu

Tabel 5.6 Perhitungan Kemiringan


Frekuensi (f)	Nilai Tengah (xi)	\bar{X}	$xi-\bar{X}$	$(xi-\bar{X})^3$
6	120.2	155.9	-35.7	-45499.293
9	135.2	155.9	-20.7	-8869.743
11	150.2	155.9	-5.7	-185.193
17	165.2	155.9	9.3	804.357
7	180.2	155.9	24.3	14348.907
2	195.2	155.9	39.3	60698.457
1	210.2	155.9	54.3	160103.007
53				181400.499

$$\text{Kemiringan} = \frac{53}{(53 - 1)(53 - 2)} \left(\frac{181400,499}{21,26^3} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Kemiringan} &= 0,0199 (98,439) \\ &= 1,97 \end{aligned}$$

6. Ukuran Keruncingan (Kurtosis)

Ukuran keruncingan atau biasa disebut kurtosis adalah derajat kelancipan suatu distribusi bila dibandingkan dengan distribusi normal. Suatu distribusi yang lebih lancip dibandingkan dengan distribusi normal, maka disebut distrivusi leptokurtis, dan bila lebih tumpul daripada distribusi normal disebut platikurtis, serta untuk distribusi normal disebut mesokurtis, sehingga ukuran keruncingan terdiri dari model leptokurtis, model platikurti dan model mesokurtis. Adapun gambar model yang dimaksud Pada Gambar 2, kurva merah menggambarkan distribusi yang mesokurtic. Kurva biru menggambarkan distribusi yang platykurtic dan yang hijau leptokurtic.



Gambar 5.2 Model Keruncingan

Adapun rumus digunakan untuk menghitung kurtosis, sebagai berikut:

$$Kurtosis = \left\{ \frac{(n)(n+1) \sum (X - \bar{X})^4}{(n-1)(n-2)(n-3) s^4} \right\} - \frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}$$

Misalkan dengan menggunakan data Tabel

Tabel 5.7 Perhitungan Nilai Kurtosis

Frekuensi (f)	Nilai Tengah (xi)	\bar{X}	$xi - \bar{X}$	$(xi - \bar{X})^4$
6	120.2	155.9	-35.7	1624324.76
9	135.2	155.9	-20.7	183603.68
11	150.2	155.9	-5.7	1055.6001
17	165.2	155.9	9.3	7480.5201
7	180.2	155.9	24.3	348678.44

Frekuensi (f)	Nilai Tengah (xi)	\bar{X}	$xi-\bar{X}$	$(xi-\bar{X})^4$
2	195.2	155.9	39.3	2385449.36
1	210.2	155.9	54.3	8693593.28
53				13244185.6

nilai kurtosis dapat dihitung:

$$Kurtosis = \left\{ \frac{(53)(53 + 1)(13244185,6)}{(53 - 1)(53 - 2)(53 - 3) 21,26^4} \right\} - \frac{3(53 - 1)^2}{(53 - 2)(53 - 3)}$$

Penyelesaian dengan Rstudio

Langkah 1: Menyiapkan data di Microsoft excel

Langkah 2: Mengimpor data Ke RStudio

```
library(readxl)
```

```
## Warning: package 'readxl' was built under R version 3.6.3
```

```
ukuran_pusat <- read_excel("D:/ukuran_pusat.xlsx")
View(ukuran_pusat)
```

Langkah 3: Membaca Ringkasan Data dengan Menggunakan Fungsi Summary()

```
summary(ukuran_pusat)
```

```
##      Harga jual
##      Min.      :113.2
##      1st Qu.:141.2
##      Median  :157.9
##      Mean    :155.9
```

```
## 3rd Qu.:169.1  
## Max. :209.9
```

Langkah 4 Menentukan Ukuran Pemusatan dan Ukuran Penyebaran

Nilai minimum

```
min(ukuran_pusat)
```

```
## [1] 113.2
```

Nilai Maksimum

```
max(ukuran_pusat)
```

```
## [1] 209.9
```

Rentang (Range)

```
x=ukuran_pusat$`Harga jual`  
summary(x)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
## 113.2  141.2   157.9   155.9  169.1   209.9
```

```
range(x)
```

```
## [1] 113.2 209.9
```

```
range.data<-function(x){max(x)-min(x)}
```

```
range.data(x)
```

```
## [1] 96.7
```

Median

R dapat digunakan untuk menghitung nilai median dengan menggunakan function (median)

```
median(x)
```

```
## [1] 157.9
```

Modus

```
mode <- function(x) {  
  uqx <- unique(x)  
  tab <- table(x)  
  sort(uqx)[tab == max(tab)]  
mode(x)  
  
## [1] 157.9
```

Varians dan Standart Deviasi untuk menghitung varians dan standart deviasi pada R, menggunakan function (var) dan fungction (sd)

```
var(x)  
  
## [1] 435.5638  
  
sd(x)  
  
## [1] 20.87017
```

Jangkauan Antarkuartil

```
JAK <- function(x) {  
  as.numeric(quantile(x, 0.75) - quantile(x, 0.25))  
Qd <- function(x) {as.numeric(0.5*(quantile(x, 0.75) - q  
uantile(x, 0.25)))}  
JAK(x)  
  
## [1] 27.9  
  
Qd(x)  
  
## [1] 13.95
```

Langkah 5: Menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran, dapat dihitung secara bersamaan di R namun diawali menginstal packages ("psych") dan ("pastecs")

```
library(psych)
```

```
library(pastecs)
```

Langkah 6: Menghitung Ukuran pemusatan dan penyebaran dengan menggunakan fungsi `stat.desc()` dan fungsi `decribe()`

```
describe(x)
```

```
##      vars  n mean      sd median trimmed  mad   min   max ra
nge skew kurtosis
## X1     1 53 155.9 20.87  157.9  155.74 20.61 113.2 209.9 9
6.7 0.08  -0.12
##      se
## X1 2.87
```

```
stat.desc(ukuran_pusat)
```

```
##
##      Harga jual
## nbr.val      53.0000000
## nbr.null     0.0000000
## nbr.na       0.0000000
## min         113.2000000
## max         209.9000000
## range       96.7000000
## sum         8262.7000000
## median      157.9000000
## mean        155.9000000
## SE.mean     2.8667378
## CI.mean.0.95 5.7525303
## var         435.5638462
## std.dev     20.8701664
## coef.var    0.1338689
```

Bab VI

PENGUJIAN ASUMSI STATISTIK PARAMETRIK

A. Pengantar

Pengujian hipotesis statistik di sebuah penelitian, seorang peneliti terlebih dahulu menentukan statistik uji mana yang tepat digunakan, apakah menggunakan uji statistik parametrik atau non parametrik (Supardi, 2013). Dalam penggunaan uji statistik parametrik dan non parametrik, perlu dilaksanakan uji persyaratan analisis. Pengujian dengan uji statistik inferensial parametrik mensyaratkan uji normalitas, uji homogenitas variansi, dan uji linearitas (Usmadi, 2020).

Statistik parametrik membutuhkan pengujian terhadap model yang dikembangkan dalam sebuah penelitian dan memiliki asumsi asumsi yang harus dipenuhi tentang parameter populasi yang merupakan sumber dari sampel penelitian. Selain itu, tes statistik parametrik menuntut skor-skor yang dianalisis harus merupakan hasil suatu pengukuran sedikitnya berkekuatan sebagai skala interval (Siegel, 2011). Asumsi yang dikembangkan statistik parametrik berdasarkan analisis variansi. Penggunaan analisis variansi di dalam statistik parametrik didasari karena empat hal, sebagai berikut: asumsi Hinkle, dkk (1979) menjelaskan asumsi-asumsi yang mendasari teknik analisis variansi adalah: 1) sampel penelitian diambil secara random dari masing-masing populasi; 2) variabel terikat (dependen) merupakan data rasio atau minimal interval; 3) sampel yang diambil dari populasi berdistribusi normal; dan 4) Variansi kelompok sampel adalah homogen (Hinkle, *et.al*, 1979; Minium & Clarke, 1982; Hadi & Pamardiyanto, 1993). dengan demikian, muncul pertanyaan apakah syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam pengujian statistik parametrik tersebut? syarat-syarat dalam uji statistik parametrik adalah data yang digunakan harus memenuhi asumsi-asumsi klasik seperti normalitas, homogenitas, multikolinieritas, heteroksedasitas, autokorelasi dan harus berskala interval atau rasio.

Sebagai persyaratan untuk pengujian statistik parametrik dibutuhkan pengujian normalitas dan homogenitas. Pengujian asumsi distribusi normal bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sampel yang dikumpulkan berasal dari populasi normal atau tidak seperti pada analisis uji t dan uji F sedangkan pengujian asumsi homogenitas, bertujuan untuk menjaga komparabilitas terutama untuk pengujian tentang perbedaan rata-rata melalui statistik uji t dan uji F.

B. Pengujian Asumsi Distribusi Normalitas

Asumsi normalitas mempunyai urgensi yang sangat penting dalam pengujian statistik parametrik, misalkan uji beda rata-rata dari dua populasi dengan uji t dan analisis varians. Disebabkan dengan uji-uji parametrik akan bekerja dengan baik ketika asumsi normalitas dipenuhi. Sebagaimana yang dikemukakan Conover (1999):

“Sebagian besar metode parametrik didasarkan pada asumsi normalitas karena teori di balik pengujian dapat dikerjakan dengan distribusi populasi normal. Prosedur yang dihasilkan adalah prosedur yang efisien dan kuat untuk data yang terdistribusi normal. Prosedur parametrik lain telah dikembangkan dengan asumsi populasi memiliki distribusi lain, seperti eksponensial, Weibull, dan segera”.

Uji normalitas digunakan mengetahui apakah nilai residual yang terstandarisasi pada model regresi linear terdistribusi normal atau tidak. Nilai residual berdistribusi normal jika nilai residual yang terstandarisasi sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Uji asumsi normalitas yang lebih kompleks dan lengkap biasa disebut dengan uji kesesuaian model (*goodness of fit*) yaitu dimaksudkan untuk menguji apakah model yang diusulkan dalam sebuah penelitian memiliki kesesuaian (*fit*) dengan data atau tidak. Suatu model penelitian dikatakan fit apabila matriks korelasi sampel tidak jauh berbeda dengan matriks korelasi estimasi. Untuk mendeteksi data berdistribusi normal dapat dilakukan dengan beberapa metode, sebagai berikut:

1. Metode Liliefors

Misalkan sebuah penelitian yang mempunyai sampel acak dengan hasil penelitian $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$. dari sampel ini akan diuji hipotesis nol (H_0) bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal dan hipotesis (H_1) bahwa populasi yang tidak berdistribusi normal, sehingga dengan demikian

untuk mengetahui uji normalitas Lilliefors dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- 1) Susun sebaran data yang akan diuji dengan terlebih dahulu diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar.
- 2) Hitunglah nilai normal standar tiap data (datum) dengan rumus

$$Z = \frac{X_i - \bar{X}}{s} \quad (6.1)$$

Di mana:

Z = Nilai normal standar

X_i = datum

\bar{X} = Nilai rata-rata hitung

s = simpangan baku (standar deviasi)

- 3) Gunakan z tabel untuk menghitung luas di bawah kurva normal baku.
- 4) Hitung besar peluang dengan cara menghitung luas masing-masing nilai z.
- 5) Hitung nilai S(z), yakni frekuensi kumulatif relatif dari masing-masing nilai z.
- 6) Tentukan nilai lilliefors hitung L_h dengan rumus $L_h = |F(z) - S(z)|$
- 7) Tentukan nilai lilliefors tabel dengan rumus: L_t pada tingkat kepercayaan 95% adalah $L_t = \frac{0,886}{\sqrt{n}}$
- 8) Bandingkan nilai lilliefors hitung terbesar (L_h) dengan nilai lilliefors tabel (L_t). jika nilai $L_h < L_t$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 6.1 Nilai Kritik Uji Lilliefors

Ukuran Sampel (n)	Tingkat signifikansi ()				
	0.01	0.05	0.1	0.15	0.2
4	0.417	0.381	0.352	0.319	0.3
5	0.405	0.337	0.315	0.299	0.285
6	0.364	0.319	0.294	0.277	0.265
7	0.348	0.3	0.276	0.258	0.247

Ukuran Sampel (n)	Tingkat signifikansi ()				
	0.01	0.05	0.1	0.15	0.2
8	0.331	0.285	0.261	0.244	0.233
9	0.311	0.271	0.249	0.233	0.223
10	0.294	0.258	0.239	0.224	0.215
11	0.284	0.249	0.23	0.217	0.206
12	0.275	0.242	0.223	0.212	0.199
13	0.268	0.234	0.214	0.202	0.19
14	0.261	0.227	0.207	0.194	0.183
15	0.257	0.22	0.201	0.187	0.177
16	0.25	0.213	0.195	0.182	0.173
17	0.245	0.206	0.289	0.177	0.169
18	0.239	0.2	0.184	0.173	0.166
19	0.235	0.195	0.179	0.169	0.163
20	0.231	0.19	0.174	0.166	0.16
25	0.2	0.173	0.158	0.147	0.142
30	0.187	0.161	0.144	0.136	0.131
39	0.165	0.141	0.128	0.122	0.117
40	0.1631	0.14	0.127	0.121	0.116
41	0.161	0.138	0.125	0.119	0.114

Sumber: Sudjana, (1992)

Kasus 6.1

Suatu penelitian yang dilakukan seorang mahasiswa di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap 100 perusahaan, salah satu topik kajian penelitiannya adalah besarnya modal kerja (juta/Rupiah) perusahaan-perusahaan tersebut, diperoleh data sebagai berikut:

75	86	66	86	50	78	66	79	68	60
80	83	87	79	80	77	81	92	57	52
58	82	73	95	66	60	84	80	79	63
80	88	58	84	96	87	72	65	79	80
86	68	76	41	80	40	63	90	83	94
76	66	74	76	68	82	59	75	35	34
65	63	85	87	79	77	76	74	76	78
75	60	96	74	73	87	52	98	88	64
76	69	60	74	72	76	57	64	67	58
72	80	72	56	73	82	78	45	75	56

Penyelesaian

- Susun sebaran data yang akan diuji dengan terlebih dahulu diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar (kolom 1 Tabel)
- Tentukan frekuensi, untuk data yang unik diberi nilai 1, sedangkan untuk data yang sama diberi nilai 2 atau lebih sesuai dengan banyaknya data yang sama (kolom 1 Tabel).
- Hitunglah nilai normal standar tiap data dengan rumus:

$$Z = \frac{X_i - \bar{X}}{s}$$

Sebagaimana diketahui $\bar{X} = 72,66$ dan $s = 13,27$

Misal untuk data pertama

$$Z = \frac{34 - 72,66}{13,27} = -2,91$$

Dengan cara yang sama, tentukan nilai Z untuk masing-masing data.

- Gunakan Tabel **A1** untuk menentukan nilai Z tabel. Contoh nilai Z tabel data pertama diperoleh 0.4982, yakni data dari koordinat baris ke 2, 3 kolom ke-3. Dengan cara yang sama, tentukan nilai Z tabel untuk seluruh data.

- e) Hitung besar peluang dengan cara menghitung luas masing nilai Z. contoh peluang untuk data pertama, karena nilai $Z = -2,91$ maka luas di bawah kurva $F_z = 0,5 - Z$ tabel $= 0,5 - 0.4982 = 0,0081$ atau gunakan langsung (**Tabel 2**) untuk $Z = -2,33$ (baris -2-3 kolom 0,03) diperoleh luas 0,0081. Dengan cara yang sama, tentukan luas kurva (F_z) berikutnya
- f) Hitung nilai $A(z)$, yakni frekuensi kumulatif relatif dari masing-masing nilai Z contoh nilai $S(z)$ untuk data pertama $1/n = 1/100 = 0,01$, dan seterusnya.
- g) Tentukan nilai lilliefors hitung L_n , dengan rumus $L_n = f(z) - S(Z)$. contoh nilai L_n untuk data pertama $= 0,0081 - 0,01 = -0,082$ dan seterusnya.
- h) Tentukan nilai lilliefors tabel 9 lihat lampiran (tabel D) dengan tingkat kepercayaan 95% adalah
- $$L_t = \frac{0,886}{\sqrt{\pi}} = \frac{0,886}{\sqrt{100}} = 0,0886$$
- i) Karena nilai lilliefors hitung terbesar ($L_n = 0,0801$) > Lilliefors table ($L_t = 0,0886$) maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Tabel 6.2 Perhitungan Pengujian Lilliefors

Xi	f	Z	Ztabel	Fz	Sz	(Fz - Sz)
34	1	-2.91	0.4982	0.0018	0.01	-0.0082
35	1	-2.84	0.4977	0.0023	0.02	-0.0177
40	1	-2.46	0.4931	0.0069	0.03	-0.0231
41	1	-2.39	0.4916	0.0084	0.04	-0.0316
45	1	-2.08	0.4812	0.0188	0.05	-0.0312
50	1	-1.71	0.4564	0.0436	0.06	-0.0164
52	2	-1.56	0.4406	0.0594	0.08	-0.0206
56	2	-1.26	0.3962	0.1038	0.1	0.0038
57	2	-1.18	0.381	0.119	0.12	-0.001
58	3	-1.10	0.3643	0.1357	0.15	-0.0143
59	1	-1.03	0.3485	0.1515	0.16	-0.0085

Xi	f	Z	Ztabel	Fz	Sz	(Fz - Sz)
60	4	-0.95	0.3289	0.1711	0.2	-0.0289
63	3	-0.73	0.2673	0.2327	0.23	0.0027
64	2	-0.65	0.2422	0.2578	0.25	0.0078
65	2	-0.58	0.219	0.281	0.27	0.011
66	4	-0.50	0.1915	0.3085	0.31	-0.0015
67	1	-0.43	0.1664	0.3336	0.32	0.0136
68	3	-0.35	0.1368	0.3632	0.35	0.0132
69	1	-0.28	0.1103	0.3897	0.36	0.0297
72	4	-0.05	0.0199	0.4801	0.4	0.0801
73	3	0.03	0.012	0.488	0.43	0.058
74	4	0.10	0.0398	0.4602	0.47	-0.0098
75	4	0.18	0.014	0.486	0.51	-0.024
76	7	0.25	0.0987	0.4013	0.58	-0.1787
77	2	0.33	0.1293	0.3707	0.6	-0.2293
78	3	0.40	0.1554	0.3446	0.63	-0.2854
79	5	0.48	0.1844	0.3156	0.68	-0.3644
80	7	0.55	0.2088	0.2912	0.75	-0.4588
81	1	0.63	0.2357	0.2643	0.76	-0.4957
82	3	0.70	0.258	0.242	0.79	-0.548
83	2	0.78	0.2823	0.2177	0.81	-0.5923
84	2	0.85	0.3023	0.1977	0.83	-0.6323
85	1	0.93	0.3238	0.1762	0.84	-0.6638
86	3	1.01	0.3438	0.1562	0.87	-0.7138
87	4	1.08	0.3599	0.1401	0.91	-0.7699
88	2	1.16	0.377	0.123	0.93	-0.807
90	1	1.31	0.409	0.091	0.94	-0.849
92	1	1.46	0.4279	0.0721	0.95	-0.8779
94	1	1.61	0.4463	0.0537	0.96	-0.9063

Xi	f	Z	Ztabel	Fz	Sz	(Fz - Sz)
95	1	1.68	0.4535	0.0465	0.97	-0.9235
96	2	1.76	0.4608	0.0392	0.99	-0.9508
98	1	1.91	0.4719	0.0281	1	-0.9719

2. Metode Kolmogorov-Smirnov

Metode lilifors hampir sama dengan Kolmogorov-Smirnov yang digunakan untuk menguji normalitas sebuah data. Proses penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikansi yang berbeda. Untuk metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembandingan yaitu Tabel Kolmogorov Smirnov dan Tabel Liliefors untuk metode Lilliefors sebagai tabel pembandingan. Pengujian ini menggunakan fungsi kumulatif. Nilai Residual terstandarisasi berdistribusi normal jika K hitung $<$ K tabel atau $\text{sig} >$ α . Dapat diselesaikan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Susun sebaran data yang akan diuji dengan terlebih dahulu diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar.
- 2) Tentukan frekuensi masing-masing data (f).
- 3) Tentukan nilai komulatif (kp).
- 4) Hitunglah nilai normal standar tiap data (datum) dengan rumus:

$$Z = \frac{X_i - \bar{X}}{s} \quad (6.2)$$

Di mana:

Z = Nilai normal standar

X_i = datum

\bar{X} = Nilai rata-rata hitung

s = simpangan baku (standar deviasi)

- 5) Gunakan z tabel untuk menentukan nilai z tabel.
- 6) Tentukan nilai a_1 dan a_2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 a_2 = selisih Z tabel dan kp pada batas atas, yakni:

$$a_2 = |kp - F_z| \quad (6.3)$$

a_1 = selisih Z tabel dan kp pada batas atas, yakni:

$$a_1 = \left| a_2 - \frac{f_i}{n} \right| \quad (6.4)$$

- 7) Nilai a_1 dan a_2 dinotasikan dengan D hitung (D_h).

- 8) Tentukan nilai D dengan rumus : D_t tingkat kepercayaan 95% dan n diatas 35 adalah

$$D_t = \frac{1,36}{\sqrt{n}}$$

- 9) Bandingkan nilai D hitung terbesar (D_n) dengan nilai D tabel (D_t) jika nilai $D_h < d_t$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal

Kasus 6.2

dengan menggunakan data Kasus 6.1

Tabel 6.3 Perhitungan Pengujian Kolmogorov-Smimov

X_i	f	f(kum)	kp	Z	Ztabel	Fz	a1	a2
34	1	1	0.01	-2.91	0.4982	0.0018	0.0082	-0.0018
35	1	2	0.02	-2.84	0.4977	0.0023	0.0177	-0.0023
40	1	3	0.03	-2.46	0.4931	0.0069	0.0231	-0.0069
41	1	4	0.04	-2.39	0.4916	0.0084	0.0316	-0.0084
45	1	5	0.05	-2.08	0.4812	0.0188	0.0312	-0.0188
50	1	6	0.06	-1.71	0.4564	0.0436	0.0164	-0.0436
52	2	8	0.08	-1.56	0.4406	0.0594	0.0206	-0.0594
56	2	10	0.1	-1.26	0.3962	0.1038	0.0038	-0.1038
57	2	12	0.12	-1.18	0.381	0.119	0.001	-0.119
58	3	15	0.15	-1.10	0.3643	0.1357	0.0143	-0.1357
59	1	16	0.16	-1.03	0.3485	0.1515	0.0085	-0.1515
60	4	20	0.2	-0.95	0.3289	0.1711	0.0289	-0.1711
63	3	23	0.23	-0.73	0.2673	0.2327	0.0027	-0.2327
64	2	25	0.25	-0.65	0.2422	0.2578	0.0078	-0.2578
65	2	27	0.27	-0.58	0.219	0.281	-0.011	-0.281
66	4	31	0.31	-0.50	0.1915	0.3085	0.0015	-0.3085
67	1	32	0.32	-0.43	0.1664	0.3336	0.0136	-0.3336

Xi	f	f (kum)	kp	Z	Ztabel	Fz	a1	a2
68	3	35	0.35	-0.35	0.1368	0.3632	- 0.0132	-0.3632
69	1	36	0.36	-0.28	0.1103	0.3897	- 0.0297	-0.3897
72	4	40	0.4	-0.05	0.0199	0.4801	- 0.0801	-0.4801
73	3	43	0.43	0.03	0.012	0.488	-0.058	-0.488
74	4	47	0.47	0.10	0.0398	0.4602	0.0098	-0.4602
75	4	51	0.51	0.18	0.014	0.486	0.024	-0.486
76	7	58	0.58	0.25	0.0987	0.4013	0.1787	-0.4013
77	2	60	0.6	0.33	0.1293	0.3707	0.2293	-0.3707
78	3	63	0.63	0.40	0.1554	0.3446	0.2854	-0.3446
79	5	68	0.68	0.48	0.1844	0.3156	0.3644	-0.3156
80	7	75	0.75	0.55	0.2088	0.2912	0.4588	-0.2912
81	1	76	0.76	0.63	0.2357	0.2643	0.4957	-0.2643
82	3	79	0.79	0.70	0.258	0.242	0.548	-0.242
83	2	81	0.81	0.78	0.2823	0.2177	0.5923	-0.2177
84	2	83	0.83	0.85	0.3023	0.1977	0.6323	-0.1977
85	1	84	0.84	0.93	0.3238	0.1762	0.6638	-0.1762
86	3	87	0.87	1.01	0.3438	0.1562	0.7138	-0.1562
87	4	91	0.91	1.08	0.3599	0.1401	0.7699	-0.1401
88	2	93	0.93	1.16	0.377	0.123	0.807	-0.123
90	1	94	0.94	1.31	0.409	0.091	0.849	-0.091
92	1	95	0.95	1.46	0.4279	0.0721	0.8779	-0.0721
94	1	96	0.96	1.61	0.4463	0.0537	0.9063	-0.0537
95	1	97	0.97	1.68	0.4535	0.0465	0.9235	-0.0465
96	2	99	0.99	1.76	0.4608	0.0392	0.9508	-0.0392
98	1	100	1	1.91	0.4719	0.0281	0.9719	-0.0281

Penyelesaian

- 1) Susun sebaran data yang akan diuji dengan terlebih dahulu diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar (*sudah jelas*).
- 2) Tentukan frekuensi masing-masing data (f) (*sudah jelas*).
- 3) Tentukan nilai kumulatif proporsi (kp). Sebelum menentukan kumulatif proporsi, terlebih dahulu f kumulatif, contoh data ke 5 (45) = 5 memiliki kumulatif = $1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5$, demikian seterusnya. Setelah itu, tentukan nilai kp nya dengan rumus $kp = f \text{ kum}/n$ misalkan data ke 4 (40) memiliki $kp = 3/100 = 0,03$, demikian seterusnya
- 4) Hitunglah nilai normal standar tiap data ($datum$) (*seperti perhitungan sebelumnya*):
- 5) Gunakan z tabel untuk menentukan nilai z tabel (*seperti perhitungan sebelumnya*)
- 6) Tentukan nilai a_1 dan a_2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 $a_2 = \text{selisih } Z \text{ tabel dan } kp \text{ pada batas atas, yakni:}$

$$a_2 = |kp - F_z| = |0,01 - 0,0018 = -0,0018|$$

$a_1 = \text{selisih } Z \text{ tabel dan } kp \text{ pada batas atas, yakni:}$

$$a_1 = \left| a_2 - \frac{f_i}{n} = -0,0018 - \frac{1}{100} = 0,0082 \right|$$

Dan seterusnya

- 7) Nilai a_1 dan a_2 dinotasikan dengan D hitung (D_h). Nilai terbesarnya adalah 0,9719
- 8) Tentukan nilai D dengan rumus : D_t tingkat kepercayaan 95% dan n diatas 35 adalah

$$D_t = \frac{1,36}{\sqrt{100}} = 0,136$$

- 9) Bandingkan nilai D hitung terbesar (D_h) dengan nilai D tabel (D_t) jika nilai $D_h > D_t$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal

Penerapan R untuk menguji **lilliefors dan Kolmogorov-Smirnov**

Langkah 1: Mengimpor data yang telah di Microsoft excel

```
library(readxl)
```

```
## Warning: package 'readxl' was built under R version 3.6.3
```

```
normalitas <- read_excel("D:/normalitas.xlsx")
View(normalitas)
```

Langkah 2: Mendeskripsikan Variabel atau data

```
x=normalitas$modal
summary(x)
```

##	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
##	34.00	64.75	75.00	72.66	80.25	98.00

Langkah 3: Menginstal Packages nortest dan membaca hasil instalasi

```
library(nortest)
```

Langkah 4: Melakukan Perhitungan dengan menggunakan function

```
lillie.test()
```

```
lillie.test(x)
```

```
##
##  Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
##
## data:  x
## D = 0.12016, p-value = 0.001154
```

Nilai p value diperoleh sebesar 0,001154 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

3. Metode Jarque Bera

Dengan menggunakan koefisien keruncingan (kurtosis) dan koefisien kemiringan (skewness), metode Jarque Bera dilakukan dengan membandingkan statistic Jarque Bera (JB) dengan nilai X^2 tabel. Jika nilai Jarque-Bera ($JB \leq X^2$ tabel) maka nilai residual terstandarisasi dinyatakan berdistribusi normal.

Untuk menghitung Jarque Bera (JB) digunakan rumus, sebagai berikut:

$$JB = n \left[\frac{X^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right] \quad (6.5)$$

Dimana:

JB = statistic Jarque Bera

S = koefisien skewness

K = Koefisien kurtosis

Uji normalitas JB merupakan suatu uji dari hipotesis gabungan (*joint hypothesis*), yakni S dan K masing-masing bernilai 0 dan 3. Dalam hal ini, nilai statistik dari uji JB diharapkan 0 (Gujarati, 2010). Untuk kemiringan dan kurtosis dihitung rumus.

$$\text{Kemiringan} = \frac{n}{(n-1)(n-2)} \left(\frac{\sum(X-\bar{X})^3}{s^3} \right) \quad (6.6)$$

$$\text{Kurtosis} = \left\{ \frac{(n)(n+1)\sum(X-\bar{X})^4}{(n-1)(n-2)(n-3)s^4} \right\} - \frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)} \quad (6.7)$$

Kasus 6.3

Dengan Kasus uji normalitas metode Jarque Bera dapat diselesaikan dengan R, sebagai berikut:

Langkah 1: Mengimpor data yang telah di Microsoft excel

```
library(readxl)
normalitas <- read_excel("D:/normalitas.xlsx")
View(normalitas)
```

Langkah 2: Mendeskripsikan Variabel atau data

```
x=normalitas$modal
summary(x)
```

##	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
##	34.00	64.75	75.00	72.66	80.25	98.00

Langkah 3: Menginstal Packages e1071 dan tseries dan membaca hasil instalasi

```
library(e1071)
## Warning: package 'e1071' was built under R version 3.6.3
```

```
library(tseries)

## Warning: package 'tseries' was built under R version 3.6.3

## Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
##   method      from
## as.zoo.data.frame zoo
```

Langkah 4: Menghitung Kemiringan

```
a=moment(x,order = 2,center = TRUE)
b=moment(x,order = 4,center = TRUE)
a
## [1] 174.2044
b
## [1] 104132.9
c=a^2
c
## [1] 30347.17
```

Langkah 5 Mencari Kurtosis

```
kurtosis=b/c
kurtosis
## [1] 3.431386
```

Langkah 6 Menghitung JB

```
jarque.bera.test(x)
##
## Jarque Bera Test
##
## data: x
## X-squared = 8.4179, df = 2, p-value = 0.01486
```

$$JB = n \left[\frac{X^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24} \right]$$

$$JB = 100 \left[\frac{30347,17}{6} + \frac{(3.431386 - 3)^2}{24} \right]$$


Langkah 6 Pengambilan Keputusan

Keputusan normal atau tidaknya sebuah data dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik dari uji Jarque-Bera terhadap nilai kritis *chi-kuadrat* (χ_{kritis}^2). Statistik dari uji Jarque-Bera berdistribusi sampling *chi-kuadrat* dengan derajat bebas (df) 2 untuk ukuran sampel yang besar. Gujarati (2010), menjelaskan:

"Di bawah hipotesis nol bahwa residu terdistribusi normal, Jarque dan Bera menunjukkan bahwa secara asimtotik (yaitu, dalam sampel besar) statistik JB yang diberikan dalam (5.12.1) mengikuti distribusi chi-kuadrat dengan 2 df."

Dengan demikian, adapun kriteria pengambilan keputusan

- Jika dibandingkan nilai statistik $JB \leq \chi_{kritis}^2$, H_0 diterima
- Jika dibandingkan nilai statistik $JB > \chi_{kritis}^2$, H_1 diterima.



Derajat bebas	Signifikansi	Nilai Kritis Chi Kuadrat
2	0,05	5,9915

Gambar 6.1 Penentuan Nilai Chi Kuadrat

Dengan demikian dapat diketahui nilai kritis *chi-kuadrat* sebesar 5,9915, jika dibandingkan nilai statistik dari Jarque Bera sebesar

Berdasarkan Gambar 6.1, diketahui nilai kritis *chi-kuadrat* bernilai 5,991. Karena nilai statistik dari uji Jarque-Bera, sebesar 8.4179, lebih besar dibandingkan nilai kritis *chi-kuadrat*, sebesar 5,991, maka hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak, sehingga asumsi mengenai data

nilai ujian matematika kelas 6 SD ditarik dari populasi yang berdistribusi normal dapat diterima pada tingkat signifikansi 5%.

Perhatikan juga bahwa nilai probabilitas atau p-value adalah 0,8572 (lihat Gambar 6.7). Karena nilai probabilitas, yakni 0,8572, lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05, maka hipotesis alternatif diterima, dan hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti asumsi mengenai data modal kerja ditarik dari populasi tidak berdistribusi normal pada tingkat signifikansi 5%.

4. Metode Shapiro Wilk

Metode Shapiro Wilk yang diperkenalkan Shapiro dan Wilk yang digunakan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metode Shapiro Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel/data berjumlah kecil. Metode Shapiro Wilk menggunakan data dasar yang belum dibuat dalam bentuk tabel frekuensi. Proses dimulai dengan mengurutkan data, kemudian dikelompokkan dua bagian yang akan dikonversi dalam Shapiro Wilk. Selain itu, bisa melalui transformasi dalam Z supaya nilai Z dapat ditentukan luasan kurva normal. Demikian langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk perhitungan Uji Shapiro

Rumus digunakan untuk menentukan Uji Shapiro Wilk, sebagai berikut:

$$T_3 = \frac{1}{D} \left[\sum_{i=1}^k a_i (X_{n-i+1} - X_i) \right]^i \quad (6.8)$$

Di mana:

a_i = Coefficient test Shapiro Wilk

X_{n-i+1} = Angka ke $n - i + 1$ pada data

X_i = Angka ke i pada data

$$D = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad (6.9)$$

dimana:

X_i = Angka ke i pada data yang

\bar{X} = Rata-rata data

$$G = b_n + c_n + \ln\left(\frac{T_3 - d_n}{1 - T_3}\right) \quad (6.10)$$

dimana:

G = Identik dengan nilai Z distribusi normal

T_3 = Berdasarkan rumus di atas b_n , c_n ,

dn = Konversi Statistik Shapiro-Wilk

Di dalam Uji Shapiro Wilk memiliki beberapa syarat dari uji shapiro w adalah diantaranya: data yang digunakan bersifat interval atau Data yang bersifat interval atau rasio; Data tunggal atau belum dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi dan Data dari sampel random

Dari hasil perhitungan uji shapiro wilk dibandingkan dengan tingkat Signifikansinya. Dalam output R studio, nilai shapiro hitung ditunjukkan dengan nilai p value, sedangkan signifikansinya ditunjukkan dengan nilai Sig. Signifikansi dibandingkan dengan tabel Shapiro Wilk. Signifikansi uji nilai T_3 dibandingkan dengan nilai tabel Shapiro W, untuk dilihat posisi nilai probabilitasnya (p).

Cara menguji normalitas dengan Shapiro Wilk menggunakan R Studio dilakukan dengan cara dengan menggunakan fungsi `shapiro.test()`:

```
shapiro.test(x)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: x
## W = 0.96321, p-value = 0.006857
```

Output uji shapiro test menunjukkan nilai p value sebesar 0.006857 dibawah nilai signifikansi 0,05 hal ini dapat dijelaskan bahwa data tidak berdistribusi normal.


5. Metode Quantile-Quantile Plot (Q-Q Plot)

Melalui pendekatan grafik, asumsi normalitas dapat dilakukan yaitu yakni Q-Q (*quantile-quantile*) plot. Plot ini dapat dibentuk dari distribusi marginal sampel pada setiap variabel. Sebuah plot dari kuantil-kuantil sampel yang terekam dalam hasil penelitian akan membentuk distribusi normal. Jika kumpulan titik-titik mendekati garis lurus, maka asumsi normalitas dapat dipenuhi.

Dengan menggunakan program R *Quantile-Quantile Plot* (Q-Q Plot), dapat dilakukan dengan menggunakan function `qqnorm()` dan `qqline()`

```
qqnorm(x)
```

```
qqline(x)
```



Gambar 6.2 Pengujian Normalitas Q – Q Plot

Berdasarkan Gambar 6.2, titik-titik tidak menyebar pada dari garis diagonal, maka asumsi normalitas tidak dipenuhi.

B. Uji Homogenitas

Sebuah artikel ilmiah, pengujian homogenitas merupakan prasyarat yang harus di penuhi. Hal ini bertujuan untuk menguji apakah sebaran data dari dua varian atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua atau lebih variannya. Homogen atau tidaknya sampel akan mempengaruhi ketepatan hasil dalam analisis varian karena asumsi yang mendasari dari analisis varian adalah varian yang berasal dari populasi adalah sama. Uji homogenitas dilakukan untuk menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antarkelompok, bukan sebagai akibat

perbedaan dari kelompok. Pengujian homogenitas, umumnya dilakukan tiga cara, yaitu Bartlett test, Levene test dan Fligner test.

1. Bartlett test

Uji Bartlett test awal pertama kali diperkenalkan oleh M. S. Bartlett (1937). Uji Bartlett test digunakan untuk menguji apakah k sampel bersumber populasi dengan varians yang sama. k sampel bisa berapa saja. karena biasanya uji Bartlett digunakan untuk menguji sampel/kelompok yang lebih dari 2. Varians yang sama di seluruh sampel disebut homogenitas varians (*homoscedasticity*). Di dalam pengujian Uji Bartlett dibutuhkan dalam beberapa macam uji statistik seperti *analysis of variance* (ANOVA) sebagai persyarat jika peneliti berkenan menggunakan Anova. Uji Bartlett tes ini biasa disebut sebagai *Maurice Stevenson Bartlett*. Dalam proses pengujian Uji Bartlett dapat dipakai jika data yang digunakan sudah di uji normalitas dan datanya merupakan data normal. Namun jika datanya ternyata tidak normal bisa dilanjutkan dengan menggunakan uji Levene.

Secara manual, proses pengujian Bartlett test, dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

- 1) Bagilah set data pada variabel ke dalam beberapa kelompok;
- 2) Menghitung varian masing-masing kelompok yang di bentuk

$$\text{dengan rumus } S_i^2 = \frac{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}{n(n-1)}$$

- 3) Menyusun Kelompok-kelompok tadi kedalam tabel, berikut

Sampel	db (n-1)	Varians (S ²)	db S ²	Log S ²	db Log S ²
Jumlah					

- 4) Menghitung varian gabungan dengan menggunakan rumus $S_g^2 = \frac{\sum (ab)S_i^2}{\sum ab}$
- 5) Menghitung nilai satuan Bartlett (B)
- 6) Menghitung Nilai Chi Kuadrat $x_h^2 = (\ln 10)\{B - (db \text{Log} S_i^2)\}$

- 7) Menentukan nilai Chi Kuadrat tabel $\chi^2_t = (0,05; k - 1)$
- 8) Kesimpulan

Kasus 6.4

Dari kasus 6.1 Ujilah Asumsi homogenitas data tersebut

Penyelesaian

Tahap 1: Bagilah set data pada variabel ke dalam beberapa kelompok, misalnya 4 kelompok

Tabel 6.4 Kasus Uji Homogenitas Bartlett tes

Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
75	60	76	87
86	84	66	52
66	80	74	98
86	79	76	88
50	63	68	64
78	80	82	76
66	88	59	69
79	58	75	60
68	84	35	74
60	96	34	72
80	87	65	76
83	72	63	57
87	65	85	64
79	79	87	67
80	80	79	58
77	86	77	72
81	68	76	80
92	76	74	72
57	41	76	56
52	80	78	73

Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
58	40	75	82
82	63	60	78
73	90	96	45
95	83	74	75
66	94	73	56

Tahap 2: Menghitung varian masing-masing kelompok yang di bentuk

$$S_i^2 = \frac{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}{n(n - 1)}$$

Tabel 6.5 Perhitungan Varians Kelompok

Kelompok 1		Kelompok 2		Kelompok 3		Kelompok 4	
X ₁	X ₁ ²	X ₂	X ₂ ²	X ₃	X ₃ ²	X ₄	X ₄ ²
75	5625	60	3600	76	5776	87	7569
86	7396	84	7056	66	4356	52	2704
66	4356	80	6400	74	5476	98	9604
86	7396	79	6241	76	5776	88	7744
50	2500	63	3969	68	4624	64	4096
78	6084	80	6400	82	6724	76	5776
66	4356	88	7744	59	3481	69	4761
79	6241	58	3364	75	5625	60	3600
68	4624	84	7056	35	1225	74	5476
60	3600	96	9216	34	1156	72	5184
80	6400	87	7569	65	4225	76	5776
83	6889	72	5184	63	3969	57	3249
87	7569	65	4225	85	7225	64	4096
79	6241	79	6241	87	7569	67	4489
80	6400	80	6400	79	6241	58	3364
77	5929	86	7396	77	5929	72	5184
81	6561	68	4624	76	5776	80	6400

Kelompok 1		Kelompok 2		Kelompok 3		Kelompok 4	
X ₁	X ₁ ²	X ₂	X ₂ ²	X ₃	X ₃ ²	X ₄	X ₄ ²
92	8464	76	5776	74	5476	72	5184
57	3249	41	1681	76	5776	56	3136
52	2704	80	6400	78	6084	73	5329
58	3364	40	1600	75	5625	82	6724
82	6724	63	3969	60	3600	78	6084
73	5329	90	8100	96	9216	45	2025
95	9025	83	6889	74	5476	75	5625
66	4356	94	8836	73	5329	56	3136
1856	141382	1876	145936	1783	131735	1751	126315

Berdasarkan tabel 6.5 varians masing-masing kelompok dapat dihitung sebagai berikut:

Kelompok 1

$$S_1^2 = \frac{25 (141382) - (1856)^2}{25(25 - 1)} = 149,69$$

Kelompok 2

$$S_2^2 = \frac{25 (145936) - (1876)^2}{25(24 - 1)} = 215,04$$

Kelompok 3

$$S_3^2 = \frac{25 (131735) - (1783)^2}{25(25 - 1)} = 190,48$$

Kelompok 4

$$S_4^2 = \frac{25 (126315) - (1751)^2}{25(25 - 1)} = 153,12$$

Tahap 3: Menyusun Kelompok-kelompok tadi kedalam tabel, berikut

Sampel	db (n-1)	Varians (S ²)	db S ²	Log S ²	db Log S ²
1	24	149.69	3592.56	2.18	52.20

Sampel	db (n-1)	Varians (S ²)	db S ²	Log S ²	db Log S ²
2	24	215.04	5160.96	2.33	55.98
3	24	190.48	4571.44	2.28	54.72
4	24	153.12	3674.96	2.19	52.44
Jumlah	96	708.33	16999.9	8.97	215.34

Tahap 4: Menghitung varian gabungan dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$S_g^2 = \frac{\sum (db) S_i^2}{\sum db} = \frac{16999.9}{96} = 177.083$$

$$\text{Log } S_g^2 = 177.083 = 2,25$$

Tahap 5: Menghitung nilai satuan Bartlett (B)

$$B = \left(\sum db \right) (\text{Log } S_g^2) = 96 \times 2,25 = 215,82$$

Tahap 6: Menghitung Nilai Chi Kuadrat

$$x_h^2 = (\ln 10) \{ B - (db \text{Log } S_i^2) \} = 2,3 \times (215,82 - 215,34) = 1,11$$

Tahap 7: Menentukan nilai Chi Kuadrat tabel

$$x_t^2 = (0,05; k - 1) = (0,05; 5 - 1) = 9,488$$

Tahap 8: Kesimpulan

Dari hasil perhitungan diperoleh $x_h^2 = 1,11$ sedangkan $x_t^2 = 9,49$ karena $x_h^2 < x_t^2$, dapat disimpulkan bahwa sampel yang dikumpulkan berasal dari populasi yang homogen.

Pengujian Uji Bartlett dengan R

Langkah 1: Membuat tabulasi data di Microsoft excel

Langkah 2: Mengimpor data

```
library(readxl)
homogenitas <- read_excel("D:/homogenitas.xlsx")
View(homogenitas)
```

Langkah 3: Mendeskripsikan data/Variabel

```
varians=homogenitas
varians
## # A tibble: 100 x 2
##   Modal Kelompok
##   <dbl>      <dbl>
## 1     75         1
## 2     86         1
## 3     66         1
## 4     86         1
## 5     50         1
## 6     78         1
## 7     66         1
## 8     79         1
## 9     68         1
## 10    60         1
## # ... with 90 more rows
```

Langkah: Menginstal Packages var; Rcmdr; lawstat

```
library(car)
library(Rcmdr)
library(lawstat)
```

Langkah: Melakukan Pengujian Barlett.test

Uji Barlett.test menggunakan function `bartlett.test`(varians\$Modal, varians\$Kelompok)

```
bartlett.test(varians$Modal, varians$Kelompok)
##
## Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data:  varians$Modal and varians$Kelompok
## Bartlett's K-squared = 1.3364, df = 3, p-value
## = 0.7205
```

Berdasarkan output R, P value diperoleh sebesar 0,7205 menunjukkan lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, artinya dapat disimpulkan bahwa sampel yang dipilih berasal dari populasi yang homogen

2. Metode Uji Levene Test

Uji Levene Test pertama kali diperkenalkan Levene (1960). Uji Levene alternatif dari uji Bartlett test, digunakan untuk menguji kesamaan varians dari beberapa populasi. Jika ada bukti yang kuat bahwa data berdistribusi normal atau mendekati normal, maka uji Bartlett lebih baik digunakan. Uji Levene menggunakan analisis varian satu arah. Data ditransformasikan dengan jalan mencari selisih masing-masing skor dengan rata-rata kelompoknya.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$W = \frac{(n-k) \sum_{i=1}^k n_i (\bar{Z}_i - \bar{Z})^2}{(n-k) \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Z_{ij} - \bar{Z}_i)^2} \quad (6.11)$$

$$Z_{ij} = |Y_{ij} - \bar{Y}_i| \quad (6.12)$$

Di mana

n = jumlah data

k = jumlah kelompok

\bar{Y}_i = Rata-rata dari kelompok ke i

\bar{Z}_i = Rata-rata dari kelompok ke Z

\bar{Z} = Rata-rata kelompok keseluruhan

Kasus 6.5

Gunakan data kasus 6.1, lakukan pengujian apakah sampel berasal dari populasi yang homogen atau tidak

Tabel 6.6 Perhitungan Uji Levene

N	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
1	75	60	76	87
2	86	84	66	52
3	66	80	74	98
4	86	79	76	88

N	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
5	50	63	68	64
6	78	80	82	76
7	66	88	59	69
8	79	58	75	60
9	68	84	35	74
10	60	96	34	72
11	80	87	65	76
12	83	72	63	57
13	87	65	85	64
14	79	79	87	67
15	80	80	79	58
16	77	86	77	72
17	81	68	76	80
18	92	76	74	72
19	57	41	76	56
20	52	80	78	73
21	58	40	75	82
22	82	63	60	78
23	73	90	96	45
24	95	83	74	75
25	66	94	73	56
Rata-rata	74.24	75.04	71.32	70.04

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ Sampel semua kelompok berasal dari populasi yang homogen

$H_0 : \mu_1 \neq \mu_2$ Sampel semua kelompok berasal dari populasi yang tidak homogen

Hitung Nilai z dengan rumus $Z_{ij} = \frac{|Y_{ij} - \bar{Y}_i|}{\sigma}$ misalkan untuk data nomor 1 kelompok 1. Nilai z adalah $(75 - 74,24)$ dan seterusnya

Tabel 6.7 Perhitungan Z Homogenitas Levene

N	Z1	Z2	Z3	X4	Rata-rata
1	0.76	15.04	4.68	16.96	10.30
2	11.76	8.96	5.32	18.04	
3	8.24	4.96	2.68	27.96	
4	11.76	3.96	4.68	17.96	
5	24.24	12.04	3.32	6.04	
6	3.76	4.96	10.68	5.96	
7	8.24	12.96	12.32	1.04	
8	4.76	17.04	3.68	10.04	
9	6.24	8.96	36.32	3.96	
10	14.24	20.96	37.32	1.96	
11	5.76	11.96	6.32	5.96	
12	8.76	3.04	8.32	13.04	
13	12.76	10.04	13.68	6.04	
14	4.76	3.96	15.68	3.04	
15	5.76	4.96	7.68	12.04	
16	2.76	10.96	5.68	1.96	
17	6.76	7.04	4.68	9.96	
18	17.76	0.96	2.68	1.96	
19	17.24	34.04	4.68	14.04	
20	22.24	4.96	6.68	2.96	
21	16.24	35.04	3.68	11.96	
22	7.76	12.04	11.32	7.96	
23	1.24	14.96	24.68	25.04	
24	20.76	7.96	2.68	4.96	
25	8.24	18.96	1.68	14.04	
Rata-rata	10.11	11.63	9.64	9.80	

Hitung Nilai

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^k n_i (\bar{Z}_i - \bar{Z})^2 &= 25(10,11-10,30)^2 + 25(11,63-10,30)^2 + \\ &25(9,64 -10,30)^2 + 25(9,80-10,30)^2 \\ &= \mathbf{62,127}\end{aligned}$$

Hitung Nilai

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^4 (Z_{ij} - \bar{Z}_j)^2$$

N	Z1	Z2	Z3	X4	Jumlah
1	87.46	11.64	24.65	51.33	6338.68
2	2.72	7.12	18.70	67.98	
3	3.50	44.47	48.51	329.96	
4	2.72	58.81	24.65	66.66	
5	199.60	0.17	40.00	14.10	
6	40.35	44.47	1.07	14.71	
7	3.50	1.77	7.16	76.65	
8	28.64	29.28	35.58	0.06	
9	14.99	7.12	711.57	34.05	
10	17.04	87.07	765.92	61.39	
11	18.94	0.11	11.05	14.71	
12	1.83	73.77	1.76	10.53	
13	7.01	2.52	16.28	14.10	
14	28.64	58.81	36.42	45.63	
15	18.94	44.47	3.86	5.04	
16	54.05	0.45	15.72	61.39	
17	11.24	21.06	24.65	0.03	
18	58.49	113.82	48.51	61.39	
19	50.81	502.26	24.65	18.02	
20	147.09	44.47	8.79	46.72	
21	37.55	548.08	35.58	4.69	
22	5.53	0.17	2.81	3.37	

N	Z1	Z2	Z3	X4	Jumlah
23	78.71	11.10	226.06	232.40	
24	113.38	13.46	48.51	23.38	
25	3.50	53.75	63.44	18.02	

$$W = \frac{(100 - 4) \times 62,127}{(4 - 1) \times 6338,68} = 0,314$$

Menentukan F tabel

$$F_{\text{tabel}} (\alpha; k-1; n-k) = F_t = (0,05; 4-1; 100 - 4) = 2,48$$

Kesimpulan: karena nilai $W < F_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa sampel semua kelompok berasal dari populasi yang homogen

Pengujian Levene dengan R

Pengujian Levene dengan R sama dengan Uji Barlett.test, namun untuk Uji Levene menggunakan function `leveneTest()` atau `levene.test()`

```
leveneTest(varians$Modal, varians$Kelompok)
## Warning in leveneTest.default(varians$Modal, varians
## $Kelompok): varians$Kelompok
## coerced to factor.
## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center =
## median)
##           Df F value Pr(>F)
## group    3  0.1537 0.9271
##           96
levene.test(varians$Modal, varians$Kelompok)
##
## Modified robust Brown-Forsythe Levene-type test bas
## ed on the absolute
## deviations from the median
##
## data:  varians$Modal
## Test Statistic = 0.15369, p-value = 0.9271
```

Berdasarkan output R, P value diperoleh sebesar 0,9271 menunjukkan lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, artinya dapat disimpulkan bahwa sampel yang dipilih berasal dari populasi yang homogen

3. Metode Uji Fligner Test

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, pengujian Bartlett dapat memberikan hasil positif palsu jika datanya tidak normal. Juga, ketika ukuran sampel besar, perbedaan kecil dalam varians kelompok dapat menghasilkan uji Levene yang signifikan secara statistik (mirip dengan uji Shapiro-Wilk untuk normalitas). Uji Fligner-Killeen adalah uji non-parametrik yang kuat untuk menyimpang dari normalitas dan memberikan alternatif yang baik atau pemeriksaan ganda untuk uji parametrik sebelumnya.

Uji fligner test menggunakan fungsi `fligner.test` (`varians$Modal`, `varians$Kelompok`)

```
fligner.test (varians$Modal, varians$Kelompok)
```

```
##  
## Fligner-Killeen test of homogeneity of variances  
##  
## data:  varians$Modal and varians$Kelompok  
## Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.50803, df = 3, p-value  
= 0.9171
```

Berdasarkan output R, P value diperoleh sebesar 0,9171 menunjukkan lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, artinya dapat disimpulkan bahwa sampel yang dipilih berasal dari populasi yang homogen

4. Metode Uji Harley Test

Uji Harley merupakan uji homogenitas varians yang sangat mudah atau sederhana hanya membandingkan varians terbesar dengan varians terkecil. Syarat penggunaan Uji Harley jika jumlah sampel antar kelompok sama. Misalkan antara dua populasi normal dengan varians σ_1^2 dan σ_2^2

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

Statistik yang dipakai untuk menguji H_0 adalah

$$F = \frac{\text{varians terbesar}}{\text{varians terkecil}}$$

Di mana H_0 jika $F_{hitung} < F_{1/2\alpha}(V_1, V_2)$

5. Metode Uji Chocran Test

Uji Cochran mempertimbangkan seluruh varians yang akan diuji homogenitasnya, sehingga Uji Cochran test lebih sensitif dibandingkan dengan uji Harley test. Jika salah satu variansi kelompok jauh lebih besar dibandingkan dengan variansi kelompok yang lain, maka uji Cochran tampak lebih baik daripada uji Harley. Kesamaan uji Cochran test dan Uji Harley test adalah menuntut adanya kesamaan n dari setiap kelompok yang akan dicari homogenitasnya.

Bab VII

ANALISIS KORELASI

A. Konsep Analisis Korelasi

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia tentunya memiliki relasi/hubungan dengan manusia lainnya, di mana relasi tersebut bisa bersifat positif, negatif atau malah tidak ada hubungan sama sekali. Begitupun setiap kegiatan ekonomi tertentu memiliki hubungan dengan kegiatan lainnya, misalnya naiknya harga suatu barang berhubungan dengan jumlah permintaan barang. Hal inilah biasa disebut hubungan sebab akibat.

Untuk menentukan hubungan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya, tentunya diperlukan sebuah alat analisis lebih mendalam, dalam hal ini adalah analisis korelasi. Analisis korelasi biasa disebut analisis hubungan yaitu analisis yang digunakan mengetahui hubungan linear antara suatu variabel dengan variabel lain. Hubungan suatu variabel dengan variabel lain bisa berhubungan positif, jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan yang lain sedangkan hubungan negatif, jika variabel lain tidak diikuti oleh perubahan variabel yang lain maka dikatakan bahwa variabel tersebut tidak saling berkorelasi. Selanjutnya dalam menganalisis hubungan sebuah variabel terdapat beberapa bentuk hubungan, yaitu (Siregar, 2015):

1. Hubungan Simetris

Hubungan simetris merupakan hubungan yang menyatakan sifat kebersamaan antara dua variabel atau lebih, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat atau saling mempengaruhi. dalam bentuk hubungan ini terikat, karena kedua variabel tidak saling mempengaruhi.

Contoh:

- a. Hubungan antara berpakaian mahal dengan penampilan
- b. Hubungan yang positif antara banyak penonton sepak bola dengan tingkat kerusakan
- c. Hubungan antara burung gagak dan kematian seseorang

2. Hubungan Kausal

Hubungan Kausal merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat mempengaruhi antara variabel yang satu (variabel bebas) terhadap variabel lainnya (variabel tak bebas). Dalam bentuk ini hubungan diketahui dengan pasti atau dapat dibedakan variabel bebas (variabel yang mempengaruhi) dengan variabel terikat (variabel yang dipengaruhi).

Contoh:

- a. Hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan kerja seseorang

Variabel bebas (X) = tingkat pendidikan (mempengaruhi)

variabel tak bebas (Y) = Kemampuan kerja (dipengaruhi)

- b. Hubungan biaya promosi dengan tingkat penjualan

Variabel bebas (X) = biaya promosi (mempengaruhi)

variabel tak bebas (Y) = tingkat penjualan (dipengaruhi)

- c. Hubungan tingkat pengangguran dengan tingkat kejahatan

Variabel bebas (X) = tingkat pengangguran (mempengaruhi)

Variabel tak bebas (Y) = tingkat kejahatan (dipengaruhi)

3. Hubungan interaktif

Hubungan interaktif (timbal balik) merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih bersifat saling mempengaruhi di mana kedudukan variabel X dan Y dapat saling bergantian. Di mana suatu saat variabel X mempengaruhi variabel Y atau sebaliknya variabel Y mempengaruhi variabel X. dalam bentuk ini, identitas kedua variabel diketahui atau dapat dibedakan

Contoh:

- a. Hubungan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja tenaga kerja

Variabel bebas (X) = motivasi kerja (mempengaruhi)

Variabel tak bebas (Y) = prestasi kerja (dipengaruhi)

kedudukan kedua variabel dapat bergantian

Variabel bebas (X) = motivasi kerja (dipengaruhi)

Variabel tak bebas (Y) = prestasi kerja (mempengaruhi)

- b. Hubungan antara harga barang dengan tingkat penjualan

Variabel bebas (X) = harga barang (memengaruhi)

Variabel tak bebas (Y) = tingkat penjualan (dipengaruhi)

kedudukan kedua variabel dapat bergantian

Variabel bebas (X) = harga barang (dipengaruhi)

Variabel tak bebas (Y) = prestasi kerja (mempengaruhi)

B. Sifat-sifat Koefisien Korelasi

Sebelum pembahasan lebih lanjut terkait koefisien korelasi, sebelumnya perlu memahami sifat-sifat koefisien korelasi:

1. Bersifat simetris

Korelasi antara sebuah variabel antara X dan Y sama dengan dengan koefisien korelasi antara Y dan X, dengan demikian berlaku persamaan $r_{xy} = r_{yx}$

2. Nilai koefisien korelasi berkisar antara $-1 < r < 1$ (-1 sampai dengan 1)

Apabila nilai koefisien korelasi -1 menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif atau berlawanan arah. Artinya apabila nilai variabel X mengalami naik maka variabel Y akan turun. sebaliknya Apabila nilai koefisien korelasi $+1$ menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif atau searah. Artinya apabila nilai variabel X mengalami naik maka variabel Y juga akan naik.

3. Nilai koefisien korelasi tidak menggambarkan sebab akibat (kausalitas), namun hanya menunjukkan hubungan keeratan hubungan antar variabel

Misalkan nilai $r_{xy} = 0.976$, hal ini tidak berarti bahwa X berpengaruh terhadap Y sebesar 0.976. Namun, hanya menunjukkan tingkat hubungan antara X dan Y saja.

4. Koefisien korelasi tidak berpengaruh oleh nilai orijin dan nilai skala
Misalkan Ada dua persamaan yang kita miliki:

$$Y_1 = a + bX$$

$$Y_2 = c + dZ$$

bila nilai $a > 0$ dan $c > 0$, korelasi antara Y_1 dan Y_2 akan sama antara X dan Z . hal ini terjadi karena koefisien korelasi tidak berpengaruh oleh nilai orijin (a dan c) dan tidak berpengaruh oleh nilai skala (b dan d)

5. Hubungan keeratan sebuah variabel hanya bersifat linear dan tidak mampu menggambarkan hubungan yang bersifat non linear.

Di dalam analisis koefisien korelasi memiliki beberapa jenis dan penggunaan harus disesuaikan dengan karakteristik data. Seperti korelasi pearson dan spearman. Korelasi Pearson merupakan korelasi yang digunakan pada data interval atau rasio, atau dikenal juga dengan korelasi product moment. Sedangkan korelasi Spearman atau Kendall Tau dilakukan jika data kita adalah data ordinal atau yang berbentuk rangking. jika data berupa kategori dapat menggunakan analisis Chi Square yang selanjutnya ditransformasi ke koefisien kontingensi. Dengan demikian di dalam statistik parametrik korelasi yang digunakan adalah korelasi Pearson atau biasa juga disebut korelasi linear


C. Jenis Hubungan Korelasi

Jenis hubungan korelasi ada dua macam, yakni negatif dan positif

1. Korelasi Positif

Korelasi positif merupakan hubungan antara dua variabel dimana satu variabel menyebabkan peningkatan atau penambahan nilai variabel lainnya atau sebaliknya jika besar nilai suatu variabel, maka nilai variabel lainnya menyebabkan juga akan mengalami kenaikan atau bisa disebut dengan korelasi yang memiliki hubungan searah.

Misalkan: penambahan usia searah atau berbanding lurus dengan penambahan tinggi badan; penambahan waktu produksi akan berbanding lurus dengan penambahan volume produksi; kenaikan harga berbanding lurus dengan jumlah penawaran, bertambahnya modal menaikkan jumlah produksi dan sebagainya.




Gambar 7.1 Contoh Korelasi Positif

2. Korelasi Negatif

Korelasi negatif merupakan hubungan antara dua variabel dimana kenaikan satu variabel menyebabkan penurunan dari variabel lainnya. Begitu sebaliknya, semakin kecil nilai suatu variabel, menyebabkan suatu variabel lain mengalami kenaikan atau bertambah, atau biasa disebut korelasi berbanding terbalik

Misalkan: Harga berbanding terbalik dengan jumlah permintaan, inflasi meningkat menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun, naiknya suku bunga menyebabkan menurunnya minat investasi dan sebagainya.



Gambar 7.2 Contoh Korelasi Negatif

D. Korelasi *Pearson Product Moment*

Korelasi *Pearson Product Moment* digunakan untuk mengetahui keeratn hubungan antar sebuah variabel, yang menggunakan data berbentuk rasio dan interval. Korelasi *Pearson Product Moment* merupakan analisis korelasi yang pada umumnya digunakan. dengan asumsi bahwa, di dalam analisis Korelasi *Pearson Product Moment*, perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan dengan variabel lain sehingga kedua variabel memiliki korelasi, apakah itu berkorelasi positif atau korelasi negatif.

Untuk menentukan nilai kofisien Korelasi *Pearson Product Moment*, digunakan rumus, sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot (\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{n \cdot (\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}} \quad (7.1)$$

dimana:

r_{xy} = Koefisien korelasi *product moment*

n = jumlah data

X = Variabel bebas

Y = Variabel tak bebas (terikat)

Untuk memudahkan interpretasi nilai koefisien korelasi pearson product moment, digunakan tabel 1.1 kriteria, sebagai berikut:

Tabel 7.1 Kriteria Koefisien Korelasi Product Moment

Kriteria	Nilai r
Tidak berkorelasi	0
Korelasi lemah	< 0.5
Korelasi cukup kuat	0.5 < 0.75
Korelasi kuat	0.75 s.d 0.9
Korelasi sangat kuat	0.90 < 1
Korelasi sempurna+	1
Korelasi sempurna-	-1

Sumber: Supranto (2016)

Tabel 7.1 kriteria ini hanya digunakan sebatas untuk memberikan batasan kategori koefisien korelasi, namun tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah korelasi tersebut signifikan atau tidak. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya sebuah hubungan tidak hanya dari besarnya koefisien korelasi tetapi tergantung juga pada jumlah data (sampel) dan tingkat signifikansi. Dengan demikian untuk menguji korelasi digunakan t hitung.

Kasus 7.1

Seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk tentang apakah ada korelasi antara pendapatan mingguan dan besarnya tabungan mingguan di Kota Makassar Untuk menjawab permasalahan tersebut diambil sampel sebanyak 12 kepala keluarga.

Pendapatan	10	20	50	55	60	65	75	70	81	85	90	80
Tabungan	2	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	9

- a. Judul
Hubungan Antara Pendapatan dengan tabungan
- b. Rumusan Penelitian
Apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan masyarakat?
- c. Hipotesis
terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan masyarakat

Penyelesaian

- a. Kriteria Pengujian Hipotesis

Ho : Tidak terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan masyarakat.

Ha : terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan masyarakat.

Ho diterima, Jika $b \leq 0$, r hitung \leq tabel

Ha diterima Jika $b > 0$, r hitung $>$ t tabel.

- b. Tabel Pembantu

Pendapatan (X)	Tabungan (Y)	XY	Y ²	X ²
10	2	20	100	4
20	4	80	400	16
50	5	250	2500	25
55	6	330	3025	36
60	7	420	3600	49
65	8	520	4225	64
75	9	675	5625	81
70	8	560	4900	64
81	10	810	6561	100
85	11	935	7225	121
90	9	810	8100	81

Pendapatan (X)	Tabungan (Y)	XY	Y ²	X ²
80	9	720	6400	81
741	88	6130	52661	722

c. Perhitungan Kofisien Korelasi

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot (\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{n \cdot (\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

$$n = 12$$

$$\sum X = 741$$

$$\sum Y = 88$$

$$\sum X^2 = 52.661$$

$$\sum Y^2 = 722$$

$$\sum XY = 6.144$$

$$= \frac{12 \cdot (6.144) - (741)(88)}{\sqrt{\{12(52.661) - (741)^2\} \{12(722) - (88)^2\}}}$$

$$= 0.957$$

d. Menentukan tingkat signifikansi (5%)

e. Uji Signifikansi

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \quad (7.2)$$

$$t = \frac{0,957 \sqrt{12-2}}{\sqrt{1-0,957^2}} = 10.43$$

f. Keputusan dan Kesimpulan

t tabel dengan df ($\alpha, n-2$) atau (0,05,10) diperoleh r tabel sebesar 1,81. Karena nilai t hitung > nilai t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan.

Dengan menggunakan Rstudio

Langkah 1: Tabulasi Data di Microsoft excel

Langkah 2: Mengimpor data di software RStudio

```
library(readxl)

data_pearson <- read_excel("D:/data_pearson.xlsx")
View(data_pearson)
data_pearson

## # A tibble: 12 x 3
##       No Pendapatan Tabungan
##   <dbl>      <dbl>      <dbl>
## 1     1         10         2
## 2     2         20         4
## 3     3         50         5
## 4     4         55         6
## 5     5         60         7
## 6     6         65         8
## 7     7         75         9
## 8     8         70         8
## 9     9         81         9
## 10    10         85        10
## 11    11         90        11
## 12    12         80         9
```

Langkah 3: Mendeskripsikan Variabel

```
y=data_pearson$Tabungan
```

```
x=data_pearson$Pendapatan
```

y


```
## [1] 2 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 9
x
## [1] 10 20 50 55 60 65 75 70 81 85 90 80
```

Langkah 4: Menghitung Korelasi

```
cor(y, x)
## [1] 0.9758809
cor(y, x, method = "pearson")
## [1] 0.9758809
```

Langkah 5: Membuat Plot

```
plot(x, y, xlab = "Pendapatan", ylab = "Tabungan")
abline(lm(y~x))
```



Gambar 7.3 Plot Pendapatan dan Tabungan

Langkah 6: Uji Hipotesis (Default R adalah korelasi Pearson)

```
cor.test(y,x)
## Pearson's product-moment correlation
## data: y and x
## t = 14.136, df = 10, p-value = 6.173e-08
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.9137130 0.9934124
## sample estimates:
##      cor
## 0.9758809

cor.test(y,x,method = "pearson")
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: y and x
## t = 14.136, df = 10, p-value = 6.173e-08
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.9137130 0.9934124
## sample estimates:
##      cor
## 0.9758809
```

- Terdapat hubungan positif antara x (pendapatan) dengan y (tabungan) sebesar 0,9758809. Nilai korelasi ini tergolong sangat kuat. Hubungan positif artinya terjadi hubungan searah antara variabel x dan y, bila pendapatan meningkat maka jumlah tabungan juga akan meningkat.
- Nilai t tabel sebesar 2,228 lebih besar dari t hitung dan nilai p value 6.173e-08 lebih kecil taraf signifikansi 0,05, artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendapatan dengan tabungan

Bab VIII

Analisa Uji Beda Populasi

A. Pengantar

Analisis perbandingan komparatif adalah teknik yang digunakan untuk melihat kecenderungan rata-rata antara dua atau lebih kelompok sampel. analisis komparatif (*causal comparative*) sering digunakan untuk menguji hipotesis penelitian eksperimental. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa perbedaan antara analisa kausal komparatif dengan analisis eksperimental, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.1 Perbedaan Kasual Komparatif dan Eksperimental

Kategori	Kausal Komparatif	Eksperimental
Sample	Individu tidak dipilih secara acak tetapi dipilih karena mereka tergolong kelompok	Individu dipilih secara acak untuk dua (atau lebih) kelompok
Perlakuan	Peneliti tidak dapat memberi perlakuan pada individu pada variabel bebas	Peneliti memberi perlakuan pada variabel bebas
	Variabel Independen sudah terjadi dan tidak dapat diberi perlakuan	Peneliti memberi perlakuan pada variabel bebas untuk menentukan efeknya
Pemilihan Sampel	Sampel acak dipilih dari populasi yang sudah ada	Sampel acak dipilih dari populasi tunggal

Sumber: Riadi (2016)

Sebelum dilakukan uji beda, data yang akan diolah harus memenuhi asumsi normalitas dan asumsi homogenitas. Di dalam statistik parameterik dikenal

ada beberapa jenis diantaranya: Uji beda mean satu sampel, Uji beda mean dua sampel atau lebih saling berpasangan dan saling berhubungan, Uji dua sampel atau lebih tidak saling berpasangan dan tidak saling berhubungan dengan asumsi varians sama, Uji dua sampel atau lebih tidak saling berpasangan dan tidak saling berhubungan dengan asumsi varians berbeda

B. Uji Beda Mean Satu Populasi

Uji rata-rata populasi biasa diistilahkan uji t merupakan suatu uji dalam statistika untuk menguji rata-rata (*mean*) suatu populasi yang didasarkan pada ketidaktahuan (*unknown*) mengenai nilai varians dari populasi (σ^2) (Montgomery, D. C; dan Runger, 2011). Uji ini digunakan untuk melihat kecenderungan rata-rata dua atau lebih populasi. Uji ini biasa disebut uji Z , namun menurut Agresti dan Finlay, menggunakan simbol t daripada z karena, seperti dalam membentuk interval kepercayaan, menggunakan s untuk memperkirakan σ dalam kesalahan standar menimbulkan kesalahan tambahan. Distribusi sampling nol dari statistik uji t adalah distribusi t .

Ketika jumlah sampel meningkat, distribusi t akan mendekati distribusi normal standar Z . Nilai t mendekati normal saat derajat kebebasan (df) meningkat, dan kedua distribusi praktis identik jika $df > 30$. Dengan demikian, adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk proses pengujian, a) bersumber dari sampel acak sederhana; 2) sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau jumlah sampel minimal 30; 3) varian populasi (σ^2) diketahui.

Ott dan Longkecker (2001), menjelaskan uji t sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{y} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \quad (8.1)$$

dimana t memiliki distribusi t dengan $df = n-1$, dan, ketika n meningkat, distribusi t mendekati distribusi z .

Implementasi uji mean populasi uji t , diawali dengan pengujian asumsi normalitas, yakni berasal dari sampel yang dikumpulkan diasumsikan berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Namun jika tidak memenuhi asumsi normalitas dilanjutkan dengan uji nonparametrik. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji t , sebagai berikut:

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad = \text{rata-rata populasi } \mu \text{ bernilai } \mu_0,$$

$H_1: \mu \neq \mu_0$ = rata-rata populasi μ tidak bernilai μ_0 (untuk pengujian dua)

Nilai t_{hitung} dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s \sqrt{n}} \quad (8.2)$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n-1}} \quad (8.3)$$

$$db = n - 1$$

Dimana:

t = Nilai t hitung

\bar{X} = Rata-rata sampel

μ_0 = Rata-Rata Populasi yang dikaji

n = Jumlah Sampel

s = Standar deviasi

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan Nilai t_{kritis} dengan t_{hitung} jika Nilai $t_{hitung} > t_{kritis}$, maka H_0 ditolak sebaliknya $t_{hitung} < t_{kritis}$ H_1 diterima. Pengujian hipotesis juga bisa dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi, jika probabilitas $>$ tingkat signifikansi maka H_0 diterima, sebaliknya jika probabilitas $<$ tingkat signifikansi maka H_1 diterima.

Kasus 8.1

Dengan menggunakan data Kasus 6.1,

Dengan Menggunakan R

Langkah 1: Tabulasi Data di Microsoft Excel

Langkah 2: Mengimpor Data

```
library(readxl)
```

```
Modal <- read_excel("D:/Modal.xlsx")
```

```
View(Modal)
```

Langkah 3: Menghitung Statistik Deskriptif

```

library(psych)
library(pastecs)
stat.desc(Modal)

##                Modal
## nbr.val          100.0000000
## nbr.null         0.0000000
## nbr.na           0.0000000
## min              34.0000000
## max              98.0000000
## range            64.0000000
## sum              7266.0000000
## median           75.0000000
## mean             72.6600000
## SE.mean          1.3265144
## CI.mean.0.95    2.6320923
## var              175.9640404
## std.dev          13.2651438
## coef.var         0.1825646

```

Langkah 4: Mendeskripsikan Data

```

x=Modal$Modal
x
## [1] 75 86 66 86 50 78 66 79 68 60 80 83 87 79 80 77 81 92 57 52
58 82 73 95 66
## [26] 60 84 80 79 63 80 88 58 84 96 87 72 65 79 80 86 68 76 41 80
40 63 90 83 94
## [51] 76 66 74 76 68 82 59 75 35 34 65 63 85 87 79 77 76 74 76 78
75 60 96 74 73
## [76] 87 52 98 88 64 76 69 60 74 72 76 57 64 67 58 72 80 72 56 73
82 78 45 75 56

```

Langkah 5: Melakukan perhitungan Uji t

Cara 1

```

t.test(x,y=NULL,alternative = c("two.sided"),mu=35,paired = F
ALSE,conf.level = 0.95)

##
## One Sample t-test
##
## data: x

```

```
## t = 28.39, df = 99, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 35
## 95 percent confidence interval:
##  70.02791 75.29209
## sample estimates:
## mean of x
##      72.66
```

Cara 2

```
t.test(x, mu=35)

##
## One Sample t-test
##
## data:  x
## t = 28.39, df = 99, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 35
## 95 percent confidence interval:
##  70.02791 75.29209
## sample estimates:
## mean of x
##      72.66
```

Output R diperoleh nilai t hitung sebesar 28.39 > ttabel serta nilai probabilitas sebesar 2.2e-16 lebih kecil dari signifikansi 0,05 hal ini menunjukkan bahwa modal kerja perusahaan yang ada di daerah ABC berdistribusi normal

C. Uji Beda Mean Dua Data Saling Berpasangan dan Saling Berhubungan (T - Test /Pretest - Postes)

Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum dan sesudah perlakuan. Jenis data yang digunakan harus berskala interval atau rasio. Misalkan $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ merupakan hasil observasi dari dua populasi, yaitu populasi X dan Y yang dinyatakan dalam berpasangan. Adapun Berikut beberapa contoh kasus yang membutuhkan pengujian kesamaan rata-rata untuk data berpasangan dan atau saling berhubungan dengan uji t, seperti skor pada tes awal dan pada tes akhir, skor IQ dan prestasi akademik, kemampuan verbal dan kemampuan komunikasi.

Uji beda mean dari dua populasi data berpasangan dan saling berhubungan dengan uji t, memiliki hipotesis

$H_0: \mu_2 = \mu_1$ = tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika, sebelum dan sesudah perlakuan

$H_0: \mu_2 > \mu_1$ = terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika, sebelum dan sesudah perlakuan

Untuk menentukan berapa nilai t empiric, digunakan rumus berikut:

$$t = \frac{\sum d_i}{\sqrt{\frac{N \sum d_i^2 - (\sum d_i)^2}{N-1}}} \quad (8.4)$$

Di mana:

t = Nilai t

d = selisih nilai postes dan pretest

N = jumlah sampel

Kasus 8.2

Seorang peneliti, ingin mengetahui perbedaan nilai statistika mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi pada tes awal dan tes akhir di ambil secara acak 10 orang mahasiswa. Sebelum di beri materi R diberi tes awal begitupula setelah diberi materi R selama tiga bulan diberi tes akhir, nilai di rangkum pada tabel berikut

Tabel 8.2 Nilai Statistika Mahasiswa

Tes	Nilai Mahasiswa									
Tes Awal	66	70	50	80	75	77	74	90	85	90
Tes Akhir	70	70	66	88	85	90	82	95	96	97

Penyelesaian

a. Perumusan Hipotesis

$H_0: \mu_2 = \mu_1$ = tidak terdapat perbedaan nilai mahasiswa antara tes awal dan tes akhir

$H_0: \mu_2 > \mu_1$ = terdapat perbedaan nilai mahasiswa antara tes awal dan tes akhir

b. Menghitung Nilai t

Tabel 8.3 Pembantu Uji Analisis Satu Jalan

Tes	Nilai Mahasiswa										Jumlah
Tes Awal	66	70	50	80	75	77	74	90	85	90	757
Tes Akhir	70	70	66	88	85	90	82	95	96	97	839
d	4	0	16	8	10	13	8	5	11	7	82
d ²	16	0	256	64	100	169	64	25	121	49	864

$$t = \frac{82}{\sqrt{\frac{10 \times 864 - 82^2}{10 - 1}}} = 5,62$$

c. Menentukan Nilai t tabel

$$dk = N - 1 = 10 - 1 = 9$$

d. Kriteria Pengujian

e. Kesimpulan

Karena t hitung 5,62 berada di daerah penolakan H_0 , maka dapat disimpulkan bahwa pada saat Ramadhan dapat meningkatkan penjualan perusahaan

Uji beda mean dari dua populasi data berpasangan dan saling berhubungan dengan uji t varians berbeda, data dari selisih pasangan observasi (d), diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata μD . Namun observasi kita memiliki sampel yang besar (≥ 30), maka populasi tidak mutlak berdistribusi normal (Mann, P. S; dan Lacke, 2011), didasari atas sifat teorema limit sentral (*central limit theorem*). Pengujian asumsi normalitas dilakukan berdasarkan metode yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan Menggunakan R, Uji beda mean dari dua populasi data berpasangan dan saling berhubungan dengan uji t dapat dilakukan dengan tahapan berikut:

Langkah 1: Menyiapkan tabulasi data di Microsoft excel

Langkah 2: Mengimpor data


```
library(readxl)

## Warning: package 'readxl' was built under R version 3.6.3

data_berpasangan <- read_excel("D:/data berpasangan.xlsx")
View(data_berpasangan)
```

Langkah 4: Mendeskripsikan Variabel/data

```
t.test(data_berpasangan$Akhir,data_berpasangan$Awal,paired =
TRUE)

##
## Paired t-test
##
## data: data_berpasangan$Akhir and data_berpasangan$Awal
## t = 5.62, df = 9, p-value = 0.0003258
## alternative hypothesis: true difference in means is not eq
ual to 0
## 95 percent confidence interval:
## 4.899352 11.500648
## sample estimates:
## mean of the differences
## 8.2
```

Berdasarkan berdasarkan output R, diketahui nilai statistik dari uji t (t) sebesar 5,62, sedangkan nilai p value sebesar 0,0003258, jika diketahui derajat bebas sebesar 9, karena $5,62 > 1,83$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika nilai mahasiswa, pada tes awa dan tes akhir tingkat signifikansi sebesar 5%.

Adapun dengan cara membandingkan nilai probabilitas dengan p value, pengambilan keputusan juga dapat diambil, yaitu jika nilai probabilitas $>$ dari signifikansi maka H_0 terima sedangkan sebaliknya jika nilai probabilitas $<$ dari tingkat signifikansi maka H_1 diterima. Dari output R di peroleh nilai p value sebesar 0,0003258, Karena nilai probabilitas tersebut $>$ dibandingkan tingkat signifikansi $\alpha=0,05$, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika nilai mahasiswa, pada tes awa dan tes akhir tingkat signifikansi sebesar 5%.

Dengan menggunakan R, uji kesamaan rata-rata dari dua populasi untuk data berpasangan dan saling berhubungan dengan uji t , data dari selisih pasangan pengamatan (D) diasumsikan berdistribusi normal, dengan rata-rata normalitas untuk data selisih pasangan pengamatan. Dengan tahapan berikut:


Langkah 1: Menentukan Selisih antara Akhir dan Awal

```
selisih=data_berpasangan$Akhir-data_berpasangan$Awal
selisih
## [1] 4 0 16 8 10 13 8 5 11 7
```

Langkah 2: Menguji Normalitas dengan metode Grafik dan Jarque bera

Metode Grafik

```
qqnorm(selisih)
qqline(selisih)
```



Gambar 8.1 Uji Normal Q - Q Plot

Pada Gambar 8.1, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar sangat dekat pada garis diagonal, maka disimpulkan bahwa asumsi normalitas data dari selisih pasangan nilai mahasiswa dipenuhi.

Metode Kolmogrov dan Metode Jarque Bera

```
library(nortest)
lillie.test(selisih)

##
##  Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
##
## data:  selisih
## D = 0.11729, p-value = 0.9606

library(tseries)

## Warning: package 'tseries' was built under R version
3.6.3

## Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
##   method      from
##   as.zoo.data.frame zoo

jarque.bera.test(selisih)

##
##  Jarque Bera Test
##
## data:  selisih
## X-squared = 0.10205, df = 2, p-value = 0.9503
```

Nilai p-value metode uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,9606, nilai p value metode uji Jarque-Bera sebesar 0,9503. Keduanya menunjukkan nilai p value lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yaitu 0,05, maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak. Hal ini berarti asumsi normalitas data dari selisih pasangan nilai mahasiswa dipenuhi

D. Uji Beda Dua Mean Data Tidak Saling Berpasangan dengan asumsi varians sama dengan populasi sama (uji t)

Dalam uji beda dua mean data yang tidak saling berpasangan dan tidak berhubungan dengan asumsi varians yang sama, menguji ada tidaknya perbedaan mean antara populasi pertama dan populasi kedua, atau menguji apakah selisih rata-rata antara kelompok kedua dan pertama berbeda atau sama dengan nol. Sampel yang diambil tidak saling memengaruhi atau tidak saling berkorelasi. Misalkan kinerja karyawan laki-laki tidak mempengaruhi kinerja karyawan perempuan; harga saham perusahaan manufaktur mempengaruhi harga saham perusahaan jasa; terdapat perbedaan konsumsi mahasiswa jurusan Kedokteran dengan konsumsi mahasiswa Ekonomi dan lain sebagainya.

Uji beda mean dari dua populasi data tidak berpasangan dan tidak saling berhubungan dengan uji t, memiliki hipotesis

$H_0: \mu_2 = \mu_1$ = tidak terdapat perbedaan perbedaan rata-rata populasi pertama dan populasi kedua

$H_0: \mu_2 > \mu_1$ = terdapat perbedaan perbedaan rata-rata populasi pertama dan populasi kedua

Nilai statistik dari uji t (*thitung*) untuk sampel independent menggunakan dua model rumus sebagai berikut.

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{sp \sqrt{\frac{s_1^2}{N_1} + \frac{s_2^2}{N_2}}} \quad (8.5)$$

t = nilai t test

\bar{X}_1 = Rata-rata data populasi pertama

\bar{X}_2 = Rata-rata populasi kedua

n_1 = banyaknya sampel berasal dari populasi pertama

n_2 = banyaknya sampel berasal dari populasi kedua

sp = *pooled estimator standard deviation for two samples*

sp dapat dihitung dengan rumus:

$$S_p = \sqrt{\frac{S_1^2 (n-1) + S_2^2 (n-1)}{n_1 + n_2 - 2}} \quad (8.6)$$

Pengujian Hipotesis

Dengan membandingkan nilai statistik dari uji t dengan nilai kritis. Untuk menentukan nilai kritis t, diperlukan derajat bebas (db) yakni $n_1 + n_2 - 2$, dengan signifikansi 5%, misalkan berdasarkan hasil kasus di atas jumlah n_1 dan n_2 masing-masing 10 orang maka db sebesar 18 ($10 + 10 - 2 = 18$), sehingga nilai kritis dapat dihitung di R

Kasus 8.3

Seorang peneliti ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai ujian statistika ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Untuk pengujian hipotesis, peneliti mengambil 20 orang mahasiswa jadi sampel masing-masing 10 laki-laki dan perempuan. Adapun nilai ujian mahasiswa yang dikumpulkan, sebagai berikut

Tabel 8.4 Data Nilai Ujian Mahasiswa Laki-laki dan Perempuan

Mahasiswa Laki-laki	X	Mahasiswa Perempuan	Y
RAHIM	65	NUR	75
RAHMAN	80	ALIFIA	84
RAZAK	70	AQILA	87
WARIS	75	AFIFAH	88
ANAS	82	WANA	85
ARDI	77	WINI	90
BASO	66	TINI	75
IRWAN	85	INAR	95
WAWAN	74	BUYUNG	87
MARDI	78	MASNI	86

Sumber: Data fiktif

Penyelesaian

1. Perumusan Hipotesis

$H_0: \mu_2 = \mu_1$ = tidak terdapat perbedaan nilai ujian mahasiswa laki-laki dan perempuan

$H_0: \mu_2 \neq \mu_1$ = terdapat perbedaan perbedaan nilai ujian mahasiswa laki-laki dan perempuan

2. Menghitung Mean dan Simpangan Baku

Tabel 8.5 Perhitungan Uji Beda Sampel Independent

Sampel	X	(X-X)	(X-X) ²	Y	(Y-Y)	(Y-Y) ²
1	65	-10.2	104.04	75	-10.2	104.04
2	80	4.8	23.04	84	-1.2	1.44
3	70	-5.2	27.04	87	1.8	3.24
4	75	-0.2	0.04	88	2.8	7.84
5	82	6.8	46.24	85	-0.2	0.04
6	77	1.8	3.24	90	4.8	23.04
7	66	-9.2	84.64	75	-10.2	104.04
8	85	9.8	96.04	95	9.8	96.04
9	74	-1.2	1.44	87	1.8	3.24
10	78	2.8	7.84	86	0.8	0.64
Jumlah	752		393.6	852	766.8	343.6
Rata-rata	75.2			85.2		
Standar deviasi	6,61			6,18		

3. Menghitung Nilai Sp

$$s_p = \sqrt{\frac{(6,61)^2(10 - 9) + (6,18)^2(10 - 1)}{10 + 10 - 2}} = 6,3986$$

4. Menghitung nilai t statistik

$$t = \frac{\bar{Y} - \bar{X}}{sp \sqrt{\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y}}} = \frac{85,2 - 75,2}{6,3986 \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} = 3,494$$

5. Melakukan Pengujian Hipotesis

Nilai statistik dari uji t diperoleh sebesar 3,494, jika dibandingkan dengan t kritis sebesar 2,101, maka nilai statistik $>$ dibandingkan nilai t kritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti secara rata-rata terdapat perbedaan dan secara signifikan nilai ujian statistika antara laki-laki dan perempuan jurusan Ilmu Ekonomi dengan tingkat signifikansi 5%.

Dengan Menggunakan R, Uji beda mean dari dua populasi data tidak berpasangan dan tidak saling berhubungan dengan uji t dapat dilakukan dengan tahapan berikut:

Langkah 1: Menyiapkan tabulasi data di Microsoft excel

Langkah 2: Mengimpor data

```
library(readxl)
data_Independen <- read_excel("D:/data Independen.xlsx")
View(data_Independen)
```

Langkah 4: Melakukan pengujian

```
t.test(data_Independen$Y, data_Independen$X, var.equal = TRUE,
paired = FALSE)

##
## Two Sample t-test
##
## data: data_Independen$Y and data_Independen$X
## t = 3.494, df = 18, p-value = 0.002591
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  3.987136 16.012864
## sample estimates:
## mean of x mean of y
##      85.2      75.2
```

```
t.test(data_Independen$Y,data_Independen$X,var.equal = FALSE,
paired = FALSE)

##
## Welch Two Sample t-test
##
## data: data_Independen$Y and data_Independen$X
## t = 3.494, df = 17.918, p-value = 0.002605
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  3.985153 16.014847
## sample estimates:
## mean of x mean of y
##      85.2      75.2
```

Nilai statistik dari uji t diperoleh sebesar 3,494, jika dibandingkan dengan t kritis sebesar 2,101, maka nilai statistik > dibandingkan nilai t kritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti secara rata-rata terdapat perbedaan dan secara signifikan nilai ujian statistika antara laki-laki dan perempuan jurusan Ilmu Ekonomi dengan tingkat signifikansi 5%.

Dengan menggunakan R, uji kesamaan rata-rata dari dua populasi untuk data tidak berpasangan dan tidak saling berhubungan dengan uji t , data dari selisih pasangan pengamatan (D) diasumsikan berdistribusi normal, dengan rata-rata normalitas untuk data selisih pasangan pengamatan. Dengan tahapan berikut:

Langkah 1: Mendeskripsikan data pengamatan

```
X=data_Independen$X
Y=data_Independen$Y
X
## [1] 65 80 70 75 82 77 66 85 74 78
Y
## [1] 75 84 87 88 85 90 75 95 87 86
```

Langkah 2: Melakukan mengujian Normalitas Melalui Koreksi P Value


```
library(nortest)
lillie.test(X)

##
## Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
##
## data: X
## D = 0.128, p-value = 0.9137
```

Tanpa Koreksi p value

```
ks.test(X, "pnorm", mean(X), sd(X))

##
## One-sample Kolmogorov-Smirnov test
##
## data: X
## D = 0.128, p-value = 0.9894
## alternative hypothesis: two-sided

ks.test(Y, "pnorm", mean(Y), sd(Y))

## Warning in ks.test(Y, "pnorm", mean(Y), sd(Y)): ties
## should not be present for
## the Kolmogorov-Smirnov test

##
## One-sample Kolmogorov-Smirnov test
##
## data: Y
## D = 0.223, p-value = 0.7026
## alternative hypothesis: two-sided
```

Metode Jarque bera

```
library(tseries)
jarque.bera.test(X)

##
## Jarque Bera Test
##
## data: X
## X-squared = 0.52743, df = 2, p-value = 0.7682
```

```
jarque.bera.test(Y)

##
## Jarque Bera Test
##
## data: Y
## X-squared = 0.48905, df = 2, p-value = 0.7831
```

Output R menunjukkan Jarque-Bera untuk sampel X memiliki p-value sebesar 0.7682, sedangkan untuk sampel Y sebesar 0,7831. Dengan demikian nilai p value lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05, maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak berarti asumsi normalitas dipenuhi.

Selain ujian normalitas, bisa dilanjutkan dengan pengujian asumsi kesamaan varians dengan menggunakan uji homogenitas yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Salah satu yang bisa digunakan untuk kasus ini adalah metode levene berikut tahapan pengujian yang dilakukan

Langkah 1: Mengimpor data

```
library(readxl)
varians <- read_excel("D:/varians.xlsx")
View(varians)
```

Langkah 2: Menginstal Packages var; Rcmdr; lawstat

```
library(car)

library(lawstat)

library(lawstat)
```

Langkah 3: Melakukan pengujian

```
leveneTest(varians$Nilai, varians$Kelompok)

## Warning in leveneTest.default(varians$Nilai, varians$Kelompok): va
rians$Kelompok
## coerced to factor.
```

```
## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##      Df F value Pr(>F)
## group 1  0.2869 0.5988
##      18

levene.test(varians$Nilai,varians$Kelompok)

##
## Modified robust Brown-Forsythe Levene-type test based on the absolute
## deviations from the median
##
## data:  varians$Nilai
## Test Statistic = 0.2869, p-value = 0.5988
```

Output R, menunjukkan p value sebesar 0,5988 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, H_0 diterima dan H_1 ditolak, dengan demikian nilai laki-laki dan perempuan memiliki varians yang sama dapat diterima pada taraf signifikansi 5%.

E. Uji Beda Dua Mean Data Tidak Saling Berpasangan dengan asumsi varians sama dengan populasi Berbeda (uji t)

Dalam uji beda dua mean data yang tidak saling berpasangan dan tidak berhubungan dengan asumsi varians berbeda, menguji ada tidaknya perbedaan mean antara populasi pertama dan populasi kedua, atau menguji apakah selisih rata-rata antara kelompok kedua dan pertama berbeda atau sama dengan nol. Dalam uji ini, hasil observasi pada populasi pertama saling bebas (independent) dengan observasi populasi kedua (Independent) atau dengan kata lain kedua populasi tidak salinh berkorelasi. *Uji ini diasumsikan pada ketidaktahuan mengenai nilai varians dari kedua populasi, sehingga diasumsikan varians dari dua populasi tersebut berbeda.* Misalkan kinerja karyawan laki-laki tidak mempengaruhi kinerja karyawan perempuan; harga saham perusahaan manufaktur mempengaruhi harga sama perusahaan jasa; terdapat perbedaan konsumsi mahasiswa jurusan Kedokteran dengan konsumsi mahasiswa Ekonomi dan lain sebagainya.

Uji beda mean dari dua populasi data tidak berpasangan dan tidak saling berhubungan dengan uji t, memiliki hipotesis

$H_0: \mu_2 = \mu_1 =$ tidak terdapat perbedaan perbedaan rata-rata populasi pertama dan populasi kedua

$H_0: \mu_2 > \mu_1$ = terdapat perbedaan perbedaan rata-rata populasi pertama dan populasi kedua

Nilai statistik dari uji t (*thitung*) untuk sampel independent menggunakan dua model rumus sebagai berikut.

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{N_1} + \frac{S_2^2}{N_2}}} \quad (8.7)$$

t = nilai t test

\bar{X}_1 = Rata-rata data populasi pertama

\bar{X}_2 = Rata-rata populasi kedua

n_1 = banyaknya sampel berasal dari populasi pertama

n_2 = banyaknya sampel berasal dari populasi kedua

Pengujian Hipotesis

Dengan membandingkan nilai statistik dari uji t dengan nilai kritis. Untuk menentukan nilai kritis t , diperlukan derajat bebas (db),

$$db = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1}\right)^2}{(n_1-1)} + \frac{\left(\frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{(n_2-1)}} \quad (8.8)$$

Berdasarkan uji t , jika $t_{hitung} \leq t_{kritis}$, maka H_0 di terima dan jika $t_{hitung} > t_{kritis}$, maka H_1 Hipotesis juga dapat dilakukan dengan pendekatan nilai probabilitas (p value) dari uji t , nilai p value dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan, jika p value \leq tingkat signifikansi, maka H_0 diterima dan jika p value $>$ p value H_1 diterima .

Uji beda mean dari dua populasi data berpasangan dan saling berhubungan dengan asumsi varians berbeda, data dari selisih pasangan observasi (d), diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata μ_D . Namun observasi kita memiliki sampel yang besar (≥ 30), maka populasi tidak mutlak berdistribusi normal (Mann, P. S; dan Lacke, 2011), didasari atas sifat teorema limit sentral (*central limit theorem*). Pengujian asumsi normalitas dilakukan berdasarkan metode yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kasus 8.4

Dengan menggunakan data kasus, apakah terdapat perbedaan nilai ujian mahasiswa dengan asumsi varians berbeda

Penyelesaian**Menghitung Nilai db**

$$db = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1}\right)^2}{(n_1 - 1)} + \frac{\left(\frac{S_2^2}{n_1}\right)^2}{(n_2 - 1)}}$$

$$db = \frac{\left(\frac{S_X^2}{n_1} + \frac{S_Y^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_X^2}{n_1}\right)^2}{(n_1 - 1)} + \frac{\left(\frac{S_Y^2}{n_1}\right)^2}{(n_2 - 1)}}$$

$$db = \frac{\left(\frac{6,61}{10} + \frac{6,18}{10}\right)^2}{\frac{\left(\frac{6,61}{10}\right)^2}{(10 - 1)} + \frac{\left(\frac{6,18}{10}\right)^2}{(10 - 1)}}$$

$$db = 14,06$$

berdasarkan perhitungan di atas nilai db sebesar 14,06. Dengan tingkat signifikansi 5% sebesar 2,228.

Selanjutnya nilai t hitung dapat dihitung, sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{Y} - \bar{X}}{\sqrt{\frac{S_1^2}{N_1} + \frac{S_2^2}{N_2}}} \quad (8.9)$$

$$t = \frac{8,52 - 7,52}{\sqrt{\frac{6,61}{10} + \frac{6,18}{10}}} = 8,84$$

Diketahui derajat bebas (df) bernilai $9,802 \cong 10$. Nilai kritis t dengan derajat bebas 10 dan tingkat signifikansi 5% adalah $\pm 2,228$. Nilai t hitung statistik (t hitung) sebesar 8,84, ini berarti bahwa t hitung $>$ t kritis, yakni $8,84 > 2,228$, dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti bahwa terdapat secara rata-rata terdapat perbedaan secara signifikan antara nilai laki-laki dengan perempuan dengan tingkat signifikansi 5%.

Dengan Menggunakan R, Uji beda mean dari dua populasi data tidak berpasangan dan tidak saling berhubungan dengan asumsi varians berbeda dapat dilakukan dengan uji beda dari dua populasi data tidak berpasangan dan tidak saling berhubungan dengan asumsi varians sama.

Bab IX

ANOVA (ANALYSIS OF VARIANCE)

A. Apa itu Anova?

ANOVA pertama kali dikembangkan Ronald A. Fisher (1924, 1932, 1935). Berawal dari karya yang dilakukan W.S. Gosset (1908) tentang statistik student-t (*Student test*) dengan membandingkan rata-rata dua kondisi eksperimen. Meskipun selanjutnya statistik tersebut berkembang tidak hanya pada kondisi eksperimen bahkan muncul lebih dari dua kondisi eksperimen sehingga juga diperlukan lebih dari satu t-test yang berakibat pada meningkatnya kesalahan tipe 1 (*Type 1 error*). *Type 1 error* terjadi jika hasil yang diperoleh menolak hipotesis nol yang benar. Selanjutnya Ronald A. Fisher (1924, 1932, 1935) yang pada awalnya melakukan penelitian melakukan penelitian dibidang pertanian yang terlebih dahulu melakukan eksperimen lebih dari dua kondisi eksperimen tanpa meningkatkan *type 1 error* yang kemudian disebut ANOVA.

Regresi dan ANOVA memiliki perbedaan, dimana Regresi mencoba mencoba membuat peramalan nilai variabel dependen dari basis model yang dibangun dari variabel independen dan variabel dependen sedangkan ANOVA mencari perbedaan nilai rata-rata dari dua grup yang berbeda. Selain itu, semua variabel independen harus diperlakukan sebagai skala nominal sedangkan regresi semua skala nominal, ordinal, interval dan rasio dapat digunakan sebagai variabel Independen.

Dengan demikian, lahir istilah "*variance*" yang akhirnya berkembang *analysis of variance* yang disingkat menjadi ANOVA. ANOVA digunakan untuk menganalisis atau menguji apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan di antara dua atau lebih kelompok atau grup. Sehingga dapat diambil kesimpulan apakah rata-rata sampel tersebut menggambarkan rata-rata populasi.

Singkatan ANOVA tidak berarti yang akan dianalisis adalah varians walaupun huruf VA menggambarkan varians, dengan kata lain istilah ANOVA tampaknya tidak tepat digunakan karena dicari adalah rata-rata (*mean*) seharusnya adalah ANOME, namun dimaksudkan VA adalah mencari rata-

rata variasi sekelompok data sehingga disingkat ANOVA (*Analysis of Variance*). ANOVA terbagi dua, yaitu *One Way ANOVA* yang digunakan bila terdapat satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dan *Two Way ANOVA* digunakan ketika terdapat dua atau lebih variabel independen.

B. *One Way Anova*

One Way Anova biasa juga disebut ANOVA satu arah memiliki empat asumsi, sebagai berikut: 1) Sampel dipilih secara acak dari masing-masing k populasi atau k grup; 2) Nilai spesifik dari variabel dependen dicatat dari masing-masing unit eksperimen; 3) Variabel dependen adalah berdistribusi normal untuk masing-masing populasi atau grup; 4) Varians dari variabel dependen adalah sama untuk masing-masing populasi. Untuk memudahkan analisis varian satu arah dapat digunakan ringkasan tabel 9.1 berikut:

Tabel 9.1 Tabulasi *One Way Anova*

Sumber Varian	db	Jumlah Kuadrat (JK)	Mean Kuadrat (MK)	F	F tabel
Rata-Rata Kolom (K)	dbk = K-1	JK _K	MK _K		ftabel
Galat (G)	dbg = N-K-1	JK _G	MK _G		
Total (T)	N-1	JK _T			

Di mana

$$F = \text{Nilai } F = \frac{MKK}{MKG}$$

X = nilai observasi

nk = banyaknya objek pada kelompok k

K = banyaknya kelompok

N = banyaknya seluruh Objek

$$JK_T = \text{Jumlah Kuadrat total} = \sum XT^2 - \frac{(\sum XT)^2}{N}$$

$$JK_K = \text{Jumlah Kuadrat Kolom} = \sum \frac{(\sum XK)^2}{nK} - \frac{(\sum XT)^2}{N}$$

$$JK_G = \text{Jumlah Kuadrat Galat} = JKT - JKK$$

$$\begin{aligned} MK_K &= \text{Mean Kuadrat Kolom} = \frac{JKK}{dbK} \\ MK_G &= \text{Mean Kuadrat Galat} = \frac{JKG}{dbG} \\ MK_T &= \text{Mean Kuadrat Total} \end{aligned}$$

Selanjutnya perlu dicari populasi atau grup yang mana berbeda. Untuk menjelaskan secara rinci masing-masing populasi atau grup dapat dilakukan melalui uji dengan menggunakan *Higly Signifikansi Difference* (HSD), uji dengan menggunakan *Least Signifikansi Difference* (LSD), dan t test untuk dua kelompok sampel yang berbeda (independent). Di samping itu terdapat beberapa metode yang bisa dipakai untuk melakukan pengujian, seperti di software MINITAB yaitu ada metode Dunnett dan Fisher (Wapole, 2012). Namun di dalam pembahasan buku ini difokuskan pada *Higly Signifikansi Difference* (HSD).

Higly Signifikansi Difference (HSD) atau biasa dikenal dengan *The Tukey Kramer Method* disingkat uji Tukey. Metode ini dikembangkan oleh Jhon W. Tukey (1953), untuk menguji pasangan kombinasi yang menunjukkan adanya perbedaan diantara grup yang dibandingkan. Pada awalnya metode Tukey ini digunakan untuk grup yang mempunyai sampel yang sama (*equal sample size*), atau dikenal metode Turkey's dan kemudian metode ini dimodifikasi oleh Kramer pada pertengahan tahun 1950 untuk grup yang mempunyai ukuran sampel yang tidak sama (*unequal sample size*), sehingga dikenal metode Tukey-Kramer. Metode Tukey's juga dikenal *Tukey's honestly significant difference* (HSD) test.

Adapun rumus yang digunakan:

$$HSD_{0,05} \text{ antara } \bar{X}_1 \text{ dan } \bar{X}_2 = q_{0,05, df = df} \sqrt{\frac{MK_G}{N_1} + \frac{MK_G}{N_2}}$$

Beda signifikan jika jika $|\bar{X}_1 - \bar{X}_2| > HSD_{0,05}$

Dimana:

HSD	= <i>Higly Signifikansi Difference</i>
\bar{X}_1	= Mean grup 1
\bar{X}_2	= Mean grup 2
MK_G	= Mean Kuadrat Galat
N_1	= Banyaknya anggota sampel 1
N_2	= Banyaknya anggota sampel 2

Kasus 9.1

Seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai rata-rata permintaan dari ketiga jenis merek laptop. Subjek penelitian adalah Gerai penjual laptop di Kota ABCD yang menjual laptop merek ASUS, Samsung dan Acer. Untuk keperluan penelitian dilakukan pengambilan sampel 20 Gerai. Adapun data rata-rata permintaan di masing-masing Gerai

Tabel 9.2 Data Permintaan Laptop Berdasarkan Merek

ASUS	Samsung	ACER
180	160	180
190	190	180
170	150	150
200	200	160
150	150	160
200	200	200
180	180	140
180	150	150
180	160	160
160	160	180
150	150	160
150	150	150
150	150	140
140	170	150
160	160	160
180	180	160
180	180	180
150	150	180
160	160	200
140	140	200

Sumber: Data Fiktif

Penyelesaian

Langkah 1: Menyiapkan Tabulasi data di Microsoft excel


Langkah 2: Mengimpor data ke RStudio

```
library(readxl)
```

```
permintaan <- read_excel("D:/permintaan.xlsx")
```

Langkah 3: Menguji Normalitas data Metode boxplot, dengan menggunakan function boxplot

```
boxplot(permintaan)
```



Gambar 9.1 Boxplot Permintaan Laptop

Langkah 4: Menyusun data secara berurutan dengan function `stack()`, berdasarkan kasus diatas data dapat diurutkan dengan `stack.permintaan=stack(permintaan)`

```
stack.permintaan=stack(permintaan)
```

```
stack.permintaan
```

```
##      values      ind
## 1      180      ASUS
## 2      190      ASUS
## 3      170      ASUS
## 4      200      ASUS
## 5      150      ASUS
## 60     200      ACER
```

Langkah 6: Menghitung One Way ANOVA dengan fungsi
`one.way=aov(values~ind, data=stack.permintaan.`
`One.way Summary(one.way)`

```
one.way=aov(values~ind,data = stack.permintaan)
one.way

## Call:
##   aov(formula = values ~ ind, data = stack.permintaan)
##
## Terms:
##               ind Residuals
## Sum of Squares  103.333 19890.000
## Deg. of Freedom    2         57
##
## Residual standard error: 18.68013
## Estimated effects may be unbalanced

summary(one.way)

##           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## ind         2   103    51.7   0.148  0.863
## Residuals  57 19890   348.9
```

Dari output R diperoleh nilai F Value sebesar 0,148 lebih kecil dari F tabel atau nilai probability F lebih besar dari signifikansi 0,05, disimpulkan bahwa ketiga merek yang diuji adalah sama

Selain cara di atas ANOVA bisa dilakukan sengan menggunakan package **easyanova_1.1**. keuntungan menggunakan package **easyanova_1.1** karena hanya menggunakan dengan satu perintah hasil perhitungan dan pengujian bisa diperoleh sekaligus termasuk hasil ANOVA, pengujian asumsi multiple comparisons dengan uji Tukey. Namun sebelum menginstal package **easyanova_1.1** diawali install packages berikut: **mvtnorm**; **survival**; **splines**; **car**; **MASS** **nnet**; dan **nlme**. Kemudian aktifkan `library easyanova`.

Adapun tahapan dilakukan sebagai berikut:

Langkah 1: Mengaktifkan **easyanova** yang telah diinstal

```
library(easyanova)
```

Langkah 2: Terlebih dahulu data disusun. Misalkan data disimpan dengan nama file merek di rektori kerja kita

Langkah 3: Mengimpor data yang telah kita susun dan diberi nama ke RStudio

```
library(readxl)
merek <- read_excel("D:/merek.xlsx")
View(merek)
```

Langkah 4: Melakukan perhitungan dan Pengujian ANOVA dengan menggunakan function `eal()`

```
eal(merek)

## $`Analysis of variance`
##           df type I SS mean square F value    p>F
## treatments  2   103.3333    51.6667  0.1481 0.8627
## Residuals  57 19890.0000    348.9474    -    -
##
## $Means
##   treatment mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
## 1      ASUS 167.5          4.177    a  a      a  a
## 2      ACER 167.0          4.177    a  a      a  a
## 3     Samsung 164.5          4.177    a  a      a  a
##
## $`Multiple comparison test`
##           pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan)  p(t)
## 1     ASUS - ACER      0.5  0.9961 0.9328    0.9328 0.9328
## 2     ASUS - Samsung    3.0  0.8678 0.8678    0.6364 0.6135
## 3     ACER - Samsung    2.5  0.9062 0.6737    0.6737 0.6737
##
## $`Residual analysis`
## $`Residual analysis`$`residual analysis`
##           values
## p.value Shapiro-Wilk test    0.0008
## p.value Bartlett test      0.9516
## coefficient of variation (%) 11.2300
## first value most discrepant 24.0000
## second value most discrepant 26.0000
## third value most discrepant 46.0000
```

Berdasarkan hasil output dapat dijelaskan

- Nilai F hitung diperoleh sebesar 0,8627 atau dibulatkan menjadi 0,863 lebih kecil dari F tabel atau bisa dibandingkan juga dengan nilai F probability F sebesar 0,1481 lebih besar dari 0,05, hal ini disimpulkan bahwa bahwa dengan tingkat signifikansi 5% tidak terdapat perbedaan permintaan merek laptop
- Dari hasil asumsi analisis ragam yang harus di penuhi, menggunakan dua asumsi analisis. *Pertama uji Normalitas*, dengan menggunakan

uji Shapiro-Wilk normality test p-value sebesar 0,0008 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga menerima H_0 dan disimpulkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal. *Asumsi kedua adalah homogeneity of variances*. Dengan menggunakan metode uji Bartlett sebesar 0,9516 dengan demikian H_0 diterima varians sama. Karena p-value diperoleh sebesar 0,9516 yang > dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varians populasi untuk ketiga jenis merek tidak berbeda secara signifikan secara statistik.

- Selanjutnya dengan memperhatikan hasil perhitungan *multiple comparisons* (perbandingan berganda), hal ini dilakukan jika H_0 di tolak pada analisis ANOVA, karena analisis ini bertujuan ingin mengetahui populasi yang mana saling berbeda dengan populasi lainnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya jika menggunakan package *easynova_1.1* formula komparasi menggunakan statistik uji Tukey. Output R ketiga jenis merek laptop yang di uji tidak ada yang berbeda secara signifikan.

C. *TWO Way Anova*

Two Way ANOVA atau biasa disebut Analisis ANOVA dua arah merupakan pengembangan dari pembahasan *one way ANOVA* yaitu membandingkan perbedaan mean antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen atau biasa disebut faktor. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana interaksi antara dua variabel independen terhadap variabel dependen. *Two Way ANOVA* memiliki asumsi diantaranya; 1) data populasi dari sampel dari distribusi atau minimal mendekati normal; 2) sampel yang terpilih harus independen; 3) Variansi dari populasi sama dan 4) kelompok atau grup harus memiliki ukuran sampel yang sama. Misalnya keseragaman berat badan disebabkan oleh perbedaan usia, atau adanya gizi yang dikonsumsi atau kedua-duanya. Uji statistika yang digunakan uji F

Proses perhitungan ANOVA dua arah tidak berbeda dengan ANOVA satu arah, hanya saja pada ANOVA dua arah digunakan dua faktor. ANOVA dua arah dapat diperoleh dengan beberapa cara, yaitu: 1) ***Blocking*** dimana beberapa observasi pada masing-masing *treatment* terjadi di masing-masing *block*; 2) ***Stratifying*** mengacu kepada level dari dua faktor yang diamati dan sampel di dalam masing-masing strata; 3) ***Forming treatment combination*** (sebagai contoh cell) dialokasikan pada kombinasi individual.

Two Way ANOVA (ANOVA dua arah) untuk sampel k berkorelasi adalah pengujian hipotesis komparatif untuk sampel k sampel (lebih dari dua sampel) yang berkorelasi dengan dua vektor yang berpengaruh. Two Way ANOVA untuk sampel k berkorelasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Two Way ANOVA tanpa interaksi dan Two Way ANOVA dengan interaksi.

1. Two Way ANOVA tanpa interaksi (Analisis ANOVA dua arah tanpa Interaksi)

Analisis ANOVA dua arah tanpa Interaksi ini dimaksudkan hipotesis komparatif (perbandingan untuk k sampel (lebih dari dua sampel) yang berkorelasi dengan dua faktor yang berpengaruh, sedangkan interaksi kedua faktor tersebut ditiadakan.

Tabel 9.3 Klafikasi dua arah Tanpa Interaksi

Sumber Keragaman	derajat bebas	Jumlah Kuadrat	Ragam	F Rasio
Antarbaris	dk _B	JK _B	S ₁ ²	F ₁
Antarkolom	dk _K	JK _K	S ₂ ²	F ₂
Galak	dk _G	JK _G	S ₃ ²	

$$JK_B = \text{Jumlah Kuadrat Baris} = \frac{(\sum X_1)^2 + (\sum X_2)^2 + \dots + (\sum X_n)^2}{j} - \frac{(\sum T_x)^2}{b \cdot j}$$

$$JK_K = \text{Jumlah Kuadrat Kolom} = \frac{(\sum T_1)^2 + (\sum T_2)^2 + \dots + (\sum T_n)^2}{b} - \frac{(\sum T_x)^2}{b \cdot j}$$

$$JK_T = \text{Jumlah Kuadrat Total} = [(X_{11})^2 + (X_{12})^2 + (X_{13})^2 \dots + (X_{nj})^2] - \frac{(T_x)^2}{b \cdot j}$$

$$JK_G = JK_B - JK_K$$

$$dk_B = b - 1$$

$$dk_K = j - 1$$

$$dk_G = (b - 1)(j - 1)$$

$$S_1^2 = \text{Nilai Ragam Baris} = \frac{JK_B}{dk_B}$$

$$S_2^2 = \text{Nilai Ragam Kolom} = \frac{JK_K}{dk_K}$$

$$S_3^2 = \text{Nilai Ragam Galat} = \frac{JK_G}{dk_G}$$

$$F_1 = \text{F hitung 1} = \frac{S_1^2}{S_3^2}$$

$$F_2 = \text{F hitung 2} = \frac{S_2^2}{S_3^2}$$

Kasus 9.2

Sebuah perusahaan yang bergerak manufaktur ingin meneliti jumlah produksi dengan umur mesin dan jumlah pekerja yang digunakan dengan menggunakan 10 data yang seragam di mana umur mesin (1 – 3 tahun) jumlah pekerja (5 – 15 orang). Berikut data diperoleh:

Tabel 9.4 Data Hasil Pengamatan Produksi, Umur mesin dan Jumlah Pekerja

Umur	Jumlah pekerja dan Jumlah Produksi		
	15	10	5
1 tahun	1500	920	883
	1880	1107	757
	1590	1039	667
	1549	1219	933
	1829	1104	701
	1650	1211	719
	1772	1000	956
	1500	908	833
	1490	1157	793
	1650	1189	708
2 Tahun	1458	887	943
	1034	1020	767
	1264	1079	929
	1385	925	764
	1437	926	963
	955	1145	861
	1538	1105	867
	1218	1164	961
	1031	1006	963
	1193	1191	805
3 Tahun	1416	1164	1055
	1449	853	1008

	1442	866	953
	1130	1276	671
	1414	1226	770
	1289	945	922
	1247	1336	803
	1063	887	1174
	1108	1300	803
	1115	1291	660

Penyelesaian**Langkah 1:** Mentabulasi data di Microsoft excel**Langkah 2:** Mengimpor tabulasi data di RStudio

```
library(readxl)
Produksi <- read_excel("D:/Produksi.xlsx")
View(Produksi)
```

Langkah 3: Membuat data frame baru karena data yang dimpor dari Microsoft excel terdapat ada beberapa kolom kosong

```
Data.Produksi=data.frame(Produksi$Produksi,Produksi$Umur,Produksi$Pekerja)
Data.Produksi
```

```
##      Produksi.Produksi  Produksi.Umur  Produksi.Pekerja
## 1             1500             1             15
## 2             1880             1             15
##
## 90             660             3             5
```

Langkah 4: Membuat model Two way ANOVA


```
Twoanova=aov(Produksi.Produksi~as.factor(Produksi.Umur)*as.factor(Produksi.Pekerja),data = Data.Produksi)
Twoanova

## Call:
## aov(formula = Produksi.Produksi ~ as.factor(Produksi.Umur) *
## as.factor(Produksi.Pekerja), data = Data.Produksi)
##
## Terms:
## as.factor(Produksi.Umur) as.factor(Produksi.Pekerja)
## Sum of Squares          212632          4298087
```

```
## Deg. of Freedom          2          2
##          as.factor(Produksi.Umur):as.factor(Produksi.Pekerja) Residuals
## Sum of Squares                834969  1766552
## Deg. of Freedom                4          81
##
## Residual standard error: 147.6796
## Estimated effects may be unbalanced
```


Langkah 5: Menguji Normalitas dengan Residual, melalui dua cara

```
res=Twoanova$residuals
hist(res,main="Histogram of Residuals", xlab="residuals")
```



Gambar 9.2 Histogram of Residuals

```
boxplot(res)
```



Gambar 9.3 Boxplot Residuals

Gambar (9.1) dan (.2) menunjukkan bahwa residual memenuhi syarat terdistribusi normal

Langkah 6: Menguji Homogenitas dengan menggunakan metode Levene

```
library(car)

leveneTest(Produksi.Produksi~as.factor(Produksi.Umur)*as.factor(Produksi.Pekerja),data = Data.Produksi)

## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##      Df F value Pr(>F)
## group 8  2.2348 0.03296 *
##      81
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Nilai p value diperoleh sebesar 0,03296 lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa asumsi homogenitas dipenuhi

Langkah 7: Melakukan Pengujian Two Way ANOVA

```
summary(Twoanova)

##              Df Sum Sq Mean Sq F value
## as.factor(Produksi.Umur)      2  212632   106316   4.875
## as.factor(Produksi.Pekerja)    2  4298087  2149044  98.538
## as.factor(Produksi.Umur):as.factor(Produksi.Pekerja)  4   834969   208742   9.571
## Residuals                      81 1766552    21809
##              Pr(>F)
## as.factor(Produksi.Umur)              0.01 *
## as.factor(Produksi.Pekerja)           < 2e-16 ***
## as.factor(Produksi.Umur):as.factor(Produksi.Pekerja) 2.18e-06 ***
## Residuals
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Output R menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara Jumlah produksi dengan umur mesin, sedangkan jumlah produksi dan jumlah pekerja serta umur mesin dan jumlah pekerja juga signifikan

2. Two Way ANOVA dengan interaksi (Analisis ANOVA dua arah tanpa Interaksi

Two Way ANOVA dengan interaksi (Analisis ANOVA dua arah tanpa Interaksi merupakan pengujian hipotesis komparatif untuk k sampel (lebih dari dua sampel) yang berkorelasi dengan dua faktor yang berpengaruh, sedangkan interaksi kedua faktor diperhitungkan.

Tabel 9.5 Klafikasi dua arah dengan Interaksi

Sumber Keragaman	derajat bebas	Jumlah Kuadat	Ragam	F Rasio
Antarbaris	dk _B	JK _B	S ₁ ²	F ₁
Antarkolom	dkk	JK _K	S ₂ ²	F ₂
Interaksi	dk _I	JK _I	S ₃ ²	F ₃
Galak	dk _G)	JK _G	S ₄ ²	

$$JK_B = \text{Jumlah Kuadrat antarBaris} = \frac{(\sum TX_{r1})^2 + (\sum TX_{r2})^2 + \dots + (\sum TX_{rk})^2}{b \cdot j} - \frac{(\sum X_T)^2}{r \cdot b \cdot j}$$

$$JK_K = \text{Jumlah Kuadrat antarKolom} = \frac{(\sum T_1)^2 + (\sum T_2)^2 + \dots + (\sum T_n)^2}{b} - \frac{(\sum T_k)^2}{b \cdot j}$$

$$JK_I = \text{Jumlah Kuadrat Interaksi} = \frac{\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^b (T_{kn})^2}{b} - \frac{\sum_{j=1}^n (T_j)^2}{r \cdot b} - \frac{\sum_{i=1}^n (TX_{rk})^2}{b \cdot j} + \frac{(X_T)^2}{r \cdot b \cdot j}$$

$$JK_r = \text{Jumlah Kuadrat Total} = [(X_{11})^2 + (X_{12})^2 + (X_{13})^2 + \dots + (X_{rm})^2] - \frac{(X_T)^2}{r \cdot b \cdot j}$$

$$JK_G = \text{Jumlah Kuadrat Galat} = JK_r - JK_B - JK_K - JK_I$$

$$JK_G = JK_B - JK_K$$

$$dk_B = b - 1$$

$$dk_K = j - 1$$

$$dk_I = (b - 1)(j - 1)$$

$$dk_G = (rj)(b - 1)$$

$$S_1^2 = \text{Nilai Ragam Baris} = \frac{JK_B}{dk_B}$$

$$S_2^2 = \text{Nilai Ragam Kolom} = \frac{JK_K}{dk_K}$$

$$S_3^2 = \text{Nilai Ragam Interaksi} = \frac{JK_I}{dk_I}$$

$$S_4^2 = \text{Nilai Ragam Galat} = \frac{JK_G}{dk_G}$$

$$F_1 = \text{F hitung 1} = \frac{S_1^2}{S_4^2}$$

$$F_2 = \text{F hitung 2} = \frac{S_2^2}{S_4^2}$$

$$F_3 = \text{F hitung 2} = \frac{S_3^2}{S_4^2}$$

Hipotesis Two way anova

Analisis **Two way ANOVA (ANOVA dua arah)** dengan interaksi memiliki tiga (3) hipotesis yang dipakai yakni apakah terdapat perbedaan mean antar kategori baik kategori baris maupun kolom dan di tambah hipotesis satu yaitu apakah ada interaksi antara kategori baris dan kolom.

Adapun hipotesis dalam Anova dua arah dengan interaksi.

Hipotesis anova kolom

H0: $a_1 = a_2 = \dots = a_k$, Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kolom

H1: $a_1 \neq a_2 \neq \dots \neq a_k$, Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kolom

Hipotesis anova baris

H0: $b_1 = b_2 = \dots = b_j$, Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori baris

H1: $b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_j$, Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori baris

Hipotesis interaksi

H0: $(ab)_{11} = (ab)_{12} = \dots = (ab)_{kj}$, Tidak ada interaksi antara variabel baris dan kolom

H1: $(ab)_{11} \neq (ab)_{12} \neq \dots \neq (ab)_{kj}$, ada interaksi antara variabel baris dan kolom

Kasus 9.3

Sebuah penguasa bioskop membagi jadwal pertunjukan dan mengklasifikasi jenis-jenis film yang diputar. Data hasil pengamatan jumlah penonton di rekap sebagai berikut:

Tabel 9.6 Data Hasil Pengamatan Jumlah Penonton

Jenis (Film)	Jadwal (Jam) dan Jumlah Penonton (Orang)			
	15,00	16,00	20,00	22,00
Mandarin	100	145	135	150

Jenis (Film)	Jadwal (Jam) dan Jumlah Penonton (Orang)			
	15,00	16,00	20,00	22,00
	120	130	150	162
	130	128	152	142
	125	130	135	137
Barat	130	125	142	138
	140	128	141	141
	90	135	125	123
Indonesia	110	145	135	135
	95	108	142	130
	65	75	100	135
India	78	95	105	125
	92	88	120	120

Langkah 1: Melakukan tabulasi data di Microsoft Excel

Langkah 2: Mengimpor tabulasi data di Software RStudio

```
library(readxl)
Jumlah_Penonton <- read_excel("D:/Jumlah Penonton.xlsx")
View(Jumlah_Penonton)
```

Langkah 3: Membuat data frame baru karena data yang dimpor dari Microsoft excel terdapat ada beberapa kolom kosong, cara menggunakan function

```
data.twoway=data.frame(Jumlah_Penonton$Film, Jumlah_Penonton$Jam, Jumlah_Penonton$Jumlah)
data.twoway

##      Jumlah_Penonton.Film Jumlah_Penonton.Jam Jumlah_Penonton.Jumlah
## 1      Mandarin           15                100
## 2      Mandarin           15                120
## 3      Mandarin           15                130
## 48     India              22                120
```

Langkah 4: Membuat model Two way ANOVA

```

Two.way.anova=aov(Jumlah_Penonton.Jumlah~as.factor(Jumlah_Penonton.Film)*as.factor(Jumlah_Pe
nonton.Jam),data = data.twoway)
Two.way.anova

## Call:
## aov(formula = Jumlah_Penonton.Jumlah ~ as.factor(Jumlah_Penonton.Film) *
##   as.factor(Jumlah_Penonton.Jam), data = data.twoway)
##
## Terms:
##           as.factor(Jumlah_Penonton.Film) as.factor(Jumlah_Penonton.Jam)
## Sum of Squares           10323.396                6640.396
## Deg. of Freedom              3                  3
##           as.factor(Jumlah_Penonton.Film):as.factor(Jumlah_Penonton.Jam)
## Sum of Squares                                2514.854
## Deg. of Freedom                                  9
##
## Residuals
## Sum of Squares           3253.333
## Deg. of Freedom           32
##
## Residual standard error: 10.08299
## Estimated effects may be unbalanced


```

Langkah 5: Menguji Normalitas dengan Residual, melalui dua cara

```


res=Two.way.anova$residuals
hist(res,main="Histogram of Residuals", xlab="residuals")

```



Gambar 9.4 Histogram of Residuals

```
boxplot(res)
```



Gambar 9.5 Boxplot Residuals

Output R Menunjukkan bahwa gambar histogram dan boxplot menunjukkan data terdistribusi normal

Langkah 6: Menguji Homogenitas menguji asumsi homogenitas variansi

Misalkan dengan menggunakan metode Levene dengan mengaktifkan

```
library(car)

## Warning: package 'car' was built under R version 3.6.3

## Loading required package: carData

leveneTest(Jumlah_Penonton.Jumlah~as.factor(Jumlah_Penonton.Film)*as.factor(Ju
mlah_Penonton.Jam),data = data.twoway)

## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##      Df F value Pr(>F)
## group 15  0.5208 0.9098
##      32
```

Hasil LeveneTest P value diperoleh sebesar 0,9098 dengan tingkat signifikansi 5%, hal ini menunjukkan bahwa asumsi homogenitas terpenuhi

Langkah 7: Melakukan Pengujian Two Way ANOVA


```
summary(Two.way.anova)
```

```
##
## as.factor (Jumlah_Penonton.Film)                Df Sum Sq
## as.factor (Jumlah_Penonton.Jam)                3 10323
## as.factor (Jumlah_Penonton.Film) :as.factor (Jumlah_Penonton.Jam) 9 2515
## Residuals                                     32 3253
##
## as.factor (Jumlah_Penonton.Film)                Mean Sq F value
## as.factor (Jumlah_Penonton.Jam)                3441 33.847
## as.factor (Jumlah_Penonton.Film) :as.factor (Jumlah_Penonton.Jam) 2213 21.772
## Residuals                                     279 2.748
##
## Pr(>F)
## as.factor (Jumlah_Penonton.Film)                4.80e-10 ***
## as.factor (Jumlah_Penonton.Jam)                7.17e-08 ***
## as.factor (Jumlah_Penonton.Film) :as.factor (Jumlah_Penonton.Jam) 0.0168 *
## Residuals
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Analisis Two way anova (analisis varians dua arah) bisa juga dilakukan dengan package `easynova` 1.1, untuk model interaksi menggunakan function `ea2`. terlebih dahulu mengaktifkan library(`easynova`), selanjutnya menggunakan function `ea2()`

```
library(easynova)
```

```
ea2(Jumlah_Penonton)
```

```
## $`Analysis of variance`
##          df type III SS mean square F value    p>F
## factor_1    3  10323.396  3441.1319 33.8472 <0.001
## factor_2    3   6640.396  2213.4653 21.7718 <0.001
## factor_1:factor_2  9   2514.854   279.4282  2.7485 0.0168
## residuals   32   3253.333   101.6667    -      -
##
## $`Adjusted means (factor 1)`
##   factor_1 adjusted.mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
## 1  Mandarin    137.0000         2.9107    a  a    a a      a
## 2   Barat     134.3333         2.9107    a  a    a a      a
## 3  Indonesia  122.7500         2.9107    b  b    b b      b
## 4   India     99.8333         2.9107    c  c    c c      c
##
## $`Multiple comparison test (factor 1)`
##   pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan) p(t)
## 1  Mandarin - Barat  2.6667  0.9155 0.5217  0.5217 0.5217
## 2  Mandarin - Indonesia 14.2500  0.0080 0.0043  0.0021 0.0015
## 3  Mandarin - India  37.1667  0.0000 0.0000  0.0000 0.0000
## 4  Barat - Indonesia 11.5833  0.0394 0.0083  0.0083 0.0083
## 5   Barat - India  34.5000  0.0000 0.0000  0.0000 0.0000
## 6  Indonesia - India  22.9167  0.0000 0.0000  0.0000 0.0000
##
## $`Adjusted means (factor 2)`
##   factor_2 adjusted.mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
## 1         22    136.5000         2.9107    a  a    a a      a
## 2         20    131.8333         2.9107    a  a    a a      a
## 3         16    119.3333         2.9107    b  b    b b      b
## 4         15    106.2500         2.9107    c  c    c c      c
```

```

##
## $`Multiple comparison test (factor 2)`
##      pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan) p(t)
## 1 22 - 20 4.6667 0.6718 0.2653 0.2653 0.2653
## 2 22 - 16 17.1667 0.0012 0.0006 0.0003 0.0002
## 3 22 - 15 30.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
## 4 20 - 16 12.5000 0.0233 0.0047 0.0047 0.0047
## 5 20 - 15 25.5833 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
## 6 16 - 15 13.0833 0.0164 0.0033 0.0033 0.0033
##
## $`Adjusted means (factor 1 in levels of factor 2)`
## $`Adjusted means (factor 1 in levels of factor 2)`$`factor_1 in 15`
##      treatment adjusted.mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
## 1 Barat.15 131.6667 5.8214 a a a a a
## 4 Mandarin.15 116.6667 5.8214 ab a a a a a
## 3 Indonesia.15 98.3333 5.8214 bc b b b b b
## 2 India.15 78.3333 5.8214 c c c c c
##
## $`Adjusted means (factor 1 in levels of factor 2)`$`factor_1 in 16`
##      treatment adjusted.mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
## 8 Mandarin.16 134.3333 5.8214 a a a a a
## 7 Indonesia.16 129.3333 5.8214 a a a a a
## 5 Barat.16 127.6667 5.8214 a a a a a
## 6 India.16 86.0000 5.8214 b b b b b
##
## $`Adjusted means (factor 1 in levels of factor 2)`$`factor_1 in 20`
##      treatment adjusted.mean standard.error tukey snk duncan t scott knott
## 12 Mandarin.20 145.6667 5.8214 a a a a a
## 9 Barat.20 139.3333 5.8214 a a a a a
## 11 Indonesia.20 134.0000 5.8214 a a a a a
## 10 India.20 108.3333 5.8214 b b b b b
##
## $`Adjusted means (factor 1 in levels of factor 2)`$`factor_1 in 22`
##      treatment adjusted.mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
## 16 Mandarin.22 151.3333 5.8214 a a a a a
## 13 Barat.22 138.6667 5.8214 ab ab ab ab b
## 15 Indonesia.22 129.3333 5.8214 ab b b b b b
## 14 India.22 126.6667 5.8214 b b b b b
##
##
## $`Multiple comparison test (factor 1 in levels of factor 2)`
## $`Multiple comparison test (factor 1 in levels of factor 2)`$`factor_1 in
15`
##      pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan) p(t)
## 1 Barat.15 - Mandarin.15 15.0000 0.2819 0.0778 0.0778 0.0778
## 2 Barat.15 - Indonesia.15 33.3334 0.0017 0.0009 0.0004 0.0003
## 3 Barat.15 - India.15 53.3334 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
## 4 Mandarin.15 - Indonesia.15 18.3334 0.1376 0.0331 0.0331 0.0331
## 5 Mandarin.15 - India.15 38.3334 0.0003 0.0002 0.0001 0.0001
## 6 Indonesia.15 - India.15 20.0000 0.0917 0.0209 0.0209 0.0209
##
## $`Multiple comparison test (factor 1 in levels of factor 2)`$`factor_1 in
16`
##      pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan) p(t)
## 1 Mandarin.16 - Indonesia.16 5.0000 0.9290 0.5479 0.5479 0.5479
## 2 Mandarin.16 - Barat.16 6.6666 0.8494 0.6998 0.4521 0.4241
## 3 Mandarin.16 - India.16 48.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
## 4 Indonesia.16 - Barat.16 1.6666 0.9970 0.8409 0.8409 0.8409
## 5 Indonesia.16 - India.16 43.3333 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
## 6 Barat.16 - India.16 41.6667 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
##
## $`Multiple comparison test (factor 1 in levels of factor 2)`$`factor_1 in

```

```

20`
##
##          pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan)  p(t)
## 1   Mandarin.20 - Barat.20  6.3334  0.8677 0.4474  0.4474 0.4474
## 2   Mandarin.20 - Indonesia.20 11.6667  0.4982 0.3443  0.1902 0.1661
## 3   Mandarin.20 - India.20  37.3334  0.0004 0.0004  0.0001 0.0001
## 4   Barat.20 - Indonesia.20  5.3333  0.9155 0.5217  0.5217 0.5217
## 5   Barat.20 - India.20  31.0000  0.0036 0.0019  0.0009 0.0007
## 6   Indonesia.20 - India.20 25.6667  0.0191 0.0038  0.0038 0.0038
##
## $`Multiple comparison test (factor 1 in levels of factor 2)`$`factor_1 in
22`
##
##          pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan)  p(t)
## 1   Mandarin.22 - Barat.22 12.6666  0.4272 0.1337  0.1337 0.1337
## 2   Mandarin.22 - Indonesia.22 22.0000  0.0543 0.0307  0.0155 0.0118
## 3   Mandarin.22 - India.22  24.6666  0.0256 0.0256  0.0086 0.0052
## 4   Barat.22 - Indonesia.22  9.3334  0.6718 0.2653  0.2653 0.2653
## 5   Barat.22 - India.22  12.0000  0.4741 0.3244  0.1781 0.1547
## 6   Indonesia.22 - India.22  2.6666  0.9880 0.7481  0.7481 0.7481
##
##
## $`Adjusted means (factor 2 in levels of factor 1)`
## $`Adjusted means (factor 2 in levels of factor 1)`$`factor_2 in Barat`
##   treatment adjusted.mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
## 9   Barat.20  139.3333  5.8214  a  a  a a  a
## 13  Barat.22  138.6667  5.8214  a  a  a a  a
## 1   Barat.15  131.6667  5.8214  a  a  a a  a
## 5   Barat.16  127.6667  5.8214  a  a  a a  a
##
## $`Adjusted means (factor 2 in levels of factor 1)`$`factor_2 in India`
##   treatment adjusted.mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
## 14  India.22  126.6667  5.8214  a  a  a a  a
## 10  India.20  108.3333  5.8214  a  b  b b  b
## 6   India.16  86.0000  5.8214  b  c  c c  c
## 2   India.15  78.3333  5.8214  b  c  c c  c
##
## $`Adjusted means (factor 2 in levels of factor 1)`$`factor_2 in Indonesia`
##   treatment adjusted.mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
## 11  Indonesia.20 134.0000  5.8214  a  a  a a  a
## 7   Indonesia.16 129.3333  5.8214  a  a  a a  a
## 15  Indonesia.22 129.3333  5.8214  a  a  a a  a
## 3   Indonesia.15 98.3333  5.8214  b  b  b b  b
##
## $`Adjusted means (factor 2 in levels of factor 1)`$`factor_2 in Mandarin`
##   treatment adjusted.mean standard.error tukey snk duncan t scott_knott
## 16  Mandarin.22 151.3333  5.8214  a  a  a a  a
## 12  Mandarin.20 145.6667  5.8214  a  a  a ab  a
## 8   Mandarin.16 134.3333  5.8214  ab a  a b  a
## 4   Mandarin.15 116.6667  5.8214  b  b  b c  b
##
##
## $`Multiple comparison test (factor 2 in levels of factor 1)`
## $`Multiple comparison test (factor 2 in levels of factor 1)`$`factor_2 in
Barat`
##
##          pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan)  p(t)
## 1   Barat.20 - Barat.22  0.6666  0.9998 0.9360  0.9360 0.9360
## 2   Barat.20 - Barat.15  7.6666  0.7884 0.6249  0.3875 0.3587
## 3   Barat.20 - Barat.16 11.6666  0.4983 0.4983  0.2054 0.1661
## 4   Barat.22 - Barat.15  7.0000  0.8300 0.4015  0.4015 0.4015
## 5   Barat.22 - Barat.16 11.0000  0.5474 0.3861  0.2165 0.1909
## 6   Barat.15 - Barat.16  4.0000  0.9617 0.6304  0.6304 0.6304

```

```
##
## $`Multiple comparison test (factor 2 in levels of factor 1)`$`factor_2 in
India`
##           pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan)  p(t)
## 1 India.22 - India.20  18.3334   0.1376 0.0331    0.0331 0.0331
## 2 India.22 - India.16  40.6667   0.0001 0.0001    0.0000 0.0000
## 3 India.22 - India.15  48.3334   0.0000 0.0000    0.0000 0.0000
## 4 India.20 - India.16  22.3333   0.0496 0.0107    0.0107 0.0107
## 5 India.20 - India.15  30.0000   0.0050 0.0026    0.0013 0.0009
## 6 India.16 - India.15   7.6667   0.7884 0.3587    0.3587 0.3587
##
## $`Multiple comparison test (factor 2 in levels of factor 1)`$`factor_2 in
Indonesia`
##           pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan)  p(t)
## 1 Indonesia.20 - Indonesia.16  4.6667   0.9412 0.5748    0.5748 0.5748
## 2 Indonesia.20 - Indonesia.22  4.6667   0.9412 0.8386    0.5982 0.5748
## 3 Indonesia.20 - Indonesia.15 35.6667   0.0008 0.0008    0.0003 0.0001
## 4 Indonesia.16 - Indonesia.22  0.0000   1.0000 1.0000    1.0000 1.0000
## 5 Indonesia.16 - Indonesia.15 31.0000   0.0036 0.0019    0.0009 0.0007
## 6 Indonesia.22 - Indonesia.15 31.0000   0.0036 0.0007    0.0007 0.0007
##
## $`Multiple comparison test (factor 2 in levels of factor 1)`$`factor_2 in
Mandarin`
##           pair contrast p(tukey) p(snk) p(duncan)  p(t)
## 1 Mandarin.22 - Mandarin.20  5.6666   0.9008 0.4962    0.4962 0.4962
## 2 Mandarin.22 - Mandarin.16 17.0000   0.1864 0.1134    0.0584 0.0471
## 3 Mandarin.22 - Mandarin.15 34.6666   0.0011 0.0011    0.0004 0.0002
## 4 Mandarin.20 - Mandarin.16 11.3334   0.5227 0.1782    0.1782 0.1782
## 5 Mandarin.20 - Mandarin.15 29.0000   0.0068 0.0036    0.0018 0.0013
## 6 Mandarin.16 - Mandarin.15 17.6666   0.1606 0.0396    0.0396 0.0396
##
## $`Residual analysis`
## $`Residual analysis`$`residual analysis`
##
##           values
## p.value Shapiro-Wilk test      0.8613
## p.value Bartlett test (factor_1) 0.0233
## p.value Bartlett test (factor_2) 0.2457
## p.value Bartlett test (treatments) 0.5755
## coefficient of variation (%)    8.1700
## first value most discrepant    30.0000
## second value most discrepant    1.0000
## third value most discrepant    29.0000
```

- Output R menunjukkan bahwa faktor Jenis Film dan Jam kunjungan signifikan secara statistik pada taraf signifikansi 5%, sedangkan untuk interaksi antara jenis film dan jam kunjungan (kedua faktor) signifikan secara statistik pada taraf signifikansi 1 persen, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis film menghasilkan perbedaan rata-rata jumlah penonton dan perbedaan jam kunjungan menghasilkan perbedaan rata-rata jumlah penonton, begitupun dengan interaksi antara jenis film dan jam kunjungan, jika

- menggunakan tingkat signifikansi 1% maka interaksi tersebut signifikan menyebabkan perbedaan rata-rata jumlah penonton.
- Output asumsi normalitas dan homogenitas variansi menunjukkan bahwa uji Shapiro Wilk menunjukkan sebesar α uji Bartlett p value lebih besar dari 0,05 lebih besar 0,8613 lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 diterima, asumsi kenormalan di terima sedangkan untuk uji homogenitas untuk faktor pertama dilanggar sedangkan faktor kedua terpenuhi karena nilai Bartlett p value lebih besar dari 0,05 yakni sebesar 0,2457. Untuk hal ini sesungguhnya tidak diperkenankan untuk pengujian lebih lanjut, namun hal ini bisa dilakukan transformasi data (namun hal ini hanya contoh ilustrasi maka tidak masalah dilanjutkan).
 - Untuk pengujian dan analisis *multiple comparisons* dalam Two way ANOVA (ANOVA dua arah) memiliki penjelasan menarik untuk dikembangkan, karena hal ini bisa dikembangkan pengujian komparasi antar baris (faktor 1), komparasi antar kolom (faktor 2), komparasi antar baris (faktor 1) pada masing-masing kolom (level faktor 2), komparasi antar kolom (faktor 2) pada masing-masing baris (level faktor 1).

Bab X

ANALISIS REGRESI

A. Pendahuluan

Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel, variabel dependen pada satu atau lebih variabel lainnya, dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung (mean) atau rata-rata (populasi) variabel dependent. Jika kita sedang mempelajari ketergantungan satu variabel pada hanya satu variabel yang menjelaskan, seperti yang terjadi pada belanja konsumsi dan pendapatan riil. Studi ini dikenal dengan analisa regresi sederhana atau dua variabel.

Tetapi kalau kita sedang, mempelajari ketergantungan satu variabel pada lebih dari satu variabel yang menjelaskan, misalnya hasil panen, curah hujan, suhu cahaya matahari dan pupuk, ini dikenal dengan analisa regresi berganda (*multiple regression analysis*). Dengan kata lain dalam regresi dua variabel hanya ada satu variabel yang menjelaskan, sedangkan dalam regresi berganda ada lebih dari satu variabel yang menjelaskan.

Istilah regresi pertama kali diperkenalkan Francis Galton di sebuah artikel berjudul *Family in Stature, Proceedings of Royal Society*, London, Volume 40, Tahun 1886, yang menjelaskan bahwa:

“meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek untuk mempunyai anak-anak yang pendek, distribusi tinggi suatu populasi tidak berubah secara mencolok (besar) dari generasi ke generasi”


Hukum regresi semesta (*law of universal regression*) dari Galton diperkuat oleh Karl Pearson di sebuah artikel berjudul *Biometrika*, volume 2 Tahun 1903, dengan menggunakan lebih seribu data tinggi badan anggota kelompok keluarga, hasil diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata tinggi anak laki-laki kelompok ayah yang tinggi kurang dari tinggi ayah mereka dan rata-rata tinggi anak-anak laki-laki kelompok ayah pendek lebih besar dari tinggi ayah mereka. Mundurnya (*regressing*) anak laki-laki yang tinggi

maupun yang pendek serupa ke arah rata-rata tinggi semua laki-laki, hal inilah yang biasa diistilahkan Galton **regresi menuju mediokrasi**.

B. Model Regresi Linear Sederhana

Model regresi linear sederhana, terdiri dari 4 model, yaitu:

- Model teoritis : $Y_i = f(X_i)$
- Model Matematis : $Y_i = B_0 + B_i X_i$
- Model Stochastic : $Y_i = \widehat{B}_0 + B_i \widehat{X}_i + e_i$
- Model Empiris : $\widehat{Y}_i = \widehat{B}_0 + \widehat{B}_i X_i$



Gambar 10.1 Model Regresi

Keterangan:

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| Y | = Nilai Observasi variabel terikat |
| \widehat{Y}_i | = nilai estimasi variabel terikat |
| \bar{Y} | = Nilai observasi rata-rata |
| X | = Nilai observasi variabel terikat |
| B_0 | = intercept |

B_1	= koefisien regresi
\widehat{B}_0	= <i>intercept</i> hasil estimasi
\widehat{B}_1	= koefisien regresi hasil estimasi
e	= <i>error term</i>
i	= nilai observasi ke 1; 2; 3.....n

Misalkan: kita ambil sampel dengan observasi sebagai berikut,

$$\hat{Y} = a + bX + e_i \quad (10.1)$$

Dimana

\hat{Y}	= estimasi variabel terikat
X	= Variabel terikat
a, b	= Parameter
a	= bilangan konstan
b	= koefisien regresi x terhadap y
e_i	= <i>error term</i>

untuk mengistemasi parameter a, b terlebih dahulu diupayakan agar $\sum e_i^2$ minimum, dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) atau *Least Square Estimate* (LSE)

$$e_i = Y - \hat{Y} \quad \text{Jadi,}$$

$$\sum e_i^2 = \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$\sum e_i = \sum (Y - a - bX)^2$$

Turunan pertama

$$\frac{\partial e_i}{\partial a} = 2 \sum (Y - a - bX) (-1) = -2 \sum (Y - a - bX) = 0$$

$$\frac{\partial e_i}{\partial b} = 2 \sum (Y - a - bX) (-X) = 0 = -2 \sum (Y - a - bX) X = 0$$

(masing-masing dibagi -2)

$$\sum (Y - a - bX) = 0$$

$$\sum X (Y - a - bX) = 0$$

Maka

$$\Sigma Y - n.a - bX \qquad n.a + b\Sigma X \qquad = \Sigma Y$$

$$\Sigma XY - a - bX \qquad a\Sigma X + b\Sigma X^2 \qquad = \Sigma XY$$

$$\begin{pmatrix} n & \Sigma x \\ \Sigma x & \Sigma x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Sigma y \\ \Sigma xy \end{pmatrix}$$

$$\text{Invers} = \frac{1}{D} \text{Adjoin}$$

$$D = n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2$$

$$\text{Adjoin} = \begin{pmatrix} \Sigma x^2 & -\Sigma x \\ -\Sigma x & n \end{pmatrix}$$

$$\text{Invers} = \frac{1}{n \cdot \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} \cdot \begin{pmatrix} \Sigma x^2 & -\Sigma x \\ -\Sigma x & n \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{n \cdot \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} \begin{pmatrix} \Sigma x^2 & -\Sigma x \\ -\Sigma x & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Sigma y \\ \Sigma xy \end{pmatrix}$$

$$a = \frac{\Sigma x^2 \cdot \Sigma y - \Sigma x \cdot \Sigma y}{n \cdot \Sigma x^2 \cdot (\Sigma x)^2} \qquad (10.2)$$

$$b = \frac{n \cdot \Sigma xy - \Sigma x \cdot \Sigma y}{n \cdot \Sigma x^2 \cdot (\Sigma x)^2} \qquad (10.3)$$

Setelah penaksiran nilai koefisien regresi, maka dilanjutkan perhitungan parameter lain yaitu koefisien determinasi (R^2) yaitu angka yang menunjukkan proporsi (%) variasi nilai Y yang ditentukan oleh variasi nilai Y

$$r^2 = \frac{\Sigma y^2}{\Sigma y} \cdot \frac{(\Sigma y^2 - b^2 - \Sigma x^2)}{\Sigma y^2} \qquad (10.4)$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum y^2 - \sum y^2 + b^2 \sum x^2}{\sum y^2} \\
 &= \frac{b^2 \sum x^2}{\sum y^2} \\
 \text{b} &= \frac{(\sum xy)^2}{\sum x^2} \qquad (10.5)
 \end{aligned}$$

Jadi, Koefisien Determinasi : $\frac{(\sum xy)^2}{\sum x^2 \cdot \sum y^2}$ atau $R^2 = 1 - \frac{\sum(Y-\hat{Y})^2}{\sum(Y-\bar{Y})^2}$ (10.6)

Koefisien korelasi (r) $r = \sqrt{r^2}$

Berdasarkan rumus koefisien determinasi di atas, tentunya nilai Y prediksi ($Y - \hat{Y}$) atau nilai Y dari hasil rumus dengan nilai Y aktual. Kenyataan yang sering muncul adalah nilai koefisien determinasi akan semakin membaik jika nilainya akan terus mendekati angka 1 apabila kita menambah variabel. Semakin banyak jumlah variabel yang menentukan nilai Y prediksi, maka nilai ($Y - \hat{Y}$) akan semakin besar yang berakibat pada besarnya nilai *R squared*. Meskipun variabel yang dimasukkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, banyaknya variabel bebas yang dimasukkan maka akan semakin banyak “noise” dalam model tersebut dan ini tidak dapat dijelaskan oleh koefisien determinasi, sehingga koefisien determinasi yang telah disesuaikan (*Adjusted R Square/ R²_{adj}*) untuk mengurangi kelemahan koefisien determinasi. *Adjusted R Square* merupakan koefisien yang telah dikoreksi dengan memasukkan unsur jumlah variabel dan jumlah data yang digunakan. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan *Adjusted R Square*, sebagai berikut:

$$R_{adj}^2 = R^2 - \frac{P(1-R^2)}{N-P-1} \qquad (10.7)$$

Di mana:

R^2	= Koefisien Determinasi
P	= Jumlah Variabel bebas
N	= Jumlah Data

Di samping itu, nilai *Adjusted R-Square* akan bernilai negatif ketika nilai *R-Square* terlalu kecil sedangkan rasio antara jumlah observasi (N) dengan banyaknya variabel (k) terlalu kecil (artinya datanya terlalu sedikit atau variabelnya yang terlalu banyak). Data bisa saja terlalu sedikit atau variabel bisa saja terlalu banyak, tetapi jika *R-Square* nya memiliki nilai tinggi, maka *adjusted R-Square* akan tetap positif. (Hal ini bisa disimulasi dengan kasus dengan menggunakan R^2 , N dan P tertentu untuk membuktikannya). Dengan demikian, *Adjusted R-Square* bernilai negatif hal ini menunjukkan bahwa model tidak baik, data terlalu sedikit dan variabel yang digunakan terlalu banyak.

C. Model Regresi Linear Berganda

Pada materi sebelumnya uraikan regresi linier sederhana yang digunakan untuk memprediksi hanya melibatkan satu variabel bebas. Namun, dalam praktiknya suatu fenomena ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas. Untuk itu melakukan estimasi pengaruh variabel yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$), disebut analisis regresi linier berganda, disebut linier karena setiap estimasi atas nilai diharapkan mengalami peningkatan atau penurunan mengikuti garis lurus.

Dalam hal estimasi perbedaan regresi linier sederhana dengan regresi linier berganda hanya terletak pada jumlah variabel bebas yang dilibatkan di dalam mengestimasi variabel terikat.

Secara umum, model regresi berganda

$$\begin{aligned} \text{Rumus persamaan regresi dua variabel bebas (independen):} \\ Y &= a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_i \end{aligned} \quad (10.8)$$

$$\begin{aligned} \text{Rumus persamaan regresi tiga variabel bebas (independen):} \\ Y &= a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i \end{aligned} \quad (10.9)$$

$$\begin{aligned} \text{Rumus persamaan regresi } k \text{ variabel bebas (independen):} \\ Y &= a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k + e_i \end{aligned} \quad (10.10)$$

Dimana Y adalah variabel terikat, X_1, X_2, X_3, X_k adalah bebas (*independen*) dan e_i adalah standar error (*error term*). Di dalam model regresi biasa menggunakan subskrip i menunjukkan observasi ke- i untuk data *cross section* subskrip t untuk data *time series* menunjukkan waktu.

Misalkan menggunakan data *cross section* dengan dua variabel bebas, sehingga model dapat dibuat sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + e_i \quad (10.11)$$

Untuk mendapatkan nilai koefisien regresi $a, b_1,$ dan b_2 dari persamaan dapat digunakan metode *ordinary least square* (OLS). Nilai koefisien regresi $a, b_1,$ dan b_2 dapat dipecahkan secara simultan dari tiga persamaan berikut.

$$\Sigma Y = na + b_1 \Sigma X_1 + b_2 \Sigma X_2 \quad (10.12)$$

$$\Sigma X_1 Y = a \Sigma X_1 + b_1 \Sigma X_1^2 + b_2 \Sigma X_1 X_2 \quad (10.13)$$

$$\Sigma X_2 Y = a \Sigma X_2 + b_1 \Sigma X_1 X_2 + b_2 \Sigma X_2^2 \quad (10.14)$$

Hal ini juga dapat diselesaikan dengan matriks sebagai berikut:

$$\begin{pmatrix} n & \Sigma X_1 & \Sigma X_2 \\ \Sigma X_1 & \Sigma X_1^2 & \Sigma X_1 X_2 \\ \Sigma X_2 & \Sigma X_1 X_2 & \Sigma X_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Sigma Y \\ \Sigma X_1 Y \\ \Sigma X_2 Y \end{pmatrix} \quad (10.15)$$

$$\begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & \Sigma X_1 & \Sigma X_2 \\ \Sigma X_1 & \Sigma X_1^2 & \Sigma X_1 X_2 \\ \Sigma X_2 & \Sigma X_1 X_2 & \Sigma X_2^2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \Sigma Y \\ \Sigma X_1 Y \\ \Sigma X_2 Y \end{pmatrix} \quad (10.16)$$

Metode Biasa

$$X_1 = X_1 - \bar{X}_1$$

$$X_2 = X_2 - \bar{X}_2$$

$$Y = Y - \bar{Y}$$

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$\Sigma e_i^2 = \Sigma (Y - \hat{Y})^2$$

$$\sum e_i^2 = \sum (Y - \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2)^2$$

$$\sum e_i^2 = f(\beta_1, \beta_2)$$

$$\sum e_i^2 = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sum e_i^2}{\partial \beta_1} &= 2 \sum (Y - \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2)(-X_1) = 0 \\ &= -2 \sum X_1 (Y - \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2) \end{aligned} \quad (10.17)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sum e_i^2}{\partial \beta_2} &= 2 \sum (Y - \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2)(-X_2) \\ &= -2 \sum X_2 (Y - \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2) \end{aligned} \quad (10.18)$$

Berdasarkan Persamaan (4.17) dan (4.18)

$$\sum X_1 (Y - \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2) = 0 \quad (10.19)$$

$$\sum X_2 (Y - \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2) = 0 \quad (10.20)$$

Jadi,

$$\sum X_1 Y = \beta_1 \sum X_1^2 - \beta_2 \sum X_1 X_2 \quad (10.21)$$

$$\sum X_2 Y = \beta_1 \sum X_1 X_2 - \beta_2 \sum X_2^2 \quad (10.22)$$

Hal tersebut di atas dapat diselesaikan dengan matriks:

$$\begin{pmatrix} \sum X_1^2 & \sum X_1 X_2 \\ \sum X_1 X_2 & \sum X_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum X_1 Y \\ \sum X_2 Y \end{pmatrix} \quad (10.23)$$

Adjoint

$$\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum X_1^2 & \sum X_1 X_2 \\ \sum X_1 X_2 & \sum X_2^2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \sum X_1 Y \\ \sum X_2 Y \end{pmatrix} \quad (10.24)$$

$$\text{Invers} = \frac{1}{\sum X_1^2 (\sum X_2^2) - (\sum X_1 X_2)^2}$$

$$\begin{pmatrix} \sum X_1^2 & -\sum X_1 X_2 \\ -\sum X_1 X_2 & \sum X_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sum X_1 Y \\ \sum X_2 Y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$$

$$\beta_1, \beta_2 = \frac{1}{\sum X_1^2 (\sum X_2^2) - (\sum X_1 X_2)^2} \begin{pmatrix} \sum X_1^2 & -\sum X_1 X_2 \\ -\sum X_1 X_2 & \sum X_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sum X_1 Y \\ \sum X_2 Y \end{pmatrix}$$

Jadi:

$$\beta_1 = \frac{\sum x_2^2 (\sum x_1 y) - (\sum x_1 x_2) (\sum x_2 y)}{\sum x_1^2 \sum x_2^2 - (\sum x_1 x_2)^2} \quad (10.25)$$

$$\beta_2 = \frac{\sum x_1^2 (\sum x_2 y) - (\sum x_1 x_2) (\sum x_1 y)}{\sum x_1^2 \sum x_2^2 - (\sum x_1 x_2)^2} \quad (10.26)$$

$$\beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X}_1 - \beta_2 \bar{X}_2 \quad (10.27)$$

Dalam estimasi koefisien regresi berganda dengan menggunakan dua variabel bebas, bisa saja kita menyelesaikan dengan cara manual. Namun dengan pertimbangan waktu, ketepatan, kecepatan dan pertimbangan hal-hal yang kompleks apalagi menggunakan variabel bebas lebih dari dua, tentunya kita harus menggunakan software komputer untuk membantu pengolahan seperti R Studio, SPSS, SAS, STATA, Eviews dan sebagainya.

Setelah nilai koefisien regresi diperoleh dilanjutkan kita perlu menghitung variansi parameter dan *standar error* dari masing-masing koefisien. Adapun rumus yang digunakan, sebagai berikut:

$$\text{Variasi } \beta_1 = \frac{\sum X_2^2}{D} \cdot \sigma^2 \quad (10.28)$$

$$D = \sum X_1^2 \cdot \sum X_2^2 \quad (10.29)$$

$$D = (\sum x_{1x2})^2 \quad (10.30)$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_1^2}{n - k} \quad (10.31)$$

$$\text{Standar error} = \sqrt{\text{Varians } \beta_1} \quad (10.32)$$

$$\text{Variasi } \beta_2 = \frac{\sum X_1^2}{D} \cdot \sigma^2 \quad (10.33)$$

$$\text{Standar error} = \sqrt{\text{Varians } \beta_2} \quad (10.33)$$

Selanjutnya, menghitung Kofisien Determinasi (R^2) dan kofisien korelasi berganda

$$R^2 = \frac{\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2}{\sum y^2} \quad 0 < R^2 < 100\% \quad (10.36)$$

Koefisien Korelasi Berganda

$$R = \sqrt{R^2} \quad -1 < R < +1 \quad (10.37)$$

Setelah nilai nilai statistik baik a (konstanta), b (koefisien regresi) dan R^2 (koefisien determinasi), ketiganya merupakan estimasi yang dihitung berdasarkan data sampel (n), bagian kecil dari populasi (N), maka sangat mungkin karakteristik sampel bias terhadap karakteristik populasi, meskipun penarikan sampel telah dilakukan secara random dan bisa mewakili secara reseptatif dari populasi. Dengan demikian, seorang peneliti dalam melakukan pengujian statistik untuk memastikan sampel tidak bias terhadap populasi.

Oleh karena, nilai hasil pengamatan (X dan Y), maka akan terdapat juga nilai-nilai yang bervariasi pada estimator paramaternya, maka pada ukuran parameter juga sangat mungkin terjadi variansi. Dengan demikian dalam pengujian statistik diawali perhitungan varians dan *standar error*

$$1. \text{ Uji } t = \frac{\beta_1}{Se\beta_1} \quad (10.38)$$

- Kalau $t_{\text{hit}} < t_{\text{tab}}$ pada $df = n-2$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- Kalau $t_{\text{hit}} > t_{\text{tab}}$ pada $df = n-2$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

$$2. \text{ Uji F} = \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)(n-k)} \text{ atau } = \frac{R^2(n-k)}{(1-R^2)(n-k)} \quad (10.39)$$

Uji F ini digunakan untuk menguji ketepatan atau *fit* nya sebuah model yang dikembangkan, apakah model persamaan regresi yang dihasilkan masuk kategori *fit* atau tidak digunakan distribusi probabilitas F (Fisher) atau biasa disebut Uji F hitung. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan $df: (k-1), (n-k)$ dapat memberikan kesimpulan model tersebut *fit* atau tidak. $F_{\text{table}} =$ Penyebut $n-k$

Penerapan dengan R

Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh Gaji dan Pengawasan terhadap produksi di perusahaan “ABC”, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 10.1 Data Produksi, Gaji dan Pengawasan Perusahaan “ABC”

Produksi	38	24	32	4	17	46	30	8	20	13
Gaji	854	607	681	202	338	951	693	163	349	151
Pengawasan	9	5	7	5	7	13	15	11	16	10

Dengan menggunakan model yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + e_i$$

Dengan menggunakan R, data penelitian tersebut diolah, dengan cara:

Cara pertama: menginput langsung data

Langkah 1: Membuat Matriks data Produksi

```
Produksi<-c(38,24,32,4,17,46,30,8,20,13)
Y<-matrix(c(Produksi),ncol=1)
Y
##          [,1]
## [1,]      38
## [2,]      24
```



```
## [3, ] 32
## [4, ] 4
## [5, ] 17
## [6, ] 46
## [7, ] 30
## [8, ] 8
## [9, ] 20
## [10, ] 13
```

Langkah 2: Membuat Matriks variabel gaji dan pengawasan terdiri dari tiga Kolom, di mana kolom pertama memuat nilai angka satu semua (dengan tujuan untuk mendapatkan nilai intercept dari model linear berganda; Kolom Kedua memuat data gaji dan Kolom Ketiga memuat data pengawasan

```
Produksi<-c(38,24,32,4,17,46,30,8,20,13)
Gaji<-c(854,607,681,202,338,951,693,163,349,151)
Pengawasan<-c(9,5,7,5,7,13,15,11,16,10)
X<-matrix(c(rep(1,10),Gaji,Pengawasan),ncol=3,byrow=FALSE)
X
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1, ] 1 854 9
## [2, ] 1 607 5
## [3, ] 1 681 7
## [4, ] 1 202 5
## [5, ] 1 338 7
## [6, ] 1 951 13
## [7, ] 1 693 15
## [8, ] 1 163 11
## [9, ] 1 349 16
## [10, ] 1 151 10
```

Langkah 3: Melakukan Estimasi Parameter

```
B<-solve(t(X)%*%(X))%*%(t(X)%*%(Y))
Estimasi<-data.frame(Koefisien=c("intercept","Gaji
```

```
"", "Pengawasan"), B=c(B))
```

```
Estimasi
```

```
##      Koefisien          B
## 1 intercept -2.98377568
## 2      Gaji  0.04291186
## 3 Pengawasan 0.48725008
```

Dari hasil pengolahan di atas sehingga dapat kita membentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Produksi}_i = -2,98378 + 0,0429\text{Gaji}_i + 0,4873\text{Pengawasan}_i$$

Langkah 4: Menghitung Y produksi dan standar error

```
Y_cap<-as.matrix(B[1,1]+B[2,1]*X[,2]+B[3,1]*X[,3])
```

```
Y_cap.lm=lm(Y~Y_cap)
```

```
Y_cap.res=resid(Y_cap.lm)
```

```
Y_cap
```

```
##           [,1]
## [1,] 38.048200
## [2,] 25.499971
## [3,] 29.649949
## [4,]  8.120670
## [5,] 14.931182
## [6,] 44.159650
## [7,] 34.062892
## [8,]  9.370608
## [9,] 19.788463
## [10,] 8.368415
```

```
Y_cap.res
```

```
##      1      2      3      4      5      6
## -0.04819994 -1.49997122  2.35005128 -4.12066961  2.06881783  1.84034971
##      7      8      9     10
## -4.06289165 -1.37060772  0.21153668  4.63158463
```

Langkah 5: Melakukan Uji Simultan

```
n<-nrow(X)
p<-ncol(X)
sst<-sum((Y-mean(Y))^2)
```

```
sse<-sum((Y-X**B)^2)
ssr<-sst-sse
msr<-ssr/(p-1)
mse<-sse/(n-p)
mst<-sst/(n-1)
F_hitung<-msr/mse
pvaluef<-pf(F_hitung, (p-1), (n-p))
anova <- data.frame(source=c("Regression", "Error", "Total"), SS=c(ssr, sse, sst), MS=c(msr, mse, mst), F=c(F_hitung, "-", "-"), pvalue=c(pvaluef, "-", "-"))
anova
```

##	source	SS	MS	F	pvalue
## 1	Regression	1543.29623	771.64812	74.7061590675629	0.999981037534401
## 2	Error	72.30377	10.32911	-	-
## 3	Total	1615.60000	179.51111	-	-

Langkah 6: melakukan Uji Parsial

```
sse<-sum((Y-X**B)^2)
mse<-sse/(n-p)
inv_XtX<-solve(t(X)**(X))
SeB<-as.matrix(sqrt(diag(inv_XtX)*mse))
t_hitung<-B*1/SeB
pvaluef<-2*(1-pt(abs(t_hitung), n-p))
hasil <- data.frame(Koefisien=c("intercept", "Gaji", "Pengawasan"), B=c(B), SE_B=c(SeB), t_hitung=c(t_hitung), pvalue=c(pvaluef))
hasil
```

##	Koefisien	B	SE_B	t_hitung	pvalue
## 1	intercept	-2.98377568	3.185182633	-0.9367675	3.800631e-01
## 2	Gaji	0.04291186	0.003675343	11.6756045	7.640592e-06
## 3	Pengawasan	0.48725008	0.275322850	1.7697408	1.200818e-01

Langkah 8: Melakukan Pengujian Simultan dan Parsial secara otomatis

```
test<-lm(Produksi~Gaji+Pengawasan)
summary(test)
```

```
## Call:
## lm(formula = Produksi ~ Gaji + Pengawasan)
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -4.1207 -1.4676  0.0817  2.0117  4.6316
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -2.983776    3.185183  -0.937    0.38
## Gaji         0.042912    0.003675  11.676 7.64e-06 ***
## Pengawasan  0.487250    0.275323   1.770    0.12
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## Residual standard error: 3.214 on 7 degrees of freedom
```

```
## Multiple R-squared: 0.9552, Adjusted R-squared: 0.9425  
## F-statistic: 74.71 on 2 and 7 DF, p-value: 1.896e-05
```

Langkah 9: Menghitung koefisien Determinasi (R^2) dan R Adjusted R-Squared

```
n<-nrow(X)  
p<-ncol(X)  
sst<-sum((Y-mean(Y))^2)  
sse<-sum((Y-X*B)^2)  
ssr<-sst-sse  
msr<-ssr/(p-1)  
mse<-sse/(n-p)  
mst<-sst/(n-1)  
r_square<-1-sse/sst  
r_square  
  
## [1] 0.9552465  
  
r_square_adjusted<-1-mse/mst  
r_square_adjusted  
  
## [1] 0.9424598
```

- Gaji berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi
- Pengawasan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap produksi
- *Multiple R-squared*: 0,9552, menunjukkan sekitar 95,52% Variasi perubahan produksi di tentukan oleh gaji dan pengawasan,
- *Adjusted R-squared* merupakan koefisien determinasi yang telah dikoreksi dengan jumlah variabel dan penambahan ukuran sample yang dapat mengurangi unsur bias jika terjadi penambahan variabel maupun penambahan jumlah sampel. Nilai *Adjusted R-squared* diperoleh 0,9425 Variasi perubahan jumlah produksi dapat dijelaskan oleh gaji dan pengawasan sebesar 94,25%

DAFTAR PUSTAKA

- Cass, S. (2018) *The 2018 Top Programming Languages*, <https://spectrum.ieee.org/>. Available at: <https://spectrum.ieee.org/at-work/innovation/the-2018-top-programming-languages>.
- Conover, W. J. (1999) *Practical Nonparametric Statistics*. 3rd edn. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Creswell, J. . (2002) *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Jakarta: KIK Press.
- Dencik, A. B. et. al (2019) *Statistik Multivariat Analisis Anova, Manova, Ancova, Mancova, Repeated Measures dengan Aplikasi Excel dan SPSS*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gujarati, D. N. (2010) *Basic Econometrics*. New York: Mc Graw-hill Companies.
- Hadi, S. & Pamardiyanto, S. (1993) *Manual SPS-Paket Midi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hinkle, D.E., Wiersma, W., & Jurs, S. . (1979) *Applied Statistics for the Behavioral Sciences*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Hussein, S. (2021) *Apa itu R dan perbedaannya dengan RStudio*, www.geospasial.com. Available at: <https://geospasialis.com/perbedaannya-r-dengan-rstudio/>.
- Indriyantoro, Nur dan Supomo, B. (2002) *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kadir (2015) *Statistika Terapan Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kerlinger, N. F. (1995) *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kurniawan, Robert; dan Yuniarti, B. (2018) *Analisis Regresi Dasar dan Penerapannya dengan R*. Jakarta: Prenada Kencana Group.
- Madris (2020) *Statistika Penerapan Model Regresi dalam Penulisan Karya Ilmiah*. Makassar: Nas Media Pustaka.

- Mann, P. S; dan Lacke, C. . (2011) *Introductory Statistics, International Student Version*. 7th edn. Asia: John Wiley & Sons, Inc.
- Minium, E.W. & Clarke, R. B. (1982) *Elements of Statistical Reasoning*. New York: John Wiley & Sons.
- Montgomery, D. C; dan Runger, G. . (2011) *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 5th edn. United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Rahman, A. (2020) *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan R*. Makassar: UIN Alauddin Press.
- Riadi, E. (2016) *Statistika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS)*. Yogyakarta: Andi.
- Sedarmayanti, S. . (2011) *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Siegel, S. (2011) *Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences*. 2nd edn. New York: Mc Graw Hill.
- Smidth, R. K; dan Sanders, D. H. (2000) *Statistics a First Course*. Edited by 6. United States of America: McGraw-Hill Companies.
- Spiegel, M.R; dan Stephens, L. . (2008) *Statistics*. 4th edn. McGraw-Hill.
- Sudjana (1992) *Metode statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono (2013) *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi; dan Purwanto, S. . (2016) *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suliyanto (2011) *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Supardi, U. . (2013) *Aplikasi Statitika Dalam Penelitian (Konsep Statitika yang Lebih Komprehensif)*. Jakarta: Change Publication.
- Supranto, J. (2016) *Statistik Teori & Aplikasi*. 8 Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Team, R. C. (2020) *R: A Language and Environment for Statistical Computing.*, Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing.
- Tiro, M. A. (2008) *Dasar-Dasar Statistika*. Ketiga. Makassar: Andira Publisher.
- Usmadi (2020) 'Pengujian Persyaratan Analisis (Uji Homogenitas dan Uji Normalitas)', *Inovasi Pendidikan*, 7(1), pp. 50–62.
- Wapole (2012) *Probability and Statistics for Engineers and Scientist*. NINTH

EDIT. Boston: Prentice Hall International, Inc.

<https://cran.r-project.org/web/packages/psych/psych.pdf>

<https://cran.r-project.org/web/packages/pastecs/pastecs.pdf>

<https://cran.r-project.org/web/packages/doBy/doBy.pdf>



STATISTIKA PARAMETRIK

(Konsep, Kasus dan Analisis Data dengan Software R)

merupakan sistem untuk analisis data yang termasuk kelompok software statistik open source yang tidak memerlukan lisensi atau gratis, yang dikenal dengan freeware. Sampai saat ini, pengguna statistika di Indonesia masih belum banyak yang menggunakan

R untuk keperluan analisis data. Sebagian besar pengguna statistika di Indonesia masih menggunakan paket-paket statistik komersil, seperti SPSS, MINITAB, S-plus, SAS, atau Eviews lainnya.

Buku ini disusun agar memperoleh konsep yang matang dan mampu menerapkan teknik analisis data kuantitatif dalam proses penelitian baik secara manual sekaligus mampu mengolahnya melalui Software R (Rstudio) sehingga menghasilkan kesimpulan dan keputusan yang tepat dan akurat. Buku ini, selain memberikan konsep dan teori-teori terkait pengujian yang dilakukan di dalam statistika parametrik, dan disertai dengan kasus-kasus aplikasi penelitian di lapangan serta juga dilengkapi panduan langkah praktis mengaplikasi teori-teori tersebut dengan kasus penelitian yang ada melalui software R (Rstudio).

Buku ini menyajikan Konsep Penelitian dan Statistika; Mengenal Software R (Rstudio); Manajemen data pada R; Statistik deskriptif menjelaskan bagaimana menyajikan data dalam gambar dan grafik; juga menjelaskan bagaimana menghitung ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data baik data tunggal maupun kelompok serta uji statistik digunakan statistika parametrik diantaranya Uji Beda Populasi (Uji Z maupun Uji t; Korelasi Pearson, ANOVA (One or Two ANOVA test) dan Analisis Regresi.



Abdul Rahman, Dosen Tetap Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar sejak tahun 2015 dan sekarang diamanatkan sebagai Ketua Komite Penjaminan Mutu (KPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Tahun 2019 – 2024, lahir di O p o (B o n e) , 0 1 M e i 1 9 8 2 . M e n e m p u h

pendidikan SD, SMP dan SMA di Kabupaten Bone, kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana dengan predikat Cum Laude pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar 2005, Magister of Science (M.Si) program studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin 2009. Sekarang menempuh program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin mulai tahun 2019. Sejak bergabung di Jurusan Ilmu Ekonomi UIN Alauddin Makassar penulis mengampu mata kuliah Ekonometrika; Statistika Ekonomi; Ekonomi Pembangunan; Ekonomi Perencanaan Pembangunan; Ekonomi Demografi dan Ekonomi Mikro. Beberapa buku yang ditulis, diantaranya Pengantar Kewirausahaan; Ekonomi Internasional, Ekonomi Publik, Pengantar Ilmu Ekonomi; Ekonometrika Terapan; Teori dan Aplikasi dengan R, Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Teoritis dan Studi Empiris dan beberapa jurnal nasional maupun internasional.