

Tri Azisah Nurman

A.1.3.29

# Pra-Kalkulus

PRA-KALKULUS

Tri Azisah Nurman



ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS

# PRA-KALKULUS

Try Azisah Nurman



Alauddin University Press



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

*All Rights Reserved*  
**PRA-KALKULUS**

Penulis:  
**Try Azisah Nurman**

Editor:  
**Wahyuni Abidin**

Cetakan: I 2014  
viii+204 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN :

Alauddin University Press  
Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa

**SAMBUTAN REKTOR**

*Jika engkau ingin meng"abadi", maka tinggalkanlah "Legacy"*

Ungkapan di atas memberi gambaran bahwa setiap manusia hendaknya selalu melahirkan karya terbaiknya untuk dipersembahkan kepada umat. Karya itu akan menjadi sebuah *legacy* yang akan selalu diingat dan dikenang, bahkan diabadikan dalam catatan sejarah peradaban anak manusia. Jutaan bahkan milyaran anak manusia telah dan akan lahir di permukaan dunia ini, namun tidak semua mampu mencatatkan dirinya dalam kelindan sejarah yang "menyejarah". Hanya sebagian kecil anak manusia yang mampu menghadirkan dan meng"abadi"kan dirinya dalam garis lingkaran lintasan sejarah.

Dalam bingkai dan konstruksi emosional, manusia pada hakikatnya ingin abadi. Itulah sebabnya manusia ingin selalu mengabadikan momentum penting dalam ruang dan waktu yang senantiasa berubah. Mereka membuat gambar, foto, lukisan, dan sejenisnya yang seakan-akan berkeinginan menyetop waktu yang senantiasa berubah. Demikian pula aktivitas manusia membangun monumen bersejarah tidak lain tujuannya untuk mengabadikan sebuah peristiwa penting dalam sejarah peradaban manusia, bahkan Khairil Anwar berkata: "*Aku ingin hidup seribu tahun lagi*".

Karya akademik pada hakikatnya merupakan sebuah monumen penting dalam kehidupan yang dapat menjadi *legacy*. Karya itu dapat dinikmati oleh siapa saja yang cinta terhadap pengetahuan. Karya akademik bukan sekadar sebuah tulisan yang menjadi hiasan di dalam rak, lemari atau ruang baca, tetapi dia mampu melahirkan perubahan dan memberikan pencerahan kepada manusia. Terlebih

dalam perspektif eskatologis, karya akademik dapat menjadi amal jariah di "alam sana".

Atas dasar kesadaran itulah, maka program Gerakan Seribu Buku (GSB) ini dilaksanakan, dengan harapan setiap dosen mampu melahirkan "legacy" dalam catatan kehidupannya berupa karya tulis yang dipublikasikan. Gerakan ini diharapkan menjadi "trigger" untuk melahirkan karya-karya berikutnya.

Saya merasa gembira bahwa dosen UIN Alauddin tidak saja mampu berorasi di atas mimbar, tetapi juga dapat menuangkan gagasan, ide, dan pikirannya dalam bentuk tulisan. Hingga periode akhir masa jabatan saya sebagai Rektor, program GSB ini telah tuntas dilaksanakan. Itu artinya, hingga saat ini tidak kurang dari 1000 buah karya akademik telah dipublikasikan oleh para dosen UIN Alauddin Makassar. Fakta ini harus diapresiasi dan menjadi catatan penting bagi pejabat (Rektor) berikutnya.

Karya tulis merupakan perbendaharaan terbesar di dunia akademik. Hanya dengan budaya menulis dan membaca, maka dunia akademik menjadi hidup, bahkan al-Quran mengisyaratkan bahwa lahir dan hadirnya pengetahuan serta peradaban harus diawali dengan budaya "iqra/baca" dan "al-qalam/pena". Karena itulah, UIN sebagai kampus peradaban harus menjadi pioneer dari tradisi literasi ini, sebab rendahnya budaya "baca-tulis" pada suatu bangsa atau sebuah kampus mengindikasikan lemahnya kesadaran terhadap eksistensi diri, alam, dan Tuhan.

Samata, 2 Oktober 2014  
Rektor,

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, MS

## KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam dimohonkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, yang telah membimbing umat manusia dari berbagai permasalahan menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Banyak pihak yang memberikan andil dalam, penulisan buku ini, sehingga saya berkewajiban, secara khusus untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam penulisan buku ini.

Semua bantuan tersebut di atas penulis tak dapat membalasnya, selain menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diiringi do'a semoga amal baik mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan pahala yang berlipat ganda.

Berpegang pada prinsip "tak ada gading yang tak retak" dan tidak ada istilah final dalam ilmu, maka penulis menyadari bahwa buku ini bukan karya yang final. Oleh karena itu dengan senang hati, kritik, dan saran serta pandangan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini.

Akhirnya penulis berharap semoga buku ini ada manfaatnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Amin.

Makassar, september 201

Try Azisah Nurman

**DAFTAR ISI**

Sambutan Rektor ..... iii  
Kata Pengantar ..... v  
Daftar Isi ..... vii

**1. Limit dan Diferensial**

1.1. Definisi Limit..... 1  
1.2. Bentuk Tak Tentu ..... 6  
1.3. Teorema Limit..... 8  
1.4. Limit Tak Hingga..... 11  
1.5. Kekontinuan..... 15  
1.6. Diferensial..... 19  
Soal Latihan..... 34  
Soal Ujian..... 36  
Soal Pilihan Ganda..... 40

**2. Turunan**

2.1. Turunan bilangan konstan ..... 48  
2.2. Turunan variabel berpangkat ..... 50  
2.3. Turunan dari penjumlahan dua atau lebih  
fungsi..... 53  
2.4. Turunan dari perkalian dua atau lebih  
fungsi..... 56  
2.5. Turunan dari hasil bagi dua fungsi..... 58  
2.6. Turunan dari fungsi berpangkat ..... 59  
2.7. Turunan dari fungsi bentuk akar ..... 61  
2.8. Aturan rantai ..... 65  
2.9. Turunan dari invers suatu fungsi..... 67  
2.10. Turunan dari fungsi implisit..... 69  
2.11. Turunan fungsi trigonometri ..... 72  
2.12. Turunan fungsi logaritma natural (ln) ..... 76

2.13. Turunan bilangan konstanta berpangkat variabel.....	76
<b>3. Integral</b>	
3.1. Definisi Integral .....	95
3.2. Daerah di bawah kurva .....	96
3.3. Integral Tak Tentu .....	105
3.4. Aturan Integral .....	108
3.5. Integral Tentu.....	114
<b>4. Bentuk-bentuk Integral</b>	
4.1. Integral variabel berpangkat.....	137
4.2. Integral konstanta.....	138
4.3. Integral Penjumlahan.....	139
4.4. Integral fungsi yang berpangkat .....	141
4.5. Integral pembagian .....	145
4.6. Integral konstanta berpangkat variabel.....	152
4.7. Integral fungsi trigonometri.....	158
4.8. Integral fungsi berpangkat trigonometri.....	165
<b>Lampiran.....</b>	<b>185</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>203</b>
<b>Riwayat Hidup Penulis.....</b>	<b>204</b>

## BAB 1 LIMIT DAN DIFERENSIAL

Limit dan diferensial merupakan materi awal dari kalkulus, yang sangat penting dan merupakan metode yang sangat baik pada komputasi.

Materi dari konsep limit sangatlah penting, karena merupakan pusat dari teori dan operasi dari kalkulus. Pada bab ini kita akan membahas definisi limit, beberapa bentuk dasar dari limit, dan beberapa bentuk umumnya yang akan dilengkapi dengan contoh permasalahannya.


### 1.1. Definisi Limit

Sebelum masuk pada materi diferensial, kita harus memahami dengan seksama konsepnya. Salah satu konsep yang sesuai adalah limit dari suatu fungsi. Kita akan sering menjumpai penyelesaian dari suatu permasalahan yang akan membutuhkan pencarian nilai limit dari suatu fungsi terlebih dahulu. Penjelasan tentang limit akan dimulai dengan pemahaman secara intuisi dari suatu titik yang diketahui.

Misalkan terdapat suatu fungsi dengan ditentukan oleh persamaan:

$$y = f(x) = x^2$$

yang dapat kita lihat grafiknya pada gambar 1-1. Titik  $P$  merupakan titik yang berkorespondensi dengan titik  $y = 16$  dan  $x = 4$ . Persekitaran dari  $y$  memberikan nilai  $x$  yang mendekati titik  $x = 4$  yang merupakan arah pembahasan kita. Sekarang kita akan menghapus titik  $P$ , yang ditandai dengan bulatan pada grafik.

Gambar 1-1. Grafik  $y = x^2$ 

Kita akan memulai dengan menghitung nilai yang berada pada interval antara (dan termasuk)  $x = 2$  sampai pada  $x = 6$  yang dapat digambarkan pada gambar 1-1 yang merupakan interval  $AB$ . Interval ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$2 \leq x \leq 6 \quad \text{atau} \quad 0 \leq |x - 2| \leq 4$$

Berkorespondensi pada interval di sumbu  $y$  antara (dan termasuk)  $y = 4$  sampai  $y = 36$ . Dapat dituliskan

$$4 \leq y \leq 36$$

Sekarang kita mengambil interval yang lebih kecil,  $DE$ , masih disekitaran  $x = 4$  dengan mengambil interval  $x = 3$  sampai pada  $x = 5$ , dan diperoleh korespondensi interval pada sumbu  $y$  antara (dan termasuk)  $y = 9$  sampai  $y = 25$ . Interval untuk  $x$  dan  $y$  ini ditulis sebagai berikut:

$$3 \leq x \leq 5 \quad \text{dan} \quad 9 \leq y \leq 25$$

Setelah kita mengambil interval di sumbu- $x$  pada sekitaran  $x = 4$  (interval  $GH$  dan  $JK$ ) kita mendapati nilai dari

fungsi  $y = x^2$  yang secara perlahan-lahan akan mendekati titik  $y = 16$ . Hal ini dapat kita lihat dengan jelas pada tabel 1-1, di bawah ini.

Tabel 1-1. Tabel Nilai untuk  $f(x) = x^2$ 

Interval $x$	Interval $f(x) = y$
2 - 6	4 - 36
3 - 5	9 - 25
3,5 - 4,5	12,25 - 20,25
3,9 - 4,1	15,21 - 16,81

Walaupun kita hanya menggunakan beberapa interval pada sumbu- $x$ , kita akan dengan mudah melihat bahwa kita dapat memperkirakan nilai di sumbu- $y$  yang mendekati persekitaran dengan memperkirakan nilai  $x$  yang mendekati  $x = 4$ .

Dari beberapa percobaan kita yang bernilai benar, maka kita dapat mengarah ke kesimpulan bahwa limit dari  $x^2$  adalah: bila  $x$  mendekati 4 maka hasil untuk  $y$  akan mendekati 16. Dalam lambang matematisnya, kita tuliskan:

$$\lim_{x \rightarrow 4} x^2 = 16$$

Secara garis besarnya kita dapat menuliskan dalam bentuk umumnya sebagai berikut:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \dots (1.1)$$

Persamaan (1.1) berarti bahwa jika  $x$  mendekati  $a$ , maka limit dari  $f(x)$  akan mendekati  $L$ , dimana  $L$  merupakan nilai limit dari  $f(x)$  sebagaimana  $x$  mendekati  $a$ . Tidak ada nilai yang terbentuk untuk  $f(a)$ , untuk titik  $x = a$  tidak terdapat nilai dari  $f(x)$  di titik tersebut. Walaupun demikian limit dari  $f(x)$  untuk  $x$  mendekati  $a$  akan terdefinisi.

Sekarang kita akan mendefinisikan limit.

Misalkan  $f(x)$  terdefinisi untuk semua nilai  $x$  pada interval di persekitaran  $x = a$  tetapi tidak tepat di  $x = a$ . Maka terdapat tepat satu bilangan  $L$ , sedemikian sehingga untuk setiap bilangan positif  $\varepsilon$  (epsilon), yang sangat kecil, berlaku

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

Dibuktikan bahwa akan selalu ada bilangan positif  $\delta$  (delta) sedemikian sehingga

$$0 < |x - a| < \delta$$

Maka dapat dikatakan  $L$  merupakan limit dari  $f(x)$  untuk  $x$  mendekati  $a$ , dan kita tuliskan secara matematis

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Hal ini berarti bahwa untuk setiap bilangan  $\varepsilon > 0$  yang disebutkan, akan selalu didapatkan bilangan  $\delta$  sedemikian sehingga selisih antara  $f(x)$  dan  $L$  lebih kecil daripada bilangan  $\varepsilon$  sehingga

$$0 < |x - a| < \delta$$

Contoh: Carilah  $\delta > 0$ , andaikan diketahui  $\varepsilon = 0,1$  dan

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{3(x - 1)} = 1$$

Penyelesaian:

Dari pertanyaan di atas, maka dapat kita katakan bahwa kita harus menemukan suatu bilangan  $\delta$  sedemikian sehingga untuk setiap titik kecuali  $x = 1$ , kita memiliki selisih antara  $f(x)$  dan 1 yang lebih kecil daripada  $\varepsilon = 0,1$ . Kita tuliskan:

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\left| \frac{x^2 + x - 2}{3(x - 1)} - 1 \right| < 0,1$$

Sedangkan kita ketahui bahwa

$$\begin{aligned} \frac{x^2 + x - 2}{3(x - 1)} - 1 &= \frac{(x + 2)(x - 1)}{3(x - 1)} - 1 \\ &= \frac{(x + 2)}{3} - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{x + 2 - 3}{3} \\ &= \frac{x - 1}{3} \end{aligned}$$

Sehingga

$$\left| \frac{x^2 + x - 2}{3(x - 1)} - 1 \right| < 0,1$$

$$\left| \frac{x - 1}{3} \right| < 0,1$$

$$|x - 1| < 0,3$$

Karena

$$0 < |x - a| < \delta$$

$$0 < |x - 1| < \delta$$

maka  $\delta = 0,3$  dan kita memperoleh hasil ini sesuai dengan definisi dari limit.

Jika limit suatu fungsi ada, maka

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

sehingga dapat dikatakan bahwa kita dapat menghitung limit suatu fungsi dengan cara substitusi.

Sebagai perbandingan, untuk mendapatkan limit dari fungsi  $f(x) = x^2 - 3x + 2$  untuk  $x$  mendekati 3, maka kita substitusi 3 untuk  $x$  pada fungsi. Maka

$$\begin{aligned} f(3) &= 3^2 - 3(3) + 2 \\ &= 9 - 9 + 2 \\ &= 2 \end{aligned}$$

Karena  $x$  merupakan variabel, hal ini dapat diasumsikan bahwa suatu nilai yang mendekati 3 seperti yang kita inginkan; dan yang paling dekat kita pilih nilai  $x$  menuju 3, nilai  $f(x)$  yang paling dekat akan mendekati nilai 2. Sedemikian sehingga, 2 dikatakan limit dari  $f(x)$  seperti halnya  $x$  mendekati 3, dan kita tuliskan

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 3x + 2) = 2$$

## Masalah Praktis

Carilah limit dari tiap-tiap fungsi di bawah ini:

1.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 1}{2x - 1}$
2.  $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 2x + 3)$
3.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a}{a}$
4.  $\lim_{t \rightarrow 0} (5t^2 - 3t + 2)$
5.  $\lim_{E \rightarrow 6} \frac{E^3 - E}{E - 1}$
6.  $\lim_{Z \rightarrow 0} \frac{Z^2 - 3Z + 2}{Z - 4}$

## Jawaban

- |      |       |                   |
|------|-------|-------------------|
| 1. 1 | 2. 3  | 3. $a - 1$        |
| 4. 2 | 5. 42 | 6. $\frac{-1}{2}$ |

## 1.2. Bentuk Tak Tentu

Ketika nilai dari suatu limit tidak dapat diperoleh dengan cara substitusi, melainkan kita akan menjumpai nilai limit dengan bentuk lain seperti di bawah ini, maka kita akan menggunakan metode lain untuk menemukan nilai limit yang bernilai:

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, (\infty)0, 0^0, \infty^0, 1^\infty$$

Bentuk-bentuk di atas dikatakan sebagai bentuk tak tentu.

Ada banyak metode untuk menghitung bentuk tak tentu. Dua metode untuk menghitung bentuk tak tentu antara lain (1) faktorisasi dan (2) pembagian pembilang dan penyebutnya dengan pangkat variabel terbesar.

Terkadang faktorisasi akan dapat menyelesaikan bentuk tak tentu.

Contoh: Carilah limit untuk  $x$  mendekati 3 dari persamaan:

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

Penyelesaian:

Dengan cara substitusi, kita dapatkan

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{0}{0}$$

dimana bentuk yang dihasilkan merupakan bentuk tak tentu. Kita harus mencari metode untuk menemukan limitnya. Faktorisasi sangat memudahkan, dimana proses faktorisasinya sebagai berikut:

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x + 3)(x - 3)}{x - 3} = x + 3$$

sehingga

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} x + 3 = 6$$

dan kita memperoleh limit tentu yaitu 6

Terkadang kita akan mendapatkan hasil bentuk tak tentu ketika kita berusaha mencari nilai limit fungsi sebagai variabel tak bebas yang mendekati tak hingga

Contoh: Carilah limit untuk  $x \rightarrow \infty$  dari persamaan:

$$\frac{x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 2x}{3x^4 - 2x^2 + 1}$$

Penyelesaian:

Jika kita misalkan  $x$  mendekati tak hingga pada bentuk yang sebenarnya, maka kita mendapatkan

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 2x}{3x^4 - 2x^2 + 1} = \frac{\infty}{\infty}$$

bentuk di atas merupakan bentuk yang belum sederhana. Sehingga jika kita membagi antara pembilang dan penyebutnya dengan pangkat tertinggi dari variabel  $x$  yaitu  $x^4$ , kita akan mendapatkan

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 2x}{3x^4 - 2x^2 + 1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^4}{x^4} + \frac{2x^3}{x^4} - \frac{3x^2}{x^4} + \frac{2x}{x^4}}{\frac{3x^4}{x^4} - \frac{2x^2}{x^4} + \frac{1}{x^4}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{3 - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^4}} \\ &= \frac{1 + 0 - 0 + 0}{3 - 0 + 0} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Sehingga kita mendapatkan hasil limit  $\frac{1}{3}$ .

**Masalah Praktis**

Carilah limit dari tiap-tiap fungsi di bawah ini:

1.  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

2.  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$

3.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 3}{7x - 6}$

4.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^4 - a^4}{x - a}$

5.  $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{2a^2b - 3ab^2 + 2ab}{5ab - a^3b^2}$

6.  $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{(x - a)^2 - x^2}{a}$

**Jawaban**

1. 4

2. 5

3.  $\frac{2}{7}$

4.  $4a^3$

5.  $\frac{2-3b}{5}$

6.  $-2x$

**1.3. Teorema Limit**

Kita akan lebih sering mengoperasikan metode limit untuk mendapatkan suatu hasil atau nilai. Pada bagian ini

kita akan membahas tentang teorema-teorema tentang limit, tetapi kita tidak akan menyajikan bukti-bukti dari teorema-teorema tersebut. Melainkan teorema tersebut akan dilengkapi dengan contoh-contoh.

Diasumsikan kita memiliki tiga fungsi  $x$  yang sederhana. Kemudian, kita misalkan fungsi ini  $f(x)$ ,  $g(x)$ , dan  $h(x)$  yang memiliki limit sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x) &= A \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) &= B \\ \lim_{x \rightarrow a} h(x) &= C \end{aligned}$$

**Teorema 1.**

Limit dari jumlah dua fungsi sama dengan jumlah dari limit dua fungsi tersebut.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= A + B \end{aligned}$$

Teorema ini akan memaksa kita untuk memasukkan nilai lain pada fungsi, sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x) + h(x)] &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) + \lim_{x \rightarrow a} h(x) \\ &= A + B + C \end{aligned}$$

Contoh: Carilah limit dari  $(x - 3)^2$  untuk  $x \rightarrow 3$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} (x - 3)^2 &= \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 6x + 9) \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} x^2 - \lim_{x \rightarrow 3} 6x + \lim_{x \rightarrow 3} 9 \\ &= 9 - 18 + 9 \\ &= 0 \end{aligned}$$

**Teorema 2.**

Limit dari konstanta  $c$  kali fungsi  $f(x)$  sama dengan konstanta  $c$ , kali limit fungsi.

$$\lim_{x \rightarrow a} c \cdot f(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) \\ = c \cdot A$$

Contoh: Carilah limit dari  $2x^2$  untuk  $x \rightarrow 3$

Penyelesaian:

$$\lim_{x \rightarrow 3} 2x^2 = 2 \lim_{x \rightarrow 3} x^2 \\ = 2 \cdot 9 \\ = 18$$

### Teorema 3.

Limit dari perkalian dua fungsi sama dengan perkalian limit dari keduanya.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \left[ \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right] \left[ \lim_{x \rightarrow a} g(x) \right] \\ = AB$$

Contoh: Carilah limit dari  $(x^2 - x)(\sqrt{2x})$  untuk  $x \rightarrow 2$

Penyelesaian:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - x)(\sqrt{2x}) = \left[ \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - x) \right] \left[ \lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{2x}) \right] \\ = (4 - 2)(\sqrt{4}) \\ = 4$$

### Teorema 4.

Limit dari pembagian dua fungsi sama dengan pembagian limit dari keduanya, dimana limit dari penyebutnya tidak boleh sama dengan nol.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{A}{B}, \text{ jika } B \neq 0$$

Contoh: Carilah limit untuk  $x \rightarrow 3$  dari persamaan

$$\frac{3x^2 + x - 6}{2x - 5}$$

Penyelesaian:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 + x - 6}{2x - 5} = \frac{\lim_{x \rightarrow 3} 3x^2 + x - 6}{\lim_{x \rightarrow 3} 2x - 5} \\ = \frac{24}{1} \\ = 24$$

### Masalah Praktis

Carilah limit di bawah ini, dengan menggunakan teorema yang telah ditetapkan:

1.  $x^2 + x + 2$  untuk  $x \rightarrow 1$  (Teorema 1)a
2.  $7(x^2 - 13)$  untuk  $x \rightarrow 4$  (Teorema 2)
3.  $(5x^4)(x - 1)$  untuk  $x \rightarrow 2$  (Teorema 3)
4.  $\frac{2x^2 + x - 4}{3x - 7}$  untuk  $x \rightarrow 3$  (Teorema 4)

### Jawaban

- |       |                   |
|-------|-------------------|
| 1. 4  | 2. 21             |
| 3. 80 | 4. $\frac{17}{2}$ |

### 1.4. Limit Tak Hingga

#### DEFINISI

Suatu variabel yang mendekati nol pada limit disebut sebagai limit tak hingga. Hal ini dapat ditulis sebagai berikut

$$\lim V = 0 \text{ atau } V \rightarrow 0$$

yang berarti, seperti yang disebutkan pada penjelasan sebelumnya bahwa nilai bilangan dari  $V$  merupakan nilai yang lebih kecil dari suatu bilangan positif  $\epsilon$ .

Jika  $\lim V = L$  maka  $\lim V - L = 0$  yang mengindikasikan selisih antara variabel dan limitnya sebagai suatu yang tak hingga. Dalam artian lain, jika selisih antara variabel dan

suatu konstanta merupakan suatu bilangan tak terhingga, maka variabelnya mendekati konstanta limitnya.

Contoh: Untuk  $x$  yang menjadi makin besar tanpa batas, apakah  $\frac{1}{x^2}$  merupakan bentuk tak hingga?

Penyelesaian:

Berdasarkan definisi tak hingga, jika  $\frac{1}{x^2}$  mendekati 0 untuk  $x$  yang merupakan nilai yang makin besar tanpa batas, maka  $\frac{1}{x^2}$  merupakan tak hingga. Kita peroleh bahwa  $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$  dan hal inilah yang menyebabkannya menjadi tak hingga.

Contoh: Untuk  $x$  yang mendekati 2, apakah  $\frac{x^2-4}{x-2} - 4$  merupakan bentuk tak hingga?

Penyelesaian:

Dengan mensubstitusi definisi tak hingga, jika selisih antara  $\frac{x^2-4}{x-2}$  dan 4 mendekati 0, untuk  $x$  mendekati 2, maka  $\frac{x^2-4}{x-2} - 4$  merupakan tak hingga. Dengan mensubstitusi langsung kita dapat menemukan suatu bentuk tak hingga; sedemikian sehingga, kita menggunakan pengetahuan kita dan mengubahnya menjadi

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x + 2)(x - 2)}{x - 2} = x + 2$$

sehingga

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

Selisih antara 4 dan 4 adalah 0, sehingga bentuk  $\frac{x^2-4}{x-2} - 4$  merupakan suatu bentuk yang tak hingga untuk  $x$  mendekati 2

### JUMLAH

Suatu bentuk limit tak hingga merupakan variabel yang mendekati 0. Kita nyatakan bahwa  $\epsilon$  dan  $\delta$ , seperti yang terlihat pada tabel 1-2, merupakan tak hingga karena keduanya mendekati 0 seperti yang terlihat.

### Teorema 1.

Penjumlahan secara aljabar dari beberapa bilangan tak hingga menghasilkan bilangan tak hingga

Pada tabel 1-2, bilangan  $\epsilon$  dan  $\delta$  mendekati 0, sehingga jumlah dari keduanya mendekati 0; dengan definisi jumlah ini merupakan tak hingga. Pendekatan ini mungkin akan digunakan untuk jumlah dari beberapa bilangan tak hingga.

Tabel 1-2. Jumlah Bilangan Tak Hingga

$\epsilon \backslash \delta$	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{256}$	$\rightarrow 0$
1	2	$\frac{5}{4}$	$\frac{17}{16}$	$\frac{65}{64}$	$\frac{257}{256}$	
$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{17}{64}$	$\frac{65}{256}$	
$\frac{1}{16}$	$\frac{17}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{64}$	$\frac{17}{256}$	
$\frac{1}{64}$	$\frac{65}{64}$	$\frac{17}{64}$	$\frac{5}{64}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{5}{256}$	
$\frac{1}{256}$	$\frac{257}{256}$	$\frac{65}{256}$	$\frac{17}{256}$	$\frac{5}{256}$	$\frac{1}{128}$	
$\downarrow$						
0						

### HASIL KALI

### Teorema 2.

Hasil kali dari beberapa bilangan tak hingga merupakan bilangan tak hingga

Pada tabel 1-3, hasil kali dari dua bilangan tak hingga  $\epsilon$  dan  $\delta$ , merupakan suatu bilangan tak hingga seperti yang diperlihatkan. Hasil kali dari beberapa bilangan tak hingga juga merupakan bilangan tak hingga dengan pendekatan yang sama seperti yang diperlihatkan pada dua bilangan tersebut.

### Teorema 3.

Hasil kali dari bilangan konstanta dan suatu bilangan tak hingga akan menghasilkan bilangan tak hingga juga.

Hal ini dapat diperlihatkan pada tabel 1-3, dengan menentukan bilangan konstanta  $\epsilon$  dan  $\delta$  serta memperhatikan hasil kalinya sebagai variabel yang mendekati 0.

Tabel 1-3. Perkalian Bilangan Tak Hingga

$\epsilon \backslash \delta$	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{256}$	$\rightarrow 0$
1	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{256}$	
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{256}$	$\frac{1}{1024}$	
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{256}$	$\frac{1}{1024}$	$\frac{1}{4096}$	
$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{256}$	$\frac{1}{1024}$	$\frac{1}{4096}$	$\frac{1}{16384}$	
$\frac{1}{256}$	$\frac{1}{256}$	$\frac{1}{1024}$	$\frac{1}{4096}$	$\frac{1}{16384}$	$\frac{1}{65536}$	
$\downarrow$ 0						

### KESIMPULAN

Simbol tak hingga telah digunakan untuk menggambarkan simbol  $\Delta x$  yang mendekati nol. Besaran  $\Delta x$  merupakan selisih dari  $x$ , dimana selisih ini digunakan untuk mengindikasikan perubahan  $x$  yang telah kita buat.

Berarti  $x + \Delta x$  mengindikasikan bahwa penetapan bilangan konstanta  $x$  dan perubahan  $x$  dengan bilangan variabel kita sebut dengan  $\Delta x$ .

Selisih yang sangat kecil terkadang disebut dengan *diferensial*. Bilangan  $\Delta x$  yang kecil ini diberi simbol dengan  $dx$ . Diferensial  $\theta$  adalah  $d\theta$  dan untuk  $y$  adalah  $dy$ . Limit dari  $\Delta x$  yang mendekati 0, tentu saja 0; tetapi bukan berarti bahwa perbandingan dari dua bilangan tak hingga ini tak bisa menjadi suatu bilangan riil atau fungsi riil dari  $x$ . Sebagai contoh, tak masalah seberapa kecil  $\Delta x$  yang kita pilih, perbandingan  $\frac{dy}{dx}$  tetap akan sama dengan 1.

Pada bagian bentuk tak tentu, metode untuk menghitung bentuk  $\frac{0}{0}$  telah diperlihatkan. Bentuk ini menghasilkan apapun bentuk limit yang diambil dari satu bentuk tak hingga ke bentuk tak hingga lainnya. Dalam setiap kasus limit selalu menghasilkan bilangan riil.

### 1.5. Kekontinuan

Suatu fungsi  $f(x)$  kontinu pada  $x = a$  jika ketiga syarat di bawah ini dipenuhi, yaitu:

1.  $f(x)$  terdefinisi pada  $x = a$
2. Limit  $f(x)$  ada pada  $x$  mendekati  $a$  atau  $x \rightarrow a$
3. Nilai  $f(x)$  pada  $x = a$  sama dengan limit  $f(x)$  pada  $x = a$  atau

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Jika suatu fungsi  $f(x)$  tidak kontinu pada  $x = a$  maka dikatakan bahwa  $f(x)$  tidak kontinu atau diskontinu pada  $x = a$ . Kita akan menggunakan contoh untuk menunjukkan maksud dari pernyataan ini.

Contoh: Pada gambar 1-2, apakah fungsi  $f(x) = x^2 + x - 4$  kontinu pada  $f(2)$ ?

Penyelesaian:

Berdasarkan syarat yang harus dipenuhi, kita peroleh:


1.  $f(2) = 4 + 2 - 4 = 2$ , berarti  $f(x)$  terdefinisi pada  $x = 2$
2. Mencari limit  $f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + x - 4 = 2$$

3. Ternyata hasil untuk syarat 1 dan 2 sama, yaitu:

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + x - 4 = f(2)$$

Karena ketiga syarat dipenuhi, maka kurva pada gambar kontinu pada  $x = 2$ .




Gambar 1-2. Grafik Fungsi  $f(x) = x^2 + x - 4$

Contoh: Pada gambar 1-3, apakah fungsi  $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$  kontinu pada  $f(2)$ ?

Penyelesaian:

Berdasarkan syarat yang harus dipenuhi, kita peroleh:

1.  $f(2)$  tidak terdefinisi pada  $x = 2$



Gambar 1-3. Grafik Fungsi  $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$

Karena syarat pertama tidak dipenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut tidak kontinu atau diskontinu pada  $x = 2$ .

Walaupun begitu, dengan mengurai fungsi tersebut sebagai berikut:


$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 4, & x = 2 \end{cases}$$

Kita akan memiliki fungsi yang kontinu pada  $x = 2$

Catatan: Nilai 4 pada  $x = 2$  diperoleh dengan cara memfaktorkan pembilang dari  $f(x)$  dan menyederhanakannya.

Bentuk diskontinu yang diperlihatkan di atas terjadi ketika kita bertemu dengan fungsi tangen dari suatu sudut. Gambar 1-4 merupakan gambar dari tangen suatu sudut

bervariasi dari  $0^\circ$  sampai  $90^\circ$ ; yaitu dari 0 sampai  $\frac{\pi}{2}$ . Nilai tangen dari  $\frac{\pi}{2}$  tak terdefinisi. Sehingga fungsi dikatakan tidak kontinu pada  $\frac{\pi}{2}$ .



Gambar 1-4. Grafik dari fungsi tangen

#### Masalah Praktis

Pada fungsi yang didefinisikan di bawah ini, carilah titik di mana fungsi tersebut tidak kontinu dan tentukanlah nilai dari fungsi yang telah didefinisikan tersebut sehingga fungsinya kontinu:

$$1. f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$$

$$2. f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 3}$$

$$3. f(x) = \frac{x^2 + x - 12}{3x - 9}$$

#### Jawaban

$$1. x = 2, f(2) = 3$$

$$2. x = -3, f(-3) = -4$$

$$3. x = 3, f(3) = \frac{7}{3}$$

#### 1.6. Diferensial

Pada bagian ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang limit dan menggali pengetahuan kita tentang derivatif (turunan), dasar dari kalkulus diferensial.

Kita misalkan bahwa kita memiliki suatu fungsi awal  $x$ , yaitu  $y = x^2$ . Jika  $x$  diganti dengan nilai 10, maka nilai  $y$  yang berpasangan adalah  $(10)^2$  atau 100. Sekarang, jika kita tambahkan nilai  $x$  dengan 2, menjadi 12, kita mungkin akan mengatakan bahwa penambahan 2 ini merupakan penambahan dari  $\Delta x$ . Hal ini mengakibatkan penambahan pula pada nilai  $y$ , dan kita dapat menyebutkan hal ini sebagai hasil penambahan atau  $\Delta y$ . Dari sini kita dapat menuliskan

$$\begin{aligned} y + \Delta y &= (x + \Delta x)^2 \\ &= (10 + 2)^2 \\ &= 144 \end{aligned}$$

berarti  $x$  meningkat dari 10 ke 12,  $y$  meningkat dari 100 ke 144 sehingga

$$\Delta x = 12 - 10 = 2$$

dan

$$\Delta y = 144 - 100 = 44.$$

Jadi

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{44}{2} = 22.$$

Mari perhatikan perbandingan  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ , karena limit dari perbandingan ini pada saat  $\Delta x$  mendekati 0 merupakan derivatif (turunan) dari  $y = f(x)$ .

Tabel 1-4. Nilai kemiringan

Variabel	Nilai Variabel						
$\Delta x$	2	1	0,5	0,2	0,1	0,01	0,0001
$\Delta y$	44	21	10,25	4,04	2,01	0,2001	0,00200001
$\frac{\Delta y}{\Delta x}$	22	21	20,5	20,2	20,1	20,01	20,0001

Seperti yang telah kita bahas sebelumnya tentang limit, bahwa  $\Delta x$  yang makin kecil, akan menghasilkan  $\Delta y$  yang akan semakin kecil pula. Untuk masalah kita saat ini, perbandingan  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  mendekati 20, hal ini diperlihatkan pada tabel 1-4.

Kita dapat menggunakan banyak cara yang lebih sederhana untuk menemukan bahwa limit dari  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  untuk  $\Delta x$  mendekati 0, pada kasus ini, sama dengan 20. Kita memiliki dua persamaan,

$$y + \Delta y = (x + \Delta x)^2 \text{ dan } y = x^2.$$

Dengan menguraikan persamaan pertama kita akan memperoleh

$$y + \Delta y = x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2$$

dan berdasarkan persamaan kedua  $y = x^2$ , berarti kita memiliki

$$\Delta y = 2x\Delta x + (\Delta x)^2$$

Kedua ruas kita bagi dengan  $\Delta x$  menghasilkan

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 2x + \Delta x$$

Sekarang, ambil limit dimana  $\Delta x$  mendekati 0, maka akan menghasilkan

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 2x$$

Sedemikian sehingga,

$$\frac{dy}{dx} = 2x \quad \dots (1-1)$$

Catatan: Persamaan (1-1) merupakan salah satu simbol turunan  $y$  terhadap  $x$ . Simbol turunan lainnya adalah

$$\frac{dy}{dx} = y' = f'(x) = D(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Persamaan (1-1) memiliki arti bahwa hal tersebut tepat dan benar untuk semua nilai  $x$ . Sehingga jika  $x = 10$  maka  $\frac{dy}{dx} = 2(10) = 20$ . Dan jika  $x = 3$  maka  $\frac{dy}{dx} = 2(3) = 6$ .

Metode untuk memperoleh turunan dari  $y$  terhadap  $x$  di atas merupakan cara umum dan memungkinkan untuk diformulasikan sebagai berikut:

1. Ubahlah fungsi  $x$  sebagai fungsi  $(x + \Delta x)$  dan uraikanlah fungsi tersebut.
2. Urailah fungsi awal  $x$  dari fungsi baru  $(x + \Delta x)$ .
3. Bagilah kedua ruas persamaan dengan  $\Delta x$ .
4. Carilah limit dari semua batasan pada persamaan untuk  $\Delta x$  mendekati 0. Hasil dari persamaan ini merupakan turunan dari  $f(x)$  terhadap  $x$ .

#### BENTUK UMUM

Untuk memperoleh bentuk dari turunan untuk berbagai ekspresi dari  $x$ , asumsikan fungsi

$$y = f(x) \quad \dots (1-2)$$

sedemikian sehingga

$$y + \Delta y = f(x + \Delta x) \quad \dots (1-3)$$

Perkurangkan persamaan (1-2) ke persamaan (1-3) sehingga menghasilkan

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

lalu bagi kedua ruas persamaan dengan  $\Delta x$ , kita peroleh

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Bentuk yang diinginkan adalah dengan menarik limit dari kedua ruas dimana  $\Delta x$  mendekati 0 sedemikian sehingga

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

atau

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

**Catatan:** Simbol  $\frac{dy}{dx}$  bukanlah berarti bahwa hal tersebut merupakan suatu pembagian dimana  $dy$  sebagai pembilangnya dan  $dx$  sebagai penyebutnya. Berbeda dengan simbol  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  yang merupakan suatu pembagian dengan  $\Delta y$  sebagai pembilang dan  $\Delta x$  sebagai penyebutnya. Sedangkan,  $\frac{dy}{dx}$  merupakan simbol yang menunjukkan limit dari  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  untuk  $\Delta x$  mendekati 0.

**CONTOH-CONTOH DIFERENSIAL**

Pada bagian terakhir dari bab ini, kita akan menggunakan contoh umum dari diferensial untuk memperoleh pemahaman yang tepat tentang bentuk umum.

Contoh: Carilah turunan  $\frac{dy}{dx}$ , untuk fungsi

$$y = 5x^3 - 3x + 2$$

tentukan kemiringan dari garis miring kurva pada  $x = -1, \frac{-1}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}}, 1$  lalu gambarkan grafik fungsinya.

Penyelesaian:

Kita ketahui bahwa  $f(x) = y = 5x^3 - 3x + 2$

Kemudian mencari turunan dengan bentuk umum, kita peroleh:

$$f(x + \Delta x) = 5(x + \Delta x)^3 - 3(x + \Delta x) + 2 \quad \dots (1)$$

dan

$$f(x) = 5x^3 - 3x + 2 \quad \dots (2)$$

Uraikan persamaan (1), diperoleh

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x) \\ = 5(x + \Delta x)^3 - 3(x + \Delta x) + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 5(x^3 + 3x^2\Delta x + 3x\Delta x^2 + \Delta x^3) - 3x - 3\Delta x + 2 \\ &= 5x^3 + 15x^2\Delta x + 15x\Delta x^2 + 5\Delta x^3 - 3x - 3\Delta x + 2 \quad \dots (3) \end{aligned}$$

lalu kurangkan persamaan (2) ke persamaan (3), kemudian sederhanakan sehingga memperoleh:

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x) - f(x) \\ = [5x^3 + 15x^2\Delta x + 15x\Delta x^2 + 5\Delta x^3 - 3x - 3\Delta x + 2] - \\ - [5x^3 - 3x + 2] \\ = 5x^3 + 15x^2\Delta x + 15x\Delta x^2 + 5\Delta x^3 - 3x - 3\Delta x + 2 = \\ - 5x^3 + 3x - 2 \\ = 15x^2\Delta x + 15x\Delta x^2 + 5\Delta x^3 - 3\Delta x \\ = 5\Delta x [3x^2 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2] - 3\Delta x \end{aligned}$$

kedua ruas dibagi dengan  $\Delta x$ , sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \frac{5\Delta x [3x^2 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2] - 3\Delta x}{\Delta x} \\ &= 5[3x^2 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2] - 3 \end{aligned}$$

Carilah limit kedua ruas untuk  $\Delta x$  mendekati 0:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 5 [3x^2 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2] - 3 \\ = 5 [3x^2 + 0 + 0] - 3 \\ = 15x^2 - 3 \end{aligned}$$


Maka

$$\frac{dy}{dx} = 15x^2 - 3 \quad \dots (4)$$

Kemiringan dari garis miring pada kurva untuk titik yang telah ditentukan, menggunakan turunan ini, akan ditunjukkan pada tabel 1-5.

Tabel 1-5. Tabel Nilai

x	-1	$-\frac{1}{\sqrt{5}}$	0	$\frac{1}{\sqrt{5}}$	1
$\frac{dy}{dx}$	12	0	-3	0	12
Y	0	2,89	2	1,1	4



Gambar 1-5. Grafik dari fungsi  $f(x) = 5x^3 - 3x + 2$

Hal ini menunjukkan kepada kita metode baru untuk menggambar grafik dari suatu persamaan. Dengan mensubstitusi nilai yang berbeda dari  $x$  ke dalam persamaan (4), kita dapat menemukan kemiringan suatu garis miring kurva pada titik yang berpasangan dengan nilai  $x$ . Grafik kurva ditunjukkan pada gambar 1-5.

Contoh: Diferensialkan fungsi; berarti, carilah  $\frac{dy}{dx}$  dari  $y = \frac{1}{x}$  dan carilah kemiringan garis miring dari kurva pada titik  $x = 2$

Penyelesaian:

Gunakan bentuk dari turunan dan sederhanakan bentuknya seperti langkah di bawah ini:

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad \dots (1)$$

$$f(x + \Delta x) = \frac{1}{x + \Delta x} \quad \dots (2)$$

Perkurangkan persamaan (2) dengan persamaan (1) maka diperoleh:

$$f(x + \Delta x) - f(x) = \frac{1}{x + \Delta x} - \frac{1}{x}$$

Lalu kedua ruas di bagi dengan  $\Delta x$ , sehingga

$$\begin{aligned} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \frac{\frac{1}{x + \Delta x} - \frac{1}{x}}{\Delta x} \\ &= \frac{\frac{x - (x + \Delta x)}{x(x + \Delta x)}}{\Delta x} \\ &= \frac{\frac{-\Delta x}{x(x + \Delta x)}}{\Delta x} \\ &= \frac{-1}{x(x + \Delta x)} \end{aligned}$$

Sekarang ambillah limit pada kedua ruas untuk  $\Delta x \rightarrow 0$  sedemikian sehingga  $\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{x^2}$ .

Untuk mendapatkan kemiringan dari garis miring kurva pada titik  $x = 2$ , kita substitusi 2 untuk  $x$  pada  $\frac{dy}{dx}$  sehingga diperoleh  $\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{2^2} = \frac{-1}{4}$

Contoh: Carilah kemiringan dari garis miring grafik kurva  $f(x) = x^2 + 4$  pada  $x = 3$

Penyelesaian:

Kita perlu mencari  $\frac{dy}{dx}$  untuk mendapatkan kemiringan dari garis miring pada titik yang telah ditentukan. Gunakan bentuk turunan di bawah ini:

$$f(x + \Delta x) = (x + \Delta x)^2 + 4 \quad \dots (1)$$

dan

$$f(x) = x^2 + 4 \quad \dots (2)$$

Uraikan persamaan (1) sedemikian sehingga

$$f(x + \Delta x) = x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 + 4 \quad \dots (3)$$

Kemudian kurangkan persamaan (2) pada persamaan (3):

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x) - f(x) &= [x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 + 4] - [x^2 + 4] \\ &= x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 + 4 - x^2 - 4 \end{aligned}$$

$$= 2x\Delta x + (\Delta x)^2$$

Sekarang, bagilah kedua ruas dengan  $\Delta x$ :

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = 2x + \Delta x$$

Kemudian ambillah limit dari kedua ruas untuk  $\Delta x \rightarrow 0$  sehingga menghasilkan  $\frac{dy}{dx} = 2x$ . Substitusi  $x = 3$  pada  $\frac{dy}{dx} = 2.3 = 6$ . Sehingga kemiringan dari garis miring kurva adalah 6.

Pada contoh yang terakhir kita akan menjadikan turunan suatu fungsi  $f(x)$ , sama dengan nol dan menemukan nilai dari variabel tak bebas yang akan membuat turunan sama dengan nol untuk mendapatkan titik maksimum atau titik minimum pada kurva. Dengan titik maksimum dan titik minimum kurva, kita maksudkan bahwa titik atau titik-titik yang miring dari garis miring suatu kurva berubah dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif.

**Catatan:** Ketika suatu turunan dari suatu fungsi disamakan dengan nol, hal ini berarti kita akan menemukan titik maksimum dan titik minimum suatu kurva. Pembahasan yang mendalam tentang maksimum dan minimum akan kita jumpai pada sebagian besar pembahasan kalkulus.

Ketika kita menyamakan turunan suatu fungsi sama dengan nol, kita akan berjumpa dengan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Kita akan memiliki titik maksimum dan titik minimum.
2. Turunan fungsi tersebut ada.
3. Kita akan memperoleh titik dalam suatu kurva.

Ketika kondisi tersebut di atas kita jumpai, turunan dari suatu fungsi tersebut sama dengan nol.

Contoh: Carilah turunan dari fungsi

$$y = 5x^3 - 6x^2 - 3x + 3$$

jadikan turunannya sama dengan nol, dan carilah titik maksimum dan minimum kurvanya. Kemudian periksalah dengan menggambar grafik kurva tersebut.

Penyelesaian:

Gunakan bentuk  $\frac{dy}{dx}$  seperti berikut:

$$f(x + \Delta x) = 5(x + \Delta x)^3 - 6(x + \Delta x)^2 - 3(x + \Delta x) + 3 \quad \dots(1)$$

dan

$$f(x) = 5x^3 - 6x^2 - 3x + 3 \quad \dots(2)$$

Uraikan persamaan (1)

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x) &= 5(x^3 + 3x^2\Delta x + 3x\Delta x^2 + \Delta x^3) - 6(x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2) \\ &\quad - 3(x + \Delta x) + 3 \\ &= 5x^3 + 15x^2\Delta x + 15x\Delta x^2 + 5\Delta x^3 - 6x^2 - 12x\Delta x - \\ &\quad 6\Delta x^2 - 3x - 3\Delta x + 3 \quad \dots(3) \end{aligned}$$

dan kurangkan persamaan (2) ke persamaan (3), menghasilkan

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x) - f(x) &= [5x^3 + 15x^2\Delta x + 15x\Delta x^2 + 5\Delta x^3 - 6x^2 - 12x\Delta x - \\ &\quad 6\Delta x^2 - 3x - 3\Delta x + 3] - [5x^3 - 6x^2 - 3x + 3] \\ &= 5x^3 + 15x^2\Delta x + 15x\Delta x^2 + 5\Delta x^3 - 6x^2 - 12x\Delta x - \\ &\quad 6\Delta x^2 - 3x - 3\Delta x + 3 - 5x^3 + 6x^2 + 3x - 3 \\ &= 15x^2\Delta x + 15x\Delta x^2 + 5\Delta x^3 - 12x\Delta x - 6\Delta x^2 - 3\Delta x \\ &= 5(3x^2\Delta x + 3x\Delta x^2 + \Delta x^3) - 6(2x\Delta x + \Delta x^2) - 3\Delta x \end{aligned}$$

Sekarang bagilah kedua ruas dengan  $\Delta x$ ,

$$\begin{aligned} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= 5(3x^2 + 3x\Delta x + \Delta x^2) - 6(2x + \Delta x) - 3 \end{aligned}$$

dan ambillah limit untuk  $\Delta x \rightarrow 0$  dengan cara sebagai berikut:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 5(3x^2 + 3x\Delta x + \Delta x^2) - 6(2x + \Delta x) - 3 \\
 &= 5(3x^2 + 0 + 0) - 6(2x + 0) - 3 \\
 &= 5(3x^2) - 6(2x) - 3
 \end{aligned}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= 5(3x^2) - 6(2x) - 3 \\
 &= 15x^2 - 12x - 3
 \end{aligned}$$

Buatlah  $\frac{dy}{dx}$  sama dengan nol; sehingga:

$$\begin{aligned}
 15x^2 - 12x - 3 &= 0 \\
 3(5x^2 - 4x - 1) &= 0 \\
 (5x^2 - 4x - 1) &= 0 \\
 (5x + 1)(x - 1) &= 0
 \end{aligned}$$


Samakan kedua faktor dengan nol dan diperolehlah titik maksimum atau titik minimumnya; yaitu

$$5x + 1 = 0 \text{ dan } x - 1 = 0$$

sehingga

$$x = -\frac{1}{5} \text{ dan } x = 1$$

grafik fungsi diperlihatkan pada gambar 1-6.



Gambar 1-6. Grafik Fungsi  $f(x) = 5x^3 - 6x^2 - 3x + 3$

### Masalah Praktis

Diferensialkan fungsi pada nomer 1 sampai 3

1.  $f(x) = x^3 - 3$
2.  $f(x) = x^2 - 5x$
3.  $f(x) = 3x^2 - 2x + 3$

4. Carilah kemiringan dari garis singgung pada kurva

$$y = x^3 - 3x + 2$$

pada titik  $x = -2, 0$ , dan  $3$

5. Carilah nilai dari  $x$  dimana fungsi

$$f(x) = 2x^3 - 9x^2 - 60x + 12$$

memiliki nilai maksimum atau minimum

### Jawaban

1.  $2x$
2.  $2x - 5$
3.  $6x - 2$
4.  $m = 9, -3, 24$
5.  $x = -2, x = 5$

## KESIMPULAN

Di bawah ini adalah garis besar dari materi yang telah kita pelajari pada bab ini:

1. **Definisi Limit:** Misalkan  $f(x)$  didefinisikan untuk semua  $x$  pada persekitaran  $x = a$ . Maka terdapat suatu bilangan  $L$ , sedemikian sehingga untuk setiap bilangan positif  $\varepsilon$ , sebarangpun kecilnya, berlaku  $|f(x) - L| < \varepsilon$ , dibuktikan dengan dapatnya ditemukan suatu bilangan positif  $\delta$  sedemikian sehingga  $0 < |x - a| < \delta$ . Sehingga dapat dikatakan  $L$  merupakan limit dari  $f(x)$  untuk  $x$  mendekati  $a$ , dan kita tulis dengan

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Hal ini berarti bahwa untuk setiap bilangan  $\varepsilon > 0$  yang diberikan, akan kita dapat bilangan  $\delta$  sebagai jarak antara  $f(x)$  dan  $L$  yang sangat kecil daripada bilangan  $\varepsilon$  dimana  $0 < |x - a| < \delta$ .

2. **Bentuk Tak Tentu**

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, (\infty)0, 0^0, \infty^0, 1^\infty$$

Dua metode untuk menghitung bentuk tak tentu adalah (1) faktorisasi dan (2) pembagian pembilang dan penyebutnya dengan pangkat variabel

3. **Teorema Limit**

**Teorema 1.**

Limit dari jumlah dua fungsi sama dengan jumlah dari limit dua fungsi tersebut.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= A + B \end{aligned}$$

Teorema ini mungkin akan memaksa kita untuk memasukkan nilai lain pada fungsi, sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x) + h(x)] \\ = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) + \lim_{x \rightarrow a} h(x) \end{aligned}$$

**Teorema 2.**

Limit dari konstan.  $c$  kali fungsi  $f(x)$  sama dengan konstan  $c$ , kali limit fungsi.

$$\lim_{x \rightarrow a} c \cdot f(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

**Teorema 3.**

Limit dari perkalian dua fungsi sama dengan perkalian limit dari keduanya.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \left[ \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right] \left[ \lim_{x \rightarrow a} g(x) \right]$$

**Teorema 4.**

Limit dari pembagian dua fungsi sama dengan pembagian limit dari keduanya, dimana limit dari penyebutnya tidak boleh sama dengan nol.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}, \text{ jika } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$$

4. **Limit di Tak Hingga:** Suatu variabel yang mendekati nol seperti limit disebut sebagai limit di tak hingga

$$\lim V = 0 \text{ atau } V \rightarrow 0$$

Selisih antara variabel dan limitnya sebagai suatu yang tak terhingga:

$$\text{Jika } \lim V = L \text{ maka } \lim V - L = 0$$

5. **Penjumlahan dan Perkalian limit Tak Hingga**

**Teorema 1.**

Penjumlahan secara aljabar dari beberapa bilangan tak hingga menghasilkan bilangan tak hingga

**Teorema 2.**

Hasil kali dari beberapa bilangan tak hingga merupakan bilangan tak hingga

**Teorema 3.**

Hasil kali dari bilangan konstan dan suatu bilangan tak hingga selalu akan menghasilkan bilangan tak hingga juga.

6. **Kekontinuan:** Suatu fungsi  $f(x)$  kontinu pada  $x = a$  jika ketiga syarat di bawah ini dipenuhi, yaitu:
- $f(x)$  terdefinisi pada  $x = a$
  - Limit  $f(x)$  ada pada  $x$  mendekati  $a$  atau  $x \rightarrow a$
  - Nilai  $f(x)$  pada  $x = a$  sama dengan limit  $f(x)$  pada  $x = a$  atau

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

7. **Ketidakkontinuan:** jika suatu fungsi tidak kontinu pada  $x = a$ , maka dikatakan diskontinu pada  $x = a$ .

8. **Simbol-simbol Turunan  $y$  terhadap  $x$ :**

$$\frac{dy}{dx} = y' = f'(x) = D(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

9. **Metode Untuk Memperoleh Turunan  $y$  Terhadap  $x$ :**

- Ubahlah fungsi  $x$  sebagai fungsi  $(x + \Delta x)$  dan uraikan fungsi tersebut.
- Urailah fungsi awal  $x$  dari fungsi baru  $(x + \Delta x)$ .
- Bagilah kedua ruas persamaan dengan  $\Delta x$ .
- Carilah limit dari semua batasan pada persamaan untuk  $\Delta x$  mendekati 0. Hasil dari persamaan ini merupakan turunan dari  $f(x)$  terhadap  $x$ .

10. **Bentuk Umum Turunan Untuk Berbagai Bentuk Fungsi dalam Variabel  $x$ :**

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

11. **Titik Maksimum dan Titik Minimum Kurva:** Misalkan turunan suatu fungsi  $f(x)$ , sama dengan nol dan tentukan nilai dari variabel tak bebas yang dapat membuat turunan sama dengan nol. (Catatan: Ketika turunan suatu fungsi disamakan dengan nol, hal ini tidak berarti dalam setiap kasus kurva akan memiliki titik maksimum dan titik minimum.)

## SOAL LATIHAN

Diferensialkan fungsi pada nomor 1 sampai 5

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{x+16}{3x+4}}$
2.  $\lim_{t \rightarrow -2} \frac{3t^2 + t}{t - 3}$
3.  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x^2 + 5x + 6}$
4.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 4}{h}$
5.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + 2x + 10x^2}{2x^2 + 8}$
6.  $\lim_{x \rightarrow 9} \sqrt{x} + (x - 6)^2$  (Gunakan Teorema Limit 1)
7.  $\lim_{x \rightarrow 4} 6\sqrt{x+5}$  (Gunakan Teorema Limit 2)
8.  $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{15}{x+2}\right) \left(\frac{8x}{x^2-3}\right)$  (Gunakan Teorema Limit 3)
9.  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\frac{60}{1+x} + 2}{16/(x^2-21)}$  (Gunakan Teorema Limit 4)
10. Carilah nilai  $x$  dimana

$$f(x) = \frac{(x^2 + 6x + 8)(x - 3)}{x^2 - x - 6}$$

merupakan fungsi yang diskontinu dan tentukan nilai persamaannya sehingga fungsi nya menjadi fungsi yang kontinu.

11. Turunkan  $f(x) = 6/x - 1$
12. Carilah gradien dari garis miring yang menyinggung kurva  $y = 3x^2 - 9x$  pada titik  $x = 0$  dan  $x = 3$ .
13. Carilah nilai  $x$  dimana fungsi  $f(x) = x(4 - 2x)$  memiliki titik minimum dan maksimum.

## JAWABAN SOAL LATIHAN

1. 2
2. -2
3. 6
4. 4
5. 5
6. 12
7. 18
8. 12
9. 3
10.  $x = -2,3$   
 $f(-2) = 2$   
 $f(3) = 7$
11.  $\frac{6}{x^2}$
12.  $m = -9$   
 $m = 9$
13.  $x = 1$

## SOAL UJIAN

I. Dalam soal 1 sampai 12 diketahui bahwa  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ , untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , tentukan bilangan  $\delta > 0$  (nyatakan dalam  $\varepsilon$ ) sedemikian sehingga:

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

1.  $\lim_{x \rightarrow 2} 5x - 3 = 7$
2. a).  $\lim_{x \rightarrow -1} 2x + 7 = 5$  b).  $\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9$
3. a).  $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$  ;  $a > 0$  b).  $\lim_{x \rightarrow 9} \sqrt{x} = 3$
4.  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5} = 10$
5.  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2x^2 + 5x - 3}{2x - 1} = 3 \frac{1}{2}$
6.  $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x - 1} = 2$
7.  $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{3x} = 3$
8.  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{1}{4}$
9.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 + 3x^2 - 2x - 3}{x^2 - 1} = 5$   
Petunjuk: Sederhanakan bentuk fungsi  $f$  sehingga  $f(x) = 2x + 3$ ;  $x \neq -1$ ;  $x \neq 1$
10.  $\lim_{x \rightarrow 3} x^2 - 3x = 0$
11.  $\lim_{x \rightarrow -3} 5 - x - x^2 = -1$
12.  $\lim_{x \rightarrow a} x^2 = a^2$

II. Dalam soal 13 sampai 16, untuk setiap  $\varepsilon$  yang diberikan, tentukan suatu bilangan  $\delta > 0$  sedemikian sehingga:

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

kemudian gambar grafiknya.

13.  $\lim_{x \rightarrow -2} 3x + 7 = 1$  ;  $\varepsilon = 0,001$
14.  $\lim_{x \rightarrow 1} 7 - 3x = 4$  ;  $\varepsilon = 0,001$
15.  $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$  ;  $\varepsilon = 0,01$
16.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$  ;  $\varepsilon = 0,01$
17.  $\lim_{x \rightarrow -1} x^2 + 3x + 2 = 6$  ;  $\varepsilon = 0,01$

III. Gunakan aturan-aturan limit untuk menghitung limit fungsi berikut :

18.  $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1)(3x - 11)$
19.  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{x^2 - c^2}{x^3 - c^3}$
20.  $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{5x^2 + 2x}$
21.  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{4x^2 - 1}{(x^2 + 2)(2x - 1)}$   
 $\frac{1}{1} - \frac{1}{1}$
22.  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x - 3}$ ,  $x \neq 0$  dan  $x \neq 3$
23.  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x^3 - 27}$

IV. Limit tak hingga dan limit di tak hingga. Tentukan nilai limit fungsi berikut :

$$24. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3}$$

$$25. \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x - x^2}{2x^2 - x - 1}$$

$$26. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4}$$

$$27. \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x - x^2}{2x^2 - x - 1}$$

$$28. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x-3)^2}$$

$$29. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{2x - x^2}{2x^2 - x - 1}$$

$$30. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x-3)^3}$$

$$31. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{2x - x^2}{2x^2 - x - 1}$$

V. Diberikan fungsi  $f(x) = \frac{1}{|x|}$  gambar grafik  $f$  dan hitung

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

$$32. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - x^2}{2x^2 - x - 1}$$

$$33. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - x^2}{2x^2 - x - 1}$$

$$34. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x}$$

$$35. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + \sqrt{x}}$$

$$36. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x - x^2}{3x + x^2}$$

$$37. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{x}}{1 - \sqrt{x}}$$

$$38. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x + 2}{2x^2 + 3x + 5}$$

$$39. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 5x^4}{4x^4 + 1}$$

$$40. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 - 3x + 4}{7x^6 + 8x^4 + 2}$$

$$41. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9y^3 + 1}{y^2 - 2y + 2}$$

$$42. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 7}{\sqrt{4x^2 - 1}}$$

$$43. \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{2x^2 + 3} - \sqrt{2x^2 - 3}$$

(petunjuk: kalikan  $\sqrt{2x^2 + 3} - \sqrt{2x^2 - 3}$ )

## SOAL PILIHAN GANDA

- Jika  $y = x^2$ , maka  $y = 16$  pada grafik mengacu berdasarkan pada limit dari:
  - $L$  untuk  $x$  yang mendekati 4
  - $f(x)$  untuk  $y$  yang mendekati 4
  - $f(x)$  untuk  $x$  yang mendekati 4
  - $y = x^2$  untuk  $x$  mendekati 16
- Jika  $y = x^2$  dan kurva didefinisikan pada  $x$  sama dengan 4, maka dapat dikatakan bahwa:
  - Limit dari  $x$  sama dengan 4
  - Limit  $f(x)$  untuk  $x$  mendekati 4 sama dengan  $f(4)$
  - Limit dari  $x^2$  sama dengan 16
  - Limit dari  $f(4)$  sama dengan 4
- Interval yang manakah yang tidak akan dimiliki oleh  $\lim_{x \rightarrow 5} x^2$ 
  - 1 - 81
  - 16 - 36
  - 20,25 - 30,25
  - 4 - 6
- Pernyataan yang manakah di bawah ini yang menerangkan mengapa  $L$  merupakan limit dari  $f(x)$  untuk  $x$  mendekati  $a$ ?
  - Nilai  $f(a)$  sama dengan  $L$
  - Fungsi  $f(x)$ , ketika dihitung pada  $x$  mendekati  $a$ , sama halnya bahwa nilai  $f(x) - f(a)$  sama dengan nol (0).
  - Nilai mutlak dari jumlah  $f(x)$  dan  $L$  dibuat lebih besar dari pada suatu bilangan  $\delta$  dengan memilih suatu nilai  $x$  yang sangat dekat, tetapi tidak sama dengan  $\epsilon$
- Jika  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  untuk  $x \rightarrow a$  sama dengan  $L$ , maka  $f(a)$  ada.
  - Benar
  - Salah

Untuk semua fungsi yang diketahui pada nomor 6 sampai nomor 8 dapat diperoleh dengan mensubstitusi  $a$  untuk  $x$  untuk menghitung  $f(a)$  dari:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

- Limit dari  $3x^2 - x - 5$  untuk  $x$  mendekati -3 adalah ...
    - 10
    - 18
    - 25
    - 35
  - Limit dari  $\sqrt{2x^2 - 2x} + 3x$  untuk  $x$  mendekati 2 adalah ...
    - 12
    - 8
    - $2(\sqrt{3}+3)$
    - 4
  - Limit dari  $f(z)$  untuk  $x$  mendekati  $a$ , ketika  $f(z)$  sama dengan  $\frac{3z^2 - z}{z - 1}$  dan  $a$  sama dengan 0 adalah ...
    - 1
    - 1
    - 0
    - 5
- Untuk soal nomor 9 sampai nomor 12, carilah limit fungsinya dan jika diperlukan rubahlah fungsi tersebut dengan pembagian atau faktorisasi sedemikian sehingga tidak diperoleh bentuk tak tentu.
- $\lim_{t \rightarrow 2} 16t^2 + 20t - 30$  adalah
    - 0
    - 6
    - 36
    - 74

10.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-1}{x-1}$  adalah
- 1
  - 2
  - 0
  - $x+1$
11.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4-2x^2+3}{2x^4+x^3-3x^2+x}$  adalah
- 0
  - $\infty$
  - 3
  - $\frac{1}{2}$
12.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1}$  adalah
- 1
  - 2
  - 0
  - $x+1$
13. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar, yang menjelaskan bahwa hasil  $\frac{0}{0}$  diperoleh ketika berusaha menghitung  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  dengan mencari  $f(a)$ ?
- Limitnya adalah nol
  - Limit, jika ada, tidak dapat dihitung dengan menggunakan metode ini karena hasilnya merupakan bentuk tak tentu
  - Limitnya adalah satu
  - Limitnya tak terhingga
14. Berapakah  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x+x}{2}$ , dimana  $x$  merupakan radians?
- 1
  - $\frac{1}{2}$
  - 1
  - 0

Dalam menjawab soal nomor 15 sampai nomor 18, pilihlah teorema yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan yang diberikan.

15. Limit dari pembagian dua fungsi sama dengan pembagian limit dari keduanya, dimana limit dari penyebutnya tidak boleh sama dengan nol.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \left[ \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right] \left[ \lim_{x \rightarrow a} g(x) \right]$
  - $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
  - $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ , jika  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$
  - $\lim_{x \rightarrow a} c f(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
16. Limit dari perkalian dua fungsi sama dengan perkalian limit dari keduanya.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \left[ \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right] \left[ \lim_{x \rightarrow a} g(x) \right]$
  - $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
  - $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ , jika  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$
  - $\lim_{x \rightarrow a} c f(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
17. Limit dari jumlah dua fungsi sama dengan jumlah dari limit dua fungsi tersebut.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \left[ \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right] \left[ \lim_{x \rightarrow a} g(x) \right]$
  - $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
  - $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ , jika  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$
  - $\lim_{x \rightarrow a} c f(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

18. Limit dari konstan.  $c$  kali fungsi  $f(x)$  sama dengan konstan  $c$ , kali limit fungsi.

- a.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \left[ \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right] \left[ \lim_{x \rightarrow a} g(x) \right]$   
 b.  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$   
 c.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ , jika  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$   
 d.  $\lim_{x \rightarrow a} c f(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

19. Menggunakan teorema yang berhubungan, carilah limit dari  $3(x-2)(x^2+4)$  untuk  $x$  mendekati 5.

- a. 38  
 b. 81  
 c. 261  
 d. 340

20. Suatu hasil tak terhingga diperoleh ketika variabelnya:

- a. Mendekati 0 sebagai limit  
 b. Sama dengan limit itu sendiri  
 c. Mendekati  $\infty$  sebagai limit  
 d. Dapat dihitung sebagai nilai tentu

21. Suatu variabel yang mendekati suatu konstanta sebagai limit jika selisih antara variabel dan konstanta menjadi tak terhingga.

- a. Betul  
 b. Salah

Untuk soal nomor 22 sampai nomor 26, jawablah benar jika fungsinya menghasilkan nilai tak terhingga dalam limitnya dan salah jika hal itu tidak terjadi

22.  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2+5x-6}{x+2} - 2$   
 23.  $\lim_{x \rightarrow 4} (x^2 - 4x + 3)$   
 24.  $\lim_{x \rightarrow 2} (5x - x^3)$

25.  $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2+8x+16}{x+4}$

26.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4+2x^2-1}{x^2-3x+2}$

27. Manakah pernyataan tentang bentuk tak hingga di bawah ini yang SALAH?

- a. Hasil kali dari bilangan konstan dan suatu bilangan konstan selalu akan menghasilkan bilangan tak hingga juga.  
 b. Hasil kali dari dua atau lebih bilangan tak hingga selalu menghasilkan bilangan tak hingga juga.  
 c. Penjumlahan dua atau lebih bilangan tak hingga selalu menghasilkan bilangan tak hingga juga.  
 d. Pembagian dari dua bilangan tak hingga selalu menghasilkan bilangan tak hingga juga.

28. Berapakah nilai dari  $x$  untuk fungsi kontinyu  $\frac{2}{x+2} +$

$$\frac{4}{x^2+x-12}?$$

- a. -4  
 b. -2  
 c. 3  
 d. 4

29. Manakah di bawah ini yang fungsinya terdefinisi pada  $x$  samadengan 2?

- a.  $\frac{x}{x-2}$   
 b.  $\frac{\sqrt{13-x}}{x^3-8}$   
 c.  $\frac{x^3+3x-5}{x+2}$   
 d.  $\frac{1}{x^2-6x+8}$

30. Manakah fungsi di bawah ini yang kontinu pada  $x$  samadengan  $c$ ?

a.  $\frac{a}{cx-c^2}, c \neq 0$

b.  $\frac{2c-cx}{x-c}, c \neq 0$

c.  $\frac{x^2-c^2}{x+c}, c \neq 0$

d.  $\frac{x^2+c^2}{x^2-c^2}, c \neq 0$

31. Manakah fungsi  $x$  di bawah ini yang kontinu untuk semua nilai  $x$ ?

a.  $h(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$

b.  $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-x-6}{x-3}, & x \neq 3 \\ 5, & x = 3 \end{cases}$

c.  $q(x) = \begin{cases} \frac{x^2-3x-4}{x+1}, & x \neq 4 \\ 0, & x = 4 \end{cases}$

d.  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{x-2}, & x \neq -2 \\ 4, & x = -2 \end{cases}$

32. Dalam fungsi  $y = f(x)$ , limit dari perbandingan  $\Delta y$  terhadap  $\Delta x$  untuk  $\Delta x$  mendekati nol disebut ....

- Integral dari  $\Delta y$
- Turunan dari  $\Delta x$
- Diferensial dari  $y$
- Turunan dari  $f(x)$

## BAB 2 TURUNAN

Pada pembahasan limit sebelumnya, kita menggunakan proses delta untuk menemukan limit suatu fungsi dimana  $\Delta x$  mendekati nol. Kita menyebutkan bahwa hasil yang diperoleh dalam beberapa kasus, merupakan proses untuk mendapatkan turunan. Pada pembahasan kali ini, akan diuji beberapa aturan yang digunakan untuk mendapatkan turunan suatu fungsi tanpa menggunakan proses delta.

Untuk mendapatkan bagaimana  $y$  berubah sebagaimana  $x$  berubah, kita mengambil limit dari  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  untuk  $\Delta x \rightarrow 0$  dan dituliskan sebagai

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Simbol di atas disebut sebagai turunan  $y$  terhadap  $x$ ; kita gunakan simbol  $\frac{dy}{dx}$  untuk menandakan turunan dan ditulis

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$$

Pada bab ini, kita akan mempelajari beberapa aturan yang memungkinkan kita untuk lebih mudah menyelesaikan turunan dari beberapa fungsi aljabar. Aturan untuk turunan ini, yang akan kita sebut dengan teorema, kita asumsikan bahwa

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x)$$


atau

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

ada dan terhingga

## 2.1. Turunan bilangan konstan

Metode yang akan kita gunakan untuk mendapatkan turunan bilangan konstan sama saja prosesnya dengan proses delta pada pembahasan sebelumnya tetapi mengandung suatu pemuktian secara analitik. Diagram akan digunakan untuk memberikan pemahaman secara geometri suatu fungsi.



Gambar 2-1. Grafik dari fungsi  $y = c$ , dimana  $c$  suatu konstanta

**Teorema 1.**

Turunan suatu konstanta adalah nol.

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0, \quad \text{dimana } y = c$$

Bukti:

Pada gambar 2-1, grafik dari  $y = c$ . Dimana  $c$  merupakan suatu konstanta, nilai dari  $y$  sama untuk semua nilai  $x$  dan, dan adapun perubahan dari  $x$  (yaitu  $\Delta x$ ) tidak akan memberikan perubahan untuk  $y$ ; maka

$$\Delta y = c - c = 0,$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 0,$$

dan

$$\frac{dy}{dx} = 0.$$

Dengan cara lain yaitu ketika  $x$  sama dengan  $x_1$  dan ketika  $x$  sama dengan  $x_1 + \Delta x$ ,  $y$  tetap bernilai sama. Oleh karena itu,

$$y = c$$

dan

$$y + \Delta y = c.$$

Sehingga,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$= \frac{c - c}{\Delta x}$$

dan

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0$$

Maka

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{c - c}{\Delta x}$$

$$= 0$$

Persamaan  $y = c$ , menggambarkan suatu garis lurus yang sejajar dengan sumbu  $x$ . Kemiringan dari garis ini akan bernilai nol untuk semua nilai  $x$ . Maka dari itu, turunannya juga nol untuk semua nilai  $x$ .

Contoh: Carilah turunan  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi  $y = 6$

Penyelesaian:

Kita peroleh

$$y = 6$$

dan

$$y + \Delta y = 6.$$

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{6 - 6}{\Delta x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

## 2.2. Turunan variabel berpangkat

Variabel pada pembahasan kali ini, kita akan memperluas teorema limit yang telah dibahas sebelumnya. Ingat kembali bahwa turunan sebenarnya suatu limit. Bukti dari teorema disajikan disini akan kembali menggunakan proses delta.

### Teorema 2.

Turunan fungsi

$$y = x^n$$

adalah

$$\frac{dy}{dx} = nx^{n-1},$$

dimana  $n$  merupakan bilangan rill.

Bukti:

Berdasarkan definisi

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^n - (x)^n}{\Delta x}$$

Suku  $(x + \Delta x)^n$  dapat diuraikan dengan teorema binomial menjadi:

$$x^n + nx^{n-1}\Delta x + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}\Delta x^2 + \dots + \Delta x^n$$

Substitusi pada rumus turunan, kita peroleh:

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{nx^{n-1}\Delta x + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}\Delta x^2 + \dots + \Delta x^n}{\Delta x}$$

Sederhanakan, sehingga menjadi

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[ nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}\Delta x + \dots + \Delta x^{n-1} \right]$$

Karena  $\Delta x \rightarrow 0$ , maka kita peroleh

$$\frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$$

Terbukti.

Contoh: Carilah turunan dari  $f(x) = x^5$

Penyelesaian:

Gunakan teorema 2. Karena

$$x^5 = x^n,$$

maka

$$n = 5$$

dan

$$n - 1 = 4.$$

Sehingga untuk

$$\frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$$

Disubstitusikan nilai dari  $n$ , menghasilkan

$$\frac{dy}{dx} = 5x^4$$

Contoh: Carilah turunan dari  $f(x) = x$

Penyelesaian:

Gunakan teorema 2. Karena

$$x = x^n,$$

maka

$$n = 1$$

dan

$$n - 1 = 0.$$

Sehingga menghasilkan

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 1 \cdot x^0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Contoh di atas merupakan kasus khusus bentuk berpangkat dan hal ini mengindikasikan bahwa turunan fungsi dengan variabel yang berpangkat 1 adalah 1.

Contoh: Carilah turunan dari  $f(x) = ax$ , dimana  $a$  adalah konstanta

Penyelesaian:  
Kita memiliki

$$f(x) = ax$$

dan

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x) &= a(x + \Delta x) \\ &= ax + a\Delta x \end{aligned}$$

Sehingga

$$\begin{aligned} \Delta y &= f(x + \Delta x) - f(x) \\ &= ax + a\Delta x - ax \\ &= a\Delta x \end{aligned}$$

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a\Delta x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} a \\ &= a \end{aligned}$$

Tabel 2-1. Turunan Fungsi

$f(x)$	3	$x$	$x^2$	$x^3$	$x^4$	$3x^2$	$9x^3$	$x^{-1}$	$3x^{-4}$
$\frac{dy}{dx}$	0	1	$2x$	$3x^2$	$4x^3$	$6x$	$27x^2$	$-x^{-2}$	$-12x^{-5}$

Contoh sebelumnya merupakan kekontinuan pada turunan fungsi dengan variabel yang berpangkat satu dan mengindikasikan bahwa turunan fungsi dengan variabel yang berpangkat satu, dikali suatu konstan, merupakan suatu konstanta.

Contoh: Carilah turunan dari  $f(x) = 6x$ .

Penyelesaian:

$$\frac{dy}{dx} = 6$$

Pembahasan mengenai fungsi dan turunannya pada tabel 2-1 akan memudahkan untuk memahami bagian ini.

**Masalah Praktis**

Carilah turunan dari fungsi-fungsi di bawah ini:

1.  $f(x) = 21$
2.  $f(x) = x$
3.  $f(x) = 21x$
4.  $f(x) = 7x^3$
5.  $f(x) = 4x^2$
6.  $f(x) = 3x^{-2}$

**Jawaban**

- |            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| 1. 0       | 2. 1    | 3. 21         |
| 4. $21x^2$ | 5. $8x$ | 6. $-6x^{-3}$ |

**2.3. Turunan dari penjumlahan dua atau lebih fungsi**

**Teorema 3.**

Turunan dari jumlah dua atau lebih fungsi yang dapat didiferensialkan terhadap  $x$  sama dengan jumlah dari turunan kedua fungsi tersebut. Jika dua fungsi  $x$  diketahui, sedemikian sehingga

$$u = g(x)$$

dan

$$v = h(x)$$

serta

$$y = u + v \\ = g(x) + h(x)$$

maka

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

Bukti:

Kita memiliki:

$$y = g(x) + h(x) \quad \dots (2.1)$$

dan

$$y + \Delta y = g(x + \Delta x) + h(x + \Delta x) \quad \dots (2.2)$$

perkurangkan persamaan (2.1) dari persamaan (2.2):

$$\Delta y = g(x + \Delta x) - g(x) + h(x + \Delta x) - h(x)$$

Bagi kedua ruas dengan  $\Delta x$  dan ambil limitnya untuk  $\Delta x \rightarrow 0$ :

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{g(x + \Delta x) - g(x) + h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[ \frac{g(x + \Delta x) - g(x) + h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x} \right]$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[ \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right] + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[ \frac{h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x} \right]$$

Tetapi, berdasarkan definisi

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} = \frac{du}{dx}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x} = \frac{dv}{dx}$$

Maka dengan substitusi, diperoleh:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

Contoh: Carilah turunan dari fungsi

$$f(x) = x^3 - 8x^2 + 7x - 5$$

Penyelesaian:

Teorema 3 mengindikasikan bahwa kita harus menemukan turunan tiap suku dan menjumlahkannya; sedemikian sehingga, jika

$$y = x^3, \frac{dy}{dx} = 3x^2$$

$$y = -8x^2, \frac{dy}{dx} = -16x$$

$$y = 7x, \frac{dy}{dx} = 7$$

$$y = -5, \frac{dy}{dx} = 0$$

berarti

$$y = x^3 - 8x^2 + 7x - 5$$

maka

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 16x + 7 + 0 = 3x^2 - 16x + 7$$

**Masalah Praktis**

Carilah turunan dari fungsi-fungsi di bawah ini:

1.  $f(x) = x^2 + x - 1$
2.  $f(x) = 2x^4 + 3x + 16$
3.  $f(x) = 2x^3 + 3x^2 + x - 3$
4.  $f(x) = 3x^3 + 2x^2 - 4x + 2 + 2x^{-1} - 3x^{-3}$

**Jawaban**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. $2x+1$          | 2. $8x^3 + 3$                          |
| 3. $6x^2 + 6x + 1$ | 4. $9x^2 + 4x - 4 - 2x^{-2} + 9x^{-4}$ |

## 2.4. Turunan dari perkalian dua atau lebih fungsi

**Teorema 4.**

Turunan dari perkalian antara dua atau lebih fungsi yang dapat didiferensialkan terhadap  $x$  sama dengan fungsi pertama dikalikan dengan turunan fungsi kedua lalu dijumlahkan dengan fungsi kedua dikali dengan turunan fungsi pertama. Jika

$$y = u \cdot v$$

maka

$$\frac{dy}{dx} = u \cdot \frac{dv}{dx} + v \cdot \frac{du}{dx}$$

Teorema ini dapat dikembangkan dengan memasukkan fungsi yang ketiga atau lebih. Hasil dari turunan dari perkalian tiga fungsi dapat dilihat sebagai berikut:

Jika  $y = u \cdot v \cdot w$  maka

$$\frac{dy}{dx} = uv \cdot \frac{dw}{dx} + vw \cdot \frac{du}{dx} + uw \cdot \frac{dv}{dx}$$

Contoh: Carilah turunan dari fungsi

$$f(x) = (x^2 - 2)(x^4 + 5)$$

Penyelesaian:

Turunan dari fungsi pertama  $(x^2 - 2)$  adalah  $2x$ , dan turunan dari fungsi kedua  $(x^4 + 5)$  adalah  $4x^3$ .

Sehingga,

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2 - 2)(4x^3) + (x^4 + 5)(2x) \\ &= 4x^5 - 8x^3 + 2x^5 + 10x \\ &= 6x^5 - 8x^3 + 10x \end{aligned}$$

Contoh: Carilah turunan dari fungsi

$$f(x) = (x^3 - 3)(x^2 + 2)(x^4 - 5)$$

Penyelesaian:

Turunan ketiga fungsi di atas adalah sebagai berikut: Turunan dari fungsi pertama  $(x^3 - 3)$  adalah  $3x^2$ , turunan dari fungsi kedua  $(x^2 + 2)$  adalah  $2x$ , dan turunan dari fungsi ketiga  $(x^4 - 5)$  adalah  $4x^3$ . Sehingga,

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^3 - 3)(x^2 + 2)(4x^3) \\ &\quad + (x^2 + 2)(x^4 - 5)(3x^2) \\ &\quad + (x^3 - 3)(x^4 - 5)(2x) \end{aligned}$$

Setelah diuraikan kita mendapatkan

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x^8 + 8x^6 - 12x^5 - 24x^3 \\ &\quad + 3x^8 + 6x^6 - 15x^4 - 30x^2 \\ &\quad + 2x^8 - 6x^5 - 10x^4 + 30x \\ &= 9x^8 + 14x^6 - 18x^5 - 25x^4 - 24x^3 - 30x^2 + 30x \end{aligned}$$

**Masalah Praktis**

Carilah turunan dari fungsi-fungsi di bawah ini:

1.  $f(x) = x^3(x^2 - 4)$
2.  $f(x) = (x^3 - 3)(x^2 + 2x)$
3.  $f(x) = (x^2 - 7x)(x^5 - 4x^2)$
4.  $f(x) = (x - 2)(x^2 - 3)(x^3 - 4)$

**Jawaban**

1.  $5x^4 - 12x^2$
2.  $5x^4 + 8x^3 - 6x - 6$
3.  $7x^4 - 42x^5 - 16x^3 + 84x^2$
4.  $6x^5 - 10x^4 - 12x^3 + 6x^2 + 16x + 12$

## 2.5. Turunan dari hasil bagi dua fungsi

## Teorema 5.

Suatu perbandingan fungsi dimana penyebutnya tidak sama dengan nol, turunan dari perbandingan dua fungsi yang dapat didiferensialkan terhadap  $x$  sama dengan penyebut dikali dengan turunan pembilang diperkurangkan dengan pembilang dikali dengan turunan penyebut, hasil seluruhnya dibagi dengan pangkat dua dari penyebutnya.

Jika  $y = \frac{u}{v}$ ,  
maka

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

Contoh: Carilah turunan dari fungsi

$$f(x) = \frac{x^2 - 7}{2x + 8}$$

Penyelesaian:

Turunan dari pembilang  $(x^2 - 7)$  adalah  $2x$ , dan turunan dari penyebut  $(2x + 8)$  adalah  $2$ . Sehingga,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(2x+8)(2x) - (x^2-7)(2)}{(2x+8)^2} \\ &= \frac{4x^2+16x-2x^2+14}{(2x+8)^2} \\ &= \frac{2x^2+16x+14}{4(x+4)^2} \\ &= \frac{x^2+8x+7}{2(x+4)^2} \end{aligned}$$

## Masalah Praktis

Carilah turunan dari fungsi-fungsi di bawah ini:

1.  $f(x) = \frac{x^4}{x^2-2}$
2.  $f(x) = \frac{x^2-3}{x+7}$
3.  $f(x) = \frac{x^2+3x+5}{x^3-4}$

## Jawaban

1.  $\frac{2x^5-8x^3}{(x^2-2)^2}$
2.  $\frac{x^2+14x+3}{(x+7)^2}$
3.  $\frac{-(x^4+6x^3+15x^2+8x+12)}{(x^3-4)^2}$

## 2.6. Turunan dari fungsi berpangkat

## Teorema 6.

Turunan dari beberapa fungsi  $x$  terhadap pangkat  $n$  yang dapat didiferensialkan, dimana  $n$  merupakan bilangan riil, adalah sama dengan  $n$  kali fungsi polinomial  $x$  dengan pangkat  $(n - 1)$  dikali dengan turunan polinomial itu sendiri. Jika

$$y = u^n$$

dimana  $u$  merupakan fungsi terhadap  $x$  yang dapat didiferensialkan, maka

$$\frac{dy}{dx} = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

Contoh: Carilah turunan dari fungsi

$$y = (x^3 - 3x^2 + 2x)^7$$

Penyelesaian:

Gunakan teorema 6 dan diperoleh:

$$\frac{dy}{dx} = 7(x^3 - 3x^2 + 2x)^6(3x^2 - 6x + 2)$$

Contoh: Carilah turunan dari fungsi

$$f(x) = \frac{(x^2 + 2)^3}{x - 1}$$

Penyelesaian:

Contoh ini merupakan perpaduan antara teorema 5 dan teorema 6. Teorema 6 digunakan untuk mendapatkan turunan dari pembilangnya; kemudian teorema 5 digunakan untuk mendapatkan turunan dari hasil pembagiannya.

Turunan dari pembilangnya  $(x^2 + 2)^3$  adalah  $3(x^2 + 2)^2(2x)$ .

Sedangkan turunan dari penyebutnya  $(x - 1)$  adalah 1.

Sehingga dengan menggunakan teorema 5 diperoleh:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{(x-1)[3(x^2+2)^2(2x)] - (1)(x^2+2)^3}{(x-1)^2} \\ &= \frac{(x-1)[6x(x^2+2)^2] - (x^2+2)^3}{(x-1)^2} \\ &= \frac{6x(x^2+2)^2(x-1) - (x^2+2)^3}{(x-1)^2} \\ &= \frac{(x^2+2)^2[6x(x-1) - (x^2+2)]}{(x-1)^2} \\ &= \frac{(x^2+2)^2(6x^2 - 6x - x^2 - 2)}{(x-1)^2} \\ &= \frac{(x^2+2)^2(5x^2 - 6x - 2)}{(x-1)^2} \end{aligned}$$

### Masalah Praktis

Carilah turunan dari fungsi-fungsi di bawah ini:

1.  $f(x) = (x^3 + 2x - 6)^2$
2.  $f(x) = 5(x^2 + x + 7)^4$
3.  $f(x) = \frac{2(x+3)^2}{3x}$

### Jawaban

1.  $2(x^3 + 2x - 6)(3x^2 + 2)$
2.  $20(x^2 + x + 7)^3(2x + 1)$
3.  $\frac{18x(x+3)^2 - 6(x+3)^2}{9x^2}$

### 2.7. Turunan dari Fungsi bentuk akar

Untuk mendiferensialkan suatu fungsi yang memiliki fungsi bentuk akar, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk faktor berpangkat; kemudian mencari turunannya dengan menggunakan teorema yang memungkinkan.

Contoh: Carilah turunan dari  $f(x) = \sqrt{2x^2 - 5}$ .

Penyelesaian:

Ubahlah bentuk akar kuadrat dengan bentuk faktor yang memiliki pangkat, sedemikian sehingga

$$f(x) = (2x^2 - 5)^{1/2}$$

dan dengan menggunakan teorema 6

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2}(2x^2 - 5)^{(1/2)-1}(4x) \\ &= \frac{1}{2}(2x^2 - 5)^{(-1/2)}(4x) \\ &= 2x(2x^2 - 5)^{(-1/2)} \\ &= \frac{2x}{\sqrt{2x^2 - 5}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2x}{\sqrt{2x^2-5}} \times \frac{\sqrt{2x^2-5}}{\sqrt{2x^2-5}} \\
 &= \frac{2x\sqrt{2x^2-5}}{(\sqrt{2x^2-5})^2} \\
 &= \frac{2x\sqrt{2x^2-5}}{2x^2-5}
 \end{aligned}$$

Contoh: Carilah turunan dari  $f(x) = \frac{2x+1}{\sqrt{3x^2+2}}$ .

Penyelesaian:

Ubahlah bentuk akar kuadrat dengan bentuk faktor yang memiliki pangkat, sehingga

$$f(x) = \frac{2x+1}{(3x^2+2)^{1/2}} \quad \dots (1)$$

dan gunakan teorema 6 pada penyebutnya lalu gunakan teorema 5 untuk persamaannya atau dengan menggunakan metode lain. Kita dapat menuliskan fungsinya sebagai berikut:

$$f(x) = (2x+1)(3x^2+2)^{-1/2} \quad \dots (2)$$

lalu gunakan teorema 6 untuk suku faktor yang kedua kemudian gunakan teorema 4 untuk perkaliannya.

Dua metode penyelesaian akan dilakukan secara satu-persatu sebagai berikut:

#### Metode pertama;

Dengan menggunakan persamaan (1):

$$f(x) = \frac{2x+1}{(3x^2+2)^{1/2}}$$

Carilah turunan dari penyebutnya

$$\frac{dy}{dx} = (3x^2+2)^{1/2}$$

Dengan menggunakan teorema berpangkat

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}(3x^2+2)^{1/2} &= \frac{1}{2}(3x^2+2)^{1/2-1}(6x) \\
 &= 3x(3x^2+2)^{-1/2}
 \end{aligned}$$

Turunan dari pembilangnya adalah

$$\frac{d}{dx}(2x+1) = 2$$

Sekarang gunakanlah teorema 5

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{(3x^2+2)^{1/2}(2) - (2x+1)(3x(3x^2+2)^{-1/2})}{(3x^2+2)} \\
 &= \frac{2(3x^2+2)^{1/2} - 3x(2x+1)(3x^2+2)^{-1/2}}{(3x^2+2)} \\
 &= \frac{2(3x^2+2)^{1/2} - (6x^2+3x)(3x^2+2)^{-1/2}}{(3x^2+2)}
 \end{aligned}$$

Perkalikan keduanya, pembilang dan penyebutnya dengan  $(3x^2+2)^{1/2}$  kemudian sederhanakan:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{2(3x^2+2)^{1/2} - (6x^2+3x)(3x^2+2)^{-1/2}}{(3x^2+2)} \times \frac{(3x^2+2)^{1/2}}{(3x^2+2)^{1/2}} \\
 &= \frac{2(3x^2+2) - (6x^2+3x)}{(3x^2+2)^{3/2}} \\
 &= \frac{(6x^2+4) - (6x^2+3x)}{(3x^2+2)^{3/2}} \\
 &= \frac{6x^2+4-6x^2-3x}{(3x^2+2)^{3/2}} \\
 &= \frac{4-3x}{(3x^2+2)^{3/2}}
 \end{aligned}$$

#### Metode Kedua

Untuk mendapatkan penyelesaian yang sama dengan metode yang berbeda, gunakan persamaan (2):

$$f(x) = (2x+1)(3x^2+2)^{-1/2}$$

Carilah turunan tiap suku faktornya:

$$\frac{d}{dx}(2x+1) = 2$$

dan

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}(3x^2+2)^{-1/2} &= -\frac{1}{2}(3x^2+2)^{-1/2-1}(6x) \\
 &= -3x(3x^2+2)^{-3/2}
 \end{aligned}$$

Sekarang dengan menggunakan teorema 4:

$$f'(x) = (2x+1)[-3x(3x^2+2)^{-3/2}] + (3x^2+2)^{-1/2}(2)$$

kalikan keduanya dengan  $\frac{(3x^2+2)^{3/2}}{(3x^2+2)^{3/2}}$  sedemikian sehingga:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-3x(2x+1)+2(3x^2+2)}{(3x^2+2)^{3/2}} \\ &= \frac{-6x^2-3x+6x^2+4}{(3x^2+2)^{3/2}} \\ &= \frac{4-3x}{(3x^2+2)^{3/2}} \end{aligned}$$

Hasilnya sama dengan penyelesaian dengan menggunakan metode pertama.

Contoh: Carilah turunan dari  $f(x) = \frac{\sqrt[3]{(2x+1)^5}}{(x^2-1)^4}$ .

Penyelesaian:

Misalkan  $f(x) = y$   
maka

$$y = \frac{\sqrt[3]{(2x+1)^5}}{(x^2-1)^4}$$

Ubahlah bentuk akar kuadrat dengan bentuk faktor yang memiliki pangkat, sehingga

$$y = \frac{(2x+1)^{5/3}}{(x^2-1)^4}$$

$$\ln|y| = \ln \left[ \frac{|2x+1|^{5/3}}{(x^2-1)^4} \right]$$

$$= \ln|2x+1|^{5/3} - \ln|x^2-1|^4$$

$$= \frac{5}{3} \ln|2x+1| - 4 \ln|x^2-1|$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{5}{3} \cdot \frac{1}{2x+1} \cdot 2 - 4 \cdot \frac{1}{x^2-1} \cdot 2x$$

$$= \frac{10}{6x+3} - \frac{8x}{x^2-1}$$

$$\begin{aligned} y' &= y \left( \frac{10}{6x+3} - \frac{8x}{x^2-1} \right) \\ &= \frac{\sqrt[3]{(2x+1)^5}}{(x^2-1)^4} \left( \frac{10}{6x+3} - \frac{8x}{x^2-1} \right) \end{aligned}$$

### Masalah Praktis

Carilah turunan dari fungsi-fungsi di bawah ini:

1.  $f(x) = \sqrt{x}$
2.  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$
3.  $f(x) = \sqrt{3x-4}$
4.  $f(x) = \sqrt[3]{4x^2-3x+2}$

### Jawaban

1.  $\frac{1}{2\sqrt{x}}$  atau  $\frac{\sqrt{x}}{2x}$
2.  $-\frac{1}{2\sqrt{x^3}}$  atau  $-\frac{\sqrt{x^3}}{2x^3}$
3.  $\frac{3}{2\sqrt{3x-4}}$  atau  $\frac{3\sqrt{3x-4}}{2(3x-4)}$
4.  $\frac{8x-3}{3^3\sqrt{(4x^2-3x+2)^2}}$  atau  $\frac{8x-3\sqrt[3]{4x^2-3x+2}}{3(4x^2-3x+2)}$

### 2.8. Aturan rantai

Aturan yang sering digunakan di dalam kalkulus diferensial adalah aturan rantai. Aturan ini berhubungan dengan turunan yang memiliki variabel yang saling berkaitan. Aturan rantai adalah

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

dimana variabel  $y = f(u)$  merupakan fungsi yang dapat didiferensialkan terhadap  $u$  dan  $u = g(x)$  merupakan fungsi  $x$  yang dapat didiferensialkan.

Contoh: Carilah turunan dari fungsi  $y = (x + x^2)^2$

Penyelesaian:

$$\text{Misalkan } u = (x + x^2)$$

$$\text{Berarti } y = u^2$$

$$\text{Maka } \frac{dy}{du} = 2u \text{ dan } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 2u \frac{du}{dx}$$

$$\text{Sedangkan } \frac{du}{dx} = 1 + 2x$$

disubstitusikan ke persamaan (1) menghasilkan

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 2u(1 + 2x)$$

karena  $u = (x + x^2)$ , maka

$$\frac{dy}{dx} = 2(x + x^2)(1 + 2x)$$

Contoh: Carilah  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi  $y = 12t^4 + 7t$

$$\text{dimana } t = x^2 + 4$$

Penyelesaian:

Dengan menggunakan aturan rantai

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx}$$

$$\text{Sedangkan } \frac{dy}{dt} = 48t^3 + 7 \text{ dan } \frac{dt}{dx} = 2x$$

Maka,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} \\ &= (48t^3 + 7)(2x) \end{aligned}$$

Dan dengan mensubstitusikan

$$t = x^2 + 4$$

diperoleh:

$$\frac{dy}{dx} = (48(x^2 + 4)^3 + 7)(2x)$$

### Masalah Praktis

Carilah  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi-fungsi di bawah ini:

1.  $y = 3t^3 = 8t$  dan  $t = x^3 + 2$
2.  $y = 7n^2 + 8n + 3$  dan  $n = 2x^3 + 4x^2 + x$

### Jawaban

1.  $[9(x^3 + 2)^2 + 8](3x^2)$
2.  $[14(2x^3 + 4x^2 + x) + 8]96x^2 + 8x + 1)$

## 2.9. Turunan dari invers suatu fungsi

### Teorema 7.

Turunan dari invers suatu fungsi adalah kebalikan dari turunan fungsi awalnya.

Persamaan pada pembahasan kali ini,  $x$  merupakan variabel terikat dan  $y$  merupakan variabel bebas. Persamaannya bisa saja memiliki bentuk seperti contoh berikut:

$$y = x^2 + 3x + 2$$

anggaplah bahwa kita memiliki fungsi seperti

$$x = \frac{1}{y^2} - \frac{1}{y}$$

dan kita menginginkan untuk mendapatkan  $\frac{dy}{dx}$ . Patut diperhatikan bahwa jika kita menyelesaikan untuk  $y$  dalam variabel  $x$ , menggunakan bentuk kuadrat, kita mendapatkan fungsi yang lebih rumit:

$$y = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4x}}{2x}$$

Jika kita menganggap bahwa persamaan di atas merupakan persamaan awal, maka

$$x = \frac{1}{y^2} - \frac{1}{y}$$

Merupakan fungsi inversnya. Untuk mendapatkan  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi invers sangatlah mudah.

Contoh: Carilah turunan  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi  $x = \frac{1}{y^2} - \frac{1}{y}$

Penyelesaian:

Turunan  $\frac{dx}{dy}$  adalah:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dy} &= -2y^{-3} + y^{-2} \\ &= \frac{-2}{y^3} + \frac{1}{y^2} \\ &= \frac{-2+y}{y^3}\end{aligned}$$

Kebalikan dari  $\frac{dx}{dy}$  merupakan turunan  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi awal, dan kita peroleh

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \\ &= \frac{1}{\frac{-2+y}{y^3}} \\ &= \frac{y^3}{y-2}\end{aligned}$$

Contoh: Carilah turunan  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi  $x = y^2$

Penyelesaian:

Turunan  $\frac{dx}{dy}$  menjadi  $\frac{dx}{dy} = 2y$

Maka  $\frac{dy}{dx} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{2y}$

### Masalah Praktis

Carilah turunan  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi-fungsi di bawah ini:

1.  $x = 4 - y^2$
2.  $x = y^2 + 9y$

### Jawaban

1.  $-\frac{1}{2y}$
2.  $\frac{1}{2y+9}$

### 2.10. Turunan dari fungsi implisit

Dalam suatu persamaan yang memuat variabel  $x$  dan  $y$  secara terpisah, tidak selalu mudah. Jika kita tidak menyelesaikan persamaannya untuk  $y$ , kita sebut  $y$  merupakan *fungsi implisit* terhadap  $x$ . Dalam persamaan

$$x^2 - 4y = 0$$

$y$  merupakan fungsi implisit terhadap  $x$ , dan  $x$  juga dapat dikatakan sebagai fungsi implisit terhadap  $y$ . Jika kita menyelesaikan persamaan untuk  $y$ , sehingga berbentuk

$$y = \frac{x^2}{4}$$

maka  $y$  akan dikatakan fungsi implisit terhadap  $x$ . Di dalam banyak kasus mencari penyelesaian akan sangat jauh rumit untuk mendapatkannya.

Ketika  $y$  diketahui dengan persamaan  $y^2 + xy = 2$ , merupakan fungsi implisit terhadap  $x$ .

Ketika kita memiliki persamaan dengan bentuk seperti di atas dimana  $y$  merupakan fungsi implisit terhadap  $x$ , kita dapat mendiferensialkan fungsinya dengan cara mendiferensialkan dengan bersamaan. Turunan tiap suku yang memuat  $y$  akan diikuti dengan  $\frac{dy}{dx}$ , sesuai bunyi dari teorema 6.

Contoh: Carilah turunan  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi  $y^2 + xy^2 = 2$

Penyelesaian:

Turunan dari  $y^2$ :

$$\frac{d}{dx}(y^2) = 2y \frac{dy}{dx}$$

Turunan dari  $xy^2$ :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(xy^2) &= x(2y) \frac{dy}{dx} + (y^2)(1) \\ &= 2xy \frac{dy}{dx} + y^2 \end{aligned}$$

Turunan dari 2:

$$\frac{d}{dx}(2) = 0$$

Sedemikian sehingga,

$$2y \frac{dy}{dx} + 2xy \frac{dy}{dx} + y^2 = 0$$

Satukan suku  $\frac{dy}{dx}$ , sehingga kita peroleh:

$$\begin{aligned} (2y + 2xy) \frac{dy}{dx} + y^2 &= 0 \\ (2y + 2xy) \frac{dy}{dx} &= -y^2 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{-y^2}{(2y + 2xy)} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{-y}{2 + 2x} \end{aligned}$$

Sehingga, bagaimanapun cara kita mendiferensialkan suatu fungsi implisit, maka turunannya akan memuat kedua variabel  $x$  dan  $y$ .

Contoh: Carilah turunan  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi  $y^2 + y - 2xy^2 = 5x$

Penyelesaian:

Turunan dari  $y^2$ :

$$\frac{d}{dx}(y^2) = 2y \frac{dy}{dx}$$

Turunan dari  $y$ :

$$\frac{d}{dx}(y) = (1) \frac{dy}{dx}$$

Turunan dari  $2xy^2$ :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(2xy^2) &= 2x(2y) \frac{dy}{dx} + (y^2)(2) \\ &= 4xy \frac{dy}{dx} + 2y^2 \end{aligned}$$

Turunan dari  $5x$ :

$$\frac{d}{dx}(5x) = 5$$

Sedemikian sehingga,

$$2y \frac{dy}{dx} + \frac{dy}{dx} - (4xy \frac{dy}{dx} + 2y^2) = 5$$

Satukan suku  $\frac{dy}{dx}$ , sehingga kita peroleh:

$$\begin{aligned} 2y \frac{dy}{dx} + \frac{dy}{dx} - (4xy \frac{dy}{dx} + 2y^2) &= 5 \\ 2y \frac{dy}{dx} + \frac{dy}{dx} - 4xy \frac{dy}{dx} - 2y^2 &= 5 \\ (2y + 1 - 4xy) \frac{dy}{dx} - 2y^2 &= 5 \\ (2y + 1 - 4xy) \frac{dy}{dx} &= 5 + 2y^2 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{5 + 2y^2}{(2y + 1 - 4xy)} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{5 + 2y^2}{2y + 1 - 4xy} \end{aligned}$$

### Masalah Praktis

Carilah  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi-fungsi di bawah ini:

- $x^5 + 4xy - 3y^5 = 0$
- $x^2y + y^3 = 4$
- $x^3y^2 = 3xy$

Jawaban

1.  $\frac{-5x^4-4y^3}{12xy^2-15y^4}$       2.  $\frac{-2xy}{x^2+3y^2}$       3.  $\frac{3x^2y^2-3y}{3x-2x^3y}$

2.11. Turunan fungsi trigonometri

Jika diketahui  $y = \sin u$ , dari bentuk umum yang telah kita ketahui, kita mendapatkan turunan dari  $y$  adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{du} &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\sin(u + \Delta u) - \sin u}{\Delta u} \\ &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\sin u \cos \Delta u + \cos u \sin \Delta u - \sin u}{\Delta u} \\ &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\sin u (\cos \Delta u - 1)}{\Delta u} + \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta u \cos u}{\Delta u} \dots (2.3) \end{aligned}$$

Karena

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\cos \Delta u - 1}{\Delta u} = 0 \dots (2.4)$$

dan

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta u}{\Delta u} = 1 \dots (2.5)$$

maka dengan mensubstitusi persamaan (2.4) dan persamaan (2.5) ke persamaan (2.3), diperoleh:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{du} &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\sin u (\cos \Delta u - 1)}{\Delta u} + \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta u \cos u}{\Delta u} \\ &= \left( \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \sin u \right) \left( \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{(\cos \Delta u - 1)}{\Delta u} \right) \\ &\quad + \left( \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta u}{\Delta u} \right) \left( \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \cos u \right) \\ &= \left( \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \sin u \right) 0 + 1 \left( \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \cos u \right) \\ &= 0 + \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \cos u \\ &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \cos u \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = \cos u \dots (2.6)$$

Sekarang kita ingin mencari turunan  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi  $\sin u$ , sehingga kita gunakan aturan rantai

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Dari aturan rantai dan persamaan (2.6) kita peroleh

$$\frac{d}{dx}(\sin u) = \cos u \frac{du}{dx}$$

Dengan kata lain, untuk mendapatkan turunan dari fungsi sinus, kita gunakan fungsi cosinus dikali dengan turunan fungsinya.

Dengan proses yang sama kita dapatkan turunan dari fungsi cosinus yaitu

$$\frac{d}{dx}(\cos u) = -\sin u \frac{du}{dx}$$

Turunan dari fungsi trigonometri yang lain dapat kita temukan dengan mengubah bentuknya ke dalam bentuk fungsi sinus dan fungsi cosinus. Seperti berikut ini,

$$\frac{d}{dx}(\tan u) = \frac{d}{dx} \left( \frac{\sin u}{\cos u} \right)$$

dan dengan mensubstitusi  $\sin u$  untuk  $u$ ,  $\cos u$  untuk  $v$ , dan  $du$  untuk  $dx$  pada persamaan dari teorema

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{u}{v} \right) = \frac{v \cdot \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

kita memiliki

$$\begin{aligned} \frac{dy}{du} &= \frac{d}{dx} \left( \frac{\sin u}{\cos u} \right) \\ &= \frac{\cos u \frac{d}{du}(\sin u) - \sin u \frac{d}{du}(\cos u)}{\cos^2 u} \dots (2.7) \end{aligned}$$

katakanlah  $\frac{d}{du}(\sin u) = \cos u$  dan  $\frac{d}{du}(\cos u) = -\sin u$  kemudian kita substitusi ke persamaan (2.7), kita akan peroleh

$$\begin{aligned}\frac{dy}{du} &= \frac{\cos^2 u + \sin^2 u}{\cos^2 u} \\ &= \frac{1}{\cos^2 u} \\ &= \sec^2 u \quad \dots (2.8)\end{aligned}$$

Sekarang kita gunakan aturan rantai dan persamaan (2.8), kita peroleh

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \sec^2 u \cdot \frac{du}{dx}\end{aligned}$$

Untuk bentuk fungsi trigonometri yang lainnya, jika di ubah ke dalam bentuk sinus dan cosinus dan menggunakan proses yang sama, maka kita akan menemukan turunannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\cot u) &= -\csc^2 u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\sec u) &= \sec u \tan u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\csc u) &= -\csc u \cot u \frac{du}{dx}\end{aligned}$$

Contoh: Carilah turunan dari fungsi  $y = \sin 3x$

Penyelesaian:

Turunan dari  $y = \sin 3x$  adalah

$$\frac{dy}{dx} = \cos 3x \frac{d}{dx}(3x) = 3 \cos 3x$$

Contoh: Carilah turunan dari fungsi  $y = \tan^2(3x)$

Penyelesaian:

Dengan menggunakan teorema berpangkat maka turunan dari  $y = \sin^2(3x)$  adalah

$$\frac{dy}{dx} = 2 \tan 3x \frac{d}{dx}(\tan 3x)$$

Maka diperoleh

$$\frac{d}{dx}(\tan 3x) = \sec^2 3x \frac{d}{dx}(3x)$$

dan

$$\frac{d}{dx}(3x) = 3$$

kombinasikan semuanya, sehingga kita peroleh:

$$\frac{dy}{dx} = (2 \tan 3x)(\sec^2 3x)(3) = 6 \tan 3x \sec^2 3x$$

Contoh: Carilah turunan dari fungsi  $y = x^{\sin x}$

Penyelesaian:

Fungsi ini terdefinisi untuk  $x > 0$ , yang menghasilkan  $y > 0$ . Dengan proses yang sedikit lebih tinggi tingkat kerumitannya, dapat kita selesaikan sebagai berikut,

$$y = x^{\sin x}$$

$$\ln y = \ln x^{\sin x}$$

$$= (\sin x) \ln x$$

$$\frac{y'}{y} = (\sin x) \cdot \frac{1}{x} + (\cos x) \ln x$$

$$y' = y \left( \frac{\sin x}{x} + (\cos x) \ln x \right)$$

$$y' = x^{\sin x} \left( (\sin x) \cdot \frac{1}{x} + (\cos x) \ln x \right)$$

### Masalah Praktis

Carilah turunan dari fungsi-fungsi di bawah ini:

1.  $y = \sin 2x$
2.  $y = (\cos x^2)^2$

## Jawaban

1.  $2 \cos 2x$       2.  $-4x \cos x^2 \sin x^2$

2.12. Turunan fungsi logaritma natural ( $\ln$ )

## Teorema 8.

Fungsi logaritma natural  $y = \ln x$  memiliki turunan

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \quad \dots (2.9)$$

Untuk  $x > 0$

Jika  $u$  merupakan fungsi terhadap  $x$  yang dapat didiferensialkan, maka dengan menggunakan persamaan (2.9) dan aturan rantai,

$$\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

Contoh: Carilah turunan dari fungsi  $y = \ln(6 - x^2)$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \left( \frac{1}{6 - x^2} \right) \frac{d}{dx}(6 - x^2) \\ &= \left( \frac{1}{6 - x^2} \right) (-2x) \\ &= \frac{-2x}{6 - x^2} \\ &= \frac{2x}{x^2 - 6} \end{aligned}$$

## 2.13. Turunan bilangan konstanta berpangkat variabel

Pada bagian ini, terdapat dua bentuk umum dari bilangan konstanta berpangkat variabel yang akan dibahas. Kedua bentuk tersebut adalah  $e^x$  dan  $a^x$ , dimana  $x$

merupakan variabel dan  $a$  merupakan suatu konstanta, dan  $e$  merupakan bilangan yang nilainya sama dengan 2,71828....

Mengingat pelajaran kita pada matematika logaritma bahwa  $e$  dan  $\ln$  merupakan fungsi yang saling invers, maka

$$\begin{aligned} \ln(e) &= 1 \\ \ln(e^x) &= x \quad \dots (2.10) \end{aligned}$$

dan

$$\ln(a^x) = x \ln a.$$

Jika  $y = e^x$  maka

$$\frac{dy}{dx} = e^x \quad \dots (2.11)$$

Bukti:

Karena  $y = \ln x$  dapat didiferensialkan, maka inversnya adalah  $y = e^x$ . Untuk memperoleh turunan dari  $y = e^x$ , kita mendiferensialkan kedua ruas dari persamaan (2.10) terhadap  $x$ , dimana akan memberikan hasil

$$\frac{1}{e^x} \frac{d}{dx}(e^x) = 1 \quad \dots (2.12)$$

Perkalikan kedua ruas dari persamaan (2.12) dengan  $e^x$  menghasilkan

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

Aturan rantai diferensial dan persamaan (2.11) menghasilkan

$$\frac{d}{dx}(e^u) = e^u \frac{du}{dx}$$

Contoh: Carilah  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi  $y = e^{6x}$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= e^{6x} \frac{d}{dx}(6x) \\ &= e^{6x} (6) \\ &= 6e^{6x} \end{aligned}$$

Contoh: Carilah  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi  $y = e^{x^2 \ln x}$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (e^{x^2 \ln x}) \\ &= e^{x^2 \ln x} \cdot \frac{d}{dx} (x^2 \ln x) \\ &= e^{x^2 \ln x} \left( x^2 \cdot \frac{1}{x} + 2x \ln x \right) \\ &= x e^{x^2 \ln x} (1 + 2 \ln x)\end{aligned}$$

Contoh: Carilah  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi  $y = e^{\sin x}$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= e^{\sin x} \frac{d}{dx} (\sin x) \\ &= e^{\sin x} \cos x\end{aligned}$$

Jika  $y = a^x$  maka

$$\frac{dy}{dx} = (\ln a) a^x \quad \dots (2.13)$$

Bukti:

Gunakan aturan logaritma,

$$\begin{aligned}a^x &= e^{\ln(a^x)} \\ &= e^{x \ln a} \quad \dots (2.14)\end{aligned}$$

Diferensialkan kedua ruas dari persamaan (2.14) menghasilkan

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (a^x) &= \frac{d}{dx} (e^{x \ln a}) \\ &= e^{x \ln a} \frac{d}{dx} (x \ln a) \\ &= e^{x \ln a} (\ln a) \\ &= e^{\ln a^x} (\ln a) \\ &= a^x (\ln a) \\ &= (\ln a) a^x\end{aligned}$$

Catatan:  $\ln a$  merupakan suatu konstanta

Contoh: Carilah  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi  $y = 2^x$

Penyelesaian:

$$\frac{dy}{dx} = (\ln 2) 2^x$$

Aturan rantai diferensial dan persamaan (2.13) menghasilkan

$$\frac{d}{dx} (a^u) = (\ln a) a^u \frac{du}{dx}$$

Contoh: Carilah  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi  $y = 3^{(x^2-1)}$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= (\ln 3) 3^{(x^2-1)} \frac{d}{dx} (x^2 - 1) \\ &= (\ln 3) 3^{(x^2-1)} (2x)\end{aligned}$$

### Masalah Praktis

Carilah  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi-fungsi di bawah ini:

1.  $y = \ln(2 - e^x)$
2.  $y = e^{\sin 5x}$
3.  $y = 4^{-x}$

### Jawaban

1.  $e^x / (e^x - 2)$
2.  $5e^{\sin 5x} \cos 5x$
3.  $-(\ln 4) 4^{-x}$

## KESIMPULAN

Di bawah ini adalah garis besar dari materi yang telah kita pelajari pada bab ini:

## 1. Turunan Bilangan Konstanta:

**Teorema 1.**

Turunan suatu konstanta adalah nol. Jika  $y = c$ , maka

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0$$

## 2. Turunan Variabel Berpangkat:

**Teorema 2.**

Turunan fungsi  $y = x^n$  adalah  $\frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$ , dimana  $n$  merupakan bilangan riil.

## 3. Turunan dari Penjumlahan dua atau Lebih Fungsi:

**Teorema 3.**

Turunan dari jumlah dua atau lebih fungsi yang dapat didiferensialkan terhadap  $x$  sama dengan jumlah dari turunan kedua fungsi tersebut. Jika dua fungsi  $x$  diketahui, sedemikian sehingga  $u = g(x)$  dan  $v = h(x)$  serta  $y = u + v = g(x) + h(x)$  maka

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

## 4. Turunan dari Perkalian Dua atau Lebih Fungsi:

**Teorema 4.**

Turunan dari perkalian dua atau lebih fungsi yang dapat didiferensialkan terhadap  $x$  sama dengan fungsi pertama dikalikan dengan turunan fungsi kedua dijumlahkan dengan fungsi kedua dikali dengan turunan fungsi pertama. Jika

$$y = u \cdot v$$

maka

$$\frac{dy}{dx} = u \cdot \frac{dv}{dx} + v \cdot \frac{du}{dx}$$

Teorema ini memungkinkan untuk dikembangkan untuk memasukkan fungsi fungsi yang ketiga atau lebih. Jika  $y = u \cdot v \cdot w$  maka

$$\frac{dy}{dx} = uv \cdot \frac{dw}{dx} + vw \cdot \frac{du}{dx} + uw \cdot \frac{dv}{dx}$$

## 5. Turunan dari Hasil Bagi Dua Fungsi:

**Teorema 5.**

Suatu fungsi perbandingan dimana penyebutnya tidak sama dengan nol, turunan dari perbandingan dua fungsi yang dapat didiferensialkan terhadap  $x$  sama dengan penyebut dikali dengan turunan pembilang diperkurangkan dengan pembilang dikali dengan turunan penyebut, hasil seluruhnya dibagi dengan pangkat dua dari penyebutnya. Jika  $y = \frac{u}{v}$ , maka

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

## 6. Turunan dari Fungsi Berpangkat:

**Teorema 6.**

Turunan dari beberapa fungsi  $x$  terhadap pangkat  $n$  yang dapat didiferensialkan, dimana  $n$  merupakan bilangan riil, adalah sama dengan  $n$  kali fungsi polinomial  $x$  dengan pangkat  $(n - 1)$  dikali dengan turunan polinomial itu sendiri. Jika

$$y = u^n$$

dimana  $u$  merupakan fungsi terhadap  $x$  yang dapat didiferensialkan, maka

$$\frac{dy}{dx} = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

## 7. Turunan dari Fungsi Berbentuk Pangkat: Untuk mendiferensialkan suatu fungsi yang memiliki fungsi bentuk akar, maka kita harus mengubahnya ke dalam

bentuk faktor berpangkat; kemudian mencari turunannya dengan menggunakan teorema yang memungkinkan.

**8. Turunan Fungsi dengan Menggunakan Aturan Rantai:**

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

dimana variabel  $y = f(u)$  merupakan fungsi yang dapat didiferensialkan terhadap  $u$  dan  $u = g(x)$  merupakan fungsi  $x$  yang dapat didiferensialkan.

**9. Turunan dari Invers Suatu Fungsi:**

**Teorema 7.**

Turunan dari invers suatu fungsi adalah kebalikan dari turunan fungsi awalnya.

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} \quad \text{atau} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

**10. Turunan Fungsi Implisit:** Dalam suatu persamaan yang memuat  $x$  dan  $y$ , jika  $y$  tidak dapat diselesaikan, maka  $y$  dikatakan sebagai *fungsi implisit* terhadap  $x$ . Turunan daritapi suku yang dimuat oleh  $y$  akan diikuti oleh  $\frac{dy}{dx}$ .

**11. Turunan Fungsi Trigonometri:**

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\sin u) &= \cos u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\cos u) &= -\sin u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\tan u) &= \sec^2 u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\cot u) &= -\csc^2 u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\sec u) &= \sec u \tan u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\csc u) &= -\csc u \cot u \frac{du}{dx} \end{aligned}$$

**12. Turunan Fungsi Logaritma Natural: Teorema 8.**

Fungsi logaritma natural  $y = \ln x$  memiliki turunan

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}, \quad \text{untuk } x > 0$$

Jika  $u$  merupakan fungsi positif terhadap  $x$  yang dapat didiferensialkan, maka,

$$\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

**13. Turunan Konstanta Berpangkat Variabel:**

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

$$\frac{d}{dx}(e^u) = e^u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(a^x) = (\ln a)a^x$$

$$\frac{d}{dx}(a^u) = (\ln a)a^u \frac{du}{dx}$$

Dimana  $x$  merupakan variabel,  $u$  merupakan fungsi terhadap  $x$ ,  $a$  merupakan konstanta, dan  $e$  merupakan bilangan yang sama dengan 2,71828...

## SOAL LATIHAN

Carilah turunan  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi-fungsi di bawah ini:

1.  $f(x) = x^{3/4}$
2.  $f(x) = 3x^{-2/3}$
3.  $f(x) = 6x^{-1/3} - 8x^{1/4}$
4.  $f(x) = (2x^3 + 5)(4x^2 - 3)$
5.  $f(x) = (x - 2)(5x - 2)(4x + 3)$
6.  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{1 - x^2}$
7.  $f(x) = (x^5 - 3x^2 + 1)^{-13}$
8.  $f(x) = 6\sqrt[3]{x} + 8\sqrt{x}$
9.  $y = 2t^5 + 1/t^5$  dan  $t = x^4$
10.  $x = 1 + (y + 4)^{3/4}$
11.  $2x + yx - xy^3 = 4$
12.  $f(x) = \sqrt{\cot(x^2)}$
13.  $f(x) = 2 \sec(\sqrt{x}) + 2 \sqrt{\csc x}$
14.  $f(x) = (x^3 + 4)^{1/3} \tan 3x$
15.  $y = [\ln(x^3)]^4$
16.  $y = e^{-1/x} + x^e$
17.  $y = 7^{3(\ln x)}$

## JAWABAN SOAL LATIHAN

1. 0
2.  $-2x^{-5/3}$
3.  $-2x^{-4/3} - 2x^{-3/4}$
4.  $-18x^2 + 8 - 40x^3$
5.  $60x^2 - 66x - 20$
6.  $\frac{4x}{(1-x^2)^2}$
7.  $-13(x^5 - 3x^2 + 1)^{-14}(5x^4 + 6x^{-3})$
8.  $2x^{-2/3} + 2x^{-3/4}$
9.  $40x^{19} - 20x^{-21}$
10.  $\left(\frac{4}{3}\right)(y + 4)^{1/4}$
11.  $\frac{y^3 - y^{-2}}{x - 3xy^2}$
12.  $-x[\cot(x^2)]^{-1/2} [\csc^2(x^2)]$
13.  $x^{-1/2} \sec(\sqrt{x}) \tan(\sqrt{x}) - \sqrt{\csc x} \cot x$
14.  $3(x^3 + 4)^{1/3} \sec^2(3x) + \tan(3x)(x^3 + 4)^{-2/3} x^2$
15.  $\frac{12[\ln(x^3)]^2}{x}$
16.  $e^{-1/x} \frac{1}{x^2} + ex^{e-1}$
17.  $(\ln 7) 7^{3(\ln x)} \frac{3}{x}$

## SOAL PILIHAN GANDA

1. Turunan dari  $y = 3x^2 + 100$  adalah ...
  - a.  $6x$
  - b.  $6x^2$
  - c.  $5x + 10$
  - d.  $3x^2 + 6x\Delta x + 100$
2. Turunan dari  $y = 2x^3$  adalah ...
  - a.  $2x^6$
  - b.  $5x^3$
  - c.  $6x^2$
  - d.  $6x^2 + 6x$
3. Turunan dari  $y = \frac{1}{x^2}$  adalah ...
  - a.  $2x$
  - b.  $\frac{1}{2x}$
  - c.  $-\frac{2}{x^3}$
  - d.  $-\frac{1}{x} + 2$
4. Kemiringan dari  $y = 5x^2$  pada  $x = 4$  adalah ...
  - a. 5
  - b. 15
  - c. 30
  - d. 40
5. Kemiringan dari  $y = x^2 - 4x + 4$  pada  $x = 1$  adalah ...
  - a. -2
  - b. 2
  - c. 0
  - d. 4
6. Terdapat suatu titik maksimum atau minimum di kurva  $y = 2x^2 - 8x$  pada  $x$  sama dengan ...
  - a. 1
  - b. 2
  - c. 8
  - d. 4

7. Pada kurva  $s = \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 - 12t + 4$ , dimana  $-7 \leq t \leq 6$ , terdapat titik maksimum atau minimum pada  $t$  sama dengan ...
  - a. 2 dan -5
  - b. 3 dan -4
  - c. 3 dan 6
  - d. 3 dan -2
8. Turunan dari konstanta adalah ...
  - a. Satu
  - b. Nol
  - c. Tak hingga
  - d. Konstanta
9. Diketahui fungsi  $y = 12$ , jika kita bergerak dari titik  $x$  menuju titik  $x + \Delta x$ , apakah yang terjadi pada nilai  $y + \Delta y$ ?
  - a. Akan bertambah
  - b. Akan berkurang
  - c. Bervariasi bergantung besarnya  $\Delta x$
  - d. Semuanya bernilai sama
10. Turunan dari  $f(x) = x^4$  adalah
  - a.  $\frac{x^3}{4}$
  - b.  $x^3$
  - c.  $4x^2$
  - d.  $4x^3$
11. Jika  $f(x) = x^n$  dan  $\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)^n - x^n}{\Delta x}$  maka  $\Delta x$  mendekati 0,  $f'(x)$  sama dengan ...
  - a.  $\frac{x^{n-1}}{0}$
  - b.  $\frac{x^{n-1}}{\Delta x}$
  - c.  $nx^{n-1}$
  - d.  $\frac{x+\Delta x}{\Delta x}$

12.  $\frac{dy}{dx}$  dari  $y = kx^2$  adalah ...
- $2x$
  - $2kx$
  - $Kx$
  - $\frac{k}{x}$
13. Turunan dari jumlah dua atau lebih fungsi yang dapat didiferensialkan terhadap  $x$  adalah sama dengan ....
- Perkalian dari turunan mereka
  - Perkalian dari limit mereka
  - Jumlah dari limit mereka
  - Jumlah dari turunan mereka
14. Carilah  $\frac{dy}{dx}$  dari  $y = tx^4 + sx^3 + x^2 + 6$ .
- $4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$
  - $4tx^3 + 3sx^2 + 2x$
  - $4tx^3 + 3sc^2 + 2x + 1$
  - $4x^3 + 3x^2 + 2x + 6$

Untuk menjawab soal nomor 47 dan 48, bacalah terlebih dahulu informasi di bawah ini:

Hubungan antara waktu  $t$  penerbangan dalam detik dan ketinggian  $a$ , dalam kaki dari peluru diketahui ditentukan dengan persamaan berikut ini:

$$a = vt - 16t^2,$$

dimana  $v$  merupakan kecepatan dari peluru. Diasumsikan bahwa senjata memiliki kecepatan 384 kaki per detik pada saat ditembakkan, bentuk persamaan dari ketinggian peluru menjadi  $a = 384t - 16t^2$ .

15. Berapa lamakah setelah peluru ditembakkan akan menghasilkan ketinggian yang maksimum? (petunjuk: carilah  $\frac{da}{dt}$  dan gunakan proses untuk mendapatkan nilai maksimum)

- 14 detik
  - 12 detik
  - 10 detik
  - 8 detik
16. Berapakah ketinggian maksimum yang akan dicapai oleh peluru?
- 1,152 kaki
  - 2,304 kaki
  - 3,456 kaki
  - 4,608 kaki
17. Turunan dari dua fungsi yang dapat didiferensialkan terhadap  $x$  sama dengan perkalian dari turunan fungsi tersebut.
- Benar
  - Salah
18. Carilah  $\frac{dy}{dx}$  dari  $y = x^2(3x)$
- $6x^2$
  - $6x^2 + 3x$
  - $3x^2 + 6$
  - $9x^2$
19. Jika  $f(x) = (x^2 + 3x)(x^3 + 4)$ , bagaimanakah bentuk  $\frac{dy}{dx}$ ?
- $6x^3 + 9x^2$
  - $5x^4 + 12x^3 + 8x + 12$
  - $(x^2 + 3x)(3x^2 + 1) + (x^3 + 4)(2x)$
  - $(x^2 + 3x)(3x^2 + 1) + (x^3 + 4)(2x + 3)$
20.  $\frac{dy}{dx}$  dari  $3x^2(2x + 4)(tx^3)$  adalah ...
- $(2x + 4)(tx^3)(6x) + (3x^2)(tx^3)(6) + (3x^2)(2x + 4)(3tx^2)$
  - $(3x^2)(2x + 4)(3x^2) + (2x + 4)(3tx^2)(2) + (3x^2)(tx^3)(6x)$
  - $(3x^2)(2x + 4)(3tx^2) + (2x + 4)(tx^3)(2) + (3x^2)(tx^3)(2)$
  - $(3x^2)(2x + 4)(3tx^2) + (2x + 4)(tx^3)(6x) + (3x^2)(tx^3)(2)$

21. Jika  $w = g(x)$  dan  $z = h(x)$ , maka turunan dari  $\frac{z}{w}$  sama dengan ....

- $\frac{wg'(x) - zh'(x)}{z^2}$
- $\frac{wh'(x) - zg'(x)}{w^2}$
- $\frac{zg'(x) - wh'(x)}{z^2}$
- $\frac{zh'(x) - wg'(x)}{w^2}$

22. Turunan dari  $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x^3 + 2}$  adalah

- $\frac{-x^4 + 6x^3 + 9x^2 + 6x + 3}{(x^3 + 2)^2}$
- $\frac{x^4 + 6x^3 + 9x^2 + 6x - 3}{(x^3 + 2)^2}$
- $\frac{-x^4 + 6x^3 - 9x^2 + 4x + 3}{(x^3 + 2)^2}$
- $\frac{x^4 + 9x^3 - 9x^2 + 4x - 6}{(x^3 + 2)^2}$

23. Jika  $y = (u(x))^t$ , maka  $\frac{dy}{dx}$  sama dengan ....

- $t[u(x)]^{t-1} [u'(x)]$
- $t[u(x)]^{t-1} \frac{u'(x)}{t'(x)}$
- $t[u(x)]^{t-1}$
- $\frac{tu'(x)}{[u(x)]^{t-1}}$

24. Apakah turunan dari  $g(x) = (x^4 + 3x^3 + 2x)^5$ ?

- $5(x^4 + 3x^3 + 2x)(4x^3 + 9x + 2)$
- $5(x^4 + 3x^3 + 2x)(4x^3 + 9x^2 + 2)$
- $5(x^4 + 3x^3 + 2x)^4 (4x^3 + 9x + 2)$
- $5(x^4 + 3x^3 + 2x)^4 (4x^3 + 9x^2 + 2)$

25. Ubahlah persamaan fungsi  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{(x+3)^3}}$  menggunakan persamaan eksponen.

- $(x+3)^{-3/2}$
- $(x+3)^{3/2}$
- $\frac{1}{(x+3)^{-1/2}}$
- $\frac{1}{(x+3)^{-3/2}}$

26.  $\frac{dy}{dx}$  dari  $f(x) = \frac{4x-6}{\sqrt{x^2+3x+2}}$  sama dengan

- $(4x^2 - 9)\sqrt{x^2 + 3x + 2} + 4\sqrt{x^2 + 3x + 2}$
- $\frac{9-4x^2}{\sqrt{x^2+3x+2}} + \frac{4}{\sqrt{x^2+3x+2}}$
- $\frac{4}{\sqrt{x^2+3x+2}} - \frac{4x^2-9}{\sqrt{x^2+3x+2}}$
- $\frac{4x^2-9}{\sqrt{x^2+3x+2}} + 4\sqrt{x^2 + 3x + 2}$

27. Jika  $y = (z + 3)^2$  dan  $z = x + 3$ , maka berdasarkan aturan rantai  $\frac{dy}{dx}$  sama dengan ...

- $\frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$
- $\frac{dy}{dx} \frac{dx}{dz}$
- $\frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx}$
- $\frac{dz}{dx} \frac{dy}{dx}$

28. Jika  $y = (t^2 + 1)^3$  dan  $t = (x^2 + 5)$ . Maka  $\frac{dy}{dx}$  sama dengan ...

- $12x (t^2 + 1)^2$
- $12(x^2 + 5)[(x^2 + 5)^2 + 1]^2$
- $3[(x^2 + 5)^2 + 1]^2$
- $12x(x^2 + 5)[(x^2 + 5)^2 + 1]^2$

29. Turunan dari suatu fungsi invers sama dengan ...

- Negatif kebalikan dari turunan fungsi awalnya
- Kebalikan dari turunan fungsi awalnya
- Turunan dari fungsi awalnya
- Negatif dari turunan fungsi awalnya

30. Jika  $x = \frac{5}{y} + y^2$ , maka  $\frac{dy}{dx}$  sama dengan ...

- $y^2(2y^3 - 5y)^{-1}$
- $y^2(2u^3 - 5)^{-2}$
- $\frac{y^2}{2y^3 - 5}$
- $\frac{y^2}{2y^3 - 5y}$

31. Manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR berdasarkan persamaan:  $ax^2 + xy + y^2 = 0$ ?
- $x$  merupakan fungsi eksplisit terhadap  $y$
  - $y$  bebas dari  $x$
  - $y$  merupakan fungsi eksplisit terhadap  $x$
  - $y$  merupakan fungsi implisit terhadap  $x$
32. Turunan  $\frac{dy}{dx}$  dari fungsi  $x^2 + xy^2 + y = 0$  adalah ...
- $\frac{-2x-y^2}{1+2x}$
  - $\frac{-2x-y^2}{1+2xy}$
  - $\frac{1+2xy}{2x+y^2}$
  - $\frac{1+2x}{2x+y^2}$
33. Carilah  $\frac{d}{dx}(\cos \theta)$
- $\sin \theta \frac{d\theta}{dx}$
  - $-\sin \theta \frac{d\theta}{dx}$
  - $-\cos \theta \frac{d\theta}{dx}$
  - $\cos \theta \frac{d\theta}{dx}$
34.  $\frac{d}{dx} \left( \frac{\sin u}{\cos u} \right)$  ekuivalen dengan ...
- $\frac{1}{\cos^2 u} \frac{du}{dx}$
  - $\frac{\sec^2 u \frac{du}{dx}}{(\cos^2 u + \sin^2 u) \frac{du}{dx}}$
  - $\frac{\sec^2 u \frac{du}{dx} - \sin^2 u \frac{du}{dx}}{\cos^2 u}$
  - $\frac{(\cos u)(\cos u) \frac{du}{dx} - (\sin u)(-\sin u) \frac{du}{dx}}{\cos^2 u}$
35. Fungsi  $y = \sin 2x \cos x$  merupakan turunan dari ...
- $-\sin^2 x + 2 \cos^2 x$
  - $-\sin 2x \sin x + \cos x \cos 2x$
  - $-\sin 2x \sin x + 2 \cos x \cos 2x$
  - $\sin 2x \sin x + 2 \cos x \cos 2x$

36. Jika  $y = (\tan 2\theta)^2 (\sin 2\theta)$ , maka  $\frac{dy}{d\theta}$  sama dengan ....
- $(\tan^2 2\theta)(\cos 2\theta) + (\sin 2\theta)(2)(\tan 2\theta)(\sec^2 2\theta)$
  - $(\tan^2 2\theta)(2)(\cos 2\theta) + (\sin 2\theta)(2 \tan 2\theta)(\sec^2 2\theta)$
  - $(\tan 2\theta)^2 (\cos 2\theta) + (\sin 2\theta)(2)(\tan 2\theta)(\sec^2 2\theta)$
  - $(\tan^2 2\theta)(\cos 2\theta)(2) + (\sin 2\theta)(2)(\tan 2\theta)(\sec^2 2\theta)(2)$
37. Carilah  $\frac{dy}{dx}$  dari  $y = e^{2x} + 1$
- $2e^{2x+1}$
  - $e^{2x} + 1$
  - $2e^{2x}$
  - $2xe^{2x}$
38. Carilah  $\frac{dy}{dx}$  dari  $y = 8^{4x} + \ln(x^4)$
- $8^{4x} + \frac{1}{x^4}$
  - $4(\ln 8) 8^{4x} + \frac{4}{x}$
  - $(\ln 8) 8^{4x} + \frac{4}{x}$
  - $4(\ln 8) 8^{4x} + 4x^3$

## SOAL UJIAN

Untuk soal 1 sampai 5, tentukan turunan pertama dari setiap fungsi yang diberikan.

1.  $f(x) = \sin(\ln 2x)$ .
2.  $f(x) = \ln(\sin 2x)$ .
3.  $f(x) = \ln \frac{1-x^2}{1+x^2}$ .
4.  $f(x) = \ln(1 + e^x)$ .
5.  $f(x) = e^{\sin x}$ .

Untuk soal 6 sampai 7, tentukan turunan implicit pertama  $y'$  dari setiap bentuk implisit yang diberikan.

6.  $\ln xy = ye^x + 3xy^2$ .
7.  $e^{xy} = \ln(1 + x^2y) + \cos y$ .

Untuk soal 8 sampai 10, tentukan turunan pertama dari setiap fungsi yang diberikan.

8.  $f(x) = (\sin x)^x$ .
9.  $f(x) = (\cos x)^{\sin x}$ .
10.  $f(x) = x^{\ln x}$ .

Untuk soal 11 sampai 15, hitunglah limit dari setiap bentuk tak tentu yang diberikan.

11.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln^2(1+x)}{x^2}$ .
12.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{2/\ln x}$ .
13.  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin^2 x)^{\tan x}$ .
14.  $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^3 + 1)^{1/\ln x}$ .
15.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{2x}$ .

BAB 3  
INTEGRAL

Dua pembahasan utama di dalam kalkulus yaitu kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Setelah mempelajari kalkulus diferensial pada pembahasan sebelumnya, sekarang kita akan membahas tentang kalkulus integral. Sebenarnya, integral merupakan invers dari diferensial seperti halnya pembagian merupakan invers dari perkalian, dan pengurangan merupakan invers dari penjumlahan.

## 3.1. Definisi Integral

Integral didefinisikan sebagai invers dari diferensial. Ketika kita berhadapan dengan diferensial, kita akan diberikan suatu fungsi  $F(x)$  dan diharapkan untuk mencari turunan dari fungsi tersebut. Di dalam integral kita akan diberikan suatu turunan dari suatu fungsi dan kemudian diharapkan untuk mendapatkan fungsi awalnya. Maksudnya, ketika kita diberikan suatu fungsi  $f(x)$ , kita akan mencari fungsi yang lainnya yaitu  $F(x)$ , sedemikian sehingga

$$\frac{d}{dx} F(x) = f(x) \quad \dots (3.1)$$

Dengan kata lain, ketika kita memiliki fungsi  $f(x)$ , kita harus mendapatkan fungsi  $F(x)$  yang turunannya adalah fungsi  $f(x)$ .

Jika kita merubah persamaan (3.1) dengan menuliskan

$$d F(x) = f(x) dx \quad \dots (3.2)$$

kita telah menggunakan  $dx$  sebagai diferensial. Pernyataan yang sama dengan persamaan (3.2) adalah


$$F(x) = \int f(x) dx$$

Kita sebut  $f(x)$  merupakan integrand, dan kita sebut  $F(x)$  sama dengan integral tak hingga dari  $f(x)$ . Huruf S yang diperpanjang menjadi  $\int$  merupakan simbol dari integral. Simbol ini digunakan karena integral menunjukkan suatu penjumlahan limit.

Kita akan menggunakan istilah luas daerah di bawah kurva untuk mempresentasikan suatu integral. Kita akan melihat, bagaimanapun, bahwa suatu integral dapat dipresentasikan dengan berbagai hal, dan hal itu dapat berupa sesuatu yang riil atau abstrak. Hal ini akan disajikan dalam bentuk bidang, luas, volume, atau permukaan suatu bidang dari beberapa gambar.

### 3.2. Daerah di bawah kurva

Untuk mendapatkan luas daerah di bawah kurva, kita pastinya akan setuju dengan yang satu ini. Pada gambar 3-1, dimana  $f(x)$  sama dengan konstanta 4 dan gambar kurvanya merupakan garis lurus



Gambar 3-1. Luas daerah segiempat


luas daerah segiempat diperoleh dengan mengalikan tinggi dan lebarnya. Sehingga, luas daerah yang berada di bawah kurva tersebut adalah

$$A = 4(b - a)$$

Masalah selanjutnya adalah menemukan metode untuk menentukan luas daerah di bawah kurva, untuk kurva yang kontinu. Pada gambar 3-2, luas daerah di bawah kurva

$$y = f(x)$$

antara titik  $x$  dan  $x + \Delta x$  diperkirakan mendekati  $f(x) \Delta x$ . Kita menganggap bahwa  $\Delta x$  merupakan suatu bilangan yang kecil dan luas daerah yang dihasilkan adalah  $\Delta A$ . Luas daerah di bawah kurva ini mendekati bentuk segiempat. Daerah  $\Delta A$ , di bawah kurva, akan berbeda dengan daerah segiempat dengan daerah segitiga ABC jika AC merupakan garis lurus.




Gambar 3-2. Luas daerah  $\Delta A$

Ketika  $\Delta x$  menjadi kecil dan makin kecil, daerah ABC adakan menjadi semakin kecil pada besaran yang tetap, dan ABC akhirnya menjadi tak berbeda atau mendekati daerah segitiga. Daerah segitiga ini akan menjadi memungkinkan ketika  $\Delta x$  yang diambil merupakan bilangan yang sangat

amat kecil. Oleh karena itu, untuk nilai yang cukup kecil dari  $\Delta x$ , kita dapat mengatakan bahwa

$$\Delta A \approx f(x) \Delta x$$

Sekarang, jika kita mempunyai kurva seperti pada gambar 3-3, jumlah dari seluruh segiempat akan mendekati sama dengan luar daerah di bawah kurva dan sekitaran garis antara  $a$  dan  $b$ . Perbedaan antara luas daerah di bawah kurva yang sebenarnya dengan jumlah daerah segiempat adalah karena akan menjumlahkan juga daerah segitiga yang berada di atas tiap-tiap segiempat.



Gambar 3-3. Luas daerah partisi-partisi segiempat

$\Delta x$  diusahakan sekecil-kecil mungkin, jumlah dari daerah segiempat akan mendekati nilai luas daerah di bawah kurva. Jumlah luas daerah segiempat disimbolkan dengan

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x \quad \dots (3.3)$$

dimana  $\Sigma$  (sigma) merupakan simbol dari penjumlahan,  $n$  merupakan banyaknya segiempat,  $f(x) \Delta x$  merupakan luas tiap daerah segiempat, dan  $k$  menunjukkan bilangan untuk tiap-tiap segiempat. Pada contoh yang yang baru saja kita

diskusikan, hanya memiliki empat segiempat, sehingga dapat kita tuliskan


$$A = \sum_{k=1}^4 f(x_k) \Delta x$$

dan kita akan mendapatkan hanya jumlah dari empat segiempat dan tidak begitu mendekati luas daerah di bawah kurva yang sebenarnya.

Ketika menggunakan limit penjumlahan, seperti halnya pada persamaan (3.3), kita akan memerlukan suatu teknik aljabar untuk mendapatkan luas daerah di bawah kurva yang sebenarnya.

Pada poin ini kita akan dihadapkan oleh pilihan dalam menggunakan aritmatika dan mendapatkan luas daerah di bawah kurva yang mendekati atau menggunakan aljabar singkat untuk mendapatkan luas daerah yang sebenarnya.

Sekarang kita akan menggunakan kalkulus untuk mendapatkan luas daerah di bawah kurva lebih mudah.




Gambar 3-4. Penggambaran limit

Pada gambar 3-4, luas daerah di bawah kurva, dari  $a$  sampai  $b$ , menunjukkan bahwa jumlah luas daerah daerah  $aA_c$  dan  $cA_b$ . Simbol  $aA_c$  berarti luas daerah di bawah kurva antara  $a$  dan  $c$ .

Teorema Nilai Rata-rata menyatakan bahwa

$${}_aA_b = f(c) (b - a)$$

dimana  $f(c)$  pada gambar 3-4 menunjukkan nilai dari fungsi pada titik tengah antara  $a$  dan  $b$ .



Gambar 3-5. Penjumlahan luas daerah  $f(x)$

Sekarang kita akan merubah sedikit gambar 3-4 seperti yang terlihat pada gambar 3-5. Ketika

$$x = a$$

maka

$${}_aA_a = 0$$

Kita lihat pada gambar 3-5 bahwa

$${}_aA_x + {}_x A_{(x+\Delta x)} = {}_a A_{(x+\Delta x)}$$

oleh karena itu, penjumlahan daerah, seperti yang diperlihatkan, adalah

$$\Delta A = {}_x A_{(x+\Delta x)}$$

Berdasarkan pada gambar 3-5 yang menunjukkan

$$\begin{aligned} {}_x A_{(x+\Delta x)} &= f(c) (x + \Delta x - x) \\ &= f(c) \Delta x \end{aligned}$$

atau

$$\frac{\Delta A}{\Delta x} = f(c)$$

dan untuk  $\Delta x$  mendekati 0, kita peroleh

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (A) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta x} \\ &= \lim_{c \rightarrow x} f(c) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Sekarang, dari definisi integral

$$\begin{aligned} {}_aA_x &= \int f(x) dx \\ &= F(x) + C \end{aligned} \quad \dots (3.4)$$

dimana  $C$  merupakan konstanta dari integral, dan

$${}_aA_a = F(a) + C$$

tetapi

$${}_aA_a = 0$$

oleh karena itu,

$$F(a) + C = 0$$

Dengan mencari nilai  $C$ , kita peroleh

$$C = -F(a)$$

dan dengan mensubstitusi  $-F(a)$  ke persamaan (3.4), kita peroleh

$${}_aA_x = F(x) - F(a)$$

jika kita misalkan

$$x = b$$

maka

$${}_aA_b = F(b) - F(a) \quad \dots (3.5)$$

dimana  $F(b)$  dan  $F(a)$  merupakan hasil integral fungsi suatu kurva pada nilai  $b$  dan  $a$ .

Bilangan konstanta integral  $C$  dihilangkan pada persamaan (3.5) karena ketika fungsi kurva pada  $b$  dan  $a$  diintegrasikan,  $C$  akan hadir pada keduanya  $F(a)$  dan  $F(b)$  serta keduanya akan diperkurangkan dengan sendirinya.

Catatan: Konsep bilangan konstanta integral akan lebih dijelaskan pada bagian akhir bab ini.

Contoh: Carilah luas daerah di bawah kurva

$$y = 2x - 1$$

pada gambar 3-6, yang dibatasi dengan garis vertikal pada titik  $a$  dan  $b$  serta sumbu  $x$

Penyelesaian:

Kita ketahui bahwa

$${}_aA_b = F(b) - F(a)$$


dan kita peroleh bahwa

$$\begin{aligned} F(x) &= \int f(x) dx \\ &= \int (2x - 1) dx \\ &= x^2 - x \end{aligned}$$

Maka, dengan mensubstitusi nilai  $a$  dan  $b$  ke dalam persamaan  $F(x) = x^2 - x$ , kita akan peroleh bahwa:

ketika  $x = a = 1$ ,  $F(a) = 1 - 1 = 0$  dan

ketika  $x = b = 5$ ,  $F(b) = 25 - 5 = 20$ .



Gambar 3-6. Luas daerah segitiga dan segiempat

Maka dengan mensubstitusi nilai-nilai di atas pada

$${}_aA_b = F(b) - F(a)$$

kita akan peroleh:

$${}_aA_b = 20 - 0 = 20$$

Kita dapat membuktikan hal ini dengan memperhatikan segitiga pada gambar 3-6 yang memiliki alas 4 dan tinggi 8 yang berada pada daerah segiempat yang memiliki tinggi 1 dan alas 4. Dengan mengetahui bentuk umumnya, kita dapatkan luas daerah di bawah kurvanya adalah 20.

Penjelasan di atas, kita menggunakan simbol  $A$  sebagai artian dari anti turunan. Istilah anti turunan ini ke depannya akan kita kenal dengan sebutan integral.

Jika kita menggunakan simbol integral maka pembahasannya bisa diperjelas sebagai berikut:

### Teorema Nilai Rata-rata

Jika fungsi  $f$  kontinu pada selang antara  $a$  dan  $b$ , maka terdapat  $c$  yang berada di antara  $a$  dan  $b$  sehingga

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a)$$

Bukti:

Dalam kasus  $a = b$ ,

Maka

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

Dan

$$f(c)(b - a) = 0$$

sehingga rumusnya terbukti secara otomatis dengan  $c = a = b$ .

Dalam kasus  $a < b$ ,

karena fungsi  $f$  kontinu pada selang antara  $a$  dan  $b$ , maka terdapat  $c$  yang berada di antara  $a$  dan  $b$  sehingga,

$$f(c) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx$$

Hal ini memberikan


$$f(c)(b - a) = \int_a^b f(x) dx$$

Sehingga terbukti bahwa yang diinginkan.

Berikut ini adalah gambaran dari teorema nilai rata-rata integral ini.

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a)$$

Pada gambar 3-7 luas daerah di bawah grafik fungsi kontinu  $f$  dan di atas sumbu  $X$  serta  $x = a$  dan  $x = b$  adalah



Gambar 3-7. Grafik fungsi antara selang  $a$  dan  $b$

Luas daerah ini sama dengan luas persegi panjang yang alasnya  $b - a$  dan tingginya  $f(c)$ , yaitu  $L = f(c)(b - a)$ .

### 3.3. Integral Tak Tentu

Ketika kita menemukan turunan dari suatu fungsi, kita tuliskan

$$\frac{d}{dx} F(x) = f(x)$$

dimana turunan dari  $F(x)$  adalah  $f(x)$ . Masalah kita sekarang adalah mencari  $F(x)$  ketika  $f(x)$  diketahui.

Kita ketahui bahwa simbol  $\int \dots dx$  merupakan invers dari  $\frac{d}{dx}$ , atau ketika kita dihadapkan dengan diferensial, operator simbol  $d$  dan  $\int$  saling invers satu sama lainnya; yaitu,

$$F(x) = \int f(x) dx$$

dan ketika turunan dari kedua dicari,  $d$  menghapuskan  $\int$ , sehingga kita memiliki

$$d F(x) = f(x) dx$$

atau ketika  $\int \dots dx$  menghilangkan  $\frac{d}{dx}$ , kita tuliskan

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} F(x) &= \frac{d}{dx} \int f(x) dx \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Dari sini, kita peroleh bahwa

$$d(x^3) = 3x^2 dx$$

sehingga,

$$\int 3x^2 dx = x^3 + C$$

Juga dapat kita tuliskan

$$d(x^3 + 3) = 3x^2 dx$$

sehingga

$$\int 3x^2 dx = x^3 + 3$$

Hal lain juga, kita dapatkan bahwa

$$d(x^3 + 9) = 3x^2 dx$$

sehingga

$$\int 3x^2 dx = x^3 + 9$$

Hal ini menggiring kita untuk mengatakan bahwa

$$d(x^3 + C) = 3x^2 dx$$

dan

$$\int 3x^2 dx = x^3 + C$$

dimana  $C$  merupakan konstanta integral

Suatu bilangan yang bebas dari variabel dalam integral disebut sebagai konstanta integral. Karena  $C$  merupakan suatu nilai yang tak terhingga besarnya, maka pernyataan diferensial mungkin memiliki banyak hasil integral dibedakan hanya dari konstantanya saja. Hal ini mengatakan bahwa dua integral akan memiliki fungsi yang sama dan hanya berbeda dari konstanta integralnya saja. Kita asumsikan bahwa pernyataan diferensial memiliki paling tidak satu integral. Karena integral mengandung  $C$  dan  $C$  itu tak terhingga banyaknya, maka kita sebutkan

$$F(x) + C$$

Merupakan integral tak terhingga dari  $F(x) dx$ . Dalam bentuk umumnya kita katakan

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Untuk fungsi  $f$  yang diketahui, kita dapat mempunyai lebih dari satu anti turunan, seperti yang diberikan pada contoh berikut

Contoh: Carilah integral dari fungsi

$$f(x) = \sin 2x$$

Penyelesaian:

Fungsi

$$f(x) = \sin 2x,$$

mempunyai beberapa hasil integral (anti turunan).

Disini terdapat tiga fungsi  $F$  yang memenuhi

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

yaitu:

$$F_1(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x + C$$

$$F_2(x) = \sin^2 x + C$$

$$F_3(x) = -\cos x \cos^2 x + C$$

Karena,

$$F_1'(x) = -\frac{1}{2}(-\sin 2x) \cdot 2$$

$$= \sin 2x$$

$$= f(x)$$

$$F_2'(x) = 2 \sin x \cos x$$

$$= \sin 2x$$

$$= f(x)$$

$$F_3'(x) = -2(\cos x)(-\sin x)$$

$$= \sin 2x$$

$$= f(x)$$

Maka fungsi  $F_1$ ,  $F_2$ , dan  $F_3$  semuanya adalah anti turunan dari fungsi  $f$  pada  $\mathbb{R}$ . Hubungan antara ketiga anti turunan dari fungsi  $f$  tersebut adalah,

$$-\frac{1}{2} \cos 2x = \sin^2 x - \frac{1}{2} = -\cos^2 x + \frac{1}{2}$$

Fenomena pada contoh ini menyatakan bahwa anti turunan dari suatu fungsi tidak tunggal, anti turunan yang satu dengan yang lainnya berbeda dengan suatu konstanta integral.

Dengan memperhatikan bilangan konstanta integral, suatu teorema dan kebalikannya akan dinyatakan seperti di bawah ini:

### Teorema 1.

Jika dua fungsi berbeda bilangan konstantanya, maka keduanya akan memiliki turunan yang sama

**Teorema 2.**

Jika dua fungsi memiliki turunan yang sama, maka yang berbeda dari keduanya hanyalah bilangan konstantanya.

**3.4. Aturan Integral**

Walaupun integral merupakan invers dari diferensial dan kita mengetahui aturan-aturan dari diferensial, kita diharapkan untuk mendapatkan jawaban dalam bentuk integralnya dengan cara coba-coba. Namun demikian, terdapat beberapa aturan untuk membantu kita dalam menentukan jawabannya.

Pada bagian ini kita akan membahas empat dari beberapa aturan dan bagaimana aturan tersebut digunakan untuk mengintegalkan bentuk-bentuk sederhana. Pada aturannya kita akan memisalkan  $u$  dan  $v$  sebagai fungsi yang dapat didiferensialkan dalam variabel  $x$ . Kita misalkan  $C$ ,  $n$ , dan  $a$  sebagai konstanta

**Aturan 1.**

$$\int du = u + C$$

Integral dari diferensial suatu fungsi adalah fungsi itu sendiri ditambah dengan suatu konstanta.

**Bukti:**

Jika

$$\frac{d}{du}(u + C) = 1$$

maka

$$d(u + C) = du$$

dan

$$\int du = u + C$$

Contoh: Hitunglah integral dari  $\int dx$

Penyelesaian:

Dengan menggunakan aturan 1, kita memperoleh

$$\int dx = x + C$$
**Aturan 2.**

$$\int a du = a \int du = au + C$$

Suatu konstanta dapat dipindahkan ke depan simbol integral. Catatan: Suatu variabel TIDAK dapat dipindahkan ke depan simbol integral.

**Bukti:**

Jika

$$\frac{d}{du}(au + C) = a \frac{d}{du}(u + C) = a$$

maka

$$d(au + C) = a d(u + C) = a du$$

dan

$$\int a du = a \int du = au + C$$

Contoh: Hitunglah integral dari  $\int 4 dx$

Penyelesaian:

Dengan menggunakan aturan 2, kita memperoleh

$$\int 4 dx = 4 \int dx$$

dan dengan menggunakan aturan 1, kita memperoleh

$$\int dx = x + C$$

Sedemikian sehingga,

$$\int 4 dx = 4x + C$$

**Aturan 3.**

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

Integral dari  $u^n du$  dapat diperoleh dengan menambahkan 1 pada bilangan pangkatnya dan membaginya dengan bilangan pangkat yang baru. Catatan: jika  $n$  adalah  $-1$ , aturan ini tidak berlaku dan kita gunakan metode yang lainnya.

**Bukti:**

Jika

$$\frac{d}{du} \left( \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \right) = \frac{(n+1)u^n}{n+1} du = u^n du$$

maka

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

Contoh: Hitunglah integral dari  $\int x^3 dx$ 

Penyelesaian:

Dengan menggunakan aturan 3,

$$\begin{aligned} \int x^3 dx &= \frac{x^{3+1}}{3+1} + C \\ &= \frac{x^4}{4} + C \end{aligned}$$

Contoh: Hitunglah integral dari  $\int \frac{7}{x^3} dx$ 

Penyelesaian:

Pertama-tama kita ubah bentuk fungsinya menjadi

$$\int 7x^{-3} dx$$

Kemudian dengan menggunakan aturan 2, ditulis menjadi

$$7 \int x^{-3} dx$$

Dan dengan menggunakan aturan 3, menjadi

$$\begin{aligned} 7 \int x^{-3} dx &= 7 \left( \frac{x^{-2}}{-2} \right) + C \\ &= -\frac{7}{2x^2} + C \end{aligned}$$

**Aturan 4.**

$$\begin{aligned} \int (du + dv + dw) &= \int du + \int dv + \int dw \\ &= u + v + w + C \end{aligned}$$

Integral dari penjumlahan sama dengan jumlah dari integralnya.

**Bukti:**

Jika

$$d(u + v + w + C) = du + dv + dw$$

maka

$$\int (du + dv + dw) = (u + C_1) + (v + C_2) + (w + C_3)$$

Sedemikian sehingga

$$\int (du + dv + dw) = u + v + w + C$$

dimana

$$C = C_1 + C_2 + C_3$$

Contoh: Hitunglah integral dari  $\int (2x - 5x + 4) dx$ 

Penyelesaian:

Kita tidak akan menggabungkan  $2x$  dan  $-5x$ .

$$\begin{aligned} \int (2x - 5x + 4) dx &= \int 2x dx - \int 5x dx + \int 4 dx \\ &= 2 \int x dx - 5 \int x dx + 4 \int dx \\ &= \frac{2x^2}{2} + C_1 - \frac{5x^2}{2} + C_2 + 4x + C_3 \\ &= x^2 - \frac{5}{2}x^2 + 4x + C \end{aligned}$$

dimana  $C$  merupakan jumlah dari  $C_1$ ,  $C_2$ , dan  $C_3$ .Contoh: Hitunglah integral dari  $\int (x^{1/2} + x^{2/3}) dx$ 

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \int (x^{1/2} + x^{2/3}) dx &= \int x^{1/2} dx + \int x^{2/3} dx \\ &= \frac{x^{3/2}}{3/2} + C_1 + \frac{x^{5/3}}{5/3} + C_2 \\ &= \frac{2x^{3/2}}{3} + \frac{3x^{5/3}}{5} + C \end{aligned}$$

Sekarang kita akan mendiskusikan perhitungan dari konstanta integral.

Jika kita menemukan persamaan kurva yang mana turunan pertamanya dua kali variabel bebas  $x$ , kita dapat menuliskan

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

atau

$$dy = 2x dx \quad \dots (1)$$

kita mungkin mendapatkan persamaan yang diinginkan untuk kurva dengan cara mengintegalkan persamaan tersebut dengan  $dy$ ; yaitu, dengan mengintegalkan kedua ruas dari persamaan (1). Jika

$$dy = 2x \, dx$$

maka,

$$\int dy = \int 2x \, dx$$

Tetapi, karena

$$\int dy = y$$


dan

$$\int 2x \, dx = x^2 + C$$

maka

$$y = x^2 + C$$

Kita mendapatkan hanya bentuk umum persamaan dari kurva karena kurva akan berbeda pada masing-masing nilai yang kita simbolkan dengan  $C$ . Hal ini ditunjukkan pada gambar 3-8. Jika kita menentukan bahwa  $x = 0$  dan  $y = 6$ , kita mungkin saja mendapatkan nilai  $C$  yang tertentu dan begitupula dengan kurvanya.



Gambar 3-8. Kumpulan kurva

Misalkan bahwa

$$y = x^2 + C, \quad x = 0, \quad \text{dan} \quad y = 6$$

maka diperoleh

$$6 = 0^2 + C$$

atau

$$C = 6$$

Dengan mensubstitusi nilai 6 ke dalam persamaan umumnya, kita mendapatkan bahwa persamaan untuk kurva tertentu adalah

$$y = x^2 + 6$$

dimana kurva  $C$  ini dapat dilihat pada gambar 3-8.

Nilai untuk  $x$  dan  $y$  akan menentukan nilai  $C$  dan juga menentukan kurva khususnya pada kumpulan kurvanya. Pada gambar 3-8, kurva  $A$  memiliki konstanta sama dengan  $-4$ , kurva  $B$  memiliki konstanta 0, dan kurva  $C$  memiliki konstanta 6.

**Contoh:** Carilah persamaan kurva jika turunan pertamanya adalah 6 kali variabel bebas,  $y$  sama dengan 2, dan  $x$  sama dengan 0.

**Penyelesaian:**

Kita dapat menuliskan persamaannya:

$$\frac{dy}{dx} = 6x$$

atau

$$\int dy = \int 6x \, dx$$

sedemikian sehingga,

$$y = 3x^2 + C$$

Selesaikan nilai  $C$  untuk  $x = 0$  dan  $y = 2$ , kita memperoleh

$$2 = 3(0^2) + C$$

$$C = 2$$

Sehingga persamaan kurvanya adalah

$$y = 3x^2 + 2$$

**Masalah Praktis**

Hitunglah integral di bawah ini:

1.  $\int x^2 dx$
2.  $\int 4x dx$
3.  $\int (x^3 + x^2 + x) dx$
4.  $\int 6 dx$
5.  $\int \frac{5}{x^2} dx$
6. Carilah persamaan kurva jika diketahui turunan pertamanya 9 kali dari variabel tak bebasnya, dimana  $y$  sama dengan 5 dan  $x$  sama dengan -1.

**Jawaban**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. $\frac{x^3}{3} + C$                                 | 2. $2x^2 + C$     |
| 3. $\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + C$ | 4. $6x + C$       |
| 5. $-\frac{5}{x} + C$                                  | 6. $y = 3x^3 + 8$ |

**3.5. Integral Tentu**

Bentuk umum dari integral tak tentu adalah

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

dan memiliki dua karakter yang teridentifikasi. Pertama, konstanta integral harus ditambahkan pada tiap hasil integralnya. Kedua, hasil integrasinya merupakan fungsi variabel dan memiliki nilai tak tentu, hingga konstanta integralnya ditentukan, dan variabelnya ditentukan nilainya.

Integral tentu menghilangkan dua karakter ini. Bentuk dari integral tentu adalah


$$\int_a^b f(x) dx = [F(b) + C] - [F(a) + C] \quad \dots (3.6)$$

$$= F(b) - F(a)$$

dimana  $a$  dan  $b$  merupakan nilai yang diketahui. Perhatikan bahwa konstanta integral tidak ada pada hasil akhir dari persamaan (3.6). dengan kata lain, persamaan ini menyatakan bahwa perbedaan nilai dari

$$\int_a^b f(x)$$

untuk  $x = a$  dan  $x = b$  memberikan daerah di bawah kurva yang didefinisikan dengan  $f(x)$ , sumbu  $X$ , dan ordinat dimana  $x = a$  dan  $x = b$ .



Gambar 3-9. Limit atas dan limit bawah

Pada gambar 3-9, nilai  $b$  merupakan limit atas dan nilai  $a$  merupakan limit bawah. Limit atas dan bawah ini mungkin menjadi nilai batas rentang pada kurva. Limit atas lebih besar daripada limit bawahnya atau dalam hal ini letaknya di sebelah kanan (positif pada kasus kita) daripada limit bawahnya.

Persamaan (3.6) merupakan limit dari jumlah dari semua partisi-partisi antara  $a$  dan  $b$ , yang memiliki luas daerah  $f(x) \Delta x$ ; yaitu,


$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{x=a}^{x=b} f(x) \Delta x = \int_a^b f(x) dx$$

Integral tentu yang ingin dihitung mulai dari  $a$  sampai  $b$  adalah

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b \quad \dots (3.7)$$

$$= F(b) - F(a)$$

Simbol  $F(x) \Big|_a^b$  pada persamaan (3.7) berarti pertama-tama kita substitusi limit atas  $b$ , masuk ke fungsi  $F(x)$  menjadi  $F(b)$ , dan dari  $F(b)$  kita kurangkan dengan  $F(a)$ , hasil dari mensubstitusi limit bawah  $a$  masuk ke  $F(x)$ .



Gambar 3-10. Luas daerah dari  $x = 2$  sampai  $x = 3$

Contoh: Carilah luas daerah yang dibatasi oleh kurva  $y = x^2$  sumbu  $X$ , dan ordinat dimana  $x = 2$  dan  $x = 3$  seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3-10.

Penyelesaian:

Substitusi ke persamaan (3.7),

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Kita peroleh;

$$\int_2^3 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_2^3$$

$$= \frac{3^3}{3} - \frac{2^3}{3}$$

$$= \frac{27}{3} - \frac{8}{3}$$

$$= \frac{19}{3} = 6\frac{1}{3}$$

Kita mungkin saja dapat mengestimasi penyelesaian ini dengan mempertimbangkan daerah yang dimaksud pada gambar 3-10 sebagai bangun segitiga siku-siku dijumlahkan dengan bangun segiempat. Segitiga memiliki luas daerah yang mendekati

$$A = \frac{1}{2} bh$$

$$= \frac{1}{2} (1) (5)$$

$$= \frac{5}{2}$$

dan luas daerah segiempat adalah

$$A = bh$$

$$= (1) (4)$$

$$= 4$$

sehingga total luas daerahnya adalah

$$4 + \frac{5}{2} = \frac{13}{2} = 6\frac{1}{2}$$

dimana hasil ini mendekati luas daerah yang dihitung dengan menggunakan proses integral.

Contoh: Carilah luas daerah yang dibatasi oleh kurva  $y = x^2$

sumbu  $x$ , dan ordinat dimana  $x = -2$  dan  $x = 2$  seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3-11.


Penyelesaian:

Substitusi ke persamaan (3.7),

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$


Kita peroleh;

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 x^2 dx &= \frac{x^3}{3} \Big|_{-2}^2 \\ &= \frac{2^3}{3} - \frac{(-2)^3}{3} \\ &= \frac{8}{3} - \left(-\frac{8}{3}\right) \\ &= \frac{16}{3} = 5\frac{1}{3} \end{aligned}$$



Gambar 3-11. Luas daerah di bawah kurva

Daerah di bawah kurva dan di atas sumbu  $x$ , seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3-12, berdasarkan integral, menghasilkan jawaban yang bernilai negatif.




Gambar 3-12. Luas daerah di atas kurva

Jika suatu grafik  $y = f(x)$ , antara  $x = a$  dan  $x = b$ , memiliki daerah bagian di atas dan daerah bagian di bawah sumbu  $X$ , seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3-13, maka

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Merupakan hasil penjumlahan dari nilai mutlak daerah positif di bawah sumbu  $X$  dan negatif daerah di bawah sumbu  $X$ , sedemikian sehingga

$$\int_a^b f(x) dx = |A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4|$$



Gambar 3-13. Luas daerah di atas dan di bawah kurva

dimana

$$A_1 = \int_a^c f(x) dx$$

$$A_2 = \int_c^d f(x) dx$$

$$A_3 = \int_d^e f(x) dx$$


$$A_4 = \int_e^b f(x) dx$$

Contoh: Carilah luas daerah antara kurva

$$y = x$$

dan sumbu X yang dibatasi oleh garis  $x = -2$  dan  $x = 2$  seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3-14.

Penyelesaian:



Gambar 3-14. Luas daerah bernilai negatif dan positif

Luas daerah ini harus kita hitung secara terpisah; oleh karena itu, kita tuliskan

$$\begin{aligned} \text{Daerah A} &= \int_{-2}^0 f(x) dx \\ &= \int_{-2}^0 x dx \\ &= \frac{x^2}{2} \Big|_{-2}^0 \\ &= 0 - \frac{4}{2} \\ &= -2 \end{aligned}$$

dan nilai mutlak dari -2 adalah 2.

Kemudian,

$$\begin{aligned} \text{Daerah B} &= \int_0^2 f(x) dx \\ &= \int_0^2 x dx \\ &= \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 \\ &= \frac{4}{2} - 0 \\ &= 2 \end{aligned}$$

Jumlahkan kedua luas daerah,  $|A|$  dan  $|B|$ , kita dapatkan

$$|A| + |B| = 2 + 2 = 4$$

Catatan: Jika fungsi diintegrasikan dari -2 sampai 2, maka hasil seperti di bawah ini SALAH:


$$\begin{aligned} \text{Daerah} &= \int_{-2}^2 f(x) dx \\ &= \int_{-2}^2 x dx \\ &= \frac{x^2}{2} \Big|_{-2}^2 \\ &= \frac{4}{2} - \frac{4}{2} \\ &= 0 \text{ (HASIL YANG SALAH)} \end{aligned}$$

Hal ini bukanlah merupakan hasil yang sebenarnya ditunjukkan oleh gambar 3-14. Seperti contoh yang mengutamakan nilai yang dihasilkan dari perhitungan untuk setiap penyelesaian. Sketsa fungsi akan membantu perhitungan.

Contoh: Carilah luas total daerah antara kurva

$$y = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$$

sumbu X, dan garis  $x = -2$  dan  $x = 4$  seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3-15.



Gambar 3-15. Luas daerah positif dan negatif

Penyelesaian:

Luas daerah yang dimaksud adalah berada di atas dan di bawah sumbu  $X$ ; walaupun demikian, kita harus mencari luas daerah secara terpisah dan menjumlahkannya menggunakan nilai mutlak dari semua hasil.

Oleh karena itu

$$\begin{aligned}
 A_1 &= \int_{-2}^1 (x^3 - 3x^2 - 6x + 8) dx \\
 &= \frac{x^4}{4} - x^3 - 3x^2 + 8x \Big|_{-2}^1 \\
 &= \left( \frac{1}{4} - 1 - 3 + 8 \right) - (4 + 8 - 12 - 16) \\
 &= 4\frac{1}{4} + 16 \\
 &= 20\frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
 A_2 &= \int_1^4 (x^3 - 3x^2 - 6x + 8) dx \\
 &= \frac{x^4}{4} - x^3 - 3x^2 + 8x \Big|_1^4 \\
 &= (64 - 64 - 48 + 32) - \left( \frac{1}{4} - 1 - 3 + 8 \right) \\
 &= -16 - 4\frac{1}{4} \\
 &= -20\frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

Maka, total luas daerah yang dimaksud adalah

$$\begin{aligned}
 |A_1| + |A_2| &= 20\frac{1}{4} + 20\frac{1}{4} \\
 &= 40\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

### Masalah Praktis

1. Carilah dengan menggunakan integral, luas daerah di bawah kurva  $y = x + 4$  dibatasi oleh sumbu  $x$  dan garis  $x = 2$  serta  $x = 7$ . Lengkapilah dengan proses geometri
2. Carilah luas daerah di bawah kurva  $y = 3x^2 + 2$  dibatasi oleh sumbu  $x$  dan garis  $x = 0$  serta  $x = 2$ .
3. Carilah luas daerah di antara kurva  $y = x^3 - 12x$  dan sumbu  $x$  dari garis  $x = -1$  sampai  $x = 3$ .

### Jawaban

1.  $42\frac{1}{2}$
2. 12
3.  $39\frac{1}{2}$

## KESIMPULAN

Di bawah ini adalah garis besar dari materi yang telah kita pelajari pada bab ini:

1. **Definisi Integral:** Integral didefinisikan sebagai invers dari diferensial.

$$F(x) = \int f(x) dx$$

dimana  $F(x)$  merupakan fungsi yang turunannya adalah fungsi  $f(x)$ ;  $\int$  merupakan simbol integral;  $f(x)$  merupakan integrannya; dan  $dx$  adalah diferensial.

2. **Daerah di bawah kurva:**

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x$$

dimana  $\Sigma$  (sigma) merupakan simbol dari penjumlahan,  $n$  merupakan banyaknya segiempat,  $f(x)$   $\Delta x$  merupakan luas tiap daerah segiempat, dan  $k$  menunjukkan bilangan untuk tiap-tiap segiempat.

*Teorema nilai tengah*

$${}_a A_b = F(b) - F(a)$$

dimana  $F(b) - F(a)$  merupakan hasil integral fungsi suatu kurva pada nilai  $b$  dan  $a$ .

3. **Integral tak tentu:**

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

dimana  $C$  dikatakan sebagai *konstanta integral*, suatu bilangan yang bebas dari variabel integral.

**Teorema 1.**

*Jika dua fungsi berbeda bilangan konstantanya, maka keduanya akan memiliki turunan yang sama*

**Teorema 2.**

*Jika dua fungsi memiliki turunan yang sama, maka yang berbeda dari keduanya hanyalah bilangan konstantanya.*

4. **Aturan integral:**

**Aturan 1.**

$$\int du = u + C$$

*Integral dari diferensial suatu fungsi adalah fungsi itu sendiri ditambah dengan suatu konstanta.*

**Aturan 2.**

$$\int a du = a \int du = au + C$$

*Suatu konstanta dapat dipindahkan ke depan simbol integral. Catatan: Suatu variabel TIDAK dapat dipindahkan ke depan simbol integral.*

**Aturan 3.**

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

*Integral dari  $u^n du$  dapat diperoleh dengan menambahkan 1 pada bilangan pangkatnya dan membaginya dengan bilangan pangkat yang baru. Catatan: jika  $n$  adalah  $-1$ , aturan ini tidak berlaku dan kita gunakan metode yang lainnya.*

**Aturan 4.**

$$\int (du + dv + dw) = \int du + \int dv + \int dw \\ = u + v + w + C$$

*Integral dari penjumlahan sama dengan jumlah dari integralnya.*

5. **Integral tentu:**

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

dimana  $b$  merupakan limit atas dan  $a$  merupakan limit bawah, yang nilainya diketahui.

## 6. Daerah di bawah dan di atas kurva:

Jika suatu grafik  $y = f(x)$ , antara  $x = a$  dan  $x = b$ , memiliki daerah bagian di atas dan daerah bagian di bawah sumbu  $x$ , maka

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

merupakan hasil penjumlahan dari nilai mutlak daerah positif di bawah sumbu  $x$  dan negatif daerah di bawah sumbu  $x$ .

## SOAL LATIHAN

Carilah integral di bawah ini:

1.  $\int \left(\frac{3}{4}\right) dx$
2.  $\int \frac{-8}{x^3} dx$
3.  $\int (7x^6 - 5x^{-6} - 10x^4 + 9x^{-4}) dx$
4.  $\int 18x^{5/4} dx$
5. Carilah persamaan kurva jika turunan pertamanya adalah 4 ditambah 8 kali variabel tak bebasnya ditambah 12 kali variabel tak bebasnya dikuadratkan,  $y$  sama dengan 12, dan  $x$  sama dengan 2.
6. Carilah luas daerah di bawah kurva  $y = 2x + 3$ , berbatasan dengan sumbu  $x$ , dan garis  $x = -3/2$  serta  $x = 1$ .
7. Carilah luas daerah antara kurva  $y = x^2 + 4x$  dan sumbu  $x$ , dari  $x = -4$  sampai  $x = 0$ .
8. Carilah total daerah yang dibatasi oleh kurva  $y = 2 + x - x^2$ , sumbu  $x$ , dan garis  $x = -2$  serta  $x = 3$ . (Petunjuk: Untuk lebih meyakinkan, sketsalah grafiknya)

## JAWABAN SOAL LATIHAN

1.  $(3/4)x + C$
2.  $4/x^2 + C$
3.  $x^7 + x^5 - 2x^5 - 3x^3 + C$
4.  $8x^{9/4} + C$
5.  $y = 3x^4 + 4x^2 + 4x - 60$
6.  $25/4$
7.  $10\frac{2}{3}$
8.  $49/6$

## SOAL PILIHAN GANDA

Tentukanlah daerah di bawah kurva sampai kepada integral dan aplikasi integral untuk menyelesaikan masalah di bawah ini.

1. Manakah pernyataan tentang integral di bawah ini yang SALAH?
  - a. Merupakan invers dari penjumlahan
  - b. Merupakan lawan dari diferensial
  - c.  $F(x) = \int E(x) dx$
  - d. Turunan dari fungsi yang diketahui dan fungsi haruslah diperoleh
2. Dalam integral  $\int f(x) dx$ ,  $dx$  dikenal sebagai ....
  - a. Limit dari integral
  - b. Tanda integral
  - c. Diferensial
  - d. Integrannya
3. Jika  $y = \int x dx$ , maka  $x$  dikenal sebagai ...
  - a. Integrannya
  - b. Diferensial
  - c. Tanda integral
  - d. Limit dari integral
4. Suatu interal digunakan hanya untuk menggambarkan luas daerah di bawah kurva.
  - a. Benar
  - b. Salah

Cara lain untuk menuliskan persamaan:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x$$


adalah dengan mensubstitusi nilai koordinat  $x$  ke fungsi  $f(x_k)$  untuk mendapatkan nilai koordinat  $y$  yang berkorespondensi. Dari sini, untuk  $k = 1$  sampai  $n$ ,  $y_0 = f(x_0)$ ,  $y_1 = f(x_1)$ ,  $y_2 = f(x_2)$ , ...,  $y_n = f(x_n)$ .

Oleh karena itu, jumlah dari luas daerah segiempat yang lebarnya  $\Delta x$  dan tingginya  $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$  dapat kita tuliskan sebagai:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} (y_0 \Delta x + y_1 \Delta x + y_2 \Delta x + \dots + y_n \Delta x)$$

Limit dari penjumlahan perkalian ini untuk  $n \rightarrow \infty$  sama dengan integral dari  $a$  sampai  $b$  dari  $y dx$  atau


$$\int_a^b y dx$$



Gambar 3A. Luas daerah  $\Delta A$

Untuk menjawab soal nomor 5 perhatikan gambar 3A di atas.

5. Pada saat kondisi yang bagaimanakah suatu  $\Delta A$  dapat mendekati besar luas daerah di bawah kurva  $y = f(x)$  antara titik  $x$  dan  $x + \Delta x$ ?
- Ketika  $\Delta x$  sangat kecil
  - Ketika  $f(x)$  sama dengan  $f(x + \Delta x)$
  - Ketika titik  $B$  bergerak ke kanan
  - Ketika  $\Delta x$  makin besar tanpa limit



Gambar 3B. Nilai titik tengah antara  $a$  dan  $b$

Untuk menjawab pertanyaan nomor 6, perhatikan gambar 3B di atas.

6. Teorema nilai titik tengah sebenarnya mengukur luas daerah dai segiempat dengan lebar  $b - a$  dan tinggi titik tengah ...
- $\frac{f(b) - f(a)}{2}$
  - $f(b) - f(a)$
  - $f(a) + f(b)$
  - $f(c)$

Ketika menghitung luas daerah di bawah kurva, kita harus yakin terhadap kurvanya, sebagai contoh  $y = f(x)$ , kontinu pada semua titik dimanapun daerahnya akan dihitung. Jika kurvanya tidak kontinu, luas daerahnya tidak akan dapat dihitung dengan metode langsung.

7. Jika  $A_x = F(x) - F(c)$  dan  $x = n$ , maka daerah antara titik  $c$  dan  $n$  pada kurva sama dengan ....
- $\frac{F(n) + F(c)}{2}$
  - $F(n) - F(c)$

- c.  $F(n) + F(c)$   
 d.  $\frac{F(n)-F(c)}{2}$
8. Manakah di bawah ini yang ekuivalen dengan  $\frac{d}{dx} \int g(x) dx$ ?
- a.  $\frac{d}{dx} g(x)$   
 b.  $g(x)$   
 c.  $\frac{d}{dx} G(x)$   
 d. b dan c benar
9.  $\frac{d}{dx}(x^4)$ ,  $\frac{d}{dx}(x^4 + 5)$ , dan  $\frac{d}{dx}(x^4 - 8)$  sama dengan
- a.  $4x^3$   
 b.  $4x^3, 4x^3 + 5, 4x^3 + 8$   
 c.  $4x^3, 4x^3 + 5, 4x^3 - 8$   
 d.  $4x^3, 4x^3 - 5, 4x^3 + 8$
10. Semua integral dari fungsi yang diketahui memiliki konstanta integral yang sama.
- a. Benar  
 b. Salah
11. Jika  $\int f(x) dx = F(x) + C$ , manakah pernyataan tentang C berikut yang BENAR?
- a. Hanyalah suatu nilai  
 b. Hanyalah suatu nilai positif  
 c. Hanyalah suatu nilai negatif  
 d. Suatu bilangan tak terhingga
12. Pernyataan "Integral dari diferensial suatu fungsi merupakan fungsi ditambah suatu konstanta" diilustrasikan oleh ....
- a.  $\int 2x dx = x^2 + C$   
 b.  $\int dy = y + C$   
 c.  $\int ax dx = ax^2 + C$   
 d.  $\int a dx = ax + C$

13. Manakah persamaan di bawah ini yang bernilai BENAR jika  $g$  merupakan suatu konstanta dan  $y$  merupakan variabel?
- a.  $\int g dy = \int g \int dy$   
 b.  $gy$   
 c.  $\int g dy = g \int dy$   
 d.  $\int g dy = y \int g$
14. Jika  $\int (dx + dy + dz) = \int dx + \int dy + \int dz$ , maka  $\int dx + \int dy + \int dz$  sama dengan ....
- a.  $x - y + z$   
 b.  $x + y + z + C$   
 c.  $x + y + z$   
 d.  $x + y - z$
15. Hitunglah integral  $\int x^2 dx$ .
- a.  $2x$   
 b.  $\frac{x^3}{3}$   
 c.  $x^3 + C$   
 d.  $\frac{x^3}{3} + C$
16. Manakah integral di bawah ini yang TIDAK DAPAT dihitung dengan menggunakan aturan  $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$
- a.  $\int x^{-3} dx$   
 b.  $\int x^{-1} dx$   
 c.  $\int x^5 dx$   
 d.  $\int x^{2/5} dx$
17. Hitunglah integral  $\int \frac{x^2}{x^4} dx$
- a.  $\frac{x^4}{4}$   
 b.  $\frac{x^5}{5} + C$   
 c.  $\frac{x^4}{4} + C$   
 d.  $4x^2 + C$

18. Hitunglah integral dari  $\int 7(x^{1/2} + x) dx$
- $\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{x^2}{2} + C$
  - $\frac{14}{3}x^{3/2} + \frac{x^2}{2} + C$
  - $\frac{14}{3}x^{3/2} + \frac{7}{2}x^2 + C$
  - $\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{x^2}{2} + 7$
19. Diketahui  $\int dy = \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$ , berapakah nilai konstanta integral ketika  $x = 3$  dan  $y = 5$ ?
- Nilainya merupakan suatu bilangan tak terhingga
  - $-110/3$
  - 14
  - 4
20. Dari segi apakah perbedaan antara interal tentu dan integral tak tentu?
- Variabelnya harus ditandai dengan nilai numerik sebelum mendapatkan konstanta integral
  - Hasil integralnya merupakan nilai tentu
  - Tidak membutuhkan konstanta pada integral
  - b dan c benar
21.  $\int_a^b f(x) dx$  merupakan integral dengan salah satu karakter di bawah ini ...
- $b$  merupakan limit bawah
  - $a$  merupakan limit atas
  - $b$  lebih positif daripada  $a$
  - $a$  dan  $b$  kedua-duanya positif
22.  $\int_5^{10} f(x) dx = F(x) \Big|_5^{10}$  sama halnya dengan ....
- $F(10) - F(5)$
  - $F(10) + F(5)$
  - $F5 - F(10)$
  - $F(5) - F(5)$

23. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva  $y = x^2 + 3$ , sumbu X, dan  $x = 1$  serta  $x = 3$  adalah ....
- $8 \frac{2}{3}$
  - $10 \frac{2}{3}$
  - 12
  - $14 \frac{2}{3}$
24. Luas daerah di bawah kurva  $y = -x^2$  tapi di atas sumbu X dan diantara  $x = 0$  dan  $x = 3$  sama dengan ....
- 9
  - $|-9|$
  - 3
  - 3
25. Suatu daerah yang dibatasi oleh kurva  $y = -x + 3$ , sumbu X,  $x = 0$  dan  $x = 6$  sama dengan .... (Petunjuk: lebih yakin dengan mensketsa grafiknya terlebih dahulu)
- 0
  - 9
  - 18
  - 36

## BAB 4

### BENTUK-BENTUK INTEGRAL

Pada bab ini secara umum akan dibahas tentang bentuk-bentuk dari integral dan bukti dari apa yang akan didiskusikan dan contoh-contoh yang akan diberikan. Beberapa bentuk umum pada bab sebelumnya akan diulang karena bentuk tersebut sangat penting dalam membantu kita memahami integral. Bentuk umum pada bab ini merupakan dasar dan tidak akan menjadikan koleksi dari bentuk umum integral kita menjadi lengkap. Integral sangatlah kompleks, sehingga terdapat tabel-tabel integral yang telah dipublikasikan di berbagai sumber referensi.

#### 4.1. Integral variabel berpangkat

Integral dari variabel berpangkat diperoleh dengan pangkat dari variabelnya ditambahkan dengan satu lalu dibagi dengan pangkat yang baru.

Bentuk umumnya:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

Bukti:

$$\begin{aligned} d\left(\frac{x^{n+1}}{n+1} + C\right) &= \frac{(n+1)x^{n+1-1}}{n+1} dx \\ &= \frac{(n+1)x^n}{n+1} dx \\ &= x^n dx \end{aligned}$$

Sehingga,

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

Contoh: Hitunglah

$$\int x^5 dx$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\int x^5 dx &= \frac{x^{5+1}}{5+1} + C \\ &= \frac{x^6}{6} + C\end{aligned}$$

Contoh: Hitunglah

$$\int x^{-5} dx$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\int x^{-5} dx &= \frac{x^{-5+1}}{-5+1} + C \\ &= \frac{x^{-4}}{-4} + C\end{aligned}$$

#### 4.2. Integral Konstanta

Suatu konstanta dapat dituliskan sebelum atau sesudah tanda integral.

Bentuk umumnya:

$$\begin{aligned}\int a du &= a \int du \\ &= au + C\end{aligned}$$

Bukti:

$$\begin{aligned}d(au + C) &= a d\left(u + \frac{C}{a}\right) \\ &= a du\end{aligned}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned}\int a du &= a \int du \\ &= au + C\end{aligned}$$

Contoh: Hitunglah

$$\int 17 dx$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\int 17 dx &= 17 \int dx \\ &= 17x + C\end{aligned}$$

Contoh: Hitunglah

$$\int 3x^4 dx$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\int 3x^4 dx &= 3 \int x^4 dx \\ &= 3 \frac{x^{4+1}}{4+1} + C \\ &= 3 \frac{x^5}{5} + C \\ &= \frac{3x^5}{5} + C\end{aligned}$$

#### 4.3. Integral Penjumlahan

Integral dari penjumlahan secara aljabar suatu fungsi yang dapat diturunkan adalah sama dengan penjumlahan secara aljabar dari integral masing-masing suku dari fungsi tersebut; sedemikian sehingga integral dari penjumlahan adalah penjumlahan dari beberapa integral.

Bentuk umumnya:

$$\int (du + dv + dw) = \int du + \int dv + \int dw$$

Bukti:

$$\int (du + dv + dw) = \int du + \int dv + \int dw$$

Sehingga,

$$\int du + \int dv + \int dw = u + C_1 + v + C_2 + w + C_3$$

dimana  $C_1 + C_2 + C_3 = C$

maka

$$\int du + \int dv + \int dw = u + v + w + C$$

dan

$$\begin{aligned} \int (du + dv + dw) &= \int du + \int dv + \int dw \\ &= u + v + w + C \end{aligned}$$

Contoh: Hitunglah

$$\int (3x^2 + x) dx$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \int (3x^2 + x) dx &= \int 3x^2 dx + \int x dx \\ &= \frac{3x^{2+1}}{2+1} + C_1 + \frac{x^{1+1}}{1+1} + C_2 \\ &= \frac{3x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + C \\ &= x^3 + \frac{x^2}{2} + C \end{aligned}$$

Contoh: Hitunglah

$$\int (x^5 + x^{-3}) dx$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \int (x^5 + x^{-3}) dx &= \int x^5 dx + \int x^{-3} dx \\ &= \frac{x^{5+1}}{5+1} + C_1 + \frac{x^{-3+1}}{-3+1} + C_2 \\ &= \frac{x^6}{6} + \frac{x^{-2}}{-2} + C \\ &= \frac{x^6}{6} - \frac{1}{2x^2} + C \end{aligned}$$

### Masalah Praktis

Hitunglah integral di bawah ini:

1.  $\int x^6 dx$
2.  $\int x^{-4} dx$
3.  $\int 17x^2 dx$
4.  $\int \pi r dx$
5.  $\int 7x^{1/2} dx$
6.  $\int (x^7 + x^6 + 3x^3) dx$
7.  $\int (6 - x^3) dx$

### Jawaban

1.  $\frac{x^7}{7} + C$
2.  $-\frac{1}{3x^3} + C$
3.  $\frac{17}{3}x^3 + C$
4.  $\frac{\pi r^2}{2} + C$
5.  $\frac{14}{3}x^{3/2} + C$
6.  $\frac{x^8}{8} + \frac{x^7}{7} + \frac{3x^4}{4} + C$
7.  $6x - \frac{x^4}{4} + C$

#### 4.4. Integral fungsi yang berpangkat

Integral dari fungsi berpangkat dengan cara mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Menambahkan pangkat dari fungsi tersebut dengan 1.
2. Membagi hasil dari langkah 1 dengan pangkat yang sudah ditambahkan.
3. Tambahkan konstanta dari hasil integrasi tersebut.

Bentuk umumnya:

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

Bukti:

$$\begin{aligned} d\left(\frac{u^{n+1}}{n+1} + C\right) &= \frac{(n+1)u^{n+1-1}}{n+1} du \\ &= \frac{(n+1)u^n}{n+1} du \\ &= u^n du \end{aligned}$$

Sehingga,

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

Catatan: Harus diingat bahwa

$$\frac{d}{dx} \left[ \frac{1}{3} (2x-3)^3 \right] = (3) \left( \frac{1}{3} \right) (2x-3)^2 (2) = 2(2x-3)^2$$

Contoh: Hitunglah

$$\int (2x-3)^2 (2) dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = (2x-3)$ sehingga  $\frac{du}{dx} = 2$ atau  $du = 2 dx$ 

kemudian dengan mensubstitusi, kita peroleh:

$$\begin{aligned} \int (2x-3)^2 (2) dx &= \int u^2 du \\ &= \frac{u^{2+1}}{2+1} + C \\ &= \frac{u^3}{3} + C \end{aligned}$$

Sehingga,

$$\int (2x-3)^2 (2) dx = \frac{(2x-3)^3}{3} + C$$

Dari proses di atas, kita harus merubah dulu ke dalam bentuk  $du$ . Jika konstanta yang melekat pada  $dx$  itu tidak ada, maka kita harus menggunakan cara

aljabar sehingga dapat di substitusi ke dalam bentuk  $du$ .

Contoh: Hitunglah

$$\int (3x+5)^6 dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = (3x+5)$ sehingga  $du = 3 dx$ 

kita hanya memiliki  $dx$  pada integral tetapi bukan  $3 dx$ . Angka 3 mesti kita adakan dalam integral kita untuk dapat disubstitusi dengan  $du$  yang kita inginkan. Sebagai mana integral yang kita punya adalah

$$\int (3x+5)^6 dx$$

Untuk dapat disubstitusi ke dalam bentuk  $du$  maka dapat kita carikan cara aljabar untuk dapat memunculkan angka 3 di depan  $dx$ . Berarti kita dapat menuliskan

$$\frac{3}{3} \int (3x+5)^6 dx$$

Kemudian menempatkan angka 3 pembilang ke depan  $dx$  seperti berikut:

$$\frac{3}{3} \int (3x+5)^6 dx = \frac{1}{3} \int (3x+5)^6 (3) dx$$

kemudian dengan mensubstitusi, kita peroleh:

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} \int (3x+5)^6 (3) dx &= \frac{1}{3} \int u^6 du \\ &= \left( \frac{1}{3} \right) \frac{u^{6+1}}{6+1} + C \\ &= \left( \frac{1}{3} \right) \frac{u^7}{7} + C \\ &= \frac{u^7}{21} + C \end{aligned}$$

$$= \frac{(3x+5)^7}{21} + C$$

Sehingga,

$$\int (3x+5)^6 dx = \frac{(3x+5)^7}{21} + C$$

Contoh: Hitunglah

$$\int 3x(2+x^2)^2 dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = (2+x^2)$

sehingga  $du = 2x dx$

maka

$$\begin{aligned} \int 3x(2+x^2)^2 dx &= \frac{2}{2} \int 3x(2+x^2)^2 dx \\ &= \frac{3}{2} \int 2x(2+x^2)^2 dx \\ &= \frac{3}{2} \int (2+x^2)^2 2x dx \\ &= \frac{3}{2} \int u^2 du \\ &= \left(\frac{3}{2}\right) \frac{u^{2+1}}{2+1} + C \\ &= \left(\frac{3}{2}\right) \frac{u^3}{3} + C \\ &= \frac{u^3}{2} + C \\ &= \frac{(2+x^2)^3}{2} + C \end{aligned}$$

Sehingga,

$$\int 3x(2+x^2)^2 dx = \frac{(2+x^2)^3}{2} + C$$

### Masalah Praktis

Hitunglah integral di bawah ini:

1.  $\int (x^2+6)(2x) dx$
2.  $\int x^2(7+x^3)^2 dx$

3.  $\int (3x^2+2x)^2(6x+2) dx$
4.  $\int (6x^3+2x)^{1/2}(9x^2+1) dx$
5.  $\int 4(x^2+7)^{-7}(x) dx$

### Jawaban

1.  $\frac{(x^2+6)^2}{2} + C$
2.  $\frac{(7+x^3)^3}{9} + C$
3.  $\frac{(3x^2+2x)^3}{3} + C$
4.  $\frac{(6x^3+2x)^{3/2}}{3} + C$
5.  $-\frac{1}{3(x^2+7)^6} + C$

### 4.5. Persamaan

Pada bagian ini, tiga metode dalam mengintegrasikan persamaan akan dijelaskan, tetapi hanya dua metode saja yang akan dibuktikan.

Metode pertama adalah merubah persamaan ke bentuk fungsi berpangkat. Metode kedua menghasilkan bentuk operasi dalam bentuk logaritma. Metode ketiga merupakan kasus khusus dimana persamaannya harus dirubah ke dalam bentuk sederhana yang menghasilkan aturan penjumlahan.

### Metode 1

Jika kita diberikan integral

$$\int \frac{2x}{(9-4x^2)^{1/2}} dx$$

kita dapat merubah bentuk integral persamaan ini ke dalam bentuk

$$\int 2x(9-4x^2)^{-1/2} dx$$

dengan memisalkan  $u = 9 - 4x^2$

akan diperoleh  $du = -8x dx$

Satu-satunya bentuk yang mirip dengan bentuk di atas yang sesuai dengan bentuk

$$\int u^n du$$

adalah memunculkan faktor untuk  $du$  yaitu  $-4$ . Kita akan mengalikan  $-4$  ini dengan  $2x dx$  sehingga menghasilkan  $-8x dx$  yang tidak lain adalah  $du$ . Dan sebagai akibatnya berarti kita harus mengalikan juga integralnya dengan  $-(1/4)$ . Sehingga

$$\begin{aligned} \int \frac{2x}{(9-4x^2)^{1/2}} dx &= \int 2x(9-4x^2)^{-1/2} dx \\ &= \frac{-4}{-4} \int 2x(9-4x^2)^{-1/2} dx \\ &= \frac{1}{-4} \int (-4)(2x)(9-4x^2)^{-1/2} dx \\ &= \frac{1}{-4} \int (-8x)(9-4x^2)^{-1/2} dx \\ &= \frac{1}{-4} \int (9-4x^2)^{-1/2} (-8x) dx \\ &= \frac{1}{-4} \int u^{-1/2} du \\ &= \left(-\frac{1}{4}\right) \frac{u^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C \\ &= \left(-\frac{1}{4}\right) \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C \\ &= -\frac{1}{2} u^{\frac{1}{2}} + C \\ &= -\frac{1}{2} (9-4x^2)^{\frac{1}{2}} + C \end{aligned}$$

Contoh: Hitunglah

$$\int \frac{x}{\sqrt{3+x^2}} dx$$

Penyelesaian:

$$\int \frac{x}{\sqrt{3+x^2}} dx = \int x(3+x^2)^{-\frac{1}{2}} dx$$

Misalkan  $u = (3+x^2)$   
sehingga  $du = 2x dx$

faktor 2 digunakan dalam integral ini untuk mendapatkan  $du$  dan sebagai akibatnya kita pun akan mengalikan integral ini dengan  $1/2$ . Sedemikian sehingga,

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{3+x^2}} dx &= \int x(3+x^2)^{-\frac{1}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int 2x(3+x^2)^{-\frac{1}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int (3+x^2)^{-\frac{1}{2}} 2x dx \\ &= \frac{1}{2} \int u^{-\frac{1}{2}} du \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) \frac{u^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C \\ &= u^{\frac{1}{2}} + C \\ &= (3+x^2)^{\frac{1}{2}} + C \end{aligned}$$

### Masalah Praktis

Hitunglah integral di bawah ini:

1.  $\int \frac{x}{(2+x^2)^{1/2}} dx$
2.  $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{3x+1}}$
3.  $\int \frac{dx}{(3x+2)^5}$

### Jawaban

1.  $(2+x^2)^{1/2} + C$
2.  $\frac{(3x+1)^{2/3}}{2} + C$
3.  $\frac{-1}{12(3x+2)^4} + C$

## Metode 2

Pada bentuk umum sebelumnya pada integral fungsi, pangkat dari fungsi tersebut tidak diijinkan bernilai -1. Pada kasus khusus dari

$$\int u^n du$$

Dimana  $n = -1$ , kita akan mengaplikasikan bentuk umum di bawah ini:

Bentuk umumnya:

$$\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C, u \neq 0$$

Bukti:

$$d(\ln|u| + C) = \frac{1}{u} du$$

$$\text{sehingga } \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$$

Catatan: Turunan dari bentuk  $\frac{d}{dx}(\ln|u|) = \frac{1}{u}, u > 0$ , telah dijabarkan pada bab 2, dapat pula ditulis dalam bentuk fungsi negatif. Jadi,  $\frac{d}{dx}(\ln|u|) = \frac{1}{u}, u \neq 0$ .

Contoh: Hitunglah integral

$$\int \frac{1}{x} dx$$

Penyelesaian:

Jika kita tuliskan

$$\int \frac{1}{x} dx = \int x^{-1} dx$$

kita akan sulit untuk menyelesaikan  $\int x^{-1} dx$ , tetapi dengan menggunakan aturan variabel berpangkat, kita dapat menyelesaikan dengan cara

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

karena,  $1 dx$  merupakan pembilang yang dalam hal ini senilai dengan  $du$  dan secara tepat dapat kita gunakan bentuk umum

$$\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$$

Contoh: Hitunglah

$$\int \frac{2}{2x+1} dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = 2x + 1$

sehingga  $du = 2 dx$

Kita memiliki bentuk umum

$$\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$$

oleh karena itu,

$$\int \frac{2}{2x+1} dx = \ln|2x+1| + C$$

Contoh: Hitunglah

$$\int \frac{2}{3x+1} dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = 3x + 1$

sehingga  $du = 3 dx$

Kita membutuhkan  $3dx$ , tetapi kita hanya memiliki  $2 dx$ , maka kita akan melakukan manipulasi aljabar sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \int \frac{2}{3x+1} dx &= 2 \int \frac{dx}{3x+1} \\ &= 2 \left( \frac{3}{3} \right) \int \frac{dx}{3x+1} \\ &= 2 \left( \frac{1}{3} \right) \int \frac{3 dx}{3x+1} \\ &= \frac{2}{3} \int \frac{du}{u} \end{aligned}$$

$$= \frac{2}{3} \ln|u| + C$$

$$= \frac{2}{3} \ln|3x + 1| + C$$

Sehingga,

$$\int \frac{2}{3x+1} dx = \frac{2}{3} \ln|3x + 1| + C$$

### Masalah Praktis

Hitunglah integral di bawah ini:

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. $\int \frac{dx}{3x+2}$ | 3. $\int \frac{x dx}{2-3x^2}$    |
| 2. $\int \frac{dx}{5-2x}$ | 4. $\int \frac{2x^3}{3+2x^4} dx$ |

### Jawaban

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. $\frac{1}{3} \ln 3x + 2  + C$    | 2. $-\frac{1}{2} \ln 5 - 2x  + C$  |
| 3. $-\frac{1}{6} \ln 2 - 3x^2  + C$ | 4. $\frac{1}{4} \ln 3 + 2x^4  + C$ |

### Metode 3

Pada metode ketiga akan dipecahkan pengintegralan persamaan. Kita ketahui bahwa untuk mengintegrasikan suatu fungsi yang secara aljabar pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: ubahlah integral tersebut ke dalam bentuk polinomial ditambah dengan bilangan rasional sejati dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Setelah persamaan tersebut telah diubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana, maka gunakanlah aturan integral yang sesuai dengan bentuk yang diperoleh tersebut.

Contoh: Hitunglah

$$\int \frac{16x^2 - 4x - 8}{2x + 1} dx$$

Penyelesaian:

Bagilah pembilang dengan penyebutnya, sehingga kita memperoleh bentuk yang lebih sederhana, yaitu:

$$\int \frac{16x^2 - 4x - 8}{2x + 1} dx = \int \left( 8x - 6 - \frac{2}{2x + 1} \right) dx$$

$$= \int 8x dx - \int 6 dx - \int \frac{2}{2x+1} dx$$

Integralkanlah tiap-tiap bagian masing-masing. Kita akan memperoleh hasil

$$\int 8x dx = 4x^2 + C_1$$

dan

$$-\int 6 dx = -6x + C_2$$

dan

$$-\int \frac{2}{2x+1} dx = -\ln|2x+1| + C_3$$

Sehingga dengan melakukan substitusi, kita peroleh bahwa

$$\int \frac{16x^2 - 4x - 8}{2x + 1} dx = 4x^2 - 6x - \ln|2x + 1| + C$$

Dimana  $C = C_1 + C_2 + C_3$

Contoh: Hitunglah

$$\int \frac{x}{x+1} dx$$

Penyelesaian:

Pembilangnya tidak lebih besar daripada penyebutnya, namun demikian, kita membaginya dan mendapatkan bahwa

$$\int \frac{x}{x+1} dx = \int \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx$$

$$= \int 1 dx - \int \frac{1}{x+1} dx$$

dengan mengintegrasikan tiap bagian masing-masing, kita peroleh:

$$\int 1 dx = \int dx$$

$$= x + C_1$$

dan

$$-\int \frac{1}{x+1} dx = -\ln|x+1| + C_2$$

sehingga,

$$\int \frac{x}{x+1} dx = x - \ln|x+1| + C$$

Dimana  $C = C_1 + C_2$

### Masalah Praktis

Hitunglah integral di bawah ini:

1.  $\int \frac{2x^2+6x+5}{x+1} dx$
2.  $\int \frac{6x^3+13x^2+20x+23}{2x+3} dx$
3.  $\int \frac{3x-8}{x} dx$
4.  $\int \frac{21x^2+16x+4}{3x+1} dx$

### Jawaban

1.  $x^2 + 4x + \ln|x+1| + C$
2.  $3x - 8 \ln|x| + C$
3.  $x^3 + x^2 + 7x + \ln|2x+3| + C$
4.  $\frac{7}{2}x^2 + 3x + \frac{1}{3}\ln|3x+1| + C$

### 4.6. Integral konstanta berpangkat variabel

Pada bagian ini, kita akan mendiskusikan dua bentuk konstanta berpangkat variabel. Kedua bentuk konstanta berpangkat variabel yang dimaksud adalah  $e^u$  dan  $a^u$ , dimana  $u$

merupakan suatu variabel,  $a$  suatu konstanta, dan  $e$  merupakan konstanta yang telah didefinisikan.

Bentuk Umumnya:

$$\int e^u du = e^u + C$$

Bukti:

$$d(e^u + C) = e^u du$$

sehingga

$$\int e^u du = e^u + C$$

Contoh: Hitunglah

$$\int e^x dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = x$

sehingga  $du = 1 dx$

integral yang akan dihitung bentuknya sama dengan bentuk umumnya, yaitu:

$$\int e^u du = e^u + C$$

dengan demikian, dengan menggunakan substitusi, kita peroleh:

$$\int e^x dx = e^x + C$$

Contoh: Hitunglah

$$\int e^{2x} dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = 2x$

sehingga  $du = 2 dx$

kita membutuhkan suatu faktor 2 pada integral kita, sehingga kita lakukan manipulasi aljabar

$$\begin{aligned} \int e^{2x} dx &= \left(\frac{2}{2}\right) \int e^{2x} dx \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) \int e^{2x} 2 dx \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) \int e^u du \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) e^u + C \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) e^{2x} + C \end{aligned}$$

Contoh: Hitunglah

$$\int xe^{2x^2} dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = 2x^2$

sehingga  $du = 4x dx$

kita membutuhkan suatu faktor 4 pada integral, sehingga:

$$\begin{aligned} \int xe^{2x^2} dx &= \left(\frac{4}{4}\right) \int xe^{2x^2} dx \\ &= \left(\frac{1}{4}\right) \int 4xe^{2x^2} dx \\ &= \left(\frac{1}{4}\right) \int e^{2x^2} 4x dx \\ &= \left(\frac{1}{4}\right) \int e^u du \\ &= \left(\frac{1}{4}\right) e^u + C \\ &= \left(\frac{1}{4}\right) e^{2x^2} + C \end{aligned}$$

Contoh: Hitunglah

$$\int \frac{x^2}{e^{x^3}} dx$$

Penyelesaian:

$$\int \frac{x^2}{e^{x^3}} dx = \int x^2 e^{-x^3} dx$$

Misalkan  $u = -x^3$

sehingga  $du = -3x^2 dx$   
maka,

$$\begin{aligned} \int x^2 e^{-x^3} dx &= \left(\frac{-3}{-3}\right) \int x^2 e^{-x^3} dx \\ &= \left(\frac{1}{-3}\right) \int -3x^2 e^{-x^3} dx \\ &= \left(\frac{1}{-3}\right) \int e^{-x^3} -3x^2 dx \\ &= \left(\frac{1}{-3}\right) \int e^u du \\ &= -\frac{1}{3} e^u + C \\ &= -\frac{1}{3} e^{-x^3} + C \end{aligned}$$

**Masalah Praktis**

Hitunglah integral di bawah ini:

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. $\int -2xe^{-x^2} dx$ | 3. $\int e^{(2x-1)} dx$         |
| 2. $\int e^{4x} dx$      | 4. $\int \frac{2x}{e^{x^2}} dx$ |

**Jawaban**

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. $e^{-x^2} + C$               | 2. $\frac{1}{4} e^{4x} + C$ |
| 3. $\frac{1}{2} e^{(2x-1)} + C$ | 4. $-e^{-x^2} + C$          |

Sekarang kita akan mendiskusikan bentuk umum integral konstanta berpangkat variabel yang kedua.

Bentuk Umumnya:

$$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C, a > 0$$

Bukti:

$$\begin{aligned} d(a^u + C_1) &= d(e^{\ln(a^u)} + C_1) \\ &= d(e^{u \ln a} + C_1) \\ &= e^{u \ln a} \ln a du \end{aligned}$$

$$= e^{\ln(a^u)} \ln a \, du$$

$$= a^u \ln a \, du$$

sehingga

$$\int a^u \ln a \, du = a^u + C_1$$

tetapi  $\ln a$  merupakan suatu konstanta, sehingga

$$\ln a \int a^u \, du = a^u + C_1$$

Kemudian, dengan membagi kedua sisi dengan  $\ln a$  diperoleh:

$$\int a^u \, du = \frac{a^u}{\ln a} + \frac{C_1}{\ln a}$$

atau

$$\int a^u \, du = \frac{a^u}{\ln a} + C$$

Dimana  $C = \frac{C_1}{\ln a}$

Contoh: Hitunglah

$$\int 3^x \, dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = x$

sehingga  $du = 1 \, dx$

Sehingga, dengan mengetahui bahwa:

$$\int a^u \, du = \frac{a^u}{\ln a} + C$$

dan menggunakan substitusi, kita peroleh bahwa

$$\int 3^x \, dx = \frac{3^x}{\ln 3} + C$$

Contoh: Hitunglah

$$\int 3^{2x} \, dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = 2x$

sehingga  $du = 2 \, dx$

Integral harus memuat faktor 2. Oleh karena itu, kita akan memasukkan faktor 2 di dalam integral dengan memanipulasi aljabar sebagai berikut:

$$\int 3^{2x} \, dx = \left(\frac{2}{2}\right) \int 3^{2x} \, dx$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right) \int 3^{2x} 2 \, dx$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right) \int 3^u \, du$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right) \frac{3^u}{\ln 3} + C$$

$$= \frac{3^{2x}}{2 \ln 3} + C$$

Contoh: Hitunglah

$$\int 7xb^{x^2} \, dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = x^2$

sehingga  $du = 2x \, dx$

kita dapati bahwa kita membutuhkan  $2x \, dx$  pada integral kita, oleh karena itu, kita lepaskan dahulu 7 lalu memasukkan faktor 2 pada integral dengan cara sebagai berikut:

$$\int 7xb^{x^2} \, dx = \left(\frac{2}{2}\right) 7 \int xb^{x^2} \, dx$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right) 7 \int 2xb^{x^2} \, dx$$

$$= \left(\frac{7}{2}\right) \int b^{x^2} 2x \, dx$$

$$= \left(\frac{7}{2}\right) \int b^u \, du$$

$$= \left(\frac{7}{2}\right) \frac{b^u}{\ln b} + C$$

$$= \frac{7b^{x^2}}{2 \ln b} + C$$

**Masalah Praktis**

Hitunglah integral di bawah ini:

1.  $\int 7^{3x} dx$
2.  $\int (3x)9^2 dx$
3.  $\int 2^{(3x^2+1)} dx$

**Jawaban**

1.  $\frac{7^{3x}}{3 \ln 7} + C$
2.  $\left(\frac{2}{3}\right) \frac{9^{x^2}}{\ln 9} + C$
3.  $\frac{2^{(3x^2+1)}}{6 \ln 2} + C$

**4.7. Integral fungsi trigonometri**

Fungsi trigonometri, merupakan sekelompok fungsi transendental, yang dapat diturunkan dan diintegrasikan pada bentuk yang sama sebagaimana fungsi yang lain. Kita akan membatasi pembuktian kita untuk fungsi sinus, fungsi cosinus dan fungsi secan tetapi juga akan didaftarkan untuk bentuk yang lain.

Bentuk Umumnya:

$$\int \sin u \, du = -\cos u + C$$

Bukti:

$$d(\cos u + C) = -\sin u \, du$$

dan

$$d(-\cos u + C) = \sin u \, du$$

oleh karena itu

$$\int \sin u \, du = -\cos u + C$$

Bentuk Umumnya:

$$\int \cos u \, du = \sin u + C$$

Bukti:

$$d(\sin u + C) = \cos u \, du$$

oleh karena itu

$$\int \cos u \, du = \sin u + C$$

Bentuk Umumnya:

$$\int \sec^2 u \, du = \tan u + C$$

Bukti:

$$d(\tan u + C) = d\left(\frac{\sin u}{\cos u} + C\right)$$

Kemudian dengan menggunakan aturan persamaan

$$d\left(\frac{\sin u}{\cos u} + C\right) = \frac{(\cos u)(\cos u) - (\sin u)(-\sin u)}{\cos^2 u} \, du$$

$$= \frac{\cos^2 u + \sin^2 u}{\cos^2 u} \, du$$

$$= \frac{1}{\cos^2 u} \, du$$

$$= \sec^2 u \, du$$

Oleh karena itu

$$\int \sec^2 u \, du = \tan u + C$$

Pada batas ini kita memiliki beberapa hasil integral dari fungsi trigonometri yang kita peroleh dari fungsi sinus, cosinus dan tangen. Ketiga integral ini akan menghasilkan fungsi cotangen, secan, dan cosecan yang terdaftar pada daftar di bawah ini sebagai integral dasar.

$$\int \sin u \, du = -\cos u + C$$

$$\int \cos u \, du = \sin u + C$$

$$\int \sec^2 u \, du = \tan u + C$$

$$\int \csc^2 u \, du = -\cot u + C$$

$$\int \sec u \tan u \, du = \sec u + C$$

$$\int \csc u \cot u \, du = -\csc u + C$$

Contoh: Hitunglah

$$\int \sin 3x \, dx$$

Penyelesaian:

Kita membutuhkan integral yang berbentuk

$$\int \sin u \, du = -\cos u + C$$

Kita misalkan  $u = 3x$

sehingga  $du = 3 \, dx$

tetapi kita tidak memiliki  $3 \, dx$ . Oleh karena itu, kita harus memunculkan faktor 3 dengan cara mengalikan integral kita dengan  $3/3$  dan memanipulasi bentuk integral kita secara aljabar seperti berikut:

$$\begin{aligned} \int \sin 3x \, dx &= \left(\frac{3}{3}\right) \int \sin 3x \, dx \\ &= \left(\frac{1}{3}\right) \int \sin 3x \, 3 \, dx \\ &= \left(\frac{1}{3}\right) \int \sin u \, du \\ &= \frac{1}{3} (-\cos u) + C \\ &= \frac{1}{3} (-\cos 3x) + C \\ &= -\frac{1}{3} \cos 3x + C \end{aligned}$$

Contoh: Hitunglah

$$\int \cos(2x + 4) \, dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = 2x + 4$

sehingga  $du = 2 \, dx$

oleh karena itu

$$\begin{aligned} \int \cos(2x + 4) \, dx &= \left(\frac{2}{2}\right) \int \cos(2x + 4) \, dx \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) \int \cos(2x + 4) \, 2 \, dx \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) \int \cos u \, du \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) \sin u + C \\ &= \frac{1}{2} \sin(2x + 4) + C \end{aligned}$$

Contoh: Hitunglah

$$\int (3 \sin 2x + 4 \cos 3x) \, dx$$

Penyelesaian:

Kita akan menggunakan aturan penjumlahan dan menuliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \int (3 \sin 2x + 4 \cos 3x) \, dx \\ &= \int 3 \sin 2x \, dx + \int 4 \cos 3x \, dx \end{aligned}$$

Kemudian, pada integral

$$\int 3 \sin 2x \, dx$$

Kita misalkan  $u = 2x$ ,

sehingga  $du = 2 \, dx$

tetapi kita memiliki  $3 \, dx$ , sehingga dengan manipulasi aljabar terciptalah bentuk sebagai berikut:

$$\int 3 \sin 2x \, dx = \left(\frac{2}{2}\right) 3 \int \sin 2x \, dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{1}{2}\right) 3 \int \sin 2x \cdot 2 dx \\
 &= \left(\frac{3}{2}\right) \int \sin u du \\
 &= \frac{3}{2}(-\cos u) + C_1 \\
 &= -\frac{3}{2} \cos 2x + C_1
 \end{aligned}$$

Integral yang kedua

$$\int 4 \cos 3x dx$$

Kita misalkan  $u = 3x$ ,  
sehingga  $du = 3 dx$

kita hitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \int 4 \cos 3x dx &= \left(\frac{3}{3}\right) 4 \int \cos 3x dx \\
 &= \left(\frac{1}{3}\right) 4 \int \cos 3x \cdot 3 dx \\
 &= \left(\frac{4}{3}\right) \int \cos u du \\
 &= \frac{4}{3} \sin u + C_2 \\
 &= \frac{4}{3} \sin 3x + C_2
 \end{aligned}$$

Kemudian dengan menggabungkan kedua solusi di atas, kita memperoleh:

$$\begin{aligned}
 \int (3 \sin 2x + 4 \cos 3x) dx \\
 &= \int 3 \sin 2x dx + \int 4 \cos 3x dx \\
 &= \frac{3}{2} \cos 2x + C_1 + \frac{4}{3} \sin 3x + C_2 \\
 &= -\frac{3}{2} \cos 2x + \frac{4}{3} \sin 3x + C
 \end{aligned}$$

Dimana  $C = C_1 + C_2$

Contoh: Hitunglah

$$\int \sec^2 5x dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = 5x$

sehingga  $du = 5 dx$

kita membutuhkan  $5 dx$ , sehingga kita melakukan manipulasi aljabar sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \int \sec^2 5x dx &= \left(\frac{5}{5}\right) \int \sec^2 5x dx \\
 &= \left(\frac{1}{5}\right) \int \sec^2 5x \cdot 5 dx \\
 &= \left(\frac{1}{5}\right) \int \sec^2 u du \\
 &= \frac{1}{5} \tan u + C
 \end{aligned}$$

Contoh: Hitunglah

$$\int \csc 2x \cot 2x dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = 2x$

sehingga  $du = 2 dx$

kita ubah agar  $du$  sama dengan  $2 dx$ , sehingga kita tulis:

$$\begin{aligned}
 \int \csc 2x \cot 2x dx &= \left(\frac{2}{2}\right) \int \csc 2x \cot 2x dx \\
 &= \left(\frac{1}{2}\right) \int \csc 2x \cot 2x \cdot 2 dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \csc u \cot u du \\
 &= \frac{1}{2} (-\csc u) + C \\
 &= -\frac{1}{2} \csc 2x + C
 \end{aligned}$$

Contoh: Hitunglah

$$\int \csc^2 6x dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = 6x$

sehingga  $du = 6 dx$

maka

$$\begin{aligned}
 \int \csc^2 6x \, dx &= \left(\frac{6}{6}\right) \int \csc^2 6x \, dx \\
 &= \left(\frac{1}{6}\right) \int \csc^2 6x \, 6 \, dx \\
 &= \left(\frac{1}{6}\right) \int \csc^2 u \, du \\
 &= \frac{1}{6}(-\cot u) + C \\
 &= -\frac{1}{6} \cot 6x + C
 \end{aligned}$$

Contoh: Hitunglah

$$\int \sec \frac{x}{2} \tan \frac{x}{2} \, dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = \frac{x}{2}$   
 sehingga  $du = \frac{1}{2} \, dx$   
 maka

$$\begin{aligned}
 \int \sec \frac{x}{2} \tan \frac{x}{2} \, dx &= \left(\frac{2}{2}\right) \int \sec \frac{x}{2} \tan \frac{x}{2} \, dx \\
 &= (2) \int \sec \frac{x}{2} \tan \frac{x}{2} \, \frac{1}{2} \, dx \\
 &= 2 \int \sec u \tan u \, du \\
 &= 2 \sec u + C \\
 &= 2 \sec \frac{x}{2} + C
 \end{aligned}$$

### Masalah Praktis

Hitunglah integral di bawah ini:

1.  $\int \cos 4x \, dx$
2.  $\int \sin 5x \, dx$
3.  $\int \sec^2 6x \, dx$
4.  $\int 3 \cos(6x + 2) \, dx$
5.  $\int x \sin(2x^2) \, dx$
6.  $\int 2 \csc^2 5x \, dx$
7.  $\int 3 \sec \frac{x}{3} \tan \frac{x}{3} \, dx$

### Jawaban

1.  $\frac{1}{4} \sin 4x + C$
2.  $-\frac{1}{5} \cos 5x + C$
3.  $\frac{1}{6} \tan 6x + C$
4.  $\frac{1}{2} \sin(6x + 2) + C$
5.  $-\frac{1}{4} \cos(2x^2) + C$
6.  $-\frac{2}{5} \cot 5x + C$
7.  $9 \sec \frac{x}{3} + C$

### 4.8. Integral fungsi trigonometri berpangkat

Integral fungsi trigonometri berpangkat akan dibatasi pada fungsi yang memungkinkan untuk substitusi dengan menuliskan bentuk umum sebagai berikut:

$$\int u^n \, du$$

Contoh: Hitunglah

$$\int \sin^4 x \cos x \, dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = \sin x$   
 sehingga  $du = \cos x \, dx$   
 dengan menggunakan substitusi

$$\int \sin^4 x \cos x \, dx = \int u^4 \, du = \frac{u^5}{5} + C$$

Kemudian, dengan menggunakan substitusi kembali, kita mendapatkan,

$$\frac{u^5}{5} + C = \frac{\sin^5 x}{5} + C$$

Oleh karena itu,

$$\int \sin^4 x \cos x \, dx = \frac{\sin^5 x}{5} + C$$

Contoh: Hitunglah

$$\int (\cos^3 x)(-\sin x) \, dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $u = \cos x$

sehingga  $du = -\sin x \, dx$

maka

$$\int (\cos^3 x)(-\sin x) \, dx = \int u^3 \, du$$

kita ketahui bahwa

$$\int u^3 \, du = \frac{u^4}{4} + C$$

Sehingga dengan substitusi diperoleh:

$$\int (\cos^3 x)(-\sin x) \, dx = \frac{\cos^4 x}{4} + C$$

Contoh: Hitunglah

$$\int \sin \sqrt{x} \, dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $t = \sqrt{x}$ ,

$$\text{maka } dt = \frac{dx}{2\sqrt{x}} = \frac{dx}{2t}$$

sehingga  $dx = 2t \, dt$ .

Dengan

$$\int \sin \sqrt{x} \, dx = \int \sin t (2t \, dt) = 2 \int t \sin t \, dt$$

Sekarang gunakan rumus integral parsial untuk menghitung  $\int t \sin t \, dt$ . Kita misalkan,

$u = t$  dan  $dv = \sin t \, dt$

$du = dt$  dan  $v = -\cos t$

jadi,

$$\begin{aligned} \int \sin \sqrt{x} \, dx &= 2 \int t \sin t \, dt = 2 \left( -t \cos t + \int \cos t \, dt \right) \\ &= -2(t \cos t - \sin t) + C \\ &= -2(\sqrt{x} \cos \sqrt{x} - \sin \sqrt{x}) + C \end{aligned}$$

Contoh: Hitunglah

$$\int \sin^5 x \, dx$$

Penyelesaian:

Misalkan  $t = \sqrt{x}$ ,

$$\int \sin^5 x \, dx = \int \sin^4 x \sin x \, dx$$

$$= -\int (1 - \cos^2 x)^2 d(\cos x)$$

$$= -\int (1 - 2\cos^2 x + \cos^4 x) d(\cos x)$$

$$= -\cos x + \frac{2}{3} \cos^3 x - \frac{1}{5} \cos^5 x + C$$

Contoh: Hitunglah

$$\int \sin^4 x \, dx$$

Penyelesaian:

$$\int \sin^4 x \, dx = \int (\sin^2 x)^2 \, dx$$

$$= \int \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x \right)^2 \, dx$$

$$= \int \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \cos^2 2x \right) \, dx$$

$$= \int \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 4x \right) \, dx$$

$$= \frac{3}{8} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx + \frac{1}{8} \int \cos 4x \, dx$$

$$= \frac{3}{8}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + C$$

Contoh: Hitunglah

$$\int \tan^4 x \, dx$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \int \tan^4 x \, dx &= \int \tan^2 x \tan^2 x \, dx \\ &= \int \tan^2 x (\sec^2 x - 1) \, dx \\ &= \int \tan^2 x \sec^2 x \, dx - \int \tan^2 x \, dx \\ &= \int \tan^2 x (d \tan x) - \int (\sec^2 x - 1) \, dx \\ &= \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x + C \end{aligned}$$

#### Masalah Praktis

Hitunglah integral di bawah ini:

1.  $\int \sin^2 x \cos x \, dx$
2.  $\int \sin^4 \left(\frac{x}{2}\right) \cos \frac{x}{2} \, dx$
3.  $\int 6 \sin x \cos^5 x \, dx$
4.  $\int \frac{\cos 2x}{\sin^3 2x} \, dx$
5.  $\int \cos^3 \left(\frac{x}{8}\right) \sin \frac{x}{8} \, dx$
6.  $\int (\sin x \cos x)(\sin x + \cos x) \, dx$

#### Jawaban

1.  $\frac{1}{3} \sin^3 x + C$
2.  $\frac{2}{5} \sin^5 \left(\frac{x}{2}\right) + C$

$$3. -\cos^6 x + C$$

$$4. \frac{-1}{4 \sin^2 2x} + C$$

$$5. -2 \cos^4 \left(\frac{x}{8}\right) + C$$

$$6. \frac{\sin^3 x - \cos^3 x}{3} + C$$

## KESIMPULAN

Di bawah ini adalah garis besar dari materi yang telah kita pelajari pada bab ini:

1. **Integral variabel berpangkat:** Integral dari variabel berpangkat adalah variabel berpangkat ditambah satu dan dibagi dengan pangkat yang baru.

$$\text{Bentuk umumnya: } \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

2. **Integral konstanta:** Suatu konstanta dapat diletakkan di depan atau setelah tanda integral.

$$\text{Bentuk umumnya: } \int a du = a \int du = au + C$$

3. **Integral fungsi penjumlahan yang dapat diturunkan:** Integral dari fungsi penjumlahan yang dapat diturunkan adalah sama dengan jumlah dari integral tiap-tiap fungsi yang dipisahkan setiap suku.

Bentuk umumnya:

$$\int (du + dv + dw) = \int du + \int dv + \int dw$$

4. **Integral fungsi berpangkat:** Integral dari suatu fungsi yang berpangkat dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- i) tambahkan pangkat dari fungsi tersebut dengan 1
- ii) bagikan hasilnya dari langkah i) dengan pangkat yang sudah ditambahkan.
- iii) Tambahkan konstanta dari integrasi

Bentuk umumnya:

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

## 5. Integral persamaan:

Metode 1. Mengintegalkan dengan mengubah persamaan kebentuk fungsi berpangkat

Metode 2. Mengintegalkan persamaan dengan menggunakan operasi logaritma.

Bentuk umumnya:

$$\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C, u \neq 0$$

Metode3. Mengintegalkan persamaan dengan mengubah fungsi persamaan yang akan diintegalkan ke dalam bentuk polinomial ditambah bilangan rasional sejati dengan cara membagi pembilangnya dengan penyebutnya.

## 6. Integral konstanta berpangkat variabel:

Bentuk umumnya:

$$\int e^u du = e^u + C \text{ dan } \int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C, a > 0$$

dimana  $u$  merupakan variabel,  $a$  konstanta, dan  $e$  terdefinisi.

## 7. Integral fungsi trigonometri:

Bentuk umumnya:

- $\int \sin u du = -\cos u + C$
- $\int \cos u du = \sin u + C$
- $\int \sec^2 u du = \tan u + C$
- $\int \csc^2 u du = -\cot u + C$
- $\int \sec u \tan u du = \sec u + C$
- $\int \csc u \cot u du = -\csc u + C$

8. **Integral fungsi trigonometri berpangkat:** Integral fungsi trigonometri berpangkat akan dibatasi pada bentuk dengan mensubstitusi, yang ditulis dalam bentuk  $\int u^n du$

## SOAL LATIHAN

Carilah integral di bawah ini:

1.  $\int (\pi^2 x^2 - \pi x + \pi) dx$
2.  $\int (6x + 3) \sqrt{x^2 + x} dx$
3.  $\int \frac{4x^3 + 1}{(1 - x - x^4)^2} dx$
4.  $\int \frac{4x^{1/3}}{3 + x^{4/3}} dx$
5.  $\int \frac{\pi x^2 + 2\pi x + 3\pi}{\pi x + \pi} dx$
6.  $\int 6e^{3x} (6 + e^{3x})^7 dx$
7.  $\int (x^\pi - \pi^x) dx$
8.  $\int e^{-x} \sin(e^{-x}) dx$
9.  $\int 12x^2 \csc(2x^3) \cot(2x^3) dx$
10.  $\int \frac{\sin(6x)}{1 + \cos(6x)} dx$
11.  $\int \sec^2(x - 1) e^{\tan(x-1)} dx$

## JAWABAN SOAL LATIHAN

1.  $\frac{\pi^2}{3} x^3 - \frac{\pi}{2} x^2 + \pi x + C$
2.  $2(x^2 + x)^{3/2} + C$
3.  $\frac{1}{(1 - x - x^4)} + C$
4.  $3 \ln |3 + x^{4/3}| + C$
5.  $\frac{x^2}{2} + x + 2 \ln |x + 1| + C$
6.  $\frac{1}{4} (6 + e^{3x})^8 + C$
7.  $\frac{x^{\pi+1}}{\pi+1} - \frac{\pi^x}{\ln \pi} + C$
8.  $\cos(e^{-x}) + C$
9.  $-2 \csc(2x^3) + C$
10.  $\frac{1}{6} \ln |1 + \cos(6x)| + C$
11.  $e^{\tan(x-1)} + C$

## SOAL PILIHAN GANDA

Untuk menjawab soal 1 sampai 11, hitunglah integral yang diketahui

1.  $\int 4x^3 dx$  adalah ....
  - a.  $x^4 + C$
  - b.  $\frac{4}{3}x^4 + C$
  - c.  $12x^2 + C$
  - d.  $12x^4 + C$
2.  $\int (5x^{\frac{3}{2}} - \pi x + 2x^{-5}) dx$  adalah
  - a.  $\frac{25}{2}x^{5/2} - \frac{\pi}{2}x^2 - \frac{x^{-4}}{2} + C$
  - b.  $2x^{5/2} - \frac{\pi}{2}x^2 - \frac{x^{-6}}{3} + C$
  - c.  $2x^{5/2} - \frac{\pi}{2}x^2 - \frac{x^{-4}}{2} + C$
  - d.  $2x^{5/2} - \pi - \frac{x^{-4}}{2} + C$
3.  $\int (x+2)^2 dx$  adalah ....
  - a.  $\frac{1}{3}(x+2)^3 + C$
  - b.  $x^2 + 4x + 4$
  - c.  $2x + 4 + C$
  - d.  $2(x+2)^3 + C$
4.  $\int (x^3 - 3)^{1/2} x^2 dx$  adalah ....
  - a.  $\frac{1}{2}(x^3 - 3)^{1/2} + C$
  - b.  $\frac{2}{9}(x^3 - 3)^{3/2} + C$
  - c.  $(x^3 - 3)^{1/2} + C$
  - d.  $\frac{(x^3 - 3)^{3/2}}{4} + C$
5.  $\int (x^2 - 6x + 2)^2 (2x - 6) dx$  adalah ....
  - a.  $5x^5 - 2x^3 + x + C$
  - b.  $2(x^2 - 6x + 2) + C$
  - c.  $\frac{1}{3}(x^2 - 6x + 2)^3 + C$
  - d.  $\frac{1}{3}(x^2 - 6x + 2)^3(2x^2 - 6)^2 + C$

6.  $\int (x^2 - 8)^2 (x^3 - 24x)^{-1/2} dx$  adalah ....
  - a.  $\frac{1}{2}(x^2 - 8)^2 + C$
  - b.  $-\frac{1}{2}(3x^2 - 24)^{-3/2} + C$
  - c.  $x^{-3/2} - 24^{-1/2} + C$
  - d.  $\frac{2}{3}(x^3 - 24x)^{1/2} + C$
7.  $\int \frac{2x}{(1+x^2)^3} dx$  adalah
  - a.  $-1(1+x^2)^2 + C$
  - b.  $-\frac{1}{2(1+x^2)^2} + C$
  - c.  $\frac{1}{4(1+x^2)^4} + C$
  - d.  $\frac{1}{(1+x^2)^3} + C$
8.  $\int \frac{x-1}{(2x-x^2)^{1/3}} dx$  adalah
  - a.  $\frac{3(x-1)^2}{8(2x-x^2)^{4/3}} + C$
  - b.  $\frac{3}{2}(2x-x^2)^{2/3} + C$
  - c.  $-\frac{3}{4}(2x-x^2)^{2/3} + C$
  - d.  $-\frac{4}{3}(2x-x^2)^{4/3} + C$
9.  $\int \frac{1}{x+1} dx$  adalah
  - a.  $\ln |x+1| + C$
  - b.  $\frac{1}{x+1} + C$
  - c.  $\frac{2}{(x+1)^2} + C$
  - d.  $2(x+1)^2 + C$
10.  $\int \frac{4}{x-8} dx$  adalah ...
  - a.  $\frac{1}{4} \ln |x-8| + C$
  - b.  $\frac{1}{2}(x-8)^2 + C$
  - c.  $\frac{8}{(x-8)^2} + C$
  - d.  $4 \ln |x-8| + C$

11.  $\int \frac{x}{2x^2-5} dx$  adalah ...
- $4 \ln |2x^2 - 5| + C$
  - $\frac{1}{4} \ln |2x^2 - 5| + C$
  - $\frac{(2x^2-5)^2}{2} + C$
  - $\frac{2}{(2x^2-5)^2} + C$
12. Ketika kita ingin mengintegalkan suatu fungsi bentuk pembagian dimana pembilangnya memuat suatu suku yang memiliki pangkat yang lebih tinggi dari pada suku pada penyebutnya, langkah pertama adalah ....
- Menggunakan bentuk umum  $\int \frac{1}{u} du$
  - Membagi penyebutnya dengan pembilangnya
  - Integralkan tiap suku dari masing-masing pembilang dan penyebut secara terpisah
  - Membagi tiap suku masing-masing pembilang dan penyebut dengan variabel yang mengandung pangkat tertinggi yang dimiliki oleh pembilangnya

Ketika pangkat dari suatu polinomial pembilang lebih besar daripada itu sama dengan pangkat polinomial dari penyebutnya, maka pembagian polinomial dengan polinomial dapat di lakukan.

Sebagai contoh,

$$(x^4 + x^2 + 2x - 80) / (x + 3)$$

Dapat kita hitung dengan cara di bawah ini:

$$\begin{array}{r} x^3 - 3x^2 + 10x - 28 \\ x + 3 \sqrt{x^4 + 0x^3 + x^2 + 2x - 80} \\ \underline{x^4 + 3x^3} \phantom{- 80} \\ -3x^3 + x^2 \phantom{- 80} \\ \underline{-3x^3 - 9x^2} \phantom{- 80} \\ 10x^2 + 2x \phantom{- 80} \\ \underline{10x^2 + 30x} \phantom{- 80} \\ -28x - 80 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -28x - 80 \\ \underline{-28x - 84} \\ 4 \end{array}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned} & \frac{x^4 + 0x^3 + x^2 + 2x - 80}{x + 3} \\ &= x^3 - 3x^2 + 10x - 28 + \frac{4}{x+3} \end{aligned}$$

Dalam menjawab soal nomor 13 sampai 27, hitunglah integral yang diberikan.

13.  $\int \frac{x^2}{x-1} dx$  adalah
- $2x + C$
  - $-\frac{x^3-x^2+2x}{x^2-2x-1} + C$
  - $\frac{(x+1)^3}{3} + \ln|x-1| + C$
  - $\frac{1}{2}x^3 + x + \ln|x-1| + C$
14.  $\int \frac{x^4-3x^2-4}{x+2} dx$  adalah
- $4x^3 - 6x + \ln|x+2| + C$
  - $\frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \ln\left|\frac{1}{(x+2)^2}\right| + C$
  - $\frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2\ln|(x+2)| + C$
  - $\frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + C$
15.  $\int e^x dx$  adalah
- $e^x + C$
  - $\frac{1}{2}e^{x^2} + C$
  - $xe^{x-1} + C$
  - $\frac{e^x}{\ln x} + C$

16.  $\int (x^2 - 1)e^{(3x-x^3)} dx$  adalah

- $\frac{1}{3} \ln|3x - x^3| + C$
- $\frac{1}{3} e^{(3x-x^3)} + C$
- $e^{(3x-x^3)} + C$
- $3e^{(3x-x^3)} + C$

17.  $\int 2^x dx$  adalah ....

- $2x + C$
- $2^x \ln 2 + C$
- $\frac{2^x}{\ln 2} + C$
- $\frac{2^{x+1}}{x+1} + C$

18.  $\int 5^{\left(\frac{x}{2}-3\right)} dx$  adalah ....

- $\frac{2\left(5^{\left(\frac{x}{2}-3\right)}\right)}{\ln 5} + C$
- $\frac{5}{2}x - 15 + C$
- $\frac{5^{\left(\frac{x}{2}-3\right)2}}{\ln 5} + C$
- $\frac{1}{2}x - 3 \ln 5 + C$

19.  $\int \sin \frac{x}{2} dx$  adalah ....

- $-\frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} + C$
- $-2 \sin \frac{x}{2} + C$
- $-2 \cos \frac{x}{2} + C$
- $2 \tan \frac{x}{2} + C$

20.  $\int x \cos 2x^2 dx$  adalah ....

- $-\sin 2x^2 + C$
- $\frac{1}{4} \sin 2x^2 + C$
- $\frac{x^2}{2} \cos \frac{2}{3}x^3 + C$
- $4 \sin 4x + C$

21.  $\int \left( \cos 2x - \sin \frac{x}{3} \right) dx$  adalah ....

- $\sin 2x + \cos \frac{x}{3} + C$
- $6 \cos 2x \sin \frac{x}{3} + C$
- $\frac{1}{2} \sin 2x + 3 \cos \frac{x}{3} + C$
- $2 \sin 2x + \frac{x}{3} + C$

22.  $\int \csc \frac{\theta}{2} \cot \frac{\theta}{2} d\theta$  adalah ....

- $2 \cos \frac{\theta}{2} \tan \frac{\theta}{2} + C$
- $2 \sec^2 \left( \frac{\theta}{2} \right) + C$
- $-\frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2} + C$
- $-2 \csc \frac{\theta}{2} + C$

23.  $\int \frac{\csc^2 \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$  adalah ....

- $-\frac{1}{3} \cot^3 \left( x^{1/2} \right) + C$
- $\frac{1}{2} \cot \sqrt{x} + C$
- $-\cot \left( x^{-1/2} \right) + C$
- $-2 \cot \sqrt{x} + C$

24.  $\int x \sec(1-x^2) \tan(1-x^2) dx$  adalah ....

- $-\frac{1}{2} \sec(1-x^2) + C$
- $-\sec 2x \tan 2x + C$
- $-\csc(1-x^2) + C$
- $\tan(1-x^2) + C$

25.  $\int \sec^2 ax dx$  adalah ....

- $\frac{1}{3a} \sec^3 ax + C$
- $\frac{1}{a} \tan^2 ax + C$
- $\frac{1}{a} \tan ax + C$
- $a \tan ax + C$

26.  $-6 \int \cos^2 x \sin x dx$  adalah ....

- $-6 \cos x + C$
- $-2 \cos^2 x + C$
- $2 \cos x^2 + C$
- $2 \sin^3 x + C$

27.  $\int \sin^3 \left(\frac{x}{3}\right) \cos \left(\frac{x}{3}\right) dx$  adalah

- $\frac{1}{12} \sin^4 \left(\frac{x}{3}\right) + C$
- $\frac{3}{4} \sin^4 \left(\frac{x}{3}\right) + C$
- $\frac{3}{4} \sin^4 \left(\frac{x}{3}\right) + C$
- $\frac{1}{12} \cos^4 \left(\frac{x}{3}\right) + C$

## SOAL UJIAN

Untuk soal 1 sampai dengan 20, hitunglah setiap integral tak tentu yang diberikan

- $\int \frac{1-x^2}{1-2x} dx.$
- $\int \frac{1-e^x}{1+e^x} dx.$
- $\int e^{\sin x} \sin 2x dx.$
- $\int e^x \sin 2 dx.$
- $\int x \ln x dx.$
- $\int \frac{dx}{x^3 \sqrt{\ln x}} dx.$
- $\int \ln^2 x dx.$
- $\int x \ln^2 x dx.$
- $\int \sin(\ln x) dx.$
- $\int x^2 e^{2x} dx.$
- $\int \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)}.$
- $\int e^x \tan^{-1} e^x dx.$
- $\int x \tan^{-1} x dx.$
- $\int x \sin^{-1} x dx.$
- $\int x \cos^{-1} x dx.$
- $\int \frac{(e^x + e^{2x})}{e^{2x} + 2e^x + 5} dx.$
- $\int \frac{dx}{\sqrt{e^x + 1}}.$
- $\int \sqrt{e^x + 1} dx.$
- $\int \ln(1 - x^2) dx.$

20.  $\int \ln(x^2 - 2x + 5) dx$

21.  $\int x\sqrt{x-4} dx.$

22.  $\int x^2\sqrt{1-x} dx.$

23.  $\int \frac{x^2-2\sqrt{x}}{x} dx.$

24.  $\int \cos x \sqrt{1-\sin x} dx.$

25.  $\int \sqrt{x-6} dx.$

26.  $\int x(x^2-9)^{3/2} dx.$

27.  $\int \frac{(x^2+4) dx}{x}.$

28.  $\int \frac{x dx}{x^2+16}.$

29.  $\int \frac{(x^2-6x+5) dx}{x}.$

30.  $\int \frac{dx}{\sqrt{2-x}}.$

31.  $\int \frac{4x^2 dx}{\sqrt{x^3+8}}.$

32.  $\int \frac{\frac{1}{4} dx}{2\sqrt{x}}.$

33.  $\int \frac{(x^2+1) dx}{\sqrt[3]{x^3+3x}}.$

34.  $\int \frac{x dx}{(2x^2+50)^2}.$

35.  $\int x^{n-1} \sqrt{a+bx^n}$

36.  $\int_0^4 \frac{x}{\sqrt{2x+1}} dx.$

37.  $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sqrt{1+\sin x}} dx.$

38.  $\int_{-\pi/2}^{\pi} x \cos x dx.$

39.  $\int_{-2}^2 |x| \sqrt{x^2+5} dx.$

40.  $\int_{1/2}^1 \cos \pi \sqrt{2x-1} dx.$

41. Tunjukkan  $\int_0^1 f(1-x) dx = \int_0^1 f(x) dx.$

42. Hitunglah  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \frac{t^2}{1+t^4} dt.$

43. Pegas dengan panjang alami 15 cm mempunyai gaya 45 N ketika diregangkan mencapai panjang 20 cm.

a) Dapatkan konstanta pegas dalam newton/ meter.

b) Dapatkan kerja yang dilakukan dalam perenggangan pegas 3 cm diluar panjang alaminya

c) Dapatkan kerja yang dilakukan dalam perenggangan pegas dari panjang 20 cm sampai 25 cm.

44. Pegas mengalami gaya 100 N ketika diregangkan 0,2 m dari panjang alaminya. Berapa kerja yang diperlukan untuk merenggangkan pegas 0,8 m dari panjang alaminya.

45. Tangki selinder dengan jari-jari 5 ft dan tinggi 9 ft,  $\frac{2}{3}$  bagiannya berisi air. Dapatkan kerja yang diperlukan untuk memompa semua air ke bibir atas tangki.

46. Sebuah batu diluncurkan dari keadaan diam pada titik 40 feet di atas tanah. Dapatkan rumus v dan s.

# LAMPIRAN

**TABEL PANGKAT, AKAR, LOGARITMA  
(TABEL ASA) (1)**

x	$\frac{1}{x}$	$x^2$	$\sqrt{x}$	$x^3$	$\sqrt[3]{x}$	$e^x$	$\ln x$	$\log x$
0,1	10	0,01	0,3162	0,001	0,4642	1,1052	-2,3026	-1
0,2	5	0,04	0,4472	0,008	0,5848	1,2214	-1,6094	-0,699
0,3	3,3333	0,09	0,5477	0,027	0,6694	1,3499	-1,204	-0,5229
0,4	2,5	0,16	0,6325	0,064	0,7368	1,4918	-0,9163	-0,3979
0,5	2	0,25	0,7071	0,125	0,7937	1,6487	-0,6931	-0,301
0,6	1,6667	0,36	0,7746	0,216	0,8434	1,8221	-0,5108	-0,2218
0,7	1,4286	0,49	0,8367	0,343	0,8879	2,0138	-0,3567	-0,1549
0,8	1,25	0,64	0,8944	0,512	0,9283	2,2255	-0,2231	-0,0969
0,9	1,1111	0,81	0,9487	0,729	0,9655	2,4596	-0,1054	-0,0458
1	1	1	1	1	1	2,7183	0	0
1,1	0,9091	1,21	1,0488	1,331	1,0323	3,0042	0,09531	0,04139
1,2	0,8333	1,44	1,0954	1,728	1,0627	3,3201	0,18232	0,07918
1,3	0,7692	1,69	1,1402	2,197	1,0914	3,6693	0,26236	0,11394
1,4	0,7143	1,96	1,1832	2,744	1,1187	4,0552	0,33647	0,14613
1,5	0,6667	2,25	1,2247	3,375	1,1447	4,4817	0,40547	0,17609
1,6	0,625	2,56	1,2649	4,096	1,1696	4,953	0,47	0,20412
1,7	0,5882	2,89	1,3038	4,913	1,1935	5,4739	0,53063	0,23045
1,8	0,5556	3,24	1,3416	5,832	1,2164	6,0496	0,58779	0,25527
1,9	0,5263	3,61	1,3784	6,859	1,2386	6,6859	0,64185	0,27875
2	0,5	4	1,4142	8	1,2599	7,3891	0,69315	0,30103

**TABEL PANGKAT, AKAR, LOGARITMA  
(TABEL ASA) (2)**

x	$\frac{1}{x}$	$x^2$	$\sqrt{x}$	$x^3$	$\sqrt[3]{x}$	$e^x$	$\ln x$	$\log x$
3	0,3333	9	1,7321	27	1,4422	20,086	1,09861	0,47712
4	0,25	16	2	64	1,5874	54,598	1,38629	0,60206
5	0,2	25	2,2361	125	1,71	148,41	1,60944	0,69897
6	0,1667	36	2,4495	216	1,8171		1,79176	0,77815
7	0,1429	49	2,6458	343	1,9129		1,94591	0,8451
8	0,125	64	2,8284	512	2		2,07944	0,90309
9	0,1111	81	3	729	2,0801		2,19722	0,95424
10	0,1	100	3,1623	1000	2,1544		2,30259	1
11	0,0909	121	3,3166	1331	2,224		2,3979	1,04139
12	0,0833	144	3,4641	1728	2,2894		2,48491	1,07918
13	0,0769	169	3,6056	2197	2,3513		2,56495	1,11394
14	0,0714	196	3,7417	2744	2,4101		2,63906	1,14613
15	0,0667	225	3,873	3375	2,4662		2,70805	1,17609
16	0,0625	256	4	4096	2,5198		2,77259	1,20412
17	0,0588	289	4,1231	4913	2,5713		2,83321	1,23045
18	0,0556	324	4,2426	5832	2,6207		2,89037	1,25527
19	0,0526	361	4,3589	6859	2,6684		2,94444	1,27875
20	0,05	400	4,4721	8000	2,7144		2,99573	1,30103

**TABEL SINGKAT  
RUMUS-RUMUS TURUNAN (1)**

NO	RUMUS
1.	$(c) = 0$ ; c konstan
2.	$\frac{d}{dx}(f_1 + f_2 + f_3 + \dots) = \frac{d}{dx}(f_1) + \frac{d}{dx}(f_2) + \frac{d}{dx}(f_3) + \dots$
3.	$x^n = nx^{n-1}; \forall n \in \mathbb{R}$
4.	$(\sin x) = \cos x$
5.	$(\cos x) = -\sin x$
6.	$(\tan x) = \sec^2 x$
7.	$(\text{ctg } x) = -\text{csc}^2 x$
8.	$(\sec x) = \sec x \tan x$
9.	$\text{cosec } x = -\text{cosec } x \text{ ctg } x$
10.	$e^x = e^x$
11.	$(a^x) = a^x \cdot \ln a$

**TABEL SINGKAT  
RUMUS-RUMUS TURUNAN (2)**

NO	RUMUS
12	$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$
13	$\frac{d}{dx}({}^a \log x) = \frac{1}{x \cdot \ln a}$ Catatan: ${}^a \log x = \frac{\ln x}{\ln a}$
14	$\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
15.	$\frac{d}{dx} c \cdot x = c \frac{d}{dx} (x) = c \cdot 1 = c$
Jika $U = u(x)$ dan $\frac{du}{dx} = U'$ maka	
16.	$\frac{d}{dx} (u^n) = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$
17	$\frac{d}{dx} (\sin u) = \cos u \frac{du}{dx}$
18	$\frac{d}{dx} (\cos u) = -\sin u \frac{du}{dx}$
19	$\frac{d}{dx} (\tan u) = \sec^2 u \frac{du}{dx}$
20	$\frac{d}{dx} (\text{ctg } u) = -\text{csc}^2 u \frac{du}{dx}$

**TABEL SINGKAT  
RUMUS-RUMUS TURUNAN (3)**

NO	RUMUS
21	$\frac{d}{dx} (\sec u) = \sec u \tan u \frac{du}{dx}$
22	$\frac{d}{dx} (\csc u) = -\csc u \cot u \frac{du}{dx}$
23	$\frac{d}{dx} (e^u) = e^u \frac{du}{dx}$
24	$\frac{d}{dx} (\ln u) = \frac{1}{u} \frac{du}{dx} = \frac{u'}{u}$
25	$\frac{d}{dx} {}^a \log u = \frac{1}{u \ln a} \frac{du}{dx}$
26	$\frac{d}{dx} (\arcsin u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$
27	$\frac{d}{dx} \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
28	$\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{x^2+1}$
29	$\frac{d}{dx} \text{arccot } x = -\frac{1}{x^2+1}$
30	$\frac{d}{dx} \text{arc sec } x = \frac{1}{ x  \sqrt{x^2-1}}$

**TABEL SINGKAT  
RUMUS-RUMUS TURUNAN (4)**

NO	RUMUS
31	$\frac{d}{dx} \arccos ecx = -\frac{1}{ x  \sqrt{x^2 - 1}}$
32	Aturan rantai : jika $y = f(u)$ dan $u = v(x)$ maka $\frac{dy}{dx} = \frac{df}{du} + \frac{du}{dx}$
33	Fungsi implisit $f(x,y) = 0$ $\frac{d}{dx} (F(x,y)) = \frac{d}{dx} (F(x,y))dx + \frac{d}{dy} (F(x,y)) = 0 \rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{df/dx}{df/dy}$
34	$\frac{d}{dx} (\arccos u) = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$
35	$\frac{d}{dx} (\arctan u) = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$
36	$\frac{d}{dx} (\operatorname{arcsec} u) = \frac{1}{ x  \sqrt{u^2 + 1}} \frac{du}{dx}$
37	$\frac{d}{dx} (\operatorname{arccosec} u) = -\frac{1}{ x  \sqrt{u^2 - 1}} \frac{du}{dx}$
38	$\frac{d}{dx} (u \cdot v) = u'v + uv'$ $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v}\right) = \frac{u'v + uv'}{v^2}$

**TABEL SINGKAT  
RUMUS-RUMUS INTEGRAL (1)**

- $\int du = u + C$
- $\int c \, du = c \int du$
- $\int (f + g + \dots) du = \int f \, du + \int g \, du + \dots$
- $\int u \, dv = uv - \int v \, du$  :Integral Parsial
- $\int u^n \, du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \quad ; (n \neq -1)$
- $\int \frac{du}{u} = \ln u + C$
- $\int \frac{u \, du}{a + bu} = \frac{1}{b^2} [a + bu - a \ln(a + bu)] + C$
- $\int \frac{u^2 \, du}{a + bu} = \frac{1}{b^3} \left[ \frac{1}{2} (a + bu)^2 - 2a(a + bu) + a^2 \ln(a + bu) \right] + C$   
 $\int \frac{u \, du}{(a + bu)^2} = \frac{1}{b^2} \left[ \frac{a}{a + bu} + \ln(a + bu) \right] + C$
- $\int \frac{u^2 \, du}{(a + bu)^2} = \frac{1}{b^3} \left[ a + bu - \frac{a^2}{a + bu} - 2a \ln(a + bu) \right] + C$
- $\int \frac{du}{u(a + bu)} = -\frac{1}{a} \ln \frac{a + bu}{u} + C$
- $\int \frac{du}{u^2(a + bu)} = -\frac{1}{au} + \frac{b}{a^2} \ln \frac{a + bu}{u} + C$
- $\int \frac{du}{u(a + bu)^2} = \frac{1}{a(a + b)} - \frac{1}{a^2} \ln \frac{a + bu}{u} + C$

**TABEL SINGKAT  
RUMUS-RUMUS INTEGRAL (2)**

13.  $\int u\sqrt{a+bu} du = \frac{2(3bu-2a)}{15b^2}(a+bu)u^{\frac{3}{2}} + C$
14.  $\int u^2\sqrt{a+bu} du = \frac{2(15b^2u^2-12abu+8a^2)}{105b^3}(a+bu)^{\frac{3}{2}} + C$
15.  $\int \frac{u du}{\sqrt{a+bu}} = \frac{2(bu-2a)}{3b^2}\sqrt{a+bu} + C$
16.  $\int \frac{u^2 du}{\sqrt{a+bu}} = \frac{2(3b^2u^2-4abu+8a^2)}{15b^2}\sqrt{a+bu} + C$
17. a)  $\int \frac{u du}{u\sqrt{a+bu}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \frac{\sqrt{a+bu}-\sqrt{a}}{\sqrt{a+bu}+\sqrt{a}} + C \quad ; (a > 0)$   
 b)  $\int \frac{u du}{u\sqrt{a+bu}} = \frac{1}{\sqrt{-a}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{a+bu}{-a}} + C \quad ; (a < 0)$
18.  $\int \frac{u du}{u^2\sqrt{a+bu}} = -\frac{\sqrt{a+bu}}{au} - \frac{b}{2a} \int \frac{du}{u\sqrt{a+bu}}$
19.  $\int \frac{\sqrt{a+bu}}{u} du = 2\sqrt{a+bu} + a \int \frac{du}{u\sqrt{a+bu}}$
20.  $\int \frac{\sqrt{a+bu}}{u^2} du = -\frac{\sqrt{a+bu}}{u} + \frac{b}{2} \int \frac{du}{u\sqrt{a+bu}}$
21.  $\int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} + C \quad \text{if } a > 0$
22.  $\int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{2a} \ln \frac{u+u}{a-u} + C = \frac{1}{a} \tanh^{-1} \frac{u}{a} + C, u^2 > a^2$

**TABEL SINGKAT  
RUMUS-RUMUS INTEGRAL (3)**

23.  $\int \frac{du}{u^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \frac{u-a}{u+a} + C = -\frac{1}{a} \coth^{-1} \frac{u}{a} + C, u^2 > a^2$   
 $\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \sin^{-1} \frac{u}{a} + C, u^2 > a^2$
24.  $\int \sqrt{a^2-u^2} du = \frac{u}{2}\sqrt{a^2-u^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$
25.  $\int u^2\sqrt{a^2-u^2} du = -\frac{u}{4}(a^2-u^2)^{\frac{3}{2}} + \frac{a^2}{8}u\sqrt{a^2-u^2} + \frac{a^4}{8} \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$   
 $\int \frac{\sqrt{a^2-u^2}}{u} du = \sqrt{a^2-u^2} - a \ln \left( \frac{a+\sqrt{a^2-u^2}}{u} \right) + C$
26.  $\int \frac{\sqrt{a^2-u^2}}{u^2} du = -\frac{\sqrt{a^2-u^2}}{u} - \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$
27.  $\int \frac{u^2}{\sqrt{a^2-u^2}} du = -\frac{u}{2}\sqrt{a^2-u^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$
28.  $\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left( \frac{a+\sqrt{a^2-u^2}}{u} \right) + C$
29.  $\int \frac{du}{u^2\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{\sqrt{a^2-u^2}}{a^2u} + C$   
 $\int (a^2-u^2)^{\frac{3}{2}} du = -\frac{u}{8}(2u^2-5a^2)\sqrt{a^2-u^2} + \frac{3a^4}{8} \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$

**TABEL SINGKAT  
RUMUS-RUMUS INTEGRAL (4)**

- $$30. \int \frac{du}{(a^2 - u^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 - u^2}} + C$$
- $$31. \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} = \ln(u + \sqrt{a^2 + u^2}) + C = \sinh^{-1} \frac{u}{a} + C$$
- $$32. \int \sqrt{a^2 + u^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 + u^2} + \frac{a^2}{2} \ln(u + \sqrt{a^2 + u^2}) + C$$
- $$= \frac{u}{2} \sqrt{a^2 + u^2} + \frac{a^2}{2} \sinh^{-1} \frac{u}{a} + C$$
- $$33. \int u^2 \sqrt{a^2 + u^2} du = \frac{u}{8} (2u^2 + a^2) \sqrt{a^2 + u^2} - \frac{a^4}{8} \ln(u + \sqrt{a^2 + u^2}) + C$$
- $$= \frac{u}{8} (2u^2 + a^2) \sqrt{a^2 + u^2} - \frac{a^4}{8} \sinh^{-1} \frac{u}{a} + C$$
- $$34. \int \frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{u} du = \sqrt{a^2 + u^2} - a \ln \left( \frac{a + \sqrt{a^2 + u^2}}{u} \right) + C$$
- $$35. \int \frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{u} du = -\frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{u} + \ln(u + \sqrt{a^2 + u^2}) + C$$
- $$= -\frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{u} + \sinh^{-1} \frac{u}{a} + C$$
- $$36. \int \frac{u^2}{\sqrt{a^2 + u^2}} du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 + u^2} - \frac{a^2}{2} \ln(u + \sqrt{a^2 + u^2}) + C$$
- $$= \frac{u}{2} \sqrt{a^2 + u^2} - \frac{a^2}{2} \sinh^{-1} \frac{u}{a} + C$$

**TABEL SINGKAT  
RUMUS-RUMUS INTEGRAL (5)**

- $$37. \int \frac{du}{u \sqrt{a^2 + u^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left( \frac{\sqrt{a^2 + u^2} + a}{u} \right) + C$$
- $$38. \int \frac{du}{u^2 \sqrt{a^2 + u^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{a^2 u} + C$$
- $$39. \int (a^2 + u^2)^{\frac{3}{2}} du = \frac{u}{8} (2u^2 + 5a^2) \sqrt{a^2 + u^2} + \frac{3a^4}{8} \ln(u + \sqrt{a^2 + u^2}) + C$$
- $$= \frac{u}{8} (2u^2 + 5a^2) \sqrt{a^2 + u^2} + \frac{3a^4}{8} \sinh^{-1} \frac{u}{a} + C$$
- $$40. \int \frac{du}{(a^2 + u^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 + u^2}} + C$$
- $$41. \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \ln(u + \sqrt{a^2 - u^2}) + C = \cosh^{-1} \frac{u}{a} + C$$
- $$42. \int \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} - \frac{a^2}{2} \ln(u + \sqrt{a^2 - u^2}) + C$$
- $$= \frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} - \frac{a^2}{2} \cosh^{-1} \frac{u}{a} + C$$
- $$43. \int u^2 \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{u}{8} (2u^2 - a^2) \sqrt{a^2 - u^2} - \frac{a^4}{8} \ln(u + \sqrt{a^2 - u^2}) + C$$
- $$= \frac{u}{8} (2u^2 - a^2) \sqrt{a^2 - u^2} - \frac{a^4}{8} \cosh^{-1} \frac{u}{a} + C$$

**TABEL SINGKAT  
RUMUS-RUMUS INTEGRAL (6)**

- $$44. \int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u} du = \sqrt{a^2 - u^2} a \cos^{-1} \frac{u}{a} + C$$
- $$= \int \sqrt{a^2 - u^2} - a \sec^{-1} \frac{u}{a} + C$$
- $$45. \int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u^2} du = -\frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u} + \ln(u + \sqrt{a^2 - u^2}) + C$$
- $$= \int -\frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u} + \cosh^{-1} \frac{u}{a} + C$$
- $$46. \int \frac{u^2}{\sqrt{a^2 - u^2}} du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \ln(u + \sqrt{a^2 - u^2}) + C$$
- $$= \frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \cosh^{-1} \frac{u}{a} + C$$
- $$47. \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} = \frac{1}{a} \cos^{-1} \frac{a}{u} + C = \frac{1}{a} \sec^{-1} \frac{u}{a} + C$$
- $$48. \int \frac{du}{u^2 \sqrt{a^2 - u^2}} = \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{a^2 u} + C$$
- $$49. \int (a^2 - u^2)^{\frac{3}{2}} du = \frac{u}{8} (2u^2 - 5a^2) \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{3a^4}{8} \ln(u + \sqrt{a^2 - u^2}) + C$$
- $$= \frac{u}{8} (2u^2 - 5a^2) \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{3a^4}{8} \cos^{-1} \frac{u}{a} + C$$
- $$50. \int \frac{du}{(a^2 + u^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 - u^2}} + C$$

**TABEL SINGKAT  
RUMUS-RUMUS INTEGRAL (7)**

- $$51. \int \sin u du = -\cos u + C$$
- $$52. \int \cos u du = \sin u + C$$
- $$53. \int \tan u du = -\ln \cos u + C = \ln \sec u + C$$
- $$54. \int \cot u du = \ln \sin u + C = -\ln \csc u + C$$
- $$55. \int \sec u du = \ln(\sec u + \tan u) + C = \ln \tan\left(\frac{u}{2} + \frac{\pi}{4}\right) + C$$
- $$56. \int \csc u du = \ln(\csc u + \cot u) + C = \ln \tan \frac{u}{2} + C$$
- $$57. \int \sec^2 u du = \tan u + C$$
- $$58. \int \csc^2 u du = -\cot u + C$$
- $$59. \int \sec u \tan u du = \sec u + C$$
- $$60. \int \csc u \cot u du = -\csc u + C$$
- $$61. \int \sin^2 u du = \frac{1}{2}(u - \sin u \cos u) + C = \frac{1}{2}u - \frac{1}{4} \sin 2u + C$$
- $$62. \int \cos^2 u du = \frac{1}{2}(u + \sin u \cos u) + C = \frac{1}{2}u + \frac{1}{4} \sin 2u + C$$
- $$63. \int \tan^2 u du = \tan u - u + C$$
- $$64. \int \sec^2 u du = \frac{1}{2} \sec u \tan u + \frac{1}{2} \ln(\sec u + \tan u) + C$$
- $$65. \int \sin mu \sin nu du = \frac{\sin(m-n)u}{2(m-n)} - \frac{\sin(m+n)u}{2(m+n)} + C$$

**TABEL SINGKAT  
RUMUS-RUMUS INTEGRAL (8)**

$$66. \int \sin mu \sin nu \, du = -\frac{\cos(m-n)u}{2(m-n)} - \frac{\cos(m+n)u}{2(m+n)} + C$$

$$67. \int \cos mu \cos nu \, du = \frac{\sin(m-n)u}{2(m-n)} + \frac{\sin(m+n)u}{2(m+n)} + C$$

$$68. \int u \sin u \, du = \sin u - u \cos u + C$$

$$69. \int u \cos u \, du = \cos nu + u \sin u + C$$

$$70. \int u^2 \sin u \, du = (2-u^2) \cos u + 2u \sin u + C$$

$$71. \int u^2 \cos u \, du = (u^2-2) \sin u + 2u \cos u + C$$

$$\int \sin^m u \cos^n u \, du = \frac{\sin^{m-1} u \cos^{n+1}}{m+n} + \frac{m-n}{m+n} \int \sin^{m-2} u \cos^n u \, du$$

$$\int \sin^m u \cos^n u \, du = \frac{\sin^{m+1} u \cos^{n-1}}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^m u \cos^{n-2} u \, du$$

$$\int \frac{du}{a+b \cos u} = \frac{2u}{\sqrt{a^2-b^2}} \tan^{-1} \left[ \frac{\sqrt{a^2-b^2} \tan(\frac{u}{2})}{a+b} \right] + C, a^2 > b^2$$

$$\int \frac{du}{a+b \cos u} = \frac{1}{\sqrt{b^2-a^2}} \ln \left[ \frac{a+b+\sqrt{b^2-a^2} \tan(\frac{u}{2})}{a+b-\sqrt{b^2-a^2} \tan(\frac{u}{2})} \right] + C, b^2 > a^2$$

$$74. \int \frac{du}{a+b \sin u} = \frac{2u}{\sqrt{b^2-a^2}} \ln \left[ \frac{a \tan(\frac{u}{2}) + b - \sqrt{b^2-a^2}}{a \tan(\frac{u}{2}) + b + \sqrt{b^2-a^2}} \right] + C, b^2 > a^2$$

**TABEL SINGKAT  
RUMUS-RUMUS INTEGRAL (9)**

$$75. \int \sin^{-1} u \, du = u \sin^{-1} u - \sqrt{1-u^2} + C$$

$$76. \int \cos^{-1} u \, du = u \cos^{-1} u - \sqrt{1-u^2} + C$$

$$77. \int \tan^{-1} u \, du = u \tan^{-1} u - \frac{1}{2} \ln(1+u^2) + C$$

$$78. \int e^n \, du = e^n + C$$

$$79. \int a^n \, du = \frac{a^n}{\ln a} + C$$

$$80. \int u e^n \, du = e^n (u-1) + C$$

$$81. \int u^n e^n \, du = u^n e^n - n \int u^{n-1} e^n \, du$$

$$82. \int \frac{e^u}{u^n} \, du = -\frac{e^u}{(n-1)u^{n-1}} + \frac{1}{n-1} \int \frac{e^u}{u^{n-1}} \, du$$

$$83. \int \ln u \, du = u \ln u - u + C$$

$$84. \int u^n \ln u \, du = u^{n+1} \left[ \frac{\ln u}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} \right] + C$$

$$85. \int \frac{du}{u \ln u} = \ln(\ln u) + C$$

$$86. \int e^{au} \sin nu \, du = \frac{e^u (a \sin nu - n \cos nu)}{a^2 + n^2} + C$$

$$87. \int e^{au} \cos nu \, du = \frac{e^u (a \cos nu + n \sin nu)}{a^2 + n^2} + C$$

**DAFTAR PUSTAKA**

- Apostol, Mtom M. 1967. *Calculus, volume I, Second Edition*. New York, John Wiley & Sons.
- Frank Ayres JR. Ph.D., *Schaum's: Matematika Universitas*, Edisi 3
- Kay David, *Schaum's Outline of Tensor Calculus*, McGraw-Hill Companies.
- L. Leithold., 1986. *Kalkulus dan Ilmu Ukur Analitik* (Terjemahan M. Margha), Jilid I, PT. Bina Aksara. Jakarta,
- Navedra. 1988. *Mathematics, Pre-Calculus and Introduction to Probability*. Nonresident training course.
- Purcell, Edwin J., and Dale Varberg. 1987. *Kalkulus dan Geometri Analitis* (Terjemahan I.N. Susila, B. Kartasasmita, dan Rawuh), Jilid I, Edisi V. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Purcell, Edwin J., and Dale Varberg, 1990, *The Calculus with Analytic Geometry*, Fourth Edition, Prentice-Hall Inc.
- Stewart, James. 2001. *Kalkulus* (Terjemahan I. N. Susila, dan H. Gunawan, Jilid I, Edisi IV, Penerbit Erlangga. Jakarta
- Stewart, James, 2007, *Calculus (Stewart's Calculus Series)*, Fourth Edition

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**TRY AZISAH NURMAN**, lahir pada tanggal 24 Mei 1983 di kota Ujung Pandang , Sulawesi selatan. Penulis memasuki jenjang S1 di Jurusan Matematika FMIPA UNM Makassar pada tahun 2001 hingga tahun 2005. Selanjutnya pada bulan September 2006, penulis melanjutkan kuliah ke jenjang S2 pada Program Studi Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Dan di terima menjadi dosen jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2009.

Adapun penelitian dan hasil karya ilmiah yang telah dilakukan dan dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Daur ulang sampah kertas menjadi aksesoris rumah tinggal (Penelitian, 2004)
2. Keefektifan Pendekatan Problem Open-Ended dalam Meningkatkan Kemampuan Koneksi Matematika Siswa Kelas XII IPA SMA Negeri 3 Makassar (2005)
3. Profil Kemampuan Siswa Sekolah Menengah Pertama dalam Memecahkan Masalah Matematika Open-Ended (*Ditinjau Dari Perbedaan Tingkat Kemampuan Matematika Siswa*) (Master Tesis, 2008)
4. Geometri Analitik, (Buku, 2011)
5. Analisis Data Kategori dengan Log Linear menggunakan prinsip hierarki (Jurnal, 2013)
6. Pendekatan open-ended problem dalam pembelajaran matematika (Jurnal, 2013)
7. Teorema Titik Tetap dan Aplikasinya pada Sistem Persamaan Linear (Jurnal, 2013)