

Wahyuni Abidin

ALJABAR LINEAR ELEMENTER



Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

ALJABAR LINEAR ELEMENTER

Penulis:
Wahyuni Abidin

Editor:
Try Azisah Nurman

Cetakan: I 2014
X + 207 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978-602-237-856-3

Alauddin University Press
Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata - Gowa

SAMBUTAN REKTOR

Jika engkau ingin meng"abadi", maka tinggalkanlah "Legacy"

Ungkapan di atas memberi gambaran bahwa setiap manusia hendaknya selalu melahirkan karya terbaiknya untuk dipersembahkan kepada umat. Karya itu akan menjadi sebuah *legacy* yang akan selalu diingat dan dikenang, bahkan diabadikan dalam catatan sejarah peradaban anak manusia. Jutaan bahkan milyaran anak manusia telah dan akan lahir di permukaan dunia ini, namun tidak semua mampu mencatatkan dirinya dalam kelindan sejarah yang "menyejarah". Hanya sebagian kecil anak manusia yang mampu menghadirkan dan meng"abadi"kan dirinya dalam garis lingkaran lintasan sejarah.

Dalam bingkai dan konstruksi emosional, manusia pada hakikatnya ingin abadi. Itulah sebabnya manusia ingin selalu mengabadikan momentum penting dalam ruang dan waktu yang senantiasa berubah. Mereka membuat gambar, foto, lukisan, dan sejenisnya yang seakan-akan berkeinginan menyetop waktu yang senantiasa berubah. Demikian pula aktivitas manusia membangun monumen bersejarah tidak lain tujuannya untuk mengabadikan sebuah peristiwa penting dalam sejarah peradaban manusia, bahkan Khairil Anwar berkata: "*Aku ingin hidup seribu tahun lagi*".

Karya akademik pada hakikatnya merupakan sebuah monumen penting dalam kehidupan yang dapat menjadi *legacy*. Karya itu dapat dinikmati oleh siapa saja yang cinta terhadap pengetahuan. Karya akademik bukan sekadar sebuah tulisan yang menjadi hiasan di dalam rak, lemari atau ruang baca, tetapi dia mampu melahirkan perubahan

dan memberikan pencerahan kepada manusia. Terlebih dalam perspektif eskatologis, karya akademik dapat menjadi amal jariah di "alam sana".

Atas dasar kesadaran itulah, maka program Gerakan Seribu Buku (GSB) ini dilaksanakan, dengan harapan setiap dosen mampu melahirkan "*legacy*" dalam catatan kehidupannya berupa karya tulis yang dipublikasikan. Gerakan ini diharapkan menjadi "trigger" untuk melahirkan karya-karya berikutnya.

Saya merasa gembira bahwa dosen UIN Alauddin tidak saja mampu berorasi di atas mimbar, tetapi juga dapat menuangkan gagasan, ide, dan pikirannya dalam bentuk tulisan. Hingga periode akhir masa jabatan saya sebagai Rektor, program GSB ini telah tuntas dilaksanakan. Itu artinya, hingga saat ini tidak kurang dari 1000 buah karya akademik telah dipublikasikan oleh para dosen UIN Alauddin Makassar. Fakta ini harus diapresiasi dan menjadi catatan penting bagi pejabat (Rektor) berikutnya.

Karya tulis merupakan perbendaharaan terbesar di dunia akademik. Hanya dengan budaya menulis dan membaca, maka dunia akademik menjadi hidup, bahkan al-Quran mengisyaratkan bahwa lahir dan hadimnya pengetahuan serta peradaban harus diawali dengan budaya "*iqra*/baca" dan "*al-qalam*/pena". Karena itulah, UIN sebagai kampus peradaban harus menjadi pioneer dari tradisi literasi ini, sebab rendahnya budaya "baca-tulis" pada suatu bangsa atau sebuah kampus mengindikasikan lemahnya kesadaran terhadap eksistensi diri, alam, dan Tuhan.

Samata, 2 Oktober 2014
Rektor,

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, MS

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan buku yang berjudul "*Aljabar Linear Elementer*". Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama islam.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung usaha penyempurnaan buku ini. Semoga amal bakti beliau-beliau di terima di sisi Allah.

Segala kritik dan saran untuk menyempurnakan buku ini kami terima dengan tangan terbuka dan ucapan terima kasih. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Samata-Gowa, 5 September 2014

Wahyuni Abidin

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii

BAB 1 Aljabar Matriks

1.1. Matriks	1
1.2. Operasi-operasi Matriks	7
1.3. Sifat-sifat Operasi Matriks.....	19
1.4. Invers Suatu Matriks	26
1.5. Sifat Invers Pada Matriks	28

BAB 2 Sistem Persamaan Linear

2.1. Pengertian Persamaan Linear	33
2.2. Solusi Persamaan linear	33
2.3. Sistem Persamaan linear dan Matriks Lengkap.....	41
2.4. Solusi Sistem Persamaan Linear	46
2.5. Matriks Bentuk Epsilon Baris Tereduksi	56
2.6. Eliminasi Gaussian	64
2.7. SPL Homogen dan Solusinya	77

BAB 3 Determinan

3.1 Permutasi.....	81
3.2 Definisi Sebuah Determinan.....	82
3.3 Menghitung Determinan Matriks	89
3.4 Determinan Pada Rumus Invers Matriks dan Aturan Cramer.....	107

BAB 4 Vektor Dalam Ruang Berdimensi-2 dan Ruang Berdimensi-3

4.1.	Pengertian Vektor.....	113
4.2.	Vektor dalam Sistem Koordinat	117
4.3.	Hasil Kali Titik dan Proyeksi	121
4.4.	Hasil Kali Silang	126

BAB 5 Ruang-Ruang Vektor

5.1.	Ruang-n Euclidis.....	131
5.2.	Ruang Vektor	139
5.3.	Subruang Vektor.....	152
5.4.	Kombinasi linear.....	159
5.5.	Merentang dan Bebas Linear	164
5.6.	Basis dan Dimensi	169
5.7.	Ruang baris dan Ruang Kolom	179

BAB 6 Ruang Hasil-Kali Dalam

6.1.	Ruang Hasil-Kali Dalam.....	185
6.2.	Panjang dan Sudut	191
6.3.	Ortonormalisasi	196

BAB 7 Transformasi Linear

7.1.	Pengertian Transformasi Linear	207
7.2.	Sifat Transformasi Linear; Kernel dan Jangkauan..	214
7.3.	Koordinat.....	219

Daftar Pustaka	227
----------------------	-----

Riwayat Hidup Penulis	228
-----------------------------	-----

BAB 1 ALJABAR MATRIKS

Bilangan-bilangan atau fungsi-fungsi yang disusun segi empat siku-siku banyak ditemukan dalam persoalan matematika, khususnya pada salah satu cabang matematika yaitu aljabar linear. Pada bab ini lebih banyak dipelajari susunan bilangan-bilangan tersebut yang selanjutnya akan sangat berguna dalam memahami buku ini.

1.1. Matriks

Definisi 1.1:

Sebuah **Matriks** adalah himpunan bilangan atau skalar yang disusun/dijajarkan secara segi empat dalam tanda kurung siku. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan **elemen/unsur** dalam matriks.

Matriks yang seluruh elemennya adalah bilangan real disebut *matriks real* dan matriks yang seluruh elemennya adalah bilangan kompleks disebut *matriks kompleks*. Huruf kapital biasanya digunakan untuk menyatakan suatu matriks sedangkan elemen matriks dinyatakan dengan huruf-huruf kecil. Kecuali matriks-matriks khusus yang digunakan pada bahasan yang lain.

Contoh 1.1:

Berikut ini adalah beberapa matriks;

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 5 & 2 & 6 \\ 14 & 2 & -1 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, b = [-1 \quad \frac{1}{2} \quad \pi \quad \sqrt{2}], T = [9]$$

Perhatikan bahwa matriks pertama tidak dinyatakan dengan suatu notasi tertentu, sedangkan matriks yang lainnya dinyatakan dengan huruf kapital. Dapat pula dilihat bahwa matriks pada contoh 1.1 mempunyai ukuran yang berbeda-beda.

Ukuran suatu matriks dapat diketahui dengan memperhatikan banyaknya baris dan banyaknya kolom pada matriks. Matriks dengan m baris dan n kolom disebut matriks berukuran $m \times n$. Matriks pertama pada contoh 1.1 adalah matriks berukuran 2×2 , matriks A berukuran 3×3 , matriks K berukuran 4×3 dan matriks T berukuran 1×1 . Jadi cara menuliskan ukuran suatu matriks adalah angka pertama menyatakan banyaknya baris dan angka kedua menyatakan banyaknya kolom. Matriks c berukuran 3×1 biasa pula disebut sebagai matriks kolom atau vektor kolom, matriks b berukuran 1×4 biasa pula disebut sebagai matriks baris atau vektor baris. Notasi untuk matriks kolom dan matriks baris digunakan huruf kecil tebal, bukan huruf kapital seperti yang biasanya digunakan pada matriks.

Matriks umum biasanya dinyatakan dengan huruf A dan unsur-unsur dalam matriks umum disesuaikan dengan huruf yang menyatakan matriks tersebut. Jadi, jika digunakan A untuk menyatakan matriks, maka a_{ij} digunakan untuk menyatakan unsur matriks yang berada pada baris ke- i dan kolom ke- j . Matriks umum berukuran $m \times n$ dapat ditulis dengan;

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Matriks umum ini dapat pula disingkat menjadi $[a_{ij}]_{m \times n}$, namun apabila ukuran matriks tidak ditekankan maka cukup ditulis $[a_{ij}]$.

Subskrip ganda pada unsur matriks diperlukan untuk menyatakan letak baris dan kolom unsur matriks tersebut, namun pada matriks kolom dan matriks baris subskrip ganda tidak diperlukan sebab matriks-matriks ini hanya memiliki satu kolom saja atau satu baris saja. Sehingga bentuk umum matriks kolom dan matriks baris dapat ditulis;

$$a = [a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n] \text{ dan } b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Selain matriks kolom dan matriks baris, berikut ini adalah beberapa matriks dengan nama khusus yang sangat penting diketahui;

a. Matriks nol

Suatu matriks yang semua unsurnya adalah nol disebut *matriks nol*, dinotasikan dengan 0 . Berikut contoh matriks nol berukuran 3×4

$$0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

b. Matriks bujursangkar.

Suatu matriks dengan banyak baris sama dengan banyak kolom disebut *matriks bujursangkar*. Bentuk umum matriks bujursangkar adalah;

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Bentuk ini adalah matriks bujursangkar berukuran- n dimana $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ disebut sebagai *diagonal utama*. Jadi, diagonal utama hanya terdapat pada matriks bujursangkar. Matriks-matriks bujursangkar yang memiliki ciri khas diberi nama khusus, matriks-matriks tersebut adalah;

Matriks diagonal

Matriks diagonal adalah matriks bujursangkar dimana semua unsurnya adalah nol kecuali diagonal utamanya.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriks identitas

Matriks identitas adalah matriks bujursangkar dengan semua unsur pada diagonal utamanya adalah 1. Matriks identitas di notasikan dengan I_n , dimana n adalah ukuran matriks tersebut.

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks skalar

Suatu matriks diagonal dengan unsur diagonal utamanya adalah bilangan yang sama disebut *matriks skalar*. Matriks identitas adalah salah satu bentuk khusus matriks skalar, dimana semua diagonal utama matriks identitas adalah 1.

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Matriks segitiga bawah

Suatu matriks bujursangkar yang semua unsur di atas diagonal utamanya adalah nol disebut *matriks segitiga bawah*.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -6 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 8 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

Matriks segitiga atas

Suatu matriks bujursangkar yang semua anggota dibawah diagonal utamanya adalah nol disebut *matriks segitiga atas*.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 & -1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Matriks simetris

Suatu matriks bujursangkar dengan sebarang unsur diagonal utama dan unsur-unsur yang "bercerminan"

terhadap diagonal utama adalah bilangan yang sama disebut *matriks simetris*.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 5 & 0 & 7 & 2 \\ -1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Beberapa jenis matriks lainnya disajikan pada bahasan-bahasan berikutnya karena diperlukan pemahaman operasi-operasi matriks untuk mendefinisikan beberapa jenis matriks tersebut.

Latihan 1.1

1. Tentukan ukuran masing-masing matriks berikut;

a. $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$

e. $[1 \ 4]$

b. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

f. $[0]$

2. Berilah nama untuk masing-masing matriks khusus berikut ini;

a. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

c. $[0 \ 0 \ 0]$

d. $\begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

e. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 0 \end{bmatrix}$

f. $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

3. Tentukan a, b, c, d dan e agar matriks berikut ini menjadi matriks simetris.

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 5 & e \\ a & 2 & -6 & 2 \\ b & c & 9 & d \\ 3 & 2 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

1.2. Operasi-operasi Matriks

Sebelumnya telah diperkenalkan matriks sebagai suatu susunan bilangan-bilangan, selanjutnya akan disajikan beberapa operasi aritmetika antara beberapa matriks.

1.2.1. Kesamaan matriks

Definisi 1.2:

Dua matriks dikatakan sama apabila kedua matriks tersebut mempunyai ukuran yang sama dan unsur-unsur yang bersesuaian sama.

Definisi 1.2 dapat diungkapkan dengan notasi matriks menjadi, jika $A = [a_{ij}]$ dan $B = [b_{ij}]$ mempunyai ukuran yang sama, maka $A = B$ jika dan hanya jika $a_{ij} = b_{ij}$ untuk semua i dan j .

Contoh 1.2

Tinjau matriks-matriks berikut ini;

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 9 & 6 & 7 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 9 & 6 & 7 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 9 & 6 & 7 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 4 & x \\ 9 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

$A = B$ karena ukuran kedua matriks sama yaitu 3×4 dan unsur-unsur yang bersesuaian juga sama. Tetapi $A \neq C$ atau $B \neq C$ karena ukurannya berbeda walaupun ada unsur-unsur yang bersesuaian yang sama. C dan D dikatakan sama hanya jika $x = 7$.

Contoh 1.3

Tentukan nilai a, b, c , dan d agar berlaku kesamaan;

$$\begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+5 & c-3 \\ b-4 & d+2 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

Berdasarkan definisi kesamaan maka diperoleh;

$$a+5=8 \Rightarrow a=3$$

$$c-3=2 \Rightarrow c=5$$

$$b-4=1 \Rightarrow b=5$$

$$d+2=3 \Rightarrow d=1$$

1.2.2. Penjumlahan dan pengurangan.

Definisi 1.3:

Jika A dan B adalah matriks-matriks berukuran sama, maka jumlah $A + B$ adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan anggota-anggota B dengan anggota A yang bersesuaian, dan selisih $A - B$ adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangi anggota-anggota B dari anggota-anggota A yang berpadanan. Matriks-matriks berukuran berbeda tidak dapat ditambah atau dikurangkan.

Contoh 1.3

Misalkan $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 6 \\ -4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -3 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ dan $C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$.

Maka $A+B = \begin{bmatrix} 1+(-3) & (-3)+4 & 6+2 \\ (-4)+1 & 2+3 & 3+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 8 \\ -3 & 5 & 5 \end{bmatrix}$ dan

$$A-B = \begin{bmatrix} 1-(-3) & (-3)-4 & 6-2 \\ (-4)-1 & 2-3 & 3-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -7 & 4 \\ -5 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Tetapi pernyataan $A+C$, $A-C$, $B+C$, dan $B-C$ tidak didefinisikan karena ukurannya berbeda.

1.2.3. Perkalian skalar

Definisi 1.4:

Jika A adalah sebarang matriks dan k adalah sebarang skalar, maka hasil kali kA adalah matriks yang diperoleh dengan cara mengalikan setiap anggota A dengan k .

Contoh 1.4

Dari contoh 1.2, $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 6 \\ -4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} -3 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$.

Maka, $2A = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 & 2 \cdot (-3) & 2 \cdot 6 \\ 2 \cdot (-4) & 2 \cdot 2 & 2 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -6 & 12 \\ -8 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ dan

$$(-1)B = \begin{bmatrix} 3 & -4 & -2 \\ -1 & -3 & -2 \end{bmatrix}.$$

Secara umum $(-1)B$ dapat ditulis dengan $-B$, matriks $-B$ disebut juga sebagai negatif matriks B . Sehingga ungkapan $A-B$ dapat ditulis $A+(-B)$.

1.2.4. Perkalian Matriks

Jika sebelumnya menjumlahkan dan mengurangi dua matriks dilakukan pada unsur-unsur matriks yang bersesuaian, maka untuk perkalian dua matriks hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Definisi 1.5:

Jika A adalah sebuah matriks berukuran $m \times p$ dan B adalah matriks berukuran $p \times n$, maka hasil kali AB adalah matriks berukuran $m \times n$ yang anggota-anggotanya didefinisikan sebagai berikut. Untuk mencari anggota dalam baris i dan kolom j dari AB , pilih baris i dari matriks A dan kolom j dari matriks B . Kalikan anggota-anggota yang berpadanan dari baris dan kolom secara bersama-sama, kemudian jumlahkan.

Suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui perkalian antara matriks terdefinisi atau tidak adalah dengan memperhatikan ukuran matriks-matriks yang diperkalikan. Perkalian matriks dapat didefinisikan apabila banyaknya kolom pada faktor pertama sama dengan banyaknya baris pada faktor kedua.

Agar definisi 1.5 mudah dipahami, berikut ini disajikan ilustrasi operasi perkalian dua matriks.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pj} & \cdots & b_{pn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & c_{ij} & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix}$$

dimana $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj}$

Contoh 1.5

Misalkan matriks-matriks berikut;

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Tentukan AB , BC , dan AC !

Penyelesaian:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + (-2) \cdot (-2) & 1 \cdot 4 + (-2) \cdot 1 & 1 \cdot 2 + (-2) \cdot (-3) \\ 4 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) & 4 \cdot 4 + 1 \cdot 1 & 4 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 8 \\ 2 & 17 & 5 \end{bmatrix}$$

$$BC = \begin{bmatrix} 1 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \\ (-2) \cdot (-1) + 1 \cdot 2 + (-3) \cdot 1 & (-2) \cdot 0 + 1 \cdot 1 + (-3) \cdot 3 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 9 & 10 \\ 1 & -8 \end{bmatrix}$$

AC tidak terdefinisi karena banyak kolom A tidak sama dengan banyak baris B .

Dari definisi hasil kali antara matriks, berikut ini adalah suatu rumus umum yang digunakan apabila yang diperlukan dari hasil kali matriks hanya kolom tertentu atau baris tertentu saja tanpa menghitung keseluruhan unsur hasil kali matriks tersebut.

1. Apabila yang diinginkan hanya kolom tertentu dari hasil kali matriks AB maka;
Matriks kolom ke- j dari $AB = A \times$ (matriks kolom ke- j dari B)
2. Apabila yang diinginkan hanya baris tertentu dari hasil kali matriks AB maka;
Matriks baris ke- i dari $AB =$ (matriks baris ke- i dari A) $\times B$

Rumus ini akan memudahkan memperoleh matriks kolom atau matriks baris tertentu dari hasil kali matriks.

Contoh 1.6

Misalkan matriks $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Tentukan

matriks kolom ke tiga dari AB dan matriks baris kedua dari AB .

Penyelesaian:

- Matriks kolom ke-3 dari AB adalah;

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2 \\ 0+1 \\ 1+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

- Matriks baris ke-2 dari AB adalah;

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1.2.5. Kombinasi Linear dari Hasil Kali Matriks

Dalam aljabar linear sering kali ditemukan perkalian antara sebarang matriks dengan matriks kolom atau perkalian antara matriks baris dengan sebarang matriks. Sehingga digunakan cara berfikir alternatif walaupun cara tersebut berdasar pada definisi perkalian matriks.

- Misal Ax terdefinisi, dimana;

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ dan } x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

maka Ax adalah matriks kolom

$$Ax = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix}$$

atau dapat ditulis sebagai kombinasi linear;

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ dan } x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$Ax = x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

Jadi hasil kali Ax adalah sebuah kombinasi linear matriks-matriks kolom dari A dan koefisien skalarnya berasal dari matriks kolom x .

- Misal yA terdefinisi, dimana;

$$y = [y_1 \ y_2 \ \cdots \ y_m] \text{ dan } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Maka

$$yA = y_1[a_{11} \ a_{12} \ \cdots \ a_{1n}] + y_2[a_{21} \ a_{22} \ \cdots \ a_{2n}] + \cdots + y_m[a_{m1} \ a_{m2} \ \cdots \ a_{mn}]$$

Jadi hasil kali yA adalah sebuah kombinasi linear matriks-matriks baris dari A dan koefisien skalarnya berasal dari matriks baris y .

Contoh 1.7

Hasil kali matriks $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 11 \end{bmatrix}$, dapat ditulis

sebagai kombinasi linear; $1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} + (-2) \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 11 \end{bmatrix}$.

Hasil kali $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 8 & -6 \end{bmatrix}$

dapat ditulis sebagai kombinasi linear;

$$1[1 \ 2 \ 0] + 0[-1 \ 3 \ 2] + 3[1 \ 2 \ -2] = [4 \ 8 \ -6]$$

1.2.6. Transpos Matriks

Operasi-operasi matriks yang sebelumnya telah dibahas adalah operasi yang biasa dijumpai pada operasi bilangan real. Namun operasi matriks yang diperkenalkan pada bagian ini adalah operasi matriks yang tidak mempunyai analog dalam bilangan real.

Definisi 1.6:

Jika A adalah sebuah matriks berukuran $m \times n$, maka transpos A , ditulis A^T . Didefinisikan sebagai matriks $n \times m$ yang diperoleh dari menuliskan setiap baris pada A , secara berurutan menjadi kolom-kolom.

Berdasarkan definisi 1.6, dapat ditulis bahwa baris pertama pada matriks A adalah kolom pertama untuk A^T , baris kedua pada matriks A adalah kolom kedua untuk A^T , hingga sampai baris terakhir pada matriks A adalah kolom terakhir untuk A^T .

Contoh 1.7

Tentukan transpos untuk masing-masing matrik berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 7 & 8 & 0 \\ 4 & 6 & 9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 0 \\ 4 & 7 & 2 \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad R = [2]$$

Penyelesaian;

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 4 \\ 1 & 8 & 6 \\ 5 & 0 & 9 \end{bmatrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 1 & 7 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad K^T = [1 \ 5 \ 6 \ 3], \quad R^T = [2]$$

1.2.7. Operasi Khusus untuk Matriks Bujursangkar

Beberapa operasi matriks yang telah diperkenalkan sebelumnya juga berlaku untuk matriks bujursangkar, namun ada beberapa operasi yang hanya dapat dilakukan pada matriks bujur sangkar. Oleh karena itu berikut disajikan beberapa operasi khusus untuk matriks bujursangkar.

Definisi 1.7:

Jika A adalah matriks bujursangkar berukuran n , maka trace dari A , ditulis $\text{tr}(A)$, adalah jumlah dari unsur-unsur diagonal utamanya.

Contoh 1.8

Misalnya,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \text{ maka } \text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + a_{33}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -5 \\ 2 & 9 & -7 & 6 \\ 2 & -1 & 8 & -5 \\ 8 & 7 & 5 & 2 \end{bmatrix}, \text{ maka } \text{tr}(B) = 1 + 9 + 8 + 2 = 20$$

Definisi 1.8:

Jika A adalah sebuah matriks bujursangkar, maka kita definisikan pangkat-pangkat bilangan bulat tak negatif dari A sebagai

$$A^0 = I \quad A^n = \underbrace{AAA \dots A}_{n \text{ faktor}} \quad (n > 0)$$

Contoh 1.9

Misalkan,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}, \text{ maka}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -5 & 18 \\ -12 & 19 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -41 & 75 \\ -50 & 59 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \\ -2 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \text{ maka}$$

$$B^2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \\ -2 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \\ -2 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -9 & -15 \\ -6 & 12 & 34 \\ -9 & 11 & 23 \end{bmatrix}$$

Definisi 1.8:

Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar, katakanlah $m \times m$ dan jika $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ adalah sebarang polinom, maka:

$$p(A) = a_0I + a_1A + a_2A^2 + \dots + a_nA^n$$

dengan I adalah matriks identitas $m \times m$.

Contoh 1.10

Jika $p(x) = 3x^2 + 2x + 5$ dan $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ maka

$$\begin{aligned} p(A) &= 3A^2 + 2A + 5I = 3 \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}^2 + 2 \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= 3 \begin{bmatrix} -5 & 18 \\ -12 & 19 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -8 & 60 \\ -40 & 72 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Walaupun banyak dari aturan-aturan ilmu hitung bilangan riil berlaku juga untuk matriks, namun terdapat beberapa pengecualian. Salah satu dari pengecualian yang terpenting terjadi dalam perkalian matriks. Untuk bilangan-bilangan riil a dan b , kita selalu mempunyai $ab = ba$ yang sering dinamakan *hukum komutatif untuk perkalian*. Akan tetapi, untuk matriks, AB dan BA tidak selalu sama. Berikut ini adalah tiga alasan yang membuat komutatif perkalian untuk matriks tidak berlaku;

1. AB terdefinisi tetapi BA tidak terdefinisi.
Misalnya jika $A_{2 \times 3}$ dan $B_{3 \times 4}$ maka $A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 4} = C_{2 \times 4}$ tetapi $B_{3 \times 4} \cdot A_{2 \times 3}$ tidak terdefinisi.
2. AB dan BA terdefinisi tetapi hasil kalinya mempunyai ukuran (ordo) yang berbeda.
Misalnya jika $A_{2 \times 3}$ dan $B_{3 \times 2}$ maka $AB = C_{2 \times 2}$ dan $BA = D_{3 \times 3}$
3. AB dan BA terdefinisi dan hasil kalinya mempunyai ukuran (ordo) yang sama, tetapi elemen pada matriks hasil kali berbeda.

Contoh 1.10

Misalnya $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.

Dengan mengalikannya maka akan memberikan

$$AB = \begin{bmatrix} -7 & -18 \\ -1 & 12 \end{bmatrix} \text{ dan } BA = \begin{bmatrix} 6 & 32 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

Jadi, $AB \neq BA$

Pada umumnya hukum komutatif perkalian tidak sah untuk matriks, namun beberapa aturan aritmetika yang

biasa digunakan dapat pula diterapkan pada matriks, beberapa diantaranya diuraikan dalam teorema berikut ini:

Teorema 1.1:

Anggaplah bahwa ukuran-ukuran matriks berikut ini memenuhi syarat sedemikian sehingga operasi-operasi yang ditunjukkan dapat diperagakan, maka aturan-aturan ilmu hitung matriks berikut akan sah.

- (a) $A + B = B + A$ (Hukum komutatif penjumlahan)
- (b) $A + (B + C) = (A + B) + C$ (Hukum asosiatif penjumlahan)
- (c) $A(BC) = (AB)C$ (Hukum asosiatif perkalian)
- (d) $A(B + C) = AB + AC$ (Hukum distributif)
- (e) $(B + C)A = BA + CA$ (Hukum distributif)
- (f) $A(B - C) = AB - AC$
- (g) $(B - C)A = BA - CA$
- (h) $a(B + C) = aB + aC$
- (i) $a(B - C) = aB - aC$
- (j) $(a + b)C = aC + bC$
- (k) $(a - b)C = aC - bC$
- (l) $a(bC) = (ab)C$
- (m) $a(BC) = (aB)C = B(aC)$

Meskipun operasi penjumlahan dan perkalian pada matriks didefinisikan untuk pasangan pasangan matriks, namun bagian c dan d dapat diungkapkan secara umum bahwa misalkan diketahui sebarang penjumlahan matriks atau perkalian matriks, pasangan tanda kurung bisa dihilangkan atau diselipkan di mana saja dalam ungkapan tersebut tanpa mempengaruhi hasil akhirnya.

Contoh 1.10

Sebagai gambaran hukum asosiatif untuk perkalian matriks, tinjaulah

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{Maka } AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 20 & 13 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{dan } BC = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 9 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{sehingga } (AB)C = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 20 & 13 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & 15 \\ 46 & 39 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{dan } A(BC) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 9 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & 15 \\ 46 & 39 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Jadi $(AB)C = A(BC)$

1.3.1. Sifat-sifat Operasi Matriks Nol

Matriks nol memainkan peranan yang hampir sama dengan bilangan real nol pada persamaan numerik. Namun telah kita ketahui bahwa beberapa aturan aritmetika pada bilangan real tidak berlaku pada aritmetika matriks. Misalnya, tinjaulah dua hasil standar berikut ini dalam aritmetika bilangan real.

- Jika $ab = ac$ dan $a \neq 0$ maka $b = c$ (hukum pencoretan)
- Jika $ad = 0$, maka paling tidak salah satu faktor di ruas kiri adalah 0

Contoh berikut ini memperlihatkan bahwa dua sifat diatas pada umumnya tidak berlaku pada operasi matriks.

Contoh 1.11

Perhatikan matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Perhatikan bahwa;

$$AB = AC = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad AD = 0$$

Meskipun $A \neq 0$ pada $AB=AC$ kita tidak dapat mencoret A pada kedua ruas untuk menulis $B=C$, jadi hukum pencoretan tidak berlaku. Begitu pula $AD=0$, walaupun $A \neq 0$ dan $D \neq 0$.

Teorema berikut memperlihatkan sifat-sifat bilangan real nol yang berlaku untuk matriks-matriks nol.

Teorema 1.2:

Dengan menganggap bahwa ukuran-ukuran matriks adalah sedemikian rupa sehingga operasi-operasi yang ditunjukkan dapat berlaku, maka aturan-aturan ilmu hitung matriks yang berikut akan sah.

$$A + 0 = 0 + A = A$$

$$A - A = 0$$

$$0 - A = -A$$

$$A0 = 0; 0A = 0$$

1.3.2. Sifat-sifat Operasi Matriks Identitas

Jika A adalah suatu matriks $m \times n$, maka berlaku $AI_n = A$ dan $I_m A = A$. Jadi sebuah matriks identitas memainkan peran yang sama dalam aritmetika matriks seperti bilangan 1 berperan dalam hubungan numerik $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.

Contoh 1.12

Tinjaulah matriks $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$

$$\text{Maka } I_2 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = A$$

$$\text{dan } AI_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = A$$

1.3.3. Sifat-sifat Operasi Transpos Matriks

Telah diketahui bahwa mentranspos suatu matriks berarti mempertukarkan baris-baris dan kolom-kolomnya, sehingga menarik untuk ditinjau sifat operasi pada transpos suatu matriks. Teorema berikut member gambaran tentang sifat-sifat operasi tersebut.

Teorema 1.3:

Jika ukuran matriks seperti operasi yang diberikan dapat dilakukan, maka

- $(A^T)^T = A$
- $(A+B)^T = A^T + B^T$
- $(kA)^T = kA^T$, dimana k adalah sebarang skalar.
- $(AB)^T = B^T A^T$

Teorema 1.3 (d) perlu perhatian yang saksama bahwa, transpos dari hasil kali adalah hasil kali dari transpos masing-masing matriks tetapi dengan urutan terbalik.

Latihan 1.3

Misalnya diketahui;

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 5 & 2 \\ -3 & 0 & 6 \\ -7 & 8 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 4 & 9 & 5 \\ -3 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \\ -3 & 6 & 1 \\ -2 & 9 & 3 \end{bmatrix},$$

$$a = 4 \text{ dan } b = -7$$

- Buktikan bahwa pernyataan-pernyataan berikut benar!

a. $A + (B+C) = (A+B) + C$	e. $a(BC) = (aB)C = B(aC)$
b. $a(B-C) = aB - aC$	f. $A(B-C) = AB - AC$
c. $(AB)C = A(BC)$	g. $(B+C)A = BA + CA$
d. $(a+b)C = aC + bC$	h. $(ab)C = a(bC)$
- Tunjukkan bahwa;
 - $(A^T)^T = A$
 - $(A+B)^T = A^T + B^T$
 - $(aA)^T = aA^T$
 - $(AB)^T = B^T A^T$

1.4. Invers Suatu Matriks

Definisi 1.9:

Jika A adalah matriks kuadrat (bujur sangkar), dan jika kita dapat mencari matriks B sehingga $AB = BA = I$, maka A dikatakan *dapat dibalik (invertible)* dan B dinamakan *invers (inverse)* dari A .

Contoh 1.13

Matriks $B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ adalah invers dari $A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

karena $AB = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$ dan $BA = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$

$$\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Jadi matriks A dapat dibalik (invertible).

Contoh 1.14

Mengapa matriks $D = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ tidak dapat dibalik?

Karena;

$$DC = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} + 4c_{21} & c_{12} + 4c_{22} & c_{13} + 4c_{23} \\ 2c_{11} + 5c_{21} & 2c_{12} + 5c_{22} & 2c_{13} + 5c_{23} \\ 3c_{11} + 6c_{21} & 3c_{12} + 6c_{22} & 3c_{13} + 6c_{23} \end{bmatrix}$$

Hasil kali DC memungkinkan memperoleh matrik I_3 . Namun hasil kali CD tidak mungkin memperoleh matriks identitas, karena semua unsur pada kolom ketiga dari CD adalah nol. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan definisi 1.5, diperoleh;

$$CD = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Teorema 1.3:

Jika baik B maupun C adalah invers matriks A , maka $B = C$

Suatu matriks yang dapat dibalik hanya mempunyai satu invers. Karena jika B adalah invers A , maka $BA = I$. Dengan mengalikan kedua ruas dari sebelah kanan dengan C maka akan memberikan $(BA)C = IC = I$. Tetapi $(BA)C = B(AC) = BI = B$, sehingga $B = C$.

Jadi, jika matriks A dapat dibalik, maka inversnya dapat dinyatakan dengan simbol A^{-1} sehingga dapat ditulis;

$$AA^{-1} = I \text{ dan } A^{-1}A = I$$

Mencari invers suatu matriks berukuran sebarang yang dapat dibalik memerlukan metode-metode tertentu, akan disajikan pada bahasan khusus. Berikut hanya disajikan suatu rumus yang telah dikenal dan digunakan secara luas. Rumus ini hanya digunakan untuk matriks 2×2 ;

$$\text{Jika } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ maka } A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Berdasarkan rumus ini, maka dihasilkan pernyataan bahwa,

matriks $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ dapat dibalik jika $ad - bc \neq 0$.

1.5. Sifat Invers Pada Operasi Matriks

Invers suatu matriks memiliki sifat-sifat khusus setelah dilakukan operasi matriks.

Teorema 1.4:

Jika A dan B adalah matriks-matriks yang dapat dibalik dan yang ukurannya sama, maka

a) AB dapat dibalik

b) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Pada teorema 1.4 hanya memperlihatkan keterbalikan dan invers hasil kali matriks untuk dua faktor (A dan B), namun hasil ini dapat diperluas untuk lebih dari dua faktor. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa; berapapun banyaknya matriks yang dapat dibalik dikalikan, hasil kali matriks-matriks tersebut juga dapat dibalik, dan invers dari hasil kali matriks-matriks tersebut adalah hasil kali invers-inversnya dalam urutan terbalik.

Contoh 1.14

Misal matriks $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ maka $AB = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 9 & 8 \end{bmatrix}$

dan dengan menggunakan rumus pada subbab 2.4 diperoleh;

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

$$(AB)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 8 & -6 \\ -9 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -\frac{9}{2} & \frac{7}{2} \end{bmatrix}$$

$$B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -\frac{9}{2} & \frac{7}{2} \end{bmatrix}$$

Maka, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ seperti yang dijamin oleh Teorema 1.4.

Definisi 1.10:

Jika A dapat dibalik, maka kita definisikan pangkat bilangan bulat negatif sebagai

$$A^{-n} = (A^{-1})^n = \underbrace{A^{-1}A^{-1}A^{-1}\dots A^{-1}}_{n \text{ faktor}}$$

Karena definisi ini berlaku pula pada bilangan real maka hukum-hukum pangkat pada teorema berikut juga berlaku.

Teorema 1.5:

Jika A adalah matriks bilangan bujur sangkar dan r serta s adalah bilangan bulat, maka

$$A^r A^s = A^{r+s} \quad (A^r)^s = A^{rs}$$

Teorema selanjutnya menetapkan beberapa sifat tambahan yang berguna dari eksponen matriks tersebut.

Teorema 1.6:

Jika A adalah sebuah matriks yang dapat dibalik, maka:

- A^{-1} dapat dibalik dan $(A^{-1})^{-1} = A$
- A^n dapat dibalik dan $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$ untuk $n = 0, 1, 2, \dots$
- Untuk setiap skalar k yang tak sama dengan nol, maka kA dapat dibalik dan $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$

a. Karena $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, maka A^{-1} dapat dibalik dan $(A^{-1})^{-1} = A$.

b. Karena $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, maka berdasarkan Teorema 1.4, A^n dapat dibalik dan invers dari A^n adalah $(A^n)^{-1}$. Menurut Teorema 1.5, $(A^n)^{-1} = A^{-n}$ sehingga menurut definisi $A^{-n} = (A^{-1})^n$

c. Jika k adalah skalar tak nol sebarang, maka hasil (l) dan (m) dari Teorema 1.1 akan memungkinkan kita untuk menuliskan

$$kA\left(\frac{1}{k}A^{-1}\right) = \frac{1}{k}(kA)A^{-1} = \left(\frac{1}{k}k\right)AA^{-1} = (1)I = I$$

Demikian juga $\left(\frac{1}{k}A^{-1}\right)(kA) = I$ sehingga kA dapat dibalik dan $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$.

Contoh 1.15

Anggap $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$. Maka

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 30 \\ 15 & 41 \end{bmatrix}$$

$$A^{-3} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 41 & -30 \\ -15 & 11 \end{bmatrix}$$

Teorema berikut menggambarkan hubungan antara invers suatu matriks yang dapat dibalik dan invers dari transposnya.

Teorema 1.7:

Jika A adalah sebuah matriks yang dapat dibalik, maka A^T juga dapat dibalik dan

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

Contoh 1.16

Tinjau matriks-matriks;

$$A = \begin{bmatrix} -5 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ dan } A^T = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Dengan menggunakan rumus diperoleh;

$$A^{-1} = \frac{1}{-5+6} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & -5 \end{bmatrix} = (A^T)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$$

Latihan 1.4

1. Gunakan rumus mencari invers matriks 2×2 untuk menemukan invers matriks-matriks berikut ini;

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -3 & 8 \\ -6 & -1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} x & y \\ z & a \end{bmatrix} \text{ dan}$$

$$D = \begin{bmatrix} 2x & -3y \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

2. Diketahui matriks;

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}, \text{ dan } C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Periksa bahwa tiga matriks A , B , dan C memenuhi kesamaan berikut;

a. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

b. $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

BAB 2

SISTEM PERSAMAAN LINEAR

Salah satu bahasan utama dalam aljabar linear adalah sistem persamaan linear (SPL) dan penyelesaiannya, sehingga SPL berperan penting dan menarik untuk diperkenalkan pada bagian awal. Beberapa hal yang akan diperkenalkan adalah istilah dasar dan suatu metode untuk memecahkan sistem-sistem persamaan linear.

2.1 Pengertian Persamaan Linear.

Pengertian umum persamaan linear adalah suatu persamaan yang;

- (i) variabel-variabelnya berpangkat satu
- (ii) tidak melibatkan hasil kali antara variabel dan akar variabel
- (iii) variabelnya tidak muncul sebagai peubah bebas dari sebuah fungsi trigonometrik, fungsi logaritmik atau untuk fungsi ekponensial.

Secara lebih umum, persamaan linear dengan n peubah $x_1, x_2, \dots, x_n$ sebagai persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = b$$

dimana $a_1, a_2, \dots, a_n$ dan b adalah konstanta-konstanta real. Konstanta a_k disebut sebagai koefisien x_k dan b disebut sebagai suku konstanta dari persamaan tersebut.

Contoh 2.1

Berikut ini adalah diberikan beberapa contoh persamaan linear dan persamaan nonlinear

- $2x+5y=3$; merupakan persamaan linear dengan dua variabel
- $y=\frac{3}{4}x+5z-3$; merupakan persamaan linear dengan tiga variabel
- $x_1+3x_2=-2x_3+x_4-7$; merupakan persamaan linear dengan empat variabel
- $x_1+x_2+\dots+x_n=12$; merupakan persamaan linear dengan n variabel
- $xy+2z=9$; bukan persamaan linear karena melibatkan perkalian variabel x dan y
- $y=\sin x$; bukan persamaan linear karena variabel x muncul sebagai argumen fungsi trigonometri
- $x^2+3y+5=0$; bukan persamaan linear karena variabel x berpangkat dua
- $x_1=2\sqrt{x_2}+5$; bukan persamaan linear karena melibatkan akar variabel x_2
- $0x_1+0x_2+0x_3=3$; merupakan persamaan linear dengan tiga variabel
- $ax=b$; merupakan persamaan linear dengan satu variabel.

Persamaan linear pada bagian (i) biasa juga disebut sebagai persamaan linear degenaratif yakni jika setiap koefisien pada suatu persamaan linear sama dengan nol. Bentuk umum persamaan linear degenarasi adalah;

$$0x_1+0x_2+0x_3+\dots+0x_n=b$$

Latihan 2.1

1. Manakah dari yang berikut ini yang merupakan persamaan linear?

a. $x_1+5x_2-\sqrt{2}x_3=1$

b. $\frac{1}{x_1}+2x_2+3x_3=5$

c. $x_1+2(x_2+x_3)=2$

d. $x_1^2-5x_3=2+x_2$

e. $x_1=-x_3-x_2$

f. $x_1(x_2-4x_3)=4$

g. $\pi x_1-x_2=x_3+\sqrt[3]{7}$

h. $\sqrt{2x_1}+x_2=2-4x_3$

2. Misalkan k adalah suatu konstanta, manakah dari yang berikut yang merupakan persamaan linear?

a. $x_1-x_3=\sin k+x_2$

b. $kx_1-\frac{1}{k}x_3=2$

c. $2^k x_1+2x_2=\sqrt[k]{x_3}$

2.2 Solusi Persamaan Linear

Solusi (*solusi khusus*) persamaan linear $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = b$ adalah urutan dari n bilangan $s_1, s_2, \dots, s_n$ sehingga apabila disubstitusi $x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$ akan memenuhi persamaan linear tersebut. Himpunan semua solusi persamaan tersebut dinamakan himpunan solusinya (*solusi umum*).

2.2.1 Solusi Persamaan Linear degeneratif

Sebagaimana yang telah diperlihatkan pada contoh 2.1 (i), semua koefisien persamaan linear degeneratif adalah nol. Solusi untuk persamaan linear semacam ini tergantung pada nilai konstanta b . Secara khusus diungkapkan oleh dua pernyataan berikut ini;

- a) Jika $b \neq 0$, maka persamaan tersebut tidak memiliki solusi
- b) Jika $b = 0$, maka setiap bilangan real adalah solusi

Contoh 2.2

Tinjau persamaan linear degeneratif berikut;

a) $0x + 0y - 0z = 3$

Perhatikan bahwa $b = 3$ dan tidak ada bilangan yang dapat disubstitusikan untuk menggantikan tiga variabel yang tak diketahui agar persamaan ini terpenuhi. Dengan kata lain, persamaan ini tidak memiliki solusi.

b) $0x - 0y + 0z = 0$

Oleh karena $b = 0$, maka sebarang bilangan real yang disubstitusi menggantikan tiga variabel yang tak-

diketahui selalu memenuhi persamaan ini. Jadi, persamaan ini memiliki banyak solusi.

2.2.2 Solusi Persamaan Linear satu variabel

Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah $ax = b$, solusi untuk persamaan linear dapat diketahui dengan memperhatikan koefisien a dan konstanta b .

Teorema 2.1:

Perhatikan persamaan linear $ax = b$.

(a) Jika $a \neq 0$, maka $ax = b$ memiliki tepat satu solusi, yaitu $x = \frac{b}{a}$.

(b) Jika $a = 0$ dan $b \neq 0$, maka $ax = b$ tidak punya solusi.

Contoh 2.3 $ax = b$

Cari solusi untuk masing-masing persamaan linear berikut;

a) $7x - 4 = 4x + 3$

b) $x + 3 = x - 7$

c) $7 - \frac{8}{2}x + 3 = 4x - 10$

Penyelesaian:

Agar solusi yang diinginkan lebih mudah di peroleh, maka sederhanakan masing-masing persamaan linear diatas.

a) $7x - 4 = 4x + 3$ dapat disederhanakan menjadi bentuk standar $3x = 7$.

Jadi, persamaan ini memiliki tepat satu solusi yaitu $x = \frac{7}{3}$

- b) $x+3=x-7$ dapat disederhanakan menjadi bentuk standar $0x=-10$.

Jadi, persamaan ini tidak memiliki solusi.

- c) $7-\frac{8}{2}x+3=4x-10$ dapat disederhanakan menjadi bentuk standar $-8x=-20$

Jadi, persamaan ini memiliki tepat satu solusi yaitu

$$x = \frac{5}{2}.$$

2.2.3 Solusi Persamaan Linear dengan dua atau lebih variabel tak diketahui.

Pertama-tama yang harus dilakukan dalam menyelesaikan persamaan linear seperti ini adalah menentukan salah satu variabel tak diketahui sebagai *variabel utama* (variabel terikat) dan variabel lainnya adalah *variabel bebas*. Biasanya, apabila ada variabel dengan koefisien sama dengan satu maka sebaiknya variabel utama adalah variabel dengan koefisien sama dengan satu. Namun apabila tidak ada, maka variabel utama adalah variabel yang paling kiri.

Selanjutnya, menentukan *parameter* untuk variabel-variabel bebas. Sampai pada tahap ini diperoleh himpunan solusi atau solusi umum untuk persamaan linear. Solusi khusus akan diperoleh jika disubstitusikan sebarang bilangan real pada parameter yang telah ditentukan sebelumnya.

Contoh 2.4

Carilah himpunan solusi masing-masing persamaan berikut:

- a. $3x-6y=9$
b. $x_1-4x_2+7x_3=5$

c. $6x_1-2x_2+2x_3-8x_4=10$

Penyelesaian;

- a. Untuk memperoleh solusi persamaan linear dengan dua variabel tak diketahui, kita tetapkan variabel terikat adalah x dan variabel bebas adalah y . Ditentukan parameter untuk variabel bebas misalnya t sehingga diperoleh;

$$y=t \Rightarrow 3x-6t=9$$

$$\Rightarrow 3x=9+6t$$

$$\Rightarrow x=3+2t$$

Solusi yang diperoleh merupakan himpunan solusi atau solusi umum dalam sebarang parameter t .

Solusi pendekatan khusus dapat diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai tertentu untuk t . Misalnya, apabila disubstitusi $t=1$ maka diperoleh solusi $x=5$ dan $y=1$. Untuk $t=-2$ maka diperoleh solusi $x=-1$ dan $y=-2$.

- b. Solusi untuk persamaan linear tiga variabel tak diketahui dapat diperoleh dengan menetapkan parameter untuk dua variabel terakhir (atau dua variabel mana saja) kemudian menyelesaikan variabel utamanya. Misalnya kita tetapkan parameter untuk dua variabel terakhir, $x_2=s$ dan $x_3=t$, sehingga kita dapat menyelesaikan variabel utama x_1 . Diperoleh himpunan solusi, $x_1=5+4s-7t$, $x_2=s$, $x_3=t$.

Solusi khusus diperoleh dengan mensubstitusi sebarang bilangan real untuk s dan t . Misal;

- Untuk $s=1$ dan $t=-2$, solusi khusus adalah $x_1=23$, $x_2=1$, $x_3=-2$
- Untuk $s=0$ dan $t=1$, solusi khusus adalah $x_1=-2$, $x_2=0$, $x_3=1$

- c. Ditetapkan variabel utama untuk persamaan linear ini adalah x_3 walaupun variabel ini tidak memiliki koefisien sama dengan satu dan bukan variabel paling kiri, pertimbangannya adalah agar memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Sehingga variabel bebas adalah x_1 , x_2 dan x_4 . Jika parameter untuk variabel bebas berturut-turut adalah p , q dan r , maka diperoleh;

$$6p - 2q + 2x_3 - 8r = 10 \quad \Rightarrow \quad 2x_3 = -6p + 2q + 8r + 10$$

$$\Rightarrow x_3 = -3p + q + 4r + 5$$

Jadi himpunan solusinya adalah;

$$x_1 = p, x_2 = q, x_3 = -3p + q + 4r + 5 \text{ dan } x_4 = r$$

Latihan 2.2

1. Carilah himpunan solusi untuk masing-masing SPL berikut ini!

a. $3x - y = 6$

e. $x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 5$

b. $x + 4y = \frac{1}{4}$

f. $3x_1 + x_2 - \frac{2}{5}x_3 = 5$

c. $3x - 4y = 5$

g. $x_1 - 4x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 5$

d. $3\frac{1}{2}x + y = 5\frac{2}{3}$

h. $x_1 - 2x_2 = x_3 - 2x_4 + 7$

2. Carilah suatu persamaan linear dalam variabel x dan y yang mempunyai penyelesaian umum $x = 5 + 2t$, $y = t$.
3. Untuk nilai-nilai konstanta k manakah sistem persamaan linear berikut ini tidak mempunyai solusi? Tepat satu solusi? Tak hingga banyaknya solusi?

$$x - y = 3$$

$$2x - 2y = k$$

2.3 Sistem Persamaan Linear dan Matriks Lengkap

Sistem persamaan linear adalah himpunan berhingga (kumpulan) persamaan linear dengan variabel-variabel tak diketahui yang sejenis. Secara umum sistem persamaan linear (SPL) yang terdiri dari m persamaan $L_1, L_2, \dots, L_m$ dengan n variabel tak diketahui $x_1, x_2, \dots, x_n$ disebut sebagai sistem $m \times n$ dan dapat ditulis dalam bentuk standar sebagai berikut;

$$L_1: a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$L_2: a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots \quad \dots \quad \vdots$$

$$L_m: a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

dimana a_{ij} dan b_i adalah konstanta. Huruf a_{ij} adalah koefisien dari variabel tak diketahui x_j pada persamaan L_i dan bilangan b_i adalah konstanta dari persamaan L_i .

Suatu SPL dinamakan sistem bujursangkar apabila $m=n$, yaitu jika banyaknya persamaan m sama dengan banyaknya variabel tak diketahui n . Misalnya suatu sistem

umum tiga persamaan dengan tiga variabel tak diketahui ditulis sebagai;

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

sistem ini adalah SPL bujursangkar karena banyaknya persamaan $m=3$ sama dengan banyaknya variabel tak diketahui $n=3$.

Subskrip ganda pada koefisien digunakan untuk menyatakan koefisien dalam sistem tersebut. Subskrip pertama pada koefisien menunjukkan di persamaan mana letak koefisien tersebut pada sistem persamaan, dan subskrip kedua menunjukkan variabel mana yang dikalikan dengan koefisien tersebut. Misalnya koefisien a_{21} berada pada persamaan ke-2 dan mengkalikan (dikalikan) variabel x_1 .

Perhatikan kembali bentuk standar SPL pada 2.3, sistem tersebut terdiri dari m persamaan dengan n variabel tak diketahui, dapat diungkapkan dalam bentuk matriks sebagai berikut;

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

atau

$$Ax = b$$

dimana;

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}; \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}; \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Matriks A disebut sebagai matriks koefisien dan b adalah matriks kolom konstanta.

Bentuk standar SPL pada 2.3 bisa disingkat dengan menuliskan susunan koefisien-koefisien x dan nilai b dalam bentuk segi empat (matriks) atau gabungan dari matriks koefisien dan matriks konstanta, biasa disebut sebagai matriks lengkap (*augmented matrix*). Sehingga bentuk standar SPL tersebut dapat ditulis dengan;

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

Contoh 2.3

Matriks lengkap untuk SPL

$$\begin{aligned}
 x_1 + x_2 + 4x_3 &= 5 \\
 2x_1 - x_2 + x_3 &= -3 \\
 -x_1 - x_2 - 5x_3 &= 0 \\
 x_2 + 7x_3 &= 2
 \end{aligned}
 \quad \text{adalah} \quad
 \begin{bmatrix}
 1 & 1 & 4 & 5 \\
 2 & -1 & 1 & -3 \\
 -1 & -1 & -5 & 0 \\
 0 & 1 & 7 & 2
 \end{bmatrix}$$

Latihan 2.3

1. Cari matriks diperbesar untuk setiap sistem persamaan linear berikut;

a. $3x_1 - 2x_2 = -1$

$$4x_1 + 5x_2 = 3$$

$$7x_1 + 3x_2 = 2$$

b. $x_1 = 1$

$$x_2 = 6$$

$$x_3 = 2$$

c. $2x_1 + 2x_3 = 1$

$$x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 6$$

$$5x_1 - 3x_2 + x_3 = 2$$

d. $2x_1 + x_2 - 4x_3 + 5x_4 = 1$

$$-x_1 + x_2 + 2x_3 = 4$$

$$x_1 + 3x_2 - 7x_3 + x_4 = 6$$

$$2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5$$

2. Cari suatu SPL yang berpadanan dengan matriks yang diperbesar berikut;

$$\begin{bmatrix}
 1 & 3 & 7 \\
 2 & -3 & 5
 \end{bmatrix}$$

b. $\begin{bmatrix}
 -1 & 2 & 4 \\
 2 & -4 & 3 \\
 1 & 0 & 3
 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix}
 1 & 0 & 0 & 2 \\
 0 & 1 & 0 & 4 \\
 2 & 1 & 3 & 5 \\
 4 & 0 & 0 & 3
 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix}
 3 & 0 & 2 & 1 \\
 -1 & 1 & 2 & 5 \\
 0 & 2 & 4 & 6
 \end{bmatrix}$

e. $\begin{bmatrix}
 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 5
 \end{bmatrix}$

2.4 Solusi Sistem Persamaan Linear

Solusi untuk sistem persamaan linear $m \times n$ pada bagian 2.3 adalah urutan dari n bilangan $s_1, s_2, \dots, s_n$ sehingga apabila disubstitusi $x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$ akan memenuhi SPL tersebut, atau urutan n -bilangan tersebut merupakan solusi untuk setiap persamaan linear pada sistem tersebut, urutan n -bilangan ini biasa disebut sebagai solusi khusus. Himpunan semua solusi sistem tersebut disebut sebagai himpunan solusi atau solusi umum.

Contoh 2.4

Perhatikan SPL berikut;

$$x_1 + x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 5$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 - 2x_4 = 1$$

$$x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 4x_4 = 3$$

Sistem ini adalah SPL 3×4 yakni terdiri dari 3 persamaan dan 4 variabel tak diketahui.

Apabila urutan bilangan $s_1 = -8, s_2 = 6, s_3 = 1, s_4 = 1$ disubstitusi ke setiap persamaan pada SPL tersebut maka akan diperoleh;

$$-8 + 6 + 4(1) + 3(1) = 5 \quad -8 + 6 + 4 + 3 = 5 \quad 5 = 5$$

$$2(-8) + 3(6) + 1 - 2(1) = 1 \text{ atau } -16 + 18 + 1 - 2 = 1 \text{ atau } 1 = 1$$

$$-8 + 2(6) - 5(1) + 4(1) = 3 \quad -8 + 12 - 5 + 4 = 3 \quad 3 = 3$$

Jadi urutan bilangan $(-8, 6, 1, 1)$ adalah solusi untuk SPL tersebut.

Namun, apabila urutan bilangan $s_1 = -10, s_2 = 5, s_3 = 1, s_4 = 2$ disubstitusi ke setiap persamaan pada SPL tersebut maka tidak memenuhi setiap persamaan linear pada SPL. Sehingga urutan bilangan $(-10, 5, 1, 2)$ bukan merupakan solusi untuk SPL tersebut. Tidak semua SPL mempunyai solusi. Misalnya SPL berikut;

$$x + y = 2$$

$$x + y = 5$$

Sistem ini merupakan SPL yang terdiri dari dua persamaan yang kontradiksi, karena tidak ada dua bilangan yang bila dijumlahkan sama dengan 2 sekaligus sama dengan 5. Sehingga tidak ada bilangan yang dapat menggantikan x dan y agar memenuhi sistem tersebut, atau dengan kata lain tidak mempunyai solusi.

Dua persamaan linear yang kontradiksi di atas memberikan gambaran bahwa tidak semua sistem persamaan linear mempunyai solusi, kadang-kadang akan didapatkan SPL yang tidak mempunyai penyelesaian. Sebuah SPL yang tidak mempunyai solusi disebut sebagai *tak-konsisten*, sedangkan apabila SPL mempunyai paling sedikit satu penyelesaian maka sistem tersebut dikatakan *konsisten*.

Secara umum, satu diantara tiga pernyataan berikut terjadi untuk penyelesaian SPL;


- a) Sistem mempunyai tepat satu solusi (solusi unik)
 - b) Sistem tidak mempunyai solusi
 - c) Sistem mempunyai lebih dari satu solusi (banyak solusi)
- Tiga pernyataan ini dapat diilustrasikan dengan gambar dimana persamaan linear pada sistem digambarkan sebagai garis lurus. Berikut diberikan contoh untuk tiga kemungkinan penyelesaian SPL. Walaupun tidak berlaku secara umum untuk SPL, contoh berikut memberikan gambaran tentang tiga kemungkinan penyelesaian SPL.

Contoh 2.5

Dengan menggunakan grafik, solusi masing-masing SPL dengan dua variabel dapat diperlihatkan sebagai berikut;

- a) $x - y = 3$
 $-x + y = 2$


Garis untuk dua persamaan ini sejajar atau tidak ada perpotongan. Akibatnya tidak ada penyelesaian untuk sistem persamaan tersebut.



Gambar 2.1

- b) $2x + y = 3$
 $x + 3y = 1$


Garis untuk dua persamaan ini berpotongan pada satu titik, sehingga SPL ini mempunyai tepat satu solusi.



Gambar 2.2

- c) $4x - 2y = 4$
 $2x - y = 2$

Garis untuk dua persamaan ini berimpit, sehingga SPL ini mempunyai banyak solusi.



Ide dasar dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan linear adalah mengganti SPL yang diberikan dengan suatu SPL baru yang mempunyai himpunan solusi yang sama tetapi SPL baru lebih mudah diselesaikan. SPL yang baru tersebut pada umumnya diperoleh dengan menerapkan serangkaian langkah dan melakukan tiga jenis operasi berikut untuk menghilangkan variabel tertentu secara sistematis.

1. Mempertukarkan dua persamaan
2. Mengalikan sebuah persamaan dengan konstanta tak-nol.
3. Mengganti sebuah persamaan dengan cara menjumlahkan persamaan tersebut (yang akan diganti) dengan kelipatan persamaan lain.

Contoh 2.6

Tentukan solusi SPL berikut ini!

$$2x + 4y - 3z = 1 \quad \dots \rightarrow L_1$$

$$x + y + 2z = 9 \quad \dots \rightarrow L_2$$

$$3x + 6y - 5z = 0 \quad \dots \rightarrow L_3$$

Untuk menentukan suatu solusi SPL di atas, dapat dilakukan tiga operasi yang sesuai agar diperoleh SPL yang baru, sebagaimana yang dilakukan berikut ini;

- Menukarkan persamaan pertama dengan persamaan kedua ($L_1 \leftrightarrow L_2$) sehingga SPL menjadi;

$$x + y + 2z = 9 \quad \dots \rightarrow L_1$$

$$2x + 4y - 3z = 1 \quad \dots \rightarrow L_2$$

$$3x + 6y - 5z = 0 \quad \dots \rightarrow L_3$$

- Mengganti persamaan kedua dengan cara, persamaan kedua ditambah -2 kali persamaan pertama ($L_2 \rightarrow L_2 + (-2L_1)$) sehingga SPL menjadi;

$$x + y + 2z = 9 \quad \dots \rightarrow L_1$$

$$2y - 7z = -17 \quad \dots \rightarrow L_2$$

$$3x + 6y - 5z = 0 \quad \dots \rightarrow L_3$$

- Mengganti L_3 dengan cara; $L_3 + (-3L_1)$ sehingga SPL menjadi;

$$x + y + 2z = 9$$

$$2y - 7z = -17$$

$$3y - 11z = -27$$

- Mengalikan L_2 dengan konstanta $\frac{1}{2}$ sehingga SPL menjadi;

$$\begin{aligned}x + y + 2z &= 9 \\y - \frac{7}{2}z &= -\frac{17}{2} \\3y - 11z &= -27\end{aligned}$$

- Mengganti L_3 dengan cara; $L_3 + (-3L_2)$ sehingga SPL menjadi;

$$\begin{aligned}x + y + 2z &= 9 \\y - \frac{7}{2}z &= -\frac{17}{2} \\-\frac{1}{2}z &= -\frac{3}{2}\end{aligned}$$

- Mengalikan L_3 dengan -2 sehingga SPL menjadi;

$$\begin{aligned}x + y + 2z &= 9 \\y - \frac{7}{2}z &= -\frac{17}{2} \\z &= 3\end{aligned}$$

- Mengganti L_1 dengan cara; $L_1 + (-L_2)$ sehingga SPL menjadi;

$$\begin{aligned}x + \frac{11}{2}z &= \frac{35}{2} \\y - \frac{7}{2}z &= \frac{17}{2} \\z &= 3\end{aligned}$$

- Mengganti L_1 dengan cara; $L_1 + (-\frac{11}{2}L_3)$ sehingga SPL menjadi;

$$\begin{aligned}x &= 1 \\y - \frac{7}{2}z &= -\frac{17}{2} \\z &= 3\end{aligned}$$

- Mengganti L_2 dengan cara; $L_2 + \frac{7}{2}L_3$ sehingga SPL menjadi;

$$\begin{aligned}x &= 1 \\y &= 2 \\z &= 3\end{aligned}$$

Sehingga solusi untuk SPL di atas adalah $x=1$, $y=2$, dan $z=3$.

Karena baris pada suatu matriks lengkap berpadanan dengan persamaan dalam SPL terkait, maka tiga operasi yang dilakukan untuk menentukan solusi SPL dapat pula diterapkan pada baris-baris matriks lengkap. Tiga operasi tersebut menjadi;

1. Mempertukarkan dua baris
2. Mengalikan sebuah baris dengan konstanta tak-nol.
3. Mengganti sebuah baris dengan cara menjumlahkan baris tersebut (yang akan diganti) dengan kelipatan baris lain.

Operasi ini dikenal sebagai Operasi Baris Elementer (OBE).

Contoh 2.7

Misalnya SPL pada contoh 2.6;

$$\begin{aligned}2x + 4y - 3z &= 1 \\x + y + 2z &= 9 \\3x + 6y - 5z &= 0\end{aligned}$$

Matriks lengkap untuk SPL di atas adalah $\begin{bmatrix} 2 & 4 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 9 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$

Untuk menyelesaikan SPL tersebut kita dapat melakukan operasi baris elementer sbb;

- Menukarkan baris pertama dengan baris kedua ($B_1 \leftrightarrow B_2$) untuk memperoleh;

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

- Mengganti baris kedua dengan cara ($B_2 + (-2B_1)$) dan mengganti baris ketiga dengan cara ($B_3 + (-3B_1)$) untuk memperoleh;

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix}$$

- Kalikan baris kedua dengan $\frac{1}{2}$ atau ditulis $\frac{1}{2}B_2$ untuk memperoleh;

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix}$$

- Mengganti baris ketiga dengan cara ($B_3 + (-3B_2)$) setelah itu kalikan baris ketiga dengan -2 untuk memperoleh;

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

- Mengganti baris pertama dengan cara; $B_1 + (-B_2)$ untuk memperoleh;

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{11}{2} & \frac{35}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

- Mengganti baris pertama dengan cara $B_1 + (-\frac{11}{2}B_3)$ dan mengganti baris kedua dengan cara $B_2 + \frac{7}{2}B_3$ sehingga diperoleh;

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Jadi solusi untuk SPL tersebut adalah; $x=1$, $y=2$, dan $z=3$

Latihan 2.4

1. Selesaikanlah setiap sistem berikut ini;

$$2x - 5y = 11$$

$$a. \quad 3x + 4y = 5$$

$$2x - 3y = 8$$

$$b. \quad -6x + 9y = 6$$

2. Carilah solusi SPL berikut ini;

$$x + 2y - z = 3$$

$$x + 3y + z = 5$$

$$3x + 8y + 4z = 17$$

3. Perhatikan sistem,

$$x + ay = 4$$

$$ax + 9y = b$$

- Tentukan nilai a berapakah sistem tersebut memiliki solusi unik?
- Tentukan pasangan nilai (a, b) sehingga sistem tersebut memiliki lebih dari satu solusi.

2.5 Matriks Bentuk Eselon Baris Tereduksi

Operasi baris elementer telah dilakukan pada contoh 2.7 untuk menyelesaikan SPL. Sehingga pada akhirnya diperoleh suatu matriks yang berbentuk;

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Matriks ini merupakan suatu contoh matriks yang berbentuk *eselon baris tereduksi*. Untuk menjadi bentuk ini, sebuah matriks harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut;

- Jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari nol maka angka tak nol pertama dalam baris tersebut adalah sebuah angka 1 yang disebut sebagai *1-utama*.
- Jika ada sebarang baris yang seluruhnya terdiri dari nol, maka baris-baris ini dikelompokkan bersama di bagian bawah matriks.
- Jika sebarang dua baris yang berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari nol, *1 utama* dalam baris yang lebih bawah terletak di sebelah kanan *1 utama* dalam baris yang lebih atas.
- Masing-masing kolom yang berisi sebuah *1 utama* mempunyai nol di tempat lainnya.

Suatu matriks yang mempunyai sifat a, b, dan c disebut sebagai matriks bentuk *eselon baris*. Apabila memenuhi keempat sifat maka matriks tersebut berbentuk *eselon baris tereduksi*. Berikut ini diberikan contoh beberapa matriks dalam bentuk eselon baris dan eselon baris tereduksi.

Contoh 2.8

Matriks-matriks berikut ini adalah bentuk *eselon baris*;

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Matriks-matriks berikut ini adalah matriks dalam bentuk *eselon baris tereduksi*

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Suatu matriks lengkap yang diperoleh dari suatu SPL direduksi menjadi bentuk eselon baris tereduksi melalui serangkaian operasi baris elementer, hal ini dilakukan agar himpunan penyelesaian sistem linear tersebut dapat diperoleh dengan mudah tanpa melakukan perhitungan yang rumit. Berikut ini diberikan contoh beberapa matriks bentuk eselon baris tereduksi.

Contoh 2.9

Anggaplah bahwa matriks lengkap dari beberapa SPL telah direduksi. Sehingga diperoleh matriks-matriks bentuk eselon baris berikut ini:

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}, \text{ SPL yang bersesuaian adalah;}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= -1 \\ x_2 &= -3 \\ x_3 &= -4 \end{aligned}$$

Sistem ini dapat langsung kita tentukan solusinya tanpa melakukan perhitungan yang rumit. Solusinya adalah $x_1 = -1$, $x_2 = -3$, dan $x_3 = -4$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 9 \end{bmatrix}, \text{ SPL yang bersesuaian adalah;}$$

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_4 &= 5 \\ x_2 + 3x_4 &= 7 \\ x_3 + x_4 &= 9 \end{aligned}$$

Menyelesaikan sistem ini membutuhkan sedikit perhitungan karena persamaan linear yang ada pada sistem adalah persamaan linear dua variabel. Namun dengan mengingat kembali pelajaran sebelumnya pada 2.2.3 pekerjaan ini menjadi lebih mudah. Ditetapkan variabel utama untuk masing-masing persamaan linear adalah yang bersesuaian dengan 1-utama pada matriks eselon baris tereduksi. Jadi variabel utama pada sistem

ini adalah x_1 , x_2 , dan x_3 . Variabel yang tidak bersesuaian dengan 1-utama ditetapkan sebagai variabel bebas, dalam contoh ini variabel bebasnya adalah x_4 . Mengikuti cara yang telah dipelajari pada 2.2.3, maka variabel bebas dapat diganti dengan sebarang parameter, misalkan s . Sehingga diperoleh solusi umum:

$$x_1 = 1 - 4s; \quad x_2 = 6 - 2s; \quad x_3 = 2 - 3s; \quad x_4 = s$$

Jadi ada tak-hingga banyaknya solusi yang diperoleh dari sistem linear ini.

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 6 & 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ SPL yang bersesuaian adalah;}$$

$$\begin{aligned} x_1 + 6x_2 + 4x_3 &= -2 \\ x_3 + 3x_5 &= 1 \\ x_4 + 5x_5 &= 2 \end{aligned}$$

Mengikuti cara pada contoh 2.9 (b), variabel utama dapat ditetapkan dengan memperhatikan sistem ini, yaitu x_1 , x_3 , dan x_4 . Variabel bebasnya adalah x_2 dan x_5 . Perhatikan bahwa baris ke empat pada matriks lengkap tidak di tuliskan pada SPL yang bersesuaian karena persamaan ke empat adalah persamaan linear degeneratif dengan $b=0$. Berarti setiap solusi yang memenuhi tiga persamaan lainnya akan memenuhi pula untuk persamaan ke empat.

Untuk memperoleh himpunan solusi maka ditetapkan sebarang parameter untuk variabel bebas yaitu $x_2 = s$ dan $x_5 = t$. Jadi solusi umum diberikan oleh rumus berikut;

$$x_1 = -2 - 6s - 4t \quad x_2 = s$$

$$x_3 = 1 - 3t$$

$$x_4 = 2 - 5t$$

$$x_5 = t$$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, SPL yang bersesuaian adalah;

$$x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 0$$

$$0x_1 + x_2 + 2x_3 = 0$$

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1$$

Persamaan terakhir adalah persamaan linear degeneratif dengan suku konstanta tak nol, yakni persamaan yang tidak memiliki solusi. Apabila dalam suatu SPL terdapat persamaan linear tidak memiliki solusi maka disimpulkan bahwa tidak ada solusi untuk sistem tersebut.

Latihan 2.5

1. Yang manakah dari matriks-matriks berikut ini yang berbentuk eselon baris, eselon baris tereduksi atau bukan keduanya.

a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

e) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}$

f) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

g) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

$$h) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$i) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$j) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$k) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & & 1 \end{bmatrix}$$

2. Selesaikanlah persamaan linear yang bersesuaian dengan matriks berikut ini.

$$a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -7 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -5 \end{bmatrix}$$

$$c) \begin{bmatrix} 1 & -6 & 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$d) \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

$$e) \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & -7 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \end{bmatrix}$$

$$f) \begin{bmatrix} 1 & 7 & -2 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

2.6 Eliminasi Gaussian

Telah kita pelajari dan memahami cara menyelesaikan sebuah SPL dengan mudah apabila matriks lengkap yang bersesuaian dengan SPL tersebut berbentuk eselon baris tereduksi. Oleh karena itu, kita akan mempelajari suatu metode yang digunakan untuk mereduksi sebarang matriks menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Metode ini akan mengilustrasikan setiap langkah dalam prosedur mereduksi suatu matriks menjadi bentuk *eselon baris* atau sampai bentuk *eselon baris tereduksi*. Metode ini biasa disebut sebagai Eliminasi Gaussian

Contoh berikut ini akan memperlihatkan langkah demi langkah yang dilakukan dalam mereduksi suatu matriks lengkap menjadi bentuk eselon baris tereduksi.

Contoh 2.10

Anggaplah matriks lengkap berikut ini bersesuaian dengan suatu SPL, reduksilah matriks berikut menjadi bentuk eselon baris tereduksi;

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

Langkah 1. Kolom yg entrinya tidak semuanya terdiri dari nol (kolom tak nol) ditempatkan pada kolom paling kiri.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

Kolom tak nol paling kiri

Langkah 2. Pertukarkan baris teratas dengan baris lainnya, jika perlu. Pada contoh ini dilakukan pertukaran baris karena anggota pertama baris teratas adalah nol, sehingga perlu membawa salah satu entri tak nol ke posisi paling atas dari kolom yang didapatkan dalam langkah 1.

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{Baris kedua pada} \\ \text{langkah 1 menjadi baris} \\ \text{pertama pada langkah 2} \end{array}$$

Langkah 3. Jika entri paling atas pada kolom yg diperoleh dari langkah 2 adalah k maka kalikan baris pertama dengan $\frac{1}{k}$ untuk mendapatkan 1-utama.

$$\begin{array}{l} \text{Diperoleh 1-utama setelah} \\ \text{baris pertama pada} \\ \text{matriks sebelum-nya dikali} \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

Langkah 4. Tambahkan hasil kali yang sesuai dari baris teratas ke baris-baris di bawahnya sedemikian hingga semua anggota di bawah 1-utama menjadi nol.

$$\begin{array}{l} \text{Baris ketiga ditambah -2} \\ \text{kali baris pertama atau} \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -27 \end{bmatrix}$$

Langkah 5. Simpan (abaikan sementara) baris teratas matriks pada langkah 4, dan lanjutkan pada sub-matriks (hanya baris 2 dan baris 3 pada langkah 4) dengan menerapkan langkah 1 sampai langkah 4 (jika diperlukan) agar diperoleh matriks dalam bentuk eselon baris.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -27 \end{bmatrix}$$

Baris pertama diabaikan sementara

Kolom tak nol paling kiri

Baris pertama pada sub-matriks dikalikan dengan $-\frac{1}{2}$ untuk memperoleh *1-utama* pada baris tersebut.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -27 \end{bmatrix}$$

Baris kedua pada sub-matriks ditambahkan dengan -5 kali baris pertama pada sub-matriks untuk memperoleh nol di bawah *1-utama* sub-matriks.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 3 \end{bmatrix}$$

Baris pertama pada sub-matriks disimpan untuk sementara, sehingga diperoleh sub-matriks baru. Selanjutnya memulai lagi langkah 1.

$$\begin{bmatrix} 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 3 \end{bmatrix}$$

Baris pertama pada sub matriks sebelumnya

Kolom tak nol paling kiri

Baris pertama dan satu-satunya baris dalam sub-matriks yang baru dikalikan dengan 2 untuk mendapatkan *1-utama*.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Sub-matriks hanya terdiri dari satu baris dan telah diperoleh *1-utama*

Sekarang, matriks yang diperoleh adalah matriks dalam bentuk *eselon-baris*. Untuk memperoleh bentuk eselon baris tereduksi maka diperlukan langkah tambahan berikut;

Langkah 6. Gunakan baris tak-nol terakhir untuk memulai langkah-langkah memperoleh nol di atas *1-utama*. Kerjakan dari baris bawah ke atas dengan menambahkan perkalian yang sesuai dari masing-masing baris ke baris-baris di atasnya.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Baris tak nol terakhir

1-utama pada baris tak nol

Baris kedua ditambah $\frac{7}{2}$ kali baris ketiga untuk memperoleh;

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Baris pertama ditambah -6 kali baris ketiga kemudian baris pertama ditambah 5 kali baris kedua untuk memperoleh

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 53 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Matriks terakhir yang diperoleh adalah matriks bentuk eselon baris tereduksi.

Prosedur yang telah kita lakukan dalam mereduksi matriks lengkap menjadi matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi disebut sebagai *Eliminasi Gauss-Jordan*. Apabila yang kita lakukan hanya menghasilkan matriks bentuk eselon-baris (hanya menggunakan lima langkah pertama) maka disebut sebagai *Eliminasi Gauss*.

Contoh 2.11

Berikut ini diberikan contoh menyelesaikan SPL berikut menggunakan eliminasi Gauss-Jordan;

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 &= 2 \\ \text{a). } x_1 + x_2 + 4x_3 - x_4 &= 3 \\ 2x_1 + 5x_2 + 9x_3 - 2x_4 &= 8 \end{aligned}$$

Matriks lengkap untuk sistem persamaan ini adalah;

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 9 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya matriks lengkap ini akan direduksi menjadi matriks bentuk eselon baris tereduksi.

- Mengganti baris kedua dengan cara $B_2 + (-B_1)$ dan mengganti baris ketiga dengan cara $B_3 + (-2B_1)$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 9 & 3 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

- Kalikan baris kedua dengan konstanta $\frac{1}{3}$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 9 & 3 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

- Mengganti baris ketiga dengan cara $B_3 + (-9B_2)$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

- Kalikan baris ketiga dengan konstanta $\frac{1}{2}$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

- Mengganti baris kedua dengan cara $B_2 + (\frac{2}{3}B_3)$ dan mengganti baris pertama dengan cara $B_1 + (-B_3)$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

- Mengganti baris pertama dengan cara $B_1 + (2B_2)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{11}{3} & 0 & \frac{17}{6} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Matriks terakhir yang diperoleh berbentuk eselon baris tereduksi dan SPL yang bersesuaian adalah;

$$\begin{aligned} x_1 + \frac{11}{3}x_3 &= \frac{17}{6} \\ x_2 + \frac{1}{3}x_3 &= \frac{2}{3} \\ x_4 &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

atau dapat ditulis;

$$x_1 = \frac{17}{6} - \frac{11}{3}x_3; \quad x_2 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}x_3; \quad x_4 = \frac{1}{2}$$

Solusi umum diperoleh dengan memisalkan $x_3 = t$, maka;

$$x_1 = \frac{17}{6} - \frac{11}{3}t; \quad x_2 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}t; \quad x_3 = t; \quad x_4 = \frac{1}{2}$$

Sehingga diperoleh *tak terhingga banyaknya solusi* untuk SPL ini.

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 - 2x_3 &= 0 \\ 2x_1 + 6x_2 - 5x_3 - 2x_4 + 4x_5 - 3x_6 &= -1 \\ 5x_3 + 10x_4 + 15x_6 &= 5 \\ 2x_1 + 6x_2 + 8x_4 + 4x_5 + 18x_6 &= 6 \end{aligned}$$

Matriks lengkap untuk SPL ini adalah;

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & -5 & -2 & 4 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 10 & 0 & 15 & 5 \\ 2 & 6 & 0 & 8 & 4 & 18 & 6 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya matriks lengkap ini akan direduksi menjadi matriks bentuk eselon baris tereduksi

- Mengganti baris kedua dan baris keempat masing-masing dengan cara $B_2 + (-2B_1)$ dan $B_4 + (-2B_1)$;

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 10 & 0 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 8 & 0 & 18 & 6 \end{bmatrix}$$

- Kalikan baris kedua dengan -1

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 10 & 0 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 8 & 0 & 18 & 6 \end{bmatrix}$$

- Mengganti baris ketiga dan baris keempat masing-masing dengan cara $B_3 + (-5B_2)$ dan $B_4 + (-4B_2)$;

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 2 \end{bmatrix}$$

- Mempertukarkan baris ketiga dan baris keempat;

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Mengalikan baris ketiga dengan $\frac{1}{6}$;

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Diperoleh matriks bentuk eselon baris, untuk memperoleh eselon baris tereduksi maka dilanjutkan dengan mengganti baris kedua yaitu $B_2 + (-3B_3)$, kemudian mengganti baris pertama dari matriks yang dihasilkan dengan cara $B_1 + 2B_2$;

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Matriks terakhir yang diperoleh adalah matriks bentuk eselon baris tereduksi dan sistem persamaan yang sesuai adalah;

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 4x_4 + 2x_5 &= 0 \\ x_3 + 2x_4 &= 0 \\ x_6 &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa baris keempat pada matriks terakhir tidak disajikan dalam bentuk persamaan linear karena persamaan yang sesuai dengan baris keempat adalah persamaan linear degeneratif dengan suku konstanta sama dengan 0 ($b=0$), akibatnya secara otomatis akan terpenuhi oleh solusi dari persamaan yang masih tersisa.

Dengan menyelesaikan peubah utama dalam peubah bebas, kita peroleh;

$$\begin{aligned} x_1 &= -3x_2 - 4x_4 - 2x_5 \\ x_3 &= -2x_4 \\ x_6 &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Jika kita memberi sebarang nilai pada peubah bebas x_2 , x_4 dan x_5 masing-masing adalah r , s dan t , solusi umum diberikan oleh rumus;

$$x_1 = -3r - 4s - 2t; \quad x_2 = r; \quad x_3 = -2s; \quad x_4 = s; \quad x_5 = t; \quad x_6 = \frac{1}{3}$$

Jadi tak terhingga banyaknya solusi yang diperoleh.

Pada saat menggunakan eliminasi Gussian, beberapa mahasiswa membawa matriks lengkap hanya sampai pada bentuk eselon baris tanpa melanjutkan ke bentuk eselon baris tereduksi. Jika ini yang dilakukan maka sistem persamaan yang bersesuaian dengan matriks bentuk eselon baris dapat diselesaikan dengan suatu cara yang disebut sebagai *substitusi-balik*. Berikut ini diperlihatkan cara melakukan substitusi balik.

Contoh 2.12

Dari operasi yang telah dilakukan pada contoh 10 bagian b, bentuk eselon baris yang diperoleh dari matriks lengkap adalah;

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Sistem persamaan linear yang bersesuaian dengan matriks ini adalah

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_5 &= 0 \\ x_3 + 2x_4 + 3x_6 &= 1 \\ x_6 &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Menyelesaikan setiap persamaan untuk peubah-peubah utama pada masing persamaan;

$$\begin{aligned} x_1 &= -3x_2 + 2x_3 - 2x_5 \\ x_3 &= 1 - 2x_4 - 3x_6 \\ x_6 &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Selanjutnya menyelesaikan sistem ini dengan mencari solusi masing-masing persamaan dimulai dari persamaan paling bawah sampai ke persamaan paling atas. Substitusikan solusi yang diperoleh dari mulai persamaan paling bawah ke setiap persamaan yang berada di atasnya. Lakukan hal ini sampai diperoleh solusi untuk persamaan paling atas.

Solusi untuk persamaan paling bawah adalah;

$$x_6 = \frac{1}{3}$$

dengan mensubstitusikan $x_6 = \frac{1}{3}$ pada persamaan di atasnya diperoleh;

$$x_3 = -2x_4$$

dengan mensubstitusikan nilai x_3 pada persamaan di atasnya diperoleh;

$$x_1 = -3x_2 - 4x_4 - 2x_5$$

Untuk memperoleh solusi umum, tetapkan sebarang parameter untuk variabel-variabel bebas, Misalkan $x_2 = r$, $x_4 = s$ dan $x_5 = t$ maka solusi umum;

$$x_1 = -3r - 4s - 2t$$

$$x_2 = r$$

$$x_3 = -2s$$

$$x_4 = s$$

$$x_5 = t$$

$$x_6 = \frac{1}{3}$$

Latihan 2.6

1. Selesaikan masing-masing sistem berikut ini dengan menggunakan eliminasi Gaussian.

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 8$$

$$\text{a) } -x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1$$

$$3x_1 - 7x_2 + 4x_3 = 10$$

$$-2b + 3c = 1$$

$$\text{b) } 3a + 6b - 3c = -2$$

$$6a + 6b + 3c = 5$$

$$3x_1 + 2x_2 - x_3 = -15$$

$$5x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0$$

$$\text{c) } 3x_1 + x_2 + 3x_3 = 11$$

$$-6x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 30$$

$$w + 2x - y = 4$$

$$x - y = 3$$

$$\text{d) } w + 3x - 2y = 7$$

$$2u + 4v + w + 7x = 7$$

2. Selesaikan masing-masing sistem pada soal 1 menggunakan eliminasi Gauss-Jordan.

2.7 SPL Homogen dan Solusinya.

Jika sebelumnya telah dipelajari tentang tiga kemungkinan solusi yang dapat terjadi pada suatu SPL, maka pada bagian ini yang menarik adalah mencari solusi yang lain dari solusi yang sangat mudah diperoleh dari SPL tersebut. Hanya dengan memperhatikan setiap suku konstantanya kita dapat langsung menyebut suatu solusi yang memenuhi SPL tersebut. SPL yang dimaksud adalah *Sistem Persamaan Linear Homogen*. SPL homogen adalah SPL yang semua suku konstantanya adalah nol. Sehingga bentuk umum SPL homogen dapat ditulis dengan bentuk;

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0$$

$$\vdots \quad \dots \quad \vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0$$

Setiap SPL homogen adalah sistem yang *konsisten* karena setiap SPL mempunyai satu solusi yang sangat mudah yaitu $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ disebut solusi *trivial*. Apabila ada solusi yang lain maka SPL homogen dikatakan mempunyai solusi *tak-trivial*.

Jika sebelumnya diketahui bahwa ada tiga kemungkinan solusi yang terjadi pada SPL, maka pada SPL homogen hanya ada dua yang mungkin terjadi, yaitu mempunyai tepat satu solusi yaitu solusi trivial, atau mempunyai tak terhingga banyaknya solusi.

Apabila ditemukan SPL homogen yang melibatkan lebih banyak bilangan tak diketahui daripada banyaknya persamaan (pada bentuk umum $n > m$), maka SPL homogen mempunyai pemecahan tak-trivial.

Contoh 2.13

Selesaikanlah SPL homogen berikut ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan.

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 &= 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 &= 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 &= 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \end{aligned}$$

Matriks lengkap untuk SPL homogen diatas adalah;

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Setelah mereduksi matriks menggunakan operasi baris elementer, maka diperoleh matriks bentuk eselon baris tereduksi sebagai berikut;

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Baris terakhir pada matriks ini tidak dituliskan sehingga sistem persamaan yang bersesuaian dengan matriks ini adalah;

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_5 &= 0 \\ x_3 + x_5 &= 0 \\ x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Tetapkan sebarang parameter untuk variabel-variabel bebas untuk memperoleh solusi umum berikut;

$$x_1 = -s - t, \quad x_2 = s, \quad x_3 = -t, \quad x_4 = 0, \quad x_5 = t$$

Latihan 2.6

1. Selesaikan SPL homogen berikut:

$$\begin{aligned}
 &2x + 2y + 4z = 0 \\
 \text{a) } &\begin{aligned} &w && -y &- 3z &= 0 \\ &2w + 3x + y + z &= 0 \\ &-2w + x + 3y - 2z &= 0 \\ &&v + 3w - 2x &= 0 \end{aligned} \\
 \text{b) } &\begin{aligned} &2u + v - 4w + 3x &= 0 \\ &2u + 3v + 2w - x &= 0 \\ &-4u - 3v + 5w - 4x &= 0 \end{aligned} \\
 &c + d + e = 0 \\
 \text{c) } &\begin{aligned} &-a - b + 2c - 3d + e &= 0 \\ &a + b - 2c &- e &= 0 \\ &2a + 2b - c && + e &= 0 \end{aligned}
 \end{aligned}$$

2. Tentukan SPL homogen berikut yang mempunyai penyelesaian tak-trivial

$$\begin{aligned}
 &2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - x_4 = 0 \\
 \text{a) } &\begin{aligned} &7x_1 + x_2 - 8x_3 + 9x_4 = 0 \\ &2x_1 + 8x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{aligned}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\
 \text{b) } &\begin{aligned} &x_2 - 8x_3 = 0 \\ &4x_3 = 0 \end{aligned}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) } &\begin{aligned} &a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ &a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0 \end{aligned}
 \end{aligned}$$

BAB 3
DETERMINAN

Determinan merupakan suatu fungsi yang menghubungkan suatu bilangan real $f(A)$ dengan suatu matriks bujur sangkar A . Dengan kata lain, fungsi determinan merupakan fungsi bernilai real dari suatu peubah matriks. Jadi, setiap matriks bujursangkar misalnya $A_{n \times n} = [a_{ij}]$ memiliki skalar khusus yang disebut sebagai determinan.

Fungsi determinan ditemukan saat dilakukan pengkajian mengenai sistem persamaan linear, sehingga fungsi determinan merupakan alat yang sangat berperan penting pada teori sistem persamaan linear terutama memperoleh sifat-sifat matriks bujursangkar dan invers suatu matriks yang dapat dibalik. Determinan suatu matriks A dinotasikan dengan:

$$\det(A) \text{ atau } |A| \text{ atau } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Telah kita pelajari sebelumnya bahwa matriks $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ dapat dibalik jika $ad - bc \neq 0$. Rumus $ad - bc$ disebut sebagai rumus mencari determinan dari matriks umum A yang berordo 2×2 . Determinan matriks A dinyatakan dengan $\det(A)$. Dengan menggunakan notasi ini, invers dari A dapat dicari menggunakan rumus berikut ini

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

3.1 Permutasi

Selanjutnya akan dipelajari konsep suatu determinan matriks-matriks yang berordo lebih tinggi. Namun sebelumnya akan diperlihatkan bagaimana permutasi mempunyai peranan penting dalam mencari determinan suatu matriks.

Definisi 3.1:

Permutasi dari suatu himpunan bilangan bulat adalah suatu susunan bilangan dari semua anggota himpunan tersebut dalam suatu urutan tanpa penghilangan atau pengulangan.

Contoh 3.1


1. Permutasi yang dapat dibuat dari himpunan bilangan bulat $\{1, 2\}$ adalah; $(1, 2)$ dan $(2, 1)$
2. Permutasi yang dapat dibuat dari himpunan bilangan bulat $\{1, 2, 3\}$ yaitu;

$(1, 2, 3)$	$(1, 3, 2)$	$(2, 1, 3)$
$(2, 3, 1)$	$(3, 1, 2)$	$(3, 2, 1)$

Jadi ada enam permutasi yang berbeda dari himpunan bilangan bulat $\{1, 2, 3\}$. Permutasi suatu himpunan bilangan bulat dapat diperoleh dengan mudah dengan menggunakan metode pohon permutasi.

Contoh 3.2

Daftarkan semua permutasi dari himpunan bilangan bulat $\{1, 2, 3\}$ menggunakan diagram permutasi!



Gambar 3.1

Perhatikan diagram permutasi pada gambar 3.1, tiga kotak paling atas mewakili pilihan-pilihan yang mungkin untuk angka urutan pertama pada permutasi. Setiap kotak pada bagian paling atas memiliki dua kotak cabang, dua kotak ini mewakili pilihan-pilihan yang mungkin untuk angka urutan kedua pada permutasi. Akhirnya, kotak paling bawah adalah satu kotak cabang dari masing-masing dua kotak cabang sebelumnya, mewakili satu-satunya pilihan untuk angka urutan ketiga pada permutasi. Permutasi yang berbeda diperoleh dengan mengikuti arah anak panah pada diagram permutasi. Sehingga daftar permutasi yang berbeda dan sistematis dari himpunan bilangan bulat $\{1, 2, 3\}$ adalah $(1, 2, 3)$; $(1, 3, 2)$; $(2, 1, 3)$; $(2, 3, 1)$; $(3, 1, 2)$; dan $(3, 2, 1)$.

Secara umum, himpunan $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ akan mempunyai $n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1 = n!$ permutasi yang

berbeda. Jadi banyaknya permutasi yang berbeda untuk himpunan $\{1,2,3,4\}$ ada $4! = 24$ permutasi.

Permutasi umum dari himpunan $\{1,2,3,\dots,n\}$ dinyatakan dengan menuliskan $(j_1, j_2, j_3, \dots, j_n)$; j_1 adalah bilangan bulat pertama dalam permutasi, j_2 adalah bilangan bulat urutan kedua dan seterusnya.

Apabila suatu bilangan bulat yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam suatu permutasi $(j_1, j_2, j_3, \dots, j_n)$, maka terjadi suatu pembalikan (*inversion*) permutasi tersebut.

Contoh 3.3

Periksalah permutasi-permutasi berikut yang di dalamnya terjadi pembalikan!

- $(1,3,2,4)$; terjadi pembalikan pada bilangan urutan kedua. Karena bilangan 3 mendahului bilangan 2.
- $(2,3,4,1)$; terjadi tiga kali pembalikan, yaitu pada bilangan urutan pertama, urutan ke-dua dan urutan ketiga. Karena bilangan 2 mendahului 1, 3 mendahului 1 dan bilangan 4 juga mendahului 1.
- $(5,4,3,2,1)$; terjadi lima kali pembalikan.
- $(1,2,3,4,5,6)$; tidak terjadi pembalikan dalam permutasi ini.

Total jumlah pembalikan yang terjadi dalam suatu permutasi bisa didapatkan dengan cara;

- Periksa bilangan setelah j_1 , kemudian cari banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil dari j_1 dalam permutasi tersebut

- Selanjutnya, periksa lagi bilangan setelah j_2 , kemudian tentukan banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil dari j_2 dalam permutasi tersebut.
- Teruskan proses menghitung ini untuk $j_3, \dots, j_{n-1}$. Jumlah dari banyaknya bilangan yang lebih kecil dari suatu bilangan urutan tertentu adalah jumlah pembalikan yang terjadi pada suatu permutasi.

Contoh 3.4

Tentukan jumlah pembalikan yang terjadi pada permutasi contoh 3.3

a. $(1,3,2,4)$

- Pada bilangan urutan pertama, tidak ada bilangan yang lebih kecil setelah bilangan 1. Berarti 0 (nol) pembalikan.
- Pada bilangan urutan ke-dua, terdapat satu bilangan yang lebih kecil setelah bilangan 3. Berarti 1 (satu) pembalikan.
- Pada bilangan urutan ke-tiga, tidak ada bilangan yang lebih kecil setelah bilangan 4. Berarti 0 (nol) pembalikan.

Sehingga jumlah pembalikan yang terjadi pada permutasi $(1,3,2,4)$ adalah $0+1+0=1$

b. $(2,3,4,1)$

Jumlah pembalikan yang terjadi adalah $1+1+1=3$.

c. $(5,4,3,2,1)$

Jumlah pembalikan yang terjadi adalah $4+3+2+1=10$.

d. $(1,2,3,4,5,6)$

Jumlah pembalikan yang terjadi adalah
 $0+0+0+0+0=0$

Definisi 2.2:

Suatu permutasi disebut **genap** jika total jumlah pembalikan merupakan suatu bilangan bulat genap dan disebut **ganjil** jika total jumlah pembalikan merupakan suatu bilangan bulat ganjil.

Contoh 3.5

Klasifikasikan permutasi dari Contoh 3.4 sebagai permutasi genap atau ganjil!

- $(1,3,2,4)$; permutasi ganjil, jumlah pembalikan adalah 1.
- $(2,3,4,1)$ permutasi ganjil, jumlah pembalikan adalah 3.
- $(5,4,3,2,1)$ permutasi genap, jumlah pembalikan adalah 10.
- $(1,2,3,4,5,6)$ permutasi genap, jumlah pembalikan adalah 0.

Latihan 3.1

- Carilah banyaknya pembalikan dalam setiap permutasi dari $\{1,2,3,4,5,6,7\}$
 - $(2,1,3,5,6,7,4)$
 - $(3,4,2,1,5,7,6)$
 - $(7,1,2,6,5,3,4)$
 - $(4,5,3,6,2,7,1)$
- Klasifikasikan setiap permutasi dalam latihan 3.1. no.1 sebagai genap atau ganjil.

3.2 Definisi Sebuah Determinan.

Definisi 3.3:

Anggap A adalah suatu matriks bujur sangkar. Fungsi *determinan* dinyatakan dengan $\det$, dan kita mendefinisikan $\det(A)$ sebagai jumlah semua *hasil kali dasar bertanda* dari A . Angka $\det(A)$ disebut *determinan A*

Suatu *hasil kali dasar* dari suatu matriks A merupakan hasil kali dari n anggota A , yang dua di antaranya tidak ada yang berasal dari baris atau kolom yang sama.

Contoh 3.6:

Tentukan semua hasil kali dasar dari matriks umum $A_{2 \times 2}$ dan matriks umum $B_{3 \times 3}$

Penyelesaian;

Matriks umum untuk $A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ dan matriks umum

untuk $B_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$

Setiap hasil kali dasar pada $A_{2 \times 2}$ mempunyai dua faktor, dan karena masing-masing faktor berasal dari suatu baris yang berbeda, maka suatu hasil kali dasar bisa ditulis dalam bentuk;

$$a_{1...} a_{2...}$$

dimana tempat yang kosong (titik-titik) menyatakan angka kolom. Karena tidak ada dua faktor dalam hasil kali tersebut yang berasal dari kolom yang sama, maka angka-angka

kolom (tempat kosong) diisi berturut-turut 1 dan 2 atau berturut 2 dan 1. Sehingga hasil kali dasar matriks $A_{2 \times 2}$ yang mungkin adalah;

$$a_{11}a_{22} \text{ dan } a_{12}a_{21}$$

Setiap hasil kali dasar $B_{3 \times 3}$ mempunyai tiga faktor, masing-masing faktor berasal dari baris yang berbeda, maka suatu hasil kali dasar $B_{3 \times 3}$ bisa ditulis dalam bentuk

$$b_{1...}b_{2...}b_{3...}$$

Karena tidak ada dua faktor dalam hasil kali dasar tersebut yang berasal dari kolom yang sama, maka angka-angka kolom tidak berulang; akibatnya, angka-angka ini harus membentuk suatu permutasi dari himpunan $\{1,2,3\}$. Jadi, hasil kali dasar $B_{3 \times 3}$ dapat diperoleh dengan mengisi tempat kosong (angka kolom) dengan hasil permutasi himpunan $\{1,2,3\}$, menghasilkan daftar hasil kali dasar berikut ini.

$$\begin{array}{ccc} b_{11}b_{22}b_{33} & b_{11}b_{23}b_{32} & b_{12}b_{21}b_{33} \\ b_{12}b_{23}b_{31} & b_{13}b_{21}b_{32} & b_{13}b_{22}b_{31} \end{array}$$

Suatu *hasil kali dasar bertanda* dari A merupakan suatu hasil kali dasar yang dikalikan dengan +1 atau -1. Kita kalikan +1 jika permutasi untuk angka kolom adalah suatu permutasi genap dan dikalikan dengan -1 jika permutasinya ganjil.

Contoh 3.7

Tentukan semua hasil kali dasar bertanda dari matriks umum $B_{3 \times 3}$ dari Contoh 3.6!

Hasil kali dasar	Permutasi angka kolom	Hasil kali dasar bertanda
$b_{11}b_{22}b_{33}$	(1,2,3); permutasi genap	$b_{11}b_{22}b_{33}$
$b_{11}b_{23}b_{32}$	(1,3,2); permutasi ganjil	$-b_{11}b_{23}b_{32}$
$b_{12}b_{21}b_{33}$	(2,1,3); permutasi ganjil	$-b_{12}b_{21}b_{33}$

$b_{13}b_{21}b_{32}$	(2,3,1); permutasi genap	$b_{12}b_{23}b_{31}$
$b_{13}b_{22}b_{31}$	(3,1,2); permutasi genap	$b_{13}b_{21}b_{32}$
	(3,2,1); permutasi ganjil	$-b_{13}b_{22}b_{31}$

Berdasarkan definisi 3.3 diperoleh determinan 2×2 dan 3×3 yaitu;

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(B) = \det \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} = b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33}$$


Latihan 3.2

1. Tentukan semua hasil kali dasar bertanda dari matriks umum $B_{4 \times 4}$, kemudian tentukan determinannya!
2. Gunakan hasil pada latihan 3.2 nomor 1 untuk menentukan determinan matriks berikut:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & -2 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

3.3 Menghitung Determinan Matriks

Agar rumus yang dihasilkan dari Contoh 3.7 dapat mudah diingat, maka kita dapat membuat jembatan keledai atau lebih dikenal dengan nama *Metode Sarrus* pada matriks 2×2 dan 3×3 seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2

Rumus untuk matriks 2×2 diperoleh dengan mengalikan elemen matriks yang dilalui oleh tanda panah ke kanan kemudian mengurangkannya dengan hasil kali elemen matriks yang dilalui oleh tanda panah ke kiri.

Sedangkan untuk matriks 3×3 diperoleh dengan menulis ulang kolom pertama dan kedua pada sebelah kanan matriks, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2b. Determinan diperoleh dengan menjumlahkan hasil kali elemen matriks yang dilalui tanda panah ke kanan dan mengurangkan hasil kali elemen matriks yang dilalui oleh tanda panah ke kiri.

Namun metode ini tidak dapat digunakan untuk mencari determinan matriks 4×4 atau ordo yang lebih tinggi. Oleh karena itu selanjutnya akan di bahas metode-metode lain yang dapat digunakan untuk matriks berordo 4×4 atau yang lebih tinggi.

Determinan suatu matriks bisa dihitung dengan mereduksi matriks tersebut menjadi matriks bentuk eselon baris atau matriks-matriks khusus. Oleh karena itu diperlukan beberapa teorema-teorema tentang determinan.

Teorema 3.1:

Anggap A adalah suatu matriks bujur sangkar.

(a) Jika A mempunyai sebuah baris nol atau sebuah kolom nol, maka $\det(A) = 0$

(b) $\det(A) = \det(A^T)$

Setelah mempelajari dan memahami Definisi 3.3 dan memperhatikan Contoh 3.6, kita dapat mengatakan bahwa setiap hasil kali dasar bertanda dari suatu matriks bujursangkar mempunyai satu faktor dari masing-masing baris dan satu faktor dari masing-masing kolom. Sehingga apabila matriks A pada Teorema 3.1 mempunyai suatu baris yang seluruhnya nol atau kolom yang seluruhnya nol maka setiap hasil kali dasar bertanda untuk matriks A adalah sama dengan nol. Karena $\det(A)$ merupakan jumlah dari hasil kali dasar bertanda, akibatnya $\det(A) = 0$. Begitu pula dengan $\det(A) = \det(A^T)$, hal ini dapat terjadi karena telah kita ketahui bahwa suatu hasil kali dasar bertanda mempunyai satu faktor dari setiap baris dan setiap kolom. Himpunan hasil kali dasar bertanda A persis sama dengan himpunan hasil kali dasar bertanda A^T .

Teorema 3.1 (b), memberikan gambaran yang jelas tentang pernyataan determinan yang memuat kata baris dapat diganti dengan kata kolom, karena kita hanya mentranspos matriks untuk mengkonversi pernyataan kolom menjadi pernyataan baris.

3.3.1 Determinan matriks-matriks segitiga

Menghitung determinan suatu matriks segitiga dapat dilakukan dengan mudah walaupun berordo tinggi. Teorema berikut memperlihatkan cara menghitung determinan suatu matriks segitiga.

Teorema 3.2:

Jika A adalah suatu matriks segitiga yang bujursangkar (segitiga atas, segitiga bawah, atau matriks diagonal), maka $\det(A)$ adalah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utamanya.

Agar notasi yang digunakan tidak terlalu banyak, kita akan membuktikan hasil untuk matriks segitiga bawah 4×4 sebagai berikut;

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

Perhatikan matriks segitiga bawah $A_{4 \times 4}$. Suatu hasil kali dasar umum untuk matriks $A_{4 \times 4}$ adalah; $a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$. Karena $a_{12} = a_{13} = a_{14} = 0$, maka kita harus mempunyai $j_1 = 1$ agar diperoleh suatu hasil kali dasar tak-nol. Apabila $j_1 = 1$, maka kita harus mempunyai $j_2 \neq 1$, karena tidak ada dua faktor yang berasal dari kolom yang sama.

Lebih jauh lagi, karena $a_{23} = a_{24} = 0$, kita harus mempunyai $j_2 = 2$ agar kita mempunyai suatu hasil kali dasar tak-nol. Apabila cara ini diteruskan, maka akan diperoleh bahwa $j_3 = 3$ dan $j_4 = 4$. Substitusikan nilai j_1, j_2, j_3 , dan j_4 pada hasil kali dasar umum untuk memperoleh $a_{11} a_{22} a_{33} a_{44}$, permutasi pada angka kolom hasil kali dasar ini adalah permutasi genap sehingga harus dikalikan dengan $+1$. Jadi diperoleh;

$$\det(A) = a_{11} a_{22} a_{33} a_{44}$$
Contoh 2.8

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 7 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & 8 & 5 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 8 & 7 & 9 & 1 & 0 \\ 8 & 9 & 6 & 4 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times 4 \times 1 \times 2 \times 1 \times 2 = 32$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 8 & 9 & 8 \\ 0 & 2 & 9 & 7 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times 3 \times 5 \times 2 \times 4 = 120$$

3.3.2 Determinan dan Operasi Baris Elementer

Teorema berikut menunjukkan pengaruh suatu operasi baris elementer terhadap nilai determinan suatu matriks.

Teorema 3.3:

Anggap A adalah suatu matriks bujursangkar.

- (a) Jika B adalah matriks yang diperoleh dari hasil kali sebarang skalar k dengan salah satu baris atau kolom dari matriks A , maka $\det(B) = k \det(A)$.
- (b) Jika B adalah matriks yang diperoleh dengan mempertukarkan dua baris atau dua kolom pada matriks A , maka $\det(B) = -\det(A)$.
- (c) Jika B adalah matriks yang diperoleh dari penggandaan suatu baris kemudian ditambahkan pada baris lainnya atau menggandakan suatu kolom kemudian ditambahkan pada kolom lainnya, maka $\det(B) = \det(A)$.

Ilustrasi berikut ini akan memberikan kita gambaran tentang pengaruh operasi baris elementer terhadap determinan suatu matriks. Ilustrasi yang diberikan juga berlaku untuk matriks yang lebih tinggi walaupun contoh yang diberikan hanya untuk matriks 3×3 .

- Matriks B adalah baris pertama matriks A dikalikan dengan sebarang skalar k .

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} k \cdot a_{11} & k \cdot a_{12} & k \cdot a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(B) &= \begin{vmatrix} k \cdot a_{11} & k \cdot a_{12} & k \cdot a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= k \cdot a_{11} a_{22} a_{33} + k \cdot a_{12} a_{23} a_{31} + k \cdot a_{13} a_{21} a_{32} \\ &\quad - k \cdot a_{13} a_{22} a_{31} - k \cdot a_{11} a_{23} a_{32} - k \cdot a_{12} a_{21} a_{33} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= k(a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{13} a_{22} a_{31} \\ &\quad - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33}) \\ &= k \cdot \det(A) \end{aligned}$$

- Matriks B adalah baris pertama matriks A ditukar dengan baris kedua matriks A .

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(B) &= \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{21} a_{12} a_{33} + a_{22} a_{13} a_{31} + a_{23} a_{11} a_{32} \\ &\quad - a_{23} a_{12} a_{31} - a_{21} a_{13} a_{32} - a_{22} a_{11} a_{33} \\ &= -\det(A) \end{aligned}$$

- Matriks B adalah kelipatan baris kedua matriks A ditambahkan ke baris pertama matriks A .

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} a_{11} + ka_{21} & a_{12} + ka_{22} & a_{13} + ka_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \\ \det(B) &= \begin{vmatrix} a_{11} + ka_{21} & a_{12} + ka_{22} & a_{13} + ka_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= (a_{11} + ka_{21}) a_{22} a_{33} + (a_{12} + ka_{22}) a_{23} a_{31} + (a_{13} + ka_{23}) a_{21} a_{32} \\ &\quad - (a_{13} + ka_{23}) a_{22} a_{31} - (a_{11} + ka_{21}) a_{23} a_{32} - (a_{12} + ka_{22}) a_{21} a_{33} \\ &= \det(A) + k(a_{21} a_{22} a_{33} + a_{22} a_{23} a_{31} + a_{23} a_{21} a_{32} - a_{23} a_{22} a_{31} \\ &\quad - a_{21} a_{23} a_{32} - a_{22} a_{21} a_{33}) \end{aligned}$$

$$= \det(A) + 0$$

$$= \det(A)$$

Karena suatu matriks dasar diperoleh dari suatu operasi baris elementer tunggal maka Teorema 3.3 juga berlaku untuk matriks-matriks dasar.

Contoh 3.9:

Determinan matriks-matriks dasar berikut ini dapat dihitung dengan menerapkan Teorema 3.3.

- (a) Baris ketiga pada I_4 dikalikan dengan 5 diperoleh matriks dasar;

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ maka } \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 5$$

- (b) Dua baris pada I_4 dipertukarkan, baris pertama ditukar dengan baris ketiga diperoleh matriks dasar;

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ maka } \det \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = -1$$

- (c) 3 kali baris keempat dari I_4 ditambahkan pada baris kedua, diperoleh matriks dasar;

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ maka } \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 1$$

Tinjau kembali Teorema 3.1 (a) untuk memudahkan kita mencari determinan suatu matriks bujursangkar yang mempunyai dua baris atau dua kolom yang proporsional.

Teorema 3.4:

Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar dengan dua baris atau dua kolom yang proporsional, maka $\det(A) = 0$

Jika suatu baris merupakan kelipatan dari baris lainnya pada matriks bujur sangkar, maka dengan mudah dapat diperoleh baris yang seluruhnya terdiri dari nol. Hal ini berlaku pula pada kolom. Menambahkan penggandaan salah satu baris ke baris lain atau suatu kolom ke kolom lainnya telah dijamin oleh teorema 2.3 (c) tidak mengubah determinan suatu matriks. Jadi suatu matriks bujur sangkar yang mempunyai baris atau kolom yang proporsional mempunyai determinan nol, karena kita dapat membuat satu baris atau satu kolom yang seluruhnya terdiri dari nol.

Contoh 3.10

Berikut ini adalah determinan matriks-matriks yang proporsional:

- (a) Baris ketiga merupakan kelipatan dari baris pertama, sehingga menambahkan -2 kali baris pertama pada baris ketiga akan membuat baris ketiga menjadi baris nol.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 9 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 6 \\ 7 & 5 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 9 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 5 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

- (b) Kolom kedua merupakan kelipatan dari kolom keempat, sehingga menambahkan -3 kali kolom keempat pada kolom kedua akan membuat kolom kedua menjadi kolom nol.

$$\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 & 2 \\ 9 & -3 & 5 & -1 \\ 2 & 9 & 2 & 3 \\ 7 & 12 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 9 & 0 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 2 & 3 \\ 7 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

3.3.3 Menghitung Determinan dengan Reduksi Baris atau Reduksi kolom.

Mereduksi matriks menjadi suatu matriks segitiga atas dengan operasi baris elementer dan menerapkan teorema 3.3 dan teorema 3.2 dapat memudahkan kita mencari determinan suatu matriks. Metode ini menghindari perhitungan yang panjang apabila menggunakan definisi determinan secara langsung. Teorema 3.3 akan menghubungkan determinan matriks segitiga yang diperoleh dengan matriks aslinya (sebelum direduksi).

Metode ini sangat cocok apabila menggunakan komputer karena metode ini sistematis dan bisa deprogram dengan mudah. Berikut ini diberikan contoh agar mudah memahami metode ini.

Contoh 2.11

Hitunglah determinan matriks-matriks berikut ini;

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \end{bmatrix}$

Tambahkan baris kedua dengan -5 kali baris pertama matriks A , kemudian gunakan teorema 3.3 (c) untuk memperoleh

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -6 & -12 \\ 2 & 4 & 7 \end{vmatrix}$$

Tambahkan baris ketiga dengan -2 kali baris pertama matriks baru, kemudian gunakan teorema 3.3 (c) untuk memperoleh

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -6 & -12 \\ 2 & 4 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -6 & -12 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Kalikan baris kedua dengan $-\frac{1}{6}$ pada matriks baru, kemudian gunakan teorema 3.3 (a) untuk memperoleh

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -6 & -12 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (-6) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Jadi $\det(A) = -6$

Perhatikan bahwa, sebenarnya kita tidak perlu sampai pada langkah terakhir (semua unsur diagonal utama adalah satu), karena pada langkah sebelumnya determinan dapat diperoleh dengan mudah.

(b) $M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned}
 \det(M) &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \\
 &= - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} \\
 &= - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} \\
 &= - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa kita tidak perlu membuat semua unsur diagonal utama adalah satu untuk memperoleh $\det(M) = -6$

Selain operasi baris, operasi terhadap kolom dapat pula menjadi pertimbangan kita agar dapat memperpendek perhitungan. Berikut contoh kasus matriks yang cocok menggunakan operasi kolom.

Contoh 2.11

Hitunglah determinan $H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \\ 2 & 9 & -2 & -10 \\ 7 & -5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

Perhatikan matriks H , unsur-unsur diatas diagonal utamanya terdapat empat angka nol. Selain itu, dua unsur pada kolom keempat merupakan kelipatan dari dua unsur pada kolom pertama yang bersesuaian. Jadi, sebaiknya kita gunakan operasi kolom untuk memudahkan perhitungan. Menambahkan 5 kali kolom pertama ke kolom keempat pada matriks H akan diperoleh matriks segitiga bawah berikut ini;

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \\ 2 & 9 & -2 & 0 \\ 7 & -5 & 4 & 38 \end{bmatrix}$$

Maka $\det(H) = (1)(8)(-2)(38) = -608$

3.3.4 Menghitung Determinan dengan perluasan kofaktor.

Perluasan kofaktor merupakan suatu metode yang penting dan berguna untuk menghitung determinan suatu matriks apabila dilakukan secara manual.

Definisi 3.4:

Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar, maka **minor** anggota a_{ij} dinyatakan oleh M_{ij} dan didefinisikan sebagai determinan sub-matriks yang masih tersisa setelah baris ke- i dan kolom ke- j dihilangkan dari A . Bilangan $(-1)^{i+j} M_{ij}$ dinyatakan oleh C_{ij} dan disebut **kofaktor** anggota a_{ij} .

Contoh 2.12

$$\text{Anggap } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Minor anggota a_{11} adalah; setelah menghapus baris 1 dan kolom 1, diperoleh sub-matriks $\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$, sehingga $M_{11} = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = (5 \times 9) - (6 \times 8) = -3$.

Kofaktor a_{11} adalah;

$$C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = (-1)^2 (-3) = -3$$

Cara yang sama dapat dicari minor anggota a_{23} dan kofaktor anggota a_{23} yaitu ;

$$M_{23} = 8 - 14 = -6 \text{ dan } C_{23} = (-1)^{2+3} (-6) = 6$$

Memperhatikan dua hasil dari contoh 2.12 maka terlihat bahwa perbedaan antara minor dan kofaktor hanya pada tanda. Apabila pangkat bilangan -1 pada rumus mencari kofaktor jumlahnya ganjil maka $C_{ij} = -M_{ij}$, namun apabila pangkat bilangan -1 pada rumus mencari kofaktor jumlahnya genap maka $C_{ij} = M_{ij}$. Oleh karena pangkat bilangan -1 tersebut ditentukan oleh baris ke- i dan kolom ke-

j , maka secara cepat tanda kofaktor dapat ditentukan menggunakan pola papan periksa berikut ini;

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - & \dots \\ - & + & - & + & \dots \\ + & - & + & - & \dots \\ - & + & - & + & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

Menggunakan "matriks" papan periksa ini maka dapat ditulis secara umum; $C_{11} = M_{11}$, $C_{21} = -M_{21}$, $C_{12} = -M_{12}$, $C_{24} = M_{24}$ dan sebagainya.

Ingat bahwa determinan matriks umum $A_{3 \times 3}$ dapat ditulis ulang dalam bentuk;

$$\det(A) = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{21}(a_{13}a_{32} - a_{12}a_{33}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22})$$

Perhatikan pernyataan yang di dalam kurung adalah kofaktor C_{11} , C_{21} dan C_{31} . Artinya determinan matriks A bisa dihitung dengan mengalikan unsur-unsur pada kolom pertama matriks A dengan kofaktornya dan menambahkan hasil kali yang didapatkan. Perluasan kofaktor ini disebut sebagai perluasan kofaktor di sepanjang kolom pertama.

Teorema 3.5:

Determinan suatu matriks $A_{n \times n}$ bisa dihitung dengan mengalikan anggota-anggota pada sebarang baris atau sebarang kolom dengan kofaktornya dan menjumlahkan hasil kali yang didapatkan; yaitu untuk setiap $1 \leq i \leq n$ dan $1 \leq j \leq n$,

$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \dots + a_{nj}C_{nj}; \text{ disebut sebagai}$$

perluasan kofaktor disepanjang kolom ke- j

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \dots + a_{in}C_{in}; \text{ disebut sebagai}$$

perluasan kofaktor disepanjang baris ke- i

Contoh 2.12:

Missal $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$

➤ $\det(A)$ dengan perluasan kofaktor sepanjang baris pertama adalah;

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} + 0 = -1$$

$\det(A)$ dengan perluasan kofaktor sepanjang kolom pertama adalah;

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 3(-4) - (-2)(-2) + 5 \cdot 3 = -1 \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa perluasan kofaktor disepanjang baris pertama melibatkan lebih sedikit perhitungan karena $a_{13} = 0$ maka tidak perlu menghitung C_{13} .

Jadi, strategi yang baik saat menggunakan perluasan kofaktor adalah memilih baris atau kolom yang mempunyai nilai nol paling banyak. Namun apabila unsur-unsur matriks tidak terdapat bilangan nol, maka kita dapat melakukan operasi baris atau kolom sebelum melakukan perluasan kofaktor. Operasi baris atau kolom berguna untuk membuat beberapa unsur pada baris tertentu atau kolom tertentu menjadi nol.

Contoh 2.13

Hitung!

$$\det \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 4 & 2 & -3 \\ 4 & 1 & -1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & -3 & -2 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

Operasi baris yang dilakukan adalah menambahkan kelipatan yang cocok dari baris keempat ke baris-baris yang lain. Berdasarkan teorema 2.3 (c) berlaku kesamaan berikut;

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 4 & 2 & -3 \\ 4 & 1 & -1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & -3 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 8 & 8 & -8 & -4 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 6 & -4 & -7 \\ 0 & 9 & 3 & -10 & -5 \\ -1 & 2 & 1 & -3 & -2 \end{vmatrix}$$

ekspansi kofaktor di sepanjang kolom pertama untuk memperoleh

$$= - \begin{vmatrix} 8 & 8 & -8 & -4 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 3 & 6 & -4 & -7 \\ 9 & 3 & -10 & -5 \end{vmatrix}$$

menambahkan kelipatan yang cocok dari baris kedua ke baris-baris yang lain, kemudian gunakan teorema 2.3 (c) untuk memperoleh;

$$= - \begin{vmatrix} 0 & -26 & -8 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & -4 & -4 \\ 0 & -15 & 2 & 16 \end{vmatrix}$$

ekspansi kofaktor di sepanjang kolom pertama memperoleh;

$$= \begin{vmatrix} -26 & -8 & 4 \\ -3 & -4 & -4 \\ -15 & 2 & 16 \end{vmatrix}$$

menambahkan kelipatan yang cocok dari baris kedua ke baris pertama dan baris ketiga, kemudian gunakan teorema 3.3 (c) untuk memperoleh ;

$$= \begin{vmatrix} -29 & -12 & 0 \\ -3 & -4 & -4 \\ -27 & 14 & 0 \end{vmatrix}$$

ekspansi kofaktor di sepanjang kolom ketiga untuk memperoleh;

$$\begin{aligned} &= 4 \begin{vmatrix} -29 & -12 \\ -27 & 14 \end{vmatrix} \\ &= 4(406 - 324) \\ &= 328 \end{aligned}$$

Latihan 3.3

1. Hitunglah determinan matriks yang diberikan dengan mereduksi matriks berikut menjadi bentuk eselon baris.

a). $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -2 & 6 & 9 \\ 1 & 1 & 7 \end{bmatrix}$

b). $\begin{bmatrix} 2 & -5 & 7 & 3 \\ 0 & 3 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & 8 & 1 \\ -1 & 6 & -2 & -1 \end{bmatrix}$

2. Hitunglah determinan matriks berikut ini

$$K = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

- a). Carilah semua minor dan semua kofaktor untuk matriks K
b). Gunakan ekspansi kofaktor sepanjang sebuah baris atau kolom untuk menentukan $\det(K)$

3.4 Determinan Pada Rumus Invers Matriks dan Aturan Cramer

Keterampilan mencari determinan suatu matriks sangat berguna untuk mencari invers suatu matriks dan penyelesaian SPL menggunakan *aturan cramer*.

3.4.1 Rumus untuk Invers Matriks

Rumus untuk mencari invers suatu matriks dinyatakan dalam teorema berikut ini;

Teorema 3.6:

Jika A adalah suatu matriks yang dapat dibalik, maka

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

Agar rumus ini dapat dipakai, maka diperlukan keterampilan mencari determinan dan adjoint suatu matriks. Oleh karena kita telah mempelajari mencari determinan dengan berbagai metode, maka berikut ini disajikan bahasan tentang adjoint suatu matriks.

Definisi 3.5:

Jika A adalah sebarang matriks $n \times n$ dan C_{ij} adalah kofaktor dari a_{ij} , maka matriks

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

Disebut matriks kofaktor dari A . Transpos dari matriks ini disebut **adjoin** A dan dinyatakan dengan $\text{adj}(A)$

Contoh 2.13

Gunakan rumus pada Teorema 3.6 untuk mencari invers

$$\text{dari } M = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & -2 \\ 3 & -2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Penyelesaian;

$\det(M) = 13$ dan kofaktor dari M adalah;

$$C_{11} = 20 - 4 = 16$$

$$C_{12} = -(5 - (-6)) = -11$$

$$C_{13} = -2 - 12 = -14$$

$$C_{21} = -(15 - 2) = -13$$

$$C_{22} = 10 - (-3) = 13$$

$$C_{23} = -(-4 - 9) = 13$$

$$C_{31} = -6 - (-4) = -2$$

$$C_{32} = -(-4 - (-1)) = 3$$

$$C_{33} = 8 - 3 = 5$$

$$\text{Jadi matriks kofaktornya adalah } \begin{bmatrix} 16 & -11 & -14 \\ -13 & 13 & 13 \\ -2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\text{dan adjoin } M \text{ adalah } \begin{bmatrix} 16 & -13 & -2 \\ -11 & 13 & 3 \\ -14 & 13 & 5 \end{bmatrix}$$

Invers matriks M adalah;

$$\begin{aligned} M^{-1} &= \frac{1}{\det(M)} \text{adj}(M) = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 16 & -13 & -2 \\ -11 & 13 & 3 \\ -14 & 13 & 5 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{16}{13} & -1 & -\frac{2}{13} \\ -\frac{11}{13} & 1 & \frac{3}{13} \\ -\frac{14}{13} & 1 & \frac{5}{13} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3.4.2 Aturan Cramer

Keterampilan mencari determinan dapat pula digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tertentu. Berikut adalah rumus mencari penyelesaian SPL yang memerlukan keterampilan mencari determinan, rumus ini dikenal sebagai Aturan Cramer.

Teorema 3.7:

Jika $Ax = b$ merupakan suatu sistem n persamaan linear dalam n peubah sedemikian sehingga $\det(A) \neq 0$, maka sistem tersebut mempunyai suatu penyelesaian mempunyai tepat satu solusi yaitu;

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)}$$

Dimana A_j adalah matriks yang diperoleh dengan menggantikan anggota-anggota pada kolom ke- j dari matriks koefisien A dengan anggota-anggota pada matriks

$$\text{konstanta } b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Contoh 2.13:

Misalkan SPL;

$$\begin{aligned} x_1 + \quad + 2x_3 &= 6 \\ -3x_1 + 4x_2 + 6x_3 &= 30 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 8 \end{aligned}$$

Matriks koefisien yang bersesuaian dengan SPL ini adalah;

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Matriks konstantanya adalah;

$$b = \begin{bmatrix} 6 \\ 30 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Matriks A_1 adalah matriks yang diperoleh dari mengganti kolom pertama pada matriks A dengan anggota-anggota pada matriks konstanta.

$$A_1 = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 30 & 4 & 6 \\ 8 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

A_2 dan A_3 masing-masing diperoleh dari mengganti kolom kedua pada A dan kolom ketiga pada A dengan matriks b .

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 \\ -3 & 30 & 6 \\ -1 & 8 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ -3 & 4 & 30 \\ -1 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

Sehingga diperoleh solusi;

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = -\frac{10}{11}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{18}{11}, \quad x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = \frac{38}{11}$$

Latihan 3.4

1. Carilah invers matriks berikut ini dengan menggunakan Teorema 3.6

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & 3 & 1 \\ 6 & 14 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

2. Gunakan aturan Cramer untuk mencari z , x , y , dan w .

$$2x - y + z - 4w = -32$$

$$7x + 2y + 9z - w = 14$$

$$3x - y + z + w = 11$$

$$x + y - 4z - 2w = -4$$

BAB 4 VEKTOR DALAM RUANG BERDIMENSI-2 DAN RUANG BERDIMENSI-3

Banyak besaran fisika, seperti luas, panjang, massa dan suhu, teruraikan secara lengkap begitu besarnya besaran tersebut diberikan. Besaran-besaran seperti itu disebut **skalar**. Besaran-besaran fisika lainnya disebut **vektor**, tidak secara lengkap terdefinisikan sampai besar dan arahnya ditentukan. Misalnya, pergerakan angin biasanya diuraikan dengan memberikan laju dan arah, katakanlah 20 meter per jam ke arah timur laut. Laju angin dan arah angin bersama-sama membentuk suatu besaran vektor dan disebut sebagai **kecepatan**. Contoh vektor lainnya adalah gaya dan berat.


4.1. Pengertian Vektor

Vektor didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai nilai (besar) dan arah. Berbeda dengan skalar yang hanya mempunyai nilai. Dalam ruang berdimensi-2 dan ruang berdimensi-3 vektor dapat digambarkan sebagai segmen garis berarah (anak panah) dari suatu titik P yang disebut *titik awal* (pangkal anak panah) ke titik lain Q yang disebut sebagai *titik akhir* (ujung anak panah).



Gambar 4.1

Panjang anak panah menunjukkan besar vektor sedangkan kepala anak panah menunjukkan arah. Suatu vektor dinotasikan dengan menggunakan huruf kecil tebal atau huruf dengan anak panah di atasnya, misalnya $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{v}$ atau $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{AB}$ dan sebagainya. Sedangkan skalar adalah bilangan real dan akan dinyatakan dengan huruf kecil miring, misalnya a , p , q dan sebagainya. Gambar 4.2(a) berikut memperlihatkan titik pangkal suatu vektor $\mathbf{v}$ adalah A dan titik ujungnya adalah B , maka dituliskan $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB}$.



Gambar 4.2


Vektor-vektor dikatakan *ekivalen* jika dan hanya jika besar dan arahnya sama walaupun mungkin titik awalnya berbeda dan terletak pada posisi berbeda. Pada Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa $\mathbf{v} = \mathbf{u}$ dan $\mathbf{v} \neq \mathbf{t} \neq \mathbf{w}$. Selanjutnya pada Gambar 4.1(b) vektor $\mathbf{t}$ memiliki besar yang sama dengan vektor $\mathbf{u}$ tetapi arahnya berlawanan, maka $\mathbf{t}$ adalah *negatif dari u*. Jadi $-\mathbf{u}$ didefinisikan sebagai vektor yang besarnya sama dengan $\mathbf{u}$, tetapi arahnya berlawanan dengan arah $\mathbf{u}$.

Selanjutnya ada bagian ini akan dipaparkan definisi tentang jumlah dari dua vektor atau lebih dan perkalian antara skalar dan vektor.

Definisi 4.1:

Jika $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ adalah dua vektor sebarang, maka **jumlah** $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut : Letakkan vektor $\mathbf{w}$ sedemikian sehingga titik pangkalnya bertautan dengan titik ujung $\mathbf{v}$. Vektor $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ disajikan oleh panah dari titik pangkal $\mathbf{v}$ ke titik ujung $\mathbf{w}$.

Secara geometris, definisi 4.1 dapat digambarkan pada Gambar 4.3 (a) sebagai berikut;



Gambar 4.3

Gambar 4.3 (b) menunjukkan bahwa $\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v}$ dan jumlah dua vektor sama dengan diagonal jajaran genjang dimana sisi-sisi jajar genjang dibentuk oleh dua vektor tersebut.

Definisi 4.2:

Jika $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ adalah dua vektor sebarang, maka **selisih** $\mathbf{w}$ dari $\mathbf{v}$ adalah vektor yang ditentukan dengan cara meletakkan titik awal vektor $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ sedemikian sehingga titik awalnya berimpitan, kemudian menghubungkan ujung titik akhirnya dengan arah dari pengurang ke yang dikurangi.


Secara geometris, definisi 4.2 dapat digambarkan pada Gambar 4.4 (a). Sedangkan pada Gambar 4.4 (b) memberi gambaran bahwa kita dapat mendefinisikan

$$v - w = v + (-w)$$

dan dapat ditulis sifat seperti pada Gambar 4.4 (c) bahwa:

$$v + (-v) = 0$$

Suatu vektor yang dijumlahkan dengan negatifnya menghasilkan vektor yang panjangnya.



Gambar 4.4

Vektor yang panjangnya nol disebut vektor nol dan dinyatakan dengan 0 . Suatu vektor nol mempunyai sebarang arah yang sesuai dengan masalah yang sedang dikaji. Sehingga untuk setiap vektor v kita definisikan


$$v + 0 = 0 + v = v$$

Definisi 4.3:

Jika v adalah suatu vektor tak-nol dan k adalah suatu bilangan real tak-nol (skalar), maka *hasil kali* kv didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya $|k|$ kali panjang v . Arah hasil kali kv sama dengan arah v jika $k > 0$ dan berlawanan jika $k < 0$. Kita definisikan $kv = 0$ jika $k = 0$ atau $v = 0$.

Suatu vektor berbentuk kv adalah suatu penggandaan skalar dari v . Gambar 4.5 berikut mengilustrasikan penggandaan skalar suatu vektor dan

hubungan antara beberapa vektor yang sejajar. Vektor-vektor yang merupakan penggandaan skalar satu sama lain adalah vektor-vektor yang sejajar, begitu pula sebaliknya bahwa vektor-vektor tak-nol yang sejajar merupakan penggandaan skalar satu sama lain.



Gambar 4.5

Latihan 4.1


1. Jika diketahui $u = (1, 2, 4)$, $v = (2, -1, 3)$, $w = (4, -2, 6)$
2. Jika $u = (2, 3k, 5)$, $v = (2, 3/2, 5)$, dan $u = v$, tentukan k .

4.2. Vektor dalam Sistem Koordinat

Banyak masalah-masalah fisik dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan vektor diilustrasikan dan disederhanakan dengan menggunakan sistem koordinat kartesian. Untuk itu pada bagian ini vektor-vektor akan ditinjau pada ruang berdimensi-2 (bidang) dan ruang berdimensi-3.

4.2.1. Vektor pada Bidang

Anggaplah v adalah sebarang vektor pada bidang dan asumsikan bahwa v telah diletakkan sehingga titik pangkalnya berada pada titik asal sistem koordinat kartesian, koordinat titik ujung v adalah (v_1, v_2) disebut komponen v , dan dapat kita tulis $v = (v_1, v_2)$.




Gambar 4.6

Pada koordinat kartesian, ekivalensi vektor dapat ditinjau dari komponen vektor-vektor tersebut. Dua vektor, misalnya $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ dan $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$, $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{u}$ dikatakan *ekivalen* jika dan hanya jika $v_1 = u_1$ dan $v_2 = u_2$.

Operasi penjumlahan dan perkalian skalar dengan vektor mudah dilakukan apabila vektor-vektor yang dioperasikan dalam bentuk komponen. Sebagaimana yang diperlihatkan pada Gambar 4.6 (b), jika $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ dan $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$ maka $\mathbf{v} + \mathbf{w} = (v_1 + w_1, v_2 + w_2)$

Jika k adalah sebarang skalar dan $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$, maka berdasarkan Gambar 4.7 dapat ditulis bahwa $k\mathbf{u} = (ku_1, ku_2)$. Karena $\mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{v} + (-1)\mathbf{w}$ maka diperoleh;
 $\mathbf{v} - \mathbf{w} = (v_1 - w_1, v_2 - w_2)$



Gambar 4.7

(a)

Panjang sebuah vektor $\mathbf{c}$ sering dinamakan norma $\mathbf{v}$ dan dinyatakan dengan $\|\mathbf{v}\|$. Norma suatu vektor $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ di ruang berdimensi-2 diperoleh dengan cara menerapkan teorema pythagoras. Sehingga;

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

Sifat-sifat Vektor Pada R^2

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ (sifat Komutatif)
2. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{v} + (\mathbf{u} + \mathbf{w})$ (sifat Asosiatif)
3. $0 + \mathbf{u} = \mathbf{u} + 0 = \mathbf{u}$ (identitas penjumlahan)
4. $-\mathbf{u} + \mathbf{u} = \mathbf{u} + (-\mathbf{u})$ (invers penjumlahan)
5. $k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\mathbf{u} + k\mathbf{v}$ (distribusi terhadap skalar)
6. $(k + l)\mathbf{u} = k\mathbf{u} + l\mathbf{u}$ (dist. terhadap penjum. skalar)
7. $(kl)\mathbf{u} = k(l\mathbf{u})$ (asos. terhdap perka. dua skalar)
8. $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$ (perkalian dengan skalar 1)


Sifat-sifat yang berlaku pada vektor R^2 juga berlaku pada vektor R^3 .

4.2.2. Vektor pada Ruang Berdimensi 3

Pada sistem koordinat kartesian, vektor-vektor pada ruang berdimensi 3 bisa diuraikan dengan tiga bilangan real. Seperti halnya ruang berdimensi-2 R^2 , ruang berdimensi-3 R^3 juga memiliki sistem koordinat siku-siku yaitu sistem koordinat-xyz dengan titik asal $O(0,0,0)$, yang dibangun oleh;

- Sumbu-x yaitu garis tempat semua titik yang mempunyai koordinat $(x, 0, 0)$.
- Sumbu-y yaitu garis tempat semua titik yang mempunyai koordinat $(0, y, 0)$.
- Sumbu-z yaitu garis tempat semua titik yang mempunyai koordinat $(0, 0, z)$.

Berikut adalah gambar koordinat siku-siku pada ruang berdimensi-3



Gambar 4.8

Sistem koordinat kartesian dalam ruang berdimensi 3 mempunyai dua kategori, yaitu *sistem tangan kanan* dan *sistem tangan kiri*. Pada sistem tangan kanan mempunyai sifat yang ditunjukkan oleh suatu sekrup biasa dalam arah positif pada sumbu-z jika sumbu-x diputar 90° ke arah sumbu-y positif. Apabila sekrup diputar ke arah sebaliknya maka disebut sistem tangan kiri. Namun yang akan digunakan adalah sistem tangan kanan.

Apabila suatu vektor misalnya $\mathbf{v}$ ditempatkan pada ruang berdimensi-3 sedemikian sehingga titik pangkalnya ada pada titik asal sistem koordinat siku-siku, maka koordinat ujungnya disebut komponen vektor tersebut dan kita tulis;

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

Jika $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ adalah dua vektor pada ruang berdimensi-3, maka:

- $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ dikatakan ekuivalen jika dan hanya jika $v_1 = w_1$, $v_2 = w_2$ dan $v_3 = w_3$
- $\mathbf{v} + \mathbf{w} = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, v_3 + w_3)$

- $k\mathbf{v} = (kv_1, kv_2, kv_3)$ dengan k adalah sebarang skalar
- Dengan menerapkan teorema Pythagoras diperoleh norma $\mathbf{v}$ adalah $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$

Latihan 4.2

- Jika $\mathbf{u} = (1, 2)$, $\mathbf{v} = (2, -3)$, $\mathbf{w} = (3, 2)$, tentukan vektor $\mathbf{x}$ yang memenuhi $2\mathbf{u} - \mathbf{v} + \mathbf{x} = 7\mathbf{x} + \mathbf{w}$
- Hitunglah jarak antara $P_1 = (2, 3, -2)$ dan $P_2 = (4, 6, 2)$.
- Jika $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ vektor-vektor pada soal 1, hitunglah
 - $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|$
 - $\|2\mathbf{u}\| + \|-3\mathbf{v} + 2\mathbf{w}\|$
 - $2\|\mathbf{u}\| + \|4\mathbf{w}\|$
 - $2\|\mathbf{u} - \mathbf{v} + 4\mathbf{w}\|$

4.3. Hasil Kali Titik dan Proyeksi

Dua vektor tak nol di ruang-2 dan ruang-3, misalkan sudut yang dibentuk oleh dua vektor yang saling bertemu pada satu titik adalah sudut yang terkecil, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.9.




Gambar 4.9

Definisi 4.4:

Jika u dan v vektor pada bidang (ruang-2) atau di ruang (ruang-3) dan θ adalah sudut antara u dan v , maka hasil kali titik (*dot product*) antara u dan v didefinisikan sebagai berikut:

$$u \cdot v = \begin{cases} \|u\| \|v\| \cos \theta, & \text{jika } u \neq 0 \text{ dan } v \neq 0 \\ 0 & \text{jika } u = 0 \text{ dan } v = 0 \end{cases}$$

Misalkan $u = (x_1, y_1, z_1)$ dan $v = (x_2, y_2, z_2)$ adalah dua vektor tak nol. Seperti pada Gambar 4.10 berikut ini



Gambar 4.10

Perhatikan Gambar 4.10 sesuai dengan definisi selisih dua vektor diperoleh $\overrightarrow{PQ} = v - u$.

Dengan menggunakan hukum kosinus di peroleh

$$\|\overrightarrow{PQ}\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\| \|v\| \cos \theta$$

$$\|u\| \|v\| \cos \theta = 1/2 (\|u\|^2 + \|v\|^2 - \|\overrightarrow{PQ}\|^2)$$

$$\|u\| \|v\| \cos \theta = 1/2 (\|u\|^2 + \|v\|^2 - \|v - u\|^2)$$

$$u \cdot v = 1/2 (\|u\|^2 + \|v\|^2 - \|v - u\|^2)$$

Dengan mensubstitusikan

$$\|u\|^2 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 \quad \|v\|^2 = x_2^2 + y_2^2 + z_2^2$$

dan

$$\|v - u\|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2$$

Setelah menyederhanakannya akan kita peroleh

$$u \cdot v = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

Untuk kasus di ruang-2 dengan cara yang serupa didapatkan aturan berikut:

$$u \cdot v = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

Contoh 4.1:

Tentukan hasil-kali titik dari $u = (2, 5, 4)$ dan $v = (-4, -3, 7)$.

Penyelesaian

$$u \cdot v = 2(-4) + 5(-3) + 4(7) = 5$$

Contoh 4.2:

Tentukan kosinus sudut antara $u = (2, 5, 4)$ dan $v = (-4, -3, 7)$.

Penyelesaian

$$\|u\| = \sqrt{2^2 + 5^2 + 4^2} = \sqrt{49}$$

$$\cos \theta = \frac{5}{\sqrt{49} \sqrt{74}} \quad \|v\| = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2 + 7^2} = \sqrt{74}$$

Hasil kali titik dapat digunakan untuk mengetahui sudut antara dua vektor dan hasil kali titik mempunyai hubungan norm yaitu

1. Sudut antara u dan u yakni $\|u\| = (u \cdot u)^{1/2}$
2. Jika u dan v adalah vektor-vektor dan θ adalah sudut antara u dan v , maka


- θ lancip, jika dan hanya jika $u \cdot v > 0$
 θ tumpul, jika dan hanya jika $u \cdot v < 0$
 $\theta = \pi/2$, jika dan hanya jika $u \cdot v = 0$

Sifat-sifat Hasil-Kali Titik

Jika u, v , dan w vektor di R^2 dan R^3 , dan k skalar, maka berlaku:

1. $u \cdot v = v \cdot u$ (komutatif)
2. $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$ (distributif)
3. $k(u \cdot v) = (ku) \cdot v = u \cdot (kv)$ (kehomogenan)
4. $u \cdot u > 0$, jika $u \neq 0$ dan $u \cdot u = 0$, jika $u = 0$ (Kepositifan)

Penguraian satu vektor u menjadi dua vektor dengan ketentuan satu vektor sejajar dengan vektor $a \neq 0$ sedangkan vektor lain tegak lurus dengan vektor a . Perhatikan Gambar 4.11.



Gambar 4.11

Pada Gambar 4.11 terlihat bahwa w_1 sejajar dengan a sedangkan w_2 tegak lurus terhadap a , sehingga

$$w_1 + w_2 = w_1 + (u - w_1) = u$$

vektor w_1 disebut proyeksi orthogonal (tegak lurus) u pada a , dan dilambangkan sebagai

$$\text{proy}_a u$$

sedangkan vektor w_2 disebut komponen vektor u yang orthogonal (tegak lurus) terhadap a yang ditentukan sebagai berikut

$$w_2 = u - w_1 = u - \text{proy}_a u$$

karena $\text{proy}_a u$ tegak lurus pada a , maka

$$\|\text{proy}_a u\| = \|u\| \cos \theta = \|u\| \frac{|u \cdot a|}{\|u\| \|a\|} = \frac{|u \cdot a|}{\|a\|}$$

Karena vektor ini berada (sejajar) dengan vektor a , maka norm ini dikalikan dengan vektor satuan yaitu $\frac{a}{\|a\|}$, sehingga

$$\|\text{proy}_a u\| = \frac{u \cdot a}{\|a\|^2} a$$

Contoh 4.3:

Jika $u = (1, -2, 6)$ dan $v = (-3, 1, 2)$ tentukan $\text{proy}_v u$ dan komponen u yang tegak lurus v .

Penyelesaian:

$$u \cdot v = 1(-3) + (-2)(1) + 6(2) = 7$$

$$v \cdot v = (-3)(-3) + 1(1) + 2(2) = 14$$

sehingga

$$\text{proy}_v u = \frac{u \cdot v}{v \cdot v} v = \frac{7}{14} (-3, 1, 2) = \frac{1}{2} (-3, 1, 2) = \left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)$$

Sedangkan komponen u yang tegak lurus v adalah

$$u - \text{proy}_v u = (1, -2, 6) - \left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1\right) = \left(\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}, 5\right)$$

Latihan 4.3

1. Tentukan kosinus sudut antara vektor u dan v , berikut:
 - a. $u = (2, 1, 4)$, $v = (3, -2, 3)$
 - b. $u = (0, 1, 2)$, $v = (2, -1, 1)$
 - c. $u = (1, 1, 2)$, $v = (0, -1, 2)$
2. Tentukan k sehingga vektor $u = (2, k, 3)$ dan $v = (-2, 1, 3)$ saling tegak lurus
3. Jika $u = (1, 2, 3)$ dan $v = (-2, 1, 1)$ tentukan $\text{proj}_v u$ dan komponen u yang tegak lurus v .

4.4. Hasil-Kali Silang

Ruang vektor diruang-3 sering kali digunakan sebuah vektor yang tegak lurus pada dua vektor yang lain.

Definisi 4.5:

Jika $u = (u_1, u_2, u_3)$ dan $v = (v_1, v_2, v_3)$ adalah vektor di ruang-3, maka hasil-kali silang $u \times v$ adalah vektor yang didefinisikan oleh

$$u \times v = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_1 v_3 - u_3 v_1, u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

atau dalam notasi determinan

$$u \times v = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} k$$

Contoh 4.4:

Jika $u = (1, -2, 6)$ dan $v = (-3, 1, 2)$ tentukan $u \times v$ dan $v \times u$.

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} u \times v &= \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} k \\ &= \begin{vmatrix} -2 & 6 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} k \\ &= (-2 \cdot 2 - 6 \cdot 1, -(1 \cdot 2 - (6 \cdot -3)), 1 \cdot 1 - (-2 \cdot -3)) \\ &= (-10, -20, -5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v \times u &= \begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ u_2 & u_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ u_1 & u_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ u_1 & u_2 \end{vmatrix} k \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} k \\ &= (1 \cdot 6 - 2(-2), -(-3 \cdot 6 - 2 \cdot 1), -3 \cdot -2 - 1 \cdot 1) \\ &= (10, 20, 5) \end{aligned}$$

Sifat-sifat Hasil-Kali Silang

Jika u, v , dan $w \in R^3$, dan k skalar maka berlaku

- a. $(u \times v) \times u = 0$
- b. $(u \times v) \times v = 0$
- c. $\|u \times v\|^2 = \|u\|^2 \|v\|^2 - (u \cdot v)^2$
- d. $u \times v = -(v \times u)$
- e. $u \times u = 0$
- f. $u \times (v + w) = u \times v + u \times w$

- g. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{w} + \mathbf{v} \times \mathbf{w}$
 h. $k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times (k\mathbf{v})$
 i. $\mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$

Identitas Lagrange yaitu $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$ dapat dijabarkan untuk mendapat luas jajaran genjang yang dibentuk oleh $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ sebagai berikut:

Jika θ menyatakan sudut di antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$, maka $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$ sehingga

$$\begin{aligned}\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \cos^2 \theta \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 (1 - \cos^2 \theta) \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \sin^2 \theta\end{aligned}$$

jadi luas jajaran genjang yang dibentuk oleh $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ yaitu

$$\|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$$

Latihan 4.4

1. Misalkan $\mathbf{u} = (1, 2, 1)$, $\mathbf{v} = (2, 3, -1)$, dan $\mathbf{w} = (-2, 1, 1)$
 - a. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$
 - b. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$
 - c. $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$
 - d. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + 2\mathbf{w})$
 - e. $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) - 3\mathbf{w}$

f. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$

2. Tentukan vektor yang orthogonal pada $\mathbf{u} = (1, 2, 1)$ dan sekaligus pada vektor $\mathbf{v} = (-1, 1, -1)$.

BAB 5 RUANG-RUANG VEKTOR

5.1. Ruang-n Euclidis

Definisi 5.1:

Jika n adalah sebuah bilangan bulat positif, maka tupel- n -terorder adalah urutan n bilangan real $(u_1, u_2, \dots, u_n)$. Himpunan semua tupel- n -terorde dinamakan ruang- n dan dinyatakan dengan R^n .

Definisi 5.2:

Vektor nol ialah vektor yang semua entrinya nol, ditulis $0 = (0, 0, \dots, 0)$

5.1.1 Operasi-operasi pada Vektor di R^n

1. Penjumlahan

Misalkan $u, v \in R^n$ dimana, $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, maka penjumlahan didefinisikan sebagai berikut:

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$

Contoh 5.1

Diketahui $u = (3, -2, 4, 5, 6)$ $v = (2, -1, 2, -3, 4)$ dan $w = (4, -1, 2, -4, 1, 5)$. Hitunglah (a) $u + v$ dan (b) $u + w$

Penyelesaian :

$$(a) \ u + v = (3 + 2, (-2) + (-1), 4 + 2, 5 + (-3), 6 + 4)$$

$$=(5, (-3), 6, 2, 10)$$

(b) $u + w =$ tidak terdefinisi karena $u \in R^5$ dan $w \in R^6$

Dua vektor $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ pada R^n dinamakan sama jika $u_1 = v_1, u_2 = v_2, \dots, u_n = v_n$

2. Pengurangan

Misalkan $u \in R^n$ dimana, $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ maka negative (invers aditif) u dinyatakan oleh $-u$ dan didefinisikan sebagai berikut:

$$-u = (-u_1, -u_2, \dots, -u_n)$$

Pengurangan dua vektor R^n didefinisikan sebagai berikut:

$$u - v = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, \dots, u_n - v_n)$$

Contoh 5.2

Diketahui $u = (3, -2, 4, 5, 6)$ $v = (2, -1, 2, -3, 4)$ dan $w = (4, -1, 2, -4, 1, 5)$. Hitunglah $u - v$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} u - v &= (3 - 2, (-2) - (-1), 4 - 2, 5 - (-3), 6 - 4) \\ &= (1, (-1), 2, 8, 2) \end{aligned}$$

3. Perkalian dengan skalar

Misalkan $u \in R^n$ dimana, $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan jika k adalah sebarang skalar, maka perkalian skalar didefinisikan sebagai berikut :

$$ku = (ku_1, ku_2, \dots, ku_n)$$

Contoh 5.3

Jika $u = (4, -5, 1, 4)$ hitunglah $-2u$

Penyelesaian:

$$-2u = (-8, 10, -1, -8)$$

Sifat-sifat dasar vektor dalam operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar di jelaskan dalam teorema berikut:

Teorema 5.1:

Untuk sebarang vektor u, v, w pada R^n dan sebarang skalar k, l pada R ,

- (i) $(u + v) + w = u + (v + w)$
- (ii) $(u + 0) = u$
- (iii) $u + (-u) = 0$
- (iv) $u + v = v + u$
- (v) $k(u + v) = ku + kv$
- (vi) $(k + l)u = ku + lu$
- (vii) $(kl)u = k(lu)$
- (viii) $(kl)u = k(lu)$

4. Hasil Kali Titik (Hasil Kali Dalam Euclides)

Ambil sebarang vektor-vektor ada R^n misalnya,

$$u = (u_1, u_2, \dots, u_n) \text{ dan } v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

Hasilkali titik (*dot product*) atau Hasil Kali Dalam (*inner product*) atau hasil kali skalar dari u dan v dinyatakan dan didefinisikan sebagai berikut

$$u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$$

Dengan kata lain, $u \cdot v$ diperoleh dengan cara mengalikan komponen-komponen yang bersesuaian dan menjumlahkan hasilkali-hasilkali yang diperoleh. Vektor-vektor u dan v dikatakan *orthogonal* (atau saling tegak lurus) jika hasil kali titiknya adalah nol, yaitu jika $u \cdot v = 0$.

Contoh 5.4

(a) Jika diketahui $u = (-2, 4, 5, 6)$, $v = (1, 2, 4, 5)$,
 $w = (4, 2, 7, 3)$

Hitunglah (i) $u \cdot v$ (ii) $v \cdot w$

Penyelesaian :

$$(i) u \cdot v = -2(1) + 4(2) + 5(4) + 6(5) \\ = -2 + 8 + 20 + 30 = 56$$

$$(ii) v \cdot w = 1(4) + 2(2) + 4(7) + 5(3) \\ = 4 + 4 + 28 + 15 = 51$$

(b) Misalkan $u = (1, 2, 3, 4)$ dan $v = (6, k, -8, 2)$, Tentukan k sedemikian rupa sehingga u dan v saling tegak lurus.

Penyelesaian:

$$u \cdot v = 1(6) + 2(k) + 3(-8) + 4(2) = 6 + 2k - 24 + 8 = 2k - 10.$$

Karena u dan v saling tegak lurus maka $u \cdot v = 0$ sehingga diperoleh $2k - 10 = 0$ atau $2k = 10$ atau $k = 5$.

Sifat-sifat dari hasil kali titik pada R^n terdapat pada teorema berikut ini :

Teorema 5.2:

Untuk sebarang vektor u, v, w pada R^n dan sebarang skalar k , pada R ,

$$(i) (u + v) \cdot w = u \cdot w + v \cdot w$$

$$(ii) (ku) \cdot v = k(u \cdot v)$$

$$(iii) u \cdot v = v \cdot u$$

$$(iv) u \cdot u \geq 0, \text{ dan } u \cdot u = 0 \text{ jika } u = 0$$

Pembuktian bagian (ii) dan (iii) sedangkan bukti selebihnya sebagai latihan bagi pembaca.

Bukti :

$$(ii) \text{ Karena } ku = (ku_1 + ku_2 + \dots + ku_n),$$

$$\begin{aligned} \text{Maka } (ku) \cdot v &= ku_1 v_1 + ku_2 v_2 + \dots + ku_n v_n \\ &= k(u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n) \\ &= k(u \cdot v) \end{aligned}$$

$$(iii) u \cdot v = (u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n) = (v \cdot u)$$

5. Norma/Panjang Vektor

Norma atau panjang suatu vektor u pada R^n dilambangkan dengan $\|u\|$ didefinisikan sebagai akar kuadrat yang bukan negatif dari $u \cdot u$. Jika $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ maka

$$\|u\| = \sqrt{u \cdot u} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

Dengan kata lain, $\|u\|$ adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat-kuadrat komponen u . Jika, $\|u\| \geq 0$ dan $\|u\| = 0$ jika dan hanya jika $u = 0$.

Suatu vektor u disebut vektor satuan jika $\|u\| = 1$ atau secara ekuivalen jika $u \cdot u = 1$. Untuk sebarang vektor bukan nol v pada R^n , vektor

$$\hat{v} = \frac{1}{\|v\|} v = \frac{v}{\|v\|}$$

adalah vektor satuan yang unik dengan arah yang sama dengan v . proses perhitungan $\hat{v}$ dari v disebut normalisasi v .

Contoh 5.5

(a) Jika diketahui $u = (-2, 4, 5, 6)$, hitunglah norm atau panjang vektor ini.

Penyelesaian :

Panjang vektor ini dapat diperoleh dari

$$\begin{aligned}\|u\| &= \sqrt{(-2)(-2) + 4.4 + 5.5 + 6.6} \\ &= \sqrt{4 + 16 + 25 + 36} = \sqrt{4 + 16 + 25 + 36} = \sqrt{81} = 9\end{aligned}$$

- (b) Jika diketahui $u = (4, -2, -3, 8)$, normalisasikan vektor u ini.

Penyelesaian :

$$\|u\| = \sqrt{4.4 + (-2)(-2) + (-3)(-3) + 8.8} = \sqrt{93}. \text{ Maka}$$

$$\hat{u} = \left(\frac{4}{\sqrt{93}}, \frac{-2}{\sqrt{93}}, \frac{-3}{\sqrt{93}}, \frac{8}{\sqrt{93}} \right)$$

6. Jarak antara Dua Vektor

Jarak antara vektor $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dengan vektor $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ pada R^n dinyatakan dan didefinisikan sebagai

$$d(u, v) = \|u - v\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}$$

Contoh 5.6

Jika diketahui $u = (1, -3, 4)$ dan $v = (2, 2, 3)$, hitunglah jarak antara vektor tersebut.

Penyelesaian:

$$d(u, v) = \|u - v\| = \sqrt{(1-2)^2 + ((-3)-2)^2 + (4-3)^2}$$

$$= \sqrt{((-1)^2 + (-5)^2 + (1)^2)} = \sqrt{(1 + 25 + 1)} = \sqrt{27}$$

7. Sudut antara Dua Vektor

Sudut antara vektor $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dengan vektor $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ pada R^n dinyatakan dan didefinisikan sebagai

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}, \text{ jika } u \neq 0, v \neq 0$$

Contoh 5.7

Jika diketahui $u = (2, -1, 9, 3, 4)$ dan $v = (1, -2, 3, -2, 1)$, hitunglah cosinus yang dibentuk oleh kedua vektor ini.

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} = \frac{2+2+27-6+4}{\sqrt{4+1+81+9+16} \sqrt{1+4+9+4+1}} \\ &= \frac{29}{\sqrt{111} \sqrt{19}} = \frac{2}{\sqrt{2109}}\end{aligned}$$

Latihan 5.1

1. Misalkan $u = (0, -1, 2, 3, 4)$, $v = (1, 2, -3, 2, 1)$,
 $w = (4, 2, 1, -3, 2)$

Carilah :

- a) $u - v$ c) $3(u - 7v)$ e) $2v - (u + w)$
b) $-w + v$ d) $7v + 3w$ f) $(3v + 2u) - 6w$

2. Tentukan vektor-vektor mana yang sama:

$$u = (1, 2, 3), v = (2, 3, 1), w = (1, 3, 2), x = (2, 3, 1),$$

3. Misalkan $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix}$, Tentukan

- a) $3u - 2v$
b) $5u + 3v - 4w$

4. Misalkan $u = (2, -5, 4, 6, -3)$, dan $v = (5, -2, 1, -7, -4)$.

Tentukan:

- a) $u \cdot v$

- b) $\|u\|$ dan $\|v\|$
 - c) $\text{proj}(u, v)$
 - d) $d(u, v)$
5. Tentukan x, y di mana:
- a) $(x, y+1) = (y-2, 6)$
 - b) $x(2, y) = y(1, -2)$
6. Normalisasikan setiap vektor:
- a) $u = (5, -7)$
 - b) $v = (1, 2, -2, 4)$
7. Tentukan k sedemikian rupa sehingga u dan v orthogonal
- a) $u = (3, k, -2), v = (6, -4, -3)$
 - b) $u = (5, k, -4, 2), v = (1, -3, 2, 2k)$
 - c) $u = (1, 7, k+2, -2), v = (3, k, -3, k)$

5.2. Ruang Vektor

Definisi 5.3:

Misalkan V adalah himpunan yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar, dimana skalar adalah bilangan real. $u, v, w \in V$ dan k, l merupakan skalar, maka V disebut ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma berikut ini:

1. Untuk setiap $u, v \in V$, berlaku $u+v \in V$ (tertutup penjumlahan)
2. Untuk setiap $u, v \in V$, berlaku $u+v = v+u$ (komutatif)
3. Untuk setiap $u, v, w \in V$, berlaku $(u+v)+w = u+(v+w)$ (asosiatif)
4. Ada $0 \in V$, dan berlaku $u + 0 = 0 + u = u$, untuk setiap $u \in V$ (identitas)
5. Untuk setiap $u \in V$, ada $-u \in V$ dan berlaku $u + (-u) = (-u) + u = 0$ (invers)
6. Untuk setiap $u \in V$ dan setiap $k \in R$, berlaku $ku \in V$
7. Untuk setiap $u, v \in V$ dan setiap $k \in R$, berlaku $k(u+v) = kv+ku$ (distributif skalar)
8. Untuk setiap $u \in V$ dan setiap $k, l \in R$, berlaku $(k+l)u = ku+lu$ (distributif skalar)
9. Untuk setiap $u \in V$ dan setiap $k, l \in R$, berlaku $(kl)u = k(lu)$ (asosiatif skalar)

Skalar dapat berupa blangan real atau bilangan kompleks, tergantung pada aplikasinya. Ruang vektor di mana skalarnya-skalarnya adalah bilangan kompleks

disebut *ruang vektor kompleks* (complex vector space), dan ruang vektor di mana skalar-skalanya merupakan bilangan real disebut *ruang vektor real* (real vector space).

Ingatlah selalu bahwa definisi dari suatu ruang vektor tidak menyebutkan sifat dari vektor maupun operasinya. Objek apa saja yang dapat menjadi suatu vektor dan operasi penjumlahan dan perkalian skalar kemungkinan tidak memiliki hubungan tau kemiripan apapun dengan operasi-operasi vektor standar pada R^n . Satu-satunya syarat adalah terpenuhinya kesepuluh aksioma ruang vektor.

Himpunan semua polinom berderajat maksimal n yang dilengkapi dengan operasi

Contoh Ruang Vektor Contoh-contoh berikut ini akan mengilustrasikan berbagai jenis ruang vektor yang mungkin. Pada setiap contoh, kita akan memberikan suatu himpunan V tak kosong dan dua operasi; penjumlahan dan perkalian skalar; kemudian kita akan membuktikan bahwa kesepuluh aksioma ruang vektor terpenuhi, sehingga V dapat disebut sebagai ruang vektor dengan melakukan operasi-operasi yang telah ditentukan.

Contoh 5.8

Tunjukkan bahwa himpunan V dari semua matriks 2×2 dengan entri-entri real adalah ruang vektor, jika penjumlahan vektor didefinisikan sebagai penjumlahan matriks dan perkalian skalar vektor didefinisikan sebagai perkalian skalar matriks.

Penyelesaian:

Untuk membuktikan matriks 2×2 ruang vektor, kita harus membuktikan ke sepuluh aksioma ruang vektor. Misalkan

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix}$$

1. Kita harus menunjukkan bahwa $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ adalah suatu objek pada V . Atau dengan kata lain, kita harus menunjukkan bahwa $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ adalah suatu matriks 2×2 .

Ambil $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in M_{2 \times 2}$, berarti kedua matriks $M_{2 \times 2}$ ini dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix},$$

maka

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} + v_{11} & u_{12} + v_{12} \\ u_{21} + v_{21} & u_{22} + v_{22} \end{bmatrix}$$

Karena $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in M_{2 \times 2}$, maka $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in M_{2 \times 2}$.

2. Ambil $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in M_{2 \times 2}$, berarti kedua matriks $M_{2 \times 2}$ ini dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix},$$

Maka

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u} + \mathbf{v} &= \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} u_{11} + v_{11} & u_{12} + v_{12} \\ u_{21} + v_{21} & u_{22} + v_{22} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} v_{11} + u_{11} & v_{12} + u_{12} \\ v_{21} + u_{21} & v_{22} + u_{22} \end{bmatrix} \\
 &= \mathbf{v} + \mathbf{u}
 \end{aligned}$$

Jadi, $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$

3. Ambil $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in M_{2 \times 2}$, berarti ketiga matriks $M_{2 \times 2}$ ini dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix}, \text{ dan } \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{bmatrix}$$

Maka

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} &= \left(\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} v_{11} + u_{11} & v_{12} + u_{12} \\ v_{21} + u_{21} & v_{22} + u_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} (v_{11} + u_{11}) + w_{11} & (v_{12} + u_{12}) + w_{12} \\ (v_{21} + u_{21}) + w_{21} & (v_{22} + u_{22}) + w_{22} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} v_{11} + (u_{11} + w_{11}) & v_{12} + (u_{12} + w_{12}) \\ v_{21} + (u_{21} + w_{21}) & v_{22} + (u_{22} + w_{22}) \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$= \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$$

Jadi, $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$

4. Ada $\mathbf{0} \in M_{2 \times 2}$, yaitu $\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (entri-entri-nya yaitu 0 merupakan bilangan real), dan ambil $\mathbf{u} \in M_{2 \times 2}$, berarti matriks $M_{2 \times 2}$ ini dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix}$$

Maka

$$\mathbf{0} + \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 + u_{11} & 0 + u_{12} \\ 0 + u_{21} & 0 + u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u} + \mathbf{0} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} + 0 & u_{12} + 0 \\ u_{21} + 0 & u_{22} + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix}$$

Jadi, $\mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$

5. Ambil $\mathbf{u} \in M_{2 \times 2}$, berarti matriks $M_{2 \times 2}$ ini dapat diuraikan sebagai berikut $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix}$ dan ada

$$-\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -u_{11} & -u_{12} \\ -u_{21} & -u_{22} \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}. \text{ Sehingga}$$

$$\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -u_{11} & -u_{12} \\ -u_{21} & -u_{22} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} u_{11}-u_{11} & u_{12}-u_{12} \\ u_{21}-u_{21} & u_{22}-u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(-u)+u = \begin{bmatrix} -u_{11} & -u_{12} \\ -u_{21} & -u_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (-u_{11})+u_{11} & (-u_{12})+u_{12} \\ (-u_{21})+u_{21} & (-u_{22})+u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Jadi, $u + (-u) = (-u) + u = 0$

6. Ambil $u \in M_{2 \times 2}$, berarti matriks $M_{2 \times 2}$ ini dapat diuraikan sebagai berikut $u = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix}$ dan ambil $k \in \mathbb{R}$, sehingga

$$ku = k \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ku_{11} & ku_{12} \\ ku_{21} & ku_{22} \end{bmatrix}$$

karena $k \in \mathbb{R}$ dan $u_{11}, u_{12}, u_{21}, u_{22} \in \mathbb{R}$ maka $ku_{11}, ku_{12}, ku_{21}, ku_{22} \in \mathbb{R}$.

7. Ambil $u, v \in M_{2 \times 2}$, berarti kedua matriks $M_{2 \times 2}$ ini dapat diuraikan sebagai berikut:

$$u = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} \text{ dan } v = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} \text{ dan ambil } k \in \mathbb{R}, \text{ maka}$$

$$k(u+v) = k \left(\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} \right)$$

$$= k \begin{bmatrix} u_{11} + v_{11} & u_{12} + v_{12} \\ u_{21} + v_{21} & u_{22} + v_{22} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} k(u_{11} + v_{11}) & k(u_{12} + v_{12}) \\ k(u_{21} + v_{21}) & k(u_{22} + v_{22}) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} ku_{11} + kv_{11} & ku_{12} + kv_{12} \\ ku_{21} + kv_{21} & ku_{22} + kv_{22} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} ku_{11} & ku_{12} \\ ku_{21} & ku_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} kv_{11} & kv_{12} \\ kv_{21} & kv_{22} \end{bmatrix}$$

$$= k \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix}$$

$$= ku + kv$$

Jadi, $k(u+v) = ku + kv$

8. Ambil $u \in M_{2 \times 2}$, berarti matriks $M_{2 \times 2}$ ini dapat diuraikan sebagai berikut:

$$u = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} \text{ dan ambil } k, l \in \mathbb{R}, \text{ maka}$$

$$(k+l)u = (k+l) \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (k+l)u_{11} & (k+l)u_{12} \\ (k+l)u_{21} & (k+l)u_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} ku_{11} + lu_{11} & ku_{12} + lu_{12} \\ ku_{21} + lu_{21} & ku_{22} + lu_{22} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} ku_{11} & ku_{12} \\ ku_{21} & ku_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} lu_{11} & lu_{12} \\ lu_{21} & lu_{22} \end{bmatrix} \\
&= k \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + l \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} \\
&= ku + lv
\end{aligned}$$

Jadi, $(k+l)u = ku + lv$

9. Ambil $u \in M_{2 \times 2}$, berarti matriks $M_{2 \times 2}$ ini dapat diuraikan sebagai berikut:

$$u = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} \text{ dan ambil } k, l \in \mathbb{R}, \text{ maka}$$

$$\begin{aligned}
(kl)u &= (kl) \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (kl)u_{11} & (kl)u_{12} \\ (kl)u_{21} & (kl)u_{22} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} k(lu_{11}) & k(lu_{12}) \\ k(lu_{21}) & k(lu_{22}) \end{bmatrix} \\
&= k \begin{bmatrix} (lu_{11}) & (lu_{12}) \\ (lu_{21}) & (lu_{22}) \end{bmatrix} \\
&= k(lu)
\end{aligned}$$

Jadi, $(kl)u = k(lu)$

10. Ambil $u \in M_{2 \times 2}$, berarti matriks $M_{2 \times 2}$ ini dapat diuraikan sebagai berikut:

$$u = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} \text{ maka,}$$

$$1 \cdot u = 1 \cdot \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = u$$

Jadi, $1 \cdot u = u$

Dengan kesepuluh pembuktian ini dapat diambil kesimpulan bahwa $M_{2 \times 2}$ merupakan ruang vektor.

Contoh 5.9 Ruang Vektor dari Matriks $m \times n$

Contoh 5.8 merupakan kasus khusus dari golongan ruang vektor yang lebih umum. Alasan-alasan pada contoh tersebut dapat disesuaikan untuk menunjukkan bahwa himpunan V dari semua matriks $m \times n$ dengan entri-entri real, bersama-sama dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar matriks, merupakan suatu ruang vektor. Matriks nol $m \times n$ adalah vektor nol 0 , dan jika u adalah matriks U , $m \times n$, maka matriks $-U$ adalah negatif $-u$ dari vektor u . Kita akan menotasi ruang vektor ini dengan simbol M_{mn} .

Contoh 5.10 Bukan Ruang Vektor dari Matriks 2×2

Andaikan $M = \left\{ \begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & b \end{bmatrix} \mid a, b \in R \right\}$ yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan yang biasa matriks 2×2 dan perkalian skalar yang biasa matriks 2×2 . Buktikan bahwa M bukan ruang vektor.

Penyelesaian :

Untuk membuktikan matriks 2×2 ruang vektor, kita harus membuktikan ke sepuluh aksioma ruang vektor. Jika salah satu tidak terpenuhi dari kesepuluh aksioma tersebut maka matriks 2×2 tersebut bukan ruang vektor. Misalkan

$$P = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & a_1 \\ b_1 & 1 \end{bmatrix} \mid a_1, b_1 \in R \right\} \text{ dan } Q = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & a_2 \\ b_2 & 1 \end{bmatrix} \mid a_2, b_2 \in R \right\}$$

1. Ambil $P, Q \in M$, berarti kedua matriks M ini dapat diuraikan sebagai berikut:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & a_1 \\ b_1 & 1 \end{bmatrix} \text{ dan } Q = \begin{bmatrix} 1 & a_2 \\ b_2 & 1 \end{bmatrix},$$

maka

$$P + Q = \begin{bmatrix} 1 & a_1 \\ b_1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & a_2 \\ b_2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 & 2 \end{bmatrix}$$

$P + Q \notin M$, karena entri pada baris pertama kolom pertama bukan 1 (satu), begitu pula entri pada baris kedua kolom pertama bukan 1 (satu).

Oleh sebab itu, M bukan ruang vektor karena tidak memenuhi aksioma pertama (tertutup terhadap operasi penjumlahan).

Beberapa Sifat Vektor Sejalan dengan semakin mendalamnya pembahasan kita, akan lebih banyak contoh ruang vektor yang dapat ditambahkan ke dalam daftar yang telah kita miliki. Kita akan menutup subbab ini dengan sebuah teorema yang berisi daftar sifat-sifat vektor yang berguna.

Teorema 5.3:

Misalkan V adalah suatu ruang vektor, u adalah suatu vektor pada V , dan k adalah suatu skalar, maka:

- a) $0u = 0$
- b) $k0 = 0$
- c) $(-1)u = -u$
- d) Jika $ku = 0$, maka $k = 0$ atau $u = 0$.

Pembuktikan bagian (a) dan (c)

Bukti (a). Kita dapat menulis

$$u + 0u = (0 + 0)u \quad [\text{Aksioma 8}]$$

$$= 0u \quad [\text{Sifat dari bilangan 0}]$$

Berdasarkan Aksioma 5, vektor $0u$ memiliki bentuk negatif, $-0u$. Dengan menambahkan negatifnya ini pada kedua ruas diatas akan menghasilkan

$$[0u + 0u] + (-0u) = 0u + (-0u)$$

atau

$$0u + [0u + (-0u)] = 0u + (-0u) \text{ [Aksioma 3]}$$

$$0u + 0 = 0 \quad \text{[Aksioma 5]}$$

$$0u = 0$$

Bukti (c). Untuk menunjukkan $(-1)u = -u$, kita harus memperlihatkan bahwa $u + (-1)u = 0$. Untuk melihat ini, amati bahwa

$$u + (-1)u = 1u + (-1)u \text{ [Aksioma 10]}$$

$$= (1 + (-1))u \text{ [Aksioma 8]}$$

$$= 0u \quad \text{[Sifat dari bilangan]}$$

$$= 0 \quad \text{[Bagian (a) di atas]}$$

Latihan 5.2

1. Persamaan bidang yang melalui titik asal adalah $ax + by + cz = 0$. Buktikanlah bahwa himpunan semua vektor R^3 pada bidang yang melalui titik asal dinyatakan oleh $P = \{(x, y, z) \in R^3 \mid ax + by + cz = 0\}$ yang dilengkapi dengan penjumlahan dan perkalian skalar biasa R^3 merupakan ruang vektor.
2. Jika V himpunan semua vektor di R^3 , dengan operasi penjumlahan

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$$

Sedangkan perkalian skalar $ku = (ku_1, ku_2, ku_3)$, buktikan bahwa V ini bukan ruang vektor!

Untuk tiap-tiap soal di bawah ini tunjukkan bahwa himpunan yang mana merupakan ruang vektor dan bukan ruang vektor dengan operasi-operasi yang diberikan. Untuk himpunan yang bukan ruang vektor, daftarkan semua aksioma yang gagal dipenuhi.

3. Himpunan semua tripel bilangan real (x, y, z) dengan operasi-operasi $(x, y, z) + (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z')$ dan $k(x, y, z) = (kx, y, z)$
4. V himpunan semua vektor di R^3 dengan operasi yang didefinisikan sebagai berikut: untuk $u = (u_1, u_2, u_3)$ dan $v = (v_1, v_2, v_3)$ maka $u + v = (u_1 + v_1, u_2 + 3v_2, u_3 + v_3)$ sedangkan $ku = (ku_1, ku_2, ku_3)$.
5. Himpunan semua pasangan bilangan real (x, y) dengan operasi-operasi $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$ dan $k(x, y) = (2kx, 2ky)$.
6. Misalkan V himpunan polinom di P_3 yang mempunyai bentuk $u = (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3)$, dengan syarat $a_0 + a_1 = 0$, dengan kedua operasi yang biasa di polinom P_3 .
7. Himpunan semua matriks 2×2 berbentuk

$$\begin{bmatrix} a & 1 \\ b & c \end{bmatrix}$$

Dengan penambahan matriks dan perkalian skalar.

8. Himpunan semua matriks 2×2 berbentuk

$$\begin{bmatrix} a+b & a \\ b & a+b \end{bmatrix}$$

Dengan penambahan matriks dan perkalian skalar.

9. Himpunan semua bilangan real positif x dengan operasi operasi $(x+x')=2xx'$ dan $kx=x^k$.
10. Himpunan semua matriks 2×2 berbentuk

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Dengan syarat $ad \neq 0$ dan dengan penambahan matriks dan perkalian skalar.

5.3. Subruang Vektor

Suatu subhimpunan dari ruang vektor V , yang juga merupakan suatu ruang vektor yang kaitannya dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar vektor yang didefinisikan pada V memiliki nama khusus.

Definisi 5.4:

Suatu subhimpunan W dari suatu ruang vektor V disebut *subruang* (*subspace*) dan V dan jika W itu sendiri merupakan suatu ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V .

Secara umum, kesepuluh aksioma ruang vektor harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwa suatu himpunan W yang tak kosong dengan penjumlahan dan perkalian skalar untuk membentuk suatu ruang vektor. Namun demikian, jika W merupakan subruang dari suatu

himpunan V yang lebih besar yang telah diketahui merupakan suatu vektor, maka beberapa aksioma tertentu tidak perlu dibuktikan untuk W karena telah "diturunkan" dari V . Sebagai contoh, $u + v = v + u$ (Aksioma 2) terhadap W tidak perlu dibuktikan karena ini semua berlaku untuk vektor pada V dan sebagai konsekuensinya untuk semua vektor pada W . Aksioma-aksioma lain yang diturunkan oleh W dari V adalah 2,3,4,5,7,8,9 dan 10. Jadi untuk menunjukkan bahwa suatu himpunan W adalah suatu subruang dari suatu ruang vektor V , kita hanya perlu membuktikan Aksioma 1 dan 6.

Teorema 5.4:

Jika W adalah suatu himpunan yang terdiri dari satu atau lebih vektor dari suatu ruang vektor V , maka W adalah suatu subruang dari V , jika dan hanya jika syarat-syarat berikut terpenuhi,

- Jika u dan v adalah vektor-vektor pada W , maka $u + v$ berada pada W .
- Jika k adalah skalar sebarang dan u adalah vektor sebarang pada W , maka ku berada pada W .

Bukti. Jika W adalah suatu subruang dari V , maka semua aksioma ruang vektor terpenuhi, khususnya Aksioma 1 dan 6 berlaku. Tetapi aksioma-aksioma ini secara tepat adalah syarat (a) dan (b).

Sebaliknya, asumsikan syarat (a) dan (b) berlaku. Karena syarat-syarat ini merupakan Aksioma 1 dan 6 dari

ruang vektor, maka kita hanya perlu menunjukkan bahwa W memenuhi kedepalan aksioma lainnya. Aksioma 2,3,7,8,9 dan 10 secara otomatis terpenuhi oleh vektor-vektor pada W . Oleh karena itu, untuk melengkapi bukti, kita hanya perlu menunjukkan bahwa Aksioma 4 dan 5 terpenuhi oleh vektor-vektor pada W .

Misalkan u adalah vektor sebarang pada W . Menurut syarat (b), ku berada pada W untuk setiap skalar k . Dengan mengatur $k = 0$, sesuai dengan Teorema 4.3 diperoleh $0u = 0$ berada pada W , dan dengan mengatur $k = -1$, maka $(-1)u = -u$ berada pada W .

CATATAN. Suatu himpunan W yang terdiri dari satu atau lebih vektor dari suatu subruang V disebut **tertutup terhadap penjumlahan** (closed under addition) jika syarat (a) pada Teorema 5.4 berlaku, dan dikatakan **tertutup terhadap perkalian skalar** (closed scalar multiplication) jika syarat (b) berlaku. Jadi Teorema 5.4 menyatakan bahwa W adalah subruang dari V jika dan hanya jika W tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skalar.

Contoh 5.11

Misalkan U himpunan semua matriks 2×2 yang berbentuk $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ dengan syarat $a + d = 0$. Tunjukkan bahwa U merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2×2 pada operasi yang biasa di matriks 2×2 .

Penyelesaian:

1. Ambil $u, v \in U$, akan ditunjukkan bahwa $u + v \in U$.
karena $u, v \in U$ maka dipenuhi

$$u = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}, a_1 + d_1 = 0 \text{ dan } v = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}, a_2 + d_2 = 0$$

Dengan demikian, $u + v = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{bmatrix}$ karena $a_1 + d_1 = 0$ dan $a_2 + d_2 = 0$, maka

$$(a_1 + a_2) + (d_1 + d_2) = 0$$

$$(a_1 + d_1) + (a_2 + d_2) = 0$$

$$0 + 0 = 0 \text{ (memenuhi)}$$

Jadi, $u + v \in U$.

2. Ambil $u \in U$, akan ditunjukkan bahwa $ku \in U$. Karena $u \in U$ maka dipenuhi

$$u = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}, a_1 + d_1 = 0. \quad \text{Dengan demikian}$$

$$ku = k \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_1 & kb_1 \\ kc_1 & kd_1 \end{bmatrix} \text{ karena } a_1 + d_1 = 0 \text{ maka}$$

$$ka_1 + kd_1 = k(a_1 + d_1) = k \cdot 0 = 0 \text{ (memenuhi)}$$

Jadi, $ku \in U$.

Contoh 5.12

Misalkan U himpunan semua vektor yang berbentuk $(a, 0, 0)$. Tunjukkan bahwa U merupakan subruang dari ruang vektor.

Penyelesaian:

Misalkan $u = (a_1, 0, 0)$ dan $v = (a_2, 0, 0)$

1. Ambil $u, v \in U$, akan ditunjukkan bahwa $u + v \in U$.
karena $u, v \in U$ maka dipenuhi $u = (a_1, 0, 0)$ dan $v = (a_2, 0, 0)$. Dengan demikian $u + v = (a_1 + a_2, 0, 0)$ karena a_1, a_2 terletak dalam vektor U maka $a_1 + a_2$ terletak dalam vektor U .
Jadi, $u + v \in U$.

2. Ambil $u \in U$, akan ditunjukkan bahwa $ku \in U$. karena $u \in U$ maka dipenuhi $u = (a_1, 0, 0)$. Dengan demikian $ku = k(a_1, 0, 0) = (ka_1, 0, 0)$, karena a_1 terletak dalam vektor U maka ka_1 terletak dalam vektor U .
Jadi, $ku \in U$.

Contoh 5.13

Misalkan P_3 himpunan semua polinomial yang berbentuk $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ dimana a_0, a_1, a_2, a_3 adalah bilangan-bilangan bulat. Tunjukkan bahwa P_3 bukan subruang dari ruang vektor.

Penyelesaian:

Misalkan $p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, dimana $a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{Z}$ dan $q = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$, dimana $b_0, b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{Z}$

1. Ambil $p, q \in P_3$, akan ditunjukkan bahwa $p + q \in P_3$.
karena $p, q \in P_3$ maka dipenuhi

$p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, dimana $a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{Z}$ dan
 $q = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$, dimana $b_0, b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{Z}$.

Dengan demikian

$$p + q = (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) + (b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3)$$

$$p + q = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + (a_3 + b_3)x^3$$

karena $a_0, \dots, a_3 \in \mathbb{Z}$ dan $b_0, \dots, b_3 \in \mathbb{Z}$, maka
 $(a_0 + b_0), (a_1 + b_1), (a_2 + b_2), (a_3 + b_3) \in \mathbb{Z}$.

Jadi, $p + q \in P_3$

2. Ambil $p \in P_3$ dan $k \in \mathbb{R}$, akan ditunjukkan bahwa $kp \in P_3$.
karena $p \in P_3$ maka dipenuhi $p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$,
dimana $a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{Z}$. Dengan demikian

$$kp = k(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = ka_0 + (ka_1)x + (ka_2)x^2 + (ka_3)x^3$$

karena $k \in \mathbb{R}$, sehingga tidak semua $ka_0, ka_1, ka_2, ka_3 \in \mathbb{Z}$,
misalkan jika k pecahan.

Jadi, $kp \notin P_3$.

Latihan 5.3

Untuk tiap-tiap soal di bawah ini tunjukkan bahwa himpunan yang mana merupakan ruang vektor dan bukan ruang vektor dengan operasi-operasi yang diberikan. Untuk

himpunan yang bukan ruang vektor, daftarkan semua aksioma yang gagal dipenuhi.

1. Misalkan V himpunan semua vektor R^3 yang mempunyai bentuk $v = (a, 1, 1)$.
2. Misalkan U himpunan semua vektor R^3 yang mempunyai bentuk $v = (a, b, c)$, dengan syarat $b = a + c + 1$.
3. Misalkan M himpunan semua matriks berordo 2×2 yang mempunyai bentuk $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ dengan syarat a, b, c, d anggota bilangan bulat.
4. Misalkan M himpunan semua matriks berordo 2×2 yang mempunyai bentuk $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ dengan syarat $a + b = c + d$.
5. Misalkan P_3 himpunan semua polinomial yang berbentuk $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ dimana $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 0$.
6. Misalkan P_2 himpunan semua polinomial yang berbentuk $a_0 + a_1x + a_2x^2$ dimana $a_0 + a_1 = 0$ dan $a_1 - a_2 = 0$.
7. Misalkan M himpunan semua matriks berordo 2×2 yang mempunyai bentuk $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ dengan syarat $\det(M) = 0$.
8. Misalkan M himpunan semua matriks berordo 2×2 yang mempunyai bentuk $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ dengan syarat $A = A^t$.
9. Misalkan M himpunan semua matriks berordo 2×2 yang mempunyai bentuk $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ dengan syarat $a + b = c$ dan $a - b = d$.
10. Misalkan P_2 himpunan semua polinomial yang berbentuk $a_0 + a_1x + a_2x^2$ dimana $a_0 + a_1 = 0$ dan $a_1 - a_2 = 0$.

5.4. Kombinasi Linear

Definisi 5.5:

Suatu vektor w disebut suatu *kombinasi linear* (linear combination) dari vektor-vektor $v_1, v_2, \dots, v_r$ jika dapat dinyatakan dalam bentuk

$$w = k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_r v_r$$

di mana $k_1, k_2, \dots, k_r$ adalah skalar.

Contoh 5.14

Nyatakan $v = (2, 3, -1)$ pada R^3 sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor $u_1 = (1, 0, 1)$, $u_2 = (0, 1, -1)$, $u_3 = (1, 1, -1)$.

Penyelesaian:

Akan dicari skalar-skalar k_1, k_2 , dan k_3 yang memenuhi $v = k_1 u_1 + k_2 u_2 + k_3 u_3$.

$$(2, 3, -1) = k_1(1, 0, 1) + k_2(0, 1, -1) + k_3(1, 1, -1)$$

$$(2, 3, -1) = (k_1, 0, k_1) + (0, k_2, -k_2) + (k_3, k_3, -k_3)$$

$$(2, 3, -1) = (k_1 + k_3, k_2 + k_3, k_1 - k_2 - k_3)$$

membentuk sistem persamaan linear sebagai berikut

$$k_1 + k_3 = 2$$

$$k_2 + k_3 = 3$$

$$k_1 - k_2 - k_3 = 1$$

Dengan menggunakan eliminasi Gauss Jordan, sistem persamaan linear ini akan diselesaikan sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Jadi, $k_1 = 2, k_2 = 3, \text{ dan } k_3 = 0$, sehingga kombinasi linear dari v adalah $v = 2u_1 + 3u_2 + 0u_3$.

Contoh 5.15

Nyatakan polinom $v = 2 + 2t + 3t^2$ dalam $p_{(t)}$ sebagai kombinasi linear dari polinom-polinom $p_1 = 2 + t + 4t^2$, $p_2 = 1 - t + 3t^2$, $p_3 = 3 + 2t + 5t^2$.

Penyelesaian:

Akan dicari skalar-skalar $k_1, k_2, \text{ dan } k_3$ yang memenuhi $v = k_1 p_1 + k_2 p_2 + k_3 p_3$.

$$2 + 2t + 3t^2 = k_1(2 + t + 4t^2) + k_2(1 - t + 3t^2) + k_3(3 + 2t + 5t^2)$$

$$2 + 2t + 3t^2 = (2k_1 + k_2 + 3k_3) + (k_1 - k_2 + 2k_3)t + (4k_1 + 3k_2 + 5k_3)t^2$$

$2 + 2t + 3t^2 = (2k_1 + k_2 + 3k_3) + (k_1 - k_2 + 2k_3)t + (4k_1 + 3k_2 + 5k_3)t^2$
membentuk sistem persamaan linear sebagai berikut:

$$2k_1 + k_2 + 3k_3 = 2$$

$$k_1 - k_2 + 2k_3 = 2$$

$$4k_1 + 3k_2 + 5k_3 = 3$$

Dengan menggunakan eliminasi Gauss Jordan, sistem persamaan linear ini akan diselesaikan sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 5 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & -3/2 & 1/2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & -2/3 & -1/3 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Jadi, $k_1 = 1/2, k_2 = -1/2, \text{ dan } k_3 = 1/2$, sehingga kombinasi linear dari v adalah $v = 1/2 p_1 - 1/2 p_2 + 1/2 p_3$.

Contoh 5.15

Nyatakan M sebagai kombinasi linear dari matriks A, B, C , dimana:

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

Akan dicari skalar-skalar $x, y, \text{ dan } z$ yang memenuhi $M = k_1 A + k_2 B + k_3 C$.

$$\begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 & 2k_1 \\ -k_1 & 3k_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & k_2 \\ 2k_2 & 4k_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4k_3 & -2k_3 \\ 0 & -2k_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 + 4k_3 & 2k_1 + k_2 - 2k_3 \\ -k_1 + 2k_2 & 3k_1 + 4k_2 - 2k_3 \end{bmatrix}$$

membentuk sistem persamaan linear sebagai berikut:

$$\begin{aligned} k_1 + 4k_3 &= -1 \\ 2k_1 + k_2 - 2k_3 &= 7 \\ -k_1 + 2k_2 &= 5 \\ 3k_1 + 4k_2 - 2k_3 &= 1 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan eliminasi Gauss Jordan, sistem persamaan linear ini akan diselesaikan sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & 7 \\ -1 & 2 & 0 & 5 \\ 3 & 4 & -2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -10 & 9 \\ 0 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & -14 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -10 & 9 \\ 0 & 0 & 24 & -14 \\ 0 & 0 & 26 & -32 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -10 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & -7/12 \\ 0 & 0 & 1 & -16/13 \end{bmatrix}$$

Karena k_3 bertentangan pada baris 3 dan 4 maka tidak nilai k_1 dan k_2 yang memenuhi.

Jadi, M bukan kombinasi linear dari A, B , dan C .

Latihan 5.4

1. Nyatakan $\mathbf{v} = (1, -2, 5)$ pada R^3 sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{u}_2 = (1, 2, 3)$, $\mathbf{u}_3 = (2, -1, 1)$.
2. Nyatakan $\mathbf{v} = (2, 0, 1)$ pada R^3 sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor $\mathbf{u}_1 = (1, -1, 0)$, $\mathbf{u}_2 = (0, 2, 1)$, $\mathbf{u}_3 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{u}_4 = (1, 3, 2)$.
3. Nyatakan $\mathbf{v} = (3, 3, 3)$ pada R^3 sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor $\mathbf{u} = (1, -1, 3)$, $\mathbf{v} = (2, 4, 0)$.
4. Nyatakan polinom $\mathbf{v} = 5 + 9x + 5x^2$ dalam $p_{(x)}$ sebagai kombinasi linear dari polinom-polinom $p_1 = 2 + x + 4x^2$, $p_2 = 1 - x + 3x^2$, $p_3 = 3 + 2x + 5x^2$.
5. Nyatakan M sebagai kombinasi linear dari matriks A, B, C , dimana:

$$M = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

6. Nyatakan M sebagai kombinasi linear dari matriks A, B, C , dimana:

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

7. Nyatakan M sebagai kombinasi linear dari matriks A, B, C , dimana:

$$M = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

5.5. Merentang dan Bebas Linear

Definisi 5.6:

Jika $v_1, v_2, \dots, v_r$ adalah vektor-vektor pada ruang vektor V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear $v_1, v_2, \dots, v_r$, maka vektor-vektor tersebut dikatakan merentang pada V .

Contoh 5.16

Tunjukkan bahwa vektor-vektor $v_1 = (3, 1, 4)$, $v_2 = (2, -3, 5)$, $v_3 = (5, -2, 9)$, dan $v_4 = (1, 4, -1)$ merentang R^3 .

Penyelesaian:

Akan ditunjukkan bahwa sebarang vektor $u = (a, b, c)$ pada R^3 adalah kombinasi linear dari v_1, v_2, v_3, v_4 . Tetapkan $u = x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3 + x_4 v_4$, yaitu

$$(a, b, c) = x_1(3, 1, 4) + x_2(2, -3, 5) + x_3(5, -2, 9) + x_4(1, 4, -1)$$

$$(a, b, c) = (3x_1, x_1, 4x_1) + (2x_2, -3x_2, 5x_2) + (5x_3, -2x_3, 9x_3) + x_4(x_4, 4x_4, -x_4)$$

$$(a, b, c) = (3x_1 + 2x_2 + 5x_3 + x_4, x_1 - 3x_2 - 2x_3 + 4x_4, 4x_1 + 5x_2 + 9x_3 - x_4)$$

Dengan demikian, didapatkan sistem persamaan linear

$$3x_1 + 2x_2 + 5x_3 + x_4 = a$$

$$x_1 - 3x_2 - 2x_3 + 4x_4 = b$$

$$4x_1 + 5x_2 + 9x_3 - x_4 = c$$

Yang dapat diselesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss Jordan,

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 & 1 & a \\ 1 & -3 & -2 & 4 & b \\ 4 & 5 & 9 & -1 & c \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 12 & 8 & 20 & 4 & 4a \\ 12 & -36 & -24 & 48 & 12b \\ 12 & 15 & 27 & -3 & 3c \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 12 & 8 & 20 & 4 & 4a \\ 0 & -44 & -44 & 44 & 12b - 4a \\ 0 & 7 & 7 & -7 & 3c - 4a \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 5/3 & 1/3 & 1/3a \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1/11(12b-4a) \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1/7(3c-4a) \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 5/3 & 1/3 & 1/3a \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1/11(3b-a) \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/7(3c-4a)-1/11(32b-a) \end{bmatrix}$$

Dari matriks di atas terlihat bahwa system persamaan linear tersebut hanya mempunyai penyelesaian jika $-1/7(3c-4a)-1/11(32b-a)=0$, sedangkan yang diminta ialah sebarang nilai a, b , dan c . Jadi, v_1, v_2, v_3, v_4 tidak merentang seluruh ruang R^3 .

Definisi 5.7:

Jika $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ adalah himpunan vektor, maka persamaan vektor

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_r v_r = 0$$

Mempunyai paling sedikit satu pemecahan, yakni

$$k_1 = 0, \quad k_2 = 0, \quad \dots, \quad k_r = 0$$

jika satu-satunya pemecahan, maka S disebut dengan bebas linear. Jika ada pemecahan lain, maka S disebut dengan tak bebas linear.

Contoh 5.17

Tentukan apakah u, v, w bebas linear atau tidak, dimana:

$$u = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad w = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

Untuk menunjukkan u, v, w bebas linear berarti harus ditunjukkan bahwa apakah persamaan $k_1 u + k_2 v + k_3 w = 0$

hanya mempunyai pemecahan trivial, dimana $0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2k_1 & 0 \\ -k_1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3k_2 \\ 2k_2 & k_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_3 & 0 \\ 2k_3 & k_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2k_1 + k_3 & 3k_2 \\ -k_1 + 2k_2 + 2k_3 & k_2 + k_3 \end{bmatrix}$$

Sehingga diperoleh sistem persamaan linear berikut ini:

$$2k_1 + k_3 = 0$$

$$3k_2 = 0$$

$$-k_1 + 2k_2 + 2k_3 = 0$$

$$k_2 + k_3 = 0$$

Sistem persamaan linear ini dapat diselesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{b_1 \text{ ditukar } b_3} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{b_3 + 2b_1} \sim$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{b_4 \text{ ditukar } b_2} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_3 - 4b_2 \\ b_4 - 3b_2 \end{matrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{b_4 + 3b_3} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_1 + 2b_3 \\ b_2 - b_3 \end{matrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{b_1 - 2b_2} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Sehingga diperoleh $-k_1 = 0, k_2 = 0, k_3 = 0$ yang berarti persamaan di atas mempunyai pemecahan trivial.

Jadi, u, v, w bebas linear.

Latihan 5.5

- Tentukan apakah vektor-vektor di bawah ini merentang R^3 dimana:
 - $v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (2, 2, 0), v_3 = (3, 0, 0)$
 - $v_1 = (2, -1, 3), v_2 = (4, 1, 2), v_3 = (8, -1, 8)$
 - $v_1 = (1, 3, 3), v_2 = (1, 3, 4), v_3 = (6, 2, 1)$
- Tentukan apakah polinom-polinom di bawah ini merentang P_2 , dimana

$$p_1 = 1 + 2x - x^2 \quad p_2 = 3 + x^2$$

$$p_3 = 5 + 4x - x^2 \quad p_4 = -2 + 2x - 2x^2$$

- Tentukan apakah u dan v bebas linear atau tidak, di mana:
 - $u = (1, 2), v = (3, -5)$
 - $u = (1, 2), v = (-3, -6)$
 - $u = (1, 2), v = (-1, 0)$
- Apakah himpunan yang terdapat pada latihan soal-soal 4.5 nomor 1 di atas bebas linear?
- Apakah himpunan yang terdapat pada latihan soal-soal 4.5 nomor 2 di atas bebas linear?

5.6. Basis dan Dimensi

Definisi 5.8:

Jika V adalah sebarang ruang vektor dan $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor pada V , maka S disebut basis untuk V jika

- S bebas linear
- S merentang V

Contoh 5.18

Misalkan $u = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, w = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. Tunjukkan bahwa himpunan $S = \{u, v, w\}$ adalah basis untuk $M_{2 \times 2}$.

Penyelesaian:

Untuk menunjukkan u, v, w bebas linear berarti harus ditunjukkan bahwa apakah persamaan $k_1u + k_2v + k_3w = 0$

hanya mempunyai pemecahan trivial, dimana $0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2k_1 & 0 \\ -k_1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3k_2 \\ 2k_2 & k_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_3 & 0 \\ 2k_3 & k_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2k_1 + k_3 & 3k_2 \\ -k_1 + 2k_2 + 2k_3 & k_2 + k_3 \end{bmatrix}$$

Sehingga diperoleh sistem persamaan linear berikut ini:

$$2k_1 + k_3 = 0$$

$$3k_2 = 0$$

$$-k_1 + 2k_2 + 2k_3 = 0$$

$$k_2 + k_3 = 0$$

Sistem persamaan linear ini dapat diselesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} b_1 \text{ ditukar } b_3 \sim \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} b_3 + 2b_1 \sim$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} b_4 \text{ ditukar } b_2 \sim \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} b_3 - 4b_2 \sim b_4 - 3b_2 \sim$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{bmatrix} b_4 + 3b_3 \sim \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} b_1 + 2b_3 \sim b_2 - b_3 \sim$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} b_1 - 2b_2 \sim \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Sehingga diperoleh $-k_1 = 0, k_2 = 0, k_3 = 0$ yang berarti persamaan di atas mempunyai pemecahan trivial.

Untuk memperlihatkan bahwa S merentang pada $M_{2 \times 2}$,

maka akan ditunjukkan bahwa sebarang vektor $x = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

pada $M_{2 \times 2}$ adalah kombinasi linear dari u, v, w . Tetapkan $x = k_1u + k_2v + k_3w$, yaitu

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2k_1 & 0 \\ -k_1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3k_2 \\ 2k_2 & k_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_3 & 0 \\ 2k_3 & k_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2k_1 + k_3 & 3k_2 \\ -k_1 + 2k_2 + 2k_3 & k_2 + k_3 \end{bmatrix}$$

Sehingga diperoleh sistem persamaan linear berikut ini:

$$\begin{aligned} 2k_1 + k_3 &= a \\ 3k_2 &= b \\ -k_1 + 2k_2 + 2k_3 &= c \\ k_2 + k_3 &= d \end{aligned}$$

Sistem persamaan linear ini dapat diselesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & a \\ 0 & 3 & 0 & b \\ -1 & 2 & 2 & c \\ 0 & 1 & 1 & d \end{bmatrix} \xrightarrow{b_1 \text{ ditukar } b_3} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & c \\ 0 & 3 & 0 & b \\ 2 & 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1 & d \end{bmatrix} \xrightarrow{b_3 + 2b_1} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & c \\ 0 & 3 & 0 & b \\ 0 & 4 & 5 & a+2c \\ 0 & 1 & 1 & d \end{bmatrix} \xrightarrow{b_4 \text{ ditukar } b_2} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & c \\ 0 & 1 & 1 & d \\ 0 & 4 & 5 & a+2c \\ 0 & 3 & 0 & b \end{bmatrix} \xrightarrow{b_3 - 4b_2} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & c \\ 0 & 1 & 1 & d \\ 0 & 0 & 1 & (a+2c)-4d \\ 0 & 3 & 0 & b \end{bmatrix} \xrightarrow{b_4 - 3b_2} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & c \\ 0 & 1 & 1 & d \\ 0 & 0 & 1 & (a+2c)-4d \\ 0 & 0 & -3 & b-3d \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & c \\ 0 & 1 & 1 & d \\ 0 & 0 & 1 & (a+2c)-4d \\ 0 & 0 & -3 & b-3d \end{bmatrix} \xrightarrow{b_3 - 4b_2} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & c \\ 0 & 1 & 1 & d \\ 0 & 0 & 1 & (a+2c)-4d \\ 0 & 0 & -3 & b-3d \end{bmatrix} \xrightarrow{b_4 - 3b_2} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & c \\ 0 & 1 & 1 & d \\ 0 & 0 & 1 & (a+2c)-4d \\ 0 & 0 & 0 & (b-3d)+3((a+2c)-4d) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & c-2((a+2c)-4d) \\ 0 & 1 & 0 & d-((a+2c)-4d) \\ 0 & 0 & 1 & (a+2c)-4d \\ 0 & 0 & 0 & (b-3d)+3((a+2c)-4d) \end{bmatrix} \xrightarrow{b_1 - 2b_2} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & c-2((a+2c)-4d)-2(d-((a+2c)-4d)) \\ 0 & 1 & 0 & d-((a+2c)-4d) \\ 0 & 0 & 1 & (a+2c)-4d \\ 0 & 0 & 0 & (b-3d)+3((a+2c)-4d) \end{bmatrix}$$

Dari matriks di atas terlihat bahwa sistem persamaan linear tersebut hanya mempunyai penyelesaian jika $(b-3d)+3((a+2c)-4d)=0$, sedangkan yang diminta ialah sebarang nilai a , b , c , dan d . Jadi, u , v , w tidak merentang seluruh ruang $M_{2 \times 2}$.

Jadi, u , v , w bukan basis untuk $M_{2 \times 2}$.

Definisi 5.9:

sebuah ruang vektor tak nol V disebut berdimensi berhingga jika ruang vektor tersebut mengandung sebuah himpunan berhingga dari sebuah vektor $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ yang membentuk basis. Jika tidak ada himpunan seperti itu, maka V disebut berdimensi takberhingga. Kecuali ruang vektor nol tidak mempunyai basis, namun dianggap berdimensi berhingga.

Contoh 5.19

R^3 , P_3 dan $M_{2 \times 2}$ adalah ruang vektor berdimensi berhingga.

Teorema 5.5:

Jika $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ adalah basis untuk ruang vektor V , maka setiap himpunan dengan lebih dari n vektor adalah takbebas linear.

Bukti:

Misalkan $P = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ adalah sebarang himpunan m vektor pada V , dimana $m > n$. akan di tunjukkan bahwa P adalah tak bebas linear. Dan $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ merupakan basis ruang vektor V yang berdimensi berhingga, maka setiap $w_1, w_2, \dots, w_m$ dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor S , sehingga diperoleh,

$$\begin{aligned} w_1 &= a_{11}v_1 + a_{21}v_2 + a_{31}v_3 + \dots + a_{n1}v_n \\ w_2 &= a_{12}v_1 + a_{22}v_2 + a_{32}v_3 + \dots + a_{n2}v_n \\ &\vdots \\ w_m &= a_{1m}v_1 + a_{2m}v_2 + a_{3m}v_3 + \dots + a_{nm}v_n \end{aligned}$$

Untuk memperlihatkan bahwa P adalah tak bebas linear, maka kita harus mencari skalar-skalar $k_1, k_2, k_3, \dots, k_m$ yang tidak semuanya nol, sehingga

$$k_1w_1 + k_2w_2 + k_3w_3 + \dots + k_mw_m = 0$$

Dilakukan substitusi, sehingga dapat ditulis kembali

$$\begin{aligned} &k_1(a_{11}v_1 + a_{21}v_2 + a_{31}v_3 + \dots + a_{n1}v_n) \\ &+ k_2(a_{12}v_1 + a_{22}v_2 + a_{32}v_3 + \dots + a_{n2}v_n) \\ &+ k_3(a_{13}v_1 + a_{23}v_2 + a_{33}v_3 + \dots + a_{n3}v_n) \\ &\vdots \\ &+ k_m(a_{1m}v_1 + a_{2m}v_2 + a_{3m}v_3 + \dots + a_{nm}v_n) = 0 \end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned} &(a_{11}k_1 + a_{12}k_2 + a_{13}k_3 + \dots + a_{1m}k_m)v_1 \\ &+ (a_{21}k_1 + a_{22}k_2 + a_{23}k_3 + \dots + a_{2m}k_m)v_2 \\ &+ (a_{31}k_1 + a_{32}k_2 + a_{33}k_3 + \dots + a_{3m}k_m)v_3 \\ &\vdots \\ &+ (a_{n1}k_1 + a_{n2}k_2 + a_{n3}k_3 + \dots + a_{nm}k_m)v_n = 0 \end{aligned}$$

Karena S bebas linear, maka

$$\begin{aligned} a_{11}k_1 + a_{12}k_2 + a_{13}k_3 + \dots + a_{1m}k_m &= 0 \\ a_{21}k_1 + a_{22}k_2 + a_{23}k_3 + \dots + a_{2m}k_m &= 0 \\ a_{31}k_1 + a_{32}k_2 + a_{33}k_3 + \dots + a_{3m}k_m &= 0 \\ &\vdots \\ a_{n1}k_1 + a_{n2}k_2 + a_{n3}k_3 + \dots + a_{nm}k_m &= 0 \end{aligned}$$

Karena $m > n$ maka sistem persamaan linear homogen di atas mempunyai penyelesaian tak trivial yang berarti skalar-skalar $k_1, k_2, k_3, \dots, k_m$ tidak semuanya bernilai nol dan berarti P tak bebas linear.

Teorema 5.6:

Sebarang dua basis untuk ruang vektor berdimensi berhingga mempunyai jumlah vektor yang sama.

Untuk teorema 4.6 silahkan pembaca untuk membuktikan.

Definisi 5.10:

Dimensi sebuah ruang vektor V yang berdimensi berhingga didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada basis untuk V . Ruang vektor nol mempunyai dimensi nol.

Contoh 5.20

Tentukanlah basis dan dimensi untuk ruang pemecahan dari sistem homogen

$$x_1 + 4x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 0$$

$$2x_1 - 8x_2 + 6x_3 - 2x_4 = 0$$

Penyelesaian:

$$x_1 - 4x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 0$$

$$2x_1 - 8x_2 + 6x_3 - 2x_4 = 0$$

Sistem persamaan linear ini dapat diselesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 & -4 & 0 \\ 2 & -8 & 6 & -2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{b_2 - 2b_1} \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Sehingga diperoleh solusi sebagai berikut

$$x_1 - 4x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 0$$

atau

$$x_1 = 4x_2 - 3x_3 + 4x_4$$

Karena x_2 dapat ditetapkan dengan sebarang nilai r , x_3 dapat diberikan sebarang nilai s , dan x_4 dapat diberikan sebarang nilai t , maka terdapat tak terhingga banyak solusi/pemecahan. Himpunan pemecahan diberikan rumus-rumus sebagai berikut

$$x_1 = 4r - 3s + 4t, \quad x_2 = r, \quad x_3 = s, \quad x_4 = t$$

Sehingga vektor-vektor pemecahan tersebut dapat dituliskan sebagai:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4r - 3s + 4t \\ r \\ s \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4r \\ r \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3s \\ 0 \\ s \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4t \\ 0 \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

jadi, basis ruang penyelesaian sistem persamaan linear diatas adalah $\{(4, 1, 0, 0), (-3, 0, 1, 0), (4, 0, 0, 1)\}$ dan dimensi 3.

Latihan 5.6

- Diantara himpunan-himpunan vektor di bawah ini yang manakah untuk ruang vektor. Jelaskan
 - $A = \{u_1 = (3, -1), u_2 = (3, 2)\}$ untuk ruang R^2
 - $A = \{u_1 = (4, 1), u_2 = (-7, -8)\}$ untuk ruang R^2
 - $A = \{u_1 = (1, 2), u_2 = (1, 2), u_3 = (2, 7)\}$ untuk ruang R^2
 - $A = \{u_1 = (2, -3, 1), u_2 = (4, 1, 1), u_3 = (0, -7, 1)\}$ ruang R^3
 - $A = \{u_1 = (1, 6, 4), u_2 = (2, 4, -1), u_3 = (-1, 2, 5)\}$ ruang R^3
- Diantara himpunan-himpunan vektor di bawah ini yang manakah untuk ruang vektor. Jelaskan
 - $p_1 = 1 - 3x + 2x^2$, $p_2 = 1 + x + 4x^2$, $p_3 = 1 - 7x$
 - $p_1 = 4 + 6x + x^2$, $p_2 = -1 + 4x + 2x^2$, $p_3 = 5 + 2x - x^2$
 - $p_1 = 1 + x + x^2$, $p_2 = x + x^2$, $p_3 = x^2$
 - $p_1 = -4 + x + 3x^2$, $p_2 = 6 + 5x + 2x^2$, $p_3 = 8 + 4x + x^2$
 - $p_1 = 2 + x + 2x^2 + 2x^3$, $p_2 = 2 + 4x + 10x^2 + 6x^3$,
 $p_3 = 2 + 2x + x^2 + x^3$, $p_4 = 2 + 4x + 13x^2 + 6x^3$
- Apakah himpunan vektor di bawah ini basis ruang vektor atau bukan basis ruang vektor.

$$m_1 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad m_2 = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad m_3 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad m_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

- Tentukanlah dimensi dan basis untuk ruang pemecahan sistem homogen.
 - $$\begin{aligned} x - 4y + 3z - w &= 0 \\ 2x - 8y + 6z - 2w &= 0 \end{aligned}$$
 - $$\begin{aligned} 2x + y + 3z &= 0 \\ x + 5z &= 0 \\ y + z &= 0 \end{aligned}$$
 - $$x - 3y + z = 0$$

$$2x - 6y + 2z = 0$$

$$x - 9y + 3z = 0$$

$$d. \quad 2x + 2y + z = 0$$

$$3x + 2y + 2z = 0$$

$$2x - 9y + 3z = 0$$

5. Buktikan teorema 5.6.

5.7. Ruang Baris dan Kolom

Pada bagian ini akan dibahas ruang vektor tertentu yang diasosiasikan dengan matriks-matriks. Prosedur sederhana untuk mencari basis dengan mereduksi matriks

yang sesuai dengan bentuk eselon baris.

Definisi 5.11:

Tinjau matriks $n \times n$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Vektor-vektor

$$\begin{aligned} r_1 &= (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}) \\ r_2 &= (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}) \\ &\vdots \\ r_m &= (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}) \end{aligned}$$

terbentuk dari baris-baris A yang disebut dengan vektor-vektor baris A , dan vektor-vektor

$$c_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, c_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, c_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

Terbentuk dari kolom-kolom A yang disebut dengan vektor-vektor kolom A . Subruang R^n yang direntang oleh vektor-vektor baris yang disebut dengan ruang baris A dan subruang R^m yang direntang oleh vektor-vektor kolom disebut dengan ruang kolom A .

Contoh 5.21

Tentukan vektor-vektor baris dan vektor-vektor kolom matriks berikut.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & -8 \\ 2 & 4 & 2 & 2 \\ 4 & 6 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

Vektor-vektor baris A adalah

$$\begin{aligned} b_1 &= (2, 1, 3, -8) \\ b_2 &= (2, 4, 2, 2) \\ b_3 &= (4, 6, 4, 2) \end{aligned}$$

Vektor-vektor baris A adalah

$$\begin{aligned} k_1 &= (2, 2, 4) \\ k_2 &= (1, 4, 6) \\ k_3 &= (3, 2, 4) \\ k_4 &= (-8, 2, 2) \end{aligned}$$

Contoh 5.22

Tentukan basis ruang kolom dan basis ruang baris beserta dimensi basis ruang kolom dan basis ruang baris.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

Basis untuk ruang baris

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_2 - b_1 \\ b_3 - 2b_1 \end{matrix} &\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ -1 \times b_2 \\ \end{matrix} \sim \\
 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_3 + b_2 \\ \\ \end{matrix} &\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_1 - b_2 \\ \\ \end{matrix} \sim \\
 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_2 + b_3 \\ \\ \end{matrix} &\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Jadi, basis untuk ruang baris adalah $\{(1,0,1,2), (0,1,1,0), (0,0,0,1)\}$ sehingga dimensi ruang baris A adalah 3.

Basis untuk ruang kolom

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_2 - b_1 \\ b_2 - 2b_1 \\ b_3 - b_1 \end{matrix} &\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ -1 \times b_2 \\ \\ \end{matrix} \sim \\
 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_3 + b_2 \\ b_4 - b_2 \\ \\ \end{matrix} &\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_4 \text{ ditukar } b_2 \\ \\ \\ \end{matrix} \sim
 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_1 - b_2 \\ \\ \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_1 - b_2 \\ \\ \end{matrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_1 - b_3 \\ b_2 - b_3 \\ \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_1 - b_3 \\ b_2 - b_3 \\ \end{matrix}$$

Jadi, basis untuk ruang kolom adalah

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ sehingga dimensi ruang kolom } A \text{ adalah 3.}$$

Teorema 5.7:

Operasi baris elemeter tidak mengubah ruang baris sebuah matriks.

Teorema 5.8:

Vektor-vektor baris tak nol berbenuk eselon baris dari matriks A membentuk basis untuk ruang baris A .

Teorema 5.9:

Jika A adalah sebarang matriks, maka ruang baris dan ruang kolom A mempunyai dimensi yang sama.

Definisi 5.12:

Dimensi ruang baris dan ruang kolom matriks A disebut dengan *rank* A dan disimbolkan dengan $\text{rank}(A)$.

Contoh 5.23

Untuk contoh 5.22 mempunyai rank 3.

Latihan 5.7

1. Tentukan vektor baris dan vektor kolom matriks

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \\ 3 & 5 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Tentukan basis ruang baris dan basis ruang kolom beserta rank A .

a. $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \\ 3 & 5 & 7 & 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 & 5 \\ 3 & 7 & 5 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$

BAB 6

RUANG HASIL-KALI DALAM

6.1. Ruang Hasil-Kali Dalam

Sudah kita bahas hasil kali dalam Euclides pada ruang vektor R^n . Pada bab ini akan dibahas hasil kali dalam dari sebarang ruang vektor real.

Definisi 6.1:

Misalkan V ruang vektor. Operasi mengaitkan anggota V , misalkan $u, v \in V$, dengan bilangan real, yang ditulis sebagai $\langle u, v \rangle$, disebut hasil kali dalam jika memenuhi keempat aksioma berikut:

1. $\forall u, v \in V$, berlaku $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle \in V$ (Kesimetrian)
2. $\forall u, v, w \in V$, $\exists \langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle \in V$ (Penjumlahan)
3. $\forall u, v \in V$ dan $\forall k \in R$ berlaku $\langle ku, v \rangle = k\langle u, v \rangle \in V$ (Kehomogenan)
4. $\forall u \in V$, berlaku $\langle u, u \rangle \geq 0$ dan $\langle u, u \rangle = 0$ jika dan hanya jika $u = 0$ (Kepositifan)

Sebuah ruang vektor real dengan sebuah hasil kali dalam disebut dengan ruang hasil kali dalam real.

Contoh 6.1

Untuk $u, v \in R^2$ didefinisikan operasi bilangan real berikut.

$$\langle u, v \rangle = 2u_1v_1 + u_2v_1 + u_1v_2 + 2u_2v_2$$

Apakah operasi ini merupakan hasil kali dalam?

Penyelesaian:

1. Ambil $u, v \in R^2$, maka

$$\begin{aligned}\langle u, v \rangle &= 2u_1v_1 + u_2v_1 + u_1v_2 + 2u_2v_2 \\ &= 2v_1u_1 + v_2u_1 + v_1u_2 + 2v_2u_2 \\ &= \langle v, u \rangle\end{aligned}$$

2. Ambil $u, v, w \in R^2$, maka

$$\begin{aligned}\langle u+v, w \rangle &= 2(u_1+v_1)w_1 + (u_2+v_2)w_1 + (u_1+v_1)w_2 + \\ &\quad 2(u_2+v_2)w_2 \\ &= 2u_1w_1 + 2v_1w_1 + u_2w_1 + v_2w_1 + u_1w_2 + v_1w_2 + \\ &\quad 2u_2w_2 + 2v_2w_2 \\ &= 2u_1w_1 + u_2w_1 + u_1w_2 + 2u_2w_2 + 2v_1w_1 + v_2w_1 + \\ &\quad v_1w_2 + 2v_2w_2 \\ &= 2u_1w_1 + u_2w_1 + u_1w_2 + 2u_2w_2 + 2v_1w_1 + v_2w_1 + \\ &\quad v_1w_2 + 2v_2w_2 \\ &= \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle\end{aligned}$$

3. Ambil $u, v \in R^2$ dan $k \in R$, maka

$$\begin{aligned}\langle ku, v \rangle &= 2ku_1v_1 + ku_2v_1 + ku_1v_2 + 2ku_2v_2 \\ &= k(2u_1v_1 + u_2v_1 + u_1v_2 + 2u_2v_2) \\ &= k\langle u, v \rangle\end{aligned}$$

4. Ambil $u \in R^2$, maka

$$\begin{aligned}\langle u, u \rangle &= 2u_1u_1 + u_2u_1 + u_1u_2 + 2u_2u_2 \\ &= 2u_1^2 + 2u_1u_2 + 2u_2^2 \\ &= 2(u_1 + u_2)^2 - 2u_1u_2\end{aligned}$$

Karena $(u_1 + u_2)^2 \geq u_1u_2$, maka $2(u_1 + u_2)^2 - 2u_1u_2 \geq 0$.
Jadi, $\langle u, u \rangle \geq 0$. Selanjutnya jika $\langle u, u \rangle = 0$ yang artinya
 $2(u_1 + u_2)^2 - 2u_1u_2 = 0$, hanya dipenuhi $u_1 = u_2 = 0$. Jadi,
 $\langle u, u \rangle = 0$ jika dan hanya jika $u = (u_1, u_2) = 0$.

Karena semua aksioma dipenuhi maka
 $\langle u, v \rangle = 2u_1v_1 + u_2v_1 + u_1v_2 + 2u_2v_2$ merupakan hasil kali
dalam pada R^2 .

Contoh 6.2

Untuk $u, v \in M_{2 \times 2}$ didefinisikan operasi bilangan real
berikut.

$$\langle u, v \rangle = \left\langle \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{vmatrix} \right\rangle = u_1v_1 + u_2v_3 + u_3v_2 + u_4v_4$$

Apakah operasi ini merupakan hasil kali dalam?

Penyelesaian:

1. Ambil $u, v \in M_{2 \times 2}$, maka

$$\begin{aligned}\langle u, v \rangle &= \left\langle \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{vmatrix} \right\rangle \\ &= u_1v_1 + u_2v_3 + u_3v_2 + u_4v_4\end{aligned}$$

$$= v_1 u_1 + v_2 u_3 + v_3 u_2 + v_4 u_4$$

$$= \left\langle \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{vmatrix} \right\rangle$$

$$= \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$$

Jadi, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$

2. Ambil $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in M_{2 \times 2}$, maka

$$\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \left\langle \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} w_1 & w_2 \\ w_3 & w_4 \end{vmatrix} \right\rangle$$

$$= \left\langle \begin{vmatrix} u_1 + v_1 & u_2 + v_2 \\ u_3 + v_3 & u_4 + v_4 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} w_1 & w_2 \\ w_3 & w_4 \end{vmatrix} \right\rangle$$

$$= (u_1 + v_1)w_1 + (u_2 + v_2)w_3 + (u_3 + v_3)w_2 + (u_4 + v_4)w_4$$

$$= (u_1 w_1 + u_2 w_3 + u_3 w_2 + u_4 w_4) + (v_1 w_1 + v_2 w_3 + v_3 w_2 + v_4 w_4)$$

$$= \left\langle \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} w_1 & w_2 \\ w_3 & w_4 \end{vmatrix} \right\rangle + \left\langle \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} w_1 & w_2 \\ w_3 & w_4 \end{vmatrix} \right\rangle$$

$$= \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$$

Jadi, $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$

3. Ambil $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in M_{2 \times 2}$ dan $k \in \mathbb{R}$, maka

$$\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \left\langle k \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{vmatrix} \right\rangle$$

$$= \left\langle \begin{vmatrix} ku_1 & ku_2 \\ ku_3 & ku_4 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{vmatrix} \right\rangle$$

$$= ku_1 v_1 + ku_2 v_3 + ku_3 v_2 + ku_4 v_4$$

$$= k(u_1 v_1 + u_2 v_3 + u_3 v_2 + u_4 v_4)$$

$$= k\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$$

Jadi, $\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$

4. Ambil $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$, maka

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = u_1 u_1 + u_2 u_3 + u_3 u_2 + u_4 u_4$$

$$= u_1^2 + 2u_2 u_3 + u_4^2$$

$u_1^2 + u_4^2 + 2u_2 u_3 \geq 0$ tidak selamanya $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$ karena ada $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \leq 0$. Sehingga aksioma 4 tidak terpenuhi yang mengakibatkan bukan hasil kali dalam $M_{2 \times 2}$.

Teorema 6.1:

Jika $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ adalah vektor-vektor pada ruang hasil kali dalam real dan k sebarang scalar, maka

1. $\langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{0} \rangle = 0$
2. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$
3. $\langle \mathbf{u}, k\mathbf{v} \rangle = k\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$

Untuk teorema 6.1 bagian 1 silahkan pembaca membuktikan.

Bukti:

2. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{v} + \mathbf{w}, \mathbf{u} \rangle$ (kesimetrian)
 $= \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{u} \rangle$ (Penjumlahan)
 $= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$ (kesimetrian)
3. $\langle \mathbf{u}, k\mathbf{v} \rangle = \langle k\mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$ (kesimetrian)
 $= k\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$ (kehomogenan)
 $= k\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ (kesimetrian)

Latihan 6.1

- Misalkan $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ adalah hasil kali dalam Euclides pada R^2 , dan misalkan $\mathbf{u} = (2, 3)$, $\mathbf{v} = (3, 4)$, dan $\mathbf{w} = (1, 2)$, dan $k = 3$.
- Untuk $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ dan $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$, apakah di bawah ini merupakan hasil kali dalam pada R^2 . Untuk yang bukan hasil kali dalam, daftarkanlah aksioma berapa yang tidak memenuhi.
 - $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 4u_1v_1 + 2u_2v_2$
 - $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_1v_1 + 7u_2v_2$
 - $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 4u_1v_1 + u_1v_2 + 4u_2v_2$
- Untuk $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ dan $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, apakah di bawah ini merupakan hasil kali dalam pada R^3 . Untuk yang bukan hasil kali dalam, daftarkanlah aksioma berapa yang tidak memenuhi.
 - $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$
 - $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2$
 - $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_1v_1 + u_2v_2 + 4u_3v_3$
 - $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 - u_2v_2 + u_3v_3$

4. Untuk $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in M_{2 \times 2}$ didefinisikan operasi bilangan real berikut.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{vmatrix} = 7u_2v_2 + 6u_4v_4$$

Apakah operasi ini merupakan hasil kali dalam?

5. Misalkan $\mathbf{u} = a_0 + a_1x + a_2x^2$ dan $\mathbf{v} = b_0 + b_1x + b_2x^2$ dimana $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in P_2$ didefinisikan operasi bilangan real berikut.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3a_0b_0 + 2a_1b_1 + a_2b_2$$

Apakah operasi ini merupakan hasil kali dalam?

6.2. Panjang dan Sudut

Dalam subbab ini kita akan membahas mengenai panjang, jarak, dan sudut di ruang hasil kali dalam yang umum.

Definisi 6.2:

Misalkan V ruang hasil kali dalam dan misalkan $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, maka:

- Panjang vektor $\mathbf{u}$ didefinisikan sebagai $\|\mathbf{u}\| = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle^{1/2}$
- Jarak antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ didefinisikan sebagai $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle^{1/2}$
- Kosinus sudut antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ didefinisikan sebagai $\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$, jika $\mathbf{u} \neq 0$ dan $\mathbf{v} \neq 0$.

Contoh 6.3

Diketahui hasil kali dalam $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$ dan diberikan $\mathbf{u} = (1, 3, 5)$ dan $\mathbf{v} = (0, 1, 2)$, hitunglah:

- Panjang $\mathbf{u}$ dan panjang $\mathbf{v}$
- Jarak antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$
- Kosinus antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$

Penyelesaian:

- a. - Panjang $\mathbf{u}$ yaitu

$$\begin{aligned}\|\mathbf{u}\| &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle^{1/2} = (2 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 5 \cdot 5)^{1/2} \\ &= (2 + 9 + 25)^{1/2} = (36)^{1/2} = 6\end{aligned}$$

- Panjang $\mathbf{v}$ yaitu

$$\begin{aligned}\|\mathbf{v}\| &= \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle^{1/2} = (2 \cdot 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2)^{1/2} \\ &= (1 + 4)^{1/2} = (5)^{1/2} = \sqrt{5}\end{aligned}$$

- b. Jarak antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ yaitu:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| &= \langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle^{1/2} = \langle (1, 2, 3), (1, 2, 3) \rangle^{1/2} \\ &= (2 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3)^{1/2}\end{aligned}$$

- c. Kosinus sudut antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ yaitu:

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 5 \cdot 2}{6 \cdot \sqrt{5}} \\ &= \frac{3 + 10}{6 \cdot \sqrt{5}} = \frac{13}{6 \cdot \sqrt{5}}\end{aligned}$$

Definisi 6.3:

Misalkan V ruang hasil kali dalam dan misalkan $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$. $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ disebut saling orthogonal jika $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$.

Contoh 6.4

Terhadap hasil kali dalam $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 + u_4v_4$, selidiki apakah $\mathbf{u} = (1, 2, 3, -2)$ dan $\mathbf{v} = (2, 3, 8, 1)$ saling orthogonal?

Penyelesaian:

Akan diselidiki apakah $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ saling orthogonal,

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 + u_4v_4 \\ &= 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 8 + (-2) \cdot 1 = 30\end{aligned}$$

Karena $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \neq 0$ maka $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ tidak saling orthogonal.

Definisi 6.4:

Misalkan V ruang hasil kali dalam dan misalkan $W = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n) \subseteq V$. vektor $\mathbf{v} \in V$ disebut orthogonal pada himpunan W jika $\mathbf{v}$ orthogonal pada setiap anggota W atau untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$ berlaku $\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{v} \rangle = 0$.

Contoh 6.5

Untuk hasil kali dalam $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_1v_1 + 2u_2v_2 + u_3v_3 + u_4v_4$, untuk ruang vektor $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^4$, selidiki apakah $\mathbf{u} = (2, 3, -1, 2)$,

dan $W = \{a = (4, 3, 8, -9), b = (0, 4, 8, -8), c = (3, 1, 2, -8), d = (2, 1, 2, -6)\}$.

Penyelesaian:

Diketahui $\langle u, v \rangle = 2u_1v_1 + 2u_2v_2 + u_3v_3 + u_4v_4$, maka

$$\langle u, a \rangle = 2.2.4 + 2.3.3 + (-1).8 + 2.(-9) = 0$$

$$\langle u, b \rangle = 2.2.0 + 2.3.4 + (-1).8 + 2.(-8) = 0$$

$$\langle u, c \rangle = 2.2.3 + 2.3.1 + (-1).2 + 2.(-8) = 0$$

$$\langle u, d \rangle = 2.2.2 + 2.3.1 + (-1).2 + 2.(-6) = 0$$

Jadi, u orthogonal terhadap himpunan W .

Definisi 6.5:

Misalkan V ruang hasil kali dalam dan misalkan $W = (u_1, u_2, \dots, u_n) \subseteq V$. W disebut himpunan orthogonal jika setiap dua anggota W yang berbeda saling orthogonal atau $\langle u_i, v_j \rangle = 0$, untuk setiap $i \neq j$, dengan $i, j = 1, 2, \dots, n$.

Contoh 6.6

Untuk hasil kali dalam $\langle u, v \rangle = 2u_1v_1 + 2u_2v_2 + u_3v_3 + u_4v_4$, untuk ruang vektor $u, v \in R^4$, selidiki apakah dan $W = \{a = (4, 3, 5, -2), b = (0, 5, -4, 5), c = (4, 1, 0, -2)\}$.

Penyelesaian:

Diketahui $\langle u, v \rangle = 2u_1v_1 + 2u_2v_2 + u_3v_3 + u_4v_4$, maka

$$\langle a, b \rangle = 2.4.0 + 2.3.5 + 5.(-4) + (-2).5 = 0$$

$$\langle a, c \rangle = 2.4.4 + 2.3.1 + 5.0 + (-2).(-2) = 42$$

$$\langle b, c \rangle = 2.0.4 + 2.5.1 + (-4).0 + 5.(-2) = 0$$

Jadi, himpunan W bukan ortogonal.

Latihan 6.2

- Diketahui hasil kali dalam $\langle u, v \rangle = 3u_1v_1 + 2u_2v_2 + u_3v_3 + u_4v_4$ dan diberikan $u = (1, 3, 5, 4)$ dan $v = (0, 1, 2, 3)$, $w = (2, 2, 0, 3)$, hitunglah:
 - Panjang u , panjang v , dan panjang w
 - Jarak antara u dan v ,
 - jarak antara v dan w ,
 - jarak antara u dan w .
 - Kosinus antara u dan v
 - Kosinus antara u dan w
- Selidiki manakah himpunan-himpunan di bawah ini yang merupakan himpunan ortogonal, untuk hasil kali dalam pada R^4
 - $N = \{u_1 = (0, 2, 3, -3), u_2 = (-1, -3, 2, 0)\}$
 - $N = \{u_1 = (0, 3, 1, -3), u_2 = (0, 1, 3, 2), u_3 = (1, 0, 0, 0), u_4 = (0, 11, -9, 8)\}$
 - $N = \{u_1 = (1, 0, 2, 2), u_2 = (0, 1, 2, -2), u_3 = (-16, 0, 4, 4), u_4 = (0, 4, -1, 1)\}$
 - $N = \{u_1 = (1, 2, 0, 1), u_2 = (-2, 1, 2, 0), u_3 = (2, 0, 1, -1)\}$

$$u_4 = (6, -16, 7, 13)\}$$

3. Untuk hasil kali dalam $\langle u, v \rangle = 2u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 + 2u_4v_4$ manakah himpunan orthogonal dari himpunan-himpunan yang terdapat pada soal no.2.
4. Tentukanlah k jika pasangan vektor di bawah ini saling orthogonal terhadap hasil kali dalam yang diberikan.
 - a. Jika $u = (2, k, 3)$ dan $v = (-1, 2k, k)$ terhadap hasil kali dalam Euclides.
 - b. Jika $u = (2, k, 3)$ dan $v = (-1, 2k, k)$ terhadap hasil kali dalam $\langle u, v \rangle = u_1v_1 + 2u_2v_2 + 4u_3v_3$
 - c. Jika $u = 5 + kx^2$ dan $v = 5 - kx^2$ terhadap hasil kali dalam $\langle u, v \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_3b_3$
 - d. Jika $u = 5 + kx^2$ dan $v = 5 - kx^2$ terhadap hasil kali dalam $\langle u, v \rangle = \int_{-1}^1 u(x)v(x)dx$

6.3. Ortonormalisasi

Definisi 6.6:

Misalkan V ruang hasil kali dalam $W = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ himpunan W disebut himpunan ortonormal jika W himpunan orthogonal dan panjang setiap anggota W adalah satu. Dapat ditulis sebagai berikut:

1. $\langle u_i, u_j \rangle = 0$, untuk $i, j = 1, 2, \dots, n$ dan $i \neq j$
2. $\|u_i\| = 1$, untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$

Contoh 6.7

Misalkan $W = \{v_1, v_2, v_3\}$ dimana: $v_1 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$,

$$v_2 = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right), \quad v_3 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), \quad \text{hasil kali dalam Euclides.}$$

Apakah W membentuk himpunan ortonormal?

Penyelesaian:

Langkah pertama yang harus ditempuh yaitu membuktikan apakah himpunan W orthogonal.

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} \cdot -\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{4}{9} - \frac{2}{9} - \frac{2}{9}\right) = 0$$

$$\langle v_1, v_3 \rangle = \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{9} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9}\right) = 0$$

$$\langle v_2, v_3 \rangle = \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{9} + \frac{2}{9} - \frac{4}{9}\right) = 0$$

Jadi, W himpunan orthogonal.

Selanjutnya yang harus kita buktikan adalah apakah panjang setiap vektor adalah satu.

$$\|v_1\| = \langle v_1, v_1 \rangle = \left(\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{2}{3} \cdot -\frac{2}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}\right)\right)^{1/2}$$

$$= \left(\left(\frac{4}{9} \right) + \left(\frac{4}{9} \right) + \left(\frac{1}{9} \right) \right)^{1/2} = \left(\frac{9}{9} \right)^{1/2} = \sqrt{1} = 1$$

$$\begin{aligned} \|v_2\| = \langle v_2, v_2 \rangle &= \left(\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \right) + \left(-\frac{2}{3} \cdot -\frac{2}{3} \right) \right)^{1/2} \\ &= \left(\left(\frac{4}{9} \right) + \left(\frac{1}{9} \right) + \left(\frac{4}{9} \right) \right)^{1/2} = \left(\frac{9}{9} \right)^{1/2} = \sqrt{1} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|v_3\| = \langle v_3, v_3 \rangle &= \left(\left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \right) + \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \right) \right)^{1/2} \\ &= \left(\left(\frac{1}{9} \right) + \left(\frac{4}{9} \right) + \left(\frac{4}{9} \right) \right)^{1/2} = \left(\frac{9}{9} \right)^{1/2} = \sqrt{1} = 1 \end{aligned}$$

Jadi, panjang setiap anggota W adalah satu.

Karena W himpunan orthogonal dan panjang setiap anggota W adalah satu, sehingga himpunan W merupakan ortonormal.

Teorema 6.2:

jika $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ adalah basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam V , dan u adalah sebarang vektor dalam V , maka

$$u = \langle u, v_1 \rangle v_1 + \langle u, v_2 \rangle v_2 + \dots + \langle u, v_n \rangle v_n$$

Bukti:

$S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ adalah basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam V , dan u adalah sebarang vektor dalam V maka

setiap vektor di V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S .

$$u = k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_n v_n$$

Selanjutnya, kalikan u dengan hasil kali dalam yang sesuai dengan salah satu vektor pada basis S ini, misalkan v_i untuk $i = 1, 2, \dots, n$, sehingga:

$$\begin{aligned} \langle u, v_i \rangle &= \langle k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_n v_n, v_i \rangle \quad \text{aksioma penjumlahan} \\ &= \langle k_1 v_1, v_i \rangle + \langle k_2 v_2, v_i \rangle + \dots + \langle k_n v_n, v_i \rangle \quad \text{kehomogenan} \\ &= k_1 \langle v_1, v_i \rangle + k_2 \langle v_2, v_i \rangle + \dots + k_n \langle v_n, v_i \rangle \end{aligned}$$

Karena $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ adalah himpunan ortonormal maka diperoleh

$$\langle v_i, v_i \rangle = \|v_i\| = 1 \text{ dan } \langle v_i, v_j \rangle = 0, \text{ jika } i \neq j$$

Maka persamaan di atas dapat kita sederhanakan menjadi $\langle u, v_i \rangle = k_i$.

Contoh 6.8

Tentukan kombinasi linear $u = (2, -1, 3)$ terhadap basis ortonormal

$$W = \{v_1 = (1, 2, 6), v_2 = (1, 3, 4), v_3 = (-2, 2, 3)\}$$

Terhadap hasil kali dalam.

Penyelesaian:

$$k_1 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle = (2.1 + (-1).2 + 3.6) = 18$$

$$k_2 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle = (2.1 + (-1).3 + 3.4) = 11$$

$$k_3 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_3 \rangle = (2.-2 + (-1).2 + 3.3) = 3$$

Jadi, kombinasi linear $\mathbf{u}$ terhadap basis W adalah $\mathbf{u} = 18\mathbf{v}_1 + 11\mathbf{v}_2 + 3\mathbf{v}_3$.

Selanjutnya akan dibahas bagaimana mendapatkan basis ortonormal. Sebelum kita membahas proses mendapatkan basis ortonormal, maka perlu di ingatkan tentang proyeksi orthogonal dan komponen vektor yang orthogonal terhadap vektor lain. Jika W dibangun oleh sehimpunan vektor ortonormal $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ maka proyeksi orthogonal $\mathbf{v}$ terhadap W adalah:

$$\text{proy}_W \mathbf{v} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2 + \dots + \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_n \rangle \mathbf{u}_n$$

Hal ini disebabkan $\text{proy}_W \mathbf{v}$ terletak di W dan $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ himpunan ortonormal yang berarti panjang setiap anggota himpunan adalah satu atau $\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_i \rangle = 1$. Sedangkan komponen $\mathbf{v}$ yang orthogonal terhadap W adalah $\mathbf{v} - \text{proy}_W \mathbf{v}$ atau

$$\mathbf{v} - \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 - \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2 - \dots - \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_n \rangle \mathbf{u}_n$$

Untuk mendapatkan vektor yang panjangnya satu dilakukan proses normalisasi yaitu dengan membagi vektor yang bersangkutan dengan panjang vektornya sendiri atau $\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$ yang dikenal vektor satuan.

Pengubahan basis sebarang menjadi basis ortonormal dengan menggunakan proses Gram-schmidt sebagai berikut:

Misalkan V ruang hasil kali dalam. Misalkan $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ basis sebarang dari V dan $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ basis ortonormal dari V yang akan di cari adalah:

1. $\mathbf{u}_1$ adalah vektor satuan $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|}$
2. $\mathbf{u}_2$ adalah komponen $\mathbf{v}_2$ yang orthogonal terhadap $\mathbf{u}_1$ dan panjangnya satu

$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{v}_2 - \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1}{\|\mathbf{v}_2 - \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1\|}$$

3. $\mathbf{u}_3$ adalah komponen $\mathbf{v}_3$ yang orthogonal terhadap $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ dan panjangnya satu

$$\mathbf{u}_3 = \frac{\mathbf{v}_3 - \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 - \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2}{\|\mathbf{v}_3 - \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 - \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2\|}$$

4. $\mathbf{u}_4$ adalah komponen $\mathbf{v}_4$ yang orthogonal terhadap $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ dan panjangnya satu

$$\mathbf{u}_4 = \frac{\mathbf{v}_4 - \langle \mathbf{v}_4, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 - \langle \mathbf{v}_4, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2 - \langle \mathbf{v}_4, \mathbf{u}_3 \rangle \mathbf{u}_3}{\|\mathbf{v}_4 - \langle \mathbf{v}_4, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 - \langle \mathbf{v}_4, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2 - \langle \mathbf{v}_4, \mathbf{u}_3 \rangle \mathbf{u}_3\|}$$

Langkah ini dapat diteruskan sampai dengan langkah yang ke- n .

$\mathbf{u}_n$ adalah komponen $\mathbf{v}_n$ yang orthogonal terhadap $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{n-1}\}$ dan panjangnya satu

$$u_n = \frac{v_n - \langle v_n, u_1 \rangle u_1 - \langle v_n, u_2 \rangle u_2 - \dots - \langle v_n, u_{n-1} \rangle u_{n-1}}{\|v_n - \langle v_n, u_1 \rangle u_1 - \langle v_n, u_2 \rangle u_2 - \dots - \langle v_n, u_{n-1} \rangle u_{n-1}\|}$$

Contoh 6.9

Terapkan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis $v_1 = (1,1,1)$, $v_2 = (0,1,1)$, $v_3 = (0,0,1)$ ke dalam basis ortonormal.

Penyelesaian:

Langkah 1

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

Langkah 2

$$\langle v_2, u_1 \rangle = 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$u_2 = \frac{v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1}{\|v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1\|} = \frac{(0,1,1) - \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)}{\left\| (0,1,1) - \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right\|}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(0,1,1) - \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right)}{\left\| (0,1,1) - \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right) \right\|} \\ &= \frac{\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)}{\left\| \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right) \right\|} = \frac{\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)}{\sqrt{\frac{4}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9}}} \\ &= \frac{\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)}{\frac{\sqrt{6}}{3}} = \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right) \end{aligned}$$

Langkah 3

$$\langle v_3, u_1 \rangle = 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\langle v_3, u_2 \rangle = 0 \cdot -\frac{2}{\sqrt{6}} + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

$$u_3 = \frac{v_3 - \langle v_3, u_1 \rangle u_1 - \langle v_3, u_2 \rangle u_2}{\|v_3 - \langle v_3, u_1 \rangle u_1 - \langle v_3, u_2 \rangle u_2\|}$$

$$= \frac{(0,0,1) - \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{1}{\sqrt{6}}\left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)}{\left\| (0,0,1) - \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{1}{\sqrt{6}}\left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right) \right\|}$$

$$= \frac{(0,0,1) - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) - \left(-\frac{2}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right)}{\left\| (0,0,1) - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) - \left(-\frac{2}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right) \right\|}$$

$$= \frac{(0,0,1) - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) - \left(-\frac{2}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right)}{\left\| (0,0,1) - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) - \left(-\frac{2}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right) \right\|}$$

$$= \frac{\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) - \left(-\frac{2}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right)}{\left\| \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) - \left(-\frac{2}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right) \right\|} = \frac{0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}}{\left\| 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\|}$$

$$= \frac{0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2} \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\text{Jadi, } \mathbf{u}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \quad \mathbf{u}_2 = \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right),$$

$$\mathbf{u}_3 = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \text{ membentuk basis ortonormal untuk } R^3.$$

Latihan 6.3

1. Yang manakah bagian berikut ini membentuk himpunan ortonormal?

a. $(1,0), (0,2)$ untuk R^2

b. $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ untuk R^2

c. $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ untuk R^3

d. $\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$ untuk R^3

e. $(1,0,0), \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), (0,0,1)$

2. Tentukan kombinasi linear dari $\mathbf{u} = (0, -2, 21)$ terhadap

hasil kali dalam Euclides $\mathbf{v}_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right),$

$$\mathbf{v}_2 = \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \mathbf{v}_3 = \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right),$$

$$\mathbf{v}_4 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right).$$

3. Misalkanlah R^2 mempunyai hasil kali dalam Euclides. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ ke dalam basis ortonormal.

a. $\mathbf{u}_1 = (1, -3), \mathbf{u}_2 = (2, 2)$

b. $\mathbf{u}_1 = (1, 0), \mathbf{u}_2 = (3, -5)$

4. Misalkanlah R^3 mempunyai hasil kali dalam Euclides. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis $\{u_1, u_2, u_3\}$ ke dalam basis ortonormal.

a. $u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (-1, 1, 0), u_3 = (1, 2, 1)$

b. $u_1 = (1, 1, 0), u_2 = (3, 7, -2), u_3 = (0, 4, 1)$

5. Misalkanlah R^4 mempunyai hasil kali dalam Euclides. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis $\{u_1, u_2, u_3\}$ ke dalam basis ortonormal.

$u_1 = (0, 2, 1, 0), u_2 = (1, -1, 0, 0), u_3 = (1, 2, 0, -1), u_4 = (1, 0, 0, 1)$

BAB 7 TRANSFORMASI LINEAR

7.1. Pengertian Transformasi Linear

Pada bab ini akan di bahas tentang fungsi F dari ruang vektor V ke ruang vektor W berarti setiap anggota V dikaitkan dengan tepat satu anggota di W . V disebut domain dan W disebut dengan kodomain.

Definisi 7.1:

Jika $F: V \rightarrow W$ adalah sebuah fungsi dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W , maka F dinamakan transformasi linear jika

(i) $F(u + v) = F(u) + F(v)$

(ii) $F(ku) = kF(u)$

Untuk sebarang skalar $a, b \in K$ dan sebarang vektor $v, w \in V$, diperoleh

$$F(av + bw) = F(av) + F(bw) = aF(v) + bF(w)$$

Secara umum, untuk sebarang skalar $a_i \in K$ dan sebarang vektor $v_i \in V$ diperoleh sifat-sifat dasar transformasi linear (pemetaan linear) berikut ini:

$$F(a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_mv_m) = a_1F(v_1) + a_2F(v_2) + \dots + a_mF(v_m)$$

Contoh 7.1

Jika $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah fungsi yang didefinisikan $F(x, y) = (2x + y, x - y)$. Apakah fungsi tersebut merupakan transformasi linear?

Penyelesaian:

1. Misalkan jika $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ dan $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$, maka

$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ sehingga,

$$\begin{aligned} F(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= F(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2), (x_1 + x_2) - (y_1 + y_2)) \\ &= (2x_1 + 2x_2 + y_1 + y_2, x_1 + x_2 - y_1 - y_2) \\ &= (2x_1 + y_1, x_1 - y_1) + (2x_2 + y_2, x_2 - y_2) \\ &= F(\mathbf{u}) + F(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

2. Jika k adalah sebuah skalar dan $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ maka

$k\mathbf{u} = (kx_1, ky_1)$ sehingga

$$\begin{aligned} F(k\mathbf{u}) &= F(kx_1, ky_1) \\ &= (2kx_1 + ky_1, kx_1 - ky_1) \\ &= k(2x_1 + y_1, x_1 - y_1) \\ &= kF(\mathbf{u}) \end{aligned}$$

Jadi, F merupakan transformasi linear.

Contoh 7.2

Jika $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah fungsi yang didefinisikan $F(x, y, z) = (\sqrt[3]{x}, \sqrt[3]{y})$. Apakah fungsi tersebut merupakan transformasi linear

Penyelesaian:

Misalkan jika $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ dan $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$, maka

$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ sehingga,

$$\begin{aligned} F(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= F(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (\sqrt[3]{x_1 + x_2}, \sqrt[3]{y_1 + y_2}) \end{aligned}$$

$$F(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \neq F(\mathbf{u}) + F(\mathbf{v})$$

Jadi, F merupakan bukan transformasi linear.

Contoh 7.3

Jika $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah fungsi yang didefinisikan $F(x, y, z) = (x, x + y - z)$. Apakah fungsi tersebut merupakan transformasi linear

Penyelesaian:

1. Jika $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$ dan $\mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2)$, maka

$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$ sehingga,

$$\begin{aligned} F(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= F(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \\ &= (x_1 + x_2, (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) - (z_1 + z_2)) \\ &= ((x_1, x_1 + y_1 - z_1) + (x_2, x_2 + y_2 - z_2)) \\ &= (2x_1 + y_1, x_1 - y_1) + (2x_2 + y_2, x_2 - y_2) \\ &= F(\mathbf{u}) + F(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

2. Jika k adalah sebuah skalar dan $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$ maka

$k\mathbf{u} = (kx_1, ky_1, kz_1)$ sehingga

$$\begin{aligned} F(k\mathbf{u}) &= F(kx_1, ky_1, kz_1) \\ &= (kx_1, kx_1 + ky_1 - kz_1) \\ &= k(x_1, x_1 + y_1 - z_1) \\ &= kF(\mathbf{u}) \end{aligned}$$

Jadi, F merupakan sebuah transformasi linear.

Contoh 7.4

Jika $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah fungsi yang didefinisikan $F(x, y, z) = (\sqrt[3]{x}, \sqrt[3]{y})$. Jika $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ dan $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$, maka $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ sehingga,

$$F(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = F(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ = (\sqrt[3]{x_1 + x_2}, \sqrt[3]{y_1 + y_2})$$

$$F(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \neq F(\mathbf{u}) + F(\mathbf{v})$$

Jadi, F merupakan bukan transformasi linear.

Contoh 7.5

Jika $F: M_{22} \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi yang didefinisikan $F\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = ad - bc$. Apakah fungsi tersebut merupakan transformasi linear?

Penyelesaian:

Misalkan jika $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}$ maka

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{bmatrix} \text{ sehingga,}$$

$$F(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = F\left(\begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{bmatrix}\right) \\ = (a_1 + a_2)(d_1 + d_2) - (b_1 + b_2)(c_1 + c_2) \\ = (a_1 d_1 + a_1 d_2 + a_2 d_1 + a_2 d_2) - (b_1 c_1 + b_1 c_2 + b_2 c_1 + b_2 c_2)$$

$$F(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \neq F(\mathbf{a}) + F(\mathbf{b})$$

Jadi, F bukan transformasi linear.

Contoh 7.6

Jika $F: M_{22} \rightarrow M_{22}$ adalah fungsi yang didefinisikan $F\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a+b & b+c \\ c+d & d+a \end{bmatrix}$. Apakah fungsi tersebut merupakan transformasi linear?

Penyelesaian:

1. Misalkan jika $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}$ maka

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{bmatrix} \text{ sehingga,}$$

$$F(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = F\left(\begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{bmatrix}\right) \\ = \begin{bmatrix} (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) & (b_1 + b_2) + (c_1 + c_2) \\ (c_1 + c_2) + (d_1 + d_2) & (d_1 + d_2) + (a_1 + a_2) \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 & b_1 + c_1 \\ c_1 + d_1 & d_1 + a_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 + b_2 & b_2 + c_2 \\ c_2 + d_2 & d_2 + a_2 \end{bmatrix} \\ = F(\mathbf{a}) + F(\mathbf{b})$$

2. Misalkan jika k adalah skalar dan $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}$ maka

$$k\mathbf{a} = \begin{bmatrix} ka_1 & kb_1 \\ kc_1 & kd_1 \end{bmatrix} \text{ sehingga}$$

$$F(k\mathbf{a}) = F\left(\begin{bmatrix} ka_1 & kb_1 \\ kc_1 & kd_1 \end{bmatrix}\right)$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} (ka_1 + kb_1) & (kb_1 + kc_1) \\ (kc_1 + kd_1) & (kd_1 + ka_1) \end{bmatrix} \\
&= k \begin{bmatrix} (a_1 + b_1) & (b_1 + c_1) \\ (c_1 + d_1) & (d_1 + a_1) \end{bmatrix} \\
&= kF \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} \\
&= kF(a)
\end{aligned}$$

Jadi, F merupakan transformasi linear.

Contoh 7.7

Jika $F: P_2 \rightarrow P_2$ adalah fungsi yang didefinisikan $F(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 + a_1(x+1) + a_2(x+1)^2)$. Apakah fungsi tersebut merupakan transformasi linear?

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}
1. \text{ Misalkan jika } p &= a_0 + a_1x + a_2x^2 \text{ dan } q = b_0 + b_1x + b_2x^2 \\
\text{maka } p + q &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 \text{ sehingga,} \\
F(p + q) &= F((a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2) \\
&= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)(x+1) + (a_2 + b_2)(x+1)^2 \\
&= (a_0 + a_1(x+1) + a_2(x+1)^2) + (b_0 + b_1(x+1) + b_2(x+1)^2) \\
&= F(p) + F(q)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2. \text{ Jika } k &\text{ adalah sebuah skalar dan } p = a_0 + a_1x + a_2x^2 \text{ maka} \\
kp &= (ka_0 + ka_1x + ka_2x^2) \text{ sehingga} \\
F(kp) &= F(ka_0 + ka_1x + ka_2x^2) \\
&= ka_0 + ka_1(x+1) + ka_2(x+1)^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= k(a_0 + a_1(x+1) + a_2(x+1)^2) \\
&= kF(p)
\end{aligned}$$

Jadi, F merupakan sebuah transformasi linear.

Latihan 7.1

- Jika $F: R^2 \rightarrow R^2$ adalah fungsi yang didefinisikan dibawah ini. Apakah fungsi di bawah ini merupakan transformasi linear? Jelaskan.
 - $F(x, y) = (2x, y)$
 - $F(x, y) = (y, x)$
 - $F(x, y) = (x, y+1)$
 - $F(x, y) = (x, 0)$
 - $F(x, y) = (x, y^2)$
- Jika $F: R^3 \rightarrow R^2$ adalah fungsi yang didefinisikan dibawah ini. Apakah fungsi di bawah ini merupakan transformasi linear? Jelaskan.
 - $F(x, y, z) = (2x, x+y+z)$
 - $F(x, y, z) = (1, 0)$
 - $F(x, y, z) = (0, 0)$
 - $F(x, y, z) = (x, 0)$
 - $F(x, y, z) = (2x+y, 3y-4z)$
- Jika $F: M_{22} \rightarrow R$ adalah fungsi yang didefinisikan dibawah ini. Apakah fungsi di bawah ini merupakan transformasi linear? Jelaskan.
 - $F \left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right) = a + c$

$$b. F\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = 2a + 3b + c - d$$

$$c. F\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = a^2 + b^2$$

4. Jika $F: P_2 \rightarrow P_2$ adalah fungsi yang didefinisikan dibawah ini. Apakah fungsi di bawah ini merupakan transformasi linear? Jelaskan.

$$a. F(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0 + (a_1 + a_2)x + (2a_0 + 3a_1)x^2$$

$$b. F(a_0 + a_1x + a_2x^2) = 1$$

$$c. F(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 + 2) + a_1x + a_2x^2$$

$$d. F(a_0 + a_1x + a_2x^2) = 0$$

7.2. Sifat Transformasi Linear; Kernel dan Jangkauan

Pada bab ini akan di bahas tentang beberapa sifat transformasi linear, kernel dan jangkauan.

Teorema 7.1:

Jika T Transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W maka sifat-sifat sebagai berikut:

- $T(0) = 0$
- $T(-v) = -T(v)$ untuk semua v di V
- $T(v - w) = T(v) - T(w)$ untuk semua v, w di V

Bukti:

- Misalkan v adalah sebarang vektor di V . Vektor $0.v = 0$ maka $T(0) = T(0v)$. Dengan aksioma transformasi linear maka skalar nol dapat dikeluarkan, sehingga $T(0v) = 0T(v) = 0$. Jadi, $T(0) = 0$

- Vektor negatif merupakan perkalian antara vektor dengan skalar satu atau $-v = (-1)v$ sehingga $T(-v) = T(-1.v) = -1 T(v) = -T(v)$. Jadi, $T(-v) = -T(v)$ untuk semua v di W .

- Kita ketahui bahwa definisi pengurangan vektor yaitu $v - w = v + (-1).w$ sehingga,

$$\begin{aligned} T(v - w) &= T(v + (-1).w) \\ &= T(v) + (-1).T(w) \\ &= T(v) - T(w) \end{aligned}$$

Definisi 7.2:

Misalkan V dan W merupakan ruang vektor dan jika $T: V \rightarrow W$ merupakan transformasi linear. Himpunan vektor di V yang dipetakan T ke dalam 0 disebut dengan **kernel** dari T atau di simbolkan dengan $\text{Ker}(T)$. Jangkauan transformasi linear T adalah himpunan semua anggota W dengan syarat ada anggota V sedemikian rupa sehingga anggota V tersebut adalah prapeta dari anggota W yang bersesuaian, dapat disimbolkan dengan $R(T)$.

Contoh 7.8:

Tentukan $\text{Ker}(T)$ dan $R(T)$ jika sebuah transformasi linear dirumuskan sebagai berikut.

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 + 2x_2 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

Mencari $\text{Ker}(T)$ berarti mencari vektor (x_1, x_2) yang petanya sama dengan nol yaitu $T(x_1, x_2) = (2x_1 + x_2, x_1 + 2x_2) = (0, 0)$ yang berarti mencari penyelesaian sistem persamaan linear homogen berikut:

$$2x_1 + x_2 = 0$$

$$x_1 + 2x_2 = 0$$

Dengan menggunakan eliminasi Gauss Jordan didapatkan penyelesaian $x_1 = 0, x_2 = 0$ sehingga $\text{Ker}(T)$ hanya berisi vektor nol atau $\text{Ker}(T) = (0, 0)$. Mencari $R(T)$ berarti mencari vektor (y_1, y_2) sehingga memenuhi persamaan

$$(y_1, y_2) = (2x_1 + x_2, x_1 + 2x_2)$$

atau

$$y_1 = 2x_1 + x_2$$

$$y_2 = x_1 + 2x_2$$

atau dapat dinyatakan dalam bentuk

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} x_2$$

Yang dapat dibaca sebagai vektor (y_1, y_2) menjadi anggota $R(T)$ jika vektor (y_1, y_2) menjadi anggota dari ruang kolom

matriks $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

Definisi 7.3:

Dimensi dari $\text{Ker}(T)$ disebut nulitas T , sedangkan dimensi dari jangkauan T disebut rank T .

Contoh 7.9

Dari contoh 7.8 tidak diperoleh basis $\text{Ker}(T)$ sehingga nulitasnya = 0. Dan basis $R(T)$ adalah basis ruang kolom

$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, dan oleh karena vektor $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ dan $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ tidak saling

berkelipatan maka basis $R(T)$ adalah $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$ dengan

demikian $\text{rank}(T) = 2$.

Latihan 7.2

Manakah vektor-vektor di bawah ini yang menjadi anggota $R(T)$ atau $\text{Ker}(T)$ untuk

$$T \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a - b + 3c \\ a - b + c \\ a + 2c \end{bmatrix}$$

a. $\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

1. Manakah vektor-vektor di bawah ini yang menjadi anggota $R(T)$ atau $\text{Ker}(T)$ untuk T
 $T(a+bx+cx^2) = (a+b+c) + (-a+b-c)x + (2b)x^2$

- a. $-2+2x$
 b. $3+x+4x^2$
 c. $2x+2x^2$

2. Manakah vektor-vektor di bawah ini yang menjadi anggota $R(T)$ atau $\text{Ker}(T)$ untuk $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a-b & b-c \\ c-d & a-d \end{bmatrix}$

a. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

3. Tentukan basis dan dimensi $\text{Ker}(T)$ dan $R(T)$ dari transformasi linear berikut ini.

a. $T\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} b+2c \\ a+2b \\ a-b \end{bmatrix}$

b. $T\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2a+b \\ a+2b \end{bmatrix}$

c. $T\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a-3b \\ a+2b \end{bmatrix}$

d. $T\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} x_1-2x_2 \\ -x_1+2x_2 \\ 2x_1-x_2 \end{bmatrix}$

4. Tentukan basis dan dimensi $\text{Ker}(T)$ dan $R(T)$ dari transformasi linear berikut ini.

a. $T(a+bx) = (a+b) + (a-b)x$

b. $T(a+bx+cx^2) = \begin{bmatrix} a-b \\ 2b+2c \\ a-3b-2c \end{bmatrix}$

7.3. Koordinat

Definisi 7.4:

Misalkan V ruang vektor, $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ basis V ,

$u \in V$ maka kombinasi linear u terhadap basis B

$$u = k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_n v_n$$

Skalar-skalar pada kombinasi linear u terhadap basis B menjadi komponen dari koorsinat u terhadap basis B sehingga dapat di tulis

$$[u]_B = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$$

Contoh 7.10

Tentukan koordinat vektor $u = (2, -1)$ terhadap basis

$$A = \{v_1 = (1, 1), v_2 = (1, 0)\}$$

Penyelesaian:

Kombinsi linear u terhadap basis A yaitu

$$u = k_1 v_1 + k_2 v_2$$

$$(2, -1) = k_1(1, 1) + k_2(2, -1)$$

$$(2, -1) = (k_1, k_1) + (2k_2, -k_2)$$

maka diperoleh system persamaan linear sebagai berikut:

$$2 = k_1 + 2k_2$$

$$-1 = k_1 - k_2$$

Dengan menggunakan eliminasi gauss maka diperoleh solusi yaitu $k_1 = 0$ dan $k_2 = 1$ sehingga koordinat u terhadap basis B adalah

$$[u]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Definisi 7.5:

Misalkan $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ adalah sebuah basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam V , $u \in V$ dan didapatkan kombinasi linear dari u terhadap basis S adalah

$$u = \langle u, v_1 \rangle v_1 + \langle u, v_2 \rangle v_2 + \dots + \langle u, v_n \rangle v_n$$

Maka koordinat u terhadap basis S adalah

$$[u]_S = \begin{bmatrix} \langle u, v_1 \rangle \\ \langle u, v_2 \rangle \\ \vdots \\ \langle u, v_n \rangle \end{bmatrix}$$

Kita ketahui bahwa koordinat sebagai sebuah vektor yang entri-entri-nya merupakan skalar-skalar pada kombinasi linear suatu vektor terhadap suatu basis, sedangkan kita ketahui bahwa basis itu tidak tunggal. Sehingga timbul

suatu pertanyaan apakah ada hubungan antar satu koordinat yang dihasilkan oleh basis B dengan basis lain?

Misalkan dimensi $(U) = n$ dua basis U misalkan

$$A = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \text{ dan } A' = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

Karena A basis U maka A membangun U setiap vektor di U dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari A yang juga berarti setiap vektor anggota A' dapat dinyatakan kombinasi linear A . Misalkan kombinasi linear sebagai berikut:

$$v_1 = k_{11}u_1 + k_{12}u_2 + \dots + k_{1n}u_n$$

$$v_2 = k_{21}u_1 + k_{22}u_2 + \dots + k_{2n}u_n$$

$$\vdots$$

$$v_n = k_{n1}u_1 + k_{n2}u_2 + \dots + k_{nn}u_n$$

Sehingga koordinatnya

$$[v_1]_A = \begin{bmatrix} k_{11} \\ k_{12} \\ \vdots \\ k_{1n} \end{bmatrix}, [v_2]_A = \begin{bmatrix} k_{21} \\ k_{22} \\ \vdots \\ k_{2n} \end{bmatrix}, \dots, [v_n]_A = \begin{bmatrix} k_{n1} \\ k_{n2} \\ \vdots \\ k_{nn} \end{bmatrix}$$

Karena A' basis U maka untuk vektor $w \in U$ dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari A' . Misalkan kombinasi linearnya sebagai berikut:

$$w = l_1v_1 + l_2v_2 + \dots + l_nv_n$$

Sehingga koordinatnya

$$[w]_{A'} = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_1 \\ \vdots \\ l_n \end{bmatrix}$$

Sehingga w dapat diuraikan sebagai berikut:

$$w = l_1 v_1 + l_1 v_2 + \dots + l_n v_n$$

$$w = l_1(k_{11}u_1 + k_{12}u_2 + \dots + k_{1n}u_n) + l_2(k_{21}u_1 + k_{22}u_2 + \dots + k_{2n}u_n) + \dots + l_n(k_{n1}u_1 + k_{n2}u_2 + \dots + k_{nn}u_n)$$

$$w = (l_1k_{11} + l_2k_{21} + \dots + l_nk_{n1})u_1 + (l_1k_{12} + l_2k_{22} + \dots + l_nk_{n2})u_2 + \dots + (l_1k_{1n} + l_2k_{2n} + \dots + l_nk_{nn})u_n$$

sehingga koordinat w terhadap basis A dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$[w]_A = \begin{bmatrix} l_1k_{11} + l_2k_{21} + \dots + l_nk_{n1} \\ l_1k_{12} + l_2k_{22} + \dots + l_nk_{n2} \\ \vdots \\ l_1k_{1n} + l_2k_{2n} + \dots + l_nk_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{21} & \dots & k_{n1} \\ k_{12} & k_{22} & \dots & k_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{1n} & k_{2n} & \dots & k_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \\ \vdots \\ l_n \end{bmatrix} = P[w]_{A'}$$

dengan

$$P = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{21} & \dots & k_{n1} \\ k_{12} & k_{22} & \dots & k_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{1n} & k_{2n} & \dots & k_{nn} \end{bmatrix}$$

Perhatikan komponen kolom-kolom matriks P adalah koordinat vektor-vektor pada basis A' terhadap basis A maka dapat dinyatakan

$$P = [[v_1]_A : [v_2]_A : \dots : [v_n]_A]$$

Matriks P disebut dengan matriks transisi dari A' ke basis A . Dengan demikian di dapatkan hubungan antara koordinat terhadap basis A dan koordinat terhadap basis A' .

Contoh 7.11

Tentukan matriks transisi dari basis A ke basis A' jika

$$A = \{u_1 = (1,2), u_2 = (1,1)\} \text{ dan } B = \{v_1 = (2,2), v_2 = (2,1)\}$$

Penyelesaian:

Koordinat v_1 terhadap basis A adalah

$$v_1 = k_1 u_1 + k_2 u_2$$

$$(2,2) = k_1(1,2) + k_2(1,1)$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix}$$

Koordinat v_2 terhadap basis A adalah

$$v_2 = k_1 u_1 + k_2 u_2$$

$$(2,1) = k_1(1,2) + k_2(1,1)$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix}$$

Sehingga matriks lengkap yaitu

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right] b_2 - 2b_1 \sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{array} \right] -b_2 \sim$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] b_1 - b_2 \sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

jadi, matriks transisi dari basis A ke basis A' adalah

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Adapun sifat-sifat matriks transisi yaitu:

- Jika P matriks transisi dari basis A' ke basis A maka P selalu mempunyai invers
- P^{-1} adalah matriks transisi dari basis B ke basis B' .

Latihan 7.3

- Tentukan koordinat vektor $u = (2,3)$ terhadap basis $v_1 = (2,1), v_2 = (0,1)$
- Tentukan koordinat vektor $u = (4,3)$ terhadap basis $v_1 = (1,5), v_2 = (2,1)$
- Tentukan koordinat vektor $u = (4,3,4)$ terhadap basis $v_1 = (1,1,5), v_2 = (3,1,2), v_3 = (1,1,1)$
- Tentukan koordinat vektor $p = 2 + x + 2x^2$ terhadap basis $q_1 = 1 + x, q_2 = 2 + 2x + 3x^2, q_3 = 1 + 3x + 4x^2$

- Tentukan koordinat vektor $p = 7 + 2x$ terhadap basis $q_1 = x, q_2 = 2 + 3x$

- Tentukan koordinat vektor $u = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ terhadap basis

$$v_1 = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, v_4 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

- Tentukan matriks transisi dari basis A' ke basis A jika $A = \{v_1 = (1,2), v_2 = (3,2)\}$ dan

$$A' = \{u_1 = (3,1), u_2 = (2,2)\}$$

- Tentukan matriks transisi dari basis A' ke basis A jika $A = \{v_1 = (1,2,1), v_2 = (2,3,2), v_3 = (1,1,1)\}$ dan

$$A' = \{u_1 = (1,2,1), u_2 = (0,1,1), u_3 = (2,3,2)\}.$$

DAFTAR PUSTAKA

1. Anton, Howard, (2000), *Dasar-dasar Aljabar Linear*, Edisi 7 Jilid 1, terjemahan Penerbit Interaksara.
2. Anton, Howard, C. Rorres (1992), *Aljabar Linear elementer*, terjemahan Penerbit Erlangga, Jakarta.
3. Farlow, Stanley J. (1994), *Finite Mathematics and Its Application*, 2^{ed} edition, Singapore: McGraw-Hill.
4. Herstein, I. N. (1975), *Topics in Algebra*, 2nd Edition, New York: John Wiley and Sons.
5. 'Imrona, Mahmud.(2013), *Aljabar Linear Dasar*, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.
6. Kreyszig, Erwin (1993). *Advanced Engineering Mathematics*, 7th Edition, New York: John Wiley and Sons.
7. Marcus, Daniel A. (1998), *Combinatorics a Problem Oriented Approach*, Washintong DC: The Mathematical Association of America.
8. Roman, Steven (1992), *Advanced Linear Algebra*, New York: Springer-Verlag.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Wahyuni Abidin, lahir pada tanggal 14 Maret 1984, Sulawesi Selatan. Penulis memasuki jenjang S1 di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNM Makassar pada tahun 2002 hingga tahun 2006. Selanjutnya pada bulan September 2006 hingga 2008, penulis melanjutkan kuliah ke jenjang S2 pada Program Studi Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Dan di terima menjadi dosen jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2009.

Adapun penelitian dan hasil karya ilmiah yang telah dilakukan dan dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Asessmen Portofolio dalam Pembelajaran Langsung untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa IX-A SMP Negeri 1 Ajangale. (Penelitian, 2006)
2. Pembelajaran berdasarkan masalah (Problem Based Instruction) pada Topik persegi dan persegipanjang di kelas VII SMP Muhammadiyah Surabaya. (Penelitian, 2008)
3. Matematika Diskrit, (Buku, 2013)
4. Transformasi Linear pada Suatu Fungsi, (penelitian, 2014)