

Turnitin Originality Report

Processed on: 05-May-2023 14:52 WIB
 ID: 2084899313
 Word Count: 2137
 Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
24%	Internet Sources: 23% Publications: 7% Student Papers: 13%

ESTIMATOR KERNEL PADA
 REGRESI NONPARAMETRIK
 MENGGUNAKAN FUNGSI
 KERNEL GAUSSIAN By

Wahidah Alwi

3% match (Internet from 08-Feb-2023)

http://repository.upi.edu/59564/4/s_adp_0700698_chapter3.pdf

3% match (Internet from 12-Dec-2019)

<http://digilib.unila.ac.id/59916/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

2% match (Internet from 28-Jun-2016)

<http://statistik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/statistik/article/download/203/224>

2% match (Internet from 06-Dec-2022)

<https://jurnal.polibara.ac.id/index.php/medsains/article/download/178/115>

2% match (Internet from 21-Jun-2016)

<http://lib.unnes.ac.id/18369/2/4150406003.pdf>

2% match (Internet from 12-Sep-2021)

<https://docplayer.info/33478547-Regresi-linier-nonparametrik-dengan-metode-theil.html>

1% match (Internet from 25-Nov-2020)

<http://repository.its.ac.id/59927/1/1312106006-Undergradute%20Thesis.pdf>

1% match ()

[Pramitasari, Novalia Dwita. "Pemodelan Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang \(MKJP\) Di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline Truncated", 2018](#)

1% match (Internet from 15-Apr-2023)

<https://www.scribd.com/document/636974780/Artikel-Kernel-RNP-Kel-8>

1% match (Internet from 20-Nov-2013)

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmat/article/download/2918/2081>

1% match (Internet from 11-Apr-2016)

http://eprints.undip.ac.id/47577/1/Prosiding_SNMPM_UNDIP_2015.pdf

1% match (Internet from 24-Jul-2020)

https://mafiadoc.com/model-regresi-linier_59caa6581723dd076cb9722f.html

1% match (Internet from 10-Sep-2022)

<https://text-id.123dok.com/document/y80wxn2q-perubahan-kinerja-sosial-perusahaan-bumn-dan-swasta-serta-pengaruhnya-terhadap-kinerja->

keuangan-perusahaan-diponegoro-university-institutional-repository-undip-ir.html

1% match (Internet from 11-Dec-2022)

<https://repofeb.undip.ac.id/6988/6/16.%20T%20-%20Fulltext%20PDF%20Bookmarks%2012010118410003.pdf>

1% match (Internet from 13-Dec-2022)

<http://repository.uinsu.ac.id/11296/1/Skripsi%20Siti%20Zunaida.pdf>

1% match (Goldstein. "Adjusting Beliefs", Wiley Series in Probability and Statistics, 04/04/2007)

[Goldstein. "Adjusting Beliefs", Wiley Series in Probability and Statistics, 04/04/2007](#)

1% match (student papers from 24-May-2022)

[Submitted to Universitas Sebelas Maret on 2022-05-24](#)

ESTIMATOR KERNEL PADA REGRESI NONPARAMETRIK MENGGUNAKAN FUNGSI KERNEL GAUSSIAN Wahidah Alwi* ,Adnan Sauddin, Nirmala Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 63 Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113 *wahidah.alwi@uin-alauddin.ac.id Abstract: Dengan menggunakan data untuk memodelkan suatu keadaan (variabel) dalam analisis statistik biasanya membutuhkan asumsi-asumsi tertentu agar penggunaan hasil analisis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan prosedur nonparametrik untuk mengestimasi suatu fungsi dimana utama analisis regresi adalah menentukan estimasi d . Pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan d adalah estimator kernel dengan pendekatan kernel Gaussian. Data yang digunakan yaitu data hasil persentase [wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah](#) menurut penolong [kelahiran](#) terakhir di daerah Sulawesi Selatan dengan variabel prediktor dokter kandungan (x_1), dokter umum (x_2), bidan (x_3), dan variabel respon jumlah dari wanita yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir. Metode GCV (Generalized Cross Validation) digunakan untuk mendapatkan bandwidth yang optimal yaitu pada $h_1=15$, $h_2=20$ dan $h_3=25$ dengan nilai GCV 719.6441. Nilai optimal yang diperoleh adalah nilai yang meminimumkan hasil persentase [wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah](#) menurut penolong [kelahiran](#) terakhir di daerah Sulawesi Selatan. Kata Kunci: Regresi nonparametrik, Pendekatan Kernel Gaussian, GCV, Pemilihan Bandwidth. I. PENDAHULUAN [Regresi atau peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi dimasa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Regresi dapat juga diartikan sebagai usaha memperkirakan perubahan. Agar tidak salah paham bahwa peramalan tidak memberikan jawaban pasti tentang apa yang akan terjadi, melainkan berusaha mencari pendekatan apa yang akan terjadi. Jadi, regresi mengemukakan tentang keingintahuan apa yang akan terjadi dimasa depan untuk memberikan kontribusi menentukan keputusan yang baik.](#) 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Analisis Regresi 2.1.1 Model [Populasi Regresi](#) Regresi [pada dasarnya adalah menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dependen dengan salah satu lebih variabel independen](#). Diberi model populasi dengan persamaan regresi sebagai berikut: $V_i = \beta_0 + \beta_1 V_1 + \dots + \beta_n V_n$ 2.1.2 Model Sampel Regresi Regresi populasi dapat diestimasi dengan menggunakan data sampel [regresi dengan sampel yang teramati dan melandaskan kesimpulan-kesimpulan yang menyangkut parameter-parameter populasi pada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah kenormalan galat, yaitu bahwa galat](#)

berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan simpangan baku tertentu. Dalam pendekatan parametrik terdapat asumsi mengenai model yaitu kurva regresi yang dapat diwakili oleh suatu model parametrik, misal kurva berbentuk linier, kuadratik, kubik dan polinomial derajat p . Bentuk hubungan antara satu peubah respon dengan satu peubah prediktor secara matematis dituliskan dalam model regresi: $V_i = \beta_0 + \beta_1 V_i + \varepsilon_i$

2.2 Regresi Nonparametrik Regresi nonparametrik adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengestimasi pola hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor dimana bentuk kurva regresinya tidak diketahui. Ada sebanyak $m = m + 1$ variabel random (X, Y) dimana Y adalah variabel dependen dan X adalah vektor $m \times 1$ merupakan variabel prediktor. Jika $E(|Y|)$ berhingga, maka model regresi nonparametrik dapat dinyatakan sebagai berikut: $V = d(x) + \varepsilon$

2.2.1 Nadaraya-Watson Pendekatan konseptual sederhana untuk representasi adalah untuk menggambarkan bentuk $\{V_{ni}(x)\}_{ni=1}$ dengan fungsi kepadatan peluang $V_{ni}(x)$ dengan parameter skala yang menyesuaikan ukuran dan bentuk bobot V . Sangat umum untuk merujuk pada fungsi bentuk ini sebagai kernel J . Jika kernel kontinu, dibatasi dan simetris, fungsi sebenarnya J yang mengintegrasikan satu, $\int J(m) dm = 1$ urutan untuk kernel penghalus (satu dimensi x) didefinisikan sebagai berikut: $V_{ni}(x) = \int J_{hn}(x - V_i) d\hat{h}_n(x)$ dimana, $n d\hat{h}_n(x) = m \sum_{i=1}^m J_{hn}(x - V_i)$ 1 $i=1$ Kernel dengan faktor skala h_n , harus bergantung pada h_n ukuran sampel m , kernel dengan pembobot $\{V_{ni}(x)\}_{ni=1}$. Fungsi $d\hat{h}(\cdot)$ adalah densitas kernel Rosenblatt-Parzen. Dan kernel telah diusulkan oleh Nadaraya (1964) dan Watson (1964). $d\hat{h} = n^{-1} \sum_{ni=1}^n \frac{1}{\sum_{in=1}^n J_h(x - V_i) V_i} \frac{1}{\sum_{in=1}^n J_h(x - V_i)}$

2.2.2 Estimasi Kernel Gaussian Diberikan kernel Gaussian yang diberikan adalah: Misalkan diberikan sampel data dari x_1 sampai x_n $J_{hi}(x_1 - V_i) = \frac{1}{h_i \sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{1}{2} (\frac{x_1 - h_i x_i}{h_i})^2)$, sehingga: $\frac{1}{2} \frac{1}{n} \sum_{in=1}^n \frac{1}{h_i \sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{1}{2} (\frac{x_1 - h_i x_i}{h_i})^2) \frac{1}{2} \frac{1}{n} \sum_{in=1}^n \frac{1}{h_i \sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{1}{2} (\frac{x_1 - h_i x_i}{h_i})^2)$

2.3 Pemilihan Bandwidth Optimal Bandwidth h adalah parameter pemulus (smoothing) yang berfungsi untuk mengontrol kemulusan dari kurva yang diestimasi. Bandwidth yang terlalu kecil akan menghasilkan kurva yang under-smoothing yaitu sangat kasar dan sangat fluktuatif, dan sebaliknya bandwidth yang terlalu lebar akan menghasilkan kurva yang over-smoothing yaitu sangat mulus, tetapi tidak sesuai dengan pola data. Oleh karena itu perlu dipilih bandwidth yang optimal. Salah satu metode untuk mendapatkan h optimal adalah dengan menggunakan kriteria GCV dengan rumus: $GCV(h) = \frac{1}{n} \sum_{in=1}^n (x_i - d\hat{h}(x_i))^2 (1 - \frac{1}{n} \sum_{ni=1}^n \frac{1}{\sum_{ni=1}^n K_{hx}(x_i - X_{xi}) - X_{xi}})^2$

2.3.1 Mean Square Error (MSE) Dalam estimasi pasti tidak lepas dari Mean Square Error (MSE) dan dua komponennya yaitu bias dan standar error atau varians. Kreteria rror yang digunakan dalam regresi nonparametrik ini yaitu dengan mencari nilai Mean Square error (MSE) yang terkecil. Penggunaan bandwidth yang optimal akan menghasilkan estimasi dengan MSE yang terkecil. Adapun rumus MSE yaitu sebagai berikut: $MRE(d(\hat{x})) = E(d(\hat{x}) - d(x))^2 = (E(d(\hat{x})) - d(x))^2 + E(d(\hat{x}) - E(d(\hat{x})))^2 = 2E(d(x) - E(d(\hat{x}))) (E(d(\hat{x})) - d(\hat{x})) + E(E(d(\hat{x})) - d(\hat{x}))^2 + E(d(\hat{x}) - E(d(\hat{x})))^2 = aiam^2 + mamiammi(d(\hat{x}))$ Kebaikan suatu penduga dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Semakin kecil tingkat kesalahan suatu penduga maka semakin baik estimasinya. Kreteria untuk menentukan estimator terbaik dalam model regresi yaitu MSE dan nilai koefisien determinasi R-Square (R^2), dengan rumus sebagai berikut: $R^2 = \frac{JRR}{JRR} = \frac{\sum_{in=1}^n (V_i - V)^2}{\sum_{i=1}^n (V_i - V)^2}$

2.3.2 Generalized Cross Validation (GCV) Defenisi dari MSE mengandung fungsi yang tidak diketahui yaitu $d(x_i)$. Sehingga untuk mengatasi hal ini digunakan metode cross validation dengan leave one at estimate $dh, \hat{i}(x_i)$ didefenisikan sebagai berikut: $n CV(h) = m \sum_{i=1}^n (x_i - dh, \hat{i}(x_i))^2$ 1 $i=1$ di peroleh, $n CV(h) = \sum_{i=1}^n (1 - \frac{m}{n} \frac{x_i - dh, \hat{i}(x_i)}{1 - G(h)})^2$ 1 $i=1$ dengan, $J_h(x - V_i) G(h) = \frac{1}{n} \sum_{ni=1}^n J_h(x - V_i)$ n Namun metode CV mempunyai kelemahan. Jika nilai x_i mempunyai pengaruh yang kuat terhadap taksir $d\hat{h}(x)$, maka nilai x_i akan besar pengaruhnya terhadap nilai CV(h). Cara mengatasi hal ini maka persamaan CV(h) diberi bobot. Persamaan CV(h) yang diberi bobot disebut sebagai GCV (Generalized

Cross Validation). Metode GCV didefinisikan sebagai berikut : $GCV(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{d}_h(x))^2 (1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{K(x_i - h)} (K(x_i - h) - X_i))$ Bandwidth optimal diperoleh dari bandwidth yang menghasilkan nilai GCV yang terkecil. $h_{opt} = \arg \min GCV(h)$ h Arg min h adalah notasi yang mengindikasikan bahwa memilih argumen h yang meminimumkan kriteria.

2.4 Kelahiran Bayi Kelahiran prematur yaitu bayi lahir hidup kurang dari 37 minggu kehamilan, menjadi penyebab morbiditas dan mortalitas perinatal. Bayi yang lahir prematur memiliki resiko kematian yang lebih tinggi, resiko penyakit, disabilitas dalam hal motorik jangka panjang, kognitif, visual, pendengaran, sikap, emosi sosial, kesehatan, dan masalah pertumbuhan jika dibandingkan dengan bayi normal.

3. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan (applied research). 3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 3.2.1 Waktu Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah data pada tahun 2015. 3.2.2 Lokasi Penelitian Lokasi Penelitian adalah BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3 Jenis dan Sumber Data 3.3.1 Jenis data Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder berupa data persentase wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir. 3.3.2 Sumber data Sumber data pada penelitian ini adalah BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sulawesi Selatan.

3.4 Definisi Operasional Variabel 3.4.1 Variabel Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: x_1 =Persentase jumlah wanitayang telah menikah dengan dokter kandungan sebagai penolong kelahiran terakhir di daerah Sulawesi Selatan x_2 = Persentase jumlah wanitayang telah menikah dengan dokter umum sebagai penolong kelahiran terakhir di daerah Sulawesi Selatan x_3 = Persentase jumlah wanitayang telah menikah dengan bidan sebagai penolong kelahiran terakhir di daerah Sulawesi Selatan x = Jumlah dari wanita yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir. 3.4.2 Definisi operasional variable Adapun definisi operasional variabel yaitu sebagai berikut : 1. Dokter kandungan (x_1) adalah yang membantu pasien khusus persalinan disetiap daerah yang ada di provinsi Sulawesi Selatan di 24 kabupaten 2. Dokter umum (x_2) adalah yang membantu pasien ada di Rumah sakit/ Praktek untuk persalinan disetiap daerah di Sulawesi Selatan di 24 kabupaten. 3. Bidan (x_3) khusus untuk membantu persalinan bayi yang ada disetiap daerah di Sulawesi Selatan di 24 kabupaten. 4. Jumlah dari wanita yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir (x) setiap daerah di Sulawesi Selatan di 24 kabupaten. 3.5 Prosedur Penelitian Adapun prosedur pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui estimasi regresi nonparametrik dengan estimator kernel gaussian pada kasus wanita yang telah menikah menurut penolong kelahiran di daerah Sulawesi Selatan yaitu : 1. Pengumpulan data 2. Membuat scattler plot data. 3. Mendefinisikan fungsi kernel gaussian : $J_h(x - V_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} h} \exp(-\frac{(x - V_i)^2}{2h^2})$ 4. Pemilihan bandwidth h_1 , h_2 , dan h_3 dilakukan dengan mencoba semua nilai- nilai bandwidth h_1 , h_2 , dan h_3 yang mungkin. 5. MenentukannilaiGCV, dimana pendekatan kernel yang digunakan adalah kernel Gaussian dengan rumus : $GCV(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{d}_h(x))^2 (1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{K(x_i - h)} (K(x_i - h) - X_i))$ 6. Berdasarkan nilai bandwidth h yang telah ditentukan sebelumnya. 6. Menentukan h optimal yang meminimumkan GCV untuk kernel gaussian , dengan rumus : $h_{opt} = \arg \min GCV(h)$ h 7. Diperoleh nilai $\hat{d}(x)$ 4. Hasil dan Pembahasan 4.1 Pemilihan bandwidth optimal Memilih bandwidth berdasarkan nilai GCV diberikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : $GCV(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{d}_h(x))^2 (1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{K(x_i - h)} (K(x_i - h) - X_i))$ 2 n Hasil perhitungan GCV diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Bandwidth h_1 , h_2 , dan h_3 dengan GCV h_1 h_2 h_3 GCV 5 10 15 3.0823000 10 15 20 1.28193000 15 30 45 60 75 20 25 719.6441 35 40 841.7207 50 55 1.46523000 65 70 2.11713000 80 85 2.62173000

Jika bandwidth $h_1 = 1, h_2 = 2, h_3 = 3$ maka nilai GCV menghasilkan nilai yang tidak terdefiniskan dan juga akan menghasilkan kurva yang over-smoothing yaitu sangat mulus. Salah satu metode untuk mendapatkan h

4.1 Pemilihan bandwidth optimal Memilih bandwidth berdasarkan nilai GCV diberikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : $GCV(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{d}_h(x))^2 (1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{K(x_i - h)} (K(x_i - h) - X_i))$ 2 n Hasil perhitungan GCV diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Bandwidth h_1 , h_2 , dan h_3 dengan GCV h_1 h_2 h_3 GCV 5 10 15 3.0823000 10 15 20 1.28193000 15 30 45 60 75 20 25 719.6441 35 40 841.7207 50 55 1.46523000 65 70 2.11713000 80 85 2.62173000

Jika bandwidth $h_1 = 1, h_2 = 2, h_3 = 3$ maka nilai GCV menghasilkan nilai yang tidak terdefiniskan dan juga akan menghasilkan kurva yang over-smoothing yaitu sangat mulus. Salah satu metode untuk mendapatkan h

4.1 Pemilihan bandwidth optimal Memilih bandwidth berdasarkan nilai GCV diberikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : $GCV(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{d}_h(x))^2 (1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{K(x_i - h)} (K(x_i - h) - X_i))$ 2 n Hasil perhitungan GCV diperoleh hasil sebagai berikut:

[optimal adalah dengan menggunakan kriteria GCV](#). Pemilihan bandwidth h_1, h_2, h_3 pada tabel diatas dilakukan dengan mencoba memasukkan semua nilai-nilai bandwidth $h_1, h_2, dan h_3$ karena bandwidth yang dimulai dari $h_1 = 5, h_2 = 10, h_3 = 15$ dapat menghasilkan nilai GCV. Adapun rentang nilai pada pemilihan bandwidth yaitu 5, karena jika rentangnya kurang dari 5 maka plot kurvanya mendekati sama. Sehingga diperoleh GCV yang terkecil sebesar 719,6441. [Oleh karena itu perlu dipilih bandwidth yang optimal](#) Pada $h_1=15, h_2 =20, dan h_3=25$ yang merupakan bandwidth yang optimal. Tabel 4.3 Nilai bandwidth dan hasil plot: Bandwidth Plot a. Bandwidth $h_1=5 h_2=10 dan h_3=15$ yt 1.5 1.0 0.5 0 Surface Plot of yt vs x2, x1 2 15 30 0 x1 45 6 4 x2 b. Bandwidth $h_1=10 h_2=15 dan h_3=20$ yt 1.6 1.2 0.8 0 Surface Plot of yt vs x2, x1 2 15 30 0 x1 45 6 4 x2 c. Bandwidth $h_1=15 h_2=20 dan h_3=25$ yt 1.5 1.2 0.9 0.6 0 Surface Plot of yt vs x2, x1 2 15 30 0 x1 45 4 6 x2 d. Bandwidth dan $h_3=40 h_1=30 h_2=35$ yt 1.4 1.2 1.0 0 Surface Plot of yt vs x2, x1 2 15 30 0 x1 45 6 4 x2 e. Bandwidth dan $h_3=55 h_1=45 h_2=50$ yt 1.3 1.2 1.1 1.0 0 Surface Plot of yt vs x2, x1 2 15 0 x1 30 45 6 4 x2 f. Bandwidth $h_1=60 h_2=65 dan h_3=70$ yt 1.25 1.20 1.15 1.10 0 Surface Plot of yt vs x2, x1 2 15 0 x1 30 45 6 4 x2 g. Bandwidth $h_1=75 h_2=80 dan h_3=85$ yt 1.25 1.20 1.15 0 Surface Plot of yt vs x2, x1 2 15 30 0 x1 45 6 4 x2

Pembahasan Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan nonparametrik dan fungsi kernel Gaussian, maka interpretasi untuk setiap nilai optimum diperoleh kondisi yang paling terbaik dari estimasi tingkat wanita yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir dan pemilihan bandwidth berdasarkan kriteria [nilai GCV yang minimum](#) atau kriteria [nilai GCV](#) yang terkecil. [Pada tabel 4.3 terlihat bahwa nilai](#) estimasi dari bandwidth $h_1=15, h_2=20, h_3=25$ diperoleh sebesar 0,6278%. Nilai estimasi yang ini merupakan nilai optimum dari estimasi tingkat wanita yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir pada kondisi optimum yang di capai $(x_1) = 42,53 (x_2) = 6,04 (x_3) = 46,55\%$. Kondisi optimum yang pertama oleh dokter kandungan (x_1) sebesar 42,53 %. Kondisi optimum yang kedua oleh dokter umum (x_2) sebesar 6,04 %. Dan kondisi optimum yang terakhir oleh bidan (x_3) sebesar 46,55%. Dan dari ketujuh hasil estimasi dari bandwidth diketahui bahwa kondisi yang paling optimum terletak pada $h_1=15, h_2=20, h_3=25$ sebesar 0,6278%. Dengan nilai GCV sebesar 719,6441. Jika nilai bandwidth h yang di ambil adalah yang terkecil maka akan terlihat plot data yang sangat kasar, jika nilai bandwidth h yang diambil adalah yang optimal maka plot data tidak sangat kasar dan tidak juga sangat halus (*mmmmh*), dan jika nilai bandwidth h yang diambil adalah yang besar maka akan terlihat plot tidak sangat berpotongan. Kesimpulan Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil dan pembahasan yaitu nilai optimum dari estimasi tingkat wanita yang telah menikah menurut kelahiran terakhir $d = \hat{d}(x_1, x_2, x_3)$ diperoleh sebesar 0,6278%. [Dalam regresi kernel yang terpenting adalah pemilihan nilai bandwidth optimal, bukan pemilihan fungsi kernel, karena penggunaan fungsi kernel yang berbeda dengan nilai bandwidth optimal menghasilkan estimasi kurva regresi yang hampir sama](#).

DAFTAR PUSTAKA [1] Alma, Buchari. "Pengantar Statistika untuk penelitian: Pendidikan, social, komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis" Alfabeta. 2011. [2] Alwi, Wahida. "Estimator Integral Pada Regresi Nonparametrik dengan Pendekatan Kernel" Tesis Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2008. [3] Andrianto, Erwin "Pendugaan Regresi Nonparametrik dengan Fungsi Kernel Gaussian", Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya. [4] Annisa, Nur, dkk. "Proyeksi Angka Migrasi Penduduk Indonesia Tahun 2005- 2010", Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas Makassar, 2010. [5] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya. Bogor: Syaamil Qur'an, 2007. [6] Fitriani Anna, dkk, Vol.4 (4) "Estimasi model regresi semiparametrik menggunakan estimator kernel uniform pada pasien DBD di Rs Puri Raharja". Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana, 2015.

- [7] Gede, I Komang SukarsaI dan Gusti Ayu Made Srinadi, Vol.2 (1) "Estimator Kernel Dalam Regresi Nonparametrik".Jurusan Matematika FMIPA Universitas Udayana Kampus Bukit Jimbaran Bandung,Bali, 2012.
- [8] Haslinda, Andi. Multivariate Adaptive Regression Spilne. (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press,2013).
- [9] Har" dle, W. Applied nonparametric regression New York: Cambridge University Prees, 1990.
- [10] Kurniasih, Dedeh dkk, "Efisiensi Relatif Estimator Fungsi Kernel Gaussian Terhadap Estimator Polinomial Dalam Peramalan USD Terhadap JPY", Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang Indonesia, 2013.
- [11] Luthfin, Mifta, dkk.Vol.2 (1) "Model Regresi Nonparametrik Berdasarkan Estimator Polinomial Lokal Kernel Pada kasus Pertumbuhan Balita", Program studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah semarang, 2007.
- [12] Novi Dhina Ariana,dkk,"Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur",Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Semarang,2011.
- [13] Paembonan Novhita,dkk, "Faktor-faktor kejadian kelahiran prematur di rumah sakit ibu dan anak Sitti Fatimah Kota Makassar", Bagian Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
- [14] Rizky, HengkyWidiardi, "Model Regresi Nonparametrik Menggunakan Fungsi Kernel ", Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya.
- [15] Saraswati, "Estimasi Dentitas Kernel Epanechnikov Rata-Rata Resampel Bootstrap Untuk Penentuan Waktu Panen Optimal Tanaman Rami", Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta,2009.
- [16] Sprent, Peter. "Metode Statistik Nonparametrik Terapan," Universitas Indonesia.
- [17] Sugiono. "Statistika untuk Penelitian," CV Alfabeta Bandung. 2000.
- [18] Wand, M. P. Kernel smooting.New York: Chapman and Hall, 1995. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11