

Struktur Aljabar - Teori Ring

Struktur Aljabar - Teori Ring

Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.



Struktur Aljabar - Teori Ring

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:
Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.

Editor: Erik Santoso

Cetakan Pertama: Desember 2021

Cover: Rusli

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2021, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Rafflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2021 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021
; 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-623-5847-52-8

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan khususnya kepada penulis yang selalu diberi kelancaran untuk menyelesaikan penulisan Buku Struktur Aljabar khususnya materi Teori Ring ini.

Dengan keberadaan buku ini, diharapkan dapat membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami konsep-konsep Ring. Buku ini disajikan kepada pembaca yang telah mempelajari Teori Bilangan dan Pengantar Dasar Matematika.

Manusia secara kontinu merumuskan konsep-konsep dan unsur-unsur dalam bidang ilmu pengetahuan agar dapat diuraikan dalam dunia nyata adalah sebagian dari sejarah ilmu pengetahuan alam. Berbicara tentang ilmu pengetahuan, Al-Qur'an telah memberikan kepada manusia kunci ilmu pengetahuan tentang dunia dan akhirat serta menyediakan peralatan untuk mencari dan meneliti segala sesuatu agar dapat mengungkap dan mengetahui keajaiban dari kedua dunia itu.

Dalam mempelajari suatu ilmu sesuai dengan paradigma *ulul albab*, yakni berbekal kemampuan intelektual semata tidak cukup, tetapi perlu didukung secara bersamaan dengan kemampuan emosional dan spiritual. Pola pikir deduktif dan logis dalam matematika juga bergantung kemampuan intuitif dan imajinatif serta mengembangkan pendekatan rasionalis, empiris dan logis.

Matematika Perguruan Tinggi lebih menekankan pada pembentukan pola pikir matematika yaitu logis, kritis, dan tegas. Jadi bukan lagi untuk mengasah kemampuan berhitung semata atau kemampuan menerapkan konsep ke dalam pemecahan masalah. Mahasiswa diharapkan dapat mengasah pola pikirnya melalui ketekunan dalam mempelajari langkah demi langkah berbagai aksioma, definisi, lemma, maupun teorema-teorema yang berkaitan

dengan Struktur Aljabar khususnya Teori Ring.

Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis dalam mengajar mata kuliah struktur aljabar di Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Buku ini disusun untuk mengatasi kekurangan buku acuan struktur aljabar terkait Teori Ring yang berbahasa Indonesia. Penyajian pokok bahasan disusun sedemikian rupa dan disertai dengan contoh-contoh, agar pembaca khususnya mahasiswa dapat meninjaunya dari berbagai aspek, sehingga kaitan antara definisi, teorema, dan penggunaannya dalam menyelesaikan masalah nampak jelas. Selain itu, setiap teorema disertai dengan contoh agar pembaca dapat lebih mudah memahami konsep yang dikandung dalam teorema tersebut.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan buku ini dalam edisi yang akan datang.

Akhirnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi, penulis, pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Amiiin.

Makassar, April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I DASAR-DASAR HIMPUNAN	1
A. Sejarah Ringkas Teori Himpunan	1
B. Pengertian Himpunan.....	1
1. Konsep Dasar Himpunan.....	2
2. Relasi antar Himpunan.....	4
3. Operasi Pada Himpunan.....	7
4. Sifat-sifat Operasi.....	9
C. Pemetaan.....	13
D. Relasi Ekuivalen.....	17
E. Sifat-sifat Operasi Biner.....	20
F. Latihan.....	23
BAB II TEORI RING	24
A. Sifat-sifat Ring.....	25
B. Integral Domain.....	37
C. Field (Lapangan)	41
D. Latihan.....	43
BAB III SUBRING DAN IDEAL.....	44
A. Subring	45
B. Ideal	49
C. Latihan.....	53
BAB IV RING FAKTOR DAN HOMOMORFISMA RING	54
A. Ring Faktor.....	55
B. Homomorfisma Ring.....	62
C. Latihan.....	72

BAB V RING POLINOM.....	73
A. Ring Polinom	73
B. Algoritma Pembagian Polinom	75
C. Unsur Tereduksi dan Tidak Tereduksi.....	81
D. Latihan.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
BIOGRAFI PENULIS	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Cayley $(\mathbb{Z}_4, +)$ dan (\mathbb{Z}_4, \cdot) -0.....	27
Tabel 2.2 Daftar Cayley $(\mathbb{P}, +)$ dan (\mathbb{P}, \cdot)	32
Tabel 2.3 Daftar Cayley (\mathbb{Z}_4, \cdot)	40
Tabel 4.1 Daftar Cayley $(\mathbb{Z}_6/\mathbb{K} = \mathbb{Z}_6/\{0, 2, 4\}, +)$ dan $(\mathbb{Z}_6/\mathbb{K} = \mathbb{Z}_6/\{0, 2, 4\}, \cdot)$	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Himpunan Bagian dan Himpunan Bagian Sejati.....	4
Gambar 1.2 Diagram Venn Satu Gabungan, Irisan dan Komplemen	8
Gambar 1.3 fungsi f dari A ke B	14
Gambar 1.4 Gambaran $f: A \rightarrow B$	15
Gambar 1.5 Pemetaan injektif, surjektif dan bijektif.....	17

BAB I

DASAR-DASAR HIMPUNAN

A. Sejarah Ringkas Teori Himpunan

George Cantor (1845 – 1918) dianggap sebagai bapak teori himpunan, karena beliaulah yang pertama kali mengembangkan cabang matematika ini. Ide-idenya tentang teori himpunan dapat memuaskan keinginan public terutama idenya tentang himpunan tak berhingga (infinite yaitu himpunan yang banyak anggotanya tak berhingga).

Beliau mengembangkan hierarki himpunan infinite yang ternyata dapat digunakan diberbagai himpunan infinite yang berbeda. Penemuan ini dianggap penemuan yang revolusioner oleh para matematikawan pada jaman itu. Cantor meninggal di suatu institusi mental di Jerman pada usia 73 tahun. Banyak yang menganggap bahwa mentalnya jatuh karena serangan-serangan terhadap ide-ide dan hasil karyanya yang dilakukan oleh para matematikawan lain.

Pada tahun-tahun terakhir ini, teori himpunan mendapatkan perhatian khusus dalam penguasaan matematika, karena setiap cabang matematika berkaitan erat dan menjadi bagian teori himpunan.

B. Pengertian Himpunan

Suatu koleksi (kumpulan) objek yang didefinisikan dengan baik (well defined) disebut himpunan .¹ Kumpulan itu dapat berupa daftar, koleksi, dan kelas. Objek-objek dalam kumpulan itu dapat berupa benda konkrit atau benda abstrak, seperti bilangan, abjad, orang, sungai, negara. Objek-objek ini disebut anggota atau elemen dari himpunan itu.

Syarat tertentu dan jelas dalam menentukan himpunan itu menyebabkan kita dapat membedakan objek yang merupakan anggota himpunan dan objek yang bukan merupakan anggota himpunan. Himpunan yang mempunyai syarat tertentu dan jelas sehingga dapat ditentukan objek mana yang menjadi anggota himpunan itu dan objek mana yang bukan anggota himpunan itu disebut himpunan yang terdefinisi dengan baik (*well defined*).

1. Konsep Dasar Himpunan

Himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf besar A, B, C, K, X, \dots , dan sebagainya. Sedang anggota suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kecil a, b, c, k, x, \dots dan sebagainya.

Ada 3 cara untuk mendefinisikan suatu himpunan yaitu:

- 1) Dengan mendaftar anggota-anggotanya di antara kurung kurawal buka dan tutup.

Contoh 1.1

1. $P = \{a, i, e, o, u\}$
2. $Q = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

- 2) Dengan menyatakan sifat-sifat yang dipenuhi oleh anggota-anggotanya

Contoh 1.2

1. $P =$ himpunan vokal dan abjad latin
2. $Q =$ himpunan bilangan cacah ganjil yang kurang dari 10

- 3) Dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan

Contoh 1.3

1. $P = \{x \mid x \text{ adalah vokal dan abjad latin}\}$
2. $Q = \{x \mid x \text{ adalah bilangan cacah ganjil yang kurang dari } 10\}$

Symbol “=” berarti “adalah nama lain dari”

Jika x adalah anggota himpunan A , berarti A mempunyai x sebagai salah satu anggotanya dan dapat ditulis: $x \in A$ (dibaca x anggota A atau x elemen A). Sebaliknya jika x bukan anggota himpunan A , berarti A tidak mempunyai x sebagai salah satu anggotanya maka ditulis: $x \notin A$ (dibaca: x bukan anggota A , atau x bukan elemen A).

Contoh 1.4

1. $P = \{a, i, e, o, u\}$, maka $a \in P, b \notin P, e \in P$
2. $Q = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, maka $3 \in Q, 6 \notin Q, 8 \notin Q$

Suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut *himpunan kosong* dan dinyatakan dengan simbol \emptyset atau $\{ \}$. Misalnya, $\{x : x \in \mathbb{R} \text{ dan } x^2 < 0\} = \emptyset$. Himpunan yang hanya mempunyai satu anggota, seperti $\{x\}$, disebut *himpunan singleton*.

Selanjutnya, notasi \mathbb{N} , \mathbb{Q} , \mathbb{R} , \mathbb{Z} , dan \mathbb{C} akan digunakan berturut-turut sebagai himpunan bilangan asli, rasional, real, bulat, dan kompleks. Dan kita gunakan notasi khusus untuk interval dari garis bilangan real sebagai berikut.

Jika a, b bilangan-bilangan real dengan $a < b$, maka:

- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ disebut interval tutup
- $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ disebut interval buka
- $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ disebut interval setengah buka
(buka kanan)
- $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$ disebut interval setengah buka
(buka kiri)


2. Relasi antar Himpunan

a. Subset dari Himpunan

Definisi 1.1

Himpunan A disebut himpunan bagian (subset) dari himpunan B jika setiap anggota A juga merupakan anggota B , yaitu $x \in A \Rightarrow x \in B$, maka A disebut himpunan bagian dari B , ditulis $A \subseteq B$.

Relasi ini dinyatakan dengan notasi $A \subset B$ (dibaca A “himpunan bagian” B atau A “subset” dari B).



Gambar 1.1 Himpunan Bagian dan Himpunan Bagian Sejati

Contoh 1.5

1. $C = \{1, 3, 5\}$ adalah himpunan bagian dari $Q = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ karena 1, 3, 5 yang anggota C juga menjadi anggota Q . Maka ditulis $C \subset Q$
2. Diketahui $D = \{a, i, o, e\}$ dan $E = \{i, a, e, o\}$. Karena a, i, o, e yang menjadi anggota D juga menjadi anggota E , maka dapat ditulis $D \subset E$
3. Diketahui $G = \{\text{bilangan bulat genap}\}$ dan $B = \{\text{bilangan bulat}\}$. Maka $G \subset B$

Contoh 1.6

Tunjukkan bahwa himpunan bilangan asli N merupakan himpunan bagian sejati dari himpunan bilangan bulat Z , himpunan bilangan

bulat Z merupakan himpunan bagian sejati dari himpunan bilangan rasional Q dan himpunan bilangan rasional Q merupakan himpunan bagian sejati dari himpunan bilangan real R .

Penyelesaian :

Diketahui :

$$N = \{\text{himpunan bilangan asli}\} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$Z = \{\text{himpunan bilangan bulat}\} = (\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots)$$

$$Q = \{\text{himpunan bilangan rasional}\} = \{\dots, -2, -1,5, -1, -0,5, 0, 0,5, 1, \dots\}$$

$$R = \{\text{himpunan bilangan real}\} = \{\dots, -2, -1,5, -1, -1/2, -1/4, 0, 0,25, 1/2, \dots\}$$

$$N \subset Z \subset Q \subset R$$

A subset B dapat ditulis sebagai $B \supset A$, dibaca B superset A atau B memuat A . Jika A bukan subset B , maka ditulis $A \not\subset B$.

b. Himpunan yang Sama

Definisi 1.2

Himpunan A dan himpunan B adalah sama (ditulis $A = B$) jika dan hanya jika $A \subset B$ dan $B \subset A$.

Contoh 1.7

-
1. Ditentukan himpunan $A = \{a, b, c, d\}$ dan $B = \{b, d, a, c\}$. Maka himpunan $A = B$, berarti $\{a, b, c, d\} = \{b, d, a, c\}$ karena setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B , dan anggota himpunan B juga menjadi anggota himpunan A . Dengan demikian urutan anggota dari dua himpunan tidak diperhatikan.
 2. Ditentukan himpunan $P = \{1, 2, 3\}$ dan $Q = \{1, 3, 2, 1, 2\}$. Maka himpunan $P = Q$, berarti $\{1, 2, 3\} = \{1, 3, 2, 1, 2\}$ karena setiap anggota himpunan P juga menjadi

anggota himpunan \mathcal{Q} , dan sebaliknya. Dengan demikian penulisan ulangan anggota suatu himpunan tidak diperhatikan dan ditulis tanpa pengulangan.

c. Himpunan yang Berpotongan

Definisi 1.3

Dua himpunan A dan B dikatakan berpotongan jika dan hanya jika ada anggota A yang menjadi anggota B .

Contoh 1.8

1. $C = \{3, 4, 5, 6\}$ dan $D = \{2, 5, 8\}$ adalah dua himpunan yang berpotongan, karena ada anggota C yaitu 5 yang menjadi anggota D .
2. Ditentukan $X = \{x \mid x^2 + 3x + 2 = 0\}$ dan $Y = \{x \mid x^2 - x - 6 = 0\}$. Maka X dan Y berpotongan, karena $X = \{-1, -2\}$ dan $Y = \{3, -2\}$, ada anggota X yang juga anggota Y , yaitu -2 .

d. Himpunan yang Saling Lepas

Definisi 1.4

Dua himpunan A dan B dikatakan lepas (ditulis $A \parallel B$) jika dan hanya jika kedua himpunan itu tidak kosong dan tidak mempunyai elemen yang sama.

Contoh 1.9

1. $F =$ himpunan bilangan bulat positif dan $G =$ himpunan bilangan bulat negatif merupakan dua himpunan yang saling lepas, karena kedua himpunan itu tidak mempunyai elemen yang sama.
2. Ditentukan $V = \{1, 3, 5\}$ dan $W = \{2, 3, 4\}$. Maka V dan W tidak saling lepas, karena kedua himpunan itu mempunyai anggota persekutuan, yaitu 3.

3. Operasi Pada Himpunan

a. Gabungan

Definisi 1.5

Gabungan himpunan A dan B (ditulis $A \cup B$) adalah himpunan semua anggota A atau semua anggota B atau anggota kedua-duanya (dibaca A gabungan B).

A gabungan B dapat juga didefinisikan sebagai:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ atau } x \in B\}$$

Contoh 1.10

- 1) Jika $P = \{1, 2, 3\}$ dan $Q = \{a, b, c, d\}$ maka $P \cup Q = \{1, 2, 3, a, b, c, d\}$
- 2) Ditentukan $C = \{0\}$ dan $D =$ himpunan bilangan bulat positif. Maka $C \cup D =$ himpunan bilangan cacah.

b. Irisan

Definisi 1.6

Irisan dari himpunan A dan himpunan B (ditulis $A \cap B$) adalah himpunan dari anggota persekutuan A dan himpunan B (dengan kata lain, himpunan yang anggota-anggotanya adalah anggota A dan anggota B) dibaca A irisan B .

A irisan B dapat didefinisikan sebagai:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ dan } x \in B\}$$


Contoh 1.11

1. Ditentukan $A = \{p, o, t, r, e, t\}$ dan $B = \{t, a, p, e\}$. Maka $A \cap B = \{p, t, e\}$
2. Jika $M = \{\text{bilangan asli kelipatan } 2\}$ dan $N = \{\text{bilangan asli kelipatan } 3\}$ maka $M \cap N = M \cap N = \{6, 12, 18, \dots\}$
3. Jika $C =$ himpunan bilangan cacah dan $D = \{x \mid 2x^2 + 5x = 3\}$ maka $C \cap D = \phi$.

c. **Komplemen**

Definisi 1.7

Komplemen suatu himpunan A (ditulis A^c atau A^c) adalah himpunan anggota-anggota di dalam semesta pembicaraan yang bukan anggota A .



Gambar 1.2 Diagram Venn Satu Gabungan, Irisan dan Komplemen

Contoh 1.12

1. Ditetapkan $E = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ di dalam semesta pembicaraan himpunan bilangan cacah. Maka $E^c = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$.
2. Semesta pembicaraan $S = \{i, n, d, o, n, e, s, i, a\}$ dan $X = \{v, o, k, a, l\}$ maka $X^c = \{n, d, s\}$
3. Jika $K = \{x | x > 0, x \text{ bilangan real}\}$ maka $K^c = \{x | x < 0, x \text{ bilangan real}\}$.

d. **Selisih Dua Himpunan (Difference)**

Definisi 1.8

Selisih dua himpunan A dan B sama dengan irisan A dan B^c : $A - B = A \cap B^c$.

Contoh 1.13

1. Diketahui $A = \{\text{abjad latin}\}$ dan $B = \{\text{vocal}\}$ maka $A - B = \{\text{konsonan}\}$
2. Jika $P = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $Q = \{2, 5, 6, 4, 7\}$ maka $P - Q = \{1, 3\}$

3. $X = \{\text{bilangan real positif}\}$ dan $Y = \{\text{bilangan real negatif}\}$. Maka $X - Y = X$

Berdasarkan pengertian di atas, maka definisi dari selisih dua himpunan A dan B dapat juga di tulis sebagai berikut:

$$A - B = \{x | x \in A, x \notin B\} = \{x | x \in A, x \in B^c\} \text{ atau } A \cap B^c.$$

4. Sifat-sifat Operasi

Jika A, B, dan C adalah himpunan bagian dari X, maka:

(a). Idempoten

a. $A \cup A = A$

b. $A \cap A = A$

(b). Identitas:

a. $A \cup U = U; A \cup \phi = A$

b. $A \cap U = A; A \cap \phi = \phi$

(c). Komutatif:

a. $A \cup B = B \cup A$

b. $A \cap B = B \cap A$

(d). Asosiatif:

a. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

b. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

(e). Distributif:

a. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

b. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

(f). De Morgan:

a. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

b. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Bukti:

$$(c). A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\} = \{x | x \in B \vee x \in A\} = B \cup A$$

$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\} = \{x | x \in B \wedge x \in A\} = B \cap A$$

(e). Misalkan x elemen sebarang dari $A \cup (B \cap C)$, maka $x \in A \cup (B \cap C)$.

$$\Leftrightarrow x \in A \vee x \in (B \cap C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \vee \{x \in B \wedge x \in C\}$$

$$\Leftrightarrow \{x \in A \vee x \in B\} \wedge \{x \in A \vee x \in C\}$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \wedge x \in (A \cup C)$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\text{Akibatnya, } A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Dan

$$(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$$

Oleh karena itu,

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$$

(f). a. Jika x elemen sebarang dari $(A \cup B)^c$, maka

$$x \in (A \cup B)^c \Leftrightarrow x \notin A \cup B.$$

$$\Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B$$

$$\Leftrightarrow x \in A^c \wedge x \in B^c$$

$$\Leftrightarrow x \in A^c \cap B^c$$

$$\text{Selanjutnya, } (A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$$

$$\text{dan } A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$$

$$\text{oleh karena itu } (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

Teorema 1.9

Untuk sebarang tiga himpunan A, B, dan C diperoleh :

1. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
2. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Bukti :

1. Akan dibuktikan $A \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap (A \cup C)$

a. Ambil $x \in A \cup (B \cap C)$

Maka $x \in A$ atau $(x \in B \cap C)$

$x \in A$ atau $(x \in B \text{ dan } x \in C)$

$(x \in A \text{ atau } x \in B)$ dan $(x \in A \text{ atau } x \in C)$

$x \in A \cup B$ dan $x \in A \cup C$

$x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$

jadi $A \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap (A \cup C)$

b. $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subset A \cup (B \cap C)$

Ambil $y \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$(y \in A \text{ atau } y \in B)$ dan $(y \in A \text{ atau } y \in C)$

$y \in A$ atau $(y \in B \text{ dan } y \in C)$

$y \in A$ atau $y \in B \cap C$

$y \in A \cup (B \cap C)$

jadi $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$

dari a dan b diperoleh $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

2. Yang dibuktikan dari $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ adalah :

a. $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Misalkan $x \in A$ dan $x \in B \cup C$

$x \in A \cap (B \cup C)$

$x \in A$ dan $x \in (B \cup C)$

$x \in A$ dan $\{x \in B \text{ atau } x \in C\}$

$$\{x \in A \text{ dan } x \in B\} \text{ atau } \{x \in A \text{ dan } x \in C\}$$

$$x \in (A \cap B) \text{ atau } x \in (A \cap C)$$

$$x \in (A \cup B) \cup (A \cup C)$$

sehingga $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$

b. $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$

Misalkan $x \in A$ dan $x \in B, x \in C$

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$x \in (A \cap B) \text{ atau } x \in (A \cap C)$$

$$\{x \in A \text{ dan } x \in B\} \text{ atau } \{x \in A \text{ dan } x \in C\}$$

$$x \in A \text{ dan } \{x \in B \text{ dan } x \in C\}$$

$$x \in A \text{ dan } x \in (B \cup C)$$

$$x \in A \cap (B \cup C)$$

sehingga $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$

Dari persamaan a dan b, terbukti bahwa $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Definisi 1.10

Untuk sebarang dua himpunan A dan B diperoleh :

(i) $A \subseteq B \iff A \cap B = A$

(ii) $A \subseteq B \iff A \cup B = B$

Bukti :

(i) Harus dibuktikan $A \subseteq B \rightarrow A \cap B = A$ dan $A \cup B = B \rightarrow A \subseteq B$

a. $A \subseteq B \rightarrow A \cap B = A$

Misalkan $x \in A$ dan $x \in B$, maka $x \in A \cap B$

$A \subseteq A \cap B$ dan $A \cap B \subseteq B$, maka $A = A \cap B$

b. $A \cap B = A \rightarrow A \subseteq B$

Misalkan $x \in A$ dan $x \in B$, maka $x \in$ keduanya

$x \in A \cap B = A$ maka $A \cap B \subseteq B$ sehingga $A \subseteq B$

dari persamaan a dan b, terbukti bahwa $A \subseteq B \iff A \cap B = A$

(ii) Harus dibuktikan bahwa $A \subseteq B \rightarrow A \cup B = B$ dan $A \cup B = B \rightarrow A \subseteq B$

a. $A \subseteq B \rightarrow A \cup B = B$

Misalkan $x \in A$ atau $x \in B$, maka $x \in$ keduanya

$x \in A \cup B$, $x \in A$ atau $x \in B$ maka $B = A \cup B$

b. $A \cup B = B \rightarrow A \subseteq B$

Misalkan $x \in A$ dan $x \in B$, maka $x \in$ keduanya

$x \in A \cup B = B$ maka $A \cup B \subseteq B$ sehingga $A \subseteq B$

dari persamaan a dan b, terbukti bahwa $A \subseteq B \iff A \cup B = B$.

C. Pemetaan

Misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak kosong. Hasil kali silang (hasil kali Cartesius) dari himpunan A dan himpunan B ditulis “A x B” didefinisikan sebagai berikut:

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ dan } y \in B\}$$

Dengan perkataan lain, A x B adalah himpunan dari semua pasangan terurut dengan komponen pertama diambil elemen dari A dan komponen kedua diambil elemen dari B.

Contoh 1.14

Misalkan $A = \{1, 2, 3\}$ dan $B = \{a, b\}$, sehingga

$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$ sedangkan


$B \times A = \{(a, 1), (b, 1), (a, 2), (b, 2), (a, 3), (b, 3)\}$

Salah satu konsep yang penting dalam setiap cabang matematika adalah pemetaan atau fungsi. Misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak kosong. Suatu cara atau aturan yang memasangkan atau mengaitkan setiap elemen dari himpunan A dengan tepat satu elemen

dari himpunan B, disebut pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Misalkan cara atau aturan yang mengaitkan tersebut disimbolkan dengan f , maka dikatakan bahwa f adalah pemetaan dari A ke B dan dilambangkan sebagai

$$f: A \rightarrow B \text{ atau } A \xrightarrow{f} B$$

dibaca :”fungsi f dari A ke B” atau f adalah pemetaan dari A ke B. Pemetaan f ini dapat dilukiskan dengan diagram seperti gambar berikut:



Gambar 1.3 fungsi f dari A ke B

Selanjutnya himpunan A disebut daerah asal (domain) dari f , dan B disebut daerah kawan (kodomain) dari f . Apabila $a \in A$ maka suatu elemen dari B yang merupakan pasangan dari a disebut peta (bayangan atau image) dari a dan dinyatakan dengan simbol $f(a)$.


Definisi 1.11 (Definisi Fungsi)

Misalkan A dan B dua buah himpunan tidak kosong, fungsi f dari A ke B adalah suatu relasi yang mengaitkan setiap anggota $a \in A$ dengan hanya satu pasangan yang dinyatakan dengan $f(a)$ di B , dan ditulis $f: A \rightarrow B$ dengan f adalah fungsi dari A ke B .

Contoh 1.15

Misalkan $A = \{a, b, c, d\}$ dan $B = \{x, y, z\}$

Misalkan $f: A \rightarrow B$ didefinisikan seperti pada diagram berikut ini:



Gambar 1.4 Gambaran $f: A \rightarrow B$

Pada pemetaan ini dapat dikatakan bahwa $f(a) = x$, $f(b) = y$, $f(c) = y$, dan $f(d) = z$. Pemetaan f ini dapat pula ditulis sebagai himpunan pasangan terurut

$$f = \{(a, x), (b, y), (c, y), (d, z)\}$$

Perlu diperhatikan bahwa setiap elemen dari A harus dipasangkan dengan tepat satu elemen dari B . Berarti tidak ada elemen dari A yang tidak berpasangan dan tidak ada elemen dari A yang dipasangkan dengan lebih dari satu elemen dari B . Tetapi satu elemen dari B boleh mempunyai pasangan lebih dari satu elemen dari A atau boleh tidak memperoleh pasangan elemen dari A .

Teorema 1.12

Jika $f: S \rightarrow T$ suatu pemetaan dan $A, B \subset S$, maka

- (i) $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$
- (ii) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
- (iii) Jika $A \subset B$ maka $f(A) \subset f(B)$

Bukti:

(i) Ambil sebarang $y \in f(A \cap B)$, maka ada $x \in A \cap B$ sedemikian hingga $y = f(x)$. Karena $x \in A \cap B$, maka $x \in A$ dan $x \in B$ sehinggalah $f(x) \in f(A)$ dan $f(x) \in f(B)$. Berarti $f(x) \in f(A) \cap f(B)$. Karena $y = f(x)$, maka $y \in f(A) \cap f(B)$. Jadi jika $y \in f(A \cap B)$ maka $y \in f(A) \cap f(B)$, sehinggalah $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.

(ii) Kita harus membuktikan kesamaan dua himpunan, sehinggalah pada (ii) kita harus menunjukkan bahwa $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$ dan $f(A) \cup f(B) \subset f(A \cup B)$. Ambil sebarang $y \in f(A \cup B)$, maka $x \in A \cup B$ sedemikian sehinggalah $y = f(x)$. Karena $x \in A \cup B$, maka $x \in A$ atau $x \in B$ sehinggalah $f(x) \in f(A)$ atau $f(x) \in f(B)$. Hal ini berarti $f(x) \in f(A) \cup f(B)$. Karena $y = f(x)$, maka $y \in f(A) \cup f(B)$. Jadi jika $y \in f(A \cup B)$ maka $y \in f(A) \cup f(B)$. Berarti $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$.

Sebaliknya, diambil sebarang $t \in f(A) \cup f(B)$. Maka $t \in f(A)$ atau $t \in f(B)$.

Jika $t \in f(A)$, maka ada $s \in A$ sehinggalah $t = f(s)$

Jika $t \in f(B)$, maka ada $r \in B$ sehinggalah $t = f(r)$

Karena $s \in A$ dan $r \in B$ maka $s, r \in A \cup B$ sehinggalah $f(s), f(r) \in f(A \cup B)$. Karena $t = f(s) = f(r)$, maka $t \in f(A \cup B)$. Jadi jika $t \in f(A) \cup f(B)$ maka $t \in f(A \cup B)$. Berarti $f(A) \cup f(B) \subset f(A \cup B)$. Terbukti bahwa $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$.


(iii) Sebagai latihan

Definisi 1.13

Misalkan $f : A \rightarrow B$ suatu fungsi

- a) f dikatakan fungsi satu-satu jika $\forall x, y \in A$ dengan $f(x) = f(y)$ maka $x = y$

- b) f dikatakan fungsi onto jika $\forall b \in B$, ada $a \in A$ sehingga $f(a) = b$
- c) Jika f fungsi satu-satu dan onto maka f dikatakan fungsi bijektif.



Gambar 1.5 Pemetaan injektif, surjektif dan bijektif

Contoh 1.16

- a. $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dengan $f(n) = 2n, \forall n \in \mathbb{N}$ adalah fungsi satu-satu.
- b. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ dengan $f(x) = x^2, \forall x \in \mathbb{R}$ adalah fungsi onto.
- c. $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dengan $f(z) = z, \forall z \in \mathbb{Z}$ adalah fungsi bijektif.

D. Relasi Ekuivalen

Suatu relasi T dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari $A \times B$. Bila pasangan (a,b) merupakan anggota dari T , maka a berelasi dengan b , dan ditulis sebagai aTb . Bila (a,b) bukan merupakan anggota dari T , maka a tidak berelasi dengan b , dan ditulis $a \nabla b$

Relasi-relasi dalam kehidupan sehari-hari misalnya “*orang tua dari*”, “*lebih pintar dari*”, “*berasal dari daerah yang sama*”. Sedangkan relasi-relasi dalam matematika misalnya “*sama dengan*”, “*adalah anggota dari*” dan

“*sebangun*”. Suatu relasi T dari A ke B mempunyai sifat bahwa untuk suatu unsur $a \in A$ dan $b \in B$, maka aTb atau $a \nabla b$.

Suatu fungsi $f: A \rightarrow B$ menunjukkan suatu relasi T dari A ke B yang memberikan aTb yang artinya $f(a) = b$. Himpunan bagian T dari $A \times B$ adalah grafik dari fungsi tersebut. Dengan demikian maka relasi-relasi adalah keadaan yang umum daripada fungsi-fungsi. Satu unsur dapat berelasi dengan beberapa unsur atau tidak berelasi sama sekali.

Suatu relasi dari himpunan A ke A sendiri disebut relasi pada A . Suatu terurut parsial pada suatu himpunan, misalnya “ \leq ” pada himpunan bilangan-bilangan real, atau “*himpunan bagian dari* (\subseteq)” pada suatu himpunan kuasa $P(X)$ adalah relasi pada himpunan-himpunan tersebut. “*sama dengan* ($=$)” adalah relasi pada suatu himpunan S dan didefinisikan oleh himpunan bagian $\{(a,a), a \in A\}$ dari $A \times A$. Suatu relasi ekuivalen adalah relasi yang mempunyai beberapa sifat yang harus dipenuhi, seperti dalam definisi berikut:

Definisi 1.14

Suatu relasi T pada himpunan A disebut relasi ekuivalen bila memenuhi sifat-sifat berikut:

- a. aTa berlaku $\forall a \in A$ (Sifat Refleksi)
- b. aTb maka bTa berlaku $\forall a, b \in A$ (Sifat Simetri)
- c. aTb dan bTc , maka aTc berlaku $\forall a, b, c \in A$ (Sifat Transitif)

Bila T adalah suatu relasi ekuivalen pada himpunan A dan $a \in A$, maka $[a] = \{x \in A \mid xTa\}$ disebut kelas ekuivalen yang memuat a . Himpunan dari semua kelas ekuivalen disebut himpunan faktor dari A oleh T , dan ditulis A/T .

Jadi,

$$A/T = \{[a] \mid a \in A\}$$

Suatu koleksi dari himpunan-himpunan bagian tak kosong disebut partisi dari himpunan A bila gabungan dari himpunan-himpunan bagian tersebut adalah A dan sebarang dua himpunan bagian tersebut adalah lepas.

Contoh 1.17

Misalkan n adalah bilangan bulat positif, a dan b adalah bilangan-bilangan bulat. Kita katakan bahwa a kongruen dengan b modulo n , bila n membagi $a - b$, yang ditulis:

$$a \equiv b \pmod{n}$$

Himpunan dari kelas-kelas ekuivalen tersebut disebut himpunan dari bilangan-bilangan bulat modulo n dan ditulis dengan Z_n . Tunjukkan bahwa relasi kongruen modulo n adalah suatu relasi ekuivalen pada himpunan bilangan bulat Z .

Penyelesaian:

$$a \equiv b \pmod{n} \text{ bila hanya bila } n \mid (a - b)$$

a. Sifat Refleksi

$$\forall a \in Z$$

Jika $n \mid (a - a)$, ini berarti $a \equiv a \pmod{n}$, sehingga aTa

b. Sifat Simetris

$$\forall a, b \in Z$$

Jika $n \mid (a - b)$, ini berarti $a \equiv b \pmod{n}$, sehingga aTb

Jika $n \mid -(a - b) = n \mid (b - a)$, ini berarti $b \equiv a \pmod{n}$, sehingga bTa

Jadi bila aTb maka bTa

c. Sifat Transitif

$$\forall a, b, c \in Z$$

Jika $n \mid (a - b)$, ini berarti $a \equiv b \pmod{n}$, sehingga aTb

Jika $n \mid (b - c)$, ini berarti $b \equiv c \pmod{n}$, sehingga bTc

Jika $n \mid (a - b) + (b - a) = n \mid (a - c)$, ini berarti $a \equiv c \pmod{n}$, sehingga $a \equiv c \pmod{n}$.

Jadi, bila $a \equiv b \pmod{n}$ dan $b \equiv c \pmod{n}$, maka $a \equiv c \pmod{n}$.

Jadi kongruensi modulo n adalah suatu relasi ekuivalen pada himpunan \mathbb{Z} .

Di dalam relasi kongruensi modulo 2, mempunyai kelas-kelas ekuivalen sebagai berikut:

$$[0] = \{\dots, -2, 0, 2, 4, 6, \dots\} \quad [2] = \{\dots, 0, 2, 4, 6, \dots\} = [0]$$

$$[1] = \{\dots, -1, 1, 3, 5, 7, \dots\} \quad [3] = \{\dots, 1, 3, 5, 7, \dots\} = [1]$$

Suatu kelas ekuivalen pada bilangan bulat modulo 2 haruslah satu diantara $[0]$ atau $[1]$, $\mathbb{Z}_2 = \{[0], [1]\}$

Suatu kelas ekuivalen pada bilangan bulat modulo n adalah $\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], [2], \dots, [n-1]\}$ merupakan kongruen n dengan sisa pembagian n .

Salah satu himpunan dari kelas-kelas ekuivalen yang termasuk ke dalam kelas sederhana (dasar) adalah himpunan bilangan-bilangan rasional, misalkan $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{4}$ merupakan bilangan rasional yang sama. Pada konsep dari kelas ekuivalen didefinisikan relasi T pada $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ (dengan $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} - \{0\}$) oleh $(a,b)T(c,d)$ bila dan hanya bila $ad = bc$. Relasi tersebut adalah relasi ekuivalen pada $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ tersebut disebut bilangan rasional. Relasi ekuivalen tersebut ditulis $[(a, b)]$ oleh $\frac{a}{b}$. Jadi $(1,2)T(2,4)$, maka $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.

E. Sifat-sifat Operasi Biner

Definisi 1.15

Misalkan S adalah suatu himpunan sebarang tak kosong, maka pemetaan $S \times S \rightarrow S$ disebut operasi biner.

Misalkan f suatu operasi biner dalam S , yaitu suatu pemetaan dari $S \times S$ ke S , dan misalkan $(a,b) \in S \times S$ dengan $f(a,b) \in c$, maka ditulis $a * b = c$ (dibaca a operasi biner b sama dengan c . jadi sesuai dengan konsep pemetaan, sesungguhnya pasangan terurut $(a,b) \in S \times S$ dikaitkan dengan c , yang dinotasikan dengan $(a,b) \rightarrow c$.

Definisi 1.16

Suatu operasi biner $*$ dan \circ pada himpunan tidak kosong G dikatakan:

- (i) Asosiatif, jika $(a*b)*c = a*(b*c)$, $\forall a, b, c \in G$
- (ii) Komutatif, jika $a*b = b*a$, $\forall a, b \in G$
- (iii) Mempunyai unsur identitas, jika ada $e \in G$, sehingga $e*a = a*e = a \forall a \in G$
- (iv) Setiap anggota mempunyai invers di G , jika $\forall a \in G$ ada $a^{-1} \in G$ sehingga $a*a^{-1} = a^{-1}*a = e$
- (v) Operasi $*$ pada G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri, jika $a*b = a*c$ mengakibatkan $b = c$ untuk setiap $a, b, c \in G$
- (vi) Operasi $*$ pada G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan, jika $b*a = c*a$, mengakibatkan $b = c$, untuk setiap $a, b, c \in G$
- (vii) Anggota $e \in G$ dikatakan identitas kiri di G , jika $e*a = a$, $\forall a \in G$
- (viii) Jika e identitas kanan di G , jika $a*e = a \forall a \in G$. Dan jika $b \in G$, dikatakan invers kanan dari $a \in G$, jika $a*b = e$
- (ix) Operasi \circ dikatakan distributif kiri terhadap $*$ jika $a \circ (b*c) = (a \circ b) * (a \circ c)$, $\forall a, b, c \in G$
- (x) Operasi \circ dikatakan distributif kanan terhadap $*$ jika $(a*b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$, $\forall a, b, c \in G$.

Definisi 1.17

Suatu himpunan tidak kosong G dengan satu atau lebih operasi biner pada G dikatakan struktur aljabar, atau sistem aljabar dan ditulis $(G, *)$.

Misalkan S suatu himpunan yang dilengkapi dengan sekelompok operasi biner $*$ dan \circ , maka S menjadi satu struktur aljabar dengan dua operasi biner yang dinotasikan $(S, *, \circ)$ atau $(S, \circ, *)$

Contoh 1.18

Himpunan semua bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan suatu struktur aljabar, yang dinotasikan dengan $(Z, *, .)$

Definisi 1.18

Grupoid adalah suatu struktur aljabar yang mempelajari hanya satu operasi biner (terhadap penjumlahan atau perkalian).

Contoh 1.19

Misalkan S adalah suatu himpunan tak kosong didefinisikan $x \cdot y = y$ untuk setiap $x, y \in S$, maka $(S, .)$ adalah merupakan sebuah grupoid.

Contoh 1.17

Misalkan S adalah suatu himpunan tak kosong, didefinisikan $x + y = y$ untuk setiap $x, y \in S$, maka $(S, +)$ adalah merupakan grupoid

F. Latihan

1. Jika $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ dan $C = \{2, 4, 5, 7\}$
Tunjukkan bahwa $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
2. Jika $A = \{1, 3, 5, 7, 8\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $C = \{1, 2, 5, 9\}$
Tentukanlah $A - B - C$
3. Buktikan bahwa $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
4. Dengan menggunakan relasi ekuivalen. Tunjukkan bahwa :
 - a. $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$
 - b. $\frac{10}{2} = 5$
 - c. $\frac{4}{2} = \frac{8}{4} = 2$
5. Misalkan suatu himpunan yang tak kosong Z^+ adalah himpunan bilangan bulat positif didefinisikan $x * y = |x - y|$ bila $x \neq y$ dan $y * y = y$ untuk setiap $x, y \in Z^+$. Tunjukan apakah operasi binernya tertutup, komutatif dan assosiatif!
6. Misalkan suatu himpunan yang tak kosong $S = \{a, b, c, d\}$, didefinisikan $x * y = y$ untuk setiap $x, t \in S$ adalah suatu operasi biner dalam S . Tunjukan operasi biner dari himpunan tersebut!



BAB II

TEORI RING

A. Sifat-sifat Ring

Pada buku sebelumnya telah dibahas konsep grup yaitu suatu struktur aljabar dengan satu operasi biner pada operasi penjumlahan dan perkalian dengan syarat yaitu sifat tertutup dan asosiatif, memiliki identitas, dan memiliki invers.

Misalkan pandang suatu bilangan bulat Z sebagai suatu grup $(Z, +)$ dan himpunan bilangan bulat yang tidak sama dengan nol Z' sebagai monoid (Z', \cdot) , tetapi kedua struktur tersebut mengabaikan relasi antara penjumlahan $(+)$ dan perkalian (\cdot) , misalkan diketahui bahwa perkalian tersebut memenuhi sifat distributif terhadap penjumlahan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai struktur aljabar yang terdiri dari satu himpunan tak kosong dengan dua operasi biner yaitu terhadap penjumlahan dan perkalian, struktur aljabar ini disebut dengan Ring (Gelanggang)

Berikut ini diberikan definisi ring yaitu:

Definisi 2.1

Suatu Ring $(R, +, \cdot)$ adalah suatu himpunan tak kosong R dengan operasi biner penjumlahan $(+)$ dan perkalian (\cdot) pada R yang memenuhi aksioma-aksioma berikut:

1. Tertutup terhadap penjumlahan
Misalkan a dan b adalah anggota R ,
Maka a dan b tertutup bila $a + b \in R$
2. Asosiatif terhadap penjumlahan
Misalkan $a, b, c \in R$
Maka $(a + b) + c = a + (b + c)$
3. Adanya unsur satuan atau identitas terhadap penjumlahan
Misalkan $a \in R$

- Maka $a + e = e + a = a$
4. Adanya unsur balikan atau invers terhadap penjumlahan
Misalkan $a \in R$
Maka $a + (-a) = (-a) + a = e$
 5. Komutatif terhadap penjumlahan
Misalkan $a, b \in R$
Maka $a + b = b + a$
 6. Tertutup terhadap penjumlahan
Misalkan a dan b adalah anggota R ,
Maka a dan b tertutup bila $a \cdot b \in R$
 7. Asosiatif terhadap perkalian
Misalkan $a, b, c \in R$
Maka $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
 8. Adanya unsur satuan atau identitas terhadap perkalian
Misalkan $a \in R$
Maka $a \cdot e = e \cdot a = a$
 9. Distributif perkalian (\cdot) terhadap penjumlahan($+$)
Misalkan $a, b, c \in R$
Maka $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ dan $(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner $(R, + \cdot)$ dikatakan suatu Ring (Gelanggang) bila:

1. $(R, +)$ merupakan suatu Grup komutatif
2. (R, \cdot) merupakan suatu Semigrup/Monoid
(catatan : Beberapa penulis buku mengatakan bahwa di dalam suatu Ring tidak perlu mempunyai identitas terhadap perkalian)
3. Distributif perkalian terhadap penjumlahan

Contoh 2.1

Tunjukkan bahwa Z_4 adalah merupakan Ring.

Penyelesaian:

Tabel 2.1 Daftar Cayley ($Z_4, +$) dan (Z_4, \cdot)-0

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

.	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

Dari tabel 2.1 akan ditunjukkan bahwa $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ merupakan suatu Ring bila memenuhi:

1. Grup Komutatif terhadap penjumlahan ($Z_4, +$)

- Tertutup

Ambil sebarang nilai dari Z_4

Misalkan $0, 1, 2, 3 \in Z_4$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 2$$

$$1 + 2 = 3$$

$$1 + 3 = 0$$

Karena hasilnya $0, 1, 2, 3 \in Z_4$ maka tertutup terhadap Z_4

- Assosiatif

Ambil sebarang nilai dari Z_4

Misalkan $a = 2, b = 1$ dan $c = 3 \in Z_4$

$$(a + b) + c = (2 + 1) + 3 = 3 + 3 = 6$$

$$a + (b + c) = 2 + (1 + 3) = 2 + 4 = 6$$

sehingga:

$$(a + b) + c = a + (b + c) = 6$$

Maka Z_4 assosiatif

- Adanya unsur satuan atau identitas

Ambil sebarang nilai dari Z_4

- Misalkan $0 \in Z_4$
 $0 + e = e + 0 = 0$
- Misalkan $1 \in Z_4$
 $1 + e = e + 1 = 1$
- Misalkan $2 \in Z_4$
 $2 + e = e + 2 = 2$
- Misalkan $3 \in Z_4$
 $3 + e = e + 3 = 3$

Maka Z_4 ada unsur satuan atau identitas

- Adanya unsur balikan atau invers

- Ambil sebarang nilai dari Z_4 , misalkan $0 \in Z_4$, pilih $0 \in Z_4$ sehingga
 $0 + 0 = 0 = e$, maka $(0)^{-1} = 0$
- Ambil sebarang nilai dari Z_4 , misalkan $1 \in Z_4$, pilih $3 \in Z_4$ sehingga
 $1 + 3 = 0 = e$, maka $(1)^{-1} = 3$
- Ambil sebarang nilai dari Z_4 , misalkan $2 \in Z_4$, pilih $2 \in Z_4$ sehingga
 $2 + 2 = 0 = e$, maka $(2)^{-1} = 2$
- Ambil sebarang nilai dari Z_4 , misalkan $3 \in Z_4$, pilih $1 \in Z_4$ sehingga
 $3 + 1 = 0 = e$, maka $(3)^{-1} = 1$

Maka Z_4 ada unsur balikan atau invers

- Komutatif

Ambil sebarang nilai dari Z_4

Misalkan $a = 2, b = 3 \in Z_4$

$$(a + b) = (2 + 3) = 1$$

$$(b + a) = (3 + 2) = 1$$

Sehingga:

$$(a + b) = (b + a) = 1$$

Maka Z_4 komutatif

Jadi, $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ merupakan Grup Komutatif terhadap penjumlahan $(Z_4, +)$.

2. Semigrup terhadap perkalian (Z_4, \cdot)

- Tertutup

Ambil sebarang nilai Z_4

misalkan $0, 1, 2, 3, \in Z_4$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

$$1 \cdot 2 = 2$$

$$1 \cdot 3 = 3$$

Karena hasilnya $0, 1, 2, 3 \in Z_4$, maka tertutup terhadap Z_4

- Asosiatif

Ambil sebarang nilai Z_4

Misalkan $a = 2, b = 1$ dan $c = 3 \in Z_4$

$$(a \cdot b) \cdot c = (2 \cdot 1) \cdot 3 = 2 \cdot 3 = 2$$

$$a \cdot (b \cdot c) = 2 \cdot (1 \cdot 3) = 2 \cdot 3 = 2$$

sehingga :

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) = 2$$

Maka Z_4 asosiatif

Jadi, $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ merupakan Semigrup terhadap Perkalian (Z_4, \cdot)

3. Distribusi perkalian terhadap penjumlahan

Ambil sebarang nilai dari Z_4

Misalkan $a = 2, b = 1$ dan $c = 2 \in Z_4$

$$a \cdot (b + c) = 2 \cdot (1 + 3)$$

$$= 2 \cdot (0)$$

$$\begin{aligned}
&= 0 \\
(a \cdot b) + (a \cdot c) &= (2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) \\
&= 2 + 2 \\
&= 0 \\
\text{maka, } a \cdot (b + c) &= (a \cdot b) + (a \cdot c) = 0 \\
(a + b) \cdot c &= (2 + 1) \cdot 3 \\
&= (3) \cdot 3 = 2 + 3 \\
&= 1 \\
(a \cdot c) + (b \cdot c) &= (2 \cdot 3) + (1 \cdot 3) \\
&= (2 + 3) \\
&= 1
\end{aligned}$$

$$\text{maka, } (a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c) = 1$$

Jadi, $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ distribusi perkalian terhadap penjumlahan

Karena $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ memenuhi semua aksioma-aksioma yang ada, maka Z_4 adalah suatu Ring $(Z_4, +, \cdot)$.

Contoh 2.2

Misalkan $R = \{-1, 1\}$, $(R, +, \cdot)$ bukan merupakan suatu Ring karena tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan.

Contoh 2.3

Misalkan $R = \{0, 1\}$, $(R, +, \cdot)$ bukan merupakan suatu Ring karena tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan, tetapi $Z_2 = \{0, 1\}$, $(Z_2, +, \cdot)$ merupakan suatu Ring karena tertutup terhadap operasi penjumlahan dan memenuhi sifat-sifat dari Ring.

Definisi 2.2

Suatu Ring dikatakan komutatif/abelian bila operasi perkalian (multifikasi) terpenuhi sifat komulatif. Secara singkat akan dijelaskan syarat dari Ring Komutatif pada definisi berikut :

Definisi 2.3

Suatu atruktur aljabar dengan dua operasi biner $(R, +, \cdot)$ dikatakan suatu Ring (Gelanggang) Komutatif (Abelian) bila :

1. $(R, +)$ merupakan suatu Grup Komutatif
2. (R, \cdot) merupakan suatu Semigrup/monoid Komutatif
3. Distribustif perkalian terhadap penjumlahan

Jadi, pada Ring Komutatif (R, \cdot) yang merupakan suatu Semigrup/Monoid harus memenuhi sifat-sifat komutatifnya, yaitu :
 $a \cdot b = b \cdot a, \forall a, b \in R$

Contoh 2.4

Dari contoh 2.1, tunjukan bahwa Ring $(Z_4, +, \cdot)$ merupakan suatu Ring Komutatif.

Penyelesaian :

Dari contoh 2.1, telah ditunjukan bahwa $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ adalah suatu Ring $(Z_4, +, \cdot)$.

Sekarang akan ditunjukan sifat komutatif dari Ring tersebut.

$$a \cdot b = b \cdot a, \forall a, b \in R$$

Ambil sebarang nilai dari Z_4 , misalkan 2 dan $3 \in Z_4$ (pada tabel 2.1)

$$2 \cdot 3 = 2$$

$$3 \cdot 2 = 2$$

Sehingga $2 \cdot 3 = 3 \cdot 2 = 2$

Karena Ring $(Z_4, +, \cdot)$ tersebut memenuhi sifat komutatif, maka Ring $(Z_4, +, \cdot)$ tersebut adalah Ring Komutatif atau Ring Abelian.

Contoh 2.5

Misalkan $P = \{\text{genap, ganjil}\}$ dan $P \subseteq Z$. Tunjukan bahwa elemen-elemen bilangan “genap” dan “ganjil” adalah suatu Ring Komutatif.

Penyelesaian :

Tabel 2.2 Daftar Cayley $(P, +)$ dan (P, \cdot)

+	Ganjil	Genap	.	ganjil	genap
genap	Genap	Ganjil	genap	genap	genap
ganjil	Ganjil	Genap	ganjil	genap	ganjil

Dari tabel 2.2. akan ditunjukkan bahwa $P = \{\text{genap, ganjil}\}$ merupakan suatu Ring Komutatif bila memenuhi:

1. **Grup Komutatif terhadap penjumlahan $(P, +)$**

- Tertutup

Ambil sebarang nilai dari P

Misalkan genap, ganjil $\in P$

$$\text{genap} + \text{genap} = \text{genap}$$

$$\text{genap} + \text{ganjil} = \text{ganjil}$$

$$\text{ganjil} + \text{ganjil} = \text{genap}$$

karena hasilnya genap dan ganjil $\in P$, maka tertutup terhadap P

- Asosiatif

Ambil sebarang nilai dari P

Misalkan $a = \text{genap}$, $b = \text{ganjil}$ dan $c = \text{genap} \in P$

$$(a + b) + c = (\text{genap} + \text{ganjil}) + \text{genap} = \text{ganjil} + \text{genap} = \text{ganjil}$$

$$a + (b + c) = \text{genap} + (\text{ganjil} + \text{genap}) = \text{genap} + \text{ganjil} = \text{ganjil}$$

sehingga :

$$(a + b) + c = a + (b + c) = \text{ganjil}$$

- Adanya unsur satuan atau identitas

- Ambil sebarang nilai dari P , misalkan genap $\in P$, pilih genap $\in P$, sehingga $\text{genap} + e = e + \text{genap}$, maka $e = \text{genap}$

- Ambil sebarang nilai dari P, misalkan ganjil $\in P$, pilih genap $\in P$, sehingga ganjil + e = e + ganjil = ganjil, maka e = genap

maka P ada unsur satuan atau identitas

- Adanya unsur balikan atau invers
 - Ambil sebarang nilai dari P, misalkan genap \in pilih genap $\in P$, sehingga genap + genap = genap = e, maka $(\text{genap})^{-1} = \text{genap}$
 - Ambil sebarang nilai dari P, misalkan ganjil $\in P$, pilih ganjil $\in P$, sehingga ganjil + ganjil = ganjil = e, maka $(\text{ganjil})^{-1} = \text{ganjil}$

Maka p ada unsur balikan atau invers

- Komutatif

Ambil sebarang nilai dari P

Misalkan a = genap, b = ganjil $\in P$

$(a + b) = (\text{genap} + \text{ganjil}) = \text{ganjil}$

Sehingga :

$$(a + b) = (b + a) = \text{ganjil}$$

Maka P komutatif

Jadi, $P = \{\text{genap}, \text{ganjil}\}$ merupakan Grup Komutatif terhadap penjumlahan $(P, +)$

2. Monoid terhadap perkalian (P, \cdot)

Ambil sebarang nilai dari P

Misalkan genap dan ganjil $\in P$

genap \cdot ganjil = genap

genap \cdot genap = genap

ganjil \cdot ganjil = ganjil

karena hasilnya genap dan ganjil $\in P$, maka tertutup terhadap P

- Assosiatif

Ambil sebarang nilai dari P

Misalkan $a = \text{genap}$, $b = \text{ganjil}$ dan $c = \text{genap} \in P$

$$(a \cdot b) \cdot c = (\text{genap} \cdot \text{ganjil}) \cdot \text{genap} = \text{ganjil} \cdot \text{genap} = \text{genap}$$

$$a \cdot (b \cdot c) = \text{genap} \cdot (\text{ganjil} \cdot \text{genap}) = \text{genap} \cdot \text{genap} = \text{genap}$$

sehingga :

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) = \text{genap}$$

Maka P assosiatif

- Adanya unsur satuan atau identitas

- Ambil sebarang nilai dari P, misalkan $\text{genap} \in P$, pilih $\text{ganjil} \in P$, sehingga $\text{genap} \cdot e = e \cdot \text{genap} = \text{genap}$, maka $e = \text{ganjil}$

- Ambil sebarang nilai dari P, misalkan $\text{ganjil} \in P$, pilih $\text{ganjil} \in P$, sehingga $\text{ganjil} \cdot e = e \cdot \text{ganjil} = \text{ganjil}$, maka $e = \text{ganjil}$

Maka P ada unsur satuan atau identitas

- Komutatif

Ambil sebarang nilai dari P

Misalkan $a = \text{genap}$, $b = \text{ganjil} \in P$

$$(a \cdot b) = (\text{genap} \cdot \text{ganjil}) = \text{genap}$$

$$(b \cdot a) = (\text{ganjil} \cdot \text{genap}) = \text{genap}$$

Sehingga :

$$(a \cdot b) = (b \cdot a) = \text{genap}$$

Maka P komutatif

Jadi, $P = \{\text{genap}, \text{ganjil}\}$ merupakan Monoid Komutatif terhadap perkalian (P, \cdot)

3. Distributif perkalian terhadap penjumlahan

Ambil sebarang nilai dari p

Misalkan $a = \text{genap}$, $b = \text{ganjil}$ dan $c = \text{genap} \in P$

$$a \cdot (b + c) = \text{genap} \cdot (\text{ganjil} + \text{genap})$$

$$\begin{aligned}
&= \text{genap} \cdot (\text{ganjil}) \\
&= \text{genap} \\
(a \cdot b) + (a \cdot c) &= (\text{genap} \cdot \text{ganjil}) + (\text{genap} \cdot \text{genap}) \\
&= \text{genap} + \text{genap} \\
&= \text{genap} \\
\text{Maka, } a \cdot (b + c) &= (a \cdot b) + (a \cdot c) = \text{genap} \\
(a + b) \cdot c &= (\text{genap} + \text{ganjil}) \cdot \text{genap} \\
&= (\text{ganjil}) \cdot \text{genap} \\
&= \text{genap} \\
(a \cdot c) + (b \cdot c) &= (\text{genap} \cdot \text{genap}) + (\text{ganjil} \cdot \text{genap}) \\
&= \text{genap} + \text{genap} \\
&= \text{genap}
\end{aligned}$$

Maka, $(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c) = \text{genap}$

Jadi, $P = \{\text{genap}, \text{ganjil}\}$ distributif perkalian terhadap penjumlahan.

Karena $P = \{\text{genap}, \text{ganjil}\}$ memenuhi semua aksioma-aksioma yang ada, maka P adalah suatu Ring Komutatif $(P, +, \cdot)$.

Teorema 2.4

Dalam suatu Ring berlaku sifat-sifat :

1. $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$
2. $a \cdot (-b) = -(ab) = (-a) \cdot b$
3. $-(-a) = a$
4. $-(a+b) = (-a) + (-b)$
5. $a \cdot (b-c) = a \cdot b - a \cdot c$
6. $(a-b) \cdot c = a \cdot c - b \cdot c$
7. $(-1) \cdot a = -a$
8. $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$

Bukti:

1. $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$
 $a \cdot 0 = a \cdot (0+0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$

karena $a.0 \in R$ dan R suatu Ring maka terdapat $-(a.0) \in R$,
seingga :

$$\begin{aligned} a.0 &= a.0 + a.0 \\ a.0 - a.0 &= a.0 + a.0 - a.0 \\ 0 &= a.0 \end{aligned}$$

Jadi terbukti $a.0 = 0$

2. $a.(-b) = -(ab) = (-a).b$

$-(a.b)$ adalah balikan dari $a.b$

Akan ditunjukkan $a.(-b)$ adalah balikan dari $a.b$

$$\begin{aligned} a.b + a.(-b) &= a.(-b) + (-b) \\ &= a.0 = 0 \end{aligned}$$

Jadi terbukti $-(a.b) = a.(-b)$

3. $-(-a) = a$

$$\begin{aligned} -(-a) + (-a) &= 0 \\ -(-a) + (-a) + a &= a + 0 \\ -(-a) + (-a + a) &= a \\ -(-a) + 0 &= a \\ -(-a) &= a \end{aligned}$$

Jadi terbukti $-(-a) = a$

4. $-(a+b) = (-a) + (-b)$

$$\begin{aligned} (a+b) + (-a-b) &= 0 \\ (-b) + (a+b) + (-a-b) &= (-b) + 0 \\ a + ((-b) + b) + (-a-b) &= (-b) \\ -(a + b) &= (-a) + (-b) \end{aligned}$$

Jadi terbukti $-(a + b) = (-a) + (-b)$

5. $a.(b-c) = a.b - a.c$

$$\begin{aligned} a.(b + (-c)) &= a.b + a.(-c) \\ a.(b-c) &= a.b - a.c \end{aligned}$$

jadi terbukti $a.(b-c) = a.b - a.c$

$$\begin{aligned}
6. \quad (a-b).c &= a.c - b.c \\
&(a+(-b)).c &= a.c + (-b).c \\
&(a-b).c &= a.c - b.c
\end{aligned}$$

Jadi terbukti $(a-b).c = a.c - b.c$

$$\begin{aligned}
7. \quad (-1).a &= -a \\
&(-1).a &= -1.(1.a) \\
&&= -(1.1).a \\
&&= -a(1.1) \\
&&= -a
\end{aligned}$$

Jadi terbukti $(-1).a = -a$

$$\begin{aligned}
8. \quad (-a).(-b) &= a.b \\
&(-a).(-b) &= (-1).a.(-1).b \\
&&= (-1).(-1).a.b \\
&&= 1.a.b \\
&&= a.b
\end{aligned}$$

Jadi terbukti $(-a).(-b) = a.b$

B. Integral Domain

Salah satu sifat yang banyak digunakan dari sistem bilangan-bilangan yang telah kita kenal adalah bahwa bila $ab = 0$, maka $a = 0$ atau $b = 0$. Sifat tersebut menyatakan bahwa hukum kancellasi berlaku untuk unsur-unsur (elemen-elemen) yang bukan unsur nol, karena bila $ab = ac$ dan $a \neq 0$, maka $a(b - c) = 0$ dan diperoleh $b = c$.

Definisi 2.5

Bila (R, \cdot) adalah suatu Ring Komutatif, suatu unsur bukan nol $a \in R$ disebut pembagi nol bila ada unsur yang bukan nol $b \in R$ sedemikian hingga $a.b = 0$

Dengan kata lain suatu unsur $a \neq 0 \in R$ disebut pembagi nol di R bila $a.b = 0$ untuk suatu unsur $a \neq 0 \in R$

Definisi 2.6

Suatu Ring Komutatif yang tidak mempunyai pembagi nol disebut Integral Domain (Daerah Integral).

Untuk lebih jelas mengenai syarat-syarat dari Integral Domain adalah sebagai berikut :

Definisi 2.7

Suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner $(R, +, \cdot)$ dikatakan suatu Integral Domain (Daerah Integral) bila :

1. Tertutup terhadap penjumlahan (+)
Misalkan a dan b adalah anggota R ,
Maka a dan b tertutup bila $a + b \in R$
2. Asosiatif terhadap penjumlahan (+)
Misalkan $a, b, c \in R$
Maka $(a + b) + c = a + (b + c)$
3. Adanya unsur satuan atau identitas terhadap penjumlahan (+)
Misalkan $a \in R$
Maka $a + e = e + a = a$
4. Adanya unsur balikan atau invers terhadap penjumlahan (+)
Misalkan $a \in R$
Maka $a + (-a) = (-a) + a = e = 0$
5. Komutatif terhadap penjumlahan (+)
Misalkan $a, b \in R$
Maka $a + b = b + a$
6. Tertutup terhadap perkalian (\cdot)
Misalkan a dan b anggota R ,

Maka a dan b tertutup bila $a \cdot b \in R$

7. Asosiatif terhadap perkalian (\cdot)

Misalkan $a, b, c \in R$

Maka $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

8. Adanya unsur balikan atau invers terhadap perkalian (\cdot)

Misalkan $a \in R$

Maka $a \cdot e = e \cdot a = a$

9. Komutatif terhadap perkalian (\cdot)

Misalkan $a, b \in R$

Maka $a \cdot b = b \cdot a$

10. Tidak ada pembagi nol

Misalkan $a, b \in R$

Jika $a \cdot b = 0$, maka $a = 0$ atau $b = 0$

11. Distributif perkalian (\cdot) terhadap penjumlahan ($+$)

Misalkan $a, b, c \in R$

Maka $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ dan $(a + b) \cdot c = (a \cdot c)$

$+ (b \cdot c)$

Contoh 2.6

Dari soal 2.5, $P = \{\text{genap, ganjil}\}$ adalah suatu Ring Komutatif. Akan ditunjukkan bahwa Ring Komutatif tersebut adalah Integral Domain.

Penyelesaian :

Diketahui $P = \{\text{genap, ganjil}\}$ adalah suatu Ring Komutatif

Syarat dari integral Domain adalah Ring Komutatif yang tidak mempunyai pembagi nol, dengan kata lain :

$a \cdot b = 0$, untuk $a = 0$ atau $b = 0$

misalkan :

$X = \{\dots, -3, -1, 1, 3, \dots\}$ adalah himpunan bilangan ganjil dan
 $Y = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$ adalah himpunan bilangan genap.
 Dari himpunan tersebut dapat dilihat bahwa bilangan ganjil tidak ada unsur nol, tetapi bilangan genap ada unsur nol.

Jadi dapat disimpulkan bahwa $P = \{\text{genap, ganjil}\}$ merupakan Integral Domain, karena $a \cdot b = 0$, $a = 0$ atau $b = 0$, $\forall a, b \in P$

Contoh 2.7

Jika R adalah suatu daerah Integral dan $ab = ac$ untuk $a \neq 0$, serta $b, c \in R$. tunjukan bahwa $b = c$

Penyelesaian :

$ab = ac$, maka :

$ab - ac = 0$

$a(b - c) = 0$

karena R adalah Integral Domain yang tidak mempunyai pembagi nol dan

$a \neq 0$, maka :

$b - c = 0$

jadi $b = c$

Contoh 2.8

Tunjukan bahwa Z_4 bukan merupakan Integral Domain.

Penyelesaian :

Tabel 2.3 Daftar Cayley (Z_4, \cdot)

.	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

Dari tabel 6.3 dapat kita lihat bahwa $[2]$ adalah merupakan pembagi nol, dimana diperoleh $[2].[2] = 0$, sehingga kita tidak selalu dapat mengkensel seperti $[2].[1] = [2].[3]$ tetapi $[1] \neq [3]$.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Z_4 bukan merupakan suatu Integral Domain karena memiliki pembagi nol yaitu $[2]$.

C. Field (Lapangan)

Pada umumnya didalam suatu Ring, penjumlahan, pengurangan dan perkalian terdapat unsur suatu Ring akan diperoleh hasil, tetapi untuk pembagi tidak selalu diperoleh hasil. Didalam Integral Domain, unsur-unsurnya dapat dikensel tetapi tidak selalu diperoleh hasil bila dibagi dengan unsur yang bukan nol. Misalnya, bila $a, b \in Z$, maka $3a = 3b$ menghasilkan $a = b$, tetapi tidak setiap unsur Z dapat dibagi 3. Ada suatu sistem bilangan-bilangan yang selalu diperoleh hasil bila dibagi unsur yang bukan nol, yang disebut Field (Lapangan).

Definisi 2.8

Field adalah suatu Ring yang unsur-unsur bukan nolnya membentuk Grup Komutatif/Abelian terhadap perkalian. Sengan kata lain suatu Field adalah Ring Komutatif yang mempunyai unsur balikan/invers terhadap perkalian.

Dari defenisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner $(R, +, \cdot)$ dikatakan suatu Field bila :

1. $(R, +)$ merupakan suatu Grup Komutatif
2. $(R - \{0\}, \cdot)$ merupakan suatu Grup Komutatif
3. Distributif perkalian terhadap penjumlahan

Jadi untuk menunjukkan bahwa suatu Ring adalah Field harus kita buktikan Ring itu komutatif dan mempunyai unsur balikan atau invers terhadap perkalian. Atau kita tunjukan R merupakan suatu Grup Komulatif terhadap penjumlahan dan perkalian serta distributif perkalian terhadap penjumlahan.

Contoh 2.9

Dari soal 2.5 $P = \{\text{genap, ganjil}\}$ adalah suatu Grup Komutatif. Akan ditunjukkan apakah Ring Komutatif tersebut adalah Field.

Penyelesaian :

Diketahui $P = \{\text{ganjil, genap}\}$ adalah suatu Ring Komutatif

Syarat dari Field adalah Ring Komutatif yang mempunyai unsur balikan atau invers terhadap perkalian, dengan kata lain.

$$\forall a \in P, \exists a^{-1} \in P, \text{ sedemikian sehingga } a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$$

Telah diketahui identitas dari P adalah $e = \text{ganjil}$.

- Ambil sebarang nilai dari P , misalkan $\text{genap} \in P$, pilih $\text{ganjil} \in P$, sehingga $\text{genap} \cdot \text{ganjil} = \text{genap} \neq e$
- Ambil sebarang nilai dari P , misalkan $\text{genap} \in P$, pilih $\text{genap} \in P$, sehingga $\text{genap} \cdot \text{genap} = \text{genap} \neq e$

Maka P tidak ada unsur balikan atau invers

Jadi dapat disimpulkan bahwa $P = \{\text{genap, ganjil}\}$ bukan merupakan Field.

Dari contoh 2.9, dapat kita simpulkan bahwa $P = \{\text{genap, ganjil}\}$ dimana $P \subseteq \mathbb{Z}$, adalah suatu Ring Komutatif yang juga merupakan Integral Domain (Daerah Integral) tetapi bukan merupakan Field (Lapangan).

D. Latihan

1. Tunjukkan bahwa bilangan bulat $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ adalah merupakan suatu Ring Komutatif, dengan Penjumlahan dan Perkalian pada kelas-kelas kongruensi modulo n yang didefinisikan oleh $[x] + [y] = [x + y]$ dan $[x] \cdot [y] = [x \cdot y]$
2. Misalkan $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ didefinisikan operasi \oplus dan \otimes pada \mathbb{R} sebagai berikut :
 $a \oplus b = a + b + 1$ dan $a \otimes b = ab + a + b$.
Tunjukkan apakah merupakan suatu ring komutatif.
3. Tunjukkan bahwa $(Q(\sqrt{2}), +, \cdot)$ adalah Ring Komutatif dengan $Q(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in Q\}$.
4. Buatlah tabel penjumlahan dan perkalian untuk $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$.
tunjukkan apakah merupakan suatu Ring Komutatif.
5. Tunjukkan pada soal no 1, apakah merupakan:
 - a. Integral Domain
 - b. Field
6. Tunjukkan pada soal no 2, apakah merupakan:
 - a. Integral Domain
 - b. Field
7. Tunjukkan pada soal no 3, apakah merupakan:
 - a. Integral Domain
 - b. Field
8. Tunjukkan pada soal no 4, apakah merupakan:
 - a. Integral Domain
 - b. Field



BAB III

SUBRING DAN IDEAL

A. Subring

Pada sub pokok bahasan ini akan dijelaskan mengenai struktur bagian dari Ring yang tersebut Subring (Gelanggang Bagian), adapun definisinya adalah sebagai berikut :

Definisi 3.1

Misalkan $(R, +, \cdot)$ adalah suatu Ring, $S \neq \emptyset$ adalah merupakan himpunan bagian dari R ($S \subseteq R$). Bila operasi yang sama dengan $(S, +)$ membentuk suatu Ring maka S disebut Subring dari R

Untuk lebih jelasnya kita harus mengetahui syarat-syarat dari Subring, yaitu sebagai berikut:

Definisi 3.2

Misalkan $(R, +, \cdot)$ adalah suatu Ring, S adalah himpunan bagian dari R yang disebut Subring dari R bila untuk setiap $a, b \in S$, berlaku :

1. $S \neq \emptyset$
2. $a - b \in S$
3. $a \cdot b \in S$

syarat (1) menyatakan bahwa himpunan bagian dari Ring tersebut bukan himpunan kosong (\emptyset), syarat (2) menyatakan bahwa $(S, +)$ adalah merupakan suatu Grup Komulatif. Syarat (3) menyatakan bahwa (S, \cdot) adalah merupakan suatu Semigrup. Sehingga dapat kita katakan bahwa syarat-syarat tersebut telah memenuhi syarat dari suatu Ring. Dikarenakan S adalah himpunan bagian dari R , $S \subseteq R$ maka S dapat dikatakan sebagai Subgrup dari R .

Contoh 3.1

Misalkan $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ merupakan suatu Ring, tunjukkan bahwa $S = \{0, 2\}$ adalah Subring dari Z_4 .

Penyelesaian:

Akan kita tunjukkan bahwa $S = \{0, 2\}$ memenuhi syarat-syarat dari suatu Ring.

1. $S \neq \emptyset$, syarat terpenuhi

2. $a + b \in S$

misalkan $0, 2 \in S$

$$2 + 0 = 2$$

$$2 + 2 = 0$$

$$0 + 2 = 2$$

Sehingga $0, 2 \in S$

3. $a \cdot b \in S$

misalkan $0, 2 \in S$

$$2 \cdot 0 = 0$$

$$2 \cdot 2 = 0$$

$$0 \cdot 2 = 0$$

Seingga $0 \in S$

Syarat (1), (2) dan (3) terpenuhi maka S adalah Subring dari Z_4 .

Kita juga bisa membuktikan S (dalam contoh 1) merupakan suatu Subring dari Ring Z_4 , dengan menunjukkan operasi yang sama pada Z_4 terhadap penjumlahan dan perkalian. Sehingga S adalah merupakan Grup komutatif terhadap penjumlahan ($S, +$) dan juga merupakan Semigrup/Monoid terhadap perkalian (S, \cdot). karena ($S, +, \cdot$) memenuhi syarat-syarat dari suatu Ring, maka $S = \{0, 2\}$ adalah Subring dari Ring $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$.

Contoh 3.2

Tunjukkan bahwa $Q(\sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in Q\}$ adalah merupakan Subring dari R .

Penyelesaian:

Akan kita tunjukkan bahwa $Q(\sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in Q\}$ memenuhi syarat-syarat dari suatu Ring.

1. $S \neq \emptyset$, syarat terpenuhi karena $Q(\sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in Q\}$

2. $a - b \in Q(\sqrt{3})$

misalkan $a + b\sqrt{3}, c + d\sqrt{3} \in Q(\sqrt{3})$, maka:

$$a + b\sqrt{3} - c + d\sqrt{3} = (a - c) + (b - d)\sqrt{3} \in Q(\sqrt{3})$$

3. $a \cdot b \in Q(\sqrt{3})$

misalkan $a + b\sqrt{3}, c + d\sqrt{3} \in Q(\sqrt{3})$, maka:

$$(a + b\sqrt{3}) \cdot (c + d\sqrt{3}) = (ac + 3bd) + (ad + bc)\sqrt{3} \in Q(\sqrt{3})$$

Syarat (1), (2) dan (3) terpenuhi maka $Q(\sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in Q\}$ adalah Subring dari R .

Sama halnya seperti pada contoh 7.1, kita juga bisa membuktikan $Q(\sqrt{3})$ (dalam contoh 7.2) merupakan Subring dari R , dengan menunjukkan operasi yang sama pada R terhadap penjumlahan dan perkalian sehingga S adalah merupakan Grup Komutatif terhadap penjumlahan $(Q(\sqrt{3}), +)$ dan juga merupakan Semogrup/Monoid terhadap perkalian $(Q(\sqrt{3}), \cdot)$. karena $(Q(\sqrt{3}), +, \cdot)$ memenuhi syarat-syarat dari suatu Ring, maka $Q(\sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in Q\}$ adalah Subring dari R .

Dari contoh 7.1 bisa kita simpulkan bahwa bila R adalah suatu Ring, $S \subseteq R$ dan $S \neq \emptyset$, maka S merupakan suatu Subring bila S memenuhi syarat-syarat dari suatu Ring.

Contoh 3.3

Misalkan $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ merupakan suatu ring. Buktikan bahwa $S = \{0, 3\}$ adalah subring dari Z_4 .

Penyelesaian:

Akan ditunjukkan bahwa $S = \{0, 3\}$ memenuhi syarat-syarat dari suatu ring.

1. $S \neq \emptyset$, syarat terpenuhi karena $S = \{0, 3\}$
2. $S \subset Z_4$ karena untuk setiap $a \in S$, $a \in Z_4$ yaitu $\{0, 3\} \subset Z_4$
3. $a + b \in S$, Misalkan $0, 3 \in S$

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

Sehingga berdasarkan table Cayley di atas , diperoleh bahwa:

$+_4$	0^+	3^+
0	0	3
3	3	2

Dengan demikian, untuk setiap $a, b \in S$ maka tidak berlaku $a + b \in S$

Karena syarat di atas tidak terpenuhi maka S adalah bukan Subring dari Z_4 .

Contoh 3.4

Diketahui bahwa himpunan $M_{2 \times 2}(R)$ merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Buktikan bahwa himpunan matriks segitiga atas $NA_{2 \times 2}(R) = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} \mid a, b, c \in R \right\}$ merupakan subring dari $(M_{2 \times 2}(R), +, \cdot)$!

Bukti:

1. perhatikan bahwa himpunan $NA_{2 \times 2}(R) \neq 0$ karena terdapat $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in NA_{2 \times 2}(R) \right\}$

2. untuk setiap $A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & z \end{bmatrix} \in NA_{2 \times 2}(R)$ berlaku:

$$A + B = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+x & b+y \\ 0 & c+z \end{bmatrix} \in NA_{2 \times 2}(R)$$

Dan

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax & ay + bz \\ 0 & cz \end{bmatrix} \in NA_{2 \times 2}(R)$$

Berdasarkan syarat perlu dan cukup

B. Ideal

Pada materi Grup kita ketahui ada Subgrup Normal yang merupakan Subgrup yang memiliki sifat khusus. Di dalam Ring juga ada Subring khusus yang memiliki sifat-sifat istimewa yaitu tertutup terhadap perkalian unsur di luar Subring. Subring semacam ini dinamakan suatu Ideal.

Pada ideal dikenal dengan Ideal kiri yaitu bila tertutup terhadap perkalian unsur di sebelah kiri dan Ideal kanan yaitu bila tertutup terhadap perkalian unsur di sebelah kanan. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat dalam definisi berikut:

Definisi 3.3

Misalkan $(R, +, \cdot)$ adalah suatu Ring dan $(S, +, \cdot)$ adalah Subring dari R disebut Ideal kiri jika untuk setiap $a \in S$ dan $r \in R$ maka $ra \in S$.

Definisi 3.4

Misalkan $(R, +, \cdot)$ adalah suatu Ring dan $(S, +, \cdot)$ adalah Subring dari R disebut Ideal jika merupakan Ideal kiri dan Ideal kanan yaitu untuk setiap $a \in S$ dan $r \in R$ maka $ra \in S$ dan $ar \in S$.

Untuk lebih mempermudah memahami suatu Ideal baik itu Ideal kiri maupun Ideal kanan, dapat kita jabarkan secara rinci definisi-definisi yang telah ada sebagai berikut:

Definisi 3.5

Misalkan $(R, +, \cdot)$ adalah suatu Ring dan $S \neq \emptyset$ merupakan himpunan bagian dari R ($S \subseteq R$) disebut Ideal, bila untuk setiap $a, b \in S$ dan $r \in R$, berlaku :

1. $a - b \in S$
2. $a \cdot b \in S$
3. $ra \in S$ dan $ar \in S$

Jadi suatu Subring dinamakan Ideal bila Subring tersebut tertutup terhadap operasi unsur sebelah kiri (Ideal kiri) dan Subring tersebut juga tertutup terhadap operasi perkalian unsur disebelah kanan (Ideal kanan).

Contoh 3.5

Dari contoh 2.1, misalkan $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ merupakan suatu Ring, tunjukkan bahwa Subring $S = \{0, 2\}$ adalah suatu Ideal.

Penyelesaian :

Pada contoh sebelumnya telah ditunjukkan bahwa $S = \{0, 2\}$ adalah Subring dari $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$. Sekarang kita akan tunjukkan bahwa S

merupakan suatu Ideal, dengan membuktikan bahwa S adalah Ideal kiri dan Ideal kanan.

Diketahui : $0, 1, 2, 3 \in \mathbb{Z}_4$ dan $0, 2 \in S$

Ideal kiri $0 \cdot 0 = 0$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$2 \cdot 0 = 0$$

$$3 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 2 = 0$$

$$1 \cdot 2 = 2$$

$$2 \cdot 2 = 0$$

$$3 \cdot 2 = 2$$

S merupakan Ideal kiri dari \mathbb{Z}_4

Ideal kiri $0 \cdot 0 = 0$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$0 \cdot 2 = 0$$

$$0 \cdot 3 = 0$$

$$2 \cdot 0 = 0$$

$$2 \cdot 1 = 2$$

$$2 \cdot 2 = 0$$

$$2 \cdot 3 = 2$$

S merupakan Ideal kiri dari \mathbb{Z}_4

Jadi S merupakan Ideal kiri dan Ideal kanan dari \mathbb{Z}_4 sehingga S adalah Ideal dari \mathbb{Z}_4

Contoh 3.6

Misalkan $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ adalah suatu Ring maka himpunan bagian dari $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ yaitu $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(3\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(4\mathbb{Z}, +, \cdot)$ dan seterusnya merupakan sebuah Ideal dari $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Contoh 3.7:

Misalkan $(\mathbb{Q}, +)$ adalah suatu Ring maka himpunan bagian dari $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ yaitu $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ merupakan bukan suatu Ideal dari $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$.

Dari contoh yang telah diberikan, bila kita telah mengetahui bahwa S adalah suatu Subring dari R , kita cukup mencari nilai dari perkalian unsumnya saja tidak perlu lagi dibuktikan bahwa S adalah suatu Subring atau bukan, kita harus membuktikan S terlebih dahulu merupakan suatu Subring, setelah itu kita baru mencari nilai dari perkalian unsumnya yang tertutup terhadap Subring tersebut.

C. Latihan

1. Misalkan R adalah suatu Ring dan A dan B adalah Subring dari R . buktikan bahwa $A \cap B$ juga merupakan Subring dari R .
2. Misalkan Z_5 adalah suatu Ring
 - a. Tentukan subring-subring yang dibangun oleh unsur-unsur dari Z_5
 - b. Apakah subring-subring tersebut merupakan suatu Ideal.
3. Misalkan P adalah suatu Ring dan S dan T adalah Ideal dari R . buktikan bahwa $S \cap T$ juga merupakan Ideal dari R .
4. Misalkan unsur-unsur bilangan “genap” dan “ganjil” adalah membentuk suatu Ring.
 - a. Tentukan subring-subring yang dibangun oleh unsur-unsur bilangan “genap” dan “ganjil”.
 - b. Apakah subring-subring tersebut merupakan suatu Ideal.
5. Misalkan $(Q(\sqrt{2}), +, \cdot)$ adalah subring dari Q . Tunjukkan bahwa $Q(\sqrt{2})$ adalah suatu Ideal dari Q , didefinisikan $Q(\sqrt{2}) = \{a + b(\sqrt{2}) \mid a, b \in Q\}$.
6. Diketahui R adalah suatu Ring K dan L adalah merupakan Ideal kanan-ideal kanan dari R . Buktikan :
 - a. $K \cap L$ merupakan Ideal kanan dari R
 - b. $K + L$ merupakan Ideal kanan dari R , dengan :
 $K + L = \{a + b \mid a \in K \text{ dan } b \in L$



BAB IV

RING FAKTOR DAN HOMOMORFISMA RING

A. Ring Faktor

Pada bab 3, telah kita pelajari mengenai Ideal, yang mirip dengan Subgrup Normal dalam Grup. Suatu Ring Faktor terdiri dari himpunan dari koset-koset Ring tersebut yang diantaranya adalah ideal-ideal.

Definisi 4.1

Misalkan R adalah suatu Ring dan S adalah suatu Ideal dari R . $R/S = \{S + a \mid a \in R\}$ adalah Ring dengan $(S + a) + (S + b) = S + (a + b)$ dan $(S + a) \cdot (S + b) = S + (a \cdot b)$. Ring seperti ini disebut Ring Faktor atau Ring Koisen.

Sekarang akan kita buktikan bahwa $R/S = \{S + a \mid a \in R\}$ membentuk suatu Ring, yaitu dengan memperhatikan syarat-syarat dari suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner yaitu terhadap penjumlahan (+) dan terhadap perkalian (.) yang memebentuk suatu Ring $(R/K, +, \cdot)$. adapun syarat-syarat suatu struktur aljabar yang mempunyai dua operasi biner membentuk suatu Ring adalah sebagai berikut:

1. Tertutup terhadap penjumlahan (+) di R/S

Misalkan $a, b \in R$ dan $a + b \in R$

Maka :

Untuk setiap $(S + a), (S + b) \in R/S$

Berlaku $(S + a) + (S + b) = S + (a + b)$

Yang berarti $S + (a + b) \in R/S$

Sehingga $S + (a + b) \in R/S$, tertutup terhadap penjumlahan di R/S

2. Asosiatif terhadap penjumlahan (+) di R/S

Misalkan $a, b, c \in R$

Maka $(a + b) + c = a + (b + c)$

Sehingga:

Untuk setiap $(S + a), (S + b), (S + c) \in R/S$

$$[(S + a) + (S + b)] + (S + c) = (S + a) + [(S + b) + (S + c)]$$

$$[S + (a + b)] + (S + c) = (S + a) + [S + (b + c)]$$

$$S + [(a + b) + c] = S + [a + (b + c)]$$

$$S + [a + (b + c)] = S + [(a + b) + c]$$

$$(S + a) + [S + (b + c)] = [S + (a + b)] + (S + c)$$

$$(S + a) + [(S + b) + (S + c)] = [(S + a) + (S + b)] + (S + c)$$

3. Adanya unsur satuan atau identitas terhadap penjumlahan (+) di R/S

Misalkan $a \in R$

Maka $a + e = e + a = a$

Sehingga :

Untuk setiap $(S + a) \in R/S$

$$(S + 0) + (S + a) = S + (0 + a) = S + a$$

$$(S + a) + (S + 0) = S + (a + 0) = S + a$$

$$(S + 0) + (S + a) = (S + a) + (S + 0) = S + a$$

4. Adanya unsur balikan atau invers terhadap penjumlahan (+) di R/S

Misalkan $a \in R$

Maka $a + (-a) = (-a) + a = e = 0$

Sehingga :

Untuk setiap $(S + a) \in R/S$

$$(S + a) + (S + (-a)) = S + (a + (-a)) = S + 0 = S$$

$$(S + (-a)) + (S + a) = S + ((-a) + a) = S + 0 = S$$

$$(S + a) + (S + (-a)) = (S + (-a)) + (S + a) = S + 0 = S$$

5. Komutatif terhadap penjumlahan (+) di R/S

Misalkan $a, b \in R$

Maka $a + b = b + a$

Sehingga:

Untuk setiap $(S + a), (S + b) \in R/S$

$$(S + a) + (S + b) = (S + b) + (S + a)$$

$$S + (a + b) = S + (b + a)$$

$$S + (b + a) = S + (a + b)$$

$$(S + b) + (S + a) = (S + a) + (S + b)$$

6. Tertutup terhadap perkalian (.) di R/S

Misalkan $a, b \in R$ dan $a \cdot b \in R$

Maka :

Untuk setiap $(S + a), (S + b) \in R/S$

Berlaku $(S + a) \cdot (S + b) = S + (a \cdot b)$

Yang berarti $S + (a \cdot b) \in R/S$

Sehingga $S + (a \cdot b) \in R/S$, tertutup terhadap perkalian (.) di R/S

7. Asosiatif terhadap perkalian (.) di R/S

Misalkan $a, b, c \in R$

Maka $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

Sehingga:

Untuk setiap $(S + a), (S + b), (S + c) \in R/S$

$$[(S + a) \cdot (S + b)] \cdot (S + c) = (S + a) \cdot [(S + b) \cdot (S + c)]$$

$$[S + (a \cdot b)] \cdot (S + c) = (S + a) \cdot [S + (b \cdot c)]$$

$$S + [(a \cdot b) \cdot c] = S + [a \cdot (b \cdot c)]$$

$$S + [a \cdot (b \cdot c)] = S + [(a \cdot b) \cdot c]$$

$$(S + a) \cdot [S + (b \cdot c)] = [S + (a \cdot b)] \cdot (S + c)$$

$$(S + a) \cdot [(S + b) \cdot (S + c)] = [(S + a) \cdot (S + b)] \cdot (S + c)$$

8. Adanya unsur satuan atau identitas terhadap perkalian (\cdot) di R/S

Misalkan $a \in R$

Maka $a + e = e + a = a$

Sehingga :

Untuk setiap $(S + a) \in R/S$

$$(S + 1) \cdot (S + a) = S + (1 \cdot a) = S + a$$

$$(S + a) \cdot (S + 1) = S + (a \cdot 1) = S + a$$

$$(S + 1) \cdot (S + a) = (S + a) \cdot (S + 1) = S + a$$

9. Distributive perkalian (\cdot) terhadap penjumlahan ($+$) di R/S

Misalkan $a, b, c \in R$

Maka $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ dan $(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$

Sehingga :

Untuk setiap $(S + a), (S + b), (S + c) \in R/S$

$$(S + a) \cdot [(S + b) \cdot (S + c)] = [(S + a) \cdot (S + b)] + [(S + a) \cdot (S + c)]$$

$$(S + a) \cdot [S + (b \cdot c)] = [S + (a \cdot b)] + [S + (a \cdot c)]$$

$$S + [a \cdot (b + c)] = S + [(a \cdot b) + (a \cdot c)]$$

$$S + [(a \cdot b) + (a \cdot c)] = S + [a \cdot (b + c)]$$

$$[S + (a \cdot b)] + [S + (a \cdot c)] = (S + a) \cdot [S + (b + c)]$$

$$[(S + a) \cdot (S + b)] + [(S + a) \cdot (S + c)] = (S + a) \cdot [(S + b) \cdot (S + c)]$$

Dan

$$[(S + a) \cdot (S + b)] \cdot (S + c) = [(S + a) \cdot (S + c)] + [(S + b) \cdot (S + c)]$$

$$[(S + (a \cdot b)) \cdot (S + c)] = [S + (a \cdot c)] + [S + (b \cdot c)]$$

$$S + [(a + b) \cdot c] = S + [(a \cdot c) + (b \cdot c)]$$

$$S + [(a \cdot c) + (b \cdot c)] = S + [(a + b) \cdot c]$$

$$[S + (a \cdot c)] + [S + (b \cdot c)] = [S + (a + b)] \cdot (S + c)$$

$$[(S + a) \cdot (S + c)] + [(S + b) \cdot (S + c)] = [(S + a) \cdot (S + b)] \cdot (S + c)$$

Dengan kata lain, misalkan R adalah suatu Ring dan S adalah suatu Ideal dari R, maka R/S disebut Ring Faktor jika :

1. $(R/S, +)$ merupakan suatu Ring Komutatif
2. $(R/S, \cdot)$ merupakan suatu Semigrup/Monoid
3. $(R/S, +, \cdot)$ merupakan distributive perkalian terhadap penjumlahan

Contoh 4.1

Bila $K = \{0, 2, 4\}$ adalah suatu Ideal yang dibangun oleh 2 dalam Z_6 . Tunjukan Z_6/K adalah merupakan Ring Faktor.

Penyelesaian:

Ada dua koset / Ideal dari Ring Z_6 , yaitu:

$$K = \{0, 2, 4\}$$

$$K + 1 = \{1, 3, 5\}$$

$$\text{Sehingga } Z_6/K = \{K, K + 1\}$$

Tabel 4.1 Daftar Cayley ($Z_6/K = Z_6/\{0, 2, 4\}, +$) dan ($Z_6/K = Z_6/\{0, 2, 4\}, \cdot$)

+	K	K+1
K	K	K+1
K+1	K+1	K

.	K	K+1
K	K	K+1
K+1	K+1	K

Table 4.1. menunjukkan penjumlahan dan perkalian unsur-unsur dari Z_6/K . Selanjutnya dari table, kita akan membuktikan bahwa Z_6/K dengan syarat-syarat suatu Ring merupakan Ring Faktor dari Z_6/K . adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Tertutup terhadap penjumlahan (+) di Z_6/K

$$\forall K, K + 1 \in Z_6/K$$

$$\text{Berlaku } K + (K + 1) = K + (0 + 1) = K + 1$$

$$\text{Sehingga } K + 1 \in Z_6/K$$

2. Asosiatif terhadap penjumlahan (+) di Z_6/K

$$\forall K, K + 1 \in Z_6/K$$

$$[K + (K + 1)] + (K + 1) = K + [(K + 1) + (K + 1)]$$

$$[K + (0 + 1)] + (K + 1) = K + [K + (1 + 1)]$$

$$(K + 1) + (K + 1) = K + (K + 0)$$

$$K + (1 + 1) = K + (0 + 0)$$

$$K = K$$

Sehingga

$$[K + (K + 1)] + (K + 1) = K + [(K + 1) + (K + 1)] = K$$

3. Adanya unsur satuan atau identitas terhadap penjumlahan (+) di Z_6/K

$$\forall K + 1 \in Z_6/K$$

$$(K + 0) + (K + 1) = K + (0 + 1) = K + 1$$

$$(K + 1) + (K + 0) = K + (1 + 0) = K + 1$$

$$\text{Sehingga } (K + 0) + (K + 1) = (K + 1) + (K + 0) = K + 1$$

4. Adanya unsur balikan atau invers terhadap penjumlahan (+) di Z_6/K

$$\forall K + 1 \in Z_6/K$$

$$(K + 1) + (K + (-1)) = K + (1 + (-1)) = K + 0 = K$$

$$(K + (-1)) + (K + 1) = K + ((-1) + 1) = K + 0 = K$$

$$\text{Sehingga } (K + 1) + (K + (-1)) = (K + (-1)) + (K + 1) = K + 0 = K$$

5. Komutatif terhadap penjumlahan (+) di Z_6/K

$$\forall K, K + 1 \in Z_6/K$$

$$K + (K + 1) = (K + 1) + K$$

$$K + (0 + 1) = K + (1 + 0)$$

$$K + 1 = K + 1$$

$$\text{Sehingga } K + (K + 1) = (K + 1) + K = K + 1$$

6. Tertutup terhadap perkalian (\cdot) di Z_6/K
 $\forall K, K + 1 \in Z_6/K$
 Berlaku $K \cdot (K + 1) = K + (0 \cdot 1) = K + 0 = K$
 Sehingga $K \in Z_6/K$
7. Asosiatif terhadap perkalian (\cdot) di Z_6/K
 $\forall K, K + 1 \in Z_6/K$
 $[K \cdot (K + 1)] \cdot (K + 1) = K \cdot [(K + 1) \cdot (K + 1)]$
 $[K + (0 \cdot 1)] \cdot (K + 1) = K \cdot [K + (1 \cdot 1)]$
 $(K + 0) \cdot (K + 1) = K \cdot (K + 1)$
 $K + (0 \cdot 1) = K \cdot (K + 1)$
 $K = K$
 Sehingga $[K \cdot (K + 1)] \cdot (K + 1) = K \cdot [(K + 1) \cdot (K + 1)] = K$
8. Adanya unsur satuan atau identitas terhadap perkalian (\cdot) di Z_6/K
 $\forall K + 1 \in Z_6/K$
 $(K + 1) \cdot K = K + (0 \cdot 1) = K + 0 = K$
 $K \cdot (K + 1) = K + (1 + 0) = K + 0 = K$
 Sehingga $(K + 1) \cdot K = K \cdot (K + 1) = K + 0 = K$
9. Distributive perkalian (\cdot) terhadap penjumlahan ($+$) di Z_6/K
 $\forall K, K + 1 \in Z_6/K$
 Misalkan $a = K$, $b = K + 1$ dan $c = K + 1$
 $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
 $K \cdot [(K + 1) + (K + 1)] = [K \cdot (K + 1)] + [K \cdot (K + 1)]$
 $K \cdot [K + (1 + 1)] = [K + (0 \cdot 1)] + [K + (0 \cdot 1)]$
 $K + [0 \cdot (1 + 1)] = K + [(0 \cdot 1) + (0 \cdot 1)]$
 $K + (0 \cdot 0) = K + (0 + 0)$
 $K = K$

$$\text{Sehingga } K \cdot [(K + 1) + (K + 1)] = [K \cdot (K + 1)] + [K \cdot (K + 1)] = K$$

Jadi, $Z_6/K = \{K, K + 1\}$ adalah merupakan suatu Ring Faktor

Sebenarnya dari table juga kita telah bisa mengetahui bahwa Z_6/K adalah merupakan Ring Faktor, karena hasil dari penjumlahan dan perkalian unsur-unsur Z_6/K menghasilkan unsur-unsur itu sendiri. Jadi bila K adalah suatu Ideal dan R adalah suatu Ring, maka kita dapat menentukan Ring Faktor dari R/K dengan membuat table daftar Cayley terhadap penjumlahan dan perkalian unsur-unsur dari R/K , yang disebut table Ring Faktor dari R/K .

B. Homomorfisma Ring

Pada bab 4, telah kita pelajari mengenai Homomorfisma Grup yaitu suatu pemetaan dari Grup G ke Grup G' yang mengawetkan operasi yang ada pada Grup tersebut.

Sama halnya dengan Grup, pada Ring juga ada pemetaan dari Ring R ke Ring R' yang mengawetkan kedua operasi yang ada dalam Ring tersebut, yang disebut dengan Homomorfisma Ring

Definisi 4.2

Suatu pemetaan f dari Ring $(R, +, \cdot)$ ke Ring (R', \oplus, \otimes) disebut suatu Homomorfisma Ring bila $\forall a, b \in R$ berlaku:

1. $f(a + b) = f(a) \oplus f(b)$
2. $f(a \cdot b) = f(a) \otimes f(b)$

Dalam suatu Ring telah diketahui operasi biner yang ada pada umumnya adalah operasi penjumlahan dan operasi perkalian, sehingga biar tidak menimbulkan keraguan maka definisi tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut :

Definisi 4.3

Suatu pemetaan f dari Ring R ke Ring R' disebut suatu Homomorfisma Ring bila $\forall a, b \in R$ berlaku:

1. $f(a + b) = f(a) + f(b)$
2. $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$

Ada beberapa definisi khusus mengenai Homomorfisma Ring adalah sebagai berikut:

Definisi 4.4

- a. Suatu Homomorfisma Ring yang bersifat injektif ($1 - 1$) disebut dengan Monomorfisma Ring
- b. Suatu Homomorfisma Ring yang bersifat surjektif (pada) disebut dengan Epimorfisma Ring
- c. Suatu Homomorfisma Ring yang bersifat bijektif, yaitu bersifat injektif ($1 - 1$) dan surjektif (pada), disebut dengan Isomorfisma Ring

Definisi 4.5

Suatu Homomorfisma dari suatu Ring ke dalam dirinya sendiri dinamakan Endomorfisma dan suatu Endomorfisma yang bijektif dinamakan Automorfisma

Contoh 4.2

Tunjukkan apakah $f: Z \rightarrow R$ dengan $f(a) = a$ adalah suatu Homomorfisma Ring

Penyelesaian:

Akan kita buktikan bahwa $\forall a, b \in R$ berlaku:

1. $f(a + b) = f(a) + f(b)$
2. $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$

sehingga :

1. $f(a + b) = f(a) + f(b), \forall a, b \in R$
 $(a + b) = (a) + (b)$

$$\begin{aligned}
 a + b &= a + b \\
 2. \quad f(a \cdot b) &= f(a) \cdot f(b), \forall a, b \in \mathbb{R} \\
 (a \cdot b) &= (a) \cdot (b) \\
 a \cdot b &= a \cdot b
 \end{aligned}$$

Dikarenakan untuk $f(a + b) = f(a) + f(b)$ dan $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$ maka $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ untuk $f(a) = a$ adalah merupakan Homomorfisme Ring.

Contoh 4.3

Tunjukkan apakah $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(a) = 2a$ adalah merupakan Homomorfisme Ring.

Penyelesaian:

Akan kita buktikan bahwa $\forall a, b \in \mathbb{R}$ berlaku:

$$\begin{aligned}
 1. \quad f(a + b) &= f(a) + f(b) \\
 2. \quad f(a \cdot b) &= f(a) \cdot f(b)
 \end{aligned}$$

sehingga :

$$\begin{aligned}
 1. \quad f(a + b) &= f(a) + f(b), \forall a, b \in \mathbb{R} \\
 2(a + b) &= 2a + 2b \\
 2(a + b) &= 2(a + b) \\
 a + b &= a + b \\
 2. \quad f(a \cdot b) &= f(a) \cdot f(b), \forall a, b \in \mathbb{R} \\
 2ab &= 2a + 2b \\
 2ab &\neq 4ab
 \end{aligned}$$

Dikarenakan untuk $f(a \cdot b) \neq f(a) \cdot f(b)$ maka $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ untuk $f(a) = 2a$ bukan merupakan Homomorfisme Ring.

Teorema 4.6

Misalkan R adalah suatu Ring dan R' juga merupakan suatu Ring. Bila pemetaan $f: R \rightarrow R'$ adalah suatu Homomorfisme Ring, maka:

1. $f(0) = 0'$, dengan 0 merupakan unsur nol di R dan $0'$ merupakan unsur nol di R'
2. $f(-a) = -f(a)$, $\forall a \in R$

Bukti:

1. $f(0) = 0'$, dengan 0 merupakan unsur nol di R dan $0'$ merupakan unsur nol di R'

Ambil sebarang nilai $a \in R$

0 merupakan unsur nol di R , yang berarti $a + 0 = 0 + a = a$

Sehingga :

$$f(a) = f(a + 0) = f(a) + f(0)$$

dan

$$f(a) = (0 + a) = f(0) + f(a)$$

Maka :

$$f(a) = f(a) + f(0) = f(0) + f(a)$$

Ini berarti bahwa $f(0)$ merupakan unsur nol di R' . Karena unsur nol di R' adalah $0'$ maka dengan sifat ketuggalan unsur nol didapat $f(0) = 0'$.

2. $f(-a) = -f(a)$, $\forall a \in R$

Ambil sebarang nilai $a \in R$

Karena ada $a \in R$, maka ada $-a \in R$

Yang berarti $a + (-a) = (-a) + a = 0$

Sehingga :

$$f(0) = f(a + (-a)) = f(a) + f(-a)$$

dan

$$f(0) = f((-a) + a) = f(-a) + f(a)$$

maka :

$$f(0) = f(a) + f(-a) = f(-a) + f(a)$$

dari pembuktian $f(0)=0'$, didapat :

$$f(a) + f(-a) = f(-a) + f(a) = f(0) = 0'$$

dengan sifat ketunggalan dari unsur balikan atau invers, maka $f(-a) = -f(a)$.

Definisi 4.7

Kernel (inti) dari Homomorfisma Ring f adalah $\{a \in R \mid f(a) = 0'\}$, biasa ditulis $K = \{a \in R \mid f(a) = 0'\}$.

Pada sub pokok bahasan berikut akan dibicarakan mengenai teorema yang cukup penting dalam Homomorfisma Ring, yaitu teorema dasar Isomorfisma.

Misalkan terdapat dua Ring R dan R' , Ring R dan R' dikatakan Isomorfik jika terdapat suatu Isomorfisma dari R ke R' atau sebaliknya terdapat suatu Isomorfisma dari R' ke R . terdapat tiga teorema dasar mengenai Isomorfisma Ring yang akan dijelaskan dalam sub pokok bahasan ini.

Teorema berikut disebut sebagai teorema pertama untuk Isomorfisma Ring.

Teorema 4.8 (Teorema Pertama Isomorfisma)

Misalkan R dan R' adalah suatu Ring. Bila μ adalah suatu Homomorfisma dari R pada R' dengan kernel K , maka $R' \cong R/K$.

Bukti:

Misalkan $\hat{\sigma} : R/K \rightarrow R'$, maka $\hat{\sigma}(K + a) = \mu(a)$

- a. Akan ditunjukkan bahwa $\hat{\sigma}$ merupakan suatu pemetaan misalkan $K + a = K + b$, dimana $K + a, K + b \in R/K$ maka $\hat{\sigma}(K + a) = \mu(a)$ dan $\hat{\sigma}(K + b) = \mu(b)$ jika μ adalah Homomorfisma maka $\mu(a - b) = \mu(a) - \mu(b)$ $K + a = K + b$, berarti $a - b \in K$

Sehingga :

$$\begin{aligned} \mu(a - b) &= 0' \\ \mu(a) - \mu(b) &= 0' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu(a) &= \mu(b) \\ \hat{\sigma}(\mathbb{K} + a) &= \hat{\sigma}(\mathbb{K} + b)\end{aligned}$$

Jadi $\hat{\sigma}$ merupakan suatu pemetaan

- b. Akan ditunjukkan bahwa $\hat{\sigma}$ merupakan suatu Homomorfisma

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}[(\mathbb{K} + a) + (\mathbb{K} + b)] &= \hat{\sigma}(\mathbb{K} + (a + b)) \\ &= \mu(a + b) \\ &= \mu(a) + \mu(b) \\ &= \hat{\sigma}(\mathbb{K} + a) + \hat{\sigma}(\mathbb{K} + b)\end{aligned}$$

Dan

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}[(\mathbb{K} + a) \cdot (\mathbb{K} + b)] &= \hat{\sigma}(\mathbb{K} + (a \cdot b)) \\ &= \mu(a \cdot b) \\ &= \mu(a) \cdot \mu(b) \\ &= \hat{\sigma}(\mathbb{K} + a) \cdot \hat{\sigma}(\mathbb{K} + b)\end{aligned}$$

Jadi $\hat{\sigma}$ merupakan suatu Homomorfisma

- c. Akan ditunjukkan bahwa $\hat{\sigma}$ bersifat injektif (1 - 1)

$$\begin{aligned}\text{Misalkan } \mu(a) = \mu(b) &\longrightarrow \mathbb{K} + a = \mathbb{K} + b \\ \mu(a) &= \mu(b) \\ \mu(a) + \mu(b) &= 0' \\ \mu(a + b) &= 0'\end{aligned}$$

Itu berarti $a - b \in \mathbb{K}$, sehingga $\mathbb{K} + a = \mathbb{K} + b$

Jadi $\hat{\sigma}$ bersifat injektif (1 - 1)

- d. Akan ditunjukkan bahwa $\hat{\sigma}$ bersifat surjektif (pada)

Misalkan $b \in \mathbb{R}'$, berarti $b = \mu(a)$ untuk suatu $a \in \mathbb{R}$

Diketahui $a \in \mathbb{R}$ dan $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}/\mathbb{K}$, berarti a dipetakan ke $\mathbb{K} + a \in \mathbb{R}/\mathbb{K}$

Kita pilih $c = \mathbb{K} + a \in \mathbb{R}/\mathbb{K}$, sehingga

$$\hat{\sigma}(c) = \hat{\sigma}(\mathbb{K} + a) = \mu(a) = b \in \mathbb{R}'$$

Jadi $\hat{\sigma}$ bersifat surjektif (pada)

Terbukti terdapat Isomorfisma dari R/K ke R'
 $R' \cong R/K$ atau $R/K \cong R'$

Teorema berikut ini disebut sebagai teorema kedua dari Isomorfisma Ring.

Teorema 4.9 (Teorema Kedua Isomorfisma)

Misalkan R dan R' adalah suatu Ring dan μ adalah Homomorfisma dari R pada R' dengan kernel K . Bila S' adalah suatu Ideal dari R' dan S adalah suatu Ideal dari R , maka $S/K \cong S'$ untuk $S = \{ a \in R \mid \mu(a) \in S' \}$.

Bukti:

Untuk membuktikan teorema ini, maka terlebih dahulu perlu kita buktikan bahwa S adalah merupakan Ideal dari R .

Dari definisi Ideal diperoleh:

- a. $S \neq \emptyset$, maka terdapat $0 \in R$, sehingga $\mu(0) = 0'$ dan $0' \in S'$
- b. S merupakan himpunan bagian dari R , sehingga $S \subseteq R$
- c. Misalkan $a, b \in S$

Sehingga diperoleh $a \in R, \mu(a) \in S'$ dan $b \in R, \mu(b) \in S'$

Jika $a + b \in R$, maka $\mu(a + b) = \mu(a) + \mu(b) \in S'$

- d. Misalkan $a \in S$ dan $r \in S$

- Untuk Ideal Kiri

Misalkan $a \in R$ dan $r \in R$

$$\mu(ra) = \mu(r) \cdot \mu(a)$$

sehingga $\mu(a) \in S'$ dan $\mu(r) \in R'$

karena S' merupakan Ideal R' , maka diperoleh $\mu(ra)$

$$= \mu(r) \cdot \mu(a)$$

jadi $ra \in S$, sehingga S merupakan Ideal Kiri di R

- Untuk Ideal Kanan

Misalkan $a \in R$ dan $r \in R$

$$\mu(ar) = \mu(a) \cdot \mu(r)$$

sehingga $\mu(a) \in S'$ dan $\mu(r) \in R'$
 karena S' merupakan Ideal R' , maka diperoleh $\mu(ar)$
 $= \mu(a) \cdot \mu(r)$
 jadi $ar \in S$, sehingga S merupakan Ideal Kanan di R

Maka dapat disimpulkan bahwa S adalah Ideal di R

Berikutnya akan ditunjukkan bahwa $K \in S$

Misalkan $k \in K$ dan $\mu(k) = 0' \in S'$

Sehingga $k \in S$, yang berarti $\forall k \in K, k \in S \implies k \in S$.

Dapat disimpulkan $K \subseteq S$

Jadi pemetaan μ yang dibatasi pada S mendefinisikan suatu Homomorfisma dari S ke S' dengan kernel K . Sehingga berdasarkan teorema pertama Isomorfisma, terbukti bahwa terdapat Isomorfisma dari S/K ke S' .

$S' \cong S/K$ atau $S/K \cong S'$

Teorema berikut ini disebut sebagai teorema ketiga dari Isomorfisma Ring.

Teorema 4. 10 (Teorema Ketiga Isomorfisma)

Misalkan R dan R' adalah suatu Ring dan μ adalah Homomorfisma dari R pada R' dengan kernel K . Bila S' adalah suatu Ideal dari R' dan S adalah suatu Ideal dari R , maka $R/S \cong R'/S'$ untuk $S = \{a \in R \mid \mu(a) \in S'\}$. Secara ekuivalen, bila K suatu Ideal dari R dan $K \subseteq S$ adalah suatu Ideal dari R , maka $R/S \cong (R/K) / (S/K)$.

Bukti :

Misalkan $\hat{\sigma} : a \rightarrow \mu(a) + S'$ atau $\hat{\sigma}(a) \in R'/S'$, mendefinisikan pemetaan

$$\hat{\sigma} : R \rightarrow R'/S'$$

a. Akan ditunjukkan bahwa $\hat{\sigma}$ merupakan suatu Homomorfisma

Misalkan $a, b \in R$

Sehingga diperoleh $\hat{\sigma}(a) = \mu(a) + S'$ dan $\hat{\sigma}(b) = \mu(b) + S'$

$$\begin{aligned}
\hat{\sigma}(a + b) &= \mu(a + b) + S' \\
&= (\mu(a) + \mu(b)) + S' \\
&= (\mu(a) + S') + (\mu(b) + S') \\
&= \hat{\sigma}(a) + \hat{\sigma}(b)
\end{aligned}$$

Dan

$$\begin{aligned}
\hat{\sigma}(a \cdot b) &= \mu(a \cdot b) + S' \\
&= (\mu(a) \cdot \mu(b)) + S' \\
&= (\mu(a) + S') \cdot (\mu(b) + S') \\
&= \hat{\sigma}(a) \cdot \hat{\sigma}(b)
\end{aligned}$$

Jadi $\forall a, b \in R$ berlaku $\hat{\sigma}(a + b) = \hat{\sigma}(a) + \hat{\sigma}(b)$ dan $\hat{\sigma}(a \cdot b) = \hat{\sigma}(a) \cdot \hat{\sigma}(b)$, yang berarti $\hat{\sigma}$ merupakan suatu Homomorfisma

b. Akan ditunjukkan bahwa $\hat{\sigma}$ bersifat surjektif (pada)

Ambil $x \in R'/S'$

Misalkan $x = a' + S'$, $a' \in R'$

Jika μ pemetaan pada, berarti $\exists a \in R$ sehingga $\mu(a) = a'$

Maka diperoleh $x = \mu(a) + S'$

Pilih $a \in R$ sehingga $\hat{\sigma}(a) = \mu(a) + S' = x$

Jadi $\forall x \in R'/S' \exists a \in R$ sehingga $\hat{\sigma}(a) = x$

Dengan kata lain, $\hat{\sigma}$ bersifat surjektif (pada)

c. Akan ditunjukkan bahwa $S = K$

Ambil $a \in \text{Ker}(\hat{\sigma}) \subseteq R$

Diperoleh $\hat{\sigma}(a) = S'$, padahal $\hat{\sigma}(a) = \mu(a) + S'$

Jadi $\mu(a) + S' = S'$

Karena S' Grup bagian aditif dari R' diperoleh $\mu(a) \in S'$

Berdasarkan definisi Ideal, diperoleh $a \in S$

Jadi $\forall a \in \text{Ker}(\hat{\sigma}) \rightarrow a \in S$

Dengan kata lain, $\text{Ker}(\hat{\sigma}) \in S$

Ambil $a \in S$, berarti $a \in R$ dan $\mu(a) \in S'$

Diperoleh $\hat{\sigma}(a) = \mu(a) + S' = S'$, sebab $\mu(a) \in S'$

Sehingga $a \in K$, yang berarti $S \subseteq K$
Jadi dapat disimpulkan bahwa $S = K$

Diperoleh : $R \xrightarrow{\varphi} R'/S'$ Homomorfisma surjektif (pada) dengan kernel
 $K = S$.

Berdasarkan teorema kedua Isomorfisma, diperoleh $R/S \cong R'/S'$.

Padahal $R' \cong R/K$ dan $S \cong S/K$

Sehingga terbukti terdapat Isomorfisma dari R'/S' ke R/S

$$\mathbf{R'/S' \cong R/S \cong (R/K)/(S/K)}$$

C. Latihan

1. Misalkan K adalah ideal-ideal yang dibangun oleh Z_4 . Carilah ideal-ideal yang dibangun tersebut dan tunjukkan Z_4/K adalah merupakan Ring Factor.
2. Carilah K yang merupakan suatu Ideal yang dibangun oleh 2 dalam Z_8 . Tunjukkan Z_8/K adalah merupakan Ring Factor.
3. Berikut ini diberikan pemetaan-pemetaan, yang mana dari pemetaan-pemetaan tersebut merupakan Homomorfisma.
 - $f: Z \longrightarrow Z$, dengan $f(a) = 4a$
 - $f: Z \longrightarrow Z$, dengan $f(a) = a^3$
 - $f: Z_6 \longrightarrow Z_3$, dengan $f(a) = a + 1$
 - $f: Z \longrightarrow Z$, dengan $f(a) = 2^a$
4. Tunjukkan apakah $Z_2 \times Z_3$ merupakan Isomorfisma dengan Z_6 , sehingga $Z_2 \times Z_3 \cong Z_6$
5. Tunjukkan bila R, R' dan R'' adalah merupakan suatu ring-ring dan bila $g: R \longrightarrow R'$ dan $g: R' \longrightarrow R''$ adalah merupakan suatu homomorfisma-homomorfisma, maka pemetaan komposisi $f \circ g: R \longrightarrow R''$ adalah juga merupakan homomorfisma.

BAB V

RING POLINOM

A. Ring Polinom

Salah satu kegunaan yang terpenting dari teori Ring dan Field adalah perluasan dari suatu Field yang lebih besar atau lebih luas sehingga suatu polinom (suku banyak) yang diketahui mempunyai akar. Sebagai contoh Field bilangan kompleks adapat diperoleh dengan memperluas Field bilangan real sehingga semua persamaan kuadrat akan mempunyai solusi.

Pada sub pokok bahasan ini, akan dibahas mengenai struktur dari Ring Polinom yang merupakan gabungan dari ring-ring (suku banyak-suku banyak). Berikut ini merupakan definisi dari Ring Polinom yaitu sebagai berikut:

Definisi 5.1

Bentuk umum dari polinom (suku banyak) adalah $p(x) = a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = \sum_{i=1}^n a_i x_i$, dimana a_i adalah koefisien dari $p(x)$. Bila $x^n \neq 0$ maka derajat dari $p(x)$ adalah n dan bila $n = 0$ maka derajat $p(x)$ adalah nol.

Contoh 5.1

$P(x) = 3x^6 + x^4 - 2x + 1$, adalah polinom yang mempunyai derajat 6. Berikut merupakan definisi dari kesamaan dua buah polinom, yaitu:

Definisi 5.2

Misalkan dua buah polinom $p(x) = a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ dan $q(x) = b_0 + b_1x^1 + b_2x^2 + \dots + b_mx^m$ dikatakan sama jika dan hanya jika $a_i = b_i$ untuk semua $i \geq 0$.

Contoh 5.2

$3x^6 + x^4 - 2x + 1 \neq 3x^6 + 2x^4 - 2x + 1$ karena terdapat koefisien yang tidak sama, yaitu koefisien x^4 diruas kiri yang tidak sama dengan koefisien x^4 diruas kanan. Sedangkan $3x^6 + x^4 - 2x + 1 = 3x^6 + x^4 - 2x + 1$ karena untuk masing-masing suku yang bersesuaian mempunyai koefisien yang sama.

Untuk perkalian dan penjumlahan dua buah polinom didefinisikan sebagai berikut:

Definisi 5.3

Misalkan dua buah polinom $p(x) = a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ dan $q(x) = b_0 + b_1x^1 + b_2x^2 + \dots + b_mx^m$, $p(x) + q(x) = c_0 + c_1x^1 + c_2x^2 + \dots + c_kx^k$ dimana $k = \max\{n,m\}$ untuk setiap i , $c_i = a_i + b_i$, untuk $0 \leq i \leq k$.

Definisi 5.4

Misalkan dua buah polinom $p(x) = a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ dan $q(x) = b_0 + b_1x^1 + b_2x^2 + \dots + b_mx^m$, $p(x) \cdot q(x) = c_0 + c_1x^1 + c_2x^2 + \dots + c_kx^k$ dimana $k = n + m$, $c_i = a_i b_0 + a_{i-1} b_1 + \dots + a_1 b_{i-1} + a_0 b_i$.

Dari definisi dan sifat-sifat polinom-polinom tersebut, berikut merupakan definisi dari Ring Polinom.

Definisi 5.5

Misalkan R adalah suatu Ring Komutatif. $R[x]$ dikatakan sebagai Ring Polinom atas R dengan $R[x] = \{p(x), q(x), r(x), \dots\}$ untuk $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x_i$, $q(x) = \sum_{i=0}^n b_i x_i$, ... dan $a_i \in R$.

Contoh 5.3

Misalkan $p(x)$ dan $q(x)$ dengan $p(x) = 2x^2 + 2$ dan $q(x) = 2x + 2$, maka :

$$\begin{aligned} p(x) + q(x) &= (2x^2 + 2) + (2x + 2) \\ &= 2x^2 + 2x + 4 \end{aligned}$$

Contoh 5.4

Misalkan $p(x)$ dan $q(x)$ dengan $p(x) = 2x^2 + 2$ dan $q(x) = 2x + 2$, maka :

$$\begin{aligned} p(x) \cdot q(x) &= (2x^2 + 2) \cdot (2x + 2) \\ &= 4x^3 + 4x^2 + 4x + 4 \end{aligned}$$

Contoh 5.5

Misalkan $p(x)$ dan $q(x)$ adalah polinom-polinom pada $Z_3[x]$, dengan $p(x) = 2x^2 + 2$ dan $q(x) = 2x + 2$, maka :

$$\begin{aligned} p(x) + q(x) &= (2x^2 + 2) + (2x + 2) \\ &= 2x^2 + 2x + (2 + 2) \\ &= 2x^2 + 2x + 1 \end{aligned}$$

Contoh 5.6

Misalkan $p(x)$ dan $q(x)$ adalah polinom-polinom pada $Z_3[x]$, dengan $p(x) = 2x^2 + 2$ dan $q(x) = 2x + 2$, maka :

$$\begin{aligned} p(x) \cdot q(x) &= (2x^2 + 2) \cdot (2x + 2) \\ &= (2 \cdot 2)x^{(2+1)} + (2 \cdot 2)x + (2 \cdot 2)x^2 + (2 \cdot 2) \\ &= x^0 + x + x^2 + 1 \\ &= x^2 + x + 2 \end{aligned}$$

Dari contoh-contoh tersebut, bila tidak ada penjelasan mengenai koefisien polinomnya dianggap sebagai bilangan real. Tetapi bila ada penjelasan lebih lanjut, maka koefisien sesuai dengan Ring yang ditunjuk. Pada $Z_3[x]$, artinya koefisiennya adalah hanya 0, 1 dan 2 saja.

B. Algoritma Pembagian Polinom

Pada bab terdahulu telah dibahas mengenai algoritma pembagian bilangan bulat, dimana bila suatu bilangan bulat dibagi oleh bilangan bulat yang lainnya, maka diperoleh suatu hasil bagi (faktor) dan sisa. Dalam sub pokok bahasan ini, akan dibahas mengenai algoritma

pembagian polinom-polinom, adapun tentang pembagian itu dapat dinyatakan dalam algoritma pembagian sebagai berikut:

Teorema 5.6 (Algoritma Pembagian Polinom)

Misalkan $f(x)$ dan $g(x)$ adalah dua buah polinom, $f(x), g(x) \in R[x]$ dan $g(x) \neq 0$, maka terdapat polinom-polinom yang unik $q(x), r(x) \in R[x]$ sedemikian sehingga:

$$f(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x)$$

dengan $r(x) = 0$ atau derajat $r(x) < g(x)$.

Polinom-polinom $q(x)$ dan $r(x)$ ditentukan secara tunggal oleh $f(x)$ dan $g(x)$ yang diperlukan. Selanjutnya $f(x)$ disebut polinom yang dibagi, $g(x)$ disebut polinom pembagi, $q(x)$ disebut hasil bagi polinom, dan $r(x)$ disebut sisa hasil bagi polinom.

Bukti:

Bila $f(x)$ adalah polinom nol, maka $q(x) = 0$ dan $r(x) = 0$ adalah polinom-polinom dari $R[x]$ sehingga:

$$f(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x)$$

dengan $r(x) = 0$

bila $f(x)$ adalah bukan nol, dimana $f(x) \neq 0$ dan $g(x) \neq 0$

misalkan:

$$p(x) = a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_nx^n, a_n \neq 0$$

dan

$$q(x) = b_0 + b_1x^1 + b_2x^2 + \dots + b_mx^m, b_m \neq 0$$

Berarti derajat $f(x) = n$ dan derajat $g(x) = m$

- Bila $n < m$ berarti derajat $f(x) < g(x)$
Maka terdapat $q(x) = 0$ dan $r(x) = f(x)$ di $R[x]$ sehingga

$$f(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x)$$

dengan derajat $r(x) = f(x) < \text{derajat } g(x)$

- Bila $n \geq m$ berarti $f(x) \geq \text{derajat } g(x)$

Misalkan:

Pembagian $f(x)$ dan $g(x)$ menghasilkan :

$$f(x) = (a_n b_m^{-1} x^{n-m})g(x) + f_1(x)$$

Dengan $f_1(x)$ adalah polinom berderajat $(n-1)$ di $R[x]$

Pembagian $f_1(x)$ dan $g(x)$ pada $R[x]$ terdapat $q_1(x)$

dan $r(x)$ di $R[x]$

Sehingga:

$$f_1(x) = q_1(x) \cdot g(x) + r(x)$$

dengan derajat $r(x) = f(x) < \text{derajat } g(x)$

sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned} f(x) &= (a_n b_m^{-1} x^{n-m})g(x) + q_1(x) \cdot g(x) + r(x) \\ &= [(a_n b_m^{-1} x^{n-m}) + q_1(x)] g(x) + r(x) \\ &= q(x) \cdot g(x) + r(x) \end{aligned}$$

Dengan $q(x) = (a_n b_m^{-1} x^{n-m}) + q_1(x)$ dan derajat $r(x) = \text{derajat } f(x) < \text{derajat } g(x)$. Hasil ini diulang terus sehingga diperoleh hasil yang diinginkan.

Untuk membuktikan keunikan dari $q(x)$ dan $r(x)$, kita misalkan polinom-polinom lain $q'(x)$ dan $r'(x)$ sehingga:

$$f(x) = q'(x) \cdot g(x) + r'(x)$$

dengan $r'(x) = 0$ atau derajat $r'(x) < \text{derajat } g(x)$

karena berlaku juga:

$$f(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x)$$

dengan $r(x) = 0$ atau derajat $r(x) < \text{derajat } g(x)$

diperoleh:

$$q(x) \cdot g(x) + r(x) = q'(x) \cdot g(x) + r'(x)$$

karena itu:

$$[q(x) - q'(x)]g(x) = r'(x) - r(x)$$

Sehingga ada kemungkinan yang didapat :

$$q(x) - q'(x)]g(x) = r'(x) - r(x)$$

Sehingga ada kemungkinan yang didapat :

- $q(x) - q'(x) = 0$ dan $r'(x) - r(x) = 0$ sehingga $q(x) = q'(x)$
dan $r'(x) = r(x)$
- $q(x) - q'(x) \neq 0$ dan $r'(x) - r(x) \neq 0$

jadi terbukti bahwa $q(x)$ dan $r(x)$ adalah unik.

Keunikan dari faktor $g(x)$ dan keunikan sisa $r(x)$ sama seperti ditunjukkan oleh faktor dan sisa dalam algoritma pembagian bilangan-bilangan bulat. Polinom faktor dan polinom sisa dapat dihitung dengan pembagian panjang dari polinom-polinom tersebut.

Contoh 5.7

Tentukan hasil bagi dari polinom-polinom berikut, dimana $p(x) = 2x^2 + 2$ dan $q(x) = 2x + 2$, $p(x)$ adalah polinom yang dibagi dan $g(x)$ polinom pembagi.

Penyelesaian:

Diketahui:

$p(x) = 2x^2 + 2$ adalah polinom yang dibagi

$g(x) = 2x + 2$ adalah polinom pembagi

artinya koefisien=koefisien dari polinom-polinom tersebut adalah bilangan real $R[x]$.

$$p(x) / g(x) = \frac{2x^2 + 2}{2x + 2}, \text{ selanjutnya:}$$

$$\begin{array}{r} x-1 \\ 2x^2 + 2 \\ \underline{2x^2 + 2x} \\ -2x + 2 \\ \underline{-2x - 2} \\ 4 \end{array}$$

Dari pembagian polinom-polinom tersebut didapat hasil bagi $q(x) = x - 1$ dan sisa $r(x) = 4$.

Sehingga:

$$\begin{aligned} p(x) &= q(x) \cdot g(x) + r(x) \\ &= (x - 1) \cdot (2x + 2) + 4 \\ &= 2x^2 - 2x + 2x - 2 + 4 \\ &= 2x^2 + 2 \end{aligned}$$

Jadi terbukti bahwa hasil bagi dari $p(x) / g(x) = \frac{2x^2 + 2}{2x + 2}$ adalah $x - 1$ dengan sisa 4.

Bila tidak ada penjelasan mengenai koefisien dari polinom-polinomnya, maka polinom-polinomnya dianggap sebagai bilangan real. Tetapi bila koefisien polinom-polinomnya ditentukan seperti pada contoh berikut ini, maka koefisien dan derajat dari polinom-polinomnya sesuai dengan koefisien sesuai dengan Ring yang ditunjuk. Misalkan dalam contoh berikut ini ditentukan koefisien dengan Ring $Z_3[X]$.

Contoh 5.8

Tentukan hasil bagi dari polinom-polinom berikut terhadap $Z_3[X]$, dimana $p(x) = 2x^2 + 2$ dan $q(x) = 2x + 2$, $p(x)$ adalah polinom yang dibagi dan $g(x)$ polinom pembagi.

Penyelesaian:

Diketahui:

$$p(x) = 2x^2 + 2$$

adalah polinom yang dibagi dalam $Z_3[X]$

$$g(x) = 2x + 2$$

adalah polinom pembagi dalam $Z_3[X]$

Artinya koefisien-koefisien dari polinom-polinom tersebut adalah hanya bernilai 0, 1 dan 2 saja.

$$p(x) / g(x) = \frac{2x^2 + 2}{2x + 2}, \text{ selanjutnya:}$$

$$\begin{array}{r} 2x + 2 \overline{) 2x^2 + 2} \\ \underline{2x^2 + 2x} \\ x + 2 \end{array}$$

Dari pembagian polinom-polinom tersebut dalam $Z_3[X]$ didapat hasil bagi $q(x) = x$ dan sisa $r(x) = x + 2$.

Sehingga:

$$\begin{aligned} p(x) &= q(x) \cdot g(x) + r(x) \\ &= x \cdot (2x + 2) + (x + 2) \\ &= 2x^2 + 2x + x + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2x^2 + (2 + 1)x + 2 \\
&= 2x^2 + 0x + 2 \\
&= 2x^2 + 2
\end{aligned}$$

Jadi terbukti bahwa hasil bagi dalam $Z_3[X]$ dari $p(x) / g(x) = \frac{2x^2 + 2}{2x + 2}$ adalah x dengan sisa $x + 2$.

Contoh 5.9

Tentukan hasil bagi dari polinom-polinom berikut terhadap $Z_4[X]$, dimana $p(x) = 3x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ dan $q(x) = x^2 + 2$, $p(x)$ adalah polinom yang dibagi dan $g(x)$ polinom pembagi.

Penyelesaian:

Diketahui:

$p(x) = 3x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ adalah polinom yang dibagi dalam $Z_4[X]$

$g(x) = x^2 + 2$ adalah polinom pembagi dalam $Z_4[X]$

Artinya koefisien-koefisien dari polinom-polinom tersebut adalah hanya bernilai 0, 1, 2 dan 3 saja.

$$p(x) / g(x) = \frac{3x^3 + 3x^2 + 2x + 1}{x^2 + 2}, \text{ selanjutnya:}$$

$$\begin{array}{r}
x^2 + 2 \overline{) 3x^3 + 3x^2 + 2x + 1} \\
\underline{3x^3 + 2x} \\
3x^2 + 1 \\
\underline{3x^2 + 2} \\
3
\end{array}$$

Dari pembagian polinom-polinom tersebut dalam $Z_4[X]$ didapat hasil bagi $q(x) = 3x + 3$ dan sisa $r(x) = 3$.

Sehingga:

$$\begin{aligned}
p(x) &= q(x) \cdot g(x) + r(x) \\
&= (3x + 3) \cdot (x^2 + 2) + 3 \\
&= 3x^3 + 3x^2 + (3 \cdot 2)x + (3 \cdot 2) + 3 \\
&= 3x^3 + 3x^2 + 2x + 2 + 3 \\
&= 3x^3 + 3x^2 + 2x + 1
\end{aligned}$$

Jadi terbukti bahwa hasil bagi dalam $Z_4[X]$ dari $p(x) / g(x) = \frac{3x^3 + 3x^2 + 2x + 1}{x^2 + 2}$ adalah $3x + 3$ dengan sisa 3.

C. Unsur Tereduksi dan Tidak Tereduksi

Pada sub pokok bahasan ini kita akan mempelajari tentang unsur tereduksi dan tidak tereduksi pada Ring Polinom. Adapun definisi-definisinya adalah sebagai berikut:

Definisi 5.7

Misalkan $f(x)$ adalah suatu polinom dan $R[x]$ adalah merupakan Ring Polinom, $f(x) \in R[x]$ dikatakan polinom monic (monic polinomial) bila koefisien x dengan pangkat tertingginya adalah 1

Contoh 5.10

Polinom $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$ adalah merupakan polinom monic.

Definisi 5.8

Misalkan $f(x)$ dan $g(x)$ adalah dua buah polinom dan $R[x]$ merupakan Ring Polinomnya, sehingga $f(x), g(x) \in R[x]$. Polinom $g(x)$ dikatakan membagi $f(x)$ dengan $g(x) \neq 0$, ditulis $g(x) \mid f(x)$, bila $f(x) = a(x) \cdot g(x)$ untuk suatu $a(x) \in R[x]$.

Contoh 5.11

Misalkan $f(x) = x^2 + 2 \in R[x]$ dikatakan membagi $g(x) = 2x^2 + 4 \in R[x]$, ditulis $x^2 + 2 \mid 2x^2 + 4$ karena $2x^2 + 4 = 2(x^2 + 2)$.

Contoh

Misalkan $f(x) = x + 1 \in R[x]$ dikatakan membagi $g(x) = x^2 + 3x + 2 \in R[x]$, ditulis $x + 1 \mid x^2 + 3x + 2$ karena $x^2 + 3x + 2 = (x + 2)(x + 1)$.

Definisi 5.9

Polinom $d(x) \in R[x]$ disebut pembagi sekutu terbesar dari $f(x), g(x) \in R[x]$, dinotasikan dengan $(f(x), g(x)) = d(x)$ dengan $f(x)$ dan $g(x)$ tidak boleh keduanya nol, bila $d(x)$ adalah polinom monik sehingga:

- $d(x) \mid f(x)$ dan $d(x) \mid g(x)$
- jika $(x) \mid f(x)$ dan $(x) \mid g(x)$, maka $(x) \mid d(x)$

Contoh 5.12

Pembagi sekutu terbesar antara $p(x) = x^6 + x^3 + x + 1$ dengan $q(x) = x^2 + 1$ adalah $x^2 + 1$. Karena $x^2 + 1$ adalah bukan polinom monik, sehingga $(x) \neq (x^6 + x^3 + x + 1)$ dan $(x) \neq (x^2 + 1)$

Definisi 5.10

Polinom-polinom $f(x), g(x) \in R[x]$ dikatakan relatif prima jika pembagi sekutu terbesarnya 1.

Contoh 5.13

$p(x) = x - 1$ dengan $g(x) = x + 1$ adalah merupakan relatif prima.

Definisi 5.11

Suatu polinom tak konstan $f(x) \in R[x]$ dikatakan tak tereduksi atas R jika $f(x)$ tidak dapat dinyatakan sebagai perkalian dua polinom $g(x), h(x) \in R[x]$ dengan derajat $(g, h) < \text{derajat}(f)$

Contoh 5.14

$f(x) = x^2 - 3$ tidak tereduksi di $R[x]$, karena $x^2 - 3$ tidak dapat dinyatakan sebagai perkalian dua polinom $g(x), h(x) \in R[x]$ dengan derajat $(g, h) < \text{derajat}(f)$.

Contoh 5.15

$f(x) = x^2 - 3$ tereduksi di $R[x]$, karena $x^2 - 3$ dapat dinyatakan sebagai perkalian dua polinom $g(x), h(x) \in R[x]$ dengan derajat $(g, h) <$ derajat (f) , sehingga $x^2 - 3 = (x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})$.

Berikut ini adalah suatu teorema yang dapat digunakan untuk mempermudah atau dapat merupakan suatu teknik untuk menentukan suatu polinom kuadratik (berderajat dua) atau polinom kubik (berderajat 3) tereduksi atau tidak tereduksi.

Teorema 5.12

Bila $f(x) \in R[x]$ dan misalkan derajat $(f(x)) = 2$ atau 3 , maka berlaku $f(x)$ tereduksi atas R jika dan hanya jika f mempunyai pembuat nol di R .

Bukti :

- \implies Misalkan $f(x)$ tereduksi atas R
Berarti $f(x) = g(x) \cdot h(x)$ dengan $0 <$ derajat $(g(x))$ dan derajat $(h(x)) <$ derajat $(f(x))$. Diperoleh $g(x)$ atau $h(x)$ berderajat 1. Misalkan $g(x)$ berderajat 1, maka $g(x) = x - a$, untuk $a \in R$, berarti $g(a) = 0$ sehingga $f(a) = 0$.
Jadi f mempunyai pembuat nol di R .
- \impliedby misalkan $f(a) = 0$ dan $a \in R$
berarti $(x - a)$ adalah faktor dari $f(x)$
jadi $f(x)$ tereduksi atas R .

Contoh 5.15

Tunjukkan bahwa polinom $p(x) = x^2 + x + 2$ tidak tereduksi atas Z_3 .

Penyelesaian:

$Z_3 = \{0, 1, 2\}$, maka diperoleh:

$$\begin{aligned} p(0) &= 0^2 + 0 + 2 \\ &= 2 \\ p(1) &= 1^2 + 1 + 2 \\ &= 1 + 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 1 \\
 p(2) &= 2^2 + 2 + 2 \\
 &= 1 + 1 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

Karena tidak terdapat $x \in \mathbb{Z}_3$ sehingga $p(x) = 0$
 Jadi $p(x)$ tidak tereduksi atas \mathbb{Z}_3 .

Contoh 5.16

Tunjukkan bahwa polinom $p(x) = x^2 + x + 1$ tereduksi atas \mathbb{Z}_3 .

Penyelesaian :

$\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$, maka diperoleh:

$$\begin{aligned}
 p(0) &= 0^2 + 0 + 1 \\
 &= 1 \\
 p(1) &= 1^2 + 1 + 1 \\
 &= 1 + 2 \\
 &= 0 \\
 p(2) &= 2^2 + 2 + 1 \\
 &= 1 + 0 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Karena terdapat $x \in \mathbb{Z}_3$ sehingga $p(1) = 0$
 Jadi $p(x)$ tereduksi atas \mathbb{Z}_3 .

D. Latihan

1. Diketahui polinom-polinom $f(x) = 3x^3 + x^2 + 2x + 2$ dan $g(x) = x^2 + 3$.

Carilah:

- $f(x) + g(x)$ dalam $Q[x]$
- $f(x) - g(x)$ dalam $Q[x]$
- $f(x) \times g(x)$ dalam $Q[x]$
- $f(x) : g(x)$ dalam $Q[x]$

2. Diketahui polinom-polinom $f(x) = 3x^3 + x^2 + 2x + 2$ dan $g(x) = x^2 + 3$.

Carilah:

- $f(x) + g(x)$ dalam $Z_4[x]$
- $f(x) - g(x)$ dalam $Z_4[x]$
- $f(x) \times g(x)$ dalam $Z_4[x]$
- $f(x) : g(x)$ dalam $Z_4[x]$

3. Diketahui polinom-polinom $f(x) = 3x^4 + 4x^3 - x^2 + 3x - 1$ dan $g(x) = 2x^2 + x + 1$.

Carilah:

- $f(x) + g(x)$ dalam $Q[x]$
- $f(x) - g(x)$ dalam $Q[x]$
- $f(x) \times g(x)$ dalam $Q[x]$
- $f(x) : g(x)$ dalam $Q[x]$

4. Diketahui polinom-polinom $f(x) = 3x^4 + 4x^3 - x^2 + 3x - 1$ dan $g(x) = 2x^2 + x + 1$.

Carilah:

- $f(x) + g(x)$ dalam $Z_5[x]$
- $f(x) - g(x)$ dalam $Z_5[x]$
- $f(x) \times g(x)$ dalam $Z_5[x]$
- $f(x) : g(x)$ dalam $Z_5[x]$

5. Diketahui polinom-polinom $f(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x + 1$ dan $g(x) = x^3 + x + 1$.
Carilah:
- $f(x) + g(x)$ dalam $Z_2[x]$
 - $f(x) - g(x)$ dalam $Z_2[x]$
 - $f(x) \times g(x)$ dalam $Z_2[x]$
 - $f(x) : g(x)$ dalam $Z_2[x]$
6. Periksalah apakah polinom-polinom berikut tereduksi atau tidak tereduksi
- $P(x) = x^5 + 3x^4 + x^3 + 4x^2 + 2x + 5$ di $Z_6[x]$
 - $p(x) = x^2 - 4$ di $R[x]$
 - $p(x) = x^7 + 3$ di $Z_{10}[x]$
 - $p(x) = x^6 + 1$ di $Z_{11}[x]$



DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Wahidah. Teori Grup. Uin Alauddin Press. Makassar
Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan
Terjemahannya. Penerbit Fajar Mulia, Jakarta. 2002.
- Durbin J.R. 1985. Modern Algebra. New York: John Willey & Sons
- Mas'ood, Padli. Struktur Aljabar. Penerbit Akademia, Jakarta Barat.
2013.
- M.H. Tirta Saputro, Theresia. Pengantar Dasar Matematika Logika
dan Teori Himpunan. Penerbit Erlangga, Jakarta. 1992.
- Herstein, I.N. 1975. Topics in Algebra, 2nd Edition, New York: John
Willey & Sons
- Hidayanto, Erry. 2001. Struktur Aljabar. Malang: Universitas Negeri
Malang
- Raisinghania M.D and R. S. Aggarwal. Modern Algebra. S. Chand &
Company LTD, Ram Nagar New Delhi. 1980.
- Soebagio, Suharti, dan Sukirman. Struktur Aljabar. Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Dasar dan
Menengah Proyek Peningkatan Mutu Guru SLTP Setara D-III,
Jakarta. 1994/1995.
- Soebagio, A.S.1993. Materi Pokok Struktur Aljabar. Jakarta:
Universitas Terbuka, Depdikbud
- Tahmir, Suradi. Teori Grup. Penerbit Andira Publisher, Makassar.
2004.
- Wahyudin, 1989. Aljabar Modern. Bandung: Tarsito

BIOGRAFI PENULIS



Wahidah Alwi, lahir di Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru pada Tanggal 1 Pebruari 1979. Lahir sebagai anak pertama dari dua bersaudara dan merupakan putri dari pasangan Muh. Alwi dan Siti Aman (almarhumah). Penulis menempuh pendidikan dasar pada SD Inpres Lawallu mulai Tahun 1985 sampai Tahun 1991. Pada tahun yang sama penulis juga menempuh pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah DDI Lawallu dan tamat pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri Mangkoso dan tamat pada Tahun 1994. Selanjutnya Sekolah Menengah Umum di SMU Negeri 1 Soppeng Riaja Kab. Barru mulai Tahun 1994 dan tamat Tahun 1997. Pada Tahun 1997 penulis mengikuti kursus Bahasa Inggris di *Guide English Institute* (GEI) Makassar. Penulis berhasil lolos seleksi UMPN Tahun 1998 pada Jurusan Matematika FMIPA UNM Makassar program Strata Satu (S1) Non Kependidikan. Pada Tahun 2004 penulis melanjutkan pendidikan program Strata Dua (S2) pada Jurusan Statistika FMIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Pada Tahun 2009 penulis berhasil lulus menjadi dosen di Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Berbagai seminar dan workshop sudah diikuti penulis diantaranya: Pelatihan Analisis Data Kualitatif Bagi Dosen UIN Alauddin Makassar, Workshop Evaluasi Kurikulum UIN Alauddin Makassar, Pelatihan Research Design, Pelatihan Manajemen Berbasis Hasil, Pelatihan Penyusunan SOP Praktikum, dll. Pada Tahun 2013 Penulis Berhasil Lolos Seleksi Gerakan Seribu Buku UIN Alauddin Makassar yaitu Buku Analisis Real.