

Turnitin Originality Report

Processed on: 05-May-2023 09:36 WIB
 ID: 2084659082
 Word Count: 6766
 Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
22%	Internet Sources: 18% Publications: 12% Student Papers: 11%

Analisis Real By Wahidah Alwi

5% match (Internet from 19-Nov-2020)

<https://doku.pub/documents/analisis-real-iipdf-dmqek7yp7pg5>

4% match (student papers from 02-Nov-2017)

[Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2017-11-02](#)

4% match (Internet from 20-Mar-2019)

<https://edoc.site/analisis-real-5-pdf-free.html>

3% match (student papers from 24-Jun-2021)

[Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia on 2021-06-24](#)

2% match (student papers from 09-Dec-2021)

[Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2021-12-09](#)

1% match (Internet from 27-May-2019)

<https://zh.scribd.com/doc/252467189/Lecture-Note-Analisis-i>

1% match (Internet from 22-Nov-2020)

<https://qdoc.tips/langkah-awal-menuju-osn-3-pdf-free.html>

1% match (Klaus Dürrschnabel. "Mathematik für Ingenieure", Springer Science and Business Media LLC, 2021)

[Klaus Dürrschnabel. "Mathematik für Ingenieure", Springer Science and Business Media LLC, 2021](#)

1% match (Arfatin Nurrahmah, Abdul Karim. "Penerapan model pembelajaran ARIAS untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis mahasiswa pada mata kuliah analisa real", Math Didactic: Jurnal Pendidikan Matematika, 2018)

[Arfatin Nurrahmah, Abdul Karim. "Penerapan model pembelajaran ARIAS untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis mahasiswa pada mata kuliah analisa real", Math Didactic: Jurnal Pendidikan Matematika, 2018](#)

1% match (publications)

[NAJMEDDINE ATTIA. "L'analyse En mathématiques Pour les élèves de prépa", Centre de publication universitaire](#)

ANALISIS REAL ANALISIS REAL Wahidah Alwi ANALISIS REAL © Penerbit
 Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI) Penulis: Wahidah Alwi
 Editor: Erik Santoso Cetakan Pertama : Desember 2021 Cover: Rusli Tata
 Letak : Tim Kreatif PRCI Hak Cipta 2021, pada Penulis. Diterbitkan

pertama kali oleh: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151 Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009 Website : www.rcipress.rcipublisher.org E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com Copyright © 2021 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia All Right Reserved - Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021 ; 14,8 x 21 cm ISBN : 978-623-5847-51-1 Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta [Pasal 72 Undang-undang](#), No. [19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta](#) Pasal 72 [Barang siapa dengan sengaja](#) melanggar [dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat \(1\) atau pasal 49 ayat \(1\) dan ayat \(2\) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 \(satu\) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 \(satu juta rupiah\), atau pidana penjara paling lama 7 \(tujuh\) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 \(lima miliar rupiah\). Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait](#) sebagai [dimaksud pada ayat \(1\) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 \(lima\) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 \(lima ratus juta rupiah\)](#). KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan khususnya kepada penulis yang selalu diberi kelancaran untuk menyelesaikan penulisan Buku Analisis Real ini. Dengan keberadaan buku ini, diharapkan dapat membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami konsep-konsep Analisis Real. Buku ini disajikan kepada pembaca yang telah mempelajari kalkulus, teori himpunan, dan barisan elementer. Matematika Perguruan Tinggi [lebih menekankan pada pembentukan pola pikir matematika](#) yaitu [logis](#), kritis, [dan](#) tegas. [Jadi bukan lagi](#) untuk mengasah [kemampuan berhitung semata](#) atau kemampuan menerapkan konsep ke dalam pemecahan masalah. [Mahasiswa diharapkan dapat mengasah pola pikirnya melalui ketekunan dalam mempelajari langkah demi langkah berbagai aksioma, definisi, lemma, maupun teorema-teorema yang berkaitan dengan bilangan real. Analisis real](#) adalah suatu cabang matematika yang merupakan dasar di dalam matematika untuk berfikir formal yaitu berfikir secara deduktif aksiomatik. Buku ini di tulis berdasarkan pada pengalaman penulis mengajar mata kuliah Analisis Real pada [Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN](#) Alauddin Makassar, [yang](#) kemudian dilengkapi dengan beberapa bab dan tambahan beberapa definsi dan teorema sehingga terbentuk tulisan dalam bentuk buku. Selain itu penulis merasa bahwa buku yang membahas Analisis Real hingga saat ini masih cukup langka, khususnya buku-buku yang berbahasa Indonesia. Analisis Real | i Dalam buku ini dibahas konsep-konsep dari Analisis Real yang diharapkan agar pembaca dapat memulai berfikir secara deduktif aksiomatik, dalam mempelajari materi-materi yang lebih abstrak. Buku ini membahas tentang sistem bilangan real, barisan bilangan real, limit fungsi dan kekontinuan di \mathbb{R} , turunan fungsi, Integral Riemann, topologi diruang cartesius, dan ruang metrik. Selanjutnya buku yang dihasilkan ini digunakan untuk perkuliahan di Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Matematika UIN Alauddin Makassar, karena adanya keterbatasan referensi. Penulis menyadari bahwa buku edisi sebelumnya masih ada beberapa kekurangan, oleh karena itu buku edisi revisi ini diterbitkan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan pada edisi sebelumnya, [untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik](#) yang membangun [dari pembaca](#) demi penyempurnaan buku ini dalam edisi yang akan datang. Akhirnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi, penulis, pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan

secara umum. Amiiin. Makassar, Juli 2020 Penulis ii | Analisis Real [DAFTAR ISI KATA PENGANTAR](#)

.....	i	DAFTAR ISI
iii		DAFTAR
	vi	GAMBAR.....vi
		BAB I SISTEM BILANGAN REAL.....
	1	A. Aljabar pada Bilangan Real.....1
	5	B. Sifat Urutan pada R
	11	1. Ketaksamaan (Inequalities)
	13	2. Nilai Mutlak dan Garis Bilangan Real
	16	3. Garis Bilangan Real (The Real Line)
	17	C. Kelengkapan pada R
	24	D. Sifat Archimedes pada R.....
		BAB II BARISAN BILANGAN REAL
	29	A. Barisan dan Limit Barisan.....
	29	B. Teorema-teorema Limit.....
	38	C. Barisan Monoton.....
	45	D. Barisan Bagian
	48	E. Barisan Cauchy
	55	F. Sifat Barisan Divergen
	58	G. Deret Tak Berhingga
	60	BAB III LIMIT DAN KEKONTINUAN DI R
	69	A. Limit fungsi di suatu titik
	69	B. Perluasan Konsep Limit
	76	C. Fungsi Kontinu di Suatu titik
	80	D. Fungsi Kontinu Pada Interval
	82	E. Lebih Jauh Tentang Fungsi Kontinu Pada Interval
	85	F. Kombinasi Fungsi Kontinu
	87	G. Kekontinuan Seragam dan Fungsi invers
	89	BAB IV TURUNAN FUNGSI
	95	A. Pengertian Turunan.....
	95	B. Sifat-sifat Aljabar Turunan Fungsi
	97	C. Turunan fungsi Invers
	104	D. Turunan Tingkat Tinggi
	110	E. Teorema Nilai Rata-rata.....
	112	1. Maksimum dan Minimum Lokal
	112	2. Titik Stasioner
	113	3. Teorema Nilai Rata-rata dan Teorema Taylor
	114	4. Aplikasi Teorema Nilai Rata-rata
	116	5. Ketaksamaan
	118	6. Sifat Nilai Antara dari Suatu Turunan
	120	F. Aturan L'Hopital
	121	BAB V INTEGRAL RIEMANN
	129	A. Konsep Partisi
	129	B. Jumlah Riemann
	130	C. Integral Riemann
	131	D. Sifat-sifat Dasar Integral Riemann
	135	E. Keintegralan Fungsi Kontinu dan Fungsi Monoton
	138	F. Teorema Dasar Kalkulus Untuk Integral Riemann
	139	G. Teorema Nilai Rata-rata dan Teorema Taylor Untuk Integral
	143	BAB VI TOPOLOGI DI RUANG KARTESIUS.....
	147	A. Interval dalam R
	147	B. Himpunan Terbuka
	152	C. Himpunan Tertutup
	156	D. Sekitar (Neighbourhood).....
	158	E. Sel-sel Tertumpuk (Nested Cell).....
	161	F. Titik Kumpul
	163	G. Teorema Bolzano-Weierstrass dan Heine-Borel
	165	H. Himpunan

Terhubung	170	BAB VII
RUANG METRIK	175	A.
Pengertian Ruang Metrik	175	B.
Limit di Ruang Metrik	185	C.
Kekontinuan di Ruang Metrik	186	1.
Fungsi Kontinu di Ruang Metrik	186	2.
Himpunan Buka dan Himpunan Tutup di Ruang Metrik	190	D.
Terbatas Total, Lengkap dan Kompak	197	1.
Himpunan Terbatas dan Himpunan Terbatas Total	197	2.
Ruang Metrik Lengkap	201	3.
Ruang Metrik Kompak	203	E.
Himpunan- himpunan Khusus dalam Ruang Metrik ..	205	F.
Himpunan Terhubung	209	DAFTAR
PUSTAKA.....	212	
BIOGRAFI PENULIS	213	DAFTAR
GAMBAR Gambar 1.1 Jarak antara $a = -1$ dan $b = 1$	16	
Gambar 1.2 Persekitaran $V?$ (a)	16	
Gambar 3.1 $\lim_{x \rightarrow \infty} x = K$	69	
Gambar 3.2 $\lim_{x \rightarrow \infty} 412x + 1 = 3$	70	
Gambar 3.3 Fungsi kontinu di suatu titik	81	
Gambar 3.4 Grafik fungsi kontinu pada interval buka	82	
Gambar 3.5 Grafik fungsi kontinu pada interval tutup	83	
Gambar 3.6 Persekitaran $V? f(c)$	87	
Gambar 3.7 Persekitaran $V?$ $f(c)$	88	
Gambar 4.1 f mencapai nilai maksimum lokal di c	112	
BAB I SISTEM BILANGAN REAL		
Pada bagian ini dibahas tentang aljabar pada bilangan real, sifat urutan pada \mathbb{R} , sifat kelengkapan pada \mathbb{R} , dan sifat Archimedes pada \mathbb{R} . A. Aljabar pada <u>Bilangan Real</u> Pada <u>himpunan bilangan real \mathbb{R}</u> terdapat <u>dua operasi</u> biner yang dilambangkan dengan $+$ dan \cdot dan berturut-turut disebut penambahan dan perkalian. Operasi-operasi tersebut mempunyai sifat: 1. Sifat komutatif yaitu $a + b = b + a$, untuk setiap $a, b \in \mathbb{R}$ 2. Sifat asosiatif yaitu $(a + b) + c = a + (b + c)$, untuk setiap $a, b, c \in \mathbb{R}$ 3. Eksistensi unsur nol. Terdapat unsur nol di \mathbb{R} <u>sehingga $0 + a = a + 0 = a$, untuk setiap $a \in \mathbb{R}$</u> 4. Eksistensi unsur negatif. <u>Untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, terdapat unsur $-a \in \mathbb{R}$ sehingga $a + (-a) = (-a) + a = 0$</u> 5. Sifat komutatif perkalian. <u>$a \cdot b = b \cdot a$, untuk setiap $a, b \in \mathbb{R}$</u> 6. Sifat asosiatif perkalian. <u>$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$, untuk setiap $a, b, c \in \mathbb{R}$</u> 7. Eksistensi unsur satuan di \mathbb{R} . Terdapat unsur 1 di \mathbb{R} yang berbeda dengan nol sehingga $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$ 8. <u>Eksistensi unsur</u> kebalikan. <u>Untuk setiap $a \neq 0$ di \mathbb{R} terdapat unsur di \mathbb{R} sehingga $a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1$</u> 9. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. <u>$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ dan $(b + c) \cdot a = (b \cdot a) + (c \cdot a)$ untuk setiap $a, b, c \in \mathbb{R}$</u> . Teorema 1.1.1 <u>a. Jika z dan a unsur di \mathbb{R} sehingga $z + a = a$ maka $z = 0$ b. Jika u dan $b \neq 0$ unsur di \mathbb{R} sehingga $u \cdot b = b$ maka $u = 1$ Bukti: a. $z + a = a$ $z + a + (-a) = a + (-a)$ [Tambahkan $(-a)$ pada kedua ruas] $z + 0 = 0$ [sifat 4] $z = 0$ [sifat 3] b. $u \cdot b = b$, karena $b \neq 0$ maka terdapat di \mathbb{R}, selanjutnya $1 \cdot b = b$ kita kalikan dengan sehingga, $1 \cdot (u \cdot b) = (b \cdot 1) \cdot 1$ $1 \cdot (u \cdot b) = (b \cdot 1) \cdot 1$ $1 \cdot (u \cdot b) = (b \cdot 1) \cdot 1$ [sifat 6] $u \cdot 1 = 1$ [sifat 8] $u = 1$ [sifat 7] Teorema 1.1.2 <u>a. Jika a dan b unsur-unsur di \mathbb{R} sehingga $a + b = 0$, maka $b = -a$ b. Jika $a \neq 0$ dan b unsur-unsur di \mathbb{R} sehingga $a \cdot b = 1$, maka $b = \frac{1}{a}$ Bukti: a. $a + b = 0$ $(-a) + (a + b) = (-a) + 0$ [Tambahkan $(-a)$ pada kedua ruas] $(-a + a) + b = -a$ [sifat 2 dan sifat 3] $0 + b = -a$ [sifat 4] $b = -a$ [sifat 3] b. $a \cdot b = 1$ Karena $a \neq 0$, maka terdapat di \mathbb{R}, selanjutnya kedua $1 \cdot b = 1$ ruas kita kalikan dengan sehingga $1 \cdot (a \cdot b) = (a \cdot 1) \cdot b = 1 \cdot b = 1$ [Sifat 6 dan sifat 7] $1 \cdot b = 1$ [sifat 8] $b = \frac{1}{a}$ [sifat 7] Teorema 1.1.3 <u>Jika $a \in \mathbb{R}$, maka $a \cdot a \cdot 0 = 0$ b. $(-1) \cdot a = -a$ c. $(-a) = a$ d. $(-1)(-1) = 1$ Bukti: a. $a \cdot a \cdot 0 = a \cdot (1 + a) \cdot 0 = a \cdot (1 + 0) = a \cdot 1 = a$ Selanjutnya: $(-a) + (a + a) \cdot 0 = (-a) + a \cdot 0 = 0$ $0 + a \cdot 0 = 0$ Jadi $a \cdot 0 = 0$ b. $(-1) \cdot a + a =$</u></u></u>		

$(-1) \cdot a + 1 \cdot a = (-1 + 1) \cdot a = 0 \cdot a = 0$ Jadi $(-1) \cdot a = -a$ c. $-(-a) + (-a) = (-1)(-a) + 1 \cdot (-a) = (-1 + 1)(-a) = 0 \cdot (-a) = 0$ Jadi $-(-a) = a$ d. Dari bukti (b) ambil $a = -1$ maka diperoleh $(-1) \cdot (-1) = -(-1) = 1$ (bukti c)

Teorema 1.1.4 Misalkan a, b, c unsur-unsur di R . Jika $a \neq 0$ maka $1x \neq 0$ dan (11) $= a \cdot b$. Jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$ maka $b = c$. Jika $a \cdot b = 0$ maka $a = 0$ atau $b = 0$ Bukti teorema di atas sebagai latihan bagi pembaca.

Bilangan rasional dan bilangan irrasional Unsur di R yang dapat ditulis sebagai dengan $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$ disebut bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional dilambangkan dengan Q jadi $Q = \{x : x = \frac{a}{b}, a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$ Akan tetapi, tidak semua elemen R merupakan elemen Q , seperti $\sqrt{2}$ yang tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk $\frac{a}{b}$. Elemen R yang bukan elemen Q disebut bilangan irrasional (irrational numbers). Akan ditunjukkan bahwa tidak terdapat bilangan rasional yang kuadratnya adalah 2. Untuk membuktikannya digunakan istilah genap dan ganjil. Suatu bilangan asli disebut genap apabila bilangan itu mempunyai bentuk $2n$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$, dan disebut ganjil apabila bilangan itu mempunyai bentuk $2n - 1$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$.

Teorema 1.1.5 Tak ada bilangan rasional t sehingga $t^2 = 2$ Bukti: Andaikan ada $t \in Q$ sehingga $t^2 = 2$, maka dapat dipilih p, q di \mathbb{Z} sehingga $(\frac{p}{q})^2 = 2$ dan $(p, q) = 1$ karena $p^2 = 2q^2$, maka $p^2 = m \cdot m$ genap. Akibatnya p genap sehingga $p = 2m$ untuk suatu m bilangan bulat sehingga $4m^2 = 2q^2$ atau $q^2 = 2m^2$, yang berarti q^2 genap akibatnya q juga genap. Karena p, q keduanya genap, maka $(p, q) > 1$. Ini bertentangan dengan $(p, q) = 1$. Jadi haruslah tak ada bilangan rasional t sehingga $t^2 = 2$.

B. Sifat Urutan pada R Pada himpunan bilangan real R , terdapat himpunan tak kosong P dari R yaitu bilangan positif yang memenuhi sifat: a. Jika a, b di P maka $a + b$ di P . b. Jika a, b di P maka ab di P . c. Jika a di R maka tepat satu pernyataan berikut dipenuhi : a di P , $a = 0$, dan $-a$ di P . Sifat ini sering dinamakan sifat trikotomi.

Definisi 1.2.1 Jika a di P dikatakan bahwa a bilangan real positif dan ditulis $a > 0$. Jika a di P atau 0 , dikatakan bahwa a bilangan nonnegatif dan ditulis $a \geq 0$, jika $-a$ di P dikatakan bahwa a bilangan real negatif dan ditulis $a < 0$, jika $-a$ di P atau 0 , dikatakan bahwa a nonpositif dan ditulis $a \leq 0$.

Definisi 1.2.2 Misalkan a, b unsur-unsur di R . Jika $a - b$ di P maka kita tulis $a > b$ atau $b < a$. Jika $a - b$ di $P \neq \{0\}$, maka kita tulis $a \neq b$ atau $b \neq a$, selanjutnya kita tulis $a < b < c$ yang berarti $a < b$ dan $b < c$.

Teorema 1.2.3 Misalkan a, b, c unsur-unsur di R . Jika $a > b$ dan $b > c$ maka $a > c$. Terdapat tepat satu hubungan $a < b, a = b, a > b$. Jika $a \neq b$ dan $b \neq a$ maka $a = b$ Bukti: a. Diketahui $a > b$ dan $b > c$, ini berarti $a - b, b - c$ di P . Jadi $(a - b) + (b - c)$ di P atau $a - c$ di P . Dengan kata lain $a > c$. b. Dengan sifat trikotomi maka terdapat tepat satu hubungan $a - b$ di $P, a - b = 0$, atau $-(a - b) = b - a$ di P atau $a > b, a = b$ atau $a < b$. c. Andaikan $a \neq b$, maka $a - b \neq 0$ yang berarti $a - b$ di P atau $-(a - b) = b - a$ di P . Jadi $a > b$ atau $a < b$. Ini bertentangan dengan hipotesis yaitu $a \neq b$ dan $a \neq b$. Jadi haruslah $a = b$.

Teorema 1.2.4 Jika $a \in R$ dan $a \neq 0$ maka $a^2 > 0$. Bukti: Dengan sifat trikotomi maka $a \in P$ atau $-a \in P$, jika $a \in P$ maka $a^2 = a \cdot a \in P$ jika $-a \in P$ maka $a^2 = (-a) \cdot (-a) \in P$. Jadi $a^2 > 0$

Teorema 1.2.5 Misalkan a, b, c, d unsur-unsur di R . Jika $a > b$ maka $a + c > b + c$. Jika $a > b$ dan $c > d$ maka $a + c > b + d$. Jika $a > b$ dan $c > 0$ maka $ac > bc$. Jika $a > b$ dan $c < 0$ maka $ac < bc$. Jika $a > 0$ maka $a > 0 \cdot 1$ dan $a < 0 \cdot 1$

Bukti sebagai latihan Teorema 1.2.6 Jika a, b di R dan $a > b$, maka $a > \frac{1}{2}(a + b) > b$. 2. Bukti: Karena $a > b$ maka $2a = a + a > a + b$ dan $a + b > b + b = 2b$. Jadi $2a > a + b > 2b$. Selanjutnya karena $2 > 0$ maka $a > \frac{1}{2}(a + b) > b$.

Teorema 1.2.7 Jika $a \in R, a > 0$ maka $a > a > 0$ 1. Bukti diserahkan kepada pembaca sebagai latihan

Teorema 1.2.8 Jika $a \in R$ sedemikian sehingga $0 \leq a < ?$ untuk setiap $? > 0$ maka $a = 0$ Bukti: Andaikan $a > 0$ maka $a > ? > 0$. Diambil $? = \frac{1}{2}a$ ($\frac{1}{2}a$ adalah $\frac{1}{2} \cdot a$ bilangan real positif tegas), maka $a > \frac{1}{2}a > 0$. Kontradiksi dengan pernyataan $0 \leq a < ?$ untuk setiap $? > 0$. Jadi pengandaian salah, seharusnya $a = 0$. Perkalian antar dua bilangan positif hasilnya adalah

positif. Akan tetapi, hasil perkalian yang positif belum tentu setiap faktornya positif. Teorema 1.2.9 Jika $ab > 0$, maka berlaku i. $a > 0$ dan $b > 0$, atau ii. $a < 0$ dan $b < 0$. Akibat 1.2.10 Jika $ab < 0$, maka berlaku i. $a < 0$ dan $b > 0$, atau ii. $a > 0$ dan $b < 0$. Soal Latihan 1. Jika $a \in \mathbb{R}$ sehingga $a \cdot a = a$ buktikan $a = 0$ atau $a = 1$! Petunjuk ringkas penyelesaian soal: Soal di atas boleh dibuktikan salah satunya saja yaitu $a = 0$ atau $a = 1$. Permasalahan: Akan dibuktikan bahwa, jika $a \in \mathbb{R}$ sehingga $a \cdot a = a$ maka $a = 0$ atau $a = 1$. Petunjuk: Anggap $a \in \mathbb{R}$, dengan menggunakan Sifat 8 dalam aljabar pada bilangan real terbukti bahwa $a \cdot a = a$ maka $a = 1$. 2. Jika $a \in \mathbb{R}$ dan $a \neq 0$ sehingga $ab = ac$ buktikan $b = c$! Petunjuk ringkas penyelesaian soal: Permasalahan: Akan dibuktikan bahwa jika $a \in \mathbb{R}$ dan $a \neq 0$ sehingga $ab = ac$ maka $b = c$. Petunjuk: Diketahui bahwa $a \neq 0$, maka ada. Dengan mengalikan $1/a$ pada kedua ruas dari $ab = ac$ dan dengan menggunakan sifat 6, sifat 7, dan sifat 8 dalam aljabar pada bilangan real diperoleh $b = c$. 3. Jika $a \in \mathbb{R}$ dan $a \neq 0$ buktikan $a^2 > 0$! Petunjuk ringkas penyelesaian soal: Permasalahan: akan dibuktikan bahwa jika $a \in \mathbb{R}$ dan $a \neq 0$ maka $a^2 > 0$. Petunjuk: Diketahui $a \in \mathbb{R}$ dan $a \neq 0$, dengan menggunakan sifat urutan (3) yaitu sifat trikotomi maka a di P atau $-a$ di P . Dari sifat ini diperoleh bahwa $a^2 > 0$. 4. Jika $a > b$ dan $c > d$ buktikan $a + c > b + d$! Petunjuk ringkas penyelesaian soal: Permasalahan: akan dibuktikan bahwa jika $a > b$ dan $c > d$ maka $a + c > b + d$. Petunjuk: Diketahui $a > b$ dan $c > d$, berdasarkan definisi 1.2.2 (i) maka $a - b$ di P dan $c - d$ di P . dengan menggunakan sifat urutan (1) maka terbukti $a + c > b + d$. 5. Jika $a > b$ dan $c > 0$ buktikan $ca > cb$! Petunjuk ringkas penyelesaian soal: Permasalahan: akan dibuktikan bahwa jika $a > b$ dan $c > 0$ maka $ca > cb$. Petunjuk: Diketahui $a > b$ dan $c > 0$, berdasarkan definisi 1.2.2 (i) maka $a - b$ di P dan c di P . Dengan menggunakan sifat urutan (2) maka terbukti $ca > cb$. 6. Jika $a > b$ dan $c < 0$ buktikan $ca < cb$! Petunjuk ringkas penyelesaian soal: Permasalahan: akan dibuktikan bahwa jika $a > b$ dan $c < 0$ maka $ca < cb$. Petunjuk: Diketahui $a > b$ dan $c < 0$, berdasarkan definisi 1.2.2 (i) maka $a - b$ di P dan $-c$ di P . Dengan menggunakan sifat urutan (2) maka terbukti $ca < cb$. 1. Ketaksamaan (Inequalities) Selanjutnya, akan ditunjukkan bagaimana sifat urutan dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu ketaksamaan. Perhatikan contoh dibawah ini. Contoh 1.2.1 a. Tentukan himpunan A dari bilangan real x sedemikian sehingga $2x + 3 \leq 6$. Jawab: Diketahui $x \in A$ dan $2x + 3 \leq 6$, maka $2x + 3 \leq 6 \Rightarrow 2x \leq 3 \Rightarrow x \leq 3/2$ Jadi $A = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 3/2\}$ b. Diberikan $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + x > 2\}$. Tentukan bentuk lain dari B . Jawab: Diketahui $x \in B$ dan $x^2 + x > 2$ atau $x^2 + x - 2 > 0$ atau $(x - 1)(x + 2) > 0$. Sehingga diperoleh bahwa 1. $x - 1 > 0$ dan $x + 2 > 0$ diperoleh $x > 1$ dan $x > -2$ yang berarti $x > 1$ 2. $x - 1 < 0$ dan $x + 2 < 0$ diperoleh $x < 1$ dan $x < -2$ yang berarti $x < -2$ Jadi himpunannya adalah $B = \{x \in \mathbb{R} : x > 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x < -2\}$ Teorema 1.2.11 Jika $a \in \mathbb{R}$ dan $b \in \mathbb{R}$, maka a. $a < b \Rightarrow a^2 < b^2 \Rightarrow \sqrt{a} < \sqrt{b}$ b. $a \geq b \Rightarrow a^2 \geq b^2 \Rightarrow \sqrt{a} \geq \sqrt{b}$ Teorema 1.2.12 Ketaksamaan Bernoulli Jika $x > -1$ maka $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$ Bukti: Akan dibuktikan menggunakan induksi matematika. Untuk $n = 1$, maka $(1 + x)^1 \geq 1 + 1 \cdot x$ (pernyataan benar) Misalkan benar untuk $n = k$, yaitu $(1 + x)^k \geq 1 + kx$. Akan dibuktikan benar untuk $n = k + 1$, yaitu: $(1 + x)^{k+1} = (1 + x)^k(1 + x) \geq (1 + kx)(1 + x) = 1 + kx + x + kx^2 = 1 + (k + 1)x + kx^2$ Karena $kx^2 > 0$, maka $(1 + x)^{k+1} \geq 1 + (k + 1)x$, yang berarti benar untuk $n = k + 1$. Jadi, terbukti bahwa $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$ Teorema 1.2.13 Ketaksamaan Cauchy Jika $n \in \mathbb{N}$ dan $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}$, maka $(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$ Atau $m \times m \quad (\sum_{i=1}^m Z_i Z_i) \leq (\sum_{i=1}^m Z_i^2) (\sum_{i=1}^m Z_i^2)$ $i=1 \quad i=1 \quad i=1$ Selanjutnya, jika tidak semua $b_i = 0$ maka $m \times m \quad (\sum_{i=1}^m Z_i Z_i) \leq (\sum_{i=1}^m Z_i^2) (\sum_{i=1}^m Z_i^2)$ $i=1 \quad i=1 \quad i=1$ Jika dan hanya jika terdapat $s \in \mathbb{R}$ sedemikian hingga $a_1 = sb_1, a_2 = sb_2, \dots, a_n = sb_n$. Bukti sebagai latihan. 2. Nilai Mutlak dan Garis Bilangan Real Dari sifat trikotomi, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika $a \in \mathbb{R}$ dan $a \neq 0$, maka $|a|$ atau $-a$ merupakan bilangan real positif. Nilai mutlak dari $a \in \mathbb{R}$ didefinisikan sebagai nilai

positif dari dua bilangan tersebut. Definisi 1.2.14 Nilai mutlak (absolute value) dari suatu bilangan real a , dinotasikan dengan $|a|$, didefinisikan sebagai Z , $\forall Z > 0 \quad |Z| := \{ 0, \forall Z = 0 -Z, \forall Z < 0$ Sebagai contoh, $|3| = 3$ dan $|-9| = 9$. Dapat dilihat dari definisi di atas bahwa $|a| \geq 0$ untuk semua $a \in \mathbb{R}$, dan bahwa $|a| = 0$ jika dan hanya jika $a = 0$. Juga bahwa $|-a| = a$ untuk semua $a \in \mathbb{R}$. Berikut ini diberikan beberapa sifat nilai mutlak. Teorema 1.2.15 (a) $|ab| = |a| |b|$ untuk semua $a, b \in \mathbb{R}$. (b) $|a|^2 = a^2$ untuk semua $a \in \mathbb{R}$. (c) Jika $c \geq 0$, maka $|a| \leq c$ jika dan hanya jika $-c \leq a \leq c$. (d) $-|a| \leq a \leq |a|$ untuk semua $a \in \mathbb{R}$. Bukti: (a) Jika $a = b = 0$, maka terbukti. Jika $a > 0$ dan $b > 0$, maka $ab > 0$, sehingga $|ab| = ab = |a| |b|$. Jika $a > 0$ dan $b < 0$, maka $ab < 0$, sehingga $|ab| = -ab = |a| |b|$. (b) Karena $a^2 \geq 0$, maka $a^2 = |a^2| = |aa| = |a| |a| = |a|^2$. (c) Jika $|a| \leq c$, maka diperoleh $a \leq c$ yang berarti $-c \leq a \leq c$. Sebaliknya, jika $-c \leq a \leq c$, maka diperoleh $|a| \leq c$ dan $-a \leq c$. Jadi, $|a| \leq c$. (d) Gunakan langkah yang sama seperti pada (c) dengan mengambil $c = |a|$. Berikut ini diberikan sebuah teorema yang disebut dengan Ketaksamaan Segitiga (Triangel Inequality). Teorema 1.2.16 (Ketaksamaan Segitiga) Jika $a, b \in \mathbb{R}$, maka $|a + b| \leq |a| + |b|$ Bukti: Dari Teorema 1.2.15 (d), diketahui $-|a| \leq a \leq |a|$ dan $-|b| \leq b \leq |b|$. Dengan menjumlahkan kedua persamaan diperoleh $-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$. Menggunakan Teorema 1.2.15 (c) diperoleh bahwa $|a + b| \leq |a| + |b|$. Akibat 1.2.17 Jika $a, b \in \mathbb{R}$, maka $|a - b| \leq |a| + |b|$ Bukti: a. Tulis $a - b = a - b + b$ dan masukkan ke dalam Ketaksamaan Segitiga. Sehingga $|a - b| = |(a - b) + b| \leq |a - b| + |b|$. Kurangkan kedua ruas dengan $|b|$, diperoleh $|a - b| - |b| \leq |a - b|$. Gunakan cara yang sama untuk $b = b - a + a$, diperoleh $-|a - b| \leq |a| - |b|$. Kombinasikan kedua ketaksamaan tersebut, diperoleh $-|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|$. Menggunakan Teorema 1.2.15 (c) diperoleh bahwa $|a| - |b| \leq |a - b| \leq |a| + |b|$. Gantilah b pada Ketaksamaan Segitiga dengan $-b$, sehingga diperoleh $|a - b| \leq |a| + |-b|$. Karena $|-b| = b$, maka diperoleh $|a - b| \leq |a| + |b|$. Ketaksamaan Segitiga di atas dapat diperluas sehingga berlaku untuk sebarang bilangan real yang banyaknya berhingga. Akibat 1.2.18 Jika a_1, a_2, \dots, a_n adalah sebarang bilangan real, maka $|z_1 + z_2 + \dots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \dots + |z_n|$. Contoh 1.2.2 Diberikan fungsi f yang didefinisikan dengan $2x^2 - 3x + 1$ $f(x) = 2x - 1$ untuk $x \in [2, 4]$. Tentukan konstanta M sedemikian sehingga $|f(x)| \leq M$, untuk setiap $x \in [2, 4]$. $2x^2 - 3x + 1$ Diketahui $|f(x)| = |2x^2 - 3x + 1| \leq |2x^2| + |-3x| + |1| = 2|x^2| + 3|x| + 1 = 2|4^2| + 3|4| + 1 = 45$ dan $|2x - 1| \geq ||2x| - |1|| \geq ||2(2)| - |1|| = 3$ Sehingga $|f(x)| = 2x^2 - 3x - x + 1 \leq 45$. Jadi, dengan mengambil $M = 45 \leq 3 \cdot 3$, didapat $|f(x)| \leq M$, untuk setiap $x \in [2, 4]$. 3. Garis Bilangan Real (The Real Line) Interpretasi geometri yang dikenal di antaranya garis bilangan real (real line). Pada garis real, nilai mutlak $|a|$ dari suatu elemen $a \in \mathbb{R}$ adalah jarak a ke 0. Jarak (distance) antara elemen a dan b di \mathbb{R} adalah $|a - b|$. Perhatikan gambar berikut: Gambar 1.1 Jarak antara $a = -1$ dan $b = 1$ Definisi 1.2.19 Diberikan $a \in \mathbb{R}$ dan $\delta > 0$. Persekitaran $V_\delta(a)$ (neighborhood) dari a didefinisikan sebagai himpunan $V_\delta(a) := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \delta\} = (a - \delta, a + \delta)$ Gambar 1.2 Persekitaran $V_\delta(a)$. Dapat dilihat bahwa $x \in V_\delta(a)$ jika dan hanya jika $a - \delta < x < a + \delta$. Teorema 1.2.20 Diberikan $a \in \mathbb{R}$. Jika x berada dalam persekitaran $V_\delta(a)$ untuk setiap $\delta > 0$, maka $x = a$. Bukti: Jika x memenuhi $|x - a| < \delta$, maka berdasarkan Teorema 1.2.8 diperoleh bahwa $|x - a| = 0$, yang berakibat $x = a$. C. Kelengkapan pada \mathbb{R} Definisi 1.3.1 Diberikan subset tak kosong $S \subset \mathbb{R}$. 1. Himpunan S dikatakan terbatas ke atas (bounded above) jika terdapat suatu bilangan $u \in \mathbb{R}$ sedemikian hingga $s \leq u$ untuk semua $s \in S$. Setiap bilangan u seperti ini disebut dengan batas atas (upper bound) dari S . 2. Himpunan S dikatakan terbatas ke bawah (bounded below) jika terdapat suatu bilangan $w \in \mathbb{R}$ sedemikian hingga $w \leq s$ untuk semua $s \in S$. Setiap bilangan w seperti ini disebut dengan batas bawah (lower bound) dari S . 3. Suatu himpunan dikatakan terbatas (bounded) jika terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Jika tidak, maka dikatakan tidak terbatas (unbounded). Sebagai contoh, himpunan $S := \{x \in \mathbb{R} : x \leq 3\}$ ini terbatas ke atas, sebab

bilangan 3 dan sebarang bilangan lebih dari 3 merupakan batas atas dari S. Himpunan ini tidak mempunyai batas bawah, jadi himpunan ini tidak terbatas ke bawah. Jadi, S merupakan himpunan yang tidak terbatas

Definisi 1.3.2 Misalkan $S \subseteq \mathbb{R}$. Jika S terbatas di atas, maka suatu batas atas dikatakan supremum (batas atas terkecil) dari S jika ia lebih kecil dari setiap batas atas yang lain dari S. 2. Jika S terbatas di bawah, maka suatu batas bawah dikatakan infimum (batas bawah terbesar) dari S jika ia lebih besar dari setiap batas bawah yang lain dari S. Definisi di atas dapat dinyatakan dengan cara lain: a. $u \in \mathbb{R}$ supremum dari $S \subseteq \mathbb{R}$, jika memenuhi dua sifat: 1) $s \leq u$ untuk semua $s \in S$ 2) Jika $s < v$ untuk semua $s \in S$ maka $u < v$. Ditulis $u = \sup S$. b. $t \in \mathbb{R}$ infimum dari $S \subseteq \mathbb{R}$, jika memenuhi dua sifat berikut: 1) $s \geq t$ untuk semua $s \in S$ 2) Jika $s > r$ untuk semua $s \in S$ maka $t > r$. Ditulis $t = \inf S$ Jika diberikan suatu himpunan S subset dari \mathbb{R} , maka hanya terdapat satu supremum, atau supremumnya tunggal. Juga dapat ditunjukkan bahwa jika u' adalah sebarang batas atas dari suatu himpunan tak kosong S, maka $\sup S \leq u'$, sebab $\sup S$ merupakan batas atas terkecil dari S. Suatu subset tak kosong $S \subseteq \mathbb{R}$ mempunyai empat kemungkinan, yaitu a. mempunyai supremum dan infimum, b. hanya mempunyai supremum, c. hanya mempunyai infimum, d. tidak mempunyai infimum dan supremum. Setiap bilangan real $a \in \mathbb{R}$ merupakan batas atas dan sekaligus juga merupakan batas bawah himpunan kosong \emptyset . Jadi, himpunan \emptyset tidak mempunyai supremum dan infimum. Teorema 1.3.3 Suatu batas atas u dari himpunan tak kosong S di \mathbb{R} adalah supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $s \in S$ sehingga $u - \epsilon < s$. Bukti: (?) Misalkan u batas atas sehingga untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat $s \in S$ sehingga $u - \epsilon < s$. Akan ditunjukkan $u = \sup S$. Misalkan v batas atas dan $v < u$. Andaikan $v < u$, ambil $\epsilon = u - v > 0$, menurut hipotesis, maka terdapat $s \in S$ sehingga $u - \epsilon < s$. Akibatnya $u - (u - v) = v < s$. Ini suatu kontradiksi bahwa v batas atas, jadi haruslah $v > u$, yang berarti $u =$ batas atas terkecil dari S. Jadi $u = \sup S$. (?) Misalkan $u = \sup S$ dan ambil $\epsilon > 0$ sebarang. Karena $u - \epsilon < u$, maka $u - \epsilon$ bukan batas atas dari S. Ini berarti terdapat $s \in S$ sehingga $u - \epsilon < s$. Contoh-contoh: 1. Jika S_1 hanya mempunyai berhingga unsur, maka dapat ditunjukkan bahwa S_1 mempunyai unsur terbesar u dan unsur terkecil v . Maka $u = \sup S_1$ dan $v = \inf S_1$. Dimana u dan v unsur-unsur di S_1 . 2. Himpunan $S_2 = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 2\}$. Himpunan ini mempunyai batas atas terkecil 2 dan batas bawah terbesar 0 yang keduanya terletak pada S_2 . 3. Himpunan $S_3 = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 2\}$. Himpunan ini mempunyai batas atas terkecil 2 dan batas bawah terbesar 0 tetapi keduanya tidak terletak pada S_3 . Sifat Lengkap \mathbb{R} (Aksioma Supremum) 1.3.4 Jika subset tak kosong $S \subseteq \mathbb{R}$ terbatas ke atas maka supremumnya ada, yaitu terdapat $u \in \mathbb{R}$, sedemikian sehingga $u = \sup S$ Akibat 1.3.5 Jika subset tak kosong $S \subseteq \mathbb{R}$ terbatas ke bawah, maka infimumnya ada, yaitu terdapat $w \in \mathbb{R}$ sedemikian hingga $w = \inf S$ Bukti: Misalkan himpunan T terbatas ke bawah, $T \subseteq \mathbb{R}$. Dibentuk himpunan $S = \{-t : t \in T\}$, maka S terbatas ke atas dan tidak kosong. Menurut Aksioma Supremum, $\sup S$ ada, namakan $u = \sup S$, maka $-u = \inf T$. Teorema 1.3.6 Diberikan subset tak kosong $S \subseteq \mathbb{R}$ yang terbatas ke atas dan sebarang $a \in \mathbb{R}$. Didefinisikan himpunan $a + S := \{a + s : s \in S\}$, maka berlaku $\sup(a + S) = a + \sup(S)$ Bukti: Jika diberikan $u := \sup S$, maka $x \leq u$ untuk semua $x \in S$, sehingga $a + x \leq a + u$. Oleh karena itu, $a + u$ merupakan batas atas dari himpunan $a + S$. Akibatnya $\sup(a + S) \leq a + u$. Selanjutnya, misalkan v adalah sebarang batas atas $a + S$, maka $a + x \leq v$ untuk semua $x \in S$. Akibatnya $x \leq v - a$ untuk semua $x \in S$, sehingga $v - a$ merupakan batas atas S. Oleh karena itu, $u = \sup S \leq v - a$. Karena v adalah sebarang batas atas $a + S$, maka dengan mengganti v dengan $u = \sup S$, diperoleh $a + u \leq \sup(a + S)$. Di lain pihak diketahui $\sup(a + S) \leq a + u$. Akibatnya terbukti bahwa $\sup(a + S) = a + u = a + \sup S$ Teorema 1.3.7 Diberikan subset tak kosong $S \subseteq \mathbb{R}$ yang terbatas dan sebarang bilangan real $a \in \mathbb{R}$. Didefinisikan himpunan $aS := \{as : s \in S\}$, maka berlaku $\inf(aS) = a \inf(S)$ Bukti: Tulis $u = \inf aS$ dan $v = \inf S$. Akan dibuktikan bahwa $u = av$. Karena $u = \inf aS$,

maka $u = \inf S$, untuk setiap $s \in S$. Karena $v = \inf S$, maka $v \leq s$ untuk setiap $s \in S$. Akibatnya $av \leq as$ untuk setiap $s \in S$. Berarti av merupakan batas bawah aS . Karena u batas bawah terbesar aS , maka $av = u$. Karena $u = \inf S$ untuk setiap $s \in S$, maka diperoleh $u \leq s$ untuk setiap $s \in S$ (sebab $u \leq as$ untuk setiap $s \in S$, maka diperoleh $u \leq s$ untuk setiap $s \in S$). Karena $v = \inf S$, maka $v \leq s$ yang berakibat $u \leq av$. Di lain pihak diketahui $av = u$. Akibatnya $u = av$. Jadi, terbukti bahwa $\inf(aS) = a \inf(S)$. Teorema 1.3.8 **Jika A dan B subset** tak kosong R dan memenuhi $a \leq b$ untuk semua $a \in A$ dan $b \in B$, maka $\sup A \leq \inf B$. Bukti: Diambil sebarang $b \in B$, maka $a \leq b$ untuk semua $a \in A$. Artinya bahwa b merupakan batas atas A , sehingga $\sup A \leq b$. Selanjutnya, karena berlaku untuk semua $b \in B$, maka $\sup A$ merupakan batas bawah B . Akibatnya diperoleh bahwa $\sup A \leq \inf B$. Soal Latihan 1. Misalkan $S_1 = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$. Tunjukkan bahwa himpunan S_1 mempunyai batas bawah tetapi tidak mempunyai batas atas. Tunjukkan $\inf S_1$! Petunjuk bukti: Karena $x \geq 0$, untuk setiap $x \in S_1$, maka menurut definisi 0 adalah salah satu batas bawah dari S_1 . Permasalahan: Akan ditunjukkan bahwa $0 = \inf S_1$. Misalkan t sebarang batas bawah S_1 , akan ditunjukkan $t \leq 0$. Andaikan $t > 0$, karena $0 \in S_1$ berarti t bukan batas bawah S_1 . Kontradiksi dengan t batas bawah S_1 . Pengandaian $t > 0$ salah. Jadi $t \leq 0$. 0 adalah salah satunya batas bawah dari S_1 , t sebarang batas bawah S_1 sehingga $t \leq 0$ maka menurut definisi $0 = \inf S_1$. 2. Misalkan $S_2 = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$. Apakah S_2 memiliki batas bawah? Tunjukkan pernyataan saudara Petunjuk Bukti: Karena $x > 0$, untuk setiap $x \in S_2$. Permasalahan: akan dibuktikan bahwa $0 = \inf S_2$. Andaikan 0 bukan batas bawah dari S_2 berarti terdapat $s \in S_2$ sehingga $s < 0$. $s < 0$ maka $s \notin S_2$. Kontradiksi dengan $s \in S_2$. Jadi pengandaian 0 bukan batas bawah dari S_2 adalah salah. Jadi 0 batas bawah dari S_2 . 3. Misalkan $S_3 = \{1 - (-1)^n/n : n \in \mathbb{N}\}$. Temukan $\inf S_3$ dan $\sup S_3$. Petunjuk penyelesaian: Permasalahan: akan ditentukan $\inf S_3$ dan $\sup S_3$. Penyelesaian: Tentukan anggota dari himpunan S_3 , kemudian tentukan $\inf S_3$ dan $\sup S_3$. 4. Misalkan $S_4 = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x < 5\}$. Tentukan supremum dan infimum dari S_4 . Petunjuk penyelesaian: Permasalahan: akan ditentukan supremum dan infimum S_4 . Penyelesaian: Tentukan batas bawah dan batas atas himpunan S_4 , kemudian tentukan **batas atas terkecil dan batas bawah** terbesarnya. D. Sifat Archimedes pada \mathbb{R} Perhatikan bilangan asli \mathbb{N} . Bilangan asli ini terbatas dibawah oleh 1 , **tetapi tidak terbatas di atas** oleh \mathbb{R} . Ini berarti bahwa jika diberikan sebarang bilangan real x , **maka terdapat $n \in \mathbb{N}$ sehingga $x < n$** . Teorema 1.4.1 (Teorema Archimedes) **Jika $x \in \mathbb{R}$ maka terdapat bilangan asli $n \in \mathbb{N}$ sehingga $x < n$** . Bukti: Ambil sebarang $x \in \mathbb{R}$. Andaikan tidak ada $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $x < n$, maka $n \leq x$, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Dengan kata lain, x merupakan batas atas \mathbb{N} . Jadi $\mathbb{N} \leq x$, dan \mathbb{N} terbatas ke atas. Menurut aksioma supremum, maka $\sup \mathbb{N}$ ada, tulis $u = \sup \mathbb{N}$. Karena $u - 1 < u$, maka menurut Teorema 1.3.3 terdapat $m \in \mathbb{N}$ sehingga $u - 1 < m$. Tetapi kemudian $u < m + 1$ dengan $(1 + m) \in \mathbb{N}$. Timbul kontradiksi dengan $u = \sup \mathbb{N}$, artinya u bukan batas atas dari \mathbb{N} . Jadi pengandaian salah, yang benar adalah terdapat $n \in \mathbb{N}$ sehingga $x < n$. Akibat 1.4.2 Jika $S := \{1/n, n \in \mathbb{N}\}$, maka $\inf S = 0$. Bukti: Karena S terbatas ke bawah oleh 0 , maka S mempunyai infimum, tulis $w := \inf S$. Jelas bahwa $w \geq 0$. Untuk sebarang $\epsilon > 0$, menggunakan Sifat Archimedes, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga $1/n < \epsilon$. Oleh karena itu $0 \leq w < 1/n < \epsilon$. Akan tetapi karena $\epsilon > 0$ sebarang, maka berdasarkan Teorema 1.2.8 berakibat bahwa $w = 0$. Terbukti bahwa $\inf S = 0$. Akibat 1.4.3 Misalkan y dan z bilangan real positif, maka: a. Terdapat $n \in \mathbb{N}$ sehingga $z < ny$. b. **Terdapat $n \in \mathbb{N}$ sehingga $0 < 1/n < y - z$** . c. Terdapat $n \in \mathbb{N}$ sehingga $n - 1 \leq z < n$. Bukti: a. Sebut $x = y - z > 0$, maka terdapat $n \in \mathbb{N}$ sehingga $x < nx$. Oleh karena itu $z < ny$. b. Dari bukti (a) ambil $z = 1$, maka $1 < ny$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$. Akibatnya $0 < 1/n < y$. c. Sifat Archimedes menjamin bahwa subset $K = \{m \in \mathbb{N} : z < m\}$. Jelas $K \neq \emptyset$. Misalkan n bilangan terkecil dari himpunan ini, maka $n - 1$ bukan anggota himpunan ini, sehingga $n - 1 \leq z < n$. Eksistensi Bilangan Real dan Densitas Bilangan Rasional di \mathbb{R} Salah satu penggunaan Sifat Supremum

adalah dapat digunakan untuk memberikan jaminan eksistensi bilangan-bilangan real. Berikut ini akan ditunjukkan bahwa [ada bilangan real](#) positif [x sedemikian hingga](#) $x^2 = 2$. Teorema 1.4.4 [Ada bilangan real](#) positif [x sedemikian hingga](#) $x^2 = 2$. Bukti: Dibentuk himpunan $S = \{s \in \mathbb{R} : s^2 < 2\}$. Jelas bahwa $S \neq \emptyset$ sebab $0 \in S$ dan $1 \in S$. S terbatas ke atas dengan salah satu batas atasnya adalah 2. Jika $t \in S$, maka $t^2 < 2$. Jadi, $t = 2t$. Menggunakan Aksioma Supremum, $S \subset \mathbb{R}$, $S \neq \emptyset$, dan S terbatas ke atas, maka S mempunyai supremum. Namakan $x = \sup S$, dengan $x \in \mathbb{R}$. Akan dibuktikan bahwa $x^2 = 2$. Andaikan $x^2 < 2$, maka $x^2 < 2$ atau $x^2 > 2$. Kemungkinan I: Untuk $x^2 < 2$. Karena $x^2 < 2$, maka $2 - x^2 > 0$. Karena $m^2 \geq 1m$ maka, $(x + 1)^2 = x^2 + mx + m^2 \geq x^2 + m(2x + 1) \geq 1 + m$. Karena $2 - x^2 > 0$ dan $2x + 1 > 0$ maka $2x + 1 > 0$. Menurut sifat $2 - x^2$ akibat Archimedes, dapat ditemukan $n \in \mathbb{N}$ sehingga, $\frac{1}{2-x^2} m < 2x+1$. Akibatnya, $1(2x + 1) < 2 - x^2 m$ dan $(x + 1)^2 < x^2 + 1(2x + 1) = x^2 + 2 - x^2 = 2$. Diperoleh bahwa, $(x + 1)^2 < 2$, yang berarti bahwa $x + 1 \in S$. Kontradiksi dengan $x = \sup S$. Oleh karena itu tidak mungkin $x^2 < 2$. Kemungkinan II: $x^2 > 2$. Karena $x^2 > 2$ maka $x^2 - 2 > 0$, Perhatikan bahwa: $(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1 > x^2 - 2x + 1$. Karena $x^2 - 2 > 0$ dan $2x > 0$, maka dipilih $m \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga: $m > \frac{x^2 - 2}{2x - 2}$ atau $2x < x^2 - 2m$ akibatnya, $(x - 1)^2 > x^2 - 2x + 1 > x^2 - (x^2 - 2) = 2$. Diperoleh bahwa $(x - 1)^2 > 2$. Berarti $x - 1 \notin S$, yaitu $x - 1$ batas atas. Kontradiksi dengan $x = \sup S$. Oleh karena itu tidak mungkin $x^2 > 2$. Jadi pengandaian salah, seharusnya $x^2 = 2$. Teorema 1.4.5 (The Density Theorem) [Jika x dan y bilangan real dengan x < y maka](#) terdapat [bilangan](#) rasional [r sehingga x < r < y](#). Bukti: Tanpa mengurangi keumuman (without loss of generality), diambil $x > 0$. Menurut sifat Archimedes, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sehingga $n > \frac{1}{y-x}$, jadi $ny - nx > 1$. Karena $nx > 0$, maka menurut Akibat 1.4.3, terdapat $m \in \mathbb{N}$ sehingga $m - 1 < nx < m$, m ini juga memenuhi $m < ny$ (karena $m - nx < 1 < ny - nx$ atau $m < ny$). Jadi kita peroleh $nx < m < ny$ atau $x < \frac{m}{n} < y$. Pilih $r = \frac{m}{n}$, jadi m bilangan rasional dan memenuhi $x < r < y$. Soal Latihan 1. [Jika x, y \in \mathbb{R}](#) dengan $x < y$ buktikan bahwa ada [bilangan](#) irrasional [r sedemikian sehingga x < r < y](#)! Petunjuk [bukti](#): Permasalahan: akan ditunjukkan bahwa $x < r < y$ Diketahui $x, y \in \mathbb{R}$ dengan $x < y$. Dengan menggunakan Teorema Densitas, dan sifat bilangan rasional. Akibatnya $x < q < y$ dan q^2 merupakan bilangan irrasional. 2. Jika $S := \{1 : i \in \mathbb{K}\}$, buktikan $\inf S = 0$! Petunjuk [bukti](#): Permasalahan: Akan ditunjukkan bahwa $\inf S = 0$. Karena $S \neq \emptyset$ terbatas kebawah oleh 0, maka S mempunyai infimum. Di tulis $w := \inf S$. Jelas $w \geq 0$. Dengan menggunakan sifat Archimedes dan Teorema 1.2.8 diperoleh bahwa $\inf S = 0$. 3. Jika $y > 0$, [terdapat ny \in \mathbb{N}](#), buktikan [ny - 1 < y < ny](#)! Petunjuk [bukti](#): Permasalahan: akan ditunjukkan $ny - 1 < y < ny$. Dengan menggunakan sifat Archimedes dan sifat urutan. E_y mempunyai elemen yang paling kecil dinotasikan dengan ny . Oleh karena itu $ny - 1$ bukan elemen E_y . Akibatnya $ny - 1 < y < ny$. BAB II BARISAN BILANGAN REAL Pada bab ini dibahas mengenai pengertian barisan bilangan real. Selanjutnya, dibahas tentang limit dan konvergensi dari suatu barisan. Di antaranya adalah Teorema Konvergen Monoton, prinsip barisan bagian, dan Kriteria Cauchy untuk barisan yang konvergen. A. Barisan dan Limit Barisan Barisan (sequence) pada himpunan S adalah suatu fungsi dengan domain \mathbb{N} dan mempunyai range dalam S . Pada subbab ini akan dibahas mengenai barisan di \mathbb{R} dan konvergensi dari suatu barisan [Definisi 2.1.1. Barisan bilangan real adalah](#) suatu [fungsi](#) yang didefinisikan pada himpunan \mathbb{N} dengan range dalam \mathbb{R} . Dengan kata lain, barisan dalam \mathbb{R} mengawankan setiap [bilangan asli n = 1, 2, 3, ...](#) kepada suatu bilangan real. [Jika X : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}](#) merupakan [barisan, maka](#) biasanya dituliskan dengan nilai dari X pada n dengan notasi x_n . Barisan sering [dinotasikan dengan X](#) atau (x_n) atau $(x_n : n \in \mathbb{N})$ atau $\{x_n\}$ atau $\{x_n\}_n$. 1. Apabila diketahui suatu barisan Y , artinya $Y = (y_k)$. Contoh 2.1.1 1. Barisan (x_n) dengan $x_n = (-1)^n$ adalah barisan $-1, 1, -1, 1, -1, 1, \dots, (-1)^n, \dots$ 2. Barisan (x_n) dengan $x_n = 2m$, $(2m, i \in \mathbb{N}) = 12, 14, 18, \dots, 2m, 1, 1, 1, \dots$ 3. Barisan konstan (kn) , dengan $kn, = 2$ adalah $2, 2, 2, 2, \dots$ 4. Barisan

$() = 1, 2, 3, \dots, m, m+1, 234, m+1$ Definisi 2.1.2 Diberikan barisan bilangan real (x_n) dan (y_n) , dan $?$ \mathbb{R} . Maka dapat didefinisikan: 1. $(x_n) ? (y_n) = (x_n ? y_n)$, $n ? \mathbb{N}$ 2. $?$ $(x_n) = (? x_n)$, $n ? \mathbb{N}$ 3. $(x_n) \cdot (y_n) = (x_n \cdot y_n)$, $n ? \mathbb{N}$ 4. $(x_m) = (x_m)$, $y_n ? 0$, $n ? \mathbb{N}$ $(x_m) x_m$ Definisi di atas menyatakan bahwa suku-suku barisan baru yang merupakan jumlah dua barisan lainnya dibentuk dengan menjumlahkan suku-suku yang berpadanan pada kedua barisan lainnya. Untuk barisan-barisan selisih, hasil kali dan hasil bagi dua barisan, dikerjakan dengan cara yang serupa. Sebagai contoh, jika $X = (x_n) = (1, 12, 13, 14, \dots)$ dan $Y = (y_n) = (0, 12, 23, 34, \dots)$ maka $X + Y = (1, 1, 1, 1, \dots)$, $X - Y = (1, 0, -1, -3, 2, 4, \dots)$. Contoh lain, Misalkan X, Y suatu barisan $X = (3, 6, 9, 12, \dots, 3n, \dots)$ $Y = (1, 1, 1, 1, \dots, , \dots)$ 1 234 m Maka, $X + Y = (4, 13, 28, \dots, 3m^2+1, \dots)$ 2, 3 m $X - Y = (4, 11, 26, \dots, 3m^2-1, \dots)$ 2, 3 m $X \cdot Y = (3, 3, 3, 3, \dots, 3, \dots)$ $2X = (6, 12, 18, 24, \dots, 6n, \dots)$ $X X = (3, 12, 27, 48, \dots, 3n^2, \dots)$ Analisis Real | iii iv | Analisis Real Analisis Real | v vi | Analisis Real [Analisis Real | 1 2](#) | [Analisis Real Analisis Real | 3 4](#) | [Analisis Real Analisis Real | 5 6](#) | Analisis Real Analisis Real | 7 8 | Analisis Real Analisis Real | 9 10 | Analisis Real Analisis Real | 11 12 | Analisis Real Analisis Real | 13 14 | Analisis Real Analisis Real | 15 16 | Analisis Real Analisis Real | 17 18 | Analisis Real Analisis Real | 19 20 | Analisis Real Analisis Real | 21 22 | Analisis Real Analisis Real | 23 24 | Analisis Real Analisis Real | 25 26 | Analisis Real Analisis Real | 27 28 | Analisis Real Analisis Real | 29 30 | Analisis Real