

ANALISIS REAL

ANALISIS REAL

Wahidah Alwi



ANALISIS REAL

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:
Wahidah Alwi

Editor: Erik Santoso

Cetakan Pertama : Desember 2021

Cover: Rusli

Tata Letak : Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2021, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2021 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-5847-51-1

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan khususnya kepada penulis yang selalu diberi kelancaran untuk menyelesaikan penulisan Buku Analisis Real ini.

Dengan keberadaan buku ini, diharapkan dapat membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami konsep-konsep Analisis Real. Buku ini disajikan kepada pembaca yang telah mempelajari kalkulus, teori himpunan, dan barisan elementer.

Matematika Perguruan Tinggi lebih menekankan pada pembentukan pola pikir matematika yaitu logis, kritis, dan tegas. Jadi bukan lagi untuk mengasah kemampuan berhitung semata atau kemampuan menerapkan konsep ke dalam pemecahan masalah. Mahasiswa diharapkan dapat mengasah pola pikirnya melalui ketekunan dalam mempelajari langkah demi langkah berbagai aksioma, definisi, lemma, maupun teorema-teorema yang berkaitan dengan bilangan real.

Analisis real adalah suatu cabang matematika yang merupakan dasar di dalam matematika untuk berfikir formal yaitu berfikir secara deduktif aksiomatik.

Buku ini di tulis berdasarkan pada pengalaman penulis mengajar mata kuliah Analisis Real pada Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, yang kemudian dilengkapi dengan beberapa bab dan tambahan beberapa definisi dan teorema sehingga terbentuk tulisan dalam bentuk buku. Selain itu penulis merasa bahwa buku yang membahas Analisis Real hingga saat ini masih cukup langka, khususnya buku-buku yang berbahasa Indonesia.

Dalam buku ini dibahas konsep-konsep dari Analisis Real yang diharapkan agar pembaca dapat memulai berfikir secara deduktif aksiomatik, dalam mempelajari materi-materi yang lebih abstrak.

Buku ini membahas tentang sistem bilangan real, barisan bilangan real, limit fungsi dan kekontinuan di \mathbb{R} , turunan fungsi, Integral Riemann, topologi diruang cartesius, dan ruang metrik. Selanjutnya buku yang dihasilkan ini digunakan untuk perkuliahan di Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Matematika UIN Alauddin Makassar, karena adanya keterbatasan referensi.

Penulis menyadari bahwa buku edisi sebelumnya masih ada beberapa kekurangan, oleh karena itu buku edisi revisi ini diterbitkan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan pada edisi sebelumnya, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan buku ini dalam edisi yang akan datang.

Akhirnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi, penulis, pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Amiiin.

Makassar, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I SISTEM BILANGAN REAL.....	1
A. Aljabar pada Bilangan Real.....	1
B. Sifat Urutan pada \mathbb{R}	5
1. Ketaksamaan (Inequalities)	11
2. Nilai Mutlak dan Garis Bilangan Real	13
3. Garis Bilangan Real (<i>The Real Line</i>).....	16
C. Kelengkapan pada \mathbb{R}	17
D. Sifat Archimedes pada \mathbb{R}	24
BAB II BARISAN BILANGAN REAL.....	29
A. Barisan dan Limit Barisan.....	29
B. Teorema-teorema Limit.....	38
C. Barisan Monoton.....	45
D. Barisan Bagian	48
E. Barisan Cauchy	55
F. Sifat Barisan Divergen	58
G. Deret Tak Berhingga	60
BAB III LIMIT DAN KEKONTINUAN DI \mathbb{R}	69
A. Limit fungsi di suatu titik	69
B. Perluasan Konsep Limit.....	76
C. Fungsi Kontinu di Suatu titik	80
D. Fungsi Kontinu Pada Interval.....	82
E. Lebih Jauh Tentang Fungsi Kontinu Pada Interval.....	85
F. Kombinasi Fungsi Kontinu	87
G. Kekontinuan Seragam dan Fungsi invers	89

BAB IV TURUNAN FUNGSI	95
A. Pengertian Turunan.....	95
B. Sifat-sifat Aljabar Turunan Fungsi.....	97
C. Turunan fungsi Invers	104
D. Turunan Tingkat Tinggi	110
E. Teorema Nilai Rata-rata.....	112
1. Maksimum dan Minimum Lokal	112
2. Titik Stasioner.....	113
3. Teorema Nilai Rata-rata dan Teorema Taylor.....	114
4. Aplikasi Teorema Nilai Rata-rata.....	116
5. Ketaksamaan	118
6. Sifat Nilai Antara dari Suatu Turunan	120
F. Aturan L'Hopital.....	121
 BAB V INTEGRAL RIEMANN.....	 129
A. Konsep Partisi	129
B. Jumlah Riemann	130
C. Integral Riemann	131
D. Sifat-sifat Dasar Integral Riemann.....	135
E. Keintegralan Fungsi Kontinu dan Fungsi Monoton....	138
F. Teorema Dasar Kalkulus Untuk Integral Riemann	139
G. Teorema Nilai Rata-rata dan Teorema Taylor Untuk Integral.....	143
 BAB VI TOPOLOGI DI RUANG KARTESIUS.....	 147
A. Interval dalam \mathbb{R}	147
B. Himpunan Terbuka	152
C. Himpunan Tertutup.....	156
D. Sekitar (<i>Neighbourhood</i>).....	158
E. Sel-sel Tertumpuk (<i>Nested Cell</i>).....	161
F. Titik Kumpul.....	163
G. Teorema Bolzano-Weierstrass dan Heine-Borel.....	165

H. Himpunan Terhubung	170
BAB VII RUANG METRIK.....	175
A. Pengertian Ruang Metrik	175
B. Limit di Ruang Metrik.....	185
C. Kekontinuan di Ruang Metrik	186
1. Fungsi Kontinu di Ruang Metrik	186
2. Himpunan Buka dan Himpunan Tutup di Ruang Metrik	190
D. Terbatas Total, Lengkap dan Kompak	197
1. Himpunan Terbatas dan Himpunan Terbatas Total 197	
2. Ruang Metrik Lengkap	201
3. Ruang Metrik Kompak.....	203
E. Himpunan-himpunan Khusus dalam Ruang Metrik ..	205
F. Himpunan Terhubung	209
DAFTAR PUSTAKA.....	212
BIOGRAFI PENULIS	213

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jarak antara $a = -1$ dan $b = 1$	16
Gambar 1.2 Persekitaran $V_\varepsilon(a)$	16
Gambar 3.1 $\lim x \rightarrow c f x = L$	69
Gambar 3.2 $\lim x \rightarrow 412x + 1 = 3$	70
Gambar 3.3 Fungsi kontinu di suatu titik.....	81
Gambar 3.4 Grafik fungsi kontinu pada interval buka.....	82
Gambar 3.5 Grafik fungsi kontinu pada interval tutup.....	83
Gambar 3.6 Persekitaran $V_\varepsilon f(c)$	87
Gambar 3.7 Persekitaran $V_\delta f(c)$	88
Gambar 4.1 f mencapai nilai maksimum lokal di c	112

BAB I

SISTEM BILANGAN REAL

Pada bagian ini dibahas tentang aljabar pada bilangan real, sifat urutan pada \mathbb{R} , sifat kelengkapan pada \mathbb{R} , dan sifat Archimedes pada \mathbb{R} .

A. Aljabar pada Bilangan Real

Pada himpunan bilangan real \mathbb{R} terdapat dua operasi biner yang dilambangkan dengan $+$ dan \cdot dan berturut-turut disebut penambahan dan perkalian. Operasi-operasi tersebut mempunyai sifat:

1. Sifat komutatif yaitu $a + b = b + a$, untuk setiap $a, b \in \mathbb{R}$
2. Sifat asosiatif yaitu $(a + b) + c = a + (b + c)$, untuk setiap $a, b, c \in \mathbb{R}$
3. Eksistensi unsur nol. Terdapat unsur nol di \mathbb{R} sehingga $0 + a = a + 0 = a$, untuk setiap $a \in \mathbb{R}$
4. Eksistensi unsur negatif. Untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, terdapat unsur $-a \in \mathbb{R}$ sehingga $a + (-a) = (-a) + a = 0$
5. Sifat komutatif perkalian. $a \cdot b = b \cdot a$, untuk setiap $a, b \in \mathbb{R}$
6. Sifat asosiatif perkalian. $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$, untuk setiap $a, b, c \in \mathbb{R}$
7. Eksistensi unsur satuan di \mathbb{R} . Terdapat unsur 1 di \mathbb{R} yang berbeda dengan nol sehingga $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$
8. Eksistensi unsur kebalikan. Untuk setiap $a \neq 0$ di \mathbb{R} terdapat unsur $\frac{1}{a}$ di \mathbb{R} sehingga $a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1$
9. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ dan $(b + c) \cdot a = (b \cdot a) + (c \cdot a)$ untuk setiap $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Teorema 1.1.1

- a. Jika z dan a unsur di \mathbb{R} sehingga $z + a = a$ maka $z = 0$
b. Jika u dan $b \neq 0$ unsur di \mathbb{R} sehingga $u \cdot b = b$ maka $u = 1$

Bukti:

a. $z + a = a$

$$z + a + (-a) = a + (-a) \quad [\text{Tambahkan } (-a) \text{ pada kedua ruas}]$$

$$z + 0 = 0 \quad [\text{sifat 4}]$$

$$z = 0 \quad [\text{sifat 3}]$$

- b. $u \cdot b = b$, karena $b \neq 0$ maka terdapat $\frac{1}{b}$ di \mathbb{R} , selanjutnya kedua ruas kita kalikan dengan $\frac{1}{b}$ sehingga,

$$(u \cdot b) \cdot \frac{1}{b} = (b \cdot \frac{1}{b})$$

$$u \cdot (b \cdot \frac{1}{b}) = (b \cdot \frac{1}{b}) \quad [\text{sifat 6}]$$

$$u \cdot 1 = 1 \quad [\text{sifat 8}]$$

$$u = 1 \quad [\text{sifat 7}]$$

Teorema 1.1.2

- a. Jika a dan b unsur-unsur di \mathbb{R} sehingga $a + b = 0$, maka $b = -a$
b. Jika $a \neq 0$ dan b unsur-unsur di \mathbb{R} sehingga $a \cdot b = 1$, maka $b = \frac{1}{a}$

Bukti:

a. $a + b = 0$

$$(-a) + (a + b) = (-a) + 0 \quad [\text{Tambahkan } (-a) \text{ pada kedua ruas}]$$

$$(-a + a) + b = -a \quad [\text{sifat 2 dan sifat 3}]$$

$$0 + b = -a \quad [\text{sifat 4}]$$

$$b = -a \quad [\text{sifat 3}]$$

b. $a \cdot b = 1$

Karena $a \neq 0$, maka terdapat $\frac{1}{a}$ di \mathbb{R} , selanjutnya kedua ruas kita kalikan dengan $\frac{1}{a}$ sehingga

$$\frac{1}{a} \cdot (a \cdot b) = \frac{1}{a} \cdot 1$$

$$\left(\frac{1}{a} \cdot a\right) \cdot b = \frac{1}{a}$$

[Sifat 6 dan sifat 7]

$$1 \cdot b = \frac{1}{a}$$

[sifat 8]

$$b = \frac{1}{a}$$

[sifat 7]

Teorema 1.1.3

Jika $a \in \mathbb{R}$, maka

a. $a \cdot 0 = 0$

b. $(-1) \cdot a = -a$

c. $-(-a) = a$

d. $(-1)(-1) = 1$

Bukti:

a. $a + a \cdot 0 = a \cdot 1 + a \cdot 0$
 $= a(1 + 0)$
 $= a \cdot 1$
 $= a$

Selanjutnya:

$$\begin{aligned}(-a) + (a + a \cdot 0) &= (-a) + a \\(-a + a) + a \cdot 0 &= 0 \\0 + a \cdot 0 &= 0\end{aligned}$$

Jadi $a \cdot 0 = 0$

b. $(-1) \cdot a + a = (-1) \cdot a + 1 \cdot a$
 $= (-1 + 1) \cdot a$
 $= 0 \cdot a$
 $= 0$

Jadi $(-1) \cdot a = -a$

c. $-(-a) + (-a) = (-1)(-a) + 1 \cdot (-a)$
 $= (-1 + 1)(-a)$
 $= 0 \cdot (-a)$

$$= 0$$

$$\text{Jadi } -(-a) = a$$

d. Dari bukti (b) ambil $a = -1$ maka diperoleh

$$(-1) \cdot (-1) = -(-1)$$

$$= 1 \text{ (bukti c)}$$

Teorema 1.1.4

Misalkan a, b, c unsur-unsur di \mathbb{R}

a. Jika $a \neq 0$ maka $\frac{1}{a} \neq 0$ dan $\frac{1}{\left(\frac{1}{a}\right)} = a$

b. Jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$ maka $b = c$

c. Jika $a \cdot b = 0$ maka $a = 0$ atau $b = 0$

Bukti teorema di atas sebagai latihan bagi pembaca.

Bilangan rasional dan bilangan irrasional

Unsur di \mathbb{R} yang dapat ditulis sebagai $\frac{a}{b}$ dengan a, b bilangan bulat, $b \neq 0$ disebut **bilangan rasional**. Himpunan bilangan rasional dilambangkan dengan \mathbb{Q} jadi

$$\mathbb{Q} = \left\{x : \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\right\}$$

Akan tetapi, tidak semua elemen \mathbb{R} merupakan elemen \mathbb{Q} , seperti $\sqrt{2}$ yang tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk $\frac{b}{a}$. Elemen \mathbb{R} yang bukan elemen \mathbb{Q} disebut **bilangan irrasional** (*irrational numbers*).

Akan ditunjukkan bahwa tidak terdapat bilangan rasional yang kuadratnya adalah 2. Untuk membuktikannya digunakan istilah genap dan ganjil. Suatu bilangan asli disebut genap apabila bilangan itu mempunyai bentuk $2n$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$, dan disebut ganjil apabila bilangan itu mempunyai bentuk $2n - 1$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$.

Teorema 1.1.5

Tak ada bilangan rasional t sehingga $t^2 = 2$

Bukti:

Andaikan ada $t \in \mathbb{Q}$ sehingga $t^2 = 2$, maka dapat dipilih p, q di \mathbb{Z} sehingga $(\frac{p}{q})^2 = 2$ dan $(p, q) = 1$ karena $p^2 = 2q^2$, maka $p^2 =$ genap. Akibatnya p genap sehingga $p = 2m$ untuk suatu m bilangan bulat sehingga $4m^2 = 2q^2$ atau $q^2 = 2m^2$, yang berarti q^2 genap akibatnya q juga genap. Karena p, q keduanya genap, maka $(p, q) > 1$. Ini bertentangan dengan $(p, q) = 1$. Jadi haruslah tak ada bilangan rasional t sehingga $t^2 = 2$.

B. Sifat Urutan pada \mathbb{R}

Pada himpunan bilangan real \mathbb{R} , terdapat himpunan tak kosong P dari \mathbb{R} yaitu bilangan positif yang memenuhi sifat:

- a. Jika a, b di P maka $a + b$ di P
- b. Jika a, b di P maka ab di P
- c. Jika a di \mathbb{R} maka tepat satu pernyataan berikut dipenuhi : a di P , $a = 0$, dan $-a$ di P . Sifat ini sering dinamakan sifat *trikotomi*.

Definisi 1.2.1

Jika a di P dikatakan bahwa a bilangan real positif dan ditulis $a > 0$. Jika a di P atau 0 , dikatakan bahwa a bilangan nonnegatif dan ditulis $a \geq 0$, jika $-a$ di P dikatakan bahwa a bilangan real negatif dan ditulis $a < 0$, jika $-a$ di P atau 0 , dikatakan bahwa a nonpositif dan ditulis $a \leq 0$.

Definisi 1.2.2

Misalkan a, b unsur-unsur di \mathbb{R}

- Jika $a - b$ di P maka kita tulis $a > b$ atau $b < a$
- Jika $a - b$ di $P \cup \{0\}$ maka kita tulis $a \geq b$ atau $b \leq a$, selanjutnya kita tulis $a < b < c$ yang berarti $a < b$ dan $b < c$.

Teorema 1.2.3

Misalkan a, b, c unsur-unsur di \mathbb{R}

- Jika $a > b$ dan $b > c$ maka $a > c$
- Terdapat tepat satu hubungan $a < b, a = b, a > b$
- Jika $a \geq b$ dan $b \geq a$ maka $a = b$

Bukti:

- Diketahui $a > b$ dan $b > c$, ini berarti $a - b, b - c$ di P . Jadi $(a - b) + (b - c)$ di P atau $a - c$ di P . Dengan kata lain $a > c$
- Dengan sifat trikotomi maka terdapat tepat satu hubungan $a - b$ di $P, a - b = 0$, atau $-(a - b) = b - a$ di P atau $a > b, a = b$ atau $a < b$
- Andaikan $a \neq b$, maka $a - b \neq 0$ yang berarti $a - b$ di P atau $-(a - b) = b - a$ di P . Jadi $a > b$ atau $a < b$. Ini bertentangan dengan hipotesis yaitu $a \geq b$ dan $a \leq b$. Jadi haruslah $a = b$.

Teorema 1.2.4

Jika $a \in \mathbb{R}$ dan $a \neq 0$ maka $a^2 > 0$.

Bukti:

Dengan sifat trikotomi maka $a \in P$ atau $-a \in P$,

jika $a \in P$ maka $a^2 = a \cdot a \in P$

jika $-a \in P$ maka $a^2 = (-a) \cdot (-a) \in P$.

Jadi $a^2 > 0$

Teorema 1.2.5

Misalkan a, b, c, d unsur-unsur di \mathbb{R}

- a. Jika $a > b$ maka $a + c > b + c$
- b. Jika $a > b$ dan $c > d$ maka $a + c > b + d$
- c. Jika $a > b$ dan $c > 0$ maka $ac > bc$
Jika $a > b$ dan $c < 0$ maka $ac < bc$
- d. Jika $a > 0$ maka $\frac{1}{a} > 0$
Jika $a < 0$ maka $\frac{1}{a} < 0$

Bukti sebagai latihan

Teorema 1.2.6

Jika a, b di \mathbb{R} dan $a > b$, maka $a > \frac{1}{2}(a + b) > b$.

Bukti:

Karena $a > b$ maka $2a = a + a > a + b$ dan $a + b > b + b = 2b$.
Jadi $2a > a + b > 2b$.

Selanjutnya karena $2 > 0$ maka $\frac{1}{2} > 0$ dan menurut Teorema 1.2.5.c kita peroleh:

$$a = \frac{1}{2}(2a) > \frac{1}{2}(a + b) > \frac{1}{2}(2b) = b. \text{ Jadi } a > \frac{1}{2}(a + b) > b.$$

Teorema 1.2.7

Jika $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$ maka $a > \frac{1}{2}a > 0$

Bukti diserahkan kepada pembaca sebagai latihan

Teorema 1.2.8

Jika $a \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $0 \leq a < \varepsilon$ untuk setiap $\varepsilon > 0$ maka $a = 0$

Bukti:

Andaikan $a > 0$ maka $a > \frac{a}{2} > 0$. Diambil $\varepsilon_0 = \frac{a}{2}$ (ε_0 adalah bilangan real positif tegas), maka $a > \varepsilon_0 > 0$. Kontradiksi

dengan pernyataan $0 \leq a < \varepsilon$ untuk setiap $\varepsilon > 0$. Jadi pengandaian salah, seharusnya $a = 0$.

Perkalian antar dua bilangan positif hasilnya adalah positif. Akan tetapi, hasil perkalian yang positif belum tentu setiap faktornya positif.

Teorema 1.2.9

Jika $ab > 0$, maka berlaku

- i. $a > 0$ dan $b > 0$, atau
- ii. $a < 0$ dan $b < 0$.

Akibat 1.2.10

Jika $ab < 0$, maka berlaku

- i. $a < 0$ dan $b > 0$, atau
- ii. $a > 0$ dan $b < 0$.

Soal Latihan

1. Jika $a \in \mathbb{R}$ sehingga $a \cdot a = a$ buktikan $a = 0$ atau $a = 1$!
Petunjuk ringkas penyelesaian soal:
Soal di atas boleh dibuktikan salah satunya saja yaitu $a = 0$ atau $a = 1$.
Permasalahan: Akan dibuktikan bahwa, jika $a \in \mathbb{R}$ sehingga $a \cdot a = a$ maka $a = 0$ atau $a = 1$.
Petunjuk:
Anggap $a \neq 0$, dengan menggunakan Sifat 8 dalam aljabar pada bilangan real terbukti bahwa $a \cdot a = a$ maka $a = 1$.
2. Jika $a \in \mathbb{R}$ dan $a \neq 0$ sehingga $ab = ac$ buktikan $b = c$!
Petunjuk ringkas penyelesaian soal:
Permasalahan: Akan dibuktikan bahwa jika $a \in \mathbb{R}$ dan $a \neq 0$ sehingga $ab = ac$ maka $b = c$.
Petunjuk:
Diketahui bahwa $a \neq 0$, maka $\frac{1}{a}$ ada. Dengan mengalikan $\frac{1}{a}$ pada kedua ruas dari $ab = ac$ dan dengan menggunakan sifat 6, sifat 7, dan sifat 8 dalam aljabar pada bilangan real diperoleh $b = c$.
3. Jika $a \in \mathbb{R}$ dan $a \neq 0$ buktikan $a^2 > 0$!
Petunjuk ringkas penyelesaian soal:
Permasalahan: akan dibuktikan bahwa jika $a \in \mathbb{R}$ dan $a \neq 0$ maka $a^2 > 0$.
Petunjuk:
Diketahui $a \in \mathbb{R}$ dan $a \neq 0$, dengan menggunakan sifat urutan (3) yaitu sifat trikotomi maka a di P atau $-a$ di P . Dari sifat ini diperoleh bahwa $a^2 > 0$

4. Jika $a > b$ dan $c > d$ buktikan $a + c > b + d$!
Petunjuk ringkas penyelesaian soal:
Permasalahan: akan dibuktikan bahwa jika $a > b$ dan $c > d$ maka $a + c > b + d$.
Petunjuk:
Diketahui $a > b$ dan $c > d$, berdasarkan definisi 1.2.2 (i) maka $a - b$ di P dan $c - d$ di P. Dengan menggunakan sifat urutan (1) maka terbukti $a + c > b + d$.
5. Jika $a > b$ dan $c > 0$ buktikan $ca > cb$!
Petunjuk ringkas penyelesaian soal:
Permasalahan: akan dibuktikan bahwa jika $a > b$ dan $c > 0$ maka $ca > cb$.
Petunjuk:
Diketahui $a > b$ dan $c > 0$, berdasarkan definisi 1.2.2 (i) maka $a - b$ di P dan c di P. Dengan menggunakan sifat urutan (2) maka terbukti $ca > cb$.
6. Jika $a > b$ dan $c < 0$ buktikan $ca < cb$!
Petunjuk ringkas penyelesaian soal:
Permasalahan: akan dibuktikan bahwa jika $a > b$ dan $c < 0$ maka $ca < cb$.
Petunjuk:
Diketahui $a > b$ dan $c < 0$, berdasarkan definisi 1.2.2 (i) maka $a - b$ di P dan $-c$ di P. Dengan menggunakan sifat urutan (2) maka terbukti $ca < cb$.

1. Ketaksamaan (Inequalities)

Selanjutnya, akan ditunjukkan bagaimana sifat urutan dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu ketaksamaan. Perhatikan contoh dibawah ini.

Contoh 1.2.1

- a. Tentukan himpunan A dari bilangan real x sedemikian sehingga $2x + 3 \leq 6$.

Jawab:

Diketahui $x \in A$ dan $2x + 3 \leq 6$, maka

$$2x + 3 \leq 6 \Leftrightarrow 2x \leq 3 \Leftrightarrow x \leq \frac{3}{2}$$

Jadi $A = \{x \in \mathbb{R} : x \leq \frac{3}{2}\}$

- b. Diberikan $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + x > 2\}$. Tentukan bentuk lain dari B.

Jawab:

Diketahui $x \in B$ dan $x^2 + x > 2$ atau $x^2 + x - 2 > 0$ atau $(x - 1)(x + 2) > 0$. Sehingga diperoleh bahwa

1) $x - 1 > 0$ dan $x + 2 > 0$ diperoleh $x > 1$ dan $x > -2$ yang berarti $x > 1$

2) $x - 1 < 0$ dan $x + 2 < 0$ diperoleh $x < 1$ dan $x < -2$ yang berarti $x < -2$

Jadi himpunannya adalah $B = \{x \in \mathbb{R} : x > 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x < -2\}$

Teorema 1.2.11

Jika $a \geq 0$ dan $b \geq 0$, maka

a. $a < b \Leftrightarrow a^2 < b^2 \Leftrightarrow \sqrt{a} < \sqrt{b}$

b. $a \leq b \Leftrightarrow a^2 \leq b^2 \Leftrightarrow \sqrt{a} \leq \sqrt{b}$

Teorema 1.2.12 Ketaksamaan Bernoulli

Jika $x > -1$ maka $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$

Bukti:

Akan dibuktikan menggunakan induksi matematika.

Untuk $n = 1$, maka

$$(1 + x)^1 \geq 1 + 1 \cdot x \Leftrightarrow 1 + x \geq 1 + x \text{ (pernyataan benar)}$$

Misalkan benar untuk $n = k$, yaitu $(1 + x)^k \geq 1 + kx$. Akan dibuktikan benar untuk $n = k + 1$, yaitu:

$$\begin{aligned} (1 + x)^{k+1} &= (1 + x)^k (1 + x) \geq (1 + kx) (1 + x) \\ &= 1 + kx + x + kx^2 \\ &= 1 + (k + 1)x + kx^2 \end{aligned}$$

Karena $kx^2 > 0$, maka $(1 + x)^{k+1} \geq 1 + (k + 1)x$, yang berarti benar untuk $n = k + 1$. Jadi, terbukti bahwa $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ untuk semua $n \in N$

Teorema 1.2.13 Ketaksamaan Cauchy

Jika $n \in N$ dan $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in R$, maka

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2) (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$$

Atau

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

Selanjutnya, jika tidak semua $b_i = 0$ maka

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

Jika dan hanya jika terdapat $s \in R$ sedemikian hingga $a_1 = sb_1$, $a_2 = sb_2, \dots, a_n = sb_n$.

Bukti sebagai latihan.

2. Nilai Mutlak dan Garis Bilangan Real

Dari sifat trikotomi, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika $a \in R$ dan $a \neq 0$, maka a atau $-a$ merupakan bilangan real positif. Nilai mutlak dari $a \neq 0$ didefinisikan sebagai nilai positif dari dua bilangan tersebut.

Definisi 1.2.14

Nilai mutlak (absolute value) dari suatu bilangan real a , dinotasikan dengan $|a|$, didefinisikan sebagai

$$|a| := \begin{cases} a, & \text{jika } a > 0 \\ 0, & \text{jika } a = 0 \\ -a, & \text{jika } a < 0 \end{cases}$$

Sebagai contoh, $|3| = 3$ dan $|-9| = 9$. Dapat dilihat dari definisi di atas bahwa $|a| \geq 0$ untuk semua $a \in R$, dan bahwa $|a| = 0$ jika dan hanya jika $a = 0$.

Juga bahwa $|-a| = a$ untuk semua $a \in R$. Berikut ini diberikan beberapa sifat nilai mutlak.

Teorema 1.2.15

- (a) $|ab| = |a| |b|$ untuk semua $a \in R$.
- (b) $|a|^2 = a^2$ untuk semua $a \in R$.
- (c) Jika $c \geq 0$, maka $|a| \leq c$ jika dan hanya jika $-c \leq a \leq c$.
- (d) $-|a| \leq a \leq |a|$ untuk semua $a \in R$.

Bukti:

- (a) Jika $a = b = 0$, maka terbukti. Jika $a > 0$ dan $b > 0$, maka $ab > 0$, sehingga $|ab| = ab = |a||b|$. Jika $a > 0$ dan $b < 0$, maka $ab < 0$, sehingga $|ab| = -ab = a(-b) = |a||b|$.
- (b) Karena $a^2 \geq 0$, maka $a^2 = |a^2| = |aa| = |a||a| = |a^2|$.

- (c) Jika $|a| \leq c$, maka diperoleh $a \leq c$ yang berarti $-c \leq a \leq c$. Sebaliknya, jika $-c \leq a \leq c$, maka diperoleh $a \leq c$ dan $-a \leq c$. Jadi, $|a| \leq c$.
- (d) Gunakan langkah yang sama seperti pada (c) dengan mengambil $c = |a|$

Berikut ini diberikan sebuah teorema yang disebut dengan Ketaksamaan Segitiga (*Triangel Inequality*).

Teorema 1.2.16 (Ketaksamaan Segitiga)

Jika $a, b \in R$, maka $|a + b| \leq |a| + |b|$

Bukti:

Dari Teorema 1.2.15 (d), diketahui $-|a| \leq a \leq |a|$ dan $-|b| \leq b \leq |b|$. Dengan menjumlahkan kedua persamaan diperoleh

$$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|.$$

Menggunakan Teorema 1.2.15 (c) diperoleh bahwa $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Akibat 1.2.17

Jika $a, b \in R$, maka

- a. $||a| - |b|| \leq |a - b|$
- b. $|a - b| \leq |a| + |b|$

Bukti:

- a. Tulis $a = a - b + b$ dan masukkan ke dalam Ketaksamaan Segitiga. Sehingga $|a| = |(a - b) + b| \leq |a - b| + |b|$. Kurangkan kedua ruas dengan $|b|$, diperoleh $|a| - |b| \leq |a - b|$. Gunakan cara yang sama untuk $b = b - a + a$, diperoleh $-|a - b| \leq |a| - |b|$. Kombinasikan kedua ketaksamaan tersebut, diperoleh

$$-|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|.$$

Menggunakan Teorema 1.2.15 (c) diperoleh bahwa $||a| - |b|| \leq |a - b|$

- b. Gantilah b pada Ketaksamaan Segitiga dengan $-b$, sehingga diperoleh

$$|a - b| \leq |a| + |-b|. \text{ Karena } |-b| = b, \text{ maka diperoleh } |a - b| \leq |a| + |b|.$$

Ketaksamaan Segitiga di atas dapat diperluas sehingga berlaku untuk sebarang bilangan real yang banyaknya berhingga.

Akibat 1.2.18

Jika a_1, a_2, \dots, a_n adalah sebarang bilangan real, maka

$$|a_1 + a_2 + \dots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|.$$

Contoh 1.2.2

Diberikan fungsi f yang didefinisikan dengan $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{2x - 1}$ untuk $x \in [2, 4]$. Tentukan konstanta M sedemikian sehingga $|f(x)| \leq M$, untuk setiap $x \in [2, 4]$.

$$\text{Diketahui } |f(x)| = \frac{2x^2 - 3x + 1}{2x - 1}$$

$$\begin{aligned} |2x^2 - 3x + 1| &\leq |2x^2| - |3x| + |1| \\ &= 2|x^2| + 3|x| + 1 \\ &= 2|4^2| + 3|4| + 1 \\ &= 45 \end{aligned}$$


dan

$$\begin{aligned} |2x - 1| &\geq ||2x| - |1|| \\ &\geq ||2(2)| - |1|| \\ &= 3 \end{aligned}$$

Sehingga $|f(x)| = \frac{2x^2 - 3x + 1}{2x - 1} \leq \frac{45}{3}$. Jadi, dengan mengambil $M = \frac{45}{3}$, didapat $|f(x)| \leq M$, untuk setiap $x \in [2, 4]$.

3. Garis Bilangan Real (*The Real Line*)

Interpretasi geometri yang dikenal di antaranya garis bilangan real (*real line*). Pada garis real, nilai mutlak $|a|$ dari suatu elemen $a \in \mathbb{R}$ adalah jarak a ke 0. Jarak (distance) antara elemen a dan b di \mathbb{R} adalah $|a - b|$. Perhatikan gambar berikut:




Gambar 1.1 Jarak antara $a = -1$ dan $b = 1$

Definisi 1.2.19

Diberikan $a \in \mathbb{R}$ dan $\varepsilon > 0$. Persekitaran ε (ε neighborhood) dari a didefinisikan sebagai himpunan

$$V_\varepsilon(a) := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \varepsilon\} = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$



Gambar 1.2 Persekitaran $V_\varepsilon(a)$.

Dapat dilihat bahwa $x \in V_\varepsilon(a)$ jika dan hanya jika $a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$.

Teorema 1.2.20

Diberikan $a \in \mathbb{R}$. Jika x berada dalam persekitaran $V_\varepsilon(a)$ untuk setiap $\varepsilon > 0$, maka $x=a$.

Bukti:

Jika x memenuhi $|x-a|<\varepsilon$ untuk setiap $\varepsilon >0$, maka berdasarkan Teorema 1.2.8 diperoleh bahwa $|x-a| = 0$, yang berakibat $x = a$.

C. Kelengkapan pada \mathbb{R}

Definisi 1.3.1

Diberikan subset tak kosong $S \subset \mathbb{R}$

1. Himpunan S dikatakan terbatas ke atas (*bounded above*) jika terdapat suatu bilangan $u \in \mathbb{R}$ sedemikian hingga $s \leq u$ untuk semua $s \in S$. Setiap bilangan u seperti ini disebut dengan batas atas (*upper bound*) dari S
2. Himpunan S dikatakan terbatas ke bawah (*bounded below*) jika terdapat suatu bilangan $w \in \mathbb{R}$ sedemikian hingga $w \leq s$ untuk semua $s \in S$. Setiap bilangan w seperti ini disebut dengan batas bawah (*lower bound*) dari S .
3. Suatu himpunan dikatakan terbatas (*bounded*) jika terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Jika tidak, maka dikatakan tidak terbatas (*unbounded*).

Sebagai contoh, himpunan $S := \{x \in \mathbb{R} : x < 3\}$ ini terbatas ke atas, sebab bilangan 3 dan sebarang bilangan lebih dari 3 merupakan batas atas dari S . Himpunan ini tidak mempunyai batas bawah, jadi himpunan ini tidak terbatas ke bawah. Jadi, S merupakan himpunan yang tidak terbatas

Definisi 1.3.2

Misalkan $S \subseteq \mathbb{R}$

1. Jika S terbatas diatas, maka suatu batas atas dikatakan *suprimum* (batas atas terkecil) dari S jika ia lebih kecil dari setiap batas atas yang lain dari S .
2. Jika S terbatas dibawah, maka suatu batas bawah dikatakan *infimum* (batas bawah terbesar) dari S jika ia lebih besar dari setiap batas bawah yang lain dari S .

Definisi di atas dapat dinyatakan dengan cara lain:

- a. $u \in \mathbb{R}$ suprimum dari $S \subseteq \mathbb{R}$, jika memenuhi dua sifat:

- 1) $s \leq u$ untuk semua $s \in S$
- 2) Jika $s \leq v$ untuk semua $s \in S$ maka $u \leq v$

Ditulis $u = \sup S$.

- b. $t \in \mathbb{R}$ infimum dari $S \subseteq \mathbb{R}$, jika memenuhi dua sifat berikut:

- 1) $s \geq t$ untuk semua $s \in S$
- 2) Jika $s \geq r$ untuk semua $s \in S$ maka $t \geq r$.

Ditulis $t = \inf S$

Jika diberikan suatu himpunan S subset dari \mathbb{R} , maka hanya terdapat satu supremum, atau supremumnya tunggal. Juga dapat ditunjukkan bahwa jika u' adalah sebarang batas atas dari suatu himpunan tak kosong S , maka $\sup S \leq u'$, sebab $\sup S$ merupakan batas atas terkecil dari S . Suatu subset tak kosong $S \subset \mathbb{R}$ mempunyai empat kemungkinan, yaitu

- a. mempunyai supremum dan infimum,
- b. hanya mempunyai supremum,
- c. hanya mempunyai infimum,
- d. tidak mempunyai infimum dan supremum.

Setiap bilangan real $a \in \mathbb{R}$ merupakan batas atas dan sekaligus juga merupakan batas bawah himpunan kosong \emptyset . Jadi, himpunan \emptyset tidak mempunyai supremum dan infimum.

Teorema 1.3.3

Suatu batas atas u dari himpunan tak kosong S di \mathbb{R} adalah supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $s_\varepsilon \in S$ sehingga $u - \varepsilon < s_\varepsilon$.

Bukti:

(\Leftarrow) Misalkan u batas atas sehingga untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat $s_\varepsilon \in S$ sehingga $u - \varepsilon < s_\varepsilon$.

Akan ditunjukkan $u = \sup S$. Misalkan v batas atas dan $v \neq u$.

Andaikan $v < u$, ambil $\varepsilon = u - v > 0$, menurut hipotesis, maka terdapat $s_\varepsilon \in S$ sehingga $u - \varepsilon < s_\varepsilon$. Akibatnya $u - (u - v) = v < s_\varepsilon$. Ini suatu kontradiksi bahwa v batas atas, jadi haruslah $v > u$, yang berarti $u =$ batas atas terkecil dari S . Jadi $u = \sup S$.

(\Rightarrow) Misalkan $u = \sup S$ dan ambil $\varepsilon > 0$ sebarang. Karena $u - \varepsilon < u$, maka $u - \varepsilon$ bukan batas atas dari S . Ini berarti terdapat $s_\varepsilon \in S$ sehingga $u - \varepsilon < s_\varepsilon$.

Contoh-contoh:

1. Jika S_1 hanya mempunyai berhingga unsur, maka dapat ditunjukkan bahwa S_1 mempunyai unsur terbesar u dan unsur terkecil v . Maka $u = \sup S_1$ dan $v = \inf S_1$. Dimana u dan v unsur-unsur di S_1 .
2. Himpunan $S_2 = \{x \in \mathbb{R}: 0 \leq x \leq 2\}$. Himpunan ini mempunyai batas atas terkecil 2 dan batas bawah terbesar 0 yang keduanya terletak pada S_2 .

3. Himpunan $S_3 = \{x \in \mathbb{R}: 0 < x < 2\}$. Himpunan ini mempunyai batas atas terkecil 2 dan batas bawah terbesar 0 tetapi keduanya tidak terletak pada S_3 .

Sifat Lengkap R (Aksioma Suprimum R) 1.3.4

Jika subset tak kosong $S \subset \mathbb{R}$ terbatas ke atas maka supremumnya ada, yaitu terdapat $u \in \mathbb{R}$, sedemikian sehingga $u = \sup S$

Akibat 1.3.5

Jika subset tak kosong $S \subset \mathbb{R}$ terbatas ke bawah, maka infimumnya ada, yaitu terdapat $w \in \mathbb{R}$ sedemikian hingga $w = \inf S$

Bukti:

Misalkan himpunan T terbatas ke bawah, $T \subset \mathbb{R}$. Dibentuk himpunan $S = \{-t : t \in T\}$, maka S terbatas ke atas dan tidak kosong. Menurut Aksioma Supremum, $\sup S$ ada, namakan $u = \sup S$, maka $-u = \inf T$.

Teorema 1.3.6

Diberikan subset tak kosong $S \subset \mathbb{R}$ yang terbatas ke atas dan sebarang $a \in \mathbb{R}$. Didefinisikan himpunan $a + S := \{a + s : s \in S\}$, maka berlaku

$$\sup(a + S) = a + \sup(S)$$

Bukti:

Jika diberikan $u := \sup S$, maka $x \leq u$ untuk semua $x \in S$, sehingga $a + x \leq a + u$. Oleh karena itu, $a + u$ merupakan batas atas dari himpunan $a + S$. Akibatnya $\sup(a + S) \leq a + u$. Selanjutnya, misalkan v adalah sebarang batas atas $a + S$, maka $a + x \leq v$ untuk semua $x \in S$. Akibatnya $x \leq v - a$ untuk semua $x \in S$, sehingga $v - a$ merupakan batas atas S . Oleh karena itu, $u = \sup S \leq v - a$. Karena v adalah sebarang batas

atas $a + S$, maka dengan mengganti v dengan $u = \sup S$, diperoleh $a + u \leq \sup(a + S)$. Di lain pihak diketahui $\sup(a + S) \leq a + u$. Akibatnya terbukti bahwa $\sup(a + S) = a + u = a + \sup S$

Teorema 1.3.7

Diberikan subset tak kosong $S \subset \mathbb{R}$ yang terbatas dan sebarang bilangan real $a > 0$. Didefinisikan himpunan $aS := \{as : s \in S\}$, maka berlaku

$$\inf(aS) = a \inf(S)$$

Bukti:

Tulis $u = \inf aS$ dan $v = \inf S$. Akan dibuktikan bahwa $u = av$. Karena $u = \inf aS$, maka $u \leq as$, untuk setiap $s \in S$. Karena $v = \inf S$, maka $v \leq s$ untuk setiap $s \in S$. Akibatnya $av \leq as$ untuk setiap $s \in S$. Berarti av merupakan batas bawah aS . Karena u batas bawah terbesar aS , maka $av \leq u$. Karena $u \leq as$ untuk setiap $s \in S$, maka diperoleh $\frac{u}{a} \leq s$ untuk setiap $s \in S$ (sebab $a > 0$). Karena $v = \inf S$, maka $\frac{u}{a} \leq v$ yang berakibat $u \leq av$. Di lain pihak diketahui $av \leq u$. Akibatnya $u = av$. Jadi, terbukti bahwa $\inf(aS) = a \inf(S)$.

Teorema 1.3.8

Jika A dan B subset tak kosong \mathbb{R} dan memenuhi $a \leq b$ untuk semua $a \in A$ dan $b \in B$, maka $\sup A \leq \inf B$.

Bukti:

Diambil sebarang $b \in B$, maka $a \leq b$ untuk semua $a \in A$. Artinya bahwa b merupakan batas atas A , sehingga $\sup A \leq b$. Selanjutnya, karena berlaku untuk semua $b \in B$, maka $\sup A$ merupakan batas bawah B . Akibatnya diperoleh bahwa $\sup A \leq \inf B$.

Soal Latihan

1. Misalkan $S_1 = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$. Tunjukkan bahwa himpunan S_1 mempunyai batas bawah tetapi tidak mempunyai batas atas. Tunjukkan $\inf S_1$!

Petunjuk bukti:

Karena $x \geq 0$, untuk setiap $x \in S_1$, maka menurut definisi 0 adalah salah satu batas bawah dari S_1 .

Permasalahan: Akan ditunjukkan bahwa $0 = \inf S_1$.

Misalkan t sebarang batas bawah S_1 , akan ditunjukkan $t \leq 0$.

Andaikan $t > 0$, karena $0 \in S_1$ berarti t bukan batas bawah S_1 . Kontradiksi dengan t batas bawah S_1 .

Pengandaian $t > 0$ salah.

Jadi $t \leq 0$. 0 adalah salah satunya batas bawah dari S_1 , t sebarang batas bawah S_1 sehingga $t \leq 0$ maka menurut definisi $0 = \inf S_1$.

2. Misalkan $S_2 = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$. Apakah S_2 memiliki batas bawah? Tunjukkan pernyataan saudara

Petunjuk Bukti:

Karena $x > 0$, untuk setiap $x \in S_2$.

Permasalahan: akan dibuktikan bahwa $0 = \inf S_2$.

Andaikan 0 bukan batas bawah dari S_2 berarti terdapat $s \in S_2$ sehingga $s < 0$.

$s < 0$ maka $s \notin S_2$. Kontradiksi dengan $s \in S_2$.

Jadi pengandaian 0 bukan batas bawah dari S_2 adalah salah. Jadi 0 batas bawah dari S_2 .

3. Misalkan $S_3 = \{1 - (-1)^n/n : n \in \mathbb{N}\}$. Temukan $\inf S_3$ dan $\sup S_3$.

Petunjuk penyelesaian:

Permasalahan: akan ditentukan $\inf S_3$ dan $\sup S_3$.

Penyelesaian:

Tentukan anggota dari himpunan S_3 , kemudian tentukan $\inf S_3$ dan $\sup S_3$.

4. Misalkan $S_4 = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x < 5\}$. Tentukan supremum dan infimum dari S_4 .

Petunjuk penyelesaian:

Permasalahan: akan ditentukan supremum dan infimum S_4 .

Penyelesaian:

Tentukan batas bawah dan batas atas himpunan S_4 , kemudian tentukan batas atas terkecil dan batas bawah terbesarnya.

D. Sifat Archimedes pada R

Perhatikan bilangan asli N . Bilangan asli ini terbatas dibawah oleh 1, tetapi tidak terbatas di atas oleh R . Ini berarti bahwa jika diberikan sebarang bilangan real x , maka terdapat $n \in N$ sehingga $x < n$.

Teorema 1.4.1 (Teorema Archimedes)

Jika $x \in R$ maka terdapat bilangan asli $n \in N$ sehingga $x < n$.

Bukti:

Ambil sebarang $x \in R$. Andaikan tidak ada $n \in N$ sedemikian sehingga $x < n$, maka $n \leq x$, untuk setiap $n \in N$. Dengan kata lain, x merupakan batas atas N . Jadi $N \subseteq R$, $N \neq \emptyset$, dan N terbatas ke atas. Menurut aksioma supremum, maka $\sup N$ ada, tulis $u = \sup N$. Karena $u - 1 < u$, maka menurut Teorema 1.3.3 terdapat $m \in N$ sehingga $u - 1 < m$. Tetapi kemudian $u < m + 1$ dengan $(m + 1) \in N$. Timbul kontradiksi dengan $u = \sup N$, artinya u bukan batas atas dari N . Jadi pengandaian salah, yang benar adalah terdapat $n \in N$ sehingga $x < n$.

Akibat 1.4.2

Jika $S := \left\{ \frac{1}{n}, n \in N \right\}$, maka $\inf S = 0$

Bukti:

Karena $S \neq \emptyset$ terbatas ke bawah oleh 0, maka S mempunyai infimum, tulis $w := \inf S$. Jelas bahwa $w \geq 0$. Untuk sebarang $\varepsilon > 0$, menggunakan Sifat Archimedes, terdapat $n \in N$ sedemikian hingga $\frac{1}{\varepsilon} < n$ akibatnya $\frac{1}{n} < \varepsilon$. Oleh karena itu $0 \leq w < \frac{1}{n} < \varepsilon$. Akan tetapi karena $\varepsilon > 0$ sebarang,

maka berdasarkan Teorema 1.2.8 berakibat bahwa $w = 0$.
Terbukti bahwa $\inf S = 0$.

Akibat 1.4.3

Misalkan y dan z bilangan real positif, maka :

- a. Terdapat $n \in \mathbb{N}$ sehingga $z < ny$
- b. Terdapat $n \in \mathbb{N}$ sehingga $0 < 1/n < y$
- c. Terdapat $n \in \mathbb{N}$ sehingga $n - 1 \leq z < n$

Bukti:

- a. Sebut $x = \frac{z}{y} > 0$, maka terdapat $n \in \mathbb{N}$ sehingga $\frac{z}{y} = x < n$. Oleh karena itu $z < ny$.
- b. Dari bukti (a) ambil $z = 1$, maka $1 < ny$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$. Akibatnya $\frac{1}{n} < y$. Jadi $0 < \frac{1}{n} < y$
- c. Sifat Archimedes menjamin bahwa subset $K = \{m \in \mathbb{N} : z < m\}$. Jelas $K \neq \emptyset$. Misalkan n bilangan terkecil dari himpunan ini, maka $n - 1$ bukan anggota himpunan ini, sehingga $n - 1 \leq z < n$.

Eksistensi Bilangan Real dan Densitas Bilangan Rasional di \mathbb{R}

Salah satu penggunaan Sifat Supremum adalah dapat digunakan untuk memberikan jaminan eksistensi bilangan-bilangan real. Berikut ini akan ditunjukkan bahwa ada bilangan real positif x sedemikian hingga $x^2 = 2$.

Teorema 1.4.4

Ada bilangan real positif x sedemikian hingga $x^2 = 2$.

Bukti:

Dibentuk himpunan $S = \{s \in \mathbb{R} : s \geq 0 \text{ dan } s^2 < 2\}$. Jelas bahwa $S \neq \emptyset$ sebab $0 \in S$ dan $1 \in S$. S terbatas ke atas dengan

salah satu batas atasnya adalah 2. Jika $t \geq 2$, maka $t^2 \geq 4$. Jadi, $t = 2 \notin S$. Menggunakan Aksioma Supremum, $S \subset \mathbb{R}$, $S \neq \emptyset$, dan S terbatas ke atas, maka S mempunyai supremum. Namakan $x = \sup S$, dengan $x \in \mathbb{R}$. Akan dibuktikan bahwa $x^2 = 2$. Andaikan $x^2 \neq 2$, maka $x^2 < 2$ atau $x^2 > 2$.

Kemungkinan I: Untuk $x^2 < 2$.

Karena $x^2 < 2$, maka $2 - x^2 > 0$. Karena $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n}$ maka,

$$\left(x + \frac{1}{n}\right)^2 = x^2 + \frac{2}{n}x + \frac{1}{n^2} \leq x^2 + \frac{1}{n}(2x + 1)$$

Karena $2 - x^2 > 0$ dan $2x + 1 > 0$ maka $\frac{2 - x^2}{2x + 1} > 0$. Menurut sifat akibat Archimedes, dapat ditemukan $n \in \mathbb{N}$ sehingga,

$$\frac{1}{n} < \frac{2 - x^2}{2x + 1}$$

Akibatnya,

$$\frac{1}{n}(2x + 1) < 2 - x^2$$

dan

$$\left(x + \frac{1}{n}\right)^2 < x^2 + \frac{1}{n}(2x + 1) = x^2 + 2 - x^2 = 2$$

Diperoleh bahwa, $\left(x + \frac{1}{n}\right)^2 < 2$, yang berarti bahwa $x + \frac{1}{n} \in S$. Kontradiksi dengan $x = \sup S$. Oleh karena itu tidak mungkin $x^2 < 2$.

Kemungkinan II: $x^2 > 2$

Karena $x^2 > 2$ maka $x^2 - 2 > 0$, Perhatikan bahwa:

$$\left(x - \frac{1}{m}\right)^2 = x^2 - \frac{2}{m}x + \frac{1}{m^2} > x^2 - \frac{2}{m}x$$

Karena $x^2 - 2 > 0$ dan $2x > 0$, maka dipilih $m \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga:

$$m > \frac{2x}{x^2 - 2} \text{ atau } \frac{2x}{m} < x^2 - 2$$

akibatnya,

$$\left(x - \frac{1}{m}\right)^2 > x^2 - \frac{2}{m}x > x^2 - (x^2 - 2) = 2$$

Diperoleh bahwa $\left(x - \frac{1}{m}\right)^2 > 2$. Berarti $x - \frac{1}{m} \notin S$, yaitu $x - \frac{1}{m}$ batas atas. Kontradiksi dengan $x = \sup S$. Oleh karena itu tidak mungkin $x^2 > 2$. Jadi pengandaian salah, seharusnya $x^2 = 2$.

Teorema 1.4.5 (The Density Theorem)

Jika x dan y bilangan real dengan $x < y$ maka terdapat bilangan rasional r sehingga $x < r < y$.

Bukti:

Tanpa mengurangi keumuman (*without loss of generality*), diambil $x > 0$. Menurut sifat Archimedes, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sehingga $n > \frac{1}{y-x}$, jadi $ny - nx > 1$.

Karena $nx > 0$, maka menurut Akibat 1.4.3, terdapat $m \in \mathbb{N}$ sehingga $m - 1 \leq nx \leq m$, m ini juga memenuhi $m < ny$ (karena $m - nx \leq 1 < ny - nx$ atau $m < ny$).

Jadi kita peroleh $nx < m < ny$ atau $x < \frac{m}{n} < y$. Pilih $r = \frac{m}{n}$, jadi r bilangan rasional dan memenuhi $x < r < y$.

Soal Latihan

1. Jika $x, y \in \mathbb{R}$ dengan $x < y$ buktikan bahwa ada bilangan irrasional r sedemikian sehingga $x < r < y$!

Petunjuk bukti:

Permasalahan: akan ditunjukkan bahwa $x < r < y$

Diketahui $x, y \in \mathbb{R}$ dengan $x < y$.

Dengan menggunakan Teorema Densitas, dan sifat bilangan rasional. Akibatnya $x < q\sqrt{2} < y$ dan $q\sqrt{2}$ merupakan bilangan irrasional.

2. Jika $S := \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$, buktikan $\inf S = 0$!

Petunjuk bukti:

Permasalahan: Akan ditunjukkan bahwa $\inf S = 0$.

Karena $S \neq \emptyset$ terbatas kebawah oleh 0, maka S mempunyai infimum. Di tulis $w := \inf S$. Jelas $w \geq 0$. Dengan menggunakan sifat Archimedes dan Teorema 1.2.8 diperoleh bahwa $\inf S = 0$.

3. Jika $y > 0$, terdapat $n_y \in \mathbb{N}$, buktikan $n_y - 1 < y < n_y$!

Petunjuk bukti:

Permasalahan: akan ditunjukkan $n_y - 1 < y < n_y$.

Dengan menggunakan sifat Archimedes dan sifat urutan. E_y mempunyai elemen yang paling kecil dinotasikan dengan n_y . Oleh karena itu $n_y - 1$ bukan elemen E_y . Akibatnya $n_y - 1 < y < n_y$.

BAB II

BARISAN BILANGAN REAL

Pada bab ini dibahas mengenai pengertian barisan bilangan real. Selanjutnya, dibahas tentang limit dan konvergensi dari suatu barisan. Di antaranya adalah Teorema Konvergen Monoton, prinsip barisan bagian, dan Kriteria Cauchy untuk barisan yang konvergen.

A. Barisan dan Limit Barisan

Barisan (*sequence*) pada himpunan S adalah suatu fungsi dengan domain \mathbb{N} dan mempunyai range dalam S . Pada subbab ini akan dibahas mengenai barisan di \mathbb{R} dan konvergensi dari suatu barisan

Definisi 2.1.1.

Barisan bilangan real adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada himpunan \mathbb{N} dengan range dalam \mathbb{R} .

Dengan kata lain, barisan dalam \mathbb{R} mengawankan setiap bilangan asli $n = 1, 2, 3, \dots$ kepada suatu bilangan real. Jika $X : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan barisan, maka biasanya dituliskan dengan nilai dari X pada n dengan notasi x_n . Barisan sering dinotasikan dengan X atau (x_n) atau $(x_n : n \in \mathbb{N})$ atau $\{x_n\}$ atau $\{x_n\}_{n \geq 1}$. Apabila diketahui suatu barisan Y , artinya $Y = (y_k)$.

Contoh 2.1.1

1. Barisan (x_n) dengan $x_n = (-1)^n$ adalah barisan $-1, 1, -1, 1, -1, 1, \dots, (-1)^n, \dots$
2. Barisan (x_n) dengan $x_n = \frac{1}{2^n}, \left(\frac{1}{2^n}, n \in \mathbb{N}\right) = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots$

3. Barisan konstan (k_n) , dengan $k_n = 2$ adalah $2, 2, 2, 2, \dots$
4. Barisan $\left(\frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$

Definisi 2.1.2

Diberikan barisan bilangan real (x_n) dan (y_n) , dan $\alpha \in \mathbb{R}$. Maka dapat didefinisikan:

1. $(x_n) \pm (y_n) = (x_n \pm y_n), n \in \mathbb{N}$
2. $\alpha (x_n) = (\alpha x_n), n \in \mathbb{N}$
3. $(x_n) \cdot (y_n) = (x_n \cdot y_n), n \in \mathbb{N}$
4. $\frac{(x_n)}{(y_n)} = \left(\frac{x_n}{y_n}\right), y_n \neq 0, n \in \mathbb{N}$

Definisi di atas menyatakan bahwa suku-suku barisan baru yang merupakan jumlah dua barisan lainnya dibentuk dengan menjumlahkan suku-suku yang berpadanan pada kedua barisan lainnya. Untuk barisan-barisan selisih, hasil kali dan hasil bagi dua barisan, dikerjakan dengan cara yang serupa. Sebagai contoh, jika $X = (x_n) = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots)$ dan $Y = (y_n) = (0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots)$ maka $X + Y = (1, 1, 1, 1, \dots)$, $X - Y = (1, 0, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{4}, \dots)$. Contoh lain, Misalkan X, Y suatu barisan

$$X = (3, 6, 9, 12, \dots, 3n, \dots)$$

$$Y = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots)$$

Maka,

$$X + Y = (4, \frac{13}{2}, \frac{28}{3}, \dots, \frac{3n^2+1}{n}, \dots)$$

$$X - Y = (4, \frac{11}{2}, \frac{26}{3}, \dots, \frac{3n^2-1}{n}, \dots)$$

$$X \cdot Y = (3, 3, 3, 3, \dots, 3, \dots)$$

$$2X = (6, 12, 18, 24, \dots, 6n, \dots)$$

$$\frac{X}{Y} = (3, 12, 27, 48, \dots, 3n^2, \dots)$$

Definisi 2.1.3 (Limit Barisan)

Diketahui (x_n) barisan bilangan real. Suatu bilangan real x dikatakan **limit** barisan (x_n) jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $K(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dengan $n > K(\varepsilon)$ berlaku $|x_n - x| < \varepsilon$.

Jika x adalah limit suatu barisan (x_n) , maka dikatakan (x_n) **konvergen** ke x , atau (x_n) mempunyai limit x . Dalam hal ini ditulis $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = x$ atau $\lim (x_n) = x$ atau $x_n \rightarrow x$. Jika (x_n) tidak konvergen, maka (x_n) dikatakan **divergen**.

Teorema 2.1.4

Jika barisan (x_n) konvergen, maka (x_n) memiliki paling banyak satu limit (limitnya tunggal).

Bukti:

Andaikan $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = x'$ dan $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = x''$ dengan $x' \neq x''$.

Maka untuk sebarang $\varepsilon > 0$ terdapat K' sedemikian sehingga $|x_n - x'| < \varepsilon/2$ untuk setiap $n \geq K'$, dan terdapat K'' sedemikian sehingga $|x_n - x''| < \varepsilon/2$ untuk setiap $n \geq K''$. Dipilih $K = \max\{K', K''\}$. Menggunakan ketaksamaan segitiga, maka untuk $n \geq K$ diperoleh,

$$\begin{aligned} |x' - x''| &= |x' - x_n + x_n - x''| \\ &= |x' - x_n| + |x_n - x''| \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon \end{aligned}$$

Karena berlaku untuk setiap $\varepsilon > 0$, maka $x' - x'' = 0$ berarti $x' = x''$. Kontradiksi dengan pengandaian. Jadi terbukti limitnya tunggal.

Teorema 2.1.5

Jika (x_n) barisan bilangan real dan $x \in \mathbb{R}$, maka empat pernyataan berikut *ekuivalen*.

1. Barisan (x_n) konvergen ke x
2. Untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $K \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \geq K$ berlaku $|x_n - x| < \varepsilon$
3. Untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $K \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \geq K$ berlaku $x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon$
4. Untuk setiap persekitaran $V_\varepsilon(x)$ dari x , terdapat $K \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \geq K$ berlaku $x_n \in V_\varepsilon(x)$.

Bukti:

1. \Rightarrow (b) Jelas (definisi)
2. \Rightarrow (c) $|x_n - x| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < x_n - x < \varepsilon \Leftrightarrow x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon$
3. \Leftrightarrow (d) $x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon \Leftrightarrow x_n \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \Leftrightarrow x_n \in V_\varepsilon(x)$.
4. \Leftrightarrow (a) $x_n \in V_\varepsilon(x) \Leftrightarrow x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon \Leftrightarrow |x_n - x| < \varepsilon$.

Contoh 2.1.2

1. Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

Jawab:

Akan ditunjukkan bahwa $(x_n) = \left(\frac{1}{n}\right)$ konvergen ke 0, yaitu $\frac{1}{n} \rightarrow 0$. Harus dibuktikan bahwa untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $K(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dengan $n \geq K(\varepsilon)$ berlaku $\left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon$.

Ambil sebarang $\varepsilon > 0$, maka $\frac{1}{\varepsilon} > 0$. Menurut Sifat Archimedes, maka terdapat $K(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga $\frac{1}{\varepsilon} < K(\varepsilon)$ atau $\frac{1}{K(\varepsilon)} < \varepsilon$. Akibatnya untuk setiap $n \geq K(\varepsilon)$ berlaku

$|\frac{1}{n} - 0| = |\frac{1}{n}| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{K(\varepsilon)} < \varepsilon$. Jadi, terbukti bahwa untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $K(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dengan $n \geq K(\varepsilon)$ berlaku

$$|\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon \text{ atau } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

2. Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$

Jawab :

Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $K(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dengan $n \geq K(\varepsilon)$ berlaku $|\frac{1}{n^2} - 0| < \varepsilon$, Diambil sebarang $\varepsilon > 0$, maka $\varepsilon^{1/2} > 0$, akibatnya $\frac{1}{\varepsilon^{1/2}} > 0$. Menurut Sifat Archimedes, terdapat $K(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga $\frac{1}{\varepsilon^{1/2}} < K(\varepsilon)$ atau $\frac{1}{K(\varepsilon)} < \varepsilon^{1/2}$ diperoleh $\frac{1}{K(\varepsilon)^2} < \varepsilon$. Akibatnya untuk setiap $n \geq K(\varepsilon)$ berlaku $|\frac{1}{n^2} - 0| = \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{K(\varepsilon)^2} < \varepsilon$. Jadi, terbukti bahwa untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $K(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dengan $n \geq K(\varepsilon)$ berlaku $|\frac{1}{n^2} - 0| < \varepsilon$ atau $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$.

Contoh 2.1.3

Tunjukkan bahwa $((-1)^n)$ divergen.

Jawab :

Andaikan $((-1)^n)$ konvergen, berarti terdapat bilangan real x sehingga untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $K \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga untuk setiap $n \geq K$ berlaku $|(-1)^n - x| < 1$. Untuk $n \geq K$ dan n genap, maka $((-1)^n) = 1$, diperoleh

$$1 - x < 1 \Leftrightarrow -1 < 1 - x < 1,$$

yang berakibat $x > 0$. Untuk $n \geq K$ dan n ganjil, maka $((-1)^n) = -1$, diperoleh

$$|-1 - x| < 1 \Leftrightarrow -1 < -1 - x < 1$$

yang berakibat $x < 0$. Timbul kontradiksi, yaitu $x > 0$ dan $x < 0$. Jadi pengandaian salah, yang benar $((-1)^n)$ divergen.

Ekor dari Barisan

Untuk menyelidiki kekonvergenan suatu barisan maka cukup memperhatikan ekor dari barisan tersebut, yaitu barisan bagian dari barisan tersebut yang dimulai dari suatu urutan tertentu.

Definisi 2.1.6

Misalkan $X = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots)$ barisan bilangan real dan misalkan M bilangan asli. Maka ekor- M dari X adalah barisan,

$$X_M = (x_{M+n} : n \in \mathbb{N}) = (x_{M+1}, x_{M+2}, x_{M+3}, \dots)$$

Sebagai contoh, Misalkan $X = (1, 3, 5, 7, \dots, 2n - 1, \dots)$, maka

$$X_5 = (11, 13, 15, \dots, 2n + 9, \dots).$$

Teorema 2.1.7

Diberikan barisan bilangan real $X = (x_n : n \in \mathbb{N})$ dan $m \in \mathbb{N}$. Maka $X_M = (x_{M+n} : n \in \mathbb{N})$ konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Dalam hal ini $\lim X_m = \lim X$.

Bukti:

Perhatikan bahwa untuk sebarang $p \in \mathbb{N}$, elemen ke- p dari X_m adalah elemen ke $(p + m)$ dari X . Sama halnya, jika $q > m$, maka bentuk elemen ke- q dari X_m adalah elemen ke- $(q - m)$ dari X . Diasumsikan bahwa X konvergen ke x . Diberikan sebarang $\varepsilon > 0$, pada barisan X untuk $n \geq K(\varepsilon)$ berlaku $|x_n$

$-x/ < \varepsilon$, maka pada X_m untuk $k \geq K(\varepsilon) - m$ berlaku $|x_k - x| < \varepsilon$.
 Dapat diambil $K_m(\varepsilon) = K(\varepsilon) - m$, sehingga X_m konvergen ke x .

Sebaliknya, jika pada X_m untuk $k \geq K_m(\varepsilon)$ berlaku $|x_k - x| < \varepsilon$, maka pada X untuk $n \geq K(\varepsilon) + m$ berlaku $|x_n - x| < \varepsilon$.
 Dapat diambil $K(\varepsilon) = K_m(\varepsilon) + m$. Dengan demikian terbukti bahwa X konvergen ke x jika dan hanya jika X_m konvergen ke x .

Teorema 2.1.8

Diberikan barisan bilangan real (x_n) dan $x \in \mathbb{R}$. Jika (a_n) adalah suatu barisan bilangan real positif dengan $\lim (a_n) = 0$ dan jika untuk $c > 0$ dan $m \in \mathbb{N}$ berlaku

$$|x_n - x| < ca_n \text{ untuk semua } n \geq m,$$

maka $\lim (x_n) = x$.

Bukti:

Diambil $\varepsilon > 0$, maka $\frac{\varepsilon}{c} > 0$. Karena $\lim (a_n) = 0$, maka terdapat $K(\frac{\varepsilon}{c}) \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga untuk setiap $n \geq K(\frac{\varepsilon}{c})$ berlaku $|a_n - 0| < \frac{\varepsilon}{c}$. Akibatnya untuk setiap $n \geq K(\frac{\varepsilon}{c})$ berlaku $|x_n - x| \leq c |a_n| < c \frac{\varepsilon}{c} = \varepsilon$ atau $|x_n - x| < \varepsilon$.
 Terbukti bahwa $\lim (x_n) = x$.

Contoh 2.1.4

Jika $a > 0$, tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+na} = 0$

Jawab: Karena $a > 0$, maka $0 < na < 1+na$ yang berakibat bahwa

$$0 < \frac{1}{1+na} < \frac{1}{na} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{a} \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N}.$$

Diperoleh

$$\left| \frac{1}{1+na} - 0 \right| = \left| \frac{1}{1+na} \right| < \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \left| \frac{1}{n} \right| \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N}.$$

Karena telah diketahui bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, maka menurut Teoema 2.1.8 dan dengan mengambil $c = \frac{1}{a} > 0$ berakibat bahwa:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+na} = 0.$$

Soal Latihan

1. Tuliskan lima bilangan pertama dari barisan (x_n) untuk x_n berikut:

a. $x_n := \frac{(-1)^n}{n}$

b. $x_n := \frac{1}{n^2+2}$

c. $x_n := \frac{1}{n(n+1)}$

d. $x_n := 1(-1)^n$

Petunjuk penyelesaian:

Mencari lima bilangan pertama dari barisan (x_n)

2. Tentukan rumus ke- n untuk barisan berikut:

a. 5, 7, 9, 11, ...

b. $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$

Petunjuk penyelesaian:

Mencari rumus ke- n untuk barisan di atas menggunakan rumus suku ke- n .

3. Untuk sebarang $b \in \mathbb{R}$, buktikan bahwa $\lim \left(\frac{b}{n}\right) = 0$

Petunjuk penyelesaian:

Permasalahan: Akan dibuktikan bahwa $\lim \left(\frac{b}{n}\right)$ konvergen ke 0.

Dengan menggunakan definisi limit barisan yaitu untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $K(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dengan $n \geq K(\varepsilon)$ berlaku $|\frac{b}{n} - 0| < \varepsilon$ dan sifat Archimedes. Akibatnya $\lim \left(\frac{b}{n}\right) = 0$.

B. Teorema-teorema Limit

Pada subbab ini akan dibahas mengenai beberapa teorema yang berkaitan dengan limit pada barisan bilangan real, seperti barisan terbatas dan kekonvergenan barisan.

Definisi 2.2.1

Barisan bilangan real $X = (x_n)$ dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real $M > 0$ sedemikian sehingga $|x_n| \leq M$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$.

Oleh Karena itu, barisan (x_n) terbatas jika dan hanya jika himpunan $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ merupakan subset terbatas dalam \mathbb{R} .

Teorema 2.2.2

Jika $X = (x_n)$ konvergen maka $X = (x_n)$ terbatas.

Bukti:

Diketahui $X = (x_n)$ konvergen, misalkan konvergen ke x .
Diambil

$\varepsilon = 1$, maka terdapat $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \geq K$ berlaku $|x_n - x| < 1$. Menggunakan akibat Ketaksamaan Segitiga, maka $|x_n| - |x| < 1$ atau $|x_n| < 1 + |x|$ untuk semua $n \geq K$. Pilih $M = \sup \{x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, |x| + 1\}$, maka $|x_n| \leq M$, untuk semua $n \in \mathbb{N}$. Jadi terbukti bahwa $X = (x_n)$ terbatas.

Teorema 2.2.3

Jika $X = (x_n) \rightarrow x$, $Y = (y_n) \rightarrow y$, dan $c \in \mathbb{R}$, maka

1. $X \pm Y \rightarrow x + y$
2. $X \cdot Y \rightarrow xy$
3. $cX \rightarrow cx$

Bukti sebagai latihan

Teorema 2.2.4

Jika $X = (x_n) \rightarrow x$ dan $Z = (z_n) \rightarrow z \neq 0$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$, maka

$$\frac{X}{Z} = \left(\frac{x_n}{z_n} \right) \rightarrow \frac{x}{z}$$

Bukti:

Terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa $\frac{1}{Z} = \left(\frac{1}{z_n} \right) \rightarrow \frac{1}{z}$.
Diambil $\alpha = \frac{1}{2}|z|$, maka $\alpha > 0$. Karena $\lim(z_n) = z$, maka terdapat $K_1 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \geq K_1$ berlaku $|z_n - z| < \alpha$. Menggunakan akibat Ketaksamaan Segitiga bahwa $-\alpha \leq -|z_n - z| \leq |z_n| - |z|$ untuk $n \geq K_1$, yang berarti $\frac{1}{2}|z| = |z| - \alpha \leq |z_n|$ untuk $n \geq K$.

Oleh karena $\frac{1}{|z_n|} \leq \frac{2}{|z|}$ untuk $n \geq K$, maka diperoleh

$$\left| \frac{1}{z_n} - \frac{1}{z} \right| = \left| \frac{z - z_n}{z_n z} \right| = \frac{1}{|z_n z|} \leq \frac{2}{|z|^2} |z - z_n|.$$

Selanjutnya, diberikan $\varepsilon > 0$, maka terdapat $K_2 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga jika $n \geq K_2$, maka $|z_n - z| < \frac{1}{2} \varepsilon |z|^2$. Jika diambil $K(\varepsilon) = \max \{K_1, K_2\}$, maka

$$\left| \frac{1}{z_n} - \frac{1}{z} \right| < \varepsilon \text{ untuk semua } n \geq K(\varepsilon).$$

Karena berlaku untuk sebarang $\varepsilon > 0$, maka terbukti bahwa $\lim \left(\frac{1}{z_n} \right) = \left(\frac{1}{z} \right)$ atau $\left(\frac{1}{z_n} \right)$ konvergen ke $\frac{1}{z}$. Menggunakan Teorema 2.2.3(ii) dan dengan mengambil Y sebagai barisan $\left(\frac{1}{z_n} \right)$, maka $X \cdot Y = \left(\frac{x_n}{z_n} \right) \rightarrow x \left(\frac{1}{z} \right) = \frac{x}{z}$.

Teorema 2.2.5.

Jika $X = (x_n)$ barisan bilangan real dengan $x_n \geq 0$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$ dan $(x_n) \rightarrow x$, maka $x \geq 0$.

Bukti:

Andaikan $\varepsilon = -x > 0$. Karena $(x_n) \rightarrow x$, maka terdapat $K \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \geq K$ berlaku

$$|x_n - x| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < x_n - x < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow x - (-x) < x_n < x + (-x)$$

$$\Leftrightarrow 2x < x_n < 0$$

Kontradiksi dengan pernyataan bahwa $x_n \geq 0$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$. Jadi pengandaian salah, yang benar adalah $x \geq 0$.

Teorema 2.2.6

Jika $(x_n) \rightarrow x$, $(y_n) \rightarrow y$, dan $x_n \leq y_n$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$, maka $x \leq y$.

Bukti:

Diberikan $z_n := y_n - x_n$ sehingga $Z := (z_n) = Y - X$ dan $z_n \geq 0$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$. Dengan menggunakan Teorema 2.2.3 dan Teorema 2.2.5 diperoleh bahwa:

$$0 \leq \lim Z = \lim (y_n) - \lim (x_n) \text{ atau } \lim (x_n) \leq \lim (y_n).$$

Jadi terbukti bahwa $x \leq y$.

Teorema 2.2.7

Jika $X = (x_n)$ konvergen ke x dan jika $a \leq x_n \leq b$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$, maka $a \leq x \leq b$.

Bukti:

Definisikan barisan $A = (a_n) = (a, a, a, \dots)$ dan $B = (b_n) = (b, b, b, \dots)$ maka $a_n \leq x_n \leq b_n$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$. Oleh karena itu, $\lim A = a$, $\lim B = b$. Menurut Teorema 2.2.6, diperoleh bahwa $a = \lim A \leq \lim X$ dan $\lim X \leq \lim B = b$. Jadi terbukti $a \leq$

$\lim X \leq b$ atau $a \leq x \leq b$.

Teorema Apit (Sandwich Theorem) 2.2.8

Diberikan barisan-barisan bilangan real $X = (x_n)$, $Y = (y_n)$ dan $Z = (z_n)$ dengan $x_n \leq y_n \leq z_n$ untuk setiap $n \in N$. Jika $\lim(x_n) = \lim(z_n)$, maka $Y = (y_n)$ konvergen dan $\lim(x_n) = \lim(y_n) = \lim(z_n)$.

Bukti:

Dimisalkan $\lim(x_n) = \lim(z_n) = v$. Jadi untuk setiap bilang real $\varepsilon > 0$ terdapat bilangan asli K_1 dan K_2 sehingga:

$$\text{untuk } n \geq K_1 \text{ berlaku } |x_n - v| < \varepsilon$$

$$\text{untuk } n \geq K_2 \text{ berlaku } |z_n - v| < \varepsilon$$

diambil $K = \max\{K_1, K_2\}$, maka untuk $n \geq K$ berlaku:

$$|x_n - v| < \varepsilon \text{ dan } |z_n - v| < \varepsilon$$

Karena $x_n \leq y_n \leq z_n$ maka $x_n - v \leq y_n - v \leq z_n - v$.

Jadi untuk $n \geq K$ berlaku:

$$|y_n - v| \leq \sup\{|x_n - v|, |z_n - v|\} < \varepsilon$$

Terbukti barisan (y_n) konvergen ke $\lim(y_n) = v$

Contoh 2.2.1

Hitung $\lim\left(\frac{\sin n}{n}\right)$. Karena $-1 \leq \sin n \leq 1$ maka $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$.

Telah dikerjakan sebelumnya bahwa $\lim\left(-\frac{1}{n}\right) = \lim\left(\frac{1}{n}\right) = 0$.

Maka berdasarkan Teorema 2.2.7, $\lim\left(\frac{\sin n}{n}\right) = 0$.

Teorema 2.2.9

Jika $X = (x_n)$ barisan bilangan real konvergen ke x maka barisan $(|x_n|)$ konvergen ke $|x|$.

Bukti:

Diketahui $\lim(x_n) = x$. Jadi untuk setiap bilangan $\varepsilon > 0$ terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk $n \geq K$ berlaku $|x_n - x| < \varepsilon$. Tetapi, $||x_n| - |x|| < |x_n - x| < \varepsilon$.

Jadi $||x_n| - |x|| < \varepsilon$ untuk semua $n \geq K$. Terbukti barisan $(|x_n|)$ konvergen ke $|x|$

Teorema 2.2.10

Diberikan $X = (x_n)$ barisan bilangan real dengan $x_n > 0$. Jika $\lim \frac{x_{n+1}}{x_n} < 1$ maka (x_n) konvergen ke 0.

Bukti sebagai latihan.

Soal Latihan

1. Buktikan bahwa barisan (n) divergen!

Petunjuk penyelesaian:

Permasalahan: akan ditunjukkan bahwa barisan (n) divergen.

Andaikan (n) konvergen, maka menurut Teorema 2.2.2, barisan (n) terbatas. Ini bertentangan dengan Teorema Archimedes. Jadi haruslah (n) divergen.

2. Buktikan $\lim \left(\frac{2n+1}{n} \right) = 2$.

Petunjuk penyelesaian:

Permasalahan: akan ditunjukkan bahwa $\lim \left(\frac{2n+1}{n} \right) = 2$.

Ambil $(x_n) = (2, 2, 2, \dots)$ dan $(y_n) = \left(\frac{1}{n} \right)$, maka

$$\left(\frac{2n+1}{n} \right) = \left(2 + \frac{1}{n} \right) = (x_n) + (y_n)$$

$$\lim (x_n) = 2 \text{ dan } \lim (y_n) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{jadi } \lim \left(\frac{2n+1}{n} \right) &= \lim (x_n) + \lim (y_n) \\ &= 2 + 0 = 2 \end{aligned}$$

3. Buktikan $\lim \left(\frac{2n}{n^2+1} \right) = 0$

Petunjuk penyelesaian:

Permasalahan: akan dibuktikan bahwa $\lim \left(\frac{2n}{n^2+1} \right) = 0$

$$\lim \left(\frac{2n}{n^2+1} \right) = \lim \left(\frac{2/n}{1 + \frac{1}{n^2}} \right).$$

$$\text{Misalkan } (x_n) = \left(\frac{2}{n} \right) \text{ dan } (z_n) = 1 + \frac{1}{n^2},$$

Maka $\lim(x_n) = 0$ dan $\lim(z_n) = 1$, $z_n \neq 0$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$. Jadi $\lim \left(\frac{2n}{n^2+1} \right) = \lim \left(\frac{X}{Z} \right) = \frac{\lim X}{\lim Z} = \frac{0}{1} = 0$.

4. Buktikan $\lim \left(\frac{\sin n}{n} \right) = 0$.

Petunjuk penyelesaian:

Permasalahan: Akan ditunjukkan bahwa $\lim \left(\frac{\sin n}{n} \right) = 0$

Diketahui bahwa $-1 \leq \sin x \leq 1$, maka

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n} \text{ untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

$$\lim \left(-\frac{1}{n} \right) = 0 \text{ dan } \lim \left(\frac{1}{n} \right) = 0.$$

Menurut Teorema Apit, maka $\left(\frac{\sin n}{n} \right) = 0$.

C. Barisan Monoton

Berikut ini diberikan pengertian mengenai barisan naik dan turun monoton

Definisi 2.3.1

Diberikan barisan bilangan real $X = (x_n)$

- Barisan X dikatakan **naik** (*increasing*) jika $x_n \leq x_{n+1}$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$.
- Barisan X dikatakan **naik tegas** (*strictly increasing*) jika $x_n < x_{n+1}$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$.
- Barisan X dikatakan **turun** (*decreasing*) jika $x_n \geq x_{n+1}$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$.
- Barisan X dikatakan **turun tegas** (*strictly decreasing*) jika $x_n > x_{n+1}$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$.

Definisi 2.3.2

Barisan $X = (x_n)$ dikatakan **monoton** jika berlaku salah satu X naik atau X turun.

Contoh 2.3.1

- Barisan berikut ini naik (monoton)
 - $(1, 2, 3, \dots, n, \dots)$
 - $(1, 2, 2, 3, 3, 3, \dots)$
 - $(a, a^2, a^3, \dots, a^n, \dots)$ jika $a > 1$
- Barisan berikut ini turun (monoton)
 - $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots)$
 - $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \frac{1}{2^{n-1}}, \dots)$
 - $(b, b^2, b^3, \dots, b^n, \dots)$ jika $0 < b < 1$

3. Barisan berikut ini tidak monoton

a. $(+1, -1, +1, \dots, (-1)^{n+1}, \dots)$

b. $(-1, +2, -3, +4, \dots)$

2.3.3. Teorema Konvergensi Monoton

a. Jika $X = (x_n)$ naik (monoton) dan terbatas ke atas, maka $X = (x_n)$ konvergen dengan

$$\lim(x_n) = \sup \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$$

b. Jika $X = (x_n)$ turun (monoton) dan terbatas ke bawah, maka $X = (x_n)$ konvergen dengan

$$\lim(x_n) = \inf \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$$

Bukti:

a. Karena $X = (x_n)$ terbatas ke atas, maka terdapat $M \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $x_n \leq M$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$. Namakan $A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, maka $A \subset \mathbb{R}$, terbatas ke atas dan tidak kosong. Menurut Sifat kelengkapan \mathbb{R} , maka supremum A ada, namakan $x = \sup A$. Diambil $\varepsilon > 0$, maka terdapat $K \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $x - \varepsilon < x_k \leq x$. Karena X naik monoton, maka untuk $n \geq K$ berlaku

$$x - \varepsilon < x_k \leq x_n \leq x < x + \varepsilon$$

atau

$$x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon \Leftrightarrow |x_n - x| < \varepsilon$$

Jadi terbukti bahwa $X = (x_n)$ konvergen ke $x = \lim(x_n) = \sup \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$

b. Gunakan cara yang hampir sama dengan pembuktian (a).

Contoh 2.3.2

Diketahui barisan (y_n) dengan $y_1 = 1$ dan $y_{n+1} = \sqrt{2 + y_n}$, $n \geq 1$. Apakah y_n konvergen? Jika ya, tentukan

$\lim(y_n)$

Jawab.

Akan ditunjukkan menggunakan induksi bahwa (y_n) naik monoton. Untuk $n = 1$, diperoleh $y_2 = \sqrt{2+1} = \sqrt{3} \geq 1$ (benar). Misalkan benar untuk $n = k$, yaitu $y_{k+1} = \sqrt{2+y_k}$, $y_{k+1} \geq y_k$. Akan dibuktikan benar untuk $n = k+1$, yaitu

$$y_{k+2} = \sqrt{2+y_{k+1}} \geq \sqrt{2+y_k} = y_{k+1}$$

Berarti benar untuk $n = k+1$. Jadi, menurut induksi (y_n) naik monoton. Selanjutnya, ditunjukkan bahwa (y_n) terbatas ke atas (oleh 3), yaitu $y_n \leq 3$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$.

Untuk $n = 1$ benar, sebab $y_1 = 1 \leq 3$. Misalkan benar untuk $n = k$, yaitu $y_k \leq 3$. Maka $y_{k+1} = \sqrt{2+y_k} \leq \sqrt{2+3} = \sqrt{5} \leq 3$ yang berarti benar untuk $n = k+1$. Jadi, menurut induksi terbukti bahwa $y_n \leq 3$, untuk semua $n \in \mathbb{N}$. Karena (y_n) naik monoton dan terbatas ke atas, maka menurut Teorema 2.3.4 barisan (y_n) konvergen. Misalkan $y = \lim y_n$, maka diperoleh

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{2+y} \Leftrightarrow y^2 = 2+y \Leftrightarrow y^2 - y - 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow (y-2)(y+1) = 0 \end{aligned}$$

Diperoleh $y = 2$ atau $y = -1$. Untuk $y = -1$ jelas tidak mungkin, sebab $1 \leq y_n \leq 3$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$. Jadi, terbukti bahwa y_n konvergen dan $\lim(y_n) = 2$

D. Barisan Bagian

Pada bagian ini akan diberikan konsep barisan bagian (*subsequences*) dari suatu barisan bilangan real.

Definisi 2.4.1

Diberikan barisan bilangan real $X = (x_n)$ dan diberikan barisan bilangan asli naik tegas $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$. Barisan $X' = (x_{n_k})$ dengan

$$(x_{n_k}) = (x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}, \dots)$$

disebut dengan **barisan bagian** atau **sub barisan** (*subsequences*) dari X .

Contoh 2.4.1

Diberikan $X := \left(\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right)$

- Barisan $X_1' = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{2n}, \dots\right)$ merupakan barisan bagian dari X
- Barisan $X_2' = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \dots\right)$ merupakan barisan bagian dari X
- Barisan $X_3' = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots\right)$ bukan merupakan barisan bagian dari X karena $n_2 < n_1$

Teorem 2.4.2

Jika $X = (x_n)$ konvergen ke x , maka setiap barisan bagian $X' = (x_{n_k})$ dari X juga konvergen ke x .

Bukti:

Diambil $\varepsilon > 0$. Karena $(x_n) \rightarrow x$, maka terdapat $K(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \geq K(\varepsilon)$ berlaku $n_k \geq k \geq$

$K(\varepsilon)$. Sehingga $|x_{n_k} - x| < \varepsilon$.

Terbukti bahwa $X' = (x_{n_k})$ konvergen ke x .

Teorema 2.4.3

Diberikan barisan bilangan real $X = (x_n)$, maka pernyataan berikut ini ekuivalen.

- a. Barisan $X = (x_n)$ tidak konvergen ke $x \in \mathbb{R}$
- b. Ada $\varepsilon_0 > 0$ sedemikian hingga untuk sebarang $k \in \mathbb{N}$, terdapat $n_k \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga $n_k \geq k$ dan $|x_{n_k} - x| \geq \varepsilon_0$.
- c. Ada $\varepsilon_0 > 0$ dan suatu barisan bagian $X' = (x_{n_k})$ sedemikian hingga $|x_{n_k} - x| \geq \varepsilon_0$ untuk semua $k \in \mathbb{N}$.

Bukti:

- a. \Rightarrow (ii) tidak konvergen ke x , maka untuk suatu $\varepsilon_0 > 0$ tidak mungkin ditemukan $k \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga untuk setiap $n_k \geq k$ berlaku $|x_{n_k} - x| < \varepsilon_0$. Akibatnya tidak benar bahwa untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, $n \geq k$ memenuhi $|x_{n_k} - x| < \varepsilon_0$. Dengan kata lain, untuk setiap $k \in \mathbb{N}$ terdapat $n_k \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga $n_k \geq k$ dan $|x_{n_k} - x| \geq \varepsilon_0$.
- b. \Rightarrow (iii) Diberikan $\varepsilon_0 > 0$ sehingga memenuhi (ii) dan diberikan $n_1 \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga $n_1 \geq 1$ dan $|x_{n_1} - x| \geq \varepsilon_0$. Sedemikian hingga $n_2 > n_1$ dan $|x_{n_2} - x| \geq \varepsilon_0$. Demikian seterusnya sehingga diperoleh suatu barisan bagian $X' = (x_{n_k})$ sehingga berlaku $|x_{n_k} - x| \geq \varepsilon_0$ untuk semua $k \in \mathbb{N}$.
- c. \Rightarrow (i) Misalkan $X = (x_n)$ mempunyai barisan bagian $X' = (x_{n_k})$ yang memenuhi sifat (iii). Maka X tidak konvergen ke x , sebab jika konvergen ke x , maka $X' =$

(x_{n_k}) juga konvergen ke x . Hal ini tidak mungkin, sebab $X' = (x_{n_k})$ tidak berada dalam persekitaran $V_{\varepsilon_0}(x)$.

Teorema 2.4.4 (Kriterian Divergensi)

Jika barisan bilangan real $X = (x_n)$ memenuhi salah satu dari sifat berikut, maka barisan X divergen.

- a. X mempunyai dua barisan bagian konvergen $X' = (x_{n_k})$ dan $X'' = (x_{r_k})$ dengan limit keduanya tidak sama.
- b. X tidak terbatas.

Contoh 2.4.2

Tunjukkan bahwa barisan $(1, \frac{1}{2}, 3, \frac{1}{4}, \dots)$ divergen.

Jawab : Namakan barisan di atas dengan $Y = (y_n)$, dengan $y_n = \frac{1}{n}$ jika n genap, dan $y_n = n$ jika n ganjil. Jelas bahwa Y tidak terbatas. Jadi barisan $Y = (y_n)$ divergen.

Teorema 2.4.5 Teorema Barisan Bagian Monoton

Jika $X = (x_n)$ barisan bilangan real, maka terdapat barisan bagian dari X yang monoton.

Bukti.

Pembuktian dibagi menjadi dua kasus, yaitu X mempunyai tak hingga banyak puncak, dan X mempunyai berhingga banyak puncak.

Kasus I: X mempunyai tak hingga banyak puncak. Tulis semua puncak berurutan naik, yaitu $x_{m_1}, x_{m_2}, \dots, x_{m_k}, \dots$. Maka $x_{m_1} \geq x_{m_2} \geq \dots \geq x_{m_k}, \dots$. Oleh karena itu, (x_{m_k}) merupakan barisan bagian yang turun (monoton).

Kasus II: X mempunyai berhingga banyak puncak. Tulis semua puncak berurutan naik, yaitu $x_{m_1}, x_{m_2}, \dots, x_{m_k}, \dots$. Misalkan $s_1 := m_{r_1} + 1$ adalah indeks pertama dari puncak yang terakhir. Karena x_{s_1} bukan puncak, maka terdapat $s_2 > s_1$ sedemikian hingga $x_{s_1} < x_{s_2}$. Karena x_{s_2} bukan puncak, maka terdapat $s_3 > s_2$ sedemikian hingga $x_{s_2} < x_{s_3}$. Jika proses ini diteruskan, diperoleh barisan bagian x_{s_1} yang naik (monoton).

Teorema 2.4.6 Teorema Bolzano-Weierstrass

Setiap barisan bilangan real yang terbatas pasti memuat barisan bagian yang konvergen.

Bukti.

Diberikan barisan bilangan real terbatas $X = (x_n)$. Namakan $S = \{x_n : n \in N\}$ range barisan, maka S mungkin berhingga atau tak berhingga.

Kasus I: Diketahui S berhingga. Misalkan, $S = \{x_1, x_2, \dots, x_t\}$ maka terdapat $m \in N$ dengan $1 \leq m \leq t$ dan barisan $(r_k : k \in N)$ dengan $r_1 < r_2 < r_3 < \dots$ sehingga $x_{r_1} = x_{r_2} = \dots = x_m$. Hal ini berarti terdapat barisan bagian $(x_{r_k} : k \in N)$ yang konvergen ke x_m .

Kasus II: Karena S tak berhingga dan terbatas, maka S mempunyai titik cluster atau titik limit, namakan x titik limit S . Misalkan $u_k = \left(x - \frac{1}{k}, x + \frac{1}{k}\right)$ persekitaran titik x .

Untuk $k = 1$, maka terdapat $x_{r_1} \in S \cap u_1, x_{r_1} \neq x$ sedemikian hingga $|x_{r_1} - x| < 1$

Untuk $k = 2$, maka terdapat $x_{r_2} \in S \cap u_2, x_{r_2} \neq x$ sedemikian hingga $|x_{r_2} - x| < \frac{1}{2}$

Untuk $k = 3$, maka terdapat $x_{r_3} \in S \cap u_3, x_{r_3} \neq x$ sedemikian

hingga $|x_{r_3} - x| < \frac{1}{3}$

Demikian seterusnya, sehingga diperoleh:

Untuk $k = n$, maka terdapat $x_{r_n} \in S \cap u_n$, $x_{r_n} \neq x$ sedemikian

hingga $|x_{r_n} - x| < \frac{1}{n}$

Ambil $\varepsilon_0 > 0$. Menurut Sifat Archimedes, maka terdapat $K \in$

\mathbb{N} sedemikian hingga $\frac{1}{K} < \varepsilon$ Maka untuk setiap $n \geq K$ berlaku

$|x_{r_n} - x| < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{K} < \varepsilon$. Terbukti bahwa x_{r_n} konvergen ke x dengan x_{r_n} barisan bagian (x_n)

Teorema 2.4.7

Diberikan barisan bilangan real terbatas $X = (x_n)$ dan diberikan $x \in \mathbb{R}$ yang mempunyai sifat bahwa setiap barisan bagian dari X konvergen ke x . Maka barisan X konvergen ke x .

Bukti.

Misalkan $M > 0$ adalah batas dari barisan X sehingga $|x_n| \leq M$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$. Andaikan X tidak konvergen ke x , maka menggunakan Teorema 2.4.3 terdapat $\varepsilon_0 > 0$ dan barisan bagian $X' = (x_{n_k})$ sedemikian hingga $|x_{n_k} - x| \geq \varepsilon_0$ untuk semua $k \in \mathbb{N}$. Karena X' barisan bagian dari X , maka M juga batas dari X' . Menggunakan Teorema Bolzano-Weierstrass berakibat bahwa X' memuat barisan bagian X'' . Karena X'' juga barisan bagian dari X , maka X'' juga konvergen ke x . Dengan demikian, akan selalu berada dalam persekitaran $V_{\varepsilon_0}(x)$. Timbul kontradiksi, yang benar adalah X selalu konvergen ke x .

Soal Latihan

1. Tunjukkan bahwa barisan berikut ini divergen

a. $(1 - (-1)^n + \frac{1}{n})$

b. $(\sin \frac{n\pi}{4})$

Petunjuk penyelesaian:

Untuk $n \in \mathbb{N}$ maka diperoleh barisan untuk bagian (a) dan (b). Kalau barisannya tidak konvergen ke suatu titik maka barisannya divergen.

2. Berikan contoh barisan tak terbatas yang memuat barisan bagian konvergen.

3. Tentukan konvergensi dan limit barisan berikut:

a. $(\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^2)$

b. $(\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{2n^2})$

Petunjuk penyelesaian:

Dengan mencari nilai limit barisan untuk $n \in \mathbb{N}$, kalau ada limitnya berarti barisan tersebut konvergen.

4. Buktikan bahwa jika barisan $X = (x_n)$ konvergen ke x , maka sebarang subbarisan (barisan bagian) dari X konvergen ke x !

Petunjuk penyelesaian:

Permasalahan: Akan ditunjukkan bahwa sebarang subbarisan (barisan bagian) X konvergen ke x .

Ambil $\varepsilon > 0$ sebarang.

Pilih $K \in \mathbb{N}$ sehingga $|x_n - x| < \varepsilon$ apabila $n \geq K$.

Karena $r_1 < r_2 < r_3 < \dots < r_n$ barisan naik maka $r_n \geq n$, oleh

karena itu jika $n \geq K$ maka $r_n \geq n \geq K$ dan berlaku $|x_{r_n} - x| < \varepsilon$.

Ini menunjukkan bahwa barisan bagian dari X konvergen ke x .

5. Buktikan bahwa $\lim (b^n) = 0$ jika dan hanya jika $0 < b < 1$.

Petunjuk penyelesaian:

Permasalahan: akan ditunjukkan bahwa $\lim (b^n)$ konvergen ke 0.

Misalkan barisan-barisan $(b^{2n}) = ((b^2)^n)$, (b^{2n-1}) , (b^{n+2}) adalah barisan bagian dari (b^n) .

Jadi $\lim (b^{2n}) = \lim (b^{2n-1}) = \lim (b^{n+1}) = \lim (b^n) = 0$

E. Barisan Cauchy

Definisi 2.5.1

Barisan bilangan real $X = (x_n)$ disebut barisan Cauchy jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $H(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga untuk setiap $n, m \in \mathbb{N}$ dengan $n, m \geq H(\varepsilon)$ berlaku $|x_n - x_m| < \varepsilon$.

Contoh 2.5.1

Barisan $\left(\frac{1}{n}\right)$ merupakan barisan Cauchy.

Jika diberikan $\varepsilon > 0$, dapat dipilih $H = H(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $H > \frac{2}{\varepsilon}$. Maka jika $n, m \geq H$, diperoleh $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{H} < \frac{\varepsilon}{2}$ dan dengan cara yang sama diperoleh $\frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{2}$. Oleh karena itu, jika $n, m \geq H(\varepsilon)$, maka

$$\left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Karena berlaku untuk sebarang $\varepsilon > 0$, maka dapat disimpulkan bahwa $\left(\frac{1}{n}\right)$ merupakan barisan Cauchy.

Lemma 2.5.2

Jika $X = (x_n)$ barisan bilangan real yang konvergen, maka X merupakan barisan Cauchy.

Bukti:

Misalkan $x := \lim X$. Diberikan $\varepsilon > 0$, maka terdapat $K\left(\frac{\varepsilon}{2}\right) \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga jika $n \geq K\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)$, maka $|x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2}$. Oleh karena itu, jika $H(\varepsilon) := K\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)$ dan jika $n, m \geq H(\varepsilon)$, maka diperoleh

$$\begin{aligned}
|x_n - x_m| &= |(x_n - x) + (x_m - x)| \\
&= |x_n - x| + |x_m - x| \\
&< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon
\end{aligned}$$

Karena berlaku untuk sebarang $\varepsilon > 0$, maka terbukti bahwa (x_n) barisan Cauchy.

Teorema 2.5.3

Jika $X = (x_n)$ barisan Cauchy, maka X barisan terbatas.

Bukti sebagai latihan

Teorema 2.5.4 (Kriterian Konvergensi Cauchy)

Barisan bilangan real $X = (x_n)$ konvergen jika dan hanya jika $X = (x_n)$ barisan Cauchy.

Bukti:

\Rightarrow Jelas (Lemma 2.5.2)

\Leftarrow Diketahui $X = (x_n)$ barisan Cauchy. Diambil $\varepsilon > 0$, maka terdapat $H = H(\varepsilon) > 0$ sedemikian sehingga untuk setiap $n, m \in \mathbb{N}$ dengan $n, m \geq H$ berlaku $|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$. Karena X barisan Cauchy, maka X terbatas, sehingga X memuat barisan bagian $X' = (x_{n_k})$ yang konvergen ke x^* . Oleh karena itu terdapat $K \geq H$ dengan $K \in \{n_1, n_2, n_3, \dots\}$ sedemikian hingga $|x_K - x^*| < \frac{\varepsilon}{2}$. Akibatnya untuk $m = K$ diperoleh,

$$\begin{aligned}
|x_n - x^*| &= |x_n - x_K + x_K - x^*| \\
&\leq |x_n - x_K| + |x_K - x^*| \\
&< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon
\end{aligned}$$

Karena berlaku untuk sebarang $\varepsilon > 0$, maka terbukti bahwa barisan $X = (x_n)$ konvergen.

Contoh 2.5.2

Misalkan $X = (x_n)$ barisan yang didefinisikan sebagai $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ dan $x_n = \frac{1}{2}(x_{n-2} + x_{n-1})$ $n > 2$.

Dapat ditunjukkan bahwa $1 \leq x_n \leq 2$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$.

Permasalahan:

Akan ditunjukkan bahwa:

$$|x_n - x_{n+1}| = \frac{1}{2^{n-1}}, \text{ untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

$$|x_1 - x_2| = |1 - 2| = 1 = \frac{1}{2^0}. \text{ Jadi benar untuk } n = 1.$$

Misalkan benar untuk $n = k$, maka

$$|x_k - x_{k+1}| = \frac{1}{2^{k-1}}$$

Akan dibuktikan bahwa,

$$|x_{k+1} - x_{k+2}| = \frac{1}{2^k}$$

$$\begin{aligned} |x_{k+1} - x_{k+2}| &= \left| x_{k+1} - \frac{1}{2}(x_k + x_{k+1}) \right| \\ &= \left| x_{k+1} - \frac{1}{2}x_k - \frac{1}{2}x_{k+1} \right| \\ &= \frac{1}{2} |x_{k+1} - x_k| \\ &= \frac{1}{2} |x_k - x_{k+1}| \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{1}{2^k} \end{aligned}$$

Misalkan $m > n$

$$\begin{aligned} |x_n - x_m| &\leq |x_n - x_{n+1}| + |x_{n+1} - x_{n+2}| + \dots + |x_{m-1} - x_m| \\ &= \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n} + \dots + \frac{1}{2^{m-2}} \\ &= \frac{1}{2^{n-1}} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{m-n-1}} \right) \\ &< \frac{1}{2^{n-2}}. \end{aligned}$$

Ambil $\varepsilon > 0$ sebarang.

Pilih $N_0 \in \mathbb{N}$ sehingga $\left(\frac{1}{2}\right)^{N_0} < \frac{\varepsilon}{8}$, maka jika $m, n \geq N_0$ berlaku

$$|x_{N_0} - x_m| < \frac{1}{2^{N_0-2}} = 4 \left(\frac{1}{2}\right)^{N_0} < 4 \frac{\varepsilon}{8} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

$$\text{Dan } |x_{N_0-x_n}| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{Sehingga } |x_n - x_m| \leq |x_{N_0-x_n}| + |x_{N_0} - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Ini berarti $X = (x_n)$ barisan Cauchy.

F. Sifat Barisan Divergen

Pada bagian ini diberikan beberapa sifat dari suatu barisan bilangan real (x_n) yang mendekati atau menuju ke $\pm \infty$, yaitu $\lim(x_n) = +\infty$ dan $\lim(x_n) = -\infty$. Perlu diingat bahwa barisan divergen adalah barisan yang tidak konvergen.

Definisi 2.6.1

Diberikan barisan bilangan real (x_n) .

- Barisan (x_n) dikatakan mendekati $+\infty$, ditulis $\lim(x_n) = +\infty$ jika untuk setiap $\alpha \in \mathbb{R}$ terdapat $K(\alpha) \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga jika $n \geq K(\alpha)$ maka $x_n > \alpha$
- Barisan (x_n) dikatakan mendekati $-\infty$, ditulis $\lim(x_n) = -\infty$ jika untuk setiap $\beta \in \mathbb{R}$ terdapat $K(\beta) \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga jika $n \geq K(\beta)$ maka $x_n < \beta$

Barisan (x_n) dikatakan **divergen proper** (tepat/tegas) jika $\lim(x_n) = +\infty$ atau $\lim(x_n) = -\infty$. Berikut ini diberikan contoh bahwa $\lim(n^2) = +\infty$.

Teorema 2.6.2

Barisan bilangan real monoton merupakan barisan divergen proper jika dan hanya jika barisannya tidak terbatas.

- a. Jika (x_n) barisan naik tak terbatas, maka $\lim(x_n) = +\infty$
- b. Jika (x_n) barisan turun tak terbatas, maka $\lim(x_n) = -\infty$

Bukti:

- a. Misalkan (x_n) barisan naik. Jika (x_n) terbatas, maka (x_n) konvergen. Jika (x_n) tidak terbatas, maka untuk sebarang $\alpha \in \mathbb{R}$ terdapat $n(\alpha) \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\alpha < x_{n(\alpha)}$. Tetapi karena (x_n) naik, diperoleh $\alpha < x_n$ untuk semua $n \geq n(\alpha)$. Karena α sebarang, maka diperoleh bahwa $\lim(x_n) = +\infty$.
- b. Bukti hampir sama dengan (a).

Teorema 2.6.3

Diberikan barisan bilangan real (x_n) dan (y_n) , dengan $x_n \leq y_n$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$.

- a. Jika $\lim(x_n) = +\infty$ maka $\lim(y_n) = +\infty$
- b. Jika $\lim(x_n) = -\infty$ maka $\lim(y_n) = -\infty$

Bukti:

- a. Jika $\lim(x_n) = +\infty$ dan jika diberikan $\alpha \in \mathbb{R}$, maka terdapat $K(\alpha) \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga jika $n \geq K(\alpha)$ maka $\alpha < x_n$. Karena diketahui $x_n \leq y_n$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$, maka $\alpha < y_n$ untuk semua $n \geq K(\alpha)$. Karena α sebarang, maka $\lim(y_n) = +\infty$.
- b. Bukti hampir sama dengan (a).

Teorema 2.6.4

Diberikan barisan bilangan real (x_n) dan (y_n) , dan untuk suatu $L \in \mathbb{R}$, $L > 0$ diperoleh $\lim \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = L$, maka $\lim(x_n) = +\infty$ jika dan hanya jika $\lim(y_n) = +\infty$

Bukti:

Diketahui $\lim \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = L$, artinya terdapat $K \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \geq K$ berlaku

$$\frac{1}{2}L < \frac{x_n}{y_n} < \frac{3}{2}L$$

Oleh karena itu, diperoleh $(\frac{1}{2}L) y_n < x_n < (\frac{3}{2}L) y_n$, untuk semua $n \geq K$. Sehingga menggunakan Teorema 2.6.3, teorema terbukti.

G. Deret Tak Berhingga

Pada bagian ini akan dibahas deret tak hingga dari bilangan real. Deret bilangan real secara formal didefinisikan sebagai berikut:

$$\Sigma(a_n) = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

Jika didefinisikan $s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$, maka barisan $S = (s_n)$ disebut barisan jumlah parsial dari $\Sigma(a_n)$, dan bilangan s_n disebut jumlah parsial ke- n dari Σa_n .

Definisi 2.7.1

Deret $\Sigma(a_n)$ dikatakan konvergen ke s jika barisan jumlah parsial (s_n) konvergen ke s . Jika barisan (s_n) tidak konvergen, deret $\Sigma(a_n)$ dikatakan divergen. Jika barisan (s_n) terbatas dan

tidak konvergen, deret $\Sigma(a_n)$ dikatakan berosilasi dengan hingga.

Definisi 2.7.2

Deret $\Sigma(a_n)$ dikatakan konvergen mutlak jika deret $\Sigma(|a_n|)$ konvergen. Suatu deret dikatakan konvergen bersyarat jika ia konvergen tetapi tidak konvergen mutlak.

Contoh 2.7.1

Perhatikan deret $\Sigma\left(\frac{1}{n(n+1)}\right)$.

$$\begin{aligned} \text{Jumlah parsial } s_n &= \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

Terlihat bahwa barisan jumlah parsial (s_n) konvergen ke 1. jadi deret $\Sigma\left(\frac{1}{n(n+1)}\right)$ konvergen ke 1 (atau mempunyai jumlah 1).

Teorema 2.7.3

- Jika deret $\Sigma(x_n)$ dan $\Sigma(y_n)$ konvergen maka deret $\Sigma(x_n + y_n)$ konvergen dan $\Sigma(x_n + y_n) = \Sigma(x_n) + \Sigma(y_n)$. Hasil yang sama berlaku untuk $\Sigma(x_n - y_n)$
- Jika deret $\Sigma(x_n)$ konvergen dan c bilangan real maka deret $\Sigma(cx_n)$ konvergen dan $\Sigma(cx_n) = c \Sigma(x_n)$
Bukti sebagai latihan

Teorema 2.7.4 (Teorema Cauchy)

Deret $\Sigma(x_n)$ konvergen jika dan hanya jika untuk setiap bilangan $\epsilon > 0$ terdapat bilangan asli K sehingga untuk semua

bilangan asli $n \geq k$ berlaku:

$$|x_{n+1} + x_{n+2} + \dots + x_{n+p}| < \varepsilon, \quad p = 1, 2, 3, \dots$$

Bukti:

Dimisalkan (s_n) barisan jumlah parsial deret $\Sigma(x_n)$. Deret $\Sigma(x_n)$ konvergen jika dan hanya jika barisan jumlah parsial (s_n) konvergen. Berdasarkan criteria Cauchy (untuk barisan), barisan (s_n) konvergen jika dan hanya jika untuk setiap bilangan $\varepsilon > 0$ terdapat bilangan asli K untuk semua $n, m \geq K$ (sebut $m = n + p$) berlaku:

$$|s_m - s_n| = |x_{n+1} + x_{n+2} + \dots + x_{n+p}| < \varepsilon \\ p = 1, 2, 3, \dots$$

Teorema 2.7.5 (The nth Term Test)

Jika $\Sigma(x_n)$ konvergen maka $\lim(x_n) = 0$

Bukti:

Ambil $p = 1$ dalam Teorema 2.7.1. diperoleh:

$$|x_{n+1}| < \varepsilon \text{ untuk } n \geq K$$

atau $|x_n| < \varepsilon$ untuk $n \geq K + 1$

jadi $\lim(x_n) = 0$.

$\lim(x_n) = 0$ hanyalah syarat perlu agar deret $\Sigma(x_n)$ konvergen, artinya jika $\lim(x_n) \neq 0$ maka deret $\Sigma(x_n)$ tidak konvergen.

Teorema 2.7.6

Jika $\Sigma(x_n)$ konvergen mutlak maka ia konvergen.

Bukti sebagai latihan

Teorema 2.7.7

Diberikan (x_n) barisan bilangan real nonnegatif, maka deret $\Sigma(x_n)$ konvergen jika dan hanya jika barisan $S = (s_k)$ dari jumlah parsial terbatas. Dalam hal ini,

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \lim(s_k) = \sup\{s_k: k \in N\}$$

Bukti:

Karena $x_n > 0$, maka barisan jumlah parsial S naik monoton, yaitu

$$s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq s_k \leq \dots$$

menggunakan Teorema 2.3.4, barisan $S = (s_k)$ konvergen jika dan hanya jika barisan terbatas, dalam hal ini limitnya sama dengan $\sup\{s_k\}$.

Contoh 2.7.2

Deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konvergen.

Karena jumlah parsialnya monoton, maka cukup ditunjukkan bahwa barisan bagian (s_k) terbatas. Jika $k_1 := 2^1 - 1 = 1$, maka $s_{k_1} = 1$. Jika $k_2 := 2^2 - 1 = 3$, maka

$$s_{k_2} = \frac{1}{1} + \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}\right) < 1 + \frac{2}{2^2} = 1 + \frac{1}{2}$$

dan jika $k_3 := 2^3 - 1 = 7$, maka diperoleh

$$s_{k_3} = s_{k_2} + \left(\frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2}\right) < s_{k_2} + \frac{4}{4^2} < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}$$

menggunakan induksi matematik, diperoleh bahwa jika $k_j := 2^j - 1$, maka

$$0 < s_{k_j} < 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{j-1}$$

Karena ruas kanan merupakan jumlahan parsial dari deret geometri dengan $r = \frac{1}{2}$, maka $\lim(s_k) = \frac{1}{(1-\frac{1}{2})} = 2$. Jadi deret

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konvergen.

Teorema 2.7.8 Comparison Test

Diberikan barisan-barisan bilangan real positif $X = (x_n)$ dan $Y = (y_n)$ dan untuk suatu bilangan asli n_0 berlaku:

$$x_n \leq y_n \text{ untuk } n \geq n_0.$$

Jika $\sum y_n$ konvergen maka $\sum x_n$ konvergen

Bukti:

Jika $\sum y_n$ konvergen maka untuk setiap bilangan $\varepsilon > 0$ dapat dipilih bilangan asli $K \geq n_0$ sehingga untuk semua $m \geq n \geq K$ berlaku:

$$y_{n+1} + y_{n+2} + \dots + y_m < \varepsilon$$

karena $x_{n+1} + x_{n+2} + \dots + x_m < y_{n+1} + y_{n+2} + \dots + y_m$

maka $x_{n+1} + x_{n+2} + \dots + x_m < \varepsilon$ untuk $m \geq n \geq K$

terbukti deret $\sum(x_n)$ konvergen.

Teorema 2.7.9 Limit Comparison Test

Diberikan barisan-barisan bilangan real positif $X = (x_n)$ dan $Y = (y_n)$.

- Jika berlaku $\lim\left(\frac{x_n}{y_n}\right) \neq 0$ maka $\sum(x_n)$ konvergen jika dan hanya jika $\sum(y_n)$ konvergen.
- Jika $\lim\left(\frac{x_n}{y_n}\right) = 0$ dan $\sum(y_n)$ konvergen maka $\sum(x_n)$ konvergen.

Bukti sebagai latihan.

Teorema 2.7.10 Root Test (Uji Akar)

Diberikan $X = (x_n)$ barisan bilangan real

- Jika terdapat bilangan real positif $r < 1$ dan bilangan asli K sehingga:

$$|x_n|^{1/n} \leq r \text{ untuk } n \geq K$$

maka $\sum(x_n)$ konvergen mutlak.

b. Jika terdapat bilangan real $r > 1$ dan bilangan asli K sehingga

$$|x_n|^{1/n} \geq r \text{ untuk } n \geq K$$

maka $\Sigma(x_n)$ divergen.

Bukti sebagai latihan.

Teorema Akibat 2.7.11

Jika $0 < r < 1$ dan barisan $X = (x_n)$ memenuhi $|x_n|^{1/n} \leq r, n \geq K$ untuk suatu bilangan asli K , maka jumlah parsial s_n , dan jumlah $s = \Sigma(x_n) n \geq K$ memenuhi:

$$|s - s_n| \leq r^{n+1}/(1-r) \text{ untuk } n \geq K.$$

Bukti:

Diambil $m \geq n \geq K$, maka:

$$\begin{aligned} |s_m - s_n| &= |x_{n+1} + x_{n+2} + \dots + x_m| \leq |x_{n+1}| + |x_{n+2}| + \dots + |x_m| \\ &\leq r^{n+1} + r^{n+2} + \dots + r^m < r^{n+1}/(1-r) \end{aligned}$$

Selanjutnya diambil limit untuk $m \rightarrow \infty$, maka:

$$|s - s_n| \leq r^{n+1}/(1-r).$$

Teorema Akibat 2.7.12

Diberikan barisan bilangan real $X = (x_n)$. Jika $r = \lim(|x_n|)^{1/n}$ ada maka $\Sigma(x_n)$ konvergen mutlak bila $r < 1$ dan $\Sigma(x_n)$ divergen bila $r > 1$.

Bukti:

Jika $r = \lim(|x_n|)^{1/n} < 1$ maka dapat dipilih bilangan real $0 < r_1 < 1$ dan bilangan asli K sehingga $(|x_n|)^{1/n} < r_1$ untuk $n \geq K$.

Menurut teorema root test, deret $\Sigma(x_n)$ konvergen mutlak. Selanjutnya jika $r = \lim(|x_n|)^{1/n} > 1$ maka dapat dipilih bilangan real $r_2 > 1$ dan bilangan asli N sehingga $(|x_n|)^{1/n} < r_2$ untuk $n \geq N$. Menurut teorema root test, deret $\Sigma(x_n)$ divergen.

Teorema 2.7.13 Ratio Test (Uji Rasio)

Diberikan barisan bilangan real tak nol $X = (x_n)$.

- a. Jika terdapat bilangan $0 \leq r < 1$ dan bilangan asli K sehingga

$$|x_{n+1}| \leq r |x_n|$$

untuk $n \geq K$ maka deret $\sum(x_n)$ konvergen mutlak

- b. Jika $r \geq 1$ dan $|x_{n+1}| \geq r |x_n|$ untuk $n \geq K$ maka deret $\sum(x_n)$ divergen.

Bukti sebagai latihan.

Teorema 2.7.14 (Tes Perbandingan Limit)

Misalkan $X = (x_n)$ barisan positif naik tegas dan misalkan limit berikut ada dalam \mathbb{R} , yaitu

$$r := \lim \left(\frac{x_n}{y_n} \right).$$

- a. Jika $r \neq 0$ maka $\sum x_n$ konvergen jika dan hanya jika $\sum y_n$ konvergen
- b. Jika $r = 0$ maka $\sum y_n$ konvergen jika dan hanya jika $\sum x_n$ konvergen

Bukti:

- a. Diketahui $r := \lim \left(\frac{x_n}{y_n} \right)$ maka terdapat $K \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk $n \geq K$ berlaku $\frac{1}{2}r \leq \frac{x_n}{y_n} \leq 2r$, sehingga diperoleh

$$\left(\frac{1}{2}r \right) y_n \leq x_n \leq (2r) y_n.$$

Dengan menggunakan tes perbandingan (comparison test) dua kali, maka pernyataan (a) terbukti.

- b. Jika $r = 0$, maka terdapat $K \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga

untuk $n \geq K$ berlaku $0 < x_n \leq y_n$. Dengan menggunakan teorema tes perbandingan (comparison test) maka pernyataan (b) terbukti.

Contoh 2.7.3

Deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+n}$ konvergen

Diketahui ketaksamaan berikut benar

$$0 < \frac{1}{n^2+n} \leq \frac{1}{n^2}, \text{ untuk } n \in \mathbb{N}$$

Karena telah diketahui bahwa deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konvergen, maka dengan menggunakan tes perbandingan (comparison test) diperoleh deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+n}$ konvergen.



BAB III

LIMIT DAN KEKONTINUAN DI R

Pada bab ini dibahas mengenai konsep dasar limit fungsi dan limit sepihak. Selanjutnya, dibahas tentang konsep dasar fungsi kontinu, kekontinuan sepihak dan kekontinuan pada selang.


A. Limit fungsi di suatu titik

Misalkan $a \in \mathbb{R}$ dan f suatu fungsi bernilai real dengan daerah asal yang memuat semua titik pada interval buka $(a - h, a + h)$ kecuali hanya di titik a sendiri.


Definisi 3.1.1

Dikatakan bahwa $f(x)$ mendekati L (dimana $L \in \mathbb{R}$) apabila x mendekati a , jika diberikan $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga $|f(x) - L| < \varepsilon$ bila $0 < |x - a| < \delta$.

Dalam hal ini ditulis, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ atau $f(x) \rightarrow L$ bila $x \rightarrow a$. Perhatikan gambar berikut



Gambar 3.1 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$



Gambar 3.2 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{2}x + 1 = 3$

Contoh 3.1.1

1. Tunjukkan bahwa, $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$.

Jawab:

Analisis pendahuluan:

$$|x^2 - 4| = |x + 2| |x - 2|$$

Disini kita harus menentukan berapa besar $|x + 2|$, untuk itu dipilih $\delta \leq 1$, maka $|x - 2| < 1$ atau $x \in (1, 3)$.

Jadi $|x + 2| < 5$ apabila $|x - 2| < \delta \leq 1$. Oleh karena itu,

$$|x^2 - 4| = |x + 2| |x - 2| < 5\delta \text{ apabila } 0 < |x - 2| < \delta$$

Analisis Formal:

Ambil $\varepsilon > 0$ sebarang. Pilih $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{5}\}$. Maka jika $0 <$

$|x - 2| < \delta$ diperoleh,

$$|x^2 - 4| = |x + 2| |x - 2| < 5\delta \leq \varepsilon$$

Ini menunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$.

2. Tunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 2x) = 15$

Jawab:

Analisis pendahuluan:

$$|x^2 + 2x - 15| = |(x + 5)(x - 3)|$$

$$= |x + 5| |x - 3|$$

Untuk $\delta \leq 1$, $|x - 3| < 1$ atau $x \in (2, 4)$.

Jadi $|x + 5| < 9$ apabila $|x - 3| < \delta \leq 1$. Oleh karena itu,

$$|x^2 + 2x - 15| = |x + 5| |x - 3| < 9\delta \text{ apabila } 0 < |x - 3| < \delta$$

Analisis Formal:

Ambil $\varepsilon > 0$ sebarang. Pilih $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{9}\}$. Maka jika $0 < |x - 3| < \delta$ diperoleh,

$$|x^2 + 2x - 15| = |x + 5| |x - 3| < 9\delta \leq \varepsilon$$

Ini menunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 2x) = 15$.

Teorema 3.1.2

Misalkan $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ dan $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ maka $f(x) + g(x)$ mempunyai limit dan $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$

Bukti:

Ambil $\varepsilon > 0$ sebarang. Karena $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, maka terdapat $\delta_1 > 0$ sehingga $|f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$ apabila $0 < |x - a| < \delta_1$. Karena $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$, maka terdapat $\delta_2 > 0$ sehingga $|g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2}$ apabila $0 < |x - a| < \delta_2$. Pilih $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, maka untuk $0 < |x - a| < \delta$ dipenuhi,

$$|f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2} \text{ dan } |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Akibatnya

$$\begin{aligned} |(f(x) + g(x)) - (L + M)| &= |(f(x) - L) - (g(x) - M)| \\ &\leq |f(x) - L| + |g(x) - M| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Karena $\varepsilon > 0$ sebarang, maka $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$

Teorema 3.1.3

Misalkan $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ dan $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ maka:

- a. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = L - M$
- b. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$
- c. Jika $M \neq 0$, maka $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$

Bukti sebagai latihan

Definisi 3.1.4

Dikatakan bahwa $f(x)$ mendekati L apabila x mendekati takhingga, jika diberikan $\varepsilon > 0$, terdapat $M \in \mathbb{R}$ sehingga $|f(x) - L| < \varepsilon$ apabila $x \geq M$.

Contoh 3.1.2

Jika $f(x) = \frac{1}{x} + 1$, maka $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$.

Jawab :

Ambil $\varepsilon > 0$ sebarang

Pilih $M > \frac{1}{\varepsilon}$, maka untuk $x \geq M$ dipenuhi

$$\begin{aligned} |f(x) - 1| &= \left| \frac{1}{x} + 1 - 1 \right| \\ &= \left| \frac{1}{x} \right| \\ &\leq \left| \frac{1}{M} \right| < \varepsilon \end{aligned}$$

Ini menunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$

Definisi 3.1.5

Dikatakan bahwa $f(x)$ mendekati L apabila x mendekati a dari kanan. Jika diberikan $\varepsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sehingga $|f(x) - L| < \varepsilon$ apabila $0 < x - a < \delta$.

Dengan cara yang sama, dikatakan bahwa $f(x)$ mendekati L apabila x mendekati a dari kiri, jika diberikan $\varepsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sehingga $|f(x) - L| < \varepsilon$ apabila $0 < a - x < \delta$.

Untuk yang pertama biasa kita tulis $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ dan yang kedua kita tulis $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$. Jadi dapat disimpulkan bahwa $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ jika dan hanya jika $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$.

Contoh 3.1.3

Hitung $\lim_{x \rightarrow 2} x|x - 2|$ jika ada.

Jawab:

$$x|x - 2| = \begin{cases} x(x - 2), & \text{jika } x \geq 2 \\ -x(x - 2), & \text{jika } x < 2 \end{cases}$$

maka,

$$\lim_{2^+} x|x - 2| = \lim_{2^+} x(x - 2) = 2(2 - 2) = 0$$

$$\lim_{2^-} x|x - 2| = \lim_{2^-} -x(x - 2) = -2(2 - 2) = 0$$

Karena $\lim_{2^+} x|x - 2| = \lim_{2^-} x|x - 2|$ berarti $\lim_{x \rightarrow 2} x|x - 2|$ ada dan sama dengan nol.

Soal Latihan

1. Buktikan limit berikut dengan menggunakan definisi limit di satu titik.

a. $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$

b. $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$

Petunjuk penyelesaian:

Dengan menggunakan definisi limit yaitu dikatakan bahwa $f(x)$ mendekati L (dimana $L \in \mathbb{R}$) apabila x mendekati a , jika diberikan $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga $|f(x) - L| < \varepsilon$ bila $0 < |x - a| < \delta$.

2. Hitunglah:

a. $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 4)$

b. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$

Petunjuk penyelesaian:

- a. Dengan mensubstitusi $x = 2$ ke $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 4)$ maka akan diperoleh nilai dari $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 4)$

- b. Dengan menfaktorkan $x^2 - 16$, kemudian mensubstitusi $x = 4$ ke $\lim_{x \rightarrow 4} (x + 4)$, maka akan diperoleh nilai dari

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$$

3. Jika $f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{jika } x \leq 2 \\ 8 - x^2, & \text{jika } x > 2 \end{cases}$, hitunglah:

a. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

b. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

c. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ jika ada

Petunjuk penyelesaian:

Dengan menentukan $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ yang didekati dari kiri atau $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, dan $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ yang didekati dari kanan atau $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, maka akan diperoleh $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ jika ada

4. Jika $f(x) = 3 + |2x - 4|$, hitunglah:

a. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

b. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

c. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ jika ada

Petunjuk penyelesaian:

Dengan menentukan $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ yang didekati dari kiri atau $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, dan $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ yang didekati dari kanan atau $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, maka akan diperoleh $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ jika ada

5. Diberikan fungsi f dengan $f(x) = 2|x + 3| - \frac{x+3}{|x+3|}$. Tuliskan f dalam bentuk tanpa nilai mutlak, kemudian selidiki apakah $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ ada!

Petunjuk penyelesaian:

Dengan menyelidiki $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ untuk $x \rightarrow 3^-$ dan $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ untuk $x \rightarrow 3^+$, maka akan diperoleh $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ untuk $x \rightarrow 3$.

B. Perluasan Konsep Limit

Pada kondisi tertentu, mungkin suatu fungsi tidak memiliki limit di suatu titik tertentu, akan tetapi apabila fungsi tersebut dibatasi pada himpunan semestanya, maka fungsi tersebut memiliki limit. Contoh pada fungsi signum yaitu,

$$s(x) = \text{sgn}(x) \text{ dimana:}$$

$$s(x) = -1, x < 0$$

$$s(x) = 0, x = 0$$

$$s(x) = 1, x > 0$$

Fungsi tersebut tidak mempunyai limit di $x = 0$, tetapi jika dibatasi daerah asalnya pada $P = (0, \infty)$, maka fungsi $s(x)$ mempunyai limit di $x = 0$. Demikian pula jika dibatasi daerah asalnya pada $N = (-\infty, 0)$ fungsi $s(x)$ juga mempunyai limit di $x = 0$. Oleh karena itu, limit $s(x)$ di $x = 0$ adalah 1 dan biasa disebut limit kanan dari $s(x)$ di $x = 0$, dan selanjutnya, limit $s(x)$ di $x = 0$ adalah -1 dan biasa disebut limit kiri dari $s(x)$ di $x = 0$.

Definisi 3.2.1

Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}, f: A \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Jika $c \in \mathbb{R}$ titik kumpul dari $A \cap (c, \infty) = \{x \in A : x > c\}$, maka kita katakan bahwa L limit kanan dari f di c jika untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sehingga $|f(x) - L| < \varepsilon$ apabila $0 < x - c < \delta, x \in A$ dan kita tulis :

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

2. Jika $c \in \mathbb{R}$ titik kumpul dari $A \cap (-\infty, c) = \{x \in A : x < c\}$, maka kita katakan bahwa L limit kiri dari f di c jika untuk


setiap $\varepsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sehingga $|f(x) - L| < \varepsilon$ apabila $0 < c - x < \delta$, $x \in A$ dan kita tulis :

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$$


Contoh 3.2.1

1. $f(x) = \text{sgn}(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \text{ dan } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$$




2. $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty \text{ dan } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0.$$

$$3. f(x) = \frac{1}{e^{1/x} + 1}$$



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty \text{ dan } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$

Teorema 3.2.2

Misalkan $A \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Misalkan $c \in \mathbb{R}$ titik kumpul dari $A \cap (c, \infty) = \{x \in A : x > c\}$, maka:

1. $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L \subset \mathbb{R}$ jika dan hanya jika
2. Untuk setiap barisan (x_n) konvergen ke c sehingga $x_n \in A$ dan $x_n < c \quad \forall n \in \mathbb{N}$, maka barisan $(f(x_n))$ konvergen ke $L \subset \mathbb{R}$.

Bukti :

Misalkan $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$.

Ambil $\varepsilon > 0$ sebarang dan (x_n) barisan di $A \cap (c, \infty)$ konvergen ke c .

Pilih $\delta > 0$ sehingga $|f(x) - L| < \varepsilon$ apabila $0 < x - c < \delta$.

Karena (x_n) konvergen ke c , maka terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$, sehingga $0 < x_n - c < \delta$ apabila $n > n_0$. Oleh karena itu $|f(x_n) - L| < \varepsilon$

apabila $n > n_0$. Ini menunjukkan bahwa $(f(x_n))$ konvergen ke L . Selanjutnya misalkan (ii) dipenuhi.

Akan ditunjukkan $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$.

Andaikan tidak demikian maka terdapat $\varepsilon_0 > 0$ sehingga

$\forall \delta > 0, \exists x \in (c, c + \delta)$ sehingga $f(x) \notin (L - \varepsilon_0, L + \varepsilon_0)$.

Buat $U_n = \left(c, c + \frac{1}{n}\right)$ dan untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ pilih

$x_n \in A \cap U_n$ sehingga $f(x) \notin (L - \varepsilon_0, L + \varepsilon_0)$.

Jelas (x_n) konvergen ke c , tetapi $(f(x_n))$ tidak konvergen ke L ini bertentangan dengan (ii). Jadi haruslah $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$.

Teorema 3.2.3

Misalkan $A \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Misalkan $c \in \mathbb{R}$ titik kumpul dari $A \cap (c, \infty)$ dan $A \cap (-\infty, c)$, maka $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$.

Bukti:

Misalkan $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$.

Ambil $\varepsilon > 0$ sebarang.

Pilih $\delta > 0$ sehingga $|f(x) - L| < \varepsilon$ apabila $|x - c| < \delta$.

Untuk setiap δ ini berlaku:

(a) $|f(x) - L| < \varepsilon$ apabila $0 < x - c < \delta$, dan

(b) $|f(x) - L| < \varepsilon$ apabila $0 < c - x < \delta$.

Dari (a) berarti $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$. Dan dari (b) berarti $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$. Jadi $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$. Selanjutnya misalkan:

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x).$$

Ambil $\varepsilon > 0$ sebarang.

Karena $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$, maka terdapat $\delta_1 > 0$ sehingga

$$|f(x) - L| < \varepsilon \text{ apabila } |x - c| < \delta_1. \quad (1)$$

Karena $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$, maka terdapat $\delta_2 > 0$ sehingga

$$|f(x) - L| < \varepsilon \text{ apabila } |x - c| < \delta_2. \quad (2)$$

Pilih $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, maka untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ dengan $|x - c| < \delta$

Berlaku $|f(x) - L| < \varepsilon$. Ini berarti $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$.


C. Fungsi Kontinu di Suatu titik

Secara intuitif, fungsi f kontinu di $x = a$ jika grafik fungsi di $x = a$ tidak putus, tersambung, dan sinambung. Karena itu $f(a)$ harus didefinisikan.

Definisi 3.3.1

Andaikan f terdefinisi pada selang buka yang memuat a . Fungsi f kontinu di a , jika dan hanya jika $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sehingga $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ bila $|x - a| < \delta$

Definisi di atas ekuivalen dengan “ f kontinu di a jika dan hanya jika $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ”. Secara intuitif, f kontinu di c berarti grafik fungsi f tidak “terputus” di c .



Gambar 3.3 Fungsi kontinu di suatu titik

Seperti halnya limit sepihak, kita juga mempunyai definisi kekontinuan sepihak.

Definisi 3.3.2

1. Andaikan f terdefinisi dalam selang $[a, c)$. Fungsi f dikatakan kontinu kanan di a , jika dan hanya jika $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$, sehingga $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ bila $0 \leq x - a < \delta$
2. Andaikan f terdefinisi dalam selang $(b, a]$. Fungsi f dikatakan kontinu kiri di a , jika dan hanya jika $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$, sehingga $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ bila $0 \leq a - x < \delta$

Definisi ini menghasilkan teorema:

Teorema 3.3.3

Andaikan fungsi f terdefinisi pada selang buka I yang memuat a , fungsi kontinu di a jika dan hanya jika fungsi f kontinu kiri dan kontinu kanan di a .

Contoh 3.3.1

Fungsi $f(x) = \begin{cases} |x - 3|, & x \neq 3 \\ 0, & x = 3 \end{cases}$ kontinu di $x = 3$ karena

$$f(x) = \begin{cases} x - 3, & x > 3 \\ 3 - x, & x < 3 \\ 0, & x = 3 \end{cases} \text{ kontinu kiri dan kontinu kanan di } x = 3$$

sebagai berikut:

$f(x)$ kontinu kiri di $x = 3$, yaitu:

a. $f(3) = 0$

b. $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (3 - x) = 0$

c. $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = f(3)$

dan,

$f(x)$ kontinu kanan di $x = 3$, yaitu:


- a. $f(3) = 0$
- b. $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x - 3) = 0$
- c. $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = f(3)$

D. Fungsi Kontinu Pada Interval

Secara geometris, f kontinu di suatu titik berarti bahwa grafiknya tidak terputus di titik tersebut. Serupa dengan itu, f kontinu pada suatu interval apabila grafiknya tidak terputus pada interval tersebut. Secara intuitif, f kontinu pada suatu interval apabila kita dapat menggambar grafik fungsi f pada interval tersebut tanpa harus mengangkat pena pada kertas.

Secara formal, sebuah fungsi f dikatakan kontinu pada suatu interval buka I jika dan hanya jika f kontinu di setiap titik pada I . Fungsi f dikatakan kontinu pada interval tutup $I = [a, b]$ jika dan hanya jika f kontinu di setiap titik $c \in (a, b)$, kontinu kanan di a , dan kontinu kiri di b .

Berikut ini gambar grafik fungsi kontinu pada interval buka:



Gambar 3.4 Grafik fungsi kontinu pada interval buka


Contoh 3.4.1

Misalkan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan sebagai

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 1 \\ \frac{3}{2}, & x > 1 \end{cases}$$

Perhatikan bahwa f kontinu di setiap titik kecuali di $c = 1$. Namun f kontinu kiri di $c = 1$, dan karenanya f kontinu pada interval $[0,1]$. Karena f tidak kontinu kanan di $c = 1$, maka f tidak kontinu pada interval $[1, 2]$

Berikut ini gambar grafik fungsi kontinu pada interval tutup :



Gambar 3.5 Grafik fungsi kontinu pada interval tutup

Proposisi 3.4.2

Misalkan f terdefinisi pada suatu interval I . Maka, f kontinu pada I jika dan hanya jika, untuk setiap $x \in I$ dan setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Untuk $y \in I$ dengan $|x - y| < \delta$.

Sifat-sifat fungsi kontinu pada interval dapat dilihat pada proposisi 3.4.3 dan 3.4.4 berikut:

Proposisi 3.4.3

Misalkan f dan g kontinu pada suatu interval I dan $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Maka $\lambda f + \mu g$ dan fg kontinu pada I . Juga, jika $g(x) \neq 0$ untuk setiap $x \in I$, maka f/g kontinu pada I .

Contoh 3.4.2

1. Setiap fungsi polinom kontinu pada sebarang interval
2. Setiap fungsi rasional kontinu pada sebarang interval dalam daerah asalnya. Sebagai contoh, $f(x) = 1/x$ kontinu pada $(0, \infty)$
3. Fungsi $f(x) = x + \sqrt{x}$ kontinu pada sebarang interval $I \subseteq [0, \infty)$, karena $f_1(x) = x$ dan $f_2(x) = \sqrt{x}$ kontinu pada sebarang interval $I \subseteq [0, \infty)$.

Proposisi 3.4.4

Misalkan $g: I \rightarrow J$ kontinu pada interval I dan $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu pada interval J . Maka $f \circ g$ kontinu pada I .

Contoh 3.4.3

1. Fungsi $h(x) = |1 + x|$ kontinu pada sebarang interval, karena $f(x) = |x|$ dan $g(x) = 1 + x$ kontinu pada sebarang interval.
2. Fungsi $h(x) = \frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$ kontinu pada sebarang interval $I \subseteq [0, \infty)$.

E. Lebih Jauh Tentang Fungsi Kontinu Pada Interval

Teorema 3.5.1

Misalkan f kontinu pada interval $[a, b]$. Maka $f([a, b])$ juga merupakan suatu interval kompak.

Teorema ini merupakan konsekuensi dari beberapa teorema berikut.

Teorema 3.5.2

Misalkan f kontinu pada suatu interval I . Maka daerah nilainya, yaitu $f(I)$, juga merupakan suatu interval.

Teorema 3.5.3 (Teorema Nilai Antara)

Misalkan f kontinu pada suatu interval I yang memuat a dan b . Jika u terletak di antara $f(a)$ dan $f(b)$, maka terdapat c di antara a dan b sedemikian sehingga $f(c) = u$.

Bukti:

Asumsikan $a < b$ dan $f(a) < u < f(b)$. Tinjau himpunan $H := \{x \in [a, b] : f(x) < u\}$. Jelas bahwa $H \neq \emptyset$, karena $a \in H$. Karena H juga terbatas, maka H mempunyai supremum, sebutlah $c = \sup H$. Disini $a < c < b$. Selanjutnya tinggal membuktikan bahwa $f(c) = u$, dengan menunjukkan bahwa tidak mungkin $f(c) < u$ ataupun $f(c) > u$.

Andaikan $f(c) < u$. Karena f kontinu di c , maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $f(c + \delta/2) < u$ (?). Jadi $c + \delta/2 \in H$. Ini bertentangan dengan fakta bahwa $c = \sup H$.

Andaikan $f(c) > u$. Karena f kontinu di c , maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $f(x) > u$ untuk $c - \delta < x < c$. Jadi tidak ada satupun anggota H pada interval $(c - \delta, c]$. Ini juga bertentangan dengan fakta bahwa $c = \sup H$.

Teorema 3.5.4

Misalkan f kontinu pada interval $[a,b]$, maka f terbatas pada $[a,b]$.

Bukti:

Misalkan f tak terbatas pada $[a,b]$. Maka terdapat suatu barisan (x_n) di $[a,b]$ sedemikian sehingga

$$|f(x_n)| \rightarrow +\infty \text{ untuk } n \rightarrow \infty \quad (*)$$

Karena (x_n) terbatas, maka menurut teorema Bolzano-Weierstrass terdapat suatu sub-barisan (x_{nk}) yang konvergen ke suatu titik $c \in [a,b]$. Tetapi f kontinu di c , sehingga $f(x_{nk}) \rightarrow f(c)$ untuk $k \rightarrow \infty$. Ini bertentangan dengan $(*)$ di atas. Jadi seharusnya f kontinu di $[a,b]$.

Teorema 3.5.5

Misalkan f kontinu pada interval $[a,b]$, maka f mencapai nilai maksimum dan nilai minimum pada $[a,b]$

Bukti:

Dari Teorema 3.5.4 bahwa f terbatas pada $[a,b]$. Misalkan $v := \sup f[a,b]$. Konstruksi barisan (x_n) di $[a,b]$ dengan $f(x_n) \rightarrow v$ untuk $n \rightarrow \infty$. Karena (x_n) terbatas, terdapat sub-barisan (x_{nk}) yang konvergen ke suatu titik $c \in [a,b]$. Namun kekontinuan di c mengakibatkan $f(x_{nk}) \rightarrow f(c)$ untuk $k \rightarrow \infty$. Jadi seharusnya $v = f(c)$, dan ini berarti bahwa v merupakan nilai maksimum. Serupa dengan itu, f juga mencapai nilai minimumnya.

Contoh 3.5.1


Persamaan $10x^7 - 13x^5 - 1 = 0$ mempunyai sebuah akar $c \in (-1,0)$. Untuk menunjukkannya, misalkan $f(x) = 10x^7 - 13x^5 - 1$. Maka $f(-1) = 2$ dan $f(0) = -1$. Karena f kontinu pada $[-1,0]$ dan 0 terletak diantara $f(-1)$ dan $f(0)$, maka menurut Teorema

Nilai Antara terdapat $c \in (-1,0)$ sedemikian sehingga $f(c) = 0$. Bilangan c dalam hal ini merupakan akar persamaan di atas.


F. Kombinasi Fungsi Kontinu

Definisi 3.6.1

Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ dan misalkan $c \in A$. Dikatakan bahwa f kontinu di c , jika untuk sebarang lingkungan V dari $f(c)$, terdapat lingkungan U_V dari c sehingga $f(x) \in V$ apabila $x \in A \cap U_V$.



Gambar 3.6 Persekitaran $V_\epsilon f(c)$



Gambar 3.7 Persekitaran $V_{\delta}f(c)$

Definisi 3.6.2

Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Jika $B \subseteq A$ dikatakan bahwa f kontinu pada B jika f kontinu disetiap titik pada B .

Contoh 3.6.1

1. $y = 2x$ kontinu pada $A = [0, 1]$
2. $y = \frac{1}{x^2}$ kontinu pada $B = [1, 2]$
3. $y = e^x$ kontinu pada $C = [0, 1]$

Teorema 3.6.3

Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ dan $c \in A$ maka pernyataan berikut ekuivalen:

1. f kontinu di c
2. untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$ bila $|x - c| < \delta, x \in A$

3. untuk setiap (x_n) barisan di A konvergen di c , maka barisan $(f(x_n))$ konvergen ke $f(c)$.

Bukti sebagai latihan.

Akibat 3.6.4

Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ dan $c \in A$. Maka f tidak kontinu di c jika dan hanya jika terdapat barisan (x_n) di A yang konvergen ke c , tetapi $f(x_n)$ tidak konvergen ke $f(c)$.

Teorema 3.6.5

Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}$, f, g fungsi-fungsi pada A dan $b \in \mathbb{R}$

Misalkan $c \in \mathbb{R}$ dan f, g kontinu di c maka:

1. $f + g, f - g, fg$, dan bf kontinu di c
2. jika $h: A \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu di c dan $h(x) \neq 0$ untuk semua $x \in A$, maka $\frac{f}{h}$ kontinu di c .

Bukti:

f, g kontinu di c , maka $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ dan $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = g(c)$.

Dari Teorema 3.1.2 diperoleh:

Akibat 3.6.6

Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}$, f, g kontinu pada A dan $b \in \mathbb{R}$, maka fungsi-fungsi:

1. $f + g, f - g, fg$, dan bf kontinu pada A
2. jika $h: A \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu di c dan $h(x) \neq 0$ untuk semua $x \in A$, maka $\frac{f}{h}$ kontinu pada A .

G. Kekontinuan Seragam dan Fungsi invers

Proposisi 3.4.2 menyatakan bahwa suatu fungsi f kontinu pada sebuah interval I jika dan hanya jika untuk setiap $x \in I$

dan setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ untuk $y \in I$, dengan $|x - y| < \delta$.

Contoh 3.7.1

Diketahui bahwa $f(x) = \frac{1}{x}$ kontinu pada $(0,1]$. Diberikan $x \in (0,1]$ dan $\varepsilon > 0$ sebarang, dapat dipilih $\delta = \min \left\{ \frac{x}{2}, \frac{\varepsilon x^2}{2} \right\}$, sedemikian sehingga untuk $y \in (0,1]$ dengan $|x-y| < \delta$ berlaku

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| = \left| \frac{x-y}{xy} \right| = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y} \cdot |x - y| < \frac{1}{x} \cdot \frac{2}{x} \cdot \frac{\varepsilon x^2}{2} = \varepsilon.$$

Perhatikan bahwa jika x menuju 0, maka δ akan menuju 0.

Dalam kasus tertentu, nilai δ hanya bergantung pada ε , tidak pada x . Hal ini terjadi pada contoh, $f(x) = px + q$, $x \in \mathbb{R}$, dengan $p \neq 0$. Diberikan $\varepsilon > 0$, dapat dipilih $\delta = \frac{\varepsilon}{|p|}$ sedemikian sehingga

$$|f(x) - f(y)| = |p| \cdot |x - y| < \varepsilon$$

untuk $x,y \in \mathbb{R}$ dengan $|x - y| < \delta$. Kekontinuan $f(x) = px + q$ dalam hal ini merupakan kekontinuan seragam.

Fungsi $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ dikatakan kontinu seragam pada I apabila untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

untuk $x,y \in I$ dengan $|x - y| < \delta$. Perhatikan bahwa dalam definisi di atas x dan y muncul setelah δ , yang mengindikasikan bahwa δ tidak bergantung pada x (dan y).

Teorema 3.7.1

Fungsi $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ tidak kontinu seragam pada I jika dan hanya jika terdapat $\varepsilon_0 > 0$ dan dua barisan (x_n) dan (y_n) di I sedemikian sehingga $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ dan $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

Bukti sebagai latihan

Teorema 3.7.2

Jika f kontinu pada $[a,b]$, maka f kontinu seragam pada $[a,b]$

Bukti:

Andaikan f tidak kontinu seragam pada $[a,b]$. Maka, menurut Teorema 3.6.1, terdapat $\varepsilon_0 > 0$ dan dua barisan (x_n) dan (y_n) di $[a,b]$ sedemikian sehingga $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ dan $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Karena (x_n) terbatas di $[a,b]$, maka menurut Teorema Bolzano-Weierstrass terdapat sub-barisan (x_{nk}) yang konvergen, sebutlah ke $c \in [a,b]$. Karena $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, maka sub-barisan (y_{nk}) akan konvergen ke c juga. Selanjutnya, karena f kontinu di c , maka $(f(x_{nk}))$ dan $(f(y_{nk}))$ konvergen ke $f(c)$. Akibatnya, $|f(x_{nk}) - f(y_{nk})| \rightarrow 0$ untuk $k \rightarrow \infty$. Ini tidak mungkin karena $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

Untuk menentukan apakah suatu fungsi kontinu itu kontinu seragam atau tidak, ini cukup sulit apabila pembahasannya tidak pada himpunan tertutup. Namun demikian kondisi suatu fungsi dipenuhi, maka fungsi tersebut adalah kontinu seragam.

Definisi 3.7.3

Misalkan $A \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ terdapat suatu konstan $K > 0$ sehingga

$$|f(x) - f(c)| \leq K|x - c| \text{ untuk semua } x, c \text{ di } A$$

Maka f disebut sebagai fungsi Lipschitz.

Teorema 3.7.4

Jika $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi Lipschitz, maka f kontinu seragam.

Bukti:

Ambil $\delta = \frac{\varepsilon}{K}$, maka untuk x, c di A dengan $|x - c| < \delta$ diperoleh

$$|f(x) - f(c)| \leq K|x - c|$$

$$< K \cdot \delta = K \frac{\varepsilon}{K} = \varepsilon.$$

Teorema ini tidak berlaku sebaliknya, yaitu suatu fungsi yang kontinu seragam pada A belum tentu suatu fungsi Lipschitz.

Contoh 3.7.2

Fungsi $y = \sqrt{x}$ pada $[0, 1]$. Fungsi ini kontinu pada $[0,1]$, dan karena $[0,1]$ tertutup maka menurut Teorema 3.7.2, $f(x)$ kontinu seragam, tetapi tidak memenuhi kondisi fungsi Lipschitz, yaitu bila diambil $c = 0$.

$$|f(x) - f(0)| = |\sqrt{x} - \sqrt{0}| = \sqrt{x}.$$

Nilai ini harus lebih kecil dari $K \cdot |x - c| = K \cdot x$.

Jika ditentukan $K > 0$, maka untuk $x \in [0,1]$ dengan $x = \frac{1}{2K^2}$,

diperoleh:

$$|f(x) - f(0)| = \sqrt{x} \leq K \cdot |x - c|$$

$$\sqrt{x} \leq K \cdot x$$

$$\frac{1}{K\sqrt{2}} \leq K \frac{1}{2K^2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \leq \frac{1}{2} \text{ ini suatu kontradiksi.}$$

Jadi $f(x) = \sqrt{x}$ pada $[0,1]$

Pada pembahasan ini akan diuraikan suatu syarat agar suatu fungsi kontinu mempunyai invers pada interval $I \subset \mathbb{R}$. Suatu fungsi mempunyai invers pada selang I apabila f injektif (satu-satu) pada I, yaitu x, y di I, $x \neq y$ maka $f(x) \neq f(y)$. Oleh karena itu agar suatu fungsi kontinu pada I mempunyai invers, maka f harus monoton naik atau monoton turun. Selanjutnya akan diberikan teorema untuk fungsi invers:

Teorema 3.7.5

Misalkan $I \subset \mathbb{R}$ interval dan $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi kontinu monoton naik, maka fungsi g yaitu invers dari f kontinu monoton naik pada $J = f(I)$.

Bukti sebagai latihan.



BAB IV

TURUNAN FUNGSI

Pada bab ini dibahas mengenai pengertian turunan, sifat-sifat aljabar turunan fungsi, turunan fungsi invers, turunan tingkat tinggi, dan Teorema Nilai Rata-rata.

A. Pengertian Turunan

Pengertian turunan fungsi $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ di titik $c \in [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ dapat dijelaskan dalam definisi berikut.

Definisi 4.1.1

Diberikan interval $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$, fungsi $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, dan $c \in [a, b]$. Bilangan real L disebut turunan fungsi f di titik c , jika diberikan sembarang bilangan $\varepsilon > 0$ terdapat bilangan $\delta > 0$ sehingga untuk setiap $x \in [a, b]$ dengan sifat $0 < |x - c| < \delta$ berlaku:

$$\left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - L \right| < \varepsilon$$

Dalam hal ini fungsi f dikatakan terdiferensial (diferensiabel) di titik c dan ditulis $f'(c)=L$. Dengan kata lain, turunan fungsi f di titik c dapat dinyatakan sebagai limit:

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \text{ jika limitnya ada.}$$

Secara umum, konsep turunan dikenakan pada suatu fungsi yang terdefinisi pada suatu interval. Jika turunan fungsi $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ada di titik $c \in [a, b]$, maka nilainya dinotasikan dengan $f'(c)$. Dalam kasus fungsi f' , sudah terbiasa untuk memandang f' sebagai fungsi dari x .

Contoh 4.1.1

Diberikan fungsi bernilai real f yang didefinisikan dengan

$f(x) = x^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Untuk sembarang $c \in \mathbb{R}$, diperoleh:

$$\begin{aligned} f'(c) &= \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \\ &= \lim_{x \rightarrow c} \frac{x^2 - c^2}{x - c} \\ &= \lim_{x \rightarrow c} (x + c) \\ &= 2c \end{aligned}$$

Jadi dalam kasus ini, fungsi f' terdefinisi pada \mathbb{R} dan $f'(x) = 2x, \forall x \in \mathbb{R}$.

Teorema 4.1.2

Diberikan interval $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$. Jika fungsi $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ terdiferensialkan (mempunyai turunan) di titik $c \in [a, b]$, maka fungsi f kontinu di titik c .

Bukti:

Ambil sembarang $x \in [a, b]$, dengan $x \neq c$. Perhatikan bahwa

$$f(x) - f(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Berdasarkan hipotesis bahwa fungsi f terdiferensial atau f' ada, maka dengan menerapkan operator dan sifat aljabar limit fungsi diperoleh

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow c} f(x) - \lim_{x \rightarrow c} f(c) &= \lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \right) \lim_{x \rightarrow c} (x - c) \\ \lim_{x \rightarrow c} f(x) - \lim_{x \rightarrow c} f(c) &= f'(c) \cdot 0 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

Oleh karena $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ maka terbukti f kontinu di c .

Contoh 4.1.2

Diberikan fungsi bernilai real f yang didefinisikan dengan:

$$f(x) = |x|, \forall x \in \mathbb{R}$$

Tunjukkan bahwa fungsi tersebut kontinu di 0. Selanjutnya tunjukkan bahwa $f'(0)$ tidak ada.

Jadi kekontinuan fungsi di suatu titik tidaklah menjadi syarat cukup eksistensi turunan fungsi di titik tersebut.

B. Sifat-sifat Aljabar Turunan Fungsi

Teorema 4.2.1

Diberikan interval $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$, $c \in [a, b]$, serta fungsi $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dan fungsi $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ keduanya terdiferensial di titik c .

- Untuk setiap $\alpha \in \mathbb{R}$, fungsi αf terdiferensial di titik c , dan $(\alpha f)'(c) = \alpha f'(c)$
- Fungsi $f + g$ terdiferensial di titik c , dan $(f + g)'(c) = f'(c) + g'(c)$
- Fungsi $f g$ terdiferensial di titik c , dan $(fg)'(c) = f'(c)g(c) + f(c)g'(c)$
- Jika $g(c) \neq 0$ maka fungsi $\frac{f}{g}$ terdiferensial di titik c , dan

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \frac{f'(c)g(c) - f(c)g'(c)}{(g(c))^2}$$

Bukti:

Ambil sembarang interval $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$, dan $c \in [a, b]$. Diketahui fungsi $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dan fungsi

$g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ keduanya terdiferensial di titik c .

- Misalkan $h = \alpha f$, maka untuk setiap $x \in [a, b]$ dengan $x \neq c$ diperoleh

$$\frac{h(x) - h(c)}{x - c} = \frac{\alpha f(x) - \alpha f(c)}{x - c}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow c} \frac{h(x) - h(c)}{x - c} &= \lim_{x \rightarrow c} \frac{\alpha f(x) - \alpha f(c)}{x - c} \\ h'(c) &= \alpha \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \\ &= \alpha f'(c)\end{aligned}$$

Karena $h = \alpha f$, maka diperoleh $(\alpha f)'(c) = \alpha f'(c)$.

- b. Bukti sebagai latihan.
c. Misalkan $h = fg$, maka untuk setiap $x \in [a, b]$ dengan $x \neq c$ diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{h(x)-h(c)}{x-c} &= \frac{fg(x)-fg(c)}{x-c} \\ &= \frac{f(x)g(x)-f(c)g(c)}{x-c} \\ &= \frac{f(x)g(x)-f(c)g(x)+f(c)g(x)-f(c)g(c)}{x-c} \\ &= \frac{f(x)-f(c)}{x-c} g(x) + f(c) \frac{g(x)-g(c)}{x-c} \\ \lim_{x \rightarrow c} \frac{h(x)-h(c)}{x-c} &= \lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f(x)-f(c)}{x-c} g(x) + f(c) \frac{g(x)-g(c)}{x-c} \right) \\ h'(c) &= \lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f(x)-f(c)}{x-c} g(x) \right) + \lim_{x \rightarrow c} \left(f(c) \frac{g(x)-g(c)}{x-c} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f(x)-f(c)}{x-c} \right) \lim_{x \rightarrow c} g(x) + \lim_{x \rightarrow c} f(c) \lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{g(x)-g(c)}{x-c} \right) \\ &= f'(c)g(c) + f(c)g'(c)\end{aligned}$$

Karena $h = fg$, maka diperoleh $(fg)'(c) = f'(c)g(c) + f(c)g'(c)$

- d. Misalkan $h = \left(\frac{f}{g}\right)$ dan $g \neq 0$, maka untuk setiap $x \in [a, b]$ dengan $x \neq c$ diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{h(x)-h(c)}{x-c} &= \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x)-\left(\frac{f}{g}\right)(c)}{x-c} \\ &= \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(c)}{g(c)}}{x-c} = \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(c)}{g(c)}}{x-c} \\ &= \frac{\left(\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(c)}{g(c)}\right)g(x)g(c)}{(x-c)g(x)g(c)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{f(x)g(c)-f(c)g(x)}{(x-c)g(x)g(c)} = \frac{f(x)g(c)-f(c)g(c)+f(c)g(c)-f(c)g(x)}{(x-c)g(x)g(c)} \\
&= \left[\left(\frac{f(x)-f(c)}{(x-c)} \right) g(c) - f(c) \left(\frac{g(x)-g(c)}{(x-c)} \right) \right] \frac{1}{g(x)g(c)} \\
\lim_{x \rightarrow c} \frac{h(x)-h(c)}{x-c} &= \lim_{x \rightarrow c} \left[\left(\frac{f(x)-f(c)}{(x-c)} \right) g(c) - \right. \\
&\left. f(c) \left(\frac{g(x)-g(c)}{(x-c)} \right) \right] \lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{g(x)g(c)} \\
h'(c) &= [f'(c)g(c) - f(c)g'(c)] \frac{1}{g(x)g(c)}
\end{aligned}$$

Karena $h = \frac{f}{g}$, maka diperoleh

$$\left(\frac{f}{g} \right)'(c) = \frac{f'(c)g(c) - f(c)g'(c)}{(g(c))^2}$$

Dengan menggunakan induksi matematika, aturan-aturan pendiferensialan dapat diperluas yang secara ringkas diberikan pada akibat berikut.

Akibat 4.2.2

Jika $f_1, f_2, f_3, \dots, f_n$ masing-masing fungsi dari $[a, b] \subseteq \text{ke } \mathbb{R}$ dan terdiferensial di $c \in [a, b]$, maka

a. fungsi $f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_n$ terdiferensial di titik c , dan

$$(f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_n)'(c) = f_1'(c) + f_2'(c) + f_3'(c) + \dots + f_n'(c)$$

b. fungsi $f_1 f_2 f_3 \dots f_n$ terdiferensial di titik c , dan

$$\begin{aligned}
(f_1 f_2 f_3 \dots f_n)'(c) &= f_1'(c)f_2(c)f_3(c) \dots f_n(c) &+ \\
&f_1(c)f_2'(c)f_3(c) \dots f_n(c) &+ \\
&f_1(c)f_2(c)f_3'(c) \dots f_n(c) &+ \\
&f_1(c)f_2(c)f_3(c) \dots f_n'(c) &(*)
\end{aligned}$$

Jika pada (*) fungsi-fungsinya sama, yaitu $f_1 = f_2 = f_3 = \dots = f_n = f$ maka pada (*) berlaku

$$(f^n)'(c) = n f'(c) (f(c))^{n-1} \quad (**)$$

Teorema 4.2.3 (Aturan Rantai)

Diberikan interval $[a, b]$ dan $[c, d]$ keduanya interval di dalam \mathbb{R} , $g: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ dan $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ keduanya fungsi dengan

sifat $f([a,b]) \subseteq [c,d]$ dan $c^* \in [a,b]$. Jika fungsi f terdiferensial di titik c^* dan fungsi g terdiferensial di titik $f(c^*)$, maka fungsi komposisi $g \circ f$ terdiferensial di titik c^* , dan $(g \circ f)'(c^*) = g'(f(c^*))f'(c^*)$.

Bukti:

Misalkan $e = f(c^*)$, oleh karena g terdiferensial di $f(c^*)$ maka $g'(e)$ ada. Selanjutnya didefinisikan fungsi bernilai real G yang *well-defined* pada $[c,d]$ dengan

$$G(x) = \begin{cases} \frac{g(y) - g(e)}{y - e}, & y \neq e \\ g'(e) & , y = e \end{cases}$$

Oleh karena fungsi g terdiferensial di $e = f(c^*)$, maka

$$\lim_{y \rightarrow e} G(y) = \lim_{y \rightarrow e} \frac{g(y) - g(e)}{y - e} = g'(e) = G(e).$$

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi G kontinu di $e = f(c^*)$.

Selanjutnya karena fungsi G kontinu di $e = f(c^*)$, fungsi f di kontinu di c^* dan $f([a,b]) \subseteq [c,d]$, maka berdasarkan teorema kekontinuan komposisi fungsi-fungsi kontinu, diperoleh $G \circ f$ kontinu di c^* , sehingga

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow c^*} (G \circ f)(x) &= \lim_{x \rightarrow c^*} G(f(x)) = G(f(c^*)) = G(e) = g'(e) \\ &= g'(f(c^*)) \end{aligned}$$

Dari definisi fungsi G , dapat ditulis

$$g(y) - g(e) = G(y)(y - e), \quad \forall y \in [c, d]$$

Oleh karenanya, jika $x \in [a, b]$ dengan $x \neq c^*$, dan $f(x)=y$, diperoleh

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) - (g \circ f)(c^*) &= g(f(x)) - g(f(c^*)) \\ &= g(y) - g(e) \\ &= G(y)(y - e) \\ &= G(f(x))[f(x) - f(c^*)] \\ &= (G \circ f)(x)[f(x) - f(c^*)] \end{aligned}$$

$$\frac{(g \circ f)(x) - (g \circ f)(c^*)}{x - c^*} = (G \circ f)(x) \frac{[f(x) - f(c^*)]}{x - c^*}$$

Selanjutnya untuk $x \neq c^*$ dan dengan menerapkan operator limit, diperoleh

$$\frac{(g \circ f)(x) - (g \circ f)(c^*)}{x - c^*} = (G \circ f)(x) \frac{[f(x) - f(c^*)]}{x - c^*}$$

$$(g \circ f)'(c^*) = g'(f(c^*))f'(c^*).$$

Dengan demikian bukti telah lengkap.

Dalam kuliah kalkulus integral sering dijumpai, notasi $Df = f'$. Oleh karenanya aturan rantai

$$(g \circ f)'(c^*) = g'(f(c^*))f'(c^*)$$

Dapat pula ditulis

$$D(g \circ f) = (D(g) \circ f)Df$$

Contoh 4.2.1

1. Diberikan interval $[a, b] \subseteq R$, jika fungsi $f: [a, b] \rightarrow R$ terdiferensial pada $[a, b]$ dan $g(y) = y^n \forall y \in R, n \in N$
 $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (f(x))^n$.

Oleh karenanya berdasarkan Teorema 4.2.3 diperoleh

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x), \quad \forall x \in [a, b]$$

$$D(f(x))^n = g'(f(x))f'(x) \quad (*)$$

Dapat dimengerti bahwa, jika $g(y) = y^n$ maka $g'(y) = ny^{n-1}$, oleh karenanya dari (*) diperoleh

$$D(f(x))^n = n(f(x))^{n-1} f'(x).$$

Misalkan $f(x) = 2x$, maka $D((2x)^n) = 2n(2x)^{n-1}$.

2. Diberikan interval $[a, b] \subseteq R$, jika fungsi $f: [a, b] \rightarrow R$ terdiferensial pada $[a, b]$ dengan sifat $f(x) \neq 0$ dan $f'(x) \neq 0$ untuk setiap $x \in [a, b]$. Jika $h(y) = \frac{1}{y}, y \neq$

0, dapat dimengerti bahwa $h'(y) = -\frac{1}{y}, y \neq 0$. Oleh karenanya diperoleh

$$\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = (h \circ f)'(x) = h'(f(x))f'(x) = -\frac{f'(x)}{(f(x))^2}$$

3. Jika $f(x) = \sin x$, maka $f'(x) = \cos x$ untuk setiap $x \in R$ dan Jika $g(x) = \cos x$, maka $g'(x) = -\sin x$ untuk setiap $x \in R$.

Dengan menggunakan sifat aljabar turunan, yaitu aturan pembagian untuk setiap $x \in R$ dengan $x \neq \frac{(2k+1)\pi}{2}$ untuk k bilangan bulat, selanjutnya diperoleh

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$$

Jadi

$$h'(x) = D \tan x = \frac{\cos x \cos x - (\sin x)(-\sin x)}{\cos^2 x}$$

$$D \tan x = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$$

Demikian halnya untuk setiap $x \in R$ dengan $x \neq \frac{(2k+1)\pi}{2}$ untuk k bilangan bulat, diperoleh

$$\begin{aligned} D \sec x &= D\left(\frac{1}{\cos x}\right) = \frac{0 \cdot \cos x - 1 \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \sec x \tan x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D \cot x &= D\left(\frac{\cos x}{\sin x}\right) = \frac{-\sin x \sin x - \cos x \cos x}{\sin^2 x} \\ &= \frac{-(\sin^2 x + \cos^2 x)}{\sin^2 x} \\ &= \frac{-1}{\sin^2 x} = -\csc^2 x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 D \csc x &= D \left(\frac{1}{\sin x} \right) = \frac{0 \cdot \sin x - 1 \cdot \cos x}{\sin^2 x} = \frac{-\cos x}{\sin^2 x} \\
 &= -\frac{1}{\sin x} \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = -\csc x \cot x
 \end{aligned}$$

4. Diberikan suatu fungsi yang didefinisikan sebagai berikut.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Jika digunakan sifat aljabar turunan, yaitu aturan perkalian titik (*dot product*) pada Teorema 4.2.1 bagian c dan aturan rantai (Teorema 4.2.3) diperoleh

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, \quad x \neq 0$$

Jika $x = 0$ tak satupun dari aturan kalkulus dapat digunakan. Konsekuensinya untuk mencari turunan di titik 0 digunakan definisi, sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}
 f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Jadi turunan f , yaitu f' ada dimana-mana. Namun fungsi f' tidak punya limit di $x=0$, oleh karenanya f' diskontinu di titik 0. Dengan demikian, suatu fungsi yang terdiferensial di mana-mana, tidaklah selalu mempunyai fungsi turunan yang kontinu.

C. Turunan fungsi Invers

Pada bagian ini dipaparkan hubungan turunan suatu fungsi dengan turunan inversnya, jika fungsi yang bersangkutan mempunyai invers. Pada bagian ini pembahasan hanya dibatasi pada fungsi kontinu yang monoton tegas.

Teorema 4.3.1

Diberikan interval $[a, b] \subseteq R$, dan $f: [a, b] \rightarrow R$ fungsi monoton tegas (*strictly monotone*) dan kontinu pada $[a, b]$. Diberikan $[c, d] = f([a, b])$ dan $g: [c, d] \rightarrow R$ invers fungsi f yang monoton tegas dan kontinu. Jika fungsi f terdiferensial di titik $c^* \in [a, b]$ dan $f'(c) \neq 0$, maka fungsi g terdiferensial di titik $e = f(c^*)$, lebih lanjut

$$g'(e) = \frac{1}{f'(c^*)} = \frac{1}{f'(g(e))}$$

Bukti:

Ambil sembarang $y \in [c, d]$ dengan $y \neq e$, selanjutnya didefinisikan fungsi $H: [c, d] \rightarrow R$ dengan

$$H(y) = \frac{f(g(y)) - f(g(e))}{g(y) - g(e)}$$

Diketahui g monoton tegas, selanjutnya mudah dimengerti bahwa untuk setiap $y \in [c, d]$ dengan $y \neq e$, maka $g(y) \neq g(e)$, dengan kata lain $H: [c, d] \rightarrow R$ well-define. Demikian halnya jika $y = f(g(y))$ dan $e = f(g(e))$ maka berdasarkan definisi fungsi H diperoleh

$$H(y) = \frac{y - e}{g(y) - g(e)}$$

Mudah dibuktikan bahwa untuk setiap $y \in [c, d]$ dengan $y \neq e$, maka $H(y) \neq 0$. Selanjutnya dibuktikan bahwa

$$\lim_{y \rightarrow e} H(y) = f'(c^*)$$

Diberikan bilangan $\varepsilon > 0$ dan jika f terdiferensial di $c^*=g(e)$, maka terdapat bilangan $\delta > 0$ sehingga untuk setiap $x \in [a, b]$ dengan sifat $0 < |x - c^*| < \delta$ berlaku

$$\left| \frac{f(x) - f(c^*)}{x - c^*} - f'(c^*) \right| < \varepsilon$$

Diketahui g kontinu di titik $e = f'(c^*)$, artinya untuk setiap bilangan $\delta > 0$ terdapat bilangan $\eta > 0$ sehingga untuk setiap $y \in [c, d]$ dengan $0 < |y - e| < \eta$ maka berlaku

$$|g(y) - g(e)| < \delta$$

Karena g fungsi invers dari f , maka g bijektif, dengan kata lain g injektif dan surjektif. G injektif dan $c^*=g(e)$, maka dari pembahasan sebelumnya, diperoleh; jika $0 < |y - e| < \eta$ maka $|g(y) - g(e)| = |g(y) - c^*| < \delta$ untuk setiap $y \in [c, d]$.

Oleh karenanya untuk setiap $y \in [c, d]$ dengan $0 < |y - e| < \eta$ berakibat

$$|H(y) - f'(c^*)| = \left| \frac{f(g(y)) - f(g(e))}{g(y) - g(e)} - f'(c^*) \right| < \varepsilon$$

Untuk sebarang $\varepsilon > 0$. Jadi $\lim_{y \rightarrow e} H(y) = f'(c^*)$.

Perhatikan bahwa karena $y \neq e$ maka $H(y) = \frac{y-e}{g(y)-g(e)} \neq 0$, sehingga diperoleh $\frac{g(y)-g(e)}{y-e} = \frac{1}{H(y)}$.

Dapat disimpulkan, untuk setiap $y \in [c, d]$ dengan $y \neq e$, berlaku

$$g'(e) = \lim_{y \rightarrow e} \frac{g(y) - g(e)}{y - e} = \lim_{y \rightarrow e} \frac{1}{H(y)} = \frac{1}{\lim_{y \rightarrow e} H(y)} = \frac{1}{f'(c^*)}$$

Terbukti

$$g'(e) = \frac{1}{f'(c^*)} = \frac{1}{f'(g(e))}$$

Teorema 4.3.2

Diberikan interval $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$, dan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi monoton tegas (*stricly monotone*) pada $[a, b]$. Diberikan $[c, d] = f([a, b])$ dan $g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ invers fungsi f . Jika fungsi f terdiferensial pada $[a, b]$ dan $f'(c^*) \neq 0$ untuk setiap $x \in [a, b]$, maka fungsi g terdiferensial pada $[c, d]$, lebih lanjut

$$g'(y) = \frac{1}{(f' \circ g)(y)} = \forall y \in [c, d].$$

Bukti teorema diserahkan kepada pembaca sebagai latihan.

Contoh 4.3.1

1. Diberikan $n \in \mathbb{N}$ dengan n genap, $I = [0, \infty)$ dan fungsi bernilai real $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan dengan $f(x) = x^n, \forall x \in I$, dapat dibuktikan bahwa fungsi f naik tegas dan kontinu pada I . Sehingga fungsi inversnya ada pada I , sehingga fungsi inversnya ada, yaitu $g(y) = y^{1/n}, \forall y \in [0, \infty)$. Fungsi g naik tegas dan kontinu pada $[0, \infty)$. Lebih lanjut diperoleh $f'(x) = nx^{n-1}, \forall x \in I$. Oleh karenanya jika $y > 0$, maka $g(y) = y^{1/n}$ ada, dan

$$g'(y) = \frac{1}{(f' \circ g)(y)} = \frac{1}{n \left(y^{\frac{1}{n}} \right)^{n-1}} = \frac{1}{n \left(y^{\frac{n-1}{n}} \right)}$$

Dengan kata lain

$$g'(y) = \frac{1}{n} y^{-\left(\frac{n-1}{n}\right)} = \frac{1}{n} y^{\frac{1}{n}-1}$$

Untuk $y > 0$, akan tetapi g tak terdiferensial di titik 0.

2. Diberikan $n \in \mathbb{N}$, n ganjil dengan sifat $n \neq 1$, dan dua fungsi bernilai real F dan G berturut-turut didefinisikan dengan

$$F(x) = x^n, \forall x \in \mathbb{R}$$

dan

$$G(y) = y^{\frac{1}{n}}, \forall y \in \mathbb{R}$$

Dapat dipahami bahwa G merupakan fungsi invers F .

Berdasarkan nomor 1 telah ditemukan

$$G'(y) = \frac{1}{n} y^{-\left(\frac{n-1}{n}\right)} = \frac{1}{n} y^{\frac{1}{n}-1}$$

Untuk $y \neq 0$ dan G tak terdiferensial di titik 0, akan tetapi terdiferensial di titik-titik lain.

Soal Latihan

1. Gunakan definisi turunan fungsi untuk mencari turunan beberapa fungsi bernilai real berikut

a. $f(x) = x^3, x \in R$

b. $g(x) = \frac{1}{x}, x \in R - \{0\}$

c. $h(x) = \sqrt{x}, x \in (0, \infty)$

d. $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, x \in (0, \infty)$

Petunjuk penyelesaian:

Dengan menggunakan definisi turunan fungsi yaitu

Turunan f di c dapat di tulis:

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \text{ asalkan limitnya ada.}$$

Maka f di katakan terdiferensialkan di c

2. Diberikan fungsi $f: R \rightarrow R$ didefinisikan dengan

$$f(x) \begin{cases} x^2, & x \text{ rasional} \\ 0, & x \text{ irrasional} \end{cases}$$

Buktikan bahwa f terdiferensial di titik $x = 0$ dan tentukan $f'(0)$.

Petunjuk penyelesaian:

Dengan menggunakan definisi turunan fungsi yaitu:

Turunan f di c dapat di tulis:

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \text{ asalkan limitnya ada.}$$

Maka f di katakan terdiferensialkan di c

3. Jika $f(x) = x^2$ untuk $x \in R$, tentuka $f'(c)$!

Petunjuk penyelesaian:

Dengan menggunakan definisi turunan fungsi maka diperoleh:

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{x^2 - c^2}{x - c}$$

$$= \lim_{x \rightarrow c} (x + c) = 2c$$

4. Menggunakan aturan rantai, tentukan turunan beberapa fungsi bernilai real berikut

a. $f(x) = \frac{x}{1+x^2}, x \in \mathbb{R}$

b. $g(x) = \sqrt{5 - 2x + x^2}, x \in \mathbb{R}$

c. $h(x) = (\sin x^k)^m, m, k \in \mathbb{N}$

d. $\varphi(x) = \tan x^2, |x| < \sqrt{\frac{\pi}{2}}$

Petunjuk Penyelesaian:

Dengan menggunakan rumus untuk aturan rantai maka turunan fungsi di atas dapat diselesaikan. Aturan rantai dapat di tuliskan:

$$\frac{g(f(x)) - g(f(c))}{x - c} = \frac{g(f(x)) - g(f(c))}{f(x) - f(c)} \cdot \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Jika $f(x) \neq f(c)$.

5. Tunjukkan $f(x) = x^{1/3}, x \in \mathbb{R}$ apakah terdiferensialkan di $x = 0$!

Petunjuk penyelesaian:

Dengan menggunakan definisi turunan fungsi yaitu:

Turunan f di c dapat di tulis:

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \text{ asalkan limitnya ada.}$$

Maka f di katakan terdiferensialkan di c .

D. Turunan Tingkat Tinggi

Jika f mempunyai turunan disetiap titik dalam suatu interval terbuka I , maka dikatakan f mempunyai turunan pada I . Dalam hal ini turunan dari f , yaitu f' , merupakan fungsi yang juga terdefinisi pada I .

Selanjutnya mendefinisikan turunan kedua dari f sebagai turunan dari f' , yang nilainya di c adalah

$$f''(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x) - f'(c)}{x - c}$$

asalkan limit ini ada.

Turunan kedua dari f berkaitan dengan kecekungan grafik fungsi f . Jika f'' bernilai positif pada suatu interval, maka grafik fungsi f cekung ke atas pada interval tersebut. Sementara jika f'' bernilai negatif pada suatu interval, maka grafik fungsi f cekung ke bawah pada interval tersebut.

Setelah mendefinisikan turunan pertama dan kedua maka turunan ketiga dan turunan selanjutnya dapat didefinisikan secara serupa. Secara umum, $f^{(n)}(x)$ menyatakan turunan ke- n , $n \in N$ dari f .

Contoh 4.4.1

Jika $f(x) = 2x^3$, maka

$$f'(x) = 6x^2$$

$$f''(x) = 12x$$

$$f'''(x) = 12$$

dan seterusnya.

Contoh 4.4.2

Misalkan $f(x) = 4x^4 + 5x^3 + 2x^2 + x + 10$, maka

$$f'(x) = 16x^3 + 15x^2 + 4x + 1$$

$$f''(x) = 48x^2 + 30x + 4$$

$$f'''(x) = 96x + 30$$

Soal Latihan

1. Tentukan pada interval mana grafik fungsi $f(x) = x^3$ cekung ke atas dan pada interval mana cekung ke bawah!

Petunjuk penyelesaian:

Dengan mendefinisikan turunan kedua dari f sebagai turunan dari f' , yang nilainya di c adalah

$$f''(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} \text{ asalkan limit ini ada.}$$

Selanjutnya, turunan kedua dari f berkaitan dengan kecekungan grafik fungsi f . Jika f'' bernilai positif pada suatu interval, maka grafik fungsi f cekung ke atas pada interval tersebut. Sementara jika f'' bernilai negatif pada suatu interval, maka grafik fungsi f cekung ke bawah pada interval tersebut.

2. Diketahui $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Tentukan $f'(x)$, $f''(x)$ dan $f'''(x)$.

Petunjuk penyelesaian:

Dengan mendefinisikan turunan kedua dari f sebagai turunan dari f' , yang nilainya di c adalah

$$f''(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} \text{ asalkan limit ini ada.}$$

Selanjutnya dengan cara yang sama di selesaikan untuk f''' .

3. Berikan contoh sebuah fungsi yang mempunyai turunan pertama tetapi tidak mempunyai turunan kedua di 0.

E. Teorema Nilai Rata-rata


1. Maksimum dan Minimum Lokal

Misalkan f terdefinisi pada suatu interval terbuka (a,b) dan $c \in (a,b)$. Dikatakan bahwa f mencapai nilai maksimum dan minimum lokal di c apabila

$$f(x) \leq f(c)$$

untuk setiap x dalam suatu interval terbuka I yang memuat c . Titik c dalam hal ini disebut sebagai titik maksimum lokal.

Definisi untuk nilai dan titik minimum lokal analog dengan definisi di atas.



Gambar 4.1 f mencapai nilai maksimum lokal di c

Secara intuitif, f mencapai nilai maksimum lokal di c apabila grafiknya mempunyai sebuah “puncak” di atas titik c . Sejalan dengan itu, f mencapai nilai minimum lokal di c apabila grafiknya mempunyai sebuah “lembah” di atas titik c .

Jika $f(c)$ merupakan nilai maksimum f pada seluruh interval (a,b) , maka tentunya f mencapai nilai maksimum lokal di c . Namun sebaliknya belum tentu benar, nilai maksimum lokal belum tentu merupakan nilai maksimum f .

Teorema 4.5.1

Misalkan f mempunyai turunan pada (a,b) dan $c \in (a,b)$. Jika f mencapai nilai maksimum atau minimum lokal di c , maka $f'(c) = 0$.

Bukti:

Menurut definisi turunan $\frac{f(x)-f(c)}{x-c} \rightarrow f'(c)$ untuk $x \rightarrow c$.

Misalkan $f'(c) > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$\frac{f(x)-f(c)}{x-c} > 0 \quad (*)$$

untuk $x \in (c - \delta, c + \delta)$, $x \neq c$. Sekarang misalkan $x \in (c, c + \delta)$ sembarang. Maka, $x - c > 0$ dan (*) memberikan $f(x) - f(c) > 0$ atau $f(x) > f(c)$. Jadi f tidak mungkin mencapai nilai maksimum lokal di c . Selanjutnya misalkan $x \in (c - \delta, c)$ sembarang. Maka, $x - c < 0$ dan (*) memberikan $f(x) - f(c) < 0$ atau $f(x) < f(c)$. Jadi f juga tidak mungkin mencapai nilai minimum lokal di c .

Hal serupa terjadi ketika $f'(c) < 0$. Jadi, jika $f'(c) \neq 0$, maka f tidak akan mencapai nilai maksimum atau minimum lokal di c .

2. Titik Stasioner

Titik c dengan $f'(c) = 0$ disebut titik stasioner f . Tidak semua titik stasioner merupakan titik maksimum atau minimum lokal.

Teorema 4.5.2 (Teorema Rolle)

Misalkan f kontinu pada $[a,b]$ dan mempunyai turunan pada (a,b) . Jika $f(a) = f(b)$, maka $f'(c) = 0$ untuk suatu $c \in (a,b)$

Bukti:

Karena f kontinu pada interval kompak $[a,b]$ maka menurut sifat kekontinuan f mencapai nilai maksimum M di suatu titik $c_1 \in [a,b]$ dan juga mencapai nilai minimum m di suatu titik $c_2 \in [a,b]$.

Misalkan c_1 dan c_2 adalah titik-titik ujung $[a,b]$. Karena $f(a) = f(b)$, maka $m = M$ dan dengan demikian f konstan pada $[a,b]$. Akibatnya $f'(c) = 0$ untuk setiap $c \in (a,b)$.

Misalkan c_1 bukan titik ujung $[a,b]$. Maka $c_1 \in (a,b)$ dan f mencapai nilai maksimum lokal di c_1 . Menurut Teorema 4.5.1, $f'(c_1) = 0$. Hal serupa terjadi bila c_2 bukan titik ujung $[a,b]$.

Soal Latihan

1. Diketahui $f(x) = x|x|$, $x \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa 0 merupakan titik stasioner. Selidiki apakah f mencapai nilai maksimum atau minimum lokal di 0.

Petunjuk penyelesaian:

Dengan menggunakan Teorema Rolle maka dapat ditunjukkan bahwa 0 adalah titik stasioner dan dapat diselidiki bahwa f mencapai nilai maksimum atau minimum lokal di 0.

2. Beri contoh sebuah fungsi f yang terdefinisi pada $[a,b]$, mempunyai turunan pada (a,b) , dan $f(a) = f(b)$, namun tidak ada $c \in (a,b)$ dengan $f'(c) = 0$.

3. Teorema Nilai Rata-rata dan Teorema Taylor

Sebagai bentuk perumuman dari Teorema Rolle, maka berikut ini diberikan Teorema Nilai Rata-rata dan Teorema Taylor:

Teorema 4.5.3 (Teorema Nilai Rata-rata)

Misalkan f kontinu pada $[a,b]$ dan mempunyai turunan pada (a,b) . Maka

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

untuk suatu $c \in (a,b)$.

Bukti:

Misalkan F didefinisikan pada $[a,b]$, sebagai

$$F(x) = f(x) - hx$$

Dengan h konstanta. Maka F kontinu pada $[a,b]$ dan mempunyai turunan pada (a,b) . Pilih konstanta h sedemikian sehingga $F(a) = F(b)$, yakni

$$h = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Karena F memenuhi hipotesis Teorema Rolle, maka $F'(c) = 0$ untuk suatu $c \in (a,b)$. Namun

$$F'(c) = f'(c) - h = 0.$$

Sehingga teorema terbukti.

Jika f mempunyai turunan di c , maka persamaan garis singgung pada kurva $y = f(x)$ di titik $(c, f(c))$ adalah

$$y = f(c) + (x - c)f'(c).$$

Untuk x dekat c , nilai $f(c) + (x - c)f'(c)$ merupakan hampiran yang "baik" untuk $f(x)$.

Misalkan f mempunyai turunan ke- $(n-1)$ di c , maka bentuk polinom:

$$P(x) = f(c) + (x - c)f'(c) + \frac{(x-c)^2}{2!} f''(c) + \dots + \frac{(x-c)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(c)$$

Mempunyai turunan ke- k , $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$, yang sama dengan turunan ke- k dari f .

Teorema 4.5.4 (Teorema Taylor)

Misalkan f mempunyai turunan ke- n pada interval terbuka I yang memuat titik c . Maka, untuk setiap $x \in I$, berlaku

$$f(x) = f(c) + (x - c)f'(c) + \frac{(x-c)^2}{2!} f''(c) + \dots + \frac{(x-c)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(c) + E_n$$

dengan $E_n = \frac{1}{n!} (x - c)^n f^{(n)}(\zeta)$ untuk ζ antara x dan c .

Bukti:

Untuk t di antara x dan c , didefinisikan

$$F(t) = f(x) - f(t) - (x - t)f'(t) - \dots - \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(t)$$

Perhatikan bahwa

$$F'(t) = \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t).$$

Didefinisikan,

$$G(t) = F(t) - \frac{(x-t)^n}{(n-c)!} F(c).$$

Maka, $G(x) = G(c) = 0$, sehingga menurut teorema Rolle, terdapat ζ di antara x dan c sedemikian sehingga:

$$0 = G(\zeta) = F'(\zeta) + \frac{n(x-\zeta)^{n-1}}{(n-c)^n} F(c) = -\frac{(x-\zeta)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(\zeta) + \frac{n(x-\zeta)^{n-1}}{(n-c)^n} F(c).$$

Dari sini diperoleh:

$$F(c) = \frac{(x-c)^n}{n!} f^{(n)}(\zeta)$$

Teorema terbukti.

4. Aplikasi Teorema Nilai Rata-rata

Berikut ini diberikan contoh-contoh aplikasi teorema rata-rata:

Contoh 4.5.1

Teorema Rolle dapat digunakan untuk menunjukkan akar dari suatu fungsi. Jika fungsi g dapat diidentifikasi sebagai turunan dari fungsi f , maka diantara sebarang dua akar dari f terdapat paling sedikit satu akar dari g . Misalkan $g(x) = \cos x$, maka g adalah turunan dari $f(x) = \sin x$. Jadi diantara dua akar dari $\sin x$ terdapat paling sedikit satu akar dari $\cos x$. Pada sisi lain, $g'(x) = -\sin x = -f(x)$, sehingga aplikasi lain dari teorema Rolle mengatakan bahwa diantara dua akar \cos terdapat paling sedikit satu akar \sin . Selanjutnya kita dapat

menyimpulkan bahwa akar-akar dari \sin dan \cos berhubungan. Kesimpulan ini berlaku juga dalam fungsi Bessel J_n , $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ dengan menggunakan relasi.

$$[x^n J_n(x)]' = x^n J_{n-1}(x), [x^{n-1} J_n(x)]' = -x^{-n} J_{n+1}(x) \text{ untuk } x > 0$$

Contoh 4.5.2

Teorema nilai rata-rata dapat digunakan untuk perhitungan pendekatan dan memperoleh estimasi kesalahan. Misalkan, teorema ini digunakan untuk menghitung $\sqrt{150}$. Dengan menggunakan teorema nilai rata-rata yaitu $f(x) = \sqrt{x}$, $c = 100$, $b = 105$, diperoleh

$$\sqrt{105} - \sqrt{100} = \frac{5}{2\sqrt{c}}.$$

Untuk suatu c dengan $100 < c < 105$ Karena $10 < \sqrt{c} < \sqrt{105} < \sqrt{121} = 11$, maka dapat dinyatakan bahwa

$$\frac{5}{2(11)} < \sqrt{105} - 10 < \frac{5}{2(10)}$$

Jadi diperoleh

$$10.2272 < \sqrt{105} < 10.2500.$$

Estimasi ini belum setajam yang diinginkan. Jelas bahwa estimasi $\sqrt{c} < \sqrt{105} < \sqrt{121}$ merupakan pemborosan, dan bisa diganti dengan menggunakan kesimpulan bahwa $\sqrt{105} < 10.2500$. Jadi $\sqrt{c} < 10.2500$ dan dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa,

$$0.2439 < \frac{5}{2(10.2500)} < \sqrt{105} - 10.$$

Hasil estimasi yang baru adalah $10.2439 < \sqrt{105} < 10.2500$.

5. Ketaksamaan

Salah satu penggunaan teorema rata-rata adalah untuk menentukan suatu ketaksamaan tertentu. Informasi yang berhubungan dengan range atau daerah hasil dari turunan suatu fungsi yang tersedia. Informasi ini dapat digunakan untuk menyimpulkan sifat-sifat fungsinya.

Contoh 4.5.3

Fungsi eksponensial $f(x) = e^x$ mempunyai turunan $f'(x) = e^x$ untuk setiap nilai $x \in \mathbb{R}$. jadi $f'(x) > 1$ untuk $x > 0$, dan $f'(x) < 1$ untuk $x < 0$. Dari hubungan ini, dapat diturunkan ketaksamaan berikut:

$$e^x \geq 1 + x \text{ untuk } x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

ketaksamaan (1) di atas akan menjadi persamaan jika dan hanya jika $x = 0$. Jika $x = 0$, maka kita mempunyai persamaan yang kedua sisinya sama dengan 1. Jika $x > 0$, maka dengan menggunakan teorema nilai rata-rata untuk fungsi f diselang tutup $[0, x]$ diperoleh

$$e^x - e^0 = e^c (x - 0) \text{ untuk suatu } c, 0 < c < x.$$

karena $e^0 = 1$ dan $e^c > 1$, maka persamaan diatas menjadi

$$e^x - 1 > x$$

atau

$$e^x > 1 + x \text{ untuk } x > 0$$

dengan cara yang sama, dapat dibuktikan ketaksamaan untuk $x < 0$. Jadi ketaksamaan (1) berlaku untuk semua x dan persamaan dipenuhi jika $x = 0$.

Contoh 4.5.4

Fungsi $g(x) = \sin x$ mempunyai turunan $g'(x) = \cos x$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$. Karena $-1 \leq \cos x \leq 1$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, maka akan ditunjukkan bahwa

$$-x \leq \sin x \leq x \text{ untuk setiap } x \geq 0. \quad (2)$$

Dengan menggunakan teorema nilai rata-rata pada g di selang tutup $[0, x]$, dimana $x > 0$, diperoleh

$$\sin x - \sin 0 = (\cos c) (x - 0) \text{ untuk suatu } c, 0 < c < x.$$

Karena $\sin 0 = 0$ dan $-1 \leq \cos x \leq 1$, diperoleh

$$-x \leq \sin x \leq x.$$

Karena persamaan dipenuhi di $x = 0$, ketaksamaan (2) terbukti.

Contoh 4.5.5

Ketaksamaan Bernoulli. Jika $\alpha > 1$, maka

$$(1 + x)^\alpha \geq 1 + \alpha x \text{ untuk semua } x > -1 \quad (3)$$

Dengan persamaan dipenuhi jika dan hanya jika $x = 0$.

Akan dibuktikan dengan menggunakan teorema nilai rata-rata.

Jika $h(x) = (1 + x)^\alpha$ maka $h'(x) = \alpha(1 + x)^{\alpha-1}$ untuk semua $x > -1$.

Jika $x > 0$, maka berdasarkan teorema nilai rata-rata yang dikenakan pada h diselang tutup $[0, x]$ terdapat c dengan $0 < c < x$ sedemikian sehingga

$$h(x) - h(0) = h'(c)(x-0)$$

jadi,

$$(1 + x)^\alpha - 1 = \alpha (1 + c)^{\alpha-1} x.$$

Karena $c > 0$ dan $\alpha - 1 > 0$, serta $(1 + c)^{\alpha-1} > 1$ maka diperoleh,

$$(1 + x)^\alpha > 1 + \alpha x.$$

Jika $-1 < x < 0$, dengan menggunakan teorema nilai rata-rata diselang tutup $[x, 0]$ akan diperoleh ketaksamaan di atas. Karena untuk kasus $x = 0$ menghasilkan suatu persamaan, maka dapat disimpulkan bahwa ketaksamaan (3) berlaku untuk semua $x > -1$ dan suatu persamaan dipenuhi jika dan hanya jika $x = 0$.

Contoh 4.5.6

Misalkan α bilangan real yang memenuhi $0 < \alpha < 1$ dan $g(x) = \alpha x - x^\alpha$ untuk $x \geq 0$. Maka,

$$g'(x) = \alpha(1-x^{\alpha-1})$$

sehingga $g'(x) < 0$ untuk $0 < x < 1$ dan $g'(x) > 0$ untuk $x > 1$. Akibatnya jika $x \geq 0$, maka $g(x) \geq g(1)$ dan $g(x) = g(1)$ jika dan hanya jika $x = 1$.

Selanjutnya, jika $x \geq 0$ dan $0 < \alpha < 1$, maka diperoleh

$$x^\alpha \leq \alpha x + (1 - \alpha).$$

Jika $a > 0$ dan $b > 0$ dan jika ditetapkan $x = a/b$ dan kemudian dikalikan dengan b , diperoleh pertidaksamaan

$$a^\alpha b^{1-\alpha} \leq \alpha a + (1 - \alpha) b,$$

dimana kesamaan dipenuhi jika dan hanya jika $a = b$.

6. Sifat Nilai Antara dari Suatu Turunan

Pada bagian ini akan dibahas tentang teorema Darboux. Teorema ini menyatakan bahwa jika suatu fungsi f terdiferensialkan di setiap titik di selang I , maka fungsi f' mempunyai sifat nilai antara.

Lemma 4.5.6

Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu selang, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dan $c \in I$ serta diasumsikan bahwa f mempunyai turunan di c . Maka:

- Jika $f'(c) > 0$, maka ada suatu bilangan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $f(x) > f(c)$ untuk $x \in I$ dan memenuhi $c < x < c + \delta$.
- Jika $f'(c) < 0$, maka ada suatu bilangan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $f(x) > f(c)$ untuk $x \in I$ dan memenuhi $c - \delta < x < c$.

Bukti:

- Karena

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'(c) > 0$$

Maka berdasarkan teorema bahwa suatu bilangan $\delta > 0$ sedemikian sehingga jika $x \in I$ dan $0 < |x - c| < \delta$, maka

$$\frac{f(x)-f(c)}{x-c} > 0.$$

Jika $x \in I$ juga memenuhi $x > c$, maka diperoleh

$$f(x) - f(c) = (x - c) \cdot \frac{f(x)-f(c)}{x-c} > 0.$$

Jadi jika $x \in I$ dan $c < x < c + \delta$ maka $f(x) > f(c)$.

b. Bukti sebagai latihan

Teorema 4.5.7 (Teorema Darboux)

Jika f terdifferensialkan diselang tutup $I = [a,b]$ dan jika k adalah bilangan antara $f'(a)$ dan $f'(b)$, maka terdapat paling sedikit satu titik c diselang buka (a,b) sedemikian hingga $f'(c) = k$.

Bukti:

Andaikan bahwa $f'(a) < k < f'(b)$. Kemudian didefinisikan g diselang I dengan $g(x) = kx - f(x)$ untuk $x \in I$. Karena g kontinu, maka g memuat nilai maksimum di selang I . Karena $g'(a) = k - f'(a) > 0$, maka berdasarkan lemma maka maksimum dari g tidak terjadi di $x = a$. Demikian juga, karena $g'(b) = k - f'(b) < 0$, maka berdasarkan lemma, maka maksimum tidak terjadi di $x = b$. Selanjutnya, g memuat maksimumnya di c di (a,b) . Kemudian berdasarkan teorema bahwa dipunyai $0 = g'(c) = k - f'(c)$. Jadi $f'(c) = k$.

F. Aturan L'Hopital

Telah dibahas sebelumnya bahwa jika $A = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$ dan $B = \lim_{x \rightarrow c} g(x)$, jika $B \neq 0$, maka

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$$

Tetapi, jika $B = 0$, maka tidak diperoleh kesimpulan. Jika $A = 0$, $B = 0$, maka limit dari pembagian f/g dikatakan tak tentu. Dalam kasus ini, limitnya mungkin tidak ada atau mungkin juga sebarang nilai real, tergantung pada fungsi f dan g . Simbol $\frac{0}{0}$ digunakan untuk menyatakan kondisi ini. Misalkan, α adalah sebarang bilangan real, jika $f(x) = \alpha x$ dan $g(x) = x$, maka

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \alpha = \alpha.$$

Jadi bentuk tak tentu $\frac{0}{0}$ dapat menunjukkan sebarang bilangan real α sebagai limit.

Bentuk tak tentu lainnya dinyatakan dengan simbol,

$$\infty/\infty, 0, \infty, 0^0, 1^\infty, \text{ dan } \infty - \infty.$$

Tapi pada pembahasan ini hanya fokus untuk bentuk tak tentu $\frac{0}{0}$ dan $\frac{\infty}{\infty}$. Sedangkan untuk bentuk tak tentu lainnya diubah dulu ke dalam bentuk tak tentu $\frac{0}{0}$ dan $\frac{\infty}{\infty}$.

Teorema 4.6.1

Misalkan f dan g terdefinisi di $[a, b]$, $f(a) = g(a) = 0$, dan $g(x) \neq 0$ untuk $a < x < b$. Jika f dan g terdiferensial di a dan jika $g'(a) \neq 0$, maka limit $\frac{f}{g}$ di a ada dan sama dengan $\frac{f'(a)}{g'(a)}$. Jadi

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

Bukti:

Karena $f(a) = g(a) = 0$, maka dapat dituliskan pembagian $\frac{f(x)}{g(x)}$ untuk $a < x < b$ sebagai berikut:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}}$$

Dengan menggunakan teorema diperoleh,

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)-g(a)}{x-a}} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

Perhatikan hipotesis $f(a) = f(b) = 0$ perlu.

Teorema 4.6.2 (Teorema Nilai Rata-rata Cauchy)

Misalkan f dan g kontinu di $[a,b]$ dan terdifferensialkan di (a,b) serta dengan mengasumsikan bahwa $g(x) \neq 0$ untuk semua x di (a,b) , maka terdapat c di (a,b) sedemikian sehingga,

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Bukti:

Seperti dalam bukti teorema rata-rata, disini digunakan teorema Rolle. Karena $g'(x) \neq 0$ untuk semua x di (a,b) , maka berdasarkan teorema Rolle $g(a) \neq g(b)$. Kemudian untuk x di $[a,b]$, didefinisikan

$$h(x) = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(x) - g(a)) - (f(x) - f(a)).$$

h kontinu di $[a,b]$, terdifferensial di (a,b) , dan $h(a) = h(b) = 0$. Selanjutnya berdasarkan teorema Rolle terdapat titik c di (a,b) sedemikian sehingga

$$0 = h'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} \cdot g'(c) - f'(c).$$

Karena $g'(c) \neq 0$, maka dengan membagi persamaan di atas dengan $g'(c)$ teorema di atas terbukti.

Teorema 4.6.3 (Aturan L'Hopital Pertama)

Misalkan $-\infty \leq a < b \leq \infty$ dan f, g terdifferensialkan di (a,b) dengan $g'(x) \neq 0$ untuk semua $x \in (a,b)$. Misalkan

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x). \quad (1)$$

(a) Jika $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \mathbb{R}$, maka $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$

(b) Jika $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \{-\infty, \infty\}$, maka $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$

Bukti :

Jika $a < \alpha < \beta < b$, maka dengan teorema Rolle diperoleh $g(\beta) \neq g(\alpha)$. Kemudian dengan menggunakan teorema nilai rata-rata Cauchy, terdapat $u \in (\alpha, \beta)$ sedemikian sehingga

$$\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{g(\beta) - g(\alpha)} = \frac{f'(u)}{g'(u)} \quad (2)$$

Kasus (a) : Jika diberikan $L \in \mathbb{R}$ dan $\varepsilon > 0$, maka ada $c \in (a, b)$ sedemikian hingga

$$L - \varepsilon < \frac{f'(u)}{g'(u)} < L + \varepsilon \text{ untuk } u \in (\alpha, \beta)$$

Dengan mensubstitusikan (2) ke persamaan diatas diperoleh

$$L - \varepsilon < \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{g(\beta) - g(\alpha)} < L + \varepsilon \text{ untuk } a < \alpha < \beta \leq c \quad (3)$$

Jika kita ambil limit di (3) untuk $\alpha \rightarrow a^+$, maka diperoleh

$$L - \varepsilon < \frac{f(\beta)}{g(\beta)} \leq L + \varepsilon \text{ untuk } \beta \in (a, c].$$

Karena $\varepsilon > 0$, maka teorema terbukti.

Kasus (b) : Jika diberikan $L = +\infty$ dan $M > 0$, maka terdapat $c \in (a, b)$ sedemikian hingga

$$\frac{f'(u)}{g'(u)} > M \text{ untuk } u \in (a, c)$$

Dengan mensubstitusikan (2) ke persamaan diatas diperoleh

$$\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{g(\beta) - g(\alpha)} > M \text{ untuk } a < \alpha < \beta \leq c \quad (4)$$

Jika kita ambil limit di (4) untuk $\alpha \rightarrow a+$, maka diperoleh

$$\frac{f(\beta)}{g(\beta)} \geq M \text{ untuk } \beta \in (a, c)$$

Karena $M > 0$, sebarang, maka teorema terbukti.

Teorema 4.6.4 (Aturan L'Hopital Kedua)

Misalkan $-\infty \leq a < b \leq \infty$ dan f, g terdifferensial di (a, b) dengan $g'(x) \neq 0$ untuk semua $x \in (a, b)$. Misalkan

$$\lim_{x \rightarrow a+} g(x) = \pm\infty \quad (5)$$

(a) Jika $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \mathbb{R}$, maka $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$

(b) Jika $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \{-\infty, \infty\}$, maka $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$

Bukti :

Seperti sebelumnya, kita mempunyai $g(\beta) \neq g(\alpha)$ untuk $\alpha, \beta \in (a, b)$, $\alpha < \beta$. Selanjutnya, persamaan. (2) dibukti teorema Teorema 4.6.3 berlaku untuk suatu $u \in (\alpha, \beta)$.

Kasus (a) :

Jika diberikan sebarang $L \in \mathbb{R}$, dengan $L > 0$ dan $\varepsilon > 0$, maka terdapat $c \in (a, b)$ sehingga (3) dibukti Teorema 4.6.3 berlaku ketika $a < \alpha < \beta \leq c$ karena $g(x) \rightarrow \infty$ dapat diansumsikan $g(c) > 0$ dengan menetapkan $\beta = c$ di (3) maka diperoleh

$$L - \varepsilon < \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{g(\beta) - g(\alpha)} < L - \varepsilon \text{ untuk } \alpha \in (a, c) \quad (6)$$

Karena $\frac{g(c)}{g(\alpha)} \rightarrow 0$ untuk $\alpha \rightarrow \alpha +$, maka dapat diansumsikan bahwa $0 < \frac{g(c)}{g(\alpha)} < 1$ untuk semua $\alpha \in (a, c)$, selanjutnya

$$\frac{g(\alpha) - g(c)}{g(\alpha)} = 1 - \frac{g(c)}{g(\alpha)} > 0 \text{ untuk } \alpha \in (a, c)$$

Jika (6) dikalikan dengan $\frac{g(\alpha) - g(c)}{g(\alpha)} > 0$ akan diperoleh

$$(L - \varepsilon) \left(1 - \frac{g(c)}{g(\alpha)} \right) < \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} - \frac{f(c)}{g(\alpha)} < (L + \varepsilon) \left(1 - \frac{g(c)}{g(\alpha)} \right) \quad (7)$$

Karena $\frac{g(c)}{g(\alpha)} \rightarrow 0$ dan $\frac{f(c)}{g(\alpha)} \rightarrow 0$ untuk $\alpha \rightarrow \alpha +$ maka setiap δ dengan $0 < \delta < 1$ terhadap $d \in (a, c)$ sedemikian sehingga $0 < \frac{g(c)}{g(\alpha)} < \delta$ dan $\frac{|f(c)|}{|g(\alpha)|} < \delta$ untuk setiap $\alpha \in (a, d)$ sehingga (7) menjadi

$$(L - \varepsilon)(1 - \delta) - \delta < \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} < (L + \varepsilon) + \delta \quad (8)$$

Jika ditetapkan $\delta = \min \left\{ 1, \varepsilon, \frac{\varepsilon}{(|L|+1)} \right\}$ maka sebagai latihan tunjukkan bahwa

$$L - 2\varepsilon \leq \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} \leq L + 2\varepsilon$$

Karena $\varepsilon > 0$ sebarang, maka ini membuktikan pernyataan. Untuk pembuktian kasus $L = 0$ dan $L < 0$ serupa.

Kasus (b) :

Jika $L = +\infty$ dan diberikan $M > 1$ dan $c \in (a, b)$ sedemikian sehingga $\frac{f'(u)}{g'(u)}$ untuk setiap $u \in (a, c)$ maka

$$\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{g(\beta) - g(\alpha)} > M \text{ untuk } a < \alpha < \beta \leq c \quad (9)$$

Karena $g(x) \rightarrow \infty$ untuk $x \rightarrow a +$, maka boleh menyatakan c juga memenuhi $g(c) > 0$ yang $\left| \frac{f(c)}{g(\alpha)} \right| < \frac{1}{2}$ dan $0 < \frac{g(c)}{g(\alpha)} < \frac{1}{2}$ untuk setiap $\alpha \in (a, c)$. Jika dalam (9), $\beta = c$ dan kemudian kita kalikan dengan $1 - \frac{g(c)}{g(\alpha)} > \frac{1}{2}$ maka akan diperoleh

$$\frac{f(\alpha) - f(c)}{g(\alpha)} > M \left(1 - \frac{g(c)}{g(\alpha)} \right) > \frac{1}{2} M,$$

Sehingga

$$\frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} > \frac{1}{2} M + \frac{f(c)}{g(\alpha)} > \frac{1}{2} (M - 1) \text{ untuk } \alpha \in (a, c)$$

Karena $M > 1$ sebarang, maka $\lim_{\alpha \rightarrow \alpha^+} \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} = \infty$

BAB V

INTEGRAL RIEMANN

Pada bab ini dibahas mengenai konsep partisi, jumlah Riemann, integral Riemann, sifat-sifat dasar integral Riemann, Teorema Dasar Kalkulus untuk integral Riemann, Teorema Nilai Rata-rata dan Teorema Taylor untuk Integral,

A. Konsep Partisi

Definisi 5.1.1

Jika $I = [a,b]$ sebuah interval \mathbb{R} maka sebuah partisi dari interval I pasti terbatas ada himpunan berurutan $P := (x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n)$ dari titik-titik di dalam I sedemikian hingga

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

titik-titik di P berguna untuk membagi-bagi $I = [a,b]$ ke dalam subinterval yang tidak saling tumpang tindih

$$I_1 := [x_0, x_1], I_2 = [x_1, x_2], \dots, I_n := [x_{n-1}, x_n]$$

Contoh 5.1.1

Jika $I := [0,6]$ sebuah interval di \mathbb{R} maka sebuah partisi dari interval I pasti terbatas, ada himpunan berturut-turut $P := (x_0 = 0, 1.1, 2, 3.2, 4, 6 = x_5)$ dari titik-titik di dalam I sedemikian hingga

$$x_0 = 0 < 1.1 < 2 < 3.2 < 4 < 6 = x_5$$

titik-titik di P berguna untuk membagi-bagi $I = [0,6]$ ke dalam subinterval yang tidak saling tumpang tindih.

$$I_1 := [x_0 = 0, 1.1], I_2 := [1.1, 2], I_3 := [2, 3.2], I_4 := [3.2, 4], I_5 := [4, 6 = x_5]$$

Angka 5 adalah angka subinterval dalam partisi $[0,6]$

yang membagi partisi ke dalam 5 bagian. Dan $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ tidak selalu sama.

B. Jumlah Riemann

Definisi 5.2.1

Misalkan $I = [a,b]$ interval di \mathbb{R} dan $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terbatas. Untuk setiap himpunan terbatas dari titik-titik $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ sedemikian sehingga

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

dan f berkorespondensi ke setiap partisi P dari I , maka jumlah Riemann atas dan bawah dari f yang berpadanan dengan partisi P didefinisikan sebagai:

$$U(P, f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \text{ dengan } M_i = \sup f(x)$$

$$L(P, f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \text{ dengan } m_i = \inf f(x)$$

dimana $x \in [x_{i-1}, x_i]$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots$)

Perhatikan bahwa $L(P, f) \leq U(P, f)$ untuk dan $Q := \{y_0, y_1, \dots, y_m\}$ adalah partisi dari $[a,b]$, maka Q disebut sebagai suatu penghalus dari P apabila setiap titik partisi $x_k \in P$ merupakan titik partisi di Q , yakni $P \subseteq Q$. Dalam hal ini, setiap subinterval yang terkait dengan partisi P dapat dinyatakan sebagai gabungan dari beberapa subinterval yang terkait dengan partisi Q , yakni:

$$[x_{k-1}, x_k] = [y_{i-1}, y_i] \cup [y_i, y_{i+1}] \cup \dots \cup [y_{j-1}, y_j].$$

Perlu diingat bahwa, suatu penghalusan dari sebarang partisi P dengan menambahkan sejumlah titik ke P .

Proposisi 5.2.2

Jika Q merupakan penghalusan dari P , maka $L(P, f) \leq L(Q, f)$ dan $U(Q, f) \leq U(P, f)$

Akibat 5.2.3

Jika P_1 dan P_2 adalah dua partisi sembarang dari $[a, b]$, maka $L(P_1, f) \leq U(P_2, f)$

C. Integral Riemann

Pada bagian ini diasumsikan bahwa $f: [a, b] \rightarrow R$ terbatas. Menurut Akibat 5.2.3. Himpunan $\{L(P, f): P \text{ partisi dari } [a, b]\}$ terbatas di atas (oleh suatu jumlah Riemann atas). Sementara himpunan $\{U(P, f): P \text{ partisi dari } [a, b]\}$ terbatas di bawah (oleh suatu jumlah Riemann bawah). Karena itu dapat didefinisikan

$$L(f) := \sup\{L(P, f): P \text{ partisi dari } [a, b]\}$$

Dan

$$U(f) := \sup\{U(P, f): P \text{ partisi dari } [a, b]\}$$

$L(f)$ disebut sebagai integral Riemann atas dari f . Sementara $U(f)$ disebut sebagai integral Riemann bawah dari f .

Proposisi 5.3.1

$$L(f) \leq U(f).$$

Bukti.

Untuk setiap partisi P_0 dari $[a, b]$. $U(P_0, f)$ merupakan batas atas dari $\{L(P, f): P \text{ partisi dari } [a, b]\}$, sehingga

$$L(f) := \sup\{L(P, f): P \text{ partisi dari } [a, b]\} \leq U(P_0, f).$$

Karena ini berlaku untuk sembarang partisi P_0 . Maka $L(f)$ merupakan batas bawah dari

$$\{U(P_0, f): P_0 \text{ partisi dari } [a, b]\}.$$

Akibatnya

$$L(f) \leq \inf\{U(P_0, f): P_0 \text{ partisi dari } [a, b]\} = U(P_0, f).$$

Sebagaimana yang diharapkan.

Teorema berikut memberikan suatu kriteria untuk keterintegralan f pada $[a, b]$. (Untuk selanjutnya, 'terintegralkan' berarti 'terintegralkan Riemann' dan 'integral' berarti 'integral Riemann')

Teorema 5.3.2

f terintegralkan pada $[a, b]$ jika dan hanya jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu partisi P_ϵ dari $[a, b]$ sedemikian sehingga

$$U(P_\epsilon, f) - L(P_\epsilon, f) < \epsilon.$$

Bukti.

Misalkan f terintegralkan pada $[a, b]$ ambil $\epsilon > 0$ sembarang

$$L(f) - \frac{1}{2}\epsilon < L(P_1, f).$$

Dari definisi infimum, terdapat pula suatu partisi P_2 dari $[a, b]$ sehingga

$$U(P_2, f) < U(f) + \frac{\epsilon}{2}$$

Sekarang misalkan $P_\epsilon = P_1 \cup P_2$. Maka P_ϵ merupakan perhalusan dari P_1 dan P_2 .

Akibatnya,

$$\begin{aligned} L(f) - \frac{\epsilon}{2} < L(P_1, f) \leq L(P_\epsilon, f) \leq U(P_\epsilon, f) \leq U(P_2, f) \\ < U(f) + \frac{\epsilon}{2} \end{aligned}$$

Namun $L(f) = U(f)$, sehingga diperoleh

$$U(P_\epsilon, f) - L(P_\epsilon, f) < \epsilon$$

Sebaliknya misalkan untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu partisi P_ϵ dari $[a, b]$ sedemikian sehingga

$$U(P_\epsilon, f) - L(P_\epsilon, f) < \epsilon$$

Maka untuk setiap $\epsilon > 0$, berlaku

$$0 \leq U(f) - L(f) \leq U(P_\epsilon, f) - L(P_\epsilon, f) < \epsilon$$

Dari sini dapat di simpulkan bahwa $U(f) = L(f)$ atau f diintegalkan pada $[a, b]$

Akibat 5.3.3

Misalkan terdapat barisan partisi $\langle P_n \rangle$ dari $[a, b]$ sedemikian sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [U(P_n, f) - L(P_n, f)] = 0$$

Maka f terintegalkan pada $[a, b]$ dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L(P_n, f) = \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} U(P_n, f)$$

Soal Latihan

1. Misalkan $f(x) = x$, $x \in [0,1]$. dan $P_n = \left\{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, 1\right\}$, $n \in \mathbb{N}$.
tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} [U(P_n, f) - L(P_n, f)] = 0$, dan
kemudian simpulkan bahwa f terintegralkan pada $[0,1]$
Petunjuk Penyelesaian:

Akan dibuktikan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} [U(P_n, f) - L(P_n, f)] = 0$,
dengan barisan partisi $\langle P_0 \rangle$ dari $[0,1]$.

Kemudian f diintegrasikan pada $[0,1]$ yaitu:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L(P_n, f) = \int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} U(P_n, f)$$

2. Misalkan fungsi f didefinisikan pada $[0,1]$ sebagai

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1; \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Buktikan bahwa f terintegralkan pada $[0,1]$ dengan

$$\int_0^1 f(x) dx = 0$$

Petunjuk Penyelesaian:

Mengintegrasikan fungsi f pada $[0,1]$ yaitu:

$$\int_0^1 f(x) dx = 0 \text{ dengan menggunakan integral Riemann.}$$

3. Misalkan fungsi f didefinisikan pada $[0,1]$ sebagai

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1; \\ 2, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

Buktikan bahwa f terintegralkan pada $[0,2]$ dengan

$$\int_0^2 f(x) dx = 3$$

Petunjuk Penyelesaian:

Mengintegrasikan fungsi f pada $[0,2]$ yaitu

$$\int_0^2 f(x) dx = 3 \text{ dengan menggunakan integral Riemann.}$$

D. Sifat-sifat Dasar Integral Riemann

Pada bagian ini akan dipelajari sifat-sifat dasar integral Riemann. Sifat pertama adalah sifat kelinearan, yang dinyatakan dalam Proposisi 1. Sepanjang bab ini, I menyatakan interval $[a, b]$, kecuali bila kita nyatakan lain.

Proposisi 5.4.1

Misalkan $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan pada I, dan $c \in \mathbb{R}$ suatu konstanta. Maka cf dan $f + g$ terintegralkan pada I dan

$$\int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx, \quad (1)$$

$$\int_a^b (f + g)(x)dx = c \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx, \quad (2)$$

Bukti:

1. Jika $c = 0$, maka pernyataan tentang cf jelas benar. Sekarang tinjau kasus $c > 0$. (Kasus $c < 0$ serupa dan diserahkan sebagai latihan). Misalkan $P := \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ partisi sembarang dari I. Karena $c > 0$, kita mempunyai $\inf \{cf(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\} = c \inf \{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}$ untuk $k = 1, 2, \dots, n$. Kalikan tiap suku ini dengan $x_k - x_{k-1}$ dan jumlahkan, didapatkan

$$L(P, cf) = cL(P, f).$$

Jadi, karena $c > 0$, diperoleh:

$$L(cf) = \sup\{cL(P, f) : P \text{ partisi dari } I\} = c \sup\{L(P, f) : P \text{ partisi dari } I\} = cL(f).$$

Dengan cara yang serupa diperoleh pula $U(P, cf) = cU(P, f)$ dan $U(cf) = \inf\{cU(P, f) : P \text{ partisi dari } I\} = c \inf\{U(P, f) : P \text{ partisi dari } I\} = cU(f)$.

Karena f terintegralkan, $U(f) = L(f)$ dan akibatnya $L(cf) = cL(f) = cU(f) = U(cf)$.

Jadi cf terintegralkan dan

$$\int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx.$$

2. Untuk sembarang interval $I_k := [x_{k-1}, x_k]$, kita mempunyai

$$\inf \{f(x) : x \in I_k\} + \inf \{g(x) : x \in I_k\} \leq \inf \{(f+g)(x) : x \in I_k\}$$

$$\sup \{(f+g)(x) : x \in I_k\} \leq \sup \{f(x) : x \in I_k\} + \sup \{g(x) : x \in I_k\}.$$

Dari sini diperoleh

$$L(P, f) + L(P, g) \leq L(P, f+g)$$

dan

$$U(P, f+g) \leq U(P, f) + U(P, g)$$

untuk sembarang partisi P dari I . Sekarang, jika $\epsilon > 0$ diberikan, maka terdapat partisi $P_{f,\epsilon}$ dan $P_{g,\epsilon}$ sedemikian sehingga

$$U(P_{f,\epsilon}, f) \leq L(P_{f,\epsilon}, f) + \frac{\epsilon}{2}$$

dan

$$U(P_{g,\epsilon}, g) \leq L(P_{g,\epsilon}, g) + \frac{\epsilon}{2}.$$

Akibatnya, untuk $P_\epsilon := P_{f,\epsilon} \cup P_{g,\epsilon}$, di peroleh

$$U(P_\epsilon, f+g) \leq U(P_\epsilon, f) + U(P_\epsilon, g) \leq L(P_\epsilon, f) + L(P_\epsilon, g) + \epsilon \leq L(P_\epsilon, f+g) + \epsilon.$$

Menurut Kriteria Keterintegralan Riemann, $f+g$ terintegralkan. Selanjutnya perhatikan bahwa dari ketaksamaan di atas, kita peroleh

$$\int_a^b (f+g)(x) dx \leq U(P_\epsilon, f+g) \leq L(P_\epsilon, f) + L(P_\epsilon, g) \leq \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx + \epsilon.$$

Sementara itu,

$$\int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \leq U(P_\epsilon, f) + U(P_\epsilon, g) \leq L(P_\epsilon, f+g) + \epsilon \leq \int_a^b (f+g)(x) dx + \epsilon.$$

Dari kedua ketaksamaan ini, diperoleh

$$\left| \int_a^b (f + g)(x) dx - \left(\int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \right) \right| < \epsilon.$$

Karena ini berlaku untuk $\epsilon > 0$ sembarang, dapat disimpulkan simpulkan bahwa

$$\int_a^b (f + g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx,$$

dan bukti pun selesai.

Proposisi berikut dikenal sebagai sifat kepositifan integral Riemann. (Buktinya diserahkan sebagai latihan.)

Proposisi 5.4.2

Misalkan $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan pada I . Jika $f(x) \geq 0$ untuk setiap $x \in I$, maka $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

Akibat 5.4.3

Misalkan $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan pada I . Jika $f(x) \leq g(x)$ untuk setiap $x \in I$, maka $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

Proposisi 5.4.4

Misalkan $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan pada I . Jika $m \leq f(x) \leq M$ untuk setiap $x \in [a, b]$, maka

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a).$$

Proposisi 5.4.5

Misalkan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ terbatas dan $a < c < b$. Maka, f terintegralkan pada $[a, b]$ jika dan hanya jika f terintegralkan pada $[a, c]$ dan pada $[c, b]$. Dalam hal ini,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

E. Keintegralan Fungsi Kontinu dan Fungsi Monoton

Teorema 5.5.1

Jika f kontinu pada $[a, b]$ maka f terintegralkan pada $[a, b]$

Bukti:

Menurut teorema kekontinuan seragam bahwa fungsi yang kontinu pada $[a, b]$ mestilah kontinu seragam pada $[a, b]$. karena itu, diberikan $\epsilon > 0$ sembarang, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga untuk $x, y \in [a, b]$ dengan $|x - y| < \delta$ berlaku

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{b - a}$$

Selanjutnya untuk tiap $n \in \mathbb{N}$ dengan $n > \frac{b-a}{\epsilon}$, tinjau partisi $P_n = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$

Dengan $x_k = a + k \cdot \frac{b-a}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n$ (Disini interval $[a, b]$ terbagi menjadi n sub-interval sama panjang)

Menurut teorema bahwa pada setiap sub-interval $[x_{k-1}, x_k]$, f mencapai nilai maksimum M_k dan minimum m_k . Sebut,

$$f(u_k) = M_k \text{ dan } f(v_k) = m_k$$

Dalam hal ini diperoleh

$$M_k - m_k = f(u_k) - f(v_k) < \frac{\epsilon}{b - a}$$

Dan akibatnya,

$$\begin{aligned} 0 \leq U(P_n, f) - L(P_n, f) &= \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) (x_k - x_{k-1}) \\ &\leq \sum_{k=1}^n \frac{\epsilon}{b - a} \cdot \frac{b - a}{n} = \epsilon \end{aligned}$$

Dari sini dapat disimpulkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} [U(P_n \cdot f) - L(P_n \cdot f)] = 0$ dan karenanya f terintegralkan pada $[a, b]$

Selain fungsi kontinu, teorema berikut menyatakan bahwa fungsi monoton juga terintegralkan.

Teorema 5.5.2

Jika f monoton pada $[a, b]$, maka f terintegralkan pada $[a, b]$

Bukti:

Tanpa mengurangi keumuman, asumsikan f naik pada $[a, b]$, untuk tiap $n \in \mathbb{N}$. Tinjau partisi $P_n := \{x_0, x_1 \dots x_n\}$ dengan $x_k = a + k \cdot \frac{b-a}{n}, k = 0, 1, \dots, n$. Karena f naik pada $[x_{k-1}, x_k]$, maka $m_k = f(x_{k-1})$ dan $M_k = f(x_k)$. Dalam hal ini diperoleh suatu deret teleskopis

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) (x_k - x_{k-1}) &= \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n [f(x_k) - f(x_{k-1})] \\ &= \frac{b-a}{n} [f(b) - f(a)] \end{aligned}$$

Sekarang, jika $\epsilon > 0$ diberikan, maka untuk tiap $n \in \mathbb{N}$ dengan $n > \frac{b-a}{\epsilon} [f(b) - f(a)]$. Berlaku

$$0 \leq U(P_n \cdot f) - L(P_n \cdot f) = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) (x_k - x_{k-1}) < \epsilon$$

Dengan demikian f mestilah terintegralkan pada $[a, b]$.

F. Teorema Dasar Kalkulus Untuk Integral Riemann

Teorema 5.6.1 (Teorema Dasar Kalkulus I)

Misalkan f terbatas pada $I = [a, b]$ dan F didefinisikan pada I sebagai

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, x \in I$$

Maka, F kontinu pada I . Selanjutnya, jika f kontinu di $c \in (a, b)$, maka F mempunyai turunan di c dan $F'(c) = f(c)$.

Berikut ini diberikan Teorema Dasar Kalkulus II untuk integral Riemann, yang dapat dibuktikan tanpa menggunakan Teorema Dasar Kalkulus I melainkan dengan menggunakan Kriteria Keterintegralan Riemann.

Teorema 5.6.2 (Teorema Dasar Kalkulus II).

Misalkan f terintegralkan pada $I = [a, b]$. Jika $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ adalah anti-turunan dari f pada I , maka :

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a),$$

Bukti:

Diberikan $\epsilon > 0$ sembarang, pilih partisi $P := \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ dari I sedemikian sehingga

$$U(P, f) - L(P, f) < \epsilon.$$

Menurut Teorema Nilai Rata-rata (yang diterapkan pada F), pada tiap interval $[x_{k-1}, x_k]$ terdapat titik $tk \in [x_{k-1}, x_k]$ sedemikian sehingga

$$F(x_k) - F(x_{k-1}) = (x_k - x_{k-1})f(tk).$$

Misalkan m_k dan M_k adalah infimum dan supremum dari f pada $[x_{k-1}, x_k]$. Maka

$m_k (x_k - x_{k-1}) \leq F(x_k) - F(x_{k-1}) \leq M_k (x_k - x_{k-1})$ untuk tiap $k = 1, 2, \dots, n$. Perhatikan bahwa bila kita jumlahkan suku-suku di tengah, maka kita peroleh suatu deret teleskopis yang jumlahnya sama dengan $F(b) - F(a)$.

Karena itu, kita peroleh

$$L(P, f) \leq F(b) - F(a) \leq U(P, f)$$

Namun, kita mempunyai

$$L(P, f) \leq \int_a^b f(t) dt \leq U(P, f)$$

Akibatnya, diperoleh

$$\left| \int_a^b f(t) dt - [F(b) - F(a)] \right| < \epsilon$$

Karena ini berlaku untuk $\epsilon > 0$ sembarang, kita simpulkan bahwa

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Soal Latihan

1. Misalkan $f(x) = |x|, x \in [-1, 1]$. terkait dengan f , definisikan

$$F(x) = \int_1^x f(t) dt, x \in [-1, 1]$$

- (a) Peroleh rumus untuk $F(x), x \in [-1, 1]$.
(b) Periksa bahwa $F'(x) = f(x)$ untuk $x \in [-1, 1]$.
(c) Periksa bahwa $\int_{-1}^1 f(t) dt = F(1) - F(-1)$

Petunjuk penyelesaian:

Gunakan Teorema Dasar Kalkulus 1 untuk bagian a dan b. selanjutnya Teorema Dasar Kalkulus II untuk bagian c.

2. Misalkan $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definisikan sebagai

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

terkait dengan f , definisikan

$$F(x) = \int_1^x f(t) dt, x \in [-1, 1]$$

- (a) Peroleh rumus untuk $F(x)$, apakah F kontinu pada $[-1, 1]$?
(b) Tunjukkan bahwa $F'(x) = f(x)$ untuk $x \in [-1, 1], x \neq 0$.
(c) Periksa bahwa $\int_{-1}^1 f(t) dt = F(1) - F(-1)$. Berikan argumen yang mendukung fakta tersebut.

Petunjuk penyelesaian:

Gunakan Teorema Dasar Kalkulus I dan Teorema Dasar Kalkulus II.

G. Teorema Nilai Rata-rata dan Teorema Taylor Untuk Integral

Jika f kontinu pada $I = [a, b]$, maka (menurut Teorema 3.5.5 pada Bab 3) f akan mencapai nilai maksimum M dan minimum m pada $[a, b]$. Menurut proposisi 5.2.4, kita mempunyai

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$$

Atau

$$m \leq \frac{1}{(b - a)} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

Nilai $\frac{1}{(b-a)} \int_a^b f(x) dx$ disebut *nilai rata-rata integral* f pada interval I . (Dalam versi diskrit, nilai rata-rata aritmatik dari sejumlah bilangan adalah jumlah dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan itu. Dalam versi 'kontinum', integral menggantikan jumlah dan panjang interval menggantikan banyaknya interval.)

Mengingat m dan M ada di daerah nilai f dan $\frac{1}{(b-a)} \int_a^b f(x) dx$ ada diantara kedua nilai tersebut, maka menurut Teorema Nilai Antara terdapat suatu titik $c \in I$ sedemikian sehingga

$$f(c) = \frac{1}{(b - a)} \int_a^b f(x) dx$$

Fakta ini dikenal dengan sebagai *Teorema Nilai Rata-rata untuk Integral*, yang dinyatakan di bawah ini.

Teorema 5.7.1 (Teorema Nilai Rata-rata untuk Integral)

Jika f kontinu pada $I = [a, b]$, maka terdapat $c \in I$ sedemikian sehingga

$$f(c) = \frac{1}{(b-a)} \int_a^b f(x) dx$$

Teorema 5.7.2 (Teorema Taylor untuk Integral)

Misalkan $f, f', \dots, f^{(n)}$ kontinu pada $I = [a, b]$, maka

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a) + E_n$$

Dengan $E_n = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^b (b-t)^{n-1} f^{(n)}(t) dt$.

Bukti:

Dengan perintegralan parsial di peroleh

$$\begin{aligned} E_n &= \frac{1}{(n-1)!} \left[(b-t)^{n-1} f^{(n-1)}(t) \Big|_a^b + (n-1) \int_a^b (b-t)^{n-2} f^{(n-1)}(t) dt \right] \\ &= \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a) \\ &\quad + \frac{1}{(n-1)!} \int_a^b (b-t)^{n-2} f^{(n-1)}(t) dt \end{aligned}$$

Jika dilakukan pengintegralan parsial hingga n kali, maka teorema di atas terbukti.

Soal Latihan

1. Buktikan jika f kontinu pada $I = [a, b]$ dan $f(x) \geq 0$ untuk setiap $x \in I$ maka terdapat $c \in I$ sedemikian sehingga

$$f(c) = \left[\frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(x) dx \right]^{1/2}$$

Petunjuk penyelesaian:

Diketahui jika f kontinu pada $I = [a, b]$ dan $f(x) \geq 0$ untuk setiap $x \in I$.

Permasalahan: akan dibuktikan bahwa

$$f(c) = \left[\frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(x) dx \right]^{1/2}.$$

Gunakan teorema rata-rata untuk integral

2. Buktikan jika f kontinu pada $I = [a, b]$ dan $f(x) \geq 0$ untuk setiap $x \in I$ maka untuk sebarang $k \in \mathbb{N}$ terdapat $c = c_k \in I$ sedemikian sehingga

$$f(c) = \left[\frac{1}{b-a} \int_a^b f^k(x) dx \right]^{1/k}$$

Petunjuk penyelesaian:

Diketahui jika f kontinu pada $I = [a, b]$ dan $f(x) \geq 0$ untuk setiap $x \in I$.

Permasalahan: akan dibuktikan bahwa

$$f(c) = \left[\frac{1}{b-a} \int_a^b f^k(x) dx \right]^{1/k}.$$

Gunakan teorema rata-rata untuk integral



BAB VI

TOPOLOGI DI RUANG KARTESIUS

Pada bagian ini membahas tentang interval dalam \mathbb{R} , himpunan terbuka, himpunan tertutup, himpunan sekitar (*neighbourhood*), sel-sel tertumpuk (*nested cell*), titik kumpul, Teorema Bolzano Weierstrass dan Heine Borel, dan himpunan terhubung.

A. Interval dalam \mathbb{R}

Jika diberikan $a, b \in \mathbb{R}$ dengan $a < b$, maka interval terbuka yang ditentukan oleh a dan b adalah himpunan

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

Titik a dan b disebut titik ujung (endpoints) interval. Titik ujung tidak termuat dalam interval terbuka. Jika kedua titik ujung digabungkan ke dalam interval terbukanya, maka disebut interval tertutup, yaitu himpunan

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$$

Interval setengah terbuka atau setengah tertutup adalah interval yang memuat salah satu titik ujungnya. Gabungan interval terbuka dengan titik ujung a , ditulis $[a, b)$, dan gabungan interval terbuka dengan titik ujung b , ditulis $(a, b]$. Masing-masing interval tersebut terbatas dan mempunyai panjang (*length*) yang didefinisikan dengan $b - a$. Jika $a = b$, maka interval terbukanya berkorespondensi dengan himpunan kosong $(a, a) = \emptyset$, dan interval tutupnya berkorespondensi dengan himpunan singleton $[a, a] = \{a\}$.

Berikut ini diberikan lima jenis interval tidak terbatas. Simbol ∞ (atau $+\infty$) dan $-\infty$ digunakan sebagai symbol titik

ujungnya yang tak berhingga. Interval terbuka tak terbatas adalah himpunan dengan bentuk

$$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\} \text{ dan } (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}.$$

Himpunan pertama tidak mempunyai batas atas dan yang kedua tidak mempunyai batas bawah. Diberikan interval tertutup tak terbatas, yaitu:

$$[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\} \text{ dan } (-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}.$$

Himpunan \mathbb{R} dapat dituliskan sebagai $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$.

Teorema 6.1.1 Teorema Karakteristik Interval

Jika S adalah subset \mathbb{R} yang memuat paling sedikit dua titik dan mempunyai sifat:

$$\text{Jika } x, y \in S \text{ dan } x < y \text{ maka } [x, y] \subseteq S$$

Maka S merupakan suatu interval.

Interval Tertumpuk (susut) (Nested Interval)

Telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa barisan adalah fungsi $f: \mathbb{N} \rightarrow A \neq \emptyset$. Jika A adalah himpunan interval-interval, maka terbentuk barisan interval $\{I_n\}_{n \geq 1}$ atau biasa ditulis I_n .

Definisi 6.1.2

Barisan I_n , $n \in \mathbb{N}$ dikatakan **interval susut** (*nested intervals*) jika

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots \supseteq I_n \supseteq I_{n+1} \supseteq \dots$$

Contoh 6.1.1

Diberikan $I_n = [0, \frac{1}{n}]$ yaitu $I_1 = [0, 1]$, $I_2 = [0, \frac{1}{2}]$, $I_3 = [0, \frac{1}{3}]$, ... maka $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots$ (*nested*) dan $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{0\}$ (mempunyai titik berserikat)

6.1.3 Sifat interval susut (Nested Interval Property)

Jika $I_n = [a_n, b_n]$, $n \in \mathbb{N}$ interval tertutup terbatas dan $I_n \supseteq I_{n+1}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ (*interval susut*) maka $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset$, yaitu terdapat $\zeta \in \mathbb{R}$ sedemikian hingga $\zeta \in I_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Selanjutnya, jika panjang $I_n = b_n - a_n$ memenuhi $\inf\{b_n - a_n : n \in \mathbb{N}\} = 0$, maka elemen berserikat ζ tersebut tunggal.

Bukti:

Dibentuk himpunan $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Jelas $A \neq \emptyset$ sebab $a_1 \in A$ dan $A \subset \mathbb{R}$. Himpunan A terbatas ke atas sebab $I_n \supseteq I_{n+1}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Sehingga diperoleh bahwa

$$a_n \leq b_n$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, yang berarti b_1 batas bawah A . Menggunakan sifat lengkap \mathbb{R} , maka supremum A ada, yaitu terdapat $\zeta \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\zeta = \sup A$. Jelas bahwa

$$a_m \leq \zeta$$

untuk setiap $m \in \mathbb{N}$. Selanjutnya untuk sebarang $n, m \in \mathbb{N}$ berlaku

$$a_n \leq a_{n+m} \leq b_{n+m} \leq b_m \quad \text{atau} \quad a_n \leq b_m$$

hal ini berakibat

$$\sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \leq b_m \quad \text{atau} \quad \zeta \leq b_m$$

karena $a_m \leq \zeta$ dan $\zeta \leq b_m$, maka diperoleh $a_m \leq \zeta \leq b_m$ untuk setiap $m \in \mathbb{N}$, berarti $\zeta \in I_n = [a_n, b_n]$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Sehingga

$$\zeta \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n.$$

yang berakibat $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset$. Jika $\eta = \inf\{b_n : n \in \mathbb{N}\}$, maka dengan cara yang sama (sebelumnya), diperoleh $\eta \in I_m$ untuk setiap $m \in \mathbb{N}$. Sehingga diperoleh

$$\eta \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n.$$

Akan dibuktikan ketunggalannya yaitu, $\eta = \zeta$. Diambil sebarang $\varepsilon > 0$. Jika $\inf\{b_n - a_n : n \in \mathbb{N}\} = 0$, maka terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sehingga

$$0 \leq \eta - \zeta \leq b_{n_0} - a_{n_0} < \varepsilon \text{ atau } 0 \leq \eta - \zeta < \varepsilon$$

Karena berlaku untuk sebarang $\varepsilon > 0$, maka $\eta - \zeta = 0$ atau $\eta = \zeta$. Jadi terbukti $\eta = \zeta \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ tunggal.

Himpunan Terhitung (*Countable*)

Diberikan $\xi_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, $n \in \mathbb{N}$. Dua himpunan A dan B dikatakan **ekuivalen**, ditulis $A \sim B$ jika ada fungsi bijektif $f: A \rightarrow B$.

Contoh 6.1.2

1. Misalkan $A = \{1, 2, 3\}$ dan $B = \{a, b, c\}$, maka $A \sim B$.

2. Misalkan $f: A \rightarrow C$ dengan $C = \{w, x, y, z\}$, maka $A \sim C$

Suatu himpunan dikatakan **tak berhingga** (*infinite*) jika himpunan tersebut ekuivalen dengan salah satu himpunan bagian sejatinya. Jika tidak demikian, maka himpunan tersebut dikatakan **berhingga** (*finite*), yaitu ekuivalen dengan ξ_n .

Contoh 6.1.3

1. Himpunan $A = \{2, 3, 4\}$ adalah berhingga

2. Misalkan $N = \{1, 2, 3, \dots\}$ dan $T = \{2, 4, 6, \dots\} \subseteq N$.

Fungsi $f: N \rightarrow T$ dengan $n \rightarrow f(n) = 2n$. Jadi N tak berhingga maka T juga tak berhingga.

Suatu himpunan D dikatakan **denumerable** jika $D \sim N$. Suatu himpunan dikatakan **terhitung** (*countable*) jika himpunan tersebut berhingga atau *denumerable*. Jika tidak, maka dikatakan himpunan **tak terhitung** (*uncountable* atau

non denumerable), yaitu himpunan yang tidak ekuivalen dengan \mathbb{N} . Jika himpunan A terhitung, maka A dapat disajikan sebagai $A = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ dengan $x_i \neq x_j$ untuk $i \neq j$.

Contoh 6.1.4

1. Himpunan \emptyset terhitung berhingga.
2. Himpunan \mathbb{N} terhitung tak berhingga.
3. Himpunan $A = \{1,2,3\}$ terhitung berhingga.

Teorema 6.1.4

Himpunan $I = [0,1]$ tak terhitung

Bukti:

Andaikan I terhitung, maka dapat ditulis dengan:

$$I = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots\}$$

Dikonstruksikan barisan interval tertutup, terbatas, susut (*nested*), dan $\inf\{b_n - a_n : n \in \mathbb{N}\} = 0$. Interval $I = [0,1]$ dibagi menjadi tiga sama panjang, yaitu:

$$\left[0, \frac{1}{3}\right], \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right], \text{ dan } \left[\frac{2}{3}, 1\right]$$

Titik $x_1 \in I$ termuat dalam paling banyak dua sub interval. Pilih sub interval yang tidak memuat x_1 , namakan $I_1 = [a_1, b_1]$. Jadi $x_1 \notin I_1$. Selanjutnya I_1 dibagi menjadi tiga sama panjang yaitu:

$$\left[a_1, a_1 + \frac{1}{9}\right], \left[a_1 + \frac{1}{9}, a_1 + \frac{2}{9}\right], \left[a_1 + \frac{2}{9}, b_1\right]$$

Kemudian pilih sub interval yang tidak memuat x_2 , namakan $I_2 = [a_2, b_2]$. Jadi $x_2 \notin I_2$. Jika proses diteruskan, diperoleh barisan interval tertutup, terbatas, $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \dots \supset I_n$ dengan $\inf\{b_n - a_n : n \in \mathbb{N}\} = \inf\{\frac{1}{3^n}\}$. Menggunakan sifat *Nested Interval* maka terdapat dengan tunggal $y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$. Berarti $y \in I$, yaitu $y_n = x$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$. Akibatnya $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ yaitu $x_n \in I_n$. Sedangkan dari konstruksi diperoleh

$x_n \notin I_n$. Timbul kontradiksi, yang benar adalah $I = [0,1]$ tak terhitung, sehingga \mathbb{R} juga tak terhitung.

B. Himpunan Terbuka

Definisi 6.2.1

Suatu himpunan G dalam \mathbb{R}^p dikatakan terbuka dalam \mathbb{R}^p , jika untuk setiap titik $x \in G$, terdapat suatu bilangan real $r > 0$ sehingga setiap titik y dalam \mathbb{R}^p yang memenuhi $\|x - y\| < r$, juga termuat dalam G , atau suatu himpunan G terbuka jika untuk setiap titik dalam G adalah pusat dari beberapa bola terbuka yang seluruhnya termuat dalam G .

Contoh 6.2.1

- Keseluruhan himpunan \mathbb{R}^p adalah terbuka, karena kita dapat mengambil $r = 1$ untuk sebarang x
- Himpunan $G = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}$ adalah terbuka dalam $\mathbb{R} = \mathbb{R}^1$
Himpunan $F = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}$ tidak terbuka dalam \mathbb{R} . Mengapa?
- Himpunan $G = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ dan $H = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x^2 + y^2 < 1\}$ adalah terbuka, tetapi $F = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ tidak terbuka dalam \mathbb{R}^2 . Mengapa?
- Himpunan $G = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 1, y = 0\}$ tidak terbuka dalam \mathbb{R}^2 . Himpunan $H = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < y < 1\}$ adalah himpunan terbuka, tetapi himpunan $F = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y < 1\}$ tidak terbuka dalam \mathbb{R}^2 .
- Himpunan $G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z > 0\}$ adalah terbuka dalam \mathbb{R}^3 , juga himpunan $H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x > 0, y > 0, z > 0\}$, sedangkan himpunan $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = z\}$ tidak terbuka dalam \mathbb{R}^3 .

- f. Jika B suatu bola dengan pusat x dan jari-jari $a - \|x - z\|$ termuat dalam B . Jadi B terbuka dalam \mathbb{R}^p .
- g. Himpunan $G = \emptyset$ adalah terbuka dalam \mathbb{R}^p , karena tidak memiliki titik sama sekali, dan persyaratan definisi secara trivial dipenuhi.

Teorema 6.2.2

- a. Himpunan kosong \emptyset dan seluruh ruang \mathbb{R}^p adalah terbuka dalam \mathbb{R}^p
- b. Irisan dari sebarang dua himpunan terbuka adalah terbuka dalam \mathbb{R}^p
- c. Gabungan dari sebarang koleksi himpunan-himpunan terbuka adalah terbuka dalam \mathbb{R}^p

Bukti

- a. Sudah dijelaskan sifat-sifat keterbukaan himpunan-himpunan kosong \emptyset dalam \mathbb{R}^p
- b. Misalkan G_1 dan G_2 terbuka dan $G_3 = G_1 \cap G_2$. Untuk menunjukkan bahwa G_3 terbuka, misalkan $x \in G_3$. Karena x termuat dalam G_1 , terdapat $r_1 > 0$, sehingga jika $\|x - z\| < r_1$, maka $z \in G_1$. Dengan cara sama terdapat $r_2 > 0$, sehingga $\|x - w\| < r_2$, maka $w \in G_2$. Dengan memilih $r_3 = \min\{r_1, r_2\}$ kita simpulkan bahwa jika $y \in \mathbb{R}^p$ sehingga $\|x - y\| < r_3$, maka termuat dalam G_1 dan G_2 . Disini elemen y yang demikian termuat dalam $G_3 = G_1 \cap G_2$, yang menunjukkan bahwa G_3 terbuka dalam \mathbb{R}^p .
- c. Misalkan $\{G_\alpha, G_\beta, \dots\}$ adalah koleksi himpunan-himpunan terbuka dalam \mathbb{R}^p . Misalkan $G = G_\alpha \cup G_\beta \cup \dots$. Untuk menunjukkan bahwa G terbuka, misalkan $x \in G$. Dengan definisi gabungan dipenuhi bahwa untuk himpunan tertentu sebut misalnya G_λ , didapat $x \in G_\lambda$, karena G_λ terbuka, terdapat suatu bola terbuka dengan pusat x yang

seluruhnya termuat dalam G_λ . Karena $G_\lambda \subseteq G$, bola ini seluruhnya termuat dalam G , yang menunjukkan bahwa G terbuka dalam \mathbb{R}^n .

Soal Latihan

1. Berikan contoh dalam \mathbb{R}^2 dan \mathbb{R}^3 , himpunan-himpunan terbuka dan tidak terbuka. Jelaskan alasan anda!

Petunjuk penyelesaian:

Mencari himpunan terbuka dan tidak terbuka dalam \mathbb{R}^2 dan \mathbb{R}^3

2. Selidiki himpunan-himpunan berikut, terbuka atau tidak terbuka. Jelaskan pendapat anda:

a. $F = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2: x^2 + y^2 < 1, -\frac{1}{2} < y < \frac{1}{2}\}$

b. $G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3: x^2 + y^2 < 1, z = 0\}$

Petunjuk penyelesaian:

Perhatikan definisi himpunan terbuka. Membuat grafik pada \mathbb{R}^2 dan \mathbb{R}^3 . Kemudian menentukan apakah F dan G merupakan himpunan terbuka atau bukan.

C. Himpunan Tertutup

Definisi 6.3.1

Suatu himpunan F dalam \mathbb{R}^p dikatakan tertutup dalam \mathbb{R}^p apabila komplementnya $F^c = \mathbb{R}^p \setminus F$ terbuka dalam \mathbb{R}^p .

Contoh 6.3.1

- Keseluruhan himpunan \mathbb{R}^p tertutup dalam \mathbb{R}^p karena komplementnya \emptyset terbuka dalam \mathbb{R}^p
- Himpunan kosong \emptyset tertutup dalam \mathbb{R}^p karena komplementnya dalam \mathbb{R}^p (seluruh \mathbb{R}^p) terbuka dalam \mathbb{R}^p
- Himpunan $F = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}$ tertutup dalam \mathbb{R} . Cara termudah untuk melihat ini adalah perhatikan komplementnya dalam \mathbb{R} yaitu gabungan dari dua himpunan $\{x \in \mathbb{R} : x < 0\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x > 1\}$ yang masing-masing terbuka. Juga himpunan $\{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x\}$ adalah tertutup.
- Himpunan $F = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ adalah tertutup karena komplementnya dalam \mathbb{R}^2 adalah himpunan $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > 1\}$ yang terbuka.
- Himpunan $H : \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0\}$ juga tertutup dalam \mathbb{R}^3 , seperti juga $F : \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = z\}$.
- Bola tertutup B dengan pusat x dalam \mathbb{R}^p , jari-jari $r > 0$ adalah himpunan tertutup dalam \mathbb{R}^p . Karena jika $z \notin B$, maka bola terbuka dengan pusat z dan jari-jari $\|z - x\| - r$ tertutup dalam B^c . Karena B^c terbuka dan B tertutup dalam \mathbb{R}^p .

Teorema 6.3.2

- a. Himpunan kosong \emptyset dan seluruh ruang \mathbb{R}^p tertutup dalam \mathbb{R}^p
- b. Gabungan dari dua himpunan tertutup sebarang adalah tertutup dalam \mathbb{R}^p
- c. Irisan dari sebarang koleksi himpunan-himpunan tertutup dalam \mathbb{R}^p adalah tertutup dalam \mathbb{R}^p .

Bukti:

- a. Sudah dijelaskan tentang sifat-sifat ketertutupan himpunan-himpunan \emptyset dalam \mathbb{R}^p .
- b. Misalkan $G = G_1 \cup G_2$, G_1 dan G_2 adalah himpunan tertutup. Akan ditunjukkan bahwa G tertutup. Telah dibuktikan bahwa irisan dari sebarang dua himpunan terbuka adalah terbuka dalam \mathbb{R}^p . Berdasarkan definisi himpunan tutup bahwa F tertutup jika dan hanya jika F^c adalah himpunan buka. Maka :

$$\begin{aligned} G &= G_1 \cup G_2 && \text{tertutup} \\ G^c &= (G_1 \cup G_2)^c && \text{Hukum De Morgan} \\ &= G_1^c \cap G_2^c \end{aligned}$$

- c. Karena G_1^c dan G_2^c adalah himpunan buka, maka $G^c = G_1^c \cap G_2^c$ adalah buka. Jadi dapat disimpulkan bahwa G adalah tutup di \mathbb{R}^p .
- d. Misalkan $\{G_1, G_2, G_3, \dots\}$ adalah koleksi himpunan-himpunan tutup dalam \mathbb{R}^p . Ambil $G = G_1 \cap G_2 \cap G_3 \cap \dots$. Akan ditunjukkan bahwa G adalah tertutup dalam \mathbb{R}^p . Menurut Teorema 6.2.2, telah dibuktikan bahwa gabungan dari sebarang koleksi himpunan-himpunan buka adalah buka dalam \mathbb{R}^p . Berdasarkan definisi himpunan tutup bahwa F tutup jika dan hanya jika F^c adalah buka. Maka,

$$\begin{aligned} G &= G_1 \cap G_2 \cap G_3 \cap \dots && \text{Tertutup} \\ G^c &= (G_1 \cap G_2 \cap G_3 \cap \dots)^c && \text{Hukum de Morgan} \end{aligned}$$

$$= G_1^c \cup G_2^c \cup G_3^c \cup \dots$$

Karena $G_1^c, G_2^c, G_3^c, \dots$ himpunan buka dalam \mathbb{R}^p , maka $G^c = G_1^c \cup G_2^c \cup G_3^c \cup \dots$ adalah buka dalam \mathbb{R}^p . Jadi dapat disimpulkan bahwa G tertutup dalam \mathbb{R}^p .

D. Sekitar (*Neighbourhood*)

Definisi 6.4.1

- Jika $x \in \mathbb{R}^p$, maka sebarang himpunan yang memuat suatu himpunan terbuka dimana x termuat disebut suatu sekitar dari x (*Neighbourhood* x).
- Suatu titik $x \in \mathbb{R}^p$ disebut titik dalam (*interior point*) dari suatu himpunan $A \subseteq \mathbb{R}^p$ jika ada suatu sekitar dari x yang seluruhnya termuat dalam A .
- Suatu titik $x \in \mathbb{R}^p$ disebut titik batas (*boundary point*) dari himpunan $A \subseteq \mathbb{R}^p$, jika setiap sekitar dari x memuat satu titik dari A dan satu titik dari A^c .
- Suatu titik $x \in \mathbb{R}^p$ disebut titik luar (*exterior point*) dari suatu himpunan $A \subseteq \mathbb{R}^p$, jika terdapat suatu sekitar dari x yang seluruhnya termuat dalam A^c .

Contoh 6.4.1

- Himpunan U suatu sekitar dari titik x jika dan hanya jika terdapat satu bola buka dengan pusat x seluruhnya terletak dalam U .
- Titik x suatu titik dalam A jika dan hanya jika terdapat satu bola dengan pusat x seluruhnya termuat dalam A
- Titik x suatu titik batas dari himpunan A , jika dan hanya jika untuk setiap bilangan real n terdapat $a_n \in A$ dan $b_n \in A^c$ sedemikian sehingga $||x - a_n|| < 1/n$ dan $||x - b_n|| < 1/n$
- Setiap titik dalam interval $(0,1) \subset \mathbb{R}$ adalah titik dalam
- Titik 0 dan 1 adalah titik batas dari $(0,1)$

- f. Andaikan $A = [0,1] \subset \mathbb{R}$, maka titik dalam A adalah titik dalam-dalam $(0,1)$. Titik 0 dan 1 adalah titik batas dari A .

Teorema 6.4.3

Suatu himpunan $F \subseteq \mathbb{R}^p$ tertutup jika dan hanya jika F memiliki semua titik batasnya.

Bukti:

\Rightarrow Misalkan F tertutup dan x suatu titik batas F . Jika $x \notin F$, maka himpunan terbuka F^c memuat x dan tanpa titik-titik dari F , kontradiksi bahwa titik x titik batas F , maka $x \in F$.

\Leftarrow Sebaliknya, andaikan bahwa F memuat semua titik batasnya. Jika $y \notin F$, maka y bukan titik dalam F atau bukan titik batas F . Karena itu y titik luar dari F . karena itu ada suatu sekitar M dari y yang seluruhnya termuat dalam F^c . Karena hal ini berlaku untuk semua $y \notin F$, kita simpulkan bahwa F^c terbuka dan akibatnya F tertutup dalam \mathbb{R}^p .

Soal latihan

1. Manakah titik dalam, titik batas, dan titik luar dari himpunan $[0,1]$, simpulkan bahwa himpunan tersebut tidak terbuka dan tidak tertutup!

Petunjuk penyelesaian:

Perhatikan definisi titik dalam, titik batas, dan titik luar. Tentukan titik dalam, titik batas, dan titik luar himpunan $[0,1]$ sesuai definisi.

2. Diketahui $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2: 4 \leq x^2 + y^2 \leq 16\}$
 - a. Tunjukkan bahwa himpunan A tertutup!
 - b. Tentukan titik dalam himpunan A !
 - c. Tentukan titik batas himpunan A !
 - d. Tentukan titik luar himpunan A !
 - e. Gambar grafik dari himpunan A !

Petunjuk penyelesaian:

Perhatikan definisi himpunan tertutup, titik dalam, titik batas, dan titik luar. Untuk memudahkan menentukan titik dalam, titik batas dan titik luarnya, terlebih dahulu gambar grafik dari himpunan A .

E. Sel-sel Tertumpuk (*Nested Cell*)

Jika $a \leq b$, maka selang terbuka pada \mathbb{R} dinyatakan dengan (a,b) ialah himpunan yang didefinisikan dengan $(a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$, dan selang tertutup $[a,b]$ pada \mathbb{R} adalah himpunan $[a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.

Hasil kali kartesius dua interval biasa disebut suatu siku empat dan hasil kali kartesius tiga interval disebut parallel epipedum. Untuk sederhananya digunakan istilah “sel” untuk “selang” tanpa memperhatikan dimensi ruang.

Definisi 6.5.1

Suatu sel terbuka J dalam \mathbb{R}^p adalah suatu produk kartesius dari- p sel-sel terbuka dari bilangan-bilangan real, yang berbentuk:

$$J = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p : a_i < x_i < b_i, i = 1, 2, \dots, p\}$$

Suatu sel tertutup I dalam \mathbb{R}^p adalah suatu produk kartesius dari- p sel-sel tertutup dari bilangan-bilangan real, yang berbentuk:

$$I = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p : a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, 2, \dots, p\}.$$

Suatu himpunan bagian $A \subseteq \mathbb{R}^p$ terbatas, jika A termuat dalam sel tertentu.

Selanjutnya, barisan sel $I_n, n \in \mathbb{N}$, yang memenuhi sifat $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots \supseteq I_n \supseteq I_{n+1} \supseteq \dots$ disebut sel tertumpuk

Misalkan, barisan interval $I_n = [0, \frac{1}{n}]$, $n \in \mathbb{N}$. Sehingga diperoleh,

$$I_1 = [0,1] \supseteq [0, \frac{1}{2}] = I_2,$$

yang merupakan sel tertumpuk.

Teorema 6.5.2 Sel-sel tertumpuk (Nested Cell Teorema)

Misalkan (I_k) adalah sebuah barisan sel-sel tertutup, tidak kosong dalam \mathbb{R}^p , yang tertumpuk dalam pengertian bahwa $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots \supseteq I_k \supseteq \dots$. Maka terdapat suatu titik dalam \mathbb{R}^p yang termuat dalam semua sel itu.

Bukti:

Anggap bahwa I_k adalah sel $I_k = \{(x_1, x_2, \dots, x_p) : a_{k1} \leq x_1 \leq b_{k1}, \dots, a_{kp} \leq x_p < b_{kp}\}$. Mudah terlihat bahwa sel $[a_{k1}, b_{k1}]$, $k \in \mathbb{N}$, membentuk suatu tertumpuk barisan sel-sel tertutup, tidak kosong dari bilangan-bilangan real, dan dengan sifat lengkap dari sistem bilangan real \mathbb{R} , terdapat suatu bilangan real y , yang termuat dalam semua sel-sel ini. Menggunakan alasan ini untuk setiap koordinat, didapat satu titik $y = (y_1, y_2, \dots, y_p)$ dari \mathbb{R}^p , sehingga jika j memenuhi $J = 1, 2, \dots, p$, maka y_j termuat dalam sel-sel $\{[a_{kj}, b_{kj}] : k \in \mathbb{N}\}$. Karena y termuat dalam semua sel (I_k) .

Soal Latihan

1. Misalkan $I_n = (0, \frac{1}{n}) \times (0, \frac{1}{n}) \times \dots \times (0, \frac{1}{n})$, $n \in \mathbb{N}$. Buktikan I_n adalah sel tertumpuk!
2. Misalkan $I_n = (n, \infty) \times \dots \times (n, \infty)$, $n \in \mathbb{N}$. Buktikan bahwa I_n adalah sel tertumpuk!

Petunjuk penyelesaian nomor 1 dan 2:

Gunakan definisi dan teorema sel-sel tertumpuk. Anggap bahwa I_n adalah sel $I_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_p) : a_{n1} \leq x_1 \leq b_{n1}, \dots, a_{np} \leq x_p < b_{np}\}$. Mudah terlihat bahwa sel $[a_{n1}, b_{n1}]$, $n \in \mathbb{N}$, membentuk suatu tertumpuk barisan sel-sel tertutup, tidak kosong dari bilangan-bilangan real.

F. Titik Kumpul

Definisi 6.6.1

Suatu titik $x \in \mathbb{R}^p$ adalah titik kumpul dari suatu himpunan bagian $A \subseteq \mathbb{R}^p$. dalam hal setiap sekitar dari x memuat sekurang-kurangnya satu titik dari A , yang tidak sama dengan x .

Contoh 6.6.1

- a. Satu titik $x \in \mathbb{R}^p$ titik kumpul dari A jika dan hanya jika untuk setiap bilangan asli n terdapat satu anggota $a_n \in A$ sehingga $0 < ||x - a_n|| < \frac{1}{n}$.
- b. Jika suatu titik batas suatu himpunan tidak termuat pada himpunan tersebut, maka titik tersebut adalah titik kumpul himpunan tersebut.
- c. Setiap titik dalam interval satuan I dari \mathbb{R} adalah titik kumpul dari I .

- d. Misalkan $A = (0,1)$ maka setiap titik dari A adalah titik-titik dalam dan titik-titik kumpul dari A . Jadi 0 dan 1 adalah titik kumpul dari A .
- e. Suatu himpunan bagian berhingga dari \mathbb{R}^p tidak mempunyai titik kumpul.
- f. Himpunan tak berhingga dari bilangan-bilangan bulat $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$ tidak mempunyai titik kumpul.

Teorema 6.6.3

Suatu himpunan $F \subseteq \mathbb{R}^p$ tertutup jika dan hanya jika memiliki semua titik-titik kumpulnya.

Bukti:

Misalkan F tertutup dan x suatu titik kumpul dari F . Jika $x \notin F$, maka himpunan terbuka F^c adalah sekitar dari x dan karenanya memuat sekurang-kurangnya satu titik dari F . tetapi ini tidak mungkin. Jadi disimpulkan $x \in F$. Sebaliknya jika F memuat semua titik kumpulnya, akan diperlihatkan bahwa F^c terbuka. Karena jika $y \in F^c$, maka y bukan titik kumpul F . Karena itu ada satu sekitar V_y dari y sehingga $F \cap V_y = \emptyset$. Sepanjang ini berlaku untuk setiap $y \in F^c$, kita simpulkan F^c terbuka dalam \mathbb{R}^p , dan F tertutup.

Soal Latihan

1. Andaikan $A, B \subseteq \mathbb{R}^p$ dan x titik kumpul $A \cup B$ dalam \mathbb{R}^p . Tunjukkan bahwa x titik kumpul A atau x titik kumpul B !
2. Andaikan $A, B \subseteq \mathbb{R}^p$ dan x titik kumpul $A \cap B$ dalam \mathbb{R}^p . Tunjukkan bahwa x titik kumpul A dan x titik kumpul B !
3. Berdasarkan soal pada bagian 4.3 (2). Tentukan titik kumpul dari himpunan A !
Petunjuk penyelesaian:
Gunakan teorema dan definisi titik kumpul.

G. Teorema Bolzano-Weierstrass dan Heine-Borel

Teorema 6.7.1

Setiap himpunan bagian tak terhingga yang terbatas dari \mathbb{R} mempunyai satu titik kumpul.

Bukti:

Misalkan S himpunan tak berhingga terbatas maka dimuat oleh suatu interval $I_1 = [a, b]$. Proses bukti ini adalah memotong berulang-ulang hingga membentuk barisan sel-sel tertumpuk (*nested cell*) yang tertutup.

Pertama-tama I_1 kita potong menjadi dua subinterval $[a, \frac{1}{2}(a + b)]$ dan $[\frac{1}{2}(a + b), b]$. Karena I_1 memuat tak berhingga titik, maka salah satu dari sub interval di atas pasti memuat tak berhingga titik. Sub interval ini kita beri lambang I_2 . Misalkan $I_2 = [a_2, b_2]$. I_2 kita potong menjadi dua $[a_2, \frac{1}{2}(a_2 + b_2)]$ dan $[\frac{1}{2}(a_2 + b_2), b_2]$. Dari pemotongan ini tentu salah satu interval $[a_2, \frac{1}{2}(a_2 + b_2)]$ atau $[\frac{1}{2}(a_2 + b_2), b_2]$ memuat tak berhingga titik. Kita lambangkan $I_3 = [a_3, b_3]$ pada interval yang memuat tak berhingga titik.

Proses ini kita lanjutkan sehingga kita peroleh barisan sel tertumpuk yang tertutup $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots \supseteq I_n \supseteq \dots$, dengan panjang interval $I_n = \frac{b-a}{2^{n-1}}$.

$S \cap I_n$ memuat tak berhingga titik, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Menurut teorema sel tertumpuk, terdapat: $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$. Akan ditunjukkan bahwa x titik kumpul dari S .

Ambil $\varepsilon > 0$ sebarang dan $V = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ persekitaran- ε dari x . Pilih $n \in \mathbb{N}$ sehingga $\frac{b-a}{2^{n-1}} < \varepsilon$. Karena $x \in I_n$ dan panjang $I_n < \varepsilon$, maka $I_n \subseteq V$ dan karena juga memuat tak berhingga titik dari S yang berbeda dari x , maka x adalah titik kumpul dari S .

Definisi 6.7.2

Suatu himpunan K disebut kompak, apabila ia termuat dalam gabungan dari suatu koleksi himpunan-himpunan terbuka $G = \{G_\alpha\}$, maka ia juga termuat dalam gabungan sejumlah hingga himpunan-himpunan tertentu dalam G .

Suatu koleksi G dari himpunan-himpunan terbuka yang gabungannya memuat K sering disebut selimut dari K . Karena itu syarat dari K agar kompak ialah bahwa setiap selimut G dari K dapat diganti ax dengan satu selimut berhingga dari K , hanya menggunakan himpunan-himpunan dalam G . Kita ingat agar dapat menggunakan definisi untuk membuktikan bahwa suatu himpunan K kompak, kita perlu memeriksa suatu koleksi himpunan-himpunan terbuka sebarang, yang gabungannya memuat K , dan menunjukkan bahwa K termuat dalam gabungan sub koleksi berhingga tertentu dari tiap koleksi demikian. Dilain pihak menunjukkan bahwa suatu himpunan H tidak kompak, cukup menunjukkan satu selimut yang tidak dapat digantikan dengan sub koleksi berhingga yang menyelimuti H .

Contoh 6.7.1

- a. Misalkan $K = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ suatu himpunan bagian berhingga dari \mathbb{R}^p . Jelas, bahwa jika $G = [G_\alpha]$ suatu koleksi himpunan-himpunan terbuka dalam \mathbb{R}^p dan jika setiap titik dari K termasuk dalam himpunan bagian tertentu dari G , maka pada pemilihan secara hati-hati paling banyak m himpunan bagian dari G , juga akan memiliki sifat bahwa gabungan mereka memuat K . Karena itu K adalah himpunan bagian kompak dari \mathbb{R}^p .
- b. Akan dibuktikan menurut definisi bahwa $H = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ tidak kompak. Misalkan $H = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$, jika $H_n = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1 - \frac{1}{n}\}$, untuk $n > 1$. Maka koleksi $x = \{H_n : n > 1\}$ dari himpunan-himpunan terbuka adalah selimut dari H . Jika $\{H_{n_1}, H_{n_2}, \dots, H_{n_k}\}$ adalah sub koleksi berhingga dari x , misalkan $M = \sup \{n_1, n_2, \dots, n_k\}$ sehingga $H_{n_j} \subseteq H_M$, untuk $j = 1, 2, \dots, k$. Jelas bahwa H_M adalah gabungan dari himpunan-himpunan $\{H_{n_1}, H_{n_2}, \dots, H_{n_k}\} = H_M = \bigcup_{i=1}^k H_{n_i}$. Dapat dilihat $H = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$, dan karena $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1 - \frac{1}{M}\} \subseteq H$ tetapi $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1 - \frac{1}{M}\} \not\subseteq H_M$. Karena itu tidak ada subkoleksi berhingga dari H_n dapat menjadi selimut H . Jadi H tidak kompak.
- c. Andaikan $H = (0,1)$ dalam \mathbb{R} . Jika $G_n = (\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n})$, untuk $n > 2$, maka koleksi $G = \{G_n : n > 2\}$ dari himpunan-himpunan terbuka adalah selimut dari H . Jika $\{G_{n_1}, G_{n_2}, \dots, G_{n_k}\}$ adalah sub koleksi berhingga dari G , misalkan $M = \sup \{n_1, n_2, \dots, n_k\}$ sehingga $G_{n_j} \subseteq G_M$, untuk $j = 1, 2, \dots, k$. Jelas bahwa G_M adalah gabungan dari himpunan-himpunan $\{G_{n_1}, G_{n_2}, \dots, G_{n_k}\}$ walaupun bilangan real $\frac{1}{M} \in H$ tetapi $\frac{1}{M} \notin G_M$. Karena

itu tidak ada sub koleksi berhingga dari G dapat menjadi selimut H . Jadi H kompak.

Teorema 6.7.3 (Teorema Heine-Borel)

Suatu himpunan bagian dari \mathbb{R}^p kompak jika dan hanya jika ia tertutup dan terbatas.

Bukti:

Pertama kita tunjukkan bahwa jika K kompak dalam \mathbb{R}^p , maka K tertutup. Misalkan $x \in K^c$ dan untuk setiap bilangan real m , misalkan G_m adalah himpunan yang didefinisikan dengan,

$$G_m = \{y \in \mathbb{R}^p : \{y \in \mathbb{R}^p : \|y - x\| > \frac{1}{m}\}.$$

Nampak bahwa masing-masing himpunan G_m , $m \in \mathbb{N}$, terbuka dalam \mathbb{R}^p . Juga gabungan dari semua himpunan G_m , $m \in \mathbb{N}$, terdiri dari semua titik-titik di \mathbb{R}^p . Kecuali x , karena $x \notin K$, setiap titik dari K termuat dalam himpunan G_m tertentu. Dalam memperhatikan sifat kompak dari K , maka berlaku bahwa ada suatu bilangan asli M sehingga K memuat dalam gabungan dari himpunan-himpunan G_1, G_2, \dots, G_M .

Karena himpunan G_m membesar menurut m , maka K termuat dalam G_M . Disini sekitar $\{z \in \mathbb{R}^p : \|z - x\| > \frac{1}{M}\}$ tidak memotong K , menunjukkan bahwa K^c temuat terbuka. Karena itu K tertutup dalam \mathbb{R}^p .

Selanjutnya tunjukkan bahwa K kompak dalam \mathbb{R}^p , maka K terbatas, (yaitu K termuat dalam himpunan $\{x \in \mathbb{R}^p : \|x\| < r\}$ untuk r yang cukup besar. Dalam kenyataan untuk setiap $m \in \mathbb{N}$, nilai H_m himpunan terbuka yang didefinisikan oleh $H_m = \{x \in \mathbb{R}^p : \|x\| < m\}$. Keseluruhan ruang \mathbb{R}^p dari disini K termuat dalam gabungan dari himpunan H_m yang membesar, $m \in \mathbb{N}$. Karena K kompak, maka terdapat $M \in \mathbb{N}$ sehingga $K \subseteq H_M$. Ini menunjukkan bahwa K terbatas. Jika K tertutup dan terbatas

yang termuat dalam gabungan suatu koleksi $G = \{G_\alpha\}$ dari himpunan-himpunan terbuka dalam \mathbb{R}^p , maka ia termuat dalam gabungan dari sejumlah hingga himpunan-himpunan tertentu dalam G . Karena G terbatas, kita dapat menutupnya dengan sel tertutup I_1 dalam \mathbb{R}^p . Misalnya kita pilih $I_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_p) : |x_k| \leq r, k = 1, 2, \dots, p\}$ untuk $r > 0$ yang besarnya sesuai. Untuk mendapatkan kontradiksi, maka misalkan K tidak termuat dalam gabungan sejumlah hingga himpunan-himpunan manapun dalam G . Karena itu sekurang-kurangnya satu bagian 2^p bagian sel-sel tertutup yang didapat dengan membagi dua sisi-sisi I_1 , memuat titik-titik dari K , dan sedemikian sehingga bagian dari K didalamnya, tidak termuat dalam gabungan sejumlah hingga himpunan-himpunan manapun dalam G . (Karena jika setiap bagian dari 2^p bagian dari K termuat dalam gabungan sejumlah hingga himpunan-himpunan dalam G , maka K akan termuat dalam gabungan sejumlah hingga himpunan-himpunan dalam G , kontradiksi dengan hipotesis). Misalkan I_2 adalah salah satu subset dari pembagian I_1 , yang sedemikian sehingga himpunan tidak kosong $K \cap I_2$, tidak termuat dalam $\bigcup_{\alpha=1}^n G_\alpha, G_\alpha \in G$. Kita lanjutkan proses ini dengan membagi sisi-sisi I_2 untuk mendapatkan 2^p sub sel tertutup dari I_2 , dan misalkan I_3 salah satu subset sehingga himpunan tidak kosong $K \cap I_3$ tidak termuat dalam $\bigcup_{\alpha=1}^m G_\alpha, G_\alpha \in G$, dan seterusnya.

Dengan cara ini diperoleh tumpukan barisan sel-sel tidak kosong (I_n) yang menurut teorema tumpukan sel ada satu titik sekutu y dari I_n . Karena setiap I_n memuat titik-titik dalam K maka titik sekutu y adalah titik kumpul dari K . Karena K tertutup, maka $y \in K$ dan termuat dalam himpunan terbuka G_λ tertentu dalam G . Karena itu ada $\varepsilon > 0$ sehingga semua titik w dengan $\|y - w\| < \varepsilon$, maka $w \in G_\lambda$. Dilain pihak, sel-sel $I_k, k \geq 2$ diperoleh dengan pembagian berturut-turut sisi-sisi sel I_1

$= \{(x_1, x_2, \dots, x_p) : |x_j| \leq r\}$. Jadi panjang sisi I_k adalah $\frac{r}{2^{k-2}}$.

Menurut teorema terdahulu, jika $w \in I_k$, maka $\|y - w\| \leq \frac{\sqrt{p}}{2^{k-3}}$.

Disini jika k terpilih cukup besar sehingga $\frac{r\sqrt{p}}{2^{k-3}} \leq \varepsilon$, maka semua titik-titik dalam I_k termuat dalam himpunan tunggal G_λ . Tetapi ini kontradiksi dengan proses pembentukan I_k sebagai himpunan sehingga $K \cap I_k$ termuat dalam gabungan sejumlah hingga himpunan-himpunan dalam G . Kontradiksi ini menunjukkan bahwa asumsi himpunan K yang tertutup dan terbatas memerlukan sejumlah tak terhingga himpunan-himpunan dalam G untuk menutupnya tidak dapat dilaksanakan.

H. Himpunan Terhubung

Definisi 6.8.1

Suatu himpunan bagian $D \subseteq \mathbb{R}^p$ dikatakan tidak terhubung jika ada dua himpunan terbuka A dan B , sehingga $A \cap D$ dan $B \cap D$ saling asing, tidak kosong dan gabungannya adalah D . Dalam hal ini pasangan A dan B disebut membentuk ketidakterhubungan D . Suatu himpunan bagian yang bukan tidak terhubung disebut terhubung.

Contoh 6.8.1

- Himpunan $H = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ tidak terhubung.
- Himpunan $S = \{\text{semua rasional positif}\}$ dalam \mathbb{R} tidak terhubung karena kita dapat memilih $A = \{x \in \mathbb{R} : x < \sqrt{2}\}$ dan $B = \{x \in \mathbb{R} : x > \sqrt{2}\}$.
- Jika $0 < c < 1$, maka himpunan $A = \{x \in \mathbb{R} : x \leq c\}$ dan $B = \{x \in \mathbb{R} : x > c\}$ memecah interval satuan $I = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}$ ke dalam himpunan yang saling asing dan tidak kosong

yang gabungannya I. Meskipun begitu karena A tidak terbuka, contoh ini tidak menunjukkan bahwa I tidak terhubung.

Teorema 6.8.2

Interval satuan tertutup $I = [0,1]$ adalah himpunan bagian terhubung dari \mathbb{R} .

Bukti:

Kita proses dengan kontradiksi, misalkan himpunan buka A dan B membentuk ketidakterhubungan I. Karena A dan B terbuka, tidak mungkin $A \cap I$ dan $B \cap I$ hanya terdiri dari satu titik. Untuk menghindari sifat keterbatasan, kita misalkan ada titik-titik $a \in A$ dan $b \in B$ sehingga $0 < a < b < 1$. Dengan menggunakan sifat supremum, kita misalkan $c = \sup\{x \in A : x < b\}$. Karena itu $0 < c < 1$; di sini $c \in A \cup B$. Jika $c \in A$, maka $c \neq b$, dan karena A terbuka, ada satu titik $a_1 \in A$, $c < a_1$, sehingga interval $[c, a_1]$ termuat dalam $\{x \in A : x < b\}$, kontradiksi dengan definisi c. Secara sama jika $c \in B$, karena B terbuka maka ada satu titik $b_1 \in B$, $b_1 < c$, sehingga interval $[b_1, c]$ termuat dalam $B \cap I$. kontradiksi dengan definisi c. Karena hipotesis bahwa I tidak terhubung menghasilkan kontradiksi. Jadi interval satuan I adalah terhubung.

Teorema 6.8.3

Keseluruhan ruang \mathbb{R}^p adalah terhubung

Bukti:

Jika tidak demikian maka ada dua himpunan A dan B yang terbuka, tidak kosong dan tidak berpotongan, yang gabungannya adalah \mathbb{R}^p . Misalkan $x \in A$ dan $y \in B$ dan perhatikan segmen garis S yang menghubungkan x dan y, sebutlah $S = \{x + t(y - x) : t \in I\}$. Misalkan $A_1 = \{t \in \mathbb{R} : x + t(y -$

$x) \in A\}$ dan $B_1 = \{t \in \mathbb{R}: x + t(y - x) \in B\}$. Mudah dilihat bahwa A_1 dan B_1 saling asing, tidak kosong dan terbuka.

$A_1, B_1 \subseteq \mathbb{R}$ dan menghasilkan suatu ketidakterhubungan I. kontradiksi dengan teorema 6.8.2.

Teorema 6.8.4 (Akibat)

Hanya \emptyset dan \mathbb{R}^p , himpunan bagian-bagian dari \mathbb{R}^p yang sekaligus terbuka dan tertutup.

Bukti:

Karena jika A terbuka dan tertutup dalam \mathbb{R}^p , maka begitu juga $B = \mathbb{R}^p \setminus A$, jika A tidak kosong, dan bukan juga seluruh \mathbb{R}^p , maka pasangan A dan B membentuk satu ketidakterhubungan untuk \mathbb{R}^p , kontradiksi dengan teorema.

Soal Latihan

1. Jika A dan B adalah himpunan bagian terhubung dari \mathbb{R}^p , berikan contoh bahwa $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, dapat terhubung atau tak terhubung!.

Petunjuk penyelesaian:

Menuliskan contoh $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ merupakan himpunan terhubung atau tidak terhubung berdasarkan definisi himpunan terhubung. Pilih A dan B adalah himpunan bagian terhubung dari \mathbb{R}^p .

2. Jika $C \subseteq \mathbb{R}^p$ terhubung dan x satu titik kumpul dari C , maka $C \cup \{x\}$ adalah terhubung. Buktikan!

Petunjuk penyelesaian:

Gunakan definisi titik kumpul dan himpunan terhubung.

3. Apakah himpunan $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$ merupakan himpunan terhubung? Petunjuk penyelesaian:

Gunakan definisi himpunan terhubung.

Pilih $A = \{x \in \mathbb{R} : x < \frac{3}{2}\}$ dan $B = \{x \in \mathbb{R} : x > \frac{3}{2}\}$, dengan demikian \mathbb{N} tidak terhubung.



BAB VII

RUANG METRIK

Pada bagian ini membahas pengertian dan contoh-contoh ruang metrik, limit di ruang metrik, dan kekontinuan di ruang metrik diantaranya fungsi kontinu di ruang metrik, himpunan buka dan himpunan tutup di ruang metrik, dan terbatas total, lengkap dan kompak.

A. Pengertian Ruang Metrik

Misalkan $R^2 = \{(x_1, x_2): x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$ adalah himpunan titik-titik pada sebuah bidang datar. Di dalam R^2 telah dikenal konsep jarak antara dua titik, yaitu jika titik $S = (x_1, x_2)$ dan titik $T = (y_1, y_2)$, maka jarak antara titik S dan titik T adalah

$$d = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} \text{ atau}$$
$$d = ((x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Didalam $R^3 = \{(x_1, x_2, x_3): x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$ yaitu himpunan semua titik pada suatu ruang juga dikenal konsep jarak antara dua titik, yaitu misalkan titik $K = (x_1, x_2, x_3)$ dan titik $L = (y_1, y_2, y_3)$ maka jarak antara dua titik K dan L adalah:

$$d = ((x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Selanjutnya perluasan dari R^3 adalah R^n dengan $n \geq 4$. Pada R^n dengan $n \geq 4$ kita tidak dapat menggambarkan secara geometris dari suatu titik, sehingga kita juga tidak dapat menggambarkan jarak antara dua titik di R^n , $n \geq 4$. Untuk itu kita perlu konsep jarak yang diperluas.

Misalkan $\mathbb{R}^4 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}\}$, $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ dan $y = (y_1, y_2, y_3, y_4)$ di \mathbb{R}^4 , maka jarak antara x dan y adalah:

$$d = \|x - y\|$$

$$= ((x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2 + (x_4 - y_4)^2)^{\frac{1}{2}}$$

Selanjutnya untuk $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) : x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$, $x = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ dan $y = (y_1, y_2, y_3, \dots, y_n)$ di \mathbb{R}^n , maka jarak antara x dan y adalah:

$$d = \|x - y\| = (\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2)^{\frac{1}{2}}$$

Sekarang kita perhatikan bahwa pada rumus jarak di atas berlaku sifat-sifat sebagai berikut:

Misalkan x, y, z di \mathbb{R}^n , $n \geq 1$, maka:

1. $d(x, y) \geq 0, \forall x, y \in \mathbb{R}^n$
2. $d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$
3. $d(x, y) = d(y, x)$
4. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Definisi 7.1.1:

Misalkan X suatu himpunan sebarang, $X \neq \emptyset$ dan fungsi $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ yang bersifat $\forall x, y, z$ di X :

1. $\rho(x, y) \geq 0$
2. $\rho(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$
3. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
4. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$.

Maka ρ disebut metrik pada X dan pasangan (X, ρ) disebut ruang metrik.

Contoh 7.1.1

1. \mathbb{R} = himpunan bilangan riil. $\rho(x, y) = |x - y|$, maka (\mathbb{R}, ρ) suatu ruang metrik.
2. $\mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2), x_1, x_2 \text{ di } \mathbb{R}\}$, $x = (x_1, x_2)$ dan $y = (y_1, y_2)$ didefinisikan: $\rho : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $\rho(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$, maka (\mathbb{R}^2, ρ) suatu ruang metrik.

Bukti:

Misalkan $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2)$ dan $z = (z_1, z_2)$ di \mathbb{R}^2 .

- a. $\rho(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| \geq 0$
- b. Misalkan $\rho(x, y) = 0$
$$|x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| = 0 \quad (7.1)$$

Karena $|x_1 - y_1| \geq 0$ dan $|x_2 - y_2| \geq 0$ dan dipenuhi (5.1), Maka $|x_1 - y_1| = 0$ dan $|x_2 - y_2| = 0$, atau $x_1 = y_1$ dan $x_2 = y_2$.
Jadi $x = y$.

Selanjutnya misalkan $x = y$, ini berarti $x_1 = y_1$ dan $x_2 = y_2$.

$$\rho(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| = 0 + 0 = 0$$

- c. $\rho(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$
$$= |y_1 - x_1| + |y_2 - x_2|$$
$$= \rho(y, x)$$
- d. $\rho(x, z) + \rho(z, y) = |x_1 - z_1| + |x_2 - z_2| + |z_1 - y_1| + |z_2 - y_2|$
$$= |x_1 - z_1| + |z_1 - y_1| + |x_2 - z_2| + |z_2 - y_2|$$
$$\geq |x_1 - z_1 + z_1 - y_1| + |x_2 - z_2 + z_2 - y_2|$$
$$= |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$$
$$= \rho(x, y)$$

Jadi ρ yang didefinisikan pada \mathbb{R}^2 dengan $\rho(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$ suatu metrik pada \mathbb{R}^2 . Jadi (\mathbb{R}^2, ρ) suatu ruang metrik.

3. $\mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2), x_1, x_2 \text{ di } \mathbb{R}\}$, $x = (x_1, x_2)$ dan $y = (y_1, y_2)$ didefinisikan: $\rho : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $\rho(x, y) = \max\{|x_1 -$

$y_1|, |x_2 - y_2|$ }, maka (\mathbb{R}^2, ρ) suatu ruang metrik.

a. $\rho(x, y) = \text{maks}\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} \geq 0$

b. Misalkan $\rho(x, y) = 0$, maka, $\text{maks}\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} = 0$

Karena nilai mutlak suatu bilangan real nonnegatif, maka $|x_1 - y_1| \geq 0$ dan $|x_2 - y_2| \geq 0$. Tetapi $\text{maks}\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} = 0$, jadi $|x_1 - y_1| = 0$ dan $|x_2 - y_2| = 0$, akibatnya $x_1 = y_1$ dan $x_2 = y_2$. Jadi $x = y$. Selanjutnya misalkan $x = (x_1, x_2)$ dan $y = (y_1, y_2)$ dan $x = y$, ini berarti $x_1 = y_1$ dan $x_2 = y_2$. Akibatnya

$$\begin{aligned} \rho(x, y) &= \text{maks}\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} \\ &= \text{maks}\{0, 0\} = 0 \end{aligned}$$

c. $\rho(x, y) = \text{maks}\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$
 $= \text{maks}\{|y_1 - x_1|, |y_2 - x_2|\}$
 $= \rho(y, x)$

d. $\rho(x, z) + \rho(z, y) = \text{maks}\{|x_1 - z_1|, |x_2 - z_2|\} + \text{maks}\{|z_1 - y_1|, |z_2 - y_2|\}$
 $= \text{maks}\{(|x_1 - z_1| + |z_1 - y_1|), (|x_1 - z_1| + |z_2 - y_2|), (|x_2 - z_2| + |z_1 - y_1|), (|x_2 - z_2| + |z_2 - y_2|)\}$
 $\geq \text{maks}\{(|x_1 - z_1| + |z_1 - y_1|), (|x_2 - z_2| + |z_2 - y_2|)\}$
 $\geq \text{maks}\{(|x_1 - z_1 + z_1 - y_1|), (|x_2 - z_2 + z_2 - y_2|)\}$
 $= \text{maks}\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$
 $= \rho(x, y)$

Jadi ρ yang didefinisikan pada \mathbb{R}^2 dengan $\rho(x, y) = \text{maks}\{|x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|\}$ suatu metrik pada \mathbb{R}^2 . Jadi (\mathbb{R}^2, ρ) suatu ruang metrik.

Himpunan X yang dilengkapi dengan suatu metrik d , dituliskan dengan (X, d) disebut Ruang Metrik (*Metrik Space*).

Anggota ruang metrik (X, d) disebut titik atau *point* dan untuk setiap $a, b \in X$ ada bilangan non-negatif $d(a, b)$ yaitu jarak titik a dengan b .

Contoh 7.1.2

1. Fungsi d yang didefinisikan oleh $d(a,b)=|a-b|$, dengan a dan b bilangan-bilangan Real, adalah metrik dan disebut Metrik Biasa pada garis Real R .

Bukti:

- a. $d(a,b) = |a-b| \geq 0$ dan $d(a,b) = 0$ jika dan hanya jika $a = b$.
- b. $d(a,b) = |a-b| = |b-a| = d(b,a)$
- b. $|a-b| + |b-c| \geq |a-b+b-c|$
 $= |a-c|$
atau $d(a,c) \leq d(a,b)+d(b,c)$, $a < b < c$
- c. $d(a,b) = |a-b| > 0$ jika $a \neq b$

2. Fungsi d yang didefinisikan oleh $d(p,q) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2}$, dengan $p = (a_1, a_2)$ dan $q = (b_1, b_2)$ adalah titik dalam bidang R^2 adalah metrik dan disebut Metrik Biasa pada R^2 .

Bukti:

- a. $d(p,q) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2} \geq 0$ dan $d(p,q) = 0$
 $\sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2} = 0$
 $(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 = 0$
 $(a_1 - b_1)^2 = -(a_2 - b_2)^2$
 $(a_1 - b_1) = -(a_2 - b_2)$
 $(a_1 - b_1) = -a_2 + b_2$
 $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$

Jadi $d(p,q) = 0$ jika dan hanya jika $a_1 = b_1$ dan

$$\begin{aligned}
 \text{b. } d(p, q) &= \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2} \\
 &= \sqrt{(a_1^2 - 2a_1b_1 + b_1^2) + (a_2^2 - 2a_2b_2 + b_2^2)} \\
 &= \sqrt{(b_1^2 - 2a_1b_1 + a_1^2) + (b_2^2 - 2a_2b_2 + a_2^2)} \\
 &= \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2} \\
 &= d(q, p)
 \end{aligned}$$

$$d(p, q) = d(q, p)$$

$$\begin{aligned}
 \text{c. } d(p, q) + d(q, r) &= \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2} + \sqrt{(b_1 - c_1)^2 + (b_2 - c_2)^2} \\
 &\geq \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + (b_1 - c_1)^2 + (b_2 - c_2)^2} \\
 &= \sqrt{(a_1^2 - 2a_1b_1 + b_1^2) + (a_2^2 - 2a_2b_2 + b_2^2) + (b_1^2 - 2b_1c_1 + c_1^2) + (b_2^2 - 2b_2c_2 + c_2^2)} \\
 &\geq \sqrt{(a_1^2 - 2a_1c_1 + c_1^2) + (a_2^2 - 2a_2c_2 + c_2^2)} \\
 &= \sqrt{(a_1 - c_1)^2 + (a_2 - c_2)^2}
 \end{aligned}$$

$$\text{Jadi } \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2} + \sqrt{(b_1 - c_1)^2 + (b_2 - c_2)^2}$$

$$\geq \sqrt{(a_1 - c_1)^2 + (a_2 - c_2)^2}$$

atau $d(p, r) \leq d(p, q) + d(q, r)$ dengan $p = (a_1, a_2)$,
 $q = (b_1, b_2)$ dan $r = (c_1, c_2)$

$$\text{d. } d(p, q) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2} > 0 \text{ jika } p \neq q,$$

dimana $p < q < r$.

3. Misal X adalah suatu himpunan yang tidak kosong dan d adalah fungsi yang didefinisikan oleh

$$d(a,b) = \begin{cases} 0, & a = b \\ 1, & a \neq b \end{cases}$$

Maka d adalah metrik pada X . Fungsi jarak d biasanya disebut metrik trivial pada X atau metrik diskrit pada X .

Bukti:

- a. $d(a,b) = 1 \geq 0$, jika $a \neq b$ dan $d(a,b) = 0$ jika dan hanya jika $a = b$.

$$d(a,b) = \begin{cases} 0, & a = b, b = a \\ 1, & a \neq b, b \neq a \end{cases}$$

- b.

$$d(a,b) = d(b,a)$$

$$d(a,b) + d(b,c) = \begin{cases} 0 + 0 = 0 \\ 1 + 1 = 2 \end{cases}$$

- c.

$$d(a,b) + d(b,c) \geq d(a,c) = \begin{cases} 0, & a = c \\ 1, & a \neq c \end{cases}$$

Jadi $d(a,c) \leq d(a,b) + d(b,c)$, $a < b < c$

$$d(a,b) = \begin{cases} 0, & a = b \\ 1, & a \neq b \end{cases}$$

- d.

$$d(a,b) = 1 > 0 \text{ jika } a \neq b.$$

4. Misal $p = (a_1, a_2)$ dan $q = (b_1, b_2)$ adalah titik-titik sebarang pada bidang R^2 yaitu pasangan terurut dari bilangan-bilangan real. Fungsi d_1 dan d_2 yang didefinisikan oleh

$$d_1(p, q) = \text{maks}(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|)$$

dan

$$d_2(p, q) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2|$$

adalah metrik-metrik yang berbeda pada R^2 .

Maka d adalah metrik pada X . Fungsi jarak d biasanya disebut pseudometrik pada X .

Bukti:

$$\text{a. } d_1(p, q) = \text{maks}(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|) \geq 0,$$

$$d_2(p, q) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| \geq 0$$

karena harga mutlak nilainya selalu positif, dan

$$d_1(p, q) = 0$$

$$\text{maks}(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|) = 0$$

$$|a_1 - b_1| = 0 \quad \text{atau} \quad |a_2 - b_2| = 0$$

$$a_1 - b_1 = 0 \quad a_2 - b_2 = 0$$

$$a_1 = b_1 \quad a_2 = b_2$$

$$\text{b. } d_1(p, q) = \text{maks}(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|)$$

$$= \text{maks}(|b_1 - a_1|, |b_2 - a_2|)$$

$$= d_1(q, p)$$

$$d_2(p, q) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2|$$

$$= |b_1 - a_1| + |b_2 - a_2|$$

$$= d_2(q, p)$$

$$\text{c. Misalkan } r = (c_1, c_2)$$

$$d_1(p, q) + d_1(q, r) = \text{maks}(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|) + \text{maks}(|b_1 - c_1|, |b_2 - c_2|)$$

$$= |a_1 - b_1| + |b_1 - c_1| \vee |a_1 - b_1| + |b_2 - c_2| \vee |a_2 - b_2| + |b_1 - c_1| \vee |a_2 - b_2| + |b_2 - c_2|$$

$$\geq |a_1 - b_1 + b_1 - c_1| \vee |a_1 - b_1 + b_2 - c_2| \vee |a_2 - b_2 + b_1 - c_1| \vee |a_2 - b_2 + b_2 - c_2|$$

$$= |a_1 - c_1| \vee |a_1 - c_2| \vee |a_2 - c_1| \vee |a_2 - c_2|$$

$$\begin{aligned}
&= \text{maks}(|a_1 - c_1|, |a_1 - c_2|, |a_2 - c_1|, |a_2 - c_2|) \\
&\geq \text{maks}(|a_1 - c_1|, |a_2 - c_2|) \\
&= d_1(p, r)
\end{aligned}$$

Jadi $d_1(p, q) + d_1(q, r) \geq d_1(p, r)$ atau dapat ditulis $d_1(p, r) \leq d_1(p, q) + d_1(q, r)$.

Dan

$$\begin{aligned}
d_2(p, q) + d_2(q, r) &= |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + |b_1 - c_1| + |b_2 - c_2| \\
&= |a_1 - b_1| + |b_1 - c_1| + |a_2 - b_2| + |b_2 - c_2| \\
&\geq |a_1 - b_1 + b_1 - c_1| + |a_2 - b_2 + b_2 - c_2| \\
&= |a_1 - c_1| + |a_2 - c_2| \\
&= d_2(p, r)
\end{aligned}$$

Jadi $d_2(p, q) + d_2(q, r) \geq d_2(p, r)$ atau dapat ditulis $d_2(p, r) \leq d_2(p, q) + d_2(q, r)$

d. Bila $p \neq q$ maka

Jelas $d_1(p, q) = \text{maks}(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|) > 0$ dan

$$d_2(p, q) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| > 0$$

Soal Latihan

1. Q adalah himpunan bilangan rasional. Jika $\rho(x,y) = |x - y|$, buktikan bahwa (Q, ρ) merupakan ruang metrik!

Petunjuk penyelesaian:

Diketahui Q adalah himpunan bil rasional.

Permasalahan: akan dibuktikan bahwa (Q, ρ) ruang metrik.

Penyelesaian:

Gunakan sifat-sifat pada ruang metrik yaitu:

- $\rho(x,y) \geq 0$
 - $\rho(x,y) = 0 \Rightarrow x = y$
 - $\rho(x,y) = \rho(y,x)$
 - $\rho(x,y) \leq \rho(x,z) + \rho(z,y)$.
2. R^n adalah ruang real berdimensi n , didefinisikan

$\rho : R^n \times R^n \rightarrow R$ sebagai berikut:

Misalkan $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dan $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

$\rho(x,y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|, \dots, |x_n - y_n|\}$.

Buktikan (R^n, ρ) membentuk suatu ruang metrik.

Petunjuk penyelesaian:

Diketahui R^n adalah ruang real berdimensi n

Permasalahan: akan dibuktikan bahwa (R^n, ρ) ruang metrik.

Penyelesaian:

Gunakan sifat-sifat pada ruang metrik yaitu:

- $\rho(x,y) \geq 0$
- $\rho(x,y) = 0 \Rightarrow x = y$
- $\rho(x,y) = \rho(y,x)$
- $\rho(x,y) \leq \rho(x,z) + \rho(z,y)$.

B. Limit di Ruang Metrik

Pada pembahasan terdahulu telah diketahui bahwa $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ mempunyai arti bahwa apabila diberikan $\varepsilon > 0$ sebarang, maka senantiasa dapat ditemukan $\delta > 0$ sehingga jarak antara $f(x)$ dan L kurang dari ε apabila jarak x dan a kurang dari δ kecuali jaraknya nol. Selanjutnya pada pembahasan ini kita akan memperluas pengertian limit pada ruang metrik.

Misalkan (M_1, ρ_1) dan (M_2, ρ_2) ruang metrik. $a \in M_1$, f suatu fungsi yang daerah jelajahnya dimuat didalam M_2 untuk semua $x \in M_1$ sehingga $\rho_1(x, a) < h$ (untuk suatu $h > 0$) kecuali $x = a$. Juga diasumsikan a suatu titik kumpul dari daerah asal f .

Definisi 7.2.1

Dikatakan bahwa $f(x)$ mendekati L ($L \in M_2$) apabila x mendekati a , jika diberikan $\varepsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$. Sehingga $\rho_2(f(x), L) < \varepsilon$ untuk semua x dengan $0 < \rho_1(x, a) < \delta$. Dalam hal ini ditulis $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. Jika $(M_1, \rho_1) = (M_2, \rho_2) = \mathbb{R}^1$ maka Definisi 5.2.1 ini akan sama persis dengan Definisi 3.1.1.

Teorema 7.2.2

Misalkan (M, ρ) ruang metrik dan a titik di M . Misalkan f dan g fungsi bernilai real dengan daerah asal termuat di M . Jika $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ dan $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = N$, maka:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = L + N$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = L - N$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot N$$

Selanjutnya jika $N \neq 0$ maka

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{N}$$

Bukti sebagai latihan.

Definisi 7.2.3

Misalkan (M, ρ) suatu ruang metrik dan $X = (x_n)$ barisan titik-titik di M . dikatakan bahwa $x \in M$ limit dari x jika untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat $N_0 \in \mathbb{N}$ sehingga untuk setiap $n \geq N_0$ berlaku $\rho(x_n, x) < \varepsilon$. Disini ditulis $\lim X = x$ atau barisan X konvergen ke x .

Definisi 7.2.4

Misalkan (M, ρ) ruang metrik dan $X = (x_n)$ barisan di M . dikatakan bahwa X barisan Cauchy jika diberikan $\varepsilon > 0$ terdapat $N_0 \in \mathbb{N}$ sehingga $\rho(x_m, x_n) < \varepsilon$ apabila $n, m \geq N_0$.

Contoh 7.2.1

Misalkan $M = (0, 1)$ dan $\rho(x, y) = |x - y|$, maka (M, ρ) suatu metrik. Pandang barisan $X = (x_n)$ dengan $x_n = \frac{1}{n}$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$, maka X barisan Cauchy tetapi X tidak konvergen.

C. Kekontinuan di Ruang Metrik

1. Fungsi Kontinu di Ruang Metrik

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas kekontinuan di \mathbb{R} . Dari konsep tersebut akan diperluas pada ruang metrik umum. Sebagai langkah awal dari pengertian kekontinuan diruang metrik berikut ini didefinisikan bola buka diruang metrik.

Definisi 7.3.1

Misalkan (M, ρ) suatu ruang metrik. Jika $a \in M$ dan $r > 0$, maka $B[a; r]$ yang didefinisikan sebagai himpunan semua titik di M yang jaraknya dari a kurang dari r , yaitu

$$B[a; r] = \{x \in M : \rho(x, a) < r\}$$

Kita sebut $B[a; r]$ bola buka berjari-jari r disekitar a .

Contoh 7.3.1

Misalkan $R^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \text{ di } R\}$ dengan metrik baku di R^3 . Himpunan semua titik di R^3 yang berjarak kurang dari $\frac{1}{2}$ dari 0, yaitu

$B[0; \frac{1}{2}] = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 < \frac{1}{4}\}$ adalah bola buka.

Contoh 7.3.2

Misalkan $M = [1, 5]$ dengan metrik harga mutlak. $B[1\frac{1}{2}; 1] = [1, 2\frac{1}{2}]$ adalah bola buka berjari-jari 1 dari $1\frac{1}{2}$.

Contoh 7.3.3

Misalkan $x = (x_1, x_2)$ dan $y = (y_1, y_2)$ di R^2 dan $\rho(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$, maka (R^2, ρ) adalah suatu ruang metrik. Didefinisikan:

$B[(2,1); 1]$ = himpunan semua titik yang berjarak kurang dari 1 dari $(2,1)$ adalah bola buka.

Definisi 7.3.2

Fungsi f kontinu di $a \in M_1$ jika $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Teorema 7.3.3

Fungsi f kontinu di $a \in M_1$ jika dan hanya jika salah satu kondisi berikut dipenuhi:

1. Untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sehingga $\rho_2(f(x), f(a)) < \varepsilon$ apabila $\rho_1(x, a) < \delta$.
2. Invers image oleh f dari sebarang bola buka $B[f(a); \varepsilon]$ dari $f(a)$ memuat suatu bola buka $B[a, \delta]$ dari a .
3. Apabila $\{x_n\}$ barisan titik-titik di M_1 konvergen ke a , maka barisan $\{f(x_n)\}$ titik-titik di M_2 konvergen ke $f(a)$.

Teorema 7.3.4

Misalkan (M_1, ρ_1) , (M_2, ρ_2) , (M_3, ρ_3) suatu metrik, dan misalkan $f: M_1 \rightarrow M_2$ dan $g: M_2 \rightarrow M_3$. Jika f suatu fungsi kontinu di $a \in M_1$ dan g kontinu di $f(a) \in M_2$ maka $g \circ f: M_1 \rightarrow M_3$ kontinu di a .

Bukti: sebagai latihan

Teorema 7.3.5

Misalkan M suatu ruang metrik dan misalkan f, g fungsi-fungsi bernilai real yang kontinu di $a \in M$. Maka $f + g, f - g$, dan fg kontinu di a . Selanjutnya jika $g(a) \neq 0$, maka f/g kontinu di a .

Bukti sebagai latihan

Definisi 7.3.6

Misalkan M_1 dan M_2 ruang metrik dan misalkan $f: M_1 \rightarrow M_2$. Dikatakan f kontinu dari M_1 ke M_2 , jika f kontinu di setiap titik pada M_1 .

Teorema 7.3.7

Jika f, g fungsi kontinu bernilai real pada ruang metrik M , maka $f + g$, $f - g$, dan fg kontinu pada M . selanjutnya jika $g(x) \neq 0 \forall x \in M$, maka f/g kontinu pada M .

Bukti sebagai latihan.

Soal Latihan

1. \mathbb{R}^3 dengan $\rho: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan dengan $\rho(x, y) = \sum_{i=1}^3 |x_i - y_i|$.

Apakah (\mathbb{R}^3, ρ) merupakan ruang metrik?

Petunjuk penyelesaian:

Gunakan sifat-sifat pada ruang metrik yaitu:

- $\rho(x, y) \geq 0$
 - $\rho(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$
 - $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
 - $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$.
2. \mathbb{R}^3 dengan $\rho: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan dengan $\rho(x, y) = \max \{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|, |x_3 - y_3|\}$.

Apakah (\mathbb{R}^3, ρ) merupakan ruang metrik?

Petunjuk Penyelesaian:

Gunakan sifat-sifat pada ruang metrik yaitu:

- $\rho(x, y) \geq 0$
- $\rho(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$
- $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
- $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$.

2. Himpunan Buka dan Himpunan Tutup di Ruang Metrik


Definisi 7.3.4

Misal $a \in X$ dan $r > 0$. **Bola buka** dengan jari-jari r dan titik pusat a adalah himpunan $B_r(a) = \{x \in X \mid d(x, a) < r\}$. Dan **Bola Tutup** dengan jari-jari r dan titik pusat a adalah himpunan $\overline{B_r(a)} = \{x \in X \mid d(x, a) \leq r\}$.

Contoh 7.3.4


Pada \mathbb{R} dengan jarak euclid, bola $B_r(a)$ merupakan interval terbuka $(a - r, a + r)$.

Pada \mathbb{R}^2 dengan jarak euclid, bola $B_r(a)$ merupakan sebuah piringan dengan titik pusat a dan jari-jari r .




Pada \mathbb{R}^3 dengan jarak euclid, bola $B_r(a)$ adalah bola yang kita kenal sehari-hari, sedangkan Pada \mathbb{R}^2 dengan $d^*((a_1, a_2), (b_1, b_2)) = \max(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|)$, bola $B_1(0,0)$

berbentuk



Sedangkan pada R^2 dengan
 $d^*((a_1, a_2), (b_1, b_2)) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2|$ bola $B_1((0, 0))$
berbentuk



Definisi 7.3.5

Misalkan M suatu ruang metrik, dikatakan bahwa $G \subset M$ subhimpunan buka di M jika untuk setiap $x \in G$, terdapat bilangan $r > 0$ sehingga bola $B[x;r] \subset G$.

Contoh 7.3.5

Misalkan (M, ρ) suatu ruang metrik, maka M adalah himpunan buka.

Bukti:

Ambil $x \in M$ sebarang dan $r > 0$ maka $B[x;r] \subset M$. Karena $x \in M$ sebarang, terdapat $r > 0$ sehingga $B[x;r] \subset M$ maka M himpunan buka.

Contoh 7.3.6

Misalkan (M, ρ) suatu ruang metrik. Bola buka $B[x;r]$ adalah himpunan buka.

Bukti:

Ambil $t \in B[x;r]$ sebarang. Pilih $\delta = r - \rho(x,t)$. Karena $t \in B[x;r]$ maka $\rho(x,t) < r$, sehingga $\delta > 0$.

Buat bola $B[t;\delta]$.

Akan ditunjukkan $B[t;\delta] \subset B[x;r]$

Ambil $y \in B[t;\delta]$ sebarang.

$$\begin{aligned}\rho(y,x) &\leq \rho(y,t) + \rho(t,x) \\ &< \delta + (r - \delta) \\ &< r\end{aligned}$$

Karena $\rho(y,x) < r$, maka $y \in B[x;r]$. Ini menunjukkan bahwa $B[t;\delta] \subset B[x;r]$.

Karena $t \in B[x;r]$ sebarang maka $B[x;r]$ himpunan buka.

Teorema 7.3.6

Misalkan ζ adalah koleksi himpunan buka di ruang metrik M , maka $\bigcup_{G \in \zeta} G$ himpunan buka.

Bukti:

Misalkan $K = \bigcup_{G \in \zeta} G$

Ambil $x \in K$ sebarang, maka $x \in G$ untuk suatu $G \in \zeta$. Karena G himpunan buka, maka terdapat $r > 0$ sehingga

$B[x;r] \subset G$. Jelas $G \subset K$, jadi $B[x;r] \subset K$. Karena $x \in K$ sebarang, maka K himpunan buka.

Teorema 7.3.7

Misalkan G_1, G_2 himpunan buka di ruang metrik M , maka $G_1 \cap G_2$ himpunan buka

Bukti:

Misalkan $G_1 \cap G_2 \neq \emptyset$.

Ambil $x \in G_1 \cap G_2$ sebarang. Karena $x \in G_1$, G_1 himpunan buka maka terdapat $r_1 > 0$ sehingga $B[x;r_1] \subset G_1$. Juga $x \in G_2$, G_2 himpunan buka maka terdapat $r_2 > 0$ sehingga $B[x;r_2] \subset G_2$. Pilih $r = \min\{r_1, r_2\}$, maka $B[x;r_1] \subset G_1$ dan $B[x;r_2] \subset G_2$, sehingga diperoleh $B[x;r] \subset G_1 \cap G_2$.

Karena $x \in G_1 \cap G_2$ sebarang, maka $G_1 \cap G_2$ himpunan buka.

Akibat 7.3.8

Misalkan G_1, G_2, \dots, G_n himpunan-himpunan buka di ruang metrik M , maka $\bigcap_{i=1}^n G_i$ himpunan buka.

Bukti sebagai latihan.

Definisi 7.3.9

Misalkan E subhimpunan dari ruang metrik M , titik $x \in M$ disebut titik limit dari E jika terdapat barisan titik-titik di E yang konvergen ke x .

Himpunan \bar{E} yaitu himpunan semua titik limit dari E disebut tutupan dari E .

Contoh 7.3.7

1. Misalkan $M = \mathbb{R}$ dengan metrik baku dan $E = (0,1)$ maka $\bar{E} = [0,1]$
2. Misalkan $M = \mathbb{R}$ dengan metrik diskrit dan $E = (0,1)$

- maka $\bar{E} = (0,1)$
3. Misalkan $M = \mathbb{R}$ dengan metrik baku dan $E = \{1,2,3\}$
maka $\bar{E} = \{1,2,3\}$
 4. Misalkan $M = \mathbb{R}^2$ dengan metrik baku dan
 $E = \{(x,y) : x^2 + y^2 < 1\}$, maka
 $\bar{E} = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$

Lemma 7.3.10

Jika E subhimpunan dari ruang metrik M , maka $E \subset \bar{E}$.

Definisi 7.3.11

Misalkan E subhimpunan dari ruang metrik M . Dikatakan bahwa E subhimpunan tutup dari M jika $E = \bar{E}$.

Teorema 7.3.12

Misalkan E subhimpunan dari ruang metrik M . Maka $x \in M$ titik limit dari E jika dan hanya jika setiap bola buka $B[x;r]$ memuat sekurang-kurangnya satu titik dari E .

Bukti:

Misalkan x titik limit dari E .

Ambil bola buka $B[x;r]$ sebarang.

Karena x titik limit dari E , maka terdapat barisan (x_n) di E yang konvergen ke x , sehingga terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ yang memenuhi $\rho(x_{n_0}, x) < r$, ini berarti $x_{n_0} \in B[x;r]$.

Selanjutnya misalkan $x \in M$ dan setiap bola $B[x;r]$ memuat suatu titik di E . Maka setiap bola $B[x; 1/n]$ memuat $x_n \in E$.

Jelas barisan (x_n) konvergen ke x .

Jadi x titik limit dari E .

Teorema 7.3.13

Jika E subhimpunan dari ruang metrik M , maka \bar{E} himpunan tutup yaitu $\bar{E} = \bar{\bar{E}}$.

Bukti

Jelas $\bar{E} \subset \bar{\bar{E}}$ (1)

Akan ditunjukkan bahwa $\bar{\bar{E}} \subset \bar{E}$.

Ambil $x \in \bar{\bar{E}}$ dan sebarang bola $B[x;r]$. x titik limit dari \bar{E} , maka terdapat $y \in \bar{E}$ sedemikian sehingga $y \in B[x;r]$. Sebut $p = \rho(x,y)$. jelas $p < r$. Sebut $t = r - p > m$ dan buat bola $B[y;t]$. Karena $y \in \bar{E}$ maka terdapat $z \in E$ dengan $z \in B[y;t]$. Jelas $\rho(y,z) < t$.

Sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned}\rho(x,z) &\leq \rho(x,y) + \rho(y,z) \\ &< p + t \\ &= p + (r - p) = r\end{aligned}$$

Jadi $\rho(x,z) < r$. Ini berarti $z \in B[x;r]$

Jadi untuk setiap $x \in \bar{\bar{E}}$ dan $B[x;r]$ sebarang, terdapat $z \in E$ sedemikian sehingga $z \in B[x;r]$. Ini berarti $x \in \bar{E}$. Jadi $\bar{\bar{E}} \subset \bar{E} \dots$ (2)

Dari (1) dan (2) diperoleh $\bar{E} = \bar{\bar{E}}$.

Teorema 7.3.14

Misalkan (M, ρ) suatu ruang metrik, maka M dan \emptyset suatu himpunan tertutup.

Bukti: sebagai latihan

Teorema 7.3.15

Jika F_1 dan F_2 adalah sub himpunan tutup di ruang metrik M , maka $F_1 \cup F_2$ himpunan tutup.

Bukti:

Ambil $x \in \overline{F_1 \cup F_2}$, maka terdapat barisan (x_n) titik-titik di $F_1 \cup F_2$ yang konvergen ke x . Dari barisan ini dapat dipilih subbarisan di F_1 atau titik-titik di F_2 . Jelas subbarisan ini juga konvergen ke x . Jadi $x \in \overline{F_1}$ atau $x \in \overline{F_2}$. Karena F_1 dan F_2 himpunan tutup, maka $x \in F_1$ atau $x \in F_2$. Jadi $x \in F_1 \cup F_2$. Ini menunjukkan bahwa $\overline{F_1 \cup F_2} \subset F_1 \cup F_2$. Jadi $F_1 \cup F_2$ himpunan tutup.

Teorema 7.3.16

Misalkan ξ adalah koleksi himpunan-himpunan tutup di ruang metrik M , maka $\bigcap_{F \in \xi} F$ himpunan tutup.

Bukti:

Misalkan $x \in \overline{\bigcap_{F \in \xi} F}$, dan sebarang bola buka $B[x;r]$, maka terdapat $y \in B[x;r]$. Jadi setiap $F \in \xi$, bola $B[x;r]$ memuat titik dari F yaitu y , oleh karena itu $x \in \overline{F}$, tetapi $F = \overline{F}$. Jadi $x \in F$ untuk setiap $F \in \xi$. Ini berarti $x \in \bigcap_{F \in \xi} F$ atau $\overline{\bigcap_{F \in \xi} F} \subset \bigcap_{F \in \xi} F$.

Jadi $\bigcap_{F \in \xi} F$ himpunan tertutup.

Teorema 7.3.17

Jika G subhimpunan buka di ruang metrik M dan $G^c = M - G$, maka G^c himpunan tutup, sebaliknya jika F subhimpunan tutup di ruang metrik M dan $F^c = M - F$, maka F^c himpunan buka.

Bukti:

Misalkan G subhimpunan buka di M .

Ambil $x \in G$ Sebarang. Pilih $B[x;r]$ sedemikian sehingga $B[x;r] \subset G$. Oleh karena itu $B[x;r]$ tidak memuat titik dari G^c , dengan kata lain semua titik limit di G^c berada di G^c atau $\overline{G^c} \subset G^c$. Jadi G^c himpunan tutup.

Selanjutnya misalkan F subhimpunan tutup di M .

Ambil $x \in F^c$ sebarang.

Karena F tutup maka $F = \bar{F}$, oleh karena itu $x \notin \bar{F}$. Jadi terdapat bola $B[x;r]$ sehingga $B[x;r] \cap F = \emptyset$. Ini berarti $B[x;r] \subset F^c$. Karena $x \in F^c$ sebarang, maka terdapat $B[x;r]$ sehingga $B[b;r] \subset F^c$, maka F^c himpunan buka.

Teorema 7.3.18

Misalkan (M_1, ρ_1) , (M_2, ρ_2) suatu ruang metrik dan misalkan $f : M_1 \rightarrow M_2$. Maka f kontinu jika dan hanya jika $f^{-1}(F)$ subhimpunan tutup dari M_1 apabila F subhimpunan tutup dari M_2 .

Bukti :

Misalkan $f : M_1 \rightarrow M_2$ kontinu dan $F \subset M_2$ himpunan tutup.

F^c himpunan buka, oleh karena itu $f^{-1}(F^c)$ himpunan buka di M_1 . Karena $F \cup F^c = M_2$ dan $f^{-1}(F \cup F^c) = f^{-1}(F) \cup f^{-1}(F^c)$ maka $f^{-1}(F \cup F^c) = f^{-1}(M_2) = M_1$. Karena F dan F^c saling komplement. Tetapi

$f^{-1}(F^c)$ himpunan buka, maka $f^{-1}(F)$ himpunan tutup.

Selanjutnya misalkan $f^{-1}(F)$ himpunan tutup apabila F himpunan tutup di M_2 .

Ambil $G \subset M_2$, G himpunan buka sebarang.

Akan dibuktikan bahwa $f^{-1}(G)$ himpunan buka. G himpunan buka, maka G^c himpunan tutup. Menurut hipotesis, $f^{-1}(G^c)$ himpunan tutup. $f^{-1}(G) \cup f^{-1}(G^c) = M_1$ dan G dan G^c saling komplement maka $f^{-1}(G)$ dan $f^{-1}(G^c)$ juga saling komplement. Tetapi $f^{-1}(G^c)$ himpunan tutup maka $f^{-1}(G)$ himpunan buka. Karena untuk sebarang $G \subset M_2$, G himpunan buka berakibat $f^{-1}(G)$ buka, maka f kontinu pada M_1 .

D. Terbatas Total, Lengkap dan Kompak

1. Himpunan Terbatas dan Himpunan Terbatas Total

Definisi 7.4.1

Misalkan (M, ρ) suatu ruang metrik. Dikatakan bahwa subhimpunan A dari M terbatas jika terdapat bilangan positif L sehingga

$$\rho(x,y) \leq L \quad \text{untuk setiap } x,y \text{ di } A$$

Jika A terbatas, didefinisikan diameter dari A (dilambangkan dengan $\text{diam } A$) sebagai

$$\text{diam } A = \sup_{\substack{x \in A \\ y \in A}} \rho(x,y)$$

jika A tak terbatas, ditulis $\text{diam } A = \infty$.

Sebagai contoh:

1. Misalkan $M = \mathbb{R}$ dengan metrik baku, $A = (5, 10)$. A terbatas, karena $\rho(x,y) \leq 5$ untuk setiap x, y di A .
2. $B = (0, \infty)$ tak terbatas di \mathbb{R} dengan metrik baku, tetapi terbatas apabila menggunakan metrik diskrit, karena $\rho(x,y) \leq 1$ untuk setiap x,y di B .

Definisi 7.4.2

Misalkan (M, ρ) suatu ruang metrik, $A \subset M$ disebut terbatas total jika diberikan $\varepsilon > 0$, terdapat sejumlah berhingga subhimpunan A_1, A_2, \dots, A_n dari M dengan $\text{diam } A_k < \varepsilon$ ($k = 1, 2, 3, \dots, n$) sehingga $A \subset \bigcup_{k=1}^n A_k$.

Teorema 7.4.3

Jika A subhimpunan dari ruang metrik M terbatas total, maka A terbatas.

Misalkan A terbatas total, maka terdapat A_1, A_2, \dots, A_n subhimpunan dari M dengan $\text{diam } A_k < 1$ ($k = 1, 2, 3, \dots, n$) dan $A \subset \bigcup_{k=1}^n A_k$. Untuk setiap $k = 1, 2, \dots, n$, ambil $a_k \in A_k$. Sebut $J = \rho(a_1, a_2) + \rho(a_2, a_3) + \dots + \rho(a_{n-1}, a_n)$.

Ambil x, y di A sebarang, maka terdapat bilangan asli s, t dengan $s, t < n$ sehingga $x \in A_s$ dan $y \in A_t$. Tanpa mengurangi sifat umum misalkan $s < t$, maka

$$\begin{aligned} \rho(x,y) &\leq \rho(x, a_s) + \rho(a_s, a_{s+1}) + \dots + \rho(a_{t-1}, a_t) + \rho(a_t, y) \\ &\leq 1 + J + 1 \\ &= J + 2 \end{aligned}$$

Karena x, y di A sebarang, maka A terbatas.

Teorema ini tidak berlaku sebaliknya, yaitu jika $A \subset M$ terbatas belum tentu terbatas total.

Contoh, misalkan R_d ruang metrik diskrit dan $A = (0,1) \subset R_d$. Jelas A terbatas, tetapi A tidak terbatas total yaitu jika diambil $\varepsilon = \frac{1}{2}$, maka tidak ada $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $A \subset \bigcup_{k=1}^{n_0} A_k$. Sebab A_k hanya memuat paling sedikit satu titik. Jika $M = \mathbb{R}$ dengan metrik baku, maka pengertian terbatas total adalah sama.

Akibat 7.4.3

$A \subset R_d$ terbatas total jika dan hanya jika A himpunan berhingga.

Bukti sebagai latihan

Definisi 7.4.4

Misalkan A subhimpunan dari ruang metrik M . Subhimpunan B dari A disebut rapat- ε di A apabila untuk setiap $x \in A$, terdapat $y \in B$ sehingga $\rho(x,y) < \varepsilon$.

Teorema 7.4.5

Misalkan (M,ρ) suatu ruang metrik, $A \subset M$, A terbatas total jika dan hanya jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat subhimpunan berhingga dari A yang rapat- ε di A .

Bukti:

Misalkan A terbatas total. Ambil $\varepsilon > 0$ sebarang.

Karena A terbatas total, maka terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sehingga $A \subset \bigcup_{i=1}^{n_0} A_i$ dengan $\text{diam } A_i < \varepsilon$.

Tanpa mengurangi sifat umum bukti, misalkan $A_i \neq \emptyset$ untuk setiap $i = 1, 2, 3, \dots, n_0$.

Ambil $a_i \in A_i$ untuk setiap i dan $K = \{a_1, a_2, \dots, a_{n_0}\}$. Ambil $x \in A$, maka $x \in A_k$ untuk suatu $k \in K$.

Pilih $a_k \in A_k$, maka diperoleh $\rho(x, a_k) \leq \text{Diam } A_k < \varepsilon$.

Jadi K rapat- ε di A .

Selanjutnya, misalkan untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat subhimpunan berhingga dari A yang rapat- ε di A .

Akan ditunjukkan bahwa A terbatas total.

Ambil $\varepsilon > 0$ sebarang.

Menurut hipotesis, terdapat $B = \{y_1, y_2, \dots, y_{n_1}\} \subset A$ sehingga B rapat- $1/2 \varepsilon$. Buat $B_i = [y_i, 1/2 \varepsilon]$, untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n_1$, maka $\text{diam } B_i < \varepsilon$.

Ambil $x \in A$ sebarang, maka terdapat $y_k \in B$ sedemikian sehingga $\rho(x, y_k) < 1/2 \varepsilon$. Ini berarti $x \in B_k \subset \bigcup_{i=1}^{n_1} B_i$. Karena $x \in A$ sebarang, maka $A \subset \bigcup_{i=1}^{n_1} B_i$. Jadi A terbatas total.

Teorema 7.4.6

Misalkan (M, ρ) suatu ruang metrik. Subhimpunan $A \subset M$ terbatas total jika dan hanya jika untuk setiap barisan di A memuat subbarisan Cauchy.

Bukti:

Misalkan A terbatas total dan misalkan subhimpunan dari A sebarang. Akan ditunjukkan bahwa (x_n) mempunyai subbarisan Cauchy.

A dapat dikaver oleh sejumlah berhingga subhimpunan dari A dengan diameter < 1 . Salah satu dari subhimpunan ini

tentu memuat tak berhingga unsur-unsur dari barisan (x_n) , sebut A_1 . Ambil $n_1 \in \mathbb{N}$ sehingga $x_{n_1} \in A_1$. Kemudian A_1 jelas terbatas total, maka A_1 dapat dikaver oleh sejumlah berhingga subhimpunan dari A_1 yang berdiameter $< \frac{1}{2}$. Salah satu subhimpunan ini pasti memuat takberhingga unsure dari barisan (x_n) .

Ambil $n_2 \in A_1$ maka $x_{n_2} \in A_2$.

Karena $A_2 \subset A_1$ maka $x_{n_2} \in A_1$.

Proses ini dilanjutkan terus sehingga untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, subhimpunan A_k dan A_{k-1} dengan diameter $A_k < \frac{1}{k}$ dan $x_{n_k} \in A$ dari barisan (x_n) . Karena $x_{n_k}, x_{n_{k+1}}, x_{n_{k+2}}, \dots$ terletak di A_k dan $\text{diam } A_k < \frac{1}{k}$, maka (x_{n_k}) subbarisan Cauchy dari (x_n) .

2. Ruang Metrik Lengkap

Pada pembahasan sebelumnya, setiap barisan (x_n) yang konvergen, maka (x_n) adalah barisan Cauchy. Juga telah ditunjukkan bahwa setiap barisan Cauchy di \mathbb{R} konvergen. Namun demikian tidak berlaku pada setiap metrik umum. Misalkan $M = (0,1)$ dengan metrik harga mutlak dan (x_n) barisan di M dengan $x_n = \frac{1}{n}$. Jelas bahwa barisan ini adalah barisan Cauchy, tetapi (x_n) tidak konvergen.

Berikut akan didefinisikan pengertian ruang metrik lengkap:

Definisi 7.4.7

Dikatakan bahwa ruang metrik M lengkap apabila setiap barisan Cauchy di M konvergen di M .

Teorema 7.4.8

Misalkan (M, ρ) suatu ruang lengkap dan $A \subset M$

himpunan tutupan, maka (A, ρ) ruang lengkap.

Bukti:

Misalkan (x_n) sebarang barisan Cauchy di A . Karena $A \subset M$ maka (x_n) barisan di M dan karena M lengkap, maka barisan (x_n) konvergen ke $x \in M$.

Karena (x_n) barisan di A , maka x titik limit dari A , tetapi A himpunan tertutup, jadi $x \in A$.

Karena (x_n) sebarang barisan Cauchy di A yang konvergen di A , maka (A, ρ) ruang metrik lengkap.

Teorema 7.4.9

Misalkan (M, ρ) ruang metrik lengkap dan misalkan setiap $n \in \mathbb{N}$, F_n subhimpunan tertutup dari M , $F_n \neq \emptyset$, sehingga

- a. $F_1 \supset F_2 \supset \dots \supset F_n \supset F_{n+1} \supset \dots$ dan
- b. $\text{Diam } F_n \rightarrow 0$ apabila $n \rightarrow \infty$

Maka $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ memuat tepat satu titik.

Bukti:

Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $b_n \in F_n$, maka dari (a) diperoleh $b_n, b_{n+1}, b_{n+2}, \dots$, berada di F_n .

Ambil $\varepsilon > 0$.

Dari (b) terdapat $N \in \mathbb{N}$ sehingga $\text{diam } F_n < \varepsilon$, tetapi $b_n, b_{n+1}, b_{n+2}, \dots$ terletak di F_n . Jadi untuk $m, n \geq N$ diperoleh $\rho(b_m, b_n) \leq \text{diam } F_n < \varepsilon$. Ini menunjukkan bahwa barisan (b_n) adalah barisan Cauchy.

Karena M ruang metrik lengkap, maka (b_n) konvergen. Sebut (b_n) konvergen ke b . Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $b \in \overline{F_n}$, tetapi F_n himpunan tertutup, jadi $b \in F_n$ untuk setiap n atau $b \in \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$. Misalkan $s \in M$ sebarang, $s \neq b$, maka $\rho(s, b) > 0$, sebut $\rho(s, b) = r$. Pilih $n_1 \in \mathbb{N}$ sehingga $\text{diam } F_{n_1} < r$, sehingga $s \notin F_{n_1}$. Jadi $s \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$.

Karena $s \in M$ sebarang, $s \neq b$, $s \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$, maka $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \{b\}$.

Definisi 7.4.10

Misalkan (M, ρ) suatu ruang metrik dan $T: M \rightarrow M$. dikatakan bahwa T kontraksi pada M jika terdapat $\alpha \in \mathbb{R}$, $0 \leq \alpha < 1$ sehingga

$$\rho(Tx, Ty) \leq \alpha \rho(x, y), \text{ untuk setiap } x, y \text{ di } M.$$

Sebagai contoh,

- a. $M = [0, 1/3]$ dan $T(x) = x^2$
- b. $M = \mathbb{R}^+ = [0, \infty)$ dengan $T(x) = \frac{1}{1+x}$
- c. $M = \mathbb{R}$, $T(x) = 0$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$
- d. \mathbb{R}

3. Ruang Metrik Kompak

Definisi 7.4.11

Ruang metrik (M, ρ) disebut kompak apabila (M, ρ) ruang metrik lengkap dan terbatas total

Contoh 7.4.1

1. $M = [0, 1]$ dengan metrik harga mutlak. M himpunan tutup, maka M lengkap dan M terbatas di \mathbb{R} . Jadi M terbatas total. Jadi M kompak
2. $L = (0, 1)$ dengan metrik harga mutlak. L terbatas tetapi tidak lengkap, sebagai contoh barisan (x_n) dengan $x_n = \frac{1}{n}$ adalah barisan Cauchy yang tidak konvergen ke L . Jadi L tidak kompak.
3. Himpunan berhingga \mathbb{R} dengan metrik baku maupun metrik diskrit adalah kompak
4. Contoh 1, dengan metrik diskrit tidak kompak karena

tidak terbatas total

5. R lengkap tetapi tidak terbatas total, jadi R bukan ruang metrik kompak.

Teorema 7.4.12

Ruang metrik (M, ρ) kompak jika dan hanya jika setiap barisan titik-titik di M mempunyai subbarisan yang konvergen di M .

Bukti:

Misalkan (M, ρ) kompak dan (x_n) barisan di M .

Karena M terbatas total, maka (x_n) mempunyai subbarisan Cauchy (x_{n_k}) . Barisan (x_{n_k}) di M yang lengkap, jadi (x_{n_k}) konvergen di M .

Jadi setiap barisan (x_n) di M mempunyai subbarisan yang konvergen di M .

Selanjutnya misalkan setiap barisan (x_n) di M mempunyai subbarisan (x_{n_k}) yang konvergen di M .

Akan ditunjukkan bahwa M kompak.

Menurut Teorema 7.4.9, M terbatas total. Misalkan (x_n) barisan Cauchy di M . Menurut hipotesis (x_n) mempunyai subbarisan (x_{n_k}) yang konvergen di M , tetapi (x_n) barisan Cauchy. Jadi (x_n) konvergen ke x di M . Oleh karena itu M lengkap. Karena M lengkap dan terbatas total, maka M kompak.

Akibat 7.4.13

Misalkan (M, ρ) ruang kompak, $A \subset M$, A tutup maka (A, ρ) ruang metrik kompak.

Bukti:

Misalkan (x_n) sebarang barisan di A , maka (x_n) barisan di M , oleh karena itu (x_n) mempunyai subbarisan (x_{n_k}) yang

konvergen ke $x \in M$. (x_{nk}) barisan di A dan A himpunan tutup, maka $\lim(x_{nk}) = x \in A$. Jadi (x_n) mempunyai subbarisan yang konvergen di A , menurut teorema 7.4.12(A, ρ) ruang metrik kompak.

Teorema 7.4.14

Misalkan A subhimpunan di ruang metrik M .

Jika (A, ρ) kompak, maka A subhimpunan tutup di M .

Bukti:

Misalkan $x \in M$ sehingga $x \in \bar{A}$, maka terdapat barisan (x_n) di A yang konvergen ke x .

Karena (A, ρ) kompak, maka terdapat (A, ρ) lengkap sehingga $\lim(x_n) \in A$. Jadi $x \in A$. Karena $x \in \bar{A}$, berakibat $x \in A$ maka $\bar{A} \subset A$. Ini menunjukkan bahwa A himpunan tutup di M .

E. Himpunan-himpunan Khusus dalam Ruang Metrik

Sebelum membahas himpunan-himpunan khusus dalam ruang metrik, terlebih dahulu dibahas tentang bola terbuka di suatu titik di dalam ruang metric

Definisi 7.5.1

Diketahui ruang metrik (S, d) , $p \in S$ dan ε bilangan real dengan $\varepsilon > 0$. Bola buka dengan pusat p dengan jari-jari ε atau neighborhood p dengan jari-jari ε , dinotasikan dengan $B_\varepsilon(p)$ didefinisikan sebagai

$$B_\varepsilon(p) = \{x \in S ; d(x,p) < \varepsilon\}$$

Contoh 7.5.1

- a. Jika d metrik biasa pada \mathbb{R} , maka untuk sebarang $p \in \mathbb{R}$ dan sebarang bilangan real $\varepsilon > 0$, bola buka dengan pusat p dan jari-jari ε adalah

$$\begin{aligned}
B_\varepsilon(p) &= \{x \in \mathbb{R} : d(x,p) < \varepsilon\} \\
&= \{x \in \mathbb{R} : |x - p| < \varepsilon\} \\
&= \{x \in \mathbb{R} : p - \varepsilon < x < p + \varepsilon\} \\
&= (p - \varepsilon, p + \varepsilon)
\end{aligned}$$

Jadi $B_\varepsilon(p)$ merupakan interval buka dengan titik tengah p dan panjang interval 2ε

- b. Jika d metrik diskrit pada \mathbb{R} , maka untuk sebarang $p \in \mathbb{R}$ dan sebarang real $\varepsilon > 0$, bola buka dengan pusat dan jari-jari ε adalah

$$\begin{aligned}
B_\varepsilon(p) &= \{x \in \mathbb{R}; d(x,p) < \varepsilon\} \\
&= \begin{cases} \{p\}, & \varepsilon \leq 1 \\ \mathbb{R}, & \varepsilon > 1 \end{cases}
\end{aligned}$$

Definisi 7.5.2

Diketahui ruang metrik (S, d) , $A \subset S$ dan $p \in S$. Titik p disebut

- a. Titik limit (limit point) A jika untuk setiap bilangan real $\varepsilon > 0$ berlaku $B_\varepsilon(p) \cap A - \{p\} \neq \emptyset$
Himpunan semua titik limit A dinotasikan dengan A' .
- b. Titik dalam (interior point) A jika terdapat bilangan real $\varepsilon > 0$ sehingga $B_\varepsilon(p) \subset A$
- c. Titik eksterior A jika p merupakan titik interior A^c . Himpunan semua titik eksterior A dinotasikan dengan $\text{eks}(A)$.
- d. Titik batas (boundary) A jika untuk setiap bilangan real $\varepsilon > 0$, berlaku $B_\varepsilon(p) \cap A \neq \emptyset$ dan $B_\varepsilon(p) \cap A^c \neq \emptyset$
- e. Titik terasing A jika $p \in A$, tetapi p bukan titik limit A

Definisi 7.5.3

Diketahui ruang metrik (S,d) , $A \subset S$

- a. Himpunan semua titik interior A disebut interior A dan dinotasikan dengan $\text{int}(A)$
- b. Himpunan semua titik batas A disebut boundary A dan dinotasikan dengan $\partial(A)$
- c. Closure A , dinotasikan dengan $\text{cl}(A)$ yang didefinisikan dengan $\text{cl}(A) = A \cup A'$.

Definisi 7.5.4

Diketahui ruang metrik (S,d) . Himpunan $A \subset S$ dikatakan terbuka jika untuk setiap $p \in S$, p titik interior A atau himpunan $A \subset S$ dikatakan terbuka jika untuk setiap $p \in S$ terdapat bilangan real $\varepsilon > 0$ sehingga $B_\varepsilon(p) \subset A$. Himpunan $B \subset S$ dikatakan tertutup jika B^c merupakan himpunan terbuka.

Teorema 7.5.4

Diketahui ruang metrik (S, d) . Himpunan $A \subset S$ merupakan himpunan tutup jika dan hanya jika $A' \subset A$

Bukti sebagai latihan

Teorema 7.5.5

Diketahui ruang metrik (S,d) dan $A \subset S, B \subset S$.

- a. A tertutup jika dan hanya jika $\text{cl}(A) = A$
- b. $\text{cl}(\emptyset) = \emptyset$
- c. $\text{cl}(A)$ merupakan himpunan tertutup
- d. $\text{cl}(\text{cl}(A)) = \text{cl}(A)$
- e. jika $A \subset B$ maka $\text{cl}(A) \subset \text{cl}(B)$
- f. $\text{cl}(A \cap B) \subset \text{cl}(A) \cap \text{cl}(B)$
- g. $\text{cl}(A \cup B) = \text{cl}(A) \cup \text{cl}(B)$

- h. $\text{cl}(A)$ merupakan himpunan tutup terkecil yang memuat A .

Bukti:

- a. Syarat perlu: dari yang diketahui $A' \subset A$. Akibatnya $\text{cl}(A) = A \cup A' = A$
Syarat perlu: dari yang diketahui diperoleh $A' \subset A$. Berdasarkan Teorema 7.5.4, A merupakan himpunan tertutup
- b. Ambil sebarang $p \in S$, karena untuk sebarang bilangan real $\varepsilon > 0$ berlaku $B_\varepsilon(p) \cap \emptyset = \emptyset$, maka p bukan titik limit \emptyset . Dengan kata lain $\emptyset' = \emptyset$. Akibatnya $\text{cl}(\emptyset) = \emptyset$.
- c. Bukti c - h sebagai latihan.

Teorema 7.5.6

Diketahui ruang metrik (S,d) dan $A \subset S, B \subset S$

- a. A himpunan buka jika dan hanya jika $\text{int}(A) = A$
b. Jika $A \subset B$ maka $\text{int}(A) \subset \text{int}(B)$
c. $\text{Int}(A) \cap \text{int}(B) = \text{int}(A \cap B)$
d. $\text{Int}(A) \cup \text{int}(B) \subset \text{int}(A \cup B)$
e. $\text{Int}(A)$ merupakan himpunan buka terbesar yang termuat di dalam A
Bukti sebagai latihan

Teorema 7.5.7

Di dalam sebarang ruang metrik (S,d) berlaku

- a. \emptyset merupakan himpunan buka dan sekaligus tertutup
b. S merupakan himpunan buka dan sekaligus tertutup
c. Jika G_i merupakan himpunan buka untuk setiap $i = 1, 2, 3, \dots$ maka
$$\bigcap_{i=1}^n G_i$$

merupakan himpunan buka.

- d. Jika $G_i, i = 1, 2, \dots$, merupakan himpunan buka, maka

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} G_i$$

Merupakan himpunan buka

- e. Jika F_i merupakan himpunan tutup untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$ maka

$$\bigcup_{i=1}^n F_i$$

Merupakan himpunan tutup

- f. Jika F_i merupakan himpunan tutup untuk setiap $i = 1, 2, \dots$, maka

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} F_i$$

Merupakan himpunan tutup.

Bukti sebagai latihan

F. Himpunan Terhubung

Konsep keterhubungan himpunan dalam ruang metrik erat kaitannya dengan konsep himpunan terpisah.

Definisi 7.6.1

Diberikan ruang metrik (S, d) , $A \subset S$ dan $B \subset S$. Dua himpunan A dan B dikatakan terpisah (separated) jika

$$A \cap \text{cl}(B) = \emptyset \text{ dan } \text{cl}(A) \cap B = \emptyset.$$

Jika himpunan A dan B terpisah maka A dan B saling asing, tetapi dua himpunan yang saling asing belum tentu terpisah.

Teorema 7.6.2

Dalam sebarang ruang metrik (S, d) berlaku:

- Jika A dan B terpisah dan $A_1 \subset A, B_1 \subset B$, maka A_1 dan B_1 merupakan himpunan yang terpisah.
- Dua himpunan tertutup F_1 dan F_2 merupakan himpunan terpisah jika dan hanya jika $F_1 \cap F_2 = \emptyset$.

- c. Dua himpunan terbuka G_1 dan G_2 merupakan himpunan terpisah jika dan hanya jika $G_1 \cap G_2 = \emptyset$.
- d. Jika G himpunan terbuka dan G merupakan gabungan dua himpunan terpisah A dan B maka A dan B masing-masing merupakan himpunan buka.
- e. Jika F tertutup dan F merupakan gabungan himpunan terpisah A dan B maka A dan B masing-masing merupakan himpunan tertutup.

Bukti:

- a. Dari yang diketahui diperoleh $A \cap \text{cl}(B) = \emptyset$ dan $\text{cl}(A) \cap B = \emptyset$. Karena $A_1 \subset A$ dan $B_1 \subset B$, maka $\text{cl}(A_1) \subset \text{cl}(A)$ dan $\text{cl}(B_1) \subset \text{cl}(B)$. Oleh karena itu diperoleh: $A_1 \cap \text{cl}(B_1) = \emptyset$ dan $\text{cl}(A_1) \cap B_1 = \emptyset$.
Jadi A_1 dan B_1 adalah himpunan terpisah.
- b. Dari yang diketahui bahwa $\text{cl}(F_1) = F_1$ dan $\text{cl}(F_2) = F_2$. Oleh karena itu $F_1 \cap \text{cl}(F_1) = F_1 \cap F_2$ dan $\text{cl}(F_1) \cap F_2 = F_1 \cap F_2$.
Akibatnya $F_1 \cap \text{cl}(F_1) = \emptyset$ dan $\text{cl}(F_1) \cap F_2 = \emptyset$ jika dan hanya jika $F_1 \cap F_2 = \emptyset$.
Dengan kata lain F_1 dan F_2 merupakan terpisah jika dan hanya jika $F_1 \cap F_2 = \emptyset$.
- c. Bagian c dan d sebagai latihan.

Definisi 7.6.3

Diberikan ruang metrik (S,d) . Himpunan $A \subset S$ dikatakan tak terhubung (disconnected) jika A dapat disajikan sebagai gabungan dua himpunan tidak kosong yang tidak terpisah. Atau dapat dikatakan sebagai: Himpunan $A \subset S$ dikatakan tak terhubung jika terdapat himpunan $A_1, A_2, A_1 \neq \emptyset, A_2 \neq \emptyset, A_1$

dan A_2 himpunan terpisah dan $A = A_1 \cup A_2$. Himpunan $B \subset S$ dikatakan terhubung (connected) jika B himpunan tidak tak terhubung.

Teorema 7.6.4

Di dalam sebarang ruang metrik (S,d) berlaku:

- a. Himpunan S adalah terhubung jika dan hanya jika sebarang himpunan tidak kosong yang merupakan himpunan terbuka dan sekaligus tertutup hanyalah S .
- b. Jika $E \subset S$ himpunan terhubung.
Bukti latihan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Apostol, T.M, 1974, *Mathematical Analysis, Second Edition*, Addison-Wiley,Massachusetts USA.
- Bartle, 1976, *The Elements of Real Analysis*, Wiley, New York
- Bartle, R.G and Sherbert, D.R, 2000, *Introduction to Real Analysis, Third Edition*, John Wiley and Sons, Inc, USA.
- Gunawan, Hendra. 2009. *Pengantar Analisis Real*. FMIPA ITB. Bandung
- Lewin, 1993, *An Introduction to Mathematical Analysis*, nd.ed, Freeman, New York
- M,S, Dwijanto. 1994. *Analisis Riil*. IKIP Semarang Press. Semarang
- Purcell J Edwin, Verberg Dall. *Kalkulus dan Geometri Analitik Bidang dan Ruang*. Erlangga. Jakarta
- Riyanto, M. Z. 2008. *Pengantar Analisis Real 1*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Royden, H. L. *Real Analysis second edition*.The Mcmillan Company. Coler Mcmillan Limited. London.
- Saxena, Shah, 1987, *Introduction to Real Variabel Theory*, revised ed., Prentice-Hall of India, New Delhi
- Trench, William F. 2003. *Introductions to Real Analysis*. Wiley, New York

BIOGRAFI PENULIS



Wahidah Alwi, lahir di Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru pada Tanggal 1 Pebruari 1979. Lahir sebagai anak pertama dari dua bersaudara dan merupakan putri dari pasangan Muh. Alwi dan Siti Aman (almarhumah). Penulis menempuh pendidikan dasar pada SD Inpres Lawallu mulai Tahun 1985 sampai Tahun 1991. Pada tahun yang sama penulis juga menempuh pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah DDI Lawallu dan tamat pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri Mangkoso dan tamat pada Tahun 1994. Selanjutnya Sekolah Menengah Umum di SMU Negeri 1 Soppeng Riaja Kab. Barru mulai Tahun 1994 dan tamat Tahun 1997. Pada Tahun 1997 penulis mengikuti kursus Bahasa Inggeris di Guide English Institute (GEI) Makassar. Penulis berhasil lolos seleksi UMPTN Tahun 1998 pada Jurusan Matematika FMIPA UNM Makassar program Strata Satu (S1) Non Kependidikan. Pada Tahun 2004 penulis melanjutkan pendidikan program Strata Dua (S2) pada Jurusan Statistika FMIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Pada Tahun 2009 penulis berhasil lulus menjadi dosen di Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Berbagai seminar dan workshop sudah diikuti penulis diantaranya: Pelatihan Analisis Data Kualitatif Bagi Dosen UIN Alauddin Makassar, Workshop Evaluasi Kurikulum UIN Alauddin Makassar, Pelatihan Research Design, Pelatihan Manajemen Berbasis Hasil, Pelatihan Penyusunan SOP Praktikum, dll.