

Turnitin Originality Report

Processed on: 05-May-2023 20:39 WIB

ID: 2085080391

Word Count: 5227

Submitted: 1

8._19141-Article_Text-76874-1-10-20220202.pdf By
Anonymous

| Similarity Index | Similarity by Source |
|------------------|---|
| 16% | Internet Sources: 15% Publications: 4% Student Papers: 3% |

9% match (Internet from 12-Jul-2020)

<https://id.123dok.com/document/gog1317z-integral-riemann-darboux-usd-repository.html>

3% match (Internet from 25-Jun-2017)

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/578/MAK-RITA-%28180-185%29.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

2% match (student papers from 12-Jul-2021)

[Submitted to Technical University of Cluj-Napoca on 2021-07-12](#)

1% match (Internet from 18-Nov-2015)

<http://skripsi-skripsiun.blogspot.com/2014/11/contoh-skripsi-matematikaekuivalensi.html>

1% match (Internet from 01-Mar-2023)

http://media.wix.com/ugd/160223_09c4820c63294083b7d6ca1703005bb3.pdf

Kekonvergenan Barisan Fungsi Terintegral Darboux Wahidah Alwi Program Studi Matematika FST, UINAM, wahidah.alwi@uin-alauddin.ac.id Hikmawati Pathuddin Program Studi Matematika FST, UINAM, hikmawati.pathuddin@uin-alauddin.ac.id Baso Irvan Program Studi Matematika-FST, UINAM, Basoirvan25@gmail.com ABSTRAK, Penelitian ini membahas tentang kekonvergenan barisan fungsi terintegral Darboux. Ada dua jenis kekonvergenan pada barisan fungsi yaitu konvergen pointwise dan konvergen seragam. Mengingat tidak semua barisan fungsi yang terintegral dan konvergen ke suatu fungsi, fungsi limitnya terintegral atau jika terintegral, nilai integralnya belum tentu sama dengan nilai limit integral barisan fungsinya. Dalam hal ini dikaji syarat cukup agar suatu fungsi terintegral Darboux pada $[a, a]$ sama dengan limit dari integral barisan fungsinya. Diperoleh bahwa untuk menjamin suatu fungsi terintegral Darboux pada $[a, a]$ sama dengan limit dari integral barisan fungsinya yaitu $\{f_n\}$ adalah barisan fungsi kontinu yang konvergen seragam dan $\{f_n\}$ terbatas pada $[a, a]$. Kata Kunci:Kekonvergenan, Barisan Fungsi, Integral Darboux 1. PENDAHULUAN Matematika ialah ilmu yang memiliki banyak sekali cabang. Salah satu cabang diantaranya adalah Analisis Real. Analisis adalah proses mengurai suatu hal menjadi berbagai unsur yang terpisah agar memenuhi sifat, hubungan dan peranannya masing-masing suatu unsur. Analisis juga sering disebut dengan pembagian. Secara persis, analisis berarti pemecah-belah atau penguraian secara jelas berbeda kebagian- bagian dari suatu keseluruhan. Salah satu cabang dari analisis yaitu barisan. Secara umum barisan adalah suatu fungsi dengan domain himpunan bilangan asli. Barisan dinotasikan

dengan $\{x_m\}$ dan ditulis $x_1, x_2, x_3, \dots, x_m, \dots$. Pada umumnya telah dikenal barisan bilangan real ($X: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$), yaitu suatu barisan dengan daerah hasil bilangan real. Barisan bilangan real $\{x_m\}$ dikatakan konvergen ke x (dinotasikan dengan $\lim \{x_m\} = x$) jika untuk setiap bilangan positif δ yang diberikan terdapat bilangan asli K_δ sedemikian sehingga $|x_m - x| < \delta, k \geq K_\delta$. Dengan kata lain, jika $\lim \{x_m\} = x$ maka $\{x_m\}$ konvergen ke x . Suatu barisan objeknya tidak mesti bilangan, tetapi bisa juga objek yang lain, misalnya jika objeknya fungsi maka diperoleh barisan fungsi. Di mana barisan fungsi adalah salah satu bentuk dari barisan yang objek-objeknya berupa fungsi. Bentuk fungsi yang merupakan suku ke- k bergantung pada bilangan asli. Sehingga barisan fungsi dapat dituliskan dengan $\{f_m\}$ dan ditulis $f_1, f_2, f_3, \dots, f_m, \dots$. Seperti barisan pada umumnya, kekonvergenan suatu barisan fungsi juga dapat diselidiki. Akan tetapi, tentu terdapat perbedaan perihal kekonvergenannya. Jika dianalogikan dengan suatu barisan bilangan real yang di mana terdiri dari titik-titik yang konvergen ke suatu titik, maka barisan fungsi juga akan konvergen ke suatu fungsi. Adapun salah satu konsep yang penting pada analisis ialah teori integral. Teori integral memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara langsung dapat dibawa ke dalam bentuk model matematika. Ada berbagai jenis integral yang bertumbuh pesat pada analisis salah satunya jenis integral yang banyak diketahui yaitu integral Riemann. Integral Riemann ini tidak hanya digunakan atau dipakai dalam matematika saja, akan tetapi dapat diaplikasikan dan digunakan pada bidang-bidang lainnya, seperti pada bidang teknik dan fisika. Sebelum adanya Integral Riemann, salah satu ilmuwan matematika yaitu I. Newton menyusul teori integral dari kalkulus menggunakan anti derivative. Kemudian pada tahun 1854 G. F. B. Riemann yang juga merupakan ilmuwan matematika menyusun teori integral dengan cara yang berbeda yaitu menggunakan partisi-partisi. Selanjutnya pada tahun 1875, I. G. Darboux memodifikasi integral Riemann dengan terlebih Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.9 No. 2 Ed. Juli-Des 2021 dahulu mendefinisikan jumlah Darboux atas dan jumlah Darboux bawah serta mendefinisikan integral Darboux bawah dan integral Darboux atas. Munculnya integral Darboux awalnya hanya untuk memperlihatkan bahwasanya semua fungsi yang monoton adalah terintegral dan memperlihatkan bahwa hasil dari fungsi yang terintegral adalah terintegral juga dengan menggunakan definisi integral Riemann itu sendiri. Sehingga digunakanlah integral Darboux yang lebih sederhana. Maka pada integral Darboux kita dapat memperlihatkan semua bagian yang berada pada Integral Riemann dan akan mudah menunjukkan bahwa suatu fungsi yang monoton itu terintegral. Kedua integral memiliki kesamaan yaitu $R \int_a^b f = D \int_a^b f$. Adapun penelitian sebelumnya yang telah dibuktikan bahwa syarat-syarat cukup yang menjamin fungsi limit dari barisan fungsi yang terintegral Riemann pada $[a, a]$ dan nilai integralnya sama dengan nilai limit barisan fungsinya yaitu yang pertama barisan fungsi $\{f_m\}$ konvergen seragam pada $[a, a]$, yang kedua barisan fungsi $\{f_m\}$ terbatas pada $[a, a]$ dan yang terakhir barisan fungsi $\{f_m\}$ monoton pada $[a, a]$. Mengingat tidak semua barisan fungsi yang terintegral dan konvergen ke suatu fungsi, fungsi limitnya terintegral atau jika terintegral, nilai integralnya belum tentu sama dengan nilai limit integral barisan fungsinya. Maka akan dikaji mengenai kekonvergenan barisan fungsi terintegral Darboux di mana pada hasilnya nanti kita akan menemukan suatu syarat cukup untuk barisan fungsi terintegral Darboux yang mengakibatkan limit fungsinya juga terintegral Darboux.

2. TINJAUAN PUSTAKA BARISAN BILANGAN REAL

Barisan (Sequence) pada himpunan S adalah suatu fungsi dengan domain \mathbb{N} dan mempunyai range dalam S . Selanjutnya akan dibahas mengenai barisan di \mathbb{R} dan konvergensi dari suatu barisan. Definisi 1. Barisan bilangan real adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada himpunan \mathbb{N} dengan range dalam \mathbb{R} . dengan kata lain, barisan dalam \mathbb{R}

mengawankan setiap bilangan asli $k = 1, 2, 3, \dots$ kepada sesuatu bilangan real. Jika $X : K \rightarrow R$ merupakan barisan, maka biasanya dituliskan dengan nilai dari X pada k dengan notasi x_m . Barisan sering dinotasikan dengan X atau $\{x_m\}$ atau $(x_m : k \in K)$ atau $\{x_m\}$ atau $\{x_m\}_{m \geq 1}$. Apabila diketahui suatu barisan X , artinya $X = \{x_k\}$.

Definisi 2 (Limit Barisan). Diketahui $\{x_m\}$ barisan bilangan real. Barisan $X = (x_m)$ dikatakan konvergen ke $x \in R$, atau x dikatakan limit barisan $\{x_m\}$ jika untuk setiap $\delta > 0$ terdapat $K(\delta) \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk setiap $k \in \mathbb{N}$ dengan $k > K(\delta)$ berlaku $|x_m - x| < \delta$. Jika x adalah limit sesuatu barisan $\{x_m\}$, maka dikatakan $\{x_m\}$ konvergen ke x , atau $\{x_m\}$ mempunyai limit x . Dalam hal ini ditulis $\lim_{m \rightarrow \infty} \{x_m\} = x$ atau $\lim \{x_m\} = x$ atau $x_m \rightarrow x$. Jika $\{x_m\}$ tidak konvergen, maka $\{x_m\}$ dikatakan divergen.

Teorema 1. Jika barisan $\{x_m\}$ konvergen, maka $\{x_m\}$ memiliki paling banyak satu limit (limitnya tunggal). **Bukti :** Andaikan $\lim_{m \rightarrow \infty} \{x_m\} = x'$ dan $\lim_{m \rightarrow \infty} \{x_m\} = x''$ dengan $x' \neq x''$. Maka untuk sebarang $\delta > 0$ terdapat K' sedemikian sehingga $|x_m - x'| < \delta/2$ untuk setiap $k \geq K'$ dan terdapat K'' sedemikian sehingga $|x_m - x''| < \delta/2$ untuk setiap $k \geq K''$. Dipilih $K = \max \{K', K''\}$. Menggunakan ketaksamaan segitiga, maka untuk $k \geq K$ diperoleh, $|x' - x''| = |x' - x_m + x_m - x''| = |x' - x_m| + |x_m - x''| = \delta/2 + \delta/2 = \delta$. Karena berlaku untuk setiap $\delta > 0$, maka $x' - x'' = 0$ berarti $x' = x''$. Kontradiksi dengan pengandaian. Jadi terbukti limitnya tunggal.

Definisi 3. Barisan bilangan real $X = \{x_m\}$ dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real $K > 0$ sedemikian sehingga $|x_m| \leq K$ untuk semua $k \in \mathbb{N}$. Oleh karena itu, barisan $\{x_m\}$ terbatas jika dan hanya jika himpunan $\{x_m : k \in \mathbb{N}\}$ merupakan subset terbatas dalam R .

Teorema 2. Jika $X = \{x_m\}$ konvergen maka $X = \{x_m\}$ terbatas. **Bukti :** Diketahui $X = \{x_m\}$ konvergen, misalkan konvergen ke x . Diambil $\delta = 1$, maka terdapat $K \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk setiap $k \geq K$ berlaku $|x_m - x| < 1$. Menggunakan akibat Ketaksamaan Segitiga, maka $|x_m| - |x| < 1$ atau $|x_m| < 1 + |x|$ untuk semua $k \geq K$. Pilih $K = \sup \{x_1, x_2, \dots, x_{K-1}, |x| + 1\}$ maka $|x_m| \leq K$, untuk semua $k \in \mathbb{N}$. Jadi terbukti bahwa $\{x_m\}$ terbatas.

Definisi 4. Barisan bilangan real $X = \{x_m\}$ disebut barisan Cauchy jika untuk setiap $\delta > 0$ terdapat $H(\delta) \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga untuk setiap $k, l \in \mathbb{N}$ dengan $k, l \geq H(\delta)$ berlaku $|x_m - x_l| < \delta$.

Lemma 1. Jika $X = \{x_m\}$ barisan bilangan real yang konvergen, maka X merupakan barisan Cauchy. **Bukti :** Misalkan $x = \lim X$. Diberikan $\delta > 0$, maka terdapat $K(\delta) \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga jika $k \geq K(\delta)$, maka $|x_m - x| < \delta/2$. Oleh karena itu, jika $H(\delta) := K(\delta)$ dan jika $k, l \geq H(\delta)$, maka diperoleh $|x_m - x_l| = |(x_m - x) + (x - x_l)| = |x_m - x| + |x - x_l| < \delta/2 + \delta/2 = \delta$. Karena berlaku untuk sebarang $\delta > 0$, maka terbukti bahwa $\{x_m\}$ barisan Cauchy.

Teorema 3. Jika $X = \{x_m\}$ barisan Cauchy, maka X barisan terbatas. **Teorema 4 (Kriterian Konvergensi Cauchy).** Barisan bilangan real $X = \{x_m\}$ konvergen jika dan hanya jika $X = \{x_m\}$ barisan Cauchy. **Bukti :** \Rightarrow Jelas (Lemma 1.) \Leftarrow Diketahui $X = \{x_m\}$ barisan Cauchy. Diambil $\delta > 0$, maka terdapat $H = H(\delta) > 0$ sedemikian sehingga untuk setiap $k, l \in \mathbb{N}$ dengan $k, l \geq H$ berlaku $|x_m - x_l| < \delta$. Karena X barisan Cauchy, maka X terbatas, jadi sehingga X memuat barisan bagian $X' = \{x_{mk}\}$ yang konvergen ke x^* . Oleh karena itu terdapat $K \geq H$ dengan $K \in \{k_1, k_2, k_3, \dots\}$ sedemikian sehingga $|x_K - x^*| < \delta/2$. Akibatnya untuk $k = K$ diperoleh $|x_m - x^*| = |x_m - x_K + x_K - x^*| \leq |x_m - x_K| + |x_K - x^*| < \delta/2 + \delta/2 = \delta$. Karena berlaku untuk sebarang $\delta > 0$, $\delta/2 + \delta/2 = \delta$ maka terbukti bahwa $X = \{x_m\}$ konvergen.

BARISAN FUNGSI Barisan fungsi memiliki dua jenis kekonvergenan yaitu konvergen pointwise dan konvergen seragam. Barisan Fungsi Konvergen Pointwise

Definisi 5. Barisan fungsi $\{f_m\}$ dikatakan konvergen pointwise ke suatu fungsi f jika $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = f(x)$, untuk setiap $x \in D$ dimana $D \subseteq \mathbb{R}$.

Lemma 2. Suatu barisan fungsi $\{f_m\}$ pada himpunan $D \subseteq \mathbb{R}$ konvergen ke suatu fungsi jika dan hanya jika untuk setiap $\delta > 0$ dan setiap $x \in D$ ada bilangan asli $K_{\delta, x}$ sedemikian hingga untuk semua $k \geq K_{\delta, x}$ berlaku $|f_m(x) - f(x)| < \delta$.

(2.1) Bukti : (\Rightarrow) Jika $\{f_m\} \in D \subseteq \mathbb{R}$ konvergen pointwise ke suatu fungsi maka $\forall \delta > 0$ dan $\forall x \in D$, $\exists K_{\delta, x} \in \mathbb{N} \exists \forall k \geq K_{\delta, x}$, berlaku $|f_m(x) - f(x)| < \delta$. Menurut Definisi 5. jika barisan fungsi konvergen ke suatu

fungsi pada himpunan D maka diperoleh $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = f(x)$. Akibatnya $m \rightarrow \infty$ $|f_m(x) - f(x)| < \delta, \forall k \geq K\epsilon$. Untuk pertidaksamaan di atas tidak hanya nilai δ yang berpengaruh untuk menentukan nilai k agar pertidaksamaan tersebut dapat terpenuhi, akan tetapi didalam barisan fungsi juga terdapat nilai x yang berpengaruh terhadap pertidaksamaan, sedemikian sehingga untuk nilai k bergantung terhadap nilai x dan δ . (\Leftarrow) Jika $\forall \delta > 0$ dan $\forall x \in D, \exists K\epsilon, x \in \mathbb{N} \ni \forall k \geq K\epsilon, x$, berlaku $|f_m(x) - f(x)| < \delta$ maka $\{f_m\}$ konvergen pointwise ke suatu fungsi. Untuk pernyataan di atas mirip dengan definisi dari suatu barisan yang konvergen di mana pada pernyataan tersebut dikatakan bahwa barisan fungsi konvergen ke suatu fungsi, pada barisan yang konvergen nilai k yang memenuhi agar barisan tersebut bilangan asli k selain bergantung pada δ , bilangan asli k bergantung pada nilai x yang diberikan dikarenakan untuk nilai suatu fungsi bergantung pada domain yang diberikan. Jadi, jika ada nilai k yang memenuhi dengan syarat di atas maka barisan fungsi tersebut konvergen ke suatu fungsi. Barisan Fungsi Konvergen Seragam Definisi 6. Barisan fungsi $\{f_m\}$ bernilai real di $D \subseteq \mathbb{R}$. Barisan fungsi $\{f_m\}$ dikatakan konvergen seragam ke fungsi f di D , jika diberikan $\delta > 0, \exists K\epsilon \ni |f_m(x) - f(x)| < \delta, \forall k \geq K\epsilon, x \in D$. Fungsi $f(x)$ merupakan nilai limit dari $f_m(x)$ untuk nilai $k \rightarrow \infty$. Akibat 1. Barisan fungsi $\{f_m\}$ tidak konvergen seragam ke f di D jika dan hanya jika $\exists \delta_0 > 0 \ni \nexists N$ yang memenuhi $|f_m(x) - f(x)| < \delta_0 \forall k \geq K\epsilon_0, \forall x \in D$. Lemma 3. Barisan fungsi $\{f_m\}$ tidak konvergen seragam ke fungsi f di D jika dan hanya jika untuk suatu $\delta_0 > 0$ ada subbarisan $\{f_{m_k}\}$ dari $\{f_m\}$ dan barisan $\{x_k\}$ pada D sedemikian sehingga berlaku $|f_{m_k}(x_k) - f(x_k)| \geq \delta_0$ untuk semua $k \in \mathbb{N}$. Bukti : (\Rightarrow) Karena barisan fungsi $\{f_m\}$ tidak konvergen seragam menuju fungsi f maka ada $\delta_0 > 0$ dan subbarisan f_{m_k} sedemikian sehingga $|f_{m_k}(x_k) - f(x_k)| \geq \delta_0$ untuk semua $k \in \mathbb{N}$. Untuk suatu δ_0 terdapat nilai x pada D sedemikian sehingga pertidaksamaan tersebut bernilai lebih dari atau sama dengan δ_0 . Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan di atas dapat berupa sebuah barisan $\{x_k\}$ pada D sedemikian sehingga $|f_{m_k}(x_k) - f(x_k)| \geq \delta_0$ (\Leftarrow) Andai f_m konvergen seragam ke f pada D , diberikan $\delta_0 > 0$ maka ada $k \geq K\epsilon$ sedemikian sehingga $|f_{m_k}(x_k) - f(x_k)| < \delta_0, \forall x_k \in D$ Barisan fungsi $\{f_{m_k}\}$ merupakan sub barisan dari $\{f_m\}$ maka sub barisan tersebut juga konvergen $|f_{m_k}(x_k) - f(x_k)| < \delta_0$ Terjadi kontradiksi, maka pengandaian haruslah dinegasikan. Jadi terbukti bahwa f_m tidak konvergen seragam ke f . Teorema 4 (Kriteria Cauchy). Barisan fungsi $\{f_m\}$ konvergen seragam ke f di D jika dan hanya jika diberikan $\delta > 0$ maka ada bilangan asli $K\epsilon \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga $|f_m(x) - f_n(x)| < \delta$ untuk semua $k, k \geq K\epsilon; x \in D$. Bukti : Untuk barisan fungsi $\{f_m\}$ konvergen seragam ke f di D . Diberikan $\delta > 0 \Rightarrow \epsilon > 0$, barisan fungsi $\{f_m\}$ konvergen seragam ke f sedemikian sehingga $|f_m(x) - f(x)| = |f(x) - f_m(x)| < \delta$ k merupakan bilangan asli juga dimana $k \geq 2 K\epsilon$, berlaku $|f_m(x) - f(x)| < \delta$ maka diperoleh $2 |f_m(x) - f_m(x)| = |(f_m(x) - f(x)) + (f(x) - f_m(x))| \leq |f_m(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \epsilon + \epsilon = \delta$. Teorema 5. Barisan fungsi $\{f_m\}$ merupakan barisan fungsi yang kontinu dalam himpunan $D \subseteq \mathbb{R}$ dan konvergen seragam ke f di D . Maka f kontinu di D . Bukti : Barisan fungsi $\{f_m\}$ adalah barisan fungsi kontinu maka f_m merupakan fungsi kontinu. Fungsi f_m kontinu di $a \in D$, maka diberikan $\delta > 0 \Rightarrow \epsilon > 0$ ada $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|f_m(x) - f_m(a)| < \delta$ untuk $|x - a| < \delta$. Barisan fungsi $\{f_m\}$ adalah barisan fungsi yang konvergen seragam ke f , jika diberikan $\delta > 0 \Rightarrow \epsilon > 0$, maka ada 3 bilangan asli $K\epsilon \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $|f_m(x) - f(x)| < \delta, a \in D$ dan $\{f_m\}$ konvergen seragam di D maka $|f_m(a) - f(a)| < \delta$ Akan dibuktikan f kontinu di D . $|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - f_m(a)| + |f_m(a) - f(a)| < \delta + \delta + \delta < 3\delta$ Teorema 7. Jika $\{f_m\}$ adalah barisan fungsi kontinu yang konvergen seragam ke suatu fungsi f pada $[a, a]$ maka $\int_a^a f_m(x) dx = \int_a^a f(x) dx$. (2.2) Bukti : Barisan $\{f_m\}$ konvergen seragam maka $\{f_m\}$ konvergen pointwise ke f , sedemikian sehingga $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = f(x)$ Barisan fungsi $\{f_m\}$ merupakan konvergen seragam pada interval $[a, a]$. Jika diberikan $\delta > 0$ maka ada $K\epsilon \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk semua $x \in [a, a]$

dan $k \geq K\varepsilon$ berlaku $|\int f_m(x) - f(x)| < \delta$ $\int f_m(x)ax - \int f(x)ax < \delta$ $\int f_m(x)ax \rightarrow \int f(x)ax$ Jadi, $\lim_{m \rightarrow \infty} \int f_m(x)ax = \int f(x)ax$ Ekuivalen dengan, $\lim_{m \rightarrow \infty} \int f_m(x)ax = \int \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x)ax$ INTEGRAL DARBOUX Definisi 7. Misal diberikan interval tertutup dan terbatas $[a, a]$. Partisi dari $[a, a]$ adalah himpunan berhingga P dari titik-titik $x_0, x_1, x_2, \dots, x_m$ di mana $a = x_0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_{m-1} \leq x_m = a$. Partisi P terdiri dari $k + 1$ titik. Jelasnya sebarang anggota partisi dari $[a, a]$ dapat berbeda jumlahnya sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan partisi di atas diperoleh subinterval-subinterval dari $[a, a]$ yaitu $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{i-1}, x_i], \dots, [x_{m-1}, x_m]$. subinterval ke- i $[x_{i-1}, x_i]$ disimbolkan dengan Δx_i . Simbol Δx_i juga merupakan Panjang $x_i - x_{i-1}$ sehingga $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $(i = 1, 2, \dots, k)$ Misalkan f adalah fungsi bernilai real yang terbatas pada $[a, a]$. Karena itu f juga terbatas pada setiap subinterval yang bersesuaian dengan salah satu partisi P . Misal K_i, k_i berturut-turut adalah supremum dan infimum dari f pada Δx_i . Dibentuk dua jumlahan : $m U(P, f) = \sum_{i=1}^m K_i \Delta x_i = K_1 \Delta x_1 + K_2 \Delta x_2 + \dots + K_m \Delta x_m$ $m K(P, f) = \sum_{i=1}^m k_i \Delta x_i = k_1 \Delta x_1 + k_2 \Delta x_2 + \dots + k_m \Delta x_m$ Berturut-turut disebut Jumlah Darboux Atas dan Jumlah Darboux Bawah dari f terhadap partisi P . Jika K, k adalah batas dari pada $[a, a]$, f didapatkank $k \leq k_i \leq K_i \leq K$ dan mengakibatkan $k \Delta x_i \leq k_i \Delta x_i \leq K_i \Delta x_i \leq K \Delta x_i$ Dengan menjumlahkan untuk $i = 1, 2, \dots, k$, didapatkan $k(a - a) \leq K(P, f) \leq U(P, f) \leq K(a - a)$. Setiap partisi dapat memberikan sepasang jumlahan, jumlah Darboux atas dan jumlah Darboux bawah. Dari semua patisi pada $[a, a]$, didapatkan himpunan U sebagai himpunan semua jumlah Darboux atas himpunan K sebagai himpunan semua jumlah Darboux bawah. Ketidaksamaan di atas menunjukkan bahwa kedua himpunan ini terbatas dan setiap himpunan tersebut mempunyai supremum dan infimum. Infimum dari himpunan jumlah Darboux atas disebut Integral Darboux Atas dan supremum dari himpunan jumlah Darboux bawah disebut Integral Darboux Bawah dari f pada $[a, a]$, yakni : $D \int_a^a f ax = \inf U = \inf\{U(P, f); P \text{ adalah partisi dari } [a, a]\}$ dan $D \int_a^a f ax = \sup K = \sup\{K(P, f); P \text{ adalah partisi dari } [a, a]\}$ Kedua integral tersebut dapat bernilai sama atau bisa saja tidak sama. Definisi 8 (Kondisi Terintegral Darboux). Apabila integral di atas memiliki nilai yang sama, yaitu $D \int_a^a f ax = D \int_a^a f ax = D \int_a^a f ax$ Maka dikatakan bahwa f terintegral Darboux terhadap $[a, a]$, ditulis dengan $f \in D[a, a]$. 3. METODOLOGI Penelitian ini merupakan kajian teori mengenai kekonvergenan barisan fungsi yaitu kekonvergenan barisan fungsi yang terintegral Darboux. Prosedur pada penelitian ini adalah mengidentifikasi sifat dari barisan fungsi yang konvergen dan fungsi yang terintegral Darboux. Kemudian menganalisis kekonvergenan barisan fungsi yang terintegral Darboux di mana suatu fungsi yang terintegral Darboux sama dengan limit dari integral barisan fungsinya. Selanjutnya, menentukan syarat suatu fungsi terintegral Darboux sama dengan limit dari integral barisan fungsinya. Sehingga pada akhirnya diperoleh teorema kekonvergenan fungsi yang terintegral Darboux. 4. PEMBAHASAN SIFAT BARISAN FUNGSI KONVERGEN Suatu barisan fungsi memiliki dua jenis kekonvergenan yaitu konvergen pointwise dan konvergen seragam. Kekonvergenan pointwise yang dinyatakan konvergen dengan bergantung pada setiap nilai dalam interval yang diberikan. Sedangkan kekonvergenan seragam yang dinyatakan konvergen berlaku untuk semua nilai interval yang diberikan. Berdasarkan Definisi 5, barisan fungsi $\{f_m\}$ dikatakan konvergen pointwise ke suatu fungsi f jika $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = f(x)$, untuk setiap $m \rightarrow \infty$ $x \in D$ di mana $D \subseteq R$. Kasus 1. Tentukan kekonvergenan barisan fungsi $\{f_m(x)\} = \{x^{mn}\}$ untuk $x \in [0, 1]$. Penyelesaian: Syarat kekonvergenan barisan fungsi yaitu $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = f(x)$. Barisan fungsi $\{f_m(x)\} = \{x^{mn}\}$ konvergen ke 0 karena $\lim_{m \rightarrow \infty} \{x^n\} = 0$ untuk $m \rightarrow \infty$ $m x \in [0, 1]$. Sehingga $\forall \delta > 0, x \in D, \forall k \geq K\varepsilon, x$ berlaku $|\int f_m(x) - f(x)| = |x^{mn} - 0| \leq < \delta, 1 m$ yang berarti berdasarkan δ dan x yang diberikan barisan $f_m(x)$ konvergen pointwise ke 0 pada interval $[0, 1]$ dan nilai limit untuk $k \rightarrow \infty$ dari barisan fungsi $\{f_m(x)\}$ atau $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = 0$. $m \rightarrow \infty$ Untuk $x \in [1, \infty)$ barisan fungsi $\{f_m(x)\} = \{m\} x^n$ tidak mempunyai nilai limit.

Sebab, nilai limit $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = 0$ untuk $k \rightarrow \infty$ adalah $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = 0$, akibatnya nilai $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = \infty$. Sehingga, $m \rightarrow \infty$ barisan fungsi $\{f_m(x)\} = \{m\}$ konvergen x_n pointwise pada interval $[0,1]$ tetapi tidak konvergen pointwise pada interval $[1, \infty)$. Dapat dilihat bahwa ada tidaknya suatu limit pada barisan fungsi tergantung pada nilai x yang diberikan. Barisan fungsi yang konvergen pointwise pada barisan fungsi sering dikatakan barisan fungsi tersebut konvergen. Selain itu pada barisan fungsi yang konvergen pointwise, nilai k yang memenuhi agar barisan tersebut konvergen bergantung pada nilai x dan δ yang diberikan. Selanjutnya, berdasarkan Definisi 6, barisan fungsi $\{f_m\}$ bernilai real di $D \subseteq \mathbb{R}$. Barisan fungsi $\{f_m\}$ dikatakan konvergen seragam ke fungsi f di D , jika diberikan $\delta > 0, \exists K \in \mathbb{N} \exists |f_m(x) - f(x)| < \delta, \forall k \geq K, x \in D$. Fungsi $f(x)$ merupakan nilai limit dari $f_m(x)$ untuk nilai $k \rightarrow \infty$.

Kasus 2. Tentukan kekonvergenan barisan fungsi $\{f_m(x)\} = \{xm\}$ untuk $x \in [0,1]$. Penyelesaian: Syarat kekonvergenan barisan fungsi yaitu $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = f(x)$. Barisan fungsi $f_m(x) = \{xm\}$ konvergen ke 0 karena $\lim_{m \rightarrow \infty} m = 0, x \in [0,1]$ yang berarti $\forall \delta > 0, x \in D, \forall k \geq K, x$ berlaku $|f_m(x) - f(x)| = |xm - 0| \leq m < \delta$, yang berarti berdasarkan δ dan x yang diberikan barisan $f_m(x)$ konvergen pointwise ke 0 pada interval $[0,1]$ karena nilai limitnya ada dan barisan fungsi $\{f_m(x)\} = \{xm\}$ konvergen seragam menuju $f(x) = 0$ pada $x \in [0,1]$ karena nilai $|x - 0| \leq \delta$, yang berarti jika m diambil sebarang nilai $\delta > 0$ ada nilai $k \geq K$ sedemikian sehingga $|x - 0| < \delta$ berlaku untuk m semua $x \in [0,1]$. Dari Kasus 2 menunjukkan bahwa kekonvergenan pointwise memuat kekonvergenan seragam yang berarti suatu barisan $\{f_m\}$ dikatakan konvergen seragam jika dan hanya jika $\{f_m\}$ konvergen pointwise dan ketika nilai keduanya ada maka nilainya sama. Pada Akibat 1 dijelaskan mengenai suatu barisan fungsi yang tidak konvergen seragam, maka dapat dilihat pada Kasus 3 di bawah.

Kasus 3. Tentukan kekonvergenan barisan fungsi $f_m(x) = 1+mx, x \in [0,1]$. Penyelesaian: Barisan fungsi $f_m(x) = 1+mx, x \in [0,1]$. $f_m(x)$ konvergen ke 0 dengan $\lim_{m \rightarrow \infty} 1+mx = 0$. Tetapi $f_m(x)$ tidak konvergen seragam di $x \in [0,1]$ karena jika diambil $\delta = 1$ dan $x = 1$, maka $|f_m(x) - f(x)| = |1+m - 0| = 1+m > 1$. Yang berarti tidak ada nilai k yang memenuhi agar $m < 1$. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu barisan fungsi yang konvergen seragam pastilah konvergen pointwise akan tetapi barisan fungsi yang konvergen pointwise belum tentu konvergen seragam. Setelah mengetahui barisan fungsi tersebut konvergen, selanjutnya akan dibahas mengenai sifat-sifat dari barisan konvergen. Sifat yang dimaksud adalah sifat barisan fungsi konvergen yang melekat pada fungsi kontinu dan fungsi yang terintegral. Pada Teorema 6 sudah dijelaskan bahwa barisan fungsi $\{f_m\}$ merupakan barisan fungsi yang kontinu dalam himpunan $D \subseteq \mathbb{R}$ dan konvergen seragam ke f di D . Maka f kontinu di D . Pada Teorema 7 juga dijelaskan bahwa Jika $\{f_m\}$ adalah barisan fungsi kontinu yang konvergen seragam ke suatu fungsi f pada $[a, a]$ maka: $\lim_{m \rightarrow \infty} \int_a^a f_m(x) dx = \int_a^a f(x) dx$ Kasus 4. Tentukan kekonvergenan barisan fungsi $\{f_m(x)\} = \{m+1\}$ kontinu pada interval $x \in [0,1]$. Penyelesaian: Barisan fungsi $\{f_m(x)\} = \{m+1\}$ kontinu pada x interval $[0,1]$ karena nilai $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = f_m(a) x \rightarrow a$ dan juga barisan fungsi tersebut konvergen seragam menuju ke fungsi f dengan $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = f(x) = 0$ pada interval $[0,1]$. Nilai $\lim_{m \rightarrow \infty} \int_0^1 f_m(x) dx = \int_0^1 mx+1 dx = 1$ dan $\lim_{m \rightarrow \infty} \int_0^1 0 dx = 0$. Hal ini menunjukkan bahwa $\lim_{m \rightarrow \infty} \int_0^1 f_m(x) dx \neq \int_0^1 \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) dx$. Sehingga dapat dikatakan bahwa syarat kekonvergenan suatu barisan fungsi terintegral yaitu apabila fungsi tersebut kontinu dan konvergen seragam.

SIFAT FUNGSI TERINTEGRAL DARBOUX Ada beberapa syarat suatu fungsi terintegral Darboux. Berdasarkan Definisi 7 menjelaskan bahwa integral Darboux untuk fungsi real yang terbatas pada suatu interval tertutup dan terbatas $[a, a]$. Selanjutnya berdasarkan Definisi 8 kondisi terintegral Darboux ketika kedua nilai integral mempunyai nilai yang sama, yang dimaksudkan dengan kedua integral tersebut ialah integral Darboux bawah dan integral

Darboux atas. Kasus 5. Akan ditunjukkan bahwa fungsi konstan k terintegral Darboux dengan $a \int k \, dx = k(a - a)$ a Untuk partisi P pada interval $[a, a]$. Penyelesaian: $K(P, f) = k \Delta x_1 + k \Delta x_2 + \dots + k \Delta x_m = k(\Delta x_1 + \Delta x_2 + \dots + \Delta x_m) = k(a - a)$ Sehingga $a \int k \, dx = \sup K(P, f) = k(a - a)$ a Sejalan dengan hal yang di atas, diperoleh $a \int k \, dx = \inf U(P, f) = \inf(k\Delta x_1 + k\Delta x_2 + \dots + k\Delta x_m) = k(a - a)$ Jadi $a \int k \, dx = \int k = k(a - a)$ a Yang mengakibatkan fungsi konstan k terintegral dan $a \int k = k(a - a)$ a Kasus 6. Akan ditunjukkan bahwa fungsi f yang didefinisikan dengan $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } x \text{ irasional} \\ 0, & \text{jika } x \text{ rasional} \end{cases}$ Tidak terintegral Darboux disebarkan interval $[a, a]$. Penyelesaian: Dengan memperhatikan sebuah partisi P pada interval $[a, a]$, berlaku $m U(P, f) = \sum_{i=1}^m K_i \Delta x_i = 1\Delta x_1 + 1\Delta x_2 + \dots + 1\Delta x_m = a - a$ Sehingga $a \int f \, dx = \inf U(P, f) = a - a$ Dan $a \int f \, dx = \sup K(P, f) = \sup\{0\Delta x_1 + 0\Delta x_2 + \dots + 0\Delta x_m\} = 0$ Dalam hal ini digunakan sifat kepadatan bilangan real Jadi $a \int f \, dx \neq \int f \, dx$ a a Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi f tidak terintegral Darboux. Kasus 7. Akan ditunjukkan bahwa x^2 terintegral Darboux pada sebarang interval $[0, k]$, dimana $k > 0$ Penyelesaian: Dibuat partisi P pada $[0, k]$ dengan cara membagi interval tersebut menjadi k bagian yang sama, sehingga $[0, km, 2mk, \dots, mmk]$ adalah partisi P , $[(i - 1)(k)]^2$ dan $[i k]^2$ berturut-turut m adalah batas bawah dan batas atas fungsi di Δx_i dan Panjang masing-masing intervalnya adalah k/m . $U(P, x^2) = k^3(1^2 + 2^2 + \dots + k^2)/m^3 = k^3 \cdot 6(k+1)(2k+1)/6k^3 = k^3(1 + \dots + k^2)/k^3$ Dan $K(P, x^2) = k^3\{0^2 + 1^2 + 2^2 + \dots + (k-1)^2\}/k^3 = k^3(1 - \dots + (k-1)^2)/k^3$ Jadi $6 k k K(P, x^2) = k^3 \{0 + 1^2 + 2^2 + \dots + (k-1)^2\} k^3 = k^3(1 - \dots + (k-1)^2) k^3$ Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi x^2 terintegral Darboux dan $a \int x^2 \, dx = k^3 a^3$

Berdasarkan dari beberapa kasus maka dapat dikatakan bahwa syarat suatu fungsi terintegral 1] adalah partisi P . Dapat ditulis $[(i - \text{Darboux apabila intervalnya tertutup dan terbatas } [a, a] \text{ serta nilai dari kedua integral 1) (1)]$, $[(i) (1)]$. Substitusi masuk ke fungsi $k k$ Darboux atas dan integral Darboux bawahnya sehingga, $[i-1 i]$ berturut-turut adalah batas, itu sama. $km km$ bawah dan batas atas fungsi di Δx_i dengan KEKONVERGENAN BARISAN FUNGSI panjang masing-masing intervalnya adalah $1/k$ YANG TERINTEGRAL DARBOUX Selanjutnya menentukan integral Darboux Setelah kita mengetahui syarat kekonvergenan bawah dan integral Darboux atas. Dengan barisan suatu fungsi dan fungsi yang terintegral memperhatikan partisi P pada interval $[0,1]$, darboux maka kita dapat menentukan barisan berlaku: fungsi apa sajakah yang dapat terintegral k Darboux. Mengingat tidak semua barisan fungsi $U(P, f) = \sum K_i \Delta x_i$ yang terintegral dan konvergen kesuatu fungsi, $i=1$ fungsi limitnya terintegral, atau jika terintegral, k nilai integralnya belum tentu sama dengan nilai $= \sum i \cdot 1$ limit integral barisan fungsinya. $kk k i=1$ Pada Teorema 7 sudah di jelaskan mengenai k syarat suatu barisan fungsi terintegral. Maka $= 1$ akan diberi beberapa kasus yang terkait tentang $k^2 k \sum_{i=1}^k i$ kekonvergenan barisan fungsi yang terintegral Darboux. $= 1 k^2 k (1 + 2 + \dots + k)$ Kasus 8. Tentukan kekonvergenan barisan $= 1 k(k+1)$ fungsi yang terintegral Darboux $\{f_m(x)\} = k^2 k [2] \{x\}$ untuk $x \in [0,1]$ $1 (k+1) m = 2k [k] = 1 [1 +] 1$ Penyelesaian: Barisan Fungsi $f_m(x) = xm$, konvergen ke 0 $2k$ karena $\lim \{x\} = 0$ untuk $x \in [0,1]$. Yang $= 1 k 2k 2kk + 1 m \rightarrow \infty m$ Maka berarti $\forall \delta > 0, x \in D, \forall k \geq K\epsilon, x$ berlaku $1 |f_m(x) - f(x)| = |xm - 0| \leq m 1 < \delta$, yang berarti $\inf U(P, f) = 2k$ berdasarkan δ dan x yang diberikan barisan Selanjutnya $k f_m(x)$ konvergen pointwise ke 0 pada interval $[0,1]$ karena nilai limitnya ada dan barisan $K(P, f) = \sum k_i \Delta x_i$ fungsi $\{f_m(x)\} = \{mx\}$ konvergen seragam $k i=1 i - 1 1$ menuju $f(x) = 0$ pada $x \in [0,1]$ karena nilai $|x - 0| \leq < \delta$, yang berarti jika diambil $1 = \sum kk \cdot k i=1 m m k$ sebarang nilai $\delta > 0$ ada nilai $k \geq K\epsilon 1$ sedemikian sehingga $|x - 0| < \delta$ berlaku untuk $= k^2 k \sum_{i=1}^k i - 1 m$ semua $x \in [0,1]$. $= 1 i=1 k^2 k (0 + 1 + 2 + \dots + (k-1))$ Dibuat partisi P pada interval $[0,1]$ dengan cara membagi interval tersebut menjadi k bagian $= 1 [k(k-1)]$ yang sama, sehingga $[0, 1/k, 2/k, \dots, k/k]$ $kk k = 1 (k-1) 2k [k]$ Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.9 No. 2 Ed. Juli-Des 2021 $= 1 [1 -] 1 2k 1 k = 1 2k 2kk -$ Maka $\sup K(P, f) = 1$ Diperoleh $2k a \int$

