

Turnitin Originality Report

Processed on: 05-May-2023 20:39 WIB
ID: 2085080408
Word Count: 4013
Submitted: 1

Similarity Index
24%

Similarity by Source
Internet Sources: 20%
Publications: 2%
Student Papers: 13%

10.14345-Article_Text-38503-1-10-20200706.pdf By
Anonymous

8% match (student papers from 17-Sep-2018)

[Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-09-17](#)

5% match (Internet from 26-Oct-2018)

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12548/1/Ishak%20R.pdf>

3% match (Internet from 24-Feb-2023)

<https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/8552?issue=Vol+8+No+1+%282020%29%3A+Volume+8+Nomor+1&page=1>

2% match (student papers from 17-Dec-2021)

Class: DOSEN

Assignment: Penelitian Pak Irwan

Paper ID: [1732583160](#)

2% match (Internet from 04-Jun-2021)

<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1151615>

1% match (student papers from 10-Feb-2020)

Class: SKRIPSI GANJIL 2019

Assignment: Skripsi BASO IRVAN

Paper ID: [1254600796](#)

1% match (Internet from 26-Dec-2019)

<https://pt.scribd.com/doc/46191126/Pengantar-Analisis-Real-I>

1% match ()

[Fernandez, Aloysius Joakim. "Teorema Pendekatan Weierstrass dan generalisasinya oleh Stone", 2009](#)

1% match (C. R. Wilks, J. A. House. "Susceptibility of various animals to the vesiculovirus Piry", Journal of Hygiene, 2009)

[C. R. Wilks, J. A. House. "Susceptibility of various animals to the vesiculovirus Piry", Journal of Hygiene, 2009](#)

Analisis Kekontinuan Fungsi pada Barisan Fungsi Konvergen Wahidah Alwi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, wahidah.alwi@uin-alauddin.ac.id Ishak R Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ABSTRAK, [Penelitian ini membahas tentang tentang barisan fungsi ft?nt? dan hubungannya dengan fungsi kontinu ft?. Salah satu kekonvergenan dalam barisan fungsi adalah konvergen seragam, dimana jenis kekonvergenan tersebut mampu mempertahankan kekontinuan fungsi. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan karakteristik barisan fungsi](#)

ft[?]nt? yang konvergen ke fungsi kontinu ft[?]. Kemudian akan diuraikan beberapa sifat barisan fungsi ft[?]nt? konvergen seragam serta keterkaitannya dengan fungsi kontinu ft[?]. Lebih jauh, dalam Penelitian ini akan ditunjukkan karakteristik barisan yang menjadi syarat cukup konvergennya barisan ft[?]nt? ke fungsi kontinu ft[?]. Kata Kunci: Barisan fungsi, Fungsi kontinu, karakteristik barisan, Konvergen seragam 1.

PENDAHULUAN Barisan fungsi merupakan salah satu cara dalam menghampiri sebuah fungsi, sehingga kekonvergenan barisannya selalu menarik untuk dibahas. Kekonvergenan barisan fungsi terbagi menjadi dua yaitu kekonvergenan pointwise dan kekonvergenan seragam. Pengkajian yang lebih jauh dapat dilihat pada kekonvergenan seragam, sebab ini memiliki hubungan yang erat dengan beberapa pembahasan lain seperti kekontinuan, teori integral dan diferensial. Pembahasan kekonvergenan seragam juga memuat criteria Cauchy. Barisan fungsi konvergen seragam dapat dicari melalui nilai mutlak dari selisih suku yang berdekatan.

Sebagaimana barisan fungsi konvergen seragam, kriteria Cauchy memiliki hubungan yang erat dengan kekontinuan fungsi. Dibagian khusus, barisan fungsi monoton kontinu yang konvergen ke fungsi kontinu, mengimplikasikan bahwa barisan tersebut konvergen seragam atau lebih dikenal dengan teorema dini. Selanjutnya, tulisan ini akan membahas karakteristik barisan fungsi yang konvergen ke fungsi kontinu atau dengan kata lain karakteristik yang menjadi syarat cukup konvergennya suatu barisan fungsi kontinu. Penelitian ini dibatasi pada pendefinisian fungsi kontinu pada interval [at[?], bt[?]]. Interval [at[?], bt[?]] merupakan interval tertutup dan terbatas yang mana menurut teorema Heine-Borel interval tersebut adalah interval kompak. 2. TINJAUANPUSTAKA

Kekontinuan Sebelum masuk kemateri kekontinuan, terlebih dahulu diperkenalkan materi limit. Limit merupakan pembahasan yang paling penting dalam analisis real, sebab materi selalu digunakan hampir disemua pembahasan lainnya. Limit secara intuitif dapat diartikan sebagai nilai suatu fungsi pada suatu titik. Untuk pemahaman lebih jelas dapat dilihat pada definisi berikut mining dapat dilakukan dalam beberapa langkah. Definisi 2.1 Misalkan At[?] ⊆ ℝ dan ct[?] adalah titik disekitar At[?]. Untuk fungsi ft[?]: At[?] → ℝ, bilangan real Lt[?] dikatakan sebagai limit At[?] di ct[?] jika untuk setiap εt[?] > 0 terdapat δt[?] > 0 sedemikian hingga jika xt[?] ∈ At[?] dan 0 < |xt[?] – ct[?]| < δt[?] maka berlaku |ft[?](xt[?]) – Lt[?]| < εt[?]. Definisi tersebut merupakan definisi limit yang secara umum dituliskan sebagai lim ft[?](xt[?]) = xt[?]→ct[?] Lt[?]. Teorema 2.2 Jika ft[?]: At[?] → ℝ dan c adalah titik limit At[?]. Jika At[?] memiliki limit maka limitnya tunggal. Bukti: Ambil εt[?] > 0 dan misalkan ft[?](xt[?]) memiliki limit Lt[?] dan Lt[?]' untuk xt[?] → ct[?] maka terdapat rt[?]1 > 0 dan rt[?]2 > 0 sehingga untuk xt[?] ∈ At[?] dengan 0 < |xt[?] – ct[?]| < rt[?]1 berlaku |ft[?](xt[?]) – Lt[?]| < εt[?] Dan untuk xt[?] ∈ At[?] dengan 0 < |xt[?] – ct[?]| < rt[?]2 berlaku |ft[?](xt[?]) – Lt[?]'| < εt[?] Jika diambil rt[?] = min{rt[?]1, rt[?]2} maka diperoleh 2 |Lt[?] – Lt[?]'| ≤ |Lt[?] – ft[?](xt[?])| + |ft[?](xt[?]) – Lt[?]'| < εt[?] + εt[?] = εt[?] 2 Terjadi kontradiksi, sehingga limit ft[?](xt[?]) dengan xt[?] → ct[?] adalah tunggal Selanjutnya salah satu konsep penting dalam matematika analisis yang sangat berkaitan dengan limit adalah kekontinuan. Kekontinuan suatu fungsi sangat bergantung dari ada tidaknya limit fungsi tersebut di suatu titik. Definisi 2.3 Misalkan At[?] ⊆ ℝ, ft[?]: At[?] → ℝ dan ct[?] ∈ At[?]. Fungsi ft[?] dikatakan kontinu di ct[?] jika untuk setiap εt[?] > 0 terdapat δt[?] > 0 sedemikian hingga jika xt[?] adalah suatu titik di At[?] terpenuhi |xt[?] – ct[?]| < δt[?] maka berlaku |ft[?](xt[?]) – Lt[?]| < εt[?]. definisi ini menyatakan bahwa suatu fungsi dikatakan kontinu disuatu titik jika ft[?] terdefinisi dititik tersebut dan limitnya ada. Jika suatu fungsi tidak memenuhi kondisi tersebut maka dikatakan diskontinu. Tinjauan dalam kekontinuan yang juga perlu diperhatikan adalah kekontinuan pada interval. Fungsi ft[?] dikatakan kontinu pada At[?] jika untuk setiap xt[?] ∈ At[?] dan εt[?] > 0 terdapat δt[?] > 0 sedemikian hingga jika ut[?] ∈ At[?] dengan |xt[?] – ut[?]| <

$\delta t?$ maka berlaku $|ft?(xt?) - ft?(ut?)| < \varepsilon t?$. Definisi cukup jelas memperlihatkan bahwa nilai $\delta t?$ bergantung pada nilai $\varepsilon t?$ dan $xt?$. Kekontinuan memiliki ruang kajian yang cukup luas, salah satunya adalah perluasan pada kekontinuan seragam. Suatu fungsi yang kontinu seragam adalah fungsi kontinu, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Salah satu perbedaan kekontinua dan kekontinuan seragam adalah nilai $\delta t?$. jika dalam kekontinuan nilai $\delta t?$ bergantung pada nilai $\varepsilon t?$ dan $xt?$, maka dalam kekontinuan seragam nilai $\delta t?$ hanya bergantung pada $\varepsilon t?$. Definisi 2.5 Misalkan $At? \subseteq \mathbb{R}$ dan $ft?: At? \rightarrow \mathbb{R}$. Fungsi $ft?$ dikatakan kontinu seragam pada $At?$ jika untuk setiap $\varepsilon t? > 0$ terdapat $\delta t? > 0$ sedemikian hingga jika $xt?, ut? \in At?$ dengan $|xt? - ut?| < \delta t?$ maka berlaku $|ft?(xt?) - ft?(ut?)| < \varepsilon t?$. Selanjutnya ditunjukkan teorema yang menjamin suatu fungsi kontinu seragam. Teorema 2.6 Misalkan $It?$ interval terbatas tertutup dan $ft?: It? \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu di $It?$, maka fungsi $ft?$ kontinu seragam pada $It?$.

Bukti : Jika $ft?$ tidak kontinu seragam pada $It?$, maka terdapat $\varepsilon t?0 > 0$ dan dua barisan yaitu $xt?nt?$ dan $yt?nt?$ di $It?$ sedemikian sehingga $|xt?nt? - yt?nt?| < 1nt?$ dan $|ft?(xt?nt?) - ft?(yt?nt?)| \geq \varepsilon t?0$ untuk semua bilangan asli $nt?$. Karena $It?$ terbatas maka $xt?nt?$ juga terbatas sehingga terdapat subbarisan $xt?nt?kt?$ dari $xt?nt?$ yang konvergen ke $zt?$. Karena $It?$ tertutup, maka $zt?$ terdapat pada $It?$. Cukup jeas bahwa subbarisan $yt?nt?kt?$ juga konvergen ke $zt?$, karena $?yt?nt?kt? - zt? \leq ?yt?nt?kt? - xt?nt?kt? + |xt?nt?kt? - zt?|$ Selanjutnya, jika $ft?$ kontinu di $zt?$ maka kedua barisan $ft?(xt?nt?kt?)$ dan $ft?(yt?nt?kt?)$ haruslah konvergen ke $ft?(zt?)$. Tetapi ini tidak mungkin terjadi karena $|ft?(xt?nt?) - ft?(yt?nt?)| \geq \varepsilon t?$ Untuk semua bilangan asli $nt?$. Terjadi kontradiksi, sehingga ini membuktikan bahwa jika $ft?$ kontinu di $It?$, maka $ft?$ kontinu seragam pada $It?$. Teorema ini menunjukkan bahwa fungsi kontinu yang terdefinisi pada interval tertutup dan terbatas juga kontinu seragam. Barisan 58 • Wahidah Alwi; Ishak R Barisan bilangan real merupakan pemetaan dari bilangan asli ke bilangan real yang diperjelas dengan definisi berikut

Definisi 2.7 Barisan bilangan real (atau barisan di \mathbb{R}) adalah fungsi yang didefinisikan pada himpunan $Nt?$ dengan range dalam $Rt?$. Selanjutnya, suatu barisan dikatakan konvergen kesuatu titik jika barisan tersebut memiliki limit. Definisi 2.8 Barisan $Xt? = (xt?nt?)$ dikatakan konvergen ke $xt? \in Rt?$, atau $xt?$ dikatakan limit barisan $(xt?nt?)$ jika untuk setiap $\varepsilon t? > 0$ terdapat bilangan asli $Kt?(\varepsilon t?)$ sedemikian hingga untuk setiap $nt? \geq Kt?(\varepsilon t?)$, untuk $xt?nt?$ berlaku $|xt?nt? - xt?| < \varepsilon t?$. Beberapa sifat barisan konvergen dapat dilihat dalam teorema berikut yang menyangkut ketenggalan nilai limit dan keterbatasan barisan. Teorema 2.9 Jika barisan $(xt?nt?)$ konvergen, maka $(xt?nt?)$ limitnya tunggal. Bukti: Misalkan $\lim(xt?nt?) = xt?'$ dan $\lim(xt?nt?) = xt?''$ $nt? \rightarrow \infty$ dengan $xt?' \neq xt?''$. Jika diambil $\varepsilon t? > 0$ terdapat $Kt?'(\varepsilon t?)$ sedemikian sehingga $|xt?nt? - xt?'| < \varepsilon t?2$ untuk setiap $nt? \geq Kt?'(\varepsilon t?)$ dan terdapat $Kt?''(\varepsilon t?)$ sedemikian sehingga $|xt?nt? - xt?''| < \varepsilon t?2$ untuk semua $nt? \geq Kt?''(\varepsilon t?)$. Dipilih $Kt? = \max\{Kt?'(\varepsilon t?), Kt?''(\varepsilon t?)\}$. Menurut Ketaksamaan Segitiga untuk $nt? \geq Kt?$ diperoleh $|xt?'' - xt?'| = |xt?'' - xt?nt?| + |xt?nt? - xt?'| < \varepsilon t? + \varepsilon t? = \varepsilon t? 2$

2 Karena berlaku untuk setiap $\varepsilon t? > 0$, maka $xt?'' - xt?' = 0$ yang berarti $xt?' = xt?''$. Kontradiksi dengan pengandaian, sehingga terbukti bahwa limit $(xt?nt?)$ tunggal. Teorema 2.10 Jika $Xt? = (xt?nt?)$ konvergen, maka $Xt? = (xt?nt?)$ terbatas. Bukti: Diketahui $\lim(xt?nt?) = xt?$ dan ambil $\varepsilon t? = 1$, maka terdapat bilangan asli $Kt? = Kt?(1)$ sedemikian hingga berlaku $|xt?nt? - xt?| < 1$ untuk semua $nt? \geq Kt?$. Dengan ketaksamaan segitiga untuk $nt? \geq Kt?$ maka diperoleh $|xt?nt? - xt? + xt?| \leq |xt?nt? - xt?| + |xt?| < 1 + |xt?|$ Jika dipilih $Mt? = \sup\{|xt?1|, |xt?2|, \dots, |xt?Kt? - 1|, 1 + |xt?|\}$ Maka terbukti bahwa $|xt?nt?| \leq Mt?$ untuk semua $nt? \in Nt?$. Teorema 2.11 (i) Jika $Xt? = (xt?nt?)$ naik (monoton) dan terbatas ke atas, maka $Xt? = (xt?nt?)$ konvergen dengan lim $(xt?nt?) = \sup\{xt?nt? : nt? \in Nt?\}$. (ii) Jika $Xt? = (xt?nt?)$ turun (monoton) dan terbatas ke bawah, maka $Xt? = (xt?nt?)$ konvergen dengan lim $(xt?nt?) = \inf\{xt?nt? : nt? \in Nt?\}$. Bukti: Karena $Xt? = (xt?nt?)$ terbatas ke atas, maka terdapat $Mt? \in Nt?$ sedemikian hingga $xt?nt? \leq Mt?$ untuk semua $nt? \in Nt?$. Namakan

$A_{\bar{t}} = \{x_t? n_t? : n_t? \in N_t?\}$, maka $\subset R_t?$, terbatas ke atas dan tidak kosong. Menurut Sifat Lengkap, maka $A_{\bar{t}}$ memiliki supremum, misalkan $x_{\bar{t}}? = \sup A_{\bar{t}}$. Diambil $\epsilon_t? > 0$, maka terdapat $K_t? \in N_t?$ sedemikian hingga $x_{\bar{t}}? - \epsilon_t? < x_{\bar{t}}? k_t? \leq x_{\bar{t}}?$. Karena $X_t?$ monoton naik, maka untuk $\forall n_t? \geq K_t?$ berlaku $x_{\bar{t}}? - \epsilon_t? < x_{\bar{t}}? k_t? \leq x_{\bar{t}}? n_t? < x_{\bar{t}}? + \epsilon_t?$ Atau $x_{\bar{t}}? - \epsilon_t? < x_{\bar{t}}? n_t? < x_{\bar{t}}? + \epsilon_t? \Leftrightarrow |x_{\bar{t}}? n_t? - x_{\bar{t}}?| < \epsilon_t?$ Ini membuktikan bahwa $x_{\bar{t}}? = (x_{\bar{t}}? n_t?)$ konvergen ke $x_{\bar{t}}? = \lim(x_{\bar{t}}? n_t?) = \sup \{x_{\bar{t}}? n_t? : n_t? \in N_t?\}$. pembuktian untuk infimum serupa. Barisan Fungsi Barisan fungsi merupakan barisan yang elemennya adalah berupa fungsi. Sehingga fungsi untuk setiap suku bergantung pada bilangan asli. Barisan fungsi konvergen terbagi atas konvergen pointwise dan konvergen seragam. Kekonvergenan pointwise didefinisikan sebagai berikut. Definisi 2.12 Barisan fungsi $\{f_t? n_t?\}$ dikatakan konvergen pointwise ke suatu fungsi $f_t?$ jika $\lim f_t? n_t?(x_t?) = n_t? \rightarrow \infty f_t?(x_t?)$, untuk setiap $x_t? \in E_t?$ dimana $E_t? \subseteq R_t?$. Definisi tersebut cukup jelas menggambarkan bahwa nilai interval yang diberikan sangat mempengaruhi nilai limitnya sebagaimana dalam lemma berikut. Lemma 2.13 Suatu barisan fungsi $\{f_t? n_t?\}$ pada himpunan $A_{\bar{t}} \subseteq R_t?$ konvergen ke suatu fungsi jika dan hanya jika untuk setiap $\epsilon_t? > 0$ dan setiap $x_t? \in A_{\bar{t}}$ ada bilangan asli $N_t? \epsilon_t?, x_t?$ sedemikian sehingga untuk semua $n_t? \geq N_t? \epsilon_t?, x_t?$ berlaku $|f_t? n_t?(x_t?) - f_t?(x_t?)| < \epsilon_t?$. Bukti: Pertidaksamaan di atas menunjukkan bahwa $x_t?$ berpengaruh terhadap $n_t?$ untuk memenuhi pertidaksamaan. Sehingga jelas bahwa dalam memenuhi pertidaksamaan, $n_t?$ bergantung terhadap nilai $x_t?$ dan $\epsilon_t?$. Selanjutnya, suatu barisan yang konvergen seragam hanya bergantung pada nilai $\epsilon_t?$ dan berlaku untuk semua nilai $x_t?$ dalam interval. Kekonvergenan seragam didefinisikan sebagai berikut. Definisi 2.14 Barisan fungsi $\{f_t? n_t?\}$ bernilai riil di $E_t? \subseteq R_t?$ Barisan fungsi $\{f_t? n_t?\}$ dikatakan konvergen seragam ke fungsi $f_t?$ di $E_t?$, jika diberikan $\epsilon_t? > 0$, $\exists N_t? \epsilon_t? \exists |f_t? n_t?(x_t?) - f_t?(x_t?)| < \epsilon_t?, \forall n_t? \geq N_t? \epsilon_t?, x_t? \in E_t?$. Fungsi $f_t?(x_t?)$ merupakan nilai limit dari $f_t? n_t?(x_t?)$ untuk nilai $n_t? \rightarrow \infty$. Akibat 2.15 Barisan fungsi $\{f_t? n_t?\}$ tidak konvergen seragam ke $f_t?$ di $E_t?$ jika dan hanya jika $\exists \epsilon_t? 0 > 0 \exists N_t? \text{ yang memenuhi } |f_t? n_t?(x_t?) - f_t?(x_t?)| < \epsilon_t? 0 \forall n_t? \geq N_t? \epsilon_t? 0, \forall x_t? \in E_t?$. Bukti: Sesuai dengan definisi barisan konvergen seragam bahwa Barisan fungsi $\{f_t? n_t?\}$ dikatakan konvergen seragam ke fungsi $f_t?$ di $E_t?$, jika diberikan $\epsilon_t? > 0$, $\exists N_t? \epsilon_t? \exists |f_t? n_t?(x_t?) - f_t?(x_t?)| < \epsilon_t?, \forall n_t? \geq N_t? \epsilon_t?, x_t? \in E_t?$. Fungsi $f_t?(x_t?)$ merupakan nilai limit dari $f_t? n_t?(x_t?)$ untuk nilai $n_t? \rightarrow \infty$, diketahui bahwa jika diambil $\epsilon_t? > 0$ maka $\forall n_t? \geq N_t? \epsilon_t?$ memenuhi pertidaksamaan $|f_t? n_t?(x_t?) - f_t?(x_t?)| < \epsilon_t?$. Jadi, jika diambil $\epsilon_t? > 0$ sehingga tidak ada $n_t? \geq N_t? \epsilon_t?$ yang memenuhi pertidaksamaan $|f_t? n_t?(x_t?) - f_t?(x_t?)| < \epsilon_t?$ maka $f_t? n_t?(x_t?)$ dinyatakan tidak konvergen seragam. 3. METODOLOGI Penelitian ini merupakan kajian teori yang membahas mengenai kekontinuan dengan memperhatikan barisan fungsinya. Prosedur penelitian dimulai dengan menunjukkan hubungan konvergensi barisan fungsi dan fungsi kontinu. Kemudian menganalisis sifat barisan fungsi yang konvergen ke fungsi kontinu. Terakhir, akan ditunjukkan barisan fungsi yang konvergen ke fungsi kontinu yang berimplikasi pada ditunjukannya karakteristik barisan fungsi yang menjadi syarat cukup kekontinuan fungsi yang didekatinya. 4. PEMBAHASAN Hubungan barisan fungsi konvergen dan kekontinuan Barisan fungsi konvergen terbagi menjadi dua yaitu konvergen pointwise dan konvergen seragam. Meskipun telah diketahui bahwa konvergen pointwise merupakan syarat perlu konvergen seragam, akan tetapi berdasarkan definisinya mengimplikasikan bahwa barisan fungsi yang konvergen pointwise tidak mampu mempertahankan kekontinuan fungsi. Lain halnya dengan kekonvergenan seragam, kekonvergenan tersebut mampu mempertahankan kekontinuan suatu fungsi . dengan kata lain barisan fungsi yang konvergen seragam akan konvergen ke suatu fungsi kontinu. Hal tersebut dapat dilihat pada teorema berikut Teorema 4.1 Misalkan $f_t? n_t?$ konvergen seragam ke $f_t?$ pada suatu interval $[a_t?, b_t?]$. Jika $f_t? n_t?$ kontinu di $[a_t?, b_t?]$ untuk tiap $n_t? \in N_t?$, maka $f_t?$ juga kontinu di $[a_t?, b_t?]$. Bukti: Ambil $\epsilon_t? > 0$ terdapat $N_t? \in \mathbb{N}$ sedemikian

hingga untuk $nt \geq Nt$ berlaku $|ft(nt)(xt) - ft(Nt)(xt)| < \varepsilon t$. $\exists xt \in [at, bt]$ • Wahidah Alwi; Ishak R Misalkan $ft(Nt)(xt)$ kontinu maka $ft(Nt)(xt)$ juga kontinu seragam. Maka untuk setiap $\varepsilon t > 0$ terdapat $\delta t > 0$ sehingga untuk setiap $xt, yt \in [at, bt]$ dengan $|xt - yt| < \delta t$ berlaku $|ft(Nt)(xt) - ft(Nt)(yt)| < \varepsilon t$. Sehingga diperoleh ketaksamaan berikut $3 |ft(nt)(xt) - ft(nt)(yt)| \leq |ft(nt)(xt) - ft(Nt)(xt)| + |ft(Nt)(xt) - ft(Nt)(yt)| + |ft(Nt)(yt) - ft(nt)(yt)| < \varepsilon t + \varepsilon t + \varepsilon t = 3\varepsilon t$. Ini membuktikan bahwa ft kontinu. Pernyataan ini cukup jelas menunjukkan bahwa kekonvergenan seragam hanya mampu mempertahankan kekontinuan fungsi. Dengankata lain, jika $ft(nt)$ tidak kontinu maka kekonvergenan seragam tidak mampu mengakibatkan $ft(nt)$ konvergen kefungsi kontinu. Oleh sebab itu, dibagian selanjutnya $ft(nt)$ akan dianggap fungsi kontinu pada interval kompak $[at, bt]$ yang mengimplikasikan bahwa $ft(nt)$ juga konvergen seragam. Sebab konvergen seragam mengimplikasikan konvergen ke fungsi kontinu, maka selanjutnya cukup ditulis konvergen. Sifat dasar barisan fungsi yang konvergen ke fungsi kontinu Syarat perlu dari suatu barisan yang onvergen kefungsi kontinu adalah ketunggalan nilai limit serta keterbatasan barisannya, sebagaimana terdapat pada teorema berikut.

Teorema 4.2 Jika barisan $ft(nt)$ konvergen ke ft , maka limit barisan ft tunggal. **Bukti:** Andaikan $ft(nt)$ konvergen ke ft dengan $ft \neq gt$. Maka untuk sebarang $\varepsilon t > 0$ terdapat Kt' sedemikian sehingga $|ft(nt) - gt| < 2\varepsilon t$ untuk setiap $nt \geq Kt'$ dan terdapat Kt'' sedemikian sehingga $|ft(nt) - gt| < \varepsilon t/2$ untuk setiap $nt \geq Kt''$. Dipilih $Kt = \max\{Kt', Kt''\}$, untuk $nt \geq Kt$ diperoleh $|ft - gt| = |ft - ft(n) + ft(n) - gt| = |ft(n) - gt| < \varepsilon t/2 + \varepsilon t/2 = \varepsilon t$. Karena berlaku untuk setiap $\varepsilon t > 0$, maka $ft - gt = 0$ yang berarti $ft = gt$.

Kontradiksi dengan pengandaian. Jadi, terbukti bahwa limitnya tunggal.

Contoh Tunjukkan kekonvergenan barisan $ft(nt)(xt) = xt$ untuk $xt \in [0, 1]$. xt $ft(nt)(xt) = xt$ nt konvergen seragam menuju $ft(xt) = 0$ pada $xt \in [0, 1]$ karena nilai $xt - 0 \leq 1$ nt $nt < \varepsilon t$, yang berarti jika diambil sebarang nilai $\varepsilon t > 0$ ada nilai $nt \geq Nt$ sedemikian sehingga $|xt - 0| < \varepsilon t$ berlaku untuk semua $xt \in [0, 1]$. nt Barisan $ft(nt)$

merupakan barisan fungsi kontinu yang sebagaimana terlihat bahwa $ft(nt)$ konvergen seragam ke $ft = 0$. Berdasarkan sifat limit barisan, cukup jelas bahwa ft merupakan fungsi kontinu. Suatu himpunan tak kosong It dikatakan terbatas keatas jika terdapat mt sedemikian sehingga berlaku $It \leq mt$. It dikatakan terbatas kebawah jika terdapat nt sedemikian sehingga berlaku $It \geq nt$. Selanjutnya It dikatakan terbatas jika terbatas keatas dan terbatas kebawah. Berikut teorema kekonvergenan yang dipengaruhi oleh keterbatasan. **Teorema 4.3** Jika barisan $ft(nt)$ konvergen ke ft , maka $ft(nt)$ terbatas. **Bukti:** Diketahui $\{ft(nt)\}$ konvergen ke ft dan diambil $\varepsilon t > 0$, maka terdapat bilangan asli $Kt = Kt(\varepsilon t)$ sedemikian hingga berlaku $|ft(nt) - ft| < \varepsilon t$ untuk semua $nt \geq Kt$. Jika digunakan ketaksamaan segitiga dengan $nt \geq Kt$ maka didapat $|ft(nt)| = |ft(nt) - ft + ft| \leq |ft(nt) - ft| + |ft| < \varepsilon t + |ft|$. Jika dipilih $Mt = \sup \{|ft(1)|, |ft(2)|, \dots, |ft(Kt-1)|, \varepsilon t + |ft|\}$ Maka itu menyatakan bahwa $|ft(nt)| \leq Mt$ untuk semua $nt \in Nt$. Barisan Cauchy Barisan Cauchy merupakan suatu kriteria yang dapat digunakan untuk menunjukkan barisan fungsi konvergen. Kriteria yang digunakan adalah dengan memperhatikan nilai mutlak dari dua suku yang berdekatan.

Definisi 4.4 Barisan $ft(nt)$ dikatakan barisan Cauchy jika setiap $\varepsilon t > 0$ terdapat bilangan asli Nt sehingga untuk $nt, nt' \geq Nt$ berlaku $|ft(nt) - ft(nt')| < \varepsilon t$. Salah satu sifat dasar barisan konvergen juga berlaku dalam barisan Cauchy. Sifat itu ditunjukkan dalam teorema berikut. **Teorema 4.5** Barisan Cauchy adalah barisan terbatas **Bukti:** Misalkan $ft(nt)$ adalah barisan Cauchy dan diambil $\varepsilon t > 0$, maka terdapat bilangan asli $Kt = Kt(\varepsilon t)$ sedemikian hingga berlaku $|ft(nt) - ft(Kt)| < \varepsilon t$ untuk semua $nt \geq Kt$. Dengan ketaksamaan segitiga untuk $nt \geq Kt$ maka diperoleh $|ft(nt) - ft(Kt)| = |ft(nt) - ft(Kt) + ft(Kt) - ft(nt)| \leq |ft(nt) - ft(Kt)| + |ft(Kt) - ft(nt)| < \varepsilon t + |ft(Kt) - ft(nt)|$. Jika dipilih $Mt = \sup \{|ft(1)|, |ft(2)|, \dots, |ft(Kt-1)|, \varepsilon t + |ft(Kt)|\}$

|} Maka terbukti bahwa $|f_{nt}| \leq M$ untuk semua $nt \in N$. Selanjutnya diperlihatkan bahwa kriteria Cauchy menjamin konvergennya barisan f_{nt} konvergen ke fungsi kontinu. Teorema 4.6 Barisan f_{nt} konvergen ke f jika dan hanya jika f_{nt} adalah barisan Cauchy. Bukti: Karena f_{nt} konvergen maka terdapat f sedemikian hingga untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $K \in \mathbb{N}$ sehingga untuk $nt \geq K$ berlaku $|f_{nt} - f| < \epsilon$. Berdasarkan ketaksamaan tersebut, untuk $2 nt, mt \geq K$ berlaku $|f_{nt} - f_{mt}| \leq |f_{nt} - f| + |f - f_{mt}| < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon$. Terbukti bahwa f_{nt} konvergen merupakan barisan Cauchy. Selanjutnya diperlihatkan bahwa f kontinu. Diketahui f_{nt} adalah barisan Cauchy yang berarti untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $N \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga untuk $nt, nt \geq N$ berlaku $|f_{nt}(x) - f_{nt}(x')| < \epsilon$ $x, x' \in [a, b]$. Hal ini mengindikasikan bahwa barisan $f_{nt}(x)$ dengan $x \in [a, b]$ merupakan barisan Cauchy di \mathbb{R} . Selanjutnya ini mengimplikasikan bahwa $f_{nt}(x)$ konvergen yang berarti untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $N \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga untuk $nt \geq N$ berlaku $|f_{nt}(x) - f(x)| < \epsilon$. Sehingga diperoleh ketaksamaan berikut $|f_{nt}(x) - f(x)| \leq |f_{nt}(x) - f_{nt}(x')| + |f_{nt}(x') - f(x)| < \epsilon + \epsilon + \epsilon = 3\epsilon$. Jadi terbukti bahwa f merupakan fungsi kontinu. Barisan fungsi monoton Barisan fungsi f_{nt} dikatakan monoton naik apabila $f_{nt} \leq f_{nt+1}$ dan f_{nt} monoton turun apabila $f_{nt} \geq f_{nt+1}$.

Teorema 4.7 (1). Jika barisan f naik monoton dan mempunyai supremum maka barisan f_{nt} konvergen ke supremumnya.

(2). Jika barisan f_{nt} turun monoton dan mempunyai infimum maka barisan f_{nt} konvergen ke infimumnya.

Bukti: (1) Misalkan $A = \{f_{nt}: nt \in N\}$ dan $s = \sup A$. Diambil $\epsilon > 0$, maka terdapat $K \in \mathbb{N}$ sedemikian hingga $s - \epsilon < f_K \leq s$. Karena $\{f_{nt}\}$ naik monoton, maka untuk $nt \geq K$ berlaku $s - \epsilon < f_{nt} \leq s + \epsilon$. Atau $s - \epsilon < f_{nt} < s + \epsilon$ $\Leftrightarrow |f_{nt} - s| < \epsilon$. Jadi, terbukti bahwa $\{f_{nt}\}$ konvergen ke $s = \sup \{f_{nt}: nt \in N\}$. Infimum dapat dibuktikan dengan cara yang sama. Teorema 4.8 Diberikan barisan $f_{nt}(x)$ terbatas. (1). Jika $f_{nt}(x)$ naik seragam maka $f_{nt}(x)$ memiliki supremum. Lebih jauh, barisan $f_{nt}(x)$ konvergen ke supremumnya. (2). Jika $f_{nt}(x)$ turun seragam maka $f_{nt}(x)$ memiliki infimum. Lebih jauh, barisan $f_{nt}(x)$ konvergen ke infimumnya.

Bukti: Diketahui f_{nt} terbatas dan naik seragam, maka untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $N_0 \in \mathbb{N}$ sehingga untuk setiap $nt \geq N_0$ berlaku $0 \leq f_{nt+1}(x) - f_{nt}(x) < \epsilon$ $x \in [a, b]$. Cukup jelas bahwa untuk setiap $x \in [a, b]$ barisan $f_{nt}(x)$ terbatas di \mathbb{R} . Sesuai dengan sifat kelengkapan, maka terdapat $f(x) = \sup f_{nt}(x)$ untuk setiap $x \in [a, b]$. Berdasarkan Teorema 4.7, cukup jelas bahwa $f_{nt}(x)$ konvergen ke supremumnya yaitu $f(x)$. Tapi akan dilanjutkan mengenai kekontinuan $f(x)$. Ambil $\epsilon > 0$ terdapat $N_1 \in \mathbb{N}$ sehingga untuk setiap $nt \geq N_1$ berlaku $|f_{nt}(x) - f_{nt+1}(x)| < \epsilon$. Ambil bilangan asli $N = \sup\{N_0, N_1\}$. 3. Andaikan f kontinu maka terdapat $\delta > 0$ sehingga untuk setiap $x, y \in [a, b]$ dengan $|x - y| < \delta$ berlaku $|f(x) - f(y)| < \epsilon$. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa 3 untuk $x, y \in [a, b]$ dengan $|x - y| < \delta$ berlaku $|f(x) - f(y)| \leq |f_{nt}(x) - f_{nt+1}(x)| + |f_{nt+1}(x) - f_{nt+2}(x)| + \dots + |f_{nt+1}(y) - f_{nt+2}(y)| < \epsilon + \epsilon + \dots + \epsilon = \epsilon$. Terbukti bahwa f kontinu. Infimum dapat dibuktikan dengan cara yang sama. Karakteristik barisan fungsi yang konvergen ke fungsi kontinu Pembuktian teorema konvergen seragam dan kekontinuan menunjukkan bahwa f_{nt} konvergen ke fungsi kontinu jika dan hanya jika f_{nt} merupakan barisan fungsi yang kontinu di $[a, b]$. Sehingga hal pertama yang perlu diperhatikan dalam menentukan kekonvergenan barisan fungsi kontinu adalah kekontinuan barisannya sendiri. Sifat-sifat barisan yang telah diuraikan sebelumnya mengindikasikan suatu

