

## Turnitin Originality Report

Processed on: 05-May-2023 20:39 WIB  
 ID: 2085080415  
 Word Count: 3900  
 Submitted: 1

11.\_14346-Article\_Text-49377-1-10-20201223.pdf By Anonymous

Similarity Index	Similarity by Source
16%	Internet Sources: 13% Publications: 5% Student Papers: 6%

4% match (Internet from 01-Nov-2022)

<https://Garuda.Kemdikbud.Go.Id/author/view/225283>

2% match (student papers from 17-Dec-2021)

Class: DOSEN

Assignment: Penelitian Pak Irwan

Paper ID: [1732583160](#)

1% match ()

[Alwi, Wahidah, Ishak, Ishak, Irwan, Muh.. "EKUIVALENSI KEKONVERGENAN POINTWISE DAN KEKONVERGENAN SERAGAM PADA BARISAN FUNGSI", "Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar", 2019](#)

1% match (Internet from 11-Apr-2021)

<https://sciencemathematicseducation.files.wordpress.com/2014/01/diktat-kuliah-s2-analisis-real.pdf>

1% match (Andrey Batukhtin, Irina Batukhtina, Maxim Bass, Sergey Batukhtin, Pavel Safronov, Marina Baranovskaya. "Solving a Sequence of Recurrence Relations for First-Order Differential Equations", EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2017)

[Andrey Batukhtin, Irina Batukhtina, Maxim Bass, Sergey Batukhtin, Pavel Safronov, Marina Baranovskaya. "Solving a Sequence of Recurrence Relations for First-Order Differential Equations", EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2017](#)

1% match (student papers from 12-Apr-2023)

[Submitted to Hellenic Open University on 2023-04-12](#)

1% match (Jie Wu, Decao Yin, Halvor Lie, Carl M. Larsen, Rolf Baarholm, Stergios Liapis. "ON THE SIGNIFICANCE OF THE HIGHER ORDER STRESS IN RISER VIV RESPONSES", Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, 2018)

[Jie Wu, Decao Yin, Halvor Lie, Carl M. Larsen, Rolf Baarholm, Stergios Liapis. "ON THE SIGNIFICANCE OF THE HIGHER ORDER STRESS IN RISER VIV RESPONSES", Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, 2018](#)

1% match (Internet from 09-Aug-2022)

<https://www.aiou.edu.pk/SoftBooks/6449.pdf>

< 1% match (student papers from 17-Sep-2018)

[Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-09-17](#)

< 1% match (Internet from 25-Apr-2023)

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/msa/article/download/JMSA.VOL8N1056/pdf/>

< 1% match (student papers from 09-Dec-2020)

[Submitted to Hellenic Open University on 2020-12-09](#)

< 1% match (Internet from 17-Mar-2021)

[https://dms.uni-landau.de/roth/lehre/skripte/did\\_algebra/did\\_algebra\\_2\\_terme.pdf](https://dms.uni-landau.de/roth/lehre/skripte/did_algebra/did_algebra_2_terme.pdf)

< 1% match (student papers from 21-Mar-2019)

[Submitted to Seoul National University on 2019-03-21](#)

< 1% match (student papers from 05-Sep-2019)

[Submitted to University of Glamorgan on 2019-09-05](#)

< 1% match (student papers from 01-Feb-2019)

[Submitted to University of Newcastle upon Tyne on 2019-02-01](#)

< 1% match (student papers from 11-Jul-2021)

[Submitted to University of Newcastle on 2021-07-11](#)

< 1% match (Internet from 10-Apr-2020)

<https://pt.scribd.com/document/293710240/fungsi-sederhana1>

< 1% match (student papers from 30-Oct-2022)

[Submitted to Flinders University on 2022-10-30](#)

< 1% match (student papers from 12-Mar-2021)

[Submitted to Wuhan Britain-China School on 2021-03-12](#)

< 1% match (Siyang Wang, Alvin Lebeck, Chris Dwyer. "Nanoscale Resonance Energy Transfer-based Devices for Probabilistic Computing", IEEE Micro, 2015)

[Siyang Wang, Alvin Lebeck, Chris Dwyer. "Nanoscale Resonance Energy Transfer-based Devices for Probabilistic Computing", IEEE Micro, 2015](#)

< 1% match (Alix Dupont, Yezekael Hayel, Tania Jiménez, Olivier Beaudé, Cheng Wan. "Chapter 20 Coupled Queueing and Charging Game Model with Energy Capacity Optimization", Springer Science and Business Media LLC, 2021)

[Alix Dupont, Yezekael Hayel, Tania Jiménez, Olivier Beaudé, Cheng Wan. "Chapter 20 Coupled Queueing and Charging Game Model with Energy Capacity Optimization", Springer Science and Business Media LLC, 2021](#)

< 1% match (Internet from 15-Jul-2021)
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/mathunesa/article/download/37541/34199

< 1% match (Internet from 19-Aug-2022)
https://www.researchgate.net/publication/330448176\_ANALISIS\_KLASTER\_UNTUK\_PENGELOMPOKKAN\_KABUPATENKOTA\_DI\_PROVINSI...

< 1% match (Internet from 10-Dec-2020)
http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/13082/Karakitsos\_17030.pdf?isAllowed=y&sequence=1

Analisis Prinsip Ketiga Littlewood dalam Teori Fungsi Variabel Ril Wahidah Alwi Program Studi Matematika, Wahidah.alwi@uin-alauddin.ac.id Ishak Mahasiswa Program Studi Matematika, ishakr97@gmail.com ABSTRAK, Penelitian ini membahas tentang prinsip ketiga dari tiga prinsip littlewood dalam teori fungsi variabel ril yaitu hampir setiap barisan fungsi terukur yang konvergen adalah konvergen seragam. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip tersebut dengan mengkaji kekonvergenan barisan fungsi terukur. pembahasan dalam tulisan ini berisi kekonntinuan dalam fungsi terukur dan kekonvergenan barisan fungsi terukur serta kaitannya dengan kekonvergenan seragam. Lebih jauh dalam tulisan ini akan ditunjukkan suatu sifat yang menyatakan terdapatnya kekonvergenan seragam dalam barisan fungsi terukur konvergen. Kata Kunci: barisan konvergen, fungsi kontinu, fungsi terukur 1. PENDAHULUAN Tiga prinsip Littlewood banyak dijelaskan dalam literatur yang membahas tentang teori fungsi variabel ril. prinsip ketiga littlewood menyatakan bahwa hampir setiap barisan fungsi terukur yang konvergen adalah konvergen seragam. Selanjutnya untuk fungsi terukur memiliki beberapa sifat, salah satunya adalah kekontinuan fungsi. Fungsi fi? dikatakan terukur apabila fi? terdefinisi dengan daerah asal terukur. Fungsi terukur dapat dilihat pada berbagai fungsi yang tidak asing seperti fungsi tangga dan fungsi kontinu dengan daerah asal terukur Kekontinuan suatu fungsi secara umum diilustrasikan dengan fungsi yang grafiknya tidak terputus disuatu titik dalam interval yang diberikan. Misalkan fi? terdefinisi pada [ai?, bi?], fi? dikatakan kontinu pada [ai?, bi?] jika fi? kontinu disetiap titik pada interval [ai?, bi?]. Sebagai hal yang cukup mendasar dalam bidang matematika, penelitian mengenai fungsi tidak hanya terbatas dalam dalam ruang yang sempit akan tetapi dikaji hingga konvergensi barisannya ketika menuju tak hingga. Salah satu kekonvergenan dalam barisan fungsi adalah kekonvergenan seragam. Kekonvergenan ini memiliki kemampuan untuk mempertahankan kekontinuan fungsi. Kekonvergenan seragam menunjukkan bahwa barisan fungsi kontinu yang konvergen akan konvergen kesuatu fungsi yang kontinu. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, tulisan ini bertujuan membahas mengenai kekonvergenan seragam dari barisan fungsi terukur guna menganalisis prinsip ketiga Littlewood dalam teori fungsi variable ril. 2. TINJAUAN PUSTAKA Fungsi terukur Secara umum suatu fungsi dikatakan terukur dengan melihat daerah asal fungsi tersebut yang terukur. Namun ketika diperhatikan lebih jauh terdapat kondisi yang harus dipenuhi agar suatu fungsi dikatakan terukur. Definisi 1: Misalkan (Xi?, Wi?) adalah ruang terukur dan misalkan Di? ∈ Wi?. Fungsi fi? bernilai ril diperluas yang terdefinisi pada Di? dikatakan terukur Wi? pada Di? jika memenuhi kondisi {xi? ∈ Di?: fi?(xi?) ≤ ai?} ∈ Wi? yang berarti fi?-1([-∞, ai?]) ∈ Wi? untuk setiap ai? ∈ R. Selanjutnya, jika (Xi?, Wi?) = (R, Wi? Li?), Di? ∈ Wi?Li? dan fi? terukur Wi?Li? pada Di? maka fi? dikatakan terukur Lebesgue. Proposisi 2: Andaikan fi? fungsi ril dengan daerah asal himpunan terukur, maka keempat pernyataan berikut ekuivalen. a. ∀ai? ∈ R, {xi?|fi?(xi?) > ai?} himpunan terukur b. ∀ai? ∈ R, {xi?|fi?(xi?) ≥ ai?} himpunan terukur c. ∀ai? ∈ R, {xi?|fi?(xi?) < ai?} himpunan terukur d. ∀ai? ∈ R, {xi?|fi?(xi?) ≤ ai?} himpunan terukur Akibat keempat pernyataan diatas yaitu e. ∀ai? ∈ R, {xi?|fi?(xi?) = ai?} himpunan terukur Operasi dalam fungsi terukur hampir sama dengan operasi fungsi pada umumnya. Misalkan ci? ∈ R, kemudian fi? dan gi? terdefinisi pada domain terukur, maka ci?ci?, fi? + gi?, fi?gi?, gi? fi? merupakan fungsi terukur. Kekontinuan Dalam Fungsi Terukur Suatu fungsi yang terukur dalam penjelasan sebelumnya dapat diketahui dengan melihat daerah asalnya. Jika daerah asal fungsi tersebut terukur maka fungsi tersebut terukur. Pernyataan ini juga berlaku pada fungsi terukur kontinu sebagai berikut. Teorema 3: Fungsi kontinu yang didefinisikan pada himpunan terukur adalah fungsi terukur. Bukti: Misalkan fi?: Di? → R dimana Di? merupakan himpunan terukur dan fi? kontinu. Karena Di? terukur, maka Di?fi? = Di? terukur. Ambil sebarang ai? ∈ R sehingga {xi?: fi?(xi?) > ai?} = {xi?: fi?(xi?) ∈ (ai?, ∞)} = fi?-1((ai?, ∞)) ⊆ Di? Interval (ai?, ∞) merupakan himpunan buka di R, dan juga diketahui bahwa fi?-1((ai?, ∞)) merupakan himpunan buka di Di?. Karena fi?-1((ai?, ∞)) = ∪(ai?ki?, bi?ki?) ki? dan setiap interval merupakan himpunan terukur maka {xi?: fi?(xi?) > ai?} terukur. Selanjutnya, kekontinuan dalam himpunan tertutup di R juga memiliki sifat yang hampir sama dengan kekontinuan dalam fungsi terukur secara umum. Hal ini dapat dilihat pada proposisi berikut. Proposisi 4: Misalkan Fi? adalah himpunan tertutup di R. Jika fi? adalah fungsi bernilai ril pada Ei?, maka fi? memiliki perluasan kontinu ke Ri, ini berarti terdapat fungsi kontinu bernilai ril gi? pada R sedemikian sehingga gi? = fi? pada R. Bukti: Misalkan Gi? = Fi?ci?. Kemudian Gi? adalah himpunan buka di R sehingga Gi? = ∪ki? ∈ N Ii?ki? dimana (Ii?ki?: ki? ∈ N) adalah koleksi terhingga dari interval buka saling asing di R. Misalkan Ii?ki? = (ai?ki?, bi?ki?) untuk ki? ∈ N. Misalkan didefinisikan fungsi bernilai ril gi? pada R dengan gi? = fi? pada Fi? dan gi?(xi?) = fi?(bi?ki?) - fi?(ai?ki?) bi?ki? - ai?ki? (xi? - ai?ki?) + fi?(ai?ki?) ui?ui?ui?ui?ui? xi? ∈ [ai?ki?, bi?ki?] ui?ui?ui?ui?ui? ki? ∈ N Ini berarti gi? linear pada interval tutup [ai?ki?, bi?ki?] ⊃ Ii?ki?. Perlu dicatat bahwa ai?ki? dan bi?ki? di Fi?, sehingga fi?(ai?ki?) dan fi?(bi?ki?) terdefinisi dan gi?(ai?ki?) = fi?(ai?ki?) dan gi?(bi?ki?) = fi?(bi?ki?). Misal ditunjukkan bahwa gi? kontinu di setiap xi?0 ∈ R. Sekarang Gi? ∩ Fi? = ∅ dan Gi? ∪ Fi? = R dan setiap xi?0 ∈ R adalah salah satu di Gi? atau di Fi?. Selanjutnya, pembahasan mengenai kekontinuan dalam ruang terukur juga dapat dilihat pada teorema berikut. Teorema 5 (Lusin): Misalkan fi? suatu fungsi terukur Wi?Li? bernilai ril diperluas pada R yang bernilai ril di mana-mana pada R. Maka untuk setiap εi? > 0 terdapat himpunan buka Gi? di R dengan mi?Li?(Gi?) < εi? dan fungsi bernilai ril kontinu pada gi? R sedemikian sehingga gi? = fi? pada R\Gi?. Bukti: Ambil εi? > 0, untuk setiap ni? ∈ N terdapat subset Ei?ni? dari R terukur Wi?Li? dengan mi?Li?(Ei?ni?) < 2εi? 21ni? dan fungsi bernilai ril fi?ni? pada R sedemikian sehingga |fi?ni? - fi?| < εi? 221ni? pada R\Ei?ni?. Misalkan Ei? = ∪ni? ∈ N Ei?ni? maka dipunyai ni? ∈ N, |fi?ni? - fi?| < εi? 221ni? pada R\Ei? untuk setiap Ini menunjukkan bahwa barisan (fi?ni?: ni? ∈ N) dari fungsi kontinu konvergen seragam ke fi? pada R\Ei?. Kekontinuan dari fi? ni? dan kekonvergenan seragam fi?ni? ke fi? pada R\Ei? mengimplikasikan bahwa fi? kontinu pada R\Ei?. Sekarang mi?Li?(Ei?) = mi?Li? ?? Ei?ni??? = ? mi?Li?(Ei?ni?) ni? ∈ N ni? ∈ N εi? 1 εi? < ? 2 ni? = 2 ni? ∈ N Berdasarkan ukuran luar, terdapat himpunan buka Gi? di R sedemikian sehingga Gi? ⊆ Ei? dan mi?Li?(Gi?) < mi?Li?(Ei?) + εi? 2 < εi?. Telah diketahui bahwa fi? kontinu pada R\Ei?, berarti kontinu pada himpunan tertutup R\Gi? maka terdapat fungsi kontinu bernilai ril gi? pada R sedemikian sehingga gi? = fi? pada R\Gi?. Barisan fungsi terukur dan kekonvergenan dalam ukuran Barisan fungsi terukur merupakan suatu barisan dimana elemen-elemennya merupakan fungsi terukur. Sifat-sifat barisan fungsi terukur meliputi limit dan supremum dari barisan merupakan fungsi terukur. Lebih jelasnya ditunjukkan oleh teorema berikut. Teorema 8[1] Misalkan (fi?ni?) barisan fungsi terukur, maka sup {fi?1, fi?2, fi?3, ..., fi?ni?}, inf {fi?1, fi?2, fi?3, ..., fi?ni?}, sup {fi?ni?}, inf {fi?ni?}, li?li?li?{fi?ni?}, dan li?li?li?{fi?ni?} adalah fungsi-fungsi terukur. Bukti: Misalkan h terdefinisi dengan h(xi?) = sup {fi?1(xi?), ..., fi?ni?(xi?)}, maka ni? {xi?: fi?(xi?) > ai?} = ∪xi?i: fi?ii?(xi?) > ai?} ii?=1 Oleh karena itu ukuran dari fi?ii? mengimplikasikan pada h. Serupa dengan sebelumnya, jika gi? terdefinisi dengan gi?(xi?) = si?si?si? fi?ni?(xi?), maka ∞ {xi?: gi?(xi?) > ai?} = ∪xi?i: fi?ni?(xi?) > ai?} ii?=1 Sehingga gi? terukur. Argumen serupa juga berlaku pada pernyataan mengenai infimum. Menurut pernyataan li?li?li? fi?ni? = ii?ii?ni?ii? ki?si?si?si?ni? fi?ki? diketahui bahwa li?li?li? fi?ni? terukur. Pembuktian untuk li?li? li? fi?ni? serupa. Kekonvergenan dalam ruang terukur dapat dinyatakan bahwa limitnya ketika ni? mendekati tak hingga dalam ukuran bernilai 0, yang didefinisikan sebagai berikut. Definisi 9: Diberikan ruang terukur (Xi?, Wi?, mi?). Misalkan (fi?ni?: ni? ∈ N) adalah barisan fungsi terukur- Wi? bernilai ril diperluas monoton pada himpunan Di? ∈ Wi?. (fi?ni?: ni? ∈ N) dikatakan konvergen dalam ukuran mi? pada Di? jika terdapat fungsi terukur- Wi? bernilai ril diperluas fi? pada Di? sedemikian hingga untuk setiap εi? > 0 berlaku ni?li-→m∞ mi?{Di?: |fi?ni? - fi?| ≥ εi?} = 0 Ini berarti untuk setiap εi? > 0 dan ni? > 0 terdapat Ni?ei?, ni? ∈ N sedemikian hingga mi?{Di?: |fi?ni? - fi?| ≥ εi?} < ni? ui?ui?ui?ui?ui? ni? < Ni?ei?, ni? Kekonvergenan ini dapat ditulis fi?ni? → fi? pada Di?. mi? Proposisi 10: Diberikan ruang terukur (Xi?, Wi?, mi?). Misalkan (fi?ni?: ni? ∈ N) adalah barisan fungsi terukur- Wi? bernilai ril diperluas monoton pada himpunan Di? ∈ Wi? dan misalkan fi? adalah fungsi terukur- Wi? bernilai ril pada Di?. Maka fi?ni? → fi? pada mi? Di? jika dan hanya jika untuk setiap δi? > 0

terdapat  $Ni?di? \in \mathbb{N}$  sedemikian hingga  $\mu_i? \{Di?: |fi?ni? - fi?| \geq \delta i?\} < \delta i? \text{ ui?ui?ui?ui?ui? ni?} \geq Ni?di?$  (3) Bukti: Misalkan ditunjukkan bahwa (3) ekuivalen pada pernyataan (2) pada definisi 9 dan (2) berimplikasi pada (3). Kemudian (3) berimplikasi pada (2) ditunjukkan dengan memisalkan  $ei? > 0$  dan  $\eta i? > 0$  dan misalkan  $\delta i? = ei? < \eta i?$ . Dengan pernyataan (3) terdapat  $Ni?di? \in \mathbb{N}$  sedemikian sehingga  $\mu_i? \{Di?: |fi?ni? - fi?| \geq \delta i?\} < \delta i? \text{ ui?ui?ui?ui?ui? ni?} \geq Ni?di?$ . Sekarang untuk  $ei? \geq \delta i?$  berimplikasi  $\{Di?: |fi?ni? - fi?| \geq ei?\} \subset \{Di?: |fi?ni? - fi?| \geq \delta i?\}$  dan dipunyai  $\mu_i? \{Di?: |fi?ni? - fi?| \geq ei?\} \leq \mu_i? \{Di?: |fi?ni? - fi?| \geq \delta i?\} < \delta i? \leq \eta i? \text{ ui?ui?ui?ui?ui? ni?} \geq Ni?di?$  Ini menunjukkan bahwa (3) berimplikasi pada (2). Akibat 11: Diberikan ruang terukur  $(X i?, \mathcal{X} i?, \mu i?)$ . Misalkan  $(fi?ni?): ni? \in \mathbb{N}$  adalah barisan fungsi terukur-  $\mathcal{X} i?$  bernilai ril diperluas monoton pada himpunan  $Di? \in \mathcal{X} i?$  dan misalkan  $fi?$  adalah fungsi terukur-  $\mathcal{X} i?$  bernilai ril pada  $Di?$ . Terdapat dua barisan bilangan positif  $(\alpha i?ni?): ni? \in \mathbb{N}$  dan  $(\beta i?ni?): ni? \in \mathbb{N}$  sedemikian hingga (1)  $ni?li \rightarrow \infty \alpha i?ni? = 0$  dan  $ni?li \rightarrow \infty \beta i?ni? = 0$  (2)  $\mu_i? \{Di?: |fi?ni? - fi?| \geq \alpha i?ni?\} < \beta i?ni?$  untuk setiap  $ni? \in \mathbb{N}$  Maka  $(fi?ni?): ni? \in \mathbb{N}$  konvergen ke  $fi?$  di  $Di?$  dalam ukuran  $\mu_i?$ . Bukti: Diberikan sebarang  $ei? > 0$  misalkan  $Ni? \in \mathbb{N}$  bernilai besar sehingga untuk setiap  $ni? > Ni?$  dipunyai  $\alpha i?ni? < ei?$  dan  $\beta i?ni? < ei?$ . Maka  $\mu_i? \{Di?: |fi?ni? - fi?| \geq ei?\} \subset \mu_i? \{Di?: |fi?ni? - fi?| \geq \alpha i?ni?\} \cup \mu_i? \{Di?: |fi?ni? - fi?| \geq \beta i?ni?\} < ei?$  untuk  $ni? > Ni?$ . Ini menunjukkan bahwa  $(fi?ni?): ni? \in \mathbb{N}$  konvergen ke  $fi?$  pada  $Di?$  dalam ukuran  $\mu_i?$  sesuai dengan proposisi 10 Lemma12: Diberikan ruang terukur  $(X i?, \mathcal{X} i?, \mu i?)$ . Misalkan  $fi?$  dan  $gi?$  adalah dua fungsi terukur-  $\mathcal{X} i?$  bernilai ril pada himpunan  $Di? \in \mathcal{X} i?$ . Misalkan  $ei?, ei?1$ , dan  $ei?2$  adalah bilangan positif sedemikian hingga  $ei? = ei?1 + ei?2$ . Maka untuk suatu fungsi  $h$  terukur-  $\mathcal{X} i?$  bernilai ril diperluas pada  $Di?$ , berlaku  $\{Di?: |fi? - gi?| \geq ei?\} \subset \{Di?: |fi? - h| \geq ei?1\} \cup \{Di?: |h - gi?| \geq ei?2\}$ , (1) Dan  $\mu_i? \{Di?: |fi? - gi?| \geq ei?\} \leq \mu_i? \{Di?: |fi? - h| \geq ei?1\} + \mu_i? \{Di?: |h - gi?| \geq ei?2\}$ . (2) Bukti: Misalkan tiga himpunan di (1) dapat ditulis dengan  $Ai?, Ai?1$ , dan  $Ai?2$ . Jika  $xi? \in Di?$  dan  $xi? \notin Ai?1 \cup Ai?2$ , maka  $xi? \notin Ai?1$  dan  $xi? \notin Ai?2$  sehingga  $|fi?(xi?) - h(xi?)| < ei?1$  dan  $|h(xi?) - gi?(xi?)| < ei?2$  maka  $|fi?(xi?) - gi?(xi?)| \leq |fi?(xi?) - h(xi?)| + |h(xi?) - gi?(xi?)| < ei?1 + ei?2 = ei?$  Sehingga  $xi? \notin Ai?$ . Jika  $xi? \in Ai?$  maka  $xi? \in Ai?1 \cup Ai?2$  maka  $xi? \in Ai?1$  atau  $xi? \in Ai?2$  sehingga  $Ai?1 \cup Ai?2 \subset Ai?$  sehingga  $Ai?1 \cup Ai?2 \supset Ai?$ . Ini membuktikan pernyataan (1). Maka pernyataan (2) dibuktikan dengan mengikuti pernyataan (1) dengan kemonotonan dan subaditifitas dari  $\mu_i?$ . Teorema 13 (H. Lebesgue): Diberikan ruang terukur  $(X i?, \mathcal{X} i?, \mu i?)$ . Misalkan  $(fi?ni?): ni? \in \mathbb{N}$  adalah barisan fungsi terukur-  $\mathcal{X} i?$  bernilai ril diperluas pada himpunan  $Di? \in \mathcal{X} i?$  dan misalkan  $fi?$  adalah fungsi terukur-  $\mathcal{X} i?$  bernilai ril pada  $Di?$ . Beraku (1)  $(fi?ni?): ni? \in \mathbb{N}$  konvergen ke  $fi?$  diman-mana pada himpunan  $Di?$ , (2)  $\mu_i? \{Di?\} < \infty$  Maka  $(fi?ni?): ni? \in \mathbb{N}$  konvergen ke  $fi?$  dalam ukuran  $\mu_i?$  pada himpunan  $Di?$ . Bukti: Dalam ruang terukur  $(X i?, \mathcal{X} i?, \mu i?)$ , diketahui bahwa fungsi terukur-  $\mathcal{X} i?$  bernilai ril diperluas pada himpunan  $Di? \in \mathcal{X} i?$  konvergen ke  $fi?$  dimana-mana pada  $Di?$  dan  $\mu_i?(Di?) < \infty$  yang berimplikasi bahwa untuk setiap  $mi? \in \mathbb{N}$  dipunyai lim  $\mu_i? \{Di?: |fi?ni? - fi?| \geq 1/mi?\} = 0$ . Sehingga ini  $ni? \rightarrow \infty mi?$  menunjukkan kekonvergenan  $(fi?ni?): ni? \in \mathbb{N}$  ke  $fi?$  pada ukuran. Barisan Cauchy dalam Kekonvergenan terukur Barisan Cauchy merupakan barisan yang kekonvergenannya ditinjau dari selisih antar suku barisan. Dibagian ini akan dijelaskan barisan Cauchy dan kekonvergenannya dalam ruang ukuran. Definisi 14: Diberikan ruang terukur  $(X i?, \mathcal{X} i?, \mu i?)$ . Misalkan  $(fi?ni?): ni? \in \mathbb{N}$  adalah barisan fungsi terukur-  $\mathcal{X} i?$  bernilai ril pada himpunan  $Di? \in \mathcal{X} i?$ . Dapat dikatakan barisan adalah barisan Cauchy yang konvergen dalam ukuran  $\mu_i?$  pada  $Di?$  jika untuk setiap  $ei? > 0$  dan  $\eta i? > 0$  terdapat  $Ni?ei?, \eta i? \in \mathbb{N}$  sedemikian hingga  $\mu_i? \{xi? \in Di?: |fi?ni?(xi?) - fi?ni?(xi?)| \geq ei?\} < \eta i?$  untuk  $mi?, ni? \geq Ni?ei?, \eta i?$ . Atau ekuivalen dengan untuk setiap  $\delta i? > 0$  terdapat  $Ni?di? \in \mathbb{N}$  sedemikian hingga  $\mu_i? \{xi? \in Di?: |fi?ni?(xi?) - fi?ni?(xi?)| \geq \delta i?\} < \delta i?$  untuk  $mi?, ni? \geq Ni?$   $ei?, \eta i?$ . Observasi 15: Jika  $(fi?ni?): ni? \in \mathbb{N}$  adalah barisan fungsi terukur-  $\mathcal{X} i?$  bernilai ril dan jika  $fi?ni? \rightarrow fi?$  pada  $Di?$ ,  $\mu_i?$  maka  $(fi?ni?): ni? \in \mathbb{N}$  adalah barisan Cauchy yang konvergen dalam ukuran  $\mu_i?$  pada  $Di?$ . Bukti: Jika  $fi?ni? \rightarrow fi?$  pada  $Di?$ , maka untuk setiap  $ei? > 0$  terdapat  $Ni?ei? > 0$  sedemikian sehingga  $\mu_i? \{Di?: |fi?ni? - fi?ni?| \geq ei?\} \leq \mu_i? \{Di?: |fi?ni? - fi?| \geq ei?/2\} + \mu_i? \{Di?: |fi?ni? - fi?| \geq ei?/2\} < 2ei? + ei?/2 = ei?$  untuk  $mi?, ni? \geq Ni?ei?$ . Ini menunjukkan bahwa  $(fi?ni?): ni? \in \mathbb{N}$  adalah barisan Cauchy yang konvergen dalam ukuran  $\mu_i?$  pada  $Di?$ . Tiga prinsip Littlewood Dalam teori fungsi variabel ril, J.E. Littlewood menyatakan tiga prinsip yang lazim digunakan, yaitu: a. [Hampir setiap himpunan terukur merupakan gabungan berhingga selang-selang](#). b. [Hampir setiap fungsi terukur merupakan fungsi kontinu](#). c. [Hampir setiap barisan fungsi \(terukur\) yang konvergen adalah konvergen seragam](#). 3. METODOLOGI Penelitian ini merupakan kajian teori mengenai kekonvergenan barisan fungsi terukur, dimana akan dibuktikan bahwa [fungsi terukur yang konvergen adalah konvergen seragam](#) sesuai dengan prinsip ketiga Littlewood. Prosedur dari penelitian ini yaitu: pertama, menganalisis sifat fungsi terukur khususnya dalam kekontinuan fungsi. Selanjutnya, menganalisis kekonvergenan barisan fungsi terukur berdasarkan sifat kontinu yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir adalah membuktikan bahwa [hampir setiap barisan fungsi terukur yang konvergen adalah konvergen seragam](#). 4. PEMBAHASAN Kekontinuan dalam fungsi terukur dapat ditunjukkan pada terema berikut. Teorema 17 (Borel): Misalkan  $fi?$  adalah fungsi terukur  $\mathcal{X} i?$  bernilai ril diperluas pada  $R$  yang bernilai ril pada  $R$ . Kemudian untuk setiap  $ei? > 0$  terdapat  $Ei?$  subset terukur  $\mathcal{X} i?$  dari  $R$  dengan  $\mu_i?(Ei?) < \infty$  dan fungsi bernilai ril kontinu  $gi?$  pada  $R$  sedemikian hingga  $|fi? - gi?| < ei?$  pada  $R \setminus Ei?$ . Sehingga jika  $Mi?1 \leq fi? \leq Mi?2$  pada  $R$  untuk  $Mi?1, Mi?2 \in R$  sedemikian hingga  $Mi?1 < Mi?2$ , maka  $gi?$  dapat dipilih bahwa  $Mi?1 \leq gi? \leq Mi?2$  pada  $R$ . Bukti: Diberikan  $ei? > 0$  terdapat subset terukur  $\mathcal{X} i?$  dari  $R$  dengan  $\mu_i?(Ei?) < 2ei?$  dan fungsi tangga kontinu kanan  $si?$  pada  $R$  sedemikian sehingga  $|fi? - si?| < ei?$  pada  $R \setminus Ei?0$ . Diberikan  $si?$  dengan  $si? = \sum_{ci? \in \mathbb{Z}} ci?ni?$ .  $li?ni?, ci?ni? \in R$  untuk  $ni? \in \mathbb{Z}$  dan  $\{li?ni?: ni? \in \mathbb{Z}\}$  adalah koleksi saling asing dari interval terhingga dari kelas  $ci?ni?0$  dengan  $Uni?ni? \cap li?ni? = R$ . Bilangan interval  $li?ni?$  lebih jauh bahwa  $li?ni?$  pada sisi kiri dari  $li?ni?+1$  pada garis bilangan  $R$  untuk setiap  $ni? \in \mathbb{Z}$ . Ini dapat terjadi dengan melihat bahwa titik akhir dari interval daerah asal fungsi tangga kontinu kanan di  $R$  tidak memiliki titik limit di  $R$ . Misalkan  $li?ni? = [ai?ni?, ai?ni?+1)$ ,  $ai?ni? < ai?ni?+1$  untuk  $ni? \in \mathbb{Z}$ . Himpunan  $\{ai?ni?: ni? \in \mathbb{Z}\}$  memuat semua titik diskontinu dari fungsi tangga  $si?$  di  $R$ . Sekarang untuk setiap  $ni? \in \mathbb{Z}$ ,  $ai?ni?$  adalah titik akhir kanan dari interval  $li?ni? - 1 = [ai?ni?, ai?ni?+1)$  dan titik akhir kiri dari interval  $li?ni? - 1 = [ai?ni?, ai?ni?+1)$ . Didefinisikan  $1$   $ei? \delta i?ni? = \min \{ 4/2ni? | 3, \ell(li?ni?+1), \ell(li?ni?) - 1 \}$   $ni? \in \mathbb{Z}$  \*  $= [ai?ni? + \delta i?ni?, ai?ni?+1 - \delta i?ni? - 1] \subset li?ni?$   $ji?ni? = [ai?ni? - \delta i?ni?, ai?ni? + \delta i?ni?]$  Maka  $R = \dots \cup ji?ni? - 1 \cup ji?ni? * - 1 \cup ji?ni? \cup ji?ni? * \cup ji?ni? + 1 \cup \dots$ , dimana  $ji?ni? - 1$  adalah disebelah kiri  $li?ni? - 1$ ,  $li?ni? - 1$  disebelah kiri  $li?ni?$ ,  $ji?ni?$  disebelah kiri  $li?ni?*$  dan seterusnya. Didefinisikan fungsi kontinu bernilai ril  $gi?$  pada  $R$  dengan  $gi? = si?$  pada  $li?ni?*$  dan memisalkan  $gi?$  linear pada  $ji?ni?*$  dengan asumsi nilai dari  $si?$  pada dua titik akhir  $li?ni?$  untuk setiap  $ni? \in \mathbb{Z}$ . sehingga untuk  $xi? \in li?ni?*$  didefinisikan  $gi?(xi?) = ci?ni?$  dan untuk  $xi? \in ji?ni?*$  didefinisikan  $gi?(xi?)$  dengan  $gi?(xi?) - ei?ni? - 1 - ci?ni? - ci?ni? - 1 - xi? - (ai?ni? - \delta i?ni?) (ai?ni? + \delta i?ni?) - (ai?ni? - \delta i?ni?) = ,$  Ini berarti,  $gi?(xi?) = ci?ni? - 2\delta i?ni? - 1 - xi? - (ai?ni? - \delta i?ni?) + ci?ni? - 1$ . Misalkan  $Ei? = Ei?0 \cup (Uni?ni? \cap li?ni?)$ . Maka  $Ei?$  merupakan subset terukur  $\mathcal{X} i?$  dari  $R$  dengan  $\mu_i?(Ei?) \leq \mu_i?(Ei?0) + ? \mu_i?(li?ni?) < ? + 2\delta i?ni? ei? 2 < ei? ni? \in \mathbb{Z} 1 1 ei? ni? \in \mathbb{Z} 2 + 2 ? 2ni? | 3 = ei?, ni? \in \mathbb{Z}$  Dan  $gi? = si?$  pada  $R \setminus Ei?$ . Maka  $|fi? - gi?| \leq |fi? - si?| + |si? - gi?| = |fi? - si?| < ei?$  pada  $R \setminus Ei?$ . Jika  $Mi?1 \leq fi? \leq Mi?2$  pada  $R$ , maka  $si?$  dapat dipilih sehingga  $Mi?1 \leq si? \leq Mi?2$  pada  $R$ . maka untuk definisi fungsi kontinu bernilai ril  $gi?$  diatas, diperoleh  $Mi?1 \leq fi? \leq Mi?2$  pada  $R$ . Menurut teorema tersebut, dapat diketahui bahwa  $fi?$  merupakan fungsi kontinu jika terdapat  $gi?$  sedemikian sehingga  $|fi? - gi?| < ei?$ . Seanjutnya, kekonvergenan dalam ruang terukur memiliki keunikan tersendiri. Khususnya fungsi suatu barisan akan konvergen yang termuat dalam teorema berikut. Teorema 18 (keunikan limit konvergen dalam ukuran): Diberikan ruang terukur  $(X i?, \mathcal{X} i?, \mu i?)$ . Misalkan  $(fi?ni?): ni? \in \mathbb{N}$  adalah fungsi terukur-  $\mathcal{X} i?$  bernilai ril diperluas pada himpunan  $Di? \in \mathcal{X} i?$  dan misalkan  $fi?$  dan  $gi?$  adalah dua fungsi terukur-  $\mathcal{X} i?$  bernilai ril pada himpunan  $Di?$ . Jika  $fi?ni? \rightarrow fi?$  pada  $Di?$   $\mu_i?$  dan  $fi?ni? \rightarrow gi?$  pada  $Di?$ , maka  $fi? = gi?$   $ei?, ei?$ . Bukti: Andaikan  $fi?ni? \rightarrow fi?$  pada  $Di?$  dan  $fi?ni? \rightarrow gi?$  pada  $Di?$   $\mu_i?$  juga. Maka untuk setiap  $ei? > 0$  dipunyai lim  $\mu_i? \{Di?: |fi?ni? - fi?| \geq ei?\} = 0$  (1)  $ni? \rightarrow \infty$  lim  $\mu_i? \{Di?: |fi?ni? - gi?| \geq ei?\} = 0$   $ni? \rightarrow \infty$  Untuk menunjukkan bahwa  $fi? = gi?$  pada  $Di?$ , diasumsikan suatu kontradiksi bahwa  $\mu_i? \{Di?: fi? \neq gi?\} > 0$ . Maka sejak  $fi?(xi?) \neq gi?(xi?)$  jika dan hanya jika  $|fi?(xi?) - gi?(xi?)| > 0$ , diperoleh  $\mu_i? \{Di?: |fi? - gi?| > 0\} > 0$  (2) Sekarang  $\{Di?: |fi? - gi?| > 0\} = Uki? \in \mathbb{N} \{Di?: |fi? - gi?| \geq 1/ki?\} \geq 1?$ , diperoleh  $ki? \mu_i? \{Di?: |fi? - gi?| > 0\} \geq \sum ki? \in \mathbb{N} \mu_i? \{Di?: |fi? - gi?| \geq 1/ki?\} \geq 1ki??$ , (3) Dengan (2), ruas kiri dari (3) adalah positif. Maka tidak semua penjumlahan diruas kanan sama dengan 0. Kemudian terdapat suatu  $ki?0 \in \mathbb{N}$  sedemikian sehingga  $\mu_i? \{Di?: |fi? - gi?| \geq 1/ki?0\} > 0$ . (4) Sehingga untuk setiap  $ni? \in \mathbb{N}$  diperoleh  $\mu_i? \{Di?: |fi? - gi?| \geq 1/ki?0\} \geq 1/ki?0 \mu_i? \{Di?: |fi? - fi?| \geq 2ki?0 1 ? + \mu_i? \{Di?: |fi?ni? - gi?| \geq 2ki?0 1 ?$ . Dengan memisalkan  $ni? \rightarrow \infty$  pada ruas kanan pertidaksamaan terakhir, diperoleh  $\mu_i? \{Di?: |fi? - gi?| \geq ?\} = 0$   $ki?0$  Sehingga kontradiksi dengan ketaksamaan (4) yang berarti kontradiksi dengan pengandaian. Kekonvergenan barisan dalam ruang terukur juga berkaitan dengan kekonvergenan seragam. Suatu barisan fungsi bernilai ril diperluas  $fi?ni?: ni? \in \mathbb{N}$  konvergen seragam pada himpunan  $Di?$  jika untuk setiap  $ei? > 0$  yang diberikan, terdapat  $Ni? \in \mathbb{N}$  yang bergantung pada  $ei?$  tetapi tidak pada  $xi? \in Di?$  sedemikian sehingga  $|fi?ni?(xi?) - fi?(xi?)| < ei?$  untuk setiap  $xi? \in Di?$  dimana  $ni? \geq Ni?$ , atau ekuivalen dengan untuk setiap  $mi? \in \mathbb{N}$  terdapat  $Ni? \in \mathbb{N}$  sedemikian sehingga  $|fi?ni?(xi?) - fi?$

$(x_i) < \frac{1}{n}$  untuk setiap  $x_i \in D_i$  dimana  $n \geq N$ . Salah satu kelebihan [dari kekonvergenan seragam](#) yaitu kemampuannya [mempertahankan kekontinuan](#) suatu [fungsi](#). Hal ini berarti jika [suatu barisan fungsi](#)  $f_i$  [konvergen seragam ke](#) fungsi  $f$ , [maka](#)  $f$  kontinu. Setelah pembahasan mengenai kekontinuan [dalam fungsi terukur dan kekonvergenan](#) dalam ruang [terukur serta](#) memperhatikan sifat dari [kekonvergenan seragam](#), ditunjukkan satu teorema kekonvergenan seragam yang berlaku dalam ruang terukur. Teorema 19: Misalkan untuk setiap  $\epsilon > 0$  terdapat  $E_\epsilon$  subset terukur  $\mathbb{R}^n$  dari  $\mathbb{R}$  dengan  $\mu(E_\epsilon) < \epsilon$ . Suatu barisan fungsi  $f_i$  yang konvergen ke  $f$  di  $E_\epsilon$  dikatakan konvergen seragam jika terdapat fungsi kontinu  $g_\epsilon$  sedemikian sehingga  $|f_i - g_\epsilon| < \epsilon$  yang setara dengan  $f_i = g_\epsilon$  dimana-mana. Bukti: Jika  $f_i$  konvergen ke  $f$  untuk  $x_i \in D_i$  maka berlaku  $|f_i - f| < \epsilon$ . Misalkan terdapat fungsi kontinu  $g_\epsilon$  sedemikian sehingga  $|f_i - g_\epsilon| < \epsilon$ . Menurut Teorema 17  $f_i$  merupakan fungsi terukur kontinu pada  $D_i$ . Karena untuk setiap  $\epsilon > 0$  berlaku  $|f_i - g_\epsilon| < \epsilon$  maka  $f_i - g_\epsilon = 0$ . Sehingga menurut Teorema 18  $f_i$  konvergen ke  $f$  ( $f_i \rightarrow f$ ) dan  $f_i$  konvergen ke ( $f_i \rightarrow g_\epsilon$ ). Ini  $\mu$  menyatakan bahwa  $f_i$  konvergen seragam ke  $f$  dimana  $f_i$  kontinu sesuai dengan sifat kekonvergenan seragam yang mempertahankan kekontinuan fungsi. Teorema 19 membuktikan secara parsial prinsip ketiga littlewood bahwa [hampir setiap barisan fungsi terukur konvergen adalah konvergen seragam](#). Dimana pada pernyataan tersebut ditunjukkan bahwa  $f_i$  konvergen ke fungsi kontinu yang bersesuaian dengan kemampuan [kekonvergenan seragam dalam mempertahankan kekontinuan fungsi](#). 5. KESIMPULAN Kesimpulan dari tulisan ini adalah suatu [barisan fungsi](#) terukur [dikatakan konvergen seragam](#) ketika barisannya konvergen [ke suatu fungsi](#) dimana fungsi tersebut kontinu. Hal ini diketahui dari sifat kekonvergenan seragam yang mempertahankan kekontinuan fungsi. [1] [2] [3] [4] 6. DAFTAR PUSTAKA Goldberg, Richard R. (1976). "Method of Ril Analysis". New York : John Wiley and Sons. Royden, H.L.(1989). "Ril Analysis 3rd". New York. Macmillan Publishing Company. Ubaidillah, Firdaus, Soeparna Darmawijaya dan Ch. Rini Indrati. (2013). "Kekonvergenan Barisan didalam Ruang Fungsi Kontinu C[a,b]". Jurnal CAUCHY, Vol. 2 No. 4, halaman 184- 188. Yeh, J..(2006). Riel Analysis: Theory of Measure and Integration 2nd. Singapore. World Scientific Publishing. 2 • Wahidah Alwi;Ishak [Analisis Prinsip Ketiga Littlewood Dalam Teori Fungsi Variabel](#) Real • 3 4 • [Wahidah Alwi;Ishak Analisis Prinsip Ketiga Littlewood Dalam Teori Fungsi Variabel](#) Real • 5 6 • [Wahidah Alwi;Ishak Analisis Prinsip Ketiga Littlewood Dalam Teori Fungsi Variabel](#) Real • 7 [Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol. 8 No. 2 Ed. Juli - Des. 2020 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol. 8 No. 2 Ed. Juli - Des. 2020 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol. 8 No. 2 Ed. Juli - Des. 2020 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol. 8 No. 2 Ed. Juli - Des. 2020 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol. 8 No. 2 Ed. Juli - Des. 2020 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol. 8 No. 2 Ed. Juli - Des. 2020 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol. 8 No. 2 Ed. Juli - Des. 2020](#)