

Turnitin Originality Report

Processed on: 05-May-2023 20:39 WIB
ID: 2085080424
Word Count: 2601
Submitted: 1

Similarity Index
23%

Similarity by Source
Internet Sources: 21%
Publications: 12%
Student Papers: 10%

12._17409-Article_Text-49382-1-10-20201223.pdf By Anonymous

3% match (Internet from 08-Mar-2016)

<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian/article/download/3671/3573>

3% match (Internet from 29-Jan-2021)

<http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/statistika/article/download/4135/pdf>

3% match (student papers from 22-Jan-2018)

[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-01-22](#)

2% match (Internet from 15-Aug-2019)

<https://www.scribd.com/document/388039118/aku>

1% match (Internet from 25-Nov-2021)

<http://repository.unp.ac.id/31043/>

1% match (Internet from 29-May-2021)

<http://jurnal.fmipa.unmul.ac.id/index.php/exponensial/article/download/66/36/>

1% match (Internet from 15-Apr-2014)

<http://www.readbag.com/dinkes-sulsel-go-id-pdf-profil-sulsel-08>

1% match (Internet from 23-Aug-2022)

<https://riniekafebriani.blogspot.com/2015/11/regresi-poisson.html>

1% match (Internet from 13-Sep-2020)

<https://riniekafebriani.blogspot.com/2015/11/>

1% match ()

[Ihsan, Hisyam, Sanusi, Wahidah, Ulfadhiyanti, Risna. "Model Generalized Poisson Regression \(GPR\) dan Penerapannya pada Angka Pengangguran bagi Penduduk Usia Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan", 'Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar', 2021](#)

1% match (Internet from 17-Aug-2015)

<http://es.slideshare.net/merlinda07/skripsi-penuh>

1% match (Internet from 14-Sep-2022)

<https://statistics.uji.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/Edy-Widodo-Laporan-Penelitian-Penerapan-Regresi-M-untuk-Pemodelan-Ketahanan-Pangan-Jawa-Tengah-Tahun-2014.pdf>

1% match (student papers from 26-Sep-2021)

Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan on 2021-09-26

1% match (student papers from 21-Jan-2023)

Submitted to Universitas Tidar on 2023-01-21

1% match (Internet from 28-Dec-2022)

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20228266-S209-Penaksiran+parameter.pdf>

1% match (Internet from 20-Jul-2021)

<https://repository.its.ac.id/2029/>

1% match (Internet from 23-Dec-2019)

<http://eprints.blog.undip.ac.id/2013/10/17/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-keputusan-pembelian-rumah-bersubsidi-menggunakan-analisis-regresi/>

1% match (Internet from 09-Aug-2019)

<https://pt.scribd.com/doc/268345146/ANALISIS-FAKTOR-FAKTOR-YANG-MEMPENGARUHI-PEMILIHAN-METODE-AKUNTANSI-KONSERVATIF>

1% match ()

Nadifah, Imroatun. "Aplikasi regresi logistik ordinal untuk menganalisa pengaruh pelayanan di fakultas sains dan teknologi terhadap kepuasan mahasiswa fakultas saintek UINSA Surabaya", 2020

1% match (Internet from 11-Nov-2020)

<http://eprints.undip.ac.id/view/type/article.default.html>

Pemodelan Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Selatan Menggunakan Regresi Binomial Negatif Adnan Sauddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, adnan.sauddin@uin-alauddin.ac.id Nur Indah Auliah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Wahidah Alwi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Wahidah.alwi@uin-alauddin.ac.id ABSTRAK, Kematian ibu merupakan indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat suatu daerah. Jumlah kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 terbilang masih cukup tinggi sebanyak 115 kasus. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis untuk mengetahui faktor apa yang signifikan berpengaruh terhadap jumlah kematian ibu. Dalam penelitian ini, jumlah kematian ibu dapat dimodelkan menggunakan analisis regresi poisson. Akan tetapi, pada model tersebut terjadi masalah overdispersi sehingga analisis dilanjutkan menggunakan analisis regresi binomial negatif sehingga diperoleh hasil dengan dua variabel yang signifikan berpengaruh terhadap jumlah kematian ibu yaitu variabel persalinan ditolong tenaga kesehatan (X_1 ?3) dan variabel ibu nifas mendapat vitamin A (X_2 ?9) dengan model regresi binomialnegatif (μ_i)= $\exp(10,374-0,301X_3+0,208X_9)$. Kata Kunci: Kematian ibu, overdispersi, regresi binomial negatif 1. PENDAHULUAN Kematian ibu merupakan salah satu faktor pendukung dalam menilai sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah salah satunya di bidang kesehatan. Salah satu provinsi dengan jumlah kematian ibu yang masih cukup tinggi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016 sebesar 153 orang_per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2017 jumlahnya sebesar 115 orang per 100.000 kelahiran hidup[1]. Kasus kematian ibu yang masih cukup tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa kualitas kesehatannya masih cukup rendah. Tingginya jumlah kematian ibu dapat dipengaruhi

oleh berbagai faktor di antaranya komplikasi kebidanan, proses persalinan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan, kurang memadainya pelayanan kesehatan ibu hamil maupun nifas. Menurunkan jumlah kasus kematian ibu dapat dilakukan dengan memahami dan mempelajari faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kematian pada ibu baik pada saat masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Penelitian terkait bidang kesehatan salah satunya kasus kematian dan faktor penyebabnya telah banyak dilakukan dengan menggunakan berbagai metode salah satunya yaitu analisis regresi poisson. Analisis regresi poisson merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel respon dan variabel penjelasan terkait dengan bidang kesehatan. Analisis regresi poisson memiliki asumsi variansi dan mean dari variabel respon harus sama. Akan tetapi, pada data count sering dijumpai kondisi dimana nilai variansi lebih besar dari nilai mean atau yang sering disebut dengan overdispersi. Oleh karena itu, analisis harus dilanjutkan salah satunya dengan menggunakan analisis regresi binomial negatif. Salah satu penelitian yang menggunakan analisis regresi binomial untuk mengatasi masalah overdispersi yaitu penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Ma'sum (2013) dengan studi kasus angka kematian ibu di Provinsi Jawa Timur tahun 2011. Dari hasil analisis, dari sembilan variabel yang digunakan terdapat satu variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kematian ibu yaitu jumlah ibu nifas mendapat vitamin A [2]. Oleh karena itu, untuk memodelkan jumlah kematian ibu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada penelitian ini akan menggunakan analisis regresi binomial negatif. Penggunaan analisis regresi binomial negatif karena pada metode ini tidak mengasumsikan bahwa nilai variansi harus sama dengan nilai mean. 2. TINJAUAN PUSTAKA DISTRIBUSI BINOMIAL NEGATIF Suatu percobaan bernoulli bebas yang terdiri dari n_l ? usaha berulang akan menghasilkan dua kemungkinan yaitu sukses dengan peluang p_l ? dan gagal dengan peluang q_l ? = $1 - p_l$? , di mana x_l ? dinyatakan sebagai banyaknya percobaan yang diperlukan untuk memperoleh k_l ? sukses dalam n_l ? usaha bebas[3]. Maka distribusi peluang peubah acak x_l ? disebut/sebagai distribusi binomial negatif yang diberikan sebagai berikut: $f(x) = \frac{1}{x!} (1-p)^{x-k} p^k, x = k, k+1, k+2, \dots$

(0.1)

UJI OVERDISPERSI Overdispersi adalah pelanggaran asumsi yang terjadi apabila nilai variansi variabel respon lebih besar dari nilai mean nya atau $V(Y_l) > E(Y_l)$. Kasus overdispersi dapat terjadi karena adanya pencilan pada data, pengamatan yang hilang pada peubah penjelas, terjadinya korelasi antar pengamatan dan perlunya transformasi pada peubah penjelas[4]. Kondisi overdispersi dapat diketahui dengan melihat nilai deviansi/derajat bebas dan Pearson Chi-Square/bebas keduanya menghasilkan nilai yang lebih besar dari 1.

Statistik uji nilai deviansinya sebagai berikut[5]: $D = 2 \sum_{i=1}^{n_l} (y_i \ln(y_i) - (y_i - \bar{y})^2 / (n_l - 1))$

D = Nilai deviansi y_i = Nilai sebenarnya respon amatan ke- i ? y_i = Nilai dugaan respon amatan ke- i ? Untuk nilai Pearson Chi-Square diperoleh dari persamaan sebagai berikut: $\sum_{i=1}^{n_l} (y_i - \bar{y})^2 / (n_l - 1) = \chi^2$

Nilai pearson chi-square y_i = Nilai sebenarnya respon amatan ke- i ? y_i = Nilai dugaan respon amatan ke- i ? MODEL REGRESI BINOMIAL NEGATIF Model regresi binomial negatif merupakan model yang berasal dari distribusi poisson- gamma mixture yang merupakan penerapan dari General Linear Model yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Regresi binomial negatif biasanya digunakan untuk memodelkan data dengan variabel respon berupa data count. Regresi binomial negatif digunakan sebagai alternatif dari model regresi poisson yang mengalami overdispersi ($\text{var} > \text{mean}$). Model regresi binomial negatif mengasumsikan bahwa peubah respon berganda dapat dituliskan sebagai berikut[6]: $\ln(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \dots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i$ $\mu_i = e^{\beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \dots + \beta_k X_{ik}}$

(0.4)

μ_i = Nilai ekspektasi dari y_i ? yang berdistribusi binomial negatif β_0 = Nilai Konstanta X_{i1} = Nilai variabel independen ke- i ? β_k = Nilai koefisien variabel independen ke- k ? PENAKSIRAN PARAMETER DENGAN

METODE MAXIMUM LIKELIHOOD Parameter dalam model regresi binomial negatif yang tidak diketahui nilainya, yaitu $\beta_1=0, \beta_1=1, \dots, \beta_1=p$ perlu ditaksir. Penaksiran parameter dapat dilakukan menggunakan metode maximum likelihood. Langkah-langkah penafsiran parameter sebagai berikut:

1. Membentuk fungsi likelihood $L(\beta, a) = \prod f(y_i; \beta, a)$
- $= \prod_{i=1}^n \frac{y_i!}{\Gamma(y_i+1)} \left(\frac{1}{1+a} \right)^{y_i} \left(\frac{1+a}{1+aexp(x_i'\beta)} \right)^{1-y_i}$
2. Membentuk fungsi log dari fungsi likelihood yang telah diperoleh $L(\beta, a) = \ln L(\beta, a) = \ln \left(\prod_{i=1}^n \frac{y_i!}{\Gamma(y_i+1)} \left(\frac{1}{1+aexp(x_i'\beta)} \right)^{y_i} \left(\frac{1+a}{1+aexp(x_i'\beta)} \right)^{1-y_i} \right)$
3. Memaksimumkan fungsi $\ln L(\beta, a)$ dapat dilakukan dengan mencari turunan masing-masing parameter β_1 dan a kemudian disamakan nol.

Untuk menentukan penaksir

44 • Adnan Saudin; Nur Indah Auliah; Wahidah Alwi kemungkinan maksimumnya, digunakan metode iteratif yang cukup rumit. Metode iteratif atau numerik yang digunakan untuk memperoleh penaksir parameter dalam model regresi binomial negatif adalah dengan menggunakan metode Newton Raphson [7].

PENGUJIAN PARAMETER MODEL REGRESI BINOMIAL NEGATIF

Pengujian parameter dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian parameter dilakukan menggunakan dua uji yaitu uji serentak (overall) dan uji parsial.

1. Uji Overall Uji overall dilakukan untuk melihat pengaruh secara serentak variabel independen terhadap variabel dependen pada model. Adapun rumusan hipotesis pada uji overall: $H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_j = 0$ $H_1 : \beta_j \neq 0$ Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut: $G = -2 \log L_0 - L_1 = -2(\log L_0 - \log L_1)$ (0.7) Statistik Uji G mengikuti distribusi chi-square sehingga dibandingkan dengan tabel chi-square dengan derajat bebas db (banyaknya variabel), dengan daerah penolakan H_1 jika $G_1 > \chi_1^2(2\alpha)$ atau berdasarkan p-value yang dibandingkan dengan nilai α , dengan daerah penolakan $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k < \alpha = 0,05$.
2. Uji Parsial Uji Parsial digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Adapun rumusan hipotesis pada uji parsial: $H_0 : \beta_j = 0$ $H_1 : \beta_j \neq 0$ Statistik uji yang digunakan adalah uji Wald dengan rumus sebagai berikut: $W = \frac{\beta_j}{SE(\beta_j)}^2$ (0.8) Dimana nilai Uji W mengikuti distribusi chi-square sehingga dibandingkan dengan chi-square tabel $\chi_1^2(2\alpha, df=1)$. Maka kriteria uji untuk pengambilan keputusan dengan taraf nyata (α) adalah tolak H_0 jika nilai $W_1 > \chi_1^2(2\alpha, df=1)$ dan dapat dilihat berdasarkan $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k < \alpha = 0,05$ [8].

ANGKA KEMATIAN IBU Kematian ibu merupakan kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi atau akhir kehamilan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, akan tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain, atau dengan kata lain kematian merupakan banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan [9].

3. METODOLOGI Sumber Data Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 terkait dengan kematian ibu. Variabel Penelitian Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari sembilan variabel independen dan satu variabel dependen yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.1 Variabel Penelitian Variabel dependen YI? Jumlah kematian ibu X1?1 Perilaku hidup bersih dan sehat X1?2 Penanganan komplikasi kebidanan Variabel Independen X1?3 Persalinan ditolong tenaga kesehatan X1?4 Pelayanan kesehatan ibu hamil (K1) X1?5 Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) X1?6 Ibu hamil memperoleh tablet Fe1 30 tablet X1?7 Ibu hamil memperoleh tablet Fe3 90 tablet X1?8 Pelayanan kesehatan nifas X1?9 Ibu nifas mendapat vitamin A Prosedur Penelitian Adapun langkah-langkah analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mendeskripsikan data
- Melakukan uji overdispersi
- Membentuk model regresi binomial negatif
- Uji signifikansi parameter model regresi binomial negatif
- Uji overall
- Uji parsial
- Interpretasi hasil analisis
- PEMBAHASAN

Deskripsi Data Nilai statistik untuk setiap variabel yang digunakan pada penelitian ini disajikan [pada tabel berikut: Tabel 4.1 Statistika Deskriptif Variabel](#) Mean Variansi Min Maks Y 4,791 7,911 1 13 X1 55,949 205,660 36,300 80,950 X2 82,933 293,736 54,150 118,030 X3 94,407 11,429 85,150 100,410 X4 99,351 10,108 93,760 105,300 X5 90,015 32,754 78,010 98,490 X6 97,350 50,474 72,490 110,300 X7 87,325 53,996 69,300 97,310 X8 91,922 21,649 79,470 98,910 X9 94,166 16,511 80,700 100,410 Dari nilai statistik yang disajikan pada tabel 4.1, diketahui bahwa nilai variansi lebih besar dari nilai mean ($\text{var} > \text{mean}$) untuk variabel dependen Y. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kasus overdispersi pada data tersebut. Oleh karena itu, data tersebut memenuhi asumsi regresi binomial negatif. Uji Overdispersi Overdispersi merupakan asumsi yang harus dipenuhi untuk menggunakan regresi binomial negatif. Oleh karena itu, dilakukan uji dispersi untuk membuktikan bahwa data tersebut memenuhi asumsi regresi binomial negatif. Dari hasil analisis membuktikan bahwa data tersebut memenuhi asumsi. Nilai overdispersi [dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4.2](#) Uji Dispersi Deviansi df Dispersi 14,775 14 1,055 Berdasarkan tabel 4.2, diperoleh nilai dispersi > 1 , sehingga disimpulkan bahwa data tersebut mengalami overdispersi. Hal ini menunjukkan bahwa regresi binomial negatif tepat digunakan untuk memodelkan jumlah [kematian ibu](#). Model Regresi Binomial Negatif Setelah uji overdispersi terpenuhi, langkah selanjutnya adalah membentuk [model regresi binomial negatif](#) terkait jumlah [kematian ibu](#) dengan nilai estimasi parameter yang disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.3 Nilai Estimasi Parameter Parameter Nilai Dugaan $\Pr(|z| > |\beta|)$

β_0	13,267288	β_1	0,004518	β_2	-0,016614	β_3	0,068684	β_4	-0,006993	β_5	0,433300	β_6	-0,583428	β_7	0,0000858	β_8	0,101846	β_9	0,246425
β_{10}	0,041228	β_{11}	0,231113	β_{12}	-0,015346	β_{13}	0,625931	β_{14}	0,505117	β_{15}	0,059660	β_{16}	0,051396	β_{17}	-0,422888	β_{18}	0,000437	β_{19}	-0,021548

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh model regresi binomial negatif yaitu: $(\mu_i) = \exp(13,267288 - 0,016614 X_1 - 0,006993 X_2 - 0,583428 X_3 + 0,101846 X_4 + 0,041228 X_5 - 0,015346 X_6 - 0,021548 X_7 - 0,059660 X_8 - 0,422888 X_9)$

Overall Parameter Model Regresi Binomial Negatif Pengujian parameter secara serentak dilakukan dengan membandingkan nilai Likelihood Ratio 46 • Adnan Sauddin; Nur Indah Auliah; Wahidah Alwi (G) dengan nilai Chi-Square atau membandingkan nilai p-value dengan α yang disajikan [pada tabel di bawah ini: Tabel 4.4](#) Uji Overall G $\chi^2 = 0,05,9$ $p = 1 - \text{F}(v, v) = 1 - \text{F}(19,153) = 16,919$ $0,023 < 0,05$ Berdasarkan tabel 4.4, diperoleh nilai $G = 19,153 >$ nilai $\chi^2 = 16,919$ dan nilai $\text{Nilai } p = 1 - \text{F}(v, v) = 1 - \text{F}(19,153) = 0,023 < \alpha = 0,05$ yang berarti tolak H_0 . Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara serentak. [Uji Parsial Parameter Model](#) Regresi Binomial Negatif [Pengujian](#) parameter [secara parsial dilakukan](#) dengan memperhatikan nilai wald yang disajikan pada tabel di bawah ini: Tabel 4.5 Uji Parsial Berdasarkan tabel 4.5, diperoleh hasil [bahwa variabel yang](#) signifikan [berpengaruh terhadap](#) jumlah [kematian ibu di Provinsi](#) Sulawesi Selatan yaitu [variabel](#) X_1 dan X_2 . Di mana X_1 merupakan persalinan ditolong tenaga kesehatan dan variabel X_2 merupakan ibu nifas mendapat vitamin A. Dengan menggunakan persamaan (0.4), diperoleh model regresi binomial negatif berdasarkan tabel 4.5, yaitu: $(\mu_i) = \exp(-0,583428 X_3 - 0,422888 X_9)$

Berdasarkan persamaan tersebut, variabel persalinan ditolong tenaga kesehatan (X_1) dengan nilai parameter $\beta_1 = -0,583428$ diperoleh nilai eksponensial 0,55798. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase persalinan yang ditolong tenaga kesehatan maka jumlah kematian ibu cenderung menurun. Sedangkan untuk variabel ibu nifas mendapat vitamin A (X_2) dengan nilai parameter $\beta_2 = 0,422888$ diperoleh nilai eksponensial 1,52636. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase ibu nifas mendapat vitamin A maka jumlah kematian ibu cenderung meningkat. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan hasil analisis yang diperoleh, persalinan yang ditolong tenaga

