

Turnitin Originality Report

Processed on: 15-May-2023 13:55 WIB
ID: 2093506304
Word Count: 764
Submitted: 1

Similarity Index
10%

Similarity by Source
Internet Sources: 10%
Publications: 0%
Student Papers: 0%

9. Artikel By Ermawati Ermawati

4% match (Internet from 03-Sep-2022)

<https://adoc.pub/estimasi-parameter-regresi-terpotong-kiri-dengan-metode-maks.html>

3% match (Internet from 21-Jul-2018)

<https://media.neliti.com/media/publications/116585-ID-estimasi-parameter-regresi-terpotong-kir.pdf>

1% match (Internet from 15-Sep-2022)

<https://adoc.pub/simulasi-monte-carlo-untuk-menentukan-estimasi-cadangan-miny.html>

1% match ()

[Pratiwi, R. \(Ratna\), Ispriyanti, D. \(Dwi\). "Estimasi Parameter Regresi Terpotong Kiri Dengan Metode Maksimum Likelihood", 'Faculty of Engineering Diponegoro University', 2006](#)

1% match (Internet from 04-Apr-2017)

<http://etheses.uin-malang.ac.id/5757/1/12610019.pdf>

1% match (Internet from 22-Jun-2019)

<https://pt.scribd.com/doc/231013296/Abs-Trak-20091>

MEAN DAN VARIANSI DARI DISTRIBUSI NORMAL TERPOTONG 1)Ermawati, 2)Nurhidayah, 3)Wahidah Alwi [Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri](#) Alauddin Makassar ABSTRAK Distribusi normal terpotong muncul akibat tidak dilakukan observasi pada bagian tertentu dari suatu populasi distribusi normal (Normal Distribution). Akibat pemotongan, secara otomatis karakteristik data seperti mean dan variansi juga ikut berubah. μ yang semula Mean berubah menjadi mean terpotong dan σ^2 yang semula variansi berubah menjadi variansi terpotong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk persamaan ekspektasi (mean) dan variansi [distribusi normal terpotong \(truncated normal distribution\)](#). Keyword : [Distribusi normal](#), distribusi normal standar, distribusi normal terpotong, ekspektasi. PENDAHULUAN Suatu populasi yang telah diketahui berdistribusi normal akan berubah menjadi distribusi normal terpotong (Truncated Normal Distribution) jika terdapat pemotongan nilai tertentu. Data terpotong tersebut muncul akibat tidak dilakukan observasi pada bagian tertentu atau terdapat data hilang dari suatu populasi. Sebagai contoh, penelitian tentang nilai penjualan yang digolongkan kedalam industri menengah di beberapa [perusahaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data](#) terpotong, karena objek utama merupakan bagian tertentu dari populasi. Akibat

diobservasi, maka hasil distribusinya adalah distribusi normal terpotong atas dengan fkp sebagai berikut : $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ Jika $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ dan b konstanta, maka mean dan variansi dari distribusi normal terpotong atas adalah sebagai berikut : $E(X) = \mu + \frac{\sigma^2}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_b^\infty e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$ $\text{Var}(X) = \sigma^2 + \frac{\sigma^4}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_b^\infty (x-\mu)^2 e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$

TERPOTONG ATAS BAWAH Berdasar variabel acak berdistribusi normal dengan fkp sebagai berikut: jika nilai x di bawah suatu nilai a dan di atas suatu nilai b tidak dapat diobservasi, maka hasil distribusi yang diperoleh adalah distribusi normal terpotong atas- bawah dengan fkp sebagai berikut: Dimana $f(x)$ adalah fungsi kepadatan peluang distribusi normal. $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

Berikut kurva dari distribusi normal terpotong bawah: Gambar 3: Kurva distribusi normal terpotong atas-bawah Jika $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ dan a, b konstanta, maka mean dan variansi dari distribusi normal terpotong atas bawah adalah sebagai berikut : $E(X) = \mu + \frac{\sigma^2}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^\infty e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$

Dengan, $a < \mu < b$ Mean dan variansi terpotong dari distribusi normal terpotong bawah adalah $\text{Mean} = \mu + \frac{\sigma^2}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^\infty e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$ $\text{Var} = \sigma^2 + \frac{\sigma^4}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^\infty (x-\mu)^2 e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$

PENUTUP Mean dan variansi terpotong dari distribusi normal terpotong bawah adalah $\text{Mean} = \mu + \frac{\sigma^2}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^\infty e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$ $\text{Var} = \sigma^2 + \frac{\sigma^4}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^\infty (x-\mu)^2 e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$

