

# Turnitin Originality Report

Processed on: 08-May-2023 23:07 WIB  
ID: 2087684657  
Word Count: 3088  
Submitted: 1

<b>Similarity Index</b>  <h1>20%</h1>	<b>Similarity by Source</b>	
	Internet Sources:	17%
	Publications:	5%
	Student Papers:	6%

10.\_37263-Article\_Text-111731-1-10-20230428.pdf  
By Anonymous

2% match (Internet from 04-Oct-2016)  
<https://fr.scribd.com/doc/51684932/aljabar-linier>

2% match (Internet from 01-Mar-2019)  
<http://skripsiiceran.blogspot.com/2014/09/skripsi-mathematicsinvers-suatu-matriks.html>

2% match (Internet from 09-Feb-2021)  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/60648/Chapter%20II.pdf?isAllowed=y&sequence=4>

1% match (student papers from 17-Sep-2018)  
[Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-09-17](#)

1% match (student papers from 07-Aug-2018)  
[Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-08-07](#)

1% match (student papers from 15-Apr-2018)  
[Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-04-15](#)

1% match ()  
[Fitri Aryani. "TRACE MATRIKS 3X3 BERPANGKAT BILANGAN BULAT", Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018](#)

1% match ()  
[Fadhilah Syafria. "PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASIPENGELOLAAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BERBASISBALANCED SCORECARD \(BSC\) MENGGUNAKAN METODEANALYTIC NETWORK PROCESS \(ANP\)\(Studi Kasus : PT. Askes \(Persero\) Cabang Utama Pekanbaru\)", 2010](#)

1% match (Internet from 22-Sep-2022)  
<https://docplayer.info/30230941-Invers-suatu-matriks-toeplitz-menggunakan-metode-adjoin.html>

1% match (Internet from 30-Mar-2023)  
<https://docobook.com/nama-penulis-1-penulis-2-penulis-3.html>

1% match (Internet from 30-Jun-2017)  
<http://eprints.uny.ac.id/44670/2/BAB%20II%20KAJIAN%20PUSTAKA.pdf>

1% match (Internet from 16-Dec-2022)  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/6909/1/09610090.pdf>

1% match (Internet from 26-Jul-2022)

[https://REPOSITORY.IPB.AC.ID/handle/123456789/29/browse?etal=-1&order=ASC&rpp=20&sort\\_by=1&starts\\_with=I&type=title](https://REPOSITORY.IPB.AC.ID/handle/123456789/29/browse?etal=-1&order=ASC&rpp=20&sort_by=1&starts_with=I&type=title)

1% match (Internet from 14-Oct-2021)

<http://ojs.uho.ac.id/index.php/semantik/article/download/6027/pdf>

1% match (Internet from 24-Jun-2021)

<https://adoc.pub/analisis-metode-eliminasi-gauss-dan-aturan-cramer-dalam-meny.html>

1% match (Internet from 13-Jan-2019)

<https://www.scribd.com/document/76299773/Diktat-ALE>

1% match (Lara Hoffmann Xavier, Carlos Tadeu dos Santos Dias. "Acurácia do modelo univariado para análise de medidas repetidas por simulação multidimensional", Scientia Agricola, 2001)

[Lara Hoffmann Xavier, Carlos Tadeu dos Santos Dias. "Acurácia do modelo univariado para análise de medidas repetidas por simulação multidimensional", Scientia Agricola, 2001](#)

1% match ( )

[wiryawan, hari mulya. "sifat-sifat matsriks normal dan hubunganya dengan matriks Hermit", 2010](#)

Bentuk Umum Determinan Matriks Toeplitz Tridiagonal Ermawati Prodi Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UINAM ermawati@uin-alauddin.ac.id Siti Fatmasari Try Asizah Nurman Mahasiswa Program Studi Matematika, Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UINAM UINAM Info: ABSTRAK Jurnal MSA Vol. 4 No. 1 Penelitian ini membahas tentang bentuk umum determinan matriks toeplitz Edisi: Januari – Juni 2016 tridiagonal. Tujuan dalam penelitian ini adalah menentukan bentuk umum Artikel No.: 5 determinan matriks toeplitz tridiagonal, dengan entri bilangan riil. Untuk Halaman: 33 - 39 memperoleh bentuk umum dari determinan matriks toeplitz tridiagonal ISSN: 2355-083X tersebut [dilakukan dengan mengamati pola yang terbentuk dari determinan](#) Prodi Matematika UINAM [matriks toeplitz tridiagonal berordo  \$3 \times 3\$  hingga  \$8 \times 8\$  yang diperoleh dengan menggunakan kombinasi metode reduksi baris dan ekspansi kofaktor.](#) Bentuk umum  $T_n = k \sum_{p=0}^{n-1} \left( \prod_{k=1}^{n-k} (b)(n-2k) (-ac)^k \right) \dots$   $n-1$   $n$   $p = 2$ , untuk  $n$  ganjil dan  $p =$ , untuk  $n$  genap berlaku untuk matriks 2 berordo  $n \times n$  dimana  $n \geq 3$ . Kata Kunci: Matriks Toeplitz Tridiagonal, Determinan Matriks Toeplitz Tridiagonal, Kombinasi Metode Reduksi Baris dan Ekspansi Kofaktor 1. PENDAHULUAN [Matematika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Matematika juga merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya. Matematika memiliki peran yang sangat penting pada ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, seperti fisika, kimia, biologi, ekonomi dan lain-lain. Bukan hanya itu, matematika juga merupakan ilmu yang tidak terlepas dari agama. Dalam teori matriks terdapat berbagai macam bentuk matriks, salah satu diantaranya adalah matriks toeplitz. Matriks toeplitz pada dasarnya memiliki operasi yang sama dengan matriks biasa hanya saja pada matriks toeplitz mempunyai struktur yang khusus, karena setiap entri pada diagonal utama bernilai sama begitupun dengan entri pada subdiagonal yang bersesuaian dengan diagonal utama juga bernilai sama. Ditinjau dari ukurannya, matriks ini merupakan jenis matriks persegi karena memiliki ukuran  \$n \times n\$  atau dengan kata lain jumlah baris](#)

dan kolomnya sama. Telah ada penelitian sebelumnya mengenai matriks toeplitz, yaitu sebuah jurnal tentang "Invers Suatu Matriks Toeplitz Menggunakan Metode Adjoin". Bentuk umum dari matriks toeplitz yang digunakan yaitu diagonal nol dan selainnya  $x_{ij} \in \mathbb{R}$ . Dalam jurnal tersebut membahas sedikit mengenai matriks toeplitz tridiagonal sebagai salah satu jenis dari matriks toeplitz. Berangkat dari jurnal inilah penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai matriks toeplitz tridiagonal. Salah satu pembahasan dalam teori matriks, baik matriks biasa maupun matriks toeplitz tridiagonal yaitu menentukan determinan matriks. Determinan memiliki peranan dalam mencari invers matriks dan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, selain itu juga terdapat berbagai macam metode untuk mencari nilai determinan matriks, diantaranya ialah metode sarrus, metode reduksi baris, metode minor dan kofaktor, serta metode corner. Pada kenyataannya baik reduksi baris maupun ekspansi kofaktor tidak asing lagi bagi penyimak matematika. Apalagi sebagian besar buku-buku aljabar membahas kedua metode ini. Namun, pada umumnya penggunaan metode ini diterapkan secara terpisah. Maka dari itu, penulis bermaksud untuk menggunakan metode yang mengkombinasikan kedua metode ini, karena penggunaan metode reduksi baris dan ekspansi kofaktor secara bersamaan akan menyebabkan perhitungan determinan suatu matriks menjadi lebih mudah. Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Bentuk Umum Determinan Matriks Toeplitz Tridiagonal". Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu bagaimana bentuk umum determinan matriks toeplitz tridiagonal? Tujuan Penelitian Dengan adanya permasalahan yang muncul, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan bentuk umum determinan matriks toeplitz tridiagonal.

**TINJAUAN PUSTAKA** Definisi Matriks Matriks didefinisikan sebagai suatu himpunan angka, variabel atau parameter dalam bentuk suatu persegi panjang, yang tersusun di dalam baris dan kolom. Pada umumnya matriks dinotasikan dalam huruf besar, sedangkan elemen-elemennya dalam huruf kecil.

1. Matriks Toeplitz Tridiagonal Secara sederhana matriks toeplitz dapat didefinisikan sebagai berikut: 1. Berbentuk matriks kuadrat yang simetris berorde  $n$  2. Semua unsur pada diagonal utama bernilai sama, dinotasikan dengan  $t_{ii} = t_{ii} - j_{ii}$  untuk  $i = j = 1, 2, 3, \dots, n$  3. Semua unsur pada subdiagonal atau unsur di atas diagonal dan di bawah diagonal bernilai sama, dinotasikan dengan  $t_{i,i-1} = t_{i,i-1} - j_{i,i-1}$  untuk  $i \neq j$  dan  $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$ . Secara umum dituliskan dalam bentuk  $t_{ij} = t_{i-j+1}$  untuk  $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$ . Matriks toeplitz merupakan suatu matriks yang setiap unsur pada diagonal utamanya sama dan setiap unsur pada subdiagonal yang bersesuaian dengan diagonal utama juga sama. Oleh karena itu diasumsikan bahwa terdapat berbagai jenis dari matriks toeplitz. Salah satu jenis dari matriks toeplitz adalah matriks toeplitz tridiagonal.

Andaikan  $A_n$  suatu matriks toeplitz tridiagonal berorde  $n$ :  $A_n = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & \\ & c_2 & a_3 & b_3 & \\ & & c_3 & a_4 & b_4 \\ & & & c_4 & a_5 \end{pmatrix}$  di mana  $a_i \neq 0$  dan  $c_i \neq 0$  pada (2.2). Jenis lain dari matriks toeplitz adalah matriks toeplitz dengan diagonal nol dan selainnya  $x_{ij} \in \mathbb{R}$ , sebagaimana yang digunakan Bakti Siregar dalam penelitiannya.  $T_{ij} = x_{i-j+1}$  untuk  $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$  (2.3)

Determinan Matriks Suatu determinan adalah suatu fungsi khusus yang mengasosiasikan suatu bilangan real dengan suatu matriks bujur sangkar. Determinan adalah suatu skalar (angka) yang diturunkan dari suatu matriks bujur sangkar melalui operasi khusus. Disebut operasi khusus karena dalam proses penurunan determinan dilakukan perkalian-perkalian sesuai dengan aljabar matriks. Suatu matriks yang mempunyai determinan disebut dengan matriks singular sedangkan matriks yang tidak mempunyai determinan (determinannya = 0) disebut matriks non singular. Determinan matriks  $A_n$  dengan ukuran  $n \times n$  (matriks persegi).

Determinan, dinotasikan dengan  $\det(A)$ , didefinisikan sebagai jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari matriks  $A$ . 3. Reduksi Baris dan Ekspansi Kofaktor a. Reduksi Baris Gagasan dari metode ini adalah dengan mereduksi matriks yang diberikan menjadi bentuk segitiga atas melalui operasi baris elementer, kemudian menghitung determinan dari matriks segitiga atas, kemudian menghubungkan determinan tersebut dengan matriks aslinya. Reduksi baris dilakukan melalui operasi baris elementer (OBE). Dalam OBE ini ada beberapa operasi yang dapat digunakan, yaitu: a. Mengalikan suatu baris dengan konstanta tidak sama dengan nol; b. Mempertukarkan dua baris c. Menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. b. Ekspansi Kofaktor Ekspansi kofaktor adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung determinan dari suatu matriks, yang selanjutnya dapat dikembangkan untuk menentukan invers matriks tersebut dan akhirnya membantu untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Sebelum membahas kofaktor, terlebih dahulu mendefinisikan minor sebagai suatu cara untuk menghitung determinan dengan cara manual. Determinan dari matriks  $3 \times 3$ ,  $\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$  (2.4) Dengan mengatur kembali suku-suku dan memfaktorkan, (2.4) dapat ditulis kembali sebagai:  $\det(A) = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$  (2.5) Pernyataan dalam kurung pada (2.5), masing-masing merupakan determinan:  $\det(A_{22}) = a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}$ ,  $\det(A_{23}) = a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}$ ,  $\det(A_{31}) = a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}$ . Maka definisi minor dan kofaktor, yaitu: Jika  $A$  adalah suatu matriks bujur sangkar, maka minor dari entri  $a_{ij}$  dinyatakan sebagai  $M_{ij}$  dan didefinisikan sebagai determinan dari submatriks yang tersisa setelah baris ke- $i$  dan kolom ke- $j$  dihilangkan dari  $A$ . Bilangan  $(-1)^{i+j}M_{ij}$  dinyatakan sebagai  $C_{ij}$  dan disebut sebagai kofaktor dari entri  $a_{ij}$ . Definisi: (Matriks Kofaktor) Jika  $A$  adalah sembarang matriks  $n \times n$  dan  $C$  adalah kofaktor dari  $A$ , maka matriks dengan bentuk:  $C_{11} \ C_{12} \ \dots \ C_{1n}$   $C_{21} \ C_{22} \ \dots \ C_{2n}$   $\vdots$   $C_{n1} \ C_{n2} \ \dots \ C_{nn}$  dinamakan matriks kofaktor dari matriks  $A$ . Menurut definisi minor dan kofaktor di atas, pernyataan dalam (2.5) dapat ditulis dalam bentuk minor dan kofaktor sebagai:  $\det(A) = a_{11}(M_{11}) + a_{12}(-M_{12}) + a_{13}(M_{13}) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$  (2.7) Persamaan (2.7) menunjukkan bahwa determinan  $A$  dapat dihitung dengan mengalikan entri-entri pada baris pertama dari  $A$  dengan kofaktor-kofaktornya yang bersesuaian dan menjumlahkan hasil kali-hasil kali yang diperoleh. Metode perhitungan  $\det(A)$  ini disebut ekspansi kofaktor (cofactor expansion) sepanjang baris pertama dari  $A$ . Ekspansi kofaktor untuk menghitung determinan matriks adalah mengikuti teorema (ekspansi kofaktor): Apabila diberikan matriks  $A$  yang berukuran  $n \times n$ , maka determinan matriks  $A$  dapat dihitung dengan menggunakan: a. Ekspansi kofaktor sepanjang kolom  $j$ :  $\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \dots + a_{nj}C_{nj}$  b. Ekspansi kofaktor sepanjang baris  $i$ : 3. METODE PENELITIAN Untuk mencapai tujuan dalam penelitian, maka ada 2 tahap yang dilakukan untuk mendapatkan bentuk umum determinan matriks toeplitz tridiagonal adalah sebagai berikut: Tahap I: Mencari determinan matriks toeplitz tridiagonal ordo  $3 \times 3$  hingga  $8 \times 8$  dengan kombinasi metode reduksi baris dan ekspansi kofaktor, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 1. Membentuk matriks toeplitz tridiagonal yang akan dicari determinannya. 2. Mereduksi matriks yang diberikan melalui operasi baris elementer hingga terdapat suatu baris atau kolom yang banyak memuat entri nol (hanya satu yang bukan nol) 3. Melakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris atau kolom yang memuat nol terbanyak 4. Mengulangi langkah 2 dan 3 hingga terbentuk matriks  $2 \times 2$ . Melakukan perhitungan determinan (sesuai dalam persamaan (2.11)). Tahap II: Membuat bentuk umum penyelesaian



matematika, andaikan  $T_{n \times n}$  adalah matriks toeplitz tridiagonal dengan ordo  $n \times n$  dimana  $n \geq 3$   $\det T_4 = b^2 \times \begin{vmatrix} b & -ac & & \\ -ac & b & & \\ & & b & -ac \\ & & & b \end{vmatrix}$  yakni  $\{3, 4, 5, \dots, n\}$ . a. Untuk  $n$  ganjil ( $n = 3, 5, \dots, m$ ), maka  $n-1 = \begin{vmatrix} b & -ac & & \\ -ac & b & & \\ & & b & -ac \\ & & & b \end{vmatrix} = (b^2 - ac)^2 - (b^2 ac)$   $\det T_4 = b^4 - 2b^2 ac + a^2 c^2 - b^2 ac$  Sehingga hasilnya adalah:  $\det T_4 = b^4 - 3b^2 ac + a^2 c^2$  Dengan cara yang sama pada matriks  $3 \times 3$ ,  $4 \times 4$  diperoleh determinan untuk matriks  $5 \times 5$   $6 \times 6$ ,  $7 \times 7$ , dan  $8 \times 8$  secara berturut-turut sebagai berikut:  $\det T_5 = b^5 - 4b^3 ac + 3ba^2 c^2$   $\det T_6 = b^6 - 5b^4 ac + 6b^2 a^2 c^2 - a^3 c^3$   $\det T_7 = b^7 - 6b^5 ac + 10b^3 a^2 c^2 - 4ba^2 c^3$   $p=2$  Jadi, bentuk umum determinan matriks toeplitz tridiagonal ordo  $n \times n$  dengan  $n$  bilangan ganjil adalah:  $T_n = \begin{vmatrix} b & -ac & & & \\ -ac & b & & & \\ & & b & -ac & \\ & & & & b \end{vmatrix} = b^n + (n-1)b^{n-2}(-ac) + \dots + \dots$  Untuk  $n=3$  maka  $T_3 = \begin{vmatrix} b & -ac & \\ -ac & b & \\ & & b \end{vmatrix} = b^3 - 2bac$  Untuk  $n=5$  maka  $T_5 = \begin{vmatrix} b & -ac & & & \\ -ac & b & & & \\ & & b & -ac & \\ & & & & b \end{vmatrix} = b^5 - 4b^3 ac + 3ba^2 c^2$  Tahap II: Membuat bentuk umum penyelesaian determinan matriks toeplitz tridiagonal.  $T_5 = \begin{vmatrix} b & -ac & & & \\ -ac & b & & & \\ & & b & -ac & \\ & & & & b \end{vmatrix} = b^5 - 4b^3 ac + 3ba^2 c^2$  Untuk  $n = m$  maka  $T_m = \begin{vmatrix} b & -ac & & & \\ -ac & b & & & \\ & & b & -ac & \\ & & & & b \end{vmatrix} = b^m + (m-1)b^{m-2}(-ac) + \dots + \dots$  Sehingga deretan untuk  $n$  ganjil adalah:  $(b^3 - 2bac) + (b^5 - 4b^3 ac + 3ba^2 c^2) + \dots + (b^m + (m-1)b^{m-2}(-ac) + \dots) = \sum_{k=0}^{n-k} (b)(n-2k)(-ac)^k$