

Turnitin Originality Report

Processed on: 08-May-2023 23:07 WIB
 ID: 2087684704
 Word Count: 4552
 Submitted: 1

14._garuda549214.pdf By
 Anonymous

Similarity by Source	
Similarity Index	
16%	
Internet Sources:	15%
Publications:	3%
Student Papers:	9%

3% match (Internet from 09-Jul-2019)

<https://de.scribd.com/doc/234318826/Metode-Analisa-Numerik-Rinaldi-Munir>

2% match (student papers from 17-Sep-2018)

[Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-09-17](#)

1% match (Internet from 08-Jul-2019)

<http://digilib.unila.ac.id/57480/3/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

1% match (Internet from 13-May-2019)

<http://digilib.unila.ac.id/56580/3/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TEKS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.p>

1% match (Internet from 17-Jun-2019)

<http://digilib.unila.ac.id/57019/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

1% match (Internet from 12-Oct-2018)

<https://docplayer.fi/35115844-Bergmanin-avaruuden-funktioiden-nollakohdista.html>

1% match (Internet from 05-Sep-2019)

<http://www.samsularifin.com/2016/05/persamaan-diferensial-dan-integrasi.html>

1% match (Internet from 08-Oct-2014)

<http://fr.slideshare.net/tryjayanti7/metode-numerik-rifqikhwanuddincom>

1% match (Internet from 16-Dec-2021)

https://123doku.com/document/eb6_solusi-integrasi-numerik-dengan-metode-simpson.html

1% match (Internet from 14-Nov-2022)

<https://docplayer.info/32531112-Penerapan-integrasi-numerik-pada-medan-magnet-karena-arus-listrik.html>

1% match (Internet from 02-Jun-2014)

<http://toto.fonbet.com/list/ru/753/kvits.htm>

1% match (Zhiyue Zhang. "The alternating group explicit parallel algorithms for convection dominated diffusion problem of variable coefficient", International Journal of Computer Mathematics, 7/1/2004)

[Zhiyue Zhang. "The alternating group explicit parallel algorithms for convection dominated diffusion problem of variable coefficient", International Journal of Computer Mathematics, 7/1/2004](#)

1% match (student papers from 09-Sep-2019)

[Submitted to Syiah Kuala University on 2019-09-09](#)

1% match (Internet from 09-Jan-2021)

<http://blog.ub.ac.id/rizkifrmnsyh/>

1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://qdoc.tips/prosiding-seminar-nasional-teknik-industri-pdf-free.html>

PERBANDINGAN SOLUSI NUMERIK INTEGRAL LIPAT DUA PADA FUNGSI ALJABAR DENGAN METODE ROMBERG DAN SIMULASI MONTE CARLO Ermawatii , PujiRahayuii, Faihatus Zuhairohiii [i Dosen Jurusan Matematika FST UIN Alauddin](#) Makassar [ii Mahasiswa Jurusan Matematika FST UIN Alauddin Makassar](#) iii Dosen Jurusan Matematika YPUP ABSTRAK, Integrasi numerik merupakan metode yang rumit dapat menggunakan metode numerik.

dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan integral yang sulit diselesaikan secara analitis. Artikel ini Metode numerik merupakan teknik dimana membahas tentang perbandingan tingkat keakuratan antara masalah matematika diformulasikan sedemikian metode Romberg dan Simulasi Monte Carlo pada rupa sehingga dapat diselesaikan oleh penyelesaian integral lipat dua untuk fungsi aljabar baik pengoperasian matematika, dimana penggunaan fungsi aljabar rasional maupun irrasional. Tingkat metode ini menghasilkan solusi hampiran yang keakuratan dapat di ketahuin dari perbandingan galat antara kedua metode tersebut. Berdasarkan hasil simulasi memang tidak persis sama dengan solusi yang pada beberapa fungsi aljabar baik rasional maupun sebenarnya (sejati). Akan tetapi tingkat irrasional menunjukkan bahwa nilai galat metode Romberg keakuratannya dapat dilihat dari galat sekecil lebih kecil dibandingkan metode Simulasi Monte Carlo, mungkin. Operasi hitungan dalam metode meskipun jumlah iterasi untuk metode Simulasi Monte numerik umumnya dilakukan dengan iterasi Carlo jauh lebih besar dibandingkan dengan metode Romberg. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode sehingga jumlah hitungan yang dilakukan Romberg lebih akurat dibandingkan dengan metode banyak dan berulang-ulang. Oleh karena itu Simulasi Monte Carlo, pada penyelesaian integral lipat dua diperlukan bantuan program aplikasi komputer dengan fungsi aljabar baik yang rasional maupun untuk melaksanakan operasi hitungan tersebut. irrasional. [Metode numerik yang digunakan untuk memecahkan persoalan integral disebut integrasi](#) Kata Kunci: [Integrasi numerik](#), Galat, [metode Romberg](#), numerik. Integrasi numerik merupakan suatu Simulasi Monte Carlo [metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai hampiran dari beberapa integral tentu](#)

1. PENDAHULUAN [yang memerlukan penyelesaian](#) numerik [sebagai hampirannya](#). Perkembangan teknologi mempengaruhi Penyelesaian integrasi dengan metode numerik berbagai segi kehidupan manusia yang dapat terdiri dari tiga kelompok berdasarkan proses membawa perubahan pada bagaimana cara penurunannya yaitu metode pias, metode Gauss manusia menyelesaikan permasalahan yang dan metode Newton-Cotes. Metode pias seperti dihadapi. Hadirnya pengaruh komputer metode trapesium, segi empat dan titik tengah. membawa perkembangan yang terus Metode Gauss seperti Gauss Legendre 2 titik, 3 berkelanjutan dalam melakukan pendekatan titik dampai n titik. Sedangkan metode Newton- untuk menyelesaikan permasalahan yang Cotes seperti metode trapesium, metode Simpson dihadapi. dan metode Boole. Metode Romberg merupakan Banyak permasalahan yang dihadapi dapat gabungan dari rumus trapesium rekursif dan dimodelkan ke dalam suatu persamaan integral. Boole Rekursif yang didasarkan pada perluasan Namun persamaan integral ini terkadang ekstrapolasi Richardson sehingga dapat bentuknya rumit sehingga sulit untuk memperoleh nilai integrasi yang semakin baik. diselesaikan dengan menggunakan kaidah- Selain itu, terdapat pula sebuah metode yang kaidah kalkulus secara analitik. Untuk itu menggunakan pembangkit bilangan acak yang diperlukan bantuan komputer dan metode disebut Simulasi Monte Carlo. Walaupun pendekatan yang tepat untuk dapat menggunakan bilangan acak, metode Simulasi menyelesaikan persamaan tersebut secara efisien Monte Carlo mempunyai akurasi yang cukup dan tepat. Untuk menangani persamaan yang tinggi karena berdasarkan pada teori probabilitas dan statistik. Masalah yang akan di bahas dalam artikel ini berkaitan dengan perbedaan tingkat keakuratan antara [metode Romberg dan metode Simulasi Monte Carlo](#) pada penyelesaian [integral lipat dua pada fungsi](#) aljabar, yang dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan tingkat keakuratan penggunaan [metode Romberg dan Simulasi Monte Carlo](#) dalam menyelesaikan [integral lipat dua pada fungsi](#) aljabar. 2. TINJAUAN PUSTAKA Fungsi Suatu [fungsi f](#) merupakan [suatu aturan korespondensi yang menghubungkan setiap objek x dalam suatu himpunan pertama dengan suatu nilai tunggal a\(x\) dari suatu himpunan kedua](#). Secara garis besar fungsi dibedakan menjadi dua yaitu [fungsi aljabar dan fungsi transenden](#). [Fungsi aljabar adalah fungsi yang diperoleh dari sejumlah berhingga operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan dan penarikan akar](#). Adapun yang termasuk [fungsi aljabar](#) adalah fungsi polynomial, fungsi rasional dan fungsi irrasional. Integral Integral [merupakan perhitungan kebalikan dari diferensial suatu fungsi \(suatu fungsi asal yang diturunkan dapat ke fungsi asalnya dengan cara integral\)](#). Integral [terdiri dari integral taktentu \(indefinite\) dan integral tentu \(definite\)](#). Misalkan f suatu fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup [a, b]. Jika ada, maka dikatakan f adalah terintegralkan pada [a, b]. Lebih lanjut $\int_a^b f(x) dx$ disebut Integral $\int_a^b f(x) dx$ tentu (integral Riemann) f dari a ke b, kemudian diberikan oleh $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$ [Dalam bidang teknik, integral sering muncul dalam bentuk integral ganda dua \(lipat dua\) atau integral ganda tiga \(lipat tiga\)](#). Integral lipat dua didefinisikan sebagai berikut:
$$a \iint_A a(x, x) dx = \int \int_A [f(x, x) dx] dx$$
 Integrasi Numerik [Integrasi numerik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai hampiran dari beberapa integral tentu yang memerlukan penyelesaian numeric sebagai hampirannya](#). [Terdapat tiga pendekatan dalam menurunkan rumus integral numerik. Pendekatan pertama adalah berdasarkan tafsiran geometri integral tentu. Daerah integrasi dibagi atas sejumlah pias \(strip\) yang berbentuk segiempat. Luas daerah integrasi dihipir dengan luas seluruh pias](#). Integrasi numerik yang diturunkan dengan pendekatan ini digolongkan kedalam metode pias. Kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode pias adalah kaidah segiempat, kaidah trapezium dan kaidah titik tengah. [Pendekatan kedua adalah berdasarkan interpolasi polinomial. Disini fungsi integran f\(x\) dihipir dengan polinomial interpolasi pn\(x\). Selanjutnya, integrasi dilakukan terhadap pn\(x\) karena polinom lebih mudah diintegalkan daripada mengintegalkan f\(x\). Rumus integrasi numerik yang diturunkan dengan pendekatan ini digolongkan kedalam metode Newton-Cotes, yaitu metode umum untuk](#)

[menurunkan rumus](#) integrasi [numerik](#). Adapun beberapa kaidah integrasi numerik yang diturunkan dari [metode Newton-Cotes](#) antara lain [kaidah trapesium](#), [kaidah Simpson 1 dan kaidah Simpson 3](#). [Pendekatan ketiga sama sekali tidak 3 menggunakan titik-titik diskrit sebagaimana 8 pada kedua pendekatan di atas. Nilai integral diperoleh dengan mengevaluasi nilai fungsi pada sejumlah titik tertentu di dalam selang \[-1,1\], mengalikannya dengan suatu konstanta, kemudian menjumlahkan keseluruhan perhitungan. Pendekatan ketiga ini dinamakan Kuadratur Gauss. Metode Romberg Metode Romberg merupakan metode integrasi yang didasarkan pada perluasan ekstrapolasi Richardson yang dihasilkan dari aturan trapesium rekursif. Kelemahan dari metode ini adalah harus menggunakan jumlah interval yang besar guna mencapai akurasi yang diharapkan. Salah satu cara untuk meningkatkan akurasi adalah dengan membagi dua interval secara terus menerus sampai nilai integral yang dihitung dengan \$2k\$ dan \$2k+1\$ konvergen pada suatu nilai. Proses penyelesaian integral dengan menggunakan metode Romberg dapat dilihat pada flow chart seperti pada gambar 1 berikut: start Input \$x_1, x_2\$ dan \$n\$ \$h = x_2 - x_1\$ \$R\(1,1\) = T_0 = 2 \int_{x_1}^{x_2} a\(x\) dx\$ \$R\(r, 1\) = T_{k+1} = T_k h 2^k 2 + 2^{k+1} a 2^{r-1}\$; \$r=1\$ \$a\(i\) = a\(x_1 + i 2^{k+1}\)\$, \$r \geq 2\$ \$h R\(r, r\) = 4r-1 R\(r, r-1\) - R\(r-1, r-1\) \(4r-1 - 1\)\$ Output I end Gambar 1 Flowchart Penyelesaian Integral dengan Metode Romberg Simulasi Monte Carlo Metode simulasi Monte Carlo merupakan salah satu metode integrasi numerik dengan cara memasukkan sejumlah \$N\$ nilai fungsi \$x\$ secara random dengan \$x\$ berada dalam interval integral, menurunkan secara acak nilai variabel tidak pasti secara berulang-ulang dalam simulasi model. Rumusan integrasi numerik dengan metode simulasi Monte Carlo adalah sebagai berikut: \$\int_a^b f\(x\) dx \approx \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\(x_i\)\$ Dengan \$x_i\$ adalah bilangan random yang dibangkitkan dengan harga \$a \leq x_i \leq b\$ dan \$n\$ adalah jumlah masukkan \(pengulangan\) banyak data yang diinginkan. Proses penyelesaian integral dengan menggunakan simulasi Monte Carlo dapat dilihat pada flow chart seperti pada gambar 2 berikut: Gambar 2 Flow Chart Penyelesaian Integral dengan Simulasi Monte Carlo Galat \[Galat atau biasa disebut error dalam metode numerik adalah selisih antara yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik\]\(#\). Galat dibedakan menjadi tiga yaitu: 1. \[Galat Mutlak Kesalahan mutlak dari suatu angka, pengukuran, atau perhitungan adalah perbedaan numerik nilai sesungguhnya terhadap nilai pendekatan yang diberikan, atau yang diperoleh dari hasil perhitungan atau pengukuran\]\(#\). Kesalahan \(\$E\$ \) = nilai Eksak - Nilai perkiraan Jika \$a^*\$ adalah hampiran dari nilai eksak \$a\$ maka galat mutlak dari \$a\$ adalah \$E = |a - a^*|\$ yang berarti hampiran = nilai eksak - galat 2. Galat Relatif \$a = E / a^*\$ Gakar \$A = a =\$ Nilai Ekrak 3. Persentase Galat Persentase galat adalah 100 kali galat relatif \$\xi a = a^* 100\%\$ 3. METODOLOGI Prosedur Analisis Adapun prosedur penelitian yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Memberikan contoh soal integral lipat dua dengan fungsi aljabar rasional untuk diselesaikan secara analitik, 2. Menyelesaikan contoh soal menggunakan metode Romberg dan Simulasi Monte Carlo secara numeric dengan iterasi \$n = 2\$ dan \$n = 4\$, 3. Menghitung galat dari masing-masing metode dan membandingkan hasilnya, 4. Mensimulasikan beberapa fungsi aljabar rasional dan irrasional pada program Matlab dengan menggunakan metode Romberg dan Simulasi Monte Carlo sesuai dengan flowchart pada BAB II, 5. Membandingkan hasil simulasi untuk \$n = 2\$ dan \$n = 4\$. Kemudian menganalisis galat mutlak dari kedua metode untuk mendapatkan metode yang paling akurat. 4. PEMBAHASAN Diberikan contoh soal integral lipat dua sebagai berikut: \$2 \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 x^3 dx\$ 0 Penyelesaian secara Analitik Metode Substitusi: Misal \$r = x^3 + 1\$ \$ar = 3x^2ax\$ 1 untuk batas \$x = 0 \Rightarrow r = 0^3 + 1 = 1\$, dan \$3 ar = x^2 ax\$ untuk batas \$x = 1 \Rightarrow r = 1^3 + 1 = 2\$ \$2 \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 x^3 dx = \int_1^2 \frac{1}{3} dy = \frac{1}{3} \(2 - 1\) = \frac{1}{3}\$ 3 \$\ln 2\$ \$y^2\$ \$?? 20 y^2 1 6 ? \ln 2 4 6\$ Solusi di atas merupakan solusi eksak. Namun untuk menyelesaikan perhitungan secara numerik harus diubah dalam bentuk desimal untuk mendapatkan solusi hampiran. Oleh karena itu, nilai \$4 \ln 2\$ jika diubah dalam bentuk 6 desimal menjadi 0,46209812 Penyelesaian Secara Numerik Dengan menggunakan 8 angka penting, hasil perhitungan numerik metode Romberg dan Simulasi Monte Carlo adalah sebagai berikut: Metode Romberg: 1. Fungsi integran yang didefinisikan adalah \$x^2x^3+1\$ 2. Batas bawah daerah integrasi \$x_1 = 0\$, batas atas daerah integrasi \$x_2 = 1\$ Batas bawah daerah integrasi \$x_1 = 0\$, batas atas daerah integrasi \$x_2 = 2\$ 3. Untuk iterasi \$n=2\$: Integral pertama yang diselesaikan adalah integral terhadap \$x\$ a. Menentukan lebar interval \(\$h\$ \) pada batas \$x\$: \$h = x_2 - x_1\$ \$h = 1 - 0 = 1\$ b. Menghitung integrasi pada kolom pertama \$R\(1,1\)\$: \$R\(1,1\) = T_0 = \int_0^1 a\(x\) dx = \int_0^1 \(x^2 + x^3 + 1\) dx = \left\[\frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + x \right\]_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + 1 = \frac{17}{12} \approx 1,416666667\$ c. Menghitung integrasi pada baris kedua kolom pertama \$R\(2,1\)\$: \$2k R\(r, 1\) = T_{i+1} = T_i + 2^{i+1} a 2^{i-1} h^2\$, \$ai i=1 = a\(x_1 + i h 2^{i+1}\)\$, \$r \geq 2\$ \$R\(2,1\) = T_1 = \frac{1}{2} \(T_0 + a\(1\)\) = \frac{1}{2} \(\frac{17}{12} + 2\) = \frac{1}{2} \(\frac{17}{12} + \frac{24}{12}\) = \frac{1}{2} \(\frac{41}{12}\) = \frac{41}{24} \approx 1,708333333\$ d. Menghitung integrasi pada baris kedua kolom kedua \$R\(2,2\)\$: \$R\(r, r\) = 4s-1 R\(r, r-1\) - R\(r-1, r-1\) \(4s-1 - 1\)\$ \$R\(2,2\) = 4\(2\)-1 R\(2,1\) - R\(1,1\) \(4\(2\)-1 - 1\) = 3 R\(2,1\) - 2 R\(1,1\) = 3\(\frac{41}{24}\) - 2\(\frac{17}{12}\) = \frac{41}{8} - \frac{17}{6} = \frac{41}{8} - \frac{22}{8} = \frac{19}{8} = 2,375\$ Integral kedua yang diselesaikan adalah integral terhadap \$y\$ dengan fungsi \$0.23158148 x : 1\$. Menentukan lebar interval \(\$h\$ \) pada batas \$y\$: \$h = x_2 - x_1 = 2 - 0 = 2\$ 2. Menghitung integrasi pada kolom pertama \$R\(1,1\)\$: \$R\(1,1\) = T_0 = \int_0^2 a\(x, y\) dy = \int_0^2 a\(x, 0\) dy = \int_0^2 0 dy = 0\$ \$2 \int_0^2 a\(x, y\) dy = \int_0^2 a\(x, 2\) dy = \int_0^2 0,46296296 dy = 0,46296296 \cdot 2 = 0,92592592\$ 3. Menghitung integrasi pada baris kedua kolom pertama \$R\(2,1\)\$: \$R\(r, 1\) = T_{i+1} = T_i h 2^i + a\(x_1 + i h 2^{i+1}\)\$, \$ai i=1 = a\(x_1 + i h 2^{i+1}\)\$, \$r \geq 2\$ \$R\(2,1\) = T_1 = \frac{1}{2} \(T_0 + a\(1\)\) = \frac{1}{2} \(0 + 0,92592592\) = 0,46296296\$ e. Menghitung integrasi pada baris kedua](#)

kolom kedua $R(2,2)$: $R(2,2) = 42 - 1R(2,2 - 1) - R(2 - 1,2 - 1) 42 - 1 - 1 = 4R(2,1) - R(1,1) 4(0,46296296) - 0,46296296 4 - 1 = 0,46296296 3$ a. Untuk iterasi $n = 4$:
 Menyelesaikan integral pertama terhadap x . Menentukan lebar interval (h) pada batas x : $h = x_2 - x_1 = 1 - 0 = 1$ 2. Menghitung integrasi pada kolom pertama $R(1,1)$: $R(1,1) = T_0 = a(x_1, x) h + a(x_2, x) 2 a(x_1, x) = a(0, x) = a(0) = 0 a(x_2, x) = a(1, x) = a(1) = 0,50000000$
 $x R(1,1) = T_0 = (0 + 0,50000000x) 1 1 2 = x = 0,25000000 x 4$ 3. Menghitung integrasi pada baris kedua kolom pertama $R(2,1)$: $R(r, 1) = T_{i+1} = T_i h 2k \frac{2 + 2i+1}{2} a_{2i-1}, ai i=1 = a x_1 + i \frac{2i+1}{2} h, r \geq 2 R(2,1) = T_1 = T_0 h 2 + a_1 2 a_1 = a x_1 + 2 h = a 0 + = a 1 1 2 \frac{2 1 2}{2} = (2) x 1 3 (\frac{2}{2}) + 1 = 0,22222222 x 0,25000000 x R(2,1) = T_1 = 2 + 1 2 0,22222222 x = 0,23611111 x 4$. Menghitung integrasi pada baris ketiga kolom pertama $R(3,1)$: $R(r, 1) = T_{i+1} = T_i h 2k \frac{2 + 2i+1}{2} a_{2i-1}, ai i=1 = a x_1 + i \frac{2i+1}{2} h, r \geq 2 T_1 h R(3,1) = T_2 = + (a_1 + a_3) 2 h 4 a_1 = a x_1 + 4 = a 0 + = a 1 1 2 4 4 1 = (4) x 1 3 (4) + 1 = 0,06153846 x 3h 3 3 a_3 = a x_1 + 4 = a 0 + = a 4 4 3 2 = (4) x 3 3 (4) + 1 = 0,39560439 x R(3,1) = T_2 = 0,23611111 x 1 2 + (0,06153846 x + 0,39560439 x) 4 = 0,23234127 x 5. Menghitung integrasi pada baris keempat kolom pertama $R(4,1)$: $R(r, 1) = T_{i+1} h 2k = T_i \frac{2 + 2i+1}{2} a_{2i-1}, ai i=1 = a x_1 + i \frac{2i+1}{2} h, r \geq 2 h R(4,1) = T_3 = T_2 2 + (a_1 + a_3 + a_5 + a_7) h 8 (8) x 1 2 a_1 = a x_1 + = a 0 + h 1 8 8 = (8) + 1 1 3 = 0,01559454 x 3h 3 3 a_3 = a x_1 + 8 = a 0 + = a 2 8 8 (8) x 3 = 3 3 (8) + 1 = 0,13358070 x 5h 5 5 a_5 = a x_1 + 8 = a 0 + = a 8 8 5 2 = (8) x 3 (8) + 1 5 = 0,31397174 x 7h 7 a_7 = a x_1 + 8 = a 0 + 8 = a 0 + 8 = a 7 7 2 (8) x 8 = 7 3 (8) + 1 = 0,45847953 x R(4,1) = T_3 = 0,2323 x 2 + (0,01559454 x 1 + 0,13358070 x + 8 0,31397174 x + 0,45847953) = 0,23137395 x 6. Menghitung integrasi pada baris kedua kolom kedua $R(2,2)$: $4s - 1R(r, r - 1) - R(r - 1, r - 1) R(r, r) = 4s - 1 - 1 R(2,2) = 42 - 1R(2,2 - 1) - R(2 - 1,2 - 1) 42 - 1 - 1 = 4R(2,1) - R(1,1) = 4R(3,1) - R(2,1) 4(0,23611111 x) - 0,25000000 x 3 3 = R(3,2) = 4(0,23234127 x) - 0,23611111 x = 0,231488148 x 3 = 0,23108466 x 3 7. Menghitung integrasi pada baris ketiga kolom Dengan cara/formula yang sama, hasil kedua $R(3,2)$: perhitungan untuk baris dan kolom yang lain $R(3,2) = 42 - 1R(3,2 - 1) - R(3 - 1,2 - 1)$ dapat dilihat pada table 1 berikut: $42 - 1 - 1$
 Tabel 1 Hasil integrasi Romberg terhadap $x R(r,s)$ 1 2 3 4 1 0.25000000 y 2 0.23611111 y 0.23148148 y 3 0.23234127 y 0.23108466 y 0.23105820 y 4 0.23137395 y 0.23105151 y 0.23104930 y 0.23104916 y Menyelesaikan integral kedua terhadap y dengan fungsi $0.23104916 x$: 1. Menentukan lebar interval (h) pada batas y : $h = x_2 - x_1 = 2 - 0 = 2$ 2. Menghitung integrasi pada kolom pertama $R(1,1)$: $R(1,1) = T_0 = \frac{a(x, x_1) + a(x, x_2) h a(x, x_1) = a(x, 0) = 0,23104916 (0) = 0 2 a(x, x_2) = a(x, 2) = 0,23104916 (2) = 0,46209831$
 $R(1,1) = T_0 = (0 + 0,46209831) 2 = 0,46209831 2$ 3. Menghitung integrasi pada baris kedua kolom pertama $R(2,1)$: $R(r, 1) = T_{i+1} = T_i 2k 2 + h 2i+1 a_{2i-1}, ai i=1 = a x_1 + i 2i+1 h, r \geq 2 T_0 h R(2,1) = T_1 = + a_1 2 a_1 = a x_1 + 2 h 2 = a 0 + = a(1) 2 2 = 0,23104916 = 0,23104916 0,46209831 R(2,1) = T_1 = 2 + 2 0,23104916 = 0,46209831 2 4. Menghitung integrasi pada baris ketiga kolom pertama $R(3,1)$: $R(3,1) = T_2 = T_1 2 + 22 (a_1 + a_3) h a_1 = a x_1 + h 2 2 2 = a 0 + 1 4 = 0,23104916 = 0,11552458 2 a_3 = a x_1 + 3 22 h = a 0 + 3 2 = 0,23104916 3 4 = 0,34657374 2 R(3,1) = T_2 = 0,46209831 2 + (0,11552458 2 + 0,34657374) 4 = 0,46209831 5. Menghitung integrasi pada baris keempat kolom pertama $R(4,1)$: $R(4,1) = T_3 = T_2 + h 2 2 3 (a_1 + a_3 + a_5 + a_7) a_1 = a x_1 + 23 h = a 0 + 2 0,46209831 8 R(4,1) = T_3 = 0,23104916 1 4 + (0,05776229 2 2 a_1 = 0,05776229 + 0,17328687 + 8 a_3 = a x_1 + 3 23 h = a 0 + 3 2 0,28881145 + 0,40433603) 8 = 0,46209831 = 0,23104916 3 6. Menghitung integrasi pada baris kedua kolom kedua $R(2,2)$: $= 0,17328687 4 \frac{R(r, r) = 4s - 1R(r, r - 1) - R(r - 1, r - 1) a_5 = a x_1 + 5 23 h = a 0 + 5 2 42 - 1R(2,2 - 1) - R(2 - 1,2 - 1) 4s - 1 - 1 8 = 0,23104916 5 R(2,2) = 0,28881145 4 = 4R(2,1) - R(1,1) 42 - 1 - 1 a_7 = a x_1 + 7 23 = a 0 + 7 h 2 = 4(0,46209831) - 0,46209831 4 - 1 8 3 = 0,23104916 7 = 0,46209831 4 = 0,40433603 Dengan cara/formula yang sama, hasil perhitungan untuk baris dan kolom yang lain dapat dilihat pada table 2 berikut: Tabel 2 Hasil integrasi Romberg terhadap $y R(r,s)$ 1 2 3 4 1 0,46209831 2 0,46209831 0,46209831 3 0,46209831 0,46209831 0,46209831 0,46209831 4 0,46209831 0,46209831 0,46209831 0,46209831 Metode Simulasi Monte Carlo a. Fungsi integran yang didefinisikan adalah $x_2 x_3 + 1$ b. Batas bawah daerah integrasi $x_1 = 0$ batas atas daerah integrasi $x_2 = 2$ c. Untuk iterasi $n = 2$ Integral pertama yang diselesaikan adalah integral terhadap x : 1) Membangkitkan 2 buah data (x_i) dari 0 sampai 1 pada Matlab Misalkan $x_i = 0,7431 0,3922$ 2) Mensubstitusikan masing-masing nilai x_i pada fungsi integran: $0,7431 2 x_1 = 0,7431 3 + 1 = 0,39153564 x 0,3922 2 x_2 = 0,3922 3 + 1 = 0,14506904 x 3) Menjumlahkan nilai x_i : $2 x_i = 0,39153564 x + 0,14506904 x i=0 = 0,53660468 x 4) Menghitung nilai integrasi I: $a - a_n I = n x_i i=0 = 1 - 0 2 x 0,53660468 x = 0,26830234 x$ Integral kedua yang diselesaikan adalah integral terhadap y dengan fungsi integran berubah menjadi $0.26830234 x$. 1) Membangkitkan 2 buah data (x_i) dari 0 sampai 2 pada Matlab Misalkan $x_i = 1,3110 0,3424$ 2) Mensubstitusikan masing-masing nilai x_i pada fungsi integran: $x_1 = 0,2683 x = 0,26830234 (1,3110) Integral kedua yang diselesaikan adalah = 0,34174438 integral terhadap y dengan fungsi integran $x_2 = 0,2683 x = 0,26830234 (0,3424) berubah menjadi 0.22579786 x. = 0,09186672 3) Menjumlahkan nilai x_i : 1) Membangkitkan 4 buah data (x_i) dari 0 2 sampai 2 pada Matlab $x_i = 0,34174438 + 0,09186672$ Misalkan $i=0 x_i = 0,2279 1,2123 1,3451 1,1745 = 0,44361109$ 2) Mensubstitusikan masing-masing nilai x_i 4) Menghitung nilai integrasi I: pada fungsi integran: $a - a_n x_1 = 0,22579786 x I = 0,22579786 (0,2279) = 0,05145933 n x_i i=0 x_2 = 0,22579786 x = 2 - 0 = 0,22579786 (1,2123) = 0,27373474 2 x 0,44361109 x_3 = 0,22579786 x = 0,44361109 = 0,22579786 (1,3451) = 0,30372070 Maka diperoleh solusi akhir untuk $n = 2$ yaitu $x_4 = 0,22579786 x 0, 33330003 = 0,22579786$$$$$$$$$$$$$

MSA VOL. 5 NO. 1 ED. JAN-JUNI 2017 JURNAL MSA VOL. 5 NO. 1 ED. JAN-JUNI 2017
JURNAL MSA VOL. 5 NO. 1 ED. JAN-JUNI 2017 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57