

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI
PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS KASSI KASSI DAN PUSKESMAS
DAHLIA KOTA MAKASSAR TAHUN 2019-2020**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

ANDI NURFADILAH SYAM

NIM: 70600117004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

MAKASSAR

M A K A S S A R

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Andi Nurfadilah Syam
NIM : 70600117004
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 10 Agustus 1998
Jur/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN Minasa Upa Blok E 9/12
Judul : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 Februari 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Penyusun

ALAUDDIN
M A K A S S A R


Andi Nurfadilah Syam
NIM:70600117004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020” yang disusun oleh Andi Nurfadilah Syam, NIM 70600117004, mahasiswi program studi pendidikan dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 17 Februari 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 22 Februari 2021 M
10 Rajab 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

(.....)

Sekretaris: dr. Rini Fitriani, M.Kes

(.....)

Pembimbing I: dr. Andi Tihardimanto, Sp.JP., M.Kes

(.....)

Pembimbing II: dr. Asrul Abdul Azis

(.....)

Penguji I: dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed

(.....)

Penguji II: Dr. Muh. Sabir Maidin, M.Ag

(.....)

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi sebagai *Rahmatan Lil’alam* beserta para sahabat. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat bagi setiap mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terima kasih, rasa hormat dan penghargaan atas semua bantuan dan dukungan yang diperoleh kepada:

1. Ayah, Ibu, dan Kakak, serta seluruh keluarga besar peneliti yang selama ini telah memberikan curahan kasih sayang, dukungan, dan nasihat tak terhingga, serta telah mengorbankan meterinya selama peneliti menjalankan studi.
2. dr. Andi Tihardimanto, Sp.JP., M.Kes selaku pembimbing I dan dr. Asrul Abdul Azis selaku pembimbing II, yang telah mengorbankan banyak waktu di sela-sela kesibukan demi memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi hingga peneliti dapat Menyusun usulan penelitian ini.
3. dr. M. Yusuf Sidang Amin, Sp.An., M.Biomed selaku penguji kompetensi pada seminar proposal, dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed selaku penguji kompetensi

pada seminar hasil penelitian, dan Dr. Muh. Sabir Maidin, M.Ag selaku penguji agama pada seminar proposal yang telah banyak memberikan banyak arahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

4. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta jajarannya.
5. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan.
6. dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku kepala Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Seluruh staff dosen yang telah sabar dan bersedia dalam membagikan ilmu kepada peneliti sampai saat ini.
8. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada peneliti selama menjalankan pendidikan.
9. Sahabat-sahabat peneliti yang juga telah banyak mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu dalam membantu proses penyusunan proposal penelitian ini.
10. Teman-teman EU2TACHIUS, sebagai teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam keadaan apapun.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa proposal penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu. Peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar proposal ini kelak bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 1 Februari 2021

Peneliti,

Andi Nurfadilah Syam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Hipotesis	4
D. Definisi Operasional	4
1. Definisi Operasional	4
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	7
G. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan.....	19


C. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi Dalam Kehamilan	25
D. Integrasi Keislaman.....	43
E. Kerangka Teori	49
F. Kerangka Konsep.....	50
G. Kerangka Kerja.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Desain Penelitian	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C. Variabel Penelitian.....	49
D. Populasi dan Sampel.....	50
E. Cara Pengumpulan Data.....	52
F. Instrumen Penelitian	52
G. Pengolahan Data dan Analisis Data.....	52
H. Penyajian Data	54
I. Etika Penelitian	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Hasil.....	55
B. Pembahasan.....	62
C. Keterbatasan Penelitian.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR BAGAN

Gambar 1. Kerangka Teori.....	49
Gambar 2. Kerangka Konsep.....	50
Gambar 3. Kerangka Kerja.....	51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi.....	13
Tabel 2.2 Penyebab Hipertensi Sekunder	14
Tabel 2.3 Intervensi Nonfarmakologis dalam Tatalaksana Hipertensi	16
Tabel 2.4 Obat Antihipertensi Yang Direkomendasikan dalam JNC VII.....	18
Tabel 2.5 Klasifikasi Hipertensi dalam Kehamilan	26
Tabel 2.6 Gejala Pada Pasien PE Ringan dan Berat	39
Tabel 2.7 Obat Antihipertensi Untuk Hipertensi dalam Kehamilan	41
Tabel 4.1 Distribusi Sampel Kasus dan Kontrol Berdasarkan Kelompok Umur.....	56
Tabel 4.2 Distribusi Sampel Kasus dan Kontrol Berdasarkan Kelompok Paritas	56
Tabel 4.3 Distribusi Sampel Kasus dan Kontrol Berdasarkan Kelompok Riwayat Abortus	57
Tabel 4.4 Distribusi Sampel Kasus dan Kontrol Berdasarkan Kelompok LILA.....	57
Tabel 4.5 Hubungan Umur dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil.....	58
Tabel 4.6 Hubungan Paritas dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil	59
Tabel 4.7 Hubungan Riwayat abortus dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil	60
Tabel 4.8 Hubungan LILA dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil SPSS.....	82
Lampiran 2. Dokumentasi Pengambilan Data	87
Lampiran 3. Sampel Kasus dan Kontrol	89
Lampiran 4. Permohonan Izin Pengambilan Data Awal.....	95
Lampiran 5. Izin Penelitian.....	97
Lampiran 6. Rekomendasi Izin Penelitian	98
Lampiran 7. Permohonan Izin Penelitian.....	100
Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Meneliti	102
Lampiran 9. Riwayat Hidup.....	103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Andi Nurfadilah Syam

NIM : 70600117004

Judul : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020

Sekitar 810 wanita meninggal dikarenakan komplikasi kehamilan atau persalinan di setiap harinya. Hipertensi merupakan masalah medis yang biasanya muncul selama kehamilan dan akan menimbulkan komplikasi pada 2-3% kehamilan. **Tujuan:** untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020. **Metode:** Penelitian ini menggunakan rancangan *cross sectional* dengan desain penelitian *case control study*. Sebanyak 116 sampel, dengan 58 sampel berada dalam kelompok kasus, dan 58 lainnya berada dalam kelompok kontrol. Analisa data menggunakan analisa univariat dan analisa bivariat dengan uji *Chi-square*. **Hasil:** uji hipotesis dengan metode *Chi-square* didapatkan nilai signifikansi (p) umur ibu sebesar 0.837, paritas 0.186, dan riwayat abortus 0.254. Hasil ini menunjukkan nilai signifikansi $\alpha > 0.05$, yang berarti tidak terdapat hubungan bermakna antara umur ibu, paritas dan riwayat abortus dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. Sedangkan hasil nilai signifikansi (p) Lingkar Lengan Atas (LILA) 0.018. Hasil ini menunjukkan nilai signifikansi $\alpha < 0.05$, yang berarti terdapat hubungan yang bermakna antara LILA dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. **Kesimpulan:** Terdapat hubungan yang bermakna antara LILA dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. Sedangkan umur ibu, paritas dan riwayat abortus tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020.

Kata kunci : *Hipertensi Ibu Hamil, Umur, Paritas, Riwayat abortus, LILA*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Andi Nurfadilah Syam
Student Reg. Number : 70600117004
Judul : The Risk Factors of Hypertensive Disorders in Pregnant Women at Kassi Kassi and Dahlia Health Centers of Makassar City 2019-2020

Every day, an average of 810 women die from the complications of pregnancy and childbirth delivery. Hypertension was considered to be one of the medical problems that occurred during pregnancy. It was evident to occur on about 2 to 3% of pregnant women. **Purpose:** The major purpose of this research was to determine the risk factors of hypertensive disorders in pregnant women at Kassi Kassi and Dahlia Health Centers in the city of Makassar in 2019-2020. **Method:** A cross sectional design with a case control study design was adopted in this study. A total of 116 samples was selected where 58 samples were considered to be the case group samples and 58 samples were considered to be the control group samples. The data were analysed by using univariate analysis and bivariate analysis with Person Chi-square test. **Results:** Based on the hypothesis testing by using the Chi-square method, it was evident that the significance values were 0.837 for the aspect of maternal ages, 0.186 for the aspect of parity, and 0.254 for the aspect of abortion history. These results indicated a significance value of $\alpha > 0.05$ (more than 0.05), which means that there is no significant relationship between hypertensive disorders in pregnant women and the aspects such as maternal ages, parity, and abortion history. Another results of this research indicated that the significance value (p) for the circumference of the upper arm (LILA) was 0.018. This result indicated a significance value of $\alpha < 0.05$ (less than 0.05), which means that there is a significant relationship between hypertensive disorders in pregnant women and the aspect of LILA. **Conclusion:** It could be concluded that there is a significant relationship between hypertensive disorders in pregnant women and the aspect of LILA. Meanwhile, there is no significant relationship between hypertensive disorders in pregnant women and the aspects such as maternal age, parity, and abortion history, particularly at Kassi Kassi and Dahlia Health Centers of Makassar in 2019-2020.

Key words: *Hypertensive disorders in pregnant women, Ages, Parity, Abortion history, LILA.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan yang masih menduduki urutan ketiga tertinggi di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara (Kemenkes RI, 2015). Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan oleh kehamilan atau pengelolaannya dan bukan karena sebab lain (SDKI, 2012). Sekitar 810 wanita meninggal dikarenakan komplikasi kehamilan atau persalinan di setiap harinya (WHO, 2019).

AKI di Indonesia tahun 2019 masih tetap tinggi yaitu 305/100.000 kelahiran. Artinya ada 400.000 ibu meninggal setiap bulan, dan 15.000 meninggal setiap harinya (Profil Kesehatan Indonesia, 2018). Target AKI Indonesia tahun 2015 adalah 102/100.000 kelahiran. Sedangkan AKI di negara-negara ASEAN seperti Brunei Darussalam terdapat 60/100.000 kelahiran, Kamboja 170/100.00 kelahiran, Laos terdapat 357/100.000 kelahiran, Malaysia terdapat 24/100.000 kelahiran, Myanmar 180/100.000 kelahiran, Filipina terdapat 221/100.000 kelahiran, Singapore terdapat

7/100.000 kelahiran, Thailand terdapat 25/100.000 kelahiran, dan Vietnam terdapat 69/100.000 kelahiran (ASEANSecretariat, 2017).

Sekitar 75% kematian ibu disebabkan oleh perdarahan pasca persalinan, infeksi, hipertensi dalam kehamilan, partus lama atau macet dan abortus.. Dimana penyebab kematian ibu yang disebabkan oleh pendarahan sekitar 32% dan 26% disebabkan oleh hipertensi yang disertai dengan kejang yang menyebabkan kematian bagi ibu (Profil Kesehatan Indonesia, 2018). Di Indonesia terdapat 4.226 kematian ibu pada tahun 2018-2019 terdapat 1.066 yang meninggal akibat hipertensi dalam kehamilan (Kemenkes RI, 2020).

Hipertensi merupakan salah satu masalah medis yang biasanya muncul selama kehamilan dan akan menimbulkan komplikasi pada 2-3% kehamilan (Prawirohardjo, 2016). Hipertensi dalam kehamilan juga mempengaruhi sekitar 10% dari semua perempuan hamil di seluruh dunia. Hipertensi pada kehamilan dapat menyebabkan kekurangan cairan plasma yang disebabkan gangguan pembuluh darah, gangguan ginjal, gangguan hematologis, gangguan kardiovaskular, gangguan hati, gangguan pernafasan, sindrom HELLP (*hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count*), pertumbuhan janin terhambat, preamaturitas serta kematian janin dalam rahim (Imaroh, Nugraheni, 2018).

Terdapat banyak faktor risiko untuk terjadinya hipertensi dalam kehamilan seperti, primigravida, mola hidatidosa, kehamilan multiple, diabetes melitus, hidrops fetalis, bayi besar, umur yang kurang dari 20 tahun atau lebih dari 30 tahun, riwayat keluarga yang pernah menderita hipertensi dalam kehamilan, riwayat hipertensi sebelumnya, penyakit ginjal, serta obesitas (Prawirohardjo, 2016).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu jumlah ibu hamil yang mengalami hipertensi tahun 2019 sebanyak 901 orang (Dinkes, 2019). Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 menunjukkan prevalensi kejadian hipertensi di Kota Makassar yaitu sebesar 8% atau terdapat 8 kasus per 1000 penduduk (Sukfitrianty, Aswadi and Lagu, 2016).

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari data kunjungan pemeriksaan kehamilan, jumlah ibu hamil yang mengalami hipertensi di Puskesmas Kassi Kassi tahun 2019 sebanyak 22 orang dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 69 orang. Sedangkan di Puskesmas Dahlia jumlah ibu hamil yang mengalami hipertensi tahun 2019 sebanyak 7 orang dan tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 11 orang. Hipertensi dalam kehamilan merupakan masalah dalam kehamilan yang memerlukan perhatian khusus dan merupakan keadaan darurat jika tidak ditangani dengan segera.

Berdasarkan masalah yang ditemukan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang berhubungan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020?

C. Hipotesis

- 1) Terdapat hubungan antara umur ibu dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020.
- 2) Terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020.

- 3) Terdapat hubungan antara riwayat abortus dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020.
- 4) Terdapat hubungan antara LILA dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020.

D. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Hipertensi

a) **Definisi** : Hipertensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tekanan darah pemeriksaan terakhir ibu hamil mencapai $\geq 140/90$ mmHg atau lebih (Prawirohardjo, 2018).

b) Kriteria Objektif

Hipertensi : Apabila tekanan darah pada pemeriksaan terakhir mencapai $\geq 140/90$ mmHg atau lebih.

Tidak Hipertensi : Apabila tekanan darah pada pemeriksaan terakhir kurang dari $\geq 140/90$ mmHg.

Umur

a) **Definisi** : Umur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah waktu hidup ibu yang dihitung mulai sejak lahir sampai pada saat kehamilan (Chunningham, 2013).

b) Kriteria Objektif

Berisiko : Kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun

Tidak Berisiko : 20 tahun sampai dengan 35 tahun

Paritas

a) **Definisi** : Paritas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan baik yang lahir hidup maupun lahir mati (Prawirohardjo, 2016).

b) Kriteria Objektif

Berisiko : Paritas <2 dan >4

Tidak Berisiko : Paritas 2 – 4 (Prawirohardjo, 2016).

Riwayat Abortus

a) **Definisi**: Abortus adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar rahim yaitu kurang dari 20 minggu usia kehamilan dengan berat janin kurang dari 500 gram (Prawirohardjo, 2016).

b) Kriteria Objektif:

Berisiko : Apabila responden pernah mengalami

Tidak berisiko : Apabila responden tidak pernah mengalami

LILA

a) **Definisi** : Lingkar Lengan Atas (LILA) merupakan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Pengukuran

LILA dilakukan pada pertengahan antara pangkal lengan atas dan ujung siku dalam ukuran cm (centi meter)(Wahyuni, 2019).

b) Kriteria Objektif :

Berisiko : -Obesitas: >28,5 cm

Tidak berisiko : -Normal: 23,5-28,5 cm

-*Underweight*: <23,5 cm (Almatsier, 2011).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini membahas mengenai Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia. Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berdasarkan buku registrasi kunjungan pemeriksaan kehamilan.

E. Kajian Pustaka

Sebagai bahan penguat penelitian, penulis mengutip beberapa penelitian yang relevan :

1. Rohmani, Taufiqy, dan Puspitasari (2013) dalam penelitian yang berjudul *Faktor Resiko Kejadian Hipertensi Dalam Kehamilan di RSUD Tulungrejo*. Penelitian ini terdiri dari 531 sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling* yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yang ada. Desain penelitian ini menggunakan studi observasional dengan metode *cross sectional*. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara usia

maternal, dan indeks massa tubuh dan tidak terdapat hubungan antara graviditas dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil.

2. Rahayu, Yunarsih (2020) dalam penelitian yang berjudul *Faktor Pendukung Terjadinya Pre Eklampsia di RSUD Kabupaten Kediri*. Desain penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* dengan rancangan *case control study*. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara Purposive Sampling dan didapatkan jumlah sampel sebesar 25 responden sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Chi-Square*. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu, riwayat abortus, obesitas dan tidak terdapat hubungan antara status gravida terhadap kejadian preeklampsia pada ibu hamil.
3. Radjamuda, Montalau (2014) dalam penelitian yang berjudul *Faktor-Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Poli Klinik Obs-Gin Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuang Kota Manado*. Desain penelitian yang digunakan adalah *analitik korelasi* dengan pendekatan *retrospektif*. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil dengan hipertensi kehamilan yang berjumlah 207 ibu hamil. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara umur dan paritas dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil.

4. Sinambela, Sari (2018) dalam penelitian yang berjudul *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hipertensi Pada Kehamilan Di Wilayah Kerja Puskesmas Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Dari Bulan Januari Sampai Desember Tahun 2018*. Desain penelitian ini ialah *observasional analitik* dengan rancangan penelitian *case control*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang mengalami hipertensi pada tahun 2018. Jumlah kasus ibu yang mengalami hipertensi sebanyak 36 ibu hamil sedangkan jumlah kontrol ibu yang tidak mengalami hipertensi sebanyak 36 ibu. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara umur, paritas, dan obesitas terhadap hipertensi pada kehamilan.
5. Anas (2013) dalam penelitian yang berjudul *Hubungan Lingkar Lengan Atas (LILA) Pada Ibu Hamil Dengan Angka Kejadian Preeklampsia di RS. PKU Muhammadiyah Surakarta*. Metode penelitian ini yaitu studi *observasional analitik* dengan pendekatan *Cross Sectional*. Dari analisis statistik diperoleh nilai Ratio Prevalensi (RP) = 0,85 artinya bahwa kadar lemak yang dapat diukur dengan LILA bukan merupakan faktor risiko utama dalam kejadian preeklampsia. Dari Uji Chi-Square diperoleh nilai p sebesar 0,000. Pada hasil penelitian ini didapatkan terdapat hubungan antara lingkar lengan atas (LILA) pada ibu hamil dengan angka kejadian preeklampsia di RS. PKU Muhammadiyah Surakarta.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui hubungan antara umur ibu dan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020..
- 2) Untuk mengetahui hubungan antara paritas dan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020..
- 3) Untuk mengetahui hubungan antara riwayat abortus dan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020.
- 4) Untuk mengetahui hubungan antara LILA dan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020.
- 5) Untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang paling berpengaruh dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020.

F. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian dan menerapkan ilmu yang telah didapat di bidang kesehatan terutama mengenai faktor risiko yang menyebabkan terjadinya hipertensi dalam kehamilan.

b. Bagi Pengetahuan

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan salah satu bahan acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang kesehatan ibu dan anak, serta dapat memberikan informasi ilmiah tentang faktor risiko yang menyebabkan terjadinya hipertensi dalam kehamilan.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi bagi masyarakat khususnya untuk para ibu hamil agar dapat mengetahui dan memahami faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dalam kehamilan.

d. Instansi

Sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian tentang kasus ibu dan anak, sehingga dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi

1. Definisi

Menurut *American Society of Hypertension* (ASH) hipertensi adalah kumpulan beberapa gejala kardiovaskuler yang progresif sebagai akibat dari kondisi lain yang kompleks dan saling berhubungan, Menurut WHO hipertensi merupakan peningkatan tekanan sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan diastolik ≥ 95 mmHg, Sedangkan menurut JNC VII hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah di atas 140/90 mmHg (Nuraini, 2015).

Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan gagal ginjal, penyakit jantung koroner serta stroke, jika tidak dideteksi secara dini dan tidak mendapat pengobatan yang memadai (Kemenkes RI, 2014).

Menurut *Joint National Comitten on Detection Evolution and Treatment of High Blood Pressure* VIII dalam (Kayce Bell, June Twiggs and Bernie R. Olin, 2015) mengklasifikasikan tekanan darah pada orang dewasa usia >18 tahun sebagai berikut:

Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi

Kategori	Tekanan Darah Sistolik (mmHg)	Tekanan Darah Diastolik (mmHg)
Normal	<120	<80
Pre-Hipertensi	120-139	80-89
Hipertensi derajat I	140-159	90-99
Hipertensi derajat II	≥160	>100

Sumber: (Kayce Bell, June Twiggs and Bernie R. Olin, 2015)

2. Etiologi

Berdasarkan penyebabnya hipertensi terbagi menjadi hipertensi primer (esensial) dan hipertensi sekunder.

1. Hipertensi Primer

Lebih dari 90% pasien yang memiliki tekanan darah tinggi mengalami hipertensi primer. Hipertensi primer tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol dengan terapi yang tepat. Dalam hal ini, faktor genetik mungkin berperan penting untuk pengembangan hipertensi primer dan bentuk tekanan darah yang tinggi cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun (Kayce Bell, June Twiggs and Bernie R. Olin, 2015).

2. Hipertensi Sekunder

Kurang dari 10% pasien yang memiliki tekanan darah tinggi mengalami hipertensi sekunder. Penyebab hipertensi sekunder seperti penyakit komorbid atau obat-obatan. Penyakit ginjal kronis atau

penyakit renovaskular adalah penyebab sekunder yang paling sering (Kayce Bell, June Twiggs and Bernie R. Olin, 2015).

Tabel 2.2 Penyebab Hipertensi Sekunder

Penyakit	Obat-obatan dan lainnya
Penyakit ginjal kronik	Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs): ibu profen, naproxen
Tumor kelenjar adrenal	Pil KB
<i>Obstructive sleep apnea</i>	Dekongestan: Pseudoephedrine, phenylephrine
Penyakit paratiroid	Kokain
Feokromositoma	Amfetamin: prednisolone, methylprednisolone, dexamethasone, hydrocortisone
Penyakit tiroid	Makanan: Sodium, etanol, <i>licorice</i>
Aldosterinism primer	Alkohol
Penyakit renovaskuler	

Sumber: (Kayce Bell, June Twiggs and Bernie R. Olin, 2015)

3. Manifestasi Klinis

Hipertensi sering disebut sebagai pembunuh gelap (silent killer), karena penyakit tersebut dapat mematikan, tanpa disertai dengan gejala. Adapun gejala hipertensi yang muncul dianggap sebagai gangguan biasa yaitu, penderita berprasangka dalam keadaan sehat yang membuat penderita terlambat untuk ditangani karena tidak mengetahui dirinya mengidap hipertensi (Artiyaningrum, 2016).

Pada kasus hipertensi berat, gejala yang dialami penderita antara lain: sakit kepala, palpitasi, kelelahan, mual, muntah, cemas, keringat berlebihan, tremor otot, nyeri dada, epitaksis, pandangan kabur atau ganda, tinitus (telinga berdenging), dan kesulitan tidur (Yusiana and Rejeki, 2015).

4. Penatalaksanaan

a. Non Farmakologis

Intervensi non-farmakologis merupakan salah satu cara efektif untuk menurunkan tekanan darah. Salah satu diet yang ditujukan untuk penderita hipertensi adalah DASH (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*) yaitu, diet rendah garam, suplemen kalium, peningkatan aktivitas fisik, dan pengurangan konsumsi alkohol (Whelton *et al.*, 2018).

Tabel 2.3 Intervensi nonfarmakologis dalam tatalaksana hipertensi

	Intervensi Non-Farmakologis	Dosis	Perkiraan Penurunan TD Sistolik	
			Hipertensi	Normotensi
Penurunan berat badan	Berat/lemak tubuh	Tujuan utama adalah berat badan ideal, minimal penurunan 1 kg pada individu overweight. Diharapkan penurunan 1 mmHg / 1 kg penurunan berat badan	±5 mmHg	± 2/3 mmHg
Diet sehat	DASH	Diet kaya buah, sayur, gandum, rendah lemak (rendah lemak jenuh dan total).	± 11 mmHg	± 3 mmHg
Diet rendah garam	Diet natrium	Target optimal < 1500 mg/hari, minimal < 1000 mg/hari	± 5/6 mmHg	± 2/3 mmHg
Diet tinggi kalium	Diet kalium	Target 3500 – 5000 mg/hari, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan kaya kalium.	± 4/5 mmHg	± 2 mmHg
Aktivitas fisik	Aerobik	90 – 150 menit/minggu, 65-75% <i>heart rate reserve</i> .	± 5/8 mmHg	± 2/4 mmHg
	Dynamic resistance	90 – 150 menit/minggu, 50-80% minimal 1 repetisi, 6 gerakan, 3 set / gerakan, 10 repetisi / set.	± 4 mmHg	± 2 mmHg
	Isometric resistance	4 x 2 menit, 1 menit istirahat antar gerakan, 30-40% kontraksi volunter maksimal, 3 sesi / minggu selama 8 – 10 minggu.	± 5 mmHg	± 4 mmHg
Pembatasan konsumsi alkohol	Konsumsi alkohol	Ditujukan untuk pecandu alkohol, Laki-laki: ≤ 2 gelas/hari Perempuan: ≤ 1 gelas/hari.	± 4 mmHg	± 3 mmHg

Sumber: (Whelton *et al.*, 2018)

b. Farmakologi

Terapi hipertensi direkomendasikan sebagai pencegahan sekunder penyakit kardiovaskuler rekuren pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler dengan tekanan darah sistolik 130 mmHg atau diastolik 80 mmHg (Whelton *et al.*, 2018).



Tabel 2.4 Obat antihipertensi yang direkomendasikan dalam JNC VIII

Antihypertensive Medication	Initial Daily Dose, mg	Target Dose In RCTs Reviewed, mg	No. of Doses per Day
ACE Inhibitors			
Captopril	50	150-200	2
Enalapril	5	20	1-2
Lisinopril	10	40	
Angiotensin receptor Blockers			
Eprosartan	400	600-800	1-2
Candesartan	4	12-32	1
Losartan	50	100	1-2
Valsartan	40-80	160-132	1
Irbesartan	75	300	1
β-Blockers			
Atenolol	25-50	100	1
Metoprolol	50	100-200	1-2
Calcium channel blockers			
Amlodipine	25	10	1
Diltiazem	120-180	360	1
Nifedipine	10	20	1-2
Thiazide-type diuretics			
Bendroflumethiazide	5	10	1
Chlorthalidone	12.5	12.5-25	1
Hydrochlorothiazide	12.5-25	25-100	1-2
Indapamide	1.25	1.25-2.5	1

Sumber: (James *et al.*, 2014)

B. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Pengertian Kehamilan

Menurut *Federasi Obstetri Ginekologi Internasional*, kehamilan merupakan proses fertilisasi (penyatuan) dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, dimana trimester kesatu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 13-27 minggu, dan trimester ketiga berlangsung 28-40 minggu (Prawirohardjo, 2016).

2. Proses Kehamilan

Dalam (Manuaba, 2013) Proses kehamilan merupakan proses yang berkesinambungan dan terdiri dari:

a. Ovulasi

Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh sistem hormonal yang kompleks. Selama masa subur yang berlangsung 20 sampai 35 tahun, hanya 420 buah ovum yang dapat mengikuti proses pematangan dan terjadi ovulasi. Dengan pengaruh hormone LH (*luteinizing hormone*) yang semakin besar dan fluktuasi yang mendadak, dan terjadi proses pelepasan ovum yang disebut ovulasi.

b. Spermatozoa

Sebagian besar spermatozoa mengalami kematian dan hanya beberapa ratus yang dapat mencapai tuba fallopi. Spermatozoa yang masuk ke dalam alat genitalia wanita dapat hidup selama tiga hari.

c. Konsepsi

Pertemuan inti ovum dengan inti spermatozoa disebut konsepsi atau fertilisasi dan akan membentuk zigot yang terjadi di tuba uterina pars ampullaris. Pada proses ovulasi ovum dilepaskan dan akan dibuahi setelah 12 jam dan hidup selama 48 jam. Kedua inti ovum dan inti spermatozoa bertemu dengan membentuk zigot.

d. Proses Nidasi atau Implantasi

Zigot terbentuk dalam beberapa jam dan telah mampu membelah dirinya menjadi dua dan seterusnya. Nidasi atau implantasi terjadi pada hari ke-6 sampai 7 setelah konsepsi. Pada saat tertanamnya blastula ke dalam endometrium, akan muncul flek atau bercak darah dalam jumlah sedikit.

e. Pembentukan Plasenta

Sel trofoblas menghancurkan endometrium sampai terjadi pembentukan plasenta yang berasal dari primer vili korialis. Ruang amnion dengan cepat mendekati korion sehingga jaringan yang terdapat diantara amnion dan embrio padat dan berkembang menjadi tali pusat.

3. Tanda dan Gejala Kehamilan

Tanda dan gejala kehamilan menurut (Manuaba, 2013) dibagi menjadi 3 bagian, yaitu;

1) Tanda Dugaan Kehamilan

a. *Amenorrhoe* (tidak haid)

Pada wanita hamil umumnya memberikan gejala tidak haid, sehingga dapat diketahui tanggal haid hari pertama dan haid terakhir (HPHT) yang digunakan sebagai penanda untuk menentukan taksiran persalinan.

b. Mual dan muntah

Gejala ini sering terjadi pada trimester pertama hingga bulan terakhir yang biasanya terjadi pada pagi hari (*morning sickness*).

c. Mengidam (ingin makanan khusus)

Menginginkan makanan khusus juga merupakan gejala pada wanita hamil yang sering terjadi pada trimester pertama kehamilan dan akan menghilang di usia kehamilan yang sudah mencapai trimester tiga.

d. *Anoreksia* (tidak nafsu makan)

Gejala ini hanya berlangsung pada trimester pertama kehamilan dan akan menghilang di usia kehamilan yang memasuki trimester tiga.

e. Mamae menjadi tegang dan membesar

Keadaan seperti ini dapat disebabkan karena adanya pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang merangsang duktus dan alveoli payudara.

f. Sering buang air kecil

Gejala seperti ini dapat disebabkan karena kandung kemih tertekan oleh uterus yang sudah mulai membesar. Gejala ini akan hilang pada trimester dua dan gejala ini bisa kembali terjadi di akhir trimester tiga kehamilan dikarenakan kandung kemih tertekan oleh kepala janin.

g. Konstipasi atau obstipasi

Gejala ini bisa terjadi karena tonus otot usus menurun yang disebabkan oleh adanya hormon steroid yang dapat menyebabkan kesulitan buang air besar.

h. *Pigmentasi* (perubahan warna kulit)

Pada areola mamae, genital, chloasma, serta linea alba akan berwarna lebih tegas, melebar, dan bertambah gelap pada perut bagian bawah.

i. *Epulis*

Gejala yang muncul yaitu gusi berdarah dan sering terjadi di trimester awal kehamilan.

j. *Varises* (pemekaran vena-vena)

Adanya pengaruh hormon esterogen dan progesteron yang menyebabkan pembesaran pembuluh darah vena yang biasanya terjadi di sekitar genitalia eksterna, kaki, betis serta payudara.

2) Tanda Kemungkinan Kehamilan

a. Perut membesar

Perut yang membesar dapat dijadikan sebagai tanda kemungkinan kehamilan apabila usia kehamilan sudah memasuki lebih dari 14 minggu.

b. Uterus membesar

Uterus membesar dapat terjadi karena perubahan dalam bentuk, besar, dan konsistensi dari rahim.

c. Tanda *Hegar*

Konsistensi rahim dalam kehamilan berubah menjadi lunak terutama daerah isthmus. Pada minggu pertama, isthmus uteri mengalami hipertrofi seperti korpus uteri. Hipertrofi isthmus pada trimester pertama mengakibatkan isthmus menjadi panjang dan lebih lunak.

d. Tanda *Chadwick*

Perubahan warna menjadi kebiruan atau keunguan pada vulva, vagina, dan serviks. Perubahan warna ini disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen.

e. Tanda *Piscaseck*

Uterus mengalami pembesaran, dimana pembesaran tersebut memiliki permukaan yang tidak rata tetapi di daerah telur bernidasi lebih cepat tumbuhnya. Hal ini menyebabkan uterus membesar ke salah satu bagian.

f. Tanda *Braxton Hicks*

Tanda *braxton hicks* merupakan tanda khas uterus dalam kehamilan yang dapat terjadi pada keadaan uterus yang membesar tetapi tidak ada kehamilan (mioma uteri).

g. Teraba *Ballotement*

Ballotement merupakan fenomena bandul atau pantulan balik yang menandakan adanya janin di dalam uterus.

3) Tanda pasti kehamilan

a. Gerakan janin yang dapat dilihat, dirasa, atau diraba juga bagian-bagian janin.

b. Denyut jantung janin yang bisa didengar dengan stetoskop monoral leanec, dicatat dan didengar dengan alat doppler dicatat dengan fotoelektro kardiograf dan dilihat pada ultrasonografi.

- c. Terlihat tulang-tulang janin dalam pemeriksaan fotorontgen.

4. Gejala dan Tanda Bahaya Selama Kehamilan

Gejala dan tanda bahaya kehamilan menurut Prawirohardjo (2016) sebagai berikut:

- a. Perdarahan

Perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan <20 minggu biasanya disebabkan oleh abortus dan perdarahan pada kehamilan >20 minggu disebabkan oleh plasenta previa.

- a. Preeklampsia

Usia kehamilan >20 minggu yang disertai dengan peningkatan tekanan darah di atas normal disebut dengan preeklampsia.

- b. Nyeri hebat di daerah abdominopelvikum

Nyeri ini terjadi di daerah abdominopelvikum yang biasanya muncul di trimester dua atau tiga.

C. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi Ibu Hamil

1. Definisi Hipertensi Kehamilan

Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK) dapat didefinisikan sebagai tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg dalam dua kali pengukuran atau lebih (Cunningham *et al.*, 2014). Hipertensi dalam kehamilan merupakan 5-15% penyulit kehamilan dan merupakan salah satu dari tiga penyebab tertinggi mortalitas dan morbiditas ibu bersalin (Prawirohardjo, 2016).

2. Klasifikasi Hipertensi dalam Kehamilan

Hipertensi pada kehamilan dapat digolongkan menjadi: preeklampsia/eklampsia, hipertensi kronis pada kehamilan, hipertensi kronis disertai preeklampsia, dan hipertensi gestasional (Malha *et al*, 2016).

Tabel 2.5 Klasifikasi hipertensi dalam kehamilan

Klasifikasi	Usia Kehamilan (minggu)	Tekanan darah (mmHg)	Proteinuria	Kejang
Hipertensi Gestasional	>20	>140/90	Tidak ada	Tidak ada
Preeklampsia Sedang	>20	>140/90	<5 g/24 h	Tidak ada
Preeklampsia Berat	>20	>160/110	<5 g/24 h	Tidak ada
Eklampsia	>20	>160/110	<5 g/24 h	Ada
Hipertensi Kronik	Sudah ada sejak <20	>140/90	Tidak ada	Tidak ada
Superimposed Preeclampsia	<20	>140/90	Ada	Tidak ada

Sumber: (Ankichetty *et al.*, 2013)

3. Faktor Risiko

Menurut (Prawirohardjo, 2016) beberapa faktor risiko dari hipertensi pada kehamilan:

1) Faktor Maternal

a. Umur

Umur ibu pada waktu hamil merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelangsungan kehamilan dan juga merupakan salah

faktor risiko terjadinya hipertensi. Umur ibu yang terlalu muda (≤ 20 tahun) memiliki risiko yang besar untuk terjadinya hipertensi. Hal ini disebabkan karena ibu yang hamil pada usia yang terlalu muda dari segi biologis perkembangan alat-alat reproduksinya belum optimal sedangkan pada usia tua (≥ 35 tahun) akan menambah terjadinya komplikasi kehamilan. Dengan bertambahnya umur Ibu, mengakibatkan absorpsi tubuh cenderung memburuk dan alat reproduksinya sudah mulai degenerasi sehingga memungkinkan terjadinya komplikasi (Sukfitrianty, Aswadi and Lagu, 2016).

b. Paritas

Primigravida lebih berisiko untuk mengalami hipertensi dari pada multigravida karena preeklampsia timbul pada wanita yang pertama kali terpapar vilus korion. Hal ini terjadi karena pada wanita tersebut mekanisme imunologik pembentukan *blocking antibody* yang dilakukan oleh HLA-G (*human leukocyte antigen G*) terhadap antigen plasenta belum terbentuk secara sempurna, sehingga proses implantasi trofoblas ke jaringan desidua ibu menjadi terganggu.

Primigravida juga rentan mengalami stress dalam menghadapi persalinan yang akan menstimulasi tubuh untuk mengeluarkan kortisol. Efek kortisol adalah meningkatkan respon simpatis, sehingga curah jantung dan tekanan darah juga akan meningkat (Denantika, Serudji and Revilla, 2015). Sedangkan

grandemultigravida Pada usia > 35 tahun terjadi proses degeneratif yang mengakibatkan perubahan struktural dan fungsional yang terjadi pada pembuluh darah perifer yang bertanggung jawab terhadap perubahan tekanan darah, sehingga lebih rentan mengalami preeklampsia (Sutrimah, 2015).

c. Obesitas

Obesitas merupakan masalah gizi karena kelebihan kalori, biasanya disertai kelebihan lemak dan protein hewani, kelebihan gula dan garam yang kelak bisa merupakan faktor risiko terjadinya berbagai jenis penyakit degeneratif, seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, reumatik dan berbagai jenis keganasan (kanker) dan gangguan kesehatan lain. Hubungan antara berat badan ibu dengan risiko preeklampsia bersifat progresif, meningkat dari 4,3% untuk wanita dengan indeks masa tubuh kurang dari 19,8 kg/m² terjadi peningkatan 13 menjadi 13,3 % untuk mereka yang indeksnya ≥ 35 kg/m² (Cunningham, 2014).

d. Riwayat Hipertensi

Riwayat hipertensi kronis yang dialami selama kehamilan dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi dalam keamilan, dimana komplikasi tersebut dapat mengakibatkan preeklampsia dan hipertensi kronis dalam kehamilan (Prawirohardjo, 2016).

e. Riwayat keluarga yang menderita hipertensi

Risiko menderita hipertensi sangat tinggi apabila dalam keluarga memiliki riwayat atau keturunan hipertensi. Riwayat keluarga merupakan masalah yang memicu terjadinya hipertensi. Jika seorang dari orangtua memiliki riwayat hipertensi maka sepanjang hidup memiliki kemungkinan 25% terkena hipertensi (Makmur and Fitriahadi, 2020).

f. Riwayat Abortus

Riwayat abortus berpengaruh terhadap kasus hipertensi pada ibu hamil. Hal ini berhubungan dengan adanya luka pada endometrium dan miometrium. Adanya luka pada uterus pada kasus abortus diperberat dengan tindakan kuretase yang dilakukan. Oleh sebab itu, riwayat abortus pada kehamilan sebelumnya dikaitkan dengan adanya hipertensi (Gustri dkk, 2016).

g. Penyakit ginjal

Risiko preeklampsia meningkat secara bermakna pada perempuan hamil yang dikaitkan dengan morbiditas maternal dan fetal. Gambaran sindroma preeklampsia mencakup memburuknya hipertensi dan proteinuria secara bermakna (dua kali lipat), diiringi dengan penurunan jumlah platelet atau peningkatan enzim hati. Biasanya sindroma ini muncul pada trimester ketiga, namun pada

perempuan dengan penyakit ginjal kronik, risiko lebih besar pada trimester kedua. Risiko buruk pada kehamilan berhubungan dengan derajat disfungsi ginjal (Makmur and Fitriahadi, 2020).

2) Faktor Kehamilan

Faktor kehamilan seperti mola hidatidosa, kehamilan multipel, diabetes melitus, hidrops fetalis, bayi besar berhubungan dengan hipertensi kehamilan (Prawirohardjo, 2016). Faktor kehamilan ganda terhadap preeklampsia frekuensi relatif kecil hal ini karena kejadian kehamilan ganda yang jarang terjadi. Meskipun kasusnya jarang, namun berisiko terhadap preeklampsia berat (Komalasari and Rahayu, 2015). Kehamilan ganda atau kehamilan kembar adalah kehamilan dengan dua janin atau lebih. Kehamilan kembar adalah satu kehamilan dengan dua janin. Kehamilan kembar dapat memberikan resiko yang lebih tinggi terhadap bayi dan ibu. Pertumbuhan janin ganda lebih sering mengalami gangguan dibandingkan janin tunggal seperti kejadian preeklampsia akibat adanya beban penambahan sirkulasi darah kejanin (ZA, Renjani and Astuti, 2019).

Berdasarkan penelitian (Nurfatihah *et al.*, 2020) faktor risiko untuk terjadinya hipertensi pada ibu hamil adalah: umur ibu, pendidikan, paritas, riwayat penggunaan alat kontrasepsi, dan riwayat hipertensi keluarga. Sedangkan dalam penelitian (Imaroh, 2018) faktor risiko hipertensi kehamilan yaitu: umur ibu, pendidikan, pekerjaan,

penghasilan, gravida, riwayat hipertensi keluarga, riwayat abortus, dan indeks massa tubuh.

4. Patofisiologi Hipertensi Kehamilan

Penyebab hipertensi dalam kehamilan hingga kini belum diketahui dengan jelas. Banyak teori telah dikemukakan tentang terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Teori-teori yang sekarang banyak dianut adalah:

a) Teori kelainan vaskularisasi plasenta

Pada kehamilan normal, dengan sebab yang belum jelas, terjadi invasi trofoblas ke dalam lapisan otot arteri spiralis yang menimbulkan degenerasi lapisan otot tersebut, sehingga terjadi dilatasi arteri spiralis. Invasi trofoblas juga memasuki jaringan sekitar arteri spiralis, sehingga jaringan matriks menjadi gembur dan memudahkan lumen spiralis mengalami distensi dan dilatasi. Distensi dan vasodilatasi lumen arteri spiralis ini memberi dampak penurunan tekanan darah, penurunan resistensi vaskular, dan peningkatan aliran darah pada utero plasenta. Akibatnya, aliran darah ke janin cukup banyak dan perfusi jaringan juga meningkat, sehingga dapat menjamin pertumbuhan janin dengan baik.

Proses ini dinamakan "*remodeling arteri spiralis*".

Pada hipertensi dalam kehamilan tidak terjadi invasi sel-sel trofoblas pada lapisan otot arteri spiralis dan jaringan matriks sekitarnya. Lapisan otot arteri spiralis menjadi tetap kaku dan keras

sehingga lumen arteri spiralis tidak memungkinkan mengalami distensi dan vasodilatasi. Akibatnya, arteri spiralis mengalami vasokonstriksi, dan terjadi kegagalan “*remodeling arteri spiralis*”, sehingga aliran darah uteroplasenta menurun, dan terjadilah hipoksia dan iskemia plasenta (Prawirohardjo, 2016).

b) Teori intoleransi imunologik

Pada perempuan hamil normal, respons imun tidak menolak adanya hasil konsepsi yang bersifat asing. Hal ini disebabkan adanya *human leukocyte antigen protein G* (HLA-G) menolak hasil konsepsi atau plasenta. Adanya HLA-G pada plasenta dapat melindungi trofoblas janin dari lisis oleh sel *Natural Killer* (NK) ibu. Selain itu, adanya HLA-G akan mempermudah invasi sel trofoblas ke dalam jaringan desidua ibu. Jadi, HLA-G merupakan prakondisi untuk terjadinya invasi trofoblas ke dalam jaringan desidua ibu, disamping untuk menghadapi sel *Natural Killer*.

Ada plasenta hipertensi dalam kehamilan, terjadi penurunan ekspresi HLA-G. Berkurangnya HLA-G di desidua daerah plasenta, menghambat invasi trofoblas ke dalam desidua. Invasi trofoblas sangat penting agar jaringan desidua menjadi lunak sehingga memudahkan terjadinya dilatasi arteri spiralis. HLA-G juga merangsang produksi sitokin, sehingga memudahkan terjadinya reaksi inflamasi.

Kemungkinan terjadi *Immune-Maladaption* pada preeklampsia. Pada awal trimester kedua kehamilan perempuan yang mempunyai kecenderungan terjadinya preeklampsia, ternyata mempunyai proporsi *Helper Sel* yang lebih rendah di banding pada normotensif (Prawirohardjo, 2016).

c) Teori Stimulus Inflamasi

Teori Stimulus Inflamasi Pada kehamilan normal plasenta juga melepaskan debris trofoblas, sebagai sisa-sisa proses apoptosis dan nekrotik trofoblas, akibat reaksi stress oksidatif. Bahan-bahan ini sebagai bahan asing yang kemudian merangsang timbulnya proses inflamasi. Pada kehamilan normal, jumlah debris trofoblas juga meningkat. Makin banyak sel trofoblas plasenta, misalnya pada plasenta besar pada hamil ganda, maka stress oksidatif akan sangat meningkat, sehingga jumlah sisa debris trofoblas juga makin meningkat. Keadaan ini menimbulkan beban reaksi inflamasi dalam darah ibu menjadi jauh lebih besar, dibanding reaksi inflamasi pada kehamilan normal. Respons inflamasi ini akan mengaktivasi sel endotel dan sel-sel makrofag/granulosit, yang lebih besar pula, sehingga terjadi reaksi sistemik inflamasi yang menimbulkan gejala-gejala preeklampsia pada ibu (Prawirohardjo, 2016).

5. Manifestasi Klinis

a. Preeklampsia

Preeklampsia adalah sindrom klinis pada masa kehamilan yaitu setelah kehamilan 20 minggu yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah ($\geq 140/90$ mmHg) dan proteinuria (0,3 gram/hari) (Myrtha, 2015). Preeklampsia juga dapat disertai gejala sakit kepala, perubahan visual, nyeri epigastrium, dan dyspnea (Karthikeyan, 2015).

Tabel 2.6 Gejala Pada Pasien Preeklampsia Ringan dan Berat

Gejala	PE Ringan	PE Berat
Tekanan darah	Sistolik ≥ 140 mmHg dan diastolik ≥ 90 mmHg, lebih dari 20 minggu usia kehamilan	Sistolik ≥ 160 mmHg dan diastolik ≥ 110 mmHg dalam pemeriksaan kualitatif
Proteinuria	$\geq 0,3$ g/24 jam atau $\geq 1+$ dipstick	≥ 5 g/24 jam atau $\geq 3+$ dipstick
Lainnya		<ul style="list-style-type: none">- Oligouria- Gangguan penglihatan dan serebral- Edema paru dan sianosis- Nyeri epigastrium atau kuadran kanan atas- Gangguan fungsi hepar- Pertumbuhan janin terhambat

Sumber: (Portelli and Baron, 2018)

b. Eklampsia

Eklampsia adalah terjadinya kejang pada wanita dengan preeklampsia yang tidak dapat dikaitkan dengan penyebab lainnya (Karthikeyan, 2015). Eklampsia merupakan keadaan darurat yang

dapat mengancam jiwa, terjadi pada sebelum, saat, dan setelah persalinan (antepartum, intrapartum, postpartum). Eklampsia didahului dengan sakit kepala dan perubahan penglihatan, kemudian kejang selama 60-90 detik (Leeman, L., Dresang, L.T., and Fontaine, 2016).

Menurut (Prawirohardjo, 2016) kejang pada eklampsia dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu:

1. Tingkat awal berlangsung sekitar 30 detik. Pada tingkat ini mata penderita terbuka tanpa melihat, kelopak mata dan tangan bergetar dan kepala diputar kekanan atau kekiri.
2. Tingkat kejang tonik berlangsung 30 detik. Pada tingkat ini seluruh otot menjadi kaku, wajah kelihatan kaku, tangan menggenggam dan kaki bengkok ke dalam. Pernafasan berhenti, wajah menjadi sianotik dan lidah dapat tergigit. Stadium ini akan disusul oleh tingkat kejang klonik.
3. Tingkat kejang klonik yang berlangsung antara 1-2 menit. Spasme tonik menghilang, semua otot berkontraksi dan berulang-ulang dalam tempo yang cepat. Mulut membuka dan menutup dan lidah dapat tergigit lagi. Bola mata menonjol. Dari mulut keluar lidah yang berbusa, wajah menunjukkan kongesti dan sianotis. Setelah kejang berhenti, pasien bernafas dengan mendengkur.
4. Tingkat koma, dimana lamanya ketidaksadaran tidak selalu sama. Secara perlahan penderita biasa menjadi sadar lagi.

c. Hipertensi Kronik

Hipertensi kronis pada kehamilan apabila tekanan darahnya $\geq 140/90$ mmHg, terjadi sebelum kehamilan atau ditemukan sebelum 20 minggu kehamilan (Malha *et al.*, 2016). Hipertensi kronik ditandai dengan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg, terdapat riwayat hipertensi sebelum hamil, atau diketahui adanya hipertensi pada usia kehamilan < 20 minggu. Tidak ada proteinuria (diperiksa dengan tes celup urin), dapat disertai keterlibatan organ lain, seperti mata, jantung, dan ginjal (Mochtar, 2012).

d. Hipertensi Kronik *Superimposed Preeclampsia*

Superimposed preeklampsia pada hipertensi kronik yaitu adanya riwayat hipertensi kronik (sudah ada sebelum usia kehamilan 20 minggu). Tes celup urin menunjukkan proteinuria $> +1$ atau trombosit < 10.000 sel/uL pada usia kehamilan 20 minggu (Alpiansyah and Rodiani, 2017).

e. Hipertensi Gestasional

Hipertensi gestasional yaitu hipertensi tanpa proteinuria yang timbul setelah kehamilan 20 minggu dan menghilang setelah persalinan. Diagnosis ditegakkan bila ditemukan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg, tidak ada riwayat hipertensi sebelum hamil, tekanan darah normal di usia kehamilan (Mochtar, 2012). Pasien mungkin mengalami sakit kepala, penglihatan kabur, dan sakit perut.

Didapatkan tes laboratorium abnormal, termasuk jumlah trombosit rendah dan tes fungsi hati abnormal (Karthikeyan, 2015).

6. Penegakan Diagnosis

Dilakukan anamnesis untuk mengetahui adanya gejala-gejala yang dialami oleh ibu hamil. Gejala yang ditimbulkan dapat berupa nyeri kepala, gangguan visus, *dyspneu*, nyeri dada, mual, muntah dan kejang. Adanya riwayat hipertensi sebelum kehamilan, pemakaian kontrasepsi hormonal, dan penyakit ginjal. Adanya riwayat gaya hidup seperti, lingkungan sosial, merokok, dan minum alkohol (Karthikeyan, 2015).

Pemeriksaan tekanan darah dapat dilakukan dengan posisi ibu diberi kesempatan untuk duduk dengan tenang dalam 15 menit sebelum pengukuran. Pada saat dilakukan pengukuran pastikan pada posisi manset setingkat dengan jantung dan tekanan diastolik dapat diukur dengan mendengar bunyi korotkoff V(hilangnya bunyi). Ukuran manset dan kalibrasi yang sesuai juga diperlukan untuk hasil pengukuran tekanan darah yang tepat (POGI, 2016).

Untuk pemeriksaan diagnostik pada ibu hamil yang mengalami hipertensi, antara lain: uji urin kemungkinan menunjukkan proteinuria, pengumpulan urin selama 24 jam untuk pembersihan kreatinin dan protein, fungsi hati menunjukkan terjadi peningkatan enzim hati, fungsi ginjal menunjukkan kreatinin dan elektrolit abnormal, tes non tekanan dengan profil biofisik, USG dan tes tekanan kontraksi untuk menentukan

status janin, serta evaluasi aliran doppler darah untuk menentukan status janin dan ibu (Manuaba, 2013).

7. Penatalaksanaan

a. Preeklampsia

Prinsip penatalaksanaan preeklampsia ringan adalah mencegah perkembangan penyakit menjadi preeklampsia berat, menetapkan waktu persalinan, dan mengevaluasi perkembangan paru janin. Pasien preeklampsia tanpa gejala berat harus diawasi secara ketat. Pemantauan meliputi beberapa evaluasi kondisi maternal dan janin. Kondisi ibu dinilai melalui pemantauan gejala klinis, setidaknya dua kali dalam satu minggu. Tekanan darah harus sering diukur, dan tes laboratorium harus dilakukan setiap minggu, termasuk jumlah trombosit dan kadar enzim hati. Kondisi janin harus dinilai setiap hari oleh ibu sendiri (skrining gerakan janin), pemantauan detak jantung janin minimal dua kali dalam satu minggu, dan pemeriksaan USG untuk mengevaluasi volume cairan ketuban dan pertumbuhan janin (Lambert *et al.*, 2014).

Sedangkan untuk kasus preeklampsia berat, prinsipnya adalah mencegah terjadinya eklampsia, kontrol tekanan darah yang ketat serta perencanaan persalinan. Hal ini termasuk dalam risiko tinggi yang ditimbulkan oleh preeklampsia berat bagi wanita hamil, maka pasien harus mendapatkan perawatan di rumah sakit dan

memerlukan pemantauan. Terapi antihipertensi harus segera dimulai, dan harus dilakukan pemeriksaan tanda-tanda eklampsia yang akan segera terjadi. Terapi profilaksis antikejang harus segera dimulai jika diperlukan (Peres, Mariana and Cairrão, 2018).

b. Eklampsia

Pengobatan definitif untuk eklampsia adalah melahirkan janin. Kejang atau koma eklampsia adalah kedaruratan medis dan membutuhkan perawatan segera untuk mencegah kematian ibu dan janin. Terapi antikonvulsif adalah terapi terpenting untuk kasus eklampsia (Peres, Mariana and Cairrão, 2018). Obat yang direkomendasikan untuk digunakan yaitu magnesium sulfat ($MgSO_4$) intravena, yang merupakan pengobatan lini pertama untuk kejang eklampsia. $MgSO_4$ merupakan obat pilihan pertama untuk mencegah dan menangani kejang pada preeklampsia dan eklampsia (Prawirohardjo, 2016). Cara pemberian $MgSO_4$ pada preeklampsia dan eklampsia adalah:

1. *Loading dose: initial dose*

Diberikan 4 gram $MgSO_4$: intravena (40% dalam 10 cc) selama 15-20 menit (Tetesan 40 tetes/menit).

2. *Maintenance dose:*

Diberikan infus 6 gram MgSO₄ (15 cc MgSO₄ 40%) dilarutkan kedalam 500cc larutan RL diberikan dengan kecepatan 1-2 gram/jam (Tetesan 28 tetes/menit).

3. Syarat Pemberian MgSO₄:

- a) Harus tersedia antidotum MgSO₄, bila terjadi intoksikasi, kalsium 10% = 1 g (10% dalam 10 cc) diberikan i.v. selama 3 menit.
- b) Refleks patella (+)
- c) Frekuensi Pernapasan >16x/menit, dan tidak ada tanda-tanda distress napas.
- d) Pemberian MgSO₄ dihentikan bila terdapat tanda-tanda intoksikasi, dan setelah 24 jam persalinan atau 24 jam setelah kejang terakhir.

Berikut adalah tabel yang diusulkan untuk kasus hipertensi dalam kehamilan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tabel 2.7 Obat Antihipertensi Untuk Hipertensi Pada Kehamilan

Obat (Rekomendasi FDA)	Dosis	Keterangan
Obat lini pertama		
<i>Metildopa (B)</i>	0,5-3 gram/hari terbagi 2 dosis	Merupakan obat pilihan, aman digunakan setelah trimester pertama.
Obat lini kedua		
<i>Labetolol (C)</i>	200-1200 mg/hari terbagi 2-3 dosis	Mungkin berhubungan dengan gangguan pertumbuhan fetus.
<i>Nifedipine (C)</i>	30-120 mg/hari preparat lepas lambat	Dapat menghambat proses persalinan dan mempunyai mekanisme strategis dengan magnesium sulfat dalam menurunkan tekanan darah.
<i>Hydralazine (C)</i>	50-300 mg/hari terbagi 2-4 dosis	Penelitian sedikit, sedikit efek samping yang terdokumentasi, bermanfaat sebagai kombinasi agen simpatolitik, dapat menyebabkan trombositopenia neonatus.
<i>Beta blocker (C)</i>	Tergantung jenis obat	Dapat menurunkan aliran darah uteroplasenta, dapat mengganggu respons fetus terhadap stres hipoksia, risiko gangguan pertumbuhan jika mulai digunakan pada trimester pertama atau kedua, dapat menyebabkan hipoglikemia neonatus pada dosis lebih tinggi.
<i>Hydrochlorothiazide</i>	12,5-25 mg/hari	Dapat menyebabkan gangguan elektrolit, digunakan sebagai kombinasi dengan metildopa dan vasodilator untuk mengatasi retensi cairan.
Kontraindikasi		
<i>ACE inhibitor dan angiotensin I receptor antagonist (D)</i>		Menyebabkan kematian janin pada hewan percobaan. Penggunaan pada manusia menyebabkan defek jantung, fetopati, oligohidramnion, gangguan pertumbuhan, agensis renal, gagal ginjal anuria pada neonatus.

Sumber: (Malha et al., 2018)

8. Pencegahan

Beberapa pencegahan hipertensi pada ibu hamil menurut (POGI, 2016), antara lain:

- a. Istirahat dirumah 15 menit 2x/hari ditambah suplementasi nutrisi dapat menurunkan risiko preeklampsia.
- b. Pembatasan garam untuk mencegah dan komplikasi selama kehamilan tidak direkomendasikan.
- c. Penggunaan aspirin dosis rendah (75 mg/hari) direkomendasikan untuk mencegah preeklampsia dengan risiko tinggi.
- d. Aspirin dosis rendah sebagai pencegahan preeklampsia yang sebaiknya digunakan sebelum usia kehamilan 20 minggu.
- e. Suplementasi kalsium 1 g/hari direkomendasikan untuk wanita dengan asupan kalsium yang rendah.
- f. Penggunaan aspirin dosis rendah dan suplemen kalsium (minimal 1 g/hari) direkomendasikan untuk mencegah preeklampsia pada wanita dengan risiko tinggi preeklampsia.
- g. Pemberian vitamin C dan E tidak direkomendasikan untuk diberikan dalam pencegahan preeklampsia.

D. Integrasi Keislaman

Di dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa kehamilan mengalami perkembangan dan perubahan mulai dari yang masih ringan dan bertambah berat, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-A'raf (7):189, berbunyi:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾

Terjemahnya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur (Q.S. Al-A'raf:189).”

Ayat di atas menerangkan bahwa tanda-tanda kehamilan adalah adanya perubahan beban yang dialami oleh seorang perempuan. Kandungan yang setiap saat bertambah besar menyebabkan bertambahnya beban yang dialami oleh seorang ibu (Al-Mahalli, 2010). Proses kehamilan seperti disebutkan pada ayat tersebut mengalami proses atau tahapan mulai dari rasa ringan kemudian rasa berat setelah janin membesar dan beralih dari nuthfah ke proses selanjutnya (Shihab, 2012).

Tentang tahapan atau proses penciptaan manusia ini, Umar Shihab dalam *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, memaparkan bahwa proses penciptaan manusia terbagi ke dalam beberapa fase kehidupan sebagai berikut:

Pertama, fase awal kehidupan manusia yang berupa tanah. Manusia berasal dari tanah disebabkan oleh dua hal: (1) manusia adalah keturunan Nabi Adam a.s. yang diciptakan dari tanah; (2) sperma atau ovum yang menjadi cikal bakal manusia bersumber dari saripati makanan yang berasal dari tanah. Kedua, saripati makanan yang berasal dari tanah tersebut menjadi sperma atau ovum, yang disebut oleh Al-Qur'an dengan istilah *nutfah*. Ketiga, kemudian sperma dan ovum tersebut menyatu dan menetap di rahim sehingga berubah menjadi embrio (*'alaqah*). Keempat, proses selanjutnya, embrio tersebut berubah menjadi segumpal daging (*mudlgah*). Kelima, proses ini merupakan kelanjutan dari *mudlgah*. Dalam hal ini, bentuk embrio sudah mengeras dan menguat sampai berubah menjadi tulang belulang (*'idzaam*). Keenam, proses penciptaan manusia selanjutnya adalah menjadi daging (*lahmah*). Ketujuh, proses peniupan ruh. Pada fase ini, embrio sudah berubah menjadi bayi dan mulai bergerak. Kedelapan, setelah sempurna kejadiannya, akhirnya lahirlah bayi tersebut ke atas dunia (Shihab, 2005).

Demikian pula di dalam Q.S. Al-Ahqaf (46):15 tentang perjuangan yang menyusahkan bagi ibu hamil, berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ ائْتَدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي
فِي دَرِيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim (QS. Al-Ahqaf:15).”

Ayat di atas megisyaratkan bahwa proses kehamilan dan penyapihan berlangsung selama 30 bulan (Shihab, 2012). Proses penyusuannya tiga puluh bulan yakni enam bulan sebagai batas yang paling minim bagi mengandung, yaitu lama masa penyusuan maksimal. dan melahirkan dengan susah pula (Al-Mahalli, 2010). Disisi lain, ayat ini juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang kedua orang tua terutama ibu yang telah melahirkan serta mengandung dengan susah payah. Dalam masa mengandung, ibu mengalami kesulitan dan kepayahan seperti, mengidam, pingsan, rasa berat, dan cobaan lainnya yang dialami oleh ibu hamil (Syakir, 2016).

Adapun di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dan Imam Muslim dalam Shahih-nya tentang proses penciptaan manusia, berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْفُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَاقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama empat puluh hari (berupa nutfah/sperma), kemudian menjadi alaqah (segumpal darah) selama waktu itu juga, kemudian menjadi mudghah (segumpal daging) selama waktu itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat empat perkara yang telah ditentukan yaitu; rezekinya, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain-Nya, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja, namun ketetapan (Allah) mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja, namun ketetapan (Allah) mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan penghuni surga, maka ia pun masuk surga.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits diatas telah menjelaskan kepada kita tentang proses penciptaan manusia yang dimulai dari berupa janin di dalam perut ibunya. Lalu selama 120 hari janin itu mengalami tiga fase. 40 hari pertama adalah fase berupa mani atau sperma dan 40 hari kedua adalah fase berupa segumpal darah kemudian 40 hari ketiga adalah fase segumpal daging. Hadis ini juga mengajarkan kita akan

pentingnya untuk bertawakkal kepada Allah SWT dan tidak takut kepada kefakiran, karena rezeki kita telah dituliskan dan ditentukan Allah SWT semenjak kita berumur 120 hari di dalam kandungan ibu (Wahid M, 2020).

Manfaat membaca Al-Qur'an kepada ibu hamil:

1. Ibu hamil mendapat ketenangan

Kecemasan ibu hamil adalah reaksi ibu hamil terhadap dirinya dan lingkungannya yang membawa perasaan tidak senang atau tidak nyaman yang disebabkan oleh dugaan akan bahaya kecemasan terdiri dari pikiran, perasaan dan perilaku ibu hamil tersebut, setiap ibu hamil mempunyai tingkat kecemasan yang berbeda tergantung dari bagaimana ibu mempersiapkan kehamilannya. Pengaruh Al-Qur'an pada janin sebagaimana sifat terpenting Al-Qur'an sebagaimana yang Allah terangkan adalah sebagai "ruh".

Sesuai dari penelitian yang dilakukan (Annisa, 2018) yang mewawancarai ibu hamil didapatkan suatu makna bacaan yakni dalam ibu hamil mengamalkan surat dan ayat dalam Al-Qur'an itu ia merasakan suatu ketenangan pada saat itu, dan tadinya bayi yang di dalam perut ibunya itu mulai bereaksi seketika itu ia merasakan ketenangan.


2. Ibu hamil dimudahkan dalam melahirkan

Setiap ibu hamil pastilah menginginkan kelahiran secara normal dan dimudahkan dalam melahirkan, kecemasan ibu hamil juga muncul biasa disebabkan oleh rasa takut yang paling banyak dialami oleh ibu hamil saat

ingin menghadapi persalinan, maka dengan begitu ibu hamil yang mengamalkan surah dalam Al-Qur'an yang dijadikan sebagai amalan pada masa kehamilan karena mereka berharap dengan mereka mengamalkannya, akan dipermudah saat melahirkan dan dengan mereka mengamalkan itu saat melahirkan ia memang betul merasakan kemudahan yang diambakan waktu persalinan itu tiba. Terdapat beberapa ibu yang sudah mengakui bahwa ibu yang pernah hamil mereka mengutarakan bahwa saat ia melahirkan ia merasakan kemudahan (Anisa, 2018).




E. Kerangka Teori




ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gambar 1. Kerangka Teori

F. Kerangka Konsep



G. Kerangka Kerja



Gambar 3. Kerangka Kerja

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *analitik observasional* dengan menggunakan rancangan *cross sectional* yang menghubungkan variabel yang diteliti yaitu umur ibu, paritas, riwayat abortus, dan LILA dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan *case control study*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung pada bulan Desember 2020 - Februari Tahun 2021.

C. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan pada penelitian berjumlah 2 variabel yakni variabel dependen dan variabel independen sebagai berikut :

1. Variabel Independen

Variabel independen dari penelitian ini adalah Faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dari penelitian ini adalah Hipertensi ibu hamil.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah penelitian seluruh ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas Kassi Kassi dengan jumlah ibu hamil yang terdiagnosa hipertensi tahun 2019-2020 ada 69 orang dan di Puskesmas Dahlia dengan jumlah ibu hamil yang terdiagnosa hipertensi Tahun 2019-2020 ada 17 orang.

2. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol.

1) Kelompok Kasus

Sampel kelompok kasus dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang mengalami hipertensi dan melakukan pemeriksaan di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Tahun 2019-2020 serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik pengambilan sampel kasus dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *total sampling*. *Total sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara dimana jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah

populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 86 orang. Namun, jumlah sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yaitu sebanyak 58 orang.

Pengambilan sampel kasus didasarkan pada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sebagai berikut:

a. Kriteria Inklusi

1. Ibu hamil yang terdiagnosa hipertensi.
2. Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia.

b. Kriteria Eksklusi

1. Ibu hamil yang memiliki data di buku registrasi yang kurang jelas atau tidak lengkap.

2) Kelompok Kontrol

Sampel untuk kelompok kontrol pada penelitian ini adalah ibu hamil yang tidak mengalami hipertensi serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara perbandingan 1:1 dengan jumlah sampel yang terdapat pada kelompok kasus.

Pengambilan sampel kontrol didasarkan pada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sebagai berikut:

a. Kriteria Inklusi

1. Ibu hamil yang tidak terdiagnosa hipertensi.
2. Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia.

b. Kriteria Eksklusi

1. Ibu hamil yang memiliki data di buku registrasi yang kurang jelas atau tidak lengkap.

E. Cara Pengumpulan Data

Data sekunder yang didapatkan dari buku registrasi kunjungan pemeriksaan ibu hamil di ruang kesehatan ibu dan anak. Peneliti menyesuaikan subyek yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian menggunakan data di buku kunjungan pemeriksaan ibu hamil (data sekunder) dari subyek penelitian untuk mengidentifikasi variabel dependen dan independen.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data sekunder dengan melihat buku registrasi pasien yang mengalami hipertensi di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia.

G. Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengelolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS kemudian dianalisis secara deskriptif dan analitik. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan SPSS kemudian pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*: Peneliti akan memeriksa dan mengoreksi data yang telah terkumpul.
- b. *Coding*: Peneliti melakukan perubahan data dari huruf menjadi data bentuk angka/bilangan. Untuk memudahkan dalam pengolahan data serta menjaga kerahasiaan identitas responden.
- c. *Tabulasi Data*: Peneliti memasukkan data kedalam bentuk tabel, yang dimana isi tabel tersebut mencakup data yang akan dianalisis serta mampu menyajikan semua data yang akan dianalisis.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan aplikasi *Statistical for Social Science* (SPSS), dengan menggunakan analisis univariat untuk mengetahui kriteria sampel. Kemudian melakukan uji bivariat yaitu uji *Person Chi Square* untuk mengetahui ada

tidaknya hubungan antar variabel yang diteliti (umur, paritas, riwayat abortus, dan lingkaran atas).

1. Analisis Univariat

Analisa univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dengan cara mendeskripsikan tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melihat gambaran distribusi frekuensinya. Membuat tabel distribusi frekuensi dan presentasi dari masing-masing frekuensi.

2. Analisis Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel dependen dan independen untuk menetapkan ada tidaknya hubungan antara variabel independen dan dependen. Analisa data yang digunakan adalah uji *Chi square*.

I. Penyajian Data

Data yang didapatkan akan dijelaskan dalam bentuk narasi dan disajikan dalam bentuk tabel.

H. Etika Penelitian

Dengan mengajukan persetujuan etik penelitian kepada bagian komite etik penelitian kesehatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia. Jumlah sampel yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 58 sampel kasus dan 58 sampel kontrol, sehingga total keseluruhan sampel yaitu 116 sampel. Desain penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan rancangan penelitian *cross sectional* dengan pendekatan *case control study*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Tahun 2019-2020. Variabel yang diteliti meliputi umur ibu, paritas, riwayat abortus, dan LILA. Data yang diambil adalah data sekunder dari buku registrasi kunjungan pemeriksaan ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Tahun 2019-2020. Analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS, yang terlebih dahulu dilakukan uji analisis univariat kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat yaitu menggunakan uji *Person Chi-Square*.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Univariat

Tabel 4.1 Distribusi Sampel Berdasarkan Kategori Umur

Kategori Umur	Kasus		Kontrol	
	N	%	N	%
Berisiko	17	14.7%	16	13.8%
Tidak Berisiko	41	35.5%	42	36.2%
Total	58	50%	58	50%

Hasil penelitian ini didapatkan distribusi sampel berdasarkan kategori umur dapat dilihat pada tabel (4.1). Hasil penelitian didapatkan kategori umur berisiko pada sampel kasus didapatkan 17 orang atau sebanyak 14.7% ibu hamil berumur < 20 tahun dan > 35 tahun, 35.5% atau sebanyak 41 orang ibu hamil berumur 20 tahun – 35 tahun. Sedangkan pada sampel kontrol didapatkan 13.8% ibu hamil berumur < 20 atau > 35 tahun, 36,2% atau sebanyak 42 orang ibu hamil berumur 25 – 35 tahun.

Tabel 4.2 Distribusi Sampel Berdasarkan Kategori Paritas

Kategori Paritas	Kasus		Kontrol	
	N	%	N	%
Berisiko	31	26.7%	38	32.8%
Tidak Berisiko	27	23.3%	20	17.2%
Total	58	50%	10	50%

Hasil penelitian ini didapatkan distribusi sampel berdasarkan kategori paritas dapat dilihat pada tabel (4.2). Hasil penelitian didapatkan kategori paritas berisiko pada sampel kasus didapatkan 31 orang, atau sebanyak 26.7% ibu hamil dengan

paritas berisiko, 23.3% atau sebanyak 27 orang ibu hamil dengan paritas tidak berisiko. Sedangkan pada sampel kontrol didapatkan 32.8% atau sebanyak 38 orang ibu hamil paritas berisiko, 17.2%, atau sebanyak 20 orang ibu hamil dengan paritas tidak berisiko.

Tabel 4.3 Distribusi Sampel Berdasarkan Kategori Riwayat Abortus

Kategori Riwayat Abortus	Kasus		Kontrol	
	N	%	N	%
Berisiko	9	7.8%	5	4.3%
Tidak Berisiko	49	42.2%	53	45.7%
Total	58	50%	58	50%

Hasil penelitian ini didapatkan distribusi sampel berdasarkan kategori riwayat abortus dapat dilihat pada tabel (4.3). Hasil penelitian didapatkan kategori riwayat abortus berisiko pada sampel kasus didapatkan 9 orang, atau sebanyak 7.8% ibu hamil dengan riwayat abortus, 42.2% atau sebanyak 49 orang ibu hamil dengan tidak ada riwayat abortus. Sedangkan pada sampel kontrol didapatkan 4.3%, atau sebanyak 5 orang ibu hamil dengan riwayat abortus, 45.7%, atau sebanyak 53 orang ibu hamil tidak ada riwayat abortus.

Tabel 4.4 Distribusi Sampel Berdasarkan Kategori Lingkar Lengan Atas (LILA)

Kategori LILA	Kasus		Kontrol	
	N	%	N	%
Berisiko	25	43.1%	13	22.4%
Tidak berisiko	33	56.9%	45	77.6%
Total	58	50%	58	50%

Hasil penelitian ini didapatkan distribusi sampel berdasarkan kategori LILA dapat dilihat pada tabel (4.4). Hasil penelitian didapatkan kategori LILA berisiko pada sampel kasus didapatkan 25 orang, atau sebanyak 43.1%, dan ibu hamil dengan tidak berisiko, 56.9% atau sebanyak 33 orang. Sedangkan pada sampel kontrol didapatkan 22.4%, atau sebanyak 13 orang ibu hamil dengan kategori LILA berisiko, 77.6%, atau sebanyak 45 orang ibu hamil dengan kategori tidak berisiko.

2. Analisis Bivariat

Tabel 4.5 Hubungan Usia dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil

Kategori Umur	Kejadian Hipertensi				Total		<i>p-value</i>
	Ya n	%	Tidak n	%	n	%	
Berisiko:<20 atau >35 tahun	17	14.7%	16	13,8%	33	28,4%	0.837
Tidak berisiko: 20-25 tahun	41	35.5%	42	36.2%	83	71.6%	0.837

Pada tabel 4.5 menunjukkan hasil analisis bivariat berdasarkan kategori umur menunjukkan jumlah ibu hamil umur berisiko <20 tahun atau >35 yang mengalami hipertensi (14,7%) lebih banyak daripada yang tidak mengalami hipertensi (13,8%). Sedangkan ibu hamil umur tidak berisiko 20-35 tahun yang tidak mengalami hipertensi (36,2%) lebih banyak dibandingkan yang mengalami hipertensi (35,5%). Hasil uji statistik *chi-square* diperoleh *p-value* 0.837 dimana nilai signifikansi $\alpha > 0.05$,

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya hubungan antara umur ibu dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil.

Tabel 4.6 Hubungan Paritas dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil

Kategori Paritas	Kejadian Hipertensi				Total		<i>p-value</i>
	Ya n	%	Tidak n	%	n	%	
Berisiko: Primigravida (<1 kali melahirkan); grandemultigravida (>4 kali melahirkan)	17	14.7%	16	13,8%	33	28,4%	0.837
Tidak berisiko: multigravida (2-3 kali melahirkan)	41	35.5%	42	36.2%	83	71.6%	0.837

Pada tabel (4.6) berdasarkan kategori paritas menunjukkan ibu hamil berisiko yaitu primigravida (<2 kali melahirkan) dan grandemultigravida (>5 kali melahirkan) yang mengalami hipertensi (26.7%) lebih sedikit daripada yang tidak mengalami hipertensi (32.8%). Sedangkan ibu hamil dengan paritas tidak berisiko yaitu multigravida (2-3 kali melahirkan) yang tidak mengalami hipertensi (17,2%) lebih sedikit daripada yang mengalami hipertensi (23,3%). Hasil uji statistik *chi-square* diperoleh *p-value* 0.186 dimana nilai signifikansi $\alpha > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya hubungan antara paritas dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil.

Tabel 4.7 Hubungan Riwayat Abortus dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil

Kategori Riwayat Abortus	Kejadian Hipertensi				Total		<i>p-value</i>
	Ya		Tidak		n	%	
	n	%	n	%			
Berisiko: Pernah mengalami	17	14.7%	16	13,8%	33	28,4%	0.837
Tidak berisiko: Tidak pernah mengalami	41	35.5%	42	36.2%	83	71.6%	0.837

Pada tabel (4.7) didapatkan hasil pada kategori riwayat abortus ibu hamil yang berisiko mengalami hipertensi (7,8%) lebih banyak daripada yang tidak mengalami hipertensi (4,3%). Sedangkan ibu hamil tidak berisiko dengan riwayat abortus yang tidak mengalami hipertensi (15,7%) lebih sedikit daripada ibu hamil yang mengalami hipertensi (42,2%). Hasil uji statistik dengan *chi-square* didapatkan *p-value* 0.254 dimana nilai signifikansi $\alpha > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya hubungan antara riwayat abortus dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil.

Tabel 4.8 Hubungan Lingkar Lengan Atas (LILA) dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil

Kategori LILA	Kejadian Hipertensi				Total		<i>p-value</i>
	Ya		Tidak		n	%	
	n	%	n	%	n	%	
Berisiko: Obesitas (>28,5 cm)	25	43.1%	13	22.4%	38	32.8%	0.018
Tidak berisiko: Normal (23,5-28,5 cm); Underweight <23,5 cm)	33	56.9%	42	77.6%	78	78%	0.018

Berdasarkan persentase ibu hamil dengan kategori LILA yang berisiko mengalami hipertensi (43.1%) lebih banyak daripada yang tidak mengalami hipertensi (22.4%). Sedangkan ibu hamil tidak obesitas yang mengalami hipertensi (56.9%) lebih sedikit daripada yang tidak mengalami hipertensi (77.6%). Hasil uji statistik *chi-square* diperoleh *p-value* 0.018 dimana nilai signifikansi $\alpha < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya hubungan antara LILA dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil.

B. Pembahasan

1. Hubungan Umur Ibu dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil

Kehamilan dengan usia muda maupun usia tua merupakan suatu keadaan yang dapat menimbulkan risiko komplikasi dan kematian ibu. Umur 20-35 tahun adalah waktu yang paling aman untuk melahirkan dikarenakan risiko mortalitas dan morbiditas pada ibu rendah. Pada umur >35 tahun, kondisi kesehatan ibu sudah menurun akibatnya ibu hamil pada umur tersebut mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mempunyai anak cacat, persalinan lama dan perdarahan (Kaimudin *et al.*, 2018). Sedangkan umur ibu <20 tahun juga memiliki risiko yang besar untuk terjadinya hipertensi karena ibu yang hamil pada usia yang terlalu muda dari segi biologis perkembangan alat-alat reproduksinya belum optimal (Sukfitrianty, Aswadi and Lagu, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persentase ibu hamil umur <20 tahun atau >35 yang mengalami hipertensi 14,7% lebih sedikit daripada umur 25 – 35 tahun yang mengalami hipertensi 35.5%. Hasil penelitian ini diperoleh *p-value* 0.837 dimana nilai signifikansi $\alpha > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya hubungan antara umur ibu dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. Hal tersebut dimungkinkan sebagian besar umur ibu adalah umur reproduksi 20-35 tahun. Ibu berumur antara 20-29 merupakan umur terendah penyumbang kematian ibu dan bayi, sementara ibu lebih muda atau lebih tua mempunyai risiko

besar. Kehamilan ibu dengan umur 16 tahun terjadi peningkatan risiko preeklampsia, umur >35 berada pada risiko tinggi dan >40 mempunyai risiko lebih besar (Sutrimah, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Ruqaiyah (2018), sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu didapatkan hasil uji *Chi-square* diperoleh nilai $p= 0.597 > 0.05$ yang artinya tidak terdapat hubungan yang bermakna antara umur dan kejadian hipertensi kehamilan. Golongan umur ibu berisiko yang mengalami hipertensi 2 orang (4.0%) sedangkan umur tidak berisiko dan mengalami hipertensi sebanyak 6 orang (4.7%). Meskipun umur <20 dan >35 tahun termasuk dalam umur berisiko tinggi tetapi ada yang tidak mengalami hipertensi yang disebabkan karena faktor keadaan ibu hamil yang sangat baik dan terhindar dari stress, berada pada paritas tidak berisiko dan tidak memiliki riwayat hipertensi sebelumnya serta rajin melakukan pemeriksaan ANC. Sedangkan umur 20 – 35 tahun dianggap tidak berisiko tetapi mengalami hipertensi disebabkan karena rata-rata pada kehamilan pertama sehingga mereka masih memiliki kecemasan tersendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustaghfiroh, dkk (2020) juga sejalan dengan penelitian ini yaitu didapatkan bahwa sebagian kecil ibu hamil preeklampsia berada pada usia berisiko <20 atau >35 tahun sebanyak 12 ibu hamil (20%), dan sebagian besar berada pada usia tidak berisiko 20 – 35 tahun sebanyak 48 ibu hamil (80%)

dimana hasil uji *Chi-Square* didapatkan *p-value* 0,347 yaitu $>0,05$, yang berarti tidak terdapat hubungan faktor umur dengan kejadian preeklampsia.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmani, dkk (2014) yaitu didapatkan hasil analisis dengan uji *Chi-square* hubungan antara usia maternal dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan diperoleh bahwa ada sebanyak 15 dari 94 (16,0%) ibu dengan usia risiko tinggi yaitu >35 tahun yang mengalami hipertensi dalam kehamilan. Hasil uji statistik diperoleh nilai $p=0,004$ dengan $OR=2,774$ maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara usia maternal dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan dan ibu dengan usia risiko tinggi mempunyai peluang 2,774 kali mengalami hipertensi dalam kehamilan dibandingkan dengan ibu yang memiliki usia risiko rendah.

2. Hubungan Paritas dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil

Pada primigravida sering mengalami stress dalam menghadapi persalinan. Stress emosi yang terjadi pada primipara menyebabkan peningkatan pelepasan *corticotropic-releasing hormone* (CRH) oleh hipotalamus, yang kemudian menyebabkan peningkatan kortisol. Efek kortisol adalah mempersiapkan tubuh untuk berespons terhadap semua stresor dengan meningkatkan respons simpatik, termasuk respons yang ditujukan untuk meningkatkan curah jantung dan mempertahankan tekanan darah. Pada wanita dengan hipertensi dalam kehamilan, tidak terjadi penurunan sensitivitas terhadap vasopeptida-vasopeptida tersebut, sehingga

peningkatan besar volume darah langsung meningkatkan curah jantung dan tekanan darah (Ratumbusang, 2014).

Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Juaria, 2015), yang berjudul tentang hubungan antara paritas ibu hamil pada usia 25-35 tahun dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan di Puskesmas Sawahan Surabaya tahun 2016 didapatkan bahwa terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh. (Laila, 2019), yang berjudul tentang Hubungan Paritas terhadap Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil didapatkan bahwa terdapat hubungan antara Hasil uji *chi square* menunjukkan ada hubungan antara usia, paritas, riwayat hipertensi dan frekuensi pemeriksaan antenatal care dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil di Ruang Paus RSUD dengan *P-value* $0,015 < 0,05$. Karena pada multipara disebabkan karena terlalu seringnya rahim tegang saat kehamilan dan terjadi penurunan angiotensin, renin dan aldosteron sehingga dijumpai edema, hipertensi dan proteuria. Pada multipara kejadian hipertensi dalam kehamilan lebih tinggi oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya hipertensi pada ibu hamil harus melakukan pemeriksaan antenatal care yang teratur, melakukan diet sehat dengan mengonsumsi makanan seperti buah-buahan, sayuran, makanan rendah sodium, ikan, dan berolahraga (senam hamil, jalan santai dipagi hari).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase ibu hamil dengan paritas berisiko yang mengalami hipertensi (14.7%) lebih sedikit daripada yang tidak berisiko hipertensi (35.5%). Hasil penelitian ini diperoleh *p-value* 0.186 dimana nilai signifikansi $\alpha > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya hubungan antara paritas dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. Pada penelitian ini tidak ditemukan hasil yang bermakna kemungkinan disebabkan karena mayoritas sampel berada pada kehamilan yang ke 2–4 kali sehingga ibu berada dalam kategori aman dimana pada multigravida ini tidak sering di jumpai komplikasi kehamilan karena *blocking antibody* telah terbentuk secara sempurna (Prawirohardjo, 2016).

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Tika (2015) yang menunjukkan bahwa dari hasil analisis data bivariat menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara faktor risiko graviditas dengan kejadian preeklampsia. Pada penelitian tersebut mungkin disebabkan karena masih adanya berbagai faktor yang turut menyebabkan preeklampsia dan eklampsia pada ibu bersalin dengan gravida yang tidak dikendalikan misalnya faktor jarak kehamilan, faktor umur, faktor usia, faktor obesitas, faktor riwayat preeklampsia pada kehamilan sebelumnya atau keluarga, faktor stress dan perilaku tidak sehat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muzalifah, dkk (2018) juga sejalan dengan penelitian ini yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara graviditas dengan kejadian preeklampsia (*p value*= 1,000, OR = 1,138 dengan 95% CI= 0,420 – 3,089).

Hal ini karena ibu dengan primigravida pada kelompok kasus sebagian besar sebanyak 8 orang (22.9%) berusia baik untuk hamil yaitu umur 20-35 tahun, sehingga lebih siap untuk menerima kehamilannya. Umur 20-35 tahun merupakan umur yang paling aman bagi wanita untuk hamil dan melahirkan. Selain itu hasil yang didapatkan yaitu 12 ibu (34.3%) dengan primigravida pada kelompok kasus ibu yang sudah memeriksakan kehamilannya secara rutin (ANC lengkap) sebanyak 8 orang (22.9%), hal ini menunjukkan bahwa ibu primigravida dengan ANC lengkap lebih terjaga kehamilannya sehingga dapat mendeteksi hipertensi kehamilan secara dini.

Hal ini tidak sesuai dengan teori imunologik yang menyatakan bahwa primigravida mempunyai risiko lebih besar terjadinya hipertensi dalam kehamilan jika dibandingkan dengan multigravida. Pada kehamilan anak pertama sering terjadi *bloking antibodies* yang dilakukan oleh HLA-G (*human leukocyte antigen G*) terhadap antigen plasenta yang belum terbentuk secara sempurna, dimana produksi antibodi penghambat berkurang. Hal ini dapat menghambat invasi arteri spiralis ibu oleh trofoblast sampai batas tertentu hingga menghambat fungsi plasenta. Ketika kehamilan berlanjut, hipoksia plasenta menginduksi proliferasi sitotofoblast dan penebalan membran basalis trofoblast yang mungkin mengganggu fungsi metabolik plasenta. Sekresi vasodilator prostasiklin oleh sel-sel endotel plasenta berkurang dan sekresi trombosan oleh trombosit bertambah, sehingga timbul vasokonstriksi

generalisata dan sekresi aldosteron menurun. Akibat perubahan ini terjadilah pengurangan perfusi plasenta sebanyak 50 persen yang menyebabkan hipertensi pada ibu, penurunan volume plasma ibu. Jika vasospasme menetap, mungkin akan terjadi cedera sel epitel trofoblast dan fragmen-fragmen trofoblast dibawa ke paru-paru dan mengalami destruksi sehingga melepaskan tromboplastin. Selanjutnya tromboplastin menyebabkan koagulasi intravaskular dan deposisi fibrin didalam glomeruli ginjal (endoteliosis glomerular) yang menurunkan laju filtrasi glomerulus dan secara tidak langsung meningkatkan vasokonstriksi. Pada kasus berat dan lanjut, deposit fibrin ini terdapat didalam pembuluh darah sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan konvulsi (Idaman dkk, 2019).

3. Hubungan Riwayat Abortus dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil

Perkembangan plasenta sangatlah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada kehamilan usia dini sel sitotrofoblas menginvasi dinding uterus dengan merobek endotel dan tunica media dari arteri spiralis. Dinding pembuluh darah arteri spiralis akan mengalami perubahan yaitu aliran dari aliran rendah dengan resistensi tinggi menjadi aliran tinggi dengan resistensi rendah. Dalam perkembangannya terdapat dua fase invasi sitotrofoblas ke dinding endometrium, yakni a) fase pertama terjadi saat sitotrofoblas menginvasi desidua hingga mencapai arteri spiralis, fase ini terjadi saat kehamilan berusia sekitar 10-12 minggu dan b) fase kedua terjadi saat sitotrofoblas menginvasi miometrium, fase ini terjadi saat

kehamilan berusia 15-16 minggu. Pada preeklampsia terjadi ketidakseimbangan invasi sitotrofoblas ke miometrium (fase ke 2). Arteri spiralis tetap sempit dan suplai darah dari ibu ke janin menjadi terbatas. Sistem vaskularisasi uterus yang tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisi dan oksigen bagi perkembangan janin yang akan menyebabkan keadaan iskemia plasenta sebagai hasil dari hipoksia. Pada saat terjadi iskemia plasenta, maka plasenta akan melepaskan berbagai macam plasental faktor yang bertujuan untuk memperbaiki suplai nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin, tetapi plasental faktor yang dilepaskan tersebut justru menyebabkan gangguan secara sistemik pada ibu hamil (Yosef Dwi Cahyadi Salan, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan persentase ibu hamil dengan riwayat abortus berisiko yang mengalami hipertensi sebanyak 9 orang (7,8%) lebih sedikit daripada yang tidak berisiko mengalami hipertensi 49 orang (42,2%). Hasil uji *chi-square* menunjukkan terhadap kategori riwayat abortus dengan kejadian hipertensi diperoleh *p-value* 0.254 dimana nilai signifikansi $\alpha > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya hubungan antara riwayat abortus dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. Hal ini disebabkan karena persentase ibu yang pernah mengalami abortus terlalu kecil yaitu 7.8%, sedangkan ibu yang tidak pernah mengalami abortus sebanyak 42.2% memungkinkan menjadi penyebab tidak signifikannya hubungan riwayat abortus dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muzalfah, dkk (2019), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat abortus dengan kejadian preeklampsia ($p\ value= 1,000$, $OR= 0,856$ dengan $95\% CI = 0,287-2,556$).

Penelitian yang dilakukan oleh (Imaroh, Nugraheni, 2018), yang berjudul Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Wilayah kerja Puskesmas Kedungmundu, Kota Semarang Tahun 2017 dari hasil uji Chi-Square didapatkan bahwa tidak ada hubungan dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan dengan nilai $p=0,509 > 0,05$. Hasil tersebut dikarenakan distribusi frekuensi antara kelompok kasus dan kelompok kontrol cenderung lebih banyak kelompok kontrol yang tidak ada riwayat abortus.

4. Hubungan LILA dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil

Pengukuran LILA berfungsi untuk mengetahui angka kecukupan nutrisi wanita usia subur (WUS) dan pada wanita yang sedang hamil. Pada WUS akan dihitung seberapa tebal lemak dalam tubuhnya yang bisa dinilai melalui lingkaran atas secara cepat. Sehingga pada dasarnya, banyaknya lemak dalam tubuh akan sangat berpengaruh pada kesehatan wanita terutama ibu hamil. Kejadian hipertensi merupakan sebagian komplikasi dalam kehamilan yang disebabkan kadar lemak yang berlebih dalam tubuh (Anas, 2013).

Ukuran LILA akan lebih menggambarkan keadaan status gizi sang ibu apabila dibandingkan dengan berat badan. Hal ini dikarenakan berat badan ibu selama kehamilan adalah komulatif dari penambahan berat organ tubuh, volume darah ibu dan berat janin yang dikandungnya. Selain itu, pembengkakan yang biasa dialami ibu hamil, jarang mengenai lengan atas. Oleh karena itu, pengukuran LILA lebih baik untuk menilai status gizi ibu hamil dibandingkan berat badan (Widardo dkk, 2018).

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi (Almatsier, 2011). Ibu hamil dengan gizi kurang berisiko mengalami gangguan metabolisme seperti resistensi insulin, diabetes, dislipidemia, dan hipertensi dapat meningkatkan risiko aterosklerosis dan kardiovaskuler. Oleh karena itu ibu hamil harus memperhatikan asupan gizi seimbang saat mulai kehamilan dengan mengkonsumsi makanan tinggi protein atau purin seperti daging, ikan, hati, limpa dan kacang-kacangan. Ibu hamil dengan status gizi kurang menyebabkan cairan tubuh berkurang, sehingga dapat terjadi hemokonsentrasi dan sirkulasi darah ke jaringan terhambat. Akibatnya produksi oksigen dan makanan ke jaringan berkurang sehingga akan menimbulkan kerusakan jaringan salah satunya plasenta yang dapat menyebabkan terjadinya disfungsi plasenta dan berisiko mengakibatkan hipertensi (Supariasa dkk. 2012). Perubahan biokimia juga terjadi pada ibu hamil dengan obesitas, seperti meningkatnya stress oksidatif, inflamasi, hiperlipidemia, kerusakan endothelial, dan vasokonstriksi (Djamil, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan ibu hamil dengan kategori LILA yang berisiko mengalami hipertensi (14.7%) lebih sedikit daripada yang tidak berisiko mengalami hipertensi (45.5%). Hasil uji statistik *chi-square* diperoleh *p-value* 0.018 dimana nilai signifikansi $\alpha < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya hubungan antara LILA dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh (Setyawati *et al*, 2016), kondisi status gizi pada ibu hamil yang dinilai berdasarkan pengukuran lingkaran lengan atas (LILA), LILA ibu hamil ≥ 30 cm, berisiko hipertensi 3 kali dibandingkan LILA ibu hamil ≤ 30 cm, didapatkan (OR= 2.898; 95% CI = 2.076-4.044; *p-value*= 0.000) dengan nilai signifikansi $\alpha < 0.05$ artinya ditemukan hubungan yang bermakna antara LILA dengan hipertensi dalam kehamilan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Anas, 2013) sejalan dengan penelitian (Setyawati *et al*, 2016) yaitu didapatkan ukuran LILA $< 23,5$ sebanyak 37 orang (50%), dan $> 23,5$ sebanyak 37 (50%). Hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai *p* sebesar 0,000, secara statistik nilai bermakna yang berarti terdapat hubungan antara ukuran LILA ibu hamil dengan angka kejadian preeklampsia di RS PKU Muhammadiyah Surakarta.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori (Cunningham *et al.*, 2014), dikatakan bahwa obesitas merupakan masalah gizi terkait dengan kelebihan kalori, lemak dan protein hewani, dan gula serta garam yang merupakan faktor risiko

penyakit degeneratif, seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung reumatik, kanker, dan gangguan kesehatan lain.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dimasa pandemi Covid-19 sehingga pengambilan data sampel tidak dilakukan secara langsung dan hanya berdasarkan data sekunder. Data sekunder memiliki banyak kekurangan sehingga variabel yang diteliti terbatas. Dalam hal ini, data yang didapatkan mayoritas termasuk kategori tidak berisiko sehingga hal tersebut menyebabkan tidak terdapatnya hubungan dari beberapa variabel yang diteliti.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Tahun 2019-2020, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara umur ibu dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Tahun 2019-2020.
2. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara paritas dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Tahun 2019-2020.
3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat abortus dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Tahun 2019-2020.
4. Terdapat hubungan yang bermakna antara LILA dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Tahun 2019-2020.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi ibu hamil dengan kategori obesitas agar dapat mengurangi faktor yang menyebabkan kegemukan baik sebelum kehamilan maupun setelah kehamilan. Sehingga indeks massa tubuh ibu hamil dapat terkontrol selama masa kehamilannya dan tidak termasuk dalam kategori obesitas yang dapat menyebabkan hipertensi.
2. Bagi Puskesmas agar cepat menindaklanjuti pasien yang mengalami hipertensi guna mencegah komplikasi selama kehamilan sekaligus meminimalisir kejadian hipertensi dikalangan masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan variabel yang lain baik dari faktor maternal maupun faktor kehamilan agar dapat mengetahui tentang faktor risiko yang lebih beragam terhadap terjadinya hipertensi pada ibu hamil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainnurrafiq, A. R. (2019) "Terapi Non Farmakologi dalam Pengendalian Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi: Systematic Review." *MPPKI (Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia: The Jurnal of Health Promotion*, 2(3), p. 192-199.
- Anas, Muhammad Nur (2013) 'Hubungan LILA Pada Ibu Hamil Dengan Kejadian Preeklampsia di RS PKU Muhammadiyah'.
- Amila, A., Utami, N. and Marbun, A. S. (2020) "Hubungan status gizi berdasarkan lingkaran lengan atas (LiLA) dengan tekanan darah pada pasien hipertensi", *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(1), pp. 140–148. doi: 10.33024/hjk.v14i1.1851.
- Al-Mahalli, Jalaluddin & Jalaluddin As-Suyuthi. (2010) "Tafsir Jalalain.Terj. Bahrn Abu Bakar". Jakarta: Sinar Baru Algensindo.
- Almatsier. (2011) "Prinsip Dasar Ilmu Gizi." Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Alpiansyah, A. and Rodiani. (2017) "Wanita Usia 20 Tahun, Primigravida Hamil 37 Minggu dengan Eklampsia Antepartum." *Journal Medula Unila*, 7, p. 1–7. 2017.
- Anisa F. (2018) "Amalan Bacaan Al-Quran Bagi Ibu Hamil Di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat". Ilmu Al-Quran Dan Tafsir UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Artiyaningrum, B. (2016) "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Tidak Terkendali Pada Penderita Yang Melakukan Pemeriksaan Rutin di Puskesmas Kudungmundu Kota Semarang Tahun 2016." *Public Health Perspective Journal*, 1(1), p. 12-20. 2016.
- Cunningham F, L. K. (2014) "Obstetri Williams 23th Edition." New York: McGraw-Hill.
- CDC. (2014) "Family History and Other Characteristics That Increase Risk for High BloodPressure." https://www.cdc.gov/bloodpressure/risk_factors.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fbloodpressure%2Ffamily_history.htm (Diakses 20 Oktober 2020)
- Denantika, O., Serudji, J. and Revilla, G. (2013) "Hubungan Status Gravida dan Usia Ibu terhadap Kejadian Preeklampsia di RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2012-2013." *Jurnal Kesehatan Andalas*, 4(1), p. 212–217. 2015.

- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. (2020) "Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan".
- Djamil, R. (2016) "Hubungan Indeks Masa Tubuh dengan Kejadian Preeklampsia." *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(1), pp. 1–10.
- Gustri, Y., Januar Sitorus, R. and Utama, F. (2016) 'Determinants Preeclampsia in Pregnancy At Rsup Dr. Mohammad Hoesin Palembang', *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 7(3), pp. 209–217. doi: 10.26553/jikm.2016.7.3.209-217.
- Idaman, M., Putri, E. Y. and Rahmi, L. (2019) 'Analisis Resiko Preeklampsia Pada Kehamilan', *Jurnal Kesehatan*, 10(3), pp. 210–215. Available at: <http://ejurnal.stikesprimanusantara.ac.id/>.
- Imaroh, N. (2018) "Risiko Yang Mempengaruhi Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Kudungmundu, Kota Semarang Tahun 2017." *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(1), p. 570-580.
- Jackson, R. E. and Bellamy, M. C. (2015) "Antihypertensive drugs." *British Journal of Anaesthesia*, 15(6), p. 280–285.
- James PA, Oparil S, Carter BL, Cushman WC, Dennison-Himmelfarb C, Handler J, et al. (2014) "Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults Report From the Panel Members Appointed to the Eight Joint National Committee (JNC 8)." *JAMA*, 311(5), p. 507-520.
- Juaria, H. (2015) 'Paritas dan Umur Ibu Hamil Dengan Kejadian Hipertensi Dalam Kehamilan', *Akbid Griya Husada*, (110), pp. 79–86.
- Kaimudin, L. et al. (2018) "Hubungan Usia Ibu Saat Hamil Dengan Kejadian Hipertensi Di Rsu Gmim Pancaran Kasih Manado." *Jurnal Keperawatan*, 6(1).
- Karthikeyan, V.J. (2015) "Hypertension in pregnancy; in Nadar, S. and Lip, G.Y.H., Hypertension 2th Edition." Oxford Cardiology Library.
- Kemenkes RI. Profil Kesehatan Indonesia 2017. (2018). Jakarta: Kemenkes RI. <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-tahun-2017.pdf> (Diakses 3 Oktober 2020)
- Komalasari, T. and Rahayu, S. (2015) "Preeklampsi pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Umum Sumedang." *Indonesian Journal of Education and Midwifery Care*, 2(3), p. 13–20.

- Laila, E. F. (2019) 'Usia, Paritas, Riwayat Hipertensi Dan Frekuensi Pemeriksaan Anc Terhadap Kejadian Preeklampsia pada Ibu Hamil', *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 5(2), pp. 128–136. doi: 10.33024/jkm.v5i2.1220.
- Leeman, L., Dresang, L.T., and Fontaine, P. (2016) "Hypertensive disorder of pregnancy." *American Family Physicians*, 93(2), p. 1 21-7.
- Magee LA, Pels A, Helewa M, Rey E, von Dadelszen. Canadian Hypertensive Disorders of Pregnancy Working Group. (2014) "Diagnosis, evaluation, and management of the hypertensive disorders of pregnancy: executive summary." *J Obstet Gynaecol Can*, 36(5), p. 416-4. 2014.
- Manuaba, I. B. (2013) "Pengantar Kuliah Obstetri." Jakarta: EGC. 2013
- Malha, L., Podymow, T., August, P., et al., (2018) "Hypertension in Pregnancy in Hypertension: A Companion to Braunwald's Heart Disease 3th Edition." *Elsevier*.
- Mochtar R. (2012) "Sinopsis Obstetri: Obstetri Fisiologi, Obstetri Patologi 3th Edition." Jakarta: EGC.
- Mustagfiroh, M., Sari, N. and Kartika. (2020) "Relationship of Age factors, Gravida, Nutritional Status and Hypertension History of The Event of Pre Exlampsia." *Jurnal ilmiah Permas*, 10(1), pp. 41–50.
- Muzalfah, R. et al. (2018) "Kejadian Preeklampsia pada Ibu Bersalin." *Sejarah Artikel*: 2(3), pp. 417–428. 2018. doi: 10.15294/higeia/v2i3/21390.
- Myrtha, R. (2015) "Penatalaksanaan Tekanan Darah pada Preeklampsia." *Cermin Dunia Kedokteran*, 42(4).
- Nuraini, B. (2015) "Risk Factors Of Hypertension." *J Majority*, 4(5), p. 10-19.
- Nulanda, M. (2019) "Analisis Hubungan Indeks Massa Tubuh terhadap Kejadian Kasus Preeklampsia di Rsia Sitti Khadijah 1 Makassar." *UMI Medical Journal*, 4(1), pp. 76–91. doi: 10.33096/umj.v4i1.51.
- Nurfatimah, N. et al. (2020) "Gambaran Faktor Risiko Kejadian Hipertensi dalam Kehamilan pada Ibu Hamil Trimester III." *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 14(1), p. 68–75.
- Philip, R. L. (2018) "Gambaran Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Hipertensi Dalam Kehamilan DI RSUD Wates Kulon Progo Tahun 2018." *Skripsi. Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*, pp. 1-13.

- Podymow T, August P. (2013) "Hypertension in pregnancy. In: Black HR, Elliott WJ, eds. Hypertension: A companion to Braunwald's heart disease 2th Edition." *Philadelphia: Elsevier Saunders*. p. 327– 35.
- POGI. (2016) "PNPK Diagnosis dan Tatalaksana Preeklampsia." *Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia: Himpunan Kedokteran Feto Marnal*. p. 1–48.
- Portelli, M. and Baron, B. (2018) "Clinical Presentation of Preeclampsia and the Diagnostic Value of Proteins and Their Methylation Products as Biomarkers in Pregnant Women with Preeclampsia and Their Newborns." *Journal of Pregnancy*. doi: 10.1155/2018/2632637.
- Prawirohardjo, S. (2016) "Ilmu Kebidanan." Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono.
- Ratumbusang, P. V. L. and Manado, K. (2014) 'Faktor-Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Poli Klinik Obs-Gin Rumah Sakit Jiwa', *ilmiah Bidan*, pp. 33–40.
- Rohmani, A. S. (2015) "Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Dalam Kehamilan." *Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang*, 4, p. 1-9.
- Rohkuswara, T. D. and Syarif, S. (2017) "Hubungan Obesitas dengan Kejadian Hipertensi Derajat 1 di Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandung Tahun 2016." *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 1(2), p. 13–18.
- Saraswati, N. (2015) "Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil (Studi Kasus Di RSUD Kabupaten Brebes Tahun 2014)." *Unnes Journal of Public Health*, 5(2), p. 90.
- Salan, Y. D. C. (2017) "Biomarker Terkini Dalam Usaha Memprediksi Preeklampsia." *Berkala Kedokteran*, 13(1), p. 119. doi: 10.20527/jbk.v13i1.3448.
- Sari, N. K. (2018) "Kasus Hipertensi Pada Kehamilan di Indonesia." *Berita Kedokteran Masyarakat*, 32(9), p. 295.
- SDKI. (2012) "Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia." <http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/SDKI%202012-Indonesia.pdf> (Diakses 5 Oktober 2020)
- Shihab, M. Quraish. (2012) "Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an." Jakarta: Lentera Hati.

- Shihab, Umar. (2005) "Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an." Jakarta: Penamadani.
- Smeltzer, Suzanne C & Bare, Brenda G. (2013) "Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah." Jakarta: EGC.
- Sukfitrianty, Aswadi and Lagu, A. M. H. R. (2016) 'Faktor Risiko Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar', *Public Health Science Journal*, 8(2548–5334), pp. 79–88.
- Supariasa dkk. (2012) "Penilaian Status Gizi." Jakarta: EGC.
- Sutrimah, Mifbakhudin, M. and Wahyuni, D. (2015) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang', *Jurnal Kebidanan*, 4(1), pp. 1–10. Available at: https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jur_bid/article/view/1383.
- Syakir Muhammad Ahmad. (2016) "Umdah At-Tafsir Al-Hafizh Ibnu Katsir." Bairut; Darul Kutub Ilmiah.
- Tika, P., Didik dan Suryani, N. (2015) "Analisis Faktor-Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Preeklampsia-Eklampsia pada Ibu Bersalin di RSUD Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2015." *Indonesian Journal on Medical Science*, 4(1): 133-146
- Uliatiningsih, R. A. (2019) "Effect Education of DASH DIET on Dietary Intake Adherence and Blood Pressure of Hypertension Outpatients in Rumkital Marinir Cilandak." *Jurnal Gizi dan Pangan Soedirman*, 3(2), p. 121.
- Wahid, M. A. (2020) "Teori Mengenai Penciptaan Manusia Dalam Hadis Nabi; Kajian Ma'Anil Hadis" *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 10(2), pp. 173–189. doi: 10.24252/tahdis.v10i2.12462.
- Wahyuni, Y. and Miftahul Huda, A. S. (2019) 'Pemantauan Kesehatan Gizi Ibu Hamil Dilihat dari Pertambahan Berat Badan dan Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) Berbasis E-Digital', *Komputasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer dan Matematika*, 16(1), pp. 235–244. doi: 10.33751/komputasi.v16i1.1594.
- Whelton, et al. (2018) "2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APHA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults a report of the American College of

Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical practice guidelines" *Hypertension*, 71(6), p. 1269-1324.

Widardo *et al.* (2018) 'Buku Manual Keterampilan Klinik Topik Antropometri', *Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Sebelas Maret Fakultas Kedokteran*, (36), pp. 15–16.

WHO. (2017) "A Global Brief on Hypertension: Silent Killer. Global Public Health Crisis." <http://ish-world.com/news/a/World-Health-Organization-A-Global-Brief-on-Hypertension/consult%C3%A9%20le/> (Diakses 5 Oktober 2020)

Yusiana, M. A. (2015) "Terapi Guided Imagery Dan Deep Breathing Efektif Menurunkan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi." *Jurnal Stikes*, 8(2), p. 157.

Yosef Dwi Cahyadi Salan. (2017). Biomarker terkini dalam usaha memprediksi preeklampsia. *Berkala Kedokteran*, 13(1), 119–128.

ZA, R. N., Renjani, R. S. and Astuti, R. (2019) "Pengaruh Umur, Kehamilan Ganda dan Gravida pada Kejadian Preeklampsia di Rumah Sakit Umum Meuraxa Banda Aceh Tahun 2015." *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 2(2), p. 115.



LAMPIRAN

1. Lampiran Hasil SPSS

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kejadian Hipertensi * Umur	116	100.0%	0	0.0%	116	100.0%
Kejadian Hipertensi * Paritas	116	100.0%	0	0.0%	116	100.0%
Kejadian Hipertensi * Riwayat Abortus	116	100.0%	0	0.0%	116	100.0%
Kejadian Hipertensi * Obesitas	116	100.0%	0	0.0%	116	100.0 %

Kejadian Hipertensi * Umur

Crosstab

			Umur		Total
			<20 atau >35 Tahun	20-35 Tahun	
Kejadian Hipertensi	Tidak Mengalami Hipertensi	Count	16	42	58
		% within Kejadian Hipertensi	27.6%	72.4%	100.0%
		% within Umur	48.5%	50.6%	50.0%
		% of Total	13.8%	36.2%	50.0%
	Mengalami Hipertensi	Count	17	41	58
		% within Kejadian Hipertensi	29.3%	70.7%	100.0%
		% within Umur	51.5%	49.4%	50.0%
		% of Total	14.7%	35.3%	50.0%
Total		Count	33	83	116
		% within Kejadian Hipertensi	28.4%	71.6%	100.0%
		% within Umur	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	28.4%	71.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.042 ^a	1	.837		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.042	1	.837		
Fisher's Exact Test				1.000	.500
Linear-by-Linear Association	.042	1	.838		
N of Valid Cases	116				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Kejadian Hipertensi * Paritas

Crosstab

		Paritas		Total	
		Tidak Beresiko	Beresiko		
Kejadian Hipertensi	Tidak Mengalami Hipertensi	Count	20	38	58
		% within Kejadian Hipertensi	34.5%	65.5%	100.0%
		% within Paritas	42.6%	55.1%	50.0%
		% of Total	17.2%	32.8%	50.0%
Kejadian Hipertensi	Mengalami Hipertensi	Count	27	31	58
		% within Kejadian Hipertensi	46.6%	53.4%	100.0%
		% within Paritas	57.4%	44.9%	50.0%
		% of Total	23.3%	26.7%	50.0%
Total		Count	47	69	116
		% within Kejadian Hipertensi	40.5%	59.5%	100.0%
		% within Paritas	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	40.5%	59.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.753 ^a	1	.186		
Continuity Correction ^b	1.288	1	.256		
Likelihood Ratio	1.758	1	.185		
Fisher's Exact Test				.256	.128
Linear-by-Linear Association	1.738	1	.187		
N of Valid Cases	116				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Kejadian Hipertensi * Riwayat Abortus

Crosstab

			Riwayat Abortus		Total
			Tidak Beresiko	Beresiko	
Kejadian Hipertensi Tidak Mengalami Hipertensi	Count	53	5	58	
	% within Kejadian Hipertensi	91.4%	8.6%	100.0%	
	% within Riwayat Abortus	52.0%	35.7%	50.0%	
	% of Total	45.7%	4.3%	50.0%	
Kejadian Hipertensi Mengalami Hipertensi	Count	49	9	58	
	% within Kejadian Hipertensi	84.5%	15.5%	100.0%	
	% within Riwayat Abortus	48.0%	64.3%	50.0%	
	% of Total	42.2%	7.8%	50.0%	
Total	Count	102	14	116	
	% within Kejadian Hipertensi	87.9%	12.1%	100.0%	
	% within Riwayat Abortus	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	87.9%	12.1%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1.300 ^a	1	.254		
Continuity Correction ^b	.731	1	.393		
Likelihood Ratio	1.316	1	.251		
Fisher's Exact Test				.393	.197
Linear-by-Linear Association	1.289	1	.256		
N of Valid Cases	116				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Kejadian Hipertensi * LILA Crosstabulation

		LILA		Total	
		Tidak Beresiko	Beresiko		
Kejadian Hipertensi	Tidak Mengalami Hipertensi	Count	45	13	58
		% within Kejadian Hipertensi	77.6%	22.4%	100.0%
		% within LILA	57.7%	34.2%	50.0%
		% of Total	38.8%	11.2%	50.0%
	Mengalami Hipertensi	Count	33	25	58
		% within Kejadian Hipertensi	56.9%	43.1%	100.0%
		% within LILA	42.3%	65.8%	50.0%
		% of Total	28.4%	21.6%	50.0%
	Total	Count	78	38	116
		% within Kejadian Hipertensi	67.2%	32.8%	100.0%
		% within LILA	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	67.2%	32.8%	100.0%

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.636 ^a	1	.018		
Continuity Correction ^b	4.735	1	.030		
Likelihood Ratio	5.709	1	.017		
Fisher's Exact Test				.029	.014
Linear-by-Linear Association	5.587	1	.018		
N of Valid Cases	116				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.00.

b. Computed only for a 2x2 table



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

2. Lampiran Dokumentasi Pengambilan Data

- Pengambilan data di Puskesmas Kassi Kassi



ALAUDDIN
M A K A S S A R

- Pengambilan data di Puskesmas Dahlia



3. Lampiran Sampel Kasus dan Kontrol

SAMPEL KASUS

No.	No. Registrasi	Nama Pasien	Usia	Paritas	Riwayat Abortus	LILA
1.	328/19	Ny. I	28	0	0	Obesitas
2.	195/19	Ny. A	37	3	0	Obesitas
3.	117/19	Ny. M	29	3	0	Obesitas
4.	391/19	Ny. J	45	2	1	Obesitas
5.	1042/19	Ny. I	35	3	0	Obesitas
6.	154/19	Ny. U	36	2	0	Overweight
7.	233/19	Ny. T	28	0	0	Obesitas
8.	943/18	Ny. S	24	3	0	Normal
9.	266/19	Ny. M	24	1	0	Obesitas
10.	1018/19	Ny. H	23	1	0	Obesitas
11.	587/19	Ny. S	27	0	0	Obesitas
12.	613/19	Ny. J	38	1	0	Obesitas
13.	499/19	Ny. R	21	1	0	Underweight
14.	433/19	Ny. M	30	0	1	Normal
15.	220/19	Ny. Y	25	1	0	Underweight
16.	807/20	Ny. A	23	1	0	Overweight
17.	855/20	Ny. R	31	1	0	Overweight
18.	280/20	Ny. J	21	1	0	Normal

19.	629/20	Ny. R	40	2	0	Normal
20.	709/20	Ny. A	35	7	0	Obesitas
21.	571/20	Ny. S	42	4	0	Normal
22.	827/20	Ny. A	22	1	0	Overweight
23.	502/20	Ny. H	23	1	0	Overweight
24.	788/20	Ny. S	36	2	0	Obesitas
25.	751/20	Ny. I	35	0	1	Obesitas
26.	230/20	Ny. D	34	2	0	Obesitas
27.	409/20	Ny. M	26	0	0	Obesitas
28.	974/20	Ny. N	21	1	0	Obesitas
29.	495/20	Ny. K	30	0	0	Normal
30.	420/20	Ny. I	40	5	2	Obesitas
31.	736/20	Ny. R	35	2	0	Underweight
32.	196/20	Ny. R	40	4	0	Underweight
33.	367/20	Ny. F	23	0	0	Normal
34.	528/20	Ny. S	25	0	0	Normal
35.	817/20	Ny. N	33	1	1	Normal
36.	727/20	Ny. W	28	1	0	Underweight
37.	546/20	Ny. I	30	1	0	Obesitas
38.	559/20	Ny. H	35	3	1	Normal
39.	707/20	Ny. S	21	0	0	Underweight
40.	515/20	Ny. H	24	2	0	Obesitas
41.	588/20	Ny. Y	31	2	0	Overweight

42.	69/19	Ny. M	40	4	1	Normal
43.	107/19	Ny. S	42	3	0	Obesitas
44.	50/19	Ny. K	26	2	0	Obesitas
45.	76/19	Ny. M	37	4	0	Obesitas
46.	112/19	Ny. A	39	1	0	Obesitas
47.	114/19	Ny. N	37	3	2	Underweight
48.	66/19	Ny. I	35	2	0	Normal
49.	35/20	Ny. R	24	0	0	Underweight
50.	56/20	Ny. I	24	2	1	Normal
51.	118/20	Ny. N	27	2	0	Overweight
52.	124/20	Ny. I	34	2	0	Underweight
53.	128/20	Ny. F	28	2	0	Normal
54.	131/20	Ny. N	37	2	0	Normal
55.	132/20	Ny. A	19	1	0	Overweight
56.	138/20	Ny. F	38	6	0	Overweight
57.	168/20	Ny. J	33	1	0	Obesitas
58.	296/20	Ny. I	32	3	0	Obesitas

SAMPEL KONTROL

No.	No. Registrasi	Nama Pasien	Umur	Paritas	Riwayat Abortus	LILA
1.	104/19	Ny. R	21	0	0	Normal
2.	105/19	Ny. E	23	0	0	Normal
3.	106/19	Ny. N	26	1	6	Underweight
4.	109/19	Ny. R	21	0	1	Normal
5.	86/19	Ny. A	29	4	0	Normal
6.	57/19	Ny. S	28	1	0	Normal
7.	54/19	Ny. A	27	1	0	Normal
8.	50/19	Ny. N	38	1	0	Normal
9.	29/19	Ny. M	36	2	0	Normal
10.	36/19	Ny. K	32	2	0	Underweight
11.	03/19	Ny. R	28	2	0	Normal
12.	08/19	Ny. N	23	1	0	Normal
13.	12/19	Ny. N	26	2	0	Obesitas
14.	17/19	Ny. F	37	4	0	Normal
15.	25/19	Ny. L	34	3	1	Normal
16.	26/19	Ny. R	18	1	0	Obesitas
17.	28/19	Ny. R	30	0	0	Obesitas
18.	39/19	Ny. J	26	2	0	Obesitas
19.	60/19	Ny. R	29	2	0	Obesitas

20.	64/19	Ny. R	35	1	0	Underweight
21.	102/19	Ny. K	24	0	0	Normal
22.	103/19	Ny. S	30	4	0	Normal
23.	82/19	Ny. R	32	0	1	Normal
24.	40/19	Ny. N	22	0	0	Normal
25.	55/19	Ny. H	36	1	0	Underweight
26.	23/20	Ny. N	27	0	0	Obesitas
27.	25/20	Ny. H	32	1	0	Normal
28.	35/20	Ny. R	24	0	0	Underweight
29.	37/20	Ny. R	39	0	0	Normal
30.	35/20	Ny. W	30	3	0	Underweight
31.	77/20	Ny. S	28	2	0	Normal
32.	84/20	Ny. T	36	2	0	Obesitas
33.	86/20	Ny. M	27	1	0	Normal
34.	88/20	Ny. D	24	0	0	Obesitas
35.	90/20	Ny. N	25	0	0	Obesitas
36.	99/20	Ny. R	21	0	0	Obesitas
37.	167/20	Ny. I	19	0	0	Normal
38.	180/20	Ny. S	37	4	0	Obesitas
39.	256/20	Ny. M	24	2	0	Normal
40.	260/20	Ny. N	29	0	0	Normal
41.	262/20	Ny. R	36	2	0	Normal
42.	311/20	Ny. B	36	0	0	Normal

43.	320/20	Ny. F	39	0	0	Normal
44.	325/20	Ny. R	24	1	0	Obesitas
45.	327/20	Ny. U	18	0	0	Obesitas
46.	247/20	Ny. R	21	1	0	Underweight
47.	244/20	Ny. N	39	2	0	Normal
48.	227/20	Ny. R	36	0	0	Normal
49.	223/20	Ny. A	18	0	1	Normal
50.	46/19	Ny. I	23	0	0	Normal
51.	105/19	Ny. K	25	1	0	Normal
52.	92/19	Ny. H	28	1	0	Normal
53.	52/19	Ny. Y	23	1	0	Normal
54.	63/19	Ny. S	19	0	0	Underweight
55.	81/19	Ny. N	25	0	0	Underweight
56.	93/19	Ny. R	28	2	0	Normal
57.	90/19	Ny. I	27	2	0	Underweight
58.	50/19	Ny. F	21	4	0	Normal

Lampiran 4. Permohonan Izin Pengambilan Data Awal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar Telp. (0411)868720 Fax. (0411)864923
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa Telp. 1500363 (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400
Email : fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B. 2641/FKIK/PP.00.9/9/2020
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data Awal**

Makassar, 15 Desember 2020

Yth
Kepala Puskesmas Kassi-Kassi
di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Nurfadilah Syam
NIM : 70600117004
Jurusan : Pendidikan Dokter
Judul : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil
Data : Jumlah Ibu Hamil Yang Menderita Hipertensi Tahun 2019

Maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa tersebut dapat diberi izin untuk pengambilan data.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Gerny Nastity Handayani

Tembusan :
- Dekan FKIK (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar Telp. (0411) 868720 Fax. (0411) 864923
Kampus II; Jl. H.M. Yasin Liempo No. 36 Gowa Telp. 1500363 (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400
Email : fkiik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B. 3308/Un.06.1-FKIK/PP.00.9/12/2020 Makassar, 15 Desember 2020
Lampiran :-
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Yth
Kepala Puskesmas Dahlia
di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Nurfadilah Syam
NIM : 70600117004
Jurusan : Pendidikan Dokter
Judul : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil
Data : Jumlah Ibu Hamil Yang Mengalami Hipertensi Kehamilan

Maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa tersebut dapat diberi izin untuk pengambilan data.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Gemy Nastity Handayani

Tembusan :
- Dekan FKIK (sebagai laporan)

Lampiran 5. Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 10016/S.01/PTSP/2021
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-006/FKIK/PP.00.9/1/2021 tanggal 05 Januari 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ANDI NURFADILAH SYAM**
Nomor Pokok : 70600117004
Program Studi : Pend. Dokter
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA IBU HAMIL "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 Januari s/d 13 Februari 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 Januari 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

SIMAP PTSP 13-01-2021



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Lampiran 6. Rekomendasi Izin Penelitian



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710
M A K A S S A R

Nomor : 440/ 48 /PSDK /I/2021
Lamp :
Perihal : Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Kassi Kassi

Di -

Tempat

Sehubungan Surat dari Badan kesatuan bangsa dan Kesatuan Politik No :
10010/S.01/PTSP/2021, tanggal 13 Januari 2021 ,maka bersama ini disampaikan kepada
saudara bahwa :

Nama : Andi Nurfadilah Syam
NIM : 70600117004
Jurusan : Dokter
Institusi : UIN Alauddin Makassar
Judul : Faktor yang berhubungan dengan kejadian
hipertensi pada ibu hamil

Akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah puskesmas yang saudara
pimpin pada tanggal 13 Januari 2021 s/d 13 Februari 2021
Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 21 Januari 2021
Pit Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar

Ir. Agus Djaja Said, M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 19650814 199503 1 003



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710
MAKASSAR

Nomor : 440/ 48 /PSDK /II/2021
Lamp :
Perihal : Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Dahlia

Di -

Tempat

Sehubungan Surat dari Badan kesatuan bangsa dan Kesatuan Politik No :
10010/S.01/PTSP/2021, tanggal 13 Januari 2021 ,maka bersama ini disampaikan kepada
saudara bahwa :

Nama : Andi Nurfadilah Syam
NIM : 70600117004
Jurusan : Dokter
Institusi : UIN Alauddin Makassar
Judul : Faktor yang berhubungan dengan kejadian
hipertensi pada ibu hamil

Akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah puskesmas yang saudara
pimpin pada tanggal 13 Januari 2021 s/d 13 Februari 2021
Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 3 Februari 2021
Pit .Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar

Ir. Agus Djaja Said, M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 19650814 199503 1 003

Lampiran 7. Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : B-006/ FKIK/PP.00.9/1/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Gowa, 05 Januari 2021

Kepada Yth.
Kepala Puskesmas Kassi-Kassi
di-

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyelesaian skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka bersama ini kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara (i) memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Andi Nurfadilah Syam
NIM : 70600117004
Program Studi : Pendidikan Dokter
Judul Penelitian : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil
Dosen Pembimbing : 1. dr. Andi Tihardimanto, M.Kes
2. dr. Asrul Abdul Azis

Demikian penyampaian kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Gemy Nastir Handayany

Tembusan :

- Dekan FKIK (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : B-006/ FKIK/PP.00.9/1/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Gowa, 05 Januari 2021

Kepada Yth.
Kepala Puskesmas Dahlia
di-
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyelesaian skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka bersama ini kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara (i) memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Andi Nurfadilah Syam
NIM : 70600117004
Program Studi : Pendidikan Dokter
Judul Penelitian : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil
Dosen Pembimbing : 1. dr. Andi Tihardimanto, M.Kes
2. dr. Asrul Abdul Azis

Demikian penyampaian kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam



an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Gemy Nastir Handayany

Tembusan :
- Dekan FKIK (sebagai laporan)

Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Meneliti



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710
MAKASSAR

Nomor : 440/ 48 /PSDK II/2021
Lamp :
Perihal : Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Kassi Kassi

Di -
Tempat

Sehubungan Surat dari Badan kesatuan bangsa dan Kesatuan Politik No :
10010/S.01/PTSP/2021, tanggal 13 Januari 2021 ,maka bersama ini disampaikan kepada
saudara bahwa :

Nama : Andi Nurfadilah Syam
NIM : 70600117004
Jurusan : Dokter
Institusi : UIN Alauddin Makassar
Judul : Faktor yang berhubungan dengan kejadian
hipertensi pada ibu hamil

Akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah puskesmas yang saudara
pimpin pada tanggal 13 Januari 2021 s/d 13 Februari 2021
Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 21 Januari 2021
Pit Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar

Ir. Agus Djaja Said, M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 19650814 199503 1 003



DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

PUSKESMAS DAHLIA
Jl. Seroja No 3 Telepon (0411) 878303
MAKASSAR



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 015 /PKM-D/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Hj. Nurhayati Ingratubun, M.Kes
Jabatan : Kepala Puskesmas Dahlia Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDI NURFADILAH SYAM
NIM : 70600117004
Program Studi : Kedokteran
Instirusi : UIN Alauddin Makassar

Bahwa yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Puskesmas Dahlia Kota Makassar mulai tanggal 13 Januari 2021 s/d 13 Februari 2021 dengan judul penelitian "**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS KASSI-KASSI DAN PUSKESMAS DAHLIA KOTA MAKASSAR TAHUN 2019-2020**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di keluaran di : Makassar
Pada Tanggal : 5 Januari 2021



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Andi Nurfadilah Syam
2. Nim : 70600117004
3. Jurusan : Program Studi Pendidikan Dokter
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : BTN. Minasa Upa E 9/12
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : H. Andi Syamsul Bahri, SH, MH.
 - b. Ibu : Hj. Andi Ariyana Bohang, S.Sos, MM.

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Inpres Minasa Upa
2. SMP : MTsN Model Makassar
3. SMA : Pesantren Modern Putri IMMIM Pangkep
4. Tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar