

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN GEDI MERAH (*Abelmoschus manihot* L) TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH TIKUS (*Rattus novergicus*) YANG DIINDUKSI PREDNISON DAN GARAM



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A NURJANAH A R

Oleh:

701000112031

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurjanah
NIM : 70100112031
Tempat/Tgl. Lahir : Samarinda, 04 Juni 1994
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Rahmatullah 3 No.4 Tamangapa Raya
Judul : Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Gedi Merah (*Abelmoschus manihot* L) Terhadap Penurunan Tekanan Darah Tikus (*Rattus novergicus*) yang Diinduksi Prednison dan Garam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Agustus 2016

Penulis,

NURJANAH
70100112031

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Gedi Merah (*Abelmoschus manihot* L) terhadap Penurunan Tekanan Darah Tikus (*Rattus novergicus*) yang Diinduksi Prednison dan Garam” yang disusun oleh Nurjanah, NIM: 70100112031, mahasiswa jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 24 Agustus 2016 M yang bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqā’dah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 24 Agustus 2016 M
21 Dzulqā’dah 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd..	(.....)
Pembimbing I	: Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc., Apt.	(.....)
Penguji Kompetensi	: Mukhriani, S.Si., M. Si., Apt.	(.....)
Penguji Agama	: Dr. H. Dudung Abdullah, M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. A. Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP.19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala Puji hanya milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena atas Rahmat, Hidayah dan BimbinganNya-lah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Tak lupa pula tercurahkan shalawat serta salam kepada baginda Muhammad *Shalallahu 'alaihi Wa Sallam* karena atas perjuangannya lah sehingga hari ini kita bisa merasakan keindahan Islam dan kenikmatan iman, kepada para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqamah hingga hari akhir nanti InsyaaAllah.

Skripsi dengan judul “**Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Gedi Merah (*Abelmoschus manihot* L) Terhadap Penurunan Tekanan Darah Tikus (*Rattus novergicus*) yang Diinduksi Prednison dan Garam**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan **Bapak Dr. dr. H. A. Armyn Nurdin, M. Sc.** selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan seluruh jajarannya;

2. Ibu **Haeria, S.Si., M.Si.** selaku ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan penelitian ini.
3. Ibu **Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt.** selaku dosen pembimbing pertama yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu **Munifah Wahyuddin, S. Farm., M.Sc., Apt.** selaku dosen pembimbing kedua yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu **Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.** selaku dosen penguji kompetensi yang telah memberikan saran dan kritik kepada penulis demi perbaikan dan kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini serta Bapak **Dr. Dudung Abdullah, M.Ag.** selaku dosen penguji agama yang memberikan bimbingan, arahan, nasihat serta saran kepada penulis selama penelitian dan penyusunan skripsi ini .
6. Seluruh Staf pengajar jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan serta arahan kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Bapak **Hendra Herman S. Farm., M. Sc., Apt.** selaku Kepala Laboratorium Farmakologi Praktikum Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian

ini dan Kakanda **kak Ivha** selaku Laboran Farmakologi Praktikum fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia yang telah membimbing, mendampingi dan mengarahkan penulis selama penelitian ini

8. Kedua orang tuaku (Ayahanda **Aep** dan Ibunda **Yanti**) tersayang yang selalu memberikan dukungan doa lewat sujud-sujudnya, semangat serta saudara-saudaraku (Kak **Tisna**, Kak **Arifin**, kak **Rofikoh**, Kak **Maman**, Kak **Misnah**, Kak **Ulfa** dan adikku **Hanifah**)
9. Bapak dan Ibuku (Bapak **Suardi Dg.Ngalle** dan Ibu **Juria Dg. Bau**) dan saudara-saudara ku (Kak **Rahmah**, **Ihsan**, **Iwan**, **Ikca** dan adikku **Iffah**).
10. Teman-teman seperjuangan **ISOHYD12IS**, kakak-kakak dan adik-adik di **Farmasi UINAM**

Akhir kata, penulis berharap dengan Doa semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa meridhai dan membalas semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis, besar harapan penulis semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat tentunya.


Makassar.....2016

Penyusun

DAFTAR ISI


JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRAC	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Defenisi operasional dan ruang lingkup penelitian	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Uraian Tumbuhan	10
B. Uraian hewan uji	13
C. Uraian obat	16
D. Ekstraksi	24
E. Uraian Penyakit	25
F. Tinjauan Dalam Islam	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	39

B. Pendekatan Penelitian	39
C. Pengolahan Sampel.....	39
D. Instrumen Penelitian	44
E. Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Implikasi Penelitian	57
KEPUSTAKAAN	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Skema Kerja.....	64
Lampiran 2	Perhitungan Dosis	66
Lampiran 3	Tekanan darah rata-rata Sistol dan diastol	69
Lampiran 4	Analisis Statistik Secara RAL	70
Lampiran 5	Analisis statistik secara SPSS	76
Lampiran 6	Gambar	93
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup.....	95



DAFTAR TABEL

Tabel I	Data Bilogik Normal Tikus	14
Tabel II	Klasifikasi Hipertensi Menurut JNC 8	26
Tabel IV.1	Ekstraksi Daun Gedi Merah(<i>Abelmoschus manihot</i> L)	46
Tabel IV.2	Tekanan Darah sistol dan diastol	46
Tabel IV.3	Persen Penurunan Tekanan Darah	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Grafik Penurunan Tekanan Darah Sistol	47
Gambar IV.2	Grafik Penurunan Tekanan Darah Diastol	48



ABSTRAK

Nama : Nurjanah
NIM : 70100112031
Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Gedi Merah (*Abelmoschus manihot* L) Terhadap Penurunan Tekanan Darah Tikus (*Rattus novergicus*) yang Diinduksi Prednison dan Garam.

Daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) merupakan tanaman yang digunakan oleh masyarakat sebagai pengobatan alternatif untuk menurunkan kadar kolestrol, antihipertensi dan antidiabetes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antihipertensi dari ekstrak etanol 70 % daun Gedi Merah (*Abelmoschus manihot* L) pada tikus putih jantan (*Rattus novergicus*) yang diinduksi larutan Prednison[®] dan garam. Digunakan lima belas ekor tikus jantan (*Rattus novergicus*) dibagi dalam lima kelompok yaitu kelompok Kontrol Positif Kaptopril[®], Kontrol Negatif CMC 1 %, Kelompok Dosis I (50 mg/ g BB), kelompok Dosis II (100 mg/ g BB) dan kelompok Dosis III (150 mg/ g BB). Pengukuran tekanan darah sistol dan diastol dilakukan dengan menggunakan alat pengukur tekanan darah Non- Invasif CODA[®]. Hasil analisis pengukuran darah menunjukkan bahwa ekstrak 70 % daun Gedi Merah (*Abelmoschus manihot* L) dapat menurunkan tekanan darah sistol dan diastol secara bermakna pada hari ke-21 pengujian, dan ekstrak yang efektif menurunkan tekanan darah yaitu dosis 50 mg/ g BB.

Kata Kunci : Daun gedi merah, Hipertensi, Non-Invasif CODA[®], Induksi Prednison dan Garam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Nama : Nurjanah
NIM : 70100112031
Judul : The Effect Of Leaf Extract Of Red Gedi Leaf (*Abelmoschus Manihot* L) To The Decrease In Blood Pressure Induced Rats (*Rattus Novergicus*) Prednisone And Sodium Chloride.

Red gedi leaf (*Abelmoschus manihot* L) is the crop that empirically has hypertensive effect. This research aimed to know the antihypertensive effect of 70 % ethanol extract of red gedi leaf (*Abelmoschus manihot* L) in sodium chloride and prednisone induced white male rats (*Rattus novergicus*). Fifteen rats male were divided into five groups of 3 animals each were use and administered orally with), Captopril (Positive Control), CMC liquid 1 % (Negative Control), Dosage I (50 mg/ g BB), Dosage II (100 mg/ g BB) and Dosage III (150 mg/ g BB). The blood pressure systole and diastole was measured using CODA[®] non-invasive blood pressure. Result from analysis of blood pressure data showed that the 70 % ethanol extract of red gedi leaf (*Abelmoschus manihot* L) cold significantly reduce blood pressure (systole, diastole and average blood pressure)on hypertensive rats in days 21th and that effective reduce blood pressure is dosage I (50 mg/ g BB).

Key word: red gedi leaf, hypertensive, non-invasive CODA[®], sodium chloride and prednisone induced.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tumbuhan merupakan salah satu bahan obat tradisional yang telah dikenal sejak dahulu kala. Penggunaan obat tradisional telah menarik perhatian dan kepopulerannya dimasyarakat kita semakin meningkat. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat telah menerima dan membuktikan manfaat dan kegunaan tumbuhan obat dalam pemeliharaan kesehatan (Mora dan Armon, 2012).

Penggunaan bahan alam, baik sebagai obat maupun tujuan lain cenderung meningkat, terlebih dengan adanya isu *back to nature*. Obat tradisional dan tanaman obat banyak digunakan di masyarakat menengah ke bawah terutama dalam upaya *preventif, promotif* dan *rehabilitative* (Katno, 2009).

Sementara ini banyak orang beranggapan bahan penggunaan tanaman obat atau obat tradisional relatif lebih aman dibandingkan obat sintetis. Umumnya khasiat obat-obat tradisional sampai saat ini hanya didasarkan pada pengalaman empiris dan belum teruji secara ilmiah.

Di Indonesia sendiri, tanaman obat sudah digunakan oleh masyarakat secara turun temurun sejak berabad-abad yang lalu. Pengetahuan tentang tanaman obat itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui resep nenek moyang, adat istiadat dan kepercayaan setempat.

Akhir-akhir ini terjadi peningkatan penelitian terhadap herbal dan bahan alami untuk mengobati berbagai macam penyakit. Industri farmasi juga berusaha mencari peluang pemanfaatan bahan alam dan turunannya sebagai bahan untuk obat. Selain itu, kebutuhan dan permintaan pasar juga perlu dipertimbangkan dalam upaya menemukan obat yang baru untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit secara signifikan.

Daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) adalah salah satu dari jenis tanaman yang banyak ditemukan di pekarangan rumah sebagai tanaman hias juga digunakan sebagai sayuran (Astuty, 2005).

Di Papua, tanaman gedi merah (*Abelmoschus manihot* L.) sangat dikenal oleh masyarakat, karena tanaman ini dijadikan sebagai sayuran pokok oleh masyarakat setempat sedangkan di Manado tanaman ini juga dijadikan sayuran untuk menu makanan bubur Manado.

Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa tanaman gedi merah (*Abelmoschus manihot* L.) dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif yaitu untuk menurunkan kadar gula darah, antiinflamasi, antioksidan, antidepresan dan penurunan tekanan darah (Suoth, 2013).

Tanaman ini mengandung isoquercitrin, hyperoside, hibifolin, quercetin-3'-O-glukosida, quercetin dan isorhamnetin yang memiliki efek sebagai antidepresan (Guo *et al*, 2011).

Selain itu, pada bunga tanaman ini juga mengandung myricetin, cannabiscitrin, myricetin-3-O-beta-D-glucopyranoside, glycerolmonopalmitate, asam 2,4-dihidroksi benzoat, guanosin, adenosin, asam maleat, heptatriacontanoic, asam 1-triakontanol, tetracosane, beta sitosterol, dan beta-sitosterol-3-O-beta-D-glukosida yang memiliki efek sebagai antidiabetes dan antiinflamasi (Sarwar, *et al.* 2011).

Penelitian lain Chumbhale (2013), tentang kandungan fenolik yang terdapat dalam daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) melaporkan adanya kandungan flavonoid yaitu flavon, flavonol, isoflavon, antosianin dan proantosianin.

Senyawa flavonoid yang berada dalam makanan mempunyai efek antihipertensi, karena flavonoid dapat menghambat enzim perubahan angiotensin I menjadi angiotensin II (Robinson, 1995).

Pengobatan hipertensi menggunakan tanaman obat dilakukan berdasarkan konsep yang mencakup empat sisi, yaitu penurunan tekanan darah, perbaikan kerusakan atau ketidakberesan organ yang menjadi penyebab naiknya tekanan darah, pengobatan atau pencegahan penyakit komplikasi dan penyertanya, serta pemeliharaan lingkungan tubuh dalam kondisi tekanan darah normal (Andrianto, 2011).

Hipertensi atau biasa dikenal dengan tekanan darah tinggi adalah kondisi tekanan darah seseorang yang berada di atas batas-batas tekanan darah normal. Hipertensi diperkirakan menjadi penyebab kematian 7,1 juta orang diseluruh dunia, yaitu sekitar 13 % dari total kematian, dan prevalensinya hampir sama besar baik di

Negara berkembang maupun Negara maju. Hipertensi menunjukkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi karena hipertensi merupakan penyebab utama peningkatan risiko penyakit stroke, jantung dan ginjal (Puspita, 2014).

Hipertensi atau tekanan darah tinggi sampai sekarang menjadi penyakit pembunuh nomor satu di Indonesia. Belakangan ini, penyakit hipertensi tidak hanya menyerang orang lanjut usia karena faktor degeneratif akan tetapi penyakit ini juga menyerang pada usia produktif (Herlambang, 2013).

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional Tahun 2013. Prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui pengukuran pada umur > 18 tahun sebesar 25,8 %, tertinggi di Bangka Belitung (30,9 %), diikuti Kalimantan Selatan (30,8 %), Kalimantan Timur (29,6 %) dan Jawa Barat (29,4 %). Sedangkan untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri sebesar 28,1 % (Trihono, 2013).

Pada sekitar 88 % penyebab tidak diketahui dan dikenal sebagai hipertensi esensial atau hipertensi primer. Sisanya diketahui penyebabnya dikenal sebagai hipertensi sekunder (Apriyanti, 2011).

Hipertensi primer atau esensial adalah suatu kondisi yang lebih sering terjadi pada banyak orang. Penyebab dasar yang mendasarinya tidak selalu diketahui (Aprianti, 2011).

Hipertensi sekunder kemungkinan memiliki banyak penyebab; beberapa perubahan pada jantung dan pembuluh darah kemungkinan bersama-sama menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Jika penyebabnya diketahui maka

disebut hipertensi sekunder. Pada sekitar 5- 10 % penderita hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal. Pada sekitar 1- 2 % penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu (Aprianti, 2011).

Di kalangan masyarakat dikenal bahwa salah satu penyebab hipertensi yaitu terlalu banyak asupan garam yang masuk ke dalam tubuh. Namun masyarakat awam tidak mengetahui bagaimana asupan garam yang berlebih dapat meningkatkan tekanan darah sehingga seseorang terdiagnosa hipertensi.

Penderita hipertensi perlu membatasi asupan garam, karena kandungan mineral natrium (sodium) di dalamnya memegang peranan penting terhadap timbulnya hipertensi. Yang dimaksud garam disini adalah garam natrium, baik yang berupa garam dapur yang ditambahkan sewaktu memasak maupun semua bahan makanan yang mengandung natrium tinggi. Natrium dan klorida merupakan ion utama cairan ekstraseluler. Konsumsi natrium yang berlebihan dapat menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler meningkat. Departemen Kesehatan RI 2013 mengatakan konsumsi garam lebih dari 2.000 mg beresiko hipertensi. Sedangkan *The Dietary Guidelines for Americans* merekomendasikan asupan garam tidak lebih dari 2.300 mg/hari (Center Disease Control, 2012).

Selain itu, penyebab lain dari naiknya tekanan darah yaitu karena penggunaan obat-obatan (Handayany, 2014).

Salah satu obat yang dapat meningkatkan tekanan darah yaitu obat golongan kortikosteroid. Kortikosteroid dapat menyebabkan hipertensi melalui efek

mineralokortikoid yaitu dengan cara meningkatkan retensi natrium dan air di ginjal sehingga volume darah bertambah dan meningkatkan tekanan darah. Hipertensi akibat pemberian kortikosteroid bergantung pada dosis dan lama pemberian (Sitompul, 2011).

Dari uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk membuktikan hipotesa masyarakat tentang khasiat daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L.) dalam menurunkan tekanan darah yaitu dengan menggunakan tikus sebagai hewan uji yang diinduksi menggunakan prednison dan garam untuk meningkatkan tekanan darahnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemberian ekstrak daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) dapat memberikan efek menurunkan tekanan darah pada tikus putih (*Rattus novergicus*)?
2. Pada dosis berapa pemberian ekstrak daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) efektif menurunkan tekanan darah tikus (*Rattus novergicus*) ?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

- a. Gedi merupakan tanaman yang mudah tumbuh dan telah dikenal di Indonesia termasuk di Papua.

- b. Tikus (*Rattus norvegicus*) adalah hewan digunakan sebagai hewan coba dengan penggunaan sekitar 90-95 % diantara hewan mamalia laboratorium lainnya.
- c. Hipertensi merupakan penyakit heterogen yang ditandai dengan naiknya tekanan darah yang penyebabnya diketahui (sekunder) maupun yang tidak diketahui (primer)
- d. Sistol adalah tekanan darah yang terukur pada saat ventrikel kiri jantung berkontraksi.
- e. Diastol adalah tekanan darah yang terjadi pada saat jantung berelaksasi.
- f. Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu kamar. Metode maserasi digunakan untuk menyari simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyari.
- g. Ekstraksi adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut polar ataupun non polar seperti metanol, etanol, etil asetat, dan n-heksan.
- h. Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan cara menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya matahari langsung.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah laboratorium murni yang meliputi penggunaan bahan alam yang diujikan pada hewan coba.

D. Kajian Pustaka

Lexi Mamahit (2009) dalam penelitiannya “ Eikodekana Dari Daun Tumbuhan Gedi (*Abelmoschus manihot* L Medik) Asal Sulawesi Utara” mengatakan bahwa Daun Gedi (*Abelmoschus manihot* L.) mengandung senyawa kimia yang mempunyai efek farmakologis untuk membantu penyembuhan berbagai jenis penyakit.

Yori Yuliandra (2013) dalam penelitiannya “ Studi Efek Antihipertensi Tumbuhan Tali Putri (*Cassytha filiformis* L.) Pada Tikus Hipertensi Yang Diinduksi Prednison dan Garam ”. Berdasarkan penelitian tersebut hasil uji menunjukkan bahwa dengan diberikan induksi kombinasi prednison dan garam dapat meningkatkan tekanan darah.

Armenia (2007) dalam penelitiannya, “ Daun Tanaman Akar Mambu (*Connarus grandis* jack.) Sebagai Obat Antihipertensi: Efektivitas Ekstrak Etanolnya pada Tikus Hipertensi 2k1c Goldblatt. Peneliti menggunakan Kaptopril sebagai pembanding, dimana kaptopril merupakan obat hipertensi yang bekerja menghambat enzim pengubah angiotensin I menjadi angiotensin II dan menginaktifkan bradikinin suatu vasodilator kuat. Dosis kaptopril 2,5 mg/ Kg BB yang digunakan penelitian ini adalah dosis konversi dari dosis efektif manusia ke tikus.

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efek ekstrak etanol daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L.) terhadap tikus (*Rattus novergicus*) dalam menurunkan tekanan darah.
- b. Untuk mengetahui dosis ekstrak yang efektif dalam menurunkan tekanan darah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan informasi secara ilmiah mengenai khasiat daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) dalam menurunkan tekanan darah,
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang khasiat daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) dalam menurunkan tekanan darah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Uraian Tumbuhan*

1. **Klasifikasi Tumbuhan**

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledonae
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: <i>Abelmoschus</i>
Spesies	: <i>Abelmoschus manihot</i> L (Kayadu, 2013).

2. **Nama Daerah**

Gedi (Sulawesi), gidi (Minahasa), nating, iyondong, kuei, maree (Sulawesi Utara), degi (Ternate), ki dedi, edi (Jawa) dan singa depa (Sunda) (Sutarto, 2007).

3. **Morfologi Tanaman**

Tanaman gedi berasal dari suku Malvaceae yaitu suku yang sama dengan tanaman kembang sepatu. Tanaman ini merupakan tumbuhan tahunan yang berbatang tegak dengan tinggi tanaman sekitar 1,2 – 1,8 meter dan permukaan kulit batang licin atau sedikit kasar (Kayadu, 2013).

Daun gedi berwarna hijau gelap dengan bentuk menjari dan tekstut tepian daun yang bergelombang. Pertulangan daun gedi menonjol pada permukaan serta memiliki tangkai daun yang panjang. Daun gedi tersusun berseling dan bervariasi dalam bentuk, ukuran, warna pigmentasi dan pigmentasi. Ukuran panjang daun mencapai 10-40 cm sebanyak 3-7 helai (Kayadu, 2013).

Bunga berukuran besar dan berbentuk lonceng dengan diameter 4-8 cm. tangkai bunga gedi berukuran pendek dan berbulu halus. Buah gedi berbentuk kapsul dengan panjang 5-20 cm. tanaman gedi memiliki biji berbentuk bulat dan berwarna coklat dengan diameter 2-4 cm (Kayadu, 2013).

4. Ekologi

Tanaman gedi tumbuh subur di lingkungan tropis pada dataran rendah dengan ketinggian 0- 500 m tetapi masih dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 1200 m dpl. Tanaman gedi memerlukan distribusi curah hujan yang merata sepanjang tahun dengan curah hujan 1200 mm per tahun (Kayadu, 2013).

Gedi mampu tumbuh pada berbagai jenis tanah, tetapi akan tumbuh dengan baik pada jenis tanah lempung berpasir dan tanah liat dengan pH antara 5-7. Pertumbuhannya akan terhambat pada tanah-tanah yang sangat basa karena terjadi defisiensi unsure mikro dan kekeringan (Kayadu, 2013).

5. Kandungan Kimia

Tanaman ini mengandung quercetin-3-o- robinobiosid, hyperin, isoquercetin, gossipetin-8-oglukuronoid, dan Myricetin. Sedangkan bunganya

mengandung quercetin- 3- robinoside, quersetin – 3'-glikosida, hyperin,myrecetin, antosianin dan hyperoside (Lin- lin et al. 2007).

Seluruh bagian tanaman mengandung lendir dalam jumlah yang cukup banyak. Komponen lendir tersebut adalah arabinosa, ramnosa, galaktosa, glukosa, laktosa dan asam galakturonat, juga terkandung asam lemak seperti malvalat, asam sterkuliat dan asam epoksial. Pada daun juga terdapat senyawa flavonoid yaitu kelompok flavon atau 3-OH tersubsitusi serta kerabatnya seperti glikosida rutin, isokuersetin, glikosida kaemperon, glikosida ramnetin, kanabestin dan kuersimeritin (Mandey, 2013).

Selain itu, pada bunga tanaman ini juga mengandung myricetin, cannabiscitrin, myricetin-3-0-beta-D-glucopyranoside, glycerolmonopalmitate, asam 2,4-dihidroksi benzoat, guanosin, adenosin, asam maleat,heptatriacontanoic, asam 1-triakontanol, tetracosane, beta sitosterol, dan beta-sitosterol-3-0-beta-D-glukosida yang memiliki efek sebagai antidiabetes dan antiinflamasi (Sarwar, *et al.* 2011).

6. Kegunaan

Beberapa pengalaman secara empiris menyatakan bahwa tanaman gedi merah (*Abelmoschus maniho* L) dapat dijadikan sebagai obat diare, obat usus buntu dan berkhasiat untuk mempercepat proses melahirkan. Daun gedi merah (*Abelmoschus maniho* L) yang direbus tanpa garam, digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, antara lain sakit ginjal, maag dan kolesterol tinggi (Mamahit dan Soekamto).

Di Papua, daunnya banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional usai persalinan bagi ibu hamil, daunnya dipercaya mampu meningkatkan produksi ASI bagi ibu yang sedang menyusui (Assagaf, 2013).

Di daerah kecamatan Pineleng, kabupaten Minahasa bahwa daun geddi merah (*Abelmoschus manihot* L) dapat dimanfaatkan sebagai penanganan herbal yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit, seperti diabetes, kolesterol dan hipertensi (Adeline, 2015).

B. Uraian Hewan Uji

1. Klasifikasi Hewan Uji

Kingdom : Animalia
 Filum : Chordata
 Kelas : Mamalia
 Ordo : Rodentia
 Famili : Muridae
 Genus : Rattus
 Spesies : *Rattus novergicus* (Adiyati, 2011).



2. Karakterisasi Tikus

Hewan coba merupakan hewan yang dikembangbiakkan untuk digunakan sebagai hewan uji coba. Tikus sering digunakan pada berbagai macam penelitian medis selama bertahun-tahun. Hal ini disebabkan tikus memiliki karakteristik genetic yang unik, mudah berkembangbiak, murah serta mudah untuk mendapatkannya.

Tikus merupakan hewan yang melakukan aktifitasnya pada malam hari (Adiyati, 2011).

Tikus putih (*Rattus norvegicus*) atau biasa dikenal dengan nama lain *Norway rat* berasal dari daerah Cina dan menyebar ke Eropa bagian barat (Sirois, 2005). Pada wilayah Asia Tenggara tikus ini berkembang biak di Filipina, Indonesia, Laos, Malaysia, dan Singapura (Adiyati, 2011).

Tikus wistar saat ini menjadi salah satu yang strain tikus paling populer yang digunakan untuk penelitian laboratorium. Hal ini ditandai oleh kepala lebar, telinga panjang, dan memiliki panjang ekor yang kurang selalu kurang dari panjang tubuhnya (Sirois, 2005).

Tikus putih (*Rattus norvegicus*) termasuk hewan mamalia yang memiliki ekor panjang. ciri-ciri galur ini yaitu bertubuh panjang dengan kepala lebih sempit. Telinga tikus ini tebal dan pendek dengan rambut halus. Mata tikus berwarna merah. Ciri yang paling terlihat adalah ekornya yang panjang (lebih panjang dibanding tubuh). Bobot badan tikus jantan pada umur dua belas minggu mencapai 240 gram sedangkan tikus betinanya mencapai 200 gram. Tikus memiliki lama hidup antara 4-5 tahun dengan berat badan umum tikus jantan berkisar antara 267-500 gram dan betina 225-325 gram (Sirois, 2005).

3. Data Biologik Normal

Tabel. 2.1 Data Biologik Normal Tikus

- Konsumsi pakan per hari	5 g/ 100 g BB
- Konsumsi minum per hari	8-11 ml/100 g BB
- Diet Protein	12 %
- Ekskresi urin per hari	5,5 ml/100 g BB
- Lama hidup	2,5 – 3 tahun
- Bobot badan dewasa:	
- Jantan	300- 400 g
- Betina	250 – 300 g
- Bobot lahir	5- 6 g
- Dewasa kelamin	50 ±10 hari
- Siklus estrus	5 hari (polyestrus)
- Umur sapih	21 hari (40 – 50 g)
- Mulai makan pakan kering	12 hari
- Rasio kawin	1 jantan – 3 atau 4 betina
- Jumlah kromosom	42
- Suhu rectal	37,5 °C
- Laju respirasi	85 x/ mn
- Denyut jantung	300 – 500 x/ mn
- Pengambilan darah (maks)	5, 5 ml/ kg

- Jumlah sel darah merah	7,2 – 9,6 x 10 ⁶ / μl
- Jumlah sel darah putih	14 x 10 ³ / μl
- Kadar hemoglobin (Hb)	15,6 g/dl
- Pack Cell Volume (PCV)	46 %

(Syamsuddin dan Darmono, 2011).

Untuk tekanan darah hewan coba (tikus) dikatakan hipertensi jika tekanan darah sistolik melebihi 120 mmHg. Sumber lain menyebutkan bahwa hipertensi dicapai setelah tikus mengalami peningkatan tekanan darah > 10 mmHg dari tekanan darah pada kelompok normal. Dimana tekanan darah normal pada tikus yaitu 100/80 mmHg (Ciptaningsih, 2012).

C. Uraian Obat


1. Prednison

Nama Resmi : PREDNISONUM

Nama lain : Prednison, 1,2- dehydrocortison, Deltacortisone, Deltahydrocortisone, Metacortandracin

Rumus molekul : C₂₁H₂₆O₅

Rumus struktur



(Clarke's, 2005).

- Berat molekul : 358, 43
- Pemerian : Serbuk hablur, putih atau hampir putih, tidak berbau, mula- mula tidak berasa kemudian pahit
- Kelarutan : Sangat sukar larut dalam air, sukar larut dalam etanol (95 %)P, dalam kloroform P, dalam dioksan P dan dalam metanol P
- Penyimpanan : Dalam wadah tertutup baik
- Kegunaan : Adrenoglukokortikoid (Dirjen POM, 1979)
- Farmakodinamik : Sebagian besar efek glukokortikoid yang diketahui terjadi melalui reseptor glukokortikoid yang tersebar luas. Protein- protein tersebut merupakan anggota dari keluarga besar reseptor inti meliputi steroid, sterol (vitamin D), tiroid, asam retinoat, dan masih banyak reseptor lain yang berinteraksi dengan promoter dan meregulasi transkripsi gen-gen target

Farmakokinetik : Pada orang dewasa normal, disekresi 10-20 mg cortisol setiap hari, tanpa adanya stress. Tingkat sekresi tersebut mengikuti irama sirkadian yang ditentukan oleh pulsa tak beraturan ACTH yang mencapai puncak pada dini hari dan sesudah makan. Pada plasma, cortisol terikat pada protein dalam sirkulasi. *Corticosteroid-binding globulin (CBG)*- suatu globulin α_2 yang disintesis oleh hati- mengikat 90 % hormone dalam sirkulasi pada kondisi normal sedangkan sisanya (sekitar 5-10 %) bersifat bebas atau terikat lemah pada albumin (kira-kira 5 %) dan tersedia untuk digunakan efeknya pada sel target. Apabila kadar plasma kortisol melebihi 20- 30 $\mu\text{g}/\text{d}$, CBG menjadi jenuh dan konsentrasi kortisol bebas bertambah dengan cepat (Betram, 2013).

Senyawa steroid adalah senyawa golongan lipid yang memiliki struktur kimia tertentu, yaitu memiliki 3 cincin sikloheksana dan siklopentana. Suatu molekul steroid yang dihasilkan secara alami oleh korteks adrenal tubuh dikenal dengan nama senyawa kortikosteroid. Selain steroid alami, telah banyak disintesis glukokortikoid sintetik yang termasuk golongan obat yang penting karena secara luas digunakan, terutama untuk penggunaan penyakit-penyakit inflamasi. Contohnya adalah

deksametason, prednison, metilprednisolon, triamsinolon, betametason dan lain-lain (Ikawati, 2014).

Prednison (*Hostacortin*) adalah derivat-keto yang baru aktif setelah diubah dalam hati menjadi derivat-hidronya prednisolon. Khasiat dan penggunaannya sama, hanya tidak digunakan secara local dan intra-artikuler karena tidak dihidrogenasi di kulit, mukosa mata dan sendi (Tjay, Tan Hoan, 2010).

Jika diberikan dalam dosis besar daripada dosis fisiologik, steroid seperti kortison dan hidrokortison yang memiliki efek mineralokortikoid selain efek glukokortikoid, menyebabkan retensi natrium dan cairan serta pengeluaran kalium. Pada pasien dengan fungsi kardiovaskuler dan ginjal yang normal, hal ini menyebabkan alkalosis hipokalemik dan akhirnya peningkatan tekanan darah. Pada pasien dengan hipoproteinemia, penyakit ginjal atau penyakit hati juga dapat terjadi edema. Pada pasien dengan penyakit jantung, bahkan retensi natrium ringan sudah dapat memicu gagal jantung (Betram, 2013).

Peningkatan volume plasma terjadi melalui ikatan antara kortikosteroid dengan reseptor pada sel epitel *renal distal tubula*. Ikatan tersebut menyebabkan peningkatan reabsorpsi natrium dan retensi cairan sehingga volume plasma bertambah dan meningkatkan tekanan darah. Hipertensi akibat pemberian kortikosteroid bergantung pada dosis dan lama pemberian. Hipertensi umumnya ditemukan pada pasien yang menerima kortikosteroid dengan dosis ekuivalen prednison > 20 mg/hari (Fardet, 2007).

Efek samping, pemberian glukokortikoid adalah tukak peptik dan konsekuensi- konsekuensinya. Temuan klinis yang berkaitan dengan gangguan tertentu, terutama infeksi bakteri dan jamur, mungkin tersamar oleh kortikosteroid, dan pasien perlu dipantau dengan cermat untuk menghindari kesalahan serius ketika digunakan dosis besar. Miopati berat lebih sering terjadi pada pasien yang mendapat glukokortikoid kerja lama. Pemberian senyawa-senyawa semacam ini dilaporkan menyebabkan mual, pusing bergoyang, dan penurunan berat badan sebagian pasien. Hiponema atau psikosis akut dapat terjadi, terutama pada pasien yang mendapat kortikosteroid dosis tinggi. Terapi jangka panjang dengan steroid kerja sedang dan lama dilaporkan berkaitan dengan depresi dan timbulnya katarak subkapsul posterior. Pada para pasien ini diindikasikan pemantauan psikiatrik dan pemeriksaan berkala *slit lamp*. Meningkatnya tekanan intraokulus sering terjadi dan hal ini dapat memicu glaukom. Juga terjadi hipertensi intrakranium jinak (Betram, 2013).


2. Captopril

Nama resmi : CAPTOPRILUM

Nama lain : Captopril, kaptopril, Acediur, Aceomel, Acepril, Aceplus, Acepress

Rumus molekul : $C_9H_{15}NO_3S$

Rumus struktur :



- Berat molekul : 217,3
- Kelarutan : mudah larut dalam air, etanol, kloroform, metilen klorida dan metanol.
- Pemerian : serbuk berwarna putih
- Penyimpanan : dalam wadah tertutup baik
- Khasiat : Antihipertensi (Clarke's, 2005).
- Farmakokinetik : parameter farmakokinetik dan rekomendasi dosis kaptopril cepat diabsorpsi tetapi mempunyai durasi kerja yang pendek, sehingga bermanfaat untuk menentukan apakah seorang pasien akan berespon baik pada pemberian ACEI. Dosis pertama ACEI harus diberikan pada malam hari karena penurunan tekanan darah mendadak mungkin terjadi; efek ini akan meningkat jika pasien mempunyai kadar sodium rendah (Lyrawati, 2008).

Enzim adalah protein yang memiliki aktivitas katalisis, yaitu mempercepat reaksi kimia pada sistem biologis. Suatu enzim tidak memengaruhi konstanta ekuilibrium reaksi yang dikatalisisnya, tetapi menurunkan ambang energy yang dibutuhkan sehingga reaksi bisa bekerja dengan lebih mudah. Ciri khas enzim adalah aksinya yang spesifik, yaitu bahwa dia bekerja pada substrat tertentu saja (Ikawati, 2014).

Angiotensin- Converting Enzyme (ACE) merupakan enzim penting dalam sintesis rennin angiotensin. ACE disebut juga dengan peptidil dipeptida hidrolase atau peptidil dipeptidase. Enzim ini mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II adalah suatu vasokonstriksi poten dan pemacu sekresi aldosteron. Aldosteron sendiri menyebabkan peningkatan volume darah sehingga meningkatkan resistensi vaskuler. Penghambatan pada enzim ini menghasilkan efek 1) vasodilatasi lalu menurunkan resistensi vaskuler sehingga menurunkan tekanan darah, dan 2) menurunkan sekresi aldosteron, lalu menurunkan volume darah sehingga menurunkan beban akhir jantung (*afterload*). Contoh obat ini adalah kaptopril, enalapril, lisinopril, ramipril dan lain-lain (Nugroho, 2010).

Kaptopril dan obat lain dalam kelas ini menghambat enzim mengubah di peptidil dipeptidase yang menghidrolisis angiotensin I menjadi angiotensin II dan (di bawah nama kininase plasma) menginaktivkan bradikinin, suatu vasodilator poten, yang bekerja paling tidak dengan merangsang pengeluaran nitrat oksida dan prostasiklin. Aktivitas hipotensif kaptopril dihasilkan oleh efek inhibis terhadap sistem rennin angiotensin dan efek stimulatorik terhadap sistem kalikrein- kinin (Betram, 2013).

Inhibitor angiotensin II menurunkan tekanan darah terutama melalui penurunan resistensi vaskuler perifer. Curah jantung dan kecepatan jantung tidak secara signifikan berubah. Tidak seperti vasodilator langsung, obat-obat ini tidak menyebabkan pengaktifan simpatis refleks dan dapat digunakan dengan aman pada

orang dengan penyakit jantung iskemik. Tidak adanya takikardia refleks mungkin disebabkan oleh penyetelan ulang baroreseptor atau meningkatnya aktivitas parasimpatis. Meskipun ACEI paling efektif pada kondisi-kondisi yang berkaitan dengan peningkatan aktivitas rennin plasma namun tidak terdapat korelasi baik antara aktivitas rennin plasma dan respon antihipertensif. Karena itu, penentuan profil rennin tidak diperlukan. Inhibitor ACE berperan penting dalam mengobati pasien dengan penyakit ginjal kronik karena mereka mengurangi proteinuria dan menstabilkan fungsi ginjal (Betram, 2013).

Pada pasien yang hipovolemik akibat diuretik, pembatasan garam atau kehilangan cairan melalui saluran cerna, dapat terjadi hipotensif berat setelah dosis awal inhibitor ACE. Efek samping lain yang umum bagi semua inhibitor ACE adalah gagal jantung akut (terutama pada pasien dengan stenosis arteri renalis bilateral atau stenosis arteri renalis ginjal tunggal), hiperkalemia, batuk kering yang kadang disertai oleh oleh mengi, dan angiodema. Hiperkalemia lebih besar kemungkinannya terjadi pada pasien dengan infusensi ginjal atau diabetes (Betram, 2013).

Inhibitor ACE dikontraindikasikan bagi wanita hamil trimester kedua dan ketiga karena resiko hipotensi, anuria, dan gagal ginjal janin, yang kadang disertai malformasi atau kematian janin (Betram, 2013).

Interaksi obat yang penting mencakup interaksi dengan suplemen kalium atau diuretik hemat-kalium, yang dapat menyebabkan hiperkalemia. Obat antiinflamasi non-steroid dapat mengganggu efek hipotensif inhibitor ACE dengan

menghambat vasodilatasi yang diperantai oleh bradikinin, yang paling tidak sebagian diperantarai oleh prostaglandin (Betram, 2013).

D. Ekstraksi

1. Pengertian

Ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dari campurannya dengan pembagian sebuah zat terlarut antara dua pelarut yang tidak dapat tercampur untuk mengambil zat terlarut tersebut dari satu pelarut ke pelarut yang lain (Sudjadi, 1988).

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses ekstraksi adalah lama ekstraksi, suhu dan jenis pelarut yang digunakan. Pelarut yang digunakan tergantung dari sifat komponen yang akan diisolasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pelarut adalah sifat polaritas bahan. Sifat polaritas bahan harus sama dengan polaritas pelarut agar bahan dapat larut. Ada tiga jenis pelarut yaitu pelarut polar, semi polar dan non polar (Priyatmoko, 2008).

2. Mekanisme Kerja

Proses pengekstraksian komponen kimia dalam sel tanaman adalah pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dalam pelarut organik di luar sel, maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel dan proses ini akan berulang terus sampai terjadi keseimbangan antara konsentrasi cairan zat aktif di dalam dan di luar sel (Ditjen POM, 1995).

3. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi yaitu untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut (Sudjadi, 1988).

4. Maserasi

Maserasi istilah aslinya adalah maserasi (bahasa latin artinya merendam) adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati yaitu rendam menggunakan pelarut bukan air (pelarut non polar) atau setengah air, misalnya etanol encer, selama periode waktu tertentu sesuai dengan aturan dalam buku resep kefarmasian (Ditjen POM, 1995).

E. Uraian Penyakit

1. Pengertian

Hipertensi dapat dikatakan sebagai suatu penyakit persistensi yang ditandai dengan naiknya tekanan darah di atas normal $\geq 140/90$ mmHg. Hipertensi juga dapat diartikan sebagai peningkatan tekanan arteri persistensi (Dipiro *et al*, 2012).

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah diastolik tetap yang lebih besar dari 90 mmHg disertai dengan kenaikan tekanan darah sistolik (140 mmHg) (Olson, 2004).

Tekanan darah sistol merupakan tekanan darah yang tertukur pada saat ventrikel kiri jantung berkontraksi (sistol). Darah mengalir dari jantung ke pembuluh

darah sehingga pembuluh darah teregang maksimal. Pada pemeriksaan fisik, bunyi “lup” pertama yang terdengar adalah tekanan darah sistol (Korotkoff I). Tekanan darah sistol pada orang normal rata-rata 120 mmHg. Tekanan darah diastol merupakan tekanan darah yang terjadi pada saat jantung berelaksasi (diastol). Pada saat diastol, tidak ada darah mengalir dari jantung ke pembuluh darah sehingga pembuluh darah dapat kembali ke ukuran normalnya sementara darah didorong ke bagian arteri yang lebih distal. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darah diastol dapat ditentukan melalui bunyi “dup” terakhir yang terdengar (Korotkoff V). pada orang normal, rata-rata diastol adalah 80 mmHg (Rony,2010).

Meningkatnya tekanan darah di dalam arteri bisa terjadi melalui beberapa cara:

- Jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak cairan dari pada setiap detiknya
- Arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku, sehingga mereka tidak dapat mengembang pada saat jantung memompa darah melalui arteri tersebut. Karena itu, darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh yang sempit daripada biasanya dan menyebabkan naiknya tekanan. Inilah yang terjadi pada usia lanjut, dimana dinding arterinya telah menebal dan kaku karena arteriosklerosis. Dengan cara yang sama, tekanan darah juga meningkat pada saat terjadi “vasokonstriksi”, yaitu jika arteri kecil (arteriola) untuk sementara waktu mengkerut karena perangsangan saraf atau hormon di dalam darah.

- Bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Hal ini terjadi jika terdapat kelainan fungsi ginjal sehingga tidak mampu membuang sejumlah garam dan air dari dalam tubuh. Volume darah dalam tubuh meningkat, sehingga tekanan darah juga meningkat (Handayany, 2010).

2. Klasifikasi Hipertensi

Tabel. 2.2 Klasifikasi hipertensi menurut JNC 8 (Dipiro, 2012).

Klasifikasi	Sistolik (mmHg)	Diastolik (mmHg)
Normal	< 120	< 80
Prehipertensi	120 – 139	80 – 90
Hipertensi Stage I	140 – 159	90 – 99
Hipertensi Stage II	≥ 160	≥ 100

Klasifikasi hipertensi berdasarkan penyebabnya:

- Hipertensi esensial atau primer yang penyebabnya tidak diketahui disebut hipertensi idiobatik, kira-kira 90 % kasus. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti genetic, lingkungan, hiperaktivitas sistem saraf simpatis, sistem rennin angiotensin, gangguan ekskresi Na^+ , pengingkatan Na^+ dan Ca^{2+} intraseluler dan faktor-faktor resiko lain seperti obesitas, alkohol, merokok dan polisitemia.
- Hipertensi sekunder atau hipertensi renal. Terdapat 5 % kasus hipertensi yang penyebabnya diketahui, seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hiperaldosteronisme primer, feokromatositomea dan kehamilan. Hipertensi

sekunder juga dapat terjadi atau terinduksi karena penggunaan obat-obat seperti amfetamin, kokain, cyklosporin, takrolimus, NSAIDs, pseudoefedrin, prednison dan kontrasepsi oral (Priyanto, 2010).

Klasifikasi hipertensi menurut bentuknya:

- a. Hipertensi diastolik yaitu peningkatan tekanan diastolik tanpa diikuti peningkatan tekanan sistolik. Biasanya ditemukan pada anak-anak dan dewasa muda.
- b. Hipertensi campuran (sistol dan diastole meninggi) yaitu peningkatan tekanan darah pada sistol dan diastol.
- c. Hipertensi sistolik (*isolated systolic Hypertension*) yaitu peningkatan tekanan sistolik tanpa diikuti peningkatan tekanan diastolik. Umumnya ditemukan pada usia lanjut (Gunawan, 2001).

3. Patofisiologi

Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor, pada medula otak. Dari pusat vasomotor ini bermula jaras saraf simpatis, yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan keluar dari kolumna medula spinalis ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini neuron preganglion melepaskan asetilkolin, yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah,

dimana dengan dilepaskannya norepinefrin mengakibatkan konstriksi pembuluh darah (Elizabeth, 2009).

Berbagai faktor kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokonstriktor (Elizabeth, 2001).

Pada saat bersamaan dimana sistem saraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai respon rangsang emosi, kelenjar adrenal juga terangsang mengakibatkan tambahan aktivitas vasokonstriksi. Medula adrenal mengekskresi kortisol dan steroid lainnya yang dapat memperkuat respon vasokonstriktor pembuluh darah. Vasokonstriksi yang mengakibatkan penurunan aliran darah ke ginjal, menyebabkan pelepasan renin. Renin merangsang pembentukan angiotensin I yang kemudian diubah menjadi angiotensin II, suatu vasokonstriktor kuat, yang pada gilirannya merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormone ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume intravaskule. Semua faktor tersebut cenderung mencetus keadaan hipertensi (Elizabeth, 2009).

4. Faktor Resiko

1. Kegemukan (*obesitas*)

Merupakan ciri khas penderita hipertensi. Walaupun belum diketahui secara pasti hubungna antara hipertensi dengan kegemukan, namun terbukti bahwa daya pompa jantung dan sirkulasi volume darah penderita obesitas dengan hipertensi lebih tinggi daripada dengan berat badan normal. Memang tidak semua penderita hipertensi

berbadan gemuk, orang kurus pun tidak tertutup kemungkinan terserang hipertensi. Kenyataannya obesitas peluang terkena hipertensi lebih besar.

2. Stres

Diduga melalui aktivitas saraf simpatis (saraf yang bekerja pada saat beraktivitas). Peningkatan aktivitas saraf simpatis mengakibatkan meningkatnya tekanan darah secara tidak menentu.

3. Faktor keturunan (genetik)

Seseorang yang memiliki riwayat keturunan penderita hipertensi memiliki peluang lebih besar terkena hipertensi daripada orang yang tidak memiliki riwayat keturunan. Gen yang dibawa dari riwayat keturunan sedarah sangat besar pengaruhnya terhadap penyakit ini, meskipun penyakit hipertensi tidak identik penyakit keturunan.

4. Jenis kelamin

Berdasarkan data record hasil penelitian, ternyata pria berpeluang menderita hipertensi lebih besar daripada wanita. Kaitannya dengan masalah gender ini lebih dipengaruhi oleh kondisi psikologis.

5. Usia

Sering disebut bahwa hipertensi salah satu penyakit degeneratif, yaitu penyakit karena usia. Semakin bertambahnya usia akan semakin menurun produktivitas organ tubuh seseorang.

6. Asupan Garam

Konsumsi garam (NaCl) yang berlebih dapat menahan air (retensi) sehingga meningkatkan jumlah volume darah, akibatnya jantung harus bekerja keras dan tekanan darah menjadi naik.

7. Makanan dan Gaya Hidup

Tekanan darah tinggi erat kaitannya dengan gaya hidup dan makanan. Sebagian faktor gaya hidup yang menyebabkan hipertensi, antara lain konsumsi kopi berlebihan, minum alkohol, kurang olahraga, stress, dan merokok (Sunanto, 2009).

5. Tanda dan Gejala

Pada pemeriksaan fisik, tidak dijumpai kelainan apapun selain tekanan darah yang tinggi, tetapi dapat pula ditemukan perubahan pada retina, seperti pendarahan, eksudat (kumpulan cairan), penyempitan pembuluh darah, dan pada kasus berat, edema pupil (edema pada diskus optikus) (Betram, 2013).

Individu yang menderita hipertensi kadang tidak menampakan gejala sampai bertahun-tahun. Gejala bila ada menunjukkan adanya kerusakan vaskuler, dengan manifestasi yang khas sesuai sistem organ yang divaskularisasi oleh pembuluh darah bersangkutan. Perubahan patologis pada ginjal dapat bermanifestasi sebagai nokturia (peningkatan urinasi pada malam hari) dan azetoma (peningkatan nitrogen urea darah (BUN) dan kreatinin (Betram, 2013).

Berikut ini adalah beberapa gejala umum yang biasanya dirasakan oleh penderita hipertensi:

- a. Tengukuk terasa pegal dan tidak nyaman
- b. Detak jantung terasa cepat dan berdebar-debar
- c. Telinga berdengung
- d. Kerusakan jantung dan ginjal
- e. Vertigo
- f. Penglihatan kabur
- g. Nyeri di kepala
- h. Tubuh mudah lelah dan lesu
- i. Sulit tidur
- j. Rasa sakit di pinggang
- k. Mudah marah (Bayu, 2013).

6. Obat Antihipertensi

Pengobatan standar yang dianjurkan *Joint National Committee on Detection, Evaluation and treatment of High Blood Pressure* (1988) yang dikutip oleh Gunawan, (2001) menyimpulkan bahwa jenis obat antihipertensi yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Diuretika: Spironolactone, HCT, Chlortalidone dan Indopanide.

Obat ini berkerja dengan cara mengeluarkan cairan tubuh melalui urin atau memperbanyak buang air kecil dan mempertinggi pengeluaran garam didalam tubuh. Dengan turunnya kadar garam dalam tubuh maka tekanan darah akan turun, dan efek

tekanan darah rendahnya kurang kuat. Obat yang biasa digunakan biasanya obat yang daya kerjanya panjang sehingga dapat digunakan dosis tunggal.

b. Alfa-blocker: Prazosin dan Terazosin.

Obat ini bekerja dengan cara memblokir reseptor alfa dan melebarkan pembuluh darah serta untuk menurunkan tekanan darah.

c. Beta-blocker: Beta-blocker adalah Propanolol, Atenolol, Pindolol dan sebagainya.

Obat ini bekerja untuk membatasi kerja jantung sehingga mengurangi daya dan frekuensi kerja atau pompa jantung. Dengan demikian tekanan darah akan menurun dan daya tekanan darah rendahnya baik.

d. Obat yang bekerja sentral: Clonidine, Guanfacine dan Metildopa.

Obat ini dapat mengurangi pelepasan noradrenalin sehingga menurunkan aktivitas pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah.

e. Vasodilator: Hidralazine dan Ecarazine.

Obat ini bertujuan untuk mengembangkan dinding pembuluh darah arteri sehingga daya tahan pembuluh darah perifer berkurang dan tekanan darahnya menurun.

f. Antagonis kalsium; Nifedipine dan Verapamil.

Obat ini bekerja untuk menghambat masuknya ion kalsium kedalam otot polos pembuluh darah dengan efek pelebaran dan menurunkan tekanan darah.

g. Penghambat ACE

Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) menghambat secara langsung angiotensin converting enzyme (ACE) dan menghalangi konversi angiotensin-1 menjadi angiotensin-2. Aksi ini mengurangi angiotensin-2 yang dapat menimbulkan vasokonstriksi dan sekresi aldosteron. Adanya jalur lain yang menghasilkan angiotensin-2 mengakibatkan ACEI tidak menghalangi secara penuh produksi angiotensin-2 sehingga ACEI tidak menyebabkan efek pada metabolisme.

Bradikinin terakumulasi pada sebagian pasien karena penghambatan ACE mencegah kerusakan dan inaktivasi bradikinin. Bradikinin dapat mengakibatkan vasodilatasi dengan mengeluarkan nitro oksida, tetapi bradikinin juga dapat menimbulkan terjadinya batuk. Contoh obat golongan ACEI adalah kaptopril, enalapril, dan lisinopril (Saseen, 2009).

F. Tinjauan dalam Islam

Hasan Ghaznawi, M.D. dalam makalahnya '*Islam And Medicine*' menjelaskan, bahwa Islam adalah agama yang relevan di setiap zaman dan tempat. Islam adalah sebuah sistem multikompleks, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan temporal. Dengan mempraktikkan hukum-hukum Islam, setiap muslim di segala penjuru Dunia bukan saja mendapatkan doktrin spiritual, namun juga solusi dari berbagai problematika financial dan kesehatan (Basyier, 2011).

Setiap baris dalam Al-Qur'an mengandung realitas hebat atau nilai ilmiah tertentu, atau setidaknya sebuah upaya menembus realitas tertentu. Bahkan dalam

nuansa Qur'ani, ilmu pengetahuan itu adalah barisan teks yang komprehensif, memuat seluruh cabang keilmuan, pengenalan terhadap hakikat banyak agama, menyingkap ragam teknologi, pertanian, produksi dan pengobatan. Pada dasarnya, itu saja sudah merupakan bagian dari mukjizat agama kita yang suci ini, yang mampu membuat ekspansi terhadap ilmu pengetahuan manusia (Basyier, 2011).

Hal ini bisa dipahami melalui QS. An Nahl/ 16: 89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَنُذْرًا لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

Titik tekan pada potongan ayat di atas adalah yang menyatakan bahwa di turunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan sesuatu. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan; di dalam Al-Qur'an ini jelas dikatakan kepada kita segala ilmu dan segala hal. Jadi, ketika kita ingin mengambil suatu ilmu maka ambillah dalam Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu. Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari atas ilmu pengetahuan, penelitian, eksperimental ilmiah dan hukum sebab akibat (Muhammad, 2004).

Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi Wa Sallam* secara tegas mengakui bahwa setiap pencapaian yang diperoleh oleh siapapun- muslim ataupun kafir-, dalam mengenal, mengetahui dan mengilmui berbagai jenis penyakit dan obat-obatan yang dapat menyembuhkannya, haruslah dihargai. Dan bahwasanya setiap ahli medis

memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam pengenalan terhadap penyakit dan kapabilitas dalam menyembuhkannya (Basyier, 2011).

Dalam kajian terhadap ayat – ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan telah banyak dilakukan. Salah satu diantaranya menjelaskan khasiat tumbuh – tumbuhan untuk mencegah atau mengobati berbagai jenis penyakit. Salah satu kutipan ayat berikut QS. As-Syu'ara/26:7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?

Ayat tersebut mengisyaratkan agar kita senantiasa memperhatikan apa yang Allah telah ciptakan di bumi ini salah satunya yaitu tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan. Sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Perkasa, Maha Agung Lagi Mahakuasa yang telah menciptakan bumi dan menumbuhkan didalamnya tumbuh-tumbuhan yang baik berupa tanam-tanaman, buah-buahan dan hewan. Apa yang telah diciptakan oleh Allah seperti tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup harus senantiasa kita syukuri dan kita lestarikan. Pelestarian tumbuh-tumbuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan mengikuti ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Salah satunya yaitu dengan melakukan penelitian terkait tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai alternatif pengobatan.

Daun gedi merah merupakan salah satu tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah untuk digunakan sebagai obat alternatif. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk

ciptaan Allah yang diberikan kemampuan dan daya nalar, berupaya untuk menemukan khasiat pengobatan dari daun gedi merah.

Ibnul Qayyim Al-Jauzy (dikutip dalam Basyier, *Kedokteran Nabi Antara Realitas dan Kebohongan*) menjelaskan, “ Tidak diragukan lagi bahwa masing-masing daerah memiliki keistimewaan sendiri-sendiri dengan obat-obatan yang ada di daerah masing-masing yang mungkin tidak cocok untuk daerah lain. Obat-obatan yang tumbuh suatu daerah akan berguna mengobati penyakit di daerah tersebut mungkin karena pengaruh dari struktur tanahnya, temperature udara atau keduanya. Karena masing-masing tanah juga memiliki sifat khas dan tekstur, mirip dengan perbedaan watak manusianya sendiri. Seringkali ada tumbuhan di sebagian daerah yang cocok daerah yang cocok menjadi makanan mereka, namun bagi penduduk daerah lain bisa menjadi racun pembunuh. Bisa jadi sesuatu yang menjadi obat pada suatu tempat justru menjadi makanan biasa di tempat lain. Ada juga obat untuk obat penyakit tertentu di suatu tempat justru menjadi obat penyakit lain di lain tempat. Obat-obatan yang cocok untuk penduduk suatu tempat, bisa saja tidak cocok untuk penduduk di tempat lain, bahkan tidak berguna sama sekali (Basyier, 2010).

Rasulullah *Shalallahu'alaihi wa Sallam* bersabda, dalam hadits Abu Hurairah *Radhiallahu 'anhu*:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

"Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga" (HR. Bukhari: 5678).

Karena penegasan Hadits bahwa "*Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga*", bahwa setiap penyakit Allah pasti menciptakan obatnya di dunia ini, maka segala upaya yang dilakukan orang untuk meneliti jenis apapun yang diyakini bisa menjadi obat dari penyakit tertentu. Dan setiap muslim harus yakin bahwa ketika sakit pasti Allah akan menyembuhkan. Hal ini berdasarkan firman Allah melalui QS. Asy-Syu'araa/26: 80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

"*Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.*"

Tafsirnya yaitu disandarkan penyakit kepada makhluknya, sekalipun hal itu merupakan takdir dan ciptaan Allah. Akan tetapi Ia akan sandarkan hal itu kepada diri manusia sebagai sikap beradab. Makna hal itu berarti, jika aku menderita sakit, maka tidak ada seorangpun yang kuasa menyembuhkanku selain Allah (Basyier, 2011).

Bila umat Islam sangat memahami hadits tentang "*setiap penyakit ada obatnya*", mereka akan terpacu untuk bekerja keras menyingkap rahasia medis pada berbagai macam tanaman, baik itu buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, biji-bijian dedaunan bahkan juga batang-batang dan ranting pohon, bebunga, putik, hingga pongkol buah dan sejenisnya, yang bertebaran di sekitar mereka (Basyier, 2011).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimental murni. Rancangan penelitian menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap) dan dianalisis dengan metode ANAVA kemudian dilanjutkan dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) dan Tukey's HSD.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biofarmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Farmakologi Praklinik Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah berupa pendekatan eksperimental yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil dari eksperimental yang dilakukan.

C. Pengolahan Sampel

1. Pengambilan Sampel

Sampel penelitian daun gedi merah diperoleh dari Kampung Hasik Jaya Distrik Moswaren Kab. Sorong Selatan, Prov. Papua Barat.

2. Penyiapan Bahan Uji

a. Pembuatan ekstrak daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L)

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi. Sampel daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L.) yang telah kering dimasukkan ke dalam wadah maserasi, ditambahkan etanol 70 % hingga semua sampel terendam seluruhnya. Lalu ditutup rapat-rapat dan dibiarkan selama 3 x 24 jam sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring dan dipisahkan ampas dan filtratnya, lalu dimaserasi kembali dengan cairan penyari yang baru. Dipekatkan dan diuapkan etanolnya dengan menggunakan *Rotary Evaporator*. Dibeas etanolkan dengan cara ditetaskan sebanyak 2 tetes air panas pada ekstrak kental. Disimpan ekstrak tersebut di tempat yang tertutup baik.

a. Pembuatan Bahan Penginduksi

1. Pembuatan Suspensi CMC 1% b/v

Ditimbang 1 gram CMC dalam 50 ml aquadest yang dipanaskan hingga suhu 70°C. CMC kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit kedalam air yang telah dipanaskan sambil diaduk hingga homogen. Kemudian di cukupkan hingga 100 ml dan dimasukkan dalam wadah yang tertutup baik.

2. Pembuatan Suspensi Prednison®

Ditimbang tablet prednison sebanyak 10 tablet. Kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Setelah itu semua tablet dimasukkan kedalam lumpang dan digerus hingga halus dan homogen. Kemudian hitung berat serbuk prednison. Serbuk

prednison dimasukkan kedalam labu ukur kemudian disuspensikan dengan CMC 1% b/v sedikit demi sedikit hingga homogen, dicukupkan volumenya hingga 100 ml.

3. Pembuatan Larutan NaCl 2% b/v Penginduksi

Pembuatan larutan NaCl 2 % b/v yaitu dengan menimbang 2 gram NaCl kemudian dilarutkan dalam 100 ml air.

4. Pembuatan Bahan Perbandingan Kaptopril®

Ditimbang tablet kaptopril sebanyak 10 tablet. Kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Setelah itu semua tablet dimasukkan kedalam lumpang dan digerus hingga halus dan homogen. Kemudian hitung berat serbuk kaptopril. Serbuk kaptopril® dimasukkan kedalam labu ukur kemudian disuspensikan dengan CMC 1% b/v sedikit demi sedikit hingga homogen, dicukupkan volumenya hingga 100 ml.

5. Perhitungan Dosis untuk Uji Pendahuluan

Percobaan ini dimulai dengan uji pendahuluan terlebih dahulu yang bertujuan untuk optimasi dosis ekstrak daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L). Untuk uji pendahuluan ini digunakan 3 tikus jantan yang dibagi secara acak dalam tiga kelompok perlakuan. Masing-masing kelompok diberi perlakuan yaitu diinduksi dengan NaCl dan Prednison® untuk meningkatkan tekanan darahnya, kemudian diberikan ekstrak daun gedi merah dengan dosis pendahuluan yaitu 50 mg/kg BB dosis rendah, 100 mg/kg BB dosis sedang dan 150 mg/kg BB dosis tinggi.

6. Pembuatan suspensi ekstrak etanol daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L)

Dibuat suspensi ekstrak etanol daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) dengan 3 perbandingan dosis, ditimbang ekstrak daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L), dimasukkan kedalam labu ukur kemudian disuspensikan dengan CMC 1% b/v sedikit demi sedikit hingga homogen, lalu cukupkan masing-masing volumenya hingga 100 ml.

b. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Coba

Hewan uji yang digunakan yaitu tikus jantan yang berusia 2-3 bulan dengan berat badan 150-250 gram, sebanyak 15 ekor tikus yang dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan. Tiap kelompok perlakuan terdiri dari 3 ekor tikus, dimana sebelum perlakuan tikus diadaptasi selama \pm 14 hari dengan pemberian pakan hewan.

c. Perlakuan hewan uji

Setelah diadaptasi selama 14 hari dan dipuasakan 8-16 jam, diukur tekanan darah awal tikus kemudian tikus diinduksi Prednison[®] dan NaCl 2 % dengan volume pemberian masing-masing 2 ml/200 g BB secara oral selama 14 hari lalu diukur tekanan darah.

Selanjutnya tikus dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan, yaitu kelompok 1 sebagai kelompok kontrol positif dengan pemberian obat antihipertensi Kaptopril[®] pada hari ke-8, yang sebelumnya telah diinduksi NaCl 2 ml/ 200 g BB dan Prednison[®] dengan volume pemberian sebanyak 2 ml/ 200 g BB selama 14 hari, kelompok 2 sebagai kontrol negatif dengan pemberian CMC 1 % b/v pada hari ke-8

yang sebelumnya telah diinduksi NaCl 2 ml/200 g BB dan Prednison[®] dengan volume pemberian sebanyak 2 ml/ 200 g BB selama 14 hari sedangkan untuk kelompok 3, 4 dan 5 merupakan kelompok uji dengan pemberian ekstrak Daun Gedi Merah (*Abelmoschus manihot* L) dengan dosis I (50 mg/ g BB), dosis II (100 mg/g BB), dan dosis III (150 mg/ g BB) pada hari ke-8 yang sebelumnya telah diinduksi NaCl 2 ml/200 g BB dan Prednison[®] selama 14 hari.

Penginduksian dengan NaCl 2 ml/ 200 g BB dan Prednison[®] dan pemberian bahan uji dilakukan satu kali sehari secara oral dengan menggunakan sonde dan dilakukan pada jam yang sama. Pengukuran tekanan darah dilakukan pada hari ke-0, 14, dan 21. Pengukuran tekanan darah menggunakan metode *non-invasive blood pressure*.

d. Pengukuran Tekanan Darah Hewan Uji

Pengukuran tekanan darah dilakukan dengan cara terlebih dahulu tikus dimasukkan kedalam restainer (kandang individual) yang berukuran tepat untuk satu tubuh tikus dengan ekor menjuntai keluar, kemudian ekor tikus dijepit dengan alat *pressure kit* lalu dihubungkan pada *pressure meter*, untuk mengetahui tekanan darah sistolik dan diastolik. Prinsip kerja pengukuran tekanan darah adalah *cuff* digelembungkan sampai mencapai tekanan darah diatas tekanan darah sistolik, sehingga nadi menghilang kemudian tekanan *cuff* dikurangi perlahan-lahan. Pada saat tekanan darah mencapai dibawah tekanan sistolik nadi akan muncul pada layar kaca monitor.

D. Instrument Penelitian

1. Alat Yang digunakan

Alat yang digunakan adalah alat pengukur tekanan darah non invasif (CODA[®]), alu, baskom, batang pengaduk, kanula, lumpang, magnetic stirrer (Mixer Vortex[®]), mangkuk, *rotary vacum evaporator* (Heidolph[®]), sendok besi, seperangkat alat-alat gelas, spoit 5 ml (Terumo[®]), timbangan tikus (Mettler Teledo[®]), timbangan analitik (Kern[®]) dan vial.

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan adalah makanan standar untuk tikus (AD-2), aquades, NaCl, etanol 70 %, CMC 1 % b/v, Prednison[®] 5 mg , Kaptopril[®] 25 mg dan ekstrak etanol 70 % Daun Gedi Merah (*Abelmoschus manihot* L).

E. Analisis Data

Data yang diperoleh diolah secara statistik menggunakan SPSS. Analisis yang dilakukan adalah uji homogenitas. Kemudian untuk mengetahui hubungan antara kelompok perlakuan, dilakukan analisis varian satu arah (ANOVA) kemudian dilanjutkan dengan BNT (Beda Nyata Terkecil) dan uji Tukey's HSD.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstrak Daun Gedi Merah (*Abelmoschus manihot* L)

Tabel 4.1. Ekstraksi Daun Gedi Merah (*Abelmoschus manihot* L)

Sampel	Metode	Berat sampel	Berat ekstrak	Volume pelarut	Lama perendaman
Daun gedi merah	Maserasi	350 gram	10.65 gram	2 liter	3 x 24 jam


2. Pengujian Tekanan Darah Tikus

Tabel 4.2. Tekanan darah Sistol dan diastol

Perlakuan	Replikasi	Tekanan Darah pada setiap perlakuan			Persentase penurunan (%)
		Hari ke-1	Hari ke-14	Hari ke- 21	
		Sistol/diastol (mmHg)	Sistol/ Diastol (mmHg)	Sistol/diastol (mmHg)	
Kontrol positif	1	90/81	248/171	128/81	48.38/52.63
Kaptopril®	2	98/85	205/193	116/103	43.41/46.63
	3	103/74	299/268	130/112	56.52/58.20
Rata-rata		97/80	250.6/210.66	124.66/98.66	50.26/53.16


Kontrol negatif	1	118/107	263/231	226/195	14.06/15.58
CMC 1 %	2	117/83	206/201	203/157	1.45/21.89
	3	112/93	226/193	205/183	9.29/5.18
Rata-rata		115.66/94.33	231.66/208.33	211.33/178.33	8.77/14.40
Dosis 50 mg/gBB	1	106/99	209/167	127/78	39.23/53.29
	2	107/90	233/201	136/120	41.63/40.29
	3	101/82	231/196	143/119	38.09/39.28
Rata-rata		104.66/90.33	224.33/188	135.33/105.66	39.67/43.79
Dosis 100 mg/gBB	1	105/80	235/158	184/116	21.70/26.58
	2	109/95	250/171	198/123	20.8/28.07
	3	106/96	223/152	204/138	8.52/9.21
Rata-rata		106.66/90.33	236/160.33	195.33/125.66	17.23/21.62
Dosis 150 mg/gBB	1	109/98	265/146	171/153	35.47/0
	2	110/88	233/181	157/137	32.61/24.30
	3	110/89	231/196	148/106	35.93/45.91
Rata-rata		109.66/91.66	243/174.33	158.66/132	34.70/24.28

Gambar. 4.1 Grafik Persentase Penurunan Tekanan Darah Sistol



Keterangan: Awal : Pengukuran tekanan darah pada hari ke-1
 Induksi : Pengukuran tekanan darah pada hari ke-1
 Terapi : Pengukuran tekanan darah pada hari ke-21

Gambar 4.2 Grafik Persen Penurunan Tekanan Darah Diastol



Keterangan: Awal : Pengukuran tekanan darah pada hari ke-1
 Induksi : Pengukuran tekanan darah pada hari ke-14
 Terapi : Pengukuran tekanan darah pada hari ke-21

B. Pembahasan

Hipertensi adalah keadaan tekanan darah tinggi yang abnormal yang diukur dalam minimal tiga kali pengukuran dari seseorang yang telah beristirahat minimal lima menit. Hipertensi dapat didefinisikan pula sebagai peningkatan tekanan darah arteri yang persisten (Saseen dan Carter, 2005).

Beberapa faktor penyebab hipertensi diantaranya yaitu faktor genetik, jenis kelamin, usia, obat-obatan, asupan garam dan obesitas.

Salah satu faktor penyebab terjadinya hipertensi karena asupan garam yang berlebihan. Hal ini karena penumpukan garam di dalam tubuh akan meningkatkan volume cairan ekstrasel. Dimana, konsumsi natrium yang berlebihan dapat menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstrasel meningkat (Center Disease Control, 2012).

Oleh karena itu, Islam pun melarang untuk melakukan hal-hal yang berlebihan termasuk dalam hal makanan. Hal ini didasarkan atas firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam

QS. Al-A'raaf/ 7: 31

..... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

...makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Menurut tafsir Ibnu Katsir (Abdullah, 2004) Imam al-Bukhari meriwayatkan, Ibnu ‘Abbas berkata: “Makan, minum, berpakaian dan bersedekahlah kalian dengan tidak sombong dan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah suka melihat nikmat-Nya tampak pada hambaNya (Hadist ini diriwayatkan oleh an-Nasa’I dan Ibnu Majah).

Dari penjelasan ayat dan hadits diatas dijelaskan tentang dilarangnya makan atau minum secara berlebih-lebihan termasuk didalamnya asupan garam yang berlebihan sehingga dapat memicu terjadinya hipertensi.

Selain itu, penggunaan obat kortikosteroid juga dapat menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Salah satu golongan obat kortikosteroid yang dapat meningkatkan tekanan darah yaitu prednison, dimana prednison dapat menyebabkan hipertensi melalui efek mineralokortikoid yaitu dengan cara meningkatkan retensi natrium dan air di ginjal. Hipertensi sebagai efek terapi kortikosteroid dosis tinggi sebesar 20 % . Hipertensi akibat pemberian kortikosteroid bergantung pada dosis dan lama pemberian. Hipertensi umumnya ditemukan pada pasien yang menerima kortikosteroid dengan dosis ekuivalen prednison > 20 mg/ hari (Fardet, 2007).

Pengobatan hipertensi dapat dilakukan dengan menggunakan bahan alam. Salah satu bahan alam yang digunakan pada penelitian ini yaitu daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L).

Pengukuran tekanan darah menggunakan alat pengukur *Non-Invasive Blood Pressure* (non invasif CODA[®]). Metode pengukuran tekanan darah non invasif dilakukan dengan menggunakan manset ekor yang dipasang pada ekor tikus. Mekanisme kerja dari alat ini yaitu pengukuran tekanan darah dilakukan dengan cara terlebih dahulu tikus dimasukkan kedalam restainer (kandang individual) yang berukuran tepat untuk satu tubuh tikus dengan ekor menjuntai keluar, kemudian ekor tikus dijepit dengan alat *pressure kit* lalu dihubungkan pada *pressure meter*, untuk mengetahui tekanan darah sistolik dan diastolik. Prinsip kerja pengukuran tekanan darah adalah *cuff* ditiupkan sampai mencapai tekanan darah diatas tekanan darah sistolik, sehingga nadi menghilang kemudian tekanan *cuff* dikurangi perlahan-lahan. Pada saat tekanan darah mencapai dibawah tekanan sistolik nadi akan muncul pada layar kaca monitor. Alat pengukur tekanan darah non invasif CODA[®] menggunakan prinsip pengukuran tipe *volume pressure recording*. Pada tipe ini diperoleh hasil pengukuran enam parameter tekanan secara simultan, yakni tekanan darah sistol, diastol, tekanan darah rata-rata, kecepatan denyut jantung, volume darah ekor dan aliran darah ekor. Parameter tekanan darah yang nantinya akan dianalisis yakni tekanan darah sistol dan diastol. Hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran tekanan darah menggunakan alat ini yaitu panjang manset yang sesuai yang dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah suhu tubuh tikus uji yang sangat menentukan konsistensi dan akurasi

pengukuran tekanan darah, tikus uji harus tenang selama pengukuran tekanan darah, serta pengaturan suhu ruang yang tidak kurang dari 26 °C.

Sebelum dilakukan pemberian induksi maka tikus terlebih dahulu diukur tekanan darah awalnya pada hari ke-1 untuk mengetahui tekanan darah awal sebelum hewan uji diinduksi. Pengukuran tekanan darah awal tikus, dipuaskan terlebih dahulu untuk menghindari pengaruh makanan pada saat dilakukan pengukuran.

Pengukuran tekanan darah sistol hari ke-1 pengukuran awal pada kelompok dosis I (50 mg/gBB), II (100 mg/gBB) dan III (150 mg/gBB) memberikan hasil tekanan sistol rata-rata sebesar 104.6; 106.6 dan 109.6 mmHg. Berdasarkan hasil uji statistik dari ketiga kelompok dosis tersebut memiliki simpangan deviasi sebesar ± 3.21 ; ± 2.08 dan ± 0.57 . Sedangkan kelompok kontrol positif Kaptopril[®] dan kelompok kontrol negatif CMC 1 % memberikan hasil tekanan darah sistol rata-rata sebesar 97 dan 115.6 mmHg dengan simpangan deviasi sebesar ± 6.55 dan ± 3.21 . Data uji statistik dapat dilihat pada lampiran 4.

Pengukuran tekanan darah diastol hari ke-1 pengukuran awal pada kelompok dosis I (50 mg/gBB), II (100 mg/gBB) dan III (150 mg/gBB) memberikan hasil tekanan darah diastol rata-rata sebesar 90.3; 90.3 dan 91.6 mmHg dan berdasarkan hasil uji statistik dari ketiga kelompok dosis tersebut memiliki simpangan deviasi sebesar ± 8.50 ; ± 8.96 dan ± 5.50 . Sedangkan kelompok kontrol positif Kaptopril[®] dan kelompok kontrol negatif CMC 1 % memberikan hasil tekanan darah diastol rata-

rata sebesar 80 dan 94.3 mmHg dengan simpangan deviasi sebesar ± 5.56 dan ± 12.05 . Data uji statistik dapat dilihat pada lampiran 4.

Pengukuran tekanan darah sistol hari ke-14 induksi NaCl dan Prednison[®] pada kelompok dosis I (50 mg/gBB), II (100 mg/gBB) dan III (150 mg/gBB) memberikan hasil tekanan sistol rata-rata sebesar 224.3; 236 dan 243 mmHg dan berdasarkan hasil uji statistik dari ketiga kelompok dosis tersebut memiliki simpangan deviasi sebesar ± 13.31 ; ± 13.52 dan ± 19.07 sedangkan kelompok kontrol positif Kaptopril[®] dan kelompok kontrol negatif CMC 1 % memberikan hasil tekanan sistol rata-rata sebesar 250.6 dan 231.6 mmHg dengan simpangan deviasi sebesar ± 47.05 dan ± 28.91 . Hal ini menunjukkan bahwa induksi hipertensi dengan NaCl dan Prednison[®] selama 14 hari telah berhasil meningkatkan tekanan darah sistol pada tikus uji secara bermakna.

Pengukuran tekanan darah diastol hari ke-14 induksi NaCl dan Prednison[®] pada kelompok dosis I (50 mg/gBB), II (100 mg/gBB) dan III (150 mg/gBB) memberikan hasil tekanan darah diastol rata-rata sebesar 188; 160.3 dan 174.3 mmHg dan berdasarkan hasil uji statistik dari ketiga kelompok dosis tersebut memiliki simpangan deviasi sebesar ± 18.35 ; ± 9.71 dan ± 25.65 Sedangkan kelompok kontrol positif Kaptopril[®] dan kelompok kontrol negatif CMC 1 % memberikan hasil tekanan darah diastol rata-rata 210.6 dan 208.3 mmHg dengan simpangan deviasi sebesar ± 50.85 dan ± 20.03 . Hal ini menunjukkan bahwa induksi hipertensi dengan NaCl dan Prednison[®] selama 14 hari telah berhasil meningkatkan tekanan darah diastol pada tikus uji secara bermakna.

Pada hari ke-15 setelah induksi, dilanjutkan dengan pemberian sediaan uji dan kemudian diukur kembali tekanan darah tikus uji pada hari ke-21 pengujian. Pengukuran pada hari ke-21 pengujian terhadap kelompok kontrol positif Kaptopril[®] dan kelompok kontrol negatif CMC 1 % memberikan hasil tekanan sistol rata-rata 124.6 dan 214.6 mmHg dengan simpangan deviasi sebesar ± 7.57 dan ± 12.74 . Sedangkan untuk kelompok dosis I (50 mg/gBB); dosis II (100 mg/gBB) dan dosis III (150 mg/gBB) ekstrak daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) memberikan hasil tekanan darah sistol rata-rata sebesar 135.3; 195.3 dan 158.6 mmHg dan berdasarkan hasil uji statistik dari ketiga kelompok dosis tersebut memiliki simpangan deviasi sebesar ± 8.02 ; ± 10.26 dan ± 11.59 . Hal ini menunjukkan hasil bahwa pada hari ke-21, kelompok ekstrak daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) dosis I (50mg/gBB) dan ekstrak daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) dosis III (150 mg/gBB) dapat menurunkan tekanan darah sistol secara bermakna dimana hasilnya mendekati hasil penurunan tekanan darah sistol yang menggunakan kelompok positif Kaptopril[®], sedangkan kelompok kontrol negatif CMC 1 % dan ekstrak daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) dosis II (100 mg/gBB) tidak mengalami penurunan tekanan darah secara bermakna jika dibandingkan dengan kelompok kontrol positif Kaptopril[®]. Data uji statistik dapat dilihat pada lampiran 4.

Pengukuran tekanan darah diastol pada hari ke-21 pengujian terhadap kelompok kontrol positif Kaptopril[®] dan kelompok kontrol negatif CMC 1 % memberikan hasil tekanan diastol rata-rata 98.66 dan 178.3 mmHg dengan

simpangan deviasi sebesar ± 15.94 dan ± 19.42 . Sedangkan untuk kelompok dosis I (50 mg/gBB); dosis II (100 mg/gBB) dan dosis III (150 mg/gBB) ekstrak daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) memberikan hasil tekanan darah sistol rata-rata sebesar 105.6; 125.6 dan 132 mmHg dan berdasarkan hasil uji statistik dari ketiga kelompok dosis tersebut memiliki simpangan deviasi sebesar ± 23.96 ; ± 11.23 dan ± 23.89 . Hal ini menunjukkan hasil bahwa pada hari ke-21, kelompok ekstrak daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) dosis I (50mg/gBB) dan ekstrak daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) dosis III (150 mg/gBB) dapat menurunkan tekanan darah diastol secara bermakna dimana hasilnya mendekati hasil penurunan tekanan darah diastol yang menggunakan kelompok positif Kaptopril[®], sedangkan kelompok kontrol negatif CMC 1 % dan ekstrak daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) dosis II (100 mg/gBB) tidak mengalami penurunan tekanan darah secara bermakna jika dibandingkan dengan Kelompok kontrol positif Kaptopril[®]. Data uji statistik dapat dilihat pada lampiran 4.

Data nilai rata-rata tekanan sistol dan diastol dapat diolah untuk mendapatkan persentase penurunan tekanan darah, dimana persentase penurunan tekanan darah diperoleh dari selisih antara tekanan darah induksi dan tekanan darah terapi dibandingkan dengan tekanan darah induksi kemudian dikalikan seratus persen.

Data persentase penurunan tekanan darah sistol dan diastol menunjukkan bahwa dosis ekstrak daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) paling efektif menurunkan tekanan darah sistol adalah dosis I (50 mg/ g BB) kemudian diikuti dosis

III (150 mg/g BB) dan dosis II (100 mg/ g BB). Data persentase dapat dilihat pada gambar IV.1 dan 2.

Ekstrak daun gedi merah dapat menurunkan tekanan darah sistol dan diastol secara bermakna dengan pemberian ekstrak selama tujuh hari. Penurunan tekanan darah oleh ekstrak daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) diduga disebabkan karena adanya kandungan quercetin yang termasuk golongan flavonoid. Kandungan quercetin yang ada di dalam daun gedi merah diduga memiliki efek sebagai penghambat enzim pengkonversi angiotensin (inhibitor *Angiotensin- Converting Enzym*) yang dapat berperan dalam menurunkan tekanan darah pada tikus hipertensi (Jing- Xing, 2005).

Data-data diatas berupa data tekanan darah memiliki simpangan deviasi yang cukup besar. Hal ini didasarkan atas pengolahan data statistik secara SPSS yang terlampir pada lampiran 4. Standar deviasi menunjukkan heterogenan yang terjadi dalam suatu data yang sedang diteliti. Semakin besar nilai standar deviasi menandakan bahwa semakin menyebar data pengamatan dan memiliki kecenderungan setiap data berbeda satu sama lain. Sedangkan semakin kecil nilai standar deviasi atau nilai mendekati 0 (nol), menandakan bahwa data pengamatan homogen karena semua data memiliki nilai yang identik. Besarnya nilai simpangan deviasi kemungkinan disebabkan karena kelemahan dan keterbatasan alat yang digunakan secara non-invasif, selain itu pula kemungkinan terjadi disebabkan karena kesulitan dalam pengontrolan kondisi yang konduktivitas bagi tikus uji pada saat

pengukuran, yakni kondisi yang menyebabkan tikus stress. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengetahui tekanan darah tikus yang sebenarnya karena sedikit saja gangguan dapat mempengaruhi tekanan darah tikus, sehingga hasil yang didapatkan tidak sesuai yang diharapkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberian ekstrak daun gedi merah (*Abelmoschus manihot*) terhadap tikus (*Rattus novergicus*) dapat menurunkan tekanan darah.
2. Ekstrak etanol 70 % daun gedi merah (*Abelmoschus manihot* L) yang efektif menurunkan tekanan darah secara bermakna yaitu dosis I (50 mg/ g BB) pada hari ke-21, dilihat dari penurunan tekanan darah sistol dan diastol.

B. Implikasi Penelitian

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui mekanisme kerja dan senyawa aktif dari ekstrak etanol 70 % daun gedi merah yang berperan dalam penurunan tekanan darah.

KEPUSTAKAAN

Al- Quraan.

Adeline, Riska., dkk. *Uji Ekstrak Daun Gedi Merah (Abelmoschus manihot L. Medik) Terhadap Terhadap Kadar Gula Darah Tikus Putih Jantan Galur Wistar (Rattus novergicus) Yang Diinduksi Aloksan*. Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2015.

Adiyati, P. N. *Ragam Jenis Ektoparasit pada Hewan Coba Tikus Putih (Rattus novergicus) galur Sprague Dawley*. Skripsi. Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Bogor. 2011.

Andrianto, Tuhana Taufiq. *Ampuhnya Terapi Herbal Berantas Berbagai Penyakit Berat*. Yogyakarta: Najah. 2011.

Assagaf, Fadhila dkk. *Uji Toksisitas Akut (Lethal Dose 50) Ekstrak Ethanol Daun Gedi Merah (Abelmoschus manihot L) Terhadap Tikus Putih Jantan Galur Wistar (Rattus novergicus L)*. Manado: Unstrat Jurnal Ilmiah Farmasi. 2013.

Astuty. *Pengaruh Infus Daun Gedi (Abelmoschus manihot. L) Terhadap Kelarutan Batu Ginjal Secara In Vitro*, Skripsi Fakultas MIPA, Universitas Indonesia, Jakarta. 2005.

Armenia, dkk. *Daun Tanaman Akar Mambu (Connarus grandis jack.) Sebagai Obat Antihipertensi: Efektivitas Ekstrak Etanolnya pada Tikus Hipertensi 2k1c Goldblatt*. Padang: Unand. 2007.

Apriyanti, Maya.. *Meracik Sendiri Obat dan Menu Sehat Bagi Penderita Darah Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Baru. 2011.h.1-8

Basyier, Abu Umar. *Kedokteran Nabi Antara Realitas dan Kebohongan*. Surabaya: Shafa Publika. h. 27-28. 2011.

Bayu, Aditya dan Anki Novairi. *Pencegahan dan Pengobatan Herbal. Tips Sempel Mencegah dan Mengobati Penyakit dengan Herbal*. Yogyakarta: Nusa Creative. 2013. h. 11-12

Betram , Katzung., dkk. *Farmakologi Dasar dan Klinik*. Jakarta: EGC. 2013. H.. 205-207.

Center Disease Control. *Centers for Disease Control and Prevention*. Atlanta: CDC Info. 2012.

- Ciptaningsih, E. *Uji Aktivitas Antioksidan dan Karakterisasi Fitokimia pada Kopi Luwak Arabika dan Pengaruhnya terhadap Tekanan Darah Normal Tikus dan Tikus Hipertensi*. Jakarta: FMIPA UI. 2012.
- Chumbhale, e, *et al.*. *Preliminary Phytochemical And Phenolic Contents Of Stem Bark Of Abelmoschus manihot (Linn.) Medik.* India: Departemen Of Pharmacolognosy, Amrutvahini College Of Pharmacy. 2013.
- Clarke's. 2005. *Clarke's Analysis of Drugs and Poisons*. Pharmaceutical Press. London
- Dipiro, *et al.* *Pharmacotherapy a Pathofisiologyc Approach*. USA. Mc Graw Hill. 2012. h. 87
- Dirjen POM , *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1979.
- Ditjen POM, *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995.
- Elizabeth, Corwin. *Buku Saku Patofisiologi*. Jakarta: Aditya Media. 2009.
- Fardet, Laurence., *et al.* *Corticosteroid-Induced Advers Events in Adult*. Paris: Hospital Saint Antoine. 2007. H.. 865.
- Gunawan, Sulistia Gan. *Farmakologi dan Terapi Edisi V*. Jakarta: FK UI. 2008.
- Guo, *et al.*., *Anticonvulsant, Antidepressant-like activity Abelmoschus manihot Ethanol Extract and Its Potentials Activ Component In vivo*. International Journal Of Phytotherapy and PhytoPharmacology. 2011.
- Handayany, Gemy Nastity dan Misbahuddin. *Buku Dirasah Farmakologi II*. Makassar: Alauddin Press. 2010. h. 38-40.
- Handayany, Gemy Nastity. *Farmakologi Toksikologi Hipertensi*. Makassar: Alauddin Universty Press. 2014. h.15.
- Herlambang. *Menaklukkan Hipertensi dan Diabetes*. Jakarta: Tugu Publisher. 2013.
- Ikawati, Zullies.. *Farmakologi Molekuler*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press. 2014. h. 125
- Jing- Xin Li, Bing Xue, dkk. *Antihypertensive Effect Of Total Flavonoid Fraction Of Astragalus complanatus in Hypertensive Rat*. *Chinese Journal of Physiology*. h.101-106

- Katno, Pramono S. *Tingkat Manfaat dan Keamanan Tanaman Obat dan Obat Tradisional*. Balai Penelitian Obat Tawangmangu. Yogyakarta: Fakultas Farmasi UGM. 2009. h. 1
- Kayadu, Yustin Nova. *Karakteristik Arkeologi dan Analisis Nutrisi Tanaman Gedi (Abelmoschus manihot L. Medik) Asal Distrik Sentani dan Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura*. Skripsi Pertanian dan Teknologi Pertanian Manokwari: Universitas Negeri Papua. 2013. h. 5-6
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Syaamil Cipta Media. Bandung, 2012.
- Lin-Lin, W.U., Y. Xin Bo., et al. *In vivo and in vitro antiviral activity of hyperoside extracted from Abelmoschus manihot (L)*. *MedActa Pharmacol*. 2007.
- Lyrawati, Diana. *Farmakologi Hipertensi*. __, 2008.
- Mamahit, Lexi. *Eikodekana Dari Daun Tumbuhan Gedi (Abelmoschus manihot L) Asal Sulawesi Utara*. Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2009.
- Mamahit, L, dan N Sukanto. *Satu Senyawa Asam Organik dari Daun Gedi (Abelmoschus manihot L) Asal Sulawesi Utara*. Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian UNSTRAT. 2010.
- Mandey, Jet Saartje. *The Effects of Native Gedi Leaves (Abelmoschus manihot L. Medik) of Northern Sulawesi- Indonesia as a Source of Feedstuff on the Performance of Broilers*. Malang: Universitas Brawijaya. 2013.
- Mora, Enda dan Armon Fernando. *Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia 1 "Optimasi Ekstraksi Triterpenoid Total Pegagan (Centella asiatica (Linn.) Urban) yang Tumbuh di Riau"*. Pekanbaru: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, 2012.
- Muhammad Bin Abdullah Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh. *Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsiir*. Terj. M. Abdul Ghofur E.M., Abdurrohim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsiir*. Bogor: Pustaka Imam Syafii. 2004.
- Nugroho, Endro. *Farmakologi Obat- Obat Penting dalam Pembelajaran Ilmu Farmasi dan Dunia Kesehatan*. Yogyakarta: UGM Press. 2010.
- Olson, James. *Belajar Mudah Farmakologi*. Jakarta: EGC. 2004. H.. 70
- Priyanto, *Farmakoterapi dan Terminologi*. Jawa Barat: lembaga Studi dan Konsultasi Farmakologi. 2009. h. 184
- Priyatmoko, W. *Aktivitas Antibakteri Karang Lunak Hasil Transplantasi (Sinularia Sp.) Pada Dua Kedalaman Berbeda Di Perairan Pulau Pramuka*

- Kepulauan Seribu, DKI Jakarta*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian: Bogor. 2008.
- Puspita, Eva dan Yasir Haskas. *Faktor Resiko Kejadian Hipertensi Pada Pasien Yang Berobat di Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji*. Makassar: Stikes Nani Hasanuddin. 2014.
- Robinson, Trevor. *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi*. Bandung: ITB. 1995.
- Rony, dkk. *Fisiologi Kardiovaskuler: Berbasis Masalah Keperawatan*. Jakarta: EGC. 2010. h. 29.
- Sarwar, *et al*. *A review on the recent advances in pharmacological studies on medicinal plants; animal studies are done*. USA. 2011.
- Saseen, Joseph J. dan Carter, Barry L. *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Sixth Edition*. United States: McGraw-Hill, 2009. h.185-217.
- Sirois, M. *Laboratory Animal Medicine: Principles and Prosedurs* Mosby, Inc. United States of America. 2005. H.. 43-45.
- Sitompul, Ratna.. *Kortikosteroid Dalam Tatalaksana Uveitis: Mekanisme Kerja, Aplikasi Klinis, dan Efek Samping*. Jakarta: FK UI. 2011
- Sudjadi. *Metode Pemisahan*. Yogyakarta: UGM Press. 1988.
- Suoth, Elly., dkk.. *Evaluasi Kandungan Total Total Polifenol dan Isolasi Senyawa Flavonoid Pada Daun Gedi Merah (Abelmoschus manihot L)*. Manado: Universitas Kristen Indonesia Tomohon. 2013
- Susanto, Hardi. *100 Resep Sembuhkan Hipertensi, Obesitas, dan Asam Urat*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2009. H.. 5-7.
- Sutarto, Toto dan Gani Utari. *Analisis Kandungan Tumbuhan Obat Ki Dedi (Abelmoschus manihot)*. Bandung: Unpas. 2007.
- Syamsuddin dan Darmono, *Farmakologi Eksperimental*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2011. H.. 8-9.
- Tjay, Tan Hoan dan Kirana Rahardja. *Obat- Obat Penting Khasiat, Penggunaan, dan Efek- Efek Sampingnya*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2010. H..888
- Trihono, *Riset Kesehatan Dasar Riskesdas 2013*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2013. H.. 88.


Yuliandra, Yori.. *Studi Efek AntiHipertensi Tumbuhan Tali Putri (Cassytha filiformis L) pada Tikus Hipertensi yang Diinduksi Prednison dan Garam*. Padang : Universitas Andalas. 2013




Lampiran 1

Skema kerja

1. Ekstraksi sampel



2. Pengujian antihipertensi



Lampiran 2

Perhitungan Dosis

Berat tikus (*Rattus novergicus*) yang sering digunakan untuk penelitian: 200 gram

a. Perhitungan Dosis Kaptopril[®]

$$\begin{aligned}
 \text{Dosis etiket} &= 25 \text{ mg} \\
 \text{Berat rata-rata tablet} &= 119.19 \text{ mg} \\
 \text{Dosis ekuivalen manusia} &= \frac{25 \text{ mg/BB}}{60 \text{ kg}} \\
 &= 0.416 \text{ mg/kg BB} \\
 \text{Dosis untuk tikus} &= \frac{37}{6} \times 0.416 \text{ mg/kg BB} \\
 &= 2.56 \text{ mg/kgBB} \\
 \text{Untuk bobot tikus 200 g} &= \frac{2.56 \text{ mg/kgBB}}{1000} \times 200 \\
 &= 0.512 \text{ mg/gBB} \\
 \text{Larutan stok} &= \frac{10}{2} \times 0.512 \text{ mg/gBB} \\
 &= 2.56 \text{ mg/ g BB} \\
 \text{Berat yang ditimbang} &= \frac{2.56 \text{ mg/gBB}}{25} \times 119.19 \text{ mg} \\
 &= 12.20 \text{ mg/g BB dalam 10 ml}
 \end{aligned}$$

b. Perhitungan Induksi Prednison[®]

$$\begin{aligned}
 \text{Dosis etiket} &= 5 \text{ mg} \\
 \text{Berat rata-rata tablet} &= 184.39 \text{ mg} \\
 \text{Dosis ekuivalen manusia} &= \frac{5 \text{ mg/BB}}{60 \text{ kg}}
 \end{aligned}$$

$$= 0.083 \text{ mg/kgBB}$$

$$\text{Dosis untuk tikus} = \frac{37}{6} \times 0.083 \text{ mg/kg BB}$$

$$= 0.511 \text{ mg/kg BB}$$

$$\text{Untuk bobot tikus 200 gram} = \frac{0.511 \text{ mg/kgBB}}{1000} \times 200 \text{ gram}$$

$$= 0.102 \text{ mg/g BB}$$

$$\text{Larutan stok} = \frac{10}{2} \times 0.102 = 0.51 \text{ mg/gBB}$$

$$\text{Berat yang ditimbang} = \frac{0.51 \text{ mg/gBB}}{5} \times 184.39 \text{ mg/g BB}$$

$$= 18.807 \text{ mg/g BB dalam 10 ml}$$

c. Perhitungan Induksi NaCl 2 % b/v

$$\text{NaCl 2 \%} = \frac{2000 \text{ mg}}{100 \text{ ml}} = 20 \text{ mg/ml}$$

$$= 40 \text{ mg/ 2 ml}$$

$$\text{Larutan stok} = \frac{10}{2} \times 40 = 200 \text{ mg dalam 10 ml aquadest}$$

d. Perhitungan Dosis Ekstrak Daun Gedi Merah (*Abelmoschus manihot* L)

Dosis ekstrak untuk tikus 200 gram

$$\text{- Dosis ekstrak 50 mg/g BB} = \frac{200 \text{ gram}}{1000} \times 50 \text{ mg} = 10 \text{ mg}$$

$$\text{Larutan stok} = \frac{10}{2} \times 10 \text{ mg} = 50 \text{ mg/10 ml}$$

$$\text{- Dosis ekstrak 100 mg/g BB} = \frac{200 \text{ gram}}{1000} \times 100 \text{ mg} = 20 \text{ mg}$$

$$\text{Larutan stok} = \frac{10}{2} \times 20 \text{ mg} = 100 \text{ mg/ 10 ml}$$

$$\text{- Dosis ekstrak 150 mg/g BB} = \frac{200 \text{ gram}}{1000} \times 150 \text{ mg} = 30 \text{ mg.}$$

$$\text{Larutan stok} = \frac{10}{2} \times 30 \text{ mg} = 150 \text{ mg/10 ml}$$

d. Persen penurunan

$$\text{Persen penurunan} = \frac{(\text{tekanan darah induksi} - \text{tekanan darah terapi})}{(\text{tekanan darah induksi})} \times 100 \%$$



Lampiran 3

Tekanan darah rata-rata Sistol dan diastol

Hari Ke-	Tekanan darah	Tekanan Darah (rata-rata \pm SD) pada setiap perlakuan (mmHg)				
		Kontrol Positif Kaptopril [®]	Kontrol negatif CMC 1%	Dosis 50 mg/gBB	Dosis 100 mg/gBB	Dosis 150 mg/gBB
1	Sistol	97 \pm 6.55	115.6 \pm 3.21	104.6 \pm 3.21	106.6 \pm 2.08	109.6 \pm 0.57
	Diastol	80 \pm 5.56	94.3 \pm 12.05	90.3 \pm 8.50	90.3 \pm 8.96	91.6 \pm 5.50
14	Sistol	250.6 \pm 47.05	231.6 \pm 28.91	224.3 \pm 13.31	236 \pm 13.52	243 \pm 19.07
	Diastol	210.6 \pm 50.85	208.3 \pm 20.03	188 \pm 18.35	160.3 \pm 9.71	174.3 \pm 25.65
21	Sistol	124.6 \pm 7.57	214.6 \pm 12.74	135.3 \pm 8.02	195.3 \pm 10.26	158.6 \pm 11.59
	Diastol	98.6 \pm 15.94	178.3 \pm 19.42	105.6 \pm 23.96	125.6 \pm 11.23	132 \pm 23.89

Lampiran 4

1. Analisis statistik tekanan darah sistol secara RAL (Rancangan Acak Lengkap)

Perlakuan	Replikasi			Jumlah
	1	2	3	
Kontrol positif Kaptopril®	128	116	130	374
Kontrol negatif CMC 1 %	226	203	205	634
Dosis 50 mg/gBB	127	136	143	406
Dosis 100 mg/gBB	184	198	185	567
Dosis 150 mg/gBB	171	157	148	476
Total				2457

a. Faktor Koreksi (FK)

$$\begin{aligned}
 \text{FK} &= \frac{\text{Jumlah}^2}{\text{P.R}} \\
 &= \frac{(2457)^2}{5.3} \\
 &= \frac{6036849}{15} \\
 &= 402456.6
 \end{aligned}$$

b. Jumlah Kuadrat (JK)

$$1. \text{ JK Total} = [(128^2)+(116^2)+(130^2)+\dots+(148^2)] - \text{FK}$$

$$= 419203 - 402456.6$$

$$= 16746.4$$

$$2. \text{ JK Perlakuan} = \frac{[(374^2)+(634^2)+(406^2)+(567^2)+(476^2)]}{3} - FK$$

$$= 418244.333 - 402456.6$$

$$= 15787.733$$

$$3. \text{ JK Galat} = 16746.4 - 15787.733$$

$$= 958.267$$

c. Faktor koreksi = derajat bebas

$$1. \text{ Derajat bebas Total} = (P.R) - 1$$

$$= (5 \times 3) - 1$$

$$= 14$$

$$2. \text{ Derajat Bebas Perlakuan} = P - 1$$

$$= 5 - 1$$

$$= 4$$

$$3. \text{ Derajat bebas galat} = 14 - 4$$

$$= 10$$

d. Kuadrat Tengah

$$1. \text{ Kuadrat Tengah Perlakuan} = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}}$$

$$= \frac{15787.733}{4}$$

$$= 3946.933$$

$$2. \text{ Kuadrat Tengah Galat} = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}}$$

$$= \frac{958.267}{10}$$

$$= 95.826$$

3. F Hitung

$$= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}}$$

$$= \frac{3946.933}{95.826}$$

$$= 41.1$$

Hasil analisis varian tekanan darah sistol

SumberVariasi	dB	JK	F _{Hitung}	F _{Tabel}	
				5 %	1 %
Perlakuan	4	17159.066	41.1	3.48	5.99
Galat	10	2262.667			
Total	14	-			

Keterangan: Signifikan/ sangat signifikan jika F hitung > F Tabel

Tidak signifikan jika F hitung < F Tabel

Kesimpulan: F hitung > F Tabel 5 % dan 1 % (Signifikan)

Analisis statistik tekanan darah diastol

Kelompok	Replikasi			Jumlah
	1	2	3	
Kontrol positif Kaptopril®	81	103	112	296

Kontrol negatif	195	157	183	535
CMC 1 %				
Dosis 50 mg/gBB	78	120	119	317
Dosis 100 mg/gBB	153	137	106	396
Dosis 150 mg/gBB	116	123	138	377
Total				1921

a. Faktor Koreksi

$$\begin{aligned}
 \text{FK} &= \frac{\text{Jumlah}^2}{\text{P.R}} \\
 &= \frac{(1921)^2}{5.3} \\
 &= \frac{3690241}{15} \\
 &= 246016.066
 \end{aligned}$$

b. Jumlah Kuadrat (JK)

$$\begin{aligned}
 1. \text{ JK Total} &= [(81^2)+(103^2)+(112^2)+(195)^2+\dots+(138^2)] - \text{FK} \\
 &= 261565 - 257939.267 \\
 &= 15549
 \end{aligned}$$

$$2. \text{ JK Perlakuan} = \frac{[(296^2)+(535^2)+(317^2)+(396^2)+(377^2)] - \text{FK}}{3}$$

$$= 257758.333 - 257939.267$$

$$= 11742.267$$

$$3. \text{ JK Galat} = 11549 - 11742.267$$

$$= 3806.733$$

c. Faktor koreksi = derajat bebas

$$\begin{aligned} 1. \text{ Derajat bebas Total} &= (P.R) - 1 \\ &= (5 \times 3) - 1 \\ &= 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{ Derajat Bebas Perlakuan} &= P - 1 \\ &= 5 - 1 \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ Derajat bebas galat} &= 14 - 4 \\ &= 10 \end{aligned}$$

d. Kuadrat Tengah

$$\begin{aligned} 1. \text{ Kuadrat Tengah Perlakuan} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}} \\ &= \frac{11742.267}{4} \\ &= 2935.2667 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{ Kuadrat Tengah Galat} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}} \\ &= \frac{3806.733}{10} \\ &= 380.6733 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ F Hitung} &= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}} \\ &= \frac{2935.5667}{380.6733} \\ &= 7.71 \end{aligned}$$

Hasil analisis varian tekanan darah diastol

SumberVariasi	dB	JK	F _{Hitung}	F _{Tabel}	
				5 %	1 %
Perlakuan	4	11742.267	7.71	3.48	5.99
Galat	10	3806.733			
Total	14	-			

Keterangan: Signifikan/ sangat signifikan jika $F_{hitung} > F_{Tabel}$

Tidak signifikan jika $F_{hitung} < F_{Tabel}$

Kesimpulan: $F_{hitung} > F_{Tabel}$ 5 % dan 1 % (Signifikan) artinya terdapat perbedaan yang nyata dari setiap perlakuan

Lampiran 5

Analisis Statistik Secara SPSS

1. Pengukuran tekanan pada hari ke-0
 - a. sistol

Descriptives

Hasil

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kaptopril	3	97.0000	6.55744	3.78594	80.7104	113.2896	90.00	103.00
CMC	3	115.6667	3.21455	1.85592	107.6813	123.6521	112.00	118.00
Dosis I	3	104.6667	3.21455	1.85592	96.6813	112.6521	101.00	107.00
Dosis II	3	106.6667	2.08167	1.20185	101.4955	111.8378	105.00	109.00
Dosis III	3	109.6667	.57735	.33333	108.2324	111.1009	109.00	110.00
Total	15	106.7333	7.06568	1.82435	102.8205	110.6462	90.00	118.00

Test of Homogeneity of Variances

Hasil

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.617	4	10	.099

ANOVA

Hasil

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	562.267	4	140.567	10.285	.001
Within Groups	136.667	10	13.667		
Total	698.933	14			

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hasil

	(I) perlakuan1	(J) perlakuan 1	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval		
						Lower Bound	Upper Bound	
Tukey HSD	kaptopril	CMC	-18.66667 [*]	3.01846	.001	-28.6007	-8.7327	
		Dosis I	-7.66667	3.01846	.157	-17.6007	2.2673	
		Dosis II	-9.66667	3.01846	.057	-19.6007	.2673	
	CMC	Dosis III	-12.66667 [*]	3.01846	.012	-22.6007	-2.7327	
		kaptopril	18.66667 [*]	3.01846	.001	8.7327	28.6007	
		Dosis I	11.00000 [*]	3.01846	.029	1.0660	20.9340	
	Dosis II	Dosis II	9.00000	3.01846	.081	-.9340	18.9340	
		Dosis III	6.00000	3.01846	.337	-3.9340	15.9340	
		kaptopril	7.66667	3.01846	.157	-2.2673	17.6007	
	Dosis I	CMC	-11.00000 [*]	3.01846	.029	-20.9340	-1.0660	
		Dosis II	-2.00000	3.01846	.960	-11.9340	7.9340	
		Dosis III	-5.00000	3.01846	.498	-14.9340	4.9340	
	Dosis II	kaptopril	9.66667	3.01846	.057	-.2673	19.6007	
		CMC	-9.00000	3.01846	.081	-18.9340	.9340	
		Dosis I	2.00000	3.01846	.960	-7.9340	11.9340	
	Dosis III	Dosis III	-3.00000	3.01846	.852	-12.9340	6.9340	
		kaptopril	12.66667 [*]	3.01846	.012	2.7327	22.6007	
		CMC	-6.00000	3.01846	.337	-15.9340	3.9340	
		Dosis I	Dosis I	5.00000	3.01846	.498	-4.9340	14.9340
			Dosis II	3.00000	3.01846	.852	-6.9340	12.9340

LSD

	CMC	-18.66667*	3.01846	.000	-25.3922	-11.9411
kaptopril	Dosis I	-7.66667*	3.01846	.029	-14.3922	-.9411
	Dosis II	-9.66667*	3.01846	.009	-16.3922	-2.9411
	Dosis III	-12.66667*	3.01846	.002	-19.3922	-5.9411
	kaptopril	18.66667*	3.01846	.000	11.9411	25.3922
CMC	Dosis I	11.00000*	3.01846	.005	4.2744	17.7256
	Dosis II	9.00000*	3.01846	.014	2.2744	15.7256
	Dosis III	6.00000	3.01846	.075	-.7256	12.7256
	kaptopril	7.66667*	3.01846	.029	.9411	14.3922
Dosis I	CMC	-11.00000*	3.01846	.005	-17.7256	-4.2744
	Dosis II	-2.00000	3.01846	.523	-8.7256	4.7256
	Dosis III	-5.00000	3.01846	.129	-11.7256	1.7256
	kaptopril	9.66667*	3.01846	.009	2.9411	16.3922
Dosis II	CMC	-9.00000*	3.01846	.014	-15.7256	-2.2744
	Dosis I	2.00000	3.01846	.523	-4.7256	8.7256
	Dosis III	-3.00000	3.01846	.344	-9.7256	3.7256
	kaptopril	12.66667*	3.01846	.002	5.9411	19.3922
Dosis III	CMC	-6.00000	3.01846	.075	-12.7256	.7256
	Dosis I	5.00000	3.01846	.129	-1.7256	11.7256
	Dosis II	3.00000	3.01846	.344	-3.7256	9.7256

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Hasil

	perlakuan1	N	Subset for alpha = 0.05		
			1	2	3
Tukey HSD ^a	kaptopril	3	97.0000		
	Dosis I	3	104.6667	104.6667	
	Dosis II	3	106.6667	106.6667	106.6667
	Dosis III	3		109.6667	109.6667
	CMC	3			115.6667
	Sig.			.057	.498

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

b. Diastol

Descriptives

Hasil

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kaptopril	3	80.0000	5.56776	3.21455	66.1689	93.8311	74.00	85.00
CMC	3	94.3333	12.05543	6.96020	64.3860	124.2807	83.00	107.00
Dosis I	3	90.3333	8.50490	4.91031	69.2060	111.4607	82.00	99.00
Dosis II	3	90.3333	8.96289	5.17472	68.0683	112.5984	80.00	96.00
Dosis III	3	91.6667	5.50757	3.17980	77.9851	105.3482	88.00	98.00
Total	15	89.3333	8.77225	2.26499	84.4754	94.1912	74.00	107.00

Test of Homogeneity of Variances

Hasil

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.648	4	10	.641

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANOVA

Hasil

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	358.667	4	89.667	1.248	.352
Within Groups	718.667	10	71.867		
Total	1077.333	14			

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hasil

	(I) perlakuan1	(J) perlakuan 1	Mean Difference (I- J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Tukey HSD	kaptopril	CMC	-14.33333	6.92179	.303	-37.1135	8.4468
		Dosis I	-10.33333	6.92179	.589	-33.1135	12.4468
		Dosis II	-10.33333	6.92179	.589	-33.1135	12.4468
		Dosis III	-11.66667	6.92179	.483	-34.4468	11.1135
	CMC	kaptopril	14.33333	6.92179	.303	-8.4468	37.1135
		Dosis I	4.00000	6.92179	.975	-18.7802	26.7802
		Dosis II	4.00000	6.92179	.975	-18.7802	26.7802
		Dosis III	2.66667	6.92179	.995	-20.1135	25.4468
	Dosis I	kaptopril	10.33333	6.92179	.589	-12.4468	33.1135
		CMC	-4.00000	6.92179	.975	-26.7802	18.7802
		Dosis II	.00000	6.92179	1.000	-22.7802	22.7802
		Dosis III	-1.33333	6.92179	1.000	-24.1135	21.4468
	Dosis II	kaptopril	10.33333	6.92179	.589	-12.4468	33.1135
		CMC	-4.00000	6.92179	.975	-26.7802	18.7802
		Dosis I	.00000	6.92179	1.000	-22.7802	22.7802
		Dosis III	-1.33333	6.92179	1.000	-24.1135	21.4468
	Dosis III	kaptopril	11.66667	6.92179	.483	-11.1135	34.4468
		CMC	-2.66667	6.92179	.995	-25.4468	20.1135
		Dosis I	1.33333	6.92179	1.000	-21.4468	24.1135
		Dosis II	1.33333	6.92179	1.000	-21.4468	24.1135

LSD

	CMC	-14.33333	6.92179	.065	-29.7560	1.0894
kaptopril	Dosis I	-10.33333	6.92179	.166	-25.7560	5.0894
	Dosis II	-10.33333	6.92179	.166	-25.7560	5.0894
	Dosis III	-11.66667	6.92179	.123	-27.0894	3.7560
	kaptopril	14.33333	6.92179	.065	-1.0894	29.7560
CMC	Dosis I	4.00000	6.92179	.576	-11.4227	19.4227
	Dosis II	4.00000	6.92179	.576	-11.4227	19.4227
	Dosis III	2.66667	6.92179	.708	-12.7560	18.0894
	kaptopril	10.33333	6.92179	.166	-5.0894	25.7560
Dosis I	CMC	-4.00000	6.92179	.576	-19.4227	11.4227
	Dosis II	.00000	6.92179	1.000	-15.4227	15.4227
	Dosis III	-1.33333	6.92179	.851	-16.7560	14.0894
	kaptopril	10.33333	6.92179	.166	-5.0894	25.7560
Dosis II	CMC	-4.00000	6.92179	.576	-19.4227	11.4227
	Dosis I	.00000	6.92179	1.000	-15.4227	15.4227
	Dosis III	-1.33333	6.92179	.851	-16.7560	14.0894
	kaptopril	11.66667	6.92179	.123	-3.7560	27.0894
Dosis III	CMC	-2.66667	6.92179	.708	-18.0894	12.7560
	Dosis I	1.33333	6.92179	.851	-14.0894	16.7560
	Dosis II	1.33333	6.92179	.851	-14.0894	16.7560

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Hasil

	perlakuan1	N	Subset for alpha
			= 0.05
			1
Tukey HSD ^a	kaptopril	3	80.0000
	Dosis I	3	90.3333
	Dosis II	3	90.3333
	Dosis III	3	91.6667
	CMC	3	94.3333
	Sig.		

2. Pengukuran tekanan darah pada hari ke-14
 a. Sistol

Descriptives

Hasil

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kaptopril	3	250.6667	47.05670	27.16820	133.7713	367.5620	205.00	299.00
CMC	3	231.6667	28.91943	16.69664	159.8268	303.5065	206.00	263.00
Dosis I	3	224.3333	13.31666	7.68838	191.2529	257.4137	209.00	233.00
Dosis II	3	236.0000	13.52775	7.81025	202.3952	269.6048	223.00	250.00
Dosis III	3	243.0000	19.07878	11.01514	195.6057	290.3943	231.00	265.00
Total	15	237.1333	25.05385	6.46888	223.2590	251.0077	205.00	299.00

Test of Homogeneity of Variances

Hasil

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.400	4	10	.302

ANOVA

Hasil

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1237.733	4	309.433	.410	.798
Within Groups	7550.000	10	755.000		
Total	8787.733	14			

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hasil

	(I) perlakuan2	(J) perlakuan2	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval		
						Lower Bound	Upper Bound	
Tukey HSD	kaptopril	CMC	19.00000	22.43509	.910	-54.8357	92.8357	
		Dosis I	26.33333	22.43509	.766	-47.5024	100.1691	
		Dosis II	14.66667	22.43509	.962	-59.1691	88.5024	
		Dosis III	7.66667	22.43509	.997	-66.1691	81.5024	
	CMC	kaptopril	-19.00000	22.43509	.910	-92.8357	54.8357	
		Dosis I	7.33333	22.43509	.997	-66.5024	81.1691	
		Dosis II	-4.33333	22.43509	1.000	-78.1691	69.5024	
		Dosis III	-11.33333	22.43509	.985	-85.1691	62.5024	
	Dosis I	kaptopril	-26.33333	22.43509	.766	-100.1691	47.5024	
		CMC	-7.33333	22.43509	.997	-81.1691	66.5024	
		Dosis II	-11.66667	22.43509	.983	-85.5024	62.1691	
		Dosis III	-18.66667	22.43509	.915	-92.5024	55.1691	
	Dosis II	kaptopril	-14.66667	22.43509	.962	-88.5024	59.1691	
		CMC	4.33333	22.43509	1.000	-69.5024	78.1691	
		Dosis I	11.66667	22.43509	.983	-62.1691	85.5024	
		Dosis III	-7.00000	22.43509	.998	-80.8357	66.8357	
	Dosis III	kaptopril	-7.66667	22.43509	.997	-81.5024	66.1691	
		CMC	11.33333	22.43509	.985	-62.5024	85.1691	
		Dosis I	18.66667	22.43509	.915	-55.1691	92.5024	
			Dosis II	7.00000	22.43509	.998	-66.8357	80.8357

LSD

	CMC	19.00000	22.43509	.417	-30.9885	68.9885
kaptopril	Dosis I	26.33333	22.43509	.268	-23.6552	76.3218
	Dosis II	14.66667	22.43509	.528	-35.3218	64.6552
	Dosis III	7.66667	22.43509	.740	-42.3218	57.6552
	kaptopril	-19.00000	22.43509	.417	-68.9885	30.9885
CMC	Dosis I	7.33333	22.43509	.751	-42.6552	57.3218
	Dosis II	-4.33333	22.43509	.851	-54.3218	45.6552
	Dosis III	-11.33333	22.43509	.624	-61.3218	38.6552
	kaptopril	-26.33333	22.43509	.268	-76.3218	23.6552
Dosis I	CMC	-7.33333	22.43509	.751	-57.3218	42.6552
	Dosis II	-11.66667	22.43509	.614	-61.6552	38.3218
	Dosis III	-18.66667	22.43509	.425	-68.6552	31.3218
	kaptopril	-14.66667	22.43509	.528	-64.6552	35.3218
Dosis II	CMC	4.33333	22.43509	.851	-45.6552	54.3218
	Dosis I	11.66667	22.43509	.614	-38.3218	61.6552
	Dosis III	-7.00000	22.43509	.761	-56.9885	42.9885
	kaptopril	-7.66667	22.43509	.740	-57.6552	42.3218
Dosis III	CMC	11.33333	22.43509	.624	-38.6552	61.3218
	Dosis I	18.66667	22.43509	.425	-31.3218	68.6552
	Dosis II	7.00000	22.43509	.761	-42.9885	56.9885

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AL AUDDIN

S S A R

Hasil

	Perlakuan2	N	Subset for alpha = 0.05
			1

Tukey HSD^a

Dosis I	3	224.3333
CMC	3	231.6667
Dosis II	3	236.0000
Dosis III	3	243.0000
kaptopril	3	250.6667
Sig.		.766

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

b. Diastol



Descriptives

Hasil

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
					Kaptopril	3		
CMC	3	208.3333	20.03331	11.56623	158.5678	258.0988	193.00	231.00
Dosis I	3	188.0000	18.35756	10.59874	142.3973	233.6027	167.00	201.00
Dosis II	3	160.3333	9.71253	5.60753	136.2061	184.4606	152.00	171.00
Dosis III	3	174.3333	25.65801	14.81366	110.5953	238.0714	146.00	196.00
Total	15	188.3333	31.38623	8.10389	170.9522	205.7144	146.00	268.00

Test of Homogeneity of Variances

Hasil

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
3.233	4	10	.060

ANOVA

Hasil

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
--	----------------	----	-------------	---	------

Between Groups	5636.667	4	1409.167	1.728	.220
Within Groups	8154.667	10	815.467		
Total	13791.333	14			

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hasil

	(I) perlakuan2	(J) perlakuan2	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval		
						Lower Bound	Upper Bound	
Tukey HSD	kaptopril	CMC	2.33333	23.31618	1.000	-74.4021	79.0688	
		Dosis I	22.66667	23.31618	.862	-54.0688	99.4021	
		Dosis II	50.33333	23.31618	.269	-26.4021	127.0688	
		Dosis III	36.33333	23.31618	.552	-40.4021	113.0688	
		kaptopril	-2.33333	23.31618	1.000	-79.0688	74.4021	
		CMC	20.33333	23.31618	.901	-56.4021	97.0688	
		Dosis II	48.00000	23.31618	.307	-28.7355	124.7355	
		Dosis III	34.00000	23.31618	.608	-42.7355	110.7355	
		kaptopril	-22.66667	23.31618	.862	-99.4021	54.0688	
		Dosis I	CMC	-20.33333	23.31618	.901	-97.0688	56.4021
		Dosis II	Dosis I	27.66667	23.31618	.759	-49.0688	104.4021
		Dosis III	Dosis I	13.66667	23.31618	.974	-63.0688	90.4021
	Dosis II	kaptopril	-50.33333	23.31618	.269	-127.0688	26.4021	
	Dosis III	CMC	-48.00000	23.31618	.307	-124.7355	28.7355	
	Dosis I	Dosis I	-27.66667	23.31618	.759	-104.4021	49.0688	
	Dosis II	Dosis III	-14.00000	23.31618	.972	-90.7355	62.7355	
	Dosis III	kaptopril	-36.33333	23.31618	.552	-113.0688	40.4021	
	Dosis I	CMC	-34.00000	23.31618	.608	-110.7355	42.7355	
	Dosis II	Dosis I	-13.66667	23.31618	.974	-90.4021	63.0688	
	Dosis III	Dosis II	14.00000	23.31618	.972	-62.7355	90.7355	

LSD

	CMC	2.33333	23.31618	.922	-49.6184	54.2850
kaptopril	Dosis I	22.66667	23.31618	.354	-29.2850	74.6184
	Dosis II	50.33333	23.31618	.056	-1.6184	102.2850
	Dosis III	36.33333	23.31618	.150	-15.6184	88.2850
CMC	kaptopril	-2.33333	23.31618	.922	-54.2850	49.6184
	Dosis I	20.33333	23.31618	.404	-31.6184	72.2850
	Dosis II	48.00000	23.31618	.067	-3.9517	99.9517
Dosis I	Dosis III	34.00000	23.31618	.175	-17.9517	85.9517
	kaptopril	-22.66667	23.31618	.354	-74.6184	29.2850
	CMC	-20.33333	23.31618	.404	-72.2850	31.6184
Dosis II	Dosis II	27.66667	23.31618	.263	-24.2850	79.6184
	Dosis III	13.66667	23.31618	.571	-38.2850	65.6184
	kaptopril	-50.33333	23.31618	.056	-102.2850	1.6184
Dosis III	CMC	-48.00000	23.31618	.067	-99.9517	3.9517
	Dosis I	-27.66667	23.31618	.263	-79.6184	24.2850
	Dosis III	-14.00000	23.31618	.562	-65.9517	37.9517
Dosis I	kaptopril	-36.33333	23.31618	.150	-88.2850	15.6184
	CMC	-34.00000	23.31618	.175	-85.9517	17.9517
	Dosis I	-13.66667	23.31618	.571	-65.6184	38.2850
Dosis II	Dosis II	14.00000	23.31618	.562	-37.9517	65.9517

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AL AUDDIN
 SAR

Hasil

	Perlakuan2	N	Subset for alpha = 0.05
			1
Tukey HSD ^a	Dosis II	3	160.3333
	Dosis III	3	174.3333
	Dosis I	3	188.0000
	CMC	3	208.3333
	kaptopril	3	210.6667
	Sig.		

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

3. Tekanan darah pada hari ke-21

a. Sistol

Descriptives

Hasil

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
					Kaptopril	3		
CMC	3	211.3333	12.74101	7.35603	179.6829	242.9838	203.00	226.00
Dosis I	3	135.3333	8.02081	4.63081	115.4085	155.2581	127.00	143.00
Dosis II	3	195.3333	10.26320	5.92546	169.8381	220.8285	184.00	204.00
Dosis III	3	158.6667	11.59023	6.69162	129.8749	187.4584	148.00	171.00
Total	15	165.0667	35.74606	9.22959	145.2712	184.8622	116.00	226.00

Test of Homogeneity of Variances

Hasil

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.480	4	10	.751

ANOVA

Hasil

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	16841.600	4	4210.400	40.201	.000
Within Groups	1047.333	10	104.733		
Total	17888.933	14			

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hasil

	(I) perlakuan3	(J) perlakuan1	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Tukey HSD	kaptopril	CMC	-86.66667*	8.35597	.000	-114.1668	-59.1665
		Dosis I	-10.66667	8.35597	.710	-38.1668	16.8335
		Dosis II	-70.66667*	8.35597	.000	-98.1668	-43.1665
		Dosis III	-34.00000*	8.35597	.015	-61.5002	-6.4998
	CMC	kaptopril	86.66667*	8.35597	.000	59.1665	114.1668
		Dosis I	76.00000*	8.35597	.000	48.4998	103.5002
		Dosis II	16.00000	8.35597	.369	-11.5002	43.5002
		Dosis III	52.66667*	8.35597	.001	25.1665	80.1668
	Dosis I	kaptopril	10.66667	8.35597	.710	-16.8335	38.1668
		CMC	-76.00000*	8.35597	.000	-103.5002	-48.4998
		Dosis II	-60.00000*	8.35597	.000	-87.5002	-32.4998
		Dosis III	-23.33333	8.35597	.108	-50.8335	4.1668
	Dosis II	kaptopril	70.66667*	8.35597	.000	43.1665	98.1668
		CMC	-16.00000	8.35597	.369	-43.5002	11.5002
		Dosis I	60.00000*	8.35597	.000	32.4998	87.5002
		Dosis III	36.66667*	8.35597	.009	9.1665	64.1668
	Dosis III	kaptopril	34.00000*	8.35597	.015	6.4998	61.5002
		CMC	-52.66667*	8.35597	.001	-80.1668	-25.1665
		Dosis I	23.33333	8.35597	.108	-4.1668	50.8335
		Dosis II	-36.66667*	8.35597	.009	-64.1668	-9.1665

LSD

	CMC	-86.66667*	8.35597	.000	-105.2849	-68.0484
kaptopril	Dosis I	-10.66667	8.35597	.231	-29.2849	7.9516
	Dosis II	-70.66667*	8.35597	.000	-89.2849	-52.0484
	Dosis III	-34.00000*	8.35597	.002	-52.6183	-15.3817
CMC	kaptopril	86.66667*	8.35597	.000	68.0484	105.2849
	Dosis I	76.00000*	8.35597	.000	57.3817	94.6183
	Dosis II	16.00000	8.35597	.085	-2.6183	34.6183
Dosis I	Dosis III	52.66667*	8.35597	.000	34.0484	71.2849
	kaptopril	10.66667	8.35597	.231	-7.9516	29.2849
	CMC	-76.00000*	8.35597	.000	-94.6183	-57.3817
Dosis II	Dosis II	-60.00000*	8.35597	.000	-78.6183	-41.3817
	Dosis III	-23.33333*	8.35597	.019	-41.9516	-4.7151
	kaptopril	70.66667*	8.35597	.000	52.0484	89.2849
Dosis III	CMC	-16.00000	8.35597	.085	-34.6183	2.6183
	Dosis I	60.00000*	8.35597	.000	41.3817	78.6183
	Dosis III	36.66667*	8.35597	.001	18.0484	55.2849
Dosis I	kaptopril	34.00000*	8.35597	.002	15.3817	52.6183
	CMC	-52.66667*	8.35597	.000	-71.2849	-34.0484
	Dosis I	23.33333*	8.35597	.019	4.7151	41.9516
Dosis II	Dosis II	-36.66667*	8.35597	.001	-55.2849	-18.0484

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Hasil

	Perlakuan3	N	Subset for alpha = 0.05		
			1	2	3
Tukey HSD ^a	kaptopril	3	124.6667		
	Dosis I	3	135.3333	135.3333	
	Dosis III	3		158.6667	
	Dosis II	3			195.3333
	CMC	3			211.3333
	Sig.			.710	.108

b. Diastol

Descriptives**Hasil**

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kaptopril	3	98.6667	15.94783	9.20748	59.0501	138.2833	81.00	112.00
CMC	3	178.3333	19.42507	11.21507	130.0788	226.5879	157.00	195.00
Dosis I	3	105.6667	23.96525	13.83635	46.1337	165.1997	78.00	120.00
Dosis II	3	125.6667	11.23981	6.48931	97.7454	153.5879	116.00	138.00
Dosis III	3	132.0000	23.89561	13.79613	72.6400	191.3600	106.00	153.00
Total	15	128.0667	33.32624	8.60480	109.6112	146.5221	78.00	195.00

Test of Homogeneity of Variances

Hasil

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.788	4	10	.559

ANOVA

Hasil

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	11742.267	4	2935.567	7.712	.004
Within Groups	3806.667	10	380.667		
Total	15548.933	14			

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hasil

	(I) perlakuan3	(J) perlakuan3	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound

Tukey HSD

kaptopril	CMC	-79.66667*	15.93040	.004	-132.0949	-27.2384
	Dosis I	-7.00000	15.93040	.991	-59.4283	45.4283
	Dosis II	-27.00000	15.93040	.478	-79.4283	25.4283
CMC	Dosis III	-33.33333	15.93040	.294	-85.7616	19.0949
	kaptopril	79.66667*	15.93040	.004	27.2384	132.0949
	Dosis I	72.66667*	15.93040	.007	20.2384	125.0949
Dosis I	Dosis II	52.66667*	15.93040	.049	.2384	105.0949
	Dosis III	46.33333	15.93040	.090	-6.0949	98.7616
	kaptopril	7.00000	15.93040	.991	-45.4283	59.4283
Dosis II	CMC	-72.66667*	15.93040	.007	-125.0949	-20.2384
	Dosis II	-20.00000	15.93040	.722	-72.4283	32.4283
	Dosis III	-26.33333	15.93040	.500	-78.7616	26.0949
Dosis III	kaptopril	27.00000	15.93040	.478	-25.4283	79.4283
	CMC	-52.66667*	15.93040	.049	-105.0949	-.2384
	Dosis I	20.00000	15.93040	.722	-32.4283	72.4283
Dosis I	Dosis III	-6.33333	15.93040	.994	-58.7616	46.0949
	kaptopril	33.33333	15.93040	.294	-19.0949	85.7616
	CMC	-46.33333	15.93040	.090	-98.7616	6.0949
Dosis II	Dosis I	26.33333	15.93040	.500	-26.0949	78.7616
	Dosis II	6.33333	15.93040	.994	-46.0949	58.7616

LSD

	CMC	-79.66667*	15.93040	.001	-115.1618	-44.1715
kaptopril	Dosis I	-7.00000	15.93040	.670	-42.4952	28.4952
	Dosis II	-27.00000	15.93040	.121	-62.4952	8.4952
	Dosis III	-33.33333	15.93040	.063	-68.8285	2.1618
CMC	kaptopril	79.66667*	15.93040	.001	44.1715	115.1618
	Dosis I	72.66667*	15.93040	.001	37.1715	108.1618
	Dosis II	52.66667*	15.93040	.008	17.1715	88.1618
Dosis I	Dosis III	46.33333*	15.93040	.016	10.8382	81.8285
	kaptopril	7.00000	15.93040	.670	-28.4952	42.4952
	CMC	-72.66667*	15.93040	.001	-108.1618	-37.1715
Dosis II	Dosis II	-20.00000	15.93040	.238	-55.4952	15.4952
	Dosis III	-26.33333	15.93040	.129	-61.8285	9.1618
	kaptopril	27.00000	15.93040	.121	-8.4952	62.4952
Dosis III	CMC	-52.66667*	15.93040	.008	-88.1618	-17.1715
	Dosis I	20.00000	15.93040	.238	-15.4952	55.4952
	Dosis III	-6.33333	15.93040	.699	-41.8285	29.1618
Dosis III	kaptopril	33.33333	15.93040	.063	-2.1618	68.8285
	CMC	-46.33333*	15.93040	.016	-81.8285	-10.8382
	Dosis I	26.33333	15.93040	.129	-9.1618	61.8285
	Dosis II	6.33333	15.93040	.699	-29.1618	41.8285

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

ALAUDDIN
A R

Hasil

	Perlakuan-3	N	Subset for alpha =	
			0.05	
			1	2
Tukey HSD ^a	kaptopril	3	98.6667	
	Dosis I	3	105.6667	
	Dosis II	3	125.6667	
	Dosis III	3	132.0000	132.0000
	CMC	3		178.3333
	Sig.			.294

Lampiran 6 Gambar

Gambar 1. Tanaman Daun Gedi Merah

Gambar 2. Ekstrak etanol 70 %
Daun Gedi Merah

Gambar 3. Alat Pengukur Tekanan Darah



Gambar 4. Penimbangan Tikus

Non-Invasif CODA®



Gambar 4. Induksi NaCl



Gambar 5. Induksi Prednison



Gambar 6. Induksi Ekstrak



Gambar 7. Pengukuran Tekanan darah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Nurjanah, akrab dipanggil dengan nama Jannah. Lahir dari pasangan suami istri sunda tulen Aep dan Yanti, dilahirkan di Samarinda, 04 Juni 1994 yang kemudian dibesarkan oleh kedua orang tuanya di Pulau Papua. Sejak di Papua, saya

memiliki keinginan yang besar untuk melanjutkan pendidikan di luar kota Papua, hingga akhirnya saya pun melanjutkan pendidikan di Kota Daeng dan rela jauh dari kedua orangtua demi menggapai cita-cita untuk membahagiakan kedua orangtua.

Jenjang pendidikan formal dimulai pada tahun 2000 di SD Inpres 135 Hasik Jaya Kab. Sorong Selatan, kemudian melanjutkan kejenjang selanjutnya yaitu di SMPN 1 Moswaren Kab. Sorong Selatan. Tak sampai disitu saya pun melanjutkan kejenjang selanjutnya di sekolah Islam yaitu di SMA Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar, hingga akhirnya pada tahun 2012 saya pun mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam perguruan tinggi Islam yaitu di UIN Alauddin Makassar pada jurusan yang saya dambakan yaitu Farmasi. Dan Alhamdulillah, karena pertolongan Allah dan berkat dukungan orang-orang tercinta sehingga penulis pun dapat menyelesaikan kuliah di UIN. *Man Jadda wa jada.*