

**HUBUNGAN USIA DAN PARITAS DENGAN PERDARAHAN**

**POST PARTUM DI RSIA ANANDA MAKASSAR**

**TAHUN 2021**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kedokteran  
Program Studi Pendidikan Dokter Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

**NURUL HAZANAH HAMZAH**

NIM: 70600119033

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hazanah Hamzah  
NIM : 70600119033  
Tempat/ Tgl Lahir : Makassar, 14 Oktober 2000  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter  
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Perumahan Saumata Indah Blok B/12  
Judul : Hubungan Usia dan Paritas dengan  
Perdarahan Post Partum di RSIA Ananda  
Makassar Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 03 Maret 2023

Penyusun

Nurul Hazanah Hamzah

## PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

Pembimbing penulisan skripsi Nurul Hazanah Hamzah NIM: 70600119033, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul: "Hubungan Usia dan Paritas dengan Perdarahan Post Partum di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Makassar, 03 Maret 2023

Pembimbing 1



dr. Ulfah Rimayanti, Ph.D., Sp.M., M.Kes

Pembimbing 2



Dr. dr. H. Najamuddin., M.Kes

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hubungan Usia dan Paritas dengan Perdarahan Post Partum di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021**” yang disusun oleh Nurul Hazanah Hamzah, NIM 70600119033, mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 24 Februari 2023, bertepatan dengan 3 Sya’ban 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 03 Maret 2023  
10 Sya’ban 1444 H

### DEWAN PENGUJI:

**Ketua** : Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes (.....)

**Sekretaris** : Dr. dr. Rosdianah., M.Kes (.....)


**Pembimbing I** : dr. Ulfah Rimayanti, Ph.D., Sp.M., M.Kes (.....)

**Pembimbing II**: Dr. dr. H. Najamuddin, M.Kes (.....)

**Penguji I** : dr. Rini Fitriani, M.Kes (.....)

**Penguji II** : Dr. Azizul Hakim, M.Pd. I (.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes  
NIP: 19800701200604 2 002

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hubungan Usia dan Paritas dengan Perdarahan Post Partum di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai *Rahmatan Lil'alamin* beserta para sahabat beliau.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Hamzah Upu dan Ibunda Eni Suwati dan seluruh keluarga serta semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar serta seluruh jajarannya.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan Pendidikan.
3. Ibu dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Andi Tihardimanto M.Kes selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

4. Ibu dr. Ulfah Rimayanti, Ph.D., Sp.M., M.Kes selaku pembimbing I dan Bapak Dr. dr. H. Najamuddin, M.Kes selaku pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
5. Ibu dr. Ajardiana Idrus, Sp.OG (K) selaku penguji I dan bapak Dr. Azizul Hakim, M.Pd.I, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Teman-teman PA yang senantiasa memberi semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat melalui semua tantangan dengan lebih baik.
8. Teman terdekat *seafood* yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan target pengerjaan skripsi.
9. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.


Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin. Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Makassar, 18 Agustus 2022

Penyusun

Nurul Hazanah Hamzah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Hipotesis.....	5
D. Definsi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Kajian Teori.....	19
1. Perdarahan Post Partum.....	19
2. Hubungan Usia dengan Perdarahan Post Partum .....	19
3. Hubungan Paritas dengan Perdarahan Post Partum.....	20
4. Hubungan Usia dan Paritas dengan Perdarahan Post Partum dalam Perspektif Islam.....	22
B. Kerangka Teori.....	34
C. Kerangka Konsep.....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36




B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
C. Populasi dan Sampel .....	37
D. Metode Pengumpulan Data .....	37
E. Instrumen Penelitian.....	40
F. Teknik Pengolahan/Analisis Data .....	40
G. Alur Penelitian.....	42
H. Etika Penelitian .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMEBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Hasil Penelitian .....	52
C. Pembahasan.....	52
D. Keterbatasan Penelitian .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN... ..</b>	<b>63</b>



**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 2.1** National Early Warning Score (NEWS)..... 32




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Definisi Operasional.....	5
<b>Tabel 1.2</b> Kajian Pustaka.....	8
<b>Tabel 2.1</b> Diagnosis Perdarahan Post Partum.....	25
<b>Tabel 4.1</b> Distribusi Responden Berdasarkan Usia dan Paritas dengan Pasien Perdarahan Post Partum di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.....	47
<b>Tabel 4.2</b> Resiko Kejadian Perdarahan Post Partum Berdasarkan Usia Ibu di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.....	50
<b>Tabel 4.3</b> Resiko Kejadian Perdarahan Post Partum Berdasarkan Paritas Ibu di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.....	51

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 3.1</b> Kerangka Teori.....	34
<b>Bagan 3.2</b> Kerangka Konsep .....	35



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

Nama : Nurul Hazanah Hamzah

NIM : 70600119033

Judul : Hubungan Usia dan Paritas dengan Perdarahan Post Partum di RSIA  
Ananda Makassar Tahun 2021

---

Usia serta paritas ibu mempunyai keterkaitan erat terhadap perdarahan post partum yang bertanggung jawab sebagai penyebab Angka Kematian Ibu (AKI) urutan pertama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara usia serta paritas terhadap perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar tahun 2021 dengan metode analitik observasional model *case control* dengan menggunakan data sekunder dari rekam medik RSIA Ananda Makassar. Sampel yang digunakan merupakan ibu yang melahirkan dengan diagnosis perdarahan post partum dengan jumlah 98 orang sebagai kelompok kasus dan tidak diagnosis perdarahan post partum dengan jumlah 98 orang sebagai kelompok kontrol. Data diolah dan dianalisa dengan uji univariat dan bivariat dengan *chi square*. Didapatkan hasil yang berhubungan secara signifikan antara usia dengan perdarahan post partum ( $p < 0,05$ ) dan antara paritas dengan perdarahan post partum ( $p < 0,05$ ). Disimpulkan bahwa usia dan paritas di RSIA Ananda Makassar berhubungan secara bermakna terhadap kejadian perdarahan post partum.

**Kata Kunci** : Usia, Paritas, Perdarahan Postpartum

## ABSTRACT

*Name : Nurul Hazanah Hamzah*

*NIM : 70600119033*

*Title : Relationship between Age and Parity with Post Partum Hemorrhage at RSIA Ananda Makassar in 2021*

---

*Maternal age and parity have a close relationship with post partum hemorrhage which is responsible for the first cause of Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia. This study aims to determine the relationship between age and parity on post partum bleeding at RSIA Ananda Makassar in 2021 using the analytic observational case control model using secondary data from medical records at RSIA Ananda Makassar. The sample used was mothers who gave birth with a diagnosis of postpartum hemorrhage with a total of 98 people as a case group and no diagnosis of postpartum hemorrhage with a total of 98 people as a control group. Data were processed and analyzed using univariate and bivariate tests with chi square. There was a significant correlation between age and postpartum hemorrhage ( $p < 0.05$ ) and between parity and postpartum hemorrhage ( $p < 0.05$ ). It was concluded that age and parity at RSIA Ananda Makasaar were significantly related to the incidence of postpartum hemorrhage.*

***Keywords : Age, Parity, Postpartum Bleeding***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang***

Keberhasilan upaya kesehatan ibu dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI). Di Indonesia, AKI secara umum mengalami penurunan selama periode 1991-2015 dari angka 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup namun belum berhasil mencapai target *Millennium Development Goals* (MDGs) yang diharapkan yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Berdasarkan pencatatan program kesehatan keluarga di Kementerian Kesehatan tahun 2020 jumlah kematian ibu di Indonesia mencapai 4.627 kematian atau 230 per 100.000 melahirkan. Pada tahun 2020 angka kematian ibu dan anak di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 95 kasus dengan penyebab tertinggi ialah perdarahan sebanyak 44 kasus diikuti oleh hipertensi dalam kehamilan sebanyak 30 kasus (Kemenkes RI, 2020).

Pada tahun 2020 sebagian besar kematian ibu disebabkan oleh perdarahan mencapai 1.330 kasus, diikuti dengan penyebab lain seperti hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.110 kasus dan gangguan sistem peredaran darah sebanyak 230 kasus (Kemenkes RI, 2020). Penyebab tersering dari mortalitas akibat perdarahan pada ibu adalah perdarahan pasca-salin atau perdarahan post partum hingga mencapai persentase 25% dari keseluruhan kematian ibu di dunia. Kematian akibat perdarahan post partum sebagian besar terjadi selama 24 jam pertama setelah kelahiran (Musa, 2019).

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mendefinisikan perdarahan post partum sebagai kehilangan darah dari saluran genitalia >500 ml setelah melahirkan pervaginam atau >1000 ml setelah melahirkan secara operasi sesar. Perdarahan pasca-salin dapat bersifat minor (500-1000 ml) atau pun mayor (>1000 ml). Perdarahan mayor dapat dibagi menjadi sedang (1000-2000 ml) atau berat (>2000 ml). Perdarahan post partum disebabkan oleh beberapa hal dengan persentase masing-masing antara lain, atonia uteri (50-60%), sisa plasenta (23-24%), retensio plasenta (16- 17%), lacerasi jalan lahir (45%), kelainan darah (0,5-0,8%) (Maesaroh & Iwana, 2018).

Faktor resiko yang berhubungan dengan perdarahan post partum terdiri dari faktor yang sudah ada sebelumnya (*preexisting factors*), faktor plasenta dan faktor saat persalinan. *Preexisting factors* antara lain : riwayat perdarahan, preeklampsia, obesitas, anemia, paritas dan usia tua (Durmaz & Komurcu, 2018). Penelitian menyebutkan bahwa usia lebih dari 35 tahun akan meningkatkan faktor resiko obstetri, komplikasi, persalinan dengan operasi sesar termasuk insiden perdarahan. Faktor resiko lain dari perdarahan yaitu paritas, angka paritas di Indonesia masih tergolong cukup tinggi (Sanjaya & Fara, 2021).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa usia dan paritas memiliki kaitan yang erat sebagai faktor resiko terjadinya perdarahan post partum dimana kejadian perdarahan post partum ini menjadi penyumbang nomor satu angka kematian ibu di Indonesia. Melihat bagaimana kehamilan menjadi suatu hal yang dapat memberikan banyak resiko bagi seorang wanita yang



mengandung maka sudah seharusnya seorang anak senantiasa taat dan patuh pada kedua orang tuanya terutama kepada ibunya karena ibunyalah yang telah mengandung dengan berbagai resiko yang harus ditanggung bahkan sampai kematian pun dapat menjadi salah satunya misalnya dengan kausa perdarahan post partum ini.

Seperti dalam dalam QS Luqman/31:14 Allah SWT berfirman sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ  
فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ۝١٤

Terjemahnya :

“Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah Jilid 11, ayat di atas menyatakan : Kami wasiatkan yakni berpesan dengan amat kukuh kepada semua manusia mengenai kedua orang tua ibu bapaknya. Pesan kami disebabkan karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan, yakni kelemahan berganda dan dari saat ke saat bertambah-tambah. Lalu dia melahirkannya dengan susah payah, kemudian memelihara dan menyusukannya setiap saat, bahkan di tengah malam, ketika manusia lain tertidur nyenyak. Demikian hingga tiba masa menyapihan dan penyapiannya di dalam dua tahun dihitung sejak hari kelahiran sang anak. Hal ini jika orang

tua ingin menyempurnakan penyusuan. Wasiat kami itu adalah: bersyukurlah kepada-Ku! karena Aku yang telah menciptakan kamu dan menyediakan semua sarana kebahagiaan kamu, dan bersyukur pulalah kepada dua orang ibu bapak kamu karena mereka yang Aku jadikan perantara kehadiran kamu di bumi ini. Kesyukuran ini mutlak kamu lakukan karena hanya Allah dan tidak kepada selain Aku kembali kamu semua wahai manusia, untuk kamu pertanggungjawabkan kesyukuran itu (Shihab, 2017).

Dari tafsir ayat tersebut, dapat kita ketahui bahwa perjuangan seorang ibu sangat besar, sehingga sudah sepatutnya seorang anak sopan dan patuh kepada kedua orang tua, terkhusus kepada seorang ibu.

Melihat pentingnya pembahasan mengenai perdarahan post partum sebagai salah satu penyumbang terbesar Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia dan hubungannya dengan usia dan paritas sebagai faktor resiko dengan persentase yang besar, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

### ***B. Rumusan Masalah***

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana hubungan usia dan paritas dengan kejadian perdarahan post partum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar ?

### **C. Hipotesis**

#### **1. Hipotesis Nol (Ho)**

Tidak terdapat hubungan antara usia dan paritas dengan kejadian perdarahan post partum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar.

#### **2. Hipotesis Alternatif (Ha)**

Terdapat hubungan antara usia dan paritas dengan kejadian perdarahan post partum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar.

### **D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional**

Tabel 1. Defenisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	Usia	Usia merupakan kurun waktu sejak adanya seseorang dan dapat diukur menggunakan satuan waktu dipandang dari segi kronologis.	Melihat data rekam medis pasien kemudian disesuaikan dengan kriteria objektif.	Kriteria Objektif A.) Resiko Tinggi : <20 tahun dan >35 tahun B.) Resiko Rendah : 20-35 tahun	Ordinal

2	Paritas	Paritas adalah jumlah anak yang hidup atau jumlah kehamilan yang menghasilkan janin yang mampu hidup diluar rahim.	Melihat data rekam medis pasien kemudian disesuaikan dengan kriteria objektif.	Kriteria Objektif : A.) Resiko Tinggi : $<2$ dan $\geq 4$ anak B.) Resiko Rendah : 2-3 anak	Ordinal
Variabel Dependen					
1.	Perdarahan post partum	Perdarahan lebih dari 500cc yang terjadi setelah bayi lahir pervaginam atau lebih dari 1000 ml setelah persalinan abdominal	Melihat data rekam medis pasien kemudian disesuaikan dengan kriteria objektif	A.) Mengalami perdarahan post partum B.) Tidak mengalami perdarahan post partum	Nominal

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Menghubungkan antara usia dan paritas dengan metode melihat data rekam medis pasien yang mengalami perdarahan post partum.

### E. Kajian Pustaka

Tabel 2. Kajian Pustaka

No	Peneliti an/ tahun	Judul	Metode	Jumlah sampel	Instrumen peneliian	Hasil
1.	Evi Wulandari/2021	Faktor Determinan Kejadian Perdarahan Post Partum di RSUD Polman Kabupaten Polman	Penelitian Kuantitatif dengan metode <i>case control</i>	Jumlah sampel adalah 102 responden dengan 51 kasus dan 51 sampel kontrol	Data diambil melalui data semua ibu bersalin di RSUD Polman Tahun 2017.	Usia <20 atau > 35 tahun memiliki resiko 3,1 kali lebih besar dari pada ibu yang berusia 20 – 35 tahun (95% CI: 1,3 – 7,5). Paritas < 1 atau paritas > 3 memiliki resiko 6.1 kali lebih besar dibandingkan dengan paritas 2-3 (95% CI : 1,6 – 22,6).
2.	Khusnul Amirah, Suriani. B, Ros Rahmawati/ 2021	Faktor Resiko Kehamilan pada Kejadian Perdarahan Post partum di Rumah	Penelitian Kuantitatif dengan metode <i>case control</i>	Jumlah sampel adalah 62 orang dengan 31 sampel kasus dan 31 sampel	Data diambil dari rekam medis rumah sakit pasien yang mengalami perdarahan post partum	usia <20 dan >35 tahun memiliki resiko 2,879 kali lebih besar untuk mengalami perdarahan post partum. Paritas >3 didapatkan bahwa nilai $p = 0,005 < \alpha = 0,05$ dan nilai $OR > 1$ yang berarti

		Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar		kontrol. di RSKDIA Siti Fatimah tahun 2018	paritas >3 terdapat hubungan dan memiliki resiko 4,410 kali lebih besar untuk mengalami perdarahan post partum.
--	--	---	--	--	---

3.	Bahrn Hj.Huse n / 2021	Analisis Faktor Resiko Perdarahan Post Partum di RSUD Labuang Baji Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i>	Jumlah sampel adalah 142 kasus	Pengambilan data dilakukan menggunakan rekam medis ibu bersalin yang mengalami perdarahan post partum di RSUD Labuang Baji instrument yang digunakan adalah aster tabel.	Ada hubungan antara perdarahan post partum dengan paritas (nilai OR=0,046), ada hubungan perdarahan post partum dengan usia (nilai OR=0,048). Hasil analisis multivariate menunjukkan variabel paling berpengaruh adalah paritas.
----	------------------------------	--	--	---	--	---

M A K A S S A R

4.	Rusli Taher/ 2020	Faktor- faktor yang Berhubung an dengan Terjadinya Perdarahan Post Partum pada Ibu Bersalin di RSKDIA Sitti Fatimah Makassar	Penelitian ini menggunakan metode observasio nal dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 62 kasus	Pengambilan data dilakukan menggunakan n rekam medis ibu bersalin yang mengalami perdarahan post partum di Rumah Sakit Sitti Fatimah	Hasil penelitian ditemukan terdapat hubungan perdarahan post partum dengan usia (p=0,000) dan terdapat hubungan antara perdarahan post partum dengan paritas (p=0,000)
----	-------------------------	---	---	--	---	---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R



5.	Musannah Hidayati dkk/2019	Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perdarahan Post Partum di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar	Jenis penelitian kuantitatif survey analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 152 kasus	Instrumen penelitian yaitu <i>check list</i> dengan mengambil data dari rekam medis	Temuan penelitian adalah ada hubungan yang bermakna antara usia ibu dan paritas ibu dengan perdarahan post partum.
----	----------------------------	--	---	--	---	--

## ***F. Tujuan Penelitian***

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui hubungan usia dan paritas dengan kejadian perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui distribusi usia dan paritas pada ibu bersalin di RSIA Ananda Makassar.
- b. Untuk mengetahui angka kejadian perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar.

- c. Untuk mengetahui hubungan usia beresiko dan usia tidak beresiko dengan kejadian perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar.
- d. Untuk mengetahui hubungan paritas beresiko dan paritas tidak beresiko dengan kejadian perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar.

### ***G. Manfaat Penelitian***

#### **a. Bagi peneliti**

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bidang kesehatan terutama mengenai usia dan paritas pada ibu bersalin dengan kejadian perdarahan post partum.

#### **b. Bagi pengetahuan**

Dapat dijadikan salah satu bahan acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang kesehatan baik ibu dan anak.


#### **c. Bagi Masyarakat**

Menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang hubungan usia dan paritas dengan kejadian perdarahan post partum sehingga ibu dapat merencanakan kehamilannya dengan matang.

#### **d. Bagi Instansi**

- 1) Memberikan hasil data tambahan di bidang kesehatan ibu dan anak khususnya mengenai hubungan usia dan paritas dengan kejadian perdarahan post partum.

- 2) Menambah referensi bacaan terkait ibu dan anak, sehingga dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Perdarahan Post Partum**

###### **a. Definisi**

Perdarahan post partum didefinisikan sebagai perdarahan yang segera terjadi setelah persalinan dengan jumlah lebih dari 500cc (Suryati et al, 2022). Perdarahan yang terjadi dapat timbul sebelum maupun sesudah lahirnya plasenta. Perdarahan post partum biasanya disebabkan oleh karena adanya laserasi jalan lahir, kelainan darah, keberadaan plasenta atau retensio plasenta dan tidak adekuatnya kontraksi uterus atau atonia uteri. Perdarahan dapat dibagi menjadi dua berdasarkan waktu terjadinya yaitu perdarahan post partum primer dan sekunder. Perdarahan post partum primer yaitu perdarahan yang terjadi 24 jam pertama setelah proses kelahiran sedangkan perdarahan post partum sekunder adalah perdarahan yang terjadi setelah 24 jam pertama sampai 6 minggu setelah proses kelahiran (Ummah et al , 2018).

###### **b. Epidemiologi**

Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2015 perdarahan merupakan penyebab kematian terbesar pada ibu dan perdarahan post partum menjadi penyebab tersering dari keseluruhan kasus (Simanjuntak,

2020). Angka kejadian perdarahan post partum di beberapa rumah sakit di Makassar misalnya di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji periode tahun 2017 bulan April-Mei terdapat 142 pasien (Bahrun Hj Husen, 2021). Adapun pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar terdapat 31 kasus dengan persentase masing-masing laserasi jalan lahir 54,8%, retensio plasenta 25,8%, rest plasenta 12,9% serta atonia uteri 6,45% (Amirah et al, 2021).

### **c. Klasifikasi**

Perdarahan dapat dibagi menjadi perdarahan minor yaitu 500-1000 ml atau perdarahan mayor >1000 ml. Perdarahan mayor dapat dibagi menjadi sedang yaitu 1000-2000 ml atau berat >2000 ml. Adapun pembagian lain menurut Sibai adalah perdarahan ringan (*mild*) yaitu apabila jumlah perdarahan  $\leq$  1500 ml, berat (*severe*) > 1500 ml dan masif > 2500 ml. Sedangkan berdasarkan waktu terjadinya perdarahan post partum dibagi menjadi perdarahan post partum primer (*primary post partum haemorrhage*) yaitu perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama post partum dan sekunder (*secondary post partum haemorrhage*) yang terjadi setelah periode 24 jam sampai 6 minggu post partum. Penyebab utama perdarahan post partum dari banyak kasus adalah atonia uteri (Simanjuntak, 2020).

### **d. Etiologi dan Faktor Resiko**

Penyebab perdarahan post partum tersering ada 4 yaitu uterus tidak dapat berkontraksi dengan baik untuk menghentikan perdarahan dari bekas

insersi plasenta (*tone*), trauma jalan lahir (*trauma*), sisa plasenta atau bekuan darah yang menghalangi kontraksi uterus yang adekuat (*tissue*) dan gangguan pembekuan darah. (*thrombin*) (POGI, 2016).

Etiologi atau penyebab perdarahan post partum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1.) Atonia uteri. Didefinisikan sebagai keadaan tonus atau kontraksi uterus yang lemah sehingga tidak adekuat dalam menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta (Simanjuntak, 2020). Perdarahan post partum dapat dikendalikan dengan kontraksi dan retraksi serat-serat miometrium. Kontraksi dan retraksi ini menyebabkan terlipatnya pembuluh-pembuluh darah sehingga aliran darah ke tempat plasenta menjadi terhenti. Peristiwa gagalnya mekanisme akibat gangguan fungsi miometrium dinamakan atonia uteri (Oxorn, 2010).
- 2.) Laserasi atau robekan jalan lahir. Penyebab ini biasanya terjadi pada persalinan ibu dengan diikuti trauma seperti robekan spontan perineum maupun karena berbagai macam perkembangan alat bantu persalinan yang terkesan semakin traumatik dan manipulatif yang dapat membuat kemungkinan terjadinya laserasi jalan lahir semakin meningkat. Misalnya akibat episiotomi, trauma forcep, dan penggunaan vakum ekstraksi (Simanjuntak, 2020). Perdarahan yang cukup banyak dapat terjadi karena robekan pada saat proses persalinan baik normal maupun dengan tindakan. Inspeksi harus selalu dilakukan sesudah proses persalinan selesai sehingga

sumber perdarahan dapat dikendalikan. Tempat-tempat perdarahan dapat terjadi di vulva, vagina, serviks, porsio dan uterus (Oxorn, 2010).

- 3.) Keberadaan plasenta atau kotiledon dan selaput kulit ketuban yang tidak seluruhnya keluar dari rahim akan mengganggu kontraksi uterus sehingga penjepitan pembuluh darah juga menjadi tidak maksimal (Simanjuntak, 2020). Retensio sebagian atau seluruh plasenta dalam Rahim akan mengganggu kontraksi dan retraksi sinus-sinus darah tetap terbuka yang dapat menyebabkan perdarahan post partum. Perdarahan tersebut akan terjadi saat bagian plasenta terlepas dari dinding uterus (Oxorn, 2010). Retensio plasenta, seluruh atau sebagian, lobus succenturiata, sebuah kotiledon, atau suatu fragmen plasenta dapat menyebabkan perdarahan plasenta post partum. Retensio plasenta dapat disebabkan adanya plasenta akreta, perkreta dan inkreta. Faktor predisposisi terjadinya plasenta akreta adalah plasenta previa, bekas operasi sesar, pernah kuret berulang, dan multiparitas (Saifuddin, 2014).
- 4.) Gangguan pembekuan darah (koagulopati) atau gangguan pembekuan darah Afibrinogenemia atau hipofibrinogenemia dapat terjadi setelah abrupsio plasenta, retensio janin mati yang lama di dalam rahim, dan pada emboli cairan ketuban. Kegagalan mekanisme pembekuan darah ini dapat menyebabkan perdarahan yang tidak dapat dihentikan dengan tindakan yang biasanya dipakai untuk mengendalikan perdarahan post partum (Oxorn, 2010).

Faktor resiko terjadinya perdarahan post partum dapat dikategorikan menjadi faktor yang sudah ada sebelumnya, faktor saat persalinan dan faktor plasenta. Faktor yang sudah ada sebelumnya atau *preexisting factors* misalnya adalah usia, paritas, obesitas, anemia, riwayat perdarahan hingga preeklampsia (Sanjaya, 2021).

1) Usia

Usia wanita saat melahirkan anak yang lebih dari 35 tahun menjadi faktor resiko terjadinya perdarahan post partum. Hal ini disebabkan wanita dengan usia diatas 35 tahun memiliki fungsi reproduksi yang sudah mengalami penurunan dibandingkan reproduksi normal (Saifuddin, 2014).

2) Paritas

Wanita dengan paritas yang tinggi akan menjadi resiko terjadinya perdarahan post partum karena kelemahan kontraksi uterus dalam menekan pembuluh darah atau yang disebut dengan atonia uteri sehingga menyebabkan perdarahan (Nur et al, 2019).

3) Anemia

Anemia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan penurunan nilai hemoglobin dibawah nilai normal, dikatakan anemia jika kadar hemoglobin kurang dari 11g/dL. Kurangnya hemoglobin dapat menyebabkan komplikasi serius dalam kehamilan maupun persalinan.

Oksigen pada uterus yang kurang menyebabkan tidak adekuatnya



kontraksi otot uterus sehingga dapat terjadi atonia uteri yang berujung pada perdarahan post partum (Manuaba, 2014).

#### 4) Riwayat persalinan

Riwayat persalinan sebelumnya dapat berhubungan dengan hasil kehamilan dan persalinan berikutnya. Apabila riwayat persalinan yang lalu buruk maka tenaga kesehatan harus lebih waspada terhadap terjadinya komplikasi dalam persalinan yang akan berlangsung. Riwayat persalinan buruk ini dapat berupa abortus, kematian janin, eklampsia dan preeklampsia, operasi sesar, partus lama, janin besar dan ada riwayat perdarahan antepartum atau post partum (Saifuddin, 2014).

#### e. Patomekanisme

Berdasarkan etiologi dan faktor resiko yang ada, ini lah yang akan berkaitan dengan patomekanisme terjadinya perdarahan post partum . Etiologi atonia uteri biasanya didukung oleh faktor resiko berupa paritas, korioamnionitis, penggunaan oksitosin yang panjang, anestesi umum, dan kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan peningkatan distensi uterus seperti multigravida, polihidramnion, makrosomia dan miom uteri. Faktor resiko yang paling berperan dalam etiologi oleh inversi uteri seperti traksi tali pusat yang berlebihan, tali pusat yang pendek, perlengketan plasenta pada fundus uteri, trauma traktus genitalia seperti operasi vagina. Gangguan pembekuan darah juga dapat menjadi salah satu mekanisme

terjadinya perdarahan post partum terutama pada pasien dengan diagnosis KJDR atau kematian janin dalam rahim (Shakur, 2018).

Terjadinya perdarahan post partum ini memiliki banyak etiologi sehingga patomekanismenya juga akan berbeda-beda. Berikut ini adalah patomekanisme terjadinya perdarahan post partum berdasarkan etiologinya.

#### 1.) Atonia uteri

Atonia uteri merupakan keadaan uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah dilakukan pijatan pada fundus uteri yang menyebabkan pembuluh darah yang robek atau terbuka pada bekas implantasi plasenta tidak dapat tertutup karena tidak adanya kontraksi miometrium dalam menjepit pembuluh darah tersebut. Akibatnya terjadi perdarahan hebat dan jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan kematian pada ibu (Mahendra, 2020).

#### 2.) Retensio plasenta dan rest plasenta

Retensio plasenta disebabkan karena perlekatan plasenta yang sangat kuat. Ada beberapa jenis retensio plasenta yaitu (Prawirohardjo, 2020) :

- a.) Plasenta adhesiva, yaitu implantasi plasenta yang kuat dari jonjot korion plasenta
- b.) Plasenta akreta, yaitu implantasi ini menembus desidua basalis
- c.) Plasenta inkreta, yaitu implantasi plasenta telah menembus lapisan miometrium

- d.) Plasenta perkreta, yaitu implantasi plasenta menembus sampai ke lapisan perimetrium
- e.) Plasenta inkarserata, yaitu plasenta tertahan di dalam kavum uteri akibat berkontraksinya ostium uteri.

Adapun untuk sisa plasenta sendiri, sering disebabkan karena tertinggalnya 1 atau beberapa kotiledon setelah plasenta dilahirkan. Kejadian retensio plasenta ataupun sisa plasenta akan mengakibatkan kontraksi uterus tidak akan efektif dan baik sehingga pembuluh darah yang robek atau terbuka tidak akan terjepit atau tertutup secara baik sehingga akan mengakibatkan terjadinya perdarahan (Mahendra, 2020).

### 3.) Robekan jalan lahir

Robekan jalan lahir sering terjadi akibat persalinan dengan adanya trauma. Trauma yang terjadi ini bisa disebabkan secara sengaja oleh tenaga kesehatan ataupun terjadi karena trauma yang tidak disengaja. Untuk trauma karena sengaja sering dilakukan apabila terdapat indikasi seperti episiotomi.

Ada beberapa robekan yang dapat terjadi bisa berupa laserasi, lecet, luka episiotomi, robekan perineum spontan derajat ringan sampai totalis (sphinter ani terputus), robekan pada dinding vagina, forniks uteri, serviks, daerah sekitar clitoris, uretra dan terparah adalah ruptur uteri. Terjadinya ruptur atau robekan jalan lahir yang terjadi pada saat proses persalinan ini biasanya akan terlihat pada saat proses

persalinan telah selesai. Dimana, keadaan ini terlihat pada saat proses persalinan telah selesai. Dimana, keadaan ini disebut kedalam kategori perdarahan post partum (Nurhayati, 2019).

#### 4.) Gangguan Pembekuan Darah

Perdarahan post partum karena gangguan pembekuan darah kadang dicurigai menjadi penyebab setelah penyebab lain tidak ditemukan seperti atonia uteri, rest plasenta, retensio plasenta dan robekan jalan lahir. Pada seseorang dengan gangguan pembekuan darah, didapatkan trombositopenia dan hipofibrinogenemia dimana kedua faktor ini merupakan komponen faktor pembekuan darah sehingga jika terjadi perlukaan maka akan terjadi perdarahan yang lama dan susah untuk berhenti. Sama halnya pada saat orang ini hamil dan melahirkan maka akan terjadi perlukaan baik itu pada jalan lahir maupun uterus sehingga akan mengakibatkan perdarahan post partum (Prawirohardjo, 2020).

#### **f. Diagnosis**

Diagnosis dari perdarahan post partum dapat dinilai dengan munculnya perdarahan banyak dalam waktu singkat yang seringkali kehilangan banyak darah sebelum tampak pucat (Prawirohardjo, 2020).

##### 1.) Anamnesis

Anamnesis dalam pemeriksaan perdarahan post partum dinilai dengan keluhan dan gejala yang didapatkan sebelum dan selama proses persalinan. (Leveno K, 2016).

a.) Atonia uteri

Terdapat keluhan adanya perdarahan yang masih aktif dan banyak setelah bayi dan plasenta lahir, bergumpal.

b.) Robekan jalan lahir

Terdapat faktor resiko berupa bayi yang makrosomia, kehamilan gamelli dan factor lain yang menyebabkan robekan jalan lahir mulai dari epitel vagina dan atau hingga mukosa rektum.

c.) Sisa plasenta

Kala uri berlangsung tidak lancer, pada saat melakukan pemeriksaan plasenta ditemukan adanya kotiledon tidak lengkap. Ada perdarahan dari ostium uteri eksternum saat kontraksi rahim sudah baik dan robekan sudah terjahit

d.) Inversi Uterus

Inversio uteri dapat ditandai dengan adanya tanda-tanda syok karena kesakitan, perdarahan yang banyak dan bergumpal.

2.) Pemeriksaan Fisik

Pada pemeriksaan fisik secara umum perdarahan post partum didapatkan tekanan darah menurun dan frekuensi napas serta nadi menjadi lebih cepat. Perdarahan yang berlangsung terus-menerus dapat menimbulkan syok.

a.) Atonia Uteri

Pemeriksaan didapatkan fundus uteri masih setinggi pusat atau lebih pada palpasi dengan kontraksi yang lembek.

b.) Robekan Jalan Lahir

Pemeriksaan dilakukan dengan inspeksi vagina, vulva dan serviks mencari sumber perdarahan dengan menggunakan spekulum dengan warna darah merah segar dan pulsatif sesuai denyut nadi.

c.) Sisa plasenta

Lakukan eksplorasi ke dalam rahim dengan manual atau kuret yang didahului pemberian uterotonika.

d.) Inversi uterus

Pada pemeriksaan di vulva tampak endometrium terbalik dengan atau tanpa plasenta melekat.

3.) Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan mencakup pemeriksaan darah seperti pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) dan tes pembekuan darah.

Berdasarkan pembagian etiologinya, diagnosis perdarahan dengan lebih mudah dapat dikelompokkan berdasarkan temuan yang didapatkan pada saat melakukan diagnosis seperti tabel berikut :

Tabel 2.1 Diagnosa Perdarahan Post Partum

No	Gejala dan Tanda yang selalu ada	Gejala dan tanda yang kadang-kadang ada	Diagnosis Kemungkinan
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Uterus tidak berkontraksi dan lembek</li><li>▪ Perdarahan segera setelah anak lahir (Perdarahan pasca-salin primer atau p3)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Syok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Atonia Uteri</li></ul>

2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdarahan segera (P3)</li> <li>▪ Darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir (P3)</li> <li>▪ Uterus kontraksi baik</li> <li>▪ Plasenta lengkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pucat</li> <li>▪ Lemah</li> <li>▪ Menggigil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Robekan Jalan Lahir</li> </ul>
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plasenta belum lahir setelah 30 menit</li> <li>▪ Perdarahan segera (P3)</li> <li>▪ Uterus kontraksi baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tali pusat putus akibat traksi berlebihan</li> <li>▪ Inversio uteri akibat tarikan</li> <li>▪ Perdarahan lanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Retensio plasenta</li> </ul>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plasenta atau sebagian selaput (mengandung pembuluh darah) tidak lengkap</li> <li>▪ Perdarahan segera (P3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus tidak berkurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tertinggalnya sebagian plasenta</li> </ul>
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uterus tidak teraba</li> <li>▪ Lumen vagina terisi massa</li> <li>▪ Tampak tali pusat (jika plasenta belum lahir)</li> <li>▪ Perdarahan segera (P3)</li> <li>▪ Nyeri sedikit atau berat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Syok neurogenic</li> <li>▪ Pucat dan limbung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inversio uteri</li> </ul>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sub-involusi uterus</li> <li>▪ Nyeri tekan perut bawah</li> <li>▪ Perdarahan lebih dari 24 jam setelah persalina. Perdarahan sekunder atau P2S</li> <li>▪ Perdarahan bervariasi (ringan atau berat, terus-menerus atau tidak teratur) dan berbau (ada infeksi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anemia</li> <li>▪ Demam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdarahan terlambat</li> <li>▪ Endometritis atau sisa plasenta (terinfeksi atau tidak)</li> </ul>
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdarahan segera (P3) (Perdarahan intraabdominal dan atau vaginum)</li> <li>▪ Nyeri perut hebat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Syok</li> <li>▪ Nyeri tekan perut</li> <li>▪ Denyut nadi ibu cepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Robekan dinding uterus (ruptur uteri)</li> </ul>

#### e. **Tata Laksana**

Resiko terjadinya perdarahan post partum dapat diminimalisir dengan pelaksanaan manajemen kala tiga yang optimal yang terdiri atas injeksi oksitosin segera setelah bayi lahir, penegangan tali pusat terkendali dan masase uterus pasca kelahiran plasenta. Penatalaksanaan perdarahan post partum terdiri dari tatalaksana awal berupa meminta bantuan, memasang jalur intravena dengan kateter ukuran besar, mencari etiologi serta melakukan masase uterus. Setelah penatalaksanaan awal, selanjutnya diberikan tatalaksana farmakologi berupa uterotonika misalnya oksitosin, metilergometrin dan misoprostol. Dosis oksitosin yang diberikan adalah 10-20 unit dalam 500 mL NaCl 0,9% atau 1- unit intramuskular. Sedangkan misoprostol adalah analog prostaglandin E1 yang diberi dengan dosis 600-1000mcg secara oral, rektal atau vaginal. Langkah berikutnya adalah memberikan tatalaksana konservatif non bedah dengan menyingkirkan faktor sisa plasenta atau laserasi jalan lahir, kompresi bimanual atau kompresi aorta abdominal dan juga memasang tampon uterus vagina dan kondom kateter. Selanjutnya dapat dilakukan tatalaksana konservatif bedah dengan melakukan kompresi uterus dengan teknik B-Lynch, devaskularisasi sistem perdarahan pelvis, atau embolisasi arteri uterina dengan radiologi intervensi. Kemudian langkah terakhir adalah dengan melakukan histerektomi subtotal atau total (Simanjutak, 2020).

Selain penatalaksanaan yang tepat, pemantauan yang tepat juga harus dapat dilakukan agar tidak terjadi perburukan pada kasus perdarahan post



partum sangat diperlukan. Ada beberapa sistem skoring tanda klinis yang dapat digunakan sebagai tanda peringatan untuk memprediksi peristiwa kritis yang tidak diharapkan, diantaranya *National Early Warning score (NEWS)* atau *Modified Obstetric Warning Scoring System (MEOWS)*. Berdasarkan skor yang didapat, akan ditentukan frekuensi pemantauan serta respon yang diperlukan (NEWS, 2017).

Parameter Fisiologis	3	2	1	0	1	2	3
Frekuensi Napas	<8		9-11	12-20		21-24	>25
Saturasi Oksigen	<91	92-93	94-95	>96			
Pemberian Oksigen Supplemental		Ya		Tidak			
Temperatur	<35.0		35.1-36.0	36.1-38.0	38.1-39.0	>39.1	
Tekanan Darah Sistolik	<90	91-100	101-110	111-219			>220
Frekuensi Jantung	<40		41-50	51-90	91-110	111-130	>131
Kesadaran				A			V P 1 1 atau U

**Gambar 2.1** National Early Warning Score (NEWS)

## **2. Hubungan Usia dengan Perdarahan Post Partum**

Usia merupakan kurun waktu sejak adanya seseorang yang dapat diukur dengan menggunakan satuan waktu yang dipandang dari segi kronologis, individual normal yang dapat memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan fisiologis sama (Firsty et al, 2021).

Seorang ibu yang akan mengandung, harus menimbang dengan baik usia mereka saat ini. Usia merupakan salah satu komponen yang penting dalam pertimbangan kesehatan ibu. Usia yang terlalu tua maupun terlalu muda akan menjadi resiko tinggi pada seorang ibu yaitu usia dibawah 20 tahun dan diatas usia 35 tahun. Penilaian terhadap usia ibu hamil akan membantu dalam hal antisipasi diagnosis masalah kesehatan dan juga langkah tindakan yang harus diambil dalam penanganan difasilitas kesehatan (Mardha et al, 2019).

Usia yang paling aman bagi seorang wanita untuk hamil dan melahirkan adalah usia antara 20 – 35 tahun, karena mereka berada dalam masa reproduksi sehat. Perdarahan banyak terjadi pada usia < 20 tahun disebabkan karena belum matangnya reproduksi dan usia > 35 tahun terjadi kemunduran alat-alat reproduksi (Manuaba, 2012).

Pertimbangan usia merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk seorang ibu hamil. Usia reproduksi yang ideal bagi wanita untuk hamil dan melahirkan berada di rentang usia 20-35 tahun. Seorang ibu dengan usia dibawah 20 tahun atau di atas 35 tahun dikatakan 12 kali lebih beresiko untuk mengalami perdarahan post partum daripada ibu dengan usia rentang 20 sampai 35 tahun. Ibu dengan usia 20 tahun memiliki fungsi reproduksi yang

belum berkembang sempurna sehingga belum terlalu siap untuk hamil dan melahirkan. Sedangkan pada ibu dengan usia diatas 35 tahun telah terjadi penurunan anatomis dan fisiologis yang progresif sehingga mempengaruhi kekuatan kontraksi endometrium saat persalinan maupun setelah persalinan yang dapat menjadi resiko terjadinya perdarahan post partum (Edah, 2019).

Pada usia dibawah 20 tahun Rahim dan panggul ibu belum berkembang dengan baik sedangkan pada usia diatas 35 tahun elastisitas otot-otot panggul dan sekitarnya serta alat-alat reproduksi pada umumnya telah alami kemunduran sehingga dapat mempersulit persalinan bahkan menyebabkan kematian pada ibu (Nur et al, 2019).

Perdarahan post partum yang menyebabkan kematian maternal pada ibu yang melahirkan pada usia dibawah 20 tahun 2 sampai 5 kali lebih tinggi daripada yang terjadi pada usia 30-35 tahun (Ummah, 2018).

### **3. Hubungan Paritas dengan Perdarahan Post Partum**

Paritas merupakan keadaan kelahiran anak baik mati maupun hidup tetapi bukan aborsi. Kelahiran kembar dihitung sebagai paritas satu kali. Paritas merupakan jumlah kehamilan yang dapat menghasilkan janin yang mampu hidup di luar kandungan/ usia kehamilan 28 minggu (Annisa et al, 2018).

Membahas tentang perdarahan post partum sebenarnya ada banyak sekali faktor penting yang dapat mempengaruhi salah satunya oleh paritas. Seperti yang diketahui, paritas adalah jumlah kehamilan yang mampu menghasilkan janin yang hidup di luar kandungan dengan usia kehamilan

minimal 28 minggu. Wanita dengan paritas yang tinggi akan menjadi resiko tinggi terjadinya kelemahan kontraksi uterus dalam menekan pembuluh darah atau yang disebut dengan atonia uteri sehingga dapat menyebabkan terjadinya perdarahan post partum jika tidak ditangani dengan baik. Kondisi ini kemudian akan memungkinkan ibu untuk dilakukan induksi persalinan dan operasi sesar dan dirujuk ke fasilitas kesehatan (Nur et al, 2019).

Ibu dengan primipara bisa menyebabkan perdarahan karena ketidaksiapan ibu dalam menghadapi persalinan yang pertama dan bisa juga disebabkan karena adanya laserasi jalan lahir. Penelitian Puspasari (2017) terdapat hubungan antara variabel paritas dengan variabel perdarahan post partum. Besarnya resiko relatif pendarahan post partum pada kelompok ibu dengan paritas >4 memiliki resiko 7 kali dibandingkan kelompok ibu dengan paritas 2 – 3 (Annisa et al, 2018).

Menurut *International Conference on Applied Science and Health* terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian perdarahan post partum. Berdasarkan penelitian yang ada menunjukkan bahwa seorang ibu dengan riwayat paritas lebih tinggi lebih besar kemungkinannya untuk mengalami perdarahan post partum, insidennya lebih besar karena rahim yang telah melahirkan banyak anak dalam setiap tahapan persalinan akan cenderung tidak efisien (Arief, 2021). Kehamilan dan persalinan yang berulang-ulang dapat menyebabkan kerusakan 52 pembuluh darah di dinding Rahim dan kemunduran elastisitas atau daya lentur jaringan karena sudah beberapa kali

diregangkan saat kehamilan sehingga akan cenderung timbul masalah-masalah pada kehamilan maupun persalinan (Ummah et al, 2018).

Seorang ibu dengan riwayat melahirkan lebih dari 3 kali lebih beresiko dalam mengalami perdarahan pasca-salin dibandingkan dengan ibu dengan riwayat melahirkan dibawah 3 kali. Hal ini dikarenakan pada seorang ibu yang telah beberapa kali melahirkan terjadi kemunduran fungsi reproduksi yang memberikan dampak resiko perdarahan post partum semakin besar. Paritas yang semakin bertambah akan semakin banyak jaringan ikat pada uterus sehingga kemampuan untuk berkontraksi akan semakin menurun sehingga penekanan pada pembuluh darah semakin sulit setelah plasenta terlepas. Disamping itu, terjadi kemundruan dan cacat pada endometrium sehingga terbentuk fibrosis pada bekas implantasi plasenta yang menyebabkan berkurangnya vaskularisasi (Edah, 2019).

#### **4. Perdarahan Post Partum dan Hubungannya dengan Usia dan Paritas dalam Perspektif Islam**

Allah SWT sebagai Tuhan alam semesta mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi. Ilmu Allah SWT itu luas tanpa batas, bahkan Dia dapat mengetahui apa yang ada dalam kandungan seorang wanita.

Allah SWT berfirman dalam QS Ar-Rad 13:8.

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ  
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.” (QS. Ar-Rad 13 : 8).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir Allah SWT memberitahukan tentang kesempurnaan ilmu-Nya yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya, dan Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Maksudnya, apakah janin itu laki-laki atau perempuan, celaka atau bahagia, baik atau jelek, panjang atau pendek usianya. Al-'Aufi meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Dan kandungan rahim yang kurang sempurna" Maksudnya adalah, keguguran, segala keadaan janin pada rahim seorang wanita maupun telah menjadi bayi nantinya Allah SWT mengetahui semua keadaan apa dan yang akan terjadi. Maka kurang atau lebih yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala, semua itu diketahui-Nya. Pada ayat "Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya" Ukuran disini adalah waktu atau ajal, jaminan rezki dan usia atas makhluk telah ditentukan (Muhammad, 2003).

Dari tafsir ayat tersebut, dapat kita ketahui bahwa ada kemungkinan keadaan bayi dalam kandungan itu beresiko atau sebagai peringatan bahwa tidak semua janin itu dalam keadaan sehat sehingga sudah seharusnya sebagai seorang calon ibu maupun seorang ibu untuk memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi resiko berbahaya. Misalnya dengan memperbaiki nutrisi untuk janin yang dikandungnya atau dengan menghindari faktor resiko lainnya yang masih dapat diatur misalnya seperti menghindari hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua maupun tidak memiliki terlalu banyak anak seperti faktor resiko pada penelitian ini.

Namun, apabila kehamilan beresiko tetap terjadi meski telah diusahakan, maka hal ini merupakan sebuah musibah dan sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk meyakini keberadaan musibah ini dan menerimanya dengan tawakkal kepada Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam QS At-Thagabun/64:11 sebagai berikut

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

“Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. “ (QS At-Thagabun/64:11).

Thabathaba’I dalam tafsir Al Misbah menjelaskan ayat 11 di atas dalam arti Allah SWT adalah *Rabb al-‘Alamin* yakni Tuhan Pengendali alam raya. Rububiyah atau pengendalian-Nya ini berarti bahwa hanya Dia sendiri yang menguasai segala sesuatu, tidak ada penguasa selain-Nya. Sistem yang berlaku di alam raya ini adalah kumpulan dari seluruh pengendalian-Nya terhadap makhluk-Nya. Dengan demikian tidak bergerak atau diam sesuatu kecuali atas izin-Nya.

Tidak ada satu aksi dari satu pihak, tidak juga satu reaksi kecuali melalui pengetahuan-Nya yang mendahului aksi dan reaksi itu serta atas dasar kehendak-Nya. Tidak keliru pengetahuan dan kehendak-Nya tidak juga tertolak ketetapan-Nya. Dia adalah Allah yang mengantar jiwa menemukan hakikat-hakikat di atas dan mengantar pula hati untuk tenang,


tidak resah dan goncang. Sayyid Quthub menulis bahwa sebagian dari ulama salaf memahami penggalan ayat ini tentang keimanan kepada takdir ilahi serta *taslim* (penerimaan hati) atas musibah yang terjadi (Shihab, 2017).

Dalam ayat ini, Allah SWT telah berfirman bahwa yang namanya musibah itu ada dan sebagai manusia tugas kita adalah mengimani hal tersebut misalnya kejadian perdarahan post partum pada seorang ibu yang sudah mengusahakan berbagai hal untuk menghindari faktor resiko terjadinya. Sebagai manusia tugasnya adalah tetap tawakkal dan tetap bersabar.






## B. Kerangka Teori




### C. Kerangka Konsep




Keterangan :

 : Variabel independen

 : Variabel yang tidak diteliti

 : Variabel dependen

 : Hubungan yang diteliti

 : Hubungan yang tidak diteliti

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif kemudian melakukan analisis data dengan prosedur analitik yang menghubungkan antara usia dan paritas dengan kejadian perdarahan post partum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar.

##### **3. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan berlangsung selama dua bulan yakni di bulan Desember 2022 dan Januari 2023.

#### **B. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain studi dengan pendekatan *case control*. Dalam desain *case control*, penelitian dilakukan dengan cara membandingkan antara kelompok kasus dan kelompok kontrol untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara faktor resiko (variabel yang diteliti) dengan efek (sampel), kemudian diperiksa apakah terdapat faktor resiko atau tidak.

### ***C. Variabel Penelitian***

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdapat variabel dependen dan variabel independen.

#### **1. Variabel Dependen**

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Perdarahan Post Partum.

#### **2. Variabel Independen**

Variabel independen pada penelitian ini adalah usia dan paritas.

### ***D. Populasi dan Sampel Penelitian***

#### **1. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan objek yang ada dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu melahirkan yang mengalami perdarahan post partum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar tanggal 01 Januari sampai 31 Desember Tahun 2021. Jumlah ibu hamil yang mengalami perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar tanggal 01 Januari sampai 31 Desember Tahun 2021 adalah 132 orang.

#### **2. Sampel**

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai subyek dalam penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol.

##### **1.) Kelompok kasus**

Sampel kelompok kasus dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang mengalami perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar tanggal 01 Januari sampai 31 Desember Tahun 2021

serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik pengambilan sampel kasus dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling*.

Kriteria inklusi :

1. Ibu bersalin yang terdiagnosa perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar tanggal 01 Januari sampai 31 Desember Tahun 2021
2. Informasi dalam rekam medis lengkap, jelas dan dapat dibaca (data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah nomor rekam medis, identitas dan status gravida)

Kriteria eksklusi :

1. Ibu yang memiliki riwayat anemia
2. Ibu bersalin yang makrosomia
3. Ibu dengan kehamilan gamelli
4. Ibu dengan polihidramnion

2.) Kelompok kontrol

Sampel untuk kelompok kontrol pada penelitian ini adalah ibu pasca bersalin yang tidak mengalami perdarahan post partum serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Dimana data sampel kontrol akan diambil dari data rekam medis di RSIA Ananda. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara perbandingan 1:1 dengan jumlah sampel yang terdapat pada kelompok kasus.

Kriteria inklusi :

1. Ibu bersalin yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar tanggal 01 Januari sampai 31 Desember Tahun 2021
2. Informasi dalam rekam medis jelas dan dapat dibaca (data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah nomor rekam medis, identitas dan status gravida)

Kriteria eksklusi :

1. Ibu yang memiliki riwayat anemia
2. Ibu bersalin yang makrosomia
3. Ibu dengan kehamilan gamelli
4. Ibu dengan polihidramnion

Cara penentuan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan rumus *Isaac* dan *Michael* :

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

$$s = \frac{3,841 \cdot 132 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{(0,5)^2(132 - 1) + 3,841 \cdot 0,5 \cdot 0,5}$$

$$s = \frac{126,753}{0,3275 + 0,96025}$$

$$s = \frac{126,753}{1,28775} = 98,42$$

$s = 98,42$  dibulatkan menjadi 98 sampel

Keterangan :

S = jumlah sampel

$\lambda^2$  = berdasarkan tabel *chi square* dengan satu derajat kebebasan (dk) dan taraf kesalahan = 5% didapatkan *chi square* kuadrat = 3,841 (dalam tabel chi kuadrat)

N = jumlah populasi

P = peluang benar (0,5)

Q = peluang salah (0,5)

D = perbedaan bias (0,5)

Berdasarkan hasil perhitungan ukuran sampel dengan menggunakan rumus *Isaac* dan *Michael* maka untuk sampel didapatkan 98 sampel kasus. Penelitian menggunakan perbandingan *case : control* (1:1) sehingga untuk sampel kontrol sebanyak 98 sampel. Maka total keseluruhan sampel pada penelitian ini adalah 196 sampel yang terdiri dari 98 sampel kasus dan 98 sampel kontrol.

#### ***E. Jenis dan Sumber Data Penelitian***

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder digunakan untuk mencari ibu hamil yang mengalami perdarahan post partum yang didapatkan dari data rekam medis di RSIA Ananda Makassar tanggal 01 Januari sampai 31 Desember Tahun 2021.

## ***F. Instrumen Penelitian***

### **1. Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian menjadi salah satu proses yang dilakukan untuk mendapatkan data dari setiap variabel yang akan diteliti, sehingga data tersebut dapat dianalisis. Kegiatan yang termasuk dapat berupa proses pengeditan data, transformasi data (*coding*) serta penyajian data sehingga akan diperoleh data yang lengkap dari masing-masing obyek untuk setiap variabel yang akan diteliti.

- a. Pengeditan Data (*Editing*) merupakan proses yang dilakukan untuk memeriksa atau mengoreksi data yang telah terkumpul. Tujuan dilakukan pengeditan yaitu untuk menghindari kemungkinan data yang sudah diinput tidak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengeditan data juga dilakukan untuk melengkapi data yang kurang serta memperbaiki kesalahan yang dilakukan saat pengambilan data. Kesalahan data yang dilakukan dapat diperbaiki dengan cara menghilangkan data yang tidak memenuhi kriteria dan syarat untuk dianalisis.

- b. *Coding* dan Transformasi Data

*Coding* (pengkodean) data merupakan proses yang dilakukan dengan cara memberikan kode tertentu pada tiap data yang akan diteliti. Kode yang digunakan dapat berupa simbol, huruf maupun angka yang diberikan untuk menunjukkan identitas data yang akan dianalisis.



### c. Tabulasi Data

Tabulasi data merupakan proses yang dilakukan untuk memasukkan data kedalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel, yang dimana isi tabel tersebut mencakup data yang akan dianalisis serta mampu menyajikan semua data yang akan dianalisis.

## 2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan aplikasi computer yaitu program SPSS (*Statistical Package for the Social Science*), dengan menggunakan analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi dari variabel yang diteliti yaitu usia dan paritas ibu. Kemudian dilakukan analisis bivariat dengan menggunakan uji *Person Chi square* untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kejadian perdarahan post partum dengan variabel yang diteliti yaitu usia dan paritas ibu.

## G. Penyajian Data

Data penelitian akan disajikan dalam bentuk tabel dan disertai penjelasan dalam bentuk narasi.

## H. Etika Penelitian

Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada bagian komite etik penelitian kesehatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda berstatus swasta, yang didirikan oleh PT. Ananda Idy Bahagia berdasarkan akta notaris oleh Notaris Dr. Hj. Sitti Zainab, SH., M.Kn dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan SK No. C-53.HT.03.01-TH.2007 Tentang Pengesahan Perndirian PT. Ananda Idy Bahagia.

Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda telah beroperasi sejak 28 oktober 1995 dengan niat dan updaya untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, dalam hal ini memberikan pelayanan asuhan kebidanan, asuhan keperawatan dan layanan kesehatan lainnya sebagaimana layaknya yaitu melaksanakan fungsi Rumah Sakit yang beroperasi 24 jam, selama 7 Hari dalam seminggu.

Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda berlokasi di poros jalan raya yang strategis dan mudah dijangkau, di Jl. Andi Djemma No. 58 Makassar. Lokasi Rumah Sakit berada dan dikelilingi oleh sarana penunjang, toko kebutuhan bayi dan anak, restoran dan rumah makan yang memenuhi syarat kesehatan.

Adapun visi dan misi dari rumah sakit ini adalah sebagai berikut.

1. Visi Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar

Menjadikan Rumah Sakit Ibu dan Anak terbaik di Kota Makassar dengan mengutamakan mutu dalam pelayanan pada masyarakat.

2. Misi Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar

- a. Melayani dengan senyum
- b. Simpatik dan hati yang tulus
- c. Mengutamakan keselamatan pasien (*patient safety*)
- d. Memberikan pelayanan yang bermutu dengan SDM Profesional

**B. Hasil Penelitian**

**1. Analisis Univariat**

Analisis univariat merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan persentase pada masing-masing variabel penelitian. Analisis univariat bertujuan untuk melihat gambaran distribusi dari variabel independen dan variabel independen. Pada penelitian ini, jumlah sampel yaitu 196 sampel yang terdiri dari 98 sampel pada kelompok kasus dan 98 sampel pada kelompok kontrol.

**Tabel 4.1** Distribusi Responden Berdasarkan Usia dan Paritas dengan pasien perdarahan Post Partum di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021

variabel	Frekuensi	
	N	%
<b>Usia (tahun)</b>		
a. Resiko Tinggi :		
Usia <20 atau >35	49	25,0
b. Resiko rendah :		
Usia 20 – 35	147	75,0

<b>Paritas</b>		
a. Resiko tinggi :		
1 atau $\geq 4$	112	57,1
b. Resiko rendah :		
2 – 3	84	42,9
<b>Diagnosa</b>		
a. Perdarahan Post Partum	98	50
b. APN	98	50
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>100</b>

(Sumber : Data Sekunder, 2021)

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan jumlah sampel yaitu 196 yang terdiri dari 98 sampel kasus dengan diagnosa perdarahan post partum dan 98 sampel kontrol dengan diagnosa APN persentase 50% . Ibu bersalin dengan usia  $<20$  tahun atau  $>35$  tahun memiliki distribusi 49 orang dengan persentase 25,0 % dengan rincian usia  $<20$  tahun sebanyak 3 orang dan usia  $>35$  tahun sebanyak 46 orang sedangkan usia 20 – 35 tahun memiliki distribusi 147 orang dengan persentase 75,0%. Adapun ibu bersalin dengan paritas  $<2$  atau  $\geq 4$  anak memiliki distribusi 112 orang dengan persentase 57,1 % dengan rincian 10 orang pada paritas  $\geq 4$  dan 102 orang pada paritas  $<2$  anak sedangkan paritas 2 sampai 3 anak memiliki distribusi 84 orang dengan persentase 42,9%.

## 2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan uji *chi-square* untuk mengetahui perbandingan faktor risiko dari setiap variabel independen terhadap sampel.

a. Risiko Kejadian Perdarahan Post Partum Berdasarkan Usia Ibu di RSIA

Ananda Makassar Tahun 2021

**Tabel 4.2** Risiko Kejadian Perdarahan Post Partum Berdasarkan Usia Ibu di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021

Usia (tahun)	Perdarahan Post Partum		Total	P Value	OR	95% CI
	Kasus %	Kontrol %				
<20 atau >35	47 (24.0%)	2 (1.0%)	49 (25.0%)	0.000	44.235	10.322- 189.576
20-35	51 (26.0%)	96 (50.0%)	147 (75.0%)			
Total	98 (50.0%)	98 (50.0%)	196 (100.0%)			

(Sumber : Data Sekunder, 2021)

Berdasarkan tabel 4.2. pada ibu yang memiliki usia <20 atau >35 tahun pada kelompok kasus perdarahan post partum memiliki distribusi 47 orang persentase 24,0% dengan rincian 3 orang pada usia <20 tahun dan 44 orang pada usia >35 tahun dan pada kelompok kontrol memiliki distribusi 2 orang dengan persentase 1,0% pada usia >35 tahun. Sedangkan pada ibu yang memiliki usia 20 sampai 35 tahun pada kelompok kasus perdarahan post partum memiliki distribusi 51 orang dengan persentase 26,0% dan pada kelompok kontrol memiliki distribusi 96 orang dengan persentase 49%. Adapun nilai *p-value* yang didapatkan menunjukkan terdapat hubungan usia dengan kejadian perdarahan post partum karena memiliki nilai yang signifikan yaitu 0,000 ( $p < 0,005$ ), usia signifikan terhadap perdarahan post partum Nilai OR menunjukkan usia <20 atau >35 tahun memiliki

resiko 44.235 kali lipat mengalami kejadian perdarahan post partum dibandingkan usia 20-35 dengan risiko minimum 10.322 kali lipat dan risiko maksimum 189.576 kali lipat.

b. Risiko Kejadian Perdarahan Post Partum Berdasarkan Paritas Ibu di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021

**Tabel 4.3** Risiko Kejadian Perdarahan Post Partum Berdasarkan Paritas Ibu di RSIA Ananda Tahun 2021

Paritas	Perdarahan Post Partum		Total	P Value	OR	95% CI
	Kasus %	Kontrol %				
<2 atau ≥4	71 (36.2%)	41 (20.9%)	112 (57.1%)	0.000	3.656	2.011- 6.647
2-3	27 (13.8%)	57 (29.1%)	84 (42.9%)			
Total	98 (50.0%)	98 (50.0%)	196 (100.0%)			

(Sumber : Data Sekunder, 2021)

Berdasarkan tabel 4.3. pada ibu yang memiliki paritas <2 atau ≥4 pada kelompok kasus perdarahan post partum memiliki distribusi 71 orang persentase 36,2% dengan rincian 61 orang pada paritas <2 anak dan 10 orang pada paritas ≥4 anak. Pada kelompok kontrol memiliki distribusi 41 orang dengan persentase 20,9% dengan paritas <2 anak. Sedangkan pada ibu yang memiliki paritas 2 sampai 3 pada kelompok kasus perdarahan post partum memiliki distribusi 27 orang dengan persentase 13,8 % dan pada kelompok kontrol memiliki distribusi 57 orang dengan persentase 29,1%. Adapun nilai *p-value* yang didapatkan

menunjukkan terdapat hubungan usia dengan kejadian perdarahan post partum karena memiliki nilai yang signifikan yaitu 0,000 ( $p < 0,005$ ), paritas signifikan terhadap perdarahan post partum Nilai OR menunjukkan paritas  $< 2$  atau  $\geq 4$  memiliki resiko 3.656 kali lipat mengalami kejadian perdarahan post partum dibandingkan paritas 2 sampai 3 dengan resiko minimum 2,011 kali lipat dan resiko maksimum 6,647 kali lipat.

### **C. Pembahasan**

Telah dilaksanakan penelitian mengenai hubungan usia dan paritas dengan perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar per tanggal tanggal 01 Januari sampai 31 Desember Tahun 2021. Selama dilaksanakannya penelitian diperoleh sebanyak 196 sampel dengan masing-masing 98 sampel kasus dan 98 sampel kontrol. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa terdapat hubungan antara usia dengan perdarahan post partum dan paritas dengan perdarahan post partum.

#### **1. Hubungan Usia dengan Perdarahan Post Partum**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara usia ibu dengan kejadian perdarahan post partum. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, hasil penelitian ini sesuai dengan teori dimana faktor paritas menjadi salah satu faktor terjadinya perdarahan post partum. Seseorang dikatakan hamil pada usia yang optimal jika kehamilannya tidak pada usia yang terlalu muda ataupun terlalu tua yakni usia tidak dibawah 20 tahun dan juga tidak diatas 35

tahun agar tidak memberikan dampak berbagai macam komplikasi yang dapat timbul.

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Amirah (2021) yang menunjukkan bahwa usia ibu memiliki hubungan dengan terjadinya kejadian perdarahan post partum dengan nilai OR memiliki resiko 2,879 kali lipat lebih besar untuk mengalami perdarahan post partum. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Wulandari (2021) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan usia ibu dengan perdarahan post partum dimana usia <20 atau >35 tahun memiliki resiko 3,1 kali lebih besar dari pada ibu yang berusia 20 sampai 35 tahun. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riona Sanjaya (2021). Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara perhitungan statistik tidak ada hubungan antara usia dengan kejadian perdarahan post partum dengan ( $p = 0,371$ ).

Usia merupakan salah satu komponen yang penting dalam pertimbangan kesehatan ibu. Usia yang terlalu tua maupun terlalu muda akan menjadi resiko tinggi pada seorang ibu yaitu usia dibawah 20 tahun dan diatas usia 35 tahun. Penilaian terhadap usia ibu hamil akan membantu dalam hal antisipasi diagnosis masalah kesehatan dan juga langkah tindakan yang harus diambil dalam penanganan difasilitas kesehatan (Mardha et al, 2019). Wanita hamil di bawah usia 20 tahun lebih berisiko mengalami kesulitan melahirkan karena rahim dan panggulnya belum siap untuk bereproduksi.



Jika seorang wanita hamil di atas usia 35 tahun, ia dapat mengalami perdarahan. (Yang Y, 2021).

Seorang ibu dengan usia dibawah 20 tahun atau di atas 35 tahun dikatakan 12 kali lebih beresiko untuk mengalami perdarahan post partum daripada ibu dengan usia rentang 20 sampai 35 tahun. Ibu dengan usia 20 tahun memiliki fungsi reproduksi yang belum berkembang sempurna sehingga belum terlalu siap untuk hamil dan melahirkan. Pada ibu dengan usia diatas 35 tahun telah terjadi penurunan anatomis dan fisiologis yang progresif sehingga mempengaruhi kekuatan kontraksi endometrium saat persalinan maupun setelah persalinan yang dapat menjadi resiko terjadinya perdarahan post partum (Edah, 2019).

Pada usia dibawah 20 tahun Rahim dan panggul ibu belum berkembang dengan baik sedangkan pada usia diatas 35 tahun elastisitas otot-otot panggul dan sekitarnya serta alat-alat reproduksi pada umumnya telah alami kemunduran sehingga dapat mempersulit persalinan bahkan menyebabkan kematian pada ibu. (Nur et al, 2019).

## 2. Hubungan Paritas dengan Perdarahan Post Partum

Paritas dalam penelitian ini merupakan jumlah persalinan yang telah dialami oleh ibu. Hasil penelitian mengenai hubungan paritas dengan perdarahan post partum menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara paritas ibu dengan kejadian perdarahan post partum.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, hasil penelitian ini sesuai dengan teori dimana faktor paritas menjadi salah satu faktor terjadinya perdarahan post partum. Paritas yang optimal bagi seorang ibu adalah 2 sampai 3 agar tidak memberikan dampak berbagai macam dampak komplikasi yang dapat timbul. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Wulandari (2021) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan antara paritas ibu dengan kejadian perdarahan post partum dimana paritas  $< 1$  atau paritas  $> 3$  memiliki resiko 6.1 kali lebih besar dibandingkan dengan paritas 2-3 mengalami perdarahan post partum. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Amirah (2021) yang menunjukkan terdapat hubungan antara paritas ibu dengan kejadian perdarahan post partum dengan nilai ( $p = 0,005$ ). Sedangkan penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Yanti (2022). Pada penelitian ini didapatkan nilai ( $p \text{ value} = 0,79$ ) dimana  $p > 0,005$  yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara paritas ibu bersalin dengan terjadinya perdarahan post partum.

Paritas adalah jumlah kehamilan yang mampu menghasilkan janin yang hidup di luar kandungan dengan usia kehamilan minimal 28 minggu. Wanita dengan paritas yang tinggi akan menjadi resiko tinggi terjadinya kelemahan kontraksi uterus dalam menekan pembuluh darah atau yang disebut dengan atonia uteri sehingga dapat menyebabkan terjadinya perdarahan post partum jika tidak ditangani dengan baik (Nur et al, 2019).

Paritas yang rendah (paritas satu) bisa menyebabkan perdarahan karena ketidaksiapan ibu dalam menghadapi persalinan yang pertama dan bisa juga disebabkan karena adanya laserasi jalan lahir. Penelitian Puspasari (2017) terdapat hubungan antara variabel paritas dengan variabel perdarahan post partum. Besarnya resiko relatif pendarahan post partum pada kelompok ibu dengan paritas  $>4$  memiliki resiko 7 kali dibandingkan kelompok ibu dengan paritas 2 - 4 (Annisa et al, 2018).

Menurut *International Conference on Applied Science and Health* terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian perdarahan post partum. Berdasarkan penelitian yang ada menunjukkan bahwa seorang ibu dengan riwayat paritas lebih tinggi lebih besar kemungkinannya untuk mengalami perdarahan post partum, insidennya lebih besar karena rahim yang telah melahirkan banyak anak dalam setiap tahapan persalinan akan cenderung tidak efisien (Arief, 2021). Kehamilan dan persalinan yang berulang-ulang dapat menyebabkan kerusakan 52 pembuluh darah di dinding Rahim dan kemunduran elastisitas atau daya lentur jaringan karena sudah beberapa kali diregangkan saat kehamilan sehingga akan cenderung timbul masalah-masalah pada kehamilan maupun persaliinan (Ummah et al, 2018).

Wanita dengan paritas tinggi beresiko mengalami atonia uteri, yang apabila tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan perdarahan post partum (Yang Y, 2021) Pada kehamilan ibu yang berulang kali (grande multipara), uterus akan berulang kali pula teregang sehingga keadaan uterus cenderung bekerja tidak efisien dalam semua kala, dalam arti mengalami

penurunan dalam kemampuan berkontraksi untuk melakukan penekanan pada pembuluh-pembuluh darah yang terbuka setelah terlepasnya plasenta sehingga hal ini akan menurunkan kemampuan berkontraksi dari uterus segera setelah plasenta lahir dan mengakibatkan terjadinya perdarahan post partum. Hal ini disebabkan karena pada setiap kehamilan akan terjadi perubahan serabut otot menjadi jaringan ikat pada uterus. Lebih tinggi paritas maka lebih tinggi pula angka kematian maternal karena kasus perdarahan meningkat dengan bertambahnya jumlah paritas (Theresia, 2020). Multiparitas juga dapat meningkatkan risiko masalah kehamilan, persalinan, dan nifas serta memiliki peningkatan risiko kematian ibu hingga 8 kali lipat (Hanifa W, 2009).

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang telah dilakukan ini telah diusahakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah dan tidak melanggar etik penelitian yang telah ditetapkan. Akan tetapi, tentu masih memiliki beberapa sebagai berikut :

1. Dalam penelitian dengan menggunakan data sekunder ini, diperoleh beberapa catatan medik yang tidak lengkap dalam berkas sehingga dikategorikan sebagai *missing case* dan tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian.
2. Penulisan data yang ditulis tangan yang memberi kemungkinan adanya kesalahan data yang tertulis, sehingga validitas penelitian sangat bergantung pada validitas pada rekam medik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yaitu Hubungan Usia dan Paritas dengan Perdarahan Post Partum di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021, maka diperoleh kesimpulan antara lain :

1. Jumlah ibu dengan usia yang optimal adalah 144 orang (73,5 %) sedangkan jumlah ibu dengan usia yang tidak optimal adalah 52 orang (26,5 %). Adapun Jumlah ibu dengan paritas yang optimal adalah 84 orang (42,9 %) sedangkan jumlah ibu dengan paritas yang tidak optimal adalah 112 orang ( 57,1 % ).
2. Angka kejadian perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021 adalah sebanyak 132 kasus yang terdiri atas ruptur perineum derajat II, derajat III dan derajat IV, atonia uteri dan retensio plasenta.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu dengan kejadian perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara paritas ibu dengan kejadian perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

## **B. Saran**

### a. Bagi Masyarakat

Memperhatikan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap terjadinya kejadian perdarahan post partum sehingga dapat melakukan pencegahan.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar dalam penelitian selanjutnya. Mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel yang belum terdapat pada penelitian ini dengan sampel dan metode serta lokasi penelitian yang berbeda.

### c. Bagi Rumah Sakit

Membuat program-program yang dapat memberikan edukasi mengenai bahaya perdarahan persalinan dan cara pencegahannya serta melakukan pencatatan data rekam medik secara lengkap.



## DAFTAR PUSTAKA


- Annisa, UI., Senilaila., Reka LM. (2018). Faktor Resiko Hemorrhage Pasca Post Partum. *Jurnal Media Kesehatan*. 11(1). Hal: 012-101.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. (2017). *Profil Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2016*. Dinkes Kabupaten Gowa. [http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL\\_KAB\\_KOTA\\_2016/7306\\_Sulsel\\_Kab\\_GOWA\\_2016.pdf](http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2016/7306_Sulsel_Kab_GOWA_2016.pdf).
- Dinas Kesehatan Kota Makassar .(2016). *Profil Kesehatan Kota Makassar Tahun 2015*. Makassar : Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Edah, E. (2019). Faktor Predisposisi Terjadinya Perdarahan Post partum di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Tahun 2018. *Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Firsty, JN., Oksfriani, JS., Budi, TR. (2021). *Journal of Public Health and Community Medicine*. 2(1).
- Himpunan Kedokteran Feto Maternal. (2016). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Perdarahan Pasca Salin tahun 2016. POGI.
- Kemendes RI. (2020). Profil kesehatan indonesia tahun 2019. Kemendes RI.
- Khusnul, A., Suriani, B., Ros, R. (2021). Faktor Resiko Kehamilan Pada Kejadian Perdarahan Post Partum di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*. XVI (I).
- Leveno K. (2016). *Komplikasi Kehamilan*. Jakarta. EGC.
- Manuaba IAC, Manuaba IBG, Manuaba IBGF, Manuaba IBG. (2014). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC.
- Muhammad, DR Abdullah Bin. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Penebar Sunnah.
- Nur, AF., Rahman, A., Kurniawan, H. (2019). Faktor resiko kejadian perdarahan post partum di rumah sakit umum Anutapura Palu. *Jurnal Kesehatan Tadulako*. 5(1): 26-31.
- Nurul, Ummah., Ngadiyono., Elisa, Ulfiana. (2018). *Jurnal kebidanan Faktor Resiko penyebab perdarahan post partum di puskesmas pamotan kabupaten Rembang*.

- Oxorn, H., William R.F. (2010). Ilmu Kebidanan Patologi dan Fisiologi Persalinan, Human Labor and Birth. Jakarta: Yayasan Essentia Medica.
- Riona, Sanjaya., Yetty, DF. (2021). Usia, Paritas, Anemia dengan Kejadian Perdarahan Post Partum. *Jurnal Ilmiah STIKES Citra Delima Bangka Belitung*. 5(1). Hal 33-37.
- Sadikin, BG., (2021). Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <http://www.kemkes.go.id>.
- Saifuddin, A. B. (2014). Ilmu Kebidanan. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Shakur, H., Beaumont, D., Pavord, S., Gayet-Ageron A., Ker K., Mousa, HA. (2018). *Antifibrinolytic drugs for treating primary post partum haemorrhage*. *Cochrane Database Syst Rev*. 20(2). CD012964.
- Shihab, M.Q. (2017). *Tafsir Al Misbah Jilid 11*. Jakarta : Lentera Hati.
- Simanjuntak, L. (2020). Perdarahan Post partum (Perdarahan Paskasalin). *Jurnal Visi Eksakta (JVIEKS)*. 1(1). Hal 1-10.
- Siti, M., Inta, PI. (2018). Hubungan Riwayat Anemia dan Jarak Kelahiran dengan Kejadian Perdarahan Post partum di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek. *Midwifery Journal*. 3(1). Hal 21-25.
- Siti, MM. Insiden dan Faktor Resiko Perdarahan Post partum Pada Persalinan Pervaginam : Studi Literatur. (2019). *Jurnal JFKT : Universitas Muhammadiyah Tangerang*. 4(2). Hal 28-35.
- Suryati, Regen., Tuty, Y. (2021). Efektivitas Penggunaan Misoprostol dan Oksitosin Pada Penanganan Perdarahan Post Partum di BPM Suryati Bekasi Tahun 2021. 4(4). Hak 840-852.
- Theresia. 2020. Hubungan Paritas, Umur Ibu dengan Perdarahan Post Partum Primer di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta
- Ummah, N., Ulfiana, E. (2018). Faktor Resiko Penyebab Perdarahan Post Partum. 7(15).
- WHO. (2015). *Maternal Moortality*. WHO. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/maternal-mortality>.
- Wiknjosastro, Hanifa. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka. Sarwono Prawirohardjo; 2009.



Yang, Y., He, J., & Deng, N. (2021). Factors Associated with Primary Post Partum Hemorrhage in Elderly Women Undergoing Repeated Cesarean Deliveries. *International Journal of Women's Health*, Volume 13, 1261–1267.

Yusril, IM., Najamuddin, AP., Azizah, N. (2020). Hubungan Tingkat Kepatuhan ANC Dengan Onset ANC dengan Onset Perdarahan Post partum di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018. *Alami Journal*. 4(2). Hal 10-17.



Lampiran 1 Hasil SPSS

**Statistics**

		Usia	Paritas	Usia	Paritas
N	Valid	196	196	196	196
	Missing	0	0	0	0
Mean		31.3163	1.6378	1.7500	1.4286
Median		31.0000	1.0000	2.0000	1.0000
Std. Deviation		4.53951	.93721	.43412	.49614
Minimum		18.00	.00	1.00	1.00
Maximum		41.00	4.00	2.00	2.00

**Usia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<20 atau >35 Tahun	49	25.0	25.0	25.0
	20-35 Tahun	147	75.0	75.0	100.0
	Total	196	100.0	100.0	

**Paritas**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<2 atau ≥4 Anak	112	57.1	57.1	57.1
	2-3 Anak	84	42.9	42.9	100.0
	Total	196	100.0	100.0	

**Crosstab**

		Perdarahan Post Partum			
		Kasus	Kontrol	Total	
Usia	<20 atau >35 Tahun	Count	47	2	49
		Expected Count	24.5	24.5	49.0
		% within Usia	95.9%	4.1%	100.0%
		% within Perdarahan Post Partum	48.0%	2.0%	25.0%
		% of Total	24.0%	1.0%	25.0%
20-35 Tahun	20-35 Tahun	Count	51	96	147
		Expected Count	73.5	73.5	147.0
		% within Usia	34.7%	65.3%	100.0%
		% within Perdarahan Post Partum	52.0%	98.0%	75.0%
		% of Total	26.0%	49.0%	75.0%
Total	Count	98	98	196	

Expected Count	98.0	98.0	196.0
% within Usia	50.0%	50.0%	100.0%
% within Perdarahan Post Partum	100.0%	100.0%	100.0%
% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	55.102 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	52.680	1	.000		
Likelihood Ratio	65.216	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	54.821	1	.000		
N of Valid Cases	196				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.50.

b. Computed only for a 2x2 table

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Usia (<20 atau >35 Tahun / 20-35 Tahun)	44.235	10.322	189.576
For cohort Perdarahan Post Partum = Kasus	2.765	2.198	3.477
For cohort Perdarahan Post Partum = Kontrol	.063	.016	.244
N of Valid Cases	196		

### Crosstab

Paritas	<2 atau ≥4 Anak	Perdarahan Post Partum		Total
		Kasus	Kontrol	
	Count	71	41	112
	Expected Count	56.0	56.0	112.0
	% within Paritas	63.4%	36.6%	100.0%
	% within Perdarahan Post Partum	72.4%	41.8%	57.1%
	% of Total	36.2%	20.9%	57.1%

2-3 Anak	Count	27	57	84
	Expected Count	42.0	42.0	84.0
	% within Paritas	32.1%	67.9%	100.0%
	% within Perdarahan Post Partum	27.6%	58.2%	42.9%
	% of Total	13.8%	29.1%	42.9%
Total	Count	98	98	196
	Expected Count	98.0	98.0	196.0
	% within Paritas	50.0%	50.0%	100.0%
	% within Perdarahan Post Partum	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	18.750 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	17.521	1	.000		
Likelihood Ratio	19.089	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	18.654	1	.000		
N of Valid Cases	196				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 42.00.

b. Computed only for a 2x2 table

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Paritas (<2 atau ≥4 Anak / 2-3 Anak)	3.656	2.011	6.647
For cohort Perdarahan Post Partum = Kasus	1.972	1.402	2.774
For cohort Perdarahan Post Partum = Kontrol	.539	.406	.717
N of Valid Cases	196		

## Lampiran 2 Etik Penelitian

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
*HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE*  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
*UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR*

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION*  
**"ETHICAL EXEMPTION"**

No: B.361/KEPK/FKIK/XII/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Puspita Ramadani  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Gambaran Faktor Risiko Infeksi Nosokomial pada Perawat di Ruang Rawat Inap  
RSUD Labuang Baji 2022"**

*"Description of the Risk Factors for Nosocomial Infection in Nurses in Inpatient Rooms at Labuang Baji  
Hospital in 2022"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023.

*This declaration of ethics applies during the period December 27th, 2022 until December 27th, 2023.*

*December 27th, 2022*  
*Professor and Chairperson,*

  
DR. Dr. Syatirah, Sp. A., M.Kes

Lampiran 3 Izin Penelitian

 <b>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website : <a href="http://simap-new.sulselprov.go.id">http://simap-new.sulselprov.go.id</a> Email : <a href="mailto:ptsp@sulselprov.go.id">ptsp@sulselprov.go.id</a> Makassar 90231		
Nomor	: 13691/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Direktur RSIA Ananda Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	
di- Tempat		
Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1768/UN.06/LP2M/PP.00.1 tanggal 10 Januari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:		
N a m a	: NURUL HAZANAH HAMZAH	
Nomor Pokok	: 70600119033	
Program Studi	: Pendidikan Dokter	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa	
<b>PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>		
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :		
<b>" HUBUNGAN USIA DAN PARITAS DENGAN PERDARAHAN POSTPARTUM DI RSIA ANANDA MAKASSAR TAHUN 2021 "</b>		
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. <b>17 Januari s/d 17 Februari 2023</b>		
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami <b>menyetujui</b> kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.		
Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 17 Januari 2023		
<b>A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN</b> <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU</b> <b>SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>		
 <b>Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.</b> Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA Nip : 19630424 198903 1 010		
Tembusan Yth	1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar; 2. <i>Pertinggal.</i>	

*Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Meneliti*



**Rumah Sakit Ibu dan Anak ANANDA**

Jl. Andi Djemma No. 57, Makassar – Indonesia

Telp. +62411 – 874596, Fax : +62411 – 853694

Email : [sekretariat@anandahospital.com](mailto:sekretariat@anandahospital.com) | Website : [www.anandahospital.com](http://www.anandahospital.com)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 040/RSIA-A/II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qalbia Muhammad Nur, SKM., MARS

Jabatan : Sekretaris Direktur

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hazanah Hamzah

Asal Institusi : UIN Alauddin

Judul : ***“Hubungan Usia dan Paritas dengan Perdarahan  
Postpartum di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021”***

Adalah benar telah melakukan penelitian di RSIA ANANDA Makassar pada tanggal 17 Januari  
- 7 Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 08 Februari 2023

**Sekretaris Direktur**

**Qalbia Muhammad Nur, SKM., MARS**

*Lampiran 5 Dokumentasi*





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Penulis

1. Nama : Nurul Hazanah Hamzah
2. NIM : 70600119033
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Makassar, 14 Oktober 2000
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat : Perumahan Saumata Indah Blok B/12
8. Orang Tua
  - a. Ayah : Hamzah Upu
  - b. Ibu : Eni Suwati

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Paccinongang Unggulan
2. SMP : MTsN Model Makassar
3. SMA : SMAN 5 Gowa
4. Tahun 2019 melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Pendidikan Dokter