

**EVALUASI POLIFARMASI PADA PASIEN GERIATRI
DIABETES MELITUS TIPE 2 DI INSTALASI RAWAT INAP
RSUD LABUANG BAJI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

WINDA AMALIA

70100117011

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Amalia
NIM : 70100117011
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 02 Juli 1999
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Kompleks Perumahan Secaba Rindam XIV/HSN
Mawang
Judul : “Evaluasi Polifarmasi Pada Pasien Geriatri Diabetes
Melitus Tipe 2 Di Instalasi Rawat Inap RSUD
Labuang Baji”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa dia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Gowa, 24 Januari 2023

Penulis



Winda Amalia
NIM. 70100117011

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Evaluasi Polifarmasi Pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji"** yang disusun oleh **Winda Amalia, NIM. 70100117011**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari/ tanggal Selasa, 24 Januari 2023 M yang bertepatan dengan 02 Rajab 1443 H dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 24 Januari 2023 M

02 Rajab 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A, M.Kes.
Sekretaris : Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si.
Pembimbing I : apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si.
Pembimbing II : apt. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc.
Penguji I : apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin
Penguji II : Hildawati Almah, S.Ag., S.S., M.A.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Syatirah, Sp.A, M.Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat serta nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini yang berjudul **“Evaluasi Polifarmasi Pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji”** merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi di jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Salam dan shalawat senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus sebagai Rahmatan lil’alamin dan menyebarkan dakwah Islam sehingga sampai saat ini kita dapat merasakan nikmat Islam. Salam serta shalawat juga tercurahkan kepada keluarga dan para sahabat beliau.

Dalam perjalanan menyelesaikan studi selama ini penulis tidak memungkiri adanya dukungan-dukungan dari banyak pihak. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Muh. Amin dan Ibu Mantasiah yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, fasilitas, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada keluarga besar tercinta atas segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis. Melalui kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta para Wakil Rektor.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Ibu Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. H. M. Faris Satrianegara S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
7. Ibu apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis mulai dari penyusunan proposal, penelitian hingga skripsi.
8. Bapak apt. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis mulai dari penyusunan proposal, penelitian hingga skripsi.
9. Ibu apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin., selaku penguji kompetensi yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Ibu Hildawati Almah, S.Ag., S.S., M.A. selaku penguji agama yang telah memberikan saran dan masukan dalam bidang ilmu Agama Islam di skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis, serta seluruh staf akademik yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

12. Teman-teman KOVALEN Farmasi Angkatan 2017 yang tak henti-hentinya memberi semangat serta senantiasa saling mendukung dan merangkul dalam tahapan penyusunan skripsi
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun besar harapan kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi bidang keilmuan Farmasi dan masyarakat, serta bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, 24 Januari 2023

Penulis




Winda Amalia
NIM. 70100117011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka.....	3
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Polifarmasi	6
B. Geriatri.....	11
C. Diabetes Melitus Tipe 2	14
D. Tinjauan Islami	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian dan Waktu.....	28
D. Populasi dan Sampel	29
E. Penentuan Besar Sampel.....	29
F. Teknik Pengambilan Sampel.....	30
G. Variabel Penelitian.....	30

H.	Instrumen Penelitian	31
I.	Analisis Data Penelitian	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..		33
A.	Hasil Penelitian	34
B.	Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP.....		68
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN.....		77
RIWAYAT HIDUP PENULIS		102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategorisasi ADA untuk status glukosa	18
Tabel 2. Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Jenis Kelamin di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021.....	34
Tabel 3. Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Usia di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021.....	34
Tabel 4. Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Lama Rawat Inap di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021.....	35
Tabel 5. Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Jenis Penyakit Penyerta di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021.....	35
Tabel 6. Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Jumlah Penyakit Penyerta di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021.....	36
Tabel 7. Jumlah Jenis Obat Pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021.....	37
Tabel 8. Pengobatan yang Berpotensi Mengalami PIM (<i>Potentially Inapropriate Medication</i>) pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021.....	37
Tabel 9. Klasifikasi PIM (<i>Potentially Inapropriate Medication</i>) Berdasarkan Alat Evaluasi <i>Beers Criteria 2019</i> pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021.....	38

Tabel 10. Daftar Obat yang Berpotensi Tidak Tepat Berdasarkan Alat Evaluasi <i>Beers Criteria 2019</i> pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021.....	39
Tabel 11. Rekomendasi, Kualitas Bukti dan Kekuatan Rekomendasi Berdasarkan Alat Evaluasi <i>Beers Criteria 2019</i> pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari- Desember 2021.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Penelitian	77
Lampiran 2. Beers Criteria 2019	78
Lampiran 3. Kode Etik Penelitian	86
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	87
Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian	88
Lampiran 6. Karakteristik Pasien	89
Lampiran 7. Analisis Univariat	89
Lampiran 8. Data Pasien DM Tipe 2 di RSUD Labuang Baji	93



ABSTRAK

Nama : Winda Amalia
NIM : 70100117011
Jurusan : Farmasi
Judul Penelitian : Evaluasi Polifarmasi Pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji

Lansia cenderung memiliki komorbid atau penyakit kronis akibat adanya efek gabungan dari gaya hidup, genetik, maupun penuaan sehingga lansia lebih rentan mengalami polifarmasi. Polifarmasi didefinisikan sebagai penggunaan lima obat atau lebih. Polifarmasi pada lansia telah dikaitkan dengan banyak hasil kesehatan yang merugikan. Konsekuensi utama dari polifarmasi adalah penggunaan obat yang tidak tepat atau PIM (*Potentially Inappropriate Medications*). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi polifarmasi pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 terkait penggunaan obat yang tidak tepat pada lansia. Penelitian ini merupakan penelitian observasional menggunakan desain penelitian deskriptif yang dilakukan secara retrospektif dengan menggunakan instrumen rekam medis dan *Beers Criteria 2019* sebagai alat evaluasi polifarmasi dengan jumlah sampel sebanyak 55 pasien. Hasil penelitian menunjukkan kejadian PIM pada 49 pasien terkait polifarmasi menggunakan tools *Beers Criteria 2019* dengan PIM kategori 1 yakni penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat pada lansia sebanyak (62,3%), PIM kategori 2 yakni penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat pada lansia karena interaksi obat-penyakit (6,1%), PIM kategori 3 yakni obat yang harus digunakan dengan hati-hati pada lansia (28,9%), PIM kategori 4 yakni interaksi obat-obat yang harus dihindari pada lansia (0,9%) dan PIM kategori 5 yakni obat-obatan yang harus dihindari atau dosisnya dikurangi dengan tingkat fungsi ginjal yang bervariasi pada lansia (1,8%).

Kata kunci: Polifarmasi, *Beers Criteria 2019*, PIM, Geriatri, Diabetes Melitus Tipe 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Name : Winda Amalia
Student Registration Number : 70100117011
Departement : Pharmacy
Research Title : Evaluation of Polypharmacy in Geriatric Patients with Type 2 Diabetes Mellitus at the Inpatient Instalation of RSUD Labuang Baji

The elderly tend to have comorbidities or chronic diseases due to the combined effects of lifestyle, genetics, and aging so that the elderly are more susceptible to polypharmacy. Polypharmacy was defined as the use of five or more drugs. Polypharmacy in the elderly has been associated with many adverse health outcomes. The main consequence of polypharmacy is the use of inappropriate drugs or PIM (Potentially Inappropriate Medications). This study aims to evaluate polypharmacy in geriatric patients with type 2 diabetes mellitus related to inappropriate drug use in the elderly. This study is an observational study using a descriptive research design that was carried out retrospectively using medical record instruments and the 2019 Beers Criteria as a polypharmacy evaluation tool with a sample of 55 patients. The results showed the incidence of PIM in 49 patients related to polypharmacy using the Beers Criteria 2019 tools with PIM category 1, namely the use of potentially inappropriate drugs in the elderly (62,3%), PIM category 2, namely the use of potentially inappropriate drugs in the elderly due to interactions medicine-disease (6,1%), PIM category 3 is drugs that should be used with caution in the elderly (28,9%), PIM category 4 is drug-drug interactions that should be avoided in the elderly (0,9%) and PIM category 5, namely drugs that should be avoided or the dose reduced with varying levels of kidney function in the elderly (1,8%).

Keywords: Polypharmacy, Beers Criteria 2019, PIM, Geriatrics, Type 2 Diabetes Mellitus

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini populasi penduduk dunia berada pada jumlah penduduk berusia lebih dari 60 tahun mencapai 727 juta orang pada tahun 2020 yang disebut dengan *era ageing population* yang sudah menjadi fenomena global dimana hampir setiap negara di dunia mengalami penambahan penduduk lansia. Di Indonesia sendiri struktur penduduk Indonesia berada pada *ageing population*, yang ditandai dengan persentase penduduk lansia tahun 2020, dimana jumlah penduduk Indonesia yang termasuk kategori 60 tahun ke atas diperkirakan sebanyak 28 juta jiwa atau sebesar 10,7% dari total penduduk (BPS, 2021).

Seiring peningkatan populasi lansia di Indonesia diperkirakan jumlah penderita diabetes melitus akan terus mengalami peningkatan. Data terbaru *International Federation Diabetes* 2019 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan jumlah penderita diabetes melitus sebanyak 29,1 juta jiwa dan diperkirakan akan meningkat menjadi 32,8 juta penderita pada tahun 2030 dan diabetes melitus tipe 2 adalah jenis diabetes yang paling umum yang terhitung 90% dari semua kasus diabetes, dimana diabetes melitus tipe 2 paling sering didiagnosis pada lansia (IDF, 2019).

Lebih dari 80% lansia dengan diabetes melitus tipe 2 cenderung memiliki komorbid atau penyakit kronis lainnya karena adanya efek gabungan dari gaya hidup, genetik, maupun penuaan sehingga lansia lebih rentan mengalami polifarmasi dan konsekuensi yang merugikan. Oleh karena itu lansia mungkin tidak hanya terkena konsekuensi negatif dari polifarmasi, tetapi kehadiran polifarmasi juga dapat menyebabkan kontrol glikemik yang kurang optimal dan

pada akhirnya akan meningkatkan risiko komplikasi diabetes jangka panjang (Remelli et al., 2022).

Polifarmasi sendiri diartikan sebagai penggunaan beberapa obat secara bersamaan. Polifarmasi didefinisikan sebagai penggunaan lima obat atau lebih. Dalam hal ini termasuk obat bebas, obat resep dan / atau obat tradisional maupun komplementer (WHO, 2019).

Polifarmasi dan beberapa komorbid pada lansia mengakibatkan lansia lebih berisiko untuk diresepkan obat yang berpotensi tidak tepat (PIM). PIM digambarkan sebagai obat yang penggunaannya pada lansia harus dihindari karena risiko merugikan yang lebih tinggi dibandingkan manfaat kesehatan terutama bila ada alternatif yang sama atau lebih aman tersedia (Fauziah et al., 2018).

Obat yang berpotensi tidak tepat pada populasi lansia dikaitkan dengan efek samping, interaksi obat, reaksi obat yang merugikan, rawat inap yang berkepanjangan, ketidakpatuhan, maupun kontribusi terhadap sindrom geriatri dan peningkatan beban ekonomi. Dengan demikian farmakoterapi memerlukan evaluasi pada pasien lansia dengan penyakit diabetes melitus tipe 2 terutama selama rawat inap untuk mengurangi penggunaan PIM dan kejadian toksisitas obat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana evaluasi polifarmasi pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji menggunakan *Beers Criteria 2019*?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Evaluasi Polifarmasi adalah kegiatan penilaian penggunaan secara rutin lima obat atau lebih menggunakan *Beers Criteria 2019*.
- b. Pasien geriatri adalah pasien lansia dengan usia 60 (enam puluh) tahun ke atas dengan multi penyakit dan/atau mengalami gangguan yang disebabkan menurunnya fungsi organ, mengalami masalah psikologi, maupun sosial ekonomi.
- c. Diabetes melitus tipe 2 adalah diabetes yang terjadi akibat penurunan sekresi insulin yang rendah oleh kelenjar pankreas.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian observasi yang dilakukan dengan pengambilan data secara retrospektif. Penelitian ini hanya mencakup identifikasi penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat (PIMs) terkait polifarmasi pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji menggunakan *Beers Criteria 2019*.

D. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hosseini et al., 2018) dengan judul "*Polypharmacy Among the Elderly*" dengan metode studi potong lintang deskriptif dimana data tentang obat dikumpulkan melalui wawancara dan observasi resep dan obat yang dikonsumsi pasien lalu data dianalisis dengan SPSS. Dari penelitian didapatkan 1616 orang termasuk 883 pria (54,6%) dan 733 wanita (45,3%) dimana prevalensi polifarmasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah 23,1 %. Penelitian yang saya lakukan adalah bagaimana evaluasi polifarmasi pada pasien geriatri

diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji menggunakan *Beers Criteria 2019*.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Unlu et al., 2020) dengan judul “*Polypharmacy in Older Adults Hospitalized for Heart Failure*” dengan mengumpulkan dan memeriksa data 558 orang lansia berusia 65 tahun dengan rawat inap dengan gagal jantung, dimana dilakukan perhitungan terkait jumlah obat yang diminum saat masuk dan keluar rumah sakit dan mengklasifikasikan setiap obat sebagai yang terkait dengan gagal jantung, yang tidak terkait dengan gagal jantung, atau yang tidak terkait dengan kardiovaskular. Dari penelitian didapatkan sebagian besar peserta (84% saat masuk dan 95% saat keluar) menggunakan 5 obat; dan 42% saat masuk dan 55% saat keluar menggunakan 10 obat. Pada penelitian yang saya lakukan adalah evaluasi polifarmasi khusus pada kelompok geriatri dengan penyakit diabetes melitus tipe 2 yang menggunakan *Beers Criteria 2019* dimana *Beers Criteria 2019* adalah panduan yang berfokus membantu pada pemantauan obat untuk membantu lansia dan tenaga kesehatan dalam evaluasi yang tepat mengenai penggunaan obat yang dipilih.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ma et al., 2020) dengan judul “*Potentially Inappropriate Medication and Potentially Prescribing Omissions in Chinese Older Patients: Comparison of Two version of STOPP/START*” dengan metode *cross-sectional* retrospektif dimana pasien berusia 65 tahun ke atas yang telah keluar dari bangsal medis internal rumah sakit pada bulan desember 2018. Alat evaluasi digunakan STOPP/START v1 dan STOPP/START v2 untuk mendeteksi adanya PIMs (*Potentially Inappropriate Medications*) dan PPOs (*Potential Prescribing*

Omissions). Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah dimana dari 662 pasien yang disertakan pada alat evaluasi STOPP/START v1 teridentifikasi PIM dengan persentase 36,1 % dan pada alat evaluasi STOPP/START v2 teridentifikasi PIM dengan persentase 47,7 %. Kemudian prevalensi PPOs yang ditemukan sebanyak 42,0 % dan 64,2 %. Obat yang diresepkan tanpa indikasi adalah obat yang paling umum di PIM sedangkan pada PPOs obat golongan ACEI adalah obat yang paling sering ditemukan pada alat evaluasi STOPP/START v2. Penelitian yang saya lakukan adalah evaluasi polifarmasi dengan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi obat-obat yang sebaiknya dihindari atau dapat digunakan dengan perhatian khusus pada pasien geriatri.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi polifarmasi pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji menggunakan *Beers Criteria 2019*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai polifarmasi pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi tenaga kesehatan dalam upaya penggunaan obat (polifarmasi) yang tepat pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Polifarmasi

1. Definisi

Polifarmasi sendiri diartikan sebagai penggunaan beberapa obat secara bersamaan. Polifarmasi didefinisikan sebagai penggunaan lima obat atau lebih. Dalam hal ini termasuk obat bebas, obat resep dan / atau obat tradisional maupun komplementer (WHO, 2019).

2. Epidemiologi

Analisis data dari *Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe* (SHARE) menunjukkan bahwa prevalensi polifarmasi yang didefinisikan sebagai mengonsumsi lima atau lebih obat secara bersamaan pada orang berusia 65 tahun atau lebih mencapai 26,3 % di negara eropa. Menurut *Stimulating Innovation Management of Polypharmacy and Adherence in the Elderly* (SIMPATY), sebuah proyek yang didanai Uni Eropa yang bertujuan untuk pengelolaan polifarmasi pada tahun 2030, terdapat 20% orang yang berusia 70 sampai 74 tahun diberikan 10 resep obat atau lebih dan tingkat polifarmasi akan mengalami peningkatan secara signifikan (Khezrian et al., 2020).

Ketidakpatuhan terhadap obat yang diresepkan adalah masalah kesehatan masyarakat yang utama, terkait dengan multimorbiditas dan polifarmasi. Penelitian menunjukkan antara 50% dan 80% pasien dengan kondisi kronis mengalami ketidakpatuhan terhadap obat yang diresepkan. Ketidakpatuhan ini bertanggung jawab atas 48% kematian akibat asma, 80% peningkatan risiko kematian pada diabetes, dan peningkatan risiko kematian 3,8 kali lipat setelah serangan jantung (Mair et al., 2017).

3. Konsekuensi Polifarmasi

Umumnya, pada lansia menderita beberapa penyakit kronis yang mengakibatkan penggunaan obat yang lebih kompleks dibandingkan kelompok usia lain. Lansia memiliki kondisi penyakit yang lebih parah diakibatkan adanya perubahan pada farmakokinetik dan farmakodinamik dapat berpengaruh pada metabolisme obat dan efek samping yang dialami lansia.

a. Penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat

Penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat atau *Potentially Inappropriate Medications* (PIM) menurut WHO adalah obat-obatan dengan ketidakefektifan atau memiliki rasio risiko-manfaat yang tinggi untuk individu atau kelompok individu tertentu (WHO, 2019).

Potentially Inappropriate Medications (PIM) merupakan potensi penggunaan obat tidak tepat yang harus dihindari oleh pasien geriatri (Muharni et al., 2019).

Polifarmasi merupakan masalah terbesar yang berkontribusi terhadap kejadian PIM terutama pada lansia sebagai akibat perubahan respons tubuh dan multimorbiditasnya. Faktor risiko terbesar bagi lansia adalah polifarmasi yang berhubungan dengan masalah terkait obat seperti efek samping, kepatuhan penggunaan obat yang buruk (Fauziyah et al., 2018).

b. Kejadian obat yang merugikan

Kejadian obat yang merugikan atau *Adverse Drug Event* (ADE) adalah cedera akibat penggunaan obat yang dalam hal ini termasuk reaksi obat yang merugikan, reaksi alergi dan overdosis. Pada lansia, lebih rentan mengalami kejadian obat yang merugikan terkait interaksi obat-obat, dikarenakan penggunaan beberapa obat terkait kondisi kesehatan kronis. Risiko kejadian obat merugikan

yang disebabkan oleh interaksi obat-obat meningkat seiring dengan polifarmasi (Kim & Parish, 2017).

Pada tahun 2013 sampai 2014, diperkirakan terjadi peningkatan kunjungan gawat darurat terkait dengan kejadian obat yang merugikan pada lansia, dengan antikoagulan, antibiotik, dan agen diabetes bertanggung jawab sekitar 46,9 % dari kunjungan ini. Pada lansia terjadi peningkatan kejadian obat yang merugikan mengingat perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik seiring dengan penuaan (Kim & Parish, 2017).

c. Biaya

Kejadian obat yang merugikan seiring dengan polifarmasi menyebabkan kunjungan gawat darurat dan rawat inap yang berkontribusi pada peningkatan biaya perawatan kesehatan bagi pasien dan sistem perawatan kesehatan. Selain itu, polifarmasi juga berkontribusi pada peningkatan pembayaran untuk obat-obatan (Kim & Parish, 2017).

4. Instrumen Evaluasi Polifarmasi

a. *AGS Beers Criteria*

Polifarmasi umum terjadi pada lansia yang mengakibatkan lansia berada pada risiko yang lebih tinggi dari penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat (PIMs). *Potentially Inappropriate Medications* (PIMs) didefinisikan sebagai obat-obat yang harus dihindari karena risikonya yang lebih besar daripada manfaatnya. PIM merupakan salah satu masalah terkait pengobatan yang umum ditemukan pada lansia. *Beers Criteria* dikembangkan pertama kali oleh Mark H. Beers pada tahun 1991 yang bertujuan untuk mengurangi peresepan yang tidak tepat dan kejadian obat yang merugikan (ADEs) khususnya untuk mengidentifikasi obat yang harus dihindari pada lansia. Setelah kematian Beers di tahun 2011, *American Geriatrics Society* (AGS) mulai mengawasi revisi dan pembaruan dari *Beers*

Criteria. AGS telah melakukan pembaruan setiap 3 tahun mulai tahun 2012. Pada Januari 2019, AGS menerbitkan pembaruan terbaru *Beers Criteria* untuk penggunaan obat-obatan yang berpotensi tidak tepat pada lansia (Fixen, 2019).

Sama seperti AGS *Beers Criteria* sebelumnya, menurut *American Geriatric Society* tujuan pembaruan 2019 dilakukan untuk terus meningkatkan perawatan pada lansia dengan mengurangi terjadinya kejadian obat yang berpotensi tidak tepat (Fick et al., 2019).

AGS Beers Criteria 2019 merupakan pembaruan ketiga oleh AGS yang mencakup 30 kriteria obat atau kelas pengobatan yang harus dihindari pada lansia dan 16 kriteria khusus yang mencakup lebih dari 40 obat atau kelas pengobatan yang harus digunakan dengan hati-hati atau dihindari pada penyakit atau kondisi tertentu (Fick et al., 2019).

Beers Criteria 2019 merupakan panduan yang dikembangkan sebagai alat untuk membantu meningkatkan keamanan pengobatan pada lansia dimana bertujuan mengurangi penggunaan obat yang tidak tepat dan kejadian obat yang merugikan yang khususnya dalam mengidentifikasi obat yang harus dihindari pada lansia (AGS, 2019).

Beers Criteria 2019 mencakup 5 kategori yang terdiri dari kategori 1 yakni penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat pada lansia, kategori 2 yakni penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat pada lansia karena interaksi obat-penyakit atau sindrom-obat yang dapat memperparah penyakit atau sindrom, kategori 3 yakni obat yang harus digunakan dengan hati-hati pada lansia, kategori 4 yakni interaksi obat-obat yang harus dihindari pada lansia, dan kategori 5 yakni obat-obatan yang harus dihindari atau dosisnya dikurangi dengan tingkat fungsi ginjal yang bervariasi pada lansia (AGS, 2019).

b. *STOPP/START Criteria*

STOPP/START Criteria dikembangkan oleh panel ahli Eropa di tahun 2008 dan diperbarui pada tahun 2014 dimana kriteria *STOPP/START v2* menghasilkan 80 kriteria *STOPP* dan 34 *START* dibanding dengan 65 kriteria *STOPP* dan 22 *START* di versi 1. Alat evaluasi *STOPP/START* adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai tingkat *Inappropriate prescribing* (IP) atau dikenal dengan persepsan yang tidak tepat yang meliputi obat-obatan yang berpotensi tidak tepat (PIMs) dan dilaporkan telah efektif dalam meningkatkan kualitas persepsan. *STOPP* mendeteksi persepsan yang berpotensi tidak tepat, sedangkan *START* mengidentifikasi obat yang diperlukan (tetapi dihilangkan) yang meningkatkan efektivitas farmakoterapi dan mencegah komplikasi (Ma et al., 2020).

c. *EU (7)-PIM List*

European Union (EU) (7)-*PIM List* adalah salah satu alat evaluasi yang dikembangkan dengan partisipasi para ahli dari tujuh negara Eropa diantaranya Estonia, Belanda, Finlandia, Spanyol, Perancis, Swedia, dan Denmark yang memungkinkan identifikasi dan perbandingan pola persepsan PIM pada lansia di negara-negara Eropa (Guiteras, Meyer, & Thurmann, 2015). *European Union* (EU)(7)-*PIM List* merupakan alat terkini untuk evaluasi persepsan PIM di Eropa, namun dalam penelitian nasional dan praktik klinis terdapat perbedaan terapi nasional dan pasar farmasi sehingga banyak negara yang mengembangkan daftar untuk mengidentifikasi PIM di negara mereka sendiri seperti *Laroche's Criteria* di Prancis, *Priscus List* di Jerman dimana alat evaluasi ini telah dikembangkan untuk studi nasional tertentu dengan mengecualikan PIM yang tidak disetujui di pasar farmasi khusus negara dan memasukkan PIM baru yang hanya tersedia di negara tertentu (Brkić et al., 2019).

B. Geriatri

1. Definisi

Geriatri didefinisikan sebagai cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan diagnosis dan pengobatan maupun hanya pengobatan terhadap kondisi serta gangguan yang dialami lanjut usia (Kemenkes, 2016). Pasien geriatri sendiri didefinisikan sebagai pasien dengan lanjut usia yang memiliki multi penyakit dan/atau gangguan yang terjadi karena penurunan fungsi organ, sosial, psikologi, lingkungan maupun ekonomi yang dalam hal ini membutuhkan pelayanan kesehatan yang terpadu (Kemenkes, 2016). Lansia dalam UU Nomor 13 Tahun 1998 diartikan sebagai seorang yang usianya telah mencapai 60 tahun ke atas (BPS, 2021).

2. Perubahan Terkait Usia

Dalam istilah dasar, farmakokinetik adalah apa yang dilakukan tubuh terhadap obat, dan farmakodinamik adalah apa yang dilakukan obat terhadap tubuh. Keempat komponen farmakokinetik diantaranya absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dipengaruhi oleh penuaan. Seiring bertambahnya usia, keadaan menjadi lebih lemah dan lebih mungkin mengalami farmakokinetik dan farmakodinamik obat yang berubah dan bervariasi. Meskipun perubahan ini lebih dipengaruhi keadaan klinis pasien daripada usia, pasien yang lebih tua cenderung menderita penyakit yang mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik. Dalam hal ini diperlukan tanggung jawab mengenai prinsip farmakokinetik dan farmakodinamik untuk meningkatkan perawatan pasien yang lebih tua dan menghindari efek samping dari farmakoterapi (Chisholm-Burns et al., 2016).

a. Perubahan farmakokinetik

1) Absorpsi

Beberapa perubahan seiring dengan penuaan terjadi di saluran gastrointestinal yang meliputi perubahan terkait penurunan sekresi asam lambung, peristaltik lebih lemah, dan pengosongan lambung tertunda. Perubahan ini mengakibatkan lambatnya penyerapan di lambung, terutama untuk sediaan salut enterik. Keterlambatan absorpsi dapat menyebabkan diperlukannya waktu yang lebih lama untuk mencapai efek obat yang diserap (Chisholm-Burns et al., 2016).

Selain itu, seiring bertambahnya usia terjadi penurunan produksi air liur yang mengakibatkan obat-obatan yang perlu diserap dengan cepat oleh mukosa bukal diserap pada tingkat yang lebih lambat (Chisholm-Burns et al., 2016).

2) Distribusi

Seiring bertambahnya usia terjadi perubahan distribusi obat dalam tubuh yang bergantung pada faktor-faktor seperti aliran darah, pengikatan protein plasma, dan komposisi tubuh yang masing-masing dapat mengalami perubahan terkait pertambahan usia (Dipiro et al., 2017).

Distribusi obat pada lanjut usia dipengaruhi oleh perubahan fisiologis terkait perubahan lemak tubuh dan air, maupun ikatan protein. Terjadi penurunan massa tubuh tanpa lemak pada lanjut usia mencapai 12% hingga 19 % melalui hilangnya otot rangka. Hal ini menyebabkan kadar obat dalam darah yang terutama didistribusikan di otot meningkat misalnya digoxin yang dapat menimbulkan overdosis (Chisholm-Burns et al., 2016).

3) Metabolisme

Usia, penyakit akut dan kronis dapat mempengaruhi metabolisme obat dimana hati yang merupakan tempat utama metabolisme obat akan mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, meskipun penurunannya tidak konsisten,

dimana pasien dengan usia yang lebih tua mengalami penurunan metabolisme terhadap banyak obat. Penurunan massa hati sebanyak 20% hingga 30% maupun penurunan aliran darah hati sebanyak 40% terjadi dengan bertambahnya usia. Secara drastis, perubahan ini dapat mengurangi jumlah obat yang dikirim ke hati per unit waktu, mengurangi metabolisme, dan meningkatkan waktu paruh (Chisholm-Burns et al., 2016).

4) Eliminasi

Perubahan farmakokinetik yang terjadi pada lansia adalah penurunan eliminasi obat melalui ginjal. Aliran darah ginjal, massa ginjal, laju filtrasi glomerulus, dan sekresi tubulus mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Terjadi penurunan jumlah glomeruli fungsional, dan terjadi penurunan aliran darah ginjal sekitar 1% setiap tahun setelah usia 40 tahun. Dari usia 25 sampai 85 tahun, terjadi penurunan rata-rata pembersihan ginjal sebanyak 50% dan tidak tergantung pada efek penyakit. Penurunan fungsi ginjal memiliki efek yang signifikan terkait perpanjangan waktu paruh obat, dan peningkatan potensi reaksi obat yang merugikan (ADR). Pada obat yang dieliminasi melalui ginjal yang memiliki indeks terapi sempit misalnya digoxin, diperlukan perhatian khusus. Pemantauan konsentrasi serum dan penyesuaian dosis yang tepat dapat mencegah terjadinya reaksi obat merugikan secara serius akibat akumulasi obat (Chisholm-Burns et al., 2016).

Klirens kreatinin harus dihitung saat memulai ataupun untuk menyesuaikan farmakoterapi pada lansia. Rumus yang paling banyak digunakan untuk memperkirakan fungsi ginjal dan menyesuaikan dosis obat adalah persamaan Cockcroft-Gault. Persamaan Cockcroft-Gault juga digunakan untuk menentukan pedoman dosis ginjal oleh produsen obat. Persamaan Cockcroft Gault (Chisholm-Burns et al., 2016):

$$\text{Creatinine clearance} = \frac{(140 - \text{Age})(\text{Weight (kg)})}{\text{Serum creatinine} \times 72} \times (0.85 \text{ (female)})$$

Di dalam persamaan usia diberikan dalam tahun, berat badan dalam kilogram, dan konsentrasi kreatinin serum dalam ml/dL. Klirens kreatinin yang diperoleh dinyatakan dalam satuan mL/menit dan jika wanita hasil yang diperoleh dikalikan dengan 0,85 (Chisholm-Burns et al., 2016).

b. Perubahan farmakodinamik

Farmakodinamik mengacu kepada tindakan obat di situs targetnya maupun respon tubuh terhadap obat. Pada lansia, perubahan farmakodinamik cenderung meningkatkan kepekaan terhadap efek obat (Chisholm-Burns et al., 2016).

Terdapat kecenderungan dari respon obat yang berubah ataupun peningkatan sensitivitas pada lansia. Mekanisme yang mungkin terjadi meliputi perubahan jumlah reseptor, perubahan konsentrasi obat pada reseptor, perubahan afinitas reseptor, perubahan postreseptor, serta gangguan mekanisme homeostatis terkait usia (Dipiro et al., 2017).

Meskipun perubahan ini menghasilkan peningkatan kepekaan terhadap efek obat, penurunan respon juga dapat terjadi. Perubahan yang terjadi pada situs reseptor meliputi perubahan afinitas pengikatan obat, jumlah reseptor aktif pada organ target, dan efek postreseptor (Chisholm-Burns et al., 2016).

C. *Diabetes Melitus Tipe 2*

1. Definisi

Diabetes melitus tipe 2 didefinisikan adanya resistensi insulin dan disfungsi sel- β . Diabetes melitus tipe 2 ditandai dengan kombinasi beberapa derajat resistensi insulin dengan relatif kurangnya sekresi insulin yang tidak cukup untuk menormalkan kadar glukosa plasma, dengan hilangnya sel- β secara progresif dari waktu ke waktu (Dipiro et al., 2017)

2. Epidemiologi

Berdasarkan data dari WHO pada tahun 2014 sekitar 8,5 % orang dewasa berusia 18 tahun ke atas menderita diabetes. Pada tahun 2019 diabetes adalah penyebab langsung dari 1,5 juta kematian dimana diabetes melitus tipe 2 menyumbang hingga 90 % dari semua kasus diabetes melitus (WHO, 2021).

Berdasarkan data dari *International Diabetes Federation* (IDF) prevalensi diabetes meningkat seiring bertambahnya usia dimana di tahun 2019 diperkirakan jumlah penderita diabetes yang berusia 65-99 tahun adalah 135,6 juta (19,3 %). Jika hal ini terus berlanjut, maka diperkirakan jumlah orang di atas 65 tahun dengan diabetes akan menjadi 195,2 juta pada tahun 2030 dan 276,2 juta pada tahun 2045 (IDF, 2019).

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan terjadi peningkatan prevalensi diabetes melitus di Indonesia sebesar 2% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 1,5 % (Kemenkes, 2020).

3. Patofisiologi

a. Gangguan Sekresi Insulin

Pankreas pada orang dengan sel- β yang berfungsi normal mampu menyesuaikan produksi insulinnya untuk mempertahankan kadar glukosa normal. Pada diabetes melitus tipe 2, lebih banyak insulin yang disekresikan untuk mempertahankan kadar glukosa darah normal, sampai akhirnya pankreas tidak dapat lagi memproduksi insulin yang cukup. Hiperglikemia yang dihasilkan ditingkatkan oleh resistensi insulin yang sangat tinggi, kelelahan pankreas dimana sel- β kehilangan kapasitas fungsional, atau keduanya. Gangguan fungsi sel- β mengakibatkan penurunan kemampuan untuk menghasilkan respon insulin fase pertama yang cukup untuk memberi sinyal kepada hati untuk berhenti memproduksi glukosa setelah makan. Seiring waktu pasien dengan diabetes

melitus tipe 2 mengalami kematian sel- β yang progresif dan banyak yang membutuhkan insulin eksogen untuk mempertahankan kontrol glukosa darah (Chisholm-Burns et al., 2016).

b. Resistensi Insulin

Resistensi insulin adalah faktor utama yang membedakan diabetes melitus tipe 2 dari bentuk diabetes lainnya. Resistensi insulin mungkin ada selama beberapa tahun sebelum diagnosis diabetes melitus dan dapat terus berkembang sepanjang perjalanan penyakit. Resistensi terhadap insulin terjadi di jaringan adiposa, otot rangka dan hati. Resistensi insulin di hati menimbulkan ancaman ganda karena hati menjadi tidak responsif terhadap insulin untuk pengambilan glukosa, dan produksi glukosa hati setelah makan tidak berhenti, menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah puasa pasca makan (Chisholm-Burns et al., 2016).

4. Persentasi Klinis

Pasien dengan diabetes melitus tipe 2 sering tanpa gejala, tetapi adanya komplikasi mikrovaskuler pada saat diagnosis menunjukkan banyak pasien telah mengalami hiperglikemia selama bertahun-tahun. Seringkali pasien dengan diabetes melitus tipe 2 didiagnosis selama tes darah rutin atau skrining. Lesu, poliuria, nokturia dan polidipsia dapat ditemui pada diagnosis di beberapa pasien dengan diabetes melitus tipe 2, tetapi penurunan berat badan yang signifikan lebih jarang terjadi. Sebagian besar penderita diabetes melitus tipe 2 mengalami kelebihan berat badan atau obesitas (Dipiro et al., 2017).

5. Kriteria Diagnostik

Diagnosis diabetes melitus termasuk hasil glikemik melebihi nilai ambang batas dengan salah satu dari tiga pilihan pengujian. Konfirmasi nilai abnormal harus dilakukan pada hari berikutnya untuk diagnosis kecuali ada gejala

hiperglikemia yang tegas, seperti polidipsia, poliuria dan polifagia. Baik A_{1c} , glukosa plasma puasa (FPG), atau OGTT (*Oral Glucose Tolerance Test*) adalah tes yang tepat untuk mendeteksi diabetes melitus (Chisholm-Burns et al., 2016).

Menurut *American Diabetes Association* (ADA) mengkategorikan pasien menunjukkan A_{1c} antara 5,7 % dan 6,4 % (0,057 dan 0,064 atau 39 dan 46 mmol/mol Hgb) IFG, atau IGT memiliki peningkatan risiko diabetes di masa depan. Tingkat FPG mewakili produksi glukosa hepatic selama keadaan puasa, sedangkan kadar glukosa postprandial di OGTT mencerminkan pengambilan glukosa di jaringan perifer, sensitivitas insulin atau penurunan respons insulin fase pertama. OGTT mengidentifikasi orang dengan IFG atau IGT dan karena itu berpotensi lebih banyak orang pada peningkatan risiko diabetes melitus dengan penyakit kardiovaskular. OGTT merupakan tes yang lebih rumit daripada A_1 atau FPG. Adapun kriteria diagnosis diabetes melitus yang ditetapkan oleh ADA (Chisholm-Burns et al., 2016) :

- a. Gejala diabetes ditambah konsentrasi glukosa plasma sewaktu ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L). didefinisikan sebagai setiap saat sepanjang hari tanpa memperhatikan waktu sejak makan terakhir. Gejala klasik diabetes termasuk poliuria, polidipsia dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan; atau
- b. FPG ≥ 126 mg/dL (7,0 mmol/L). puasa adalah tidak ada asupan kalori setidaknya selama 8 jam; atau
- c. Pemeriksaan glukosa plasma ≥ 200 mg/dL 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral (OGTT) dengan beban glukosa 75 gram. Tes dilakukan sesuai dijelaskan oleh WHO menggunakan beban glukosa yang mengandung setara dengan 75 gram glukosa anhidrat yang dilarutkan dalam air; atau

d. $A_{1c} \geq 6,5\%$ dimana tes harus dilakukan di laboratorium yang menggunakan metode bersertifikat NGSP (*National Glycohemoglobin Standardization Program*).

Kecurigaan adanya diabetes melitus perlu dipikirkan apabila terdapat keluhan seperti: (1) keluhan klasik: poliuria, polydipsia, polifagia, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. (2) keluhan lain: lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulva pada wanita (Perkeni, 2021).

Adapun kategorisasi status glukosa menurut ADA (Chisholm-Burns et al., 2016):

Tabel 1. Kategorisasi ADA untuk status glukosa

	mg/dL	mmol/L
FPG		
1. Normal	< 100	< 5,6
2. IFG (Prediabetes)	100-125	5,6 – 6,9
3. Diabetes	≥ 126	$\geq 7,0$
Glukosa Plasma 2 jam setelah OGTT		
1. Normal	< 140	< 7,8
2. IFG (Prediabetes)	140-199	7,8 – 11,0
3. Diabetes	≥ 200	$\geq 11,1$

6. Terapi Farmakologi

Perubahan gaya hidup intensif pada pasien diabetes melitus tipe 2 gagal mencapai kontrol glikemik yang baik pada mayoritas pasien. Temuan ini menegaskan kembali perlunya penggunaan awal obat antihiperlikemik dalam

hubungannya dengan diet dan olahraga pada pasien dengan diabetes melitus tipe 2 (Dipiro et al., 2017).

a. Sulfonilurea

Sulfonilurea meningkatkan sekresi insulin dengan memblokir saluran kalium yang sensitif terhadap ATP di membran sel dari sel- β pankreas. Tindakan ini menghasilkan depolarisasi membran, memungkinkan masuknya kalsium menyebabkan translokasi butiran sekretori insulin ke permukaan sel, dan meningkatkan sekresi insulin dengan tidak bergantung pada glukosa. Insulin kemudian diangkut melalui vena portal ke hati, menekan produksi glukosa hati. (Chisholm-Burns et al., 2016).

b. Glinid

Meskipun menghasilkan efek yang sama seperti sulfonilurea, glinid yang disebut juga meglitinide memiliki onset dan durasi kerja yang jauh lebih pendek. Manfaat utama dari glinid adalah dalam mengurangi kadar glukosa pasca makan. Agen ini telah menunjukkan penurunan kadar A_{1c} antara 0,8 % dan 1 %. Karena memiliki onset dan durasi kerja yang singkat, obat-obat ini harus diminum 15-30 menit sebelum makan (Chisholm-Burns et al., 2016).

c. Biguanid

Satu-satunya biguanid yang disetujui oleh *Food and Drug Administration* (FDA) dan saat ini tersedia di Amerika Serikat adalah metformin. Agen ini diperkirakan menurunkan glukosa darah dengan menurunkan produksi glukosa hepatic dan meningkatkan sensitivitas insulin baik pada jaringan otot hepar maupun perifer. Namun mekanisme aksi yang tepat belum diketahui. Telah terbukti mengurangi kadar A_{1c} sebesar 1,5 hingga 2 % dan kadar FPG sebesar 60 hingga 80 mg/dL bila digunakan sebagai monoterapi. Metformin tidak

mempengaruhi pelepasan insulin dari sel- β pankreas, sehingga hipoglikemik bukanlah efek samping yang umum (Chisholm-Burns et al., 2016).

Metformin secara signifikan mengurangi semua penyebab kematian dan risiko stroke pada pasien kelebihan berat badan dengan diabetes melitus tipe 2 dibandingkan dengan terapi intensif dengan sulfonilurea atau insulin. Metformin juga mengurangi kematian terkait diabetes dan infark miokard dibandingkan kelompok terapi konvensional. Mengingat metformin adalah satu-satunya obat antihiperglikemik oral yang terbukti mengurangi kematian dan tersedia secara umum, metformin dianggap sebagai terapi dasar bersama dengan modifikasi gaya hidup untuk diabetes melitus tipe 2 dan sering digunakan dalam kombinasi dengan antihiperglikemik lain untuk efek sinergis (Chisholm-Burns et al., 2016).

d. Tiazolidindion

Tiazolidindion (TZDs) diketahui meningkatkan sensitivitas insulin dengan merangsang periksisom proliferasi-aktivasi reseptor gamma (PPAR- γ) yang meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan asam lemak plasma. Sebagai monoterapi, TZDs menurunkan kadar FPG sekitar 60-70 mg/dL dan efeknya pada A_{1c} adalah pengurangan hingga 1,5 %. Efek maksimal mungkin terlihat sekitar 3 bulan hingga 4 bulan terapi (Chisholm-Burns et al., 2016).

Baik pioglitazone dan rosiglitazone secara minimal meningkatkan kolesterol HDL, rata-rata 2,4–5,2 mg/dL. Pioglitazone telah terbukti menurunkan serum trigliserida (TG) rata-rata 5,91 mg/dL, tetapi peningkatan TG telah diamati pada rosiglitazone. Konsentrasi kolesterol *low-density lipoprotein* (LDL) meningkat rata-rata sekitar 12,3 mg/dL dan 21,3 mg/dL pada penggunaan pioglitazone dan rosiglitazone (Chisholm-Burns et al., 2016).

Tiazolidindion dapat menghasilkan retensi cairan dan edema. Dengan demikian, obat ini dikontraindikasikan dalam situasi dimana peningkatan volume

cairan merugikan seperti gagal jantung. Retensi cairan tampaknya berhubungan dengan dosis dan meningkat bila dikombinasikan dengan terapi insulin (Chisholm-Burns et al., 2016).

e. Inhibitor α -Glukosidase

Acarbose dan miglitol adalah inhibitor α -glukosidase yang bersaing dengan enzim usus kecil yang memecah karbohidrat kompleks. Obat ini menunda penyerapan karbohidrat dan mengurangi konsentrasi glukosa darah postprandial sebanyak 40 sampai 50 mg/dL, namun penurunan A_{1c} hanya berkisar dari 0,3 % sampai 1 %. Efek samping yang paling umum adalah perut kembung, ketidaknyamanan perut, dan diare. Dosis awal yang rendah diikuti dengan titrasi bertahap dapat meminimalkan efek samping. Inhibitor α -glukosidase dikontraindikasikan pada pasien dengan penyakit usus kronis termasuk radang usus (Chisholm-Burns et al., 2016).

f. Inhibitor Dipeptidyl Peptidase-4 (Gliptin)

Inhibitor dipeptidyl peptidase-4 (inhibitor DPP-4) yakni sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, dan alogliptin) disetujui sebagai tambahan untuk diet dan olahraga untuk meningkatkan kontrol glikemik pada orang dewasa dengan diabetes melitus tipe 2. Golongan ini menurunkan konsentrasi glukosa darah dengan menghambat DPP-4, enzim yang mendegrasi GLP-1 endogen, sehingga meningkatkan jumlah GLP-1 endogen. Efek penurunan glukosa darah dari gliptin terutama pada tingkat postprandial. Pengurangan A_{1c} adalah 0,7 % sampai 1 %. Efek samping yang umum termasuk sakit kepala dan nasofaringitis. Hipoglikemia bukanlah efek samping yang umum pada agen ini karena sekresi insulin dihasilkan dari aktivasi GLP-1 yang disebabkan oleh deteksi glukosa terkait makanan dan bukan dari stimulasi sel- β pankreas langsung (Chisholm-Burns et al., 2016).

g. *Inhibitor Selective Sodium-Dependent Glucose Contranporter-2 (SGLT-2)*

Canagliflozin, dapagliflozin, dan empagliflozin merupakan obat golongan inhibitor SGLT-2 yang disetujui sebagai tambahan untuk diet dan olahraga untuk meningkatkan kontrol glikemik pada orang dewasa dengan diabetes melitus tipe 2. Reseptor SGLT-2 bertanggung jawab atas 90 % reabsorpsi glukosa aktif di tubulus proksimal ginjal. Dengan menghambat reseptor ini, reabsorpsi glukosa menurun. Glukosa masuk ke dalam urin sehingga glukosa dalam darah berkurang. Pengurangan A_{1c} adalah 0,7 % hingga 1,3 %. Kemungkinan reaksi merugikan termasuk infeksi saluran kemih, infeksi mikotik genital, peningkatan buang air kecil, hipotensi dan peningkatan kreatinin serum (Chisholm-Burns et al., 2016).

h. *Central-Acting Dopamine Agonist*

Formulasi pelepasan cepat dari agonis dopamine kerja sentral yakni bromokriptin disetujui untuk pengobatan diabetes melitus tipe 2. Mekanisme kerja bagaimana bromokriptin mengatur control glikemik tidak diketahui, tetapi data menunjukkan bahwa bromokriptin yang diberikan di pagi hari meningkatkan sensitivitas insulin. Ketika digunakan untuk mengobati pasien dengan diabetes melitus tipe 2, bromokriptin harus diminum 2 jam setelah bangun pagi dengan makanan. Penurunan A_{1c} sebesar 0,3 % menjadi 0,6 % dapat diharapkan dari obat ini. Efek samping utama termasuk rhinitis, pusing, asthenia, sinusitis, sembelit, dan mual (Chisholm-Burns et al., 2016).

i. *Sekuestran Asam Empedu*

Colesevelam adalah satu-satunya sekuestran asam empedu yang saat ini disetujui sebagai terapi tambahan untuk meningkatkan kontrol glikemik dalam hubungannya dengan diet, olahraga, dan insulin atau agen oral untuk pengobatan diabetes melitus tipe 2. Obat ini bekerja pada lumen usus untuk mengikat asam

empedu, tetapi mekanisme pada obat yang menyebabkan penurunan glukosa plasma tidak diketahui. Pengurangan A_{1c} sekitar 0,4 % dan pengurangan FPG sekitar 5 sampai 10 mg/dL dapat diharapkan jika colesevelam ditambahkan. Efek samping umum termasuk sembelit dan dispepsia. Interaksi obat-obat dimungkinkan karena penyerapan dan dapat menjadi sangat penting pada pasien yang memakai levothyroxine, glyburide, kontrasepsi oral, fenitoin, warfarin, dan digoxin. Obat-obatan ini tidak boleh diminum bersamaan dan harus dipisahkan setidaknya 4 jam setelah pemberian colesevelam (Chisholm-Burns et al., 2016).

j. Insulin

Insulin merupakan salah satu agen yang dapat digunakan pada semua jenis diabetes melitus dan tidak memiliki dosis maksimum yang spesifik, artinya dapat dititrasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Insulin adalah pengobatan utama untuk menurunkan kadar glukosa darah untuk pasien dengan diabetes melitus tipe 1. Insulin dibagi menjadi dua kelas utama, yakni basal dan bolus, berdasarkan lama kerjanya untuk meniru fisiologi insulin endogen. Kebanyakan formulasi tersedia sebagai U-100, menunjukkan konsentrasi 100 unit/mL (Chisholm-Burns et al., 2016).

Rute pemberian insulin yang paling umum adalah injeksi subkutan menggunakan alat suntik atau pena (Chisholm-Burns et al., 2016).

7. Terapi Nonfarmakologi

a. Terapi nutrisi medis

Terapi nutrisi medis merupakan landasan pengobatan untuk semua pasien diabetes melitus. Sangat penting untuk pasien memahami hubungan timbal balik antara asupan karbohidrat, obat-obatan dan kontrol glukosa. Untuk pasien dengan berat badan berlebih atau obesitas dengan diabetes melitus tipe 2 sering membutuhkan pembatasan kalori untuk meningkatkan penurunan berat badan.

Ukuran porsi dan frekuensi asupan makanan harus diperhatikan dan membantu pasien mengadopsi perilaku makan yang lebih sehat yang mengarah pada penurunan berat badan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu lebih penting dari diet tertentu (Dipiro et al., 2017).

b. Aktivitas Fisik

Sebagian besar pasien dengan diabetes melitus mendapat manfaat dari aktivitas fisik secara teratur. Aktivitas fisik secara teratur telah terbukti meningkatkan kontrol glukosa darah dan mengurangi faktor risiko kardiovaskular seperti hipertensi dan berkontribusi pada penurunan maupun pemeliharaan berat badan. Sasaran aktivitas fisik mencakup setidaknya 150 menit/minggu (Dipiro et al., 2017).

c. Penilaian dan perawatan psikologis

Kesehatan mental telah terbukti berdampak pada kemampuan pasien untuk melakukan tugas perawatan dalam manajemen diabetes melitus. Pedoman ADA merekomendasikan skrining psikologis seperti menentukan sikap pasien mengenai diabetes melitus, harapan manajemen medis dan hasil, suasana hati dan pengaruh, kualitas hidup umum dan terkait diabetes, maupun emosional (Chisholm-Burns et al., 2016).

d. Edukasi Pasien

Edukasi mengenai diabetes kepada pasien tidak hanya pada saat diagnosis awal, tetapi juga pada interval berkelanjutan sepanjang hidup, sangat penting. *American Association of Diabetes Educators* (AADE) telah mengembangkan perilaku perawatan diri AADE7. Perilaku tersebut meliputi makan sehat, menjadi aktif, pemantauan, minum obat, pemecahan masalah, mengurangi risiko, dan *healthy coping*. Pasien harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki pengetahuan tentang penyakit dan komplikasi terkait. Tekankan bahwa

komplikasi dapat dicegah atau diminimalkan dengan kontrol glikemik yang baik. Secara singkat, hal ini melibatkan pengajuan pertanyaan terbuka yang mendorong pasien untuk mengidentifikasi dan mengakui hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan kesehatan, dan kemudian bekerja untuk mengatasinya dengan bimbingan pendidik (Chisholm-Burns et al., 2016).

D. Tinjauan Islami

1. Evaluasi

Dalam konteks pelayanan kesehatan, kita harus patuh terhadap pedoman untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan. Selain diajarkan untuk taat, kita juga diajarkan untuk senantiasa melakukan evaluasi terhadap diri kita seperti dalam firman Allah swt. dalam QS Al-Hasyr/59:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(RI, 2021)

Dalam tafsir Al-Misbah pada ayat ini Allah swt. berfirman : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah* yakni hindarilah siksa yang dapat dijatuhkan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan jalan melaksanakan perintah-Nya *dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dikedepankannya* yakni amal saleh yang telah diperbuatnya untuk hari esok yang dekat yakni akhirat (Shihab, 2009).

Perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Ini seperti seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaannya dimana ia dituntut untuk memperhatikan kembali agar menyempurnakannya bila telah baik, atau memperbaikinya bila masih ada kekurangan (Shihab, 2009).

2. Pengobatan

Dalam Islam sejak masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sudah ada berbagai penyakit. Sakit adalah merupakan salah satu ujian dari Allah swt kepada makhluk-Nya dan Allah swt. telah menciptakan obat-obatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Oleh karena itu diriwayatkan dalam Hadits Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] telah menceritakan kepada kami [Abu Ahmad Az Zubairi] telah menceritakan kepada kami [‘Umar bin Sa’id bin Abu Husain] dia berkata; telah menceritakan kepadaku [‘Atha bin Abu Rabah] dari [Abu Hurairah] radiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga.” (HR. Bukhari no. 5246)

Hadist ini diriwayatkan oleh beberapa orang rawi, yakni:

1. Abu Hurairah sebagai : Rawi pertama
2. ‘Atha bin Abu Rabah sebagai : Rawi kedua
3. ‘Umar bin Sa’id bin Abu Husain sebagai : Rawi ketiga
4. Abu Ahmad Az Zubairi sebagai : Rawi keempat
5. Muhammad bin Al Mutsanna sebagai : Rawi kelima
6. Imam Bukhari sebagai : Rawi keenam/ Rawi terakhir

Dengan demikian, maka urutan-urutan sanad dari Hadits di atas sebagai berikut:

1. Muhammad bin Al Mutsanna sebagai : Sanad pertama/Awal Sanad
2. Abu Ahmad Az Zubairi sebagai : Sanad kedua
3. ‘Umar bin Sa’id bin Abu Husain sebagai : Sanad ketiga

4. ‘Atha bin Abu Rabah sebagai : Sanad keempat
5. Abu Hurairah sebagai : Sanad kelima/ Akhir Sanad

Hadist ini menjadi gambaran pentingnya berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Hadist ini bersifat umum mencakup setiap penyakit dan obatnya. Hadist ini menetapkan sebab akibat dan bahwa pengobatan tidak menafikkan tawakkal bagi siapa yang berkeyakinan bahwa kesembuhan itu hanya dengan izin Allah dan takdir-Nya (Al Asqalani & Al Hafizh, 2016).

3. Geriatri

Kehidupan manusia merupakan sebuah perjalanan panjang, dan melalui beberapa tahapan. Allah swt. telah menjelaskan dalam QS Ar-Rum/30: 54:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

Terjemahnya:

“Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa.”(RI, 2021).

Ayat ini memulai dengan menyebut nama wujud yang teragung dan yang khusus bagi-Nya serta mencakup segala sifat-Nya yakni: *Allah*, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, yakni setetes sperma yang bertemu dengan indung telur. Lalu tahap demi tahap meningkat dan meningkat hingga kemudian setelah melalui tahap bayi, kanak-kanak, dan remaja, *Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu memiliki kekuatan* sehingga kamu menjadi dewasa dan sempurna umur. Kemudian setelah melalui usia kematangan, *Dia menjadikan kamu sesudah menyandang kekuatan itu menderita kelemahan* kembali dengan hilangnya sekian banyak potensi dan tumbuhnya uban. *Dia*

menciptakan apa yang Dia kehendaki sesuai hikmah kebijaksanaan-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Mahakuasa (Shihab, 2009).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional menggunakan desain penelitian deskriptif. Penelitian observasional merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu persoalan kesehatan dengan pendekatan komunitas atau kelompok sosial tanpa adanya intervensi terhadap variabel yang diteliti (Siswanto et al., 2018). Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk melihat gambaran yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan secara retrospektif dengan mengumpulkan data yang telah lampau melalui lembar rekam medis dari pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 tahun 2021. Pendekatan retrospektif merupakan pengumpulan datanya saat penelitian dilakukan untuk mengungkap keadaan atau kejadian di masa lalu (Siswanto et al., 2018).

C. Lokasi Penelitian dan Waktu

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di RSUD Labuang Baji

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Maret- Juli 2022

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh rekam medis pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 pada bulan Januari sampai Desember 2021 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji.

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh rekam medis pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

a. Kriteria sampel

Kriteria sampel pada penelitian ini yaitu:

1) Kriteria inklusi

- a) Pasien mendapat terapi antidiabetes
- b) Pasien rawat inap periode tahun 2021
- c) Pasien dengan komorbid

2) Kriteria eksklusi

- a) Rekam medik tidak lengkap
- b) Pasien yang meninggal dan tidak menyelesaikan terapi

E. Penentuan Besar Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Dalam penelitian ini untuk menghitung besaran sampel berdasarkan rumus slovin karena rumus slovin dinilai mudah dan praktis dalam penggunaannya (Riyanto & Hatmawan, 2020). Besar sampel apabila diketahui populasi (N) maka pengambilan sampel dengan menggunakan rumus slovin dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Total populasi

e = Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel ($e = 0,1$)

maka jumlah sampel yang dibutuhkan yaitu:

$$n = \frac{122}{1 + 122 (0.1)^2}$$

$$n = \frac{122}{2.22}$$

$$n = 54.9$$

$$n = 55 \text{ orang}$$

F. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* dimana dilakukan pengambilan sampel dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama untuk seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dalam penelitian (Siswanto, Susila, & Suyanto, 2018).

G. Variabel Penelitian

1. Variabel independen/bebas adalah variabel yang menjadi sebab perubahan/timbul variabel terikat (Siswanto, Susila, & Suyanto, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen/bebas adalah jumlah obat, komorbid, dan usia.
2. Variabel dependen/terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel independen (Siswanto, Susila, & Suyanto, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen/terikat adalah polifarmasi pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa rekam medis. Rekam medis dalam PERMENKES269/PER/III/2008 adalah berkas berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Triyanti & Weningsih, 2018).

Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi polifarmasi yang dapat mengidentifikasi adanya kejadian obat yang merugikan (PIMs) adalah *Beers Criteria 2019* yang mencakup 30 kriteria obat atau kelas pengobatan yang harus dihindari pada lansia dan 16 kriteria khusus yang mencakup lebih dari 40 obat atau kelas pengobatan yang harus digunakan dengan hati-hati atau dihindari pada penyakit atau kondisi tertentu (Fick et al., 2019).

I. Analisis Data Penelitian

Pengolahan data dilakukan secara retrospektif dengan mengumpulkan dan mencatat resep dari rekam medis pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji periode Januari-Desember 2021 pada lembar pengumpulan data dan kemudian mengklasifikasi data yang diperoleh.

Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan SPSS digunakan analisis univariat yaitu pengelolaan data berupa penyajian dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk memperoleh gambaran polifarmasi serta evaluasi dari polifarmasi dengan *Beers Criteria 2019* pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap di RSUD Labuang Baji. Dilakukan pengolahan data dengan cara yaitu:

1. Data yang telah dikumpulkan dikelompokkan kemudian diatur dalam SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*)

2. Data dianalisis secara deskriptif mengenai PIM pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 dalam bentuk tabel berdasarkan usia, jenis kelamin, lama rawat inap, komorbid, jumlah obat yang dikonsumsi dan *Beers Criteria 2019*
3. Menganalisis kategori PIM sesuai dengan *AGS Beers Criteria 2019*
4. Mengelompokkan obat-obat sesuai kategori PIM yang ditetapkan *AGS Beers Criteria 2019* meliputi kategori 1 yakni penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat pada lansia, kategori 2 yakni penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat pada lansia karena interaksi obat-penyakit atau sindrom-obat yang dapat memperparah penyakit atau sindrom, kategori 3 yakni obat yang harus digunakan dengan hati-hati pada lansia, kategori 4 yakni interaksi obat-obat yang harus dihindari pada lansia, dan kategori 5 yakni obat-obatan yang harus dihindari atau dosisnya dikurangi dengan tingkat fungsi ginjal yang bervariasi pada lansia.
5. Menyimpulkan hasil kategori obat-obatan yang tergolong PIM berdasarkan *AGS Beers Criteria 2019*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Pasien

Karakteristik pasien yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya jenis kelamin, usia, lama rawat inap, dan penyakit penyerta pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji.

a. Jenis Kelamin

Tabel 2. Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Jenis Kelamin di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021

No.	Jenis Kelamin	Pasien	Persentase %
1	Laki-laki	21	38,2%
2	Perempuan	34	61,8%
Total		55	100%

b. Usia

Tabel 3. Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Usia di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021

No.	Usia	Pasien	Persentase
1	60-65 tahun	27	49,1%
2	66-70 tahun	14	25,5%
3	71-75 tahun	7	12,7%
4	76-80 tahun	5	9,1%
5	≥ 81 tahun	2	3,6%
Total		55	100%

c. Lama Rawat Inap

Tabel 4. Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Lama Rawat Inap di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021

No	Lama Rawat Inap (Hari)	Pasien	Persentase
1	1-4 hari	13	23,6%
2	5-9 hari	30	54,5%
3	≥ 10 hari	12	21,8%
Total		55	100%

d. Penyakit Penyerta

Tabel 5. Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Jenis Penyakit Penyerta di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021

No	Penyakit Penyerta	Pasien	Persentase
1	Hipertensi	36	27,1 %
2	CHF (<i>Congestive Heart Failure</i>)	13	9,8%
3	Gastritis	3	2,3%
4	GERD (<i>Gastroesophageal Reflux Disease</i>)	2	1,5%
5	Neuropati Diabetik	11	8,3%
6	CKD (<i>Chronic Kidney Disease</i>)	5	3,8%
7	Gout	9	6,8%
8	Dislipidemia	17	12,8%
9	Osteoarthritis	2	1,5%
10	Rheumatoid Arthritis	3	2,3%
11	PPOK (<i>Penyakit Paru Obstruktif Kronik</i>)	5	3,8%

12	Hipotiroid	1	0,8%
13	Angina Pektoris	3	2,3%
14	PJK (Penyakit Jantung Koroner)	7	5,3%
15	Asma	4	3,0%
16	Dislokasi Ankle	1	0,8%
17	Vertigo	1	0,8%
18	Low Back Pain	1	0,8%
19	Aritmia	1	0,8%
20	Cefalgia	1	0,8%
21	Dispepsia	2	1,5%
22	Hiperurisemia	3	2,3%
23	Gastroenteritis	2	1,5%

Tabel 6. Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Jumlah Penyakit Penyerta di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021

No.	Jumlah Penyakit Penyerta	Pasien	Persentase
1	1	3	5,5%
2	2	29	52,7%
3	3	20	36,4%
4	4	3	5,5%
Total		55	100%

2. Data Penggunaan Obat

a. Jumlah Jenis Obat

Tabel 7. Jumlah Jenis Obat Pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021

No	Jumlah Obat	Pasien	Persentase
1	5	8	14,5%
2	6	18	32,7%
3	7	15	27,3%
4	8	9	16,4%
5	9	3	5,5%
6	10	2	3,6%
Total		55	100%

3. Obat-Obatan PIM (*Potentially Inappropriate Medications*) Berdasarkan *Beers Criteria 2019*

a. Pengobatan yang Berpotensi Mengalami PIM (*Potentially Inappropriate Medications*)

Tabel 8. Pengobatan yang Berpotensi Mengalami PIM (*Potentially Inapropriate Medications*) pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021

No	Kategori PIM	Jumlah	Persentase
1	Pengobatan tanpa PIM	6	10,9%
2	Pengobatan dengan PIM	49	89,1%
	a. 1 PIM	14	25,5%
	b. ≥ 2 PIM	35	63,6%

b. Klasifikasi PIM (*Potentially Inappropriate Medications*)

Tabel 9. Klasifikasi PIM (*Potentially Inappropriate Medications*) Berdasarkan Alat Evaluasi *Beers Criteria 2019* pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021

No.	Klasifikasi PIM	Jumlah	Persentase
1	Penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat pada lansia	71	62,3%
2	Penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat pada lansia karena interaksi obat-penyakit atau sindrom-obat yang dapat memperparah penyakit atau sindrom	7	6,1%
3	Obat yang harus digunakan dengan hati-hati pada lansia	33	28,9%
4	Interaksi obat-obat yang harus dihindari pada lansia	1	0,9%
5	Obat-obatan yang harus dihindari atau dosisnya dikurangi dengan tingkat fungsi ginjal yang bervariasi pada lansia	2	1,8%
	Total	114	100%

c. Daftar Obat PIM (*Potentially Inappropriate Medications*) Berdasarkan Alat Evaluasi *Beers Criteria 2019*

Tabel 10. Daftar Obat yang PIM Berdasarkan Alat Evaluasi *Beers Criteria 2019* pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021

PIM	Nama Obat	Jumlah	Persentase
1	Endokrin		
	1. Glimepiride	19	16,7%
	2. Glibenklamid	17	14,9%
	Kardiovaskular		
	1. Digoxin	2	1,8%
	2. Prazosin	1	0,9%
	3. Amiodarone	1	0,9%
	NSAID		
	1. Meloxicam	5	4,4%
	2. Diclofenac	4	3,5%
	3. Naproxen	2	1,8%
	4. Ibuprofen	5	4,4%
	Sistem saraf Pusat		
	Benzodiazepin		
	1. Diazepam	1	0,9%
	Antidepresan		
	1. Amitriptilin	4	3,5%

	Gastrointestinal		
	Proton-pump Inhibitor		
	1. Lanzoprazole	1	0,9%
	2. Omeprazole	4	3,5%
	3. Pantoprazole	1	0,9%
	Antiemetik		
	1. Metoclopramide	3	2,6%
	Antispasmodik		
	1. Clidinium-Chlordiazepoxide	1	0,9%
2	Pioglitazone	5	4,4%
	Ibuprofen	2	1,8%
3	Furosemid	11	9,6%
	Chlortalidone	3	2,6%
	Aspirin	5	4,4%
	Spironolactone	1	0,9%
	Hidroklorothiazid	7	6,1%
	Amitriptilin	4	3,5%
	Trimethoprim-Sulfamethoxazole	2	1,8%
4	Prednisone-Ibuprofen	1	0,9%
5	Ranitidin	1	0,9%
	Gabapentin	1	0,9%

d. Rekomendasi, Kualitas Bukti (QE), Kekuatan Rekomendasi (SR)
Berdasarkan Alat Evaluasi *Beers Criteria 2019*

Tabel 11. Rekomendasi, Kualitas Bukti dan Kekuatan Rekomendasi Berdasarkan Alat Evaluasi *Beers Criteria 2019* pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021

P I M	Golongan Obat	Nama Obat	Rekomendasi	QE	SR
1	Sulfonilurea	Glimepiride Glibenklamid	Hindari. Risiko hipoglikemia parah berkepanjangan yang lebih tinggi pada lansia	Tinggi	Kuat
	Glikosida Jantung	Digoxin	Hindari sebagai lini pertama untuk fibrilasi atrium. Hindari sebagai lini pertama untuk gagal jantung. Jika digunakan untuk fibrilasi atrium/gagal jantung hindari dosis >0,125 mg/hari. Dosis yang lebih tinggi tidak terkait dengan manfaat tambahan dan dapat	Rendah	Kuat

			meningkatkan toksisitas		
	Alpha-Blockers	Prazosin	Hindari penggunaan sebagai anti-hipertensi. Risiko tinggi hipotensi ortostatik terutama pada lansia	Sedang	Kuat
	Antiaritmia	Amiodarone	Hindari sebagai terapi lini pertama untuk fibrilasi atrium kecuali pasien mengalami gagal jantung/hipertrofi ventrikel kiri yang substantial. Efektif untuk mempertahankan irama sinus tetapi memiliki toksisitas yang lebih besar daripada antiaritmia lain	Tinggi	Kuat

	NSAID	Meloxicam Diclofenac Naproxen Ibuprofen	Hindari penggunaan jangka panjang, kecuali alternatif lain tidak efektif dan pasien dapat menggunakan agen gastroprotektif (PPI atau misoprostol). Peningkatan risiko pendarahan gastrointestinal/ penyakit tukak lambung. Penggunaan PPI atau misoprostol mengurangi tetapi tidak menghilangkan risiko. NSAID juga dapat meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan cedera ginjal	Sedang	Kuat
	Benzodiazepin	Diazepam	Hindari. Kepekaan terhadap benzodiazepine meningkat pada	Sedang	Kuat

			lansia dan penurunan metabolisme agen long-acting; secara umum semua benzodiazepine meningkatkan risiko gangguan kognitif, delirium, dan patah tulang pada lansia		
Antidepresan Trisiklik	Amitriptilin	Hindari. Sangat antikolinergik, dan menyebabkan hipotensi ortostatik	Tinggi	Kuat	
PPI	Omeprazole Lansoprazole Pantoprazole	Hindari. penggunaan terjadwal selama >8 minggu kecuali untuk pasien berisiko tinggi (misalnya penggunaan kortikosteroid oral atau penggunaan NSAID jangka panjang), esophagitis erosif, kondisi hipersekresi	Tinggi	Kuat	

			patologis dan penggunaan penghambat pompa proton menyebabkan risiko infeksi <i>Clostridium difficile</i> , keropos tulang dan patah tulang.		
	Antiemetik	Metoclopramide	Hindari, kecuali untuk gastroparesis dengan durasi penggunaan tidak lebih dari 12 minggu	Sedang	Kuat
	Antispasmodik	Clidinium-Chlordiazepoxide	Hindari. Sangat antikolinergik, efektivitas tidak pasti	Sedang	Kuat
2	TZD	Pioglitazone	Gunakan dengan hati-hati pada pasien dengan gagal jantung. Berpotensi meningkatkan retensi cairan dan/atau memperburuk gagal jantung	Tinggi	Kuat

	NSAID	Ibuprofen	Gunakan dengan hati-hati pada pasien dengan gagal jantung. Berpotensi meningkatkan retensi cairan dan/atau memperburuk gagal jantung	Sedang	Kuat
3		Aspirin	Gunakan dengan hati-hati pada lansia ≥ 70 tahun. Risiko pendarahan besar pada aspirin meningkat tajam pada lansia.	Sedang	Kuat
	Diuretik	Furosemide Hidroklorothiazid Spironolactone Chlortalidone	Gunakan dengan hati-hati. Dapat memperburuk atau menyebabkan SIADH atau hiponatremia. Pantau kadar natrium dengan cermat saat memulai atau mengubah dosis	Sedang	Kuat

			pada lansia		
	Antidepresan Trisiklik	Amitriptilin	Dapat memperburuk atau menyebabkan SIADH atau hiponatremia. Pantau kadar natrium dengan cermat saat memulai atau mengubah dosis pada lansia	Sedang	Kuat
	Antibiotik	Trimetoprim-sulfametoksazol	Gunakan dengan hati-hati pada pasien dengan ACEI atau ARB dan penurunan bersihan kreatinin. Peningkatan risiko hiperkalemia bila digunakan bersamaan ACEI atau ARB	Rendah	Kuat
4	Kortikosteroid-NSAID	Prednison-Ibuprofen	Hindari. Jika tidak memungkinkan berikan perlindungan saluran cerna; peningkatan	Sedang	Kuat

			risiko penyakit tukak lambung atau pendarahan saluran cerna		
5	Antagonis Reseptor Histamin H2	Ranitidin	Creatinine Clearance <60 ml/menit. Kurangi dosis; Efek samping SSP	Sedang	Kuat
	Antikonvulsan	Gabapentin	Creatinine Clearance <50 ml/menit. Kurangi dosis; Perubahan status mental	Sedang	Kuat

B. Pembahasan

1. Karakteristik Pasien

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang diperoleh dari rekam medis pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji periode januari- desember 2021. Analisis karakteristik pasien dilakukan untuk mengetahui angka maupun jumlah pasien yang melakukan pengobatan rawat inap di RSUD Labuang Baji.

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa jumlah pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 yang melakukan pengobatan rawat inap di RSUD Labuang Baji terdiri dari 55 orang dimana berdasarkan jenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 34 pasien (61,8%) sedangkan untuk pasien laki-laki yaitu 21 pasien (38,2%).

Berdasarkan tabel 3 usia pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 yang melakukan pengobatan rawat inap di RSUD Labuang Baji paling banyak yakni

berusia 60-65 tahun sebanyak 27 pasien (49,1%), dan yang paling sedikit yakni berusia 81 tahun ke atas sebanyak 2 pasien (3,6%).

Peningkatan diabetes melitus tipe 2 menunjukkan peningkatan seiring bertambahnya usia yang mencapai puncaknya pada umur 55 sampai 64 tahun dan menurun setelah melewati rentang umur tersebut. Pola peningkatan ini mengindikasikan semakin tinggi usia maka semakin besar untuk mengalami diabetes (Kemenkes, 2020).

Berdasarkan tabel 4 lama rawat inap pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di RSUD Labuang Baji data yang diperoleh yaitu pasien terbanyak dengan rentang lama rawat inap 5- 9 hari di rumah sakit berjumlah 30 pasien (54,5%).

Berdasarkan tabel 5 dan 6 jenis penyakit penyerta pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 yang melakukan pengobatan rawat inap di RSUD Labuang Baji terbanyak memiliki dua penyakit penyerta yakni 29 pasien (52,7%) dengan penyakit penyerta tertinggi yakni hipertensi yang diderita oleh 36 pasien (27,1%) diikuti dengan dislipidemia yang diderita oleh 17 pasien (12,8%).

Penyakit diabetes menyebabkan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular melalui berbagai mekanisme, selain itu peningkatan kadar glukosa darah dikaitkan dengan faktor risiko metabolik lain yang mendasari, termasuk hipertensi, dan dislipidemia (IDF, 2019).

2. Data Penggunaan Obat

Berdasarkan tabel 7 jumlah jenis obat yang dikonsumsi pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di RSUD Labuang Baji selama rawat inap yang terbanyak adalah 6 jenis obat dengan jumlah pasien sebanyak 18 orang (32,7%), dan yang paling sedikit 10 jenis obat sebanyak 2 orang (3,6%).

Studi yang dilakukan (Salwe et al., 2016) mendapatkan adanya korelasi positif antara jumlah hari di rawat di rumah sakit dengan peningkatan jumlah obat

dimana dijelaskan bahwa pasien geriatri memiliki multimorbiditas ataupun penyakit kompleks sehingga membutuhkan lebih banyak obat-obatan dan pemberian obat secara bersamaan. Studi yang dilakukan oleh (Hajjar et al., 2015) pada 384 lansia menunjukkan bahwa 41,4 % menggunakan 5 sampai 8 obat dan 37,2% menggunakan ≥ 9 obat. Sebuah penelitian yang juga dilakukan di Italia tahun 2011 mengenai prevalensi polifarmasi saat masuk dan keluar rumah sakit menemukan bahwa 51,9% pasien lansia menggunakan lebih dari 5 obat dan saat dipulangkan angka meningkat menjadi 67% (Nobilli et al., 2016).

Menurut (WHO, 2019) kelompok pasien yang paling rentan terhadap risiko polifarmasi adalah kelompok lansia di atas 65 tahun dimana dalam hal ini rentan terhadap kejadian seperti interaksi obat, risiko ADR (*Adverse Drug Reaction*), dan ketidakpatuhan minum obat.

3. Obat-obatan yang Berpotensi Tidak Tepat (PIM) Berdasarkan *Beers Criteria 2019*

a. Pengobatan yang Berpotensi Tidak Tepat (PIM)

Berdasarkan tabel 8 pengobatan yang berpotensi tidak tepat (PIM) pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji, terdiri dari pengobatan yang berpotensi tidak tepat (PIM) terdapat 49 pasien (89,1%) dan yang menerima pengobatan tanpa PIM sebanyak 6 pasien (10,9%).

Polifarmasi merupakan masalah terbesar yang berkontribusi terhadap kejadian PIM terutama pada lansia akibat perubahan respon tubuh dan multimorbiditas (Fauziyah et al., 2018).

b. Kategori PIM Berdasarkan *Beers Criteria 2019*

Polifarmasi umum terjadi pada lansia yang mengakibatkan lansia berada pada risiko yang lebih tinggi dari penggunaan obat yang tidak tepat (PIM). *Beers Criteria 2019* merupakan panduan yang dikembangkan sebagai alat untuk

membantu meningkatkan keamanan pengobatan pada lansia dimana bertujuan mengurangi penggunaan obat yang tidak tepat dan kejadian obat yang merugikan yang khususnya dalam mengidentifikasi obat yang harus dihindari pada lansia.

1) PIM Kategori 1

Berdasarkan tabel 9, PIM kategori 1 pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji periode Januari-Desember 2021 sebanyak 71 resep (62,3%) dimana PIM kategori 1 merupakan penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat pada lansia. Obat pertama yang kategori 1 adalah obat untuk penderita diabetes melitus golongan sulfonilurea yakni glimepiride sebanyak 19 resep (16,7%) dan glibenklamid sebanyak 17 resep (14,9%). Glimepiride dan glibenklamid merupakan obat antidiabetes golongan sulfonilurea dengan mekanisme kerja meningkatkan sekresi insulin dengan memblokir saluran kalium yang sensitif terhadap ATP di membran sel dari sel- β pankreas. Tindakan ini menghasilkan depolarisasi membran, memungkinkan masuknya kalsium menyebabkan translokasi butiran sekretori insulin ke permukaan sel, dan meningkatkan sekresi insulin dengan tidak bergantung pada glukosa (Chisholm-Burns et al., 2016). Berdasarkan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* penggunaan obat glimepiride dan glibenklamid yang harus dihindari karena risiko hipoglikemia parah berkepanjangan yang lebih tinggi pada lansia dengan kualitas bukti tinggi dan kekuatan rekomendasi kuat.

Hipoglikemia merupakan faktor pembatas utama dalam manajemen glikemik diabetes melitus. Klasifikasi hipoglikemia menurut ADA terdiri atas: level 1 didefinisikan sebagai konsentrasi glukosa terukur < 70 mg/dL (3,9 mmol/L) tetapi ≥ 54 mg/dL (3,0 mmol/L). level 2 didefinisikan sebagai konsentrasi glukosa darah < 54 mg/dL (3,0 mmol/L). hipoglikemia level 3 didefinisikan sebagai peristiwa parah yang ditandai dengan perubahan fungsi

mental dan/atau fisik yang memerlukan bantuan untuk pemulihan. Pada level 3 hipoglikemia dapat berkembang menjadi kehilangan kesadaran, kejang, koma, atau kematian (ADA, 2019).

Glimepiride dan glibenklamid merupakan sulfonilurea generasi kedua dimana glimepiride dan glibenklamid memiliki waktu paruh yang panjang dimana risiko hipoglikemia meningkat terutama pada pasien dengan insufisiensi ginjal, pasien lanjut usia, pasien dengan demensia, gagal jantung, dan diabetes jangka panjang (Yakaryilmaz & Ozturk, 2017). Glibenklamid telah dikaitkan dengan peningkatan risiko hipoglikemia dan mortalitas kardiovaskular jangka panjang. Sebuah meta-analisis yang diterbitkan tahun 2007 melaporkan peningkatan risiko hipoglikemia untuk glibenklamid dibandingkan dengan obat golongan sulfonilurea lain. Hipoglikemia dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan termasuk perubahan status mental, kejang, koma dan kematian (Ottawa, 2015). Berdasarkan penelitian oleh (Leonard et al., 2018) menguraikan tingkat standar kejadian hipoglikemia serius menegaskan bahwa sulfonilurea dikaitkan dengan tingkat hipoglikemia yang lebih tinggi daripada metformin dan tiazolidindion. Diantara obat golongan sulfonilurea, glibenklamid dikaitkan dengan dengan tingkat hipoglikemia yang lebih tinggi diikuti dengan glimepiride, lalu glipizide.

Obat kedua yang masuk dalam PIM kategori 1 adalah obat kardiovaskular yakni digoxin sebanyak 2 resep (1,8%), prazosin sebanyak 1 resep (0,9%) dan amiodarone sebanyak 1 resep (0,9%). Digoxin merupakan agen inotropik jantung yang menghambat pompa natrium atau kalium ATPase di sel miokard menghasilkan peningkatan sementara natrium intraseluler yang pada gilirannya mendorong masuknya kalsium melalui pompa pertukaran natrium-kalsium yang menyebabkan kontraktilitas (Wynn et al., 2019). Dalam alat evaluasi *Beers Criteria 2019* digoxin harus dihindari pada lansia untuk pengobatan lini pertama

fibrilasi atrium atau gagal jantung, jika digunakan sebagai lini pertama untuk fibrilasi atrium atau gagal jantung hindari dosis $>0,125$ mg/d. Digoxin harus dihindari sebagai lini pertama pada fibrilasi atrium, karena ada alternatif yang lebih aman dan efektif untuk pengendalian laju yang didukung oleh bukti berkualitas tinggi. Digoxin pada pengobatan gagal jantung, dosis yang lebih tinggi tidak terkait dengan manfaat tambahan dan dapat meningkatkan toksisitas. Terdapat penurunan massa bebas lemak dan air tubuh pada lansia, serta peningkatan lemak tubuh seiring bertambahnya usia. Peningkatan persentase lemak tubuh dan penurunan total air tubuh mengakibatkan perubahan distribusi obat tergantung pada kelarutan lipid. Waktu paruh obat meningkat dengan volume distribusi. Dengan penurunan volume distribusi obat hidrofilik, obat ini memiliki konsentrasi plasma puncak yang lebih tinggi dan waktu paruh yang lebih pendek pada lansia. Hal ini berlaku untuk digoxin yang dapat menyebabkan konsentrasi plasma toksik untuk dosis yang tidak toksik bagi orang dewasa yang lebih muda (Midlov et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Avdhoot et al., 2021) yang bertujuan untuk menilai peran digoxin pada pasien gagal jantung dengan atau tanpa diabetes dan untuk mengetahui peran digoxin pada pasien kelas NHYA melaporkan pasien diabetes memiliki angka kematian yang jauh lebih tinggi daripada pasien non-diabetes dengan gagal jantung dimana diantara pasien non-diabetes 88,1% pasien masih hidup setelah setahun dan 11,9% meninggal, sedangkan pada pasien diabetes 71,42% masih hidup dan 28,58% pasien meninggal. Terapi digoxin membalikkan kelas NHYA tetapi tidak signifikan.

Prazosin merupakan kelas obat α -1 bloker yang secara kompetitif menghambat reseptor alfa-adrenergik postsinaptik yang menghasilkan vasodilatasi vena dan arteriol dan penurunan resistensi perifer total dan tekanan darah (Wynn et al., 2019). Berdasarkan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* prazosin harus

dihindari penggunaannya pada lansia sebagai antihipertensi karena risiko tinggi hipotensi ortostatik dan bahaya terkait, terutama pada pasien lansia. Hipotensi ortostatik lebih sering terjadi pada lansia dan meningkatkan risiko jatuh yang disebabkan oleh penghambatan reseptor alfa-1, yang menyebabkan relaksasi otot polos pembuluh darah dan vasodilatasi (Frishman & Kotob, 2017). Frekuensi dan profil efek samping dari lima kelas agen antihipertensi dimana persentase pasien yang melaporkan efek samping alpha-blocker sebanyak 50% dengan persentase pasien yang penghentian karena efek samping sebanyak 6,8% dengan alpha-blocker. Alpha-blocker dikaitkan dengan kelelahan, ekstremitas dingin, insomnia, dan lebih banyak serangan palpitasi daripada obat antihipertensi lainnya. Efek dosis pertama yakni hipotensi ortostatik yang sangat besar dan refleks takikardia adalah komplikasi yang diakui dengan baik dari prazosin (Aronso, 2016).

Amiodarone merupakan agen antiaritmia kelas III yang biasanya digunakan untuk mengobati fibrilasi atrium dan aritmia ventrikel dengan mekanisme kerja menghambat stimulasi adrenergik, mempengaruhi saluran natrium, kalium dan kalsium, memperpanjang potensial aksi dan periode refrakter di jaringan miokard (Wynn et al., 2019). Berdasarkan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* Amiodarone harus dihindari penggunaannya sebagai lini pertama untuk fibrilasi atrium kecuali pasien mengalami gagal jantung atau hipertrofi ventrikel kiri yang substansial karena amiodarone efektif untuk mempertahankan ritme sinus tetapi memiliki toksisitas yang lebih besar daripada antiaritmia lain yang digunakan pada fibrilasi atrium. Pedoman Klinis Australia 2018 untuk diagnosis dan manajemen fibrilasi atrium menyatakan amiodarone harus dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir untuk kontrol laju farmakologis klinis, mengingat profil toksisitasnya. Toksisitas jantung dari pemberian amiodarone dapat dikaitkan dengan mekanisme terapeutiknya dimana selain mengobati aritmia amiodarone

dapat menyebabkan bradikardia dan kelainan konduksi atrioventricular dan intraventikular (Mujović et al., 2020). dan amiodarone memiliki waktu paruh yang sangat lama ($t_{1/2}$ dari beberapa minggu) dan diperlukan waktu 6 minggu untuk efek klinis penuh dengan terapi oral. Penelitian terhadap 4000 pasien menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan mortalitas dengan kontrol ritme dimana mayoritas pasien diobati dengan kontrol ritme amiodarone, terutama pada pasien yang lebih tua dimana kematian non- jantung dengan terapi aritmia yang dianggap lebih toksik pada lansia (Srinivasan et al., 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pada pasien geriatri dengan diabetes melitus tipe 2 terjadi neuromiopati sebagai komplikasi dari penggunaan amiodarone yang secara optimal, biopsi otot yang diperoleh mengkonfirmasi hubungan kausal antara amiodarone dan neuromiopati pada pasien (Stanton et al., 2020).

Obat ketiga yang dalam PIM kategori 1 adalah golongan obat anti-inflamasi nonsteroid (NSAID) yaitu meloxicam sebanyak 5 resep (4,3%), ibuprofen sebanyak 5 resep (4,3%), diclofenac sebanyak 4 resep (3,4%), dan naproxen sebanyak 2 resep (1,7%). NSAID memiliki mekanisme kerja menghambat enzim COX-1 dan 2 yang mengakibatkan penurunan pembentukan precursor prostaglandin (Wynn et al., 2019). Berdasarkan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* obat golongan NSAID harus dihindari penggunaannya dalam jangka panjang pada lansia karena peningkatan risiko pendarahan gastrointestinal atau penyakit tukak lambung penggunaan inhibitor pompa proton atau misoprostol mengurangi tetapi tidak menghilangkan risiko. Ulkus gastrointestinal bagian atas, pendarahan hebat, perforasi yang disebabkan oleh NSAID. Diketahui bahwa pendarahan gastrointestinal dan ulserasi dari penggunaan NSAID meningkat seiring pertambahan usia akibat dari penuaan dimana mekanisme yang mendasari efek samping gastrointestinal yang diinduksi NSAID karena obat ini

menghambat sintesis prostaglandin yang menyebabkan melemahnya penghalang pelindung mukosa gastrointestinal yang menyebabkan seseorang mengalami pendarahan (Wongrakpanich et al., 2018). NSAID mengubah fungsi ginjal jika diberikan dalam dosis yang cukup tinggi, mengurangi aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus dan menyebabkan retensi natrium sehingga tekanan darah meningkat (Morgan & Anderson, 2018). Penggunaan NSAID juga dapat meningkatkan risiko hiperkalemia terutama pada lansia, penderita diabetes, penyakit ginjal, dan penggunaan bersamaan dengan agen lain mampu menginduksi hiperkalemia (misalnya ACE inhibitor) sehingga perlu pemantauan kalium dengan cermat (Wynn et al., 2019).

Obat keempat yang masuk dalam PIM kategori 1 adalah obat sistem saraf pusat golongan benzodiazepin yaitu diazepam sebanyak 1 resep (0,9%) dan antidepresan yaitu amitriptilin sebanyak 4 resep (3,5%). Diazepam merupakan obat golongan benzodiazepin yang mengikat reseptor benzodiazepin stereospesifik pada neuron GABA postsinaptik dalam sistem saraf pusat (Wynn et al., 2019). Berdasarkan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* benzodiazepin harus dihindari karena pada lansia terjadi peningkatan kepekaan terhadap benzodiazepin dan terjadi penurunan metabolisme agen *long-acting* pada lansia. Dengan bertambahnya usia, ada perubahan dalam farmakokinetik dimana penurunan metabolisme dan ekskresi banyak obat benzodiazepin pada lansia yang menyebabkan toksisitas dapat berkembang secara perlahan karena konsentrasi obat-obat yang digunakan meningkat. Benzodiazepin tertentu seperti diazepam, flurazepam, membutuhkan waktu lebih lama untuk dikeluarkan dari tubuh lansia dibandingkan orang dewasa yang lebih muda (Neft et al., 2020). Benzodiazepin dimetabolisme di hati dengan waktu paruh 20-70 jam dan meningkat pada disfungsi hati dan lansia (Beyth & Shorr, 2017). Secara umum, semua

benzodiazepin meningkatkan risiko gangguan kognitif, delirium, patah tulang pada lansia. Benzodiazepin merupakan kelas obat yang secara umum diresepkan untuk mengobati insomnia dan kecemasan pada lansia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Gray et al., 2016) untuk menilai apakah penggunaan benzodiazepine berkaitan dengan risiko penurunan kognitif yang lebih cepat yang dilakukan pada 3434 pasien lansia menggunakan instrument skrining kemampuan kognitif (CASI) untuk memeriksa fungsi kognitif menyimpulkan risiko penurunan fungsi kognitif sedikit lebih tinggi pada orang dengan paparan benzodiazepin. Penelitian meta-analisis yang dilakukan (Crowe & Stranks, 2018) mengungkapkan efek negatif yang signifikan dari penggunaan benzodiazepin yakni fungsi neuropsikologis terganggu termasuk penurunan kewaspadaan, gangguan kinerja psikomotor dan disfungsi memori.

Amitriptilin merupakan antidepresan trisiklik dengan mekanisme kerja meningkatkan konsentrasi sinaptik serotonin dan/atau norepinefrin di sistem saraf pusat dengan menghambat ambilan kembali serotonin dan/atau norepinefrin oleh pompa membrane neuron prasinaps (Wynn et al., 2019). Amitriptilin banyak digunakan untuk mengobati nyeri neuropati (RA et al., 2019). Berdasarkan *Beers Criteria 2019* penggunaan amitriptilin harus dihindari pada lansia karena sangat antikolinergik, efek sedatif, dan menyebabkan hipotensi ortostatik. Amitriptilin memiliki sifat antikolinergik yang kuat dan dapat menyebabkan perubahan EKG dan efek seperti quinidine pada jantung (Midlov et al., 2019). Penelitian yang dilakukan (Adi Jaya & Kuswardhani, 2016) mengenai penggunaan amitriptilin pada pasien lansia dengan nyeri neuropati diabetik disimpulkan bahwa insiden efek samping lebih sering terjadi pada pasien lansia yang menerima amitriptilin dibandingkan dengan gabapentin dimana sebagian besar efek samping yang

muncul adalah mulut kering diikuti dengan sedasi atau mengantuk, kelelahan, dan pusing.

Obat kelima yang masuk dalam PIM kategori 1 adalah obat gastrointestinal golongan penghambat pompa proton dan golongan obat antiemetik. Obat golongan penghambat pompa proton yaitu omeprazole sebanyak 4 resep (3,5%), lansoprazole sebanyak 1 resep (0,9%), dan pantoprazole sebanyak 1 resep (0,9%). Mekanisme kerja obat golongan PPI yakni menekan basal lambung dan merangsang sekresi asam dengan menghambat pompa ATP sel parietal H^+ dan K^+ (Wynn et al., 2019). Berdasarkan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* penggunaan obat golongan penghambat pompa proton pada lansia harus dihindari penggunaan terjadwal selama > 8 minggu kecuali untuk pasien berisiko tinggi (misalnya penggunaan kortikosteroid oral atau penggunaan NSAID jangka panjang), esophagitis erosif, kondisi hipersekresi patologis dan penggunaan penghambat pompa proton menyebabkan risiko infeksi *Clostridium difficile*, keropos tulang dan patah tulang. Penelitian terkait kepatuhan PPI dan risiko patah tulang pada lansia menjelaskan kepatuhan tinggi penggunaan PPI memiliki risiko terbesar, lansia dengan kepatuhan menengah juga memiliki risiko patah tulang yang signifikan tetapi lebih rendah daripada kepatuhan tinggi, dan risiko tidak signifikan bagi lansia dengan kepatuhan rendah terhadap terapi PPI (Maes et al., 2018). Penurunan penyerapan kalsium usus untuk paparan PPI juga telah dievaluasi sebagai mekanisme potensial dimana PPI dapat meningkatkan risiko patah tulang. Penelitian yang dilakukan oleh untuk menilai dampak terapi PPI dengan uji silang acak, terkontrol placebo dengan menggunakan omeprazole 20 mg selama tujuh hari memperoleh hasil penyerapan kalsium dapat menurun dalam jangka pendek karena terapi PPI (O'Connell et al., 2018). Studi yang dilakukan pada 1187 pasien rawat inap yang telah menerima antibiotik diikuti dari waktu ke

waktu untuk pengembangan hasil uji positif untuk toksin *Clostridium difficile* dimana pasien diklasifikasikan sebagai pengguna PPI, pengguna antagonis H2, atau bukan pengguna yang memperoleh bahwa penggunaan PPI secara signifikan dikaitkan dengan risiko diare terkait *Clostridium difficile* dan tidak ada pasien yang mengembangkan risiko diare terkait *Clostridium difficile* yang menggunakan antagonis H2 (Dial et al., 2019). Produksi asam klorida yang rendah atau tidak ada dalam sekresi lambung meningkatkan risiko infeksi enterik *Clostridium difficile* (Inghammar et al., 2021).

Obat golongan antiemetik yang masuk dalam PIM kategori 1 adalah metoclopramide sebanyak 3 resep (2,6%). Mekanisme kerja metoclopramide meningkatkan respon terhadap asetilkolin jaringan di saluran pencernaan bagian atas yang menyebabkan peningkatan motilitas dan percepatan pengosongan lambung tanpa merangsang sekresi lambung, empedu, atau pankreas (Wynn et al., 2019). Berdasarkan *Beers Criteria 2019* metoclopramide harus dihindari pada lansia kecuali untuk gastroparesis karena dapat menyebabkan efek ekstrapiramidal, termasuk diskenesia tardif dan risiko ini akan menjadi lebih besar pada lansia yang lemah dan dengan paparan yang lama. Pemberian metoclopramide dapat memicu gejala ekstrapiramidal seperti diskinesia tardif dan parkinsonisme yang umumnya terlihat pada penggunaan jangka panjang, sedangkan distonia dan akatisia dapat terjadi setelah dosis tunggal metoclopramide. Mekanisme yang mendasari yang menyebabkan gejala ekstrapiramidal karena blokade reseptor dopamin D2 striatal yang menyebabkan ketidakseimbangan dopamine-kolinergik. Gejala ekstrapiramidal dapat ditemukan pada dosis yang dianjurkan dan biasanya terjadi dalam 24-72 jam pertama pemberian (Jo et al., 2018). Hal ini didukung oleh studi mengenai efek

ekstrapiramidal metoclopramide dimana pada pasien dengan pemberian dosis tunggal metoclopramide 10 mg mengalami akatisia (Moos & Hansen, 2018).

Obat keenam yang masuk dalam PIM kategori 1 adalah golongan antispasmodik yaitu Clidinium-Chlordiazepoxide sebanyak 1 resep (0,9%). Kombinasi Clidinium-Chlordiazepoxide memiliki sifat sebagai relaksan otot polos dimana kombinasi Clidinium-Chlordiazepoxide dapat mengurangi keluhan akibat gangguan saluran pencernaan (BPOM RI, 2015). Berdasarkan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* harus dihindari pada lansia karena sangat antikolinergik dan efektivitas tidak pasti. Obat kombinasi Clidinium-Chlordiazepoxide telah digunakan untuk pengobatan jangka pendek tetapi memiliki manfaat yang terbatas mengingat risiko yang terkait jangka panjang. Beban antikolinergik dari penggunaan Clidinium-Chlordiazepoxide berhubungan dengan peningkatan efek samping pada lansia seperti kebingungan, kehilangan memori, pusing, patah tulang, dan suasana hati yang tertekan dapat menyebabkan penurunan status fungsional yang parah pada lansia (Farrell et al., 2019).

2) PIM Kategori 2

Berdasarkan tabel 9, PIM kategori 2 pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji periode Januari-Desember 2021 sebanyak 7 resep (6,1%) dimana PIM kategori 2 yaitu penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat pada lansia karena interaksi obat-penyakit atau sindrom-obat yang dapat memperparah penyakit atau sindrom. Obat yang termasuk dalam kategori ini adalah pioglitazone sebanyak 5 resep (4,4%). Berdasarkan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* pioglitazone dihindari atau digunakan hati-hati pada lansia dengan penyakit gagal jantung karena berpotensi untuk meningkatkan retensi cairan dan/atau memperburuk gagal jantung. Pioglitazone merupakan obat yang memiliki efek yang menguntungkan bagi pasien diabetes melitus tipe 2

karena selain menurunkan kadar glukosa darah, pioglitazone memiliki efek menguntungkan pada profil lipid, dan tekanan darah. Namun penambahan berat badan, penurunan nilai hematokrit, edema, gagal jantung, patah tulang dan kemungkinan memburuknya edema macula diabetik merupakan komplikasi yang diakui dari pioglitazone. Retensi cairan dapat memperburuk gagal jantung yang ada sebelumnya dimana pioglitazone juga menyebabkan retensi cairan karena peningkatan produksi faktor pertumbuhan endotel vaskular (Aronso, 2016). Studi prospektif *Pioglitazone Clinical Trial in Macrovascular Events* meneliti kejadian gagal jantung pada pasien yang memakai pioglitazone dibandingkan dengan placebo dimana diperoleh gagal jantung yang menyebabkan masuk rumah sakit terjadi secara signifikan lebih sering pada pasien yang memakai pioglitazone dibandingkan placebo. Studi kasus juga melaporkan seorang pasien yang mengalami gagal jantung kongestif dan edema paru dengan fungsi ventrikel kiri yang normal dalam waktu satu tahun setelah memulai terapi pioglitazone (Jearath et al., 2016).

Obat lainnya yang masuk dalam kategori 2 adalah obat NSAID yakni ibuprofen sebanyak 2 resep (1,8%). Berdasarkan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* NSAID dihindari atau digunakan hati-hati pada lansia dengan penyakit gagal jantung karena berpotensi untuk meningkatkan retensi cairan dan/atau memperburuk gagal jantung. Penghambatan produksi prostanoide di ginjal dapat mengurangi filtrasi glomerulus dan ekskresi natrium dan air. Oleh karena itu NSAID dikaitkan dengan risiko hipervolemia dan perburukan gagal jantung (Varga et al., 2017)

3) PIM Kategori 3

Berdasarkan tabel 9, pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji periode Januari-Desember 2021 terdapat PIM

kategori 3 sebanyak 33 resep (28,9%) dimana PIM kategori 3 adalah obat yang harus digunakan dengan hati-hati pada lansia. Pada kategori ini kejadian terbanyak yaitu pada obat diuretik furosemide sebanyak 11 resep (9,6%) dan hidroklorothiazid sebanyak 7 resep (6,1%) diikuti dengan obat lainnya seperti chlortalidone sebanyak 3 resep (2,6%) dan spironolactone sebanyak 1 resep (0,9%). Furosemide merupakan golongan diuretik loop dengan mekanisme kerja menurunkan penyerapan natrium dan klorida di lengkung henle dan tubulus proksimal dan distal ginjal (Wynn et al., 2019). Hidroklorothiazid dan chlortalidone merupakan diuretik thiazid dengan mekanisme kerja menghambat reabsorpsi natrium di tubulus distal menyebabkan peningkatan ekskresi natrium dan air serta ion kalium dan hidrogen (Wynn et al., 2019). Spironolactone merupakan diuretik hemat kalium dengan mekanisme kerja bersaing dengan aldosteron untuk situs reseptor di tubulus distal ginjal, meningkatkan ekskresi natrium klorida dan air dengan tetap mempertahankan ion kalium dan hidrogen (Wynn et al., 2019). Berdasarkan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* obat-obatan ini harus digunakan dengan hati-hati pada lansia karena dapat memperburuk atau menyebabkan SIADH (*Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone*) atau hiponatremia sehingga diperlukan pemantauan kadar natrium dengan cermat saat memulai atau mengubah dosis pada orang dewasa yang lebih tua. Hiponatremia (natrium serum < 136 mEq/L) adalah ketidakseimbangan elektrolit. Gangguan elektrolit ini sering terjadi pada pasien lansia dengan usia > 60 tahun yang menjadi faktor risiko untuk terjadinya hiponatremia. Kecenderungan diuretik untuk menyebabkan hiponatremia disebabkan penghambatan pengenceran urine karena berkurangnya reabsorpsi NaCl di tubulus distal ginjal (Liamis et al., 2016).

Obat kedua yang masuk dalam kategori 3 adalah aspirin sebanyak 5 resep (4,4%) yang berdasarkan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* digunakan dengan

hati-hati pada pasien lansia berusia ≥ 70 tahun karena risiko pendarahan besar dari aspirin meningkat tajam pada usia yang lebih tua. Aspirin memiliki mekanisme kerja menghambat enzim COX-1 dan 2 melalui asetilasi, yang menghasilkan penurunan pembentukan precursor prostaglandin; menghambat pembentukan turunan prostaglandin, tromboksan A₂, melalui asetilasi siklooksigenase trombosit, sehingga menghambat agregasi trombosit; memiliki sifat antipiretik, analgesik dan anti-inflamasi (Wynn et al., 2019). Blokade COX-2 menurunkan sintesis protasiklin (PGI₂), vasodilator kuat dan penghambat agregasi trombosit, dan prostaglandin lain E₂ (PGE₂) yang terlibat dalam kontrol tekanan darah (Costa et al., 2017). Dampak aspirin lebih besar untuk pendarahan gastrointestinal bagian atas dimana aspirin menginduksi efek lokal dengan cedera mukosa dengan berkurangnya sekresi mukus dan bikarbonat, dan efek sistemik dari deplesi prostaglandin dan inaktivasi trombosit (Mahady et al., 2021). Penelitian yang dilakukan pada lansia berusia 70 tahun ke atas dan tidak memiliki penyakit kardiovaskular, demensia dan disabilitas. Peserta secara acak menerima 100 mg aspirin atau placebo salut enterik diperoleh hasil penggunaan aspirin dosis rendah sebagai strategi pencegahan utama pada lansia menghasilkan risiko pendarahan mayor secara signifikan (McNeil et al., 2018).

Obat ketiga yang masuk dalam kategori 3 adalah amitriptilin sebanyak 4 resep (3,5%) yang merupakan antidepresan trisiklik dengan mekanisme kerja meningkatkan konsentrasi sinaptik serotonin dan/atau norepinefrin di sistem saraf pusat dengan menghambat ambilan kembali serotonin dan/atau norepinefrin oleh pompa membrane neuron prasinaps (Wynn et al., 2019). Amitriptilin banyak digunakan untuk mengobati nyeri neuropati (RA et al., 2019). Berdasarkan *Beers Criteria 2019* penggunaan amitriptilin juga masuk ke dalam kategori 3 yang digunakan dengan hati-hati pada lansia karena dapat memperburuk atau

menyebabkan SIADH (*Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone*) atau hiponatremia sehingga diperlukan pemantauan kadar natrium dengan cermat saat memulai atau mengubah dosis pada orang dewasa yang lebih tua. Hiponatremia adalah salah satu dari banyak efek samping dari antidepresan. Ginjal mengontrol ekskresi air dan elektrolit ginjal dan menjaga osmolalitas serum dan natrium dalam kisaran sempit. Hormon yang mempengaruhi penanganan air dan elektrolit oleh ginjal adalah hormon antidiuretik (ADH). Mekanisme hiponatremia yang dihasilkan oleh antidepresan berupa peningkatan ADH atau peningkatan respon ginjal terhadap ADH. ADH mengikat reseptor V2 di ginjal dan menyebabkan peningkatan reabsorpsi air di saluran pengumpul (Leth-Møller et al., 2016).

Obat keempat yang masuk dalam kategori ini trimethoprim-sulfamethoxazole sebanyak 2 resep (1,8%) merupakan antibiotik kombinasi yang berdasarkan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* digunakan hati-hati pada pasien lansia yang mengkonsumsi obat ACEI atau ARB karena dapat menyebabkan peningkatan risiko hiperkalemia bila digunakan bersamaan dengan ACEI atau ARB. *Angiotensin -converting enzyme inhibitor* (ACEI) dan *Angiotensin receptor blocker* (ARB) adalah terapi dasar pasien dengan penyakit hipertensi, gagal jantung kongestif. Meskipun ACEI dan ARB umumnya ditoleransi dengan baik, potensi hiperkalemia serius merupakan pertimbangan penting pada pasien yang menerima obat ini. Penelitian yang dilakukan pada pasien lansia usia 66 tahun ke atas menjelaskan sebanyak 4148 pasien lansia yang dirawat dengan hiperkalemia setelah menerima antibiotik trimethoprim-sulfamethoxazole dan juga disertai terapi ACEI atau ARB, sehingga disimpulkan penggunaan trimethoprim-sulfamethoxazole dikaitkan dengan peningkatan besar risiko hiperkalemia dimana mekanisme penggunaan trimethoprim dapat memicu hiperkalemia pada pengguna ACEI atau ARB terkait dengan penghambatan saluran natrium pada luminal tuba

distal yang mengakibatkan reabsorpsi natrium sekresi kalium terganggu yang mempengaruhi individu rentan terhadap hiperkalemia (Antoniou et al., 2018).

4) PIM Kategori 4

Berdasarkan tabel 9, PIM kategori 4 pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji periode Januari-Desember 2021 sebanyak 1 resep (0,9%) yang merupakan interaksi obat-obat yang harus dihindari pada lansia. Pada kategori ini terdapat obat prednisone-ibuprofen sebanyak 1 resep (0,9%). interaksi antara obat golongan kortikosteroid dan golongan NSAID dimana penggunaan obat ini berdasarkan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* harus dihindari pada lansia karena interaksi obat ini dapat meningkatkan risiko penyakit tukak lambung dan pendarahan gastrointestinal. NSAID merupakan obat nyeri yang paling sering diresepkan yang merupakan kelas obat yang sangat efektif untuk nyeri dan peradangan; namun NSAID dikenal dengan beberapa efek samping, termasuk pendarahan gastrointestinal, efek samping kardiovaskular, dan nefrotoksisitas yang diinduksi NSAID (Wongrakpanich et al., 2018). Mekanisme kortikosteroid dapat menyebabkan pendarahan gastrointestinal belum sepenuhnya ditetapkan, tetapi kortikosteroid dapat mengganggu perbaikan jaringan, sehingga menyebabkan penundaan penyembuhan luka, selain itu anti-inflamasi dan sifat analgesik kortikosteroid dapat menutupi gejala tukak lambung dan komplikasi tukak dan dengan demikian menunda diagnosis (Narum et al., 2019). Penggunaan kombinasi kortikosteroid oral dan NSAID dapat meningkatkan potensi toksisitas gastrointestinal yang serius. Studi yang dilakukan terhadap pasien 65 tahun yang dirawat inap di rumah sakit untuk tukak lambung atau pendarahan gastrointestinal menemukan bahwa penggunaan kortikosteroid oral saat ini dikaitkan dengan risiko dua kali lipat lebih tinggi dari penyakit tukak lambung dibandingkan dengan yang tidak menggunakan. Hal ini didukung dengan studi informasi medis

arthritis, dan rematik, menemukan bahwa untuk pasien yang menerima terapi kortikosteroid ditambah dengan terapi bersamaan lain, risiko kejadian gastrointestinal serius secara signifikan pada pasien rheumatoid arthritis (Moore et al., 2015).

5) PIM Kategori 5

Berdasarkan tabel 9, pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji periode Januari-Desember 2021 sebanyak 2 resep (1,8%). PIM kategori 5 adalah obat-obatan yang harus dihindari atau dosisnya dikurangi dengan tingkatan fungsi ginjal pada lansia. Jenis pemeriksaan fungsi ginjal antara lain pemeriksaan urea dan pemeriksaan kreatinin. Kadar kreatinin serum sudah banyak digunakan untuk mengukur fungsi ginjal melalui pengukuran klirens kreatinin dan GFR (*Glomerulus Filtration Rate*). Tolak ukur fungsi ginjal yang digunakan dalam *Beers Criteria 2019* adalah klirens kreatinin dan dilaporkan dalam mL/menit.

Penggunaan obat ranitidin ditemukan sebanyak 1 resep (0,9%). Ranitidin merupakan golongan obat antagonis H_2 dengan mekanisme kerja penghambatan kompetitif histamin pada reseptor H_2 sel parietal lambung, volume lambung, dan konsentrasi ion hidrogen berkurang (Wynn et al., 2019). Berdasarkan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* penggunaan ranitidine harus dikurangi dosisnya pada pasien lansia dengan kadar klirens kreatinin <50 mL/menit karena dapat menyebabkan perubahan status mental. Perubahan status mental seperti kebingungan, halusinasi, dan agitasi dapat terjadi pada pemberian antagonis H_2 terutama pada pasien yang berusia lanjut atau yang mengalami disfungsi ginjal atau hati (Katzung et al., 2012). Rekomendasi dosis ranitidin dengan kadar klirens kreatinin <50 mL/menit yaitu 150 mg setiap 24 jam secara oral, atau 50 mg secara intravena atau intramuscular setiap 18-24 jam (Beyth & Shorr, 2017).

Selanjutnya obat yang ditemukan masuk dalam kategori ini adalah gabapentin sebanyak 1 resep (0,9%). Gabapentin adalah obat antikonvulsif yang digunakan sebagai relaksan otot dan antispasmodik, serta digunakan dalam beberapa jenis kontrol nyeri saraf seperti diabetes neuropatik (Yasaei et al., 2020). Berdasarkan *Beers Criteria 2019* penggunaan gabapentin harus dikurangi dosisnya pada pasien lansia dengan kadar klirens kreatinin <60 mL/menit karena dapat menyebabkan efek samping sistem saraf pusat. Penelitian yang dilakukan terhadap pasien diabetes yang mengalami neuropati diabetik dimana pasien dibagi menjadi kelompok penerima gabapentin dan penerima duloxetine. Efek samping secara signifikan lebih tinggi pada kelompok gabapentin dibandingkan dengan kelompok duloxetine dimana efek samping yang paling umum pada kelompok gabapentin adalah sulit tidur, dan kelelahan (Majdinasab et al., 2019). Waktu paruh eliminasi obat gabapentin adalah 6,5 jam terutama diekskresikan di ginjal dan terjadi peningkatan waktu paruh dengan penurunan fungsi ginjal, sehingga diperlukan penyesuaian dosis untuk pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal (Wynn et al., 2019). Hal ini perlu diperhatikan pada lansia karena terjadi penurunan rata-rata pembersihan ginjal sebanyak 50% yang berdampak pada efek perpanjangan paruh waktu obat. Perhitungan kadar klirens kreatinin direkomendasikan untuk menyesuaikan dosis obat pada lansia (Chisholm-Burns et al., 2016). Rekomendasi dosis yang dianjurkan untuk gabapentin yaitu 300 mg sampai 1,2 g 3 kali sehari untuk kadar klirens kreatinin ≥ 60 mL/menit, sedangkan untuk kadar klirens kreatinin >30 mL/menit sampai 59 mL/menit dosis gabapentin yang direkomendasikan yakni 200 mg 2 kali sehari (Wynn et al., 2019).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejadian obat yang berpotensi tidak tepat atau dikenal *Potentially Inappropriate Medications* (PIM) terkait polifarmasi pada pasien geriatri diabetes melitus tipe di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji menggunakan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* ialah 89,1%
2. PIM kategori 1 berdasarkan alat evaluasi *Beers Criteria 2019* sebanyak 62,3% dengan obat terbanyak adalah obat antidiabetes (31,6%) yang terdiri atas glimepiride (16,7%) dan glibenklamid (14,9%)
3. PIM kategori 2 berdasarkan alat evaluasi *Beers criteria 2019* sebanyak 6,1% dengan obat terbanyak ialah obat antidiabetes pioglitazone (4,4%)
4. PIM kategori 3 berdasarkan alat evaluasi *Beers criteria 2019* sebanyak 28,9% dengan obat terbanyak ialah furosemide (9,6%)
5. PIM kategori 4 berdasarkan alat evaluasi *Beers criteria 2019* sebanyak 0,9% yakni kombinasi kortikosteroid-NSAID yang terdiri dari kombinasi prednisone-ibuprofen (0,9%)
6. PIM kategori 5 berdasarkan alat evaluasi *Beers criteria 2019* sebanyak 1,8% yang terdiri dari obat ranitidine (0,9%) dan gabapentin (0,9%)

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan monitoring pemberian obat terkait risiko yang dapat terjadi yang berpotensi menimbulkan kejadian obat yang merugikan untuk pasien pada pengobatan polifarmasi terutama pada pasien geriatri

2. Sebaiknya kolaborasi antar tenaga kesehatan perlu ditingkatkan agar dapat saling bekerja sama dalam meningkatkan mutu pelayanan
3. Evaluasi polifarmasi bersifat teoritis sesuai alat evaluasi *Beers Criteria 2019*, sehingga pemberian obat dikembalikan ke kondisi pasien



DAFTAR PUSTAKA

- ADA. *Glycemic targets: Standards of medical care in diabetes 2019*. Diabetes Care, 42(January), S61–S70. (2019).
- Adi Jaya, M. K., & Kuswardhani, R. A. T. *Safety Comparison between Amitriptyline versus Gabapentin on Neuropathic Pain Therapy in Geriatric with Type II Diabetes Mellitus*. Bali Medical Journal, 5(3), 129. (2016).
- AGS. *A Pocket Guide To The 2019 AGS Beers Criteria*. In American Geriatrics Society (Vol. 25, Issue 11). (2019).
- Al Asqalani, I. H., & Al Hafizh, A. I. *FATHUL BAARI Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Buku 28* (28th ed.). Pustaka Azzam. (2016).
- Antoniou, T., Gomes, T., Juurlink, D. N., Loutfy, M. R., Glazier, R. H., & Mamdani, M. M. *Trimethoprim-Sulfamethoxazole-Induced Hyperkalemia In Patients Receiving Inhibitors Of The Renin-Angiotensin System: A Population-Based Study*. Archives of Internal Medicine, 170(12), 1045–1049. (2018).
- Aronso, J. K. *Meyler's Side Effects Of Drugs The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions (Sixteenth)*. Elsevier Inc. (2016).
- Avdhoot, K., Pandit, V. A., Ashish, M., Ravikant, P., & Abhijit, U. *Higher Mortality Of Diabetic Patients In Heart Failure: Role Of Digoxin*. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 8(3), 633–642. (2021).
- Beyth, R. J., & Shorr, R. I. *Drugs for the Geriatric Patient*. Elsevier Inc. (2017).
- BPOM RI. *Antispasmodik dan Obat-Obat Lain yang Mempengaruhi Motilitas Saluran Cerna*. Pusat Informasi Obat Nasional, Badan POM RI. (2015).
- BPS. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021*. Badan Pusat Statistik Indonesia, 1–288. (2021).
- Brkić, J., Laffon, B., Reissigová, J., Grešáková, S., Dogan, S., Doro, P., Tasić, L., Marinković, V., Valdiglesias, V., Costa, S., Kostřiba, J., & Fialová, D. *Applicability of EU(7)-PIM criteria in cross-national studies in European countries*. Therapeutic Advances in Drug Safety, 10, 1–22. (2019).
- Chisholm-Burns, M., Schwinghammer, T., Wells, B., Malone, P., Kolesar, J., & Dipiro, J. *Pharmacotherapy Principles and Practice* (Fourth Edi). McGraw Hill Education. (2016).
- Costa, A. C., Reina-Couto, M., Albino-Teixeira, A., & Sousa, T. *Aspirin and blood pressure: Effects when used alone or in combination with antihypertensive drugs*. Revista Portuguesa de Cardiologia, 36(7–8), 551–567. (2017)

- Crowe, S. F., & Stranks, E. K. *The Residual Medium and Long-term Cognitive Effects of Benzodiazepine Use: An Updated Meta-analysis*. Archives of Clinical Neuropsychology : The Official Journal of the National Academy of Neuropsychologists, 33(7), 901–911. (2018).
- Dial, S., Alrasadi, K., Manoukian, C., Huang, A., & Menzies, D. *Risk Of Clostridium Difficile Diarrhea Among Hospital Inpatients Prescribed Proton Pump Inhibitors: Cohort And Case-Control Studies*. Canadian Medical Association, 410(8867), 33–38. (2019).
- Dipiro, J., Talbert, R., Yee, G., Matzke, G., Wells, B., & Posey, L. *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach* (Tenth Edit). McGraw-Hill Education. (2017).
- Farrell, B., Eisener-Parsche, P., & Dalton, D. *Turning Over The Rocks: Role Of Anticholinergics And Benzodiazepines In Cognitive Decline And Falls*. Canadian Family Physician Medecin de Famille Canadien, 60(4), 345–350. (2019).
- Fauziyah, S., Radji, M., & Andrajati, R. *Polypharmacy In Elderly Patients And Their Problems*. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 10(7). (2018).
- Fick, D. M., Semla, T. P., Steinman, M., Beizer, J., Brandt, N., Dombrowski, R., DuBeau, C. E., Pezzullo, L., Epplin, J. J., Flanagan, N., Morden, E., Hanlon, J., Hollmann, P., Laird, R., Linnebur, S., & Sandhu, S. *American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults*. Journal of the American Geriatrics Society, 67(4), 674–694. (2019).
- Fixen, D. R. *2019 AGS Beers Criteria for older adults*. Pharmacy Today, 25(11), 42–54. (2019).
- Frishman, W., & Kotob, F. *Alpha-Adrenergic Blocking Drugs In Clinical Medicine*. J Clin Pharmacol. (2017).
- Gray, S. L., Dublin, S., Yu, O., Walker, R., Anderson, M., Hubbard, R. A., Crane, P. K., & Larson, E. B. *Benzodiazepine use and risk of incident dementia or cognitive decline: Prospective population based study*. BMJ (Online), 352. (2016).
- Hajjar, E., Hanlon, J., & Sloane, R. *Unnecessary Drug Use In Frail Older People At Hospital Discharge*. J Am Geriatr Soc. (2015).
- Hosseini, S., Zabihi, A., Jafarian Amiri, S., & Bijani, A. *Polypharmacy Among The Elderly*. Journal of Mid-Life Health, 9(2), 97–103. (2018)
- IDF. *IDF Diabetes Atlas*. In The Lancet (Ninth Edit). (2019).

- Inghammar, M., Svanström, H., Voldstedlund, M., Melbye, M., Hviid, A., Mølbak, K., & Pasternak, B. *Proton-Pump Inhibitor Use and the Risk of Community-Associated Clostridium difficile Infection*. *Clinical Infectious Diseases*, 72(12), E1084–E1089. (2021).
- Jearath, V., Vashisht, R., Rustagi, V., Raina, S., & Sharma, R. *Pioglitazone-Induced Congestive Heart Failure And Pulmonary Edema In A Patient With Preserved Ejection Fraction*. *Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics*, 7(1), 41–43. (2016).
- Jo, Y. Y., Kim, Y. B., Yang, M. R., & Chang, Y. J. *Extrapyramidal Side Effects After Metoclopramide Administration In A Post-Anesthesia Care Unit - A Case Report*. *Korean Journal of Anesthesiology*, 63(3), 274–276. (2018).
- Katzung, B. G., Masters, S. B., & Trevor, A. J. *Basic And Clinical Pharmacology*. In *Annual Reports in Medicinal Chemistry* (Twelfth Ed, Vol. 12, Issue C). The McGraw-Hill Companies, Inc. (2012).
- Kemenkes. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2016. Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019*. (2016).
- Kemenkes. *Tetap Produktif, Cegah Dan Atasi Diabetes Mellitus*. In *pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI* (pp. 1–10). (2020).
- Khezrian, M., McNeil, C., Murray, A., & Myint, P. *An Overview Of Prevalence, Determinants And Health Outcomes Of Polypharmacy*. *Therapeutic Advances in Vaccines*, 11, 1–10. (2020).
- Kim, J., & Parish, A. L. *Polypharmacy and Medication Management in Older Adults*. *Nursing Clinics of North America*, 52(3), 457–468. (2017).
- Leonard, C. E., Han, X., Brensinger, C. M., Bilker, W. B., Cardillo, S., Flory, J. H., & Hennessy, S. (2018). *Comparative Risk Of Serious Hypoglycemia With Oral Antidiabetic Monotherapy: A Retrospective Cohort Study*. *Pharmacoepidemiology and Drug Safety*, 27(1), 9–18. (2018).
- Leth-Møller, K. B., Hansen, A. H., Torstensson, M., Andersen, S. E., Ødum, L., Gislason, G., Torp-Pedersen, C., & Holm, E. A. *Antidepressants And The Risk Of Hyponatremia: A Danish Register-Based Population Study*. *BMJ Open*, 6(5), 1–8. (2016).
- Liamis, G., Filippatos, T. D., & Elisaf, M. S. *Thiazide-associated hyponatremia in the elderly: What the clinician needs to know*. *Journal of Geriatric Cardiology*, 13(2), 175–182. (2016).
- Ma, Z., Tong, Y., Zhang, C., & Liu, L. *Potentially inappropriate medications and potentially prescribing omissions in Chinese older patients: Comparison of two versions of STOPP/START*. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 45(6), 1405–1413. (2020).

- Maes, M. L., Fixen, D. R., & Linnebur, S. A. *Adverse effects of proton-pump inhibitor use in older adults*. *Herapeutic Advances in Drug Safety Journals SagepUb*, 9(6), 259–261. (2018).
- Mahady, S. E., Margolis, K. L., Chan, A., Polekhina, G., Robyn, L., Wolfe, R., Nelson, M. R., Lockery, J. E., Wood, E. M., Ernst, M. E., Murray, A., Thao, L. T. P., & Mcneil, J. J. *Major GI bleeding in older persons using aspirin: incidence and risk factors in the ASPREE randomised controlled trial*. 70(4), 717–724. (2021).
- Mair, A., Fernandez-Llimos, F., Alonso, A., Harrison, C., & Hurding, S. *Polypharmacy Management by 2030: A Patient Safety Challenge Stimulating Innovation Management of Polypharmacy and Adherence In The Elderly*. (2017).
- Majdinasab, N., Kaveyani, H., & Azizi, M. *A Comparative Double-Blind Randomized Study On The Effectiveness Of Duloxetine And Gabapentin On Painful Diabetic Peripheral Polyneuropathy*. *Drug Design, Development and Therapy*, 13, 1985–1992. (2019).
- McNeil, J. J., Wolfe, R., Woods, R. L., Tonkin, A. M., Donnan, G. A., Nelson, M. R., Reid, C. M., Lockery, J. E., Kirpach, B., Storey, E., Shah, R. C., Williamson, J. D., Margolis, K. L., Ernst, M. E., Abhayaratna, W. P., Stocks, N., Fitzgerald, S. M., Orchard, S. G., Trevaks, R. E., ... Murray, A. M. *Effect of Aspirin on Cardiovascular Events and Bleeding in the Healthy Elderly*. *New England Journal of Medicine*, 379(16), 1509–1518. (2018).
- Midlov, P., Eriksson, T., & Kragh, A. *Drug-related Problems in the Elderly*. Springer International Publishing. (2019).
- Moore, N., Pollack, C., & Butkerait, P. *Adverse Drug Reactions And Drug–Drug Interactions With Over-The-Counter Nsaids*. *Therapeutics and Clinical Risk Management*, 11, 1061–1075. (2015).
- Moos, D. D., & Hansen, D. J. *Metoclopramide and Extrapyramidal Symptoms: A Case Report*. *Journal of Perianesthesia Nursing*, 23(5), 292–299. (2018).
- Morgan, T., & Anderson, A. *The Effect Of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs On Blood Pressure In Patients Treated With Different Antihypertensive Drugs*. *Journal of Clinical Hypertension*, 5(1), 53–57. (2018).
- Muharni, S., Aryani, F., Fadillah, R., & Tinggi Ilmu Farmasi Riau, S. *Analisis Jumlah Obat Terhadap Potentially Inappropriate Medications (Pims) Berdasarkan Beers Criteria 2015 Pada Pasien Hipertensi Geriatri Di Puskesmas Sidomulyo Kota Pekanbaru*. *Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia*, 7(2), (2019).
- Mujović, N., Dobrev, D., Marinković, M., Russo, V., & Potpara, T. S. *The Role Of Amiodarone In Contemporary Management Of Complex Cardiac*

- Arrhythmias*. Pharmacological Research, 151. (2020).
- Narum, S., Westergren, T., & Klemp, M. *Corticosteroids And Risk Of Gastrointestinal Bleeding: A Systematic Review And Meta-Analysis*. BMJ Open, 4(5), 1–9. (2019).
- Neft, M. W., Oerther, S., Halloway, S., Hanneman, S. K., & Mitchell, A. M. *Benzodiazepine And Antipsychotic Medication Use In Older Adults*. Nursing Open, 7(1), 4–6. (2020).
- Nobilli, A., Licata, G., Salerno, F., Pasina, L., & Tettamanti, M. *Polypharmacy, Length Of Hospital Stay And Inpatient Mortality Among Elderly Patients In Internal Medicine Wards*. Eur J Clin Pharmacol. (2016).
- O'Connell, M. B., Madden, D. M., Murray, A. M., Heaney, R. P., & Kerzner, L. J. *Effects Of Proton Pump Inhibitors On Calcium Carbonate Absorption In Women: A Randomized Crossover Trial*. American Journal of Medicine, 118(7), 778–781. (2018).
- Ottawa. *Glyburide, Gliclazide Or Glimepiride For Elderly Patients With Type 2 Diabetes: A Review Of The Clinical Effectiveness And Safety*. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. (2015).
- Perkeni. *Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2021*. Perkeni, (2021).
- RA, M., S, D., D, A., P, C., & PJ., W. *Amitriptyline For Neuropathic Pain In Adults*. (2019).
- Remelli, F., Ceresini, M. G., Trevisan, C., Noale, M., & Volpato, S. *Prevalence And Impact Of Polypharmacy In Older Patients With Type 2 Diabetes*. Aging Clinical and Experimental Research. (2022).
- RI, K. A. *Qur'an Kemenag*. (2021).
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. (2020).
- Salwe, K. J., Kalyansundaram, D., & Bahurupi, Y. *A Study On Polypharmacy And Potential Drug-Drug Interactions Among Elderly Patients Admitted In Department Of Medicine Of A Tertiary Care Hospital In Puducherry*. Journal Of Clinical And Diagnostic Research. (2016).
- Shihab, Q. M. *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Penerbit Lentera Hati. (2009).
- Siswanto, Susila, & Suyanto. *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran*. Bursa Ilmu. (2018).
- Srinivasan, M., Ahmad, L., Bhindi, R., & Allahwala, U. *Amiodarone In The Aged*. Australian Prescriber, 42(5), 158–162. (2019).

Stanton, M. M., Samii, L., Leung, G., & Pearce, P. *Amiodarone-Induced Neuromyopathy In A Geriatric Patient*. BMJ Case Reports, 13(11), 1–3. (2020).

Triyanti, E., & Weningsih, R. *Manajemen Informasi Kesehatan III*. (2018)

Unlu, O., Levitan, E. B., Reshetnyak, E., Kneifati-Hayek, J., Diaz, I., Archambault, A., Chen, L., Hanlon, J. T., Maurer, M. S., Safford, M. M., Lachs, M. S., & Goyal, P. *Polypharmacy in Older Adults Hospitalized for Heart Failure*. Circulation: Heart Failure, October, 577–588. (2020).

Varga, Z., Sabzwari, S. rafay ali, & Vargova, V. *Cardiovascular Risk of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: An Under-Recognized Public Health Issue*. Cureus, 9(4). (2017).

WHO. *Medication Safety in Polypharmacy. Technical report*. 1–63. (2019).

WHO. *Diabetes*. (2021).

Wongrakpanich, S., Wongrakpanich, A., Melhado, K., & Rangaswami, J. A *Comprehensive Review Of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug Use In The Elderly*. Aging and Disease, 9(1), 143–150. (2018).

Wynn, L. R., Meiller, F. T., & Crossley, L. H. *Drug Information Handbook (25th Editi)*. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. (2019).

Yakaryilmaz, F. D., & Ozturk, A. Z. *World Journal Of Diabetes*. 9358(6). (2017).

Yasaei, R., Katta, S., & Saadabadi, A. Gabapentin. In *NCBI Bookshelf*. StatPearls Publishing LLC. (2020).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Penelitian



Lampiran 2. Beers Criteria 2019

From THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY		
A POCKET GUIDE TO THE		
2019 AGS BEERS CRITERIA®		
This guide has been developed as a tool to assist healthcare providers in improving medication safety in older adults. The role of this guide is to inform clinical decision-making, research, training, quality measures and regulations concerning the prescribing of medications for older adults to improve safety and quality of care. It is based on <i>The 2019 AGS Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults</i>. Originally conceived of in 1991 by the late Mark Beers, MD, a geriatrician, the Beers Criteria catalogues medications that cause side effects in older adults due to the physiologic changes of aging. In 2011, the AGS sponsored its first update of the criteria, assembling a team of experts and using an enhanced, evidence-based methodology. Since 2011, the AGS has been the steward of the criteria and has produced updates using an evidence-based methodology and rating each Criterion (quality of evidence and strength of evidence) using the American College of Physicians' Guideline Grading System, which is based on the GRADE scheme developed by Guyatt et al. The full document, along with accompanying resources, can be found in its entirety online at geriatriccareonline.org.		
INTENDED USE The goal of this guide is to improve care of older adults by reducing their exposure to Potentially Inappropriate Medications (PIMs). ■ This should be viewed as a guideline for identifying medications for which the risks of their use in older adults outweigh the benefits. ■ These criteria are not meant to be applied in a punitive manner. ■ This list is not meant to supersede clinical judgment or an individual patient's values and needs. Prescribing and managing disease conditions should be individualized and involve shared decision-making. ■ These criteria also underscore the importance of using a team approach to prescribing and the use of non-pharmacologic approaches and of having economic and organizational incentives for this type of model. ■ A companion piece that addresses the best way for patients, providers, and health systems to use (and not use) the AGS Beers Criteria® was also developed. The document can be found on geriatriccareonline.org.		
AGS THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY Geriatrics Health Professionals. Leading change. Improving care for older adults.		

TABLE 1. 2019 American Geriatrics Society Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults		
Organ System, Therapeutic Category, Drug(s)	Recommendation, Rationale, Quality of Evidence (DE), Strength of Recommendation (SR)	
Anticholinergics *		
First-generation anticholinergics:	Avoid	
■ Brompheniramine	Highly anticholinergic; clearance reduced with advanced age, and tolerance develops when used as hypnotic; risk of confusion, dry mouth, constipation, and other anticholinergic effects or toxicity	
■ Carbinroxamine		
■ Chlorpheniramine		
■ Clemastine		
■ Cyproheptadine		
■ Dextromethorphan	Use of diphtheryl/amine in situations such as acute treatment of severe allergic reaction may be appropriate	
■ Doxylamine	DE = Moderate, SR = Strong	
■ Diphenhydramine (oral)		
■ Doxylamine		
■ Hydroxyzine		
■ Meclizine		
■ Promethazine		
■ Pyrilamine		
■ Triprolidine		
Antiparkinsonian agents		
■ Benztropine (oral)	Avoid	
■ Trihexyphenidyl	Not recommended for prevention of extrapyramidal symptoms with antipsychotics; more effective agents available for treatment of Parkinson disease	
	DE = Moderate, SR = Strong	
Antispaasmodics:		
■ Atropine (excludes ophthalmic)	Avoid	
■ Belladonna alkaloids	Highly anticholinergic; uncertain effectiveness	
■ Cidarium	DE = Moderate, SR = Strong	
■ Chlorazepoxide		
■ Dicyclanone		
■ Homatropine (excludes ophthalmic)		
■ Hyoscine		
■ Methoclopramide		
■ Propantheline		
■ Scopolamine		
Antihypertensives		
■ Dipyridamol, oral	Avoid	
■ Short-acting does not apply to the extended-release combination with aspirin)	Rationale: May cause orthostatic hypotension; more effective alternatives available; IV form acceptable for use in cardiac stress testing	
	DE = Moderate, SR = Strong	

*See also criterion on highly anticholinergic antidepressants

CNS=central nervous system, NSAID=nonsteroidal anti-inflammatory drugs, GIADH, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone.

Table 1 (Continued)

Organ System, Therapeutic Category, Drug(s)	Recommendation, Rationale, QE, SR
Anti-infective	
■ Nitrofurantoin	Avoid in individuals with creatinine clearance <30 mL/min or for long-term suppression Potential for pulmonary toxicity, hepatotoxicity, and peripheral neuropathy, especially with long-term use; safer alternatives available QE = Low; SR = Strong
Cardiovascular	
Peripheral alpha-1 blockers for treatment of hypertension	Avoid use as an antihypertensive High risk of orthostatic hypotension and associated harms, especially in older adults; not recommended as routine treatment for hypertension; alternative agents have superior risk/benefit profile
■ Doxazosin ■ Prazosin ■ Terazosin	QE = Moderate; SR = Strong
Central-alpha agonists	Avoid clonidine as first-line antihypertensive. Avoid other CNS alpha-agonists as listed High risk of adverse CNS effects; may cause bradycardia and orthostatic hypotension; not recommended as routine treatment for hypertension
■ Clonidine for first-line treatment of hypertension ■ Other CNS alpha-agonists	QE = Low; SR = Strong
■ Guanabenz ■ Methyldopa ■ Reserpine (>0.1 mg/d)	
Disopyramide	Avoid May induce heart failure in older adults because of potent negative inotropic action; strongly anticholinergic; other antiarrhythmic drugs preferred QE = Low; SR = Strong
Dronedarone	Avoid in individuals with permanent atrial fibrillation or severe or recently decompensated heart failure Worse outcomes have been reported in patients taking dronedarone who have permanent atrial fibrillation or severe or recently decompensated heart failure QE = High; SR = Strong

Table 1 (Continued)

Organ System, Therapeutic Category, Drug(s)	Recommendation, Rationale, QE, SR
Digoxin for first-line treatment of atrial fibrillation or of heart failure	Avoid this rate control agent as first-line therapy for atrial fibrillation. Avoid as first-line therapy for heart failure. If used for atrial fibrillation or heart failure, avoid dosages >0.125 mg/d Use in atrial fibrillation: should not be used as a first-line agent in atrial fibrillation, because there are safer and more effective alternatives for rate control supported by high-quality evidence. Use in heart failure: evidence for benefits and harms of digoxin is conflicting and of lower quality; most but not all of the evidence concerns use in heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF). There is strong evidence for other agents as first-line therapy to reduce hospitalizations and mortality in adults with HFrEF. In heart failure, higher dosages are not associated with additional benefit and may increase toxicity. Decreased renal clearance of digoxin may lead to increased risk of toxic effects; further dose reduction may be necessary in those with Stage 4 or 5 chronic kidney disease. QE = Atrial fibrillation: Low; Heart failure: Low Dosage >0.125 mg/d: Moderate; SR = Atrial fibrillation: Strong; Heart failure: Strong; Dosage >0.125 mg/d: Strong
Nifedipine, immediate release	Avoid Potential for hypotension; risk of precipitating myocardial ischemia QE = High; SR = Strong
Amiodarone	Avoid as first-line therapy for atrial fibrillation unless the patient has heart failure or substantial left ventricular hypertrophy Effective for maintaining sinus rhythm but has greater toxicities than other antiarrhythmics used in atrial fibrillation; may be reasonable first-line therapy in patients with concomitant heart failure or substantial left ventricular hypertrophy if rhythm control is preferred over rate control QE = High; SR = Strong
Central nervous system	
Antidepressants, alone or in combination:	Avoid Highly anticholinergic, sedating, and cause orthostatic hypotension; safety profile of low-dose doxepin (s6 mg/d) comparable to that of placebo QE = High; SR = Strong
■ Amitriptyline ■ Amoxapine ■ Clomipramine ■ Desipramine ■ Doxepin >6 mg/d ■ Imipramine ■ Nortriptyline ■ Paroxetine ■ Protriptyline ■ Trimipramine	

Table 1 Continued

Organ System, Therapeutic Category, Drug(s)	Recommendation, Rationale, DE, SR
Antipsychotics, first- (conventional) and second- (atypical) generation	Avoid, except in schizophrenia, bipolar disorder, or for short-term use as antiemetic during chemotherapy Increased risk of cerebrovascular accident (stroke) and greater rate of cognitive decline and mortality in persons with dementia Avoid antipsychotics for behavioral problems of dementia or delirium unless nonpharmacological options (e.g., behavioral interventions) have failed or are not possible and the older adult is threatening substantial harm to self or others DE = Moderate, SR = Strong
Barbiturates ■ Amobarbital ■ Butabarbital ■ Butalbital ■ Mephobarbital ■ Pentobarbital ■ Phenobarbital ■ Secobarbital	Avoid High rate of physical dependence, tolerance to sleep benefits, greater risk of overdose at low dosages DE = High, SR = Strong
Benzodiazepines <i>Short- and intermediate-acting:</i> ■ Alprazolam ■ Estrazolam ■ Lorazepam ■ Oxazepam ■ Temazepam ■ Triazolam <i>Long-acting:</i> ■ Chloridiazepoxide (alone or in combination with amitriptyline or citalinium) ■ Clonazepam ■ Clonazepam ■ Diazepam ■ Flurazepam ■ Quazepam Meperbamate	Avoid Older adults have increased sensitivity to benzodiazepines and decreased metabolism of long-acting agents; in general, all benzodiazepines increase risk of cognitive impairment, delirium, falls, fractures, and motor vehicle crashes in older adults. May be appropriate for seizure disorders, rapid eye movement sleep behavior disorder, benzodiazepine withdrawal, ethanol withdrawal, severe generalized anxiety disorder, and periprocedural anesthesia DE = Moderate, SR = Strong
Nonbenzodiazepine, benzodiazepine receptor agonist hypnotics (ie, "Z-drugs") ■ Eszopiclone ■ Zaleplon ■ Zolpidem	Avoid Nonbenzodiazepine benzodiazepine-receptor agonist hypnotics (ie, "Z drugs") have adverse events similar to those of benzodiazepines in older adults (e.g., delirium, falls, fractures); increased emergency room visits/hospitalizations; motor vehicle crashes; minimal improvement in sleep latency and duration DE = Moderate, SR = Strong

Table 1 Continued

Organ System, Therapeutic Category, Drug(s)	Recommendation, Rationale, DE, SR
Ergotoid myclics (dihydrogenated ergot alkaloids) ■ Isosuxipine	Avoid Lack of efficacy DE = High, SR = Strong
Endocrine Androgens ■ Methyltestosterone ■ Testosterone	Avoid unless indicated for confirmed hypogonadism with clinical symptoms Potential for cardiac problems, contraindicated in men with prostate cancer DE = Moderate, SR = Weak
Dissected thyroid	Avoid Concerns about cardiac effects; safer alternatives available DE = Low, SR = Strong
Estrogens with or without progestins	Avoid systemic estrogen (eg, oral and topical patch). Vaginal cream or vaginal tablets: acceptable to use low-dose intravaginal estrogen for management of dyspareunia, recurrent lower urinary tract infections, and other vaginal symptoms Evidence of carcinogenic potential (breast and endometrium); lack of cardioprotective effect and cognitive protection in older women. Evidence indicates that vaginal estrogens for the treatment of vaginal dryness are safe and effective; women with a history of breast cancer who do not respond to nonhormonal therapies are advised to discuss the risk and benefits of low-dose vaginal estrogen (dosages of estradiol <25 mcg twice weekly) with their healthcare provider DE = Oral and patch: High. Vaginal cream or tablets: Moderate. SR = Oral and patch: Strong. Topical vaginal cream or tablets: Weak
Growth hormone	Avoid, except for patients rigorously diagnosed by evidence-based criteria with growth hormone deficiency due to an established etiology Impact on body composition is small and associated with edema, arthralgia, carpal tunnel syndrome, gynecomastia, impaired fasting glucose DE = High, SR = Strong
Insulin, sliding scale (insulin regimens containing only short- or rapid-acting insulin dosed according to current blood glucose levels without concurrent use of basal or long-acting insulin)	Avoid Higher risk of hypoglycemia without improvement in hyperglycemia management regardless of care setting; Avoid insulin regimens that include only short- or rapid-acting insulin dosed according to current blood glucose levels without concurrent use of basal or long-acting insulin. This recommendation does not apply to regimens that contain basal insulin or long-acting insulin. DE = Moderate, SR = Strong
Megestrol	Avoid Minimal effect on weight; increases risk of thrombotic events and possibly death in older adults DE = Moderate, SR = Strong

Table 1 Continued

Organ System, Therapeutic Category, Drug(s)	Recommendation, Rationale, DE, SR
Sulfonyleureas, long-acting ■ Chlorpropamide ■ Glimepiride ■ Glyburide (also known as glibenzamide)	Avoid Chlorpropamide: prolonged half-life in older adults; can cause prolonged hypoglycemia; causes SIADH Glimepiride and Glyburide: higher risk of severe prolonged hypoglycemia in older adults DE = High; SR = Strong
Gastrointestinal Metoclopramide	Avoid, unless for gastroparesis with duration of use not to exceed 12 weeks except in rare cases Can cause extrapyramidal effects; including tardive dyskinesia; risk may be greater in frail older adults and with prolonged exposure DE = Moderate; SR = Strong
Mineral oil, given orally	Avoid Potential for aspiration and adverse effects; safer alternatives available DE = Moderate; SR = Strong
Proton-pump inhibitors	Avoid scheduled use for >8 weeks unless for high-risk patients (e.g., oral corticosteroids or chronic NSAID use), erosive esophagitis, Barrett's esophagitis, pathological hypersecretory condition, or demonstrated need for maintenance treatment (e.g., because of failure of drug discontinuation trial or H₂-receptor antagonists Risk of C difficile infection and bone loss and fractures DE = High; SR = Strong
Pain medications Meperidine	Avoid Oral analgesic not effective in dosages commonly used; may have higher risk of neurotoxicity, including delirium, than other opioids; safer alternatives available DE = Moderate; SR = Strong
Non-cyclooxygenase-selective NSAIDs, oral: ■ Aspirin >325 mg/d ■ Diclofenac ■ Etoricoxib ■ Ibuprofen ■ Ketoprofen ■ Meclizolam ■ Meloxicam ■ Naproxen ■ Naproxen ■ Oxaprozin ■ Sulfadiazine ■ Tolmetin	Avoid chronic use, unless other alternatives are not effective and patient can take gastroprotective agent (proton-pump inhibitor or misoprostol) Increased risk of gastrointestinal bleeding or peptic ulcer disease in high-risk groups, including those aged >75 or taking oral or parenteral corticosteroids, anticoagulants, or antiplatelet agents; use of proton-pump inhibitor or misoprostol reduces but does not eliminate risk. Upper gastrointestinal ulcers, gross bleeding, or perforation caused by NSAIDs occur in ~1% of patients treated for 3–6 months and in ~2–4% of patients treated for 1 year; these trends continue with longer duration of use. Also can increase blood pressure and induce kidney injury. Risks are dose-related. DE = Moderate; SR = Strong

Table 1 Continued

Organ System, Therapeutic Category, Drug(s)	Recommendation, Rationale, DE, SR
■ Indomethacin ■ Ketorolac, includes parenteral	Avoid Increased risk of gastrointestinal bleeding/peptic ulcer disease, and acute kidney injury in older adults Indomethacin is more likely than other NSAIDs to have adverse CNS effects. Of all the NSAIDs, indomethacin has the most adverse effects. DE = Moderate; SR = Strong
Skeletal muscle relaxants ■ Carisoprodol ■ Chlorzoxazone ■ Cyclobenzaprine ■ Metaxalone ■ Methocarbamol ■ Orphenadrine	Avoid Most muscle relaxants poorly tolerated by older adults because some have anticholinergic adverse effects, sedation, increased risk of fractures; effectiveness at dosages tolerated by older adults questionable DE = Moderate; SR = Strong
Genitourinary Desmopressin	Avoid for treatment of nocturia or nocturnal polyuria High risk of hyponatremia; safer alternative treatments. DE = Moderate; SR = Strong

TABLE 2 2019 American Geriatrics Society Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults Due to Drug–Disease or Drug–Syndrome Interactions That May Exacerbate the Disease or Syndrome

Disease or Syndrome	Drug(s)	Recommendation, Rationale, Quality of Evidence (QE), Strength of Recommendation (SR)
Cardiovascular Heart failure	Avoid: Cliostrazol Avoid in heart failure with reduced ejection fraction: Non-dihydropyridine CCBs (diltiazem, verapamil) Use with caution in patients with heart failure who are asymptomatic; avoid in patients with symptomatic heart failure: NSAIDs and COX-2 inhibitors Thiazolidinediones (pioglitazone, rosiglitazone) Dronedrone	As noted, avoid or use with caution Potential to promote fluid retention and/or exacerbate heart failure (NSAIDs and COX-2 inhibitors, non-dihydropyridine CCBs, thiazolidinediones); potential to increase mortality in older adults with heart failure (cliostrazol and dronedrone) DE = Cliostrazol: Low Non-dihydropyridine CCBs: Moderate NSAIDs: Moderate COX-2 inhibitors: Low Thiazolidinediones: High, Dronedrone: High, SR = Strong

See Table 7 in full criteria available on www.geriatricsociety.org.

Many be required in these concurrent tachypnea, hypoxia, and other selected mental health conditions but should be prescribed in the lowest effective dose and shortest possible duration.

Excludes mild and topical forms. Oral and parenteral corticosteroids may be required for conditions such as exacerbation of COPD but should be prescribed in the lowest effective dose and for the shortest possible duration.

CCB=calcium channel blocker; AChE=acetylcholinesterase inhibitor; CNS=central nervous system; COX=cyclooxygenase; NSAID=nonsteroidal antiinflammatory drug; SNRI=serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor; SSRI=selective serotonin reuptake inhibitor; TCA=tricyclic antidepressant.

Table 2 Continued

Disease or Syndrome	Drugs†	Recommendation, Rationale, DE, SR
Syncope	Acetylcholinesterase inhibitors (AChEs)	Avoid AChEs cause bradycardia and should be avoided in older adults whose syncope may be due to bradycardia. Non-selective peripheral alpha-1 blockers (ie, doxazosin, prazosin, terazosin)
	Tertiary TCAs	
Antipsychotics	■ Chlorpromazine	Antipsychotics avoided in older adults whose syncope may be due to orthostatic hypotension. Tertiary TCAs and the antipsychotics listed increase the risk of orthostatic hypotension or bradycardia. DE = AChEs, TCAs and antipsychotics; High, Non-selective peripheral alpha-1 blockers; High, SR = AChEs, TCAs; Strong, Non-selective peripheral alpha-1 blockers, antipsychotics; Weak
	■ Thioridazine	
	■ Thioridazine	
	■ Diazepam	

Central nervous system

Delirium	Anticholinergics*	Avoid Avoid in older adults with or at high risk of delirium because of potential of inducing or worsening delirium
	Antipsychotics* Benzodiazepines Corticosteroids (oral and parenteral)* H2-receptor antagonists ■ Cimetidine ■ Famotidine ■ Nizatidine ■ Ranitidine ■ Meperidine Nonbenzodiazepine, benzodiazepine receptor agonist hypnotics: eszopiclone, zaleplon, zolpidem	
Dementia or cognitive impairment	Anticholinergics*	Avoid Avoid because of adverse CNS effects
	Benzodiazepines Nonbenzodiazepine, benzodiazepine receptor agonist hypnotics ■ Eszopiclone ■ Zaleplon ■ Zolpidem Antipsychotics, chronic and as-needed use*	

Table 2 Continued

Disease or Syndrome	Drugs†	Recommendation, Rationale, DE, SR
History of falls or fractures	Antiepileptics	Avoid unless safer alternatives are not available; avoid antiepileptics except for seizure and mood disorders. Opioids, avoid except for pain management in the setting of severe acute pain, eg, recent fractures or joint replacement
	Antipsychotics* Benzodiazepines Nonbenzodiazepine, benzodiazepine receptor agonist hypnotics ■ Eszopiclone ■ Zaleplon ■ Zolpidem ■ Antidepressants ■ TCAs ■ SSRIs ■ SNRIs ■ Opioids	

Parkinson disease	Antiemetics ■ Metoclopramide ■ Prochlorperazine ■ Promethazine All antipsychotics (except quetiapine, clozapine, pinavanserin)	Avoid Dopamine-receptor antagonists with potential to worsen parkinsonian symptoms Exceptions: Pinavanserin and clozapine appear to be less likely to precipitate worsening of Parkinson disease Quetiapine has only been studied in low quality clinical trials with efficacy comparable to that of placebo in 5 trials and to that of clozapine in 2 others. DE = Moderate, SR = Strong

Gastrointestinal	Aspirin (>325 mg/d)	Avoid unless other alternatives are not effective and patient can take gastroprotective agent (ie, proton-pump inhibitor or misoprostol) May exacerbate existing ulcers or cause new additional ulcers DE = Moderate, SR = Strong
	Non-COX-2 selective NSAIDs	

Table 2 Continued

Disease or Syndrome	Drugs†	Recommendation, Rationale, DE, SR
Kidney/Urinary tract		
Chronic kidney disease Stage IV or higher (creatinine clearance <30 mL/min)	NSAIDs (non-COX and COX-selective, oral and parenteral, nonacetylated salicylates)	Avoid May increase risk of acute kidney injury and further decline of renal function <i>DE = Moderate; SR = Strong</i>
Urinary incontinence (all types) in women	Estrogen oral and transdermal (excludes intravaginal estrogen) Peripheral alpha-1 blockers ■ Prazosin ■ Tadalafil ■ Tadalafil	Avoid in women Lack of efficacy (oral estrogen) and aggravation of incontinence (alpha-1 blockers) <i>DE = Estrogen: High; Peripheral alpha-1 blockers: Moderate; SR = Estrogen: Strong; Peripheral alpha-1 blockers: Strong</i>
Lower urinary tract symptoms, benign prostatic hyperplasia	Strongly anticholinergic drugs, except antimuscarinics for urinary incontinence.*	Avoid in men May decrease urinary flow and cause urinary retention <i>DE = Moderate; SR = Strong</i>

TABLE 3. 2019 American Geriatrics Society Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medications to Be Used with Caution in Older Adults

Drugs†	Recommendation, Rationale, Quality of Evidence (DE), Strength of Recommendation (SR)
Aspirin for primary prevention of cardiovascular disease and colorectal cancer	Use with caution in adults ≥70 years old Risk of major bleeding from aspirin increases markedly in older age. Several studies suggest lack of net benefit when used for primary prevention in older adult with cardiovascular risk factors, but evidence is not conclusive. Aspirin is generally indicated for secondary prevention in older adults with established cardiovascular disease. <i>DE = Moderate; SR = Strong</i>
Dabigatran Rivaroxaban	Use with caution for treatment of VTE or atrial fibrillation in adults ≥75 years old Increased risk of gastrointestinal bleeding compared with warfarin and reported rates with other direct oral anticoagulants when used for long-term treatment of venous thromboembolism (VTE) or atrial fibrillation in adults ≥75 years old. <i>DE = Moderate; SR = Strong</i>

Table 3 Continued

Prasugrel	Use with caution in adults ≥75 years old Increased risk of bleeding in older adults; benefit in highest-risk older adults (e.g., those with prior myocardial infarction or diabetes mellitus) may offset risk when used for its approved indication of acute coronary syndrome to be managed with percutaneous coronary intervention <i>DE = Moderate; SR = Weak</i>
Antipsychotics Carbamazepine Diuretics Mirtazapine Oxcarbazepine SNRIs SSRIs TCAs Tramadol	Use with caution May exacerbate or cause SIADH or hyponatremia; monitor sodium level closely when starting or changing dosages in older adults <i>DE = Moderate; SR = Strong</i>
Dextromethorphan/quinidine	Use with caution Limited efficacy in patients with behavioral symptoms of dementia (does not apply to treatment of PBA). May increase risk of falls and concerns with clinically significant drug interactions. Does not apply to treatment of pseudobulbar affect. <i>DE = Moderate; SR = Strong</i>
Timothoprim-sulfamethoxazole	Use with caution in patients on ACEI or ARB and decreased creatinine clearance. Increased risk of hyperkalemia when used concurrently with an ACEI or ARB in presence of decreased creatinine clearance. <i>DE = Low; SR = Strong</i>

ACEI = angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB = angiotensin receptor blocker; CrCl = creatinine clearance; SIADH = syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion; SNRIs = Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors; SSRIs = Selective serotonin reuptake inhibitors; TCA = tricyclic antidepressant; VTE = venous thromboembolism

TABLE 4. 2019 American Geriatrics Society Beers Criteria® for Potentially Clinically Important Drug-Drug Interactions That Should Be Avoided in Older Adults

Object Drug and Class	Interacting Drug and Class	Recommendation, Risk Rationale, Quality of Evidence (DE), Strength of Recommendation (SR)
RAS inhibitor (ACEIs, ARBs, aiskiren) or potassium-sparing diuretics (amilofide, triamterene)	Another RAS inhibitor (ACEIs, ARBs, aiskiren) Increased risk of hyperkalemia <i>DE = Moderate; SR = Strong</i>	Avoid routine use in those with chronic kidney disease Stage 3a or higher Increased risk of hyperkalemia <i>DE = Moderate; SR = Strong</i>
Opioids	Benzodiazepines	Avoid Increased risk of overdose <i>DE = Moderate; SR = Strong</i>

Table 4 Continued

Opioids	Gabapentin, pregabalin	Avoid, exceptions are when transitioning from opioid therapy to gabapentin or pregabalin, or when using gabapentinoids to reduce opioid dose, although caution should be used in all circumstances. Increased risk of severe sedation-related adverse events, including respiratory depression and death DE = Moderate, SR = Strong
Anticholinergic	Anticholinergic	Avoid, minimize number of anticholinergic drugs Increased risk of cognitive decline DE = Moderate, SR = Strong
Antidepressants (TCAs, SSRIs, and SNRIs)	Any combination of ≥3 of these CNS-active drugs*	Avoid total of ≥3 CNS-active drugs*, minimize number of CNS-active drugs Increased risk of falls (all) and of fracture (benzodiazepines and nonbenzodiazepine, benzodiazepine receptor agonist hypnotics) QE: Combinations including benzodiazepines and nonbenzodiazepine, benzodiazepine receptor agonist hypnotics or opioids: High. All other combinations: Moderate, SR, Strong
Antipsychotics		
Antiepileptics		
Benzodiazepines and nonbenzodiazepine, benzodiazepine receptor agonist hypnotics		
azepine receptor agonist hypnotics (ie, Z-drugs)		
Opioids		
Corticosteroids, oral or parenteral	NSAIDs	Avoid, if not possible, provide gastrointestinal protection Increased risk of peptic ulcer disease or gastrointestinal bleeding DE = Moderate, SR = Strong
Lithium	ACEIs	Avoid, monitor lithium concentrations Increased risk of lithium toxicity DE = Moderate, SR = Strong
Lithium	Loop diuretics	Avoid, monitor lithium concentrations Increased risk of lithium toxicity DE = Moderate, SR = Strong
Peripheral alpha-1 blockers	Loop diuretics	Avoid in older women, unless conditions warrant both drugs Increased risk of urinary incontinence in older women DE = Moderate, SR = Strong
Phenytoin	Trimethoprim-sulfamethoxazole	Avoid Increased risk of phenytoin toxicity DE = Moderate, SR = Strong
Theophylline	Cimetidine	Avoid Increased risk of theophylline toxicity DE = Moderate, SR = Strong
Theophylline	Ciprofloxacin	Avoid Increased risk of theophylline toxicity DE = Moderate, SR = Strong
Warfarin	Amiodarone	Avoid when possible; if used together, monitor INR closely Increased risk of bleeding DE = Moderate, SR = Strong

Table 4 (continued on page 14)

Warfarin	Ciprofloxacin	Avoid when possible; if used together, monitor INR closely Increased risk of bleeding DE = Moderate, SR = Strong
Warfarin	Macrolides (excluding azithromycin)	Avoid when possible; if used together, monitor INR closely Increased risk of bleeding DE = Moderate, SR = Strong
Warfarin	Trimethoprim-sulfamethoxazole	Avoid when possible; if used together, monitor INR closely Increased risk of bleeding DE = Moderate, SR = Strong
Warfarin	NSAIDs	Avoid when possible; if used together, monitor INR closely Increased risk of bleeding DE = High, SR = Strong

TABLE 5. 2019 American Geriatrics Society Beers Criteria® for Medications That Should Be Avoided or Have Their Dosage Reduced with Varying Levels of Kidney Function in Older Adults

Medication Class and Medication	Creatinine Clearance, mL/min, at Which Action Required	Recommendation, Rationale, Quality of Evidence (QE), Strength of Recommendation (SR)
Anti-infective	<30	Doses used to treat common infections typically require reduction when CrCl <30 mL/min Increased risk of CNS effects (eg, seizures, confusion) and tendon rupture QE = Moderate, SR = Strong
Timethoprim-sulfamethoxazole	<30	CrCl 15-29 mL/min: Reduce Dose <15 mL/min: Avoid Increased risk of worsening of renal function and hyperkalemia QE = Moderate, SR = Strong

*Central nervous system (CNS)-active drugs: antidepressants, antipsychotics, benzodiazepines, nonbenzodiazepine, benzodiazepine receptor agonist hypnotics, tricyclic antidepressants (TCAs), selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs), and opioids.

ACEIs=angiotensin-converting enzyme inhibitors; ARBs=angiotensin receptor blockers; INR=international normalized ratio; NSAIDs=nonsteroidal anti-inflammatory drugs; RAS=renin-angiotensin system.

Copyright © 2019 by the American Geriatrics Society. All rights reserved. Except where authorized, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without written permission of the American Geriatrics Society, 40 Fulton Street, 16th Floor, New York, NY 10038. The Criteria published by The American Geriatrics Society (AGS) incorporate data obtained from a literature review of the most recent studies available at the time. As with all clinical reference resources, they reflect the best understanding of the science of medicine at the time of publication, but they should be used with the clear understanding that continued research may result in new knowledge and recommendations. The Criteria are intended for general information only, are not medical advice, and do not replace professional medical care and physician advice, which always should be sought for any specific condition.

Table 5 (continued on page 15)

Table 4 Continued

Opioids	Gabapentin, pregabalin	Avoid, exceptions are when transitioning from opioid therapy to gabapentin or pregabalin, or when using gabapentinoids to reduce opioid dose, although caution should be used in all circumstances. Increased risk of severe sedation-related adverse events, including respiratory depression and death DE = Moderate; SR = Strong
Anticholinergic	Anticholinergic	Avoid, minimize number of anticholinergic drugs Increased risk of cognitive decline DE = Moderate; SR = Strong
Antidepressants (TCAs, SSRIs, and SNRIs)	Any combination of ≥3 of these CNS-active drugs*	Avoid total of ≥3 CNS-active drugs*, minimize number of CNS-active drugs Increased risk of falls (fall) and of fracture (benzodiazepines and nonbenzodiazepine, benzodiazepine receptor agonist hypnotics) DE: Combinations including benzodiazepines and nonbenzodiazepine, benzodiazepine receptor agonist hypnotics or opioids: High. All other combinations: Moderate; SR: Strong
Antipsychotics	Antipsychotics	
Antiepileptics	Antiepileptics	
Benzodiazepines and nonbenzodiazepine, benzodiazepine receptor agonist hypnotics (ie, Z-drugs*)		
Corticosteroids: oral or parenteral	NSAIDs	Avoid, if not possible, provide gastrointestinal protection Increased risk of peptic ulcer disease or gastrointestinal bleeding DE = Moderate; SR = Strong
Lithium	ACEIs	Avoid, monitor lithium concentrations Increased risk of lithium toxicity DE = Moderate; SR = Strong
Lithium	Loop diuretics	Avoid, monitor lithium concentrations Increased risk of lithium toxicity DE = Moderate; SR = Strong
Peripheral alpha-1 blockers	Loop diuretics	Avoid in older women, unless conditions warrant both drugs Increased risk of urinary incontinence in older women DE = Moderate; SR = Strong
Phenytoin	Timethoprim-sulfamethoxazole	Avoid Increased risk of phenytoin toxicity DE = Moderate; SR = Strong
Theophylline	Cimetidine	Avoid Increased risk of theophylline toxicity DE = Moderate; SR = Strong
Theophylline	Ciprofloxacin	Avoid Increased risk of theophylline toxicity DE = Moderate; SR = Strong
Warfarin	Amiodarone	Avoid when possible; if used together, monitor INR closely Increased risk of bleeding DE = Moderate; SR = Strong

Warfarin	Ciprofloxacin	Avoid when possible; if used together, monitor INR closely Increased risk of bleeding DE = Moderate; SR = Strong
Warfarin	Macrolides (excluding azithromycin)	Avoid when possible; if used together, monitor INR closely Increased risk of bleeding DE = Moderate; SR = Strong
Warfarin	Trimethoprim-sulfamethoxazole	Avoid when possible; if used together, monitor INR closely Increased risk of bleeding DE = Moderate; SR = Strong
Warfarin	NSAIDs	Avoid when possible; if used together, monitor INR closely for bleeding Increased risk of bleeding DE = High; SR = Strong

TABLE 5. 2019 American Geriatrics Society Beers Criteria® for Medications That Should Be Avoided or Have Their Dosage Reduced with Varying Levels of Kidney Function in Older Adults

Medication Class and Medication	Creatinine Clearance, mL/min, at Which Action Required	Recommendation, Rationale, Quality of Evidence (DE, Strength of Recommendation [SR])
Anti-infective		
Ciprofloxacin	<30	Doses used to treat common infections typically require reduction when CrCl <30 mL/min Increased risk of CNS effects (eg, seizures, confusion) and tendon rupture DE = Moderate; SR = Strong
Trimethoprim-sulfamethoxazole	<30	CrCl 15-29 mL/min: Reduce Dose <15 mL/min: Avoid Increased risk of worsening of renal function and hyperkalemia DE = Moderate; SR = Strong

*Central nervous system (CNS)-active drugs: antiepileptics, antidepressants, benzodiazepines, nonbenzodiazepine, benzodiazepine receptor agonist hypnotics, tricyclic antidepressants (TCAs), selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs), and opioids

ACEIs=angiotensin-converting enzyme inhibitors; ARBs=angiotensin receptor blockers; INR=international normalized ratio; NSAIDs=nonsteroidal anti-inflammatory drugs; RAS=renin-angiotensin system

Copyright © 2019 by the American Geriatrics Society. All rights reserved. Except where authorized, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without written permission of the American Geriatrics Society, 40 Fulton Street, 18th Floor, New York, NY 10038. The Criteria published by The American Geriatrics Society (AGS) incorporate data obtained from a literature review of the most recent studies available at the time. As with all clinical reference resources, they reflect the best understanding of the science of medicine at the time of publication, but they should be used with the clear understanding that continued research may result in new knowledge and recommendations. The Criteria are intended for general information only, are not medical advice, and do not replace professional medical care and physician advice, which always should be sought for any specific condition.

Lampiran 3. Kode Etik Penelitian



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No: A.079/KEPK/FKIK/III/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : WINDA AMALIA
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"EVALUASI POLIFARMASI PADA PASIEN GERIANTRI DIABETES MELITUS TIPE 2
 DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD LABUANG BAJI"**


**"EVALUATION OF POLYPHARMATION IN GERIATRIC PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES IN
 INSTALLATION LABUANG BAJI HOSPITAL"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

This declaration of ethics applies during the period March 7, 2022 until March 7, 2023

March 7, 2022
 Professor and Chairperson,

 DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 43 Makassar Telepon (01411) 806720 Faksimil (0411) 854923 Kampus II : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa Telepon 1500363 (0411) 841679 Faksimil (0411) 8221400 Email: fku@uin-alauddin.ac.id												
Nomor	: B-1282 / Un.06/FKIK/PP.00.9/03/2022	Gowa, 18 Maret 2022										
Sifat	: Penting											
Lampiran	: -											
Penhal	: Permohonan Izin Penelitian											
Kepada Yth : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel Di Tempat Assalamu 'Alaikum Wr. Wb. Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini : <table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>: Winda Amalia</td> </tr> <tr> <td>N I M</td> <td>: 70100117011</td> </tr> <tr> <td>Fakultas/Jurusan</td> <td>: Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Farmasi</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: X (Sepuluh)</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Komp. Perumahan Secaba Rindam XIV/HSN Mawang</td> </tr> </table> Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi : "Evaluasi Polifarmasi Pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji". Dengan Dosen Pembimbing : 1. Apt. Afrisunawati Rauf, S.Si., M.Si 2. Apt. Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di RSUD Labuang Baji Makassar, waktu penelitian 14 Maret – 30 April 2022 Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih, Wassalam Dehan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,   Syarifah Tembusan : -Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa			Nama	: Winda Amalia	N I M	: 70100117011	Fakultas/Jurusan	: Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Farmasi	Semester	: X (Sepuluh)	Alamat	: Komp. Perumahan Secaba Rindam XIV/HSN Mawang
Nama	: Winda Amalia											
N I M	: 70100117011											
Fakultas/Jurusan	: Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Farmasi											
Semester	: X (Sepuluh)											
Alamat	: Komp. Perumahan Secaba Rindam XIV/HSN Mawang											

Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
 Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454
 E-mail: rumahsakittlabuwangi@yahoo.co.id
MAKASSAR

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 070/ 016/LB-02/DIKLAT-1/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Jaya, SKM, M.Kes
 Nip : 19680703 199303 1 009
 Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
 Jabatan : Kepala Bagian Diklat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Winda Amalia
 Nomor Pokok : 70100117011
 Program Studi : S1 Farmasi
 Pekerjaan : Mahasiswa (UIN Alauddin)
 Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo No.36 Romang Polong Gowa

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan Pengambilan Data awal/ Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir Karya tulis ilmiah/Skripsi dengan Judul
" EVALUASI POLIFARMASI PADA PASIEN GERIATRI DIABETES MELITUS TIPE 2 RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Juni 2022

An.Wadir Umum SDM Dan Pendidikan
 Kepala Bagian Diklat,


Rahmat Jaya, SKM, M.Kes
 NIP. 19680703 199303 1 009



Ditanda Tangan Koordinasi

Lampiran 6. Karakteristik Pasien

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	21	38.2	38.2	38.2
	Perempuan	34	61.8	61.8	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

		Lama Inap			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-4 hari	13	23.6	23.6	23.6
	5-9 hari	30	54.5	54.5	78.2
	≥10 hari	12	21.8	21.8	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

Lampiran 7. Analisis Univariat

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	60-65 tahun	27	49.1	49.1	49.1
	66-70 tahun	14	25.5	25.5	74.5
	71-75 tahun	7	12.7	12.7	87.3
	76-80 tahun	5	9.1	9.1	96.4
	≥ 81 tahun	2	3.6	3.6	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

		Komorbid			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 komorbid	3	5.5	5.5	5.5
	2 komorbid	29	52.7	52.7	58.2
	3 komorbid	20	36.4	36.4	94.5

4 komorbid	3	5.5	5.5	100.0
Total	55	100.0	100.0	

Komorbid Frequencies

		Responses		Percent of
		N	Percent	Cases
Penyakit Penyerta ^a	HT	36	27.1%	65.5%
	CHF	13	9.8%	23.6%
	Gastritis	3	2.3%	5.5%
	GERD	2	1.5%	3.6%
	Neuropati	11	8.3%	20.0%
	CKD	5	3.8%	9.1%
	Gout	9	6.8%	16.4%
	Dislipidemia	17	12.8%	30.9%
	OA	2	1.5%	3.6%
	RA	3	2.3%	5.5%
	PPOK	5	3.8%	9.1%
	Hipotiroid	1	0.8%	1.8%
	Angina pectoris	3	2.3%	5.5%
	PJK	7	5.3%	12.7%
	Asma	4	3.0%	7.3%
	Dislokasi ankle	1	0.8%	1.8%
	Vertigo	1	0.8%	1.8%
	Low back pain	1	0.8%	1.8%
	Aritmia	1	0.8%	1.8%
	Cefalgia	1	0.8%	1.8%
	Dispepsia	2	1.5%	3.6%
	Hiperurisemia	3	2.3%	5.5%
	GEA	2	1.5%	3.6%
Total		133	100.0%	241.8%

Jumlah Obat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5 jenis obat	8	14.5	14.5	14.5
	6 jenis obat	18	32.7	32.7	47.3
	7 jenis obat	15	27.3	27.3	74.5
	8 jenis obat	9	16.4	16.4	90.9
	9 jenis obat	3	5.5	5.5	96.4
	10 jenis obat	2	3.6	3.6	100.0

Kategori PIM

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tanpa PIM	6	10.9	10.9	10.9
	Terdapat PIM	49	89.1	89.1	100.0
	Total	55	100.0	100.0	
Total		55	100.0	100.0	

Jumlah PIM

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tanpa PIM	6	10.9	10.9	10.9
	1 PIM	14	25.5	25.5	36.4
	≥ 2 PIM	35	63.6	63.6	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

\$PIM Frequencies

		Responses		Percent of Cases
		N	Percent	
Klasifikasi PIM ^a	Kategori Beers 1	71	62.3%	144.9%
	Kategori Beers 2	7	6.1%	14.3%
	Kategori Beers 3	33	28.9%	67.3%
	Kategori Beers 4	1	0.9%	2.0%
	Kategori Beers 5	2	1.8%	4.1%
Total		114	100.0%	232.7%

\$PIM Frequencies

		Responses		Percent of
		N	Percent	Cases
Obat Berpotensi PIM ^a	glimepiride	19	16.7%	38.8%
	digoxin	2	1.8%	4.1%
	furosemid	11	9.6%	22.4%
	Amitriptilin kategori 3	4	3.5%	8.2%
	meloxicam	5	4.4%	10.2%
	glibenklamid	17	14.9%	34.7%
	chlortalidone	3	2.6%	6.1%
	aspirin	5	4.4%	10.2%
	diazepam	1	0.9%	2.0%
	lanzoprazole	1	0.9%	2.0%
	spironolacton	1	0.9%	2.0%
	Ibuprofen CHF	2	1.8%	4.1%
	HCT	7	6.1%	14.3%
	diclofenac	4	3.5%	8.2%
	amiodarone	1	0.9%	2.0%
	amitriptilin	4	3.5%	8.2%
	omeprazole	4	3.5%	8.2%
	prazosin	1	0.9%	2.0%
	Gabapentin	1	0.9%	2.0%
	naproxen	2	1.8%	4.1%
	ibuprofen	5	4.4%	10.2%
	cliad	1	0.9%	2.0%
	ranitidin	1	0.9%	2.0%
	metoclopramid	3	2.6%	6.1%
	pioglitazone	5	4.4%	10.2%
	prednison & ibuprofen	1	0.9%	2.0%
	Etamoxul	2	1.8%	4.1%
	pantoprazole	1	0.9%	2.0%
Total		114	100.0%	232.7%

Lampiran 8. Data Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di RSUD Labuang Baji

N O	Data Pasien	Tanggal Pelayanan		Obat Yang Diresepkan
		Masuk	Keluar	
1	61/P Dislipidemia CHF	20/3/2021	23/3/2021	Metformin Glimepiride Digoxin Furosemide Simvastatin
2	77/P Hipertensi Dislipidemia Asma CKD	02/4/2021	09/4/2021	Metformin Glimepiride Aspirin Ventolin Chlortalidone Amlodipin
3	60/L Gout Dislipidemia	03/4/2021	05/4/2021	Metformin Glimepiride Colchicine Prednisone Simvastatin Paracetamol
4	66/L Hipertensi Dislipidemia Neuropati diabetic Hiperurisemia	13/1/2021	18/1/2021	Apidra Lantus Amlodipin Simvastatin Diazepam Simcobal Allopurinol
5	61/P Hipertensi PPOK	15/2/2021	26/2/2021	Metformin Lantus Seretide inhaler Amlodipin Captopril Simvastatin
6	71/P Dislipidemia PJK PPOK	30/5/2021	8/6/2021	Metformin Glimepiride Losartan Rosuvastatin Aspirin Tiotropium inhaler Ventolin inhaler Paracetamol
7	61/L Vertigo Dispepsia	08/1/2021	14/1/2021	Metformin Lantus Lansoprazole

	Dislokasi ankle			Paracetamol Histigo Meloxicam
8	63/L Hipertensi Angina Hiperurisemia	10/4/2021	17/4/2021	Metformin Glimepiride Sitagliptin Tanapres Herbesser Allopurinol Meloxicam
9	61/L CHF Dislipidemia	23/2/2021	28/2/2021	Metformin Glimepiride Atorvastatin Spironolactone Digoxin Candesartan
10	69/P Hipertensi, Dislipidemia Gout	12/9/2021	19/9/2021	Metformin Gliclazid Allopurinol Simvastatin Telmisartan Colchicine Prednisone
11	71/L Hipertensi, Dislipidemia	05/9/2021	08/9/2021	Metformin Glimepiride Telmisartan Amlodipine Simvastatin
12	61/P Low back pain Neuropati diabetic Hipertensi	05/07/2021	12/07/2021	Metformin Glimepiride Gabapentin Meloxicam Amlodipine Captopril Simvastatin Simcoba
13	64/L Dislipidemia Angina PJK	14/5/2021	20/5/2021	Metformin Gliklazid Nitrogliserin Lisinopril Bisoprolol Adalat Oros
14	81/L Rheumatoid Arthritis Hipertensi	28/11/2021	2/12/2021	Metformin Lantus Metoprolol Lisinopril

				Hidroklorotiazid Folic Acid
15	78/P PPOK Neuropati Diabetik	01/10/2021	07/10/2021	Metformin Novomix Diclofenac Simcoba Ventolin inhaler
16	67/L Hipertensi Dislipidemia, Neuropati Diabetik	19/10/2021	23/10/2021	Ryzodeg Metformin Amlodipin Simvastatin Diclofenac Captopril Gabapentin Simcoba
17	66/P Neuropati Diabetik Aritmia	03/6/2021	10/6/2021	Kendaron Gabapentin Novorapid Levemir Amitriptilin Diclofenac Simcoba
18	65/L PJK CKD Hiperurisemia	11/6/2021	22/6/2021	Clopidogrel Isosorbid dinitrate Prorenal Gliclazide Metformin Sitagliptin Candesartan Simvastatin Allopurinol Amlodipin
19	65/P Cefalgia Dispepsia	17/2/2021	22/2/2021	Metformin Glibenklamid Ramipril Omeprazole Injeksi Ceftriaxone Injeksi Neurodex
20	79/P Dislipidemia Hipertensi CKD GERD	9/12/2021	19/12/2021	Metformin Glibenklamid Chlortalidone Niacin ER Aspirin Atorvastatin Ranitidin

21	71/P Hipertensi PJK	25/5/2021	5/6/2021	Metformin Sitagliptin Dapagliflozin Nitrokaf retard Bisoprolol Atorvastatin Hidroklorotiazid Irbesartan Amlodipin Pletaal
22	67/L Hipertensi Gastritis	03/8/2021	06/08/2021	Metformin Glimepiride Prazosin Domperidone Hufamag Omeprazole
23	64/P Gout Neuropati diabetik	07/6/2021	14/6/2021	Allopurinol Colchicine Metformin Glibenklamid Gabapentin Amitriptilin Simcoba
24	66/P CHF Neuropati diabetik	10/3/2021	22/3/2021	Metformin Glibenklamid Bisoprolol Captopril Amitriptilin Simcoba
25	63/L Hipertensi CKD Gout	24/3/2021	03/4/2021	Metformin Glibenklamid Chlortalidone Allopurinol Prorenal Naproxen
26	75/P Hipertensi Dislipidemia	03/10/2021	08/10/2021	Metformin Glimepiride Diltiazem Hidroklorotiazid Atorvastatin Ibuprofen Aspirin Allopurinol
27	66/P Gout Osteoarthritis	02/9/2021	07/9/2021	Metformin Glibenklamid Losartan


	Hipertensi			Hidroklorotiazid Simvastatin Metoprolol Allopurinol Ibuprofen
28	67/L Hipertensi Rheumatoid Arthritis Neuropati Diabetik	21/12/2021	27/12/2021	Metformin Glibenklamid Leflunomide Amlodipine Captopril Meloxicam
29	68/P Gastritis	05/12/2021	08/12/2021	Metformin Glibenklamid Domperidon Cilad Simvastatin Omeprazole Hufamag
30	63/P Hipertensi CHF	16/07/2021	20/07/2021	Metformin Gliclazide Furosemide Bisoprolol Captopril
31	86/L PPOK Dislipidemia Hipotiroid	21/02/2021	04/03/2021	Metformin Glipizide Atorvastatin Levotyroxin Tiotropium inhaler Ventolin inhaler Seretide inhaler
32	62/L Asma Hipertensi Dislipidemia	01/11/2021	03/11/2021	Metformin Glibenklamid Hidroklorotiazid Amlodipin Atorvastatin Ventolin inhaler Metoclopramide
33	69/P Hipertensi Angina	03/1/2021	12/1/2021	Metformin Gliclazide Nitrokaf retard Lisinopril Bisoprolol Adalat oros
34	69/L PJK Hipertensi	19/8/2021	30/8/2021	Metformin Glimepiride Captopril

				Bisoprolol Simvastatin
35	68/P Gastritis CHF	19/4/2021	24/4/2021	Metformin Glimepiride Pioglitazone Lisinopril Amlodipine Furosemide Omeprazole Hufamag Atorvastatin
36	62/L CHF Asma	08/7/2021	15/7/2021	Metformin Pioglitazone Furosemide Captopril Atorvastatin Ventolin inhaler Seretide inhaler
37	63/P Hipertensi Asma	31/8/2021	03/9/2021	Ventolin inhaler Cetirizine Metformin Glibenklamid Amlodipin Hidroklorotiazid
38	60/P Hipertensi Dislipidemia	06/09/2021	08/09/2021	Metformin Glibenklamid Captopril Amlodipin Simvastatin
39	62/P Hipertensi	18/09/2021	21/09/2021	Metformin Glimepiride Candesartan Amlodipin Simvastatin
40	65/P Dislipidemia Gout Hipertensi	01/2/2021	08/2/2021	Glimepiride Metformin Miglitol Simvastatin Telmisartan Colchicine Allopurinol Naproxen
41	60/P Rheumatoid Arthritis Hipertensi	20/4/2021	25/4/2021	Metformin Glibenklamid Sitagliptin Metoprolol

				Lisinopril Hidroklorotiazid Prednisone Ibuprofen
42	64/P CHF	12/09/2021	17/09/2021	Metformin Glimepiride Furosemide Amlodipin Lisinopril
43	71/P PPOK CHF Gout	15/10/2021	27/10/2021	Glimepiride Metformin Ventolin inhaler Lisinopril Furosemide Bisoprolol Colchicine Allopurinol Neurodex
44	61/L GERD Hipertensi CHF	05/07/2021	11/07/2021	Metformin Glibenklamid Pantoprazole Captopril Furosemide Amlodipin Simvastatin
45	67/P Gastroenteritis Hipertensi	17/11/2021	20/11/2021	Etamoxul Metoclopramide Metformin Glibenklamid Amlodipin Captopril
46	67/L Hipertensi CHF	21/10/2021	27/10/2021	Metformin Glimepiride Candesartan Furosemide Simvastatin Ibuprofen
47	74/P PJK Hipertensi Neuropati Diabetik	31/3/2021	05/4/2021	Metformin Glimepiride Captopril Amlodipin Candesartan Gabapentin Simvastatin Meloxicam Simcoba

48	76/P Hipertensi Gout	14/3/2021	17/3/2021	Metformin Glibenklamid Captopril Amlodipin Allopurinol Colchicine
49	62/L Hipertensi Gout	11/5/2021	13/5/2021	Metformin Glimepiride Pioglitazone Captopril Furosemide Allopurinol Diclofenac
50	73/P Hipertensi Dislipidemia	18/7/2021	21/7/2021	Gliclazide Sitagliptin Lisinopril Atorvastatin Carvedilol Aspirin
51	61/P Hipertensi CKD Neuropati Diabetik	03/10/2021	10/10/2021	Amlodipin Atenolol Atorvastatin Proferro Prorenal Metformin Glibenklamid Gabapentin
52	61/P Gastroenteritis CHF Hipertensi	16/6/2021	27/6/2021	Metformin Pioglitazone Etamoxul Metoclopramide Labetalol Simvastatin Ramipril
53	60/L Osteoarthritis CHF	07/4/2021	12/4/2021	Ibuprofen Furosemide Amlodipin Simvastatin Metformin Pioglitazone Glipizide
54	65/P PJK Hipertensi	18/11/2021	23/11/2021	Nifedipine Amlodipine Metoprolol Captopril Metformin

				Simvastatin Glibenklamid
55	76/P Hipertensi CHF Neuropati diabetik	29/7/2021	09/08/2021	Amlodipin Captopril Furosemide Amitriptilin Metformin Pioglitazone Simvastatin Simcoba



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap Winda Amalia, yang biasa dipanggil Winda. Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 02 Juli 1999. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Amin dan Ibu Mantasiah. Penulis mengawali pendidikan di TK Kartika pada tahun 2004-2005. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri Centre Mawang pada tahun 2005-2011. Setelah lulus, penulis belajar di SMP Negeri 1 Sunguminasa pada tahun 2011-2014, dan melanjutkan Pendidikan di MAN 1 Jeneponto tahun 2014-2017. Hingga saat ini penulis akhirnya berhasil menempuh pendidikan di Farmasi di Universitas Negeri Alauddin Makassar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R