

**PENENTUAN KADAR FENOLIK TOTAL, FLAVONOID TOTAL SERTA
KAPASITAS ANTIOKSIDAN BEBERAPA JENIS ALGA DARI PESISIR
PANTAI TAKALAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi Jurusan
Farmasi Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh:

WINDA UTARI

70100118032

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Winda Utari
Nim : 70100118032
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 15 Desember 1998
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Poros Cikoang, Mangarabombang,
Takalar
Judul : Penentuan Kadar Fenolik Total, Flavonoid Total Serta
Kapasitas Antioksidan Beberapa Jenis Alga Dari Pesisir
Pantai Takalar

Menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 24 Januari 2023

Penulis

Winda Utari

NIM. 70100118032

PENGESEHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Penentuan Kadar Fenolik Total, Flavonoid Total Serta Kapasitas Antioksidan Beberapa Jenis Alga dari Pesisir Pantai Takalar**” yang disusun oleh **Winda Utari**, NIM:70100118032, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis yang bertepatan tanggal **10 November 2022 M** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 10 November 2022 M
15 Rabiul Awal 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.dr. Syatirah Sp.A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm.,M.Si	(.....)
Pembimbing 1	: apt. Nursalam Hamzah, S.Si, M.Si	(.....)
Pembimbing 2	: apt. Isriany Ismail, S.Si, M.Si	(.....) 26/11/23
Penguji 1	: apt. Nurul Muhlisah Maddepungen, S.Si, M.Si	(.....)
Penguji 2	: Prof. Dr. Mardan, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr.dr. Syatirah Sp.A.,M.Kes
NIP. 9800701 200604 2002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin atas segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan umat manusia ke arah yang lebih beradab dan berbelas kasih. dengan mengungkap kegelapan wawasan manusia.

Skripsi ini berjudul “Penentuan Kadar Total Fenolik, Total Flavonoid, dan Kapasitas Antioksidan Beberapa Jenis Alga Dari Pantai Takalar”, yang merupakan salah satu syarat meraih gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Saya berterima kasih kepada orang tua dan suami saya, khususnya ayah saya, Udin, dan suami saya, Syahrir Djalaluddin, yang selalu mendoakan saya dan menginspirasi saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sukses. Semoga Allah SWT selalu melindungi saya, keluarga tercinta, saudara-saudaraku Fitriani dan Widiansyah, dan kita semua.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Ibu Surya Ningsi, S.Si.,M.Si.,Apt. Selaku ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

3. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm.,M.Si selaku Sekertaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak apt. Nursalam Hamzah, S.Si, M.Si. selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing, membantu, memberikan motivasi dan meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Apt. Isriany Ismail, S.Si, M.Si. selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing, membantu dan selalu meluangkan waktunya untuk saya.
6. Ibu Apt. Nurul Muhlisah Maddappungeng, S.Si., M. Si. Sebagai penguji Kompetensi yang banyak memberikan kritik dan saran terhadap skripsi saya.
7. Bapak Prof. Dr. Mardan, M. Ag selaku Penguji Agama yang banyak memberikan tuntunan dan arahan pada skripsi saya.
8. Kepada teman-teman penelitian angker 07 yang sudah banyak membantu saya.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Farmasi 2018, Suspensi yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat untuk penelitian selanjutnya khususnya dibidang Farmasi. Meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, tentunya masih banyak kekurangan pada penelitian ini, oleh karena itu diharapkan kritik dan sarannya untuk membangun kesempurnaan penelitian ini.

Gowa, 2023

Penulis

Winda Utari

NIM : 70100118032



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional dan Ruang lingkup penelitian	3
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12

A. Klasifikasi Alga	12
B. Antioksidan	28
C. Ekstraksi	29
D. Metode Ekstraksi	30
E. Fenolik	33
F. Flavonoid	33
G. Tinjauan Islam	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan pendekatan penelitian.....	38
B. Lokasi dan waktu penelitian	38
C. Sampel	38
D. Prosedur Kerja.....	39
E. Fenolik	43
F. Flavonoid.....	44
G. Karotenoid.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Pengamatan	53
B. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA 70

RIWAYAT HIDUP 125



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Sampel Alga	53
Tabel 2. Hasil Uji Fitokimia.....	54
Tabel 3. Hasil Uji Kadar Fenolik, Flavonoid, dan Karotenoid	54
Tabel 4. Hasil Uji Kapasitas Antioksidan	55
Tabel 5. Hasil Pengukuran Absorbansi Fenolik	89
Tabel 6. Hasil Pengukuran Absorbansi Flavonoid	90
Tabel 7. Hasil Pengukuran Absorbansi Frap.....	91
Tabel 8. Hasil Pengukuran Absorbansi Cuprac	94
Tabel 9. Hasil Pengukuran Absorbansi Toac	96
Tabel 10. Hasil Pengukuran Absorbansi Dpph	99



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Fenolik	4
Gambar 2. Struktur Flavonoid	5
Gambar 3. Struktur Dpph	6
Gambar 4. <i>Ulva Lactuca</i>	13
Gambar 5. <i>Gracillaria Verrucosa</i>	15
Gambar 6. <i>Saccharina Japonica</i>	18
Gambar 7. <i>Codium sp</i>	20
Gambar 8. <i>Chaetomorpha sp</i>	22
Gambar 9. <i>Eucheuma Cottonii</i>	23
Gambar 10. <i>Caulerpa lentillifera</i>	25
Gambar 11. <i>Sargassum sp</i>	27
Gambar 12. Rendemen Ekstraksi.....	57
Gambar 13. Kadar Fenolik	60
Gambar 14. Kadar Flavonoid	61
Gambar 15. Kadar Karotenoid	62
Gambar 16. Reaksi Frap	63
Gambar 17. Kapasitas Antioksidan Metode Frap	63
Gambar 18. Reaksi Cuprac	65
Gambar 19. Kapasitas Antioksidan metode cupric	65
Gambar 20. Reaksi Penghambatan Radikal Bebas	67
Gambar 21. Kapasitas antioksidan metode Dpph.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Ekstraksi Sampel Alga	77
Lampiran 2. Penetapan Kadar Fenolik	78
Lampiran 3. Penetapan Kadar Flavonoid	79
Lampiran 4. Penetapan Kadar Karotenoid	80
Lampiran 5. Penetapan Uji Antioksidan Metode Frap	81
Lampiran 6. Penetapan Uji Antioksidan Metode Cuprac.....	83
Lampiran 7. Penetapan Uji Antioksidan Metode Dpph	85
Lampiran 8. Penetapan Uji Antioksidan Metode Toac	87
Lampiran 9. Pengukuran Standar dan Kurva Kalibrasi.....	89
Lampiran 10. Sampel Alga	107
Lampiran 11. Uji Fitokimia	109
Lampiran 12. Data SPSS.....	114



ABSTRAK

Nama : Winda Utari
Nim : 70100118032
Jurusan : Farmasi
Judul skripsi : Penentuan Kadar Fenolik Total, Flavonoid Total Serta Kapasitas Antioksidan Beberapa Jenis Alga Dari Pesisir Pantai Takalar

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kadar total Fenolik, flavonoid dan karotenoid serta kapasitas antioksidan dengan pembanding vit c dan troloks yang diukur dengan metode Frap, Cuprac, Toac dan Dpph pada ekstrak metanol makroalga, sampel diambil dari Kabupaten Takalar, kemudian dikeringkan, yang diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut metanol.

Kadar fenolik, flavonoid, menggunakan reagen *Folin-Ciocalteu* dan *aluminum klorida* ($AlCl_3$). Adapun untuk menetapkan kapasitas antioksidan digunakan metode Frap, Cuprac, Toac, dan Dpph dengan reagen berturut-turut $FeCl_3$, $CuCl_2$, ammonium molybdate $(NH_4)_2MoO_4$, dan Dpph.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kadar tertinggi dari fenolik dan flavonoid adalah *Sacharina Japonica* dengan kadar , berturut-turut, $124,12 \pm 3,64$ GAE/g, dan $50,67 \pm 1,46$ QE/g dan karotenoid adalah *Caulerpa lentillifera* dengan kadar $19,57 \pm 0,19$ CE/ng serta perbandingan kadar kapasitas antioksidan dengan metode Frap tertinggi terdapat pada alga jenis Chaetomorpha dengan pembanding Vit C yaitu $17,98 \pm 0,025102$ dan troloks $21,21 \pm 0,03478$ dan dengan metode Cuprac, Toac Dpph tertinggi berturut-turut terdapat pada sampel Saccharina Japonica pembanding Vit C yaitu $39,70 \pm 0,27$ dan troloks $107,12 \pm 0,96$, Vit C yaitu $347,20 \pm 3,39$ dan troloks $26,69 \pm 0,35$, Vit C yaitu $127,72 \pm 0,79$ dan troloks $17,71 \pm 0,11$

Kata Kunci: Makroalga, fenolik, flavonoid, karotenoid kapasitas antioksidan

ABSTRACK

Name : Winda Utari
Student Number : 70100118032
Department : Pharmacy
Title : Determination of Total Phenolic Levels, Total Flavonoids and Antioxidant Capacity of Several Types of Algae From the Takalar Coast

This study aims to compare the total levels of Phenolics, flavonoids and carotenoids as well as antioxidant capacity with a comparison of vit c and troloks measured by the Frap, Cuprac, Toac and Dpph methods on macroalgae methanol extracts, samples taken from Takalar Regency, then dried, simplicia extracted using the maceration method with methanol solvents.

Phenolic levels, flavonoids, using Folin-Ciocalteu reagents and aluminum chloride (AlCl_3). As for determining the antioxidant capacity, the Frap, Cuprac, Toac, and Dpph methods are used with successive reagents FeCl_3 , CuCl_2 , ammonium molybdate $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$, and Dpph.

The results of this study obtained that the highest levels of phenolics and flavonoids were *Sacharina Japonica* with levels, respectively, 124.12 ± 3.64 GAE / g, and 50.67 ± 1.46 QE / g and carotenoids were *Caulerpa lentillifera* with levels of 19.57 ± 0.19 CE / ng as well as the comparison of antioxidant capacity levels with the highest Frap method found in *Chaetomorpha* type algae with Vit C comparison, namely 17.98 ± 0.025102 and troloks 21.21 ± 0.03478 and with the Cuprac method, The highest Toac Dpph was found in the *Saccharina Japonica* sample comparing Vit C which was 39.70 ± 0.271385 and troloks 107.12 ± 0.960284 , Vit C which was 347.20 ± 3.396237 and troloks 26.69 ± 0.358165 , Vit C which was 127.72 ± 0.790663 and troloks 17.71 ± 0.116869 .

Keywords: *Macroalgae, phenolic, flavonoid, carotenoid antioxidant capacity*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk flora serta fauna dengan potensi yang besar serta nilai ekonomi dan ekologi. Makroalga adalah kelompok tumbuhan yang memiliki berbagai macam jenis dan peran penting pada lingkungan laut. Makroalga dapat digunakan untuk makanan dan obat-obatan, terutama pada masyarakat di daerah pesisir. Dari 8000 alga, Indonesia memiliki 628 jenis makroalga yang berbeda, dan jenis makroalga yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alga jenis *Ulva lactuca*, *Gracilaria verrucosa*, *Saccharina Japonica*, *Codium Sp*, *Chaetomorpha*, *Euclima Cottonii*, *Caulerpa lentilifera*, dan *Sargassum Sp* (Palallo, 2013).

Menurut Kepel & Mantiri (2019), makroalga merupakan salah satu sumber daya yang dapat ditemukan di semua lautan karena merupakan kelompok tumbuhan terbesar yang hidup di laut, makroalga telah digunakan sebagai makanan dan obat sejak lama. Yodium, kalsium, dan selenium, di antara mineral penting lainnya untuk metabolisme tubuh, ditemukan dalam berbagai jenis alga. (Leibo, Mantiri, & Gerung, 2016). Minuman, makanan, kosmetik dan obat-obatan sering kali menggabungkan alga sebagai bahan. Alga mampu menghasilkan metabolit sekunder yang berfungsi sebagai senyawa bioaktif dan berfungsi untuk melindungi mereka dari ancaman dan kondisi lingkungan yang keras seperti salinitas tinggi beragam hama dan penyakit. Senyawa

bioaktif alga memiliki sifat antibakteri, antioksidan, antijamur, melawan kanker, dan anti-inflamasi (Ardinata, Yulianti, Asmawati, Yuniarti, & Manguntungi, 2020).

Sulawesi Selatan merupakan fokus utama pertumbuhan laut di Indonesia dengan komitmen terbesar (29%) pada tahun 2016. Di Provinsi Sulawesi Selatan, daerah penghasil rumput laut adalah Kabupaten Takalar, Jeneponto, Luwu, dan Bulukumba. Pada tahun 2016, Kabupaten Takalar menghasilkan rumput laut paling banyak. Pola pertumbuhan Kab.5,2% Takalar dari 2012 hingga 2016 (Qalsum, Adhi, & Fariyanti, 2018).

Salah satu kabupaten nasional yang dianggap berhasil dalam budidaya rumput laut adalah Takalar. Fakta bahwa Takalar memiliki pesisir laut yang cukup panjang, landai, dan lebar hingga ratusan meter dari bibir pantai menjadi keunggulan Kabupaten Takalar. .Karena surutnya Laut Takalar, budidaya rumput laut di Takalar dapat dilakukan secara sederhana. Menurut Sumadri (2018), hal ini menjadikan Takalar sebagai lokasi yang sangat baik untuk pertumbuhan budidaya rumput laut. (Sumadri, 2018).

Makroalga memiliki banyak manfaat dan itu merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang disebutkan dalam QS al-Nahl/16:14 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Allah swt menciptakan lautan yang didalamnya terdapat binatang, dan tumbuhan yang memiliki keunikan. Sebagai manusia kita harus mencari keunikan-keunikan yang ada didalam laut, sehingga manfaatnya dapat dieksplorasikan.

Alga memiliki sejarah penggunaan yang panjang di masyarakat sebagai suplemen dan obat-obatan, termasuk untuk demam, eksim, masalah ginjal, masalah empedu, dan kanker. Alga mengandung zat aktif seperti polifenol, fenol, flavonoid, terpenoid, tanin, sterol, dan glikolipid. Antioksidan alami dalam alga membantu mengobati berbagai penyakit, seperti sitotoksitas, dan mencegah penuaan dini. (melati, 2021). Namun belum pernah dilakukan penelitian tentang membandingkan beberapa jenis alga yang memiliki kadar fenolik, flavonoid serta antioksidan yang tinggi. Berdasarkan hal di atas maka saya melakukan penelitian tentang membandingkan kadar fenolik, flavonoid, serta kapasitas antioksidan yang tinggi dari beberapa jenis alga sehingga dapat mengeksplorasi potensi-potensi yang dimiliki dari beberapa jenis alga tersebut.


B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan kadar total Fenolik, flavonoid, dan karotenoid pada ekstrak larut metanol makroalga?
2. Bagaimana perbandingan kapasitas antioksidan beberapa jenis alga dengan pembanding vit c dan trolox yang diukur dengan metode FRAP, CUPRAC, TOAC dan DPPH dari alga jenis *Ulva lactuca*, *Gracilaria verrucosa*, *Saccharina Japonica*, *Codium Sp*, *Chaetomorpha*, *Euचेuma Cottonii*, *Caulerpa lentilifera*, dan *Sargassum Sp*.

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional


- a. Alga merupakan tumbuhan laut yang tidak memiliki susunan, seperti akar, batang dan daun tapi berbentuk thallus (Mudrikah, 2021).
- b. Menurut (Kusnadi, 2018) Menurut Kusnadi (2018), fenolat adalah senyawa yang terdiri dari cincin aromatik yang mengandung satu atau lebih gugus hidroksil. Fenolik memiliki senyawa yang berat molekulnya lebih tinggi, seperti antosianin, fenilpropanoid, flavonoid, tanin, dan lignin, yang struktur dasarnya adalah fenol, cincin aromatik dengan gugus hidroksil. (Putra, 2020).



Gambar 1. Fenol

(Muwarni, 2015)


- c. Menurut Suryo (2010), polifenol merupakan senyawa flavonoid dengan struktur yang mirip dengan fenilbenzopiron. Flavonoid merupakan senyawa polar yang terdiri dari cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil yang mengandung C6-C3-C6. Flavonoid larut dalam pelarut polar seperti metanol, etanol, aseton, butanol, dimetilsulfoksida, dimetilformamida, dan air karena merupakan senyawa polar dengan sejumlah gugus hidroksil. (Dewi, Pramono, Rohman, & Martien, 2022).



Gambar 2. Flavonoid

- d. TOAC adalah ukuran berapa banyak radikal bebas yang ditangkap oleh larutan uji, yang digunakan untuk mengevaluasi kapasitas antioksidan sampel dengan menggunakan reagen Ammonium molibdat. Satuannya yaitu setara dengan mg vit c/gram ekstrak atau setara dengan mg troloks/gram ekstrak. (Rubio, Hernández-Ruiz, Subiela, Tvarijonaviciute, & Ceron, 2016).
- e. Ferric reducing ability of plasma (FRAP) adalah metode yang digunakan untuk menguji kandungan antioksidan dalam tumbuh-tumbuhan yang didasarkan pada kemampuan senyawa antioksidan untuk mereduksi ion Fe^{3+} menjadi Fe^{2+} pada pH rendah yang menyebabkan pembentukan kompleks ferro-tripirydyltriazine berwarna. Satuannya yaitu setara dengan mg vit c/gram ekstrak atau setara dengan mg troloks/gram ekstrak. (Galili & Hovav, 2014).
- f. CUPRAC (CUPric Reducing Antioxidant Capacity) adalah metode pengukuran antioksidan yang didasarkan pada pengukuran absorbansi Cu(I)-neocuproine (Nc) satuannya yaitu setara dengan mg vit c/gram ekstrak atau setara dengan mg troloks/gram ekstrak (Ozyurek, et al., 2011).

- g. DPPH adalah antioksidan dengan transfer elektron yang mengikat violet dalam etanol (Garcia, et al., 2012). Radikal bebas yang dikenal sebagai senyawa DPPH stabil dalam larutan berair atau metanol. Residu gugus pikril menyebabkan warna senyawa berubah dari ungu menjadi kuning. satuannya yaitu setara dengan mg vit c/gram ekstrak atau setara dengan mg troloks/gram ekstrak (Supomo, et al., 2021)



Gambar 3. Dpph

(Supomo, et al., 2021)

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu Penentuan total aktivitas flavonoid, fenolik, dan antioksidan sampel yang diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut metanol dengan penetapan kadar menggunakan spektrofotometer uv-vis dengan menggunakan baku standar asam galat dan kuarsetin.

D. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Natasia & Jabar (2021) *Sargassum* berpotensi meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui proses imunooksidatif. Salah satu proses produksinya, yaitu proses perendaman sampel dalam air panas, dapat mempengaruhi nilai antioksidan teh alga coklat; semakin lama sampel direndam maka semakin tinggi nilai aktivitas antioksidannya. (Natasia & Jabar, 2021).
2. Inovasi penggunaan ekstrak ganggang hijau ulva sp dari pantai Luk, Sumbawa, sebagai kandidat antibakteri terhadap salmonella thypi dan staphylococcus aureus dengan menggunakan metode ekstraksi pengeringan pada konsentrasi 60% dan metode pemanasan pada konsentrasi 100% memberikan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bakteri S. thypi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ardinata et al. (2020). Sedangkan metode ekstraksi yang menggunakan konsentrasi pemanasan 80%, pertumbuhan bakteri S. aureus justru terpengaruh. Pertumbuhan bakteri S.thypi dan S.aureus sangat dipengaruhi oleh teknik pemanasan. (Ardinata, Yulianti, Asmawati, Yunianti, & Manguntungi, 2020).
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gazali, Nurjanah, Zamani (2018) Pengujian terdiri dari analisis proksimat, senyawa aktif, total fenol, aktivitas antioksidan metode DPPH dan perhitungan rendemen ekstrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi kimia yang paling dominan terdiri dari kadar abu 52,74% dan kadar karbohidrat 23,77%. Rendemen ekstrak *Sargasuum sp.* dengan pelarut etanol 0,565%, etil asetat 0,420% dan n-heksan 0,265%. Kadar total fenol etanol ekstrak 563,22 mg GAE/g, etil asetat ekstrak 13,48 mg GAE/g, n-heksan

ekstrak 30,610 mg GAE/g. Aktivitas antioksidan etanol ekstrak dengan $IC_{50} = 239,51 \text{ mg/L}$, etil asetat ekstrak 68,89 mg/L dan n-heksan ekstrak 148.16 mg/L. Ekstrak *Sargassum sp.* terdeteksi mengandung fenol, alkaloid dan triterpenoid (Gazali, Nurjanah, & Zamani, 2018).

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M.loho, Tiho, & Assa (2021) rumput laut merah memiliki kandungan antioksidan yang dapat dinilai dengan melihat kadar *total phenolic content (TPC)*. Senyawa yang banyak ditemukan ialah fenolik dan flavonoid. yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi Aktivitas antioksidan rumput laut merah (*Rhodophyta*) yang ditinjau berdasarkan kadar IC_{50} tergolong tinggi (M. Loho, Tiho, & Assa, 2021).
5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mayasari (2021) menunjukkan bahwa rumput laut *Gracillaria verrucosa*, *Sargassum sp*, dan *Chaetomorpha antennina* mengandung alkaloid dan steroid. Flavonoid dan saponin hanya terdeteksi pada jenisnya saja rumput laut *Gracillaria verrucosa* dan *Sargassum sp*. Ditemukan juga bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak, semakin tinggi persentase IC_{50} terhadap radikal bebas. *Sargassum sp* memiliki persentase penghambatan yang stabil pada konsentrasi 2-10 ppm, sehingga direkomendasikan dalam penelitian ini untuk dipertimbangkan dibudidayakan di Aceh (Mayasri, 2021).
6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wichachucherd, Pannak, Saengthong, Rodcharoen, & Koodkaew (2019) Di Thailand, *Caulerpa lentillifera J. Agardh* dibudidayakan sebagai usaha komersial karena tingkat pertumbuhan yang tinggi dan kandungan nutrisi dan antioksidannya. *Caulerpa lentillifera J. Agardh* mengandung fenolik, dan aktivitas antioksidan.

7. Berdasarkan penelitian Yap dkk. mengenai potensi antioksidan dan antibakteri rumput laut asal Malaysia *Caulerpa racemosa* dan *Caulerpa lentillifera* menunjukkan bahwa ,*C. racemosa* chloroform ekstrak memiliki TPC tertinggi ($13,41 \pm 0,86$ mg GAE/g), efek antioksidan (EC₅₀ pada $0,65 \pm 0,03$ mg/mL), dan efek antibakteri terkuat ($97,7 \pm 0,30\%$) terhadap MRSA. Analisis LCMS mengatakan bahwa ekstrak kloroform *C. racemosa* terutama asam lemak tak jenuh ganda dan tak jenuh tunggal, terpenoid, dan alkaloid, dapat menjadi sumber antioksidan baru dan antibakteri, tetapi isolasi dan pemurnian senyawa bioaktif diperlukan, untuk mempelajari mekanismenya (Yap, Tay, Tan, Yow, & Chew, 2019).
8. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh S.Aftabuddin dkk (2020) menunjukkan bahwa konsentrasi penghambatan yang tercatat (IC₅₀) sesuai standar asam askorbat *C. racemosa* dan *U. intestinalis* masing-masing adalah 119,62 dan 34,274 g/mL. Nilainya signifikan secara statistik ($p < 0,05$) dibandingkan dengan antioksidan referensi agen asam askorbat. Dalam uji antibakteri, ekstrak *C. racemosa* menunjukkan zona hambat yang lebih tinggi ($22,65 \pm 0,58$ mm) dibandingkan *U. intestinalis* ($17 \pm 0,28$ mm). Selain itu, *U. intestinalis* menunjukkan LC₅₀ . yang lebih rendah nilai dari *C. racemosa* dalam aktivitas sitotoksik. Analisis fitokimia mengungkapkan bahwa keduanya rumput laut memiliki alkaloid, flavonoid, glikosida, fenol, saponin, steroid dan tanin (S. AftabUddin, S. Akter, S. Hossen, & M. A. Rahman, 2020)
9. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, Kilawati, & Fadjar (2018) *Eucheuma cottonii* mengandung senyawa yang diklasifikasikan sebagai sulfat galaktosa. Uji aktivitas antioksidan dengan DPPH mengungkapkan bahwa ekstrak

rumpun laut *Eucheuma cottonii* berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi air dari radikal bebas. Konsentrasi yang cukup besar. Konsentrasi ekstrak rumput laut *Eucheuma cottonii* dalam memerangi DPPH 50% adalah 39,926 ppm. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haryani dkk (2022) Dari hasil pengujian aktivitas antioksidan, diperoleh nilai IC_{50} berkisar antara 100– 500, sehingga ekstrak *Codium* aktivitas antioksidannya termasuk golongan sedang.

10. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasedya dkk (2019) *Ulva lactuca* dari pesisir TA (ULA) dan Batu Layar (ULB) di Lombok diuji aktivitas antioksidannya menggunakan metode DPPH dan memiliki nilai IC_{50} yang rendah masing-masing sebesar 522,23 43 g/mL, menurut Prasedya et al. (2019) dan 534,76 14 g/mL bila dibandingkan dengan *Ulva lactuca* (ULS;) Seriwe. Selain itu, kandungan total fenolik (TPC) ULS, ULB, dan ULA masing-masing adalah 2,675 0,5 mgGAEg⁻¹, 5,13 0,8 mgGAEg⁻¹, dan 5,33 2,1 mgGAEg⁻¹, 19,031 2,1 mgREg⁻¹, 25.315 2,6 mgREg⁻¹, dan 28,053 1,58 mgREg⁻¹ adalah kadar flavonoidnya.

Persamaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan metode antioksidan yaitu DPPH dan mengukur kadar fenolik serta flavonoid.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu beberapa kajian pustaka diatas tidak menggunakan metode antioksidan seperti TOAC, FRAP dan CUPRAC serta kapasitas antioksidan dari sampel alga dan tidak terdapat perbandingan dari jenis alga.

Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan dapat menjelaskan kadar fenolik, flavonoid serta kapasitas antioksidan dengan menggunakan metode antioksidan FRAP, CUPRAC, TOAC dan DPPH dari 8 jenis makroalga.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk membandingkan kadar total Fenolik, flavonoid dan karotenoid pada ekstrak metanol makroalga
2. Untuk membandingkan kapasitas antioksidan dengan pembanding vit c dan troloks yang diukur dengan metode FRAP, CUPRAC, TOAC dan DPPH dari dari alga jenis *Ulva lactuca*, *Gracilaria verrucosa*, *Saccharina Japonica*, *Codium Sp*, *Chaetomorpha*, *Eucheuma Cottonii*, *Caulerpa lentilifera*, dan *Sargassum Sp*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu

1. Menjadi sumber informasi secara ilmiah mengenai kandungan kadar total fenolik, flavonoid serta kapasitas antioksidan dari 8 jenis alga
2. Menjadi sumber informasi secara ilmiah mengenai perbandingan kadar fenolik, flavonoid serta kapasitas antioksidan dari 8 jenis alga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alga

1. Klasifikasi alga

Kingdom	: Plantae
Division	: Chlorophyta
Class	: Ulvophyceae
Ordo	: Ulvales
Familly	: Ulvaceae
Genus	: Ulva
Species	: <i>Ulva lactuca</i>

Deskripsi *Ulva Lactuca*

Ulva lactuca juga dikenal sebagai selada laut, adalah makroalga rumput laut dalam keluarga Chlorophyta. Karena sel rumput laut mengandung banyak klorofil, yang memberi mereka warna hijau, chlorophyta termasuk dalam divisi. Hidup di air laut, dan thallusnya rata dan tipis, seperti pedang, dengan dua lapisan sel. Sebuah pirenoid dan nukleus dengan kloroplas berbentuk cangkir membentuk sel masing-masing spesies. *Ulva lactuca* dapat tumbuh setinggi 100 cm dan memiliki bilah berbentuk tali dengan tepi halus namun bergelombang. Warnanya hijau apel cerah. Setiap helai biasanya memiliki pusat pucat dan secara bertahap menjadi lebih gelap ke arah tepi. Tanaman ini biasanya ditemukan di perairan dangkal (sampai kedalaman 10 meter di zona intertidal atas) di daerah tropis. substrat yang

tepat, sering ditemukan di daerah dengan kandungan nutrisi tinggi, seperti bakau, atau di dekat sumber air tawar. Salinitas 29-31,5 % ideal untuk pertumbuhan Ulva. Iklim Ulva adalah antara 28 dan 31° C (Dewi E. N., 2018).



Gambar 4. *Ulva Lactuca*
(Dewi e. n., 2018)

Manfaat *Ulva Lactuca*

Manusia bisa mendapatkan makanan sehat dari *Ulva lactuca*. Karena serat dalam rumput laut ini dapat membantu pencernaan, mengkonsumsi dalam jumlah tertentu dapat membantu mereka yang mengkonsumsinya mencerna makanan dengan lebih baik. Selain itu, *Ulva lactuca* memiliki sejumlah besar protein. *Ulva lactuca* adalah subjeknya. Kering memiliki 18,7% air, 14,9% protein, 0,04 persen lemak, 50,6% gula tepung, dan 0,2 persen serat. Vitamin B1, vitamin C, dan 31 ppm yodium adalah beberapa vitamin yang ada. Makanan langka seperti nori dapat dibuat dari rumput laut dari genus *ulva lactuca*. Nori, yang berasal langsung dari Jepang, Korea, dan China, dapat ditemukan di restoran yang menyajikan masakan ini di Indonesia. Produk yang mengandung nori didatangkan dari Thailand, China,

dan Korea. Dikarenakan melimpahnya rumput laut di Indonesia yang belum diolah secara optimal, maka perlu dihasilkan produk nori darinya. Selain itu, karena kandungan bahan bioaktif dan seratnya yang tinggi, produk nori menjadi primadona selain sebagai makanan sehat. *Ulva lactuca* juga mengandung mineral yang tinggi. Selain itu, polisakarida, terutama hemiselulosa dan selulosa dengan kandungan lignin lebih rendah dari tanaman darat, berpotensi sebagai sumber alternatif biomassa untuk berbagai aplikasi.. (Dewi E. N., 2018).

2. Klasifikasi alga

Kiangdom	: Plantae
Division	: Rhodophyta
Class	: Rhodophyceae
Ordo	: Gigartinales
Familly	: Gracillariaceae
Genus	: Gracillaria
Species	: <i>Gracillaria verrucosa</i>

Deskripsi Alga Merah

Morfologi rumput laut ini dicirikan oleh thallus berbentuk silinder dengan buku-buku pendek (sekitar 1-1,5 cm). Di bagian atas terbentuk rumpun padat bercabang dikotomis yang tidak beraturan. *Thallus* memiliki ujung tumpul dan sedikit berongga. Rumpun dapat tumbuh tingginya sekitar 5-7 cm. *Thallus* berwarna pirang. Melekat pada bebatuan di dalam dan di luar rataan terumbu (Devina Sarita, Subrata, Sumaryani, & Rai, 2021).



Gambar 5. *Gracillaria verrucosa*
(Junaedi, 2004)

Manfaat Alga Merah

Hasil analisis fitoimia yang dilakukan dengan menggunakan FTIR dan LCMS, sampel mengandung berbagai senyawa flavonoid, terpenoid, alkaloid, -karoten, -apo-8'-karoten, dan -tokoferol yang berfungsi sebagai antioksidan Alga merah merupakan salah satu dari sekian banyak spesies alga yang aktivitas biologisnya lebih banyak dibandingkan spesies lainnya. Senyawa kimia yang terdapat pada beberapa spesies telah didominasi dari famili *Rhodomelaceae*. Alga merah merupakan sumber pembentuk utama *halogenated compounds*. Diantara sekian

banyak khasiat senyawa *Halogenated compounds* salah satunya memiliki sifat sebagai antibakteri, antifungi, antiinflamasi, iktiotosksik, dan insektisidal. Ini juga mengandung polieter, terpenoid, sejumlah asam amino, asetogenin, asam nukleat, dan shikimate dan asetat. Ganggang merah dapat diproduksi sebagai bahan obat alami. Ganggang merah dapat mempertahankan diri terhadap penyakit dan predator dengan menghasilkan metabolit aktif. Telah ditunjukkan bahwa potensi metabolit bioaktifnya memiliki sifat biologis antioksidan, antijamur, antibakteri, antivirus, dan antiinflamasi. Karotenoid, polifenol, terpenoid, xantofil, dan alkaloid merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh alga merah.

Berbagai macam rumput laut telah banyak dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati berbagai penyakit. Untuk pengobatan asma, batuk, wasir, maag, mimisan (mimisan), dan perawatan kulit sebagai obat antiperautic dan obat cacing. Gangguan saluran kemih dapat diatasi dengan beberapa jenis rumput laut lainnya. Pemanfaatan rumput laut saat ini berkembang pesat. Hasil olahan rumput laut dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan, agar-agar, dan furselaran merupakan bahan baku penting dalam industri makanan, kosmetik, farmasi, dan lain-lain (Fitri, 2020).

3. Klasifikasi Alga

Kiandom	: Plantae
Division	: Heterokontophyta
Class	: Phaeophyceae
Ordo	: Laminariales
Familly	: Laminariaceae
Genus	: Saccharina
Species	: Saccharina japonica.

Deskripsi *Saccharina Japonica*

Thallus *Saccharina japonica* terdiri dari holdfast (berbentuk seperti akar) yang digunakan untuk menempel pada substrat, stipe pendek (berbentuk seperti batang), dan blade (berbentuk seperti daun). Blade seperti sabuk dengan seluas 10 hingga 20 cm dan panjang satu meter. Tepi bilah yang bergelombang dan tumpang tindih dan tampak tebal di bagian tengah dan tipis di bagian tepinya. Sementara stipe menjaga bilah dan thallus tetap kokoh dengan menopangnya secara keseluruhan, kombu tumbuh subur di daerah dengan air dingin. Di daerah sublittoral, akan menemukan holdfast, komponen mirip akar yang menempel pada substrat. Tergantung pada kekeruhan air laut, sebaran terdalamnya bisa mencapai lebih dari 10 meter. Penyebarannya dari kawasan Asia-Pasifik hingga pantai barat laut Samudra Pasifik. Dapat ditemukan dari pulau utara Hokkaido dan daerah pesisir dekat Pegunungan Kinkazan, pulau Honsh,

dan pantai utara laut Okhotsk hingga Wonsan pada Semenanjung Korea di sepanjang pantai utara Laut Jepang. (Rivani, 2015).



Gambar 6. *Saccharina Japonica*
(Zhang, et al., 2013).

Manfaat *Saccharina Japonica*

Saccharina japonica dapat dikonsumsi manusia, pakan ternak, keperluan industri, aplikasi medis, dan keperluan industri. Yodium, algin, dan manitol adalah produk sampingan utama dari ekstraksi Laminaria. Untuk mencegah gondok dan gangguan tiroid lainnya, yodium ditambahkan ke garam dan lainnya. makanan. Ekstraksi alginat atau asam alginat menghasilkan hidrokoloid atau phycocolloid yang dikenal sebagai algin. Selain itu, digunakan dalam industri makanan, percetakan, medis, dan tekstil.

Di negara-negara Asia, manitol digunakan sebagai antidepresan. di mana berbagai jenis makanan dibuat dari rumput laut. Selain itu, Laminaria digunakan di Cina sebagai pakan ternak dan ayam. Laminaria kadang-kadang diolah menjadi produk yang dikenal sebagai "lameal" (Laminaria meal), yang mirip dengan tepung ikan atau soymeal tetapi

kekurangan protein. *Saccharina japonica*, lebih sering disebut sebagai kombu, telah diolah menjadi berbagai makanan di Jepang. Mayoritas algin dan manitol dari *Laminaria* yang diekstraksi diekspor ke China. Bahan untuk konsumsi manusia terbuat dari sejumlah kecil Produksi *Laminaria*. *Laminaria japonica* juga digunakan dalam kosmetik sebagai bahan utama di Korea. (Rivani, 2015).

4. Klasifikasi Alga

Kiangdom	: Plantae
Division	: Chlorophyta
Class	: Ulvophyceae
Ordo	: Bryopsidales
Familly	: Codiaceae
Genus	: Codium
Species	: Codium sp.

Deskripsi *Codium sp*

Codium sp disebut sebagai "pencuri tiram" karena kecenderungannya untuk menempel pada tiram, mengapung, dan membawa hewan lain bersamanya. Memiliki nama "*Dead Man's Fingers*" atau "*Green Sea Fingers*" karena jari-jari ini terdiri dari cabang-cabang bulat dan bengkak yang dapat tumbuh hingga 1 meter panjangnya. Dapat juga disebut "rusa rumput laut", "rumput laut spons", "spons hijau" dan "bulu hijau". Ini memiliki tekstur lembut dan warna hijau tua. *Codium* tumbuh subur di

kawasan lindung seperti pelabuhan dan teluk, di mana ia bukan sumber makanan utama bagi banyak spesies invertebrata. (Nur, 2021).



Gambar 7. *Codium sp*
(Ilhamdy, Jumsurizal, Bahari, & Pratama, 2021).

Manfaat *Codium sp*

Komposisi kimia ekstrak enzimatis *Codium sp.* adalah sebagai berikut: protein 11%, gula netral 31%, sulfat 0,8%, asam uronat 0,6%, dan protein (3,0-15,7%), dengan sedikit asam uronat (1,1-4,2) dan berbagai kadar manosa (91,318,7), glukosa (62,7-8,6%), dan galaktosa (37,5-59,5%). Manusia mengkonsumsinya sebagai makanan tambahan, untuk mengobati demam, terutama pada anak-anak, dan untuk mengobati cacingan tanpa menimbulkan efek samping. Juga digunakan sebagai obat herbal di China untuk mengobati sakit gembur-gembur, cacingan, dan berbagai masalah lain dengan saluran kemih. Karena sifat antikoagulannya yang kuat, spesies *Codium sp.* mendapatkan perhatian. *Codium sp.* Memiliki peran penting dalam nutrisi dan kesehatan manusia. *Codium sp.* ditemukan dalam sebuah penelitian yang digunakan untuk mengobati peradangan dan memiliki sifat antioksidan, antivirus, dan melawan kanker. Ekstrak sulfat *Codium sp.*

polisakarida menunjukkan aktivitas antioksidan dan antibakteri yang tinggi (Nur, 2021).

5. Klasifikasi Alga

Kiangdom	: Plantae
Division	: Chlorophyta
Class	: Cholorophyceae
Ordo	: Ulotrichales
Familly	: Ulotrichaceae
Genus	: Chaetomorpha
Species	: Chaetomorpha sp

Deskripsi *Chaetomorpha*

Thallus tumbuh merayap di atas substrat dalam rumpun yang terbuat dari filamen seperti ganggang yang tidak bercabang yang berbentuk silinder, seperti benang, melingkar, kusut, dan kaku atau sedikit terjalin. Hijau muda dan epifit yang tumbuh pada ganggang lain. Memiliki *holdfast rhizoid* yang ukurannya sangat kecil. Habitat alga ini hidup berdampingan dengan alga atau lamun atau karang mati dan benda terapung. (Meriam, Kepel, & Lumingas, 2016).



Gambar 8. *Chaetomorpha sp*
(Titlyanov, Titlynova, Li, & Huang, 2017)

Manfaat *Chaetomorpha*

Chaetomorpha mempunyai kegunaan sebagai bahan tambahan pada industri kertas karena memiliki kandungan selulase yang tinggi (Devina Sarita, Subrata, Sumaryani, & Rai, 2021).

6. Klasifikasi Alga

Kiangdom	: Plantae
Division	: Chlorophyta
Class	: Cholorophyceae
Ordo	: Gigartinales
Familly	: Solieraceae
Genus	: Eucheuma
Species	: <i>Eucheuma cottonii</i>

Deskripsi Rumput laut

Ada varietas mikroskopis (kecil) dan makroskopik (berbentuk besar) rumput laut *Eucheuma cottonii*. *Eucheuma cottonii* atau rumput laut adalah nama umum untuk jenis mikroskopis ini. *Thallus* ini memiliki berbagai bentuk; Ada yang bulat, seperti tabung dan kantong, sementara yang lain pipih, seperti rambut, atau pipih. Struktur *thallus* terdiri dari satu sel (uniseluler) dan banyak sel (multiseluler). Di wilayah ini, ada dikotomis (dua atau lebih terus menerus), menyirip (dua atau lebih berlawanan sepanjang *thallus* utama), pectinate (berjajar dalam arah yang sama pada satu titik di *thallus* utama), ferticillate (berpusat di sekitar sumbu atau batang utama), dan cabang *thallus* sederhana (tidak bercabang). Berbagai jenis bahan *thallus* termasuk agar-agar, yang lunak seperti agar-agar, berkapur, yang dilapisi keras atau mengandung kapur, tulang rawan, yang seperti tulang rawan, dan spons, yang berongga. (Surni, 2014).



Gambar 9. *Eucheuma cottonii*.

(Cokrowati, Diniarti, Setyowati, Waspodo, & Marzuki, 2019).

Manfaat Rumput laut

Senyawa karagenan dan fenolik, khususnya flavonoid, ditemukan dalam *Eucheuma cottonii*. Sifat antimikroba, antiinflamasi, antipiretik, dan antikoagulan dapat ditemukan pada senyawa polisakarida yang terbuat dari berbagai spesies alga hijau. (Surni, 2014).

7. Klasifikasi Alga

Kiangdom	: Plantae
Division	: Chlorophyta
Class	: Chlorophyceae
Ordo	: Caulerpales
Familly	: Caulerpaceae
Genus	: Caulerpa
Species	: <i>Caulerpa lentillifera</i>

Deskripsi *Caulerpa lentillifera*

Caulerpa adalah golongan alga hijau, thallus (cabang) berbentuk lembaran, batangan dan bulatan, berstruktur lembut sampai keras dan siphonous. Rumpun terbentuk dari berbagai ragam percabangan, mulai dari sederhana sampai yang kompleks seperti yang terlihat pada tumbuhan tingkat tinggi, ada yang tampak seperti akar, batang dan daun. Keberadaan anggur laut tersebar hampir diseluruh perairan Indonesia. Umumnya mereka tumbuh di laut dangkal dengan aliran air yang tenang dan menempel pada substrat pasir. Tumbuhan ini memiliki spektrum kimia dan biologi yang cukup luas,

termasuk kemampuan melawan radikal bebas dengan antioksidan. Terdiri dari ramuli yang membentuk bulatan kecil yang sering saling berdekatan di sepanjang cabang berjarak sekitar 3-5 cm. Thallus memiliki warna hijau tua dan diameter 1-2 mm. *Caulerpa lentillifera* memiliki thallus dimana cabangnya seperti anggur dan tanaman merambat bulat dengan ramuli mulai dari 17 hingga 31 dan diameter 1,26 milimeter.(Nurfa, 2021).



Gambar 10. *Caulerpa lentillifera*
(Putri, 2017).

Manfaat *Caulerpa lentillifera*

Mengandung nutrisi tinggi dan tidak mengandung zat-zat berbahaya bagi tubuh sehingga tumbuhan ini sangat aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Selain itu, seluruh bagian tumbuhan rumput laut lawi-lawi ini dapat dikonsumsi. Kandungan nutrisi lawi-lawi dalam kadar per 100 gr, yaitu energi 18 kkal, protein 0,5 gr, lemak 0,9 gr, karbohidrat 2,6 gr, kalsium 307 mg, fosfor 307 mg, zat besi 9,9 mg, vitamin A 0 1 μ , vitamin B1 0 mg dan kandungan vitamin C 1,3 mg. Rumput laut ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah memiliki nutrisi yang tinggi dengan kadar protein hingga 30%, yang memiliki banyak kandungan antioksidan dan karotenoid,

dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan mudah untuk dikembangkan (Nurfa, 2021).

8. Klasifikasi Alga

Kiangdom	: Plantae
Division	: Phaeophyta
Class	: Phaeophyceae
Ordo	: Fucales
Familly	: Sargassaceae
Genus	: Sargassum
Species	: <i>Sargassum sp</i>

Deskripsi *Sargassum sp*

Sargassum memiliki *thallus* silindris dengan paku kecil merapat dan penahan yang membentuk cakram kecil dengan akar yang khas tebal dan stolon yang memanjang ke segala arah. *Thallus* dengan batang pendek dan cabang utama yang tumbuh lebat di ujungnya. *Thallus* berbentuk daun kecil, oval, memiliki tepi bergerigi atau seperti gergaji, dan urat daun tidak terlalu jelas, ujungnya melengkung rata atau meruncing, habitatnya pada substrat bebatuan (Shobir, Triastinurmiatiningsih, & Ismanto, 2019).



Gambar 11. *Sargassum sp*

(Handayani, Utomo, Nuraidah, Pramuliati, & Fahreza, 2020)

Manfaat *Sargassum sp*

Selain sifat antibakteri dan antikoagulannya, *Sargassum* termasuk dalam genus *Sargassum*, yang juga mengobati gangguan tiroid, tekanan darah tinggi, dan tumor. Protein, asam folat, yodium, dan nutrisi lainnya semuanya dapat ditemukan di *Sargassum*. Di Jepang dan Korea, *Sargassum* digunakan sebagai bahan makanan. (Shobir, Triastinurmiatiningsih, & Ismanto, 2019).

B. Antioksidan

Karena menghambat dan menetralkan reaksi oksidasi yang melibatkan radikal bebas, antioksidan memainkan peran penting dalam mencegah berbagai penyakit degeneratif, termasuk kardiovaskular, karsinogenesis, dan lain-lain, terjadi di dalam tubuh. Tubuh membutuhkan senyawa antioksidan untuk menetralkan radikal bebas dan melindungi sel normal, protein, dan lemak dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan menyumbangkan satu elektron, netralisasi memungkinkan senyawa menjadi stabil, terjadi reaksi terminasi, reaksi radikal berhenti, atau stres oksidatif di dalam sel dapat dicegah (Faruki, 2021).

Antioksidan adalah senyawa kimia yang diproduksi secara alami oleh tubuh. Memiliki kapasitas untuk mendonorkan atom hidrogen kepada radikal bebas, menghentikan reaksi berantai, dan mengubah bentuk radikal bebas yang tidak stabil. Berdasarkan asalnya, antioksidan dibagi menjadi dua kategori: antioksidan alami dan sintetis antioksidan, yang dapat menghentikan pembentukan radikal bebas. (Kamoda, et al., 2021).

Asam organik (asam galat), vitamin (tokoferol), flavonoid (quercetin), dan vitamin C (asam askorbat) yang merupakan turunan dari senyawa asam kumarin hidroksamat, merupakan sumber kimia utama antioksidan alami yang terdapat pada makanan dan tumbuhan. menjadi dua kategori: enzimatik: Glutathione reduktase (GR), polifenol oksidase (PPO), superoksida dismutase (SOD), katalase (CAT), peroksidase (POX), asam askorbat peroksidase (APX), dan non-enzimatik; Misalnya, vitamin C (L- asam askorbat), senyawa fenolik,

karotin dan α -tokoferol. Senyawa fenolik yang sangat aktif sebagai antioksidan alam dan paling banyak ditemukan dalam tanaman diantaranya adalah asam galat dan kuersetin. Pengujian aktivitas antioksidan non enzimatis pada tanaman dan bahan pangan umumnya dapat menggunakan metode yang berbasis air 2,2-difenil-1- pikrilhidrazil (DPPH) (reaksi dengan radikal bebas), Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) (reaksi reduksi-oksidasi), Ferrous Ion Chelating (FIC) (reaksi kelat atau melalui pembentukan kompleks), dan yang berbasis lemak misalnya dengan Thiobarbituric acid (TBA). Banyaknya metode uji aktivitas antioksidan tersebut dapat memberikan hasil uji yang beragam. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya pengaruh dari struktur kimiawi antioksidan, sumber radikal bebas, dan sifat fisiko-kimia sediaan sampel yang berbeda. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemilihan metode analisa aktivitas antioksidan yang tepat dan selektif untuk suatu jenis sampel tertentu (Maesaroh, Kurnia, & Anshori, 2018).

C. Ekstraksi

Pengertian ekstraksi adalah proses menghilangkan satu atau lebih komponen senyawa (analit) dari sampel dengan pelarut tertentu yang sesuai. Bahan kimia dari bahan alam akan diekstraksi sebagai tujuannya. Senyawa aktif dalam sampel akan segera larut ketika pelarut memasuki sel, sehingga menyebabkan perbedaan konsentrasi zat terlarut antara di dalam dan di luar sel. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi adalah jenis pelarut. Tergantung pada seberapa polarnya, pelarut termasuk dalam salah satu dari tiga kategori: non -polar (seperti heksana dan toluena), semi-polar (seperti DMSO dan aseton), dan polar (seperti asam asetat dan etanol). Sementara itu, pelarut

dibagi menjadi 5 kategori menurut fungsinya: pelarut sejati, pengencer, laten, penghilang cat, dan media reaksi. (Faruki, 2021).

D. Metode Ekstraksi

Dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai, ekstraksi merupakan salah satu metode untuk memisahkan atau menghilangkan satu atau lebih komponen suatu senyawa (analit) dari suatu sampel. Tujuan ekstraksi adalah mengekstrak bahan kimia dari bahan alami. Pelarut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi. Pelarut dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan polaritasnya: polar (seperti asam asetat dan etanol), semi-polar (seperti DMSO dan aseton), dan non-polar (seperti heksana dan toluena). Sementara itu, pelarut dibagi menjadi lima kategori sesuai dengan fungsinya. : pelarut sejati, pengencer, laten, penghilang cat, dan media reaksi. Ada banyak cara yang berbeda untuk metode ekstraksi, salah satunya dapat dipecah ke dalam kategori berikut berdasarkan suhu:

Cara dingin

1. Maserasi

Merupakan metode ekstraksi padat-cair yang paling sederhana adalah maserasi. Untuk melarutkan analit dalam sampel, prosedur ekstraksi melibatkan merendam sampel dalam pelarut yang sesuai pada suhu kamar. Untuk mempercepat proses pelarutan analit, sampel biasanya direndam selama 3 sampai 5 hari dengan sesekali diaduk. Untuk mengekstrak analit sepenuhnya, ekstraksi diulangi. Penggunaan pelarut tidak berwarna adalah tanda bahwa semua analit telah terekstraksi sepenuhnya. Ekstraksi ini memiliki keuntungan karena dapat digunakan

analit yang tahan panas dan tidak tahan panas berkat alat dan prosedurnya yang mudah. Penggunaan banyak pelarut merupakan kekurangannya.

2. Perkolasi

Perkolasi merupakan jenis ekstraksi yang diselesaikan dengan mengalirkan zat terlarut secara perlahan pada contoh dalam perkolator. Penambahan pelarut secara terus menerus memastikan bahwa pelarut baru digunakan selama proses ekstraksi dalam metode ini. Pola penambahan pelarut dapat dilakukan baik dengan penambahan pelarut dalam jumlah banyak secara teratur atau dengan menggunakan pola tetes pelarut dari wadah tersendiri yang disesuaikan dengan jumlah pelarut yang keluar. Cara panas

1. Refluks

Teknik umum untuk mengekstraksi suatu senyawa dari tumbuhan adalah ekstraksi refluks, yang melibatkan penguapan pada suhu tinggi. Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi refluks akan menguap pada suhu yang digunakan, tetapi kondensor dapat mendinginkannya ke suhu di mana ia akan mengembun menjadi uap dan jatuh kembali ke bejana reaksi, memungkinkan pelarut tetap selama proses.

2. Sokletasi

Sokletasi adalah salah satu metode ekstraksi yang menggunakan peralatan soxhlet. Pelarut dan sampel dipisahkan selama ekstraksi ini. Prinsipnya ekstraksinya adalah ekstraksi dilakukan menggunakan pelarut yang relatif sedikit. Pelarut dapat diuapkan setelah ekstraksi

selesai untuk mendapatkan ekstrak. Biasanya, pelarut yang mudah menguap atau memiliki titik didih rendah digunakan. Sokletasi dilakukan dengan cara pemanasan, sehingga uap yang timbul setelah dingin secara kontinyu akan membasahi sampel, secara teratur pelarut tersebut dimasukkan kembali kedalam labu dengan membawa senyawa kimia yang akan diisolasi tersebut. Pelarut yang telah membawa senyawa kimia pada labu distilasi yang diuapkan dengan rotary evaporator sehingga pelarut tersebut dapat diangkat lagi bila suatu campuran organik berbentuk cair atau padat ditemui pada suatu zat padat, maka dapat diekstrak dengan menggunakan pelarut yang diinginkan.

3. Digesti

Digesti adalah maserasi dengan pengadukan secara berulang pada temperature yang lebih tinggi dari temperatur kamar yaitu pada suhu 40-50°C.

4. Infus

Infus merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pelarut air pada temperature penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 90°C) selama 15 menit.

5. Dekok

Dekok adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur 90°C selama 30 menit (Faruki, 2021).

E. Fenolik

Fenolik merupakan golongan fitokimia yang terbesar pada tumbuhan yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan (Indra, Nurmalasari, & Kusmiati, 2019).

Sebagian besar antioksidan alami tanaman adalah senyawa fenolik. Senyawa fenolik memiliki satu (fenol) atau lebih (polifenol) cincin fenol, yaitu kumpulan hidroksi spesifik yang ditambahkan ke cincin sehingga mudah dioksidasi dengan melepaskan partikel hidrogen revolusioner. Senyawa fenol memiliki banyak potensi sebagai antioksidan karena mampu menghasilkan radikal fenoksi yang stabil selama reaksi oksidasi, senyawa fenol memiliki banyak potensi sebagai antioksidan. Senyawa fenolik alami seperti flavonoid, tanin, tokoferol, kumarin, lignin, turunan asam sinamat, asam organik polifungsional, dan senyawa eter, ester, atau glikosida adalah contoh polifenol (Dhurhania & Novianto, 2018).

F. Flavonoid

Karena flavonoid adalah antioksidan, sehingga dapat mencegah penyakit kardiovaskular, kanker, dan penyakit degeneratif terkait penuaan komponen sel lainnya. (Indra, Nurmalasari, & Kusmiati, 2019).

Karena bersifat antioksidan, senyawa flavonoid dapat membantu orang mempertahankan diri terhadap penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas. Senyawa flavonoid diketahui memiliki kemampuan untuk melawan obesitas yang merupakan akar penyebab DM, dengan mencegah akumulasi lemak melalui aktivitas antioksidannya. Selain itu, diketahui bahwa senyawa flavonoid menurunkan risiko kanker dan penyakit jantung (Hanin & Pratiwi, 2017).

G. Tinjauan Islam

Lingkungan sekitar dapat dipengaruhi oleh perilaku manusia. Perilaku negatif dapat merusak lingkungan, sedangkan perilaku positif dapat menjaga kelestarian lingkungan. Akibatnya, sebagai manusia, kita harus bertanggung jawab atas interaksi kita dengan alam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Swt di dalam QS. Al-A'raf/7: 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

Quraish Shihab menafsirkan surah Al-A'raf ayat 56, bahwa Janganlah membuat kerusakan di muka bumi yang telah dibuat dengan menebar kemaksiatan, kezaliman dan permusuhan. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut akan siksa-Nya dan berharap pahala-Nya. Kasih sayang Allah sangat dekat kepada setiap orang yang berbuat baik, dan pasti terlaksana.

Mencelakakan adalah salah satu bentuk pelanggaran, dan ayat ini melarangnya di muka bumi. Semesta alam diciptakan Allah Swt dalam keadaan yang harmonis, dan serasi. Allah Swt telah menciptakannya dalam keadaan baik, serta memerintahkan hamba-hambaya untuk memperbaikinya. Salah satu bentuk perbaikan adalah kenyataan bahwa Allah SWT mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan manusia. Kerusakan

berikutnya jauh lebih buruk daripada sebelum perbaikan. Meskipun faktanya juga dilarang memperburuk kerusakan atau menghancurkan sesuatu yang baik, ayat tersebut membuat larangannya jelas. Larangan ini berlaku untuk semua bidang, termasuk merusak hubungan baik jasmani maupun rohani, kehidupan, dan penghidupan orang lain (dalam perdagangan, misalnya), menyebabkan kerusakan lingkungan, dll. Allah swt menciptakan bumi dan semua alatnya untuk manusia agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. (Mustakim, 2017)

Menurut peneliti maksud dari QS. Al-A'raf ayat 56 yaitu larangan dalam membuat kerusakan di bumi dan hendaknya sebagai manusia kita melakukan kebaikan terhadap semua makhluk Allah Swt dalam semua ekosistem baik ekosistem yang ada di darat, ekosistem buatan maupun ekosistem perairan.

Hubungan ayat dengan penelitian ini yaitu Alga merupakan organisme yang hidup di habitat perairan laut. Sebagai manusia kita harus berbuat kebaikan dalam hal ini melestarikan lingkungan laut atau menjaga ekosistem laut sehingga alga dapat tumbuh dengan baik.

Alga merupakan makanan yang baik dan bergizi yang banyak memiliki manfaat bagi kesehatan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2:164 :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَآخِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.

Menurut Quraish Shihab, ayat 164 Surat al-Baqarah menyatakan bahwa Allah telah menciptakan bukti bagi mereka yang ingin berpikir untuk menunjukkan keberadaan dan keilahian-Nya. tanpa bertabrakan, dan fakta bahwa beberapa dari mereka memancarkan cahaya untuk alam semesta ini adalah contoh bukti. Daratan dan laut yang membentuk bumi, siklus siang-malam, dan manfaat yang datang darinya. Orang-orang dan kekayaan diangkut melintasi lautan dengan kapal. Hanya Allah yang bertanggung jawab atas pelayarannya. Dia meniupkan awan, mengirimkan angin, hujan, memberi kehidupan pada hewan, mengairi bumi, dan menanam tumbuhan. Dia mengirimkan angin dari berbagai arah yang menerbangkan awan yang berada di antara bumi dan langit. Mungkinkah hukum yang teratur dan tepat itu diciptakan oleh Yang Maha Mengetahui, Yang Mahakuasa, ataukah ada secara mandiri? Fakta bahwa alam semesta penuh dengan benda-benda angkasa sebelumnya telah diisyaratkan dalam ayat di atas oleh ilmu pengetahuan kontemporer. Ayat sebelumnya memerintahkan kita untuk mengamati fakta-fakta ilmiah tentang alam semesta, seperti pembentukan jutaan gugus bintang yang sangat jauh, planet-planetnya. , dan hukum-hukum Allah yang mengatur semuanya. Selain itu poros (putaran) bumi pada porosnya yang terus-menerus melahirkan. Ayat sebelumnya kemudian menekankan siklus hujan berulang,

yang dimulai dengan penguapan air laut. membentuk awan, mengental, menjadi dingin, dan pada akhirnya jatuh sebagai hujan, zat pemberi kehidupan di Bumi. Kedua konsep ini dirujuk dalam ayat tersebut. Disebutkan juga tentang perputaran angin. Orang yang benar-benar memperhatikan akan dapat merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam penjelasan ini.

Adapun menurut peneliti maksud dari Q.S Al-Baqarah ayat 164 yaitu Allah menciptakan langit dengan ketinggian dan keluasannya, bumi yang berisi lautan yang didalamnya terdapat binatang dan tumbuhan yang memiliki manfaat dan berguna untuk manusia, dalam hal ini alga yang memiliki manfaat sebagai bahan makanan dan obat-obatan.

Alga memiliki manfaat sebagai antiinflamasi, antibakteri, antijamur, kosmetik, bahan industri, antioksidan, makanan dan obat-obatan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Terjemahnya : Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni, no:3289).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui alga jenis apa yang memiliki nutrisi lebih tinggi sehingga dapat bermanfaat oleh banyak manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan eksperimental yang dilakukan di laboratorium Kimia Analisis dan Fitokimia.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada laboratorium biologi farmasi untuk proses preparasi sampel dan laboratorium kimia analisis untuk melakukan analisis antioksidan terhadap sampel.

2. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Agustus 2022

C. Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Chaetomorpha*, *Eucheuma Cottonii*, *Sargassum*, *Saccharina Japonica*, *Caulerpa lentillifera*, *Codium sp*, *Ulva lactuca* dan *Gracillaria verrucosa* yang didapatkan dari Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.

D. Prosedur kerja

1. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Vortex (Heidolph) Magnetic stirrer (Helth®), Sentrifuge (Hettich EBA 200-200s), Rotary evaporator (Heidolph®), Spektrofotometer UV-Vis (Genesys 10S Uv-Vis).

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan yaitu ekstrak *Chaetomorpha*, *Euclima Cottonii*, *Sargassum sp*, *Saccharina Japonica*, *Caulerpa lentillifera* *Codium sp*, *Ulva lactuca* dan *Gracillaria verrucosa*. Aquadest, Asam Galat, Kuarsetin, Metanol (Merck), Aluminium Chloride (AlCl_3), Folin ciocalteu (Merck), Natrium Hydroxide (NaOH), Vitamin C, Amonium Asetat ($\text{NH}_4\text{CH}_3\text{CO}_2$), Neucoprin (Sigma aldrich), Tembaga II Klorida Dihidrat (CuCl_2), Natrium Asetat (CH_3COONa), Besi(III) klorida (FeCl_3), 2,4,6-Tri-(2-Pyridyl)-5-Triazine (TPTZ Sigma), Asam Sulfat (H_2SO_4) pekat 98%, Troloks, Natrium dihidrogen fosfat (NaH_2PO_4), Potassium dihydrogen phosphate (KH_2PO) dan Amonium Molibdat (NH_4) $_2$ MoO $_4$ (Merck)

3. Preparasi sampel Alga

Sampel alga yang diperoleh kemudian dicuci dan dilakukan perendaman menggunakan air es selama 1 jam menggunakan air suling hingga terlihat bersih, kemudian dilakukan pengeringan sampel menggunakan tisu dan selanjutnya dimasukkan ke dalam lemari pengering selama 2 hari hingga

kering dengan baik, setelah kering sampel dimasukkan ke dalam plastik dan siap diekstraksi.

4. Ekstraksi sampel Alga

Masing-masing sampel kering ditimbang sekitar 50 gram kemudian disimpan dalam wadah dan direndam dalam metanol, ditunggu hingga 1x 24 jam dan disimpan dalam ruangan kedap cahaya. Remaserasi dilakukan sebanyak 3x. Proses pemekatan atau evaporasi dilakukan menggunakan rotary evaporator ($T= 60^{\circ}\text{C}$). Setelah di ekstraksi disentrifius kembali agar ekstrak tidak mengandung garam.

5. Penapisan fitokimia sampel alga

a. Uji alkaloid

Diambil beberapa mg ekstrak, dimasukkan kedalam tabung reaksi lalu diaduk secara terpisah dengan HCl 1% diatas penangas air selama 5 menit kemudian disaring..

1) Tes Dragendorff

Ditambahkan pereaksi dragendorff sebanyak 1-2 ml, jika terdapat endapan merah jingga menunjukkan adanya kandungan alkaloid.

2) Tes Mayer

Ditambahkan pereaksi mayer sebanyak 1-2 ml, jika terdapat endapan warna krem menunjukkan adanya kandungan alkaloid.

3) Tes Wagner

Ditambahkan pereaksi wagner sebanyak 1-2 ml, jika terdapat endapan berwarna coklat menunjukkan adanya kandungan alkaloid

b. Uji Steroid dan Terpenoid

1) Tes Salkowski

Diambil beberapa mg sampel ekstrak, ditambahkan kloroform sebanyak 2 ml lalu dikocok secara terpisah, ditambahkan H_2SO_4 pekat sebanyak 2 ml disepanjang sisi tabung uji, adanya warna coklat kemerahan pada antarmuka menunjukkan adanya terpenoid

2) Tes Liebermann-Burchard

Diambil beberapa mg sampel ekstrak, lalu dikocok dengan kloroform sebanyak 2 ml, ditambahkan beberapa tetes asam asetat anhidrad dan dididihkan didalam penangas air dan cepat dingin dalam air es. Kemudian ditambahkan H_2SO_4 pekat sebanyak 2 ml. Terbentuknya cincin coklat pada pertemuan dua lapisan dan lapisan atas berubah menjadi hijau menunjukkan adanya steroid sedangkan terbentuknya warna merah tua menunjukkan adanya triterpenoid.

c. Uji Tanin

Diambil beberapa mg ekstrak dan diaduk dengan aquadest sebanyak 5 ml dan disaring. Ditambahkan beberapa tetes $FeCl_3$ 5%

kedalam filtrat. Adanya perubahan warna hitam atau biru-hijau atau endapan menunjukkan adanya tannin.

d. Uji Saponin

Dimasukkan kedalam tabung reaksi beberapa mg ekstrak lalu dikocok hingga terbentuk buih dengan aquadest sebanyak 5-10 ml. Apabila buih tersebut bertahan selama 5 menit di penangas air menunjukkan adanya saponin.

e. Uji Glikosida

1) Tes Borntrager (Anthraquinone Glycoside)

Dimasukkan beberapa mg ekstrak kedalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 5 ml H_2SO_4 5%, campuran tersebut disimpan di penangas air selama 1-2 menit kemudian disaring. Filtratnya dikocok dengan kloroform dengan volume yang sama dan didiamkan selama 5 menit. Diambil lapisan kloroform bagian bawah lalu dikocok dengan amonia encer sebanyak setengah volume dari kloroform tersebut. Adanya warna merah muda sampai merah pada lapisan amonia memberikan indikasi glikosida antarkuinon.

2) Tes Keller-Killaini (Cardiac Glycoside)

Dimasukkan beberapa mg ekstrak kedalam tabung reaksi, lalu dikocok dengan aquadest sebanyak 5 ml. Ditambahkan 2 ml asam asetat glasial, beberapa tetes $FeCl_3$ 5% dan diikuti H_2SO_4 pekat sebanyak 1-2 ml disepanjang sisi

tabung uji. Terbentuknya cincin coklat pada antarmuka dan cincin ungu yang mungkin muncul di bawah cincin coklat menunjukkan adanya glikosida jantung.

6. Penentuan Kadar Fenolik Total

a. Pembuatan larutan uji

Diambil 25 mg ekstrak, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir. Ditambahkan 2500 μ l metanol dalam tabung reaksi tutup ulir, panaskan dan aduk sampai larut dan didinginkan hingga diperoleh konsentrasi 10000 ppm

b. Pembuatan reagen

a) Reagen Follin-Ciocalteu 7,5%

Folin 15 ml dicukupkan 200 ml air suling

b) Pereaksi natrium hidrosida (NaOH) 1%

NaOH 2,0 gram dicukupkan 200 ml air suling

c. Prosedur pengukuran larutan pembanding

Ditimbang 25 mg asam galat dan dicukupkan dengan 50 ml methanol dalam labu tentu ukur 25,0 ml. Kemudian dibuat seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut yaitu 10 μ l, 20 μ l, 30 μ l, 50 μ l, 75 μ l, 100 μ l, dan 125 μ l dengan air suling 240 μ l, 230 μ l, 220 μ l, 200 μ l, 175 μ l, 150 μ l, dan 125 μ l. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan reagen *Follin-Ciocalteu* sebanyak 1.250 μ L yang didiamkan selama 8 menit, lalu ditambahkan 1.000 μ L pereaksi natrium hidroksidan (NaOH). Kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 425 nm setelah didiamkan selama 1 jam.

d. Prosedur penetapan kadar fenolik total dalam sampel

Larutan sampel uji 50 μL dimasukkan ke dalam labu tentukur, kemudian ditambahkan air suling sebanyak 200 μL . Selanjutnya melakukan penambahan reagen *Follin-Ciocalteu* dan pereaksi natrium hidroksida (NaOH) dengan perlakuan yang sama seperti prosedur pengukuran larutan pembanding. Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi sebanyak tiga kali menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 425 nm setelah didiamkan selama 1 jam.

7. Penetapan kadar total flavonoid

a. Pembuatan larutan uji

Ditimbang ekstrak 10 mg dan dilarutkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir dengan menggunakan metanol sebanyak 10,0 ml. Selanjutnya ekstrak divorteks dan dioven hingga larut dan menghasilkan konsentrasi 10000 ppm.

b. Pembuatan reagen

1) Reagen aluminum klorida (AlCl_3) 10%

AlCl_3 2,0 g dicukupkan 20 ml air suling

2) Reagen natrium asetat (CH_3COONa) 0,1 %

CH_3COONa 1.640 mg dicukupkan 20 ml air suling

c. Prosedur pengukuran larutan pembanding

Ditimbang Kuersetin 25,0 mg dimasukkan kedalam labu tentukur dicukupkan 50 ml methanol dalam labu tentu ukur 50,0 ml . Dibuat seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut yaitu 10 μl , 15 μl , 25 μl , 35 μl , 50 μl , 75 μl dengan air suling sebanyak 3.290 μl , 3.285 μl , 3.275 μl , 3.265 μl , 3.250 μl , 3.225 μl . Masing-masing dari seri konsentrasi

ditambahkan 100 μl AlCl_3 , ditambahkan 100 μl natrium asetat. Setelah 30 menit, gunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 415 nm untuk mengukur absorbansinya.

d. Prosedur penetapan kadar flavonoid total dalam sampel.

Diambil larutan sampel uji 20 μL dimasukkan ke dalam labu tentukur, kemudian ditambahkan air suling sebanyak 3.280 μL . Ditambahkan pereaksi AlCl_3 dan pereaksi natrium asetat sebanyak 100 μl kemudian di vorteks. Terakhir, didiamkan selama 30 menit dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 415 nm dan dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali cuplik.

8. Karotenoid

1. Pembuatan larutan sampel karotenoid

Setiap sampel 10 mg dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan 10 ml aseton ke dalam tabung reaksi tutup ulir berisi ekstrak lalu ditutup rapat, divortex dan dipanaskan apabila terdapat ekstrak yang belum larut. Setelah itu, sampel yang sudah dipanaskan dibiarkan hingga dingin dan disentrifius apabila masih terdapat sampel yang belum larut.

2. Penetapan kadar karotenoid total dalam sampel

Larutan sampel diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 661,6; 664,8; dan 470 nm. Dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali

9. Uji Aktivitas Antioksidan

a. FRAP

- 1) Pembuatan larutan $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 2.0×10^{-2} M

Ditimbang 750 mg Fe (III) lalu ditambahkan 200 μl HCl 5M dan dicukupkan 50 ml aquadest.

- 2) Pembuatan larutan TPTZ 1.0×10^{-2} M

Ditimbang 167,5 mg TPTZ lalu ditambahkan etanol absolut 50 ml.

- 3) Pembuatan larutan bupper natrium asetat pH 3,6

Ditimbang natrium asetat 1,86 gr lalu ditambahkan 8 ml asam asetat pekat dan dicukupkan hingga 500 ml.

- 4) Pembuatan ekstrak 1000 ppm

Ditimbang ekstrak 10,0 mg, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir dilarutkan dengan 10 ml metanol dipanaskan dan divorteks hingga larut..

- 5) Pembuatan larutan FRAP

Buffer : TPTZ : $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (60 : 6 : 6)

- 6) Pengujian antioksidan sampel dengan FRAP

Diambil sampel sebanyak 50 μl , ditambahkan aquadest 950 μl dan ditambahkan 3000 μl larutan FRAP. Diamkan 30 menit kemudian diamati absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 595 nm.

- 7) Pengujian antioksidan vitamin C

Ditimbang vitamin C 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dibuat dalam beberapa seri konsentrasi yaitu 30 μ l, 40 μ l, 50 μ l, 60 μ l, dan 70 μ l dengan metanol sebanyak 970 μ l, 960 μ l, 950 μ l, 940 μ l, dan 930 μ l. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan 3000 μ l larutan Frap. Untuk menentukan absorbansinya, digunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 595 nm, kemudian ditentukan absorbansinya setelah didiamkan selama 30 menit.

b. Troloks

Ditimbang troloks 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dibuat dalam beberapa seri konsentrasi yaitu 20 μ l, 30 μ l, 40 μ l, 50 μ l, 60 μ l, 70 μ l dan 80 μ l dengan metanol sebanyak 980 μ l, 970 μ l, 960 μ l, 950 μ l, 940 μ l, 930 μ l dan 920 μ l. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan 3000 μ l larutan Frap Didiamkan selama 30 menit dan diamati absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 595 nm.

8) Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus:

Kapasitas antioksidan ekstrak dihitung dengan kesetaraannya terhadap vitamin c dan troloks.

c. CUPRAC

- 1) Pembuatan larutan $\text{CuCl}_2 \cdot 1\text{H}_2\text{O}$ 10×10^{-2} M
Ditimbang 425 mg CuCl_2 lalu dilarutkan dengan aquadest 250 ml.
- 2) Pembuatan larutan neocuproine 7.5×10^{-2} M
Ditimbang 390 mg neocuproine lalu dilarutkan dengan etanol absolut 250 ml.
- 3) Pembuatan larutan buffer amonium asetat pH 7.0
Ditimbang 19,27 gram amonium asetat lalu dilarutkan dengan 250 ml aquadest.
- 4) Pembuatan ekstrak 1000 ppm
Ditimbang ekstrak 10,0 mg, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir dilarutkan dengan 10 ml metanol dipanaskan dan divorteks hingga larut.
- 5) Pengujian antioksidan sampel dengan CUPRAC
Diambil sampel sebanyak 50 μl lalu ditambahkan aquadest 950 μl dan reagen CUPRAC sebanyak 3000 μl . Diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 450 nm.
- 6) Pengujian antioksidan vitamin C
Ditimbang vitamin C 10 mg lalu dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dari larutan tersebut, dibuat beberapa seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut yaitu 250 μl , 200 μl , 150 μl , 100 μl , 50 μl , dan 25 μl dan ditambahkan metanol sebanyak 750 μl , 800 μl , 850 μl , 900 μl , 950 μl , dan 975 μl . Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan larutan CUPRAC sebanyak 3000 μl . Diukur

absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 450 nm.

7) Troloks

Ditimbang troloks 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dibuat dalam beberapa seri konsentrasi yaitu 100 μ l, 150 μ l, 200 μ l, 250 μ l, dan 300 μ l, dengan metanol sebanyak 900 μ l, 850 μ l, 800 μ l, 750 μ l, dan 700 μ l. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan 3000 μ l larutan cuprac. Didiamkan selama 30 menit dan diamati absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 450 nm.

8) Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus:

Kapasitas antioksidan ekstrak dihitung dengan kesetaraannya terhadap vitamin C dan Troloks.

d. DPPH

1) Pembuatan larutan DPPH (BM 394) konsentrasi 0,1 mM

Ditimbang 2 mg DPPH dilarutkan kedalam 50 ml metanol.

2) Pembuatan ekstrak 1000 ppm

Ditimbang ekstrak 10 mg dilarutkan dengan 10 mL metanol, kemudian dipanaskan di oven hingga larut, dan dinginkan.

3) Pengujian aktivitas antioksidan vitamin C

Ditimbang 10 mg vitamin C kemudian dilarutkan kedalam metanol sebanyak 50 ml. Dari larutan tersebut dibuat beberapa seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut yaitu 10 μ l, 20 μ l, 30 μ l, 50 μ l, 75 μ l, dan 100 μ l dan ditambahkan metanol sebanyak 1.490 μ l, 1.480 μ l, 1.470 μ l, 1.450 μ l, 1.425 μ l, dan 1.400 μ l. Masing-masing dari seri konsentrasi

ditambahkan larutan DPPH sebanyak 2000 μl divortex hingga homogen dan didiamkan selama 30 menit diruangan tertutup dan gelap. Diukur absorbansinya menggunakan alat spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 517 nm.

4) Troloks

Ditimbang troloks 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dibuat dalam beberapa seri konsentrasi yaitu 10 μl , 25 μl , 50 μl , 100 μl , dan 150 μl dengan metanol sebanyak 1.490 μl , 1.475 μl , 1.450 μl , 1.400 μl , dan 1.350 μl . Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan 2000 μl larutan dpph. Didiamkan selama 30 menit dan diamati absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 517 nm

5) Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus:

Dihitung persen penghambatan dengan persamaan :

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Ablanko0} - \text{Asampel}}{\text{Ablanko}} \times 100\%$$

Nilai Kesetaraan vit c/troloks dihitung terhadap kurva konsentrasi vs %inhibisi.

$y = ax + b$, dimana nilai y sebesar 50.

$$\text{Jadi, } x = \frac{50 - b}{a}$$

Hasil x itu merupakan nilai kesetaraan vit c/troloks.

e. TOAC

1) Pembuatan larutan TOAC

Ditimbang 1.977 mg ammonium molybdate $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$, 380,2 mg potassium phosphate monobasic (KH_2PO_4) , dan 48 ml asam sulfat (H_2SO_4) ditambahkan dan dicukupkan aquadest hingga 60 ml.

2) Pembuatan ekstrak 1000 ppm

Ditimbang ekstrak 10,0 mg, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir dilarutkan dengan 10 ml metanol dipanaskan dan divorteks hingga larut.

3) Pengujian aktivitas antioksidan

Diambil sampel 200 μ l dan dimasukkan kedalam tabung reaksi tutup ulir, selanjutnya ditambahkan aquadest sebanyak 300 μ l. Ditambahkan larutan TOAC sebanyak 3 ml. Selanjutnya divortex hingga larut, diinkubasi selama 90 menit pada suhu 95°C. Diukur absorbansinya pada spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 695nm.

4) Pengujian antioksidan vitamin C

Ditimbang 10 mg vitamin C dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dari larutan tersebut dibuat seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut yaitu 50 μ l, 100 μ l, 150 μ l, 200 μ l, dan 250 μ l dengan ditambahkan metanol 450 μ l, 400 μ l, 350 μ l, 300 μ l, dan 250 μ l. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan larutan TOAC sebanyak 3000 μ l dan diinkubasi selama 90 menit pada suhu 95°C. Diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 695 nm.

5) Troloks

Ditimbang 10 mg troloks dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dari larutan tersebut dibuat seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut yaitu 50 μ l, 100 μ l, 150 μ l, 200 μ l, dan 250 μ l dengan ditambahkan metanol 450 μ l, 400 μ l, 350 μ l, 300 μ l, dan 250 μ l. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan larutan TOAC sebanyak 3000 μ l dan diinkubasi selama 90 menit pada suhu 95°C. Diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 695 nm.

6) Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus:

Kapasitas antioksidan ekstrak dihitung kesetarannya terhadap vitamin C dan trolox.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

1. Hasil Ekstraksi Sampel Alga

Tabel 1. Hasil Ekstraksi

No	Sampel	Jenis Ekstrak	Berat Simplisia	Berat Ekstrak	% Rendamen
1.	<i>Ulva Lactuca</i>	Ekstrak Kental	50 g	1,49	2,98 %
2.	<i>Gracillaria verrucosa</i>	Ekstrak Kental	50 g	0,24	0,49 %
3.	<i>Saccharina japonica</i>	Ekstrak Kental	50 g	0,96	1,93%
4.	<i>Codium sp</i>	Ekstrak Kental	50 g	0,39	0,78 %
5.	<i>Chaetomorpha sp.</i>	Ekstrak Kental	50 g	0,11	0,22 %
6.	<i>Eucheuma cottonii</i>	Ekstrak Kental	50 g	0,25	0,51 %
7.	<i>Caulerpa lentillifera</i>	Ekstrak Kental	50 g	0,12	0,24 %
8.	<i>Sargassum sp</i>	Ekstrak Kental	50 g	0,39	0,78 %

2. Hasil Uji Fitokimia

Tabel 2. Hasil uji fitokimia

No	Kelompok	Test						
		Alkaloid		Tannins	Steroids/terpenoids		Saponin	Glycoside
		Dragendorf	Mayer		Lieberman Burchard	Salkowski		
1	<i>Chaetomorpha</i>	-	-	-	-	+	+	-
2	<i>Codium sp</i>	-	-	+	-	+	-	-
3	<i>Eucheuma cottonii</i>	-	-	-	+	+	-	-
4	<i>Gracillaria verrucosa</i>	-	+	+	-	+	-	-
5	<i>Caulerpa lentillifera</i>	-	-	-	-	+	+	-
6	<i>Sargassum</i>	-	-	+	+	+	-	-
7	<i>Ulva lactuca</i>	-	-	+	+	+	+	-
8	<i>Sacharina J</i>	-	-	+	+	-	-	-

3. Hasil Uji Kadar Total Fenolik, Flavonoid, dan Karotenoid

Tabel 3

No.	Kelompok	Total Fenolik ^a	Total Flavonoid ^b	Total Carotenoid ^c
1	Chaetomorpha	67,80 ± 0,89	22,09 ± 1,44	1,8 ± 0,3
2	Codium sp	82,33 ± 0,35	42,02 ± 1,10	5,56 ± 0,3
3	<i>Eucheuma cottonii</i>	86,25 ± 0,37	4,52 ± 0,11	6,17 ± 4,52
4	<i>Gracillaria verrucosa</i>	38,42 ± 0,05	11,23 ± 0,68	1,70 ± 0,26
5	<i>Caulerpa lentillifera</i>	71,11 ± 0,74	30,19 ± 0,63	19,57 ± 0,19
6	<i>Sargassum</i>	40,90 ± 0,63	8,25 ± 1,04	0,41 ± 8,47
7	<i>Ulva Lactuca</i>	86,73 ± 0,16	15,73 ± 0,58	2,30 ± 0,72
8	<i>Sacharina Japonica</i>	124,12 ± 3,64	50,67 ± 1,46	12,06 ± 0,43

^a setara asam galat/GAE (mg/gram ekstrak)

^b setara quercetin/QE (mg/gram ekstrak)

^c setara karoten/CE (ng/gram ekstrak)

4. Hasil Uji Kapasita Antioksidan

Tabel 4.

No.	Kelompok	TOAC		DPPH		FRAP		CUPRAC	
		A	B	A	B	A	B	A	B
1	<i>Chaetomorpha sp</i>	71,08 ±0,41	3,88 ± 0,03	37,70 ±1,47	4,45 ±0,21	17,98 ±0,02	21,21 ±0,03	15,53 ±0,32	20,59 ±1,15
2	<i>Codium sp</i>	207,66±2,02	15,02±0,25	54,57± 0,84	6,95± 0,12	17,59 ±0,04	20,91±0,05	37,27 ± 1,53	103,07 ±5,39
3	<i>E. cottonii</i>	68,68 ± 0,26	3,70 ±0,02	64,65±1,65	8,43 ±0,24	8,68 ±0,16	8,39± 0,22	11,76 ±0,15	7,77 ±0,39
4	<i>G.verrucosa</i>	24,18± 0,79	*	55,23 ±0,31	7,02 ±0,04	5,04 ± 0,15	3,28 ±0,20	8,65 ±0,41	*
5	<i>C.lentillifera</i>	123,63 ±0,15	8,29 ±0,01	60,51 ±6,17	55,80 ± 2,82	10,28 ±0,34	11,62 ±0,37	36,99 ±0,24	97,51 ±0,84
6	<i>Sargassum sp</i>	73,35 ±0,25	3,95 ±0,34	40,43 ±7,61	6,12 ±1,51	7,22 ±0,09	6,53 ±0,13	10,05 ±0,58	5,30 ±0,91
7	<i>U. Lactuca</i>	126,90±12,15	9,17± 0,11	51,44± 2,06	6,48± 0,30	10,70± 0,10	10,76± 0,23	4,87± 0,02	*
8	<i>S.Japonica</i>	347,20 ±3,39	26,69 ±0,35	127,72 ±0,79	17,71 ±0,11	16,87 ±0,06	19,77±0,08	39,70 ±0,27	107,12 ±0,96

Ket : A = Setara dengan mg vit c/gram ekstrak

B= Setara dengan mg troloks/gram ekstrak

*= Dibawah batas deteksi

B. Pembahasan


Antioksidan merupakan zat yang dapat memperlambat atau menghentikan reaksi oksidasi radikal bebas. Antioksidan menghambat aktivitas senyawa oksidan dengan cara mendonorkan satu elektron pada senyawa tersebut (Dwimayasanti, 2018). Melalui proses ini dapat menghentikan reaksi stres oksidatif yang dapat menyebabkan penyakit degeneratif seperti jantung, kanker, disfungsi otak, radang sendi, dan lain-lain. Alga mengandung antioksidan yang mungkin bermanfaat bagi kesehatan. Antioksidan dapat dibuat atau diperoleh secara alami. Flavonoid, vitamin C, dan antioksidan alami lainnya seperti vitamin E telah terbukti bermanfaat menjadi aman untuk dikonsumsi manusia. Di sisi lain, antioksidan sintetik seperti BHT (butilhidroksitoluena) dan BHA (butilhidroksianisol) tidak lagi digunakan karena dapat menyebabkan kanker (Kate, 2014)

Dalam penelitian ini 8 jenis sampel alga dipreparasi dengan cara sampel alga yang diperoleh dicuci dan dilakukan perendaman menggunakan air es selama 1 jam menggunakan air suling hingga nampak bersih, kemudian dilakukan pengeringan sampel menggunakan tisu dan kemudian dimasukkan ke dalam lemari pengering selama 2 hari hingga kering dengan baik, setelah kering sampel dimasukkan ke dalam plastik dan siap dilakukan proses ekstraksi.

Ekstraksi pada sampel alga dilakukan menggunakan metode maserasi. Adapun metode maserasi adalah metode ekstraksi yang paling umum dilakukan dengan cara memasukkan simplisia tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam suatu wadah inert yang ditutup rapat pada suhu ruangan (Badaring, Mulya sari, Nurhabiba, Wulan, & Lembang, 2020). Proses ekstraksi dilakukan dengan cara masing-masing sampel kering ditimbang sekitar 50 gram kemudian disimpan dalam wadah dan direndam dalam metanol, pelarut metanol digunakan karena merupakan pelarut yang semipolar dapat melarutkan senyawa yang bersifat polar ataupun nonpolar seperti fenolik, flavonoid, saponin dan lain-lain yang

dapat menarik lebih banyak senyawa dari suatu tanaman, kemudian ditunggu hingga 1x 24 jam dan disimpan dalam ruangan kedap cahaya. Remaserasi dilakukan sebanyak 3x. Proses pemekatan atau evaporasi dilakukan menggunakan rotary evaporator ($T= 60^{\circ}\text{C}$). Setelah di ekstraksi disentrifius kembali agar ekstrak tidak mengandung garam.

Adapun Hasil % Rendamen esktrak dapat dilihat pada histogram berikut :



Gambar 12. Rendemen Ekstraksi

Pada histogram diatas menunjukkan bahwa *Ulva lactuca* memiliki % Rendamen tertinggi yaitu 3%

Penapisan fitokimia kemudian dilakukan, biasanya, tujuan dari tes ini adalah untuk menentukan bahan kimia metabolit sekunder masing-masing tanaman. Korelasi penapisan fitokimia terhadap uji kadar fenolik, flavonoid, dan karotenoid yaitu Untuk memperoleh informasi awal senyawa metabolit sekunder dalam sampel yang efektif antioksidan, dilakukan penapisan fitokimia. Flavonoid, fenolat, saponin, steroid, dan triterpenoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang secara umum diketahui berperan sebagai antioksidan. Setiap sampel mengandung kadar fenolat, flavonoid, dan karotenoid. Uji


pendahuluan yang digunakan untuk mengidentifikasi golongan metabolit sekunder yang memiliki aktivitas biologis dari suatu tanaman adalah penapisan fitokimia atau disebut juga penapisan fitokimia. Hasil penapisan fitokimia berfungsi untuk menentukan golongan senyawa kimia yang dikandungnya. Skrining fitokimia ini harus dilakukan dengan reagen tertentu selama percobaan untuk mengidentifikasi kelompok campuran sintetis yang ditemukan di tanaman ini. Sifat antioksidan diketahui hadir dalam senyawa fitokimia seperti steroid, flavonoid, dan tanin yang ditemukan dalam ekstrak alga triterpenoid. Gugus senyawa berfungsi sebagai Senyawa alkaloid misalnya dapat dimanfaatkan sebagai obat asma dan mengandung senyawa antioksidan, antihiperlikemik, dan antimalaria. Flavonoid mengandung zat yang dapat membantu merangsang sekresi insulin dan regenerasi sel beta pankreas. Saponin adalah penguat sel dan senyawa antikardiogenik. Steroid, yang memiliki antibakteri aktif dan anti komponen virus, biasanya diresepkan untuk diabetes dan gangguan menstruasi. (Badaring, Mulya sari, Nurhabiba, Wulan, & Lembang, 2020). Adanya senyawa Alkaloid ditandai dengan terbentuknya endapan, Saponin ditandai dengan terbentuknya buih, fenol ditandai dengan perubahan warna menjadi hijau kehitaman, dan tanin ditandai dengan perubahan warna menjadi coklat kehijauan. Senyawa flavonoid ditandai dengan perubahan warna menjadi merah, senyawa glikosida antarkuinon ditandai dengan adanya warna merah muda sampai merah pada lapisan amonia memberikan indikasi glikosida antarkuinon, glikosida jantung ditandai dengan terbentuknya cincin coklat pada antarmuka dan cincin ungu yang mungkin muncul di bawah cincin coklat. Dilihat pada table 2. Menunjukkan bahwa *Chaetomorpha sp* mengandung steroid, terpenoid dan saponin, pada penelitian yang dilakukan oleh (Mapatac, Mamaoag, Cubillas, & Dalago, 2015) menunjukkan bahwa *Chaetomorpha sp* mengandung steroid dan saponin. Pada penelitian *Codium sp* mengandung tannin, steroid dan terpenoid, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Haryani t. s., Hasanah, Komala, Lestari, & Agustina, 2022) *Codium sp* mengandung steroid dengan terbentuknya warna biru hijau. *Eucheuma cottonii* mengandung steroid dan terpenoid, pada penelitian yang

dilakukan oleh (Dolorosa, Nurjanah, Purwaningsih, Anwar, & Hidayat, 2017) menunjukkan bahwa *Eucheuma cottonii* mengandung terpenoid. *Gracillaria verrucosa* mengandung Alkaloid, tannin, steroid dan terpenoid, seperti pada penelitian (Dayuti, 2018). *Gracillaria verrucosa* mengandung alkaloid. Kemudian pada jurnal (Maftuch, Kurniawati, Adam, & Zamzami, 2016) *Gracillaria* mengandung tannin. *Caulerpa lentillifera* mengandung steroid, terpenoid dan saponin, pada penelitian (Tapotubun, Rieuwpassa, Supratman, & Setha, 2019) menunjukkan bahwa *Caulerpa lentillifera* mengandung steroid, terpenoid, dan juga saponin. *Sargassum sp* mengandung tannin, steroid dan terpenoid seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh (Minarti, Idiawati, & Sofiana, 2019) menunjukkan bahwa *Sargassum sp* mengandung tannin dengan terbentuknya larutan berwarna hijau, pada penelitian (Dolorosa, Nurjanah, Purwaningsih, Anwar, & Hidayat, 2017) menunjukkan bahwa *sargassum sp* mengandung steroid dan terpenoid yang ditandai dengan larutan berwarna merah-biru/hijau pada steroid dan larutan berwarna merah kecokelatan pada terpenoid. *Ulva lactuca* mengandung tannin, steroid, terpenoid dan saponin, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Shankhadarwar, 2015) *Ulva lactuca* mengandung steroid, terpenoid dan saponin. *Sacharina Japonica* mengandung tannin, steroid dan terpenoid.

Reagen Folin-Ciocalteu ditambahkan ke beberapa alga dan spektrofotometer UV-Vis (760 nm) digunakan untuk mengukur kandungan fenolik total. Metode folin-Ciocalteu merupakan metode yang sederhana, sensitif dan teliti. Karena reagen Folin-Ciocalteu digunakan untuk menentukan kandungan fenolik, natrium karbonat digunakan dalam metode ini untuk menciptakan lingkungan basa. (Kate, 2014). Ketika natrium karbonat ditambahkan ke senyawa fenolik, gugus hidroksi bereaksi dengan Folin dalam keadaan basa untuk membentuk ion fenolik yang dapat mengambil bagian dalam reaksi reduksi asam heteropoli (asam fosfomolibdat-fosfotungstat) untuk membuat kompleks molibdenum-tungsten biru. Inilah yang menyebabkan terjadinya reaksi fenolik-Folin-Ciocalteu. (Khairunnisa, 2021). Penetapan kadar fenolik menggunakan reagen Follin

dengan pembanding asam galat, alasan penggunaan asam galat sebagai standar dalam penetapan kandungan fenolik total yaitu karena asam galat terbentuk dari 3-dehydroshikimic acid pada jalur sikimat yang melalui serangkaian tahapan reaksi kimia hingga diperoleh asam amino aromatik yaitu L-phenylalanine, L-tyrosine yang merupakan bentuk dari struktur dasar yang ditemukan pada cinamic acid, coumarins, lignans dan flavonoids (Kate, 2014).

Hasil positif adanya senyawa fenolik diperoleh dengan adanya perubahan warna larutan menjadi biru. Adapun Hasil Total Fenolik dapat dilihat pada histogram berikut :




Gambar 13. Kadar Fenolik

Pada histogram diatas menunjukkan bahwa *Sacharina Japonica* memiliki kadar total fenolik tertinggi yaitu $124,12 \pm 3,64$ GAE/mg Ekstrak. Pada pengukuran senyawa flavonoid total, larutan sampel ditambahkan $AlCl_3$ yang dapat membentuk kompleks, sehingga terjadi pergeseran panjang gelombang kearah visible (tampak) yang ditandai dengan larutan menghasilkan warna lebih kuning dengan pereaksi natrium asetat ($C_2H_3NaO_2$). Penambahan asam asetat menjaga panjang gelombang dalam kisaran yang visible (tampak). Untuk memastikan bahwa reaksi berlangsung dengan sempurna dan

intensitas warna yang dihasilkan dimaksimalkan, diperlukan perlakuan inkubasi satu jam sebelum pengukuran. (Maknur & Nunung, 2019). Metode aluminium klorida bergantung pada pembentukan kompleks antara aluminium klorida, gugus keto pada atom C-4, dan gugus hidroksil pada atom C-3 atau C-5 keduanya bertetangga dengan flavon dan flavonol. Dalam menentukan kadar flavonoid total menggunakan pembanding kuarsetin, penggunaan quercetin sebagai pembanding dikarenakan quercetin merupakan salah satu flavonol yang dapat ditemukan di hampir semua jenis tumbuhan. Selain itu, quercetin merupakan antioksidan alami dengan aktivitas antioksidan yang signifikan. (Jatmiko & Mursiti, 2021).

Hasil total flavonoid dapat dilihat pada histogram berikut :




Gambar 14. Kadar flavonoid

Pada histogram dapat dilihat bahwa *Sacharina Japonica* memiliki kadar total flavonoid tertinggi yaitu $50,67 \pm 1,46$ QE/mg Ekstrak

Pigmen organik yang dikenal sebagai karotenoid dapat ditemukan di kloroplas dan kromoplas tanaman serta kelompok organisme lain seperti mikroalga. Mereka terbuat dari delapan molekul isoprena dan masing-masing memiliki 40 atom karbon. Karotenoid umumnya dikategorikan sebagai xantofil (karotenoid yang mengangkut oksigen) dan

karoten (karotenoid hanya terdiri dari hidrokarbon dan tanpa atom oksigen) (Agustini, 2017).

Adapun hasil karotenoid dapat dilihat pada histogram berikut :




Gambar 15. Kadar karotenoid

Karotenoid tertinggi terdapat pada *Caulerpa lentillifera* dengan kadar $19,57 \pm 0,19$ CE/ng Ekstrak.

Kemampuan senyawa dalam sampel bahan alam, yang biasanya diekstraksi menggunakan pelarut metanol dan etanol, untuk mengurangi radikal bebas diukur dari kapasitas antioksidannya. Unsur-unsur dalam bahan yang mampu mencegah oksidasi berpengaruh pada kapasitas antioksidan bahan. .Senyawa fenolik, flavonoid, vitamin C, dan masih banyak lagi merupakan komponen antioksidan (Sari, 2019). Pada penelitian ini dilakukan 4 metode dalam uji kapasitas antioksidan yaitu Frap, Cuprac, Toac dan Dpph.

Metode yang pertama dilakukan yaitu Frap, Antioksidan tanaman dapat diuji menggunakan FRAP. Metode FRAP ini hemat biaya, reagensinya mudah dibuat, dan prosesnya cepat dan mudah. Prinsip uji FRAP adalah reaksi transfer elektron dari antioksidan ke senyawa Fe^{3+} -TPTZ, dan metode ini dapat menentukan kandungan


antioksidan total suatu bahan berdasarkan kemampuan senyawa antioksidan mereduksi ion Fe^{3+} menjadi Fe^{2+} . Dengan cara ini, kekuatan antioksidan suatu senyawa setara dengan kemampuan mereduksinya. Senyawa Fe^{3+} -TPTZ sendiri merupakan contoh zat pengoksidasi yang dapat merusak sel dan dapat ditemukan di dalam tubuh. Kurva kalibrasi dibuat menggunakan larutan asam askorbat dan troloks dengan berbagai konsentrasi. Reaksi metode Frap sebagai berikut :



Gambar 16. Reaksi Frap

Nilai FRAP dinyatakan dalam mg equivalen Pembanding/ gr ekstrak. Pembanding dalam hal ini yaitu Vit C atau Troloks (Maryam, Baits, & Nadia, 2016). Pada penelitian ini menggunakan panjang gelombang (λ) 595 nm


Hasil uji antioksidan metode Frap dapat dilihat pada histogram berikut :



Gambar 17. Kapasitas antioksidan metode Frap

Hasil menunjukkan bahwa alga *Chaetomorpha* memiliki kadar tertinggi dengan pembandingan vit C yaitu $17,98 \pm 0,025102$ dan troloks $21,21 \pm 0,03478$


Metode kedua yang digunakan yaitu metode Cuprac, Cu(II)-neocuproin (Cu(II)-(Nc)₂) digunakan sebagai oksidator kromogenik dalam uji CUPRAC (Cupric ion reduce antioxidant capacity) karena reduksi ion Cu(II) dapat diukur. potensi reduksinya yang rendah, reagen CUPRAC adalah reagen selektif. Jika dibandingkan dengan metode pengukuran antioksidan lainnya, metode CUPRAC memiliki kelebihan, termasuk fakta bahwa reagen CUPRAC dapat mengoksidasi tiol antioksidan dengan cepat dan merupakan reagen selektif karena potensi redoksnya yang lebih rendah. Dibandingkan dengan reagen kromogenik lain seperti ABTS dan DPPH, reagen CUPRAC lebih stabil dan tersedia. Metode ini sederhana dan dapat digunakan di laboratorium konvensional dengan kolorimeter standar. Tidak perlu peralatan yang rumit atau orang yang ahli untuk menggunakannya. Antioksidan dengan sifat hidrofilik dan lipofilik, seperti -karoten dan tokoferol, dapat diukur dengan menggunakan metode ini (Maryam, Pratama, Effendi, & Naid, 2009). Daya antioksidan metode CUPRAC sebanding dengan jumlah tembaga yang direduksi oleh antioksidan melalui transfer elektron. Antioksidan akan teroksidasi sedangkan tembaga akan tereduksi. Sebagai reagen kromogenik, bis(neocuproin) copper(II) (Cu(Nc)₂²⁺) digunakan dalam metode CUPRAC. Karena potensi reduksinya yang rendah yaitu 0,17 V, reagen CUPRAC adalah reagen selektif. Reaksi yang dihasilkan akan mengubah reagen Cu(Nc)₂²⁺ biru menjadi reagen kuning (Cu(Nc)₂²⁺):



Gambar 18. Reaksi Cuprac

Pada penelitian ini menggunakan panjang gelombang (λ) 450 nm

Berikut hasil uji cupric dapat dilihat pada histogram :




Gambar 19. Kapasitas antioksidan metode Cuprac

Adapun hasil uji tertinggi terdapat pada sampel *Saccharina Japonica* dengan nilai Perbandingan vit c $39,70 \pm 0,271385$ dan troloks $107,12 \pm 0,960284$

Metode yang ketiga digunakan yaitu metode TOAC, merupakan uji yang umum digunakan untuk mengetahui aktivitas antioksidan suatu senyawa. Uji ini mengukur

kemampuan suatu antioksidan dalam menangkap radikal yang dihasilkan dalam fase air dibandingkan dengan standar trolox (analog vitamin E larut air). Pengukuran aktivitas antioksidan didasarkan pada pembacaan absorbansi pada panjang gelombang (λ) 695 nm. Metode ini menggunakan prinsip inhibisi yaitu sampel ditambahkan pada penghasil radikal bebas dan pengaruh inhibisi terhadap efek radikal bebas diukur untuk menentukan total kapasitas antioksidan dari sampel (Kurniasih, Kusmiyati, Nurhasanah, Sari, & Wafdan, 2015).

Adapun hasil uji kapasitas antioksidan metode Toac dapat dilihat pada histogram berikut :




Gambar 20. Kapasitas antioksidan metode Toac

Dari histogram diatas dapat dilihat bahwa sampel Saccharina Japonica memiliki kadar tertinggi yaitu $347,20 \pm 3,396237$ dan troloks $26,69 \pm 0,358165$

Metode yang keempat yaitu DPPH, metode DPPH adalah salah satu yang dapat dengan cepat, mudah, dan tanpa menghabiskan banyak uang mengukur aktivitas antioksidan. Sebuah tes yang disebut DPPH (diphenyl-1-picrylhydrazyl) digunakan untuk mengukur kapasitas antioksidan untuk menetralkan radikal bebas. (Prasetyo, Kharomah, & Rahayu, 2021). Karena adanya resonansi elektron di seluruh molekul, yang menunjukkan

bahwa molekul tersebut stabil, DPPH adalah senyawa radikal bebas yang stabil. Warna ungu DPPH menunjukkan resonansi ini. Komponen antioksidan ekstrak akan mengubah warna DPPH dari ungu menjadi kuning. Ini adalah karena senyawa antioksidan dapat mengikat elektron bebas dari DPPH karena memiliki elektron bebas yang tidak berpasangan (Awaluddin & Wahyuningsih, 2019). Mekanisme terjadinya reaksi DPPH ini berlangsung melalui mekanisme transfer elektron. Sebagaimana terlihat pada reaksi berikut :




Gambar 20. Reaksi Penghambatan Radikal Bebas

(Awaluddin & Wahyuningsih, 2019)

DPPH yang bereaksi dengan antioksidan yang terdapat pada sampel akan menghasilkan bentuk tereduksi difenil pikrilhidrazil. Reduksi DPPH yang berubah menjadi DPPH-H disebabkan adanya donor hidrogen dari senyawa hidroksil yang membuat radikal DPPH berubah warna menjadi kuning saat elektron berpasangan dengan antioksidan. (Magfira, 2018)

Pada penelitian ini menggunakan panjang gelombang (λ) 517 nm

Hasil uji kapasitas antioksidan metode DPPH dapat dilihat pada histogram berikut:



Gambar 21. Kapasitas antioksidan Metode Dpph

Adapun nilai uji kapasitas antioksidan dengan metode DPPH tertinggi di dapatkan pada sampel *Saccharina Japonica* dengan kadar pembanding vit c $127,72 \pm 0,790663$ dan troloks $17,71 \pm 0,116869$

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa:

1. Kadar tertinggi dari fenolik dan flavonoid adalah *Sacharina Japonica* dengan kadar , berturut-turut, $124,12 \pm 3,64$ GAE/g, dan $50,67 \pm 1,46$ QE/g dan karotenoid adalah *Caulerpa lentillifera* dengan kadar $19,57 \pm 0,19$ CE/ng
2. Perbandingan kadar kapasitas antioksidan dengan metode Frap tertinggi terdapat pada alga jenis *Chaetomorpha* dengan pembanding Vit C yaitu $17,98 \pm 0,025102$ dan troloks $21,21 \pm 0,03478$ dan dengan metode Cuprac, Toac Dpph tertinggi berturut-turut terdapat pada sampel *Saccharina Japonica* pembanding Vit C yaitu $39,70 \pm 0,271385$ dan troloks $107,12 \pm 0,960284$, Vit C yaitu $347,20 \pm 3,396237$ dan troloks $26,69 \pm 0,358165$, Vit C yaitu $127,72 \pm 0,790663$ dan troloks $17,71 \pm 0,116869$

B. Saran

Disarankan agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan *Sacharina Japonica* sebagai produk nutrasetikal.

DAFTAR PUSTAKA

- Gazali, M., Nurjanah, & Zamani, N. (2018). Eksplorasi Senyawa Bioaktif Alga Cokelat Sargassum Sp. Agardh Sebagai Antioksidan Dari Pesisir Barat Aceh. *Jurnal pengolahan hasil perikanan indonesia*, 175.
- Hanin, N. N., & Pratiwi, R. (2017). Kandungan Fenolik, Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Paku Laut (*Acrostichum aureum* L.) Fertil dan Steril. *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology*, 51.
- Juneidi, A. W. (2004). *Rumput Laut, Jenis Dan Morfologisnya*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Mapatac, I. C., Mamoag, N. R., Cubillas, C. A., & Dalago, J. M. (2015). Phytochemical Screening And Cytotoxicity Level Of Macroalgae In Loreto, Dinagat Island, Philippines. *Journal for Sustainable Tourism Development*, 126.
- Meriam, W. P., Kepel, R. C., & Lumingas, L. (2016). Inventarisasi Makroalga Di Perairan Pesisir Pulau Mantehage Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal ilmiah platax*, 93.
- Narahaubun, S. (2021). *Pemanfaatan Anggur Laut (Caulerpa Racemosa) Sebagai Bahan Pembuatan Permen Jelly Dalam Menunjang Mata Kuliah Biologi Terapan*. Ambon: Institut Agama Islam Negeri (Iain).
- Yanuarti, R., Nurjanah, Anwar, E., & Hidayat, T. (2017). Profil Fenolik Dan Aktivitas Antioksidan Dari Ekstrak Rumput Laut *Turbinaria conoides* Dan *Eucheuma cottonii*. *Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 231.
- Agustini, N. W. (2017). Kemampuan Pigmen Karoten Dan Xantofil Mikroalga *Porphyridium Crunetum* Sebagai Antioksidan Pada Domba. *Informatika Pertanian*, 2.
- Ardinata, R. A., Yulianti, Asmawati, Yuniarti, & Manguntungi, B. (2020). Inovasi Pemanfaatan Ekstrak Alga Hijau *Ulva SP* Dari Pantai Luksumbawa Sebagai Kandidat Antibakteri Terhadap *Salmonella Thypi* Dan *Staphylococcus Aureus*. *Jurnal Tambora*, 4(3), 1. doi:10.36761/jt.v4i3.785
- Awaluddin, N., & Wahyuningsih, S. (2019). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Methanol *Klika Anak Dara (Croton Oblongus Burm)* Menggunakan Metode Dpph. *Jurnal Farmasi Fkik Unam*, 42.

- Bachrir, S. R. (2015). *Pertumbuhan Dan Kualitas Rumput Laut (Caulerpa Racemosa) Yang Dipapar Dengan Warna Cahaya Berbeda*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Badaring, D. R., Mulya sari, s. P., Nurhabiba, S., Wulan, w., & Lembang, s. a. (2020). Uji Ekstrak Daun Maja (*Aegle marmelos L.*) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. *Indonesian Journal Of Fundamental Sciences (Ijfs)*, 17.
- Bhernama, b. g. (2020). *Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Rumput Laut Gracilaria sp. Asal Desa Neusu Kabupaten Aceh Besar*. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Cokrowati, N., Diniarti, N., Setyowati, D. N., Waspodo, s., & Marzuki, M. (2019). Ekplorasi dan Penangkaran Bibit Rumput Laut (*Eucheuma cottonii*) di Perairan Teluk Ekas Lombok Timur. *Jurnal Biologi Tropis*, 53.
- Dayuti, s. (2018). Antibacterial activity of red algae (*Gracilaria verrucosa*) extract against *Escherichia coli* and *Salmonella typhimurium*. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 3.
- Devina Sarita, I. A., Subrata, I. M., Sumaryani, N. P., & Rai, I. G. (2021). Identifikasi Jenis Rumput Laut Yang Terdapat Pada Ekosistem Alami Perairan Nusa Penida. *Jurnal Edukasi Matematika dan SainsP*, 148.
- Dewi, e. n. (2018). *Ulva Lactuca*. Semarang: Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.
- Dewi, E. N. (2018). *Ulva Lactuca*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dewi, i. k., Pramono, s., Rohman, a., & Martien, r. (2022). *Kosmetik Alam: Tongkol Jagung Sebagai Whitening Agent*. Surakarta: Gracias Logis Kreatif.
- Dhurhania, E., & Novianto, A. (2018). Uji Kandungan Fenolik Total dan Pengaruhnya terhadap Aktivitas Antioksidan dari Berbagai Bentuk Sediaan Sarang Semut (*Myrmecodia pendens*). *Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 62-63.
- Dolorosa, M. T., Nurjanah, Purwaningsih, S., Anwar, E., & Hidayat, T. (2017). Kandungan Senyawa Bioaktif Bubur Rumput Laut *Sargassum plagyophyllum* dan *Eucheuma cottonii* sebagai Bahan Baku Krim Pencerah Kulit. *JPHPI*, 639.
- Dwimayasanti, R. (2018). Rumput Laut : Antioksidan Alami Penangkal Radikal Bebas. *Oseana, Volume XLIII*, 14.
- Faruki, R. F. (2021). *Formulasi Dan Uji Aktivitas Krim Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) Dengan Metode Dpph (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil)*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

- Fitri. (2020). *Efektivitas Ekstrak Alga Merah (Eucheuma Spinosum) Terhadap Penyembuhan Luka: Kajian Literatur*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Galili, S., & Hovav, r. (2014). *Determination of Polyphenols, Flavonoids, and Antioxidant Capacity in Dry Seeds*. Amerika serikat: Academic press.
- Garcia, E. j., Oldoni, T. L., Alencar, S. M., Reis, a., Loguercio, a., & Grande, r. H. (2012). Antioxidant Activity by DPPH Assay of Potential Solutions to be Applied on Bleached Teeth. *Brazilian dental*, 21.
- Handayani, s., Utomo, c., Nuraidah, Pramuliati, I., & Fahreza, A. (2020). Identification of Macro-Algae Species in Sindangkerta Beach, Tasikmalaya District: an Effort to Explore TheBiodiversity of Indigenous Species. *Journal of Tropical Biodiversity*, 9.
- Haryani, t. S., Hasanah, u., komala, o., Lestari, i., & Agustina, d. (2022). Potensi Ekstrak Codium, Halimeda, Dictyota, Chondrus Glacillaria Sebagai Sumber Pigmen Dan Antioksidan Alami. *Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar dan Lingkungan Hidup*, 15-16.
- Haryani, t. s., Hasanah, u., Komala, o., Lestari, i., & Agustina, d. (2022). Potensi Ekstrak Codium, Halimeda, Dictyota, Chondrus, Glacillaria Sebagai Sumber Pigmen Dan Antioksidan Alami. *Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar dan Lingkungan Hidup*, 13.
- Ilhamdy, F. A., Jumsurizal, Bahari, M. S., & Pratama, A. G. (2021). Karakteristik Kimia Rumput Laut Hijau (*Caulerpa microphysa* dan *Codium* sp) dari Perairan Kepulauan Riau. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 123.
- Indra, Nurmalasari, N., & Kusmiati, M. (2019). Fenolik Total, Kandungan Flavonoid, dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Mareme (*Glochidion arborescens* Blume.). *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 206.
- Jatmiko, M. p., & Mursiti, s. (2021). Isolation, Identification, and Activity Test of Flavonoid Compounds in Jamblang Leaves (*Syzygium cumini* L.) Skeel as Antioxidants. *Indonesian Journal of Chemical Science*, 135.
- Kamoda, A. P., Nindatu, M., Kusadhiani, I., Astuty, E., Rahawarin, H., & Asmin, E. (2021). Uji Aktivitas Antioksidan Alga Cokelat *Saragassum* sp. Dengan Metode 1,1- Difenil-2-Pikrihidrasil (Dpph). *Pattimura medical review*, 60.
- Kate, d. i. (2014). *Penetapan Kandungan Fenolik Total Dan Uji Aktivitas Antioksidan Dengan Metode Dpph (1,1-Diphenyl-2-Pikrihidrazil) Ekstrak Metanolik Umbi Bidara Upas (Merremia Mammosa (Lour) Hallier F.)*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta .
- Kepel, r. c., & mantiri, d. M. (2019). Biodiversitas Makroalga Di Perairan Pesisir Kora-Kora, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmiah Platax*, 383.


- Khairunnisa. (2021). *Penetapan Kadar Fenolik Dan Tanin Total Dan Analisis Aktivitas Antioksidan Pada Jamur Merang (Volvariella Volvacea Bull.) Dengan Metode Dpph*. Makassar: Uin Alauddin Makassar.
- Kurniasih, n., Kusmiyati, m., Nurhasanah, Sari, r. p., & Wafdan, r. (2015). *Potensi Daun Sirsak (Annona Muricata Linn), Daun Binahong (Anredera Cordifolia (Ten) Steenis), Dan Daun Benalu Mangga (Dendrophthoe pentandra) Sebagai Antioksidan Pencegah Kanker*. Bandung: Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Bandung.
- Kusnadi, j. (2018). *Pengawet Alami untuk Makanan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Leibo, r., Mantiri, D. M., & Gerung, G. (2016). Uji Aktivitas Antioksidan Dari Ekstrak Total Alga Hijauhalimeda *Opuntia Linnaeus* Dan Halimeda *Macroloba Decaisne* Dari Perairan Teluk Totok. *Jurnal Pesisir Dan Laut Tropis*, 30.
- M. Loho, R., Tiho, M., & Assa, Y. (2021). Kandungan dan Aktivitas Antioksidan pada Rumput Laut Merah. *Medical Scope Journal (MSJ)*, 119.
- Maesaroh, K., Kurnia, D., & Anshori, J. A. (2018). Perbandingan Metode Uji Aktivitas Antioksidan Dpph, Frap Dan Fic Terhadap Asam Askorbat, Asam Galat dan Kuersetin . *Chimica et Natura Acta*, 93.
- Maftuch, Kurniawati, i., Adam, a., & Zamzami, I. (2016). Antibacterial effect of *Gracilaria verrucosa* bioactive on fish pathogenic bacteria. *Egyptian Journal of Aquatic Research*, 407.
- Magfira. (2018). *Analisis Penghambatan Ekstrak Etanol Batang Kembang Bulan (Tithonia Diversifolia) Terhadap Reaksi Oksidasi Dari Radikal Bebas Dengan Metode Dpph Abts Dan Frap*. Makassar: Universitas Hasanuddin .
- Maknur, & Nunung, d. l. (2019). *Analisis Kadar Flavonoid Total Hasil Partisi Larut Air Daun Sembukan (Paederia Foetida L.) Dengan Metode Spektrofotometri Uv-Vis*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Maryam, S., Baits, M., & Nadia, A. (2016). Pengukuran Aktivitas Antioksidanekstraketanoldaun Kelor(*Moringa Oleifera Lam.*) Menggunakan Metode Frap (Ferric Reducing Antioxidant Power). *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 115.
- Maryam, s., Pratama, r., Effendi, N., & Naid, T. (2009). Analisis Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanolikdaun *Yodium (Jatropha Multifida L.) Dengan Metodecupric Ion Reducing Antioxidant Capacity (Cuprac)*. *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 90-91.
- Mayasri, A. (2021). Potensi Beberapa Jenis Rumput Laut Di Aceh (Studi Kasus: Skrining Fitokimia Dan Aktivitas Antioksidan). *Lantanida Journal*, 90.

- melati, P. (2021). Uji Aktivitas Antioksidan, Sitotoksisitas Dan Gc-Msekrak Metanol Alga Hijau Boergesenia Forbesii(Harvey) Feldmann Dari Pantai Panjang Bengkulu. *Jurnal Pengelolaan Laboratorium Sains Dan Teknologi*, 11.
- Minarti, S., Idiawati, N., & Sofiana, m. s. (2019). Uji Fitokimia Ekstrak Metanol Sargassum polycystum dari perairan Pulau Lemukutan Kalimantan Barat. *Jurnal Laut Khatulistiwa*, 64.
- Mudrikah, I. (2021). *Modul Pembelajaran Taksonomi Tumbuhan Rendah (Algae*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mustakim. (2017). Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Analisis surat Al-A'raf Ayat 56-58 Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab). *Journal Of Islamic Education (JIE)*, 9-10.
- Muwarni, s. (2015). *Dasar-Dasar Mikrobiologi Veteriner*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Natasia, & Jabar, A. A. (2021). Potensi Alga Coklat (Sargassum Polycystum C. Agardh) Sebagai Produk Teh Untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh. *B I M F I*, 90.
- NUR, F. (2021). *Bioremediasi, Rumput Laut Pertumbuhan Dan Kualitas Rumput Laut Codium Sp. Pada Limba Cair Tambak Udang Super Intensif*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Nurfa. (2021). *Pemanfaatan Rumput Laut Caulerpa Sp. Dalam Pakan Terhadap Pertumbuhan Dan Sintasan Ikan Bandeng (Chanos Chanos)*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar .
- Ozyurek, M., Guclu, K., Tutem, e., Baskan, k. s., Ercag, e., Celik, s. e., . . . Apak, r. (2011). A comprehensive review of Cuprac methodology. *The Royal Society of Chemistry*, 1.
- Palallo, A. (2013). *Distribusi Makroalga Pada Ekosistem Lamun Dan Terumbu Karang Di Pulau Bonebatang, Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Barrang Lompo, Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Prasedya, E. S., Martyasari, N. W., Apriani, R., Mayshara, S., Fanani, r. a., & Sunarpi, h. (2019). Antioxidant activity of *Ulva lactuca* L. from different coastal locations of Lombok Island, Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Bioscience, Biotechnology, and Biometrics 2019*, 3.
- Prasetyo, e., Kharomah, N. Z., & Rahayu, t. P. (2021). Uji Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) Terhadap Ekstrak Etanol Kulit Buah Durian (*Duriozibethinnus* L.) dari Desa Alasmalang Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pharmascience*, 79.


- Putra, I. N. (2020). *Substansi Nutrasetikal Sumber Dan Manfaat Kesehatan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Putri, K. D. (2017). *Pengaruh Komposisi Substrat Terhadap Pertumbuhan, Kandungan Karotenoid, Serat, Dan Abu Anggur Laut Caulerpa Lentillifera J. Agardh, 1873) Pada Wadah Terkontrol*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Qalsum, U., Adhi, A. K., & Fariyanti, A. (2018). Pemasaran Dan Nilai Tambah Rumput Laut Di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 542.
- Rivani. (2015, juni 30). *Laminaria Japonica*. Retrieved from Ilmu itu berharga: <https://rivani19story.blogspot.com/2015/06/laminaria-japonica.html>
- Rubio, c. p., Hernández-Ruiz, J., Subiela, S. M., Tvarijonavičiute, a., & Ceron, j. J. (2016). Spectrophotometric assays for total antioxidant capacity (TAC) in dog serum: an update. *BMC Veterinary Research*, 1.
- S. AftabUddin, S. Akter, S. Hossen, & M. A. Rahman. (2020). Antioxidant, antibacterial and cytotoxic activity of *Caulerpa racemosa* (Forsskål) J Agardh and *Ulva* (Enteromorpha) intestinalis L. *Bangladesh Journal of Scientific and Industrial Research*, 242-243.
- Sari, D. k. (2019). *Uji Kapasitas Dan Aktivitas Antioksidan Air Rebusan Kulit Bawang Merah (Allium Cepa L) Dalam Berbagai Konsentrasi*. Bali: Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.
- Shankhadarwar, s. (2015). Phytochemical screening of marine algae *Ulva lacuta* (Linn.) and *Enteromorpha intestinalis* (Linn.). *Journal of Chemical and Pharmaceutical Research*, 420.
- Shobir, H., Triastinurmiatiningsih, & Ismanto. (2019). Keanekaragaman Jenis Makroalga Yang Berpotensi Sebagai Bahan Obat Di Perairan Pantai Cidatu Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar Dan Lingkungan Hidup*, 95.
- Sumadri. (2018). *Analisis Potensi Pengembangan Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Menjadi Koperasi Di Kabupaten Takalar(Studi Kasus Kecamatan Sanrobone)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Supomo, Sa'adah, H. H., Syamsul, e. s., Kintoko, Witasari, h. a., & Noorcahyati. (2021). *Khasiat Tumbuhan Akar Kuning Berbasis Bukti*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Surni, w. (2014). *Pertumbuhan Rumput Laut (Eucheuma Cottonii) Pada Kedalaman Air Laut Yang Berbeda Di Dusun Kotania Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat*. Seram: Program Studi Pendidikan Biologi.
- Suryo, j. (2010). *Herbal Penyembuh Wasir dan Kanker Prostat*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

- Tapotubun, A. M., Rieuwpassa, F., Supratman, U., & Seta, B. (2019). Effect of Different Drying Methods on Phytochemical Content of *Caulerpa lentillifera* from Kei Islands. *International Journal of ChemTech Research*, 112.
- Titlyanov, E. A., Titlynova, T. V., Li, X., & Huang, h. (2017). Chapter 4 - Common Marine Algae of Hainan Island (Guidebook). *Academic press*, 78.
- Verma, A., & Singh, A. (2013). *Animal Biotechnology Models in Discovery and Translation*. India: Academic Press.
- Wichachucherd, B., Pannak, S., Saengthong, C., Rodcharoen, E., & Koodkaew, I. (2019). Correlation between Growth, Phenolic Content and Antioxidant Activity in the Edible Seaweed, *Caulerpa lentillifera* in Open Pond Culture System. *Journal Of Fisheries And Environment 2019, Volume 43 (2)* *Journal Of Fisheries And Environment 2019, Volume 43 (2)*, 66.
- Wulandari, d., Kilawati, y., & Fadjar, m. (2018). Activity of Compounds on Seaweed *Eucaema cottonii* Extract as Antioxidant Candidate to Prevent Effects of Free Radical in Water Pollution. *Research Journal of Life Science*, 180.
- Yap, f. w., Tay, V., Tan, s. h., Yow, y. y., & Chew, J. (2019). Decoding Antioxidant and Antibacterial Potentials of Malaysian Green Seaweeds: *Caulerpa racemosa* and *Caulerpa lentillifera*. *MDPI Journal*, 13.
- Zhang, L., Cui, C., Li, X., Zhang, Z., Luo, S., Liang, G., . . . Yang, G. (2013). Effect of temperature on the development of *Saccharina japonica* gametophytes. *Journal of Applied Phycology*, 265.


Lampiran 1. Ekstraksi Sampel Alga




Lampiran 2. Penetapan kadar fenolik total




Lampiran 3. Penetapan kadar flavonoid total



Lampiran 4. Penetapan Kadar Karotenoid



Lampiran 5. Penetapan Uji antioksidan Metode Frap

Uji Troloks Frap

10,0 Troloks

Dilarutkan

50 ml Metanol

Dibuat seri konsentrasi

20 μ l30 μ l40 μ l50 μ l60 μ l70 μ l80 μ l

Ditambahkan metanol

980 μ l970 μ l960 μ l950 μ l940 μ l930 μ l920 μ l

Ditambahkan

3000 μ L Reagen Frap


Diamkan 30 Menit

596 nm


UNIVERSITAS ISLAM


ALAUDDIN

M A K A S S A R


Lampiran 6. Penetapan Uji antioksidan Metode Cuprac


Uji Troloks Cuprac




Lampiran 7. Penetapan Uji antioksidan Metode DPPH

Uji Troloks DPPH




Lampiran 8. Penetapan Uji antioksidan Metode TOAC



Lampiran 9. Pengukuran Standard dan Kurva Kalibrasi

Tabel 5. Hasil pengukuran absorbansi Fenolik

Seri Volume	ABSORBANSI				
	1	2	3	4	5
20	0,158	0,19	0,204	0,186	0,2
30	0,314	0,317	0,315	0,362	0,32
50	0,564	0,769	0,608	0,597	0,816
70	0,985	0,979	0,976	1,093	0,902
100	1,284	1,299	1,28	1,278	1,279



Sampel	ABSORBANSI			Rata-rata	SD
	1	2	3		
<i>Chaetomorpha sp</i>	0,044	0,052	0,057	67,80	0,89
<i>Codium sp</i>	0,139	0,144	0,142	82,33	0,35
<i>E. cottonii</i>	0,156	0,161	0,157	86,25	0,37
<i>G. verrucosa</i>	0,014	0,015	0,014	38,42	0,05


<i>C. lentillifera</i>	0,052	0,062	0,054	71,11	0,74
<i>Sargassum sp</i>	0,034	0,023	0,020	40,90	0,63
<i>U. Lactuca</i>	0,168	0,166	0,168	86,73	0,16
<i>S. Japonica</i>	0,429	0,470	0,479	124,12	3,64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tabel 6. Hasil pengukuran absorbansi Flavonoid

Seri Volume	ABSORBANSI				
	1	2	3	4	5
10	0,162	0,160	0,147	0,142	0,142
20	0,233	0,335	0,245	0,233	0,233
30	0,362	0,363	0,374	0,373	0,373
50	0,593	0,595	0,611	0,641	0,641
70	0,854	0,856	0,863	0,899	0,899
90	0,968	0,969	0,947	1,060	1,060




Sampel	ABSORBANSI			Rata-rata	SD
	1	2	3		
<i>Chaetomorpha sp</i>	0,498	0,506	0,451	22,09	1,44
<i>Codium sp</i>	0,680	0,650	0,653	42,02	1,10
<i>E. cottonii</i>	0,118	0,121	0,117	4,52	0,11
<i>G. verrucosa</i>	0,245	0,272	0,254	11,23	0,68
<i>C. lentillifera</i>	0,622	0,621	0,643	30,19	0,63
<i>Sargassum sp</i>	0,174	0,184	0,213	8,25	1,04
<i>U. Lactuca</i>	0,353	0,343	0,330	15,73	0,58
<i>S. Japonica</i>	0,825	0,781	0,810	50,67	1,46

Tabel 7. Hasil pengukuran absorbansi Frap

a. Perbandingan Vit C

Seri Volume	ABSORBANSI				
	1	2	3	4	5
30	0,281	0,296	0,296	0,263	0,272
40	0,410	0,413	0,407	0,407	0,410
50	0,544	0,490	0,540	0,540	0,501
60	0,674	0,642	0,637	0,637	0,620
70	0,707	0,790	0,754	0,754	0,691




Setara dengan mg vit C/ gram ekstrak

Sampel	ABSORBANSI			Rata-rata	SD
	1	2	3		
<i>Chaetomorpha sp</i>	0,358	0,359	0,359	17,98	0,02
<i>Codium sp</i>	0,379	0,378	0,377	17,59	0,04
<i>E. cottonii</i>	0,146	0,147	0,153	8,68	0,16
<i>G. verrucosa</i>	0,059	0,065	0,075	5,04	0,15
<i>C. lentillifera</i>	0,184	0,184	0,198	10,28	0,34
<i>Sargassum sp</i>	0,120	0,124	0,124	7,22	0,09
<i>U. Lactuca</i>	0,191	0,194	0,196	10,70	0,10
<i>S. Japonica</i>	0,343	0,345	0,346	16,87	0,06

b. Perbandingan Trolaks

Seri Volume	ABSORBANSI				
	1	2	3	4	5
20	0,148	0,146	0,173	0,011	0,093
30	0,237	0,285	0,285	0,23	0,232

40	0,375	0,317	0,349	0,349	0,36
50	0,416	0,405	0,405	0,396	0,419
60	0,51	0,512	0,528	0,482	0,527
70	0,566	0,566	0,703	0,555	0,554
80	0,74	0,715	0,799	0,72	0,961




Setara dengan mg troloks/ gram ekstrak

Sampel	ABSORBANSI			Rata-rata	SD
	1	2	3		
<i>Chaetomorpha sp</i>	0,358	0,359	0,359	21,21	0,03
<i>Codium sp</i>	0,379	0,377	0,378	20,91	0,05
<i>E. cottonii</i>	0,146	0,147	0,153	8,39	0,22
<i>G. verrucosa</i>	0,059	0,065	0,059	3,28	0,20
<i>C. lentillifera</i>	0,198	0,209	0,209	11,62	0,37
<i>Sargassum sp</i>	0,120	0,124	0,124	6,53	0,13
<i>U. Lactuca</i>	0,183	0,187	0,191	10,76	0,23
<i>S. Japonica</i>	0,343	0,346	0,345	19,77	0,08

Tabel 8. Hasil pengukuran absorbansi Cuprac

a. Perbandingan Vit C

Seri Volume	ABSORBANSI				
	1	2	3	4	5
50	0,199	0,194	0,310	0,211	0,212
70	0,292	0,296	0,296	0,295	0,295
100	0,427	0,401	0,413	0,407	0,449
150	0,620	0,624	0,631	0,632	0,626
200	0,796	0,873	0,919	0,881	0,866




Sampel	ABSORBANSI			Rata-rata	SD
	1	2	3		
<i>Chaetomorpha sp</i>	0,298	0,298	0,311	15,53	0,32
<i>Codium sp</i>	0,842	0,839	0,906	37,27	1,53
<i>E. cottonii</i>	0,217	0,224	0,222	11,76	0,15

<i>G. verrucosa</i>	0,155	0,137	0,140	8,65	0,41
<i>C. lentillifera</i>	0,815	0,826	0,823	36,99	0,24
<i>Sargassum sp</i>	0,184	0,184	0,209	10,05	0,58
<i>U. Lactuca</i>	0,058	0,059	0,058	4,87	0,02
<i>S. Japonica</i>	0,881	0,883	0,893	39,70	0,27

Setara
dengan mg vit C/
gram ekstrak

b. Perbandingan Trolaks

Seri Volume	ABSORBANSI		
	1	2	3
50	0,199	0,194	0,211
70	0,296	0,295	0,295
100	0,427	0,413	0,449
150	0,631	0,632	0,626
200	0,796	0,873	0,866




Setara dengan mg troloks/mg ekstrak

Sampel	ABSORBANSI			Rata-rata	SD
	1	2	3		
<i>Chaetomorpha sp</i>	0,298	0,298	0,311	20,59	1,15
<i>Codium sp</i>	0,842	0,908	0,906	103,07	5,40
<i>E. cottonii</i>	0,221	0,217	0,222	7,77	0,40
<i>G. verrucosa</i>	0,137	0,148	0,140	0	0,87
<i>C. lentillifera</i>	0,815	0,826	0,823	97,51	0,85
<i>Sargassum sp</i>	0,198	0,209	0,209	5,30	0,91
<i>U. Lactuca</i>	0,058	0,057	0,058	0	0,09
<i>S. Japonica</i>	0,881	0,883	0,893	107,12	0,96

Tabel 9. Hasil pengukuran absorbansi Toac

a. Pembanding Vit C

Seri Volume	ABSORBANSI				
	1	2	3	4	5
50	0,294	0,265	0,303	0,309	0,317
100	0,678	0,684	0,617	0,675	0,649
150	0,961	0,960	0,959	0,958	0,959
200	1,467	1,274	1,274	1,275	1,268
250	1,565	1,744	1,516	1,516	1,515




Setara dengan mg vit C/ gram ekstrak

Sampel	ABSORBANSI			Rata-rata	SD
	1	2	3		
<i>Chaetomorpha sp</i>	0,191	0,189	0,192	71,08	0,41
<i>Codium sp</i>	0,665	0,678	0,666	207,66	2,02
<i>E. cottonii</i>	0,184	0,185	0,183	68,68	0,27
<i>G. verrucosa</i>	0,017	0,012	0,017	24,18	0,79
<i>C. lentillifera</i>	0,385	0,386	0,385	123,63	0,16
<i>Sargassum sp</i>	0,210	0,212	0,211	73,35	0,26
<i>U. Lactuca</i>	0,423	0,415	0,342	126,90	12,15
<i>S. Japonica</i>	1,212	1,202	1,227	347,20	3,40

b. Pembanding Troloks

Seri	ABSORBANSI				
	1	2	3	4	5
Volume					
50	0,130	0,129	0,145	0,210	0,160
100	0,305	0,297	0,303	0,289	0,292

150	0,427	0,419	0,411	0,441	0,408
200	0,586	0,64	0,616	0,644	0,644
250	0,784	0,828	0,785	0,731	0,787




Setara dengan mg troloks/mg ekstrak

Sampel	ABSORBANSI			Rata-rata	SD
	1	2	3		
<i>Chaetomorpha sp</i>	0,191	0,189	0,192	3,88	0,03
<i>Codium sp</i>	0,647	0,665	0,666	15,02	0,25
<i>E. cottonii</i>	0,184	0,185	0,183	3,70	0,02
<i>G. verrucosa</i>	0,017	0,012	0,017	0	0,07
<i>C. lentillifera</i>	0,385	0,386	0,385	8,29	0,01
<i>Sargassum sp</i>	0,210	0,183	0,211	3,95	0,34
<i>U. Lactuca</i>	0,423	0,415	0,424	9,17	0,11
<i>S. Japonica</i>	1,212	1,202	1,181	26,69	0,36

Tabel 10. Hasil pengukuran absorbansi Dpph

a. Pembanding Vit C

Seri Volume	ABSORBANSI		
	1	2	3
100	11,90965	11,41684	10,80082
200	17,20739	16,96099	17,20739
300	26,32444	27,80287	27,18686
400	36,55031	34,20945	37,16632
500	41,97125	38,52156	47,88501
600	47,88501	51,3347	0
700	58,97331	57,86448	61,80698



Setara dengan mg vit C/ gram ekstrak


Sampel	ABSORBANSI			Rata-rata	SD
	1	2	3		
<i>Chaetomorpha sp</i>	17,620	18,361	17,196	37,70	1,47
<i>Codium sp</i>	24,820	24,291	24,926	54,57	0,84
<i>E. cottonii</i>	28,314	27,997	29,267	64,65	1,65
<i>G. verrucosa</i>	24,291	24,502	24,291	55,23	0,31
<i>C. lentillifera</i>	23,761	25,985	24,608	58,69	6,22
<i>Sargassum sp</i>	18,043	15,820	21,749	40,43	7,61
<i>U. Lactuca</i>	22,279	23,761	23,655	51,44	2,06
<i>S. Japonica</i>	51,821	52,351	51,821	127,72	0,79

Setara dengan mg troloks/mg ekstrak

Sampel	ABSORBANSI			Rata-rata	SD
	1	2	3		
<i>Chaetomorpha sp</i>	17,620	18,361	17,196	4,45	0,22
<i>Codium sp</i>	24,820	24,291	24,926	6,95	0,12
<i>E. cottonii</i>	28,314	27,997	29,267	8,43	0,24
<i>G. verrucosa</i>	24,291	24,502	24,291	7,02	0,05
<i>C. lentillifera</i>	23,761	25,985	24,608	7,11	0,42
<i>Sargassum sp</i>	18,043	26,091	21,749	6,12	1,51
<i>U. Lactuca</i>	22,279	23,761	23,655	6,48	0,31
<i>S. Japonica</i>	51,821	52,351	51,821	17,71	0,12

b. Pembanding Troloks

Seri Volume	ABSORBANSI				
	1	2	3	4	5
10	3,531828	6,98152	8,829569	13,01848	7,843943
25	25,83162	20,28747	20,04107	21,1499	21,1499
50	32,11499	31,74538	31,37577	30,88296	35,31828
100	75,23614	57,74127	57,49487	56,38604	56,87885
150	88,29569	82,38193	84,47639	85,33881	81,1499



M A K A S S A R

Perhitungan

1. Kadar total fenolik (digunakan juga untuk flavonoid, *CUPRAC*, *FRAP*, dan *TOAC*).


As.galat 5 mg → 10.0 mL (500 ppm) disebut larutan stok baku as.galat

Volume larutan stok	µg asam galat (x)*	Volume air suling (µl)	Volume total (µl)	Konsentrasi (ppm)
20	10	230	250	40
30	15	220		60
50	20	200		100
70	25	180		140
100	30	150		200

Tabel untuk grafik kurva baku

X	Y (serapan)			Y rata-rata
	1	2	3	
10	0.190	0.204	0.200	0.198
15	0.314	0.362	0.320	0.332
20	0.564	0.597	0.769	0.643
25	0.979	0.976	0.902	0.952
30	1.284	1.299	1.278	1.287

Grafik



Bobot ekstrak

Sampel	Bobot sampel	Volume metanol (ml)	Konsentrasi ppm	Jumlah sampel
Sargassum	10,2 mg	10	1020	0,20
Eucheuma cottonii	10,3 mg	10	1030	0,12
Caulerpa l	10,4 mg	10	1040	0,12
Ulva L.	10,4 mg	10	1040	0,12
Gracillaria v	10,6 mg	10	1060	0,21
Chaetomorpha	10,8 mg	10	1080	0,12
Saccharina j	10,7 mg	10	1070	0,12
Codium sp	10,5 mg	10	1050	0,12

Didapat dari perhitungan $y : ax + b$ x : bobot setara as.galat

Sampel	Bobot ekstrak (mg)	Setara asam galat		
		1	2	3
Sargassum	10,2 mg	8,49	8,24	8,30
Eucheuma cottonii	10,3 mg	10,63	10,71	10,64
Caulerpa l	10,4 mg	8,98	8,80	8,84
Ulva L.	10,4 mg	10,84	10,80	10,84
Gracillaria v	10,6 mg	8,14	8,16	8,14
Chaetomorpha	10,8 mg	8,66	8,80	8,89
Saccharina j	10,7 mg	16,28	15,41	16,12
Codium sp	10,5 mg	10,33	10,42	10,38

Kadar total fenolik

Sampel	Jumlah Sampel (mg)	Kadar total (mg/g ekstrak)			Rata-rata	SD
		1	2	3		
Sargassum	0,20	41,61	40,40	40,66	40,90	0,63
Eucheuma cottonii	0,12	85,96	86,67	86,10	86,25	0,37
Caulerpa l	0,12	71,94	70,54	70,82	71,11	0,74
Ulva L.	0,12	86,82	86,54	86,82	86,73	0,16
Gracillaria v	0,21	38,38	38,47	38,38	38,42	0,05
Chaetomorpha	0,12	66,84	67,93	68,60	67,80	0,89
Saccharina j	0,12	126,80	119,98	125,57	124,12	3,64
Codium sp	0,12	81,96	82,65	82,38	82,33	0,35

2. Perhitungan DPPH

Pembuatan larutan vit c

10,0 mg dilarutkan hingga 50.0 mL (200 ppm)

Volume larutan stok	Vitamin C (μg)*	Volume air suling (μl)	Volume total (μl)	Konsentrasi (ppm)
100	40	1400	1500	27
200	80	1300		53
300	120	1200		80
400	160	1100		107
500	200	1000		133
600	240	900		160
700	280	800		187


Serapan blanko (A)

Blanko	Serapan			Rata-rata
	1	2	3	
	0.799	0.812	0.824	0.811

Kurva baku

X = mg Vit.C

Y=% Inhibisi



Larutan sampel 10mg dilarutkan hingga 10,0 ml (1000 ppm)

Sampel	Bobot sampel (mg)	Volume metanol	Volume yang dipipet	Jumlah sampel
Codium Sp	10.5	10000	1000	1,04
Sacarina j	10.8	10000	1000	1,0
Eucheuma c.	10.5	10000	1000	1,03
Sargassum	10.6	10000	1000	1,01
Caulerpa L	10,2	10000	1000	1,02
Ulva L	10,5	10000	1000	1,03
Chaetomorpha	10,9	10000	1000	1,03
Gracillaria v	10,3	10000	1000	1,01

%inhibisi

Vol. sampel (x)	Serapan			Blanko (A)	Inhibisi%***			Y Rata-rata
100	0.715	0.719	0.688	0.811	11.91	11.42	15.24	12.85
200	0.672	0.674	0.662		17.21	16.96	18.44	17.54
300	0.586	0.581	0.591		27.80	28.42	27.19	27.80
400	0.515	0.534	0.510		36.55	34.21	37.17	35.98
500	0.471	0.516	0.499		41.97	36.43	38.52	38.97
600	0.529	0.423	0.536		34.83	47.89	33.96	38.89
700	0.333	0.342	0.310		58.97	57.86	61.81	59.55

Keterangan

$$*** : \left[\frac{(AB-AA)}{AB} \right] \times 100$$

Perhitungan kapasitas antioksidan

Sampel	Blanko	Kapasitas antioksidan			Rata-rata	SD
		1	2	3		
Codium Sp	0.811	54,92	55,18	53,61	54,57	0,84
Sacarina j		127,26	128,62	127,26	127,72	0,79
Eucheuma c		64,12	66,50	63,33	64,65	1,65
Sargassum		39,17	33,52	48,59	40,43	7,61
Caulerpa L		53,22	58,82	55,35	55,80	2,82
Ulva L		49,05	52,75	52,49	51,44	2,06
Chaetomorpha		37,43	36,37	39,28	37,70	1,47
Gracillaria v	55,58	55,04	55,04	55,23	0,31	

Lampiran 10. Gambar Sampel Alga



Gambar 1. *Gracillaria verrucosa*



Gambar 2. *Codium sp*



Gambar 3. *Caulerpa lentillifera*



Gambar 4. *Sargassum sp*



Gambar 5. *Sacharina Japonica*




Gambar 6. *Eucheuma cottonii*



Gambar 7. *Ulva Lactuca*



Gambar 8. *Chaetomorpha*



Lampiran 11. Gambar Uji Fitokimia


a. Alkaloid

Gambar 16. *Gracillaria v*Gambar 17. *Chaetomorpha*Gambar 18. *Caulerpa l.*Gambar 19. *Eucheuma cottonii*Gambar 20. *Sargassum sp*Gambar 21. *Saccharina J*Gambar 22. *Ulva Lactuca*Gambar 23. *Codium sp*

b. Steroid dan Terpenoid

Gambar 24. *Gracillaria v*Gambar 25. *Chaetomorpha*Gambar 26. *Codium sp*Gambar 27. *Caulerpa l.*Gambar 28. *Eucheuma cottonii*Gambar 29. *Sargassum sp*Gambar 30. *Ulva Lactuca*Gambar 31. *Saccharina J*

c. Tanin

Gambar 32. *Gracillaria v*Gambar 33. *Chaetomorpha*Gambar 34. *Codium sp*Gambar 35. *Caulerpa l*Gambar 36. *Euclidean cottonii*Gambar 37. *Sargassum sp*Gambar 38. *Saccharina J*Gambar 39. *Ulva Lactuca*

d. Saponin

Gambar 40. *Gracillaria v*Gambar 41. *Chaetomorpha*Gambar 42 *Codium sp*Gambar 43. *Caulerpa l*Gambar 45. *.Eucheuma cottonii*Gambar 46 *Sargassum sp*Gambar 47. *Saccharina J*Gambar 48 *Ulva Lactuca*

e. Glikosida

Gambar 48. *Gracillaria v*Gambar 49. *Chaetomorpha*Gambar 50. *Codium sp*Gambar 51. *Caulerpa l*Gambar 52. *Eucheuma cottonii*Gambar 53. *Sargassum sp*Gambar 54. *Saccharina J*Gambar 55. *Ulva Lactuca*

Lampiran 12. Data SPSS

Data SPSS Kadar Fenolik

Test of Homogeneity of Variances

fenolik

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
8.508	7	16	.000

ANOVA

fenolik

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	15896.900	7	2270.986	1191.480	.000
Within Groups	30.496	16	1.906		
Total	15927.397	23			

fenolik

	perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05							
			1	2	3	4	5	6	7	
Duncan ^a	Gracillaria verrucosa_fenolik	3	38.4167							
	Sargassum sp_fenolik	3		40.8967						
	Chaetomorpha_fenolik	3			67.7967					
	Caulerpa lentillifera_fenolik	3				71.1033				
	Codium sp_fenolik	3					82.3333			
	Eucheuma Cottonii_fenolik	3						86.2467		
	Ulva Lactuca_fenolik	3							86.7267	
	Saccharina Japonica_fenolik	3								124.1267
	Sig.			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.676	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

Data SPSS Kadar Flavonoid

Test of Homogeneity of Variances

flavonoid			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.322	7	16	.077

ANOVA

flavonoid					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5791.119	7	827.303	858.417	.000
Within Groups	15.420	16	.964		
Total	5806.539	23			

flavonoid

	perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Duncan a	Eucheuma Cottonii_flavonoid	3	4.5167								
	Sargassum sp_flavonoid	3		8.2467							
	Gracillaria verrucosa_flavonoid	3			11.2300						
	Ulva Lactuca_flavonoid	3				15.7333					
	Chaetomorpha_flavonoid	3					22.0933				
	Caulerpa lentillifera_flavonoid	3						30.1867			
	Codium sp_flavonoid	3							42.0233		
	Saccharina Japonica_flavonoid	3									50.6667
	Sig.			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

Data SPSS Kadar Karotenoid

Test of Homogeneity of Variances

karotenoid

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
16.000	7	16	.000

ANOVA

karotenoid

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2.651	7	.379	90895.429	.000
Within Groups	.000	16	.000		
Total	2.651	23			

karotenoid

	perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
			1	2	3	4
Duncan ^a	Saccharina Japonica_karotenoid	3	-1.0000			
	Sargassum sp_karotenoid	3		.0000		
	Gracillaria verrucosa_karotenoid	3		.0000		
	Ulva Lactuca_karotenoid	3		.0000		
	Chaetomorpha_karotenoid	3		.0000		
	Eucheuma Cottonii_karotenoid	3		.0033		
	Codium sp_karotenoid	3			.0100	
	Caulerpa lentillifera_karotenoid	3				.0200
	Sig.		1.000	.088	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

REKORD BUKU
MAKASSAR

Data SPSS Kadar Vit C Frap

Test of Homogeneity of Variances

vit c frap

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
6.144	7	16	.001

ANOVA

vit c frap

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	532.361	7	76.052	3133.457	.000
Within Groups	.388	16	.024		
Total	532.750	23			

vit c frap

	perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Duncan ^a	Gracillaria verrucosa_vit c frap	3	5.0367								
	Sargassum sp_vit c frap	3		7.2167							
	Eucheuma Cottonii_vit c frap	3			8.6767						
	Caulerpa lentillifera_vit c frap	3				10.2800					
	Ulva Lactuca_vit c frap	3					10.7000				
	Saccharina Japonica_vit c frap	3						16.8667			
	Codium sp_Vit c frap	3							17.5900		
	Chaetomorpha_vitc frap	3								17.9833	
	Sig.			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

Data SPSS Kadar Troloks Frap

Test of Homogeneity of Variances

troloks frap

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
3.510	7	16	.018

ANOVA

troloks frap

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1019.928	7	145.704	3596.891	.000
Within Groups	.648	16	.041		
Total	1020.576	23			

troloks frap

	perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05						
			1	2	3	4	5	6	7
Duncan ^a	Gracillaria verrucosa_troloks frap	3	3.2800						
	Sargassum sp_troloks frap	3		6.5333					
	Eucheuma Cottonii_troloks frap	3			8.3900				
	Ulva Lactuca_troloks frap	3				10.7600			
	Caulerpa lentillifera_troloks frap	3					11.6233		
	Saccharina Japonica_troloks frap	3						19.7700	
	Codium sp_troloks frap	3							20.9100
	Chaetomorpha_troloks frap	3							21.2100
	Sig.			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

Data SPSS Vit C Cuprac

Test of Homogeneity of Variances

vit c cuprac

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
5.236	7	15	.003

ANOVA

vit c cuprac

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1907.935	7	272.562	1.720	.179
Within Groups	2377.653	15	158.510		
Total	4285.587	22			

vit c cuprac

	perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05	
			1	2
Duncan ^{a,b}	Ulva Lactuca_vit c cuprac	3	6.0200	
	Gracillaria verrucosa_VIT c cuprac	3	9.4400	9.4400
	Sargassum sp_vit c cuprac	2	9.7100	9.7100
	Eucheuma Cottonii_vit c cuprac	3	21.1333	21.1333
	Chaetomorpha_vit c cuprac	3	23.2433	23.2433
	Codium sp_VIT C CUPRAC	3	25.8867	25.8867
	Caulerpa lentillifera_vit c cuprac	3	28.7100	28.7100
	Saccharina Japonica_vit c cuprac	3		31.6700
	Sig.			.076

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 2,824.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

Data SPSS Troloks Cuprac

Test of Homogeneity of Variances

troloks cuprac

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
10.304	7	16	.000

ANOVA

troloks cuprac

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	58779.015	7	8397.002	1982.219	.000
Within Groups	67.779	16	4.236		
Total	58846.793	23			

troloks cuprac

	perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05							
			1	2	3	4	5	6	7	
Duncan ^a	Ulva Lactuca_troloks cuprac	3	-16.8800							
	Gracillaria verrucosa_troloks cuprac	3		-4.1267						
	Sargassum sp_troloks cuprac	3			5.2933					
	Eucheuma Cottonii_troloks cuprac	3			7.7700					
	Chaetomorpha_troloks cuprac	3				20.5867				
	Caulerpa lentillifera_troloks cuprac	3					97.5100			
	Codium sp_troloks cuprac	3						103.0700		
	Saccharina Japonica_troloks cuprac	3							107.1200	
	Sig.			1.000	1.000	.160	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

Data SPSS Kadar Vit C Toac

Test of Homogeneity of Variances

vit c toac

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
11.220	7	16	.000

ANOVA

vit c toac

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	224680.216	7	32097.174	1562.174	.000
Within Groups	328.744	16	20.546		
Total	225008.960	23			

vit c toac

	perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05				
			1	2	3	4	5
Duncan ^a	Gracillaria verrucosa_VIT C TOAC	3	24.1833				
	Eucheuma Cottonii_vit c toac	3		68.6800			
	Chaetomorpha_vit c toac	3		71.0800			
	Sargassum sp_vit c toac	3		73.3533			
	Caulerpa lentillifera_vit c toac	3			123.6300		
	Ulva Lactuca_VIT C toac	3			126.9000		
	Codium sp_vit c toac	3				207.6567	
	Saccharina Japonica_vit c toac	3					347.2000
	Sig.			1.000	.249	.390	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

ALAUDDIN
MAKASSAR

Data SPSS Kadar Troloks Toac

Test of Homogeneity of Variances

troloks toac

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
6.076	7	16	.001

ANOVA

troloks toac

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1535.789	7	219.398	5317.139	.000
Within Groups	.660	16	.041		
Total	1536.449	23			

troloks toac

	perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05						
			1	2	3	4	5	6	
Duncan ^a	Gracillaria verrucosa_troloks toac	3	-.0867						
	Eucheuma Cottonii_troloks toac	3		3.7000					
	Chaetomorpha_troloks toac	3		3.8833					
	Sargassum sp_troloks toac	3		3.9500					
	Caulerpa lentillifera_troloks toac	3			8.2900				
	Ulva Lactuca_troloks toac	3				9.1700			
	Codium sp_troloks toac	3					15.0200		
	Saccharina Japonica_troloks toac	3							26.6933
	Sig.			1.000	.172	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

Data SPSS Kadar Vit C Dpph

Test of Homogeneity of Variances

vit c dpph

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
3.848	7	16	.012

ANOVA

vit c dpph

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	16870.915	7	2410.131	252.194	.000
Within Groups	152.906	16	9.557		
Total	17023.821	23			

vit c dpph

	perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
			1	2	3	4
Duncan ^a	Chaetomorpha_vit c dpph	3	37.6933			
	Sargassum sp_vit c dpph	3	40.4333			
	Ulva Lactuca_vit c dpph	3		51.4400		
	Codium sp_vit c dpph	3		54.5700		
	Gracillaria verrucosa_vit c dpph	3		55.2267		
	Caulerpa lentillifera_vit c dpph	3		55.8067		
	Eucheuma Cottonii_vit c dpph	3			64.6500	
	Saccharina Japonica_vit c dpph	3				127.7167
	Sig.			.294	.130	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

Data SPSS Kadar Troloks Dpph

Test of Homogeneity of Variances

troloks dpph

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
3.259	7	16	.024

ANOVA

troloks dpph

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	347.399	7	49.628	147.579	.000
Within Groups	5.381	16	.336		
Total	352.780	23			

troloks dpph

	perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
			1	2	3	4
Duncan ^a	Chaetomorpha_troloks dpph	3	4.4467			
	Sargassum sp_troloks dpph	3		6.1200		
	Ulva Lactuca_troloks dpph	3		6.4767		
	Codium sp_troloks dpph	3		6.9500		
	Gracillaria verrucosa_troloks dpph	3		7.0167		
	Caulerpa lentillifera_troloks dpph	3		7.1133		
	Eucheuma Cottonii_troloks dpph	3			8.4333	
	Saccharina Japonica_troloks dpph	3				17.7100
	Sig.			1.000	.075	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

RIWAYAT HIDUP



Winda Utari, biasa dipanggil winda, dilahirkan di Palu, 15 Desember 1998. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri Udin dan Nartin. Penulis memiliki 2 adik yaitu 1 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Penulis mengawali pendidikan pada tahun 2003 di salah satu Taman Kanak-kanak yang ada di Samarinda yaitu TK Al-Hikmah. Kemudian melanjutkan pendidikan tahun 2005 di SDN 012 Samarinda Seberang Kalimantan Timur, dan menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Labbaika, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Samarinda Seberang Kalimantan Timur dan lulus pada tahun 2017.

Setelah lulus jenjang Sekolah Menengah Atas penulis sempat menganggur selama 1 tahun dikarenakan ada kepentingan yang jauh lebih penting dan tidak dapat ditinggalkan, kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan Sarjana di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya pada jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R