


**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN  
CEDERA KEPALA BERAT DENGAN PENURUNAN  
KESADARAN MENGGUNAKAN INTERVENSI  
*FAMILIAR AUDITORY SENSORY TRAINING*  
DI RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO**



**Tugas Akhir Ners**

Oleh:

BAU SANTI NUR, S.Kep

NIM: 70900121027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN  
CEDERA KEPALA BERAT DENGAN PENURUNAN  
KESADARAN MENGGUNAKAN INTERVENSI  
*FAMILIAR AUDITORY SENSORY TRAINING*  
DI RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO**



**Tugas Akhir Ners**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Ners Jurusan Ilmu Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran  
Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri  
Alauddin Makassar

Oleh:

BAU SANTI NUR, S.Kep  
NIM: 70900121027

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bau Santi Nur, S. Kep  
NIM : 70900121021  
Tempat/Tgl. Lahir : Jampea, 21 Juli 1999  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi: Keperawatan/Ners/Keperawatan Gawat dan Darurat  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Dusun Parang, Jampea  
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Cedera Kepala Berat dengan Penurunan Kesadaran Menggunakan Intervensi Familiar Auditory Sensory Training di RSUP Wahidin Sudirohusodo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 27 Desember 2022

Penyusun,



Bau Santi Nur


NIM: 70900121027

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan tugas akhir ners saudara (i) Bau Santi Nur, NIM: 70900121027, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Cedera Kepala Berat dengan Penurunan Kesadaran Menggunakan Intervensi *Familiar Auditory Sensory Training* di RSUP Wahidin Sudirohusodo", memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 28 Desember 2022



Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kep  
Pembimbing I



Eva Yustilawati, S.Kep., Ns., M.Kep  
Pembimbing II

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Cedera Kepala Berat dengan Penurunan Kesadaran Menggunakan Intervensi *Familiar Auditory Sensory Training* di Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo”, yang disusun oleh Bau Santi Nur, NIM: 70900121027, mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar keperawatan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 M, bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam Program Studi Profesi Ners.

Gowa, 04 Januari 2023 M.  
11 Jumadil Akhir 1444 H.

#### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Ahmad J, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB	(.....)
Munaqisy II	: Baso Pallawagau, Lc., MA	(.....)
Pembimbing I	: Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Eva Yustilawati, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui,

Dekan Fakultas Kedokteran  
dan Ilmu Kesehatan



Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur atas rahmat Allah swt. sehingga karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Cedera Kepala Berat dengan Penurunan Kesadaran Menggunakan Intervensi *Familiar Auditory Sensory Training* di RSUP Wahidin Sudirohusodo” dapat terselesaikan dengan baik dan tidak lupa pula penulis persembahkan shalawat serta salam kepada Rasulullah saw. serta kepada para sahabat dan pengikutnya. Adapun tujuan dari penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah untuk memperoleh gelar Ners dari Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak oleh karenanya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang besar serta penghargaan kepada semua pihak, semoga Allah dapat membalas bantuan yang diberikan dengan pahala yang setimpal. Ucapan terima kasih saya persembahkan kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD serta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus UIN Alauddin Makassar.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menempuh pendidikan
3. Dr. Patima, S.Kep.,Ns., M.Kep selaku ketua Program Studi profesi Ners dan Syisnawati, S.Kep.,Ns., M.Kep., Sp.Kep.J selaku sekretaris Program Studi Profesi Ners, serta Dosen pengajar, bagian Tata Usaha dan Akademik bersama Staf yang selalu membagikan ilmunya serta memberikan bantuan, baik dalam proses pengurusan admistrasi maupun proses penyusunan karya tulis ilmiah

4. Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing I dan Eva Yustilawati, S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan bimbingan dan motivasi dari awal penulisan karya tulis ilmiah hingga penulis bisa sampai ke tahap ini.
5. Ahmad J, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB selaku penguji I dan Baso Pallawagau, Lc., MA selaku penguji II yang telah sabar meluangkan pikiran dan waktunya serta memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang baik.
6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Husman dan Ibunda Kasmawati yang sangat saya sayangi karena telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, dan materi kepada penulis selama menjalani studi.
7. Kepada teman-teman seperjuangan, khususnya para sahabat dan teman sekelompok bimbingan yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak pihak yang turut serta membantu dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini, namun penulis tidak dapat ucapkan secara satu persatu. Semoga Allah swt. senantiasa membalas kebaikan dari berbagai pihak dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian. Jangan berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah swt. Sekian dan terima kasih.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Sampul</b> .....	
<b>Halaman Sampul</b> .....	
<b>Lembar Keaslian Tugas Akhir Ners</b> .....	i
<b>Lembar Persetujuan Pembimbing</b> .....	ii
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	iii
<b>Kata Pengantar</b> .....	iv
<b>Daftar Isi</b> .....	vi
<b>Daftar Tabel</b> .....	viii
<b>Daftar Diagram</b> .....	ix
<b>Abstrak</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1-7
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8 - 46
2.1 Tinjauan Teoritis .....	8-22
2.2 Tinjauan Asuhan Keperawatan .....	22-42
2.3 <i>Evidence Based Practice In Nursing</i> .....	43-46
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	47-52
3.1 Rancangan Studi Kasus .....	47
3.2 Subyek Studi Kasus.....	47
3.3 Fokus Studi Kasus .....	48
3.4 Instrumen Studi Kasus .....	48
3.5 Prosedur Pengambilan Data .....	49
3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi .....	49
3.7 Analisis Data dan Penyajian Data .....	50
3.8 Etika Studi kasus .....	50
<b>BAB IV LAPORAN KASUS</b> .....	53-84



4.1 Asuhan Keperawatan.....	53-84
<b>BAB V PEMBAHASAN</b> .....	84-108
5.1 Analisis Asuhan Keperawatan .....	84-96
5.2 Analisis <i>Evidence Based Practice In Nursing</i> .....	97-108
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	109-1110
6.1 Kesimpulan .....	109
6.2 Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	111-114
Lampiran 1 Pathway .....	115
Lampiran 2 Jurnal rujukan utama .....	116
Lampiran 3 Riwayat hidup.....	118
Lampiran 4 Turnitin .....	119
Lampiran 5 Dokumentasi.....	120


## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Skala GCS .....	15
Tabel 2.2. Intervensi Keperawatan Teoritis .....	26
Tabel 4.1. Penkajian Keperawatan .....	53
Tabel 4.2. Analisa Data .....	64
Tabel 4.3. Diagnosis Keperawatan .....	66
Tabel 4.4. Intervensi Keperawatan .....	68
Tabel 4.5. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan .....	72



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 5.1. Tekanan Darah .....	97
Diagram 5.2. Nadi (HR).....	98
Diagram 5.3. Pernapasan (RR).....	100
Diagram 5.4. Suhu.....	101
Diagram 5.5. GCS .....	102



## ABSTRAK

Nama : Bau Santi Nur

NIM : 70900121027

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Cedera Kepala Berat dengan Penurunan Kesadaran Menggunakan Intervensi *Familiar Auditory Sensory Training* di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

---

**Latar belakang:** Cedera kepala merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan terjadinya kecacatan dan kematian terbesar di dunia. Penurunan kesadaran merupakan salah satu manifestasi klinis dari cedera kepala yang memerlukan perawatan dan penanganan segera untuk mengurangi kecacatan dan mencegah kematian. Terapi non farmakologi yang dapat diberikan untuk memperbaiki tingkat kesadaran pada pasien cedera kepala berat yaitu *Familiar Auditory Sensory Training* berupa stimulus sensori dengan memperdengarkan suara keluarga terdekat yang telah direkam secara digital. **Tujuan** penulisan ini adalah melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran menggunakan intervensi *Familiar Auditory Sensory Training* di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. **Metode** yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan yang melibatkan 1 responden. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data berupa format pengkajian asuhan keperawatan Gawat dan Darurat. Penelitian ini dilakukan di ruangan *Intensive Care Unit* (ICU) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang dilaksanakan selama 3 hari secara berturut-turut yaitu pada tanggal 01-03 Agustus 2022. **Hasil:** Setelah diberikan intervensi *Familiar Auditory Sensory Training* pasien mengalami peningkatan kesadaran dari GCS 6x E3 M3 Vx menjadi GCS 11 E4 M5 V2 yaitu pasien telah mampu membuka mata secara spontan, dapat melokalisir nyeri dan mengeluarkan suara tidak jelas. **Kesimpulan dan saran:** Berdasarkan hasil evaluasi kasus yang dilakukan diperoleh bahwa penerapan intervensi *Familiar Auditory Sensory Training* 3 kali sehari selama 3 hari berturut-turut dapat membantu meningkatkan kesadaran setelah pemberian intervensi. Hal ini mengindikasikan bahwa *Familiar Auditory Sensory Training* efektif dalam penanganan penurunan kesadaran pada pasien cedera kepala berat. Saran bagi peneliti selanjutnya, menerapkan *Familiar Auditory Sensory Training* secara terus menerus dan teratur untuk mendapatkan hasil yang optimal. **Kata Kunci:** Cedera Kepala Berat, Kesadaran Menurun, *Familiar Auditory Sensory Training*

## **ABSTRACT**

Name : Bau Santi Nur

NIM : 70900121027

Title : *Analysis of Nursing Care in Patients with Severe Head Injury with Decreased Consciousness Using Familiar Auditory Sensory Training Intervention at RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo*

**Background:** Head injury is a disease that causes disability and death in the world. Decreased consciousness is one of the clinical manifestations of head injuries that require immediate care and treatment to reduce disability and prevent death. Non-pharmacological therapy that can be given is Familiar Auditory Sensory Training in the form of sensory stimuli by playing the voices of the closest family that have been digitally recorded. **The purpose** of this writing was to carry out nursing care for patients with severe head injuries with decreased consciousness using Familiar Auditory Sensory Training interventions at RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. **The method** was a case study with a nursing care approach involving one respondent. Data collection techniques through interviews, observation, physical examination and documentation. The data collection instrument is in the form of assessment of the Emergency and Emergency nursing care. This research was conducted in the Intensive Care Unit (ICU) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo which was carried out for 3 days and in 1 day was carried out 3 times in a row, namely on 01-03 August 2022. **Results:** After being given the Familiar Auditory Sensory Training intervention the patient experienced increased awareness from GCS 6x E3 M3 Vx to GCS 11 E4 M5 V2, namely the patient has been able to open his eyes spontaneously, can localize pain and make unclear sounds. **Conclusions and suggestions:** Based on the results of the case evaluation, it was found that the application of the Familiar Auditory Sensory Training intervention 3 times a day for 3 consecutive days can help increase awareness after the intervention. This indicates that Familiar Auditory Sensory Training is effective in treating loss of consciousness in patients with severe head injuries. Suggestions for future researchers, apply Familiar Auditory Sensory Training continuously and regularly to get optimal results.

**Keywords:** Severe Head Injury, Decreased Consciousness, Familiar Auditory Sensory Training

ALAUDDIN  
MAKASSAR

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Cedera kepala dapat menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kesadaran pada seseorang. Hingga saat ini, salah satu yang menyebabkan terjadinya kecacatan dan kematian terbesar di dunia adalah cedera kepala. *Global Burden of Disease (GBD)* tahun 2016 memperkirakan terjadi lebih dari 27 juta kasus cedera kepala per tahun, dengan tingkat rata-rata 369 per 100.000 orang. Negara berkembang menempati angka 90% kematian yang disebabkan karena cedera kepala. Afrika merupakan salah satu negara berkembang dengan kasus cedera kepala yang diperkirakan sekitar 8 juta kasus setiap tahun dengan tingkat rata-rata 801 per 100.000 orang karena mengalami kecelakaan lalu lintas.

*Surveillance Report of Traumatic Brain Injury* pada tahun 2014, di Amerika Serikat cedera kepala merupakan salah satu penyebab kunjungan pasien datang ke rumah sakit dengan angka yang cukup tinggi. Terdapat sekitar 2,87 juta pasien mengalami cedera kepala. Diantaranya sekitar 2,5 juta orang datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang didalamnya lebih dari 812.000 pasien merupakan anak-anak. Prevalensi jatuh sebesar 47,9%, tertabrak 17,1% dan kecelakaan bermotor 13,2%. Tingkat kunjungan IGD dengan cedera kepala per 100.000 populasi paling tinggi ada pada orang dewasa yang lebih tua berusia  $\geq 75$  tahun (1.682.0), anak-

anak usia 0-4 tahun (1.618,6), dan individu berusia 15-24 tahun (1.010.1) (Peterson et al., 2019).

Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi cedera kepala sebesar 11,9% terjadi di Indonesia. Gorontalo menempati urutan pertama dengan cedera kepala terbanyak yaitu 17,9%. Sementara itu, Sulawesi Selatan menempati posisi keenam setelah NTT dengan prevalensi 15%. Penyebab cedera kepala paling banyak terjadi pada kecelakaan mobil yaitu 36,08%. Rata-rata pada individu yang mengalami cedera kepala terjadi luka pada kepala, luka pada tubuh bagian bawah dan bagian atas dengan kesamaan 67,9% dan 32,7% (Kemenkes RI, 2019). Kecelakaan bukan masalah yang harus diabaikan karena menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah pada kesehatan seseorang, seperti kecacatan bahkan berujung pada kematian.

Penurunan kesadaran merupakan salah satu manifestasi klinis dari cedera kepala yang memerlukan perawatan dan penanganan segera untuk mengurangi kecacatan dan mencegah kematian. Oleh karena itu, peran perawat sangat penting dalam melakukan asuhan keperawatan untuk meningkatkan status kesadaran dan meminimalisir kecacatan. Berbagai upaya asuhan keperawatan telah dikembangkan untuk membantu meningkatkan kesadaran pasien, antara lain oksigenasi, pengaturan posisi, dan stimulasi visual, auditori, taktil, gustatori, dan stimulasi olfaktori (Yusuf, Z. K., 2019). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa stimulasi sensoris mampu meningkatkan status kesadaran pasien dan mampu

mencegah kerusakan-kerusakan sel-sel otak akibat iskemi yang ditimbulkan oleh cedera kepala (Enny & Endah, 2015).

Stimulasi sensoris yang diberikan berupa stimulasi olfaktori, auditori, taktil, dan gustatory. Bagian tubuh yang tetap berfungsi ketika mengalami penurunan kesadaran adalah indera pendengaran, sehingga dalam meningkatkan kesadaran intervensi yang paling berpengaruh adalah stimulus auditori sensori (Maulidya et al., 2019). Stimulus auditori sensori akan merangsang aktivitas *Reticular Activating System* (RAS) sehingga dapat membuat pasien sadar terhadap diri dan lingkungannya (Yusuf, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Mohammadi & Yeganeh (2019) dengan pemberian Intervensi stimulasi auditori dengan mendengarkan suara rekaman keluarga yang dilakukan selama 10 menit serta dilakukan sebanyak tiga kali per hari dan menunjukkan hasil bahwa terjadi peningkatan kesadaran yang ditunjukkan dari hasil perbedaan nilai GCS pada kelompok kontrol dengan kelompok intervensi ( $p=0.0001$ ).

Berdasarkan hasil pengamatan di ruangan *Intensive Care Unit* (ICU) Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo rata-rata pasien yang dirawat merupakan pasien dengan penurunan kesadaran dan beberapa diantaranya disebabkan karena cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas. Pemanfaatan terapi non farmakologi berupa stimulasi sensoris auditori dengan mendengarkan suara keluarga belum dilakukan di ruangan ICU. Sementara itu, hasil wawancara dengan salah satu perawat di ruang ICU mengatakan bahwa kunjungan keluarga bagi pasien yang dirawat di ruang



ICU sangat dibatasi dan hanya diperbolehkan pada saat-saat kondisi tertentu seperti pasien mengalami penurunan kondisi, hal ini untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial.

Sementara itu, dalam agama Islam telah disebutkan bahwa menjenguk orang muslim yang sedang sakit adalah salah satu hak dari ummat muslim. Selain itu, menjenguk orang muslim yang sakit memiliki keutamaan, sebagaimana rasulullah saw bersabda:

*“Jika seorang berkunjung kepada saudaranya yang muslim (yang sedang menderita sakit), maka seakan-akan ia berjalan-jalan di syurga hingga duduk. Apabila sudah duduk, maka dituruni rahmat dengan deras. Apabila dia berkunjung di pagi hari maka tujuh puluh ribu malaikat mendo'akannya agar mendapat rahmat hingga sore hari. Apabila dia berkunjung di sore hari, maka tujuh puluh ribu malaikat mendo'akannya agar diberi rahmat hingga pagi hari” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, no. 891).*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jika seorang muslim menjenguk saudaranya yang muslim dan sedang sakit maka dia akan memperoleh keutamaan seperti berjalan di syurga, Allah swt. Akan memberikan rahmat yang berlimpah dan akan dido'akan oleh tujuh puluh ribu malaikat Allah swt. Selain itu, adab yang harus dilaksanakan oleh orang muslim ketika menjenguk saudaranya yang sakit yaitu mendoakan kesembuhan saudaranya. Namun, dengan kondisi pasien yang tidak dapat dikunjungi atau dijenguk untuk kebaikan pasien dan keluarga pasien, maka hal di atas tidak dapat dilakukan. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketakutan dan kegelisahan yang dialami anggota keluarga terhadap keondisi keluarganya

yang sakit terutama di ruang ICU karena kunjungan dibatasi dan pasien bisa dikunjungi jika ada hal-hal tertentu yang sangat penting.

Oleh sebab itu, Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh perawat terhadap pasien yang dirawat di ruang ICU adalah dengan memperdengarkan suara rekaman keluarga terdekat. Dengan stimulasi ini maka pasien dapat mendengarkan harapan dan do'a dari keluarganya, serta kecemasan dari keluarga pasien akan berkurang karena secara tidak langsung dapat berkomunikasi dengan pasien melalui rekaman suara yang diperdengarkan ke pasien. selain itu, hak sebagai seorang muslim telah dilaksanakan. Tujuan dari *stimulai familiar auditory senrory* adalah untuk meningkatkan nilai GCS pasien agar mencapai kondisi yang stabil, sehingga dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara mandiri dan berkumpul dengan keluarganya..

Berangkat dari gambaran di atas, maka penulis tertarik untuk memberikan intervensi berupa stimulasi sensoris auditori yaitu mendengrkan rekaman suara yang familiar pada pasien cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana asuhan keperawatan pada pasien cedera kepala berat yang mengalami penurunan kesadaran di ruang *Intensive Care Unit* (ICU) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo?

## 1.3 Tujuan

### 1.3.1 Tujuan Umum

Dilakukan asuhan keperawatan dengan pemberian intervensi stimulasi *familiar auditory sensory training* pada pasien cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran di ruang ICU di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Melakukan pengkajian keperawatan pada cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- b. Menentukan diagnosis keperawatan pada cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- c. Menyusun intervensi keperawatan pada cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- d. Melaksanakan implementasi keperawatan pada cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- e. Melakukan evaluasi keperawatan pada cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- f. Mengetahui analisis asuhan keperawatan dengan intervensi stimulasi *familiar auditory sensory* pada pasien cedera kepala

berat dengan penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr.  
Wahidin Sudirohusodo

## 1.4 Manfaat

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Perkembangan ilmu pengetahuan sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah pada kasus cedera kepala berat.

### 1.4.2 Manfaat Aplikatif

#### a. Bagi Keluarga

Media dalam meningkatkan pengetahuan untuk mengatasi masalah terhadap anggota keluarga yang mengalami penurunan kesadaran.

#### b. Bagi Petugas

Media dalam menambah pengetahuan dan wawasan untuk mengatasi masalah pada pasien dengan cedera kepala berat.

#### c. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat memberikan kontribusi pada program tridharma institusi khususnya mengenai cedera kepala berat dengan masalah penurunan kesadaran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Cedera Kepala**

##### 2.1.1 Defenisi

Cedera kepala adalah suatu gangguan traumatic dari fungsi otak yang dapat menyebabkan adanya deformitas berupa penyimpangan bentuk atau garis pada tulang tengkorak dan disertai atau tanpa disertai perdarahan interstisial dalam substansi otak tanpa atau diikuti terputusnya kontinuitas otak (Ristanto, 2017). Cedera kepala adalah terjadinya kerusakan pada tengkorak dan memori sebagai akibat dari deselerasi atau cedera langsung. Cedera kepala adalah kerusakan yang terjadi pada otak karena mengalami suatu benturan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Cedera kepala berat adalah cedera kepala yang mengakibatkan penurunan kesadaran dengan skor GCS 3 sampai 8 dan mengalami amnesia >24 jam (Haddad & Arabi, 2016).

Cedera kepala berat adalah suatu kondisi dimana pasien penurunan kesadaran sehingga tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya di kehidupan sehari-hari (ATLS, 2017). Cedera kepala adalah masalah kerja pikiran yang mengerikan dengan atau tanpa penerangan interstisial di substansi otak tanpa diikuti oleh pemutusan koherensi otak. Berdasarkan dari beberapa defenisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cedera kepala adalah benturan

secara tidak langsung maupun secara langsung yang menyebabkan terganggunya fungsi otak sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kesadaran.

### 2.1.2 Etiologi

Menurut Tarwoto (2014) penyebab cedera kepala adalah karena adanya trauma yang dibedakan menjadi 2 faktor, yaitu:

- a. Trauma primer, terjadi karena benturan langsung atau tidak langsung (akselerasi dan deselerasi)
- b. Trauma sekunder, terjadi akibat dari trauma saraf (melalui akson) yang meluas, hipertensi intrakranial, hipoksia, hiperkapnea atau hipotensi sistemik
- c. Kecelakaan lalu lintas
- d. Pukulan dan trauma tumpul pada kepala
- e. Kecelakaan akibat terjatuh
- f. Benturan langsung dari kepala
- g. Kecelakaan pada saat olahraga
- h. Kecelakaan yang dialami dari sebuah industri

Menurut NANDA (2013) mekanisme cedera kepala meliputi cedera akselerasi, deselerasi, akselerasi-deselerasi, coup-countre coup, dan cedera rotasional.

- a. Cedera akselerasi terjadi jika kepala diam tetapi ada objek yang bergerak dan membentur kepala, seperti benda yang terjatuh dan mengenai kepala dan peluru yang ditembakkan ke kepala.

- b. Cedera deselerasi terjadi jika sebuah objek hanya diam ditempat tetapi kepala bergerak membentur objek tersebut, seperti kepala membentur lantai karena terpeleset.
- c. Cedera akselerasi-deselerasi sering terjadi jika kepala dan suatu objek saling membentur, misalnya tabrakan pada pengendara bermotor.
- d. Cedera coup-countre coup terjadi jika kepala terbentur yang menyebabkan otak bergerak dalam ruang cranial dan dengan kuat mengenai area tulang tengkorak yang berlawanan serta area kepala yang pertamakali terbentur. Sebagai contoh pasien dipukul dibagian belakang kepala.
- e. Cedera rotasional terjadi jika pukulan atau benturan menyebabkan otak berputar di dalam rongga tengkorak, yang mengakibatkan peregangan atau robeknya neuron dalam substansi alba serta robeknya pembuluh darah yang menfiksasi otak dengan bagian dalam rongga tengkorak.

### 2.1.3 Patofisiologi

Cedera kepala terjadi karena adanya trauma pada kepala. Trauma yang dapat menyebabkan cedera kepala antara lain kejadian jatuh yang tidak disengaja, kecelakaan kendaraan bermotor, benturan benda tajam dan tumpul, benturan dari objek yang bergerak, serta benturan kepala pada benda yang tidak bergerak. Cedera kepala secara langsung maupun tidak langsung

mengenai kepala yang mengakibatkan luka pada kulit kepala, fraktur tulang tengkorak, dan kerusakan jaringan otak serta mengakibatkan gangguan neurologis (Manurung, 2018).

Cedera otak primer adalah cedera otak yang terjadi segera setelah trauma. Cedera kepala primer dapat menyebabkan kontusio dan laserasi. Cedera kepala ini dapat berlanjut menjadi cedera sekunder. Akibat trauma terjadi peningkatan kerusakan sel otak sehingga menimbulkan gangguan autoregulasi. Penurunan aliran darah ke otak menyebabkan penurunan suplai oksigen ke otak dan terjadi gangguan metabolisme dan perfusi otak. Peningkatan rangsangan simpatis menyebabkan peningkatan tahanan vaskuler sistemik dan peningkatan tekanan darah. Penurunan tekanan pembuluh darah di daerah pulmonal mengakibatkan peningkatan tekanan hidrolistik sehingga terjadi kebocoran cairan kapiler. Trauma kepala dapat menyebabkan odeme dan hematoma pada serebral sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intra kranial. Hal ini menyebabkan terjadinya penekanan vaskuler serebral sehingga terjadi iskemia dan nekrosis pada jaringan otak. Sehingga pasien akan mengeluhkan pusing serta nyeri hebat pada daerah kepala dan dapat mengalami penurunan kesadaran (Padila, 2012).

#### 2.1.4 Klasifikasi

Trauma capitis diklasifikasikan berdasarkan nilai dari Glasgow Coma Scale ( GCS ) (Nurarif & Kusuma, 2015), yaitu :



a. Ringan

- 1) GCS = 13 – 15
- 2) Dapat terjadi kehilangan kesadaran atau amnesia tetapi kurang dari 30 menit.
- 3) Tidak ada kontusio tengkorak, tidak ada fraktur serebral, hematoma.

b. Sedang

- 1) GCS = 9 – 12
- 2) Kehilangan kesadaran dan atau amnesia lebih dari 30 menit tetapi kurang dari 24 jam.
- 3) Dapat mengalami fraktur tengkorak.

c. Berat

- 1) GCS = 3 – 8
- 2) Kehilangan kesadaran dan atau terjadi amnesia lebih dari 24 jam.
- 3) Juga meliputi kontusio serebral, laserasi, atau hematoma intrakranial.

Menurut Brunner and Suddarth (2013) trauma capitis terbagi menjadi dua yaitu:

a. Cedera kepala terbuka

Luka kepala terbuka akibat cedera kepala dengan pecahnya tengkorak atau luka penetrasi, besarnya cedera kepala pada tipe ini ditentukan oleh massa dan bentuk dari benturan, kerusakan

otak juga dapat terjadi jika tulang tengkorak menusuk dan masuk kedalam jaringan otak dan melukai durameter saraf otak, jaringan sel otak akibat benda tajam/tembakan, cedera kepala terbuka memungkinkan kuman pathogen memiliki abses langsung ke otak.

b. Cedera kepala tertutup

Benturan kranial pada jaringan otak didalam tengkorak ialah guncangan yang mendadak. Dampaknya mirip dengan sesuatu yang bergerak cepat, kemudian serentak berhenti dan bila ada cairan akan tumpah. Cedera kepala tertutup yaitu kombusio geger otak.

2.1.5 Manifestasi Klinis

Gejala-gejala yang ditimbulkan tergantung pada besarnya dan distribusi cedera otak.

a. Cedera kepala ringan (GCS 13-15) menurut (Sylvia M, 2019), yaitu:

- 1) Kebingungan saat kejadian dan kebingungan terus menetap setelah cedera.
- 2) Pusing menetap dan sakit kepala, gangguan tidur, perasaan cemas.
- 3) Kesulitan berkonsentrasi, pelupa, gangguan bicara, masalah tingkah laku.

Gejala-gejala ini dapat menetap selama beberapa hari, beberapa minggu atau lebih lama setelah konkusio cedera otak akibat trauma ringan.

b. Cedera kepala sedang (GCS 9-12) menurut Diane C (2010), yaitu:

- 1) Kelemahan pada salah satu tubuh yang disertai dengan kebingungan atau bahkan koma.
- 2) Gangguan kesadaran, abnormalitas pupil, awitan tiba-tiba deficit neurologik, perubahan TTV, gangguan penglihatan dan pendengaran, disfungsi sensorik, kejang otot, sakit kepala, vertigo dan gangguan pergerakan.

c. Cedera kepala berat (GCS 3-8) menurut Diane C (2010), yaitu:

- 1) Amnesia tidak dapat mengingat peristiwa sesaat sebelum dan sesudah terjadinya penurunan kesehatan.
- 2) Pupil tidak aktual, pemeriksaan motorik tidak aktual, adanya cedera terbuka, fraktur tengkorak dan penurunan neurologik.
- 3) Nyeri, menetap atau setempat, biasanya menunjukkan fraktur.
- 4) Fraktur pada kubah kranial menyebabkan pembengkakan pada area tersebut.

Secara morfologis cedera kepala dapat meliputi fraktur kranium, kontusio, perdarahan, dan cedera difus (ATLS, 2017).

a. Fraktur kranium

Fraktur tulang tengkorak (cranium) dapat terjadi pada atap atau dasar tengkorak (basiscranii), dan dapat berbentuk garis atau linear dan dapat pula terbuka atautertutup.

Tabel 2.1 Skala GCS

Respon buka mata (E)	1 Tidak ada respon 2 Respon terhadap nyeri 3 Respon terhadap suara 4 Spontan
Respon motorik (M)	1 Tidak ada respon 2 Ekstensi abnormal 3 Fleksi abnormal 4 Fleksi normal 5 Melokalisir nyeri 6 Menururuti perintah
Respon verbal	1 Tidak ada respon 2 Suara tidak jelas 3 Kata-kata tidak teratur 4 Disorientasi tempat dan waktu 5 Berorientasi baik
Nilai GCS = V+ M + E Nilai tertinggi = 15, nilai terendah = 3	

b. Lesi intrakranial

Lesi intrakranial dapat diklasifikasikan sebagai lesi fokal atau lesi difus, walaupun kedua jenis lesi ini sering terjadi bersamaan. Lesi fokal adalah perdarahan epidural, perdarahan subdural, kontusio (hematom intraserebral), dan perdarahan intra serebral.

c. Cedera otak difusi

Cedera otak difusi adalah perdarahan yang ditandai dengan gambaran titik-titik perdarahan multiple tepat di batas area putih dan abu-abu di seluruh hemisfer pada otak. Hal ini disebabkan karena kepala yang bergerak cepat membentur suatu objek yang diam atau deselerasi. Penyebab lainnya seperti konkusi ringan dimana gambaran CT scan normal, sampai cedera iskemi-hipoksik yang berat. Cedera otak difus berat biasanya diakibatkan oleh hipoksia, iskemi otak karena syok yang berkepanjangan atau periode apneu yang terjadi segera setelah trauma. Pada kasus tersebut, awalnya CT scan sering menunjukkan gambaran normal, atau gambaran otak bengkak secara merata dengan batas area substansia putih dan abu-abu hilang.

#### d. Perdarahan epidural

Perdarahan epidural terjadi karena adanya fraktur pada tulang tengkorak sehingga terjadi robekan pada arteri meningeal media yaitu pada area temporoparietal dan temporal. Namun, perdarahan epidural jarang terjadi yaitu hanya sekitar 0,5% dari semua cedera otak dan sekitar 9% dari pasien yang mengalami koma. Hematom epidural secara tipikal berbentuk bikonveks atau cembung sebagai akibat dari pendorongan perdarahan terhadap duramater yang sangat melekat di tabula interna tulang kepala.

e. Perdarahan subdural

Perdarahan subdural lebih sering terjadi daripada perdarahan epidural, kira-kira 30% dari cedera otak berat. Perdarahan ini sering terjadi akibat robekan pembuluh darah atau vena-vena kecil di permukaan korteks serebri. Berbeda dengan perdarahan epidural yang berbentuk lensa cembung pada CT scan, perdarahan subdural biasanya mengikuti dan menutupi permukaan hemisfer otak. Perdarahan ini dapat menutupi seluruh permukaan otak. Kerusakan otak yang berada di bawah perdarahan subdural biasanya lebih berat dan prognosisnya lebih buruk daripada perdarahan epidural.

f. Kontusio dan perdarahan intraserebral

Perdarahan intraserebral terjadi pada lobus frontal dan temporalis bahkan bisa terjadi pada semua bagian otak. Kontusio dapat terjadi selama beberapa jam bahkan hari dan berkumpul hingga menjadi perdarahan yang luas. Kontusio serebri paling sering terjadi yaitu 20% sampai 30% dari cedera otak berat.

#### 2.1.6 Pemeriksaan Penunjang

Menurut Muttaqin (2017) Pemeriksaan Penunjang Pasien cedera Kapitis, yaitu:

- a. CT Scan untuk mengidentifikasi luasnya lesi, pendarahan, determinan, ventrikuler, dan perubahan jaringan otak.

- b. MRI digunakan sama dengan CT scan dengan/tanpa kontras radioaktif.
- c. Cerebral Angiography menunjukkan anomaly sirkulasi serebral seperti perubahan jaringan otak sekunder menjadi edema, pendarahan, dan trauma.
- d. Serial EEG dapat melihat perkembangan gelombang patologis.
- e. Sinar X mendeteksi perubahan struktur tulang (fraktur), perubahan struktur garis (perdarahan/edema), fragmen tulang.
- f. BAER mengoreksi batas fungsi korteks dan otak kecil.
- g. PET mendeteksi perubahan aktivitas metabolisme otak
- h. CSS untuk lumbal pungsi dapat dilakukan jika diduga terjadi perdarahan subarachnoid.
- i. Kadar elektrolit untuk mengoreksi keseimbangan elektrolit sebagai peningkatan tekanan intrakranial.
- j. Screen toxology untuk mendeteksi pengaruh obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran.
- k. Rontgen thoraks 2 arah (PA/AP dan lateral) menyatakan akumulasi udara/cairan pada area pleural.
- l. Toraksentesis menyatakan darah/cairan
- m. Analisa Gas Darah (AGD/Astrup)

Analisa gas darah adalah salah satu tes diagnostic untuk menentukan status repirasi. Status respirasi yang dapat

digambarkan melalui pemeriksaan AGD ini adalah status oksigenasi dan status asam basa.

#### 2.1.7 Penatalaksanaan

- a. Resusitasi jantung paru (airway, breathing, circulation = ABC)
  - 1) Jalan nafas (*Airway*), Bebaskan jalan nafas dari pangkal lidah yang jatuh ke belakang dengan posisi kepala ekstensi dengan memasang orofaryngeal airway (OPA) atau pipa endotrakheal, bersihkan sisa muntahan, darah, lendir atau gigi palsu. Kosongkan isi lambung dengan memasang nasogastrik untuk menghindari terjadinya aspirasi.
  - 2) Pernapasan (*Breathing*), gangguan pernapasan dapat disebabkan oleh kelainan sentral dan perifer. Kelainan sentral adalah depresi pernapasan pada lesi medulla oblongata, pernafasan cheyne stokes, ataksik dan central neurogenic hyperventilation. Penyebab perifer adalah aspirasi, trauma dada, edema paru, emboli paru, infeksi. Gangguan pernafasan dapat menyebabkan hipoksia dan hiperkapnia. Tindakan dengan pemberian O<sub>2</sub> kemudian cari dan atasi factor penyebab, jik perlu gunakan ventilator.
  - 3) Sirkulasi (*Circulation*), hipotensi menyebabkan iskemik yang dapat mengakibatkan kerusakan sekunder. Hipotensi disebabkan oleh hipovolemia akibat perdarahan luar, ruptur organ dalam, trauma dada disertai temponade jantung atau



pneumotoraks dan syok septic. Tindakan adalah menghentikan perdarahan, perbaikan fungsi jantung dan mengganti darah yang hilang dengan plasma atau darah.

b. Penanganan kasus-kasus cedera kepala di unit gawat darurat didasarkan atas patokan pemantauan dan penanganan terhadap “6 B” (Muttaqin, 2017) yakni:

1) *Breathing*, Perlu diperhatikan frekuensi dan jenis pernafasan pasien. Jika terdapat obstruksi jalan nafas perlu segera dibebaskan dengan tindakan-tindakan seperti suction, inkubasi, trakheostomi, oksigenasi yang cukup atau hiperventilasi, bila perlu melakukan tindakan yang berperan penting dengan edema pada cerebri.

2) *Blood* mencakup pengukuran tekanan darah dan pemeriksaan laboratorium darah (Hb, leukosit). Peningkatan tekanan darah dan denyut nadi yang menurun salah satu ciri adanya suatu peningkatan tekanan intracranial, sebaliknya tekanan darah yang menurun dan makin cepatnya denyut nadi menandakan adanya syok hipovolemik akibat perdarahan dan memerlukan tindakan transfusi.

3) *Brain*, penilaian keadaan otak ditekankan terhadap respon mata, motorik dan verbal (GCS). Perubahan respon ini merupakan implikasi perbaikan atau perburukan dari suatu

keadaan. Sehingga, sangat perlu pemeriksaan lebih mendalam mengenai keadaan pupil seperti ukuran, bentuk dan reaksi terhadap cahaya, serta gerakan bola mata.

- 4) *Bladder*, pemasangan kateter penting dilakukan agar urine tidak tertahan di dalam kandung kemih karena kandung kemih yang penuh merupakan suatu rangsangan untuk mengedan sehingga tekanan intracranial cenderung lebih meningkat.
- 5) *Bowel*, produksi urine perlu dipantau selama pasien dirawat. Bila produksi urine tertampung di vesika urinaria maka dapat meningkatkan tekanan intra cranial (TIK).
- 6) *Bone*, mencegah terjadinya dekubitus, kontraktur sendi dan sekunder infeksi. Sehingga, pasien perlu diberi latihan pasif atau jadwal perubahan posisi setiap 2 jam.

#### 2.1.7 Komplikasi

- a. Perdarahan pada intracranial
- b. Kejang
- c. Parese saraf cranial
- d. Meningitis atau abses otak
- e. Infeksi
- f. Edema cerebral
- g. Kebocoran cairan serospinal

## 2.2 Konsep Dasar Keperawatan Cedera Kepala Berat

### 2.2.1 Pengkajian

Trauma kepala adalah hal yang harus diperhatikan dan diwaspadai oleh seorang perawat.

a. Identitas pasien yaitu nama, umur, jenis kelamin, status, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat.

b. Riwayat Penyakit

1) Keluhan Utama

Keluhan yang dapat ditemukan pada pasien dengan cedera kepala yaitu nyeri, kaku pada leher dan punggung, ekstremitas atas dan bawah terasa kaku, dan penurunan kesadaran. Keluhan yang dialami tergantung dari besarnya cedera yang terjadi.

2) Riwayat Penyakit Saat ini

Pengkajian ini sangat penting dilakukan untuk menentukan tingkat cedera dan adanya kehilangan fungsi neurologik yang dialami. Berbagai mekanisme cedera yang dapat terjadi pada medulla spinalis yaitu destruksi, laserasi, trauma, dan kompresi akut.

3) Riwayat Penyakit Dahulu

Pasien dengan cedera kepala dapat disebabkan oleh beberapa riwayat penyakit seperti reumatoid arthritis,

pseudohipoparatiroid, spondilitis, ankilosis, osteoporosis maupun tumor ganas.

#### 4) Riwayat Penyakit Keluarga

Penyakit yang disebabkan karena genetik cukup perlu untuk diidentifikasi agar dapat menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien.

#### c. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik mengacu pada pengkajian B1-B6 dengan pengkajian fokus ditujukan pada gejala-gejala yang muncul akibat cedera kepala berat. Keadaan umum pada keadaan cedera kepala berat umumnya mengalami penurunan kesadaran, perubahan pada tanda-tanda vital, meliputi bradikardi dan hipotensi (Muttaqin, 2017).

##### 1) B1 (*Breathing*)

Perubahan pada sistem pernapasan bergantung pada gradasi blok saraf parasimpatis, pasien mengalami kelumpuhan otot-otot pernapasan dan perubahan karena adanya kerusakan jalur simpatetik descending akibat trauma pada tulang belakang sehingga mengalami terputus jaringan saraf di medula spinalis, pemeriksaan fisik dari sistem ini akan didapatkan hasil yaitu pasien tampak batuk, terjadi peningkatan produksi sputum, dan sesak napas.

##### 2) B2 (*Blood*)

Pengkajian pada sistem kardiovaskuler didapatkan renjatan syok hipovolemik yang sering terjadi pada pasien cedera kepala berat. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah menurun, nadi bradikardi dan jantung berdebar-debar. Pada keadaan lainnya dapat meningkatkan hormon antidiuretik yang berdampak pada kompensasi tubuh.

### 3) B3 (*Brain*)

Pengkajian ini meliputi tingkat kesadaran, pengkajian fungsi serebral dan pengkajian saraf kranial. Pengkajian tingkat kesadaran yaitu tingkat keterjagaan pasien dan respon terhadap lingkungan adalah indikator paling sensitif untuk disfungsi sistem persyarafan. Pengkajian fungsi serebral yaitu status mental, observasi penampilan, tingkah laku, nilai gaya bicara dan aktivitas motorik pasien. Sedangkan, pengkajian sistem motorik didapatkan kelumpuhan pada ekstermitas bawah baik bersifat paralis dan paraplegia. Pengkajian sistem sensori yaitu gangguan sensibilitas pada pasien cedera kepala berat sesuai dengan segmen yang mengalami gangguan.

### 4) B4 (*Bladder*)

Dilakukan pengkajian keadaan urine meliputi warna, jumlah dan karakteristik urine, termasuk berat jenis urine.

penurunan jumlah urine dan peningkatan retensi cairan. Dengan demikian, dapat diidentifikasi adanya penurunan perfusi pada ginjal.

5) B5 (*Bowel*)

Pada keadaan syok spinal, neuropraksia sering didapatkan adanya ileus parolitik, di mana kondisi klinisnya berupa hilangnya bising usus, kembung dan defekasi tidak ada. Hal ini merupakan gejala awal dari tahap syok spinal yang akan berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu.

6) B6 (*Bone*)

Paralisis motorik dan paralisis organ internal bergantung pada besarnya lesi pada saraf yang mengalami trauma. Gejala gangguan motorik sesuai dengan distribusi segmental dari saraf yang terkena. Disfungsi motorik paling umum adalah kelemahan dan kelumpuhan pada bagian ekstermitas bawah. Hal ini dapat dikaji melalui warna kulit, suhu, kelembapan, dan turgor kulit.

d. Pemeriksaan penunjang

1) Pemeriksaan diagnostik

- a) X-ray / CT Scan untuk mengetahui hematoma serebral, edema serebral, perdarahan intracranial, dan fraktur tulang tengkorak.

- b) MRI dengan/tanpa menggunakan kontras.
- c) Angiografi Serebral untuk mengetahui kelainan sirkulasi serebral.
- d) EEG untuk mengetahui dan memperlihatkan keberadaan atau berkembangnya gelombang patologis.
- e) BAER (Brain Auditory Evoked Respons) untuk menentukan fungsi korteks dan batang otak.
- f) PET (Positron Emission Tomography) menunjukkan perubahan aktivitas metabolisme pada otak.

## 2) Pemeriksaan laboratorium

- a) AGD yaitu  $PO_2$ , pH,  $HCO_3$  untuk mengkaji keadekuatan ventilasi yaitu mempertahankan analisis gas darah dalam rentang normal untuk menjamin aliran darah serebral adekuat atau untuk melihat masalah oksigenasi yang dapat meningkatkan TIK.
- b) Elektrolit serum, cedera kepala dapat dihubungkan dengan gangguan regulasi natrium, retensi Na berakhir dapat beberapa hari, diikuti diuresis Na, peningkatan letargi, konfusi dan kejang akibat ketidakseimbangan elektrolit.
- c) Hematologi berupa leukosit, Hb, albumin, globulin, protein serum.

- d) CSS untuk menentukan kemungkinan adanya perdarahan subarachnoid dengan melihat warna, komposisi, dan tekanan.
- e) Pemeriksaan toksikologi untuk mendeteksi obat yang mengakibatkan penurunan kesadaran.
- f) Kadar antikonvulsan darah untuk mengetahui tingkat terapi yang cukup efektif mengatasi kejang.

### 2.2.2 Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan ptrauma capitis berat (PPNI, 2017), yaitu sebagai berikut:

#### a. Pola Napas Tidak Efektif

##### 1) Definisi

Inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi yang adekuat

##### 2) Penyebab

a) Depresi pusat pernapasan

b) Hambatan upaya napas (mis. Nyeri saat bernapas, kelemahan otot)

c) Deformitas dinding dada

d) Deformitas tulang dada

e) Gangguan neuromuskular

f) Gangguan neurologis (mis. Elektroensefalogram positif, cedera kepala, gangguan kejang)



- g) Imaturitas neurologis
  - h) Penurunan energi
  - i) Obesitas
  - j) Posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru
  - k) Sindrom hipoventilasi
  - l) Kerusakan inervasi diafragma (kerusakan saraf C5 ke atas)
  - 13) Cedera pada medula spinalis
  - m) Efek agen farmakologis
  - n) Kecemasan
- 3) Gejala dan tanda mayor dan minor

<b>Gejala dan tanda mayor</b>	<b>Gejala dan tanda minor</b>
<i>Subjektif</i> : dispnea	<i>Subjektif</i> : ortopnea
<i>Objektif</i> : penggunaan otot bantu pernapasan, fase ekspirasi memanjang, pola napas abnormal (mis. Takipnea, hiperventilasi, kussmaul, cyne stokes)	<i>Objektif</i> : pernapasan pesed lip, pernapasan cuping hidung, diameter thoraks antero-posterior meningkat, ventilasi semenit menurun, kapasitas vital menurun, tekanan ekspirasi menurun, tekanan inspirasi menurun, ekskursi dada berubah

4) Kondisi Klinis Terkait

- a) Depresi pusat pernapasan
- b) Cedera kepala
- c) Trauma toraks
- d) Gullian barre syndrome
- e) Multiple sclerosis
- f) Myastenia gravis
- g) Stroke
- h) Kuadriplegia

i) Intoksikasi alkohol

b. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

1) Definisi

Ketidakmampuan membersihkan ekskresi atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten.

2) Penyebab

<b>Fisiologis</b>	<b>Situasional</b>
a) Spasme jalan napas	a) Meroko aktif
b) Jipersekresi jalan napas	b) Merokok pasif
c) Disfungsi neuromuskular	c) Terpajan polutan
d) Adanya jalan napas buatan	
e) Sekresi tertahan	
f) Hiperplasia dinding jalan napas	
g) Proses infeksi	
h) Defek agen farmakologis (mis. Anastesi)	

3) Gejala Dan Tanda Mayor Minor

<b>Gejala dan tanda mayor</b>	<b>Gejala dan tanda minor</b>
<i>Subjektif</i> : tidak tersedia	<i>Subjektif</i> : dispnea, sulit bicara, ortopnea
<i>Objektif</i> : batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi, wheezing dan/atau ronkhi kering, mekonium di jalan napas (pada neonatus)	<i>Objektif</i> : gelisah, sianosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, pola napas berubah

4) Kondisi Klinis Terkait

- a) Gullian barre syndrom
- b) Sklerosis multipel
- c) Myasthenia gravis
- d) Prosedur diagnostik
- e) Depresi sitem saraf pusat
- f) Cedera kepala

- g) Stroke
- h) Kuadriplegia
- i) Sindrom aspirasi mekonium
- j) Infeksi saluran napas

c. Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial

1) Defenisi

Gangguan mekanisme dinamika intrakranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial.

2) Penyebab

- a) Lesi menempati ruang (mis. *Space-occupying lesion* akibat tumor, abses)
- b) Gangguan metabolisme (mis. Akibat hiponatremia, ensefalopati hepatikum, uremikum, ketoasidosis diabetik, septikemia)
- c) Edema serebral (mis. Akibat cedera kepala (hematoma epidural, hematoma subarchnoid, hematoma intraserebral), stroke iskemik, stroke hemoragik, hipoksia, ensefalopati iskemik, pascaoperasi)
- d) Peningkatan tekanan vena (mis. Akibat trombosis sinus vena serebral, gagal jantung, trombosis/obstruksi vena jugularis atau vena kava superior)

e) Obstruksi aliran cairan serebrospinalis (mis. Hidrosefalus)

f) Hipertensi intrakranial idiopatik

### 3) Gejala dan Tanda Mayor Minor

Gejala dan tanda mayor	Gejala dan tanda minor
<i>Subjektif</i> : sakit kepala	<i>Subjektif</i> : tidak tersedia
<i>Objektif</i> : tekanan darah meningkat dengan tekanan nadi melebar, bradikardia, pola napas ireguler, tingkat kesadaran menurun, respon pupil melambat atau tidak sama, refleks neurologis terganggu	<i>Objektif</i> : Gelisah, agitasi, muntah tanpa disertai mual, tampak lesu/lemah, fungsi kognitif terganggu, tekanan intrakranial (TIK) $\geq 20$ mmHg, papiledema, postur desebrasi

### 4) Kondisi klinis terkait

- a) Cedera pada kepala
- b) Iskmeik pada serebral
- c) Hidrosefalus
- d) Hematoma kranial
- e) Pembentukan arteriovenous
- f) Edema vasogenik atau atau sitotoksik serebral
- g) Hipertermia
- h) Obstruksi

### d. Nyeri akut

#### 1) Definisi

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambar dan berintraksi ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan.

## 2) Penyebab

- a) Agen pencedera fisiologis (mis. Inflamasi, iskemia, neoplasma)
- b) Agen pencedera kimiawi (mis. terbakar, bahan kimia iritan)
- c) Agen pencedera fisik (mis. abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan)

## 3) Gejala dan Tanda Mayor

Gejala dan tanda mayor	Gejala dan tanda minor
<i>Subjektif</i> : Mengeluh Nyeri	<i>Subjektif</i> : tidak tersedia
<i>Objektif</i> : Tampak meringis, bersikap protektif (mis. Posisi menghindari nyeri), gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur	<i>Objektif</i> : Tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu makan berubah, roses berfikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, diaphoresis

## 4) Kondisi klinis terkait

- a) Kondisi pembedahan
- b) Cedera traumatis
- c) Infeksi
- d) Sindrom koroner akut
- e) Glaukoma

## e. Risiko Infeksi

### 1) Defisni

Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik.


## 2) Faktor Risiko

- a) Penyakit kronis seperti diabetes militus
- b) Efeks dari prosedur invasif
- c) Kondisi kurang gizi
- d) Peningkatan paparan organisme patogen lingkungan
- e) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer
- f) Peristaltik mengalami gangguan
- g) Kerusakan integritas kulit
- h) Preubahan pH
- i) Penurunan kerja siliaris
- j) Ketuban lama pecah
- k) Merokok
- l) Statis cairan tubuh
- m) Penurunan Hb
- n) Imunosupresi
- o) Leukopenia
- p) Supresi respon inflamasi
- q) Tidak melakukan vaksinasi

## 3) Kondisi Klinis Terkait

- a) AIDS
- b) Luka bakar
- c) Penyakit paru obstruktif kronik
- d) Diabetes militus

- e) Tindakan invasif
- f) Kondisi penggunaan terapi steroid
- g) Ketuban pecah sebelum waktunya
- h) Kanker
- i) Imunosupresi
- j) Lymphedema
- k) Lekositopenia
- l) Gangguan fungsi hati



## 2.2.3 Intervensi Keperawatan

Tabel 2.2 Intervensi Keperawatan Teoritis

No.	Diagnosis Keperawatan	Kriteria Hasil	Intervensi Keperawatan	Rasional
1.	Pola napas tidak efektif	Setelah dilakukan intervensi keperawatan maka pola napas tidak efektif membaik dengan kriteria hasil: a. Dispnea menurun b. Penurunan otot bantu napas c. Frekuensi napas membaik d. Kedalaman napas e. Ekskusi dada membaik	Manajemen Jalan Napas Observasi: a. Monitor pola napas b. Monitor bunyi napas tambahan (mis:gurgling, mengi, wheezing, ronghi) c. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma) Terapeutik a. Pertahankan kepatenan jalan napas b. Posisikan semi fowler atau fowler c. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik Edukasi a. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, jika tidak kontraindikasi Kolaborasi a. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu b. Pemantauan Respirasi	Manajemen Jalan Napas Observasi: a. Pola napas reguler atau ireguler b. Bunyi napas tambahan menandakan kelainan pada pernapasan c. Warna dan jumlah sputum menentukan patogen pada pernapasan Terapeutik a. Terpenuhinya kebutuhan oksigen dalam tubuh b. Kepatenan jalan napas dipertahankan c. Membersihkan jalan nafas kurang dari 15 detik Edukasi a. Memenuhi kebutuhan cairan Kolaborasi a. Bekerjasama dalam pemberian obat pengencer lendir b. Memantau pernapasan
2.	Bersihan jalan napas tidak efektif	Setelah dilakukan intervensi keperawatan maka bersihan jalan napas membaik dengan kriteria hasil: a. Batuk efektif meningkat b. Produksi sputum menurun c. Mengi menurun	Manajemen Jalan Napas Observasi: a. Monitor pola napas b. Monitor bunyi napas tambahan (mis:gurgling, mengi, wheezing, ronghi) c. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma) Terapeutik	Manajemen Jalan Napas Observasi: a. Pola napas reguler atau ireguler b. Bunyi napas tambahan menandakan kelainan pada pernapasan c. Warna dan jumlah sputum menentukan patogen pada



		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Wheezing menurun</li> <li>e. Dispnea membaik</li> <li>f. Gelisah membaik</li> <li>g. Frekuensi napas membaik</li> <li>h. Pola napas membaik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertahankan kepatenan jalan napas</li> <li>b. Posisikan semi fowler atau fowler</li> <li>c. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, jika tidak kontraindikasi</li> </ul> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu</li> <li>b. Pemantauan Respirasi</li> </ul>	<p>pernapasan</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terpenuhinya kebutuhan oksigen dalam tubuh</li> <li>b. Kepatenan jalan napas dipertahankan</li> <li>c. Membersihkan jalan nafas kurang dari 15 detik</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi kebutuhan cairan</li> </ul> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bekerjasama dalam pemberian obat pengencer lendir</li> <li>b. Memantau pernapasan</li> </ul>
3.	Nyeri akut	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keluhan nyeri menurun</li> <li>b. Meringis menurun</li> <li>c. Gelisah menurun</li> <li>d. Kesulitan tidur menurun</li> <li>e. Frekuensi nadi membaik</li> <li>f. Pola napas membaik</li> <li>g. Tekanan darah membaik</li> </ul>	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lakukan pengamatan pada lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri.</li> <li>b. Identifikasi skala nyeri.</li> <li>c. Perhatikan respon nyeri pada wajah pasien.</li> <li>d. Identifikasi faktor yang memperberat serta meringankan nyeri.</li> <li>e. Identifikasi pengetahuan tentang nyeri.</li> <li>f. Identifikasi budaya terkait respon nyeri.</li> <li>g. Pantau keberhasilan terapi komplementer yang telah dilakukan.</li> <li>h. Pantau efek samping pemberian obat anti nyeri.</li> </ul> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beri teknik non farmakologis agar rasa nyeri berkurang.</li> <li>b. Kontrol lingkungan agar rasa nyeri bisa menurun.</li> </ul>	<p>Manajemen nyeri</p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Agar mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri</li> <li>b. Mengetahui skala nyeri</li> <li>c. Melihat respon nyeri pada wajah pasien</li> <li>d. Mengetahui factor yang memperberat nyeri</li> <li>e. Menilai tingkat pengetahuan nyeri terhadap nyeri</li> <li>f. Mengetahui budaya terkait respon nyeri</li> <li>g. Mengetahui keberhasilan dari terapi komplementer yang dilakukan</li> <li>h. Mengetahui tingkat kondisi pasien</li> </ul> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mengurangi rasa nyeri</li> <li>b. Untuk mengurangi nyeri</li> <li>c. Untuk memberi kenyamanan kepada</li> </ul>

			<p>c. Bantu fasilitasi istirahat dan tidur</p> <p>d. Pada saat pemilihan strategi untuk mengatasi nyeri itu patut untuk mempertimbangkan sumber dan jenis dari nyeri itu sendiri.</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Beri penjelasan tentang penyebab, periode dan pemicu timbulnya rasa nyeri</p> <p>b. Ajarkan tentang cara meredakan nyeri</p> <p>c. Anjurkan untuk memonitor rasa nyeri sendiri</p> <p>Kolaborasi</p> <p>a. Kolaborasikan tentang pemberian analgesic untuk meredakan nyeri</p>	<p>pasien</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Agar pasien mengetahui penyebab, periode dan pemicu timbulnya rasa nyeri</p> <p>b. Agar pasien tau cara meredakan nyeri</p> <p>c. Mengetahui frekuensi nyeri</p> <p>Kolaborasi</p> <p>a. Bekerja sama dalam menurunkan rasa nyeri</p>
4.	Penurunan kapasitas adaptif intrakranial	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan maka kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan kriteria hasil:</p> <p>a. Tingkat kesadaran meningkat</p> <p>b. Gelisah menurun</p> <p>c. Tekanan darah membaik</p> <p>d. Tekanan nadi membaik</p> <p>e. Bradikardia membaik</p> <p>f. Pola napas membaik</p> <p>g. Respon pupil membaik</p> <p>h. Refleks neurologis membaik</p> <p>i. Tekanan intrakranial membaik</p>	<p>Pemantauan tekanan intrakranial</p> <p>Observasi</p> <p>a. Identifikasi penyebab peningkatan TIK (mis. lesi menempati ruang, gangguan metabolisme, edema serebral, peningkatan tekanan vena, obstruksi aliran cairan serebrospinal, hipertensi intrakranial, idiopatik)</p> <p>b. Monitor peningkatan TD</p> <p>c. Monitor pelebaran tekanan nadi (selisih TDS dan TDD)</p> <p>d. Monitor penurunan frekuensi jantung</p> <p>e. Monitor penurunan tingkat kesadaran</p> <p>f. Monitor perlambatan atau ketidaksimestrisan respon pupil</p> <p>g. Monitor kadar CO<sub>2</sub> dan pertahankan dalam rentang yang diindikasikan</p> <p>h. Monitor tekanan perfusi serebral</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Pertahankan sterilisasi sistem</p>	<p>Pemantauan tekanan intrakranial</p> <p>Observasi</p> <p>a. Mengetahui penyebab meningkatnya TIK</p> <p>b. Mengetahui peningkatan TD</p> <p>c. Mengetahui tekanan nadi pasien</p> <p>d. Kinerja jantung yang menurun akan menyebabkan terjadinya hipoksia</p> <p>e. Kesadaran menurun karena kurangnya oksigen di dalam tubuh akibat dari suatu penyakit seperti trauma</p> <p>f. Pupil yang normal akan bereaksi terhadap cahaya</p> <p>g. Mengetahui kadar CO<sub>2</sub></p> <p>h. Mengetahui tekanan perfusi serebral</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Mencegah terjadinya infeksi</p> <p>b. Posisi kepala yang netral akan mempertahankan perfusi serebral</p>

			<p>pemantauan</p> <p>b. Pertahankan posisi kepala dan leher netral</p> <p>c. Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien</p> <p>d. Dokumentasikan hasil pemantauan</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan</p> <p>b. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu</p>	<p>c. Mengetahui kondisi pasien</p> <p>d. Bahan acuan untuk melakukan implementasi selanjutnya</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Pasien dan keluarga pasien mengetahui tujuan pemantauan</p> <p>b. Pasien dan keluarga pasien mengetahui hasil pemantauan</p>
5.	Risiko infeksi		<p>Pencegahan infeksi</p> <p>Observasi</p> <p>a. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Batasi jumlah pengunjung</p> <p>b. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</p> <p>c. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi</p> <p>Kolaborasi</p> <p>a. Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu</p>	<p>Pencegahan infeksi</p> <p>Observasi</p> <p>a. Mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi</p> <p>Terapeutik</p> <p>b. Mencegah terjadinya infeksi silang</p> <p>c. Untuk mengurangi kontaminasi silang</p> <p>d. Mengurangi infeksi pasca-prosedur yang berpotensi menular</p> <p>Kolaborasi</p> <p>a. Mencegah infeksi</p>

#### 2.2.4 Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan salah satu dari proses keperawatan. Implementasi dilaksanakan jika dari hasil pengkajian telah ditentukan diagnosis keperawatan dan disusun intervensi keperawatan yang akan dilakukan. Tahapan ini dilaksanakan berdasarkan tujuan yang sesuai dengan masalah kesehatan yang didapatkan sehingga dapat membantu proses perawatan pada pasien. Oleh karena itu, pelaksanaan implementasi harus spesifik hal ini untuk menangani berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan (Nursalam, 2017).

#### 2.2.5 Evaluasi Keperawatan

Evaluasi merupakan bagian paling terakhir dari proses keperawatan. Pelaksanaan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana, berkelanjutan, terarah dan profesional untuk mengoptimalkan tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah disusun sehingga pasien memperoleh hasil yang maksimal dalam pelayanan kesehatan. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pencapaian tujuan pada rencana keperawatan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi variabel-variabel yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan, dan mengambil keputusan apakah rencana keperawatan diteruskan, modifikasi atau dihentikan.

Dokumentasi pada tahap evaluasi adalah membandingkan secara sistematis dan terencana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan kondisi pasien setelah diberikan implementasi. Evaluasi dilakukan secara bersinambungan dengan melibatkan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Evaluasi keperawatan merupakan tahap ke lima dari rangkaian proses keperawatan untuk mengetahui apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lain (Nursalam, 2017).

### **2.3 Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan**

Berdasarkan kasus yang dikelola yaitu pasien yang mengalami cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran. Sehingga, pasien membutuhkan pelayanan asuhan keperawatan secara total dan komprehensif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan melindungi pasien. Oleh sebab itu, masalah pada kasus ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Watson yaitu teori *Human Care* atau sikap peduli yang diberikan kepada manusia terutama klien yang membutuhkan kepedulian lebih karena tidak dapat menjalankan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Teori Watson (2011) menjelaskan dalam *Theory of Human Care*, bahwasannya caring sebagai hubungan dan transaksi yang terbentuk antara pemberi dan penerima asuhan yang bertujuan untuk meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia (*human being*). Hubungan yang terbentuk ini wajib dipertanggungjawabkan secara profesional. Human

caring menjadi suatu seni, kemanusiaan, ilmu klinik, yang kemudian menjadi suatu hal yang penting dalam profesi keperawatan dan dalam proses penyembuhan. Perilaku caring tersebut diyakini mampu meningkatkan kesehatan pasien dan kesejahteraannya serta terdapat pula proses fasilitasi dalam rangka promosi kesehatan.

Proses realisasi caring terdiri atas komitmen dalam melindungi, meningkatkan dalam melindungi, meningkatkan dan memulihkan nilai humanitas dengan proses pengembalian martabat, keselarasan batin dan memfasilitasi penyembuhan. Caring dapat diartikan sebagai pemberian perhatian, penghargaan kepada manusia. Di sisi lain, caring dapat pula diartikan sebagai pemberian bantuan kepada individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan membantu individu untuk kembali pada keadaan semula (Nursalam, 2017).

Keterkaitan antara teori caring dan kasus cedera kepala yang diteliti oleh penulis ialah bahwasannya pasien yang mengalami cedera kepala yang dirawat di ruangan ICU, berada dalam keadaan koma dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya, serta termasuk ke dalam pasien dengan tingkat ketergantungan penuh kepada perawat (total care). Hal ini menyebabkan pentingnya teori caring untuk terus diaplikasikan kepada pasien yang dirawat di ruang ICU sebagai bentuk pemberian asuhan keperawatan professional, baik secara fisik, emosional, maupun dalam meningkatkan rasa aman dan nyaman pasien serta membantu mengembalikan kondisi pasien menjadi lebih baik.

## 2.4 Evidence Based Nursing (EBN)

### 2.4.1 Pengertian Terapi *Familiar Auditory Sensory Training*

*Familiar Auditory Sensory Training* (FAST) merupakan suatu intervensi dimana pasien yang menerima intervensi mendengarkan suara yang direkam secara digital, rekaman tersebut merupakan rekaman suara orang yang dikenal dekat dengannya, rekaman berisi suatu kisah yang berkesan dengan pasien (Pape et al., 2018).

Stimulasi sensorik adalah metode terapeutik yang merangsang sistem aktivasi retikuler di otak dan memfasilitasi reorganisasi aktivitas otak melalui penciptaan hubungan saraf baru (Shaffer, 2016). Stimulasi pendengaran adalah salah satu dari sensori stimulus yang dapat diberikan kepada pasien di ICU oleh anggota keluarga mereka atau perawat (Grap et al., 2016).

### 2.4.2 Tujuan

- a. Meningkatkan status kesadaran pasien dengan nilai GCS meningkat
- b. Memperbaiki status hemodinamik dalam tubuh yaitu tanda-tanda vital dalam keadaan stabil
- c. Mencegah kerusakan sel otak akibat iskemik yang di timbulkan oleh cedera kepala (Ismoyowati, 2021).

### 2.4.3 Indikasi

- a. Pasien yang mengalami cedera kepala berat (GCS<8)
- b. Pasien pasca craniectomy
- c. Pasien dengan penurunan kesadaran

### 2.4.4 Kontraindikasi

- a. Pasien dengan kondisi telinga yang mengeluarkan darah/cairan

### 2.4.5 Prosedur Pemberian dan Rasionalisasi

#### Pra interaksi

- a. Siapkan alat-alat
- b. Identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontraindikasi
- c. Cuci tangan

#### Tahap orientasi

- a. Berikan salam dan panggil pasien dengan namanya
- b. Memperkenalkan diri
- c. Jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada pasien

#### Tahap kerja

- a. Mencuci tangan
- b. Melakukan penilain GCS 5 menit sebelum melakukan intervensi dengan E4, M6, V5
- c. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 2 menit sebelum melakukan intervensi
- d. Mengatur volume dengan frekuensi 48 kHz



- e. Memberikan terapi *Familiar Auditory Sensory Training* selama 10 menit
- f. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 2 menit setelah intervensi
- g. Melakukan penilaian GCS 5 menit setelah melakukan intervensi dengan E4, M6, V5

#### Fase Terminasi

- a. Merapikan alat-alat
- b. Kontrak stimulasi selanjutnya kepada pasien
- c. Mengucapkan salam
- d. Mencuci tangan
- e. Mendokumentasikan kegiatan

#### 2.4.6 Kriteria Evaluasi

- a. Nilai GCS pasien meningkat
- b. Status hemodinamik pasien membaik

#### 2.4.7 Artikel utama dan pendukung

##### a. Artikel utama

- 1) Penulis : Mohammad Kazem Mohammadi Mohammad Reza Yeganeh, Aida Mohammad Ebrahimzadeh, Zahra Atrkar Roshan, Mostafa Soodmand. and Moluk Pouralizadeh

- 2) Tahun : 2019

3) Judul : The Effects of Familiar Voices on the Level of Consciousness among Comatose Patients: A Single-Blind Randomized Controlled Trial

4) Sumber : *Google Scholar*

b. Artikel pendukung

1) Penulis : Tri Wahyuni Ismoyowati

2) Tahun : 2021

3) Judul : Stimulasi Auditori pada Pasien Cedera Kepala dengan Penurunan Kesadaran

4) Sumber : *Google Scholar*

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Studi Kasus

Pada karya tulis ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan dengan melibatkan 1 responden. Menurut Nursalam (2016) studi kasus adalah penelitian yang berfokus pada suatu kasus yang terdiri dari proses keperawatan dan memiliki tujuan memberikan gambaran secara menyeluruh, intensif, detail dan rinci mengenai latar belakang, karakter ataupun sifat pada suatu kasus tersebut. Penelitian dalam metode studi kasus dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh pasien dengan cara sistematis.

#### 3.2 Subyek Studi Kasus

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah individu yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini yaitu:

##### 3.2.1 Kriteria Inklusi

- a. Responden berada ditempat pada saat penelitian
- b. Tidak mengalami gangguan pendengaran
- c. Pasien dengan penurunan kesadaran (GCS <8)
- d. Pasien dengan *Traumatic Brain Injury* (TBI) yang sedang dirawat di ruang ICU

### 3.2.2 Kriteria Eksklusi

Responden dengan TBI yang mengalami penurunan kesadaran dengan kondisi telinga yang mengeluarkan cairan/darah.

### 3.3 Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus ini adalah melakukan asuhan keperawatan terhadap masalah yang dikaji secara mendalam yaitu asuhan keperawatan pada pasien TBI dengan penurunan kesadaran menggunakan intervensi *Family Auditori Sensory Training*.

### 3.4 Instrumen Studi Kasus

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah format asuhan keperawatan GADAR (Gawat dan Darurat), pengukuran Gasloww Coma Scale (GCS), serta alat perlindungan diri berupa handscoon dan masker, alat pemeriksaan fisik berupa stetoskop, tensi meter, termometer, timbangan, *penlight*, dan arloji dengan detik.

3.4.1 Format pengkajian keperawatan terdiri dari: data umum pasien, masalah utama, pengkajian primer *aiway, breathing, circulation, disability, ekxposure*, pengkajian sekunder *breathing, blood, neurologis, bladder, bowel, bone*, pengkajian rasa aman dan nyaman, aktivitas, istirahat, tidur, riwayat sosial, riwayat psikologi, spiritual, tanda-tanda vital, diagnostik, dan laboratorium. Pada pengkajian kebutuhan pasien menggunakan SDKI berdasarkan gejala yang ditemukan dari pasien.

- 3.4.2 Format analisa data terdiri dari: data, etiologi, dan masalah.
- 3.4.3 Format diagnosis keperawatan terdiri dari: diagnosis keperawatan
- 3.4.4 Format rencana asuhan keperawatan terdiri dari: diagnosis keperawatan, luaran keperawatan menggunakan SLKI, rencana intervensi menggunakan SIKI, dan rasional menggunakan dongoes dan artikel.
- 3.4.5 Format implementasi dan evaluasi keperawatan terdiri dari: hari dan tanggal, nomor diagnosis keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi.

### **3.5 Prosedur Pengambilan Data**

- 3.5.1 Persiapan  
Persiapan dengan konsultasi kasus
- 3.5.2 Pengumpulan data  
Pengumpulan data dengan wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi
- 3.5.3 Penyusunan Laporan  
Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah

### **3.6 Tempat dan waktu Pengambilan Data Studi Kasus**

Penelitian ini dilakukan di ruangan ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 01-03 Agustus 2022.

### **3.7 Analisis Data dan Penyajian Data**

Analisis data dan penyajian data pada studi kasus disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta dijadikan didalam teks dan bersifat naratif. Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subyek studi kasus yaitu dengan menggunakan lima proses keperawatan dalam hal ini pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. Data yang sudah diperoleh dari hasil pengkajian melalui proses wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi kemudian dimasukkan ke dalam tabel analisa data untuk merumuskan diagnosis keperawatan yang sesuai dengan keadaan pasien berdasarkan Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, selanjutnya menentukan rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan menentukan kriteria hasil yang ditetapkan berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia kemudian melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana yang ditetapkan dan yang terakhir mengevaluasi respon pasien menggunakan format SOAP setelah dilakukan tindakan khususnya pemberian intervensi relaksasi benson pada pasien, penyajian data disajikan dalam bentuk narasi yaitu menjelaskan hasil pengkajian sampai dengan evaluasi.

### **3.8 Etika Studi Kasus**

Dalam proses penelitian ini menggunakan pertimbangan etik. Pertimbangan etik digunakan untuk mencegah munculnya masalah etik selama penelitian berlangsung, untuk itu peneliti berupaya untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah yang muncul. Terdapat 3 (tiga) prinsip etik umum yang

diterapkan untuk mengatasi masalah etik yaitu *non maleficence* dan *beneficence, respect to person*, serta *justic* (Bect, 2012).

### 3.8.1 *Non Maleficence* dan *Beneficence*

#### a. Nilai Ilmiah

Pada penelitian ini tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subjek dalam penelitian ini, karena intervensi dilakukan oleh peneliti secara mandiri dan didampingi oleh perawat yang bertugas.

#### b. Manfaat

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh manfaat secara langsung yaitu memberikan stimulus suara keluarga terdekat untuk meningkatkan kesadaran pasien. Selain itu, dapat menjadi acuan petugas kesehatan dalam memberikan intervensi *Familiar Auditory Sensory Training* pada pasien yang mengalami masalah cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran.

### 3.8.2 *Respect For Person*

#### a. *Informed Consent*/Penjelasan Sebelum Penelitian (PSP)

Responden dan keluarga responden diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan sebelum dilaksanakan penelitian. Keluarga responden memiliki hak penuh untuk berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Pada *Informed Consent* dicantumkan bahwa pada data diperoleh hanya untuk mengembangkan ilmu.

b. Rahasia (*Privacy*)

Responden atau keluarga responden memiliki hak meminta bahwa data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Nama responden tidak dicantumkan pada lembar pengumpulan data, hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan responden. Hanya data tertentu saja yang dicantumkan sebagai hasil penelitian. Identitas responden pada karya tulis ilmiah ini hanya menggunakan inisial nama saja.

3.8.3 *Justice*

Dalam penelitian ini responden diperlakukan secara adil tanpa membeda-bedakan responden dengan pasien lain.



## BAB IV

### LAPORAN KASUS

#### 4.1 Pengkajian

Tabel 4.1 Pengkajian Keperawatan Gawat Darurat

PRIMARY SURVEY		
Nama Pasien : Ny. H	Umur : 45 tahun	Jenis Kelamin : Perempuan RM : 9909**
Nama Keluarga : Tn. M Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta Alamat Rumah : Poros Pelabuhan Biring Kassi, Pangkep Telp/Hp : 085347***** Diagnosa Medis : Traumatic Brain Injury Tanggal Masuk ICU : 25 Agustus 2022		
Datang tanggal : 24/08/2022	Pukul : 04.17	Asal Ruangan : IGD bedah (IRNA)
Alat terpasang : <input checked="" type="checkbox"/> Infus <input checked="" type="checkbox"/> Kateter <input checked="" type="checkbox"/> NGT <input type="checkbox"/> Ventilator <input checked="" type="checkbox"/> Monitor <input type="checkbox"/> Transfusi <input type="checkbox"/> CVC <input type="checkbox"/> Lainnya		
<b>KATEGORI MASUK ICU : Kategori 1</b>		
Keluhan Utama : Penurunan kesadaran Riwayat Penyakit/ Mekanisme Cedera : Ny. H mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 23 agustus 2022 dan di bawa ke rumah sakit Pangkep kemudian dirujuk ke rumah sakit Wahidin pada tanggal 24 agustus 2022 karena pasien mengalami penurunan kesadaran setelah 9 jam mengalami kecelakaan, terpasang ventilator pada pasien dengan tingkat kesadaran koma nilai GCS E1 M1 Vx, TD 120/70 mmHg, HR 101 x/i, suhu 36,7°C, RR 24 x/i dengan intubasi. Suami pasien mengatakan bahwa klien mengendarai motor menggunakan helm dengan kecepatan sedang dan menabrak sapi yang melintas di jalan. Keluar darah dari hidung dan telinga tidak ada, kejang tidak ada, muntah darah ada. Pasien dioperasi pada tanggal 25 agustus 2022 yaitu craniectomy dengan evakuasi hematoma + dekompresi. Kondisi saat ini, pasien post operasi craniectomy hari ke-5 kesadaran sopor dengan nilai GCS 6x E3 M3 Vx, muntah tidak ada, seluruh aktivitas pasien menggunakan bantuan total.		
Riwayat Kesehatan Keluarga : Suami klien mengatakan bahwa keluarganya tidak memiliki riwayat hipertensi dan diabetes.		
Orientasi (tempat, waktu, dan orang) : Tidak dapat dikaji karena klien mengalami penurunan kesadaran dengan nilai verbal yaitu Vx.		

Pengkajian Keperawatan	Masalah/ Dignosis Keperawatan (SDKI)	Luaran Keperawatan dan Kriteria Hasil (SIKI)	Intervensi Keperawatan (SLKI)
<p>A. <i>Airway</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak bebas : Terdapat Sputum dengan jumlah banyak, konsistensi sputum encer</li> <li>- Suara napas tambahan: terdengar suara napas snoring dan ronkhi</li> <li>- Lain-lain: Pasien tampak bisa batuk tapi tidak mampu mengeluarkan sekret dari dalam mulutnya</li> <li>- Sianosis (+/-) : tidak sianosis</li> <li>- GCS :6x E3 M3 Vx RR : 30 x/menit HR : 140 x/menit</li> </ul> <p>Ada Masalah (Ya)</p>	<p>Bersihkan jalan napas tidak efektif</p>	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan Kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi sputum menurun</li> <li>- Frekuensi napas membaik</li> </ul>	<p><b>Manajemen Jalan Napas</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)</li> <li>- Monitor bunyi napas</li> <li>- Monitor sputum</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posisikan semi fowler atau supinasi</li> <li>- Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik</li> <li>- Berikan oksigen, jika perlu</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu</li> </ul>
<p>B. <i>Breathing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pola napas:</b> takipneu</li> <li>- <b>Frekuensi napas:</b> 30 x/mnt</li> <li>- <b>Bunyi napas:</b> terdengar ronkhi dan snoring</li> <li>- <b>Irama napas</b> √ Teratur Tidak teratur</li> <li>- <b>Tanda distress Pernapasan</b> Penggunaan otot bantu ada, Retraksi dada/interkost ada, Cuping hidung tidak ada</li> <li>- <b>Jenis pernapasan:</b> Pernapasan dada dan perut</li> <li>- Lain-lain: Tidak ada</li> <li>- Sianosis (-/-): tidak ada</li> <li>- Warna Kulit: coklat</li> <li>- <i>Diaforesis</i> (-/-): tidak ada</li> <li>- Kesadaran: GCS 6x (sopor) E3 M3 Vx</li> </ul> <p>RR 30x/menit HR : 140x/menit</p>	<p>Bersihkan jalan napas tidak efektif</p>	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan Kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi sputum menurun</li> <li>- Frekuensi napas membaik</li> </ul>	<p><b>Manajemen Jalan Napas</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)</li> <li>- Monitor bunyi napas</li> <li>- Monitor sputum</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posisikan semi fowler atau supinasi</li> <li>- Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik</li> <li>- Berikan oksigen, jika perlu</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu</li> </ul>

Ada Masalah (Ya)			
<p><b>C. Circulation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akral: <ul style="list-style-type: none"> <li>√ Hangat Dingin</li> </ul> </li> <li>- Pucat : <ul style="list-style-type: none"> <li>Ya √Tidak</li> </ul> </li> <li>- Sianosis : <ul style="list-style-type: none"> <li>Ya √Tidak</li> </ul> </li> <li>- Pengisian Kapiler : 3 detik <ul style="list-style-type: none"> <li>√ &lt; 3 detik &gt; 3 detik</li> </ul> </li> <li>- Nadi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Frekuensi 140 x/mnt</li> <li>b. Irama: <ul style="list-style-type: none"> <li>√Reguller</li> <li>Irreguler</li> </ul> </li> <li>c. Kekuatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>√Kuat</li> <li>Lemah</li> <li>Palpitasi (+/-) ; tidak</li> <li>Nadi Perifer: 102 x/menit, teraba kuat</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- TD 137/85 mmHg</li> <li>- Kelembaban kulit : <ul style="list-style-type: none"> <li>Lembab √Kering</li> <li>Warna Kulit ; coklat</li> </ul> </li> <li>- Turgor: <ul style="list-style-type: none"> <li>√Normal</li> <li>Kurang</li> <li>Lain-lain</li> </ul> </li> <li>- Suara Jantung (S3/S4) ; tidak ada suara jantung tambahan</li> </ul> <p><i>Ejection Fraction (EP)</i> :sulit dikaji</p> <p>Ada Masalah (Ya)</p>	<p>Penurunan kapasitas adaptif intrakranial</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3 x 24 jam maka penurunan kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kesadaran meningkat</li> <li>- Tekanan darah membaik</li> <li>- Tekanan nadi membaik</li> <li>- Pola napas membaik</li> <li>- Tekanan intrakranial membaik</li> </ul>	<p><b>Pemantauan tekanan intrakranial</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab peningkatan TIK</li> <li>- Monitor peningkatan TD</li> <li>- Monitor tingkat kesadaran</li> <li>- Monitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan sterilitas sistem pemantauan</li> <li>- Pertahankan posisi kepala dan leher netral</li> <li>- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien</li> <li>- Dokumentasikan hasil pemantauan</li> </ul>
<p><b>D. Disability</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tingkat kesadaran :</b></li> <li>- <b>Stupor</b></li> <li>- <b>Nilai GCS</b> 6x E: 3 M :3 Vx</li> <li>- <b>Pupil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>√ Isokor Anisokor</li> <li>Respon Cahaya : +/-</li> <li>Refleks pupil (+/+)</li> <li>Diameter : 2.5 mm</li> </ul> </li> </ul>	<p>Penurunan kapasitas adaptif intrakranial</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3 x 24 jam maka penurunan kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kesadaran meningkat</li> </ul>	<p><b>Pemantauan tekanan intrakranial</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab peningkatan TIK</li> <li>- Monitor peningkatan TD</li> <li>- Monitor tingkat kesadaran</li> <li>- Monitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ekstremitas</b></li> <li>Sensorik Ya Tidak</li> <li>Motorik Ya Tidak</li> <li>Reflex patella ka/ki: -/- Reflex tendon dalam bisep/trisep: sulit dikaji Refleks Patologis: Babinski (+/-): sulit dikaji Refleks <i>Chaddock</i> (+/-): -/- <i>Hoffman</i> (+/-): sulit dikaji Kernig sign (+/-): sulit dikaji Brudinsky (+/-): sulit dikaji</li> <li>- <b>Kekuatan otot :</b> (menurun)</li> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> </table> <li>- <b>Range Of Motion :</b> (Pasif)</li> <li>- <b>Keadaan Umum:</b> lemah</li> <li>- <b>Tanda vital</b> TD : 137/85 mmHg HR: 140 x/menit Pernapasan : 30 x/menit Suhu : 38,2 °C SPO2 :100 %</li> </ul> <p>Ada Masalah (Ya)</p>	1	1	1	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekanan darah membaik</li> <li>- Tekanan nadi membaik</li> <li>- Pola napas membaik</li> <li>- Tekanan intrakranial membaik</li> </ul>	<p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan sterilitas sistem pemantauan</li> <li>- Pertahankan posisi kepala dan leher netral</li> <li>- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien</li> <li>- Dokumentasikan hasil pemantauan</li> </ul>
1	1						
1	1						
<p><b>E. Exposure</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya trauma pada daerah: kepala dengan SDH dan ICH</li> <li>- Adanya jejas/luka pada daerah: kepala</li> <li>- Kedalaman luka: pasien post op craniectomy hari ke 5 dan luka dalam kondisi terjahit sehingga sulit dikaji kedalamannya</li> <li>- Lain-lain :</li> </ul> <p>Terdapat luka dekubitus pada bokong dan lesi pada ekstremitas atas dan bawah</p> <p>Ada Masalah (Ya)</p>	<p>Risiko Infeksi</p>	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan Tingkat infeksi menurun dengan Kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebersihan badan meningkat</li> <li>- Kadar sel darah putih membaik</li> </ul>	<p><b>Pencegahan Infeksi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batasi jumlah pengunjung</li> <li>- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</li> <li>- Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu</li> </ul>				

**COMPREHENSIVE ASSESMENT & ON GOING ASSESMENT**

**Riwayat Kesehatan Lalu :**

**AMPLE**

- A (Allergies) = tidak ada  
 M (Medications) = tidak ada  
 P (Past Illness) = klien memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diabetes  
 L (Last Meal) = tidak dapat dikaji  
 E (Event Leading) = tidak ada

**AIUEO**

- A (Alkohol) : tidak ada  
 I (Insulin) : tidak ada  
 U (Uremia) : tidak ada  
 E (Epilepsi) : tidak ada  
 O (Over dosis) : tidak ada

**Pengkajian B1-B6**

**B1 (Breathing)**

- Bentuk dada: Normochest
- RR : 30 x/menit
- Pola Nafas
- Terpasang OPA (+): tampak terpasang OPA pada klien  
NPA (+/-): tidak
- Penggunaan Otot Bantu Nafas (+/-): ya, ada retraksi otot dada pada pasien
- Pernafasan cuping hidung (+/-): tidak
- Penggunaan Alat Bantu Pernafasan: terpasang ventilator pada pasien
- Suara Nafas: ronkhi
- Suara nafas tambahan :  
 Wheezing (+/-): -  
 Stridor (+/-): -  
 Gargling (+/-): -  
 Ronkhi (+/-) : +  
 Snoring (+/-) : +

*Masalah : Bersihan jalan napas tidak efektif*

**B2 (Circulation)**

- Tekanan Darah : 137/85 mmHg
- CRT : < 3 detik
- Sianosis (+/-): tidak
- Konjuktiva: tidak anemis
- Nadi : 140 x/menit
- Suhu : 38,2 °C

*Masalah : Tidak*

**B3 (Neurologi)**

- Tingkat Kesadaran : sopor
- GCS 6x E 3 M 3 Vx
- Refleks Kornea (+/-): +/+
- Refleks Cahaya (+/-): +/+
- Reflek Pupil (+/-): +/+  
 Ukuran Pupil (isokor) ukuran (2.5 / 2.5 )
- Refleks Motorik (bisep +/+ trisep +/+ patella +/+ ): sulit dikaji
- Refleks Nervus Kranialis (Jabarkan 12 Nervus Kranialis dengan singkat): sulit dikaji

*Masalah : Ya*

**B4 (Bladder)**

- Edema Vagina/Scrotum (+/-): tidak ada
- Produksi Urine: 1.840 cc/ 24 jam
- Warna Urine: kuning muda
- Bau Urine: amonia
- Sedimen Urine (+/-): - darah (+/-): -
- Distensi Uretra (+/-): -
- Terpasang kateter Urine (+/-): iya Jenis: foley
- Balance Cairan/24 Jam (Silahkan dilampirkan perhitungan BC) :

Input:

Fentanyl 25 mcg  
 Metamizole 1 gr  
 Ceftriaxon 1 gr  
 Asam traneksamat 500 mg  
 Monitol 20% 125 cc  
 Fenitoin 100 mg  
 Metoclopramid 10 mg  
 Respiredon 2 mg  
 Asetazolamid 1 tab/20 cc  
 Paracetamol 1 gr  
 Propranolol 20 mg  
 Susu 400  
 Bubur saring 300  
 Infus 1000 cc  
 Output  
 Urine 1.840  
 IWL :  $15 \times 60 \times 24 / 24 \text{ Jam} = 900$   
 Perhitungan BC:  $2.505 - 2.740 = -235 \text{ cc}$

*Masalah : tidak*

**B5 (Bowel)**

- Terpasang NGT (+/-): +, ukuran: 18 Fr, sudah terpasang 6 hari
- Kebutuhan Cairan: 1000 cc/24 J
- Kebutuhan Nutrisi Parenteral 700/24 J, Jenis: susu dan bubur saring
- Retriksi Cairan (+/-): tidak
- Residu lambung banyak  $\pm 10 \text{ cc}$
- Bentuk Abdomen (simetris/asimetris): simetris
- Distensi Abdomen (+/-): -
- Asites (+/-):-
- Mual (+/-):-
- Muntah (+/-):-
- Peristaltik Usus: 8 x/menit


*Masalah : tidak*

**B6 (Bone)**

- Warna Kulit: coklat
- Decubitus (+/-): +, bagian bokong
- Pergerakan Ekstremitas (aktif/pasif): pasif
- Kekuatan Otot :

1	1
1	1

- Lesi (+/-): terdapat lesi pada tangan dan kaki
  - Fraktur (+/-): -
  - Dekubitus (+/-): +, terdapat luka dekubitus pada bagian bokong
  - Luka terbuka (+/-): +, terdapat luka pada bagian kepala
  - Luka Post Operasi (+/-): Pasien post op craniectomy hari ke-4
- Ukuran : -  
Area : kepala



Keterangan Gambar : Operasi Craniectomy evakuasi hematoma + dekomresi

#### Pengkajian Rasa Aman dan Nyaman

- Apakah ada rasa nyeri? Di bagian mana? jelaskan secara rinci: PQRST



Pengkajian Nyeri Face Analoge Scale pada pasien dengan kesadaran menurun

Kategori	Penilaian	Skor
Ekspresi wajah	Tidak ada ekspresi wajah tertentu/ tersenyum	0
	Menyeringai sekali-kali/ mengerutkan dahi, muram, ogah-ogahan	1√
	Dagu gemetar dan rahang dikecap berulang	2
Ekstremitas	Posisi normal/ santai	0
	Gelisah, resah dan tegang	1√
	Menendang/menarik kaki	2
Gerakan	Rebahan dengan tenang, posisi normal, bergerak dengan mudah	0
	Mengerang/meregek	1√
	Menangis tersedu-sedu, menejrit, terisak-isak, menggerutu berulang-ulang	2
Kemampuan ditenangkan	Senang, santai	0
	Dapat ditenangkan dengan sentuhan, pelukan atau berbicara, dapat dialihkan	1√

	Sulit/tidak dapat ditenangkan dengan pelukan, sentuhan atau distraksi	2
	Total	4

Interpretasi

0 = tidak nyeri

1-3 = nyeri ringan

4-6 = nyeri sedang

7-10 = nyeri berat

- Apakah ada riwayat pembedahan ?  
Ya. Pasien post op craniectomy hari ke lima

### **Pengkajian Aktivitas, Istirahat dan Tidur**

#### • **AKTIFITAS**

- Apakah klien selalu berolah raga? Jenis OR? Suami klien mengatakan bahwa istrinya sering mengerjakan pekerjaan rumah tangga
- Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktivitas? Suami klien mengatakan bahwa dulu sebelum kecelakaan istrinya tidak menggunakan alat bantu dalam beraktivitas
- Suami klien mengatakan bahwa istrinya akan bangun pagi-pagi dan mengurus suami dan anak-anaknya setelah itu melakukan pekerjaan rumah dan tidur malam pada jam 10.
- Bagaimana aktifitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah perlu bantuan? Jelaskan secara Rinci. Selama sakit klien tidak bisa beraktivitas karena klien mengalami penurunan kesadaran. Klien hanya mampu berbaring di tempat tidur, klien dalam keadaan tidak mampu merawat dirinya. Skor barthel index: 0 (ketergantungan total)

#### • **ISTIRAHAT**

- Kapan dan berapa lama klien beristirahat? Suami klien mengatakan sebelum sakit istrinya biasa tidur siang 2 jam dan tidur malam sekitar 8 jam
- Apa kegiatan untuk mengisi waktu luang? Suami klien mengatakan bahwa istrinya akan berkumpul dengan ibu-ibu kompleks dan mengikuti pengajian di masjid
- Suami klien mengatakan bahwa istrinya biasa akan tidur siang
- Apakah pengisian waktu luang sesuai hoby? Suami klien mengatakan bahwa dia tidak tau tapi istrinya sering melakukan kegiatan tersebut
- Saat ini klien tampak hanya berbaring di tempat tidur

#### • **TIDUR**

- Bagaimana pola tidur klien? (jam, berapa lama, nyenyak/tidak?) Suami klien mengatakan bahwa istrinya tidur siang sekitar 2 jam dan tidur malam 8 jam, pola tidur teratur
- Apakah kondisi saat ini mengganggu klien?: Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
- Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur? Suami klien mengatakan bahwa istrinya tidak menggunakan obat penenang
- Suami klien mengatakan bahwa istrinya akan menonton TV terlebih dahulu
- Bagaimana kebiasaan tidur? Suami klien mengatakan bahwa klien tidur sesuai dengan kebiasaannya yaitu tidur siang dan malam
- Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya ? Suami klien mengatakan bahwa tidur istrinya tampak nyenyak
- Apakah klien sering terjaga saat tidur? : Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
- Pernahkan mengalami gangguan tidur? Jenis nya? : Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
- Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun

### **Pengkajian Riwayat Sosial :**

- Apakah klien mempunyai teman dekat? Suami klien mengatakan bahwa istrinya mempunyai teman dekat
- Siapa yang dipercaya klien? Suami klien mengatakan bahwa dia dan istrinya saling mempercayai
- Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat? Suami klien mengatakan bahwa istrinya biasa ikut pegajian
- Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai kemampuan? Suami klien mengatakan bahwa semua yang dilakukan klien dulu sesuai kemampuannya



**Pengkajian Riwayat Psikologi:**

- Status Emosi.
  - Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya? Suami klien mengatakan bahwa klien akan langsung mengekspresikan perasaannya jika sedih atau senang
  - Bagaimana suasana hati klien? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
  - Bagaimana perasaan klien saat ini? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
  - Apa yang dilakukan bila suasana hati sedih, marah, gembira? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
- Konsep diri:
  - Bagaimana klien memandang dirinya? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
  - Hal-hal apa yang disukai klien? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
  - Bagaimana klien memandang diri sendiri? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
  - Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan yang ada pada dirinya? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
  - Hal-hal apa yang dapat dilakukan klien saat ini? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun

**Pengkajian Riwayat Spiritual :**

- Apakah klien menganut satu agama? Klien menganut agama islam
- Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan ibadah? Klien mengalami penurunan kesadaran sehingga klien tidak mampu melaksanakan sholat
- Bagaimana hubungan antara manusia dan Tuhan dalam agama: Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun

**PEMERIKSAAN TANDA-TANDA VITAL****1. TANDA VITAL**

TD : 137/85 mmHg  
 HR : 140 x/menit  
 RR : 30 x/menit  
 SUHU : 38,2<sup>o</sup>c  
 SPO2 : 100 %  
 ETCO2 : -  
 PAIN : -

**2. Pemeriksaan Fisik****Kepala dan Leher**

- a. Inspeksi : bentuk normal, kepala tampak botak, tampak ada luka post operasi  
 Telinga : bentuk simetris, tidak ada cairan darah dari telinga  
 Mata : mata simetris, sclera warna merah, conjungtiva tidak anemis, pupil isokor, refleks cahaya+ /+, refleks pupil +/- , kedua mata bisa terbuka, tidak ada lesi pada mata  
 Hidung : bentuk simetris, tidak ada massa, tidak ada sekret, tidak ada lesi, tidak ada darah  
 Mulut : mukosa bibir agak kering, tidak ada luka/ lesi , terdapat sekret pada mulut, tidak ada tonsilitis, gigik putih  
 Leher : tidak ada pembengkakan kelenjer dan peningkatan JVP
- b. Palpasi : ada nyeri tekan pada kepala, klien teraba hangat

**3. Thoraks**

- a. Inspeksi : bentuk dada normal, pergerakan dada ada, simetris kiri dan kanan, tidak ada massa dan jejas
- b. Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi
- c. Perkusi : suara sonor
- d. Auskultasi : ronkhi

**4. Pelvis**

- a. Inspeksi : tampak bersih, tidak ada benjolan

b. Palpasi : tidak ada benjolan

**5. Ekstremitas atas/bawah**

a. Inspeksi :  
Atas : klien tidak mampu menggerakkan tangannya karena penurunan kesadaran  
Bawah : klien tidak mampu menggerakkan kakinya karena penurunan kesadaran

b. Palpasi :  
Atas : sulit dikaji, teraba hangat  
Bawah : sulit dikaji, teraba hangat

**6. Punggung**

a. Inspeksi : tidak ada edema, tidak ada lesi  
b. Palpasi : sulit dikaji

**7. Genitalia**

a. Inspeksi : Pasien terpasang kateter urine sejak tanggal 24 agustus 2022, tidak ada edema, ada luka dekubitus pada bokong  
Palpasi : Sulit dikaji

#### PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK

RONTGEN  CT-SCAN  USG  EKG  ENDOSKOPI  Lain-lain:

#### Hasil :

##### Foto Thoraks AP (tanggal 29 agustus 2022):

- Terpasang CVC pada hemithorax kanan melalui v.subclava kanan dengan tip setinggi paravertebral kanan CV T8 kesan pada cavoatrial junction
- Pneumonia kiri

##### MSCT Brain (tanpa kontras) (tanggal 28 agustus 2022)

- Pendarahan intracerebri lobus temporalis dextra dengan volume +/- 14 ml
- Brain edema
- Defek of frontotemporalparietal dextra dengan terpasang drain tip kesan pada regio frontal dextra (post op)
- Multihematosinus

##### MSCT Kepala 3 Demensi (tanpa kontras) (24 agustus 2022)

- Fraktur linear pada os temporalis kiri
- Pendarahan intracerebri lobus temporalis kanan dengan volume +/- 7.17 ml
- Pendarahan subdural regio frontoparietooccipitalis kanan
- Midline shift ke kiri sejauh +/- 0.54 cm
- Brain edema
- Panhematosinus
- Subgaleal hematoma regio temporalis kiri

#### PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
<b>HEMATOLOGI</b>			
<b>Hematologi Rutin</b>			
WBC	15.7	4.00-10.00	10 <sup>3</sup> /uL
RBC	3.84	4.00-6.00	10 <sup>6</sup> /uL
HGB	11.0	12.0-16.0	gr/dl
HCT	33	37.0-48.0	%
MCV	86	80.0-97.0	fL
MCH	29	26.5-33.5	pg
MCHC	33	31.5-35.0	gr/dl
PLT	229	150-400	10 <sup>3</sup> /uL
RDW-SD		37.0-54.0	fL

RDW-CV	14.4	10.0-15.0	
PDW	16.5	10.0-18.0	fL
MPV	9.0	6.50-11.0	fL
P-LCR		13.0-43.0	%
PCT	0.20	0.15-0.50	%
NEUT	64.7	52.0-75.0	%
LYMPH	18.8	20.0-40.0	%
MONO	11.2	2.00-8.00	%
EO	3.0	1.00-3.00	10 <sup>3</sup> /uL
BASO	2.3	0.00-0.10	10 <sup>3</sup> /uL
RET		0.00-0.10	10 <sup>3</sup> /uL
LED I		(L < 10, P <20)	10 <sup>3</sup> /uL
LED II Jam II			mm
<b>Koagulasi</b>			
PT	11.3	10-14	detik
INR	1.05	-	
APTT	17.6	22.0-30.0	detik
<b>KIMIA DARAH</b>			
<b>Glukosa</b>			
GDS	251	140	mg/dl
<b>Fungsi Ginjal</b>			
Ureum	45	10-50	mg/dl
Kreatinin	0.60	L 9< 1.3);P (<1.1)	mg/dl
<b>Fungsi Hati</b>			
SGOT	183	<38	U/L
SGPT	173	<41	U/L
Albumin	2.9	3.5-5.0	gr/dl
<b>Elektrolit</b>			
Natrium	150	136-145	mmol/l
Kalium	3.5	3.5-5.1	mmol/l
Klorda	125	97-111	mmol/l
<b>Analisa Gas Darah</b>			
PH	7.459	7.35 – 7.45	%
SO <sub>2</sub>	98.5	95 – 98	mmHg
PO <sub>2</sub>	118.6	80.0 – 100.0	ml/dl
ctO <sub>2</sub>	14.9	15.8 – 22.3	mmHg
PCO <sub>2</sub>	37.3	35.0 – 45.0	mmol/l
ctCO <sub>2</sub>	27.9	23 – 27	mmol/l
HCO <sub>3</sub>	26.7	22 – 26	mmol/l
BE	2.7	-2 s/d +2	

## 4.2 ANALISA DATA

Tabel 4.2 Analisa Data

NO.	DATA	ETIOLOGI	MASALAH KEPERAWATAN
1.	DS: Tidak dapat dikaji DO: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat suara napas tambahan: ronchi dan snoring</li> <li>- Terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi encer</li> <li>- Kesadaran sopor dengan GCS 6x, E3 M3 Vx</li> <li>- Pasien tampak mampu batuk tapi tidak mampu mengeluarkan secret dari dalam mulutnya</li> <li>- HR: 140 x/menit</li> <li>- RR: 30 x/menit</li> </ul>	Trauma kepala ↓ Ruptur vena dalam serebral ↓ Hematoma subdural akut ↓ Tekanan jaringan otak meningkat ↓ Perubahan kesadaran ↓ Ketidakmampuan mengeluarkan secret ↓ Akumulasi secret ↓ Bersihan jalan napas tidak efektif	Bersihan jalan napas tidak efektif
2.	DS : Tidak dapat dikaji DO: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengalami cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas</li> <li>- Kesadaran klien menurun dengan nilai GCS 6x, E3 M3 Vx</li> <li>- MSCT Brain: pendarahan intracerebri lobus temporalis dextra dengan volume +/- 14 ml, Brain edema , Defek of frontotemporaloparietal dextra dengan terpasang drain tip kesan pada regio frontal dextra (post op), Multihematosinus.</li> <li>- MSCT Kepala: fraktur linear pada os temporalis kiri, Pendarahan intracerebri lobus temporalis kanan dengan volume +/- 7.17 ml, Pendarahan subdural regio frontoparietooccipitalis kanan, Midline shift ke kiri sejauh +/- 0.54 cm, Brain edema, Panhematosinus, Subgaleal hematom regio temporalis kiri</li> <li>- TD : 137/85 mmHg</li> <li>- HR : 140 x/menit</li> </ul>	Trauma kepala ↓ Peningkatan TIK ↓ Kompensasi tubuh vasokonstriksi ↓ Gangguan autoregulasi ↓ Gangguan neurologis ↓ Penurunan kapasitas adaptif intrakranial	Penurunan kapasitas adaptif intrakranial
3.	DS: Tidak dapat dikaji DO: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat luka post op craniectomy pada kepala</li> <li>- Pasien tampak mengerang dan mengerutkan dahi jika kepalanya ditekan</li> <li>- Skala nyeri 4 dengan VAS</li> </ul>	Trauma kepala ↓ Rupture vena dalam serebral ↓ Hematoma subdural ↓ Vena ruang subdural robek	Nyeri akut


	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanda-tanda vital</li> <li>TD : 137/85 mmHg</li> <li>HR : 140 x/menit</li> <li>RR : 30 x/menit</li> </ul>	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Hematoma dan kerusakan sel darah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Klasifikasi dan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Nyeri pada pada kepala</p>	
4.	<p>DS : Tidak dapat dikaji</p> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien post op craniectomy hari ke-5</li> <li>- Terdapat luka pada kepala</li> <li>- Tubuh klien terasa hangat</li> <li>- MSCT Brain: pendarahan intracerebri lobus temporalis dextra dengan volume +/- 14 ml, Brain edema</li> <li>- Suhu : 38,2°C</li> <li>- RR : 30 x/menit</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Trauma kepala</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Cedera jaringan otak</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Vasodilatasi vaskuler</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Aliran darah meningkat ke area cedera</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Akumulasi darah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Edema serebral</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Peningkatan TIK</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Kompresi pada pusat suhu</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Perubahan termoregulator</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Hipertermi</p>	Hipertermi
5.	<p>DS : Tidak dapat dikaji</p> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien post op craniectomy hari ke-5</li> <li>- Terdapat luka dekubitus pada bokong</li> <li>- Terdapat lesi pada ekstremitas atas dan bawah</li> <li>- Kesadaran menurun GCS 6x, E3 M3 Vx</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Trauma kepala</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Imobilisasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tirah baring</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Penekanan pada daerah yang menonjol</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Gangguan integritas kulit</p>	Gangguan integritas kulit
6.	<p>Faktor Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien post op craniectomy hari ke 5</li> <li>- Terpasang NGT ukuran 18 Fr terpasang sejak 6 hari yang lalu</li> <li>- Terpasang kateter urine terpasang sejak 6 hari yang lalu</li> <li>- Terdapat luka dekubitus pada bokong klien</li> <li>- Hasil Hematologi rutin: WBC 15,7 (Normal: 4.00-10.00 10<sup>3</sup>/uL) HGB 11.0 (Normal: 12.0-16.00 gr/dl) HCT 33 (Normal: 37.0-48.0%)</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Trauma kepala</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Fraktur tulang tengkorak</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Arteri meningen media otak rusak</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Perdarahan pada otak</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Kesadaran menurun</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Dilakukan tindakan invasif</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pemasangan NGT/kateter</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Risiko Infeksi</p>	Risiko infeksi

### 4.3 Diagnosis Keperawatan

Tabel 4.3 Diagnosis Keperawatan

No	Diagnosis
1.	<p>Bersihkan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, dibuktikan dengan:            DS: Tidak dapat dikaji            DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat suara napas tambahan: ronchi dan snoring</li> <li>- Terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi encer</li> <li>- Kesadaran sopor dengan GCS 6x, E3 M3 Vx</li> <li>- Pasien tampak mampu batuk tapi tidak mampu mengeluarkan secret dari dalam mulutnya</li> <li>- HR: 140 x/menit</li> <li>- RR: 30 x/menit</li> </ul>
2.	<p>Penurunan kapasitas intrakranial berhubungan dengan edema cerebral dibuktikan dengan:            DS : Tidak dapat dikaji            DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengalami cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas</li> <li>- Kesadaran klien menurun dengan nilai GCS 6x, E3 M3 Vx</li> <li>- MSCT Brain: pendarahan intracerebri lobus temporalis dextra dengan volume +/- 14 ml, Brain edema , Defek of frontotemporoparietal dextra dengan terpasang drain tip kesan pada regio frontal dextra (post op), Multihematosinus.</li> <li>- MSCT Kepala: fraktur linear pada os temporalis kiri, Pendarahan intracerebri lobus temporalis kanan dengan volume +/- 7.17 ml, Pendarahan subdural regio frontoparietoccipitalis kanan, Midline shift ke kiri sejauh +/- 0.54 cm, Brain edema, Panhematosinus, Subgaleal hematoma regio temporalis kiri</li> <li>- TD : 137/85 mmH</li> <li>- HR : 140 x/menit</li> </ul>
3.	<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (trauma kepala) dibuktikan dengan:            DS: Tidak dapat dikaji            DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat luka post op craniectomy pada kepala</li> <li>- Pasien tampak mengerang dan mengerutkan dahi jika kepalanya ditekan</li> <li>- Skala nyeri 4 dengan VAS</li> <li>- Tanda-tanda vital</li> </ul> <p>TD : 137/85 mmHg            HR : 140 x/menit            RR : 30 x/menit</p>
4.	<p>Hipertermi berhubungan dengan respon trauma dibuktikan dengan:            DS : Tidak dapat dikaji            DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien post op craniectomy hari ke-5</li> <li>- Terdapat luka pada kepala</li> <li>- Tubuh klien terasa hangat</li> <li>- MSCT Brain: pendarahan intracerebri lobus temporalis dextra dengan volume +/- 14 ml, Brain edema</li> <li>- Suhu : 38,2°C</li> <li>- RR : 30 x/menit</li> <li>- HR : 140 x/menit</li> </ul>
5.	<p>Gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan penurunan mobilitas dibuktikan dengan:            DS : Tidak dapat dikaji            DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien post op craniectomy hari ke-5</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat luka dekubitus pada bokong</li><li>- Terdapat lesi pada ekstremitas atas dan bawah</li><li>- Kesadaran menurun GCS 6x, E3 M3 Vx</li><li>- Kulit tampak kering</li></ul>
8.	<p>Risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif dibuktikan dengan: Faktor Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pasien post op craniectomy hari ke 5</li><li>- Terpasang NGT ukuran 18 Fr terpasang sejak 6 hari yang lalu</li><li>- Terpasang kateter urine terpasang sejak 6 hari yang lalu</li><li>- Terdapat luka dekubitus pada bokong klien</li><li>- Hasil Hematologi rutin: WBC 15,7 HGB 11.0 HCT 33</li></ul>



#### 4.4 Intervensi Keperawatan

Tabel 4.5 Intervensi Keperawatan

No.	Diagnosis Keperawatan	Luaran Keperawatan	Rencana Intervensi	Rasional
1.	<p>Bersihkan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, dibuktikan dengan:            DS: Tidak dapat dikaji            DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat suara napas tambahan: ronchi dan snoring</li> <li>- Terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi encer</li> <li>- Kesadaran sopor dengan GCS 6x, E3 M3 Vx</li> <li>- Pasien tampak mampu batuk tapi tidak mampu mengeluarkan secret dari dalam mulutnya</li> <li>- HR: 140 x/menit</li> <li>- RR: 30 x/menit</li> </ul>	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan Kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi sputum menurun</li> <li>- Frekuensi napas membaik</li> </ul>	<p><b>Manajemen Jalan Napas</b>  <b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)</li> <li>- Monitor bunyi napas</li> <li>- Monitor sputum</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posisikan semi fowler atau supinasi</li> <li>- Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik</li> <li>- Berikan oksigen, jika perlu</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu</li> </ul>	<p><b>Manajemen Jalan Napas</b>  <b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui pola napas pasien</li> <li>- Untuk mengetahui adanya suara napas tambahan atau tidak</li> <li>- Mengetahui adanya jumlah, warna sputum</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mempertahankan jalan napas klien dan posisi sebelum melakukan suction</li> <li>- Membantu mengeluarkan lendir menggunakan suction</li> <li>- Menambah oksigen yang masuk ke dalam tubuh</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk melebarkan saluran pernapasan pasien.</li> </ul>
2.	<p>Penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema cerebral dibuktikan dengan:            DS : Tidak dapat dikaji            DO:</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3 x 24 jam maka penurunan kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan kriteria hasil:</p>	<p><b>Pemantauan tekanan intrakranial</b>  <b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab peningkatan TIK</li> <li>- Monitor peningkatan TD</li> </ul>	<p><b>Pemantauan tekanan intrakranial</b>  <b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui penyebab peningkatan TIK</li> <li>- Mengetahui peningkatan TD</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengalami cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas</li> <li>- Kesadaran klien menurun dengan nilai GCS 6x, E3 M3 Vx</li> <li>- MSCT Brain: pendarahan intracerebri lobus temporalis dextra dengan volume +/- 14 ml, Brain edema, Defek of frontotemporoparietal dextra dengan terpasang drain tip kesan pada regio frontal dextra (post op), Multihematosinus.</li> <li>- MSCT Kepala: fraktur linear pada os temporalis kiri, Pendarahan intracerebri lobus temporalis kanan dengan volume +/- 7.17 ml, Pendarahan subdural regio frontoparietooccipitalis kanan, Midline shift ke kiri sejauh +/- 0.54 cm, Brain edema, Panhematosinus, Subgaleal hematoma regio temporalis kiri</li> <li>- TD : 137/85 mmH</li> <li>- HR : 140 x/menit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kesadaran meningkat</li> <li>- Tekanan darah membaik</li> <li>- Tekanan nadi membaik</li> <li>- Pola napas membaik</li> <li>- Tekanan intrakranial membaik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tingkat kesadaran</li> <li>- Monitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan sterilitas sistem pemantauan</li> <li>- Pertahankan posisi kepala dan leher netral</li> <li>- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien</li> <li>- Berikan terapi non farmakologi</li> <li>- Dokumentasikan hasil pemantauan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui tingkat kesadaran</li> <li>- Mengetahui kadar CO2 pasien</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertahankan kebersihan sistem pemantauan</li> <li>- Mencegah terjadinya peningkatan tekanan intrakranial</li> <li>- Memantau kondisi pasien</li> <li>- Bukti dan informasi yang dapat digunakan untuk menentukan keputusan</li> </ul>
3.	<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (trauma kepala) dibuktikan dengan: DS: Tidak dapat dikaji DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat luka post op craniectomy pada kepala</li> <li>- Pasien tampak mengerang dan mengerutkan dahi jika kepalanya ditekan</li> <li>- Skala nyeri 4 dengan VAS</li> <li>- Tanda-tanda vital TD : 137/85 mmHg</li> </ul>	<p>Tingkat nyeri Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam maka nyeri berkurang, kenyamanan meningkat. Kriteria Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meringis dapat menurun</li> <li>- Fekkuensi nadi membaik</li> <li>- TD kanan darah membaik</li> </ul>	<p><b>Manajemen nyeri</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi skala nyeri</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam, terapi murattal)</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian analgetik, jika</li> </ul>	<p><b>Manajemen Nyeri</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui skala nyeri pasien</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengurangi rasa nyeri melalui tehnik nonfarmakologi</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekerja sama dengan profesi lain untuk menurunkan nyeri yang dialami pasien</li> </ul>

	HR : 140 x/menit RR : 30 x/menit		perlu.	
4.	Hipertermi berhubungan dengan respon trauma dibuktikan dengan: DS : Tidak dapat dikaji DO : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien post op craniectomy hari ke-5</li> <li>- Terdapat luka pada kepala</li> <li>- Tubuh klien teraba hangat</li> <li>- MSCT Brain: pendarahan intracerebri lobus temporalis dextra dengan volume +/- 14 ml, Brain edema</li> <li>- Suhu : 38,2°C</li> <li>- RR : 30 x/menit</li> <li>- HR : 140 x/menit</li> </ul>	Setelah dilakukan perawatan selama 3 x 24 jam maka termoregulasi membaik dengan kriteria hasil: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhu tubuh membaik</li> <li>- Takipneu menurun</li> <li>- Takikardi menurun</li> </ul>	<b>Manajemen hipertermi</b> <b>Observasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab hipertermi</li> <li>- Monitor suhu tubuh</li> <li>- Monitor komplikasi akibat hipertermi</li> </ul> <b>Terapeutik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sediakan lingkungan yang dingin</li> <li>- Ganti linen setiap hari</li> <li>- Lakukan pendinginan eksternal</li> </ul> <b>Kolaborasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu</li> </ul>	<b>Manajemen hipertermi</b> <b>Observasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui penyebab hipertermi</li> <li>- Mengetahui suhu tubuh</li> <li>- Mengetahui komplikasi akibat hipertermi</li> </ul> <b>Terapeutik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkungan yang dingin membantu menurunkan suhu tubuh</li> <li>- Menjaga linen tetap kering</li> <li>- Suhu lingkungan akan membantu menurunkan suhu tubuh</li> </ul> <b>Kolaborasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekerja sama dalam menurunkan suhu tubh klien</li> </ul>
5.	Gangguan integritas kulit dan jaringan berhubungan dengan perubahan penurunan mobilitas dibuktikan dengan: DS : Tidak dapat dikaji DO : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien post op craniectomy hari ke-5</li> <li>- Terdapat luka dekubitus pada bokong</li> <li>- Terdapat lesi pada ekstremitas atas dan bawah</li> <li>- Kesadaran menurun GCS 6x, E3 M3 Vx</li> <li>- Kulit tampak kering</li> </ul>	Setelah dilakukan perawatan selama 3 x 24 jam maka integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerusakan jaringan menurun</li> <li>- Kerusakan lapisan kulit menurun</li> </ul>	<b>Perawatan luka</b> <b>Observasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor karakteristik luka (warna, ukuran, bau)</li> <li>- Monitor tanda-tanda infeksi</li> </ul> <b>Terapeutik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersihkan luka dengan cairan NaCL atau pembersih nontoksik</li> <li>- Berikan salep yang sesuai dengan kulit</li> <li>- Pasang balutan sesuai jenis luka</li> <li>- Pertahankan tehnik steril saat melakukan perawatan luka</li> <li>- Jadwalkan perubuhan posisi setiap</li> </ul>	<b>Perawatan luka</b> <b>Observasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui karakteristik luka</li> <li>- Mengetahui tanda-tanda infeksi</li> </ul> <b>Terapeutik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NaCL tidak mengganggu proses penyembuhan luka karena memiliki kadar yang rendah</li> <li>- Mencegah reaksi alergi</li> <li>- Balutan yang tepat akan mencegah infeksi</li> <li>- Mempertahankan luka tetap steril</li> <li>- Melancarkan sirkulasi ke seluruh jaringan</li> </ul>

			2 jam atau sesuai kondisi pasien <b>Kolaborasi</b> - Kolaborasi pemberian antibiotik, jika perlu	<b>Kolaborasi</b> - Mengatasi infeksi
6.	Risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif dibuktikan dengan: Faktor Risiko: - Pasien post op craniectomy hari ke 5 - Terpasang NGT ukuran 18 Fr masuk ke rumah sakit tanggal 24 agustus 2022 - Terpasang kateter urine sejak tanggal 24 agustus 2022 - Terdapat luka dekubitus pada bokong klien - Hasil Hematologi rutin: - WBC 15,7 - HGB 11,0 - HCT 33	Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan Tingkat infeksi menurun dengan Kriteria hasil: - Kebersihan badan meningkat - Kadar sel darah putih membaik	<b>Pencegahan Infeksi</b> <b>Observasi</b> - Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <b>Terapeutik</b> - Batasi jumlah pengunjung - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien - Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi <b>Kolaborasi</b> - Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu	<b>Pencegahan Infeksi</b> <b>Observasi</b> - Untuk mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi <b>Terapeutik</b> - Mengurangi kontaminasi bakteri - Untuk mengurangi kontaminasi silang - Mengurangi risiko infeksi pasca-prosedur dan untuk meminimalkan paparan dari penyedia layanan kesehatan untuk mikroorganisme yang berpotensi menular <b>Kolaborasi</b> - Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu

## 4.5 Implementasi dan Evaluasi

Tabel 4.6 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan

Hari/Tanggal/Jam	IMPLEMENTASI	EVALUASI
Kamis, 01 September 2022  08.30 WITA   08.40 WITA   09.00 WITA	<p><b>Manajemen Jalan Napas</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) Hasil : frekuensi napas 30 kali/menit, retraksi otot dada ada, pasien tampak bernapas dengan dada dan perut</li> <li>- Monitor bunyi napas Hasil : terdapat bunyi napas tambahan yaitu ronkhi</li> <li>- Monitor sputum Hasil : terdapat sputum dengan dengan tekstur kental</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posisikan semi fowler atau supinasi Hasil : pasien diberikan posisi semi fowler</li> <li>- Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik Hasil : klien di suction setiap 15 menit</li> <li>- Berikan oksigen, jika perlu Hasil : terpasang nasal kanul dengan oksigen 4 litermenit</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu Hasil : pasien di nebulizer sebelum disuction</li> </ul>	<p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frekuensi napas 28 x/menit</li> <li>- Retraksi otot dada ada</li> <li>- Ada bunyi napas tambahan yaitu ronkhi</li> <li>- Terpasang oksigen 5-6 liter per menit</li> </ul> <p><b>A</b> : Masalah bersihan jalan napas belum teratasi</p> <p><b>P</b> : lanjutkan intervensi manajemen jalan napas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor pola napas</li> <li>- Monitor bunyi napas</li> <li>- Monitor sputum</li> <li>- Posisikan semi fowler atau supinasi</li> <li>- Lakukan pengisapan lendir</li> <li>- Berikan oksigen</li> <li>- Kolaborasi pemberian bronkodilator, mukolitik, jika perlu</li> </ul>
09.10 WITA	<p><b>Pemantauan tekanan intrakranial</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab peningkatan TIK Hasil : pasien mengalami trauma kepala dengan ICH dan SDH, pasien post op craniectomy hari ke-6</li> <li>- Monitor peningkatan TD Hasil : 135/75 mmHg</li> <li>- Monitor tingkat kesadaran</li> </ul>	<p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai rata-rata TD sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 137/79 mmHg</li> <li>- Nilai rata-rata TD setelah pemberian intervensi yaitu 130/79 mmHg</li> <li>- Nilai rata-rata HR sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 133 x/menit</li> </ul>

<p>09.25 WITA</p> <p>09.30 WITA</p> <p>14.30 WITA</p> <p>21.20 WITA</p>	<p>Hasil : kesadaran stupor dengan nilai GCS E 3 M 3 Vx</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor kadar CO<sub>2</sub> dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan Hasil : pernapasan 30 x/menit, SPO<sub>2</sub> 100%</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan posisi kepala dan leher netral Hasil : posisi kepala klien dalam keadaan netral</li> <li>- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien Hasil : interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit</li> <li>- Berikan terapi non farmakologis Hasil : klien diberi terapi <i>Family Auditory Sensory Training</i> selama 10 menit</li> <li>- Dokumentasikan hasil pemantauan Hasil :</li> </ul> <table border="1" data-bbox="602 659 1319 951"> <thead> <tr> <th>Intevensi (jam)</th> <th>TD</th> <th>HR</th> <th>RR</th> <th>Suhu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pre 1 (09.30)</td> <td>135/75</td> <td>140</td> <td>30</td> <td>38,8</td> </tr> <tr> <td>Post 1 (09.45)</td> <td>130/75</td> <td>122</td> <td>28</td> <td>38,8</td> </tr> <tr> <td>Pre 2 (14.30)</td> <td>137/78</td> <td>130</td> <td>30</td> <td>38,7</td> </tr> <tr> <td>Post 2 (14.45)</td> <td>128/76</td> <td>125</td> <td>24</td> <td>38,7</td> </tr> <tr> <td>Pre 3 (21.20)</td> <td>140/85</td> <td>130</td> <td>36</td> <td>38,9</td> </tr> <tr> <td>Post 3 (21.45)</td> <td>132/85</td> <td>128</td> <td>30</td> <td>38,9</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="602 986 1319 1153"> <thead> <tr> <th>GCS</th> <th>Pre 1</th> <th>Post 1</th> <th>Pre 2</th> <th>Post 2</th> <th>Pre 3</th> <th>Post 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Intevensi (jam)	TD	HR	RR	Suhu	Pre 1 (09.30)	135/75	140	30	38,8	Post 1 (09.45)	130/75	122	28	38,8	Pre 2 (14.30)	137/78	130	30	38,7	Post 2 (14.45)	128/76	125	24	38,7	Pre 3 (21.20)	140/85	130	36	38,9	Post 3 (21.45)	132/85	128	30	38,9	GCS	Pre 1	Post 1	Pre 2	Post 2	Pre 3	Post 3	E	3	4	3	4	4	4	M	3	3	3	3	3	3	V	x	x	x	x	x	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai rata-rata HR setelah pemberian intervensi selama satu hari yaitu 125 x/menit</li> <li>- Nilai rata-rata RR sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 32 x/menit</li> <li>- Nilai rata-rata RR setelah pemberian intervensi selama satu hari yaitu 27 x/menit</li> <li>- Nilai rata-rata suhu sebelum pemberian intervensi selama sehari yaitu 38,8<sup>o</sup>C</li> <li>- Nilai rata-rata suhu setelah pemberian intervensi selama sehari yaitu 38,8<sup>o</sup>C</li> <li>- Nilai GCS sebelum interensi selama sehari yaitu GCS 6x E3 M3 Vx</li> <li>- Nilai GCS setelah intervensi selama sehari yaitu GCS 8 E4 M3 V1</li> </ul> <p>A : masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial belum teratasi</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab peningkatan TIK</li> <li>- Monitor peningkatan TD</li> <li>- Monitor tingkat kesadaran</li> <li>- Pertahankan posisi kepala dan leher netral</li> <li>- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien</li> <li>- Berikan terapi non farmakologis</li> <li>- Dokuemntasikan hasil pemantauan</li> </ul>
Intevensi (jam)	TD	HR	RR	Suhu																																																													
Pre 1 (09.30)	135/75	140	30	38,8																																																													
Post 1 (09.45)	130/75	122	28	38,8																																																													
Pre 2 (14.30)	137/78	130	30	38,7																																																													
Post 2 (14.45)	128/76	125	24	38,7																																																													
Pre 3 (21.20)	140/85	130	36	38,9																																																													
Post 3 (21.45)	132/85	128	30	38,9																																																													
GCS	Pre 1	Post 1	Pre 2	Post 2	Pre 3	Post 3																																																											
E	3	4	3	4	4	4																																																											
M	3	3	3	3	3	3																																																											
V	x	x	x	x	x	1																																																											
<p>10.00 WITA</p>	<p><b>Manajemen nyeri</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi skala nyeri Hasil : skala nyeri diukur dengan VAS, klien tampak menyeringai sekali-</li> </ul>	<p>S : tidak dapat dikaji</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skala nyeri 4</li> </ul>																																																															

<p>10.05 WITA</p> <p>10.10 WITA</p>	<p>kali, gelisah, mengerang sekali-kali, dan dapat ditenangkan dengan sentuhan. Skala nyeri klien 4</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam, terapi murattal)</li> </ul> <p>Hasil : klien diberikan kompres dingin</p> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.</li> </ul> <p>Hasil : klien diberi metamizole 1 gram setiap 8 jam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien tampak masih gelisah</li> <li>- TD : 130/75 mmHg</li> <li>- HR : 122 x/menit</li> <li>- RR : 28 x/menit</li> <li>- S : 38,8°C</li> </ul> <p><b>A</b> : masalah nyeri akut belum teratasi</p> <p><b>P</b> : Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi skala nyeri</li> <li>- Berikan terapi non farmakologi</li> <li>- Kolaborasi pemberian analgetik</li> </ul>
<p>10.15 WITA</p> <p>10.20 WITA</p> <p>10.30 WITA</p>	<p><b>Manajemen hipertermi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab hipertermi</li> </ul> <p>Hasil : post op craniectomy hari ke-6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor suhu tubuh</li> </ul> <p>Hasil : suhu 38,8°C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor komplikasi akibat hipertermi</li> </ul> <p>Hasil : pasien tampak tidak kejang</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ganti linen setiap hari</li> </ul> <p>Hasil : linen diganti setiap hari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lakukan pendinginan eksternal</li> </ul> <p>Hasil : klien diberikan pendingin eksternal dengan menggunakan alat pendingin</p> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu</li> </ul> <p>Hasil : pasien diberikan cairan ringer laktat 1.500 per 24 jam</p>	<p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhu 38,8°C</li> <li>- Tubuh klien teraba hangat</li> <li>- TD : 130/75 mmHg</li> <li>- HR : 122 x/menit</li> <li>- RR : 28 x/menit</li> </ul> <p><b>A</b> : masalah hipertermi belum teratasi</p> <p><b>P</b> : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab hipertermi</li> <li>- Monitor suhu tubuh</li> <li>- Monitor komplikasi akibat hipertermi</li> <li>- Ganti linen setiap hari</li> <li>- Lakukan pendinginan eksternal</li> <li>- Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit</li> </ul>
<p>07.10 WITA</p>	<p><b>Perawatan luka</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor karakteristik luka</li> </ul> <p>Hasil : luka di kepala tampak masih basah, terdapat cairan berwarna</p>	<p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luka masih basah, cairan kuning sudah tidak merembes</li> <li>- Luka pada bokong tampak kemerahan</li> </ul>

<p>07.20 WITA</p> <p>07.40 WITA</p> <p>14.00 WITA</p>	<p>kuning yang merembes. Luka pada bokong berwarna kemerahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda-tanda infeksi</li> </ul> <p>Hasil : Suhu meningkat yaitu 38,8<sup>o</sup>c</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersihkan luka dengan cairan NaCL atau pembersih nontoksik</li> </ul> <p>Hasil : luka dibersihkan dengan cairan NaCL 0,9 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berikan salep yang sesuai dengan kulit</li> </ul> <p>Hasil : luka tidak diberikan salep dan langsung di verbalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasang balutan sesuai jenis luka</li> </ul> <p>Hasil : luka dibalut dengan kasa setelah itu di rekatkan dengan hypafix</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan tehnik steril saat melakukan perawatan luka</li> </ul> <p>Hasil : mencuci tangan sebelum dan sesudah perawatan luka, menggunakan handscoon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien</li> </ul> <p>Posisi pasien diubah setiap 2 jam</p> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian antibiotik, jika perlu</li> </ul> <p>Hasil : pasien diberikan ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhu tubuh 38,8<sup>o</sup>C</li> <li>- Perawatan luka dilakukan setiap hari</li> <li>- Posisi diubah setiap 2 jam sekali</li> </ul> <p><b>A</b> : masalah gangguan integritas kulit belum teratasi</p> <p><b>P</b> : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor karakteristik luka</li> <li>- Monitor tanda-tanda infeksi</li> <li>- Bersihkan luka dengan cairan NaCL</li> <li>- Berikan sa lep yang sesuai dengan kulit</li> <li>- Pasang balutan yang sesuai dengn jenis luka</li> <li>- Pertahankan tehnik steril saat melakukan perawatan luka</li> <li>- Perubahan posisi setiap 2 jam</li> </ul> <p>Kolaborasi pemberian antibiotik</p>
<p>15.30 WITA</p> <p>15.35 WITA</p> <p>21.00 WITA</p>	<p><b>Pencegahan Infeksi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</li> </ul> <p>Hasil : suhu klien 38,7<sup>o</sup>C, tidak ada pus pada luka post operasi</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batasi jumlah pengunjung</li> </ul> <p>Hasil : jumlah pengunjung dibatasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</li> </ul> <p>Hasil : perawat selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi</li> </ul> <p>Hasil : tehnik aseptik dipertahankan</p> <p><b>Kolaborasi</b></p>	<p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhu tubuh 38,7<sup>o</sup>C</li> <li>- Perawat tampak mencuci tangan sebelum melakukan tindakan aseptik</li> <li>- Tidak ada kunjungan bagi pasien yang dirawat di ruang ICU</li> <li>- WBC : 15,7</li> </ul> <p><b>A</b> : masalah infeksi belum teratasi</p> <p><b>P</b> : intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda dan gejala infeksi</li> <li>- Batasi jumlah pengunjung</li> <li>- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu</li> </ul> <p>Hasil : pasien diberi ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam</p>	
<p>Jumat, 02 September 2022</p> <p>08.30 WITA</p> <p>08.40 WITA</p> <p>09.00 WITA</p>	<p><b>Manajemen Jalan Napas</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)</li> </ul> <p>Hasil : frekuensi napas 36 kali/menit, tidak ada retraksi otot dada, pasien tampak bernapas dengan dada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor bunyi napas</li> </ul> <p>Hasil : terdapat bunyi napas tambahan yaitu ronkhi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor sputum</li> </ul> <p>Hasil : terdapat sputum dengan dengan tekstur kental</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posisikan semi fowler atau supinasi</li> </ul> <p>Hasil : pasien diberikan posisi semi fowler head up 15-30 derajat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik</li> </ul> <p>Hasil : klien di suction setiap 15 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berikan oksigen, jika perlu</li> </ul> <p>Hasil : terpasang nasal kanul dengan oksigen 4 liter/menit</p> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu</li> </ul> <p>Hasil : pasien di nebulizer sebelum di suction</p>	<p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frekuensi napas 27 x/menit</li> <li>- Retraksi otot dada ada</li> <li>- Ada bunyi napas tambahan yaitu ronkhi</li> <li>- Terpasang oksigen 5-6 liter per menit</li> </ul> <p><b>A</b> : Masalah bersihan jalan napas belum teratasi</p> <p><b>P</b> : lanjutkan intervensi manajemen jalan napas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor pola napas</li> <li>- Monitor bunyi napas</li> <li>- Monitor sputum</li> <li>- Posisikan semi fowler atau supinasi</li> <li>- Lakukan pengisapan lendir</li> <li>- Berikan oksigen</li> </ul> <p>Kolaborasi pemberian bronkodilator, mukolitik, jika perlu</p>
09.10 WITA	<p><b>Pemantauan tekanan intrakranial</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab peningkatan TIK</li> </ul> <p>Hasil : pasien mengalami trauma kepala dengan ICH dan SDH, pasien post op craniectomy hari ke-7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor peningkatan TD</li> </ul> <p>Hasil : 144/88 mmHg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tingkat kesadaran</li> </ul> <p>Hasil : kesadaran samnolen dengan nilai GCS 8 E 4 M 3 V1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan</li> </ul>	<p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai rata-rata TD sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 133/82 mmHg</li> <li>- Nilai rata-rata TD setelah pemberian intervensi yaitu 126/80 mmHg</li> <li>- Nilai rata-rata HR sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 135 x/menit</li> </ul>



<p>09.25 WITA</p> <p>09.30 WITA</p> <p>14.30 WITA</p> <p>21.10 WITA</p>	<p>Hasil : pernapasan 36 x/menit, SPO2 100%</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan posisi kepala dan leher netral Hasil : posisi kepala klien dalam keadaan netral</li> <li>- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien Hasil : interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit</li> <li>- Berikan terapi non farmakologis Hasil : klien diberi terapi <i>Family Auditory Sensory Training</i> selama 10 menit</li> <li>- Dokumentasikan hasil pemantauan Hasil :</li> </ul> <table border="1" data-bbox="602 592 1319 884"> <thead> <tr> <th>Intervensi (jam)</th> <th>TD</th> <th>HR</th> <th>RR</th> <th>Suhu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pre 1 (09.30)</td> <td>144/88</td> <td>142</td> <td>36</td> <td>37,9</td> </tr> <tr> <td>Post 1 (09.45)</td> <td>135/85</td> <td>137</td> <td>27</td> <td>37,9</td> </tr> <tr> <td>Pre 2 (14.30)</td> <td>130/80</td> <td>130</td> <td>30</td> <td>37,8</td> </tr> <tr> <td>Post 2 (14.45)</td> <td>122/78</td> <td>130</td> <td>26</td> <td>37,8</td> </tr> <tr> <td>Pre 3 (21.10)</td> <td>125/78</td> <td>132</td> <td>24</td> <td>37,9</td> </tr> <tr> <td>Post 3 (21.25)</td> <td>120/76</td> <td>128</td> <td>24</td> <td>37,9</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="602 919 1319 1086"> <thead> <tr> <th>GCS</th> <th>Pre 1</th> <th>Post 1</th> <th>Pre 2</th> <th>Post 2</th> <th>Pre 3</th> <th>Post 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Intervensi (jam)	TD	HR	RR	Suhu	Pre 1 (09.30)	144/88	142	36	37,9	Post 1 (09.45)	135/85	137	27	37,9	Pre 2 (14.30)	130/80	130	30	37,8	Post 2 (14.45)	122/78	130	26	37,8	Pre 3 (21.10)	125/78	132	24	37,9	Post 3 (21.25)	120/76	128	24	37,9	GCS	Pre 1	Post 1	Pre 2	Post 2	Pre 3	Post 3	E	4	4	4	4	4	4	M	3	4	4	4	4	4	V	1	1	1	2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai rata-rata HR setelah pemberian intervensi selama satu hari yaitu 125 x/menit</li> <li>- Nilai rata-rata RR sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 30 x/menit</li> <li>- Nilai rata-rata RR setelah pemberian intervensi selama satu hari yaitu 26 x/menit</li> <li>- Nilai rata-rata suhu sebelum pemberian intervensi selama sehari yaitu 37,8°C</li> <li>- Nilai rata-rata suhu setelah pemberian intervensi selama sehari yaitu 37,8°C</li> <li>- Nilai GCS sebelum interensi selama sehari yaitu GCS 8x E4 M3 V1</li> <li>- Nilai GCS setelah intervensi selama sehari yaitu GCS 10 E4 M4 V2</li> </ul> <p><b>A</b> : masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial belum teratasi</p> <p><b>P</b> : Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab peningkatan TIK</li> <li>- Monitor peningkatan TD</li> <li>- Monitor tingkat kesadaran</li> <li>- Pertahankan posisi kepala dan leher netral</li> <li>- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien</li> <li>- Berikan terapi non farmakologis</li> <li>- Dokuemntasikan hasil pemantauan</li> </ul>
Intervensi (jam)	TD	HR	RR	Suhu																																																													
Pre 1 (09.30)	144/88	142	36	37,9																																																													
Post 1 (09.45)	135/85	137	27	37,9																																																													
Pre 2 (14.30)	130/80	130	30	37,8																																																													
Post 2 (14.45)	122/78	130	26	37,8																																																													
Pre 3 (21.10)	125/78	132	24	37,9																																																													
Post 3 (21.25)	120/76	128	24	37,9																																																													
GCS	Pre 1	Post 1	Pre 2	Post 2	Pre 3	Post 3																																																											
E	4	4	4	4	4	4																																																											
M	3	4	4	4	4	4																																																											
V	1	1	1	2	1	2																																																											
<p>10.00 WITA</p>	<p><b>Manajemen nyeri</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi skala nyeri Hasil : skala nyeri diukur dengan VAS, klien tampak menyeringai sekali-kali, gelisah, mengerang sekali-kali, dan dapat ditenangkan dengan</li> </ul>	<p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skala nyeri 3</li> <li>- Pasien tampak masih gelisah</li> </ul>																																																															

<p>10.05 WITA</p> <p>10.10 WITA</p>	<p>sentuhan, skala nyeri klien 4</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam, terapi murattal)</li> </ul> <p>Hasil : klien diberikan kompres dingin</p> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.</li> </ul> <p>Hasil : klien diberi metamizole 1 gram setiap 8 jam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TD : 137/85 mmHg</li> <li>- HR : 137 x/menit</li> <li>- RR : 287x/menit</li> <li>- S : 37,9°C</li> </ul> <p><b>A</b> : masalah nyeri akut belum teratasi</p> <p><b>P</b> : Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi skala nyeri</li> <li>- Berikan terapi non farmakologi</li> <li>- Kolaborasi pemberian analgetik</li> </ul>
<p>10.15 WITA</p> <p>10.20 WITA</p> <p>10.30 WITA</p>	<p><b>Manajemen hipertermi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab hipertermi</li> </ul> <p>Hasil : post op craniectomy hari ke-7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor suhu tubuh</li> </ul> <p>Hasil : suhu 37,9°C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor komplikasi akibat hipertermi</li> </ul> <p>Hasil : pasien tampak tidak kejang</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ganti linen setiap hari</li> </ul> <p>Hasil : linen diganti setiap hari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lakukan pendinginan eksternal</li> </ul> <p>Hasil : klien diberikan pendingin eksternal dengan menggunakan alat pendingin</p> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu</li> </ul> <p>Hasil : pasien diberikan cairan ringer laktat 1.500 per 24 jam</p>	<p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhu 37,9°C</li> <li>- Tubuh klien teraba hangat</li> <li>- TD : 137/85 mmHg</li> <li>- HR : 137x/menit</li> <li>- RR : 287x/menit</li> </ul> <p><b>A</b> : masalah hipertermi belum teratasi</p> <p><b>P</b> : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab hipertermi</li> <li>- Monitor suhu tubuh</li> <li>- Monitor komplikasi akibat hipertermi</li> <li>- Ganti linen setiap hari</li> <li>- Lakukan pendinginan eksternal</li> <li>- Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit</li> </ul>
<p>07.10 WITA</p>	<p><b>Perawatan luka</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor karakteristik luka</li> </ul> <p>Hasil : luka di kepala tampak masih basah, luka tampak tidak merembes. Luka pada bokong berwarna kemerahan.</p>	<p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luka masih basah, cairan kuning sudah tidak merembes</li> <li>- Luka pada bokong tampak kemerahan</li> <li>- Suhu tubuh 37,9°C</li> </ul>

<p>07.20 WITA</p> <p>07.45 WITA</p> <p>14.00 WITA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda-tanda infeksi Hasil : Suhu tubuh klien yaitu 37,9°C</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersihkan luka dengan cairan NaCL atau pembersih nontoksik Hasil : luka dibersihkan dengan cairan NaCL 0,9 %</li> <li>- Berikan salep yang sesuai dengan kulit Hasil : luka tidak diberikan salep dan langsung di verban</li> <li>- Pasang balutan sesuai jenis luka Hasil : luka dibalut dengan kasa setelah itu di rekatkan dengan hypafix</li> <li>- Pertahankan tehnik steril saat melakukan perawatan luka Hasil : mencuci tangan sebelum dan sesudah perawatan luka, menggunakan handscoon</li> <li>- Jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien Posisi pasien diubah setiap 2 jam</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian antibiotik, jika perlu Hasil : pasien diberikan ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawatan luka dilakukan setiap hari</li> <li>- Posisi diubah setiap 2 jam sekali</li> </ul> <p><b>A</b> : masalah gangguan integritas kulit belum teratasi</p> <p><b>P</b> : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor karakteristik luka</li> <li>- Monitor tanda-tanda infeksi</li> <li>- Bersihkan luka dengan cairan NaCL</li> <li>- Berikan salep yang sesuai dengan kulit</li> <li>- Pasang balutan yang sesuai dengn jenis luka</li> <li>- Pertahankan tehnik steril saat melakukan perawatan luka</li> <li>- Perubahan posisi setiap 2 jam</li> <li>- Kolaborasi pemberian antibiotik</li> </ul>
<p>15.30 WITA</p> <p>15.35 WITA</p> <p>21.00 WITA</p>	<p><b>Pencegahan Infeksi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil : suhu klien 37,8°C, pasien di kompres</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batasi jumlah pengunjung Hasil : jumlah pengunjung dibatasi</li> <li>- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil : perawat selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien</li> <li>- Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi Hasil : tehnik aseptik dipertahankan</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p>	<p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhu tubuh 37,8°C</li> <li>- Perawat tampak mencuci tangan sebelum melakukan tindakan aseptik</li> <li>- Tidak ada kunjungan bagi pasien yang dirawat di ruang ICU</li> <li>- WBC : 15,7</li> </ul> <p><b>A</b> : masalah infeksi belum teratasi</p> <p><b>P</b> : intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda dan gejala infeksi</li> <li>- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien</li> <li>- Pertahankan tehnik aseptik pada pasien berisiko tinggi</li> <li>- Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu</li> </ul> <p>Hasil : pasien diberi ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam dan paracetamol drips</p>	
<p>Sabtu, 03 September 2022</p> <p>08.30 WITA</p> <p>08.40 WITA</p> <p>09.00 WITA</p>	<p><b>Manajemen Jalan Napas</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)</li> </ul> <p>Hasil : frekuensi napas 30 kali/menit, ada retraksi otot dada, pasien tampak bernapas dengan dada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor bunyi napas</li> </ul> <p>Hasil : terdapat bunyi napas tambahan yaitu ronkhi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor sputum</li> </ul> <p>Hasil : terdapat sputum dengan dengan tekstur kental</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posisikan semi fowler atau supinasi</li> </ul> <p>Hasil : pasien diberikan posisi semi fowler head up 15-30 derajat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik</li> </ul> <p>Hasil : klien di suction setiap 15 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berikan oksigen, jika perlu</li> </ul> <p>Hasil : terpasang nasal kanul dengan oksigen 4 litermenit</p> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu</li> </ul> <p>Hasil : pasien di nebulizer setiap 8 jam</p>	<p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frekuensi napas 28 x/menit</li> <li>- Retraksi otot dada ada</li> <li>- Ada bunyi napas tambahan yaitu ronkhi</li> <li>- Terpasang oksigen 5-6 liter per menit</li> </ul> <p><b>A</b> : Masalah bersihan jalan napas belum teratasi</p> <p><b>P</b> : lanjutkan intervensi manajemen jalan napas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor pola napas</li> <li>- Monitor bunyi napas</li> <li>- Monitor sputum</li> <li>- Posisikan semi fowler atau supinasi</li> <li>- Lakukan pengisapan lendir</li> <li>- Berikan oksigen</li> <li>- Kolaborasi pemberian bronkodilator, mukolitik, jika perlu</li> </ul>
09.10 WITA	<p><b>Pemantauan tekanan intrakranial</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab peningkatan TIK</li> </ul> <p>Hasil : pasien mengalami trauma kepala dengan ICH dan SDH, pasien post op craniectomy hari ke-7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor peningkatan TD</li> </ul> <p>Hasil : 130/76 mmHg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tingkat kesadaran</li> </ul> <p>Hasil : kesadaran samnolen dengan nilai GCS 9 E 4 M 4 V1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan</li> </ul>	<p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai rata-rata TD sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 135/81 mmHg</li> <li>- Nilai rata-rata TD setelah pemberian intervensi yaitu 127/78 mmHg</li> <li>- Nilai rata-rata HR sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 134 x/menit</li> </ul>

<p>09.25 WITA</p> <p>09.30 WITA</p> <p>14.20 WITA</p> <p>21.15 WITA</p>	<p>Hasil : pernapasan 35 x/menit, SPO2 96%</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertahankan posisi kepala dan leher netral Hasil : posisi kepala klien dalam keadaan netral</li> <li>- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien Hasil : interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit</li> <li>- Berikan terapi non farmakologi Hasil: klien diberi terapi <i>Family Auditory Sensory Training</i> selama 10 menit</li> <li>- Dokumentasikan hasil pemantauan</li> </ul> <p>Hasil :</p> <table border="1" data-bbox="600 593 1319 884"> <thead> <tr> <th>Intervensi (jam)</th> <th>TD Sistolik</th> <th>HR</th> <th>RR</th> <th>Suhu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pre 1 (09.30)</td> <td>130/76</td> <td>132</td> <td>30</td> <td>38,6</td> </tr> <tr> <td>Post 1 (09.45)</td> <td>122/75</td> <td>135</td> <td>28</td> <td>38,6</td> </tr> <tr> <td>Pre 2 (14.20)</td> <td>135/80</td> <td>130</td> <td>26</td> <td>38,2</td> </tr> <tr> <td>Post 2 (14.35)</td> <td>130/78</td> <td>126</td> <td>26</td> <td>38,2</td> </tr> <tr> <td>Pre 3 (21.15)</td> <td>140/87</td> <td>140</td> <td>32</td> <td>37,9</td> </tr> <tr> <td>Post 3 (21.30)</td> <td>130/80</td> <td>130</td> <td>30</td> <td>37,9</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="600 922 1319 1088"> <thead> <tr> <th>GCS</th> <th>Pre 1</th> <th>Post 1</th> <th>Pre 2</th> <th>Post 2</th> <th>Pre 3</th> <th>Post 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Intervensi (jam)	TD Sistolik	HR	RR	Suhu	Pre 1 (09.30)	130/76	132	30	38,6	Post 1 (09.45)	122/75	135	28	38,6	Pre 2 (14.20)	135/80	130	26	38,2	Post 2 (14.35)	130/78	126	26	38,2	Pre 3 (21.15)	140/87	140	32	37,9	Post 3 (21.30)	130/80	130	30	37,9	GCS	Pre 1	Post 1	Pre 2	Post 2	Pre 3	Post 3	E	4	4	4	4	4	4	M	4	4	4	4	4	5	V	1	2	1	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai rata-rata HR setelah pemberian intervensi selama satu hari yaitu 132 x/menit</li> <li>- Nilai rata-rata RR sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 29 x/menit</li> <li>- Nilai rata-rata RR setelah pemberian intervensi selama satu hari yaitu 27 x/menit</li> <li>- Nilai rata-rata suhu sebelum pemberian intervensi selama sehari yaitu 38,2°C</li> <li>- Nilai rata-rata suhu setelah pemberian intervensi selama sehari yaitu 38,2°C</li> <li>- Nilai GCS sebelum interensi selama sehari yaitu GCS 9 E4 M4 V1</li> <li>- Nilai GCS setelah intervensi selama sehari yaitu GCS 11 E4 M5 V2</li> </ul> <p><b>A:</b> masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial belum teratasi</p> <p><b>P:</b> Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab peningkatan TIK</li> <li>- Monitor peningkatan TD</li> <li>- Monitor tingkat kesadaran</li> <li>- Pertahankan posisi kepala dan leher netral</li> <li>- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien</li> <li>- Berikan terapi non farmakologis</li> <li>- Dokuemntasikan hasil pemantauan</li> </ul>
Intervensi (jam)	TD Sistolik	HR	RR	Suhu																																																													
Pre 1 (09.30)	130/76	132	30	38,6																																																													
Post 1 (09.45)	122/75	135	28	38,6																																																													
Pre 2 (14.20)	135/80	130	26	38,2																																																													
Post 2 (14.35)	130/78	126	26	38,2																																																													
Pre 3 (21.15)	140/87	140	32	37,9																																																													
Post 3 (21.30)	130/80	130	30	37,9																																																													
GCS	Pre 1	Post 1	Pre 2	Post 2	Pre 3	Post 3																																																											
E	4	4	4	4	4	4																																																											
M	4	4	4	4	4	5																																																											
V	1	2	1	2	2	2																																																											
<p>10.00 WITA</p>	<p><b>Manajemen nyeri</b> <b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi skala nyeri Hasil : skala nyeri diukur dengan VAS, klien tampak menyeringai sekali-kali, tidak gelisah, mengerang sekali-kali, dan dapat ditenangkan dengan</li> </ul>	<p><b>S:</b> tidak dapat dikaji</p> <p><b>O:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skala nyeri 3</li> <li>- Pasien tampak masih gelisah</li> </ul>																																																															

<p>10.05 WITA</p> <p>10.10 WITA</p>	<p>sentuhan, skala nyeri klien 3</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam, terapi murattal)</li> </ul> <p>Hasil : klien diberikan kompres</p> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.</li> <li>- Hasil : klien diberi metamizole 1 gram setiap 8 jam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TD : 122/75 mmHg</li> <li>- HR : 135 x/menit</li> <li>- RR : 28 x/menit</li> <li>- S : 38,6<sup>o</sup>C</li> </ul> <p><b>A</b> : masalah nyeri akut belum teratasi</p> <p><b>P</b> : Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi skala nyeri</li> <li>- Berikan terapi non farmakologi</li> <li>- Kolaborasi pemberian analgetik</li> </ul>
<p>10.15 WITA</p> <p>10.20 WITA</p> <p>10.30 WITA</p>	<p><b>Manajemen hipertermi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab hipertermi</li> </ul> <p>Hasil : post op craniectomy hari ke-8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor suhu tubuh</li> </ul> <p>Hasil : suhu 38,6<sup>o</sup>C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor komplikasi akibat hipertermi</li> </ul> <p>Hasil : pasien tampak tidak kejang</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ganti linen setiap hari</li> </ul> <p>Hasil : linen diganti setiap hari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lakukan pendinginan eksternal</li> </ul> <p>Hasil : klien diberikan pendingin eksternal dengan menggunakan alat pendingin</p> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu</li> </ul> <p>Hasil : pasien diberikan cairan ringer laktat 1.500 per 24 jam</p>	<p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhu 38,6<sup>o</sup>C</li> <li>- Tubuh klien teraba hangat</li> <li>- TD : 122/75 mmHg</li> <li>- HR : 132 x/menit</li> <li>- RR : 28 x/menit</li> </ul> <p><b>A</b> : masalah hipertermi belum teratasi</p> <p><b>P</b> : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab hipertermi</li> <li>- Monitor suhu tubuh</li> <li>- Monitor komplikasi akibat hipertermi</li> <li>- Ganti linen setiap hari</li> <li>- Lakukan pendinginan eksternal</li> <li>- Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit</li> </ul>
<p>07.20 WITA</p>	<p><b>Perawatan luka</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor karakteristik luka</li> </ul> <p>Hasil : luka di kepala tampak masih basah, luka tampak tidak merembes. Luka pada bokong berwarna kemerahan.</p>	<p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luka masih basah, cairan kuning sudah tidak merembes</li> <li>- Luka pada bokong tampak kemerahan</li> <li>- Suhu tubuh 38,2<sup>o</sup>C</li> </ul>

<p>07.25 WITA</p> <p>07.50 WITA</p> <p>14.00 WITA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda-tanda infeksi Hasil : Suhu meningkat yaitu 38,6<sup>o</sup>c</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersihkan luka dengan cairan NaCL atau pembersih nontoksik Hasil : luka dibersihkan dengan cairan NaCL 0,9 %</li> <li>- Berikan salep yang sesuai dengan kulit Hasil : luka tidak diberikan salep dan langsung di verbalan</li> <li>- Pasang balutan sesuai jenis luka Hasil : luka dibalut dengan kasa setelah itu di rekatkan dengan hypafix</li> <li>- Pertahankan tehnik steril saat melakukan perawatan luka Hasil : mencuci tangan sebelum dan sesudah perawatan luka, menggunakan handscoon</li> <li>- Jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien Posisi pasien diubah setiap 2 jam</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian antibiotik, jika perlu Hasil : pasien diberikan ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawatan luka dilakukan setiap hari</li> <li>- Posisi diubah setiap 2 jam sekali</li> </ul> <p><b>A</b> : masalah gangguan integritas kulit belum teratasi</p> <p><b>P</b> : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor karakteristik luka</li> <li>- Monitor tanda-tanda infeksi</li> <li>- Bersihkan luka dengan cairan NaCL</li> <li>- Berikan salep yang sesuai dengan kulit</li> <li>- Pasang balutan yang sesuai dengan jenis luka</li> <li>- Pertahankan tehnik steril saat melakukan perawatan luka</li> <li>- Perubahan posisi setiap 2 jam</li> <li>- Kolaborasi pemberian antibiotik</li> </ul>
<p>15.30 WITA</p> <p>15.35 WITA</p> <p>05.00 WITA</p>	<p><b>Pencegahan Infeksi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil : suhu klien 38,2<sup>o</sup>C, pasien di kompres</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil : perawat selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien</li> <li>- Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi Hasil : tehnik aseptik dipertahankan</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu Hasil : pasien diberi ceftriaxone 1 gram, setiap 8 jam dan paracetamol drips</li> </ul>	<p><b>S</b> : tidak dapat dikaji</p> <p><b>O</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhu tubuh 38,2<sup>o</sup>C</li> <li>- Perawat tampak mencuci tangan sebelum melakukan tindakan aseptik</li> <li>- Tidak ada kunjungan bagi pasien yang dirawat di ruang ICU</li> <li>- WBC : 9,0</li> </ul> <p><b>A</b> : masalah infeksi belum teratasi</p> <p><b>P</b> : intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda dan gejala infeksi</li> <li>- Batasi jumlah pengunjung</li> <li>- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien</li> </ul>

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Analisis Asuhan Keperawatan**

##### **5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan**

Pengkajian merupakan proses pengumpulan data maupun informasi baik subjektif maupun objektif seperti wawancara dengan pasien dan keluarga, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan pemeriksaan fisik serta peninjauan informasi riwayat pasien di buku rekam medis. Selain mengumpulkan data aktual, perawat juga mengumpulkan kekuatan yaitu untuk mengidentifikasi peluang promosi kesehatan dan risiko yaitu untuk mencegah penyakit atau potensi masalah yang dapat ditunda (Nurarif & Kusuma, 2015). Pengkajian keperawatan individu dilakukan fokus pada keluhan yang dialami pasien dan pemeriksaan fisik, pengkajian keluhan pasien dilakukan dengan cara wawancara sedangkan pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi (Teli, 2018).

Pasien dengan cedera kepala biasanya didapatkan keluhan utama yang berbeda-beda, seperti penurunan kesadaran, perdarahan di otak, hilangnya memori sesaat, sakit kepala, mual dan muntah, gangguan pendengaran, oedema pulmonal, kejang, infeksi, tanda herniasi otak, hemiparise, gegar otak, fraktur tengkorak (Andra Saferi Wijaya & Yessie Mariza Putri, 2013).



Pengkajian yang diperoleh pada Ny. S di *primary survey* menunjukkan bahwa klien mengalami penurunan kesadaran, datang ke IGD dengan kategori 1 yaitu pasien prioritas utama yang harus segera diberikan pertolongan. Mekanisme cedera yang dialami oleh pasien yaitu klien mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 23 agustus 2022 dan di bawa ke rumah sakit Pangkep kemudian dirujuk ke rumah sakit Wahidin pada tanggal 24 agustus 2022 karena klien mengalami penurunan kesadaran setelah 9 jam mengalami kecelakaan, terpasang ventilator pada klien dengan tingkat kesadaran koma nilai GCS E1 M1 Vx, TD 120/70 mmHg, HR 101 x/i, suhu 36,7°C, RR 24 x/i dengan intubasi. Keluar darah dari hidung dan telinga tidak ada, kejang tidak ada, muntah darah ada.

Pasien cedera kepala akan mengalami perdarahan di tengkorak, peningkatan tekanan intrakranial, dan penurunan tekanan perfusi otak. Jika keadaan semakin memburuk maka akan mengalami bradikardi (denyut nadi menurun) bahkan akan berkurangnya frekuensi respirasi. Tekanan darah dalam otak terus meningkat dan semua tanda vital terganggu kemudian akan mengakibatkan terjadinya penurunan kesadaran bahkan kematian (Widyawati, 2012). Hal ini sejalan dengan Muttaqin (2017) yang menyebutkan bahwa keadaan umum pada keadaan cedera kepala berat yaitu mengalami penurunan kesadaran dan perubahan pada tanda-tanda vital.

Trauma kepala berat (GCS >8) yaitu hilangnya kesadaran yang berkepanjangan atau yang disebut koma. Penurunan kesadaran dapat terjadi hingga beberapa bulan. Pasien tidak mampu mengikuti, bahkan perintah sederhana, karena gangguan penurunan kesadaran (Nasution, 2015).

### **5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan**

Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis tentang respon klien terhadap proses kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung maupun masalah kesehatan aktual maupun potensial (PPNI, 2017). Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada klien dengan trauma capitis berat yaitu pola napas tidak efektif, bersihan jalan napas tidak efektif, nyeri akut, penurunan kapasitas adaptif intrakranial, perfusi perifer tidak efektif, hipertermi/hipotermi, risiko kerusakan integritas kulit dan jaringan, dan risiko infeksi, risiko cedera dan risiko defisit nutrisi (Padila, 2012).

Berdasarkan pengkajian dan analisa data maka diperoleh enam diagnosis keperawatan pada pasien yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema cerebral, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (trauma kepala), hipertermi berhubungan dengan respon trauma, gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan penurunan mobilitas, dan risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif.

Pembahasan setiap diagnosis keperawatan yang muncul yaitu sebagai berikut:

- a. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan

Pengkajian diperoleh terdapat suara napas tambahan: ronchi dan snoring, terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi encer, kesadaran sopor dengan GCS 6x, E3 M3 Vx, asien tampak mampu batuk tapi tidak mampu mengeluarkan secret dari dalam mulutnya, HR 140 x/menit, RR 30 x/menit. Rendy M. Clevo (2012) menyebutkan bahwa pada pasien dengan cedera kepala akan mengalami gangguan pada pernafasan. Salah satu penyebabnya karena terjadinya penurunan kesadaran pada klien sehingga tidak mampu mengeluarkan secret dari dalam tubuhnya.

- b. Penurunan kapasitas intrakranial berhubungan dengan edema cerebral

Berdasarkan hasil pengkajian yaitu Pasien mengalami cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas, kesadaran klien menurun dengan nilai GCS 6x, E3 M3 Vx, TD : 137/85 mmH, HR : 140 x/menit. Sehingga, diperoleh diagnosis bahwa klien mengalami penurunan kapasitas adaptif intrakranial yaitu gangguan mekanisme dinamika intrakranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial. Hal ini disebabkan karena Edema serebral (mis. Akibat cedera kepala (hematoma epidural, hematoma

subarchnoid, hematoma intraserebral), stroke iskemik, stroke hemoragik, hipoksia, ensefalopati iskemik, pascaoperasi) (SDKI, 2017).

Hal ini sejalan dengan pendapat Brazinova dalam Ismoyowati (2021) bahwa mekanisme terjadinya perubahan fungsi otak pada cedera kepala terjadi karena rusaknya jaringan otak akibat cedera otak traumatis atau traumatic brain injury (TBI), yaitu bahwa terjadi edema serebral yang merupakan salah satu faktor utama penyebab mortalitas dan morbiditas. Prognosis pasien cedera kepala dipengaruhi oleh Glasgow Coma Scale (GCS) pasien tersebut, GCS merupakan parameter dalam menentukan prognosis pasien cedera kepala, semakin kecil nilai GCS, maka semakin buruk pula prognosis pasien cedera kepala.

c. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (trauma kepala)

Pasien dengan cedera kepala akan mengalami cedera pada jaringan otak akibat dari benturan langsung dan tidak langsung yang akan mengganggu fungsi dari otak. Fungsi penting dari sistem saraf di otak bergantung pada oksigen, glukosa, dan substansi lain. Jika terjadi gangguan suplai oksigen maka dapat menyebabkan penurunan kesadaran, dan sel-sel otak akan mati dalam waktu 3-4 menit. Penurunan suplai oksigen menyebabkan otak melangsungkan metabolisme secara anerob untuk mendapatkan energi. Sisa metabolisme anaerob berupa asam laktat dapat menyebabkan gangguan fungsi otak dan nyeri (Rini, et al., 2019). Pada pengkajian diperoleh

bahwa terdapat luka post op craniectomy, pasien tampak mengerang dan mengerutkan dahi jika kepalanya ditekan, kala nyeri 4 dengan VAS, TD 137/85 mmHg, HR 140 x/menit, RR 30 x/menit.

d. Hipertermi berhubungan dengan respon trauma

Pengkajian yang diperoleh pada Ny. S yaitu pasien post op craniectomy hari ke-5, terdapat luka post oprasi pada kepala, tubuh klien teraba hangat, suhu : 38,2°C. Hipertermia adalah suhu tubuh meningkat diatas rentang normal tubuh karena adanya respon trauma, proses penyakit dan peningkatan laju metabolisme (PPNI, 2017). Hal ini sejalan dengan Ismail (2019) bahwa hipertermi pada pasien dengan cedera kepala terjadi karena hipoksia jaringan otak akibat dari penurunan CBF yang signifikan dan terjadinya pembentukan edema, hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan suhu lebih tinggi daripada suhu normal.

e. Gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan penurunan mobilitas

Berdasarkan pengkajian pada Ny. S yaitu pasien post op craniectomy hari ke-5, terdapat luka dekubitus pada bokong, terdapat lesi pada ekstremitas atas dan bawah, esadaran menurun GCS 6x, E3 M3 Vx, seluruh aktivitas klien dibantu (total care). Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan kesadaran akibat trauma kepala sehingga klien mengalami imobilisasi akibatnya klien hanya tirah baring

sehingga akan terjadi penekanan pada daerah yang menonjol yang berujung pada kerusakan integritas kulit (Muttaqin, 2017).

f. Risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif

Risiko infeksi adalah berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik karena penyakit kronis, afek prosedur invasif dan peningkatan paparan organisme patogen lingkungan. Pada pengkajian diperoleh pasien post op craniectomy hari ke 5, terpasang NGT ukuran 18 Fr terpasang sejak 6 hari yang lalu, terpasang kateter urine terpasang sejak 6 hari yang lalu, terdapat luka dekubitus pada bokong klien, hasil hematologi rutin: WBC 15,7 (normal: 4.00-10.00  $10^3/uL$ ), HGB 11.0 (normal: 12.0-16.0 gr/dl), HCT 33 (normal: 37.0-48.0).

Berdasarkan Padila (2012) diagnosis yang seharusnya muncul pada pasien dengan cedera kepala berat yaitu sepuluh diagnosis berupa pola napas tidak efektif, bersihan jalan napas tidak efektif, nyeri akut, penurunan kapasitas adaptif intrakranial, perfusi perifer tidak efektif, hipertermi/hipotermi, risiko kerusakan integritas kulit dan jaringan, dan risiko infeksi, risiko cedera dan risiko defisit nutrisi. Namun, pada kasus hanya ditemukan 6 diagnosis. Salah satunya karena pada klien tidak mengalami hambatan upaya napas berupa deformitas pada dinding dada dan otot pernapasan tidak lemah, sehingga pola napas klien tidak bermasalah (PPNI, 2017).

### 5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan

Perencanaan keperawatan pada Ny. H disusun menggunakan buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia dimana perencanaan ini baru dapat disusun apabila data yang telah terkumpul sudah dianalisis dan diprioritaskan. Perencanaan ini dibuat untuk mengatasi permasalahan pasien dengan tahap tindakan dimulai dari observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi.

Intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosis pertama bersihan jalan napas yaitu manajemen jalan napas untuk memperbaiki frekuensi pernapasan klien. Penerapan manajemen jalan nafas dengan memposisikan pasien dalam posisi semi fowler terbukti dapat meningkatkan saturasi oksigen sehingga menghasilkan pola nafas yang optimal (Musri & Yudistirawati, 2021). Diagnosis kedua penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan intervensi pemantauan tekanan intrakranial untuk meningkatkan kesadaran pada klien. Salah satu intervensi yang efektif dilakukan dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial yaitu auditori dengan mendengarkan suara rekaman keluarga (Mohammadi & Yeganeh, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian Ismoyowati (2021) bahwa Auditory stimulation menggunakan suara orang terdekat (keluarga terdekat/orang yang dicintai) merupakan yang paling efektif diberikan untuk terapi

meningkatkan status kesadaran atau skor GCS pada pasien cedera kepala.

Diagnosis ketiga nyeri akut diberikan intervensi manajemen nyeri untuk menurunkan skala nyeri pada klien, dan diagnosis keempat hipertermi diberikan intervensi yaitu manajemen hipertermi untuk menurunkan suhu tubuh klien pada suhu normal (PPNI, 2018). Aziza & Adimayanti (2021) menyebutkan bahwa pemberian kompres hangat efektif dalam menurunkan demam pada pasien yaitu dari  $38,8^{\circ}\text{C}$  menjadi  $36,6^{\circ}\text{C}$ . Sejalan dengan penelitian Sarah (2019) bahwa penanganan pada pasien dewasa yang mengalami masalah hipertermi adalah kompres hangat yang dilakukan selalama tiga hari dengan terbukti dapat menurunkan suhu tubuh.

Sementara itu diagnosis ke lima yaitu gangguan integritas kulit dan jaringan diberikan intervensi perawatan luka untuk mempercepat pemulihan luka dan mencegah terjadinya infeksi, dan diagnosis terakhir yaitu risiko infeksi diberikan intervensi berupa pencegahan infeksi untuk mencegah terjadinya infeksi pada klien mengingat terdapat luka post op craniectomy dan luka dekubitus pada bokong klien (PPNI, 2018).

Berdasarkan studi kasus klien Ny. H, semua intervensi pada diagnosis keperawatan dapat dilakukan pasien dan tidak ditemukan adanya intervensi yang tidak sesuai dengan kasus. Tujuan dari asuhan keperawatan berdasarkan (PPNI, 2019) yang telah disusun pada setiap diagnosis diharapkan dapat tercapai.



#### 5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada klien Ny. H dilakukan selama tiga hari perawatan pada tanggal 01-03 Agustus 2022 diruang ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI. Implementasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan sesuai dengan masalah keperawatan yang ditemukan pada klien.

Implementasi mandiri perawat yang dapat dilakukan pada diagnosis bersihan jalan napas yaitu manajemen jalan napas berupa monitor pola napas dan bunyi napas setiap 2 jam sekali, monitor sputum, pemberian posisi semi fowler dan suction serta terapi oksigen 5-6 liter/menit. Posisi semi fowler diberikan kepada pasien untuk menjaga bersihan jalan napas pada pasien. Hal ini sejalan dengan penelitian (Adika, 2022) bahwa posisi semi fowler efektif dalam memperbaiki jalan napas pada pasien. Penerapan manajemen jalan nafas dengan memposisikan pasien dalam posisi semi fowler terbukti dapat meningkatkan saturasi oksigen sehingga menghasilkan pola nafas yang optimal (Musri & Yudistirawati, 2021).

Sementara itu, Perawat dapat melakukan tindakan mandiri berupa pemantauan tekanan intrakranial disertai pemberian terapi non farmakologis untuk meningkatkan GCS pada masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Tindakan yang dilakukan yaitu monitor

tekanan intrakranial dan terpai nonfarmakologi berupa *Familiar Auditory Sensory Training* 3 kali dalam sehari selama 3 hari berturut-turut. Berdasarkan penelitian (Mohammadi & Yeganeh, 2019) salah satu intervensi yang efektif dilakukan dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial yaitu auditori dengan mendengarkan suara rekaman keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ismoyowati, 2021) bahwa Auditory stimulation menggunakan suara orang terdekat (keluarga terdekat/orang yang dicintai) merupakan yang paling efektif diberikan untuk terapi meningkatkan status kesadaran atau skor GCS pada pasien cedera kepala.

Intervensi kompres hangat merupakan salah kegiatan mandiri perawat yang diberikan kepada pasien untuk mengatasi masalah hipertermia dan nyeri akut di samping tindakan kolaboratif pemberian analgetik. Berdasarkan Menurut (Haryani & Adimayanti, 2018) pada proses pemberian kompres hangat memberikan efek penyaluran sinyal hipotalamus melalui keringat dan vasodilatasi perifer sehingga proses perpindahan panas terjadi melalui proses konduksi dan evaporasi.

Tindakan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan masalah gangguan integritas kulit dan jaringan serta risiko infeksi yaitu perawatan luka untuk mempercepat penyembuhan luka dan mencegah terjadinya infeksi. Ulkus decubitus merupakan kondisi dimana terjadi kerusakan atau kematian kulit sampai jaringan dibawahnya bahkan dapat menembus otot sampai mengenai tulang dan dapat mengganggu

proses pemulihan pasien dan biasanya di ikuti dengan nyeri yang berkepanjangan bahkan dapat menyebabkan terjadinya infeksi sehingga proses pemulihan pasien yang berlangsung lama dan dapat menambah panjang lama perawatan (Herman et al., 2021).

### **5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan**

Berdasarkan hasil studi kasus, evaluasi sumatif pada masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif setelah diberikan intervensi selama 3 hari maka diperoleh bahwa frekuensi napas klien sedikit membaik meskipun belum stabil yaitu dari RR 30 x/menit menjadi RR 28 x/menit. Selain itu, pada hari ke tiga sudah tidak ada bunyi tambahan pada pernapasan dan intervensi dilanjutkan hingga kondisi klien stabil. Hal ini sejalan dengan penelitian Adika (2022) bahwa posisi semi fowler efektif dalam memperbaiki jalan napas pada pasien.

Evaluasi sumatif pada masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intrakranial setelah 3 hari intervensi terjadi peningkatan nilai GCS pada pasien yaitu pada hari pertama GCS 7x E4 M3 Vx, hari kedua GCS 9 E4 M3 V1, hari ke tiga GCS 11 E4 M5 V2. Meskipun status hemodinamik pada klien belum stabil tapi setiap selesai pemberian intervensi status hemodinamik pasien mengalami perubahan meskipun tidak signifikan yaitu hari pertama pre TD 135/75 post 130/75, pre HR 140 x/menit post 122 x/menit, pre RR 30 x/menit post RR 30 x/menit. Salah satu intervensi yang efektif dilakukan dengan masalah penurunan

kapasitas adaptif intrakranial yaitu auditori dengan mendengarkan suara rekaman keluarga (Mohammadi & Yeganeh, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian Ismoyowati (2021) bahwa Auditory stimulation menggunakan suara orang terdekat (keluarga terdekat/orang yang dicintai) merupakan yang paling efektif diberikan untuk terapi meningkatkan status kesadaran atau skor GCS pada pasien cedera kepala.

Selain itu, evaluasi sumatif pada masalah keperawatan nyeri selama 3 hari intervensi terjadi penurunan skala nyeri dari 4 menjadi 3, klien masih tampak gelisah. Kemudian, masalah hipertermi belum teratasi di mana suhu klien masih tidak stabil yaitu  $38,6^{\circ}\text{C}$  dan tubuh terasa hangat. Meskipun telah diberikan intervensi terapi non farmakologis namun salah satu penyebab terjadinya hipertermi pada pasien cedera kepala karena adanya respon trauma (PPNI, 2017).

Evaluasi sumatif masalah keperawatan gangguan integritas kulit dan jaringan setelah 3 hari intervensi belum ada perbaikan yang signifikan yaitu pasien luka pasien post operasi hari ke-6 masih basah, luka dekubitus pada bokong klien belum membaik. Selain itu, masalah keperawatan risiko infeksi setelah 3 hari intervensi ditemukan bahwa suhu klien belum stabil yaitu  $38,2^{\circ}\text{C}$  namun hasil lab WBC klien membaik yaitu 9,0. Sehingga, intervensi tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan tindakan yang lebih modern seperti perawatan luka modern. Perawatan luka modern dressing sangat memiliki tingkat


penyembuhan yang lebih cepat sehingga Modern dressing mampu untuk mempertahankan lingkungan lembab dan yang seimbang dengan permukaan luka (Meilin, et al., 2019).

## 5.2 Analisis Intervensi EBPN

Pada studi kasus ini, asuhan keperawatan pada klien Ny. H yang mengalami masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan intervensi familiar auditory sensory training selama 3 hari intervensi. Intervensi diberikan 1 hari sebanyak 3 kali dengan memperdengarkan rekaman dari keluarga terdekat klien.

### 5.2.1 Tekanan Darah (TD)

Diagram 5.1 Tekanan Darah



Keterangan :  
 TD sistol/diastol 1 = TD hari pertama  
 TD sistol/diastol 2 = TD hari ke dua  
 TD sistol/diastol 3 = TD hari ke tiga  
 Rata-rata Pre = Rata-rata sebelum intervensi  
 Rata-rata Post = Rata-rata setelah intervensi

Berdasarkan hasil pemantauan dari hari pertama sampai hari ke tiga maka diperoleh hasil bahwa terjadi perbedaan tekanan darah sebelum dan setelah intervensi dengan hasil perbedaan yang


signifikan yaitu perubahan TD setelah dilakukan intervensi pada hari terakhir 135/81 mmHg menjadi 127/78 mmHg.

Klien mengalami perubahan pada status hemodinamik yaitu tekanan darah setelah diberikan intervensi berupa *familiar auditory sensory training*. Hal ini, menunjukkan bahwa penurunan kapasitas adaptif intrakranial pada klien membaik. Salah satu tanda dan gejala terjadinya penurunan kapasitas adaptif intrakranial yaitu tekanan darah meningkat penyebabnya yaitu edema serebral karena cedera kepala dan iskemik serebral (PPNI, 2017).

Dengan demikian, peneliti berasumsi bahwa terjadi perubahan status hemodinamik yaitu tekanan darah pada klien cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran menggunakan intervensi *familiar auditory sensory training* selama tiga hari berturut-turut.

### 5.2.2 Nadi (HR)

Diagram 5.2 Nadi (*Heart Rate*)




Keterangan :	HR	= Nadi
	HR 1	= HR hari pertama
	HR 2	= HR hari ke dua
	HR 3	= 3 hari ke tiga
	Rata-rata Pre	= Rata-rata sebelum intervensi
	Rata-rata Post	= Rata-rata setelah intervensi

Pemantauan terhadap tekanan nadi dilakukan selama tiga hari dan dalam satu hari dilakukan tiga kali pemantauan yaitu pagi, sore, dan malam hari. Berdasarkan pemantauan diperoleh bahwa terjadi perubahan pada nadi setelah diberikan intervensi meskipun perubahannya tidak signifikan, seperti pada hari pertama sebelum intervensi HR 133 x/menit, setelah intervensi HR 125 x/menit, hari ke dua sebelum diberi intervensi yaitu HR 135 x/menit dan setelah diberi intervensi yaitu HR 132 x/menit, dan hari ke tigasebelum intervensi HR 134 xmenit, setelah intervensi 130 xmenit.

Salah satu tanda dan gejala terjadinya penurunan kapasitas adaptif intrakranial yaitu melebarnya tekanan nadi penyebabnya yaitu edema serebral karena cedera kepala dan iskemik serebral (PPNI, 2017). Meskipun tekanan darah klien membaik namun nadi pasien belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Beberapa hal yang menyebabkan denyut nadi meningkat yaitu mengonsumsi obat-obatan seperti obat tiroid, alergi, obat batuk, dan faktor psikologis seperti cemas dan stress. Seseorang dengan penurunan kesadaran pada fase delirium akan menyebabkan gangguan emosi seperti cemas, depresi dan paranoid (Kemenkes RI, 2019).

### 5.2.3 Pernapasan (RR)

Diagram 5.3 Pernapasan (*Respiration Rate*)



Keterangan : RR = Pernapasan  
 RR 1 = RR hari pertama  
 RR 2 = RR hari ke dua  
 RR 3 = RR hari ke tiga  
 Rata-rata Pre = Rata-rata sebelum intervensi  
 Rata-rata Post = Rata-rata setelah intervensi

Pemantauan pernapasan (RR) dilakukan selama tiga hari berturut-turut sama halnya dengan tekanan darah dan nadi. Hasil pemantauan diperoleh bahwa setelah diberikan intervensi familiar auditory sensory training kepada klien terjadi perubahan jumlah pernapasan dalam satu menit namun tidak terlalu signifikan dan belum menunjukkan hasil pernapasan yang stabil. Selain itu, karena terjadinya penurunan kesadaran pada pasien sehingga terjadi bersihan jalan napas pada klien yang menyebabkan tertahannya secret di dalam tubuh klien sehingga pernapasan klien menjadi takipneu.


Pasien dengan cedera kepala akan mengalami gangguan pada pernafasan. Salah satu penyebabnya karena terjadinya penurunan kesadaran pada klien sehingga tidak mampu mengeluarkan secret



dari dalam tubuhnya Rendy M. Clevo (2012). Perubahan pada sistem pernapasan bergantung pada gradasi blok saraf parasimpatis dan perubahan karena adanya kerusakan jalur simpateetik descending akibat trauma pada tulang belakang sehingga mengalami terputus jaringan saraf di medula spinalis, pemeriksaan fisik yaitu klien tampak batuk, terjadi peningkatan produksi sputum, dan sesak napas.

#### 5.2.4 Suhu

Diagram 5.4 Suhu



Keterangan : Suhu 1 = Suhu hari pertama  
 Suhu 2 = Suhu hari ke dua  
 Suhu 3 = Suhu hari ke tiga  
 Rata-rata Pre = Rata-rata sebelum intervensi  
 Rata-rata Post = Rata-rata setelah intervensi


Berdasarkan pemantauan pada suhu yang dilakukan selama tiga hari berturut-turut, maka diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan intervensi tidak ada perubahan pada suhu klien mulai dari hari pertama hingga hari ke tiga. Selain karena terjadinya penurunan kesadaran pada klien terdapat juga luka post operasi dan

luka decubitus pada klien sehingga risiko infeksi akan meningkat yang berakibat pada respon suhu tubuh yang meningkat.

Luka kepala terbuka akibat cedera kepala dengan pecahnya tengkorak atau luka penetrasi, besarnya cedera kepala pada tipe ini ditentukan oleh massa dan bentuk dari benturan, kerusakan otak juga dapat terjadi jika tulang tengkorak menusuk dan masuk kedalam jaringan otak dan melukai durameter saraf otak, jaringan sel otak akibat benda tajam/tembakan, cedera kepala terbuka memungkinkan kuman pathogen memiliki abses langsung ke otak (Brunner and Suddarth, 2013). Sehingga, intervensi yang sudah direncanakan untuk masalah hipertermi dan risiko infeksi harus dijalankan dengan maksimal untuk mencegah terjadinya komplikasi pada klien.

### 5.2.5 Glasgow Coma Scale

Diagram 5.5 *Glasgow Coma Scale (GCS)*



Keterangan : V = Verbal  
M = Motorik  
E = Eye  
Pre 1 = hari pertama sebelum intervensi  
Post = hari pertama setelah intervensi

Pre 2 = hari ke dua sebelum intervensi  
Post 2 = hari ke dua setelah intervensi  
Pre 3 = Hari ke tiga sebelum intervensi  
Post 3 = Hari ke tiga setelah intervensi

Berdasarkan pemantauan nilai GCS selama 3 hari maka diperoleh hasil yang signifikan yaitu terjadi peningkatan nilai GCS mulai dari hari pertama sampai hari ke tiga setelah pemberian intervensi. Sebelum intervensi nilai GCS 6x E3 M3 Vx dan setelah intervensi hari pertama nilai GCS 8 E4 M3 V1, hari ke dua sebelum intervensi nilai GCS 8 E4 M3 V1 setelah intervensi nilai GCS 10 E4 M4 V2, hari ke tiga sebelum intervensi nilai GCS 9 E4 M4 V1 setelah intervensi nilai GCS 11 E4 M5 V2. Dengan demikian kondisi kesadaran pasien meningkat setelah pemberian intervensi dari GCS 6 E3 M3 Vx yaitu sopor menjadi GCS 11 E4 M5 V2 yaitu delirium. Hal ini sejalan dengan penelitian Mohammadi & Yeganeh (2019) yang menunjukkan bahwa stimulasi pendengaran dengan suara akrab anggota keluarga pasien dapat meningkatkan nilai GCS di antara pasien dengan kepala trauma setelah tiga hari.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ismoyowati (2021) menyebutkan bahwa auditory stimulation dapat meningkatkan nilai Glasgow Coma Scale (GCS) atau status kesadaran. Auditory stimulation yang diberikan adalah suara orang terdekat (keluarga terdekat atau orang yang dicintai merupakan yang paling efektif diberikan untuk terapi meningkatkan status kesadaran atau skor GCS pada pasien cedera kepala. Penelitian yang dilakukan oleh Aripriatiwi

& Jon Hafan Sutawardana (2020) Hasil uji perbedaan nilai GCS pretest dan posttest pada kelompok perlakuan didapatkan nilai  $p$  value = 0,001 ( $p$  value < 0,05) sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata nilai GCS pretest posttest pada kelompok intervensi, selain itu pada uji beda selisih nilai GCS pretest dan posttest pada kelompok kontrol dan perlakuan diperoleh nilai  $p$  value = 0,010 ( $p$  value < 0,05). Hal ini dapat diartikan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara selisih nilai GCS pada kelompok kontrol dan perlakuan. Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh FAST dalam meningkatkan nilai GCS pada pasien dengan penurunan kesadaran.

Salah satu intervensi non farmakologi yakni stimulasi sensori auditori berupa Familiar Auditory Sensory Training (FAST). FAST merupakan suatu intervensi dimana pasien yang menerima intervensi mendengarkan suara yang direkam secara digital, rekaman tersebut merupakan rekaman suara orang yang dikenal dekat dengannya, rekaman berisi suatu kisah yang berkesan dengan pasien (Pape et al., 2018). Diantara berbagai indera yang distimulasi, stimulasi indera pendengaran lebih banyak berefek kepada pasien (Tavangar et al., 2015). Mekanisme dari auditori yakni batang otak akan aktif ketika adanya rangsangan auditori untuk keadaan terjaga dan bangun, kemudian nucleus genitikum medialis thalamus menyortir serta menyalurkan sinyal ke korteks terutama ke temporalis kiri dan kanan, korteks pendengaran (lobus temporalis) akan mempersepsikan suara,

sementara pada korteks pendengaran yang lain akan mengintegrasikan berbagai macam suara menjadi pola yang lebih berarti, mekanisme inilah yang memungkinkan stimulasi auditori mencapai batang otak dan korteks untuk diaktivasi meskipun kondisi klinis saat itu sedang terjadi penurunan kesadaran (Safri, et al., 2018).

Dengan demikian peneliti beramsumsi bahwa terapi *Familiar Auditory Sensory Training* dapat meningkatkan nilai GCS pada pasien. Hal ini tentunya tidak lepas dari pertolongan Allah swt sebagai pemelik hambanya. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-qur'an surah Al-Imran 3:173.

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

*Terjemahan : “Cukuplah Allah yang menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baiknya pelindung”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak gentar lalu patah semangat ketika cobaan sedang menimpanya. Sebaliknya, mereka justru bertambah yakin terhadap prtolongan Allah (Shihab, 2009). Hal ini berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis bahwa ketika sedang mengalami cobaan maka hadapilah cobaan tersebut dan dekatkanlah diri kepada Allah swt. Karena sebaik-baiknya penolong hanyalah Allah swt.

### 5.3 Keterbatasan

Intervensi yang diberikan dalam penelitian ini merupakan intervensi mandiri yang dapat dilakukan oleh perawat untuk membantu

meningkatkan kesadaran pada klien sehingga klien dapat kembali beraktivitas seperti semula. Namun, selain intervensi non farmakologis diberikukan juga intervensi farmakologis seperti pemberian obat monitol 20% untuk tekanan intrakranial dan propranolol 20 mg untuk tekanan darah tinggi pada klien. Sehingga, memungkinkan terjadinya bias dalam penelitian ini. Namun, tidak bisa dipungkiri dari berbagai penelitian telah menemukan bahwa intervensi *Familiar Auditory Sensory Training* terbukti dapat meningkatkan nilai GCS pada pasien dengan cedera kepala berat. Sehingga, penggunaan intervensi ini dapat digunakan sebagai kombinasi antara terapi farmakologis dan terapi non farmakologis. Hal ini sejalan dengan peran perawat sebagai pelaku atau pemberi asuhan keperawatan secara langsung maupun tidak langsung kepada klien yang meliputi pengkajian, perumusan diagnosis keperawatan, penusunan intervensi keperawatan, melaksanakan implementasi keperawatan dan melakukan evaluasi keperawatan (Kemenkes, 2022).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

##### **6.1.1 Pengkajian Keperawatan**

Pengkajian yang diperoleh pada Ny. S di *primary survey* menunjukkan bahwa klien mengalami penurunan kesadaran, datang ke IGD dengan kategori 1 yaitu pasien prioritas utama yang harus segera diberikan pertolongan. Mekanisme cedera yang dialami oleh pasien yaitu klien mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengalami penurunan kesadaran setelah 9 jam mengalami kecelakaan, terpasang ventilator pada klien dengan tingkat kesadaran koma nilai GCS E1 M1 V<sub>x</sub>, TD 120/70 mmHg, HR 101 x/i, suhu 36,7°C, RR 24 x/i dengan intubasi. Kondisi saat ini post craniectomy hari ke 5 dengan kesadaran sopor nilai GCS E3 M3 V<sub>x</sub>, TD 137/85 mmHg, HR 140 x/menit, RR 30 x/menit, suhu 38,2°C, SPO2 100%. Hal ini menyebabkan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial.

Kemudian, pada pengkajian breathing diperoleh pola napas klien meningkat, terdengar bunyi tambahan yaitu ronkhi sehingga terjadi bersihan jalan napas tidak efektif pada klien. Selanjutnya, pada pengkajian rasa aman nyeri didapatkan bahwa klien mengalami nyeri dengan skala 4, klien tampak gelisah dan mengerang jika diberi rangsangan nyeri. Pada saat pengkajian ditemukan suhu tubuh klien meningkat yaitu 38,2°C, WBC meningkat yaitu 15,0 , terdapat luka

post operasi hari ke 5, terdapat luka dekubitus pada bokong, sehingga pasien mengalami hipertermi dan berisiko mengalami infeksi. Kemudian pada pengkajian *bone* diperoleh bahwa terjadi gangguan mobilitas fisik dan defisit perawatan diri yaitu penurunan kekuatan otot pada pasien, pergerakan pasif, dan seluruh aktifitas klien dibantu secara total.

### **6.1.2 Diagnosis Keperawatan**

Berdasarkan pengkajian dan analisa data diperoleh 8 diagnosis keperawatan yang ditegakkan pada klien Ny. H yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, penurunan kapasitas intrakranial berhubungan dengan edema serebral, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (trauma kepala), hipertermi berhubungan dengan respon trauma, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuromuskuler, gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan penurunan mobilitas, Risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif.

### **6.1.3 Intervensi Keperawatan**

Intervensi keperawatan pada diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif diberikan manajemen jalan napas, untuk diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan terapi pemantauan tekanan intrakranial, kemudian diagnosis nyeri akut diberikan



manajemen nyeri, untuk diagnosis hipertermi diberikan manajemen hipertermi, sedangkan gangguan mobilitas fisik diberikan latihan gerak pasif, untuk defisit perawatan diri diberikan dukungan perawatan diri, selanjutnya gangguan integritas kulit diberikan perawatan luka, dan diagnosis risiko infeksi diberikan intervensi pencegahan infeksi.

#### **6.1.4 Implementasi Keperawatan**

Pelaksanaan tindakan keperawatan dilakukan pada klien selama tiga hari berturut-turut yaitu pada tanggal 01-03 agustus 2022 di ruang ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, khusus diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan 3 hari dan dalam 1 hari diberikan sebanyak 3 kali sebagai upaya untuk meningkatkan nilai GCS klien. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI.

#### **6.1.5 Evaluasi Keperawatan**

Evaluasi tindakan keperawatan terhadap klien diperoleh bahwa semua intervensi pada diagnosis keperawatan masih harus dilanjutkan meskipun sudah teratasi sebagian mengingat klien adalah pasien cedera kepala dengan post operasi hari-8 dan masih membutuhkan bantuan dan dukungan secara total.

#### **6.1.6 Intervensi EBP**

Intervensi EBP yang diberikan sebagai salah satu tindakan mandiri perawat dalam membantu meningkatkan nilai GCS pada

klien yaitu *Familiar Auditory Sensory Training* (FAST) dengan memperdengarkan rekaman suara keluarga terdekat klien. Dalam pemberian intervensi diperoleh bahwa terdapat peningkatan nilai GCS yaitu dari GCS 6 menjadi GCS 11, hal ini telah didukung beberapa penelitian bahwa terapi FAST berpengaruh terhadap peningkatan GCS pasien.

## **6.2 Saran**

### **6.2.1 Bagi Mahasiswa**

Terapi *Familiar Auditory Sensory Training* sebaiknya diberikan dengan menjaga lingkungan disekitar pasien tetap kondusif yaitu tidak ada suara atau kebisingan yang mengganggu jalannya terapi.

### **6.2.2 Bagi Perawat**

Terapi *Familiar Auditory Sensory Training* dapat dilakukan pada pasien dengan penurunan kesadaran selama 10 menit sebanyak 3 kali sehari secara berturut-turut hingga nilai GCS pasien membaik.


## DAFTAR PUSTAKA

- Aripratiwi, C., & Jon Hafan Sutawardana, M. H. (2020). Pengaruh Familiar Auditory Sensory Training Pada Tingkat Kesadaran. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 137–146. <https://doi.org/10.17509/jpki.v6i2.26917>
- ATLS. (2017). *Abdominal and Pelpic Trauma: In: Advanced Trauma Life Support for Doctors ATLS Student Course Manual 8th*. American College of Surgeons. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1993.tb07026.x>.
- Aziza, S. N., & Adimayanti, E. (2021). Pengelolaan Hipertermi pada Anak Dengan Riwayat Kejang Demam Sederhana di Desa Krajan Banyubiru. *Journal of Holistics and Health Sciences*, 3(2).
- Bect, P. &. (2012). *Resource Manual for Nursing Research. Generating and Assessing Evidance for Nursing Practice Ninth Edition*. Lippincott.
- Brunner and Suddarth. (2013). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. EGC.
- Enny, V. Y., & Endah, D. A. (2015). Pengaruh Stimulasi Auditorik Terapi Musik Terhadap Nilai Glasgow Coma Scale (GCS) Pada Pasien Cedera Otak Sedang. In *STIKes Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto*. STIKES Bina Sehat PPNI.
- Grap MJ, Munro CL, Wetzel PA, K., & JM, Ketchum JS, Anderson WL, et al. (2016). *Stimulation of critically ill patients: relation\_ship to sedation*. *Am J Crit Care*. <https://doi.org/DOI: 10.4037/AJCC2016269>
- Haddad, S.H., & Arabi, Y. M. (2016). *Critical care manajementof severe traumatic brain injury in adults*. *Scan J Trauma ResuscEmerg Med* 20 (12) :1-15.
- Haryani, S., Adimayanti, E., & A., & P., A. (2018). Pengaruh Tepid Sponge Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak Pra Sekolah Yang Mengalami Demam Di Rsud Ungaran. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 7(1), 44., 1. <https://doi.org/10.31596/jcu.v%0A0i0.212>.
- Herman, A., Thalib, S., Ningsih, L. W., Studi, P., Akademi, D. K., & Makassar, K. (2021). *Efektifitas Perawatan Luka Decubitus Dengan Metode Modern Dressing Terhadap Proses Penyembuhan Luka : Literatur Review*. XI, 37–44.
- Ismoyowati, T. W. (2021). Stimulasi Auditori pada Pasien Cedera Kepala dengan Penurunan Kesadaran. *Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 12.
- J, S. (2016). *Preliminary framework for familiar auditory sensory training (FAST) provided*. <https://doi.org/DOI: 10.3389/FPSYG. 2016.01118>

- Kementrian Kesehatan, R. (2019). *Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia tahun 2018*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kementrian Kesehatan, R. (2022). *Peran Perawat Sebagai Konselor: Yankes Kemkes*.
- Kinanti Adika, C. (2022). APPLICATION OF AIRWAY MANAGEMENT IN PATIENTS POST CRANIOTOMY. *Inovasi Penelitian*, 3(4), 5815–5820.
- Manurung, N. (2018). *Keperawatan Medikal Bedah Konsep, Mind Mapping dan NANDA NIC NOC* (TIM (ed.)).
- Maulidya S, Cecep EK, U. R. (2019). Stimulasi Auditori Pada Pasien Cedera Kepala Dengan Penurunan Kesadaran: Sistematis Review.tle. *Keperawatan Dan Kesehatan*, 1. <https://ppjp.ulm.id/journal/index.php/JDK/article/view/6239>
- Meilin, A., Sidabutar, B., Patty, R. A., & Simanjuntak, S. (2019). *Gambaran Pengetahuan Perawat Tentang Perawatan Luka Modern Dressing Di Satu Rumah Sakit Swasta Di Indonesia Barat*. 1. <https://doi.org/10.33088/Jkr.V>
- Mohammadi, M. K., & Yeganeh, M. R. (2019). *The Effects of Familiar Voices on the Level of Consciousness among Comatose Patients : A Single-Blind Randomized Controlled Trial*. 27(2), 1–8. <https://doi.org/10.9734/JPRI/2019/v27i230164>
- Musri, & Yudistirawati, N. (2021). Comparison Of Positioning Between Semi-Fowler's And Left Lateral To Oxygen Saturation In Ventilated Patients: A Quasi-Experimental Study: Comparison Of Positioning Between Semi-Fowler's And Left Lateral To Oxygen Saturation In Ventilated Patients: A Quasi. *Quality : Jurnal Kesehatan*, 15(2), 142–152, 2.
- Muttaqin, A. (2017). *Asuhan Keperawatan Klien Dengan Gangguan Sistem Persarafan*. Salemba Medika.
- Nasution, S. H. (2015). MILD HEAD INJURY. *In Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Medula*, 2(4).
- Nurarif, A. H., & Kusuma, H. (2015). *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis & NANDA NIC-NOC Jilid 1*. Medication.
- Nursalam. (2016). *Manajemen Keperawatan. Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Salemba Medika.
- Nursalam. (2017). *Konsep dan Penerapan Penelitian Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika.
- Padila, P. (2012). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. Nuha Medika.


- Pape T.L.B., Joshua M.R., Brett H., Vijaya P., A., G., Todd P., Kathleen F., C. B., & Shane M.N., Amy A. H., Bessie W., X. W. (2018). Preliminary framework for familiar auditory sensory training (FAST) provided during coma recovery. *JRRD*, 49.
- Peterson, A. B., Xu, L., Daugherty, J., & Breiding, M. J. (. (2019). *Surveillance Report of Traumatic Brain Injury-related Emergency Department Visits, Hospitalizations, and Deaths*. United States.
- PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Defenisi dan Indikator Diagnostik* (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Tindakan Keperawatan* (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Kriteria Hasil* (1st ed.). DPP PPNI.
- Rini, I. S., Suharsono, T., Ulya, I., Suryanto, Kartikawati, D., & Fathoni, M. (2019). *Buku Ajar Keperawatan pertolongan pertama gawat darurat*. UB Press.
- Ristanto, R. (2017). Diskripsi Klien Cedera Kepala Yang Mengalami Trauma Mayor. *Malang: Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti*.
- Safri, Irawaty, D., & Kariasa., I. M. (2018). *Murottal al-qur'an dapat meningkatkan kesadaran pasien stroke hemoragik*. 7–12.
- Sarah, F. (2019). *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dewasa Penderita Thypoid Fever Dengan Masalah Keperawatan Hipertermi*. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Shihab. (2009). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sylvia. M, L. (2019). *Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit*. EGC.
- Tarwoto. (2014). *Keperawatan Medikal Bedah Gangguan Sistem Persyarafan*. CV. Agung Seto.
- Tavangar, H., Kalantary, M. S., Salimi, T., &, & Jarahzadeh., M. (2015). *Effect of family members ' voice on level of consciousness of comatose patients admitted to the intensive care unit : a single blind randomized controlled trial*.
- Teli, M. (2018). *Pedoman Asuhan Keperawatan Komunitas*. Lima Bintang.
- Watson. (2011). *Nursing Theory*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Widyawati. (2012). *Konsep Dasar Keperawatan*. Prestasi Pustaka.

Yusuf, Z. K., R. (2019). Pengaruh Stimulasi Al-Qur'an Terhadap Glasgow Coma Scale Pasien Dengan Penurunan Kesadaran di Ruang ICU. *In Jambura Nurisng Journal*, 1(1). <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/jnj/44>



## LAMPIRAN

### 1. Pathway



(Sumber : Padila, 2012)

M A K A S S A R

## 2. Jurnal Rujukan Utama



*Journal of Pharmaceutical Research International*

27(2): 1-8, 2019; Article no.JPRI.48788

ISSN: 2456-9119

(Past name: British Journal of Pharmaceutical Research, Past ISSN: 2231-2919, NLM ID: 101631759)

### The Effects of Familiar Voices on the Level of Consciousness among Comatose Patients: A Single-Blind Randomized Controlled Trial

Mohammad Kazem Mohammadi<sup>1</sup>, Mohammad Reza Yeganeh<sup>1</sup>,  
Aida Mohammad Ebrahimzadeh<sup>2</sup>, Zahra Atrkar Roshan<sup>3</sup>, Mostafa Soodmand<sup>4</sup>  
and Moluk Pouralizadeh<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, IR Iran.

<sup>2</sup>Department of Nursing (Critical Care), Doctor Heshmat Educational Medical Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

<sup>3</sup>Department of Biostatistics, School of Medicine, Guilan University of Medical Science, Rasht, IR Iran.

<sup>4</sup>Department of Medical-Surgical Nursing, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, IR Iran.

#### Authors' contributions

This work was carried out in collaboration among all authors. Authors MKM, MRY and AME designed the study, managed the analyses of the study and wrote the protocol. Authors ZAR and MP performed the statistical analysis. Authors MS and MP managed the literature searches and wrote the first draft of the manuscript. All authors read and approved the final manuscript.

#### Article Information

DOI: 10.9734/JPRI/2019/v27i230164

#### Editor(s):

(1) Dr. Vasudevan Mani, Associate Professor, Department of Pharmacology and Toxicology, College of Pharmacy, Qassim University, Buraidah, Kingdom of Saudi Arabia.

#### Reviewers:

(1) Ganma Gupta, Rajiv Gandhi University of Health Sciences, India.

(2) Jorge A. Herrera, Florida International University, USA.

Complete Peer review History: <http://www.scitecresearch.com/review-history/48788>

Received 30 January 2019

Accepted 27 April 2019

Published 07 May 2019

Original Research Article

#### ABSTRACT

**Background:** Brain injury can reduce consciousness and the ability to respond to environmental stimulation.

**Objectives:** The aim of this study was to investigate the effects of familiar voices on the level of consciousness (LOC) among comatose patients with a brain injury hospitalized in the intensive care unit.

\*Corresponding author: E-mail: pouralizadehm@gmail.com, Pouralizadeh@gums.ac.ir;



DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/sf12nk232>

### Stimulasi Auditori pada Pasien Cedera Kepala dengan Penurunan Kesadaran

Tri Wahyuni Ismoyowati

Departemen Sarjana Keperawatan, STIKes Bethesda Yakkum Yogyakarta; maya@stikesbethesda.ac.id

Emiliana Binarti

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Ners, STIKes Bethesda Yakkum Yogyakarta;

binartiemiliana@gmail.com (koresponden)

Restu Mahanani

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Ners, STIKes Bethesda Yakkum Yogyakarta; nanarmhn@gmail.com

Silas

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Ners, STIKes Bethesda Yakkum Yogyakarta; silasbugz1@gmail.com

#### ABSTRACT

*Head injury is a disease that can decrease a person's level of consciousness. Based on the results of the 2018 Basic Health Research, the comparison of the incidence of head injuries in Indonesia in 2013 reached 8.2% of the population and in 2018 increased to 9.2%. Providing sensory stimulation in the form of auditory stimulation as early as possible is very important for survival, quality of life, and long-term prognosis in head injury patients because hearing is the last sense function that functions in decreased consciousness. This study aimed to determine the effect of auditory stimulation in head injury patients with decreased consciousness. This study utilized a literature review method. Some databases used such as ProQuest, NCBI, PubMed, and Google Scholar with the keywords "Cedera Otak Trauma", "Stimulasi Pendengaran", "Pasien Koma", "Tingkat Kesadaran". The inclusion criteria for articles taken were research published in 2010-2020, the type of experimental research, the study sample was head injury patients with decreased awareness, the intervention provided was in the form of auditory stimulation and the articles were written in English and Indonesian. The results of this literature study obtained 7 research articles that match the objectives and review criteria. The study concluded that auditory stimulation using the voice of the closest person in head injury patients has a significant effect on increasing awareness status with a p-value (0.001), so it can be recommended as an additional non-pharmacological therapy. This stimulation can be given 3-14 days of intervention for 5-15 minutes and given 2-3 times per day.*

**Keywords:** traumatic brain injury; auditory stimulation; comatose patient; level of consciousness

#### ABSTRAK

Cedera kepala merupakan penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kesadaran pada seseorang. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, perbandingan angka kejadian cedera kepala di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 8,2% dari populasi dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 9,2%. Pemberian stimulasi sensorik berupa stimulasi auditori sedini mungkin sangat penting untuk kelangsungan hidup, kualitas hidup dan prognosis jangka panjang pada pasien cedera kepala karena pendengaran merupakan fungsi indera yang paling akhir berfungsi pada penurunan kesadaran. Tujuan studi ini untuk mengetahui pengaruh stimulasi auditori pada pasien cedera kepala dengan penurunan kesadaran. Studi ini merupakan *literature review*. *Databased* yang digunakan yaitu *ProQuest, NCBI, PubMed dan Google Scholar* dengan kata kunci yang digunakan adalah "Cedera Otak Trauma", "Stimulasi Pendengaran", "Pasien Koma", "Tingkat Kesadaran". Kriteria inklusi artikel yang diambil yaitu penelitian yang diterbitkan pada tahun 2010-2020, jenis penelitian eksperimental, sampel penelitian adalah pasien cedera kepala dengan penurunan kesadaran, intervensi yang diberikan berupa stimulasi auditori dan artikel ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Hasil studi literatur ini diperoleh 7 artikel penelitian yang sesuai dengan tujuan dan kriteria review. Hasil telaah menyimpulkan bahwa stimulasi auditori menggunakan suara orang terdekat pada pasien cedera kepala berpengaruh signifikan terhadap peningkatan status kesadaran dengan p-value (0.001), sehingga dapat direkomendasikan sebagai terapi tambahan secara non farmakologis. Stimulasi ini dapat diberikan 3-14 hari intervensi selama 5-15 menit dan diberikan sebanyak 2-3 kali per hari

**Kata kunci:** cedera otak; stimulasi pendengaran; pasien koma; tingkat kesadaran

#### PENDAHULUAN

Cedera saat ini masih menjadi masalah kesehatan global. Cedera kepala paling banyak terjadi pada jenis kelamin laki-laki umur 15-24 tahun, hal ini diakibatkan karena mobilitas yang tinggi di kalangan usia produktif.<sup>(1)</sup> Angka kejadian cedera kepala di seluruh dunia pada tahun 2010 sekitar 2,5 juta orang, dan sudah mengakibatkan beban biaya ekonomi yang diperkirakan hampir 76,5 miliar dollar Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri kejadian cedera kepala setiap tahunnya diperkirakan mencapai 500.000 kasus, yang terdiri dari cedera kepala ringan sebanyak 296.678 kasus (59,3%), cedera kepala sedang sebanyak 100.890 kasus (20,17%) dan cedera kepala berat sebanyak 102.432 kasus (20,4%).<sup>(2)</sup> Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, angka kejadian cedera kepala di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 8,2% dari populasi dan pada tahun 2018 meningkat

### 3. Riwayat Hidup



Bau Santi Nur merupakan penulis Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Cedera Kepala Berat dengan Penurunan Kesadaran Menggunakan Intervensi *Familiar Auditory Sensory Training* di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo”. Lahir di Parang, 21 Juli 1999, penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Anak dari ayahanda Husman dan ibunda Kasmawati. Penulis yang akrab dipanggil Santi ini telah mengawali jenjang pendidikan formal di Desa Bonto Malling, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2005-2011 di SD Negeri Parang. Selanjutnya pada tahun 2011 hingga 2014 penulis menempuh pendidikan di SMP 4 Satap Parang dan pada tahun 2014 hingga 2017 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pasimasunggu Timur (Sekarang SMA Negeri 44 Selayar). Setelah lulus di SMA pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan. Selama menyangang sebagai siswa di SMP dan SMA penulis aktif dalam organisasi OSIS dan Pramuka. Kemudian, setelah menyangang sebagai mahasiswa penulis memasuki organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan.

#### 4. Turnitin

<b>22%</b>	<b>24%</b>	<b>4%</b>	<b>6%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
<b>1</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source		<b>14%</b>
<b>2</b>	<b>forikes-ejournal.com</b> Internet Source		<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>vm36.upi.edu</b> Internet Source		<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repository.poltekkes-denpasar.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repo.stikesperintis.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>journal.stikmakassar.com</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>pdfcoffee.com</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>repository.unair.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**5. Dokumentasi**



M A K A S S A R