

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN POST PARTUM
DENGAN NYERI AFTERPAINS MENGGUNAKAN TERAPI
EFFLEURAGE MASSAGE DIRUANG NIFAS
AL-GHANIYYUH RSIA SITI KHADIJAH
MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Oleh:

Fauziah Ayu Pratiwi, S.kep

Nim.70900121019

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2022/2023**

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN POST PARTUM
DENGAN NYERI AFTERPAINS MENGGUNAKAN TERAPI
EFFLEURAGE MASSAGE DIRUANG NIFAS
AL-GHANIYYUH RSIA SITI KHADIJAH
MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:

Fauziah Ayu Pratiwi, S.Kep

Nim.70900121019

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2022/2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauziah ayu pratiwi
NIM : 70900121019
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 12 April 1999
Jurusan/Prodi/Konsentrasi: Keperawatan/Ners/Keperawatan Maternitas
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Kompleks Tirta Garden, Blok B1/3, Toddopuli X
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Partum Dengan Nyeri Afterpains Menggunakan Terapi *Effleurage massage* Diruang Masa Nifas Al-Ghaniyyuh Rsia Sitti Khadijah Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Makassar,
Penyusun,

Fauziah Ayu Pratiwi

NIM: 70900121019

PENGESAHAN SKRIPSI

Tugas akhir Ners yang berjudul "*Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Postpartum Dengan Nyeri Afterpains Menggunakan Terapi Effleurage Massage Diruang Masa Nifas Al-Ghaniyyuh Rsia Sitti Khadijah Makassar*" yang disusun oleh Fauziah Ayu Pratiwi, S.Kep, NIM: 70900121019, Mahasiswa Program Studi Profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ners dalam Program Studi Profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 30 Desember 2022
*Kalender Hijriah

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Nurul Fadhilah Gani, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Wahyuddin G, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur atas rahmat Allah swt. sehingga karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Partum Dengan Nyeri Afterpains Menggunakan Terapi *Effleurage massage* Diruang Masa Nifas Al-Ghaniyyuh RSIA Sitti Khadijah Makassar” dapat terselesaikan dengan baik dan tidak lupa pula penulis persembahkan shalawat serta salam kepada Rasulullah saw. serta kepada para sahabat dan pengikutnya. Adapun tujuan dari penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah untuk memperoleh gelar Ners dari Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak oleh karenanya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang besar serta penghargaan kepada semua pihak, semoga Allah dapat membalas bantuan yang diberikan dengan pahala yang setimpal. Ucapan terima kasih saya persembahkan kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD serta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus UIN Alauddin Makassar.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menempuh pendidikan

3. Dr. Patima, S.Kep.,Ns., M.Kes selaku ketua Program Studi profesi Ners dan Syisnawati, S.Kep.,Ns., M.Kep., Sp.Kep.J selaku sekretaris Program Studi Profesi Ners, serta Dosen pengajar, bagian Tata Usaha dan Akademik bersama Staf yang selalu membagikan ilmunya serta memberikan bantuan, baik dalam proses pengurusan administrasi maupun proses penyusunan karya tulis ilmiah
4. Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku pembimbing I dan Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan bimbingan dan motivasi dari awal penulisan karya tulis ilmiah hingga penulis bisa sampai ke tahap ini.
5. Nurul Fadhilah Gani, S.Kep., Ns., M.Kep selaku penguji I dan Dr. Wahyuddin G, M.Ag selaku penguji II yang telah sabar meluangkan pikiran dan waktunya serta memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang mumpuni
6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Agussalim (Alm) dan Ibunda Erniati serta Kakak kandung Wahyuningsih dan Muhammad Zunuroin Habsar Maulana yang telah memberikan doa, motivasi, nasehat, dan fasilitas yang mendukung sehingga penulis mampu sampai ditahap yang sekarang
7. Kepada teman-teman seperjuangan, khususnya NERS angkatan XX yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak pihak yang turut serta membantu dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini, namun penulis tidak dapat ucapkan secara satu persatu. Semoga Allah swt. senantiasa membalas kebaikan dari

berbagai pihak dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian. Jangan berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah swt. Sekian dan terima kasih.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

	Halaman
1 Sampul	
2 Halaman Sampul	
Halaman Pernyataan Keaslian	i
Halaman Persetujuan	
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Halaman Abstrak	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Medis Masa Nifas	7
2.2 Konsep Dasar Nyeri	28
2.3 Konsep Asuhan Keperawatan	38
2.4 <i>Evidence Based Practice In Nursing</i>	67
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	73
3.1 Rancangan Studi Kasus	73
3.2 Subyek Studi Kasus.....	73
3.3 Fokus Studi Kasus	74
3.4 Instrumen Studi Kasus	74
3.5 Prosedur Pengambilan Data	75
3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi	75
3.7 Analisis Data dan Penyajian Data	75
3.8 Etika Studi kasus	76
BAB IV LAPORAN KASUS	78

4.1 Asuhan Keperawatan.....	78
BAB V PEMBAHASAN	79
5.1 Analisis Asuhan Keperawatan	111
5.2 Analisis <i>Evidence Based Practice In Nursing</i>	121
5.3 Keterbatasan	122
BAB VI PENUTUP	124
6.1 Kesimpulan	124
6.2 Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127
Lampiran 1: Pathway	130
Lampiran 2: Standar Operasional Prosedur	131
Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup	133
Lampiran 4: Jurnal Rujukan Utama	134



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Visual analog scale</i>	35
Gambar 2.2 <i>Verbal rating scale</i>	35
Gambar 2.3 <i>Numeric rating scale</i>	36
Gambar 2.4 <i>Wong baker pain rating scale</i>	36
Gambar 2.5 Kerangka kerja konseptual teori kenyamanan	38



ABSTRAK

Nama : Fauziah Ayu Pratiwi

Nim : 70900121019

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Partum Dengan Nyeri Afterpains Menggunakan Terapi *Effleurage massage* Diruang Masa Nifas Al-Ghaniyyuh Rsia Sitti Khadijah Makassar

Latar belakang: Post partum merupakan masa sejak bayi dilahirkan dan plasenta terlepas dari rahim, sampai 6 minggu berikutnya. Pada masa nifas seringkali muncul ketidaknyamanan yang dirasakan ibu salah satunya yaitu nyeri kontraksi uterus pada proses involusi uterus. Penanganan yang dapat diberikan pada ibu post partum dengan gangguan nyeri kontraksi uterus yang dapat mengganggu kenyamanan ibu adalah terapi farmakologis dan terapi nonfarmakologis. Terapi farmakologi berupa obat analgesik, sedangkan untuk terapi nonfarmakologi yang bisa diberikan untuk mengurangi nyeri kontraksi uterus yaitu terapi pemijatan. Salah satu bentuk terapi pemijatan yang dapat diberikan yaitu terapi *Effleurage massage*. **Tujuan** penulisan adalah untuk melakukan Analisis asuhan keperawatan pada pasien post partum dengan Nyeri afterpains menggunakan terapi *Effleurage massage* **Metode** yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan dengan melibatkan 2 responden. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Instrument pengumpulan data menggunakan format pengkajian asuhan keperawatan Post natal care dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan intervensi terapi *Effleurage massage* sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di ruang Al-Ghaniyyuh RSIA Sitti Khadijah Makassar yang dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 06-07 Juni 2022. Analisis data dan penyajian data pada studi kasus disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta dijadikan didalam teks dan bersifat naratif. **Hasil** : Setelah diberikan terapi *Effleurage massage*, kedua pasien mengalami penurunan skala nyeri yaitu dari skala ke skala 3 (NRS). **Kesimpulan** : Berdasarkan hasil evaluasi kasus yang dilakukan menyatakan bahwa penerapan terapi *Effleurage massage* 3 menit selama kontraksi berlangsung dan diulang sebanyak 3 kali, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dapat menurunkan skala nyeri dengan baik, hal ini mengindikasikan bahwa terapi ini efektif dilakukan dalam membantu menurunkan ketidaknyamanan pasca partum dengan nyeri afterpains.

Kata Kunci: Post partum, Nyeri afterpains, *Effleurage massage*

ABSTRAC

Nama : Fauziah Ayu Pratiwi

Nim : 70900121019

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Partum Dengan Nyeri Afterpains Menggunakan Terapi *Effleurage massage* Diruang Masa Nifas Al-Ghaniyyuh Rsia Sitti Khadijah Makassar

Latar belakang: Post partum merupakan masa sejak bayi dilahirkan dan plasenta terlepas dari rahim, sampai 6 minggu berikutnya. Pada masa nifas seringkali muncul ketidaknyamanan yang dirasakan ibu salah satunya yaitu nyeri kontraksi uterus pada proses involusi uterus. Penanganan yang dapat diberikan pada ibu post partum dengan gangguan nyeri kontraksi uterus yang dapat mengganggu kenyamanan ibu adalah terapi farmakologis dan terapi nonfarmakologis. Terapi farmakologi berupa obat analgesik, sedangkan untuk terapi nonfarmakologi yang bisa diberikan untuk mengurangi nyeri kontraksi uterus yaitu terapi pemijatan. Salah satu bentuk terapi pemijatan yang dapat diberikan yaitu terapi *Effleurage massage*. **Tujuan** penulisan adalah untuk melakukan Analisis asuhan keperawatan pada pasien post partum dengan Nyeri afterpains menggunakan terapi *Effleurage massage* **Metode** yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan dengan melibatkan 2 responden. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Instrument pengumpulan data menggunakan format pengkajian asuhan keperawatan Post natal care dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan intervensi terapi *Effleurage massage* sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di ruang Al-Ghaniyyuh RSIA Sitti Khadijah Makassar yang dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 06-07 Juni 2022. Analisis data dan penyajian data pada studi kasus disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta dijadikan didalam teks dan bersifat naratif. **Hasil** : Setelah diberikan terapi *Effleurage massage*, kedua pasien mengalami penurunan skala nyeri yaitu dari skala ke skala 3 (NRS). **Kesimpulan** : Berdasarkan hasil evaluasi kasus yang dilakukan menyatakan bahwa penerapan terapi *Effleurage massage* 3 menit selama kontraksi berlangsung dan diulang sebanyak 3 kali, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dapat menurunkan skala nyeri dengan baik, hal ini mengindikasikan bahwa terapi ini efektif dilakukan dalam membantu menurunkan ketidaknyamanan pasca partum dengan nyeri afterpains.

Kata Kunci: Post partum, Nyeri afterpains, *Effleurage massage*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Post partum atau biasa disebut puerperium merupakan masa sejak bayi dilahirkan dan plasenta terlepas dari rahim, sampai enam minggu (Sulfianti, 2021). Sebagian besar kematian ibu terjadi pada masa nifas yaitu 54,55%. Periode masa nifas yang berisiko terhadap kematian ibu terutama terjadi pada periode immediate post partum (50%), pada masa early post partum (20%) dan masa late post partum (5%). Masa nifas termasuk masa transisi bagi seorang ibu, bayi dan keluarga dari segi fisiologis, emosional serta sosial, baik pada negara maju maupun berkembang. Pada masa nifas, seringkali muncul ketidaknyamanan yang dapat dirasakan oleh ibu (Aldina *et al.*, 2022).

Ketidaknyamanan pasca partum merupakan perasaan tidak nyaman yang berhubungan dengan adanya proses melahirkan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). Perubahan fisiologis yang dialami oleh ibu, salah satunya adalah kontraksi uterus. Kontraksi uterus terjadi secara fisiologis sehingga menimbulkan nyeri yang dapat mengganggu kenyamanan ibu pada masa post partum. Nyeri susulan atau biasa disebut his royen berlangsung pada hari ke 2 sampai hari ke 3 setelah persalinan (Irda Novrida Ashar & Achmad Suardi, 2018).

Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan (aktual atau potensial) (Vitani, 2019). Nyeri yang dirasakan berhubungan dengan post partum

karena kontraksi uterus yang meningkat secara bermakna setelah bayi keluar. Hal tersebut diakibatkan karena pengeluaran hormone oksitosin yang dilepas oleh kelenjar hipofisis sehingga mampu memperkuat dan mengatur kontraksi uterus. Nyeri tidak hanya dirasakan pada proses melahirkan namun dirasakan juga oleh ibu pada masa post partum. Nyeri yang dirasakan dapat disebabkan karena luka jahitan pada perineum dan kontraksi uterus yang dirasakan ibu post partum, sehingga banyak yang mengeluh kurang nyaman setelah persalinan. Hal tersebut menjadi salah satu masalah pada ibu yang perlu mendapat penjelasan mengenai penanganan nyeri baik menggunakan terapi farmakologis maupun nonfarmakologis (Irda Novrida Ashar & Achmad Suardi, 2018).

Dalam Qs.Al-Baqarah yang berbunyi :

بَدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١٧

Terjemah :

“(Allah) pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka, jadilah sesuatu itu.”

Dalam tafsir Al-Muyassar atau Kementrian Agama Saudi Arabia menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh, dan apabila Allah mengatakan atau menetapkan sesuatu baik itu perkara, perencanaan sesuatu atau apapun yang ia kehendaki untuk mengadakannya, dia hanya berfirman “kun” jadilah, maka jadilah.

Pada ayat diatas dapat dikaitkan dengan masalah yang ada bahwa, sakit yang dirasakan pada saat melahirkan sampai setelah melahirkan bukanlah hal yang kebetulan. Itu semua karena Allah SWT yang menghendaki. Tidak ada yang

sulit untuk menghapus rasa sakit itu sehingga dengan mudah pula Allah mencabut rasa sakit yang dialami oleh ibu mulai dari proses melahirkan hingga rasa sakit setelah melahirkan. Apabila Allah bertitah “Kun” maka jadilah yang Allah kehendaki. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa rasa sakit pada saat melahirkan suatu hal yang wajar itu semua ketetapan Allah. Mengambil suatu tindakan untuk proses kesembuhan adalah salah satu bentuk usaha dan jika Allah mengendaki maka kesembuhan itu ada karena Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia melainkan ada hikmah dibalik rasa sakit yang dirasakan.

Terapi farmakologis berupa obat analgesik atau opioid untuk meringankan nyeri dapat menimbulkan efek samping dari penggunaan obat. Terapi non-farmakologis yang dapat diberikan salah satunya yaitu terapi massage. Terapi ini mampu meminimalisis bahkan menekan nyeri dengan minim efek samping atau bahkan tidak ada efek samping, salah satunya yaitu menggunakan terapi *Effleurage massage* (Harista, 2021).

Effleurage massage merupakan salah satu teknik relaksasi yang paling mudah dilakukan untuk memberikan rasa nyaman pada ibu postpartum. *Massage effleurage* merupakan suatu tehnik pemijatan yang menggunakan kedua telapak tangan yang diletakkan pada bagian perut ibu dengan gerakan melingkar kearah pusat dan simpisis pubis dengan gerakan searah. *Massage effleurage* dilakukan pada bagian abdomen mampu memberikan rangsangan terhadap saraf perifer eferen sampai ke lumbal pertama menuju spinal cord sebelum ditransmisikan ke otak. Selain itu dapat merangsang tubuh untuk melepaskan senyawa endorphin yang merupakan pereda sakit (Harista, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Parulian *et al.*, 2014) bahwa sebelum dilakukan teknik *massage effleurage* terdapat 20.000 ibu postpartum mengalami rata-rata rentang nyeri 3 sampai 7. Hasil penelitian setelah dilakukan *massage effleurage* sebanyak 20.000 ibu post partum mengalami penurunan nyeri kontraksi uterus dengan rentang 1 sampai 5. Pengaruh teknik *effleurage massage* berpengaruh terhadap perubahan nyeri pada ibu Postpartum.

Penelitian yang serupa dilakukan oleh (Fasikhatun, *et al.*, 2019) dalam jurnal “Gambaran Nyeri Sebelum Dan Sesudah Di Lakukan Tindakan *Effleurage massage* Kepada Ibu Post Partum Primipara Di Rsud Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga” bahwa Hasil pada kedua responden ibu post partum, pada responden pertama dengan usia 28 tahun, paritas primipara, dengan partus normal, dan dilakukan tindakan *effleurage massage* sebanyak 5 kali, sebelum dilakukan tindakan skala nyeri 4 dan sesudah tindakan skala nyeri menjadi 1, sedangkan pada responden kedua dengan usia 25 tahun, paritas primipara, dengan partus normal, dan dilakukan tindakan *effleurage massage* sebanyak 3 kali, sebelum dilakukan tindakan skala nyeri 4 dan sesudah tindakan skala nyeri menjadi 0 (Fasikhatun, *et al.*, 2019).

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Sitorus, 2020) menunjukkan bahwa intensitas nyeri pada ibu nifas sebelum dilakukan teknik *effleurage massage* mengalami nyeri sedang 73,3% dan nyeri ringan yaitu 26,7% , sesudah dilakukan *effleurage massage* sebanyak 83,3% mengalami nyeri ringan dan tidak mengalami nyeri 16,7 % . Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa teknik *effleurage massage* dapat digunakan sebagai terapi non farmakologi dapat mengatasi rasa

nyeri kontraksi uterus pada ibu nifas sehingga mengurangi rasa nyeri yang dirasakan ibu dan akan ibu merasa nyaman.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Partum Dengan Nyeri Afterpains Menggunakan Terapi *Effleurage massage* Diruang Masa Nifas Al-Ghaniyyuh RSIA Sitti Khadijah Makassar” ?

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Partum Dengan Nyeri Afterpains Menggunakan Terapi *Effleurage massage* Diruang Masa Nifas Al-Ghaniyyuh RSIA Sitti Khadijah Makassar ?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Partum Dengan Nyeri Afterpains Menggunakan Terapi *Effleurage massage* Diruang Masa Nifas Al-Ghaniyyuh RSIA Sitti Khadijah Makassar

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien post partum
- b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien post partum
- c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien post partum
- d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada pasien post partum
- e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan keperawatan pada pasien post partum

- f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien post partum dengan masalah nyeri afterpain menggunakan terapi *effleurage massage*.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan penerapan asuhan keperawatan pada pasien post partum dengan masalah nyeri (afterpain) menggunakan terapi *effleurage massage*.

1.4.2 Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian intervensi EBPN dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien post partum dengan masalah nyeri (afterpain) menggunakan terapi *effleurage massage* pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Konsep Medis Masa Nifas

2.1.1 Definisi

Post partum atau puerperium adalah masa sejak bayi dilahirkan dan plasenta keluar lepas dari rahim, sampai enam minggu berikutnya (Sulfianti, 2021). Post partum adalah masa pulihnya kembali kandungan seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung selama 6 minggu (Zubaidah *et al.*, 2021).

Puerperium berasal dari bahasa latin, yaitu puer artinya bayi dan partus artinya melahirkan atau masa setelah. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim setelah kelahiran, baik bersamaan dengan kelahirannya sang anak, setelah atau sebelumnya (2 atau 3 hari) yang disertai dengan rasa sakit (Purwanto & Rahayu, 2018).

2.1.1 Klasifikasi

Dalam buku (Sulfianti, 2021) klasifikasi post partum dibagi menjadi 3, yaitu :

- 1) Puerperium dini (immediate puerperium) yaitu pemulihan di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan (waktu 0-24 jam postpartum).
- 2) Puerperium intermedial (early puerperium) yaitu suatu masa dimana pemulihan dari organ-organ reproduksi secara menyeluruh selama kurang lebih 6-8 minggu.

3) Remote puerperium (later puerperium) yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan yang sempurna secara bertahap terutama jika selama masa kehamilan dan persalinan ibu mengalami komplikasi, waktu untuk sehat bisa berminggu-minggu, bulan bahkan tahun.

2.1.1 Perubahan Fisiologis pada masa nifas

Dalam jurnal (Purwanto & Rahayu, 2018) perubahan fisiologi dibagi menjadi 3 proses penting, yaitu :

- 1) Invulusi uteri atau pengecilan rahim
- 2) Hemokonsentrasi atau kekentalan darah kembali normal
- 3) Laktasi atau proses menyusui

Rahim merupakan organ tubuh yang spesifik dan unik karena dapat mengecil dan membesar dengan mengurangi atau menambah jumlah selnya. Ukuran rahim pada wanita yang tidak hamil sekitar 30 gr. Namun pada kehamilan, Rahim akan semakin membesar. Setelah bayi lahir, umumnya berat rahim menjadi 1000 gr dan dapat diraba kira-kira setinggi 2 jari dibawah umbilicus. (Purwanto & Rahayu, 2018).

Darah pada ibu hamil relatif encer karena jumlah cairan darah yang meningkat sementara sel darahnya berkurang. Pada pemeriksaan hemoglobin akan tampak sedikit menurun dari nilai normalnya. Jika hemoglobinnya terlalu rendah, maka bisa jadi anemia. Setelah melahirkan, sistem sirkulasi darah akan kembali normal (Purwanto & Rahayu, 2018).

Proses laktasi muncul setelah plasenta terlepas. Plasenta mengandung hormone prolactin yang menghambat pembentukan ASI. Setelah plasenta terlepas, hormone prolactin tidak dihasilkan lagi, sehingga produksi ASI keluar 3 sampai 3 hari pasca persalinan. Hal luar biasa yaitu sebelumnya dipayudara sudah terbentuk kolostrum yang sangat baik untuk bayi, karena kolostrum banyak mengandung zat kaya gizi dan antibody pembunuh kuman (Purwanto & Rahayu, 2018).

1) Perubahan system reproduksi

a. Perubahan uterus

Involusi uterus merupakan proses pengembalian uterus ke keadaan sebelum hamil. Kontraksi uterus menyebabkan iskemia pada lokasi pelekatan plasenta sehingga jaringan perlekatan antara plasenta dan dinding uterus mengalami nekrosis dan lepas. Uterus mengecil kembali setelah 2 hari setelah persalinan, setinggi sekitar umbilicus, setelah 2 minggu masuk panggul, setelah 4 minggu akan kembali ke ukuran sebelum hamil (Oktarina, 2015).

Pengembalian uterus ke keadaan sebelum hamil disebut juga involusi uterus. Setelah persalinan, tinggi fundus terletask sekita $\frac{2}{3}$ hingga $\frac{3}{4}$ bagian atas simpisis pubis dan umbilicus. Letak TFU kemudian naik sejajar dengan umbilicus dalam beberapa jam. Tinggi fundus uteri terletask 1 jari dibawah umbilicus selama 1 atau 2 hari dan bertahap turun ke dalam panggul hingga tidak dapat lagi dipalpasi

diatas simpisis pubis setelah hari ke 10 pasca persalinan (Purwanto & Rahayu, 2018).

Involusi uterus dimulai di akhir kala III persalinan. Uterus berada digaris tengah atau sekitar 2 cm dibawah umbilicus dengan bagian fundus bersandar pada promontorium sakralis. Saat itu, besar uterus kira-kira sama besar uterus sewaktu kehamilan 16 minggu dengan berat 1000 gr. Pasca persalinan terjadi penurunan hormone esterogen dan progesterone, Hal ini menyebabkan dimulainya proses invousi uterus

Proses penurunan hormone esterogen seiring sejalan dengan terproduksinya hormone oksitosin yang dilepaskan oleh kelenjar hipofise. Hormone oksitosin ini akan memperkuat dan mengatur kontraksi uterus, mengompresi pembuluh darah dan membantu proses hemostasis. Kontraksi dan retraksi myometrium akan mengurangi suplai darah ke uterus dan membantu mengurangi bekas luka tempat implantasi plasenta. Butuh 8 minggu luka perlekatan plasenta untuk sembuh secara total (Purwanto & Rahayu, 2018).

Pada awal post partum, peluruhan jaringan desidua menyebabkan keluarnya discharge vagina dalam jumlah bervariasi yang disebut Lochea. Secara mikroskopis, Lochea terdiri atas eritrosit, serpihan desidua, sel-sel epitel dan bakteri. Mikroorganisme ditemukan pada Lochea yang menumpuk di vagina dan sebagian besar

kasus juga ditemukan bahkan bila discharge diambil dari rongga uterus. Ada berapa jenis Lochea menurut (Purwanto & Rahayu, 2018)

- a) Lochea rubra/kruenta (merah): merupakan cairan bercampur darah dan sisa-sisa penebalan dinding rahim (desidua) dan sisa-sisa penanaman plasenta (selaput ketuban), berbau amis. Lochea rubra berwarna kemerah-merahan dan keluar sampai hari ke-3 atau ke4.
- b) Lochea sanguinolenta: berwarna merah dan kekuningan berisi darah dan lender. Ini terjadi pada hari ke 3 sampai hari ke 7 setelah persalinan.
- c) Lochea serosa: cairan berwarna kuning dan tidak bercampur darah lagi. Ini terjadi pada hari ke 7 hingga hari ke 14 setelah persalinan.
- d) Lochea alba: cairan putih yang terjadi pada hari setelah 2 minggu.
- e) Lochea purulenta: Lochea ini karena terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah berbau busuk.
- f) Lokeositosis: Lochea tidak lancar keluarnya.

b. Perubahan pada serviks

Setelah proses persalinan keadaan serviks akan sangat lunak, kendur dan terkulai dan biasanya mengalami memar ataupun edema. Serviks tampak mengalami kongesti yang menunjukkan banyaknya

vaskularisasi serviks. Warna serviks menjadi merah kehitaman karena banyaknya pembuluh darah.

Robekan yang terjadi disebabkan karena danya dilatasi serviks selama proses persalinan. Serviks tidak pernah kembali ke keadaan seperti semula, serviks dapat dimasukkan 2 jari sekitar seminggu, namun hanya masuk 1 jari dan terhenti pada os internal. (Purwanto & Rahayu, 2018).

c. Perubahan vagina dan perineum

Perubahan pada vagina dan perineum terjadi pada minggu ketiga masa nifas. Vagina akan mengecil dan timbul kerutan kembali. Perluasaan vagina yang tidak berhubungan dengan perineum jarang dijumpai. Robekan terdapat pada dinding lateral dan baru terlihat pada pemeriksaan speculum. Hymen muncul kembali sebagai kepingan-kepingan kecil jaringan, yang setelah mengalami sikatrisasi akan berubah menjadi carunculae mirtiformis) (Purwanto & Rahayu, 2018).

Setelah melahirkan perineum akan bengkak dan mungkin ada luka jahitan bekas robekan atau episiotomy. Penyembuhan luka post episiotomy sam dengan penyembuhan luka pada luka operasi yang lain. Perhatikan tanda-tanda terjadinya infeksi pada luka episiotomy. Penyembuhan luka post episiotomy biasanya terjadi 2 sampai 3 minggu setelah persalinan.

Vagina yang awalnya teregang akan kembali secara bertahap ke ukuran sebelum hamil. 6 hingga 8 minggu setelah bayi lahir akan

terjadi pengencangan apabila disertai dengan latihan pengencangan otot perineum. Pengencangan ini sempurna pada akhir puerperium dengan latihan setiap hari (Purwanto & Rahayu, 2018).

d. Perubahan organ otot panggul

Pada masa nifas otot panggul juga akan mengalami perubahan. Penopang dan struktur dapat mengalami cedera pada saat persalinan. Hal tersebut dapat menyebabkan relaksasi panggul yang berhubungan dengan melemahnya tahanan permukaan struktur panggul yang menopang uterus, dinding vagina, rectum, uretra dan kandung kemih. (Purwanto & Rahayu, 2018).

2) Perubahan system pencernaan

Keletihan yang dialami ibu akibat persalinan akan mengakibatkan hilangnya nafsu makan ibu selama 1 atau 2 hari pasca persalinan. Seiring berjalannya waktu kondisi ibu akan membaik dan nafsu makan akan kembali meningkat karena dipengaruhi oleh proses laktasi. Ibu post partum setelah melahirkan biasanya mengalami konstipasi. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya makanan berserat yang dikonsumsi ibu selama persalinan. Selain itu, rasa takut untuk mengedan karena adanya liak jahitan di perineum ibu juga mempengaruhi ibu mengalami kesulitan buang air besar. Buang air besar harus dilakukan 3 atau 4 hari setelah proses persalinan (Purwanto & Rahayu, 2018).

3) Perubahan perkemihan

System perkemihan pada masa nifas akan mengalami perubahan. Saluran kencing akan kembali normal dalam waktu 2 sampai 8 minggu setelah persalinan. Al tersebut tergantung pada keadaan ibu. Pelvis ginjal dan ureter yang teregang dan berdilatasi selama kehamilan kemabli normal pada minggu keempat setelah melahirkan. (Purwanto & Rahayu, 2018).

4) Perubahan tanda-tanda vital

Pada ibu pascapersalinan, terdapat beberapa perubahan tanda-tanda vital sebagai berikut (Purwanto & Rahayu, 2018) :

a. Suhu

Selama 24 jam pertama, suhu mungkin meningkatkan menjadi 38°C, sebagai akibat peningkatan kerja otot, dehidrasi atau perubahan hormonal. Peningkatan suhu perlu dipikirkan adanya infeksi sepsis selama postpartum, infeksi saluran kemih, peradangan endometrium, dan lain-lain.

b. Nadi:

pada 6 jam setelah persalinaan, sering ditemukan adanya bradikardi pada ibu dan dapat berlangsung sampai 6 hingga 10 hari setelah persalinan. Hal ini bisa berhubungan dengan penurunan usaha jantung, penurunan volume darah yang mengikuti pemisahan plasenta dan peningkatan stroke jantung. Takikardi sangat jarang terjadi, apabila terjadi makan akan berhubungan dengan kehilangan darah, infeksi atau hemoragic pascapartum yang lambat.

- c. Tekanan darah: setelah melahirkan, ibu dapat mengalami hipotensi ortostatik yang ditandai dengan adanya pusing segera setelah beranjak dan dapat terjadi 4 hingga 6 jam pertama. Vital sign khususnya tekanan darah harus tetap stabil setelah melahirkan. Penurunan tekanan darah bisa mengindikasikan penyesuaian fisiologi terhadap penurunan tekanan intratekual atau hipovolemia sekunder yang berkaitan dengan hemoragih uterus.
- d. Pernafasan: pernafasan ibu kembali ke fungsi seperti saat sebelum hamil pada bulan keenam melahirkan.

5) Perubahan payudara

Pada saat kehamilan sudah terjadi pembesaran payudara karena pengaruh peningkatan hormone estrogen, untuk mempersiapkan produksi ASI dan laktasi payudara menjadi besar ukurannya bias mencapai 800 gr, keras dan menghitam pada areola mammae di sekitar puting susu, ini menandakan dimulainya proses menyusui. Segera menyusui bayi setelah melahirkan melalui proses inisiasi menyusui dini, walaupun ASI belum keluar, laktasi sudah ada pengeluaran kolostrum.

Proses IMD ini dapat mencegah perdarahan dan merangsang produksi ASI. Pada hari ke-2 hingga ke-3 postpartum, sudah mulai diproduksi ASI matur yaitu ASI berwarna. Pada semua ibu yang telah melahirkan proses laktasi terjadi secara alami. Fisiologi menyusui mempunyai dua mekanisme fisiologi, yaitu, produksi ASI dan sekresi

ASI atau let down reflex, selama kehamilan, setelah melahirkan. Ketika hormone yang dihasilkan plasenta tidak ada lagi, maka terjadi positive feedback hormone yaitu kelenjar pituitary akan mengeluarkan hormone prolaktin. Sampai hari ketiga setelah melahirkan. Efek prolaktin pada payudara mulai bias dirasakan, perubahan darah payudara menjadi membesar terisi darah, sehingga timbul rasa hangat. Sel-sel acini yang menghasilkan ASI juga mulai berfungsi, ketika bayi menghisap puting (Sulfianti, 2021)

6) Perubahan dalam system kardiovaskular

Perubahan volume darah tergantung beberapa factor misalnya, kehilangan darah selama melahirkan dan mobilisasi serta pengeluaran cairan ekstrasvaskuler. Kehilangan darah merupakan akibat dari penurunan volume darah total yang cepat tetapi terbatas. Setelah itu terjadi perpindahan normal cairan tubuh yang menyebabkan volume darah menurun dengan lambat (Purwanto & Rahayu, 2018).

Pada kehamilan terjadi peningkatan sirkulasi volume darah yang mencapai 50%. Perubahan volume darah tergantung pada beberapa faktor, misalnya kehilangan darah selama melahirkan dan mobilisasi serta pengeluaran cairan ekstrasvaskuler. Mentoleransi kehilangan darah pada saat melahirkan perdarahan pervagina normalnya 400-500 cc. Sedangkan melalui seksio caesaria kurang lebih 700-1000 cc. Bradikardia (dianggap normal), jika terjadi takikardia dapat merefleksikan adanya kesulitan atau persalinan lama dan darah yang

keluar lebih dari normal atau perubahan setelah melahirkan. Pada minggu ketiga dan keempat setelah bayi lahir, volume darah biasanya menurun mencapai volume darah sebelum hamil (Purwanto & Rahayu, 2018).

7) Perubahan system endokrin

System endokrin akan mengalami perubahan secara tiba-tiba selama kala IV persalinan dan mengikuti lahirnya plasenta. Pada periode postpartum, terjadi perubahan hormone yang besar. Selama kehamilan payudara disiapkan untuk porses laktasi(hormone esterogen dan progesterone) kolostrum. Cairan payudara yang keluar produksi susu terjadi pada trimester III dan minggu pertama postpartum. (Purwanto & Rahayu, 2018).

8) Perubahan berat badan

Kehilangan/penurunan berat badan pada ibu setelah melahirkan terjadi akibat lahir atau keluarnya bayi, plasenta dan cairan amnion atau ketuban dan rata-rata penurunan berat badan tersebut berkisar 12 pon (4,5 kg). Pada minggu ke-7 sampai ke-8, kebanyakan ibu telah kembali ke berat badan sebelum hamil, sebagian lagi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk kembali ke berat badan semula. Faktor menyusui mempengaruhi penurunan berat badan yang paling besar (Purwanto & Rahayu, 2018).

9) Perubahan system musculoskeletal

Perubahan sistem muskuloskelektal terjadi pada saat umur kehamilan semakin bertambah. Adaptasi muskuloskelektal ini mencakup: peningkatan berat, bergesernya pusat akibat pembesaran rahim, relaksasi dan mobilitas. Namun demikian, pada saat post partum sistem muskuloskelektal berangsur angsur pulih kembali. Ambulasi dini dilakukan segera setelah melahirkan untuk membantu mencegah komplikasi dan mempercepat involusi uteri (Purwanto & Rahayu, 2018).

2.1.1 Perubahan Psikologis Pada Masa Nifas

Setelah persalinan ibu perlu waktu untuk menyesuaikan diri, menjadi dirinya lagi, dan merasa terpisah dengan bayinya sebelum dpt menyentuh bayinya. Perasaan ibu oleh bayinya bersifat kompleks dan kontradiktif. Banyak ibu merasa takut disebut sebagai ibu yang buruk, emosi yang menyakitkan mungkin dipendam sehingga sulit dalam koping dan tidur. Ibu menderita dalam kebisuannya sehingga menimbulkan distress karena kemarahan terhadap situasi.

Adaptasi psikologis pada periode postpartum merupakan penyebab stress emosional terhadap ibu baru. Bahkan bisa menjadi kondisi yang sulit jika terjadi perubahan fisik yang hebat. Factor-faktor yang mempengaruhi suksesnya masa transisi ke masa menjadi orang tua pada masa postpartum menurut (Sulfianti, 2021) yaitu :

- 1) Respons dan dukungan dari keluarga dan teman
- 2) Hubungan pengalaman melahirkan dan harapan serta aspirasi

- 3) Pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lain
- 4) Pengaruh budaya

Perubahan peran seorang ibu memerlukan adaptasi yang harus dijalani, tanggungjawab bertambah seiring dengan hadirnya bayi yang barulahir, perhatian penuh dari anggota keluarga merupakan dukungan positif untuk ibu dalam menjalani adaptasi melahirkan, ibu akan mengalami fase-fase antara lain menurut (Sulfianti, 2021) :

- 1) *Taking In Period* (Masa ketergantungan) Terjadi 1 sampai 2 hari setelah persalinan, ibu masih pasif dan sangat bergantung pada orang lain, fokus perhatian terhadap tubuhnya, ibu lebih mengingat pengalaman melahirkan dan persalinan yang dialami, serta kebutuhan tidur dan nafsu makan meningkat
- 2) *Taking Hold Period* Berlangsung 3 sampai 4 hari postpartum, ibu lebih berkonsentrasi pada kemampuannya dalam menerima tanggung jawab sepenuhnya terhadap perawatan bayi, ada masa ini ibu menjadi sangat sensitive, sehingga membutuhkan bimbingan dan dorongan perawat untuk mengatasi kritikan yang dialami ibu.
- 3) *Letting go period* dialami setelah tiba ibu dan bayi tiba di rumah, ibu mulai secara penuh menerima tanggung jawab sebagai “seorang ibu” dan menyadari atau merasa kebutuhan bayi sangat bergantung pada dirinya

2.1.1 Perawatan Masa Nifas

Perawatan masa nifas yang membantu ibu hingga masa nifas berakhir sebagai berikut (Sulfianti, 2021) :

1) Pengalaman Wanita

Masa nifas adalah hal yang sangat luar biasa, maka dari itulah wanita yang sedang berada pada masa tersebut, sangat memerlukan banyak masukan dari para tenaga kesehatan dan pihak keluarga agar dirinya mampu memiliki banyak pengetahuan sebagai seorang ibu, hal ini memiliki kaitan mengenai pantangan tertentu yang biasanya sering melingkupi perasaan serta pikiran seorang ibu nifas.

Sebenarnya tidak banyak pantangan yang menjadi momok untuk ibu nifas, hanya saja beberapa himbauan yang mungkin diberikan oleh tenaga medis kiranya akan membantu ibu nifas untuk melalui masa barunya yang berperan sebagai ibu dari bayinya, selain itu, beberapa hal mengenai nutrisi tidak ada pantangan kecuali memang terjadi alergi tertentu atau bahkan makanan yang memang membahayakan bagi ibu nifas. Serta berkaitan dengan peran baru sebagai ibu, dan dukungan dari sekitar yang akan mampu memberikan semangat serta wawasan lebih yang akan membantu ibu nifas memulai peran baru tersebut.

2) Merawat Bayi

Dalam merawat bayi barunya, seorang ibu nifas tentu memerlukan banyak sekali himbauan bahkan wawasan dari tenaga

kesehatan yang telah memiliki banyak ilmu dan pengetahuan. Hal ini akan membawa masa nifas ibu hamil menjadi jauh lebih menyenangkan dan selalu memberikan harapan baru, dengan banyak nasihat mengenai perawatan bayi baru lahir dari petugas kesehatan akan memberikan pola pikir yang berbeda bagi ibu nifas, hal tersebut merupakan sebuah ilmu yang didapati dari pendidikan dan pengalaman. Keluarga yang memberika dukungan. Juga membantu ibu nifas semakin semangat menghadapi masa barunya.

3) Adat dan Budaya

Memang benar adanya, sebuah adat istiadat serta budaya akan sangat empengaruhi pengelolaan pola fikir serta langkah dari ibu nifas terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sang buah hati. Hal ini dikarenakan, sebuah adat dan budaya menjadi tempat tinggal yang nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan adat maupun budaya masing-masing daerah dan wilayah tempat tinggal dari ibu nifas tersebut, jadi perlunya tenaga kesehatan memilih untuk tetap memberikan banyak masukan maupun wawasan lebih.

Jika sebuah adat tidak memberikan dampak negative, tentu saja akan terdapat dukungan dari tenaga kesehatan untuk terlaksananya adat maupun budaya tersebut, begitu pula pada lingkup keluarga yang akan menjadikan budaya dan adat sebagai sebuah dukungan agar ibu nifas mengikuti adat dan budaya secara baik dan benar.

4) Nutrisi

Pada masa nifas atau transisi menjadi ibu baru, maka ibu nifas bukan berarti melupakan kebutuhan dirinya dan hanya memperhatikan kebutuhan bayinya. Harus tetap terdapat keseimbangan yang nantinya mampu menjadikan ibu dan bayi sehat. Maka dari itulah, asupan nutrisi yang tepat dan seimbang untuk ibu nifas sangat penting. Hal ini dikarenakan oleh kebutuhan bayinya yang tentu didapatkan dari sang bunda. Jadi. Justru penting tentang adanya asupan sehat seimbang bagi ibu nifas, sehingga secara langsung akan terpenuhi pula kebutuhan dari buah hati tercinta.

Beberapa makanan yang perlu dihindari ibu nifas adalah makanan yang mengandung pengawet makanan, makanan yang kurang akan nilai gizi, kopi, hingga makanan yang mampu memberikan rangsangan misalnya saja cabai. Merica, dll.

5) Diet Nifas

Caranya adalah dengan mengonsumsi keseimbangan yang memang dibutuhkan tubuh ibu nifas yang sangat memerlukan asupan gizi seimbang sekaligus kesehatan seorang wanita. Dengan menu diet protein akan menjadi asupan yang membantu dalam pemenuhan nutrisi ibu nifas, bukan hanya itu, namun ibu nifas juga dapat menambahkan dengan serat serta vitamin yang nantinya akan melindungi atau menjadi benteng ibu nifas dari berbagai macam

penyakit atau kelelahan yang kiranya mudah menyerang ibu nifas. Untuk cairan. Tetap harus menjadi perhatian khusus.

6) Eliminasi

Eliminasi juga menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk juga dipenuhi oleh ibu nifas serta bayi baru lahir. Dengan eliminasi yang lancar dari ibu nifas serta bayinya maka akan berdampak bagi kesehatan keduanya . maka dari itulah perlunya tenaga kesehatan dan sanak keluarga untuk juga ikut andil dalam memenuhi kebutuhan eliminasi dari ibu nifas dan bayi baru lahir. Stress memang dapat terjadi pada masa transisi yang dialami oleh ibu nifas, namun umumnya hanya akan terjadi dalam sementara waktu dan akan segera kembali.

Dalam dunia medis, buang air kecil atau berkemih yang tepat bagi ibu nifas adalah 2 hingga 4 jam pertama usai persalinan, sedangkan buang air besar atau defekasi biasanya akan lancar setelah 24 jam pertama setelah proses melahirkan usai.

7) Produksi ASI

Produksi ASI (Air Susu Ibu) merupakan hal yang mutlak adanya untuk bayi, inilah asupan satu-satunya yang dapat didapatkan oleh bayi dari ia lahir hingga dirinya berusia enam bulan pertamanya/ maka dari itulah, anda dapat menggunakan beberapa cara yang saling berkaitan satu dengan lainnya, seperti misalnya mengenai asupan nutrisi hingga istirahat yang pas dan tepat. Hal ini akan membuat

produksi ASI sangat berpengaruh. Begitu pula dengan manfaat asi yang sangat luar biasa hebatnya.

Dengan pelaksanaan ASI yang dijalankan seorang ibu nifas dengan bayinya, maka akan terdapat banyak hal menakjubkan yang mampu terjadi. Misalnya saya mempercepat proses involusi uterus atau kembalinya Rahim ke bentuk semula seperti sedia kala. Bukan hanya itu, akan terdapat kasih sayang yang dalam antara ibu dan bayinya yang mampu tercipta jadi, Resiko Depresi atau Stres Pasca salin akan sangat sedikit atau bahkan nihil.

8) Kebersihan Diri

Kebersihan diri tersebut sangat penting bagi ibu nifas dan bayinya, tentu saja penting. Masa nifas adalah masa seorang ibu yang akan rentan terhadap infeksi, begitu pula bagi bayi baru lahir, masa awal kehidupannya adalah masa transisi yang tidak lain menjadi masa yang juga rawan terhadap daya tahan tubuhnya terhadap penyakit dan infeksi. Sebuah kebersihan bukan hanya sekedar bersih saja, namun juga dapat ditelusuri dasar yang memberikan keefektifan dan daya guna dari kebersihan diri yang ada. Hal itu akan memberikan banyak hal baru sehingga mampu membuat ibu nifas dan bayinya terjaga dari segala macam bentuk penyakit hingga hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Dengan seorang ibu nifas dan bayinya mandi 2 kali sehari, merawat kebersihan diri, dan keadaan sekitarnya, maka akan berdampak positif bagi diri dan bayinya.

9) Istirahat

Dengan menjaga serta mengatur pola istirahat yang pas bagi ibu nifas akan memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan dari sang ibu sendiri, pola istirahat bagi bayi baru lahir juga tidak jauh pentingnya, ini dikarenakan akan memiliki banyak dampak besar dalam masa perkembangan dan pertumbuhan dari sang buah hati maka dari itulah, perlunya menggunakan pola istirahat yang tepat akan sangat memberikan banyak hal positif dan membantu, salah satunya dengan ASI yang akan dihasilkan ibu nifas sangat dipengaruhi juga dari pola istirahat yang dijalankan.

Begitu pula kualitas istirahat bayi agar tumbuh serta berkembang sesuai dengan masanya yang tepat. Selain itu, istirahat juga akan sangat mempengaruhi tingkat stress atau depresi pasca salin yang mungkin terjadi pada beberapa ibu terhadap bayinya, jadi banyak sekali manfaat mengenai istirahat yang akan memberikan dampak tertentu bagi ibu dan bayinya.

10) Seksualitas

Seksualitas bukan hal yang sara untuk dibingakan dalam pengertian kesehatan. Terlebih untuk ibu nifas yang akan memiliki banyak angan tentang seputar seksualitasnya. Pola seksualiatas akan penting jika suatau waktu ibu nifas sudah berada pada suatu waktu yang mampu membawanya di masa nifas yang telah terbilang pulih dan tetap penting adanya kontrol ulang dari tenaga kesehatan dan

memungkinkan bila pola seksualitas juga akan dapat kembali seperti sedia kala. Dalam batasan yang mungkin juga diberikan dengan waktu yang tepat. Memang , pada awal akan takut , tetapi dengan berjalanya keadaan, akan menjadi hal yang wajar jika ibu nifas kembali melaksanakan pola seksualnya secara baik.

11) Senam Nifas

Kebutuhan akan kesehatan dari ibu nifas tentu sangat penting adanya, maka. Latihan atau olahraga dengan senam nifas akan banyak memiliki manfaat untuk ibu nifas. Dengan melaksanakan senam nifas, tentu terdapat banyak manfaat nyata yang akan dirasakan oleh ibu nifas tersebut . jadi, senam nifas jugaperlu dilakukan karena akan membantu pencegahan terjadinya stress hingga menguatkan otot-otot perut sehingga dapat menghasilkan bentuk tubuh ideal yang diinginkan wanita nifas usai kelahiran sang buah hati tercinta.

Senam nifas dapat dilakukan ibu nifas dengan berbagai macam cara. Seperti memilih untuk mengikuti kelas senam ibu nifas, begitu pula dengan melaksanakan sendiri di rumah dengan ketentuan atau cara yang tepat dan aman untuk dilaksanakannya senam ibu nifas. Bahkan, hal yang diperlukan untuk melaksanakan senam ibu nifas pun juga tidak terlalu banyak dan rumit. Ibu nifas hanya perlu mempersiapkan matras atau tempat tidur, bantal, baju olahraga dan kaset. Hal tersebut dapat dilakukan oleh ibu nifas secara mandiri, berkelompok, maupun dengan mengikuti kelas khusus.

12) Ambulasi

Ambulasi sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari ibu nifas, biasanya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan akan memberikan himbauan, terhadap ibu nifas dengan segera untuk mencegah terjadinya kelelahan setelah persalinan yang memiliki batasan maksimal tertentu, seperti batasan 4 jam pasca salin. Ambulasi dapat diawali dengan menggerakkan kaki, memiringkan tubuh ke arah kiri dan juga ke arah kanan, duduk, hingga bangun dari tempat tidur yang dilakukan oleh ibu nifas.

Ambulasi memiliki banyak hal atau dampak positif, misalnya saja dengan memberikan hasil yaitu bentuk tubuh yang baik atau bahkan kembali seperti sedia kala sebelum hamil, selain itu juga mampu mencegah terjadinya stress yang mungkin akan menghadang kesehatan ibu nifas, begitu pula dampaknya terhadap sirkulasi darah pada seluruh tubuh ibu nifas agar tetap lancar.

2.1.1 Penatalaksanaan Masa Nifas

- 1) Observasi 2 jam pertama post partum dengan ketat, lihat adanya perdarahan atau tidak.
- 2) 6 hingga 8 jam post partum ibu dianjurkan untuk istirahat dan tidur yang cukup dan diusahakan miring kiri dan kanan.
- 3) Hari 1 dan 2 perawat memberikan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) tentang kebersihan diri, cara menyusui dan memberikan

informasi tentang senam nifas, dan perubahan-perubahan yang terjadi selama masa nifas.

- 4) Hari ke 2 post partum ibu mulai latihan duduk
- 5) Hari ke 3 ibu diperkenalkan untuk latihan berdiri dan berjalan.

2.2. Konsep Dasar Nyeri

2.2.1. Defenisi

Kebutuhan rasa nyaman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Rasa nyaman sebagai suatu kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan akan tenteram, kepuasan, kelegaan, ketenangan psikologis, serta terbebas dari adanya rasa sakit atau nyeri. *The International Associate for the Study of Pain* dan *World Health Organization* mendefinisikan nyeri sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan terkait kerusakan jaringan baik yang bersifat actual maupun potensial, atau digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut (Risnah, 2022) Menurut beberapa ahli, nyeri diartikan sebagai berikut.

- 1) Mc. Coffery (1979), mendefinisikan nyeri sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang yang keberadaannya diketahui hanya jika orang tersebut pernah mengalaminya.
- 2) Wofl Weitzel Fuerst (1974), mengatakan bahwa nyeri merupakan suatu perasaan menderita secara fisik dan mental atau perasaan yang bisa menimbulkan ketegangan.
- 3) Arthur C Curton (1983), mengatakan bahwa nyeri merupakan suatu mekanisme produksi tubuh, timbul ketika jaringan sedang di rusak

dan menyebabkan individu tersebut bereaksi untuk menghilangkan rangsangan nyeri.

- 4) Secara umum, mengartikan nyeri sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan akibat terjadinya rangsangan fisik maupun dari serabut saraf dalam tubuh ke otak dan diikuti oleh reaksi fisik, fisiologis dan emosional

Nyeri akibat kontraksi uterus (afterpains) memerlukan penanganan untuk dapat diminimalisir atau ditekan seminim mungkin. Sebagai seorang bidan yang memberi asuhan sayang ibu, rasa nyeri yang dirasakan ibu perlu dilakukan tindakan intervensi, sehingga dapat menurunkan ketidaknyamanan yang ibu rasakan dan ibu dapat merasakan nyaman (Parulian *et al.*, 2013).

2.2.2. Patofisiologi nyeri

Taylor dalam buku (Risnah *et al.*, 2022) Mekanisme terjadinya nyeri melewati 4 tahap yakni : Transduksi, Transmisi, Persepsi dan Modulasi Nyeri

1) Transduksi

Aktivasi resptor rasa sakit disebut sebagai transduksi melalui rangsangan yang menyakitkan menyebabkan impuls listrik yang bergerak dari perifer ke sumsum tulang belakang di dorsal hom. Serat saraf perifer yang mengirimkan rasa sakit disebut nosiseptor. Selain itu, Ketika ada jaringan yang terluka, dapat melepaskan bahan kimia yang merangsang atau

mengaktifkan ujung saraf. Misalnya, sel yang rusak melepaskan histamin, yang merangsang ujung saraf. Zat lain juga dilepaskan yang merangsang nosiseptor atau reseptor rasa sakit. Ini termasuk bradykinin, prostaglandin, dan substansi P.

a) Bradykinin

Merupakan vasodilator kuat yang meningkatkan permeabilitas kapiler dan menyempitkan otot polos, ini juga memicu pelepasan histamin dan dalam kombinasi dengan itu menghasilkan kemerahan, pembengkakan, dan rasa sakit yang biasanya dia mati ketika peradangan muncul.

b) Prostaglandin adalah zat mirip hormone yang mengirim rangsangan nyeri tambahan ke SSP.

c) Substansi P menyensor reseptor pada saraf untuk merasakan sakit dan juga meningkatkan kecepatan saraf

2) Transmisi

Sensasi nyeri dari tempat cedera atau peradangan melalui jalur ke sumsum tulang belakang dan kemudian ke system saraf pusat yang lebih tinggi. Proses keseluruhan ini dikenal sebagai transmisi. Impuls sensorik menuju medulla spinalis melalui ganglion akar dorsal ke dorsal horn medulla spinalis. Pada titik ini, impuls saraf sensoris bersinapsis dengan neuron motoric. dan impuls tersebut melalui jalur saraf eferen kembali ke lokasi

stimulus nyeri sehingga muncul gerakan refleks untuk menghindarkan diri dari penyebab.

3) Persepsi

Persepsi nyeri adalah kesadaran akan pengalaman nyeri. Persepsi merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi, modulasi, aspek psikologis dan karakteristik individu lainnya. Organ tubuh yang berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung saraf bebas dalam kulit yang berespon hanya terhadap stimulus kuat yang secara potensial merusak.

4) Modulasi

Proses dimana sensasi rasa sakit terhambat atau dimodifikasi disebut modulasi. Sensasi rasa sakit tampaknya diatur atau dimodifikasi oleh zat yang disebut neuromodulator. neuromodulator ini adalah senyawa opioid endogen, yang berasal dari dalam tubuhnya seperti morfin di sumsum tulang belakang dan otak, yang memiliki aktivitas analgesic dan mengubah persepsi nyeri, senyawa opioid endogen ini diyakini menghasilkan efek analgesiknya dengan mengikat reseptor dan menghalangi pelepasan atau produksi zat yang mentransmisikan rasa sakit. Endorphin dan enkephalin di sinapsis saraf di berbagai titik sepanjang jalur CNS. Mereka adalah bahan kimia penghilang rasa sakit yang kuat. Endorphin dapat dilepaskan ketika tindakan tertentu digunakan untuk menghilangkan rasa

sakit, seperti teknik stimulasi dan relaksasi dan relaksasi kulit, dan ketika obat penghilang rasa sakit tertentu digunakan

2.2.3. Klasifikasi

Nyeri secara umum dibedakan menjadi 2 yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut merupakan nyeri yang timbul secara mendadak dan cepat menghilang yang tidak melebihi 3 bulan dan ditandai dengan tegangan otot meningkat. Nyeri kronis merupakan nyeri yang timbul secara perlahan-lahan dan biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama yaitu lebih dari 3 bulan. Yang termasuk nyeri kronis adalah nyeri terminal, sindrom nyeri kronis dan psikomatis.

Karakteristik	Nyeri Akut	Nyeri Kronis
Pengalaman	Satu kejadian	Satu situasi satu eksistensi
Sumber	Sebab eksternal atau penyakit dari dalam	Tidak diketahui atau pengobatan yang terlalu lama
Serangan	Mendadak	Bisa mendadak, berkembang dan terselubung
Waktu	Sampai 3 bulan	Lebih dari 6 bulan sampai bertahun tahun
Pernyataan nyeri	Tidak diketahui pasti area nyerinya	Daerah nyeri sulit dibedakan intensitasnya, sehingga sulit dievaluasi
Gejala	Pola respon yang khas	Pola respon

2.2.4. Mekanisme nyeri

Terdapat beberapa teori tentang terjadinya nyeri, diantaranya (Barbara C Long, 1989) :

1) Teori Pemisahan (*Specificity Theory*)

Menurut teori ini, rangsangan sakit masuk ke medula spinalis melalui kornu dorsalis yang berniaps di daerah posterior,

kemudian naik ke tractus lissur dan menyilang di garis median ke sisi lainya dan berakhir di korteks sensoris tempat rangsangan nyeri tersebut diteruskan.

2) Pola (*Pattern Theory*)

Rangsangan nyeri masuk melalui akar ganglion dorsal ke medulla spinalis dan merangsang aktivitas sel T. Hal ini mengakibatkan suatu respons yang merangsang ke bagian yang lebih tinggi, yaitu korteks serebri, serta kontraksi menimbulkan persepsi dan otot berkontraksi sehingga menimbulkan nyeri, persepsi dipengaruhi oleh modalitas dari reaksi sel T.

3) Teori Pengendalian Gerbang (*Gate Control Theory*)

Menurut teori ini nyeri bergantung dari kerja serat saraf besar dan kecil yang keduanya berada dalam akar ganglion dorsalis, rangsangan pada serat saraf besar akan mengakibatkan tertutupnya pintu mekanisme sehingga aktivitas sel T terhambat dan menyebabkan hantaran rangsangan ikut terhambat, rangsangan serat besar dapat langsung merangsang korteks serebri. Hasil persepsi ini akan dikembalikan ke dalam medulla spinalis melalui serat eferan dan reaksinya mempengaruhi aktivitas sel T. Rangsangan pada serat kecil akan menghambat aktivitas substansi gelatinosa dan membuka pintu mekanisme sehingga merangsang aktivitas sel T yang selanjutnya akan menghantarkan rangsangan nyeri.

4) Teori Transmisi dan Inhibisi


Adanya stimulus dan nociceptor memulai transmisi implus-implus saraf, sehingga transmisi impuls nyeri menjadi efektif oleh neurotransmitter yang spesifik. Kemudian inhibisi impuls nyeri menjadi efektif oleh implus-implus pada serabut-serabut besar yang memblok impuls-impuls pada serabut lamban dan endogen opiate system supresif.

2.2.5 Pengukuran skala intensitas nyeri

Pengukuran skala nyeri dapat dilakukan secara mandiri baik melalui penilaian tunggal dengan menggunakan skala pengukuran nyeri maupun penilaian multidimensi menggunakan kuesioner pengukuran nyeri, penilaian nyeri menggunakan skala tunggal meliputi *Visual Analog Scale (VAS)* , *Verbal Rating Scale (VRS)*, *Numeric Rating Scale (NRS)*, dan *Wong Baker Pain Rating Scale* (Risnah, 2022)

1) *Visual Analog Scale (VAS)*


Visual analog scale merupakan penilaian nyeri yang paling mudah. Rentang nyeri dapat dibuat pada garis sepanjang 10 cm secara vertival atau horizontal dengan memberikan tanda tidak ada nyeri di ujung satu dan di ujung lainnya merupakan rasa nyeri yang terparah, penilaian ini dapat digunakan pada anak usia 8 tahun ke atas, namu kurang bermanfaat untuk pasien pasca bedah karena memerlukan kemampuan kosentrasi.



Gambar 2.1 *Visual analog scale (VAS)*

2) *Verbal Rating Scale (VRS)*


Verbal rating scale Merupakan skala penilaian nyeri 0-10 yang dapat digunakan padapatient pasca bedah karena penilaian skala secara verbal sehingga terlalu memerlukan koordinasi visual dan motoric, skala yang digunakan dapat berupa tidak nyeri, nyeri sedang, dan nyeri berat atau menggunakan skala penurunan nyeri dengan pernyataan nyeri tidak berkurang, sedikit berkurang, cukup berkurang atau nyeri hilang.



Gambar 2.2 *Verbal rating scale*

3) *Numeric Rating Scale (NRS)*


Penilaian nyeri menggunakan NRS dapat dilakukan untuk menilai nyeri akut namun sedikitnya pilihan kata untuk menggambarkan perasaan nyeri menyulitkan penilaian tingkat nyeri secara lebih teliti dan terdapat jarak yang sama antar kata menggambarkan efek obat anti nyeri.



Gambar 2.3 Numeric Rating Scale

4) Wong baker Pain Rating Scale

Wong Baker Pain Rating Scale adalah penilaian nyeri menggunakan analogi ekspresi wajah. Penilaian ini dapat digunakan pada anak usia lebih dari 3 tahun dan usia dewasa yang tidak dapat digambarkan penilaian nyeri menggunakan angka.



Gambar 2.4 Wong Baker Pain Rating Scale

2.2.6. Nyeri Afterpains

Gangguan rasa nyeri pada masa nifas banyak dialami meskipun pada persalinan normal tanpa komplikasi. Hal tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman pada ibu, ibu diharapkan dapat mengatasi gangguan ini dan memberi kenyamanan pada ibu. Gangguan rasa nyeri yang dialami ibu salah satunya Afterpains/keram perut pasca melahirkan (Nugroho, 2014).

Afterpains disebabkan karena adanya kontraksi dalam relaksasi yang terus menerus pada uterus. Kontraksi uterus terjadi secara fisiologis yang

memicu timbulnya rasa nyeri yang dapat mengganggu kenyamanan ibu di masa nifas. Rasa sakit yang di sebut *afterpains* (meruyan/mules-mules) disebabkan oleh kontraksi rahim, biasanya berlangsung 2-4 hari pasca persalinan. Rasa nyeri yang timbul bersifat subjektif (Asih Yusari & Risneni, 2016)

Rasa nyeri yang dialami ibu tidak hanya berdampak pada dirinya saja tapi juga pada bayinya. Rasa nyeri akibat kontraksi uterus yang semakin sering membuat ibu malas menyusui bayinya, karena saat ibu menyusui terjadi pelepasan oksitosin dari kelenjar hipofisis posterior yang distimulasi oleh hisapan bayi. Oksitosin juga menstimulasi kontraksi miometrium pada uterus, yang biasanya dilaporkan wanita sebagai *afterpains* (nyeri kontraksi uterus setelah melahirkan) (Walyani Elisabeth Siwi, 2017).

Menurut (Andarmoyo, 2013) Strategi penatalaksanaan nyeri adalah suatu tindakan untuk mengurangi rasa nyeri, diantaranya dapat dilakukan dengan terapi farmakologis dan non-farmakologis. Terapi non-farmakologis yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan terapi pijatan pada ibu yang disebut dengan teknik *effleurage massage* (Parulian, TS. Sitompul, 2014).


2.3 Konsep Asuhan Keperawatan

2.3.1. Konsep Teori Keperawatan yang Terkait

Kenyamanan ialah pengalaman diterima oleh seseorang dari suatu intervensi dimana hal ini didapatkan apabila kebutuhan biopsikospiritual terpenuhi. Konsep teori ini meliputi pentingnya kenyamanan, kebutuhan

kenyamanan, variable intervensi, intervensi kenyamanan, integritas institusional, dan perilaku pencari kesehatan.

Menurut (Kolcaba, 2012), semua hal tersebut digambarkan dalam kerangka konseptual berikut ini:



Gambar 2.5 kerangka kerja konseptual pada teori kenyamanan

Keseluruhan konsep tersebut terkait dengan klien dan keluarga. Teori Kolcaba terdiri dari 3 tipe yaitu *relief* (kondisi pasien yang memerlukan penanganan spesifik dan segera, kemudian yang kedua adalah *ease* (kondisi tenang atau kepuasan hati dari klien yang terjadi karena hilangnya ketidaknyamanan fisik yang dirasakan di semua kebutuhan, dan yang terakhir adalah *transcendence* (keadaan seseorang yang mampu mengatasi masalah dari ketidaknyamanan yang terjadi).

Kolcaba memandang kenyamanan sebagai kebutuhan dasar individu yang bersifat utuh atau holistik. Kenyamanan fisik berkaitan dengan mekanisme homeostatis dan sensasi tubuh, seperti penurunan kemampuan tubuh dalam merespon prosedur invasif ataupun penyakit. Berbagai alternatif yang diberikan dalam memenuhi kebutuhan fisik yaitu merubah

posisi, memberikan obat, kompres dingin atau hangat, *backrub*, dan sentuhan terapeutik. Kenyamanan psikospiritual berhubungan dengan keharmonisan hati dan ketenangan jiwa, yang dilakukan dengan memfasilitasi kebutuhan sosialisasi dan interaksi klien dengan orang-orang terdekat selama perawatan dan pelibatan keluarga secara aktif dalam proses kesembuhan klien.

Kebutuhan kenyamanan sosiokultural terkait dengan hubungan interpersonal, keluarga dan masyarakat, seperti perawatan yang sesuai dengan budaya klien dan kebutuhan terhadap informasi kepulangan (*discharge planning*). Adapun cara yang dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sosiokultural yaitu menciptakan hubungan terapeutik dengan klien, memfasilitasi kerja tim yang mengatasi kemungkinan adanya konflik antara proses penyembuhan dengan budaya lain, mendorong klien dalam mengekspresikan perasaannya, dan menghargai hak-hak klien tanpa memandang status sosial atau budaya. Dan kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kenyamanan lingkungan yang dapat dilakukan dengan memberikan lingkungan yang aman bagi klien, menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan, membatasi pengunjung dan terapi saat klien istirahat (Kolcaba, 2012)

2.3.2 Pengkajian Keperawatan

1) Pengkajian

Asuhan masa nifas adalah penatalaksanaan asuhan yang diberikan pada klien mulai dari saat setelah lahirnya bayi sampai

dengan kembalinya tubuh dalam keadaan seperti sebelum hamil atau mendekati keadaan sebelum hamil. Pengumpulan data pada klien dan keluarga dilakukan dengan cara anamnesa, pemeriksaan fisik dan melalui pemeriksaan penunjang/hasil laboratorium (Saleha, 2018).

Adapun pengkajian pada masa nifas menurut (Saleha, 2018) meliputi:

a. Identitas Klien

Meliputi nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal dan jam MRS, nomor register.

b. Keluhan Utama

Alasan utama klien datang ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Keluhan sangat bervariasi, terlebih jika terdapat penyakit sekunder yang menyertai.

c. Riwayat Kesehatan

Riwayat kesehatan dengan cara mengumpulkan data-data tentang respon klien terhadap kelahiran bayinya serta penyesuaian selama masa post partum. Pengkajian awal mulai dengan Review prenatal dan intranatal meliputi:

(a) Lamanya proses persalinan dan jenis persalinan

(b) Lamanya ketuban pecah dini

(c) Adanya episiotomy dan laserasi

(d) Respon janin pada saat persalinan (APGAR)

(e) Pemberian anestesi selama proses persalinan dan kelahiran

(f) Medikasi lain yang diterima selama persalinan atau periode immediate post partum

(g) Komplikasi yang terjadi pada periode immediate post partum seperti atonia uteri, retensi plasenta, pengkajian ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko yang signifikan yang merupakan faktor predisposisi terjadinya komplikasi post partum.

d. Pengkajian Status Fisiologis Maternal

Untuk mengingat komponen yang diperlukan dalam pengkajian post partum, banyak perawat menggunakan istilah BUBBE-LE yaitu termasuk *Breast* (Payudara), *Uterus* (Rahim), *Bowel* (fungsi usus), *Bladder* (kandung kemih) *Lochea* (lochia), *Episiotomy* (episiotomy/perineum) *Lower Extremity* (ekstremitas bawah) dan *Emotion* (emosi)

e. Pengkajian Fisik

1) Tanda-Tanda Vital

Kaji tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu pada ibu periksa tanda-tanda vital tersebut sekitar 15 menit selama satu jam pertama setelah melahirkan atau sampai stabil, kemudian periksa setiap 30 menit untuk jam-jam berikutnya, nadi dan suhu diatas normal dapat menunjukkan

kemungkinan adanya infeksi. Tekanan darah mungkin sedikit meningkat karena upaya untuk persalinan dan kelelahan. Tekanan darah yang menurun perlu diwaspadai kemungkinan adanya perdarahan post partum.

a) Tekanan darah, normal yaitu $<140/90$ mmHg. Tekanan darah tersebut bisa meningkat dari pra persalinan pada 1-3 hari post partum. Setelah persalinan sebagian besar wanita mengalami peningkatan tekanan darah sementara waktu. Keadaan ini akan kembali normal selama beberapa hari. Bila tekanan darah menjadi rendah menunjukkan adanya perdarahan post partum. Sebaliknya bila tekanan darah tinggi, merupakan petunjuk kemungkinan adanya pre-eklampsia yang bisa timbul pada masa nifas. Namun hal ini seperti itu jarang terjadi.

b) Suhu, Suhu tubuh normal yaitu kurang lebih 38°C pada hari ke 4 setelah persalinan, suhu ibu bisa naik sedikit kemungkinan disebabkan dari aktivitas payudara. Bila kenaikan mencapai lebih 38°C pada hari kedua sampai hari-hari berikutnya, harus diwaspadai adanya infeksi atau sepsis nifas.

c) Nadi, nadi normal pada ibu nifas adalah 60-100. Denyut nadi ibu akan melambat sampai sekitar 60

x/menit yakni pada waktu habis persalinan karena ibu dalam keadaan istirahat penuh. Ini terjadi utamanya pada minggu pertama post partum. Pada ibu yang nervus nadinya bisa cepat, kira-kira 110x/mnt. Bisa juga terjadi gejala shock karena infeksi khususnya bila disertai peningkatan suhu tubuh.

d) Pernapasan, pernapasan normal yaitu 20-30 x/menit.

Pada umumnya respirasi lambat atau bahkan normal. Mengapa demikian, tidak lain karena ibu dalam keadaan pemulihan atau dalam kondisi istirahat. Bila ada respirasi cepat post partum (> 30 x/mnt) mungkin karena adanya ikutan dari tanda-tanda syok.

2) Kepala dan Wajah

a) Rambut, melihat kebersihan rambut, warna rambut, dan kerontokan rambut.

b) Wajah, adanya edema pada wajah atau tidak. Kaji adanya flek hitam.

c) Mata, konjungtiva yang anemis menunjukkan adanya anemia karena perdarahan saat persalinan.

d) Hidung, kaji dan tanyakan pada ibu, apakah ibu menderita pilek atau sinusitis. Infeksi pada ibu post partum dapat meningkatkan kebutuhan energi.

- e) Mulut dan gigi, tanyakan pada ibu apakah ibu mengalami stomatitis, atau gigi yang berlubang. Gigi yang berlubang dapat menjadi pintu masuk bagi mikroorganisme dan bisa beredar secara sistemik.
 - f) Leher, kaji adanya pembesaran kelenjar limfe dan pembesaran kelenjar tiroid. Kelenjar limfe yang membesar dapat menunjukkan adanya infeksi, ditunjang dengan adanya data yang lain seperti hipertermi, nyeri dan bengkak.
 - g) Telinga, kaji apakah ibu menderita infeksi atau ada peradangan pada telinga.
- 3) Pemeriksaan thoraks
- Inspeksi Payudara**
- a) Kaji ukuran dan bentuk tidak berpengaruh terhadap produksi ASI, perlu diperhatikan bila ada kelainan, seperti pembesaran masif, gerakan yang tidak simetris pada perubahan posisi kontur atau permukaan.
 - b) Kaji kondisi permukaan, permukaan yang tidak rata seperti adanya depresi, retraksi atau ada luka pada kulit payudara perlu dipikirkan kemungkinan adanya tumor.
 - c) Warna kulit, kaji adanya kemerahan pada kulit yang dapat menunjukkan adanya peradangan.

Palpasi Payudara

Pengkajian payudara selama masa post partum meliputi inspeksi ukuran, bentuk, warna dan kesimetrisan serta palpasi apakah ada nyeri tekan guna menentukan status laktasi. Pada 1 sampai 2 hari pertama post partum, payudara tidak banyak berubah kecil kecuali sekresi kolostrum yang banyak. Ketika menyusui, perawat mengamati perubahan payudara, menginspeksi puting dan areola apakah ada tanda tanda kemerahan dan pecah, serta menanyakan ke ibu apakah ada nyeri tekan. Payudara yang penuh dan bengkak akan menjadi lembut dan lebih nyaman setelah menyusui.

4) Pemeriksaan Abdomen

Inspeksi Abdomen

a) Kaji adakah striae dan linea alba

b) Kaji keadaan abdomen, apakah lembek atau keras.

Abdomen yang keras menunjukkan kontraksi uterus bagus sehingga perdarahan dapat diminimalkan. Abdomen yang lembek menunjukkan sebaliknya dan dapat dimasase untuk merangsang kontraksi.

Palpasi Abdomen

a) Fundus Uteri Tinggi : Segera setelah persalinan TFU 2 cm di bawah pusat, 12 jam kemudian kembali 1 cm di atas pusat dan menurun kira-kira 1 cm setiap hari.

Hari kedua post partum TFU 1 cm di bawah pusat

Hari ke 3-4 post partum TFU 2 cm di bawah pusat

Hari ke 5-7 post partum TFU pertengahan pusat-symphisis

Hari ke 10 post partum TFU tidak teraba lagi

b) Kontraksi, kontraksi lemah atau perut teraba lunak menunjukkan kontraksi uterus kurang maksimal sehingga memungkinkan terjadinya perdarahan.

c) Posisi, posisi fundus apakah sentral atau lateral. Posisi lateral biasanya terdorong oleh bladder yang penuh.

d) Uterus, setelah kelahiran plasenta, uterus menjadi massa jaringan yang hampir padat. Dinding belakang dan depan uterus yang tebal saling menutup, yang menyebabkan rongga bagian tengah merata. Ukuran uterus akan tetap sama selama 2 hari pertama setelah kelahiran, namun kemudian secara cepat ukurannya berkurang oleh involusi.

e) Diastasis rektus abdominis adalah regangan pada otot rektus abdominis akibat pembesaran uterus jika

dipalpasi, regangan ini menyerupai belah memanjang dari prosessus xiphoideus ke umbilikus sehingga dapat diukur panjang dan lebarnya. Diastasis ini tidak dapat menyatu kembali seperti sebelum hamil tetapi dapat mendekat dengan memotivasi ibu untuk melakukan senam nifas.

Cara memeriksa diastasis rektus abdominis adalah dengan meminta ibu untuk tidur terlentang tanpa bantal dan mengangkat kepala, tidak diganjal kemudian palpasi abdomen dari bawah prosessus xiphoideus ke umbilikus kemudian ukur panjang dan lebar diastasis.

5) Keadaan Kandung Kemih

Kaji dengan palpasi kandungan urin di kandung kemih. Kandung kemih yang bulat dan lembut menunjukkan jumlah urine yang tertampung banyak dan hal ini dapat mengganggu involusi uteri, sehingga harus dikeluarkan.

6) Ekstremitas Atas dan Bawah

a) Varises, melihat apakah ibu mengalami varises atau tidak. Pemeriksaan varises sangat penting karena ibu setelah melahirkan mempunyai kecenderungan untuk mengalami varises pada beberapa pembuluh darahnya. Hal ini disebabkan oleh perubahan hormonal.

b) Edema, tanda homan positif menunjukkan adanya tromboflebitis sehingga dapat menghambat sirkulasi ke organ distal. Cara memeriksa tanda human adalah memposisikan ibu terlentang dengan tungkai ekstensi, kemudian didorsofleksikan dan tanyakan apakah ibu mengalami nyeri pada betis, jika nyeri maka tanda homan positif dan ibu harus dimotivasi untuk mobilisasi dini agar sirkulasi lancar. Refleks patella mintalah ibu duduk dengan tungkainya tergantung bebas dan jelaskan apa yang akan dilakukan. Rabalah tendon dibawah lutut/patella. Dengan menggunakan hammer ketukkan tendon pada lutut bagian depan. Tungkai bawah akan bergerak sedikit ketika tendon diketuk. Bila reflek lutut negatif kemungkinan klien mengalami kekurangan vitamin B1. Bila gerakannya berlebihan dan cepat maka hal ini mungkin merupakan tanda preeklamsi.

7) Perineum

Perhatikan kebersihan perineum ibu. Kebersihan perineum menunjang penyembuhan luka. Serta adanya hemoroid derajat 1 normal untuk ibu hamil dan pasca persalinan.

a) REEDA

REEDA (Redness atau kemerahan, Edema, Ecchymosis, Discharge atau keluaran, dan Approximate atau perlekatan) pada luka episiotomy. adalah singkatan yang sering digunakan untuk menilai kondisi episiotomi atau laserasi perinium. Kemerahan dianggap normal pada episiotomi dan luka namun jika ada rasa sakit yang signifikan, diperlukan pengkajian lebih lanjut. Selanjutnya, edema berlebihan dapat memperlambat penyembuhan luka. Penggunaan kompres es (icepacks) selama periode pasca melahirkan umumnya disarankan.

b) Lochea

Kaji jumlah, warna, konsistensi dan bau lochia pada ibu post partum. Perubahan warna harus sesuai. Misalnya ibu postpartum hari ke tujuh harus memiliki lochea yang sudah berwarna merah muda atau keputihan. Jika warna lochea masih merah maka ibu mengalami komplikasi postpartum. Lochia yang berbau busuk yang dinamakan lochea purulenta menunjukkan adanya infeksi di saluran reproduksi dan harus segera ditangani.

c) Varises

Perhatikan apakah terjadinya varises di dalam vagina dan vulva. Jika ada yang membuat perdarahan yang sangat hebat.

f. Pengkajian Status Nutrisi

Pengkajian awal status nutrisi pada periode post partum didasarkan pada data ibu saat sebelum hamil dan berat badan saat hamil, bukti simpanan besi yang memadai (misal konjungtiva) dan riwayat diet yang adekuat atau penampilan. Perawat juga perlu mengkaji beberapa faktor komplikasi yang memperburuk status nutrisi, seperti kehilangan darah yang berlebih saat persalinan.

g. Pengkajian tingkat energi dan kualitas istirahat perawat harus mengkaji jumlah istirahat dan tidur, dan menanyakan apa yang dapat dilakukan ibu untuk membantunya meningkatkan istirahat selama ibu di rumah sakit. Ibu mungkin tidak bisa mengantisipasi kesulitan tidur setelah persalinan.

h. Emosi, Emosi merupakan elemen penting dari penilaian post partum. Klien post partum biasanya menunjukkan gejala dari “baby blues” atau “postpartum blues” ditunjukkan oleh gejala menangis, lekas marah, dan kadang-kadang insomnia. Postpartum blues disebabkan oleh banyak faktor, termasuk fluktuasi hormonal, kelelahan fisik, dan penyesuaian peran ibu. Ini adalah bagian normal dari pengalaman post partum. Namun,

jika gejala ini berlangsung lebih lama dari beberapa minggu atau jika klien post partum menjadi non fungsional atau mengungkapkan keinginan untuk menyakiti bayinya atau diri sendiri, klien harus diajari untuk segera melaporkan hal ini pada perawat, bidan atau dokter.

2.3.3 Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada klien dengan masa nifas menurut (Saleha, 2018) yang bersumber dari buku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI,2016) adalah :

1) Diagnosa 1 : Intoleransi aktivitas

- a. Defenisi : Ketidacukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
- b. Batasan karakteristik

Gejala dan tanda mayor	Gejala dan tanda minor
Subjektif : 1. Mengeluh lelah	Subjektif : 1. Dispnea saat/setelah aktivitas 2. Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas Merasa lemah
Objektif : 1. Frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat	Objektif : 1. Tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat 2. Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat/setelah aktivitas 3. Gambaran EKG menunjukkan iskemia 4. Sianosis

- c. Factor yang berhubungan
 - 1) Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen
 - 2) Tirah baring
 - 3) Kelemahan
 - 4) Imobilitas
 - 5) Gaya hidup monoton
- d. Kondisi klinis yang terkait

- 1) Anemia
- 2) Gagal jantung kongesif
- 3) Penyakit jantung coroner
- 4) Penyakit katup jantung
- 5) Aritmia
- 6) Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK)
- 7) Gangguan metabolic
- 8) Gangguan musculoskeletal

2) Diagnosa 2 : Nyeri Akut

a. Defenisi : Pengalaman sensori atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan.

b. Batasan karakteristik

Gejala dan tanda mayor	Gejala dan tanda minor
Subjektif : 1. Mengeluh nyeri	Subjektif : Tidak tersedia
Objektif : 1. Tampak meringis 2. Bersikap protektif (mis. waspada, posisi menghindari nyeri) 3. Gelisah 4. Frekuensi nadi meningkat 5. Sulit tidur	Objektif : 1. Tekanan darah meningkat 2. Pola napas berubah 3. Nafsu makan berubah 4. Proses berpikir terganggu 5. Menarik diri 6. Berfokus pada diri sendiri 7. Diaforesis

c. Factor yang berhubungan

- 1) Agen pencedera fisiologis (mis. inflamasi, iskemia, neoplasma)
- 2) Agen pencedera kimiawi (mis. terbakar, bahan kimia iritan)
- 3) Agen pencedera fisik (mis. abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan)

d. Kondisi klinis yang terkait

- 1) Kondisi pembedahan
- 2) Cedera traumatis
- 3) Infeksi

4) Sindrom koroner akut

3) Diagnosa 3 : Ansietas

a. **Defenisi** : Kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman.

b. Batasan karakteristik

Gejala dan tanda mayor	Gejala dan tanda minor
Subjektif : 1. Merasa bingung 2. Merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi 3. Sulit berkonsentrasi	Subjektif : 1. Mengeluh pusing 2. Anoreksia 3. Palpitasi 4. Merasa tidak berdaya
Objektif : 1. Tampak gelisah 2. Tampak tegang 3. Sulit tidur	Objektif : 1. Frekuensi napas meningkat 2. Frekuensi nadi meningkat 3. Tekanan darah meningkat 4. Diaforesis 5. Tremor 6. Muka tampak pucat 7. Suara bergetar 8. Kontak mata buruk 9. Sering berkemih 10. Berorientasi pada masa lalu

c. Factor yang berhubungan

- 1) Krisis situasional
- 2) Kebutuhan tidak terpenuhi
- 3) Krisis maturasional
- 4) Ancaman terhadap konsep diri
- 5) Ancaman terhadap kematian
- 6) Kekhawatiran mengalami kegagalan
- 7) Disfungsi sistem keluarga
- 8) Hubungan orang tua—anak tidak memuaskan
- 9) Faktor keturunan (temperamen mudah teragitasi sejak lahir)
- 10) Penyalahgunaan zat

- 11) Terpapar bahaya lingkungan (mis. toksin, polutan dan lain-lain)
- 12) Kurang terpapar informasi

d. Kondisi klinis yang terkait

- 1) Penyakit kronis progresif (mis. kanker, penyakit autoimun)
- 2) Penyakit akut
- 3) Hospitalisasi
- 4) Rencana operasi
- 5) Kondisi diagnosis penyakit belum jelas
- 6) Penyakit neurologis
- 7) Tahap tumbuh kembang

4) Diagnosa 4 : Resiko infeksi

a. Defenisi : Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenetik.

b. Faktor Resiko :

- 1) Penyakit kronis (mis. Diabetes melitus)
- 2) Efek prosedur invasif
- 3) Malnutrisi
- 4) Peningkatan paparan organisme patogen lingkungan
- 5) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer
 - a) Gangguan paristalik
 - b) Kerusakan integritas kulit
 - c) Perubahan sekresi pH
 - d) Penurunan kerja siliaris
 - e) Ketuban pecah lama
 - f) Ketuban pecah sebelum waktunya
 - g) Merokok
 - h) Statis cairan tubuh
- 6) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder:
 - a) Penurunan hemoglobin

- b) Imunosupresi
- c) Leukopenia
- d) Supresi respon inflamasi
- e) Vaksinasi tidak adekuat

c. Kondisi klinis yang terkait

- 1) AIDS
- 2) Luka bakar
- 3) PPOK
- 4) DM
- 5) Tindakan invasive
- 6) Kondisi penggunaan terapi steroid
- 7) Penyalahgunaan obat
- 8) Ketuban Pecah Sebelum Waktunya (KPSW)
- 9) Kanker
- 10) Gagal ginjal
- 11) Imunosupresi
- 12) Lymphedema
- 13) Leukositopenia
- 14) Gangguan fungsi hati

5) Diagnosa 5 : Resiko Defisit Nutrisi

a. Defenisi : Berisiko mengalami asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme.

b. Faktor Resiko

- 1) Ketidakmampuan menelan makanan
- 2) Ketidakmampuan mencerna makanan
- 3) Ketidakmampuan mengabsorbsi nutrisi
- 4) Peningkatan kebutuhan metabolisme
- 5) Faktor ekonomi (mis. finansial tidak mencukupi)
- 6) Faktor psikologis (mis. stres, keengganan untuk makan)

c. Kondisi klinis yang terkait

- 1) Stroke

- 2) Parkinson
- 3) Mobius syndrome
- 4) Cerebral palsy
- 5) Cleft lip
- 6) Cleft palate
- 7) Amyotropic lateral sclerosis
- 8) Kerusakan neuromuscular
- 9) Luka bakar
- 10) Kanker
- 11) Infeksi AIDS
- 12) Penyakit Chron's
- 13) Enterokolitis
- 14) Fibrosis kistik

6) Diagnosa 6 : Gangguan pola tidur

a. Defenisi : Gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal

b. Batasan karakteristik :

Gejala dan tanda mayor	Gejala dan tanda minor
Subjektif : 1. Mengeluh kesulitan tidur 2. Mengeluh sering terjaga 3. Mengeluh tidak puas tidur 4. Mengeluh pola tidur berubah 5. Mengeluh istirahat tidak cukup	Subjektif : 1. Mengeluh kemaluan aktivitas menurun
Objektif : Tidak tersedia	Objektif : Tidak tersedia

c. Factor yang berhubungan

- 1) Hambatan lingkungan (mis. kelembapan lingkungan sekitar, suhu lingkungan, pencahayaan, kebisingan, bau tidak sedap, jadwal pemantauan/pemeriksaan/tindakan)
- 2) Kurang kontrol tidur
- 3) Kurang privasi
- 4) Restraint fisik
- 5) Ketiadaan teman tidur
- 6) Tidak familiar dengan peralatan tidur

d. Kondisi klinis yang terkait

- 1) Nyeri/kolik
- 2) Hipertiroidisme
- 3) Kecemasan
- 4) Penyakit paru obstruktif kronis
- 5) Kehamilan
- 6) Periode pasca partum
- 7) Kondisi pasca operasi

7) Diagnosa 7 : Resiko ketidakseimbangan cairan

a. Defenisi : Berisiko mengalami penurunan, peningkatan atau percepatan perpindahan cairan dari intravaskuler, interstisial atau intraseluler.

b. Faktor Resiko

- 1) Proses pembedahan mayor
- 2) Trauma/perdarahan
- 3) Luka bakar
- 4) Aferesis
- 5) Asites
- 6) Obstruksi intestinal
- 7) Peradangan pancreas
- 8) Penyakit ginjal dan kelenjar
- 9) Disfungsi Intestinal

c. Kondisi klinis terkait

- 1) Prosedur pembedahan mayor
- 2) Penyakit ginjal dan kelenjar
- 3) Perdarahan
- 4) Luka bakar

2.3.4 Intervensi Keperawatan

a. Masalah keperawatan : **Intoleransi aktivitas**

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan **Kriteria**

Hasil:

- 1) Kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat
- 2) Kecepatan berjalan meningkat
- 3) Kekuatan tubuh bagian atas meningkat
- 4) Kekuatan tubuh bagian bawah meningkat
- 5) Keluhan lelah menurun
- 6) Frekuensi nadi membaik
- 7) Tekanan darah membaik
- 8) Saturasi oksigen membaik
- 9) Frekuensi napas membaik

Intervensi Keperawatan	Rasional
Manajemen Energi Observasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan 2) Monitor kelelahan fisik dan emosional 3) Monitor pola dan jam tidur 4) Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk dapat memecahkan masalah terkait kelelahan 2) Untuk mengetahui kelelahan fisik dan emosional klien 3) Untuk mengetahui pola tidur klien 4) Untuk mengetahui lokasi dan ketidaknyamanan klien dalam melakukan aktivitas
Terapeutik <ol style="list-style-type: none"> 1) Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus 2) Lakukan latihan rentang gerak pasif dan atau/ aktif 3) Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan 4) Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk memfasilitasi lingkungan yang mendukung dalam proses pengimplementasian 2) Agar gerakan tubuh klien tidak kaku 3) Untuk pengalihan yang dapat menenangkan klien 4) Agar dapat mempermudah proses mobilisasi klien
Edukasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Anjurkan tirah baring 2) Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan posisi yang nyaman 2) Agar energi dapat di stimulus dengan baik
Kolaborasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Agar nutrisi yang dikonsumsi klien sesuai dengan SOP yang ada

b. Masalah keperawatan : **Nyeri Akut**

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan **Kriteria Hasil**:

- 1) Keluhan nyeri menurun
- 2) Meringis menurun
- 3) Gelisah menurun
- 4) Frekuensi nadi membaik
- 5) Kesulitan tidur menurun
- 6) Tekanan darah membaik
- 7) Pola napas membaik
- 8) Nafsu makan membaik
- 9) Berfokus pada diri sendiri menurun

Intervensi Keperawatan	Rasional
Manajemen Nyeri Observasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2) Identifikasi skala nyeri 3) Monitor efek samping pemberian analgetik 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Agar mengetahui lokasi, derajat dan tingkat nyeri yang dialami dan dapat melakukan intervensi selanjutnya 2) Untuk mengidentifikasi skala nyeri 3) Untuk mengetahui reaksi analgetik yang diberikan
Terapeutik <ol style="list-style-type: none"> 1) Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 2) Berikan posisi nyaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk menurunkan atau mengalihkan perhatian klien dari nyerinya 2) Untuk menunjang penurunan nyeri
Edukasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 2) Jelaskan strategi meredakan nyeri 3) Ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Agar klien dapat mengontrol nyerinya 2) Pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pemahaman klien 3) Untuk mempercepat proses penyembuhan
Kolaborasi Kolaborasi pemberian analgetik perlu	Obat analgetik dapat meminimalisir rasa nyeri

c. Masalah keperawatan : **Ansietas**

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan tingkat ansietas menurun dengan **Kriteria Hasil**:

- 1) Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun
- 2) Perilaku gelisah menurun

- 3) Perilaku tegang menurun
- 4) Pola tidur membaik
- 5) Frekuensi pernapasan membaik
- 6) Frekuensi nadi membaik
- 7) Tekanan darah membaik
- 8) Kontak mata membaik

Intervensi Keperawatan	Rasional
<p>Terapi Relaksasi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif 2) Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan 3) Monitor respon terhadap terapi relaksasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jika klien mengalami penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu, maka klien akan sulit melakukan teknik relaksasi tersebut 2) Untuk mengetahui apakah ada perubahan yang baik pada otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan 3) Untuk membandingkan perasaan sebelum dan setelah terapi
<p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman 2) Gunakan pakaian longgar 3) Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk memberikan perasaan yang tenang dan nyaman pada saat klien sedang latihan terapi relaksasi 2) Agar klien lebih mudah bergerak 3) Untuk memberikan perasaan tenang pada klien
<p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi 2) Jelaskan secara rinci intervensi yang dipilih 3) Anjurkan mengambil posisi nyaman 4) Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi 5) Anjurkan sering mengulangi atau melatih tehnik yang dipilih 6) Demonstrasikan dan latih teknik relaksasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk memberikan informasi terkait tindakan jenis relaksasi 2) Agar klien memahami terkait intervensi yang akan dilakukan 3) Untuk memberikan rasa nyaman pada saat diberikan intervensi 4) Sebagai penunjang agar bisa merasakan ketenangan 5) Untuk membuat klien mudah mengingat dan menerapkan intervensi yang diberikan 6) Untuk memudahkan klien melakukan intervensi

d. Masalah keperawatan : Resiko Infeksi

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan tingkat infeksi menurun dengan **Kriteria Hasil**:

- 1) Demam menurun

- 2) Kemerahan menurun
- 3) Nyeri menurun
- 4) Bengkak menurun
- 5) Kadar sel darah putih membaik

Intervensi Keperawatan	Rasional
<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk mengetahui tindakan intervensi yang akan diberikan
<p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Batasi jumlah pengunjung 2) Berikan perawatan kulit pada area edema 3) Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan klien dan lingkungan klien 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk menghindari adanya kontaminasi antara klien dan pengunjung 2) Untuk mengurangi edema pada area kulit 3) Untuk menghindari terjadinya penyebaran patogen
<p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ajarkan cara mencuci tangan yang benar 2) Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi 3) Anjurkan meningkatkan asupan cairan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mencegah potensi resistensi Antimikroba 2) Menurunkan risiko infeksi akibat mal nutrisi 3) Asupan cairan yang tepenuhi membuat permukaan kulit menjadi lembab sehingga menurunkan resiko infeksi

e. Masalah keperawatan : Resiko Defisit Nutrisi

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan **Kriteria Hasil**:

- 1) Porsi makan yang dihabiskan meningkat
- 2) Kekuatan otot pengunyah meningkat
- 3) Kekuatan otot menelan meningkat
- 4) Serum albumin meningkat
- 5) Verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat
- 6) Pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat meningkat
- 7) Pengetahuan tentang pilihan minuman yang sehat meningkat
- 8) Pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat meningkat
- 9) Penyiapan dan penyimpanan makanan yang aman meningkat

- 10) Penyiapan dan penyimpanan minuman yang aman meningkat
- 11) Sikap terhadap makanan/minuman sesuai dengan tujuan kesehatan meningkat
- 12) Perasaan cepat kenyang menurun
- 13) Nyeri abdomen menurun
- 14) Sariawan menurun
- 15) Rambut rontok menurun
- 16) Diare menurun
- 17) Berat badan membaik
- 18) Indeks Massa Tubuh (IMT) membaik
- 19) Frekuensi makan membaik
- 20) Nafsu makan membaik
- 21) Bising usus membaik
- 22) Tebal lipatan kulit trisep membaik

Intervensi Keperawatan	Rasional
<p>Manajemen Nutrisi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi status nutrisi 2) Identifikasi alergi dan intoleransi makanan 3) Identifikasi makanan yang disukai 4) Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi 5) Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastric 6) Monitor asupan makanan 7) Monitor berat badan 8) Monitor hasil pemeriksaan laboratorium 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk mengetahui asupan nutrisi 2) Untuk menghindari pemberian makanan yang menyebabkan alergi 3) Untuk meningkatkan nafsu makan ketika melihat makanan yang disukai 4) Untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan gizi 5) Untuk mengetahui apakah klien membutuhkan penggunaan selang NGT atau tidak 6) Untuk mengetahui asupan makanan 7) Untuk mengetahui perkembangan berat badan dan BB yang ideal 8) Menunjukkan peningkatan berat badan atau berat badan stabil dengan nilai laboratorium normal
<p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu 2) Fasilitasi menentukan pedoman diet 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memperbaiki fungsi mulut untuk meningkatkan nafsu makan 2) Untuk merencanakan pola makan

(mis. Piramida makanan) 3) Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai 4) Berikan makan tinggi serat untuk mencegah konstipasi 5) Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein 6) Berikan suplemen makanan, jika perlu 7) Hentikan pemberian makan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi	yang sehat bergizi seimbang 3) Untuk menambah nafsu makan klien 4) Karena serat dalam makanan akan membentuk massa feses sehingga mengambang dan mudah dikeluarkan 5) Untuk membantu dalam proses penyembuhan 6) Untuk menambah nafsu makan klien 7) Komplikasi pemasangan NGT seperti rasa tidak nyaman, sinusitis dan epistaksis
Edukasi 1) Anjurkan posisi duduk 2) Ajarkan diet yang di programkan	1) Posisi duduk dapat memperlancar proses pencernaan 2) Untuk menjaga asupan makanan yang dibutuhkan tubuh
Kolaborasi 1) Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan (mis. pereda nyeri, antiemetik), jika perlu 2) Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan, jika perlu	1) Untuk memberikan rasa nyaman pada klien saat makan 2) Untuk menentukan asupan kalori harian yang diperlukan untuk mempertahankan berat badan yang sudah ditentukan

f. Masalah keperawatan : Gangguan Pola Tidur

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan pola tidur membaik dengan **Kriteria Hasil**:

- 1) Keluhan sulit tidur menurun
- 2) Keluhan sering terjaga menurun
- 3) Keluhan tidak puas tidur menurun
- 4) Keluhan pola tidur berubah menurun
- 5) Keluhan istirahat tidak cukup menurun
- 6) Kemampuan beraktivitas meningkat

Intervensi Keperawatan	Rasional
Observasi 1) Identifikasi pola aktivitas dan tidur 2) Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik dan/ psikologis) 3) Identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur (mis. kopi, teh, alkohol, makan mendekati waktu tidur, minum banyak air sebelum tidur) 4) Identifikasi obat tidur yang	1) Untuk mengetahui pola aktivitas yang dilakukan klien sebelum tidur 2) Untuk mengidentifikasi faktor yang mengganggu tidur, agar bisa di antisipasi 3) Untuk menghindari makanan yang dapat membuat pola tidur tidak efektif

Dikonsumsi	4) Untuk meminimalisir gangguan tidur akibat obat-obatan yang dikonsumsi
Terapeutik 1) Modifikasi lingkungan (mis. Pencahayaan, kebisingan, suhu, matras dan tempat tidur) 2) Batasi waktu tidur siang, jika perlu 3) Fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur 4) Tetapkan jadwal tidur rutin 5) Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (mis. Pijat, pengaturan posisi, terapi akupresur) 6) Sesuaikan jadwal pemberian obat dan/atau tindakan untuk menunjang siklus tidur terjaga	1) Untuk dapat mendukung proses yang dapat mempercepat tidur 2) Agar malam hari bisa cepat tidur 3) Agar tidak memiliki beban pada saat tidur 4) Agar dapat menciptakan tidur yang efektif 5) Agar dapat meningkatkan kenyamanan dalam tidur 6) Agar proses pemberian obat tidak mengganggu proses tidur klien
Edukasi 1) Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit 2) Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur 3) Anjurkan menghindari makanan/minuman yang mengganggu tidur 4) Anjurkan penggunaan obat tidur yang tidak mengandung supresor terhadap tidur REM 5) Ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur (mis. psikologis, gaya hidup, sering berubah shift bekerja) 6) Ajarkan relaksasi otot autogenik atau cara non farmakologi lainnya	1) Untuk mengedukasi klien mengetahui pentingnya tidur 2) Agar jadwal tidur selalu terkontrol baik 3) Agar tidak mengganggu waktu tidur 4) Agar tidak mengganggu waktu tidur 5) Agar klien mengetahui faktor-faktor yang memicu gangguan pola tidur 6) Agar mendapat kualitas tidur yang lebih nyaman

g. Masalah keperawatan : Resiko Ketidakseimbangan cairan

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan keseimbangan cairan meningkat dengan **Kriteria**

Hasil:

- 1) Asupan cairan meningkat
- 2) Membran mukosa lembap meningkat
- 3) Dehidrasi menurun
- 4) Tekanan darah membaik
- 5) Frekuensi nadi membaik
- 6) Kekuatan nadi membaik

- 7) Mata cekung membaik
- 8) Turgor kulit membaik

Intervensi Keperawatan	Rasional
Manajemen Cairan Observasi 1) Monitor status hidrasi (mis. frekuensi nadi, kekuatan nadi, akral, pengisian kapiler, kelembapan mukosa, turgor kulit, tekanan darah) 2) Monitor berat badan harian 3) Monitor hasil pemeriksaan Laboratorium	1) Untuk mengumpulkan dan menganalisis data klien untuk memantau keseimbangan cairan 2) Untuk memonitor tanda-tanda kehilangan cairan yang berlebihan 3) Untuk mengidentifikasi indikasi kemajuan ke arah atau penyimpangan dari hasil yang diharapkan
Terapeutik 1) Catat intake-output dan hitung balance cairan 24 jam 2) Berikan asupan cairan, sesuai kebutuhan 3) Berikan cairan intravena, jika Perlu	1) Memantau balance cairan dan sebagai acuan untuk tindakan selanjutnya 2) Untuk menggantikan kehilangan cairan 3) Mencegah terjadinya syok hipovolemik
Kolaborasi 1) Kolaborasi pemberian diuretic, jika perlu	1) Mengurangi penumpukan cairan tubuh melalui pengeluaran uri

2.3.5 Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rencana keperawatan diantaranya: Intervensi dilaksanakan sesuai dengan rencana setelah dilakukan validasi, keterampilan interpersonal, teknikal dan intelektual dilakukan dengan cermat dan efisien pada situasi yang tepat, keamanan fisik dan psikologis klien dilindungi serta dokumentasi intervensi dan respon pasien Pada tahap implementasi ini merupakan aplikasi secara kongkrit dari rencana intervensi yang telah dibuat untuk mengatasi masalah kesehatan dan perawatan yang muncul pada pasien (Setiadi, 2012).

2.3.6 Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan untuk menentukan apakah rencana keperawatan efektif dan bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan, merevisi rencana atau menghentikan rencana keperawatan. Evaluasi berfokus pada ketepatan perawatan yang diberikan dan kemajuan pasien atau kemunduran pasien terhadap hasil yang diharapkan. Evaluasi merupakan proses yang interaktif dan kontinu karena setiap tindakan keperawatan dilakukan, respon klien dicatat dan dievaluasi dalam hubungannya dengan hasil yang diharapkan. Kemudian berdasarkan respon klien, direvisi intervensi keperawatan atau hasil yang diperlukan (Setiadi, 2012). Ada dua komponen untuk mengevaluasi kualitas tindakan keperawatan, yaitu:

a. Proses (sumatif)

Fokus evaluasi proses adalah aktivitas dari proses keperawatan dan hasil kualitas pelayanan tindakan keperawatan. Evaluasi proses harus dilakukan sesudah perencanaan keperawatan, dilaksanakan untuk membantu keefektifan terhadap tindakan.

b. Hasil (formatif)

Fokus evaluasi hasil adalah perubahan perilaku atau status kesehatan pasien pada akhir tindakan keperawatan.

2.4 *Evidence Based Practice in Nursing*

2.4.2 Definisi

Massage (pijatan) adalah stimulasi kutaneus tubuh secara umum. Massage tidak secara spesifik menstimulasi reseptor yang sama seperti reseptor nyeri tetapi dapat berdampak melalui sistem kontrol desenden yang memberikan rangsangan ke otak. Massage dapat membuat klien lebih nyaman karena massage membuat otot menjadi rileks (Harista, 2021).

Effleurage adalah bentuk massage dengan menggunakan telapak tangan yang memberi tekanan lembut ke atas permukaan tubuh dengan arah sirkular secara berulang. Effleurage merupakan teknik massage yang aman, mudah untuk dilakukan, tidak memerlukan banyak alat, tidak memerlukan biaya, tidak memiliki efek samping dan dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain. Tindakan utama *effleurage massage* merupakan aplikasi dari teori Gate Control yang dapat “menutup gerbang” untuk menghambat perjalanan rangsang nyeri pada pusat yang lebih tinggi pada sistem saraf pusat (Fasikhatun, Sulistyowati, 2019).

2.4.3 Tujuan

Massage effleurage ini bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menghangatkan otot abdomen, serta meningkatkan relaksasi fisik dan mental stimulasi kulit dengan teknik effleurage dapat menghasilkan impuls yang dikirim melalui serabut saraf besar yang terletak dipermukaan kulit, serabut saraf besar ini yang akan menutup gerbang sehingga otak tidak menerima pesan nyeri karena sudah diblokir oleh stimulasi kulit dengan teknik effleurage ini, maka akibatnya persepsi nyeri akan berubah. Selain

dapat meredakan nyeri teknik effleurage ini juga bisa mengurangi ketegangan otot serta dapat meningkatkan sirkulasi darah pada area yang terasa nyeri (Irda Novrida Ashar dan Achmad Suardi, 2018).

Dengan dilakukannya tindakan *massage effleurage* pada ibu post partum dapat mengalihkan perhatian ibu terhadap nyeri yang dirasakan sehingga dapat mengurangi nyeri pada ibu. (Tappan & Benjamin, 2014).

2.4.4 Indikasi

Klien dengan nyeri afterpains post partum normal tanpa komplikasi

2.4.5 Kontraindikasi

Beberapa kondisi yang tidak boleh dilakukan pada tindakan massage ini menurut (Tappan & Benjamin, 2014) yaitu :

- a. Terdapat luka pada area yang akan di massage,
- b. Adanya penyakit kulit
- c. Jangan melakukan massage pada daerah yang mengalami lebam
- d. Jangan melakukan massage pada area yang mengalami peradangan
- e. Massage ini juga tidak diperbolehkan pada kondisi ruptur uterus (robekan pada dinding Rahim)

2.4.6 Prosedur pemberian Intervensi

Menurut (Gadysa, 2010) prosedur tindakan stimulasi kulit dengan teknik *effleurage massage* yaitu sebagai berikut :

- a. Fase Orientasi
 - 1) Berikan salam
 - 2) Perkenalkan diri

- 3) Identifikasi pasien
- 4) Kontrak waktu
- 5) Jelaskan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan, berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan jawab seluruh pertanyaan pasien, berikan *informed consent*.

b. Fase kerja

- 1) Langkah pertama: Pilih kata atau ungkapan singkat yang mencerminkan keyakinan pasien. Anjurkan pasien untuk memilih ungkapan yang memiliki arti khusus seperti tenang dan lain-lain.
- 2) Langkah kedua: Atur posisi tidur ibu dengan posisi tidur terlentang. Kemudian minta ibu untuk rileks. Kemudian tindakan dilakukan dengan cara menggunakan 1 atau 2 bantal, kaki dengan kedua lutut fleksi yang membentuk sudut 450°
- 3) Langkah ketiga : Pada waktu timbulnya kontraksi maka kaji respon fisiologis dan psikososial ibu kemudian tanyakan kualitas nyeri yang dirasakan berdasarkan dengan skala nyeri
- 4) Cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, kemudian berikan baby oil pada telapak tangan orang yang melakukan massage
- 5) Lakukan tindakan dengan cara yaitu letakkan kedua telapak tangan diatas simpisis pubis secara perlahan, lalu usapkan kedua telapak tangan yang sudah diberikan baby oil dengan tekanan

yang tegas, ringan, dan konstan yang dimulai dari abdomen bagian bawah di atas simpisis pubis kemudian arahkan ke samping area abdomen, lalu menuju ke arah fundus uteri, setelah sampai di fundus uteri seiring dengan ekspirasi pelan-pelan usapkan kedua telapak tangan tersebut kemudian turun ke samping area abdomen yang lain setelah itu kembali lagi ke perut bagian bawah diatas simpisis pubis.

- 6) Tindakan *massage effleurage* ini dilakukan selama \pm 5 menit. Lakukan gerakan ini secara berulang – ulang selama kontraksi rasa nyeri muncul setidaknya sebanyak 2 hingga 3 kali
- 7) Sesudah dilakukan tindakan tersebut maka kaji respon psikologis dan fisiologis ibu serta tanyakan kualitas nyeri yang dirasakan berdasarkan skala nyeri setelah tindakan selesai dilakukan
- 8) Setelah tindakan selesai maka atur kembali posisi ibu dengan posisi terlentang, kemudian ambil bantal yang ada pada kaki ibu setelah itu luruskan kembali kaki ibu yang tadi fleksi.

c. Fase Terminasi

- 1) Beritahu pasien bahwa tindakan telah selesai dilakukan
- 2) Evaluasi tindakan
- 3) Beri *reinforcement* positif pada pasien.

2.4.7 Kriteria evaluasi

Kriteria evaluasi pada terapi *effleurage massage* yaitu status kenyamanan pasca partum meningkat dengan kriteria hasil keluhan tidak

nyaman menurun, meringis menurun, kontraksi uterus menurun, berkeringat menurun, menangis menurun, merintih menurun, kontraksi uterus menurun, payudara bengkak menurun, tekanan darah membaik, frekuensi nadi membaik (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016)

2.4.8 Artikel utama dan Pendukung

- a. Artikel utama
 - 1) Penulis : Efa Fasikhatun, Priyatin Sulistyowati,
 - 2) Tahun : Volume 4 No 2 September 2019
 - 3) Judul : Gambaran nyeri sebelum dan sesudah di lakukan tindakan *effleurage massage* kepada ibu post partum di Rsud Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
 - 4) Sumber : Journal of Nursing and Health (JNH), Google Scholar
- b. Artikel pendukung (20 artikel)
 - 1) Penulis : Dessy Rindiyanti Harista, Lu'lu' Mayang , Mei Lestari
 - 2) Tahun : Vol. 1, No. 2, September 2021
 - 3) Judul : Penerapan Prosedur Terapi *Effleurage massage* Pada Ibu Dengan Ketidaknyamanan Pasca Partum: Literature Review
 - 4) Sumber : Indonesian Health Science Journal, Google Scholar
- c. Artikel pendukung
 - 1) Penulis : Irda Novrida Ashar, Achmad Suardi, Suryani Soepardan, Hidayat Wijayanegara, Jusuf Sulaeman Effendi, Ma'mun Sutisna
 - 2) Tahun : Vol 6. No 2 Juli sampai Desember 2018
 - 3) Judul : Pengaruh *Effleurage massage* Terhadap Penurunan Rasa Nyeri Pada Ibu Postpartum Multipara
 - 4) Sumber : Jurnal Kesehatan Indra Husada, Google Scholar
- d. Artikel pendukung
 - 1) Penulis : Friska Sitorus dan Ester Harianja
 - 2) Tahun : Vol.5 No.1 JUNI 2020
 - 3) Judul : Pengaruh Teknik *Effleurage massage* Terhadap Nyeri Afterpains Pada Ibu Nifas Multipara di BPM Wanti dan BPM Sartika di Kota Medan Tahun 2020
 - 4) Sumber : Jurnal Health Reproductive, Google Schola

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Studi Kasus

Pada karya tulis ini jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan dengan melibatkan 2 responden. Menurut (Nursalam *et al.*, 2020) Studi kasus adalah penelitian yang mencakup pengkajian bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian dalam metode studi kasus ini dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh klien dengan cara sistematis.

Hidayat, (2019) mendefinisikan studi kasus yaitu salah-satu metode penelitian yang menggambarkan kerangka tertentu pada tahapan prosesnya dengan menetapkan tema serta subjek penelitian, menetapkan tempat, menetapkan teknik pengumpulan data yang relevan, menetapkan metode yang akurat, menganalisis hasil data, membuat kesimpulan serta laporan dari penelitian yang dilakukan.

3.2 Subyek Studi Kasus


Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah individu yang sudah memenuhi kriteria.

3.3 Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus ini adalah melakukan asuhan keperawatan terhadap masalah yang dikaji secara mendalam yaitu asuhan keperawatan pada pasien post partum dengan masalah nyeri afterpains menggunakan intervensi terapi *massage effleurage*

3.4 Instrumen Studi Kasus

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah format asuhan keperawatan post natal care, pengukuran skala nyeri menggunakan metode Numeric Rating Scale berdasarkan tanda dan gejala dalam buku SDKI, serta alat perlindungan diri berupa handscoon dan masker, alat pemeriksaan fisik berupa stetoskop, tensi meter, termometer, dan arloji dengan detik.



M A K A S S A R

- 3.4.1 Format pengkajian keperawatan yang sesuai berdasarkan pengkajian Post Natal Care
- 3.4.2 Format analisa data terdiri dari: data, etiologi, dan masalah.
- 3.4.3 Format diagnosis keperawatan terdiri dari: diagnosa keperawatan
- 3.4.4 Format rencana asuhan keperwatan terdiri dari: diagnosis keperawatan, luaran keperawatan menggunakan SLKI, rencana

intervensi menggunakan SIKI, dan rasional menggunakan dongoes dan artikel.

- 3.4.5** Format implementasi dan evaluasi keperawatan terdiri dari: hari dan tanggal, nomor diagnosis keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi.

3.5 Prosedur Pengambilan Data

3.5.1 Persiapan

Persiapan dengan konsultasi kasus

3.5.2 Pengumpulan data

Pengumpulan data dengan wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi

3.5.3 Penyusunan Laporan

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah

3.6 Tempat dan waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Penelitian ini dilakukan di RSIA Sitti Khadijah Makassar yang dilaksanakan pada tanggal mulai pengkajian yaitu 06 Juni 2022 sampai pasien pulang pada tanggal 07 Juni 2022.

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data dan penyajian data pada studi kasus disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta dijadikan didalam teks dan bersifat naratif. Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subyek studi kasus yaitu dengan menggunakan lima proses keperawatan dalam hal ini pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. Data yang sudah diperoleh dari hasil pengkajian melalui proses wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi

kemudian dimasukkan ke dalam tabel analisa data untuk merumuskan diagnosis keperawatan yang sesuai dengan keadaan pasien berdasarkan Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, selanjutnya menentukan rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan menentukan kriteria hasil yang ditetapkan berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia kemudian melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana yang ditetapkan dan yang terakhir mengevaluasi respon pasien menggunakan format SOAP setelah dilakukan tindakan khususnya pemberian intervensi terapi *effleurage massage* pada pasien, penyajian data disajikan dalam bentuk narasi yaitu menjelaskan hasil pengkajian sampai dengan evaluasi.

3.8 Etika Studi Kasus

Dalam proses penelitian ini menggunakan pertimbangan etik. Pertimbangan etik digunakan untuk mencegah munculnya masalah etik selama penelitian berlangsung, untuk itu peneliti berupaya untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah yang muncul. Terdapat 3 (tiga) prinsip etik umum yang diterapkan untuk mengatasi masalah etik yaitu *non maleficence* dan *beneficence*, *respect to person*, serta *justice*

3.8.1 *Non Maleficence* dan *Beneficence*

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh manfaat secara langsung yaitu akan menjadi rileks dan nyaman, dan akan memperoleh manfaat karena telah mengetahui cara dalam menurunkan nyeri. Selain itu dapat menjadi acuan petugas kesehatan

dalam memberikan intervensi terapi *effleurage massage* untuk mengurangi nyeri afterpain pada pasien post partum.

3.8.2 *Respect For Person*

a. *Informed Consent*/Penjelasan Sebelum Penelitian (PSP)


Responden diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan sebelum dilaksanakan penelitian. Responden memiliki hak penuh untuk berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Pada *Informed Consent* dicantumkan bahwa pada data diperoleh hanya untuk mengembangkan ilmu.

b. Rahasia (*Privacy*)

Responden memiliki hak meminta bahwa data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Nama responden tidak dicantumkan pada lembar pengumpulan data, hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan responden. Hanya data tertentu saja yang dicantumkan sebagai hasil penelitian. Identitas responden pada karya tulis ilmiah ini hanya menggunakan inisial nama saja.

3.8.3 *Justice*

Dalam penelitian ini responden diperlakukan secara adil tanpa membeda-bedakan antara satu responden dengan responden lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

LAPORAN KASUS

4.1 Asuhan Keperawatan

4.1.1 Pengkajian Keperawatan

Tabel 4.1 Pengkajian Post Natal Care (PNC)

Pengkajian	Pasien 1	Pasien 2
Data Umum	<p>1. Identitas Klien</p> <p>Inisial Klien : Ny.T</p> <p>Usia : 20</p> <p>Status perkawinan : Kawin</p> <p>Pendidikan terakhir : SD</p> <p>Pekerjaan : IRT</p> <p>Inisial Suami : Tn. T</p> <p>Usia : 27 tahun</p> <p>Status perkawinan : Kawin</p> <p>Pekerjaan : Buruh harian</p> <p>Pendidikan Terakhir : SD</p> <p>2. Riwayat kehamilan dan persalinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengatakan ini kehamilan dan persalinan pertamanya - Tidak ada riwayat menyusui <p>3. Riwayat kehamilan saat ini</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berapa kali periksa kehamilan : klien mengatakan 6 kali - Masalah kehamilan : klien mengatakan tidak ada masalah selama kehamilan <p>4. Riwayat persalinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis persalinan : Normal 	<p>1. Identitas Klien</p> <p>Inisial Klien : Ny.F</p> <p>Usia : 18 tahun</p> <p>Status perkawinan : Kawin</p> <p>Pendidikan terakhir : SMP</p> <p>Pekerjaan : IRT</p> <p>Inisial Suami : Tn. H</p> <p>Usia : 21 tahun</p> <p>Status perkawinan : Kawin</p> <p>Pekerjaan : Wiraswasta</p> <p>Pendidikan Terakhir : SMA</p> <p>2. Riwayat kehamilan dan persalinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengatakan ini kehamilan dan persalinan pertamanya - Tidak ada riwayat menyusui <p>3. Riwayat kehamilan saat ini</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berapa kali periksa kehamilan : klien mengatakan 8 kali - Masalah kehamilan : klien mengatakan tidak ada masalah selama kehamilan <p>4. Riwayat persalinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis persalinan : Normal - Jenis kelamin bayi : Perempuan - BB/PB : 3000 gr/47 Cm - Masalah dalam persalinan : terjadi robekan perineum grade 2

	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis kelamin bayi : Laki-laki, BB/PB : 2.840 gr/47 Cm - Masalah dalam persalinan : perdarahan minimal post episotomi <p>5. Riwayat ginekologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada riwayat ginekologi - Riwayat Kb : klien mengatakan tidak pernah menggunakan Kb 	<p>5. Riwayat ginekologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada riwayat ginekologi - Riwayat Kb : klien mengatakan tidak pernah menggunakan Kb
<p>Data umum kesehatan saat ini</p>	<p>Status Obstetric : G1P0A0 Bayi rawat gabung : ya Keadaan umum : Compos Mentis Tanda vital: TD: 110/70 mmHg, Nadi: 110x/menit, Suhu: 38°C, Pernapasan: 20x/menit</p> <p>Kepala : I : bentuk kepala bulat dan simetris, tidak ada luka, tidak tampak ada pembengkakan, tidak berbau, keadaan kulit kepala bersih, rambut menyebar merata berwarna hitam, rambut lurus dan bersih, rambut sedikit rontok P : tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan</p> <p>Mata : I : tampak bersih, simetris, tidak ada secret, penglihatan baik, pupil isokor, refleks pupil (+)2.5mm kanan, (+)2.5 mm kiri, sklera berwarna putih, tidak menggunakan alat bantu penglihatan, tidak ada benjolan</p>	<p>Status Obstetric : G1P0A0 Bayi rawat gabung : ya Keadaan umum : Compos Mentis Tanda vital: TD: 100/80 mmHg, Nadi: 80x/menit, Suhu: 36°C, Pernapasan: 20x/menit</p> <p>Kepala : I : bentuk kepala bulat dan simetris, tidak ada luka, tidak tampak ada pembengkakan, tidak berbau, keadaan kulit kepala bersih, rambut menyebar merata berwarna hitam, rambut lurus dan bersih, rambut tidak rontok P : tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan</p> <p>Mata : I : tampak bersih, simetris, tidak ada secret, penglihatan baik, pupil isokor, refleks pupil (+)2.5mm kanan, (+)2.5 mm kiri, sklera berwarna putih, tidak menggunakan alat bantu penglihatan, tidak ada benjolan pada kelopak mata, P : konjungtiva anemis, tidak ada nyeri tekan,</p>

<p>pada kelopak mata, mata klien tampak sayu</p> <p>P : konjungtiva anemis, tidak ada nyeri tekan,</p> <p>Hidung :</p> <p>I : tidak ada polip, tidak ada sekret, lubang hidung lengkap dan simetris, hidung sedikit mancung</p> <p>P : tidak ada nyeri tekan</p> <p>Mulut :</p> <p>I : tidak mengalami kelainan kongenital, kemampuan bicara kooperatif, mukosa bibir kering, tidak terdapat bercak putih pada lidah, tidak menggunakan gigi palsu, mulut tidak berbau busuk, tidak ada sariawan</p> <p>Telinga :</p> <p>I : telinga berbentuk normal, simetris, tidak ada serumen/sekret, tidak ada perdarahan, fungsi pendengaran baik</p> <p>P : tidak terdapat nyeri telinga</p> <p>Leher :</p> <p>I : bentuk leher normal, menggunakan aksesoris kalung</p> <p>P : tidak ada pembesaran thyroid, tidak ada peradangan ataupun pembengkakan pada tonsil, tidak terdapat distensi vena jugularis, tidak ada pembesaran, tidak terdapat nyeri tekan, tidak ada pembesaran kelenjar limfe</p> <p>Jantung :</p> <p>A : bunyi jantung I ditemukan saat meletakkan stetoskop di area ICS 2 parasternal kanan (aorta) dan ICS</p>	<p>Hidung :</p> <p>I : tidak ada polip, tidak ada sekret, lubang hidung lengkap dan simetris, hidung sedikit mancung</p> <p>P : tidak ada nyeri tekan</p> <p>Mulut :</p> <p>I : tidak mengalami kelainan kongenital, kemampuan bicara kooperatif, tidak terdapat bercak putih pada lidah, tidak menggunakan gigi palsu, mulut tidak berbau busuk, tidak ada sariawan</p> <p>Telinga :</p> <p>I : telinga berbentuk normal, simetris, tidak ada serumen/sekret, tidak ada perdarahan, fungsi pendengaran baik</p> <p>P : tidak terdapat nyeri telinga</p> <p>Leher :</p> <p>I : bentuk leher normal</p> <p>P : tidak ada pembesaran thyroid, tidak ada peradangan ataupun pembengkakan pada tonsil, tidak terdapat distensi vena jugularis, tidak ada pembesaran, tidak terdapat nyeri tekan, tidak ada pembesaran kelenjar limfe</p> <p>Jantung :</p> <p>A : bunyi jantung I ditemukan saat meletakkan stetoskop di area ICS 2 parasternal kanan (aorta) dan ICS 2 parasternal kiri (pulmonalis), tidak terdengar suara abnormal</p> <p>Paru :</p> <p>I : bentuk dada normochest, tidak terdapat kelainan bentuk, retraksi otot dada TAK, pergerakan selama pernapasan simetris,</p> <p>P : tidak terdapat nyeri tekan, tidak terdapat massa</p>
---	--

<p>2 parasternal kiri (pulmonalis), tidak terdengar suara abnormal</p> <p>Paru :</p> <p>I : bentuk dada normochest, tidak terdapat kelainan bentuk, retraksi otot dada TAK, pergerakan selama pernapasan simetris,</p> <p>P : tidak terdapat nyeri tekan, tidak terdapat massa</p> <p>P : suara paru sonor</p> <p>A : suara pernapasan vesicular</p> <p>Payudara :</p> <p>I : payudara tampak besar dan simetris, areola mammae berwarna coklat kehitaman,</p> <p>P : payudara teraba padat, tidak ada benjolan pada payudara, tidak ada nyeri tekan sekitar payudara, klien mengatakan sudah mengetahui bagaimana cara melakukan perawatan payudara</p> <p>Puting susu :</p> <p>I : berwarna gelap dan agak menonjol keluar</p> <p>P : asi sudah keluar, tidak ada nyeri tekan</p> <p>Pengeluaran ASI : klien mengatakan pengeluaran asi lancar</p> <p>Abdomen : Involusi uterus</p> <p>Klien mengeluh kurang nyaman dan nyeri pada perut</p> <p>P : Kontraksi uterus</p> <p>Q : Nyeri seperti ditusuk benda tumpul</p> <p>R : Nyeri pada pinggang menjalar keperut</p> <p>S : Skala nyeri 5 (NRS)</p>	<p>P : suara paru sonor</p> <p>A : suara pernapasan vesicular</p> <p>Payudara :</p> <p>I : payudara tampak besar dan simetris, areola mammae berwarna coklat kehitaman,</p> <p>P : payudara teraba padat, tidak ada benjolan pada payudara, tidak ada nyeri tekan sekitar payudara, klien mengatakan sudah mengetahui bagaimana cara melakukan perawatan payudara</p> <p>Puting susu :</p> <p>I : berwarna gelap dan agak menonjol keluar</p> <p>P : asi sudah keluar, tidak ada nyeri tekan</p> <p>Pengeluaran ASI : klien mengatakan sudah ada pengeluaran asi dengan jumlah sedikit</p> <p>Abdomen : Involusi uterus</p> <p>Klien mengeluh kurang nyaman dan nyeri pada perut</p> <p>P : Kontraksi uterus</p> <p>Q : Nyeri seperti ditusuk benda tumpul</p> <p>R : Nyeri pada pinggang menjalar keperut</p> <p>S : Skala nyeri 5 (NRS)</p> <p>T : Hilang timbul sekitar 2 menit</p> <p>Fundus Uteri : Satu jari dibawah pusat (8 jam post partum)</p> <p>Uterus : teraba bulat</p> <p>Kontraksi: kontraksi uterus baik</p> <p>Perineum dan Genital</p> <p>Vagina : Klien mengeluh nyeri</p> <p>Perineum: Tampak jahitan pada perineum akibat rupture perineum</p>
--	---

<p>T : Hilang timbul sekitar 2 menit</p> <p>Fundus Uteri : Satu jari dibawah pusat (10 jam post partum)</p> <p>Uterus : teraba bulat</p> <p>Kontraksi: kontraksi uterus baik</p> <p>Perineum dan Genital</p> <p>Vagina : Klien mengeluh nyeri</p> <p>Perineum: Tampak jahitan pada luka post episiotomy</p> <p>Tanda REEDA</p> <p>R: Kemerahan : tidak ada tanda kemerahan</p> <p>E: Edema : tidak ada pembengkakan</p> <p>E: Ekimosis : tidak ada tanda kebiruan</p> <p>D: Dischargeserum : terdapat sedikit darah</p> <p>A: Approximate: penyatuan baik, jahitan kuat pada area perineum</p> <p>Lokia: Lochea rubra, warna merah kecoklatan, berbau amis, konsentrasi cair, ganti pembalut 3 kali</p> <p>Hemoroid : -</p> <p>Nyeri: klien mengeluh nyeri dan klien tampak meringis</p> <p>P : Nyeri post partum</p> <p>Q : Nyeri seperti teriris</p> <p>R : Nyeri pada daerah perineum</p> <p>S : Skala Nyeri 3 (NRS)</p> <p>T : 2 menit, nyeri hilang timbul</p> <p>Masalah Khusus: Nyeri akut</p> <p>Ekstremitas:</p> <p>Tidak ada edema, tidak ada memar pada bagian ekstremitas atas dan bawah.</p>	<p>grade 2</p> <p>Tanda REEDA</p> <p>R: Kemerahan : tidak ada tanda kemerahan</p> <p>E: Edema : tidak ada pembengkakan</p> <p>E: Ekimosis : tidak ada tanda kebiruan</p> <p>D: Dischargeserum : terdapat sedikit darah</p> <p>A: Approximate: penyatuan baik, jahitan kuat pada area perineum</p> <p>Lokia: Rubra (merah) Jumlah: 250cc/hari Jenis/warna: merah, darah segar, Konsentrasi: cair Bau: amis</p> <p>Hemoroid : -</p> <p>Nyeri: klien mengeluh nyeri pada perineum dan klien tampak meringis</p> <p>P : Nyeri post partum</p> <p>Q : Nyeri seperti teriris</p> <p>R : Nyeri pada daerah perineum</p> <p>S : Skala Nyeri 4 (NRS)</p> <p>T : 4 menit, nyeri hilang timbul</p> <p>Masalah Khusus: Nyeri akut</p> <p>Ekstremitas:</p> <p>Tidak ada edema, tidak ada memar pada bagian ekstremitas atas dan bawah.</p> <p>Eliminasi:</p> <p>Kebiasaan BAK : klien mengatakan BAK $\pm 6x$/hari sebanyak 200 ml tiap kali BAK = 7 x 200 = 1.400 ml. Klien mengatakan berwarna kuning, ada bercak darah, tidak berbusa, bau khas urin</p> <p>Kebiasaan BAB : Klien mengatakan BAB 1x tiap pagi hari. Saat dikaji, klien mengatakan belum pernah BAB selama postpartum</p> <p>Istirahat dan Kenyamanan</p>
---	--

<p>Eliminasi:</p> <p>Kebiasaan BAK : klien mengatakan BAK $\pm 7x$/hari sebanyak 1 aqua gelas berukuran 220 ml tiap kali BAK = $7 \times 220 = 1.540$ ml. Klien mengatakan berwarna kuning kadang ada bercak darah, tidak berbusa, bau khas urin</p> <p>Kebiasaan BAB : Klien mengatakan BAB 1x tiap pagi hari. Saat dikaji, klien mengatakan BAB 1x selama postpartum</p> <p>Istirahat dan Kenyamanan</p> <p>Pola tidur : Klien mengatakan sebelum dirawat tidur malam pukul 22.00 WITA malam dan bangun pukul 05.00 WITA subuh. Klien mengatakan jarang tidur siang</p> <p>Pola tidur saat ini: Klien mengeluh kurang nyaman, klien mengatakan selama diruang persalinan belum pernah tidur dan pukul 04.00 setelah persalinan di pindahkan keruang nifas klien sempat tidur 2 jam.</p> <p>Mobilisasi dan Latihan</p> <p>Tingkat mobilisasi : Klien dapat menggerakkan sendinya dengan bebas. Klien dapat berjalan sendiri tanpa bantuan</p> $\begin{array}{c c} 5 & 5 \\ \hline 5 & 5 \end{array}$ <p>(√)Bisep (√) Trisep (√)Brachioradialis (√)Patella (√)Achilles</p> <p>Latihan/senam</p> <p>Klien mengatakan sering berjalan</p> <p>Kebersihan:</p> <p>Kebersihan rambut (frekuensi): Klien mengatakan keramas 1x/ hari</p> <p>Kebersihan badan : Klien mengatakan mandi 2x/hari, pagi dan sore</p> <p>Nutrisi dan Cairan:</p> <p>Asupan nutrisi : Klien mengatakan makan nasi putih, lauk bervariasi, sayur bervariasi dan buah bervariasi yang diberikan oleh Rumah sakit. Klien mengatakan makan 3x/hari dengan porsi yang dihabiskan.</p> <p>Nafsu makan : baik</p>	<p>Pola tidur : Klien mengatakan sebelum dirawat tidur malam pukul 21.00 WITA malam dan bangun pukul 06.00 WITA subuh. Klien mengatakan jarang tidur siang</p> <p>Pola tidur saat ini: Klien mengeluh kurang nyaman, klien mengatakan selama diruang persalinan belum pernah tidur dan pukul 02.00 setelah persalinan di pindahkan keruang nifas klien sempat tidur 2 jam.</p> <p>Mobilisasi dan Latihan</p> <p>Tingkat mobilisasi : Klien dapat menggerakkan sendinya dengan bebas. Klien dapat berjalan sendiri tanpa bantuan</p> $\begin{array}{c c} 5 & 5 \\ \hline 5 & 5 \end{array}$ <p>(√)Bisep (√) Trisep (√)Brachioradialis (√)Patella (√)Achilles</p> <p>Latihan/senam</p> <p>Klien mengatakan sering berjalan</p> <p>Kebersihan:</p> <p>Kebersihan rambut (frekuensi): Klien mengatakan keramas 1x/ hari</p> <p>Kebersihan badan : Klien mengatakan mandi 2x/hari, pagi dan sore</p> <p>Nutrisi dan Cairan:</p> <p>Asupan nutrisi : Klien mengatakan makan nasi putih, lauk bervariasi, sayur bervariasi dan buah bervariasi yang diberikan oleh Rumah sakit. Klien mengatakan makan 3x/hari dengan porsi yang dihabiskan.</p> <p>Nafsu makan : baik</p>
---	--

	<p>(√)Patella (√)Achilles</p> <p>Latihan/senam Klien mengatakan sering berjalan</p> <p>Kebersihan: Kebersihan rambut (frekuensi): Klien mengatakan keramas 1x/2 hari Kebersihan badan : Klien mengatakan mandi 2x/hari, pagi dan sore</p> <p>Nutrisi dan Cairan: Asupan nutrisi : Klien mengatakan makan nasi putih, lauk bervariasi, sayur bervariasi dan buah bervariasi yang diberikan oleh Rumah sakit. Klien mengatakan makan 3x/hari dengan porsi yang dihabiskan. Nafsu makan : baik Asupan cairan : Cukup, Klien mengatakan mengonsumsi air mineral 3½ botol berukuran 600 ml = 2.100 ml</p> <p>Keadaan Mental Adaptasi psikologis : klien mengatakan agak merasa khawatir apabila bayinya menangis karena ini baru persalinan pertama, namun ia merasa tenang apabila ibu dan mertuanya ada. Penerimaan terhadap bayi : Klien mengatakan sangat bahagia karena diberi amanah oleh Tuhan untuk melahirkan anak pertamanya. Kemampuan Menyusui : Klien mengatakan sudah mengetahui</p>	<p>Asupan cairan : Cukup, Klien mengatakan mengonsumsi air mineral 3½ botol berukuran 600 ml = 2.100 ml</p> <p>Keadaan Mental Adaptasi psikologis : klien mengatakan agak merasa khawatir apabila bayinya menangis karena ini baru persalinan pertama, klien juga mengatakan khawatir untuk bergerak karena takut dengan jahitan di perineumnya Penerimaan terhadap bayi : Klien mengatakan sangat bahagia karena diberi amanah oleh Tuhan untuk melahirkan anak pertamanya. Kemampuan Menyusui : Klien mengatakan sudah mengetahui cara menyusui yang baik dan benar Obat-obatan yang dikonsumsi - Cefadroxil/12jam/Oral : Obat antibiotik yang mengatasi infeksi bakteri pada bagian tubuh, seperti kulit, tenggorokan, saluran kencing, dan jantung - SF(sulfas ferosus)/24Jam/oral : Untuk pembentukan sel darah merah, menjadi cadangan zat besi bagi janin, mengoptimalkan fungsi otot. - Asamefenamat : Obat antiinflamasi untuk meredakan rasa sakit dan peradangan - Paracetamol : Untuk meredakan demam dan nyeri</p>
--	--	--

	<p>cara menyusui yang baik dan benar</p> <p>Obat-obatan yang dikonsumsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cefadroxil/12jam/Oral : Obat antibiotik yang mengatasi infeksi bakteri pada bagian tubuh, seperti kulit, tenggorokan, saluran kencing, dan jantung - Asam Mefenamat/8jam/Oral : Obat antiinflamasi untuk meredakan rasa sakit dan peradangan - Paracetamol : Untuk meredakan demam dan nyeri - SF(sulfas ferosus)/24Jam/oral : Untuk pembentukan <u>sel darah merah</u>, menjadi cadangan zat besi bagi <u>janin</u>, mengoptimalkan fungsi otot 																									
Pemeriksaan Diagnostik																										
Pasien 1																										
- Pemeriksaan Lab																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal dan Pemeriksaan</th> <th>Test</th> <th>Hasil</th> <th>Hasil Normal</th> <th>Alasan untuk nilai abnormal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">05/06/2022 Hematologi</td> <td>WBC</td> <td>13.1</td> <td>4.0- 10.0 10³/uL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HGB</td> <td>12.2</td> <td>11.5-16.0 gr/dL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MCHC</td> <td>27.9</td> <td>31.0-35.0 gr/dL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NEUT</td> <td>11.0</td> <td>0.16-0.33 %</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tanggal dan Pemeriksaan	Test	Hasil	Hasil Normal	Alasan untuk nilai abnormal	05/06/2022 Hematologi	WBC	13.1	4.0- 10.0 10 ³ /uL		HGB	12.2	11.5-16.0 gr/dL		MCHC	27.9	31.0-35.0 gr/dL		NEUT	11.0	0.16-0.33 %					
Tanggal dan Pemeriksaan	Test	Hasil	Hasil Normal	Alasan untuk nilai abnormal																						
05/06/2022 Hematologi	WBC	13.1	4.0- 10.0 10 ³ /uL																							
	HGB	12.2	11.5-16.0 gr/dL																							
	MCHC	27.9	31.0-35.0 gr/dL																							
	NEUT	11.0	0.16-0.33 %																							
Pasien 2																										
- Pemeriksaan Lab																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal dan Pemeriksaan</th> <th>Test</th> <th>Hasil</th> <th>Hasil Normal</th> <th>Alasan untuk nilai abnormal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">05/06/2022 Hematologi</td> <td>RBC</td> <td>4.19</td> <td>3.80-5.80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HGB</td> <td>10,9</td> <td>11.5-16.0 gr/dL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MCHC</td> <td>29,1</td> <td>31.0-35.0 gr/dL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WBC</td> <td>11.4</td> <td>4.0- 10.0 10³/uL</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tanggal dan Pemeriksaan	Test	Hasil	Hasil Normal	Alasan untuk nilai abnormal	05/06/2022 Hematologi	RBC	4.19	3.80-5.80		HGB	10,9	11.5-16.0 gr/dL		MCHC	29,1	31.0-35.0 gr/dL		WBC	11.4	4.0- 10.0 10 ³ /uL					
Tanggal dan Pemeriksaan	Test	Hasil	Hasil Normal	Alasan untuk nilai abnormal																						
05/06/2022 Hematologi	RBC	4.19	3.80-5.80																							
	HGB	10,9	11.5-16.0 gr/dL																							
	MCHC	29,1	31.0-35.0 gr/dL																							
	WBC	11.4	4.0- 10.0 10 ³ /uL																							

Tabel 4.2 Analisa Data

Pasien 1

DATA	ETIOLOGI	MASALAH KEPERAWATAN
<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien mengeluh kurang nyaman Klien mengeluh nyeri perut P : Kontraksi uterus Q : Nyeri seperti ditusuk benda tumpul R : Nyeri pada pinggang menjalar keperut T : Hilang timbul sekitar 2 menit <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat Uterus teraba bulat Ada kontraksi uterus Lochea rubra berwarna merah kecoklatan, berbau amis, konsentrasi cair S : Skala nyeri 5 (NRS) 	<p>Post partum</p> <p>↓</p> <p>Adaptasi fisiologis</p> <p>↓</p> <p>Terjadi peningkatan kadar oksitosin</p> <p>↓</p> <p>Kontraksi uterus</p> <p>↓</p> <p>Nyeri</p> <p>↓</p> <p>Ibu kurang nyaman</p>	<p>Ketidaknyamanan Pasca Partum</p>
<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien mengeluh nyeri P : nyeri post partum Q : nyeri seperti teriris R : nyeri pada perineum T : 2 menit, hilang timbul <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien tampak meringis Skala Nyeri 3 Tampak jahitan pada luka post episiotomi Hasil TTV TD: 110/70 mmHg Nadi: 110x/menit Suhu: 38°C Pernapasan: 20x/menit SpO2 : 98 % 	<p>Persalinan pertama</p> <p>↓</p> <p>Tindakan Episiotomi</p> <p>↓</p> <p>Terputusnya kontinuitas jaringan/kulit</p> <p>↓</p> <p>Pelepasan mediator nyeri</p> <p>↓</p> <p>Respon cortex cerebri</p> <p>↓</p> <p>Nyeri dipersepsikan</p> <p>↓</p> <p>Nyeri akut</p>	<p>Nyeri Akut</p>
<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien mengatakan badannya terasa hangat <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> Badan teraba hangat Mukosa bibir kering 	<p>Respon trauma</p> <p>↓</p> <p>Pelepasan prostaglandin</p> <p>↓</p>	<p>Hipertermi</p>

<p>4. Hasil TTV TD: 110/70 mmHg Nadi: 110x/menit Suhu: 38°C Pernapasan: 20x/menit SpO2 : 98 %</p>	<p>Respon hipotalamus ↓ Suhu badan meningkat ↓ Demam</p>	
<p>Factor resiko :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengeluh nyeri pada area perineum 2. Badan terasa hangat 3. Suhu tubuh : 38°C 4. Tampak luka jahitan pada luka post episiotomy 5. WBC : 13.1 HGB : 12.2 MCHC : 27.9 NEUT : 11.0 	<p>Robekan perineum ↓ Tindakan prosedur invasif ↓ Pelepasan prostaglandin ↓ Respon hipotalamus ↓ Suhu badan meningkat ↓ Resiko infeksi</p>	<p>Resiko Infeksi</p>

Pasien 2

DATA	ETIOLOGI	MASALAH KEPERAWATAN
<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengeluh kurang nyaman 2. Klien mengeluh nyeri perut P : Kontraksi uterus Q : Nyeri seperti ditusuk benda tumpul R : Nyeri pada pinggang menjalar keperut T : Hilang timbul sekitar 2 menit <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat (8 jam post partum) 2. Uterus terasa bulat 3. Ada kontraksi uterus 	<p>Post partum ↓ Adaptasi fisiologis ↓ Terjadi peningkatan kadar oksitosin ↓ Kontraksi uterus ↓ Nyeri ↓ Ibu kurang nyaman</p>	<p>Ketidaknyaman Pasca Partum</p>

<p>4. Lochea rubra berwarna merah darah segar, dengan jumlah sekitar 250 cc/hari, konsentrasi cair dan berbau amis</p> <p>5. S : Skala nyeri 5 (NRS)</p>		
<p>DS :</p> <p>1. Klien mengeluh nyeri pada perineum P : nyeri post partum Q : nyeri seperti teriris R : nyeri pada perineum S : skala nyeri 4 (NRS) T : 4 menit, hilang timbul</p> <p>DO :</p> <p>1. Klien tampak meringis 2. Tampak jahitan pada perineum akibat ruptur perineum grade 2 3. Hasil TTV TD: 100/80 mmHg Nadi: 80x/menit Suhu: 36°C Pernapasan: 20x/menit SpO2 : 99 %</p>	<p>Persalinan pertama</p> <p>↓</p> <p>Rupture perineum grade 2</p> <p>↓</p> <p>Terputusnya kontinuitas jaringan/kulit</p> <p>↓</p> <p>Pelepasan mediator nyeri</p> <p>↓</p> <p>Respon cortex cerebri</p> <p>↓</p> <p>Nyeri dipersepsikan</p> <p>↓</p> <p>Nyeri akut</p>	<p>Nyeri Akut</p>
<p>Factor resiko :</p> <p>1. Klien mengeluh nyeri pada area perineum 2. Tampak luka jahitan pada perineum akibat ruptur perineum grade 2 3. WBC : 11.4 HGB : 10.9 MCHC : 29.1 RBC : 4.19</p>	<p>Robekan perineum</p> <p>↓</p> <p>Tindakan prosedur invasif</p> <p>↓</p> <p>Resiko infeksi</p>	<p>Resiko Infeksi</p>

4.1.2 Diagnosis Keperawatan

Pasien 1	Pasien 2
<p>1. Ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan involusi uterus (proses pengembalian ukuran Rahim ke bentuk semula) dibuktikan dengan :</p> <p>DS :</p> <p>1. Klien mengeluh kurang nyaman 2. Klien mengeluh nyeri perut P : Kontraksi uterus Q : Nyeri seperti ditusuk benda tumpul R : Nyeri pada pinggang menjalar keperut</p>	<p>1. Ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan involusi uterus (proses pengembalian ukuran Rahim ke bentuk semula) dibuktikan dengan :</p> <p>DS :</p> <p>1) Klien mengeluh kurang nyaman 2) Klien mengeluh nyeri perut P : Kontraksi uterus Q : Nyeri seperti ditusuk benda tumpul R : Nyeri pada pinggang menjalar</p>

<p>S : Skala nyeri 5 (NRS) T : Hilang timbul sekitar 2 menit</p> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat 2. Uterus teraba bulat 3. Ada kontraksi uterus 4. Lochea rubra berwarna merah kecoklatan, berbau amis, konsentrasi cair <p>2. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (post episiotomy) dibuktikan dengan .</p> <p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Klien mengeluh nyeri P : nyeri post partum Q : nyeri seperti teriris R : nyeri pada perineum S : skala nyeri 3 (NRS) T : 2 menit, hilang timbul <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Klien tampak meringis b) Tampak jahitan pada luka post episiotomy c) Hasil TTV TD: 110/70 mmHg Nadi: 110x/menit Suhu: 38°C Pernapasan: 20x/menit SpO2 : 98 % <p>3. Hipertemi berhubungan dengan Respon trauma dibuktikan dengan :</p> <p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Klien mengatakan badannya terasa hangat <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Badan teraba hangat b) Mukosa bibir kering c) Hasil TTV TD: 110/70 mmHg Nadi: 110x/menit Suhu: 38°C Pernapasan: 20x/menit SpO2 : 98 % <p>4. Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur tindakan invasive dibuktikan dengan :</p> <p>Factor resiko :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klien mengeluh nyeri pada area perineum 2) Badan teraba hangat 	<p>keperut</p> <p>S : Skala nyeri 5 (NRS) T : Hilang timbul sekitar 2 menit</p> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat (8 jam post partum) 2) Uterus teraba bulat 3) Ada kontraksi uterus 4) Lochea rubra berwarna merah darah segar, dengan jumlah sekitar 250 cc/hari, konsentrasi cair dan berbau amis <p>2. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (Rupture perineum) dibuktikan dengan :</p> <p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Klien mengeluh nyeri pada perineum P : nyeri post partum Q : nyeri seperti teriris R : nyeri pada perineum S : skala nyeri 4 (NRS) T : 4 menit, hilang timbul <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak meringis 2. Tampak jahitan pada perineum akibat rupture perineum grade 2 3. Hasil TTV TD: 100/80 mmHg Nadi: 80x/menit Suhu: 36°C R :20x/menit SpO2 : 99 % <p>3. Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur tindakan invasive dibuktikan dengan :</p> <p>Factor resiko :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klien mengeluh nyeri pada area perineum 2) Tampak luka jahitan pada perineum akibat rupture perineum grade 2 3) WBC : 11.4 HGB : 10.9 MCHC : 29.1 RBC : 4.19
--	---

<p>3) Suhu tubuh : 38°C 4) Tampak luka jahitan pada luka post episiotomy 5) WBC : 13.1 HGB : 12.2 MCHC : 27.9 NEUT : 11.0</p>	
---	--



4.1.3 Intervensi Keperawatan

Tabel 4.4 Intervensi Keperawatan

No.	Diagnosis Keperawatan	Luaran	Rencana Intervensi	Rasional
			Pasien 1	
1	<p>Ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan involusi uterus (proses pengembalian ukuran Rahim ke bentuk semula) dibuktikan dengan :</p> <p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengeluh kurang nyaman 2. Klien mengeluh nyeri perut <p>P : Kontraksi uterus Q : Nyeri seperti ditusuk benda tumpul R : Nyeri pada pinggang menjalar keperut S : Skala nyeri 5 (NRS) T : Hilang timbul sekitar 2 menit</p> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat 2. Uterus teraba bulat 3. Ada kontraksi uterus 4. Lochea rubra berwarna 	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 x 24 jam diharapkan status kenyamanan pasca partum meningkat dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keluhan tidak nyaman menurun b. Meringis menurun c. Kontraksi uterus menurun d. Ttv dalam batas normal 	<p>Terapi pijatan</p> <p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identifikasi kontraindikasi pijatan (misalnya penurunan trombosit, gangguan integritas kulit, deep vein thrombosis, area lesi, kemerahan atau radang, tumor, dan hipersensitivitas terhadap sentuhan) b. identifikasi kesediaan dan penerimaan dilakukan pijatan c. monitor respon terhadap pijatan <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> d. tetapkan jangka waktu untuk pijatan e. pilih area tubuh yang akan dipijat f. cuci tangan dengan air hangat g. siapkan lingkungan yang hangat, nyaman dan privasi h. buka area yang akan dipijat sesuai kebutuhan i. tutup area yang tidak terpajan (misalnya, dengan selimut, seprei atau handuk mandi) j. gunakan lotion atau minyak untuk mengurangi gesekan (perhatikan kontraindikasi penggunaan lotion atau minyak tertentu pada tiap 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengetahui kontraindikasi dari pijatan b. untuk memastikan klien setuju untuk dilakukan implementasi c. mengetahui respon klien terhadap pijatan <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> d. mengetahui waktu yang diperlukan untuk melakukan pijatan e. menjaga privasi klien, membuka area yang hanya ingin diberikan pijatan f. membuat tangan menjadi lebih rileks g. membuat klien lebih nyaman pada saat dilakukan pijatan h. menjaga privasi klien i. menjaga privasi klien j. untuk mencegah iritasi pada kulit k. membuat klien lebih rileks l. membuat klien merasakan setiap gerakan dari pijatan yang dilakukan <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> m. klien mengetahui tujuan dan tehnik dalam melakukan pijatan n. klien lebih merasakan sensasi dan pijatan

	merah kecoklatan, berbau amis, konsentrasi cair		individu) k. lakukan pemijatan secara perlahan l. lakukan pemijatan dengan teknik yang tepat Edukasi : m. jelaskan tujuan dan prosedur terapi n. anjurkan rileks selama pemijatan o. anjurkan beristirahat setelah dilakukan pemijatan	o. memaksimalkan perasaan rileks klien
2.	Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (post episiotomy) dibuktikan dengan : DS : 1. Klien mengeluh nyeri P : nyeri post partum Q : nyeri seperti teriris R : nyeri pada perineum S : skala nyeri 3 (NRS) T : 2 menit, hilang timbul DO : 1. Klien tampak meringis 2. Tampak jahitan pada luka post episiotomy 3. Hasil TTV TD: 110/70 mmHg Nadi: 110x/menit Suhu: 38°C Pernapasan: 20x/menit SpO2 : 98 %	Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan Kriteria hasil: a. Keluhan nyeri menurun b. Meringis menurun c. Frekuensi nadi dalam batas normal d. TTV dalam batas normal	Manajemen Nyeri Observasi a. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri b. Identifikasi skala nyeri c. Identifikasi respon nyeri non verbal d. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri e. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri f. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup g. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan h. Monitor efek samping analgetik Teraupetik i. Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis.TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin j. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis.suhu	Observasi a. Untuk mengetahui keadaan umum klien b. Untuk memudahkan tindakan selanjutnya c. Untuk memudahkan dalam pemberian intervensi d. Untuk memudahkan dilakukan intervensi e. Mengetahui persepsi klien mengenai nyeri f. Mengetahui sejauh mana nyeri mempengaruhi kualitas hidup klien khususnya aktivitas sehari-hari g. Memantau sejauh mana keberhasilan terapi yang diberikan h. Untuk mengetahui efek samping pemberian analgetik Teraupetik i. Untuk membantu menurunkan nyeri j. Untuk menghindari terjadinya memperberat nyeri k. Mengoptimalkan pasien untuk istirahat l. Untuk menentukan strategi meredakan nyeri

			<p>ruangan, pencahayaan, kebisingan)</p> <p>k. Fasilitasi istirahat dan tidur</p> <p>l. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri</p> <p>Edukasi</p> <p>m. Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri</p> <p>n. Jelaskan strategi meredakan nyeri</p> <p>o. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri</p> <p>p. Ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Kolaborasi</p> <p>q. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu</p>	<p>Edukasi</p> <p>m. Pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pemahaman klien</p> <p>n. Meningkatkan pengetahuan klien</p> <p>o. Klien paham cara memonitor nyeri secara mandiri</p> <p>p. Membantu klien mengurangi nyeri dan meningkatkan pengetahuan klien</p> <p>Kolaborasi</p> <p>q. Obat analgetik dapat mengurangi rasa nyeri</p>
3.	<p>Hipertemi berhubungan dengan Respon trauma dibuktikan dengan :</p> <p>DS :</p> <p>1. Klien mengatakan badannya terasa hangat</p> <p>DO :</p> <p>d) Badan terasa hangat</p> <p>e) Mukosa bibir kering</p> <p>f) Hasil TTV</p> <p>TD: 110/70 mmHg</p> <p>Nadi: 110x/menit</p> <p>Suhu: 38°C</p> <p>Pernapasan: 20x/menit</p> <p>SpO2 : 98 %</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 x 24 jam diharapkan termoregulasi membaik dengan kriteria hasil :</p> <p>a. Suhu tubuh membaik</p> <p>b. TTV dalam batas normal</p>	<p>Manajemen Hipertermia</p> <p>Observasi :</p> <p>a. Identifikasi penyebab (mis. Dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan incubator)</p> <p>b. Monitor suhu tubuh</p> <p>c. Monitor kadar elektrolit</p> <p>d. Monitor haluan urine</p> <p>e. Monitor komplikasi akibat hipertermia</p> <p>Terapeutik :</p> <p>f. Sediakan lingkungan yang dingin</p> <p>g. Longgarkan atau lepaskan pakaian</p> <p>h. Basahi dan kipas permukaan tubuh</p> <p>i. Berikan cairan oral</p> <p>j. Ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hyperhidrosis (keringat berlebih)</p>	<p>Observasi :</p> <p>a. Mengetahui penyebab hipertermia</p> <p>b. Mengetahui suhu tubuh klien</p> <p>c. Mengetahui kadar elektrolit</p> <p>d. Mengetahui pengeluaran urine</p> <p>e. Mengetahui yang terjadi akibat hipertermia</p> <p>Terapeutik :</p> <p>f. Untuk meminimalisir peningkatan suhu tubh klien</p> <p>g. Untuk membuat klien lebih nyaman dan rileks</p> <p>h. Untuk menurunkan sensasi panas yang dirasakan klien</p> <p>i. Untuk memenuhi kebutuhan cairan pasien agar terhindar dari dehidrasi</p> <p>j. Untuk mencegah terjadinya infeksi</p>

			<p>k. Lakukan pendinginan eksternal (misalnya selimut hipotermia, kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, dan aksila)</p> <p>l. Berikan oksigen jika perlu</p> <p>Edukasi :</p> <p>m. Anjurkan tirah baring</p> <p>Kolaborasi :</p> <p>n. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu</p>	<p>kuman akibat linen yang lembab</p> <p>k. Untuk menurunkan suhu tubuh klien</p> <p>Edukasi :</p> <p>l. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen klien</p> <p>m. Untuk memaksimalkan istirahat klien</p> <p>Kolaborasi :</p> <p>n. Memenuhi kebutuhan cairan klien</p>
4.	<p>Resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasive dibuktikan dengan :</p> <p>Factor resiko :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klien mengeluh nyeri pada area perineum 2) Badan terasa hangat 3) Suhu tubuh : 38°C 4) Tampak luka jahitan pada luka post episiotomy 5) WBC : 13.1 HGB : 12.2 MCHC : 27.9 NEUT : 11.0 	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan tingkat infeksi menurun dengan</p> <p>Kriteria Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Demam menurun b. Nyeri menurun c. Kadar sel darah putih membaik d. Kultur area luka membaik 	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Batasi jumlah pengunjung c. Berikan perawatan kulit pada edema d. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien e. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> f. Jelaskan tanda dan gejala infeksi g. Anjurkan cara mencuci tangan dengan benar h. Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi i. Anjurkan meningkatkan status nutrisi j. Anjurkan meningkatkan asupan cairan <p>Kolaborasi</p>	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Mengurangi kontaminasi bakteri c. Meringankan gejala edema d. Untuk mengurangi kontaminasi silang e. Mengurangi risiko infeksi pasca-prosedur dan untuk meminimalkan paparan dari penyedia layanan kesehatan untuk mikroorganisme yang berpotensi menular <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> f. Agar pasien dan keluarga pasien dapat memahami tanda dan gejala infeksi g. Untuk menumbuhkan perilaku cuci tangan yang baik dan benar h. Memeriksa tepi luka terhadap ada tidaknya epitelisasi dan/atau kontraksi i. Untuk membantu mempercepat epitelisasi j. Menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh

			Kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu	Kolaborasi Untuk merangsang kekebalan tubuh
--	--	--	--	---

No.	Diagnosis Keperawatan	Luaran	Rencana Intervensi	Rasional
Pasien 2				
1.	<p>Ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan involusi uterus (proses pengembalian ukuran Rahim ke bentuk semula) dibuktikan dengan :</p> <p>DS :</p> <p>1) Klien mengeluh kurang nyaman</p> <p>2) Klien mengeluh nyeri perut</p> <p>P : Kontraksi uterus</p> <p>Q : Nyeri seperti ditusuk benda tumpul</p> <p>R : Nyeri pada pinggang menjalar keperut</p> <p>S : Skala nyeri 5 (NRS)</p> <p>T : Hilang timbul sekitar 2 menit</p> <p>DO :</p> <p>1) Tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat (8 jam post partum)</p> <p>2) Uterus teraba bulat</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 x 24 jam diharapkan status kenyamanan pasca partum meningkat dengan kriteria hasil :</p> <p>a. Keluhan tidak nyaman menurun</p> <p>b. Meringis menurun</p> <p>c. Kontraksi uterus menurun</p> <p>d. Ttv dalam batas normal</p>	<p>Terapi pemijatan</p> <p>Observasi :</p> <p>a. identifikasi kontraindikasi pemijatan (misalnya penurunan trombosit, gangguan integritas kulit, deep vein thrombosis, area lesi, kemerahan atau radang, tumor, dan hipersensitivitas terhadap sentuhan)</p> <p>b. identifikasi kesediaan dan penerimaan dilakukan pemijatan</p> <p>c. monitor respon terhadap pemijatan</p> <p>Terapeutik :</p> <p>d. tetapkan jangka waktu untuk pemijatan</p> <p>e. pilih area tubuh yang akan dipijat</p> <p>f. cuci tangan dengan air hangat</p> <p>g. siapkan lingkungan yang hangat, nyaman dan privasi</p> <p>h. buka area yang akan dipijat sesuai kebutuhan</p> <p>i. tutup area yang tidak terpajan (misalnya, dengan selimut, seprei atau handuk mandi)</p> <p>j. gunakan lotion atau minyak untuk mengurangi gesekan (perhatikan kontraindikasi penggunaan lotion atau minyak tertentu pada tiap individu)</p>	<p>Observasi</p> <p>a. mengetahui kontraindikasi dari pemijatan</p> <p>b. untuk memastikan klien setuju untuk dilakukan implementasi</p> <p>c. mengetahui respon klien terhadap pemijatan</p> <p>Terapeutik</p> <p>d. mengetahui waktu yang diperlukan untuk melakukan pemijatan</p> <p>e. menjaga privasi klien, membuka area yang hanya ingin diberikan pijatan</p> <p>f. membuat tangan menjadi lebih rileks</p> <p>g. membuat klien lebih nyaman pada saat dilakukan pemijatan</p> <p>h. menjaga privasi klien</p> <p>i. menjaga privasi klien</p> <p>j. untuk mencegah iritasi pada kulit</p> <p>k. membuat klien lebih rileks</p> <p>l. membuat klien merasakan setiap gerakan dari pemijatan yang dilakukan</p> <p>Edukasi</p> <p>m. klien mengetahui tujuan dan tehnik dalam melakukan pemijatan</p> <p>n. klien lebih merasakan sensasi dan pemijatan</p> <p>o. memaksimalkan perasaan rileks klien</p>

	<p>3) Ada kontraksi uterus</p> <p>4) Lochea rubra berwarna merah darah segar, dengan jumlah sekitar 250 cc/hari, konsentrasi cair dan berbau amis</p>		<p>k. lakukan pemijatan secara perlahan</p> <p>l. lakukan pemijatan dengan tehnik yang tepat</p> <p>Edukasi :</p> <p>m. jelaskan tujuan dan prosedur terapi</p> <p>n. anjurkan rileks selama pemijatan</p> <p>o. anjurkan beristirahat setelah dilakukan pemijatan</p>	
2	<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (Rupture perineum) dibuktikan dengan :</p> <p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengeluh nyeri pada perineum P : nyeri post partum Q : nyeri seperti teriris R : nyeri pada perineum S : skala nyeri 4 (NRS) T : 4 menit, hilang timbul <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak meringis 2. Tampak jahitan pada perineum akibat ruptur perineum grade 2 3. Hasil TTV TD: 100/80 mmHg Nadi: 80x/menit Suhu: 36°C R :20x/menit SpO2 : 99 % 	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keluhan nyeri menurun b. Meringis menurun c. Frekuensi nadi dalam batas normal d. TTV dalam batas normal 	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri b. Identifikasi skala nyeri c. Identifikasi respon nyeri non verbal d. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri e. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri f. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup g. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan h. Monitor efek samping analgetik <p>Teraupetik</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Berikan tehnik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, tehnik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin j. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mengetahui keadaan umum klien b. Untuk memudahkan tindakan selanjutnya c. Untuk memudahkan dalam pemberian intervensi d. Untuk memudahkan dilakukan intervensi e. Mengetahui persepsi klien mengenai nyeri f. Mengetahui sejauh mana nyeri mempengaruhi kualitas hidup klien khususnya aktivitas sehari-hari g. Memantau sejauh mana keberhasilan terapi yang diberikan h. Untuk mengetahui efek samping pemberian analgetik <p>Teraupetik</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Untuk membantu menurunkan nyeri j. Untuk menghindari terjadinya memperberat nyeri k. Mengoptimalkan pasien untuk istirahat l. Untuk menentukan strategi meredakan nyeri <p>Edukasi</p>

			<p>k. Fasilitasi istirahat dan tidur l. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri</p> <p>Edukasi m. Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri n. Jelaskan strategi meredakan nyeri o. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri p. Ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Kolaborasi q. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu</p>	<p>m. Pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pemahaman klien n. Meningkatkan pengetahuan klien o. Klien paham cara memonitor nyeri secara mandiri p. Membantu klien mengurangi nyeri dan meningkatkan pengetahuan klien</p> <p>Kolaborasi q. Obat analgetik dapat mengurangi rasa nyeri</p>
3.	<p>Resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasive dibuktikan dengan :</p> <p>Factor resiko : Klien mengeluh nyeri pada area perineum 2) Tampak luka jahitan pada perineum akibat rupture perineum grade 2 3) WBC : 11.4 HGB : 10.9 MCHC : 29.1 RBC : 4.19</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan tingkat infeksi menurun dengan</p> <p>Kriteria Hasil: a. Demam menurun b. Nyeri menurun c. Kadar sel darah putih membaik d. Kultur area luka membaik</p>	<p>Pencegahan Infeksi Pencegahan Infeksi Observasi a. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil: Tidak ada tanda dan gejala infeksi lokal, S: 36,9°C</p> <p>Terapeutik b. Membatasi jumlah penjaga pasien yaitu hanya 2 orang Hasil: tidak terjadi penyebaran mikroorganisme c. Mencuci tangan sebelum dan sesudah bertemu dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil: tidak terjadi infeksi silang antara perawat dan pasien</p> <p>Edukasi d. Menganjurkan cara mencuci tangan</p>	<p>Observasi a. Untuk mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi</p> <p>Terapeutik b. Mengurangi kontaminasi bakteri c. Meringankan gejala edema d. Untuk mengurangi kontaminasi silang e. Mengurangi risiko infeksi pasca-prosedur dan untuk meminimalkan paparan dari penyedia layanan kesehatan untuk mikroorganisme yang berpotensi menular</p> <p>Edukasi f. Agar pasien dan keluarga pasien dapat memahami tanda dan gejala infeksi g. Untuk menumbuhkan perilaku cuci tangan yang baik dan benar h. Memeriksa tepi luka terhadap ada tidaknya epitelisasi dan/atau kontraksi</p>

			<p>dengan benar Hasil: penyebaran bakteri atau mikroorganisme tidak terjadi</p> <p>e. Menganjurkan keluarga untuk meningkatkan pemberian minum kepada pasien Hasil: Mengurangi risiko infeksi dengan asupan cairan yang cukup</p> <p>Kolaborasi</p> <p>f. Memberikan Ceftriaxone 1 gr melalui IV line pukul 07:00 WITA Hasil: setelah pemberian ceftriaxone 1 gr, infeksi bakteri tidak terjadi</p>	<p>i. Untuk membantu mempercepat epitalisasi</p> <p>j. Menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh</p> <p>Kolaborasi Untuk merangsang kekebalan tubuh</p>
--	--	--	---	--



<p>08.45 Wita</p>		<p>5. Menyiapkan lingkungan yang hangat, nyaman dan privasi hasil : privasi klien telah dijaga, dengan suhu ruangan 24°C</p> <p>6. Menggunakan lotion atau minyak untuk mengurangi gesekan (perhatikan kontraindikasi penggunaan lotion atau minyak tertentu pada tiap individu) hasil : sebelum dilakukan pemijatan, tuangkan 3 sampai 4 tetes baby oil untuk mencegah iritasi pada kulit</p> <p>7. Melakukan pemijatan secara perlahan hasil : pemijatan <i>Effleurage massage</i> dilakukan sesuai SOP dari referensi yang tersedia untuk memaksimalkan pemberian intervensi dengan benar</p> <p>Edukasi :</p> <p>1. Menjelaskan tujuan dan prosedur terapi hasil : klien diedukasi tentang manfaat dari terapi <i>effleurage massage</i> untuk mengurangi nyeri yang diakibatkan karena adanya kontraksi uteri atau pengembalian Rahim kebentuk semula yang membuat ibu menjadi tidak nyaman</p> <p>2. Menganjurkan rileks selama pemijatan anjurkan beristirahat setelah dilakukan pemijatan</p>	
<p>09.00 Wita</p>	<p>Nyeri Akut</p>	<p>Manajemen Nyeri Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Hasil : klien mengeluh nyeri pada perineum seperti teriris dengan durasi 2 sampai 3 menit hilang timbul</p> <p>2. Mengidentifikasi skala nyeri</p>	<p>06/06/2022 Pukul 14.00 Wita</p> <p>S :</p> <p>1) Klien mengeluh nyeri P : Nyeri post partum Q : Nyeri seperti teriris R : Nyeri pada perineum T : 2 menit, Hilang timbul</p>

<p>09.15 Wita</p> <p>09.20 Wita</p>		<p>Hasil : klien mengatakan skala nyeri 3</p> <p>3. Mengidentifikasi respon nyeri non verbal Hasil : klien tampak meringis</p> <p>4. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Hasil : klien mengatakan nyeri memberat ketika berdiri dan buang air kecil</p> <p>Teraupetik</p> <p>5. Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Hasil : klien diajarkan relaksasi nafas dalam</p> <p>Edukasi</p> <p>6. Menjelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri Hasil : klien diedukasi bahwa penyebab nyeri pada perineum karena adanya luka post episiotomy pada saat persalinan</p> <p>7. Menjelaskan strategi meredakan nyeri Hasil : klien diajarkan tehnik relaksasi nafas dalam untuk menurunkan nyeri</p> <p>Kolaborasi</p> <p>Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu Hasil ; klien diberikan terapi Asam mefenamat oral 3 x 1</p>	<p>O :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skala nyeri 3 2) Ekspresi meringis menurun 3) Tampak jahitan pada luka episiotmi 4) Hasil TTV TD : 100/80 Nadi : 100 x/menit Suhu : 36,8°C Pernafasan : 20xmenit SpO2 : 98% <p>A : Nyeri akut, Belum teratasi P : Lanjutkan intervensi,</p> <p>Manajemen Nyeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi skala nyeri 2) Identifikasi respon nyeri non verbal 3) Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis.suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) 4) Memberikan terapi nonfarmakologis : relaksasi nafas dalam 5) Fasilitasi istirahat dan tidur 6) Kolaborasi pemberian analgetik
<p>08.00 Wita</p>	<p>Hipertermi</p>	<p>Manajemen Hipertermia</p> <p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi penyebab (mis. Dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan incubator) Hasil : hipertermi disebabkan karena ada respon trauma yaitu post episiotomi 	<p>06/06/2022 Pukul 14.00 Wita</p> <p>S : Klien mengatakan demamnya sudah turun</p> <p>O :</p> <p>TD : 100/80 Nadi : 100 x/menit Suhu : 36,8°C Pernafasan : 20xmenit</p>

08.03 Wita		<p>2. Monitor suhu tubuh Hasil : Suhu tubuh menggunakan thermometer aksila 38°C</p> <p>3. Monitor komplikasi akibat hipertermia Hasil : mukosa bibir kering, dehidrasi</p> <p>Terapeutik :</p> <p>4. Sediakan lingkungan yang dingin Hasil : suhu ruangan normal 24°C</p> <p>5. Longgarkan atau lepaskan pakaian Hasil : klien hanya menggunakan sarung Berikan cairan oral Hasil : klien dianjurkan untuk minum 8 gelas perhari untuk mencegah dehidrasi</p> <p>7. Lakukan pendinginan eksternal (misalnya selimut hipotermia, kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, dan aksila) Hasil : dilakukan kompres dingin pada dahi</p> <p>Edukasi :</p> <p>8. Anjurkan tirah baring Hasil : klien dianjurkan untuk istirahat yang cukup</p> <p>Kolaborasi :</p> <p>9. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu Hasil : diberikan parasetamol 500 gr oral / 8 jam</p>	<p>SpO2 : 98%</p> <p>A : Hipertermi, Masalah teratasi</p> <p>P : Pertahankan intervensi apabila terjadi demam</p>
08.06 Wita			
08.10 Wita			
11.30 Wita	Resiko infeksi	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil: Badan terasa hangat, suhu tubuh meningkat 38°C, WBC : 13.1, HGB : 12.2, MCHC : 27.9, NEUT</p>	<p>06/06/2022 Pukul 14.00 Wita</p> <p>S : Klien mengeluh nyeri pada area perineum</p> <p>O: WBC : 13.1, HGB : 12.2, MCHC : 27.9, NEUT : 11.0</p> <p>A : Risiko Infeksi tidak terjadi</p>

<p>11.35 Wita</p> <p>11.37 Wita</p>		<p>: 11.0</p> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membatasi jumlah penjaga pasien yaitu hanya 2 orang Hasil: tidak terjadi penyebaran mikroorganism 3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah bertemu dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil: tidak terjadi infeksi silang antara perawat dan pasien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menganjurkan keluarga untuk meningkatkan pemberian minum kepada pasien Hasil: Mengurangi risiko infeksi dengan asupan cairan yang cukup <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pemberian terapi obat Cefadroxil / 12 jam/oral untuk mengatasi infeksi bakteri pada bagian tubuh. 	<p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 2. Batasi jumlah pengunjung 3. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien 4. Anjurkan meningkatkan asupan cairan 5. Pemberian Cefadroxil /12 jam/oral
<p>07/06/2022 08.30 Wita</p>	<p>Ketidaknyamanan pasca partum</p>	<p>Terapi pijatan</p> <p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kesediaan dan penerimaan dilakukan pijatan Hasil : Klien mengeluh nyeri perut seperti ditusuk benda tumpul dan menjalar, dengan skala nyeri 3 hilang timbul, klien menerima akan dilakukan terapi pijat yaitu terapi <i>effleurage massage</i> dengan berdasarkan SOP dari beberapa jurnal <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memilih area tubuh yang akan dipijat Hasil : area tubuh yang akan dipijat yaitu pada bagian perut 3. Siapkan lingkungan yang hangat dan menjaga privasi klien Hasil : suhu ruangan normal 4. Lakukan <i>Massage effleurage</i> sesuai SOP 	<p>07/06/2022 Pukul 12.00 Wita</p> <p>S :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klien mengeluh kurang nyaman 2) Klien mengeluh nyeri pinggang menjalar keperut seperti ditusuk benda tumpul sudah berkurang <p>O :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skala nyeri 2 (NRS) 2) Tinggi Fundus Uteri 2 jari dibawah pusat 3) Uterus masih teraba bulat 4) Ada kontraksi uterus <p>A : Ketidaknyamanan Pasca Partum (Involusi Uteri), belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjelaskan prosedur tindakan massage dilakukan 2) Edukasi pada ibu dan keluarga untuk

08.35 Wita		<p>Edukasi :</p> <p>5. Menjelaskan prosedur tindakan massage yang dilakukan Hasil : menjelaskan tujuan dan mengajarkan tehnik <i>effleurage massage</i> kepada keluarga dan klien.</p>	melakukan massage secara mandiri apabila kontraksi uterus masih muncul
	Nyeri akut	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi skala nyeri Hasil : Skala nyeri 2</p> <p>2. Mengidentifikasi respon nyeri non verbal Hasil : ekspresi meringis berkurang</p> <p>Terapeutik</p> <p>3. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis.suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) Hasil : nyeri pada perineum ketika buang air kecil</p> <p>4. Memberikan terapi nonfarmakologis : relaksasi nafas dalam Hasil : mendampingi klien dalam melakukan tehnik relaksasi nafas dalam</p> <p>Edukasi :</p> <p>5. Fasilitasi istirahat dan tidur Hasil : memberikan edukasi kepada klien untuk memaksimalkan waktu istirahat</p> <p>Kolaborasi :</p> <p>6. Kolaborasi pemberian analgetik Hasil : diberikan terapi asam mefenamat via oral/8 jam</p>	<p>07/06/2022 pukul 14.30</p> <p>S : Klien mengatakan nyeri pada perineum berkurang</p> <p>O :</p> <p>1) Ekspresi meringis berkurang 2) Skala nyeri 2 Hasil TTV TD : 110/80 mmHg Nadi : 100 x/menit Suhu : 36,7°C Pernafasan : 20x/menit SpO2 :99%</p> <p>A : Nyeri akut, belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <p>1) Edukasi pada pasien untuk melakukan terapi relaksasi napas dalam secara mandiri</p>
	Resiko infeksi	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil: WBC : 13.1, HGB : 12.2, MCHC : 27.9, NEUT : 11.0</p> <p>Terapeutik</p>	<p>06/06/2022 Pukul 14.00 Wita</p> <p>S : Klien mengeluh nyeri pada area perineum</p> <p>O: WBC : 13.1, HGB : 12.2, MCHC : 27.9, NEUT : 11.0</p> <p>A : Risiko Infeksi tidak terjadi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p>

		<p>2. Membatasi jumlah penjaga pasien yaitu hanya 2 orang Hasil: tidak terjadi penyebaran mikroorganisme</p> <p>3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah bertemu dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil: tidak terjadi infeksi silang antara perawat dan pasien</p> <p>Edukasi</p> <p>4. Menganjurkan keluarga untuk meningkatkan pemberian minum kepada pasien Hasil: Mengurangi risiko infeksi dengan asupan cairan yang cukup</p> <p>Kolaborasi</p> <p>5. Pemberian terapi obat Cefadroxil / 12 jam/orang untuk mengatasi infeksi bakteri pada bagian tubuh</p>	
--	--	--	--

Implementasi dan Evaluasi Keperawatan Pasien 2

HARI/TANGGAL/ JAM	NO.DIAGNOSIS	IMPLEMENTASI	EVALUASI
<p>06/06/2022 11.00 Wita</p> <p>11.10 Wita</p>	<p>Ketidaknyaman pasca partum</p>	<p>Terapi pemijatan Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kontraindikasi pemijatan (misalnya penurunan trombosit, gangguan integritas kulit, deep vein thrombosis, area lesi, kemerahan atau radang, tumor, dan hipersensitivitas terhadap sentuhan) hasil : trombosit dalam nilai normal, tidak ada kerusakan integritas kulit pada area yang akan dipijat, tidak ada peradangan dan tidak ada tumor pada bagian perut 2. Mengidentifikasi kesediaan dan penerimaan dilakukan pemijatan hasil : klien mengeluh nyeri perut seperti ditusuk benda tumpul dan menjalar, dengan skala nyeri 5 hilang timbul, klien menerima akan dilakukan terapi pijat yaitu terapi <i>effleurage massage</i> dengan berdasarkan SOP dari beberapa jurnal <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan jangka waktu untuk pemijatan Hasil : pemijatan dilakukan 4 sampai 5 menit selama kontraksi berlangsung dan diulangi 3 sampai 4 kali 4. Memilih area tubuh yang akan dipijat hasil : area tubuh yang akan dipijat yaitu pada area perut 5. Menyiapkan lingkungan yang hangat, nyaman dan privasi 	<p>06/06/2022 Pukul 12.30 Wita</p> <p>S :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klien megeluh nyeri pinggang menjalar keperut seperti ditusuk benda tumpul sudah berkurang <p>O :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skala nyeri 2 (NRS) 2) Tinggi Fundus Uteri 1 jari dibawah pusat 3) Ada kontraksi uterus <p>A : Ketidaknyamanan Pasca Partum (Involusi Uteri), belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjelaskan prosedur tindakan massage yang dilakukan 2) Menganjurkan kepada keluarga untuk melakukan tehnik massage dirumah secara mandiri dengan benar

11.20 Wita		<p>hasil : privasi klien telah dijaga, dengan suhu ruangan 24°C</p> <p>6. Menggunakan lotion atau minyak untuk mengurangi gesekan (perhatikan kontraindikasi penggunaan lotion atau minyak tertentu pada tiap individu) hasil : sebelum dilakukan pemijatan, tuangkan 3 sampai 4 tetes baby oil untuk mencegah iritasi pada kulit</p> <p>7. Melakukan pemijatan secara perlahan hasil : pemijatan <i>Effleurage massage</i> dilakukan sesuai SOP dari referensi yang tersedia untuk memaksimalkan pemberian intervensi dengan benar</p> <p>Edukasi :</p> <p>3. Menjelaskan tujuan dan prosedur terapi hasil : klien diedukasi tentang manfaat dari terapi <i>effleurage massage</i> untuk mengurangi nyeri yang diakibatkan karena adanya kontraksi uteri atau pengembalian Rahim kebentuk semula yang membuat ibu menjadi tidak nyaman</p> <p>4. Menganjurkan rileks selama pemijatan anjurkan beristirahat setelah dilakukan pemijatan</p>	
09.30 Wita	Nyeri Akut	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Hasil : klien mengeluh nyeri pada perineum seperti teriris dengan durasi 4 menit hilang timbul</p> <p>2. Mengidentifikasi skala nyeri Hasil : klien mengatakan skala nyeri 4</p> <p>3. Mengidentifikasi respon nyeri non verbal Hasil : klien tampak meringis</p>	<p>06/06/2022 Pukul 14.30 Wita</p> <p>S :</p> <p>1) Klien mengeluh nyeri P : Nyeri post partum Q : Nyeri seperti teriris R : Nyeri pada perineum T : 2 menit, Hilang timbul</p> <p>O :</p> <p>1) Skala nyeri 3 2) Ekspresi meringis menurun</p>

<p>09.35 Wita</p> <p>09.40 Wita</p>		<p>4. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Hasil : klien mengatakan nyeri memberat ketika berdiri dan buang air kecil</p> <p>Teraupetik</p> <p>5. Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Hasil : klien diajarkan relaksasi nafas dalam</p> <p>Edukasi</p> <p>6. Menjelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri Hasil : klien diedukasi bahwa penyebab nyeri pada perineum karena adanya luka post episiotomy pada saat persalinan</p> <p>7. Menjelaskan strategi meredakan nyeri Hasil : klien diajarkan tehnik relaksasi nafas dalam untuk menurunkan nyeri</p> <p>Kolaborasi</p> <p>Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu Hasil ; klien diberikan terapi Asam mefenamat oral 3 x 1</p>	<p>3) Tampak jahitan pada luka episiotomi</p> <p>4) Hasil TTV TD : 120/100 Nadi : 88 x/menit Suhu : 36,5°C Pernafasan : 20xmenit SpO2 : 99%</p> <p>A : Nyeri akut, Belum teratasi P : Lanjutkan intervensi,</p> <p>Manajemen Nyeri</p> <p>1) Memberikan terapi nonfarmakologis : relaksasi nafas dalam</p> <p>2) Mengajarkan kepada pasien untuk melakukan tehnik relaksasi napas dalam secara mandiri dirumah</p>
<p>08.00 Wita</p>	<p>Resiko infeksi</p>	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil: tampak luka jahitan pada perineum, HGB 10.9</p> <p>Terapeutik</p> <p>2. Membatasi jumlah penjaga pasien yaitu hanya 2 orang Hasil: tidak terjadi penyebaran mikroorganism</p> <p>3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah bertemu dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil: tidak terjadi infeksi silang antara perawat dan</p>	<p>06/06/2022 Pukul 14.00 Wita</p> <p>S : Klien mengeluh nyeri pada area perineum O: Tampak luka jahitan pada perineum A : Risiko Infeksi tidak terjadi P : Lanjutkan intervensi</p> <p>1) Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</p> <p>2) Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</p>

<p>08.03 Wita</p>		<p>pasien Edukasi 4. Menganjurkan keluarga untuk meningkatkan pemberian minum kepada pasien Hasil: Mengurangi risiko infeksi dengan asupan cairan yang cukup Kolaborasi</p>	<p>3) Anjurkan meningkatkan asupan cairan</p>
-------------------	--	---	---



BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan

5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan

Pengkajian adalah proses pengumpulan data maupun informasi baik subjektif maupun objektif seperti wawancara dengan pasien dan keluarga, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan pemeriksaan fisik serta peninjauan informasi riwayat pasien di buku rekam medis. Selain mengumpulkan data aktual, perawat juga mengumpulkan kekuatan yaitu untuk mengidentifikasi peluang promosi kesehatan dan risiko yaitu untuk mencegah penyakit atau potensi masalah yang dapat ditunda (Nurarif, A. H., & Kusuma, 2015). Pengkajian keperawatan individu dilakukan fokus pada keluhan yang dialami pasien dan pemeriksaan fisik, pengkajian keluhan pasien dilakukan dengan cara wawancara sedangkan pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi (Teli, 2018).

Pada pengkajian didapatkan kedua pasien mengeluh tidak nyaman dikarenakan adanya nyeri kontraksi uterus yang muncul secara tiba-tiba. Penulis mendapatkan kesamaan antara kasus yang ditemukan dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Harista, 2021) bahwa perubahan fisiologi yang terjadi pada ibu post partum yaitu kontraksi uterus. Kontraksi uterus merupakan proses pengembalian rahim ke bentuk semula yang dapat mengakibatkan nyeri perut yang biasa disebut dengan nyeri susulan atau his

royan. Perubahan fisiologis tersebut yang membuat ibu post partum merasa tidak nyaman.

Pada pengkajian status nyeri, kedua pasien mengeluh nyeri. Hal ini sesuai dengan penelitian (Haryani *et al.*, 2022) yang mengemukakan bahwa trauma perineum baik yang disebabkan oleh tindakan episiotomy ataupun kejadian rupture perineum akan berdampak negative pada ibu baik secara fisik maupun psikologisnya. Secara fisik trauma perineum akan menyebabkan nyeri akut pada luka jahitan diperineum ibu post partum. Berdasarkan teori tersebut masalah nyeri akut sangat erat kaitannya dengan kondisi trauma perineum, hal tersebut serupa dengan yang dirasakan pasien.

Pada pengkajian proteksi dan keamanan ditemukan bahwa kedua pasien mengalami trauma perineum. Kondisi yang dialami ibu post partum dengan adanya trauma perineum mengakibatkan resiko infeksi sangat rentan terjadi. Terdapat kesamaan fakta dengan teori yang terdapat pada diagnosis resiko infeksi yaitu efek prosedur invasive. Sama halnya dengan pasien 1 dengan post episiotomy dan pasien 2 dengan rupture perineum. Keduanya telah diberikan tindakan invasive yaitu jahitan pada perineum.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Utami & Triana, 2021) bahwa apabila perawatan perineum tidak dimaksimalkan dapat mengakibatkan kondisi luka jahitan perineum terkena lochea dan menjadi lembab, kondisi tersebut sangat menunjang terjadinya perkembangbiakan bakteri yang dapat menyebabkan timbulnya infeksi.

Kesimpulan yang didapat dari data pengkajian pada kedua pasien hampir keseluruhan sesuai dengan teori. Beberapa gejala yang timbul pada kedua pasien hampir sama.

5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis tentang respon klien terhadap proses kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung maupun masalah kesehatan aktual maupun potensial (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017)

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data terdapat 4 diagnosis yang ditegakkan pada pasien 1 dan 2. Pada pasien 1 terdapat 4 diagnosis keperawatan yaitu diagnosis pertama ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan involusi uteri, diagnosis kedua nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, diagnosis ketiga hipertermi berhubungan dengan respon trauma, dan diagnosis keempat yaitu resiko infeksi berhubungan dengan prosedur tindakan invasive.

Pada pasien 2 terdapat 3 diagnosis keperawatan yaitu, diagnosis pertama ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan involusi uteri, diagnosis kedua nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, dan diagnosis ketiga yaitu resiko infeksi berhubungan dengan prosedur tindakan invasive.

Berikut pembahasan diagnosis yang muncul sesuai teori pada kasus pasien 1 dan 2 yaitu :

- a. Ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan involusi uteri

Kedua pasien mengeluh tidak nyaman karena nyeri pinggang menjalar ke perut yang dirasakan kedua pasien. Skala nyeri yang dirasakan kedua ibu yaitu berada pada skala 5 menggunakan metode NRS. Pada ibu post partum nyeri perut yang dirasakan disebabkan karena faktor fisiologis yaitu adanya kontraksi uterus dalam proses involusi uteri atau pengembalian rahim ke bentuk semula.

Diagnosis keperawatan ditetapkan oleh peneliti adalah ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan involusi uterus. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Harista, 2021) bahwa ibu post partum bisa mengalami ketidaknyamanan pasca partum akibat nyeri kontraksi uterus. Jadi menurut analisis peneliti terdapat kesesuaian antara hasil studi kasus dengan teori.

b. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik

Dalam buku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) pada diagnosis keperawatan nyeri akut, tanda dan gejala mayor dari data subjektif yaitu klien mengeluh nyeri dan data objektif klien tampak meringis. Berdasarkan hasil pengkajian tentang nyeri akut, ditemukan bahwa kedua pasien mengalami nyeri yang disebabkan karena adanya pencedera fisik yaitu tindakan prosedur invasive yang disertai bukti data objektif terdapat luka jahitan pada perineum. Perbedaan antara pasien 1 dan pasien 2 hanya di skala nyeri yang dirasakan.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Mulati, 2019) yang mengemukakan bahwa nyeri perineum timbul karena adanya kejadian

robekan /laserasi perineum saat proses melahirkan. Nyeri perineum akan dirasakan secara berbeda pada setiap ibu post partum karena setiap ibu post partum memiliki kemampuan yang berbeda dalam beradaptasi dengan rasa nyeri.

c. Hipertermi berhubungan dengan respon trauma

Dalam buku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) pada diagnosis keperawatan hipertermi, tanda dan gejala mayor dari data subjektif yaitu suhu tubuh diatas nilai normal. Berdasarkan hasil pengkajian tentang hipertermi, ditemukan bahwa pasien 1 mengalami hipertermi karena suhu tubuh berada diatas nilai normal yaitu 38°C. Dikaitkan dengan teori dalam buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia bahwa penyebab hipertermi karena adanya respon trauma.

d. Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur tindakan invasive

Menurut analisa peneliti, muncul masalah keperawatan resiko infeksi pada kedua pasien karena ditemukan adanya luka jahitan pada perineum. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Utami & Triana, 2021) yang mengemukakan bahwa luka jahitan pada perineum dapat menunjang terjadinya perkembangbiakan bakteri apabila perawatan tidak dimaksimalkan.

5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan

Perencanaan keperawatan pada pasien 1 dan 2 disusun menggunakan buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia dimana perencanaan ini baru dapat disusun apabila data yang telah terkumpul sudah dianalisis dan diprioritaskan. Perencanaan

ini dibuat untuk mengatasi permasalahan pasien dengan tahap tindakan dimulai dari observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi.

Perencanaan yang dapat dilakukan pada pasien dengan diagnosis ketidaknyamanan pasca partum yang berhubungan dengan involusi uterus berdasarkan SIKI 2018 salah satunya yaitu terapi pemijatan. Dalam jurnal (Irda Novrida Ashar dan Achmad Suardi, 2018) menjelaskan bahwa *massage* bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menghangatkan otot abdomen, serta meningkatkan relaksasi fisik dan mental sehingga ibu post partum akan merasa nyaman. Tujuan asuhan keperawatan berdasarkan SIKI 2018 diharapkan status kenyamanan pasca partum meningkat dengan kriteria hasil keluhan tidak nyaman menurun, keluhan nyeri menurun, kontraksi uterus menurun, dan vital sign dalam batas normal.

Intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosa keperawatan nyeri akut berdasarkan buku SIKI 2018 yaitu manajemen nyeri. Pasien yang masih merasa nyeri dan tampak meringis apabila efek dari analgetik hilang sehingga dibutuhkan terapi non-farmakologis. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aini, S. N., & Nilasari, 2018) Bahwa nyeri merupakan masalah yang serius yang harus direspons dan diintervensi dengan memberikan rasa nyaman, aman dan bahkan membebaskan nyeri tersebut. Manajemen nyeri adalah satu bagian dari disiplin ilmu medis yang berkaitan dengan upaya-upaya menghilangkan nyeri. Penanganan nyeri bisa dilakukan secara farmakologi yaitu dengan pemberian analgesik. Sedangkan secara non

farmakologi melalui distraksi, relaksasi, kompres hangat atau dingin, aromaterapi, hypnotis, dll.

Berdasarkan studi kasus pasien 1 dan 2, intervensi manajemen nyeri dilakukan pada kedua pasien dan tidak ditemukan adanya perbedaan. Tujuan dari asuhan keperawatan berdasarkan SLKI (2018) diharapkan masalah nyeri akut teratasi dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, meringis menurun dan vital sign dalam nilai normal.

Intervensi yang dapat dilakukan pada ibu post partum dengan diagnosis keperawatan hipertermi berdasarkan SIKI 2018 yaitu manajemen hipertermi. Pasien 1 dengan suhu tubuh diatas nilai normal yaitu 38°C dapat diberikan tindakan farmakologis dan nonfarmakologis. Salah satu bentuk terapi nonfarmakologis yaitu pemberian kompres dingin pada dahi.

Asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada pasien pertama dan kedua dengan masalah keperawatan risiko infeksi yaitu pencegahan infeksi berdasarkan SIKI (2018) sedangkan tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil demam menurun, nyeri menurun, kadar sel darah putih membaik, dan kultur area luka membaik.

5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien 1 dan 2 dilakukan diwaktu yang sama pada hari pertama perawatan. Pada pasien pertama dilakukan 2 hari perawatan pada tanggal 06 sampai 07 Juni 2022 sedangkan pada pasien 2 hanya dilakukan 1 hari perawatan pada tanggal 06 dikarenakan pasien pulang. Perawatan kedua pasien dilakukan diruang Masa Nifas Al-

Ghaniyyuh Rsia Sitti Khadijah Makassar. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI. Implementasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan sesuai dengan masalah keperawatan yang ditemukan pada kedua pasien.

Perencanaan yang dibuat peneliti untuk diagnosis ketidaknyamanan pasca partum yaitu terapi pemijatan. Berdasarkan SIKI 2018 yaitu mengidentifikasi kontraindikasi dari pemijatan dan mengidentifikasi kesediaan dilakukan pemijatan, monitor respon terhadap pemijatan, menetapkan jangka waktu untuk pemijatan, pilih area tubuh yang akan dipijat, siapkan lingkungan yang aman dan privasi terjaga, gunakan lotion atau minyak untuk mencegah iritasi, melakukan tehnik pemijatan dengan tepat, menjelaskan prosedur terapi dan menaganjurkan rileks selama pemijatan.

Pada hari 1 dan 2, kedua pasien diberikan intervensi terapi pemijatan yaitu *massage effleurage* selama 4 sampai 5 menit yang dan diulangi selama 3 kali selama kontraksi berlangsung. Pada hari kedua hanya pasien 1 diberikan intervensi yang sama dikarenakan pasien 2 sudah pulang. Gerakan *massage effleurage* dilakukan langsung kepada pasien selama kontraksi berlangsung yang sebelumnya telah dilakukan *informed consent* berdasarkan SOP yang ada pada jurnal (Fasikhatun, Sulistyowati, 2019). Setelah dilakukan gerakan *massage effleurage* dilakukan tahap evaluasi yaitu menanyakan langsung kepada pasien perasaan setelah diberikan terapi. Kedua pasien mengatakan ia merasa rileks dan nyaman serta skala nyeri pada kedua

pasien mengalami penurunan. Berdasarkan studi kasus pada pasien semua intervensi terapi pemijatan yang telah disusun dilakukan pada pasien.

Berdasarkan perencanaan yang dibuat peneliti, melakukan tindakan keperawatan yang telah disusun sebelumnya untuk mengatasi masalah nyeri akut pada pasien 1 dan 2 yaitu melakukan manajemen nyeri. Tindakan mandiri yang diberikan perawat adalah relaksasi napas dalam. Relaksasi napas dalam menjadi terapi nonfarmakologi yang dipilih oleh penulis. Hal ini di dukung oleh Penelitian yang menunjukkan bahwa relaksasi nafas dalam dapat menurunkan intensitas nyeri ringan hingga sedang yang dirasakan oleh pasien. Tidak semua intervensi yang disusun pada rencana keperawatan dilakukan oleh penulis karena adanya beberapa pertimbangan seperti situasi dan kondisi pasien.

Kemudian untuk diagnosis Hipertermi yang hanya dialami oleh pasien 1, diberikan tindakan keperawatan manajemen hipertermi dimana tindakan mandiri keperawatan yaitu kompres dingin pada dahi. Kompres dingin diberikan pada klien namun dikolaborasikan dengan terapi farmakologis yaitu diberikan obat demam paracetamol 500 gr oral. Dan untuk tindakan utama yang dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan pada masalah risiko infeksi pasien 1 dan 2 yaitu pencegahan infeksi misalnya mencuci tangan sebelum dan sesudah bertemu dengan pasien dan lingkungan pasien.

5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan

Berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif terkait masalah ketidaknyaman pasca partum yang didapatkan dari pasien 1 adalah pasien

mengatakan nyeri perut seperti ditusuk benda tumpul dan menjalar berkurang. Klien mengatakan skala nyerinya berada di angka 3, data objektifnya yaitu Tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat dan uterus masih teraba bulat. Sedangkan pada pasien dua setelah diberikan implemetasi, hasil evaluasinya yaitu klien mengatakan skala nyerinya berada diangka 2, data objektif yang didapatkan tinggi fundus uteri masih 1 jari dibawah pusat dan uterus masih teraba bulat.

Berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif terkait masalah nyeri akut didapatkan dari pasien satu adalah pasien mengatakan masih merasa nyeri, pasien mengatakan jika nyeri ia melakukan relaksasi napas dalam. Ekspresi meringis menurun. TTV : TD : I00/80, N: 100 kali/menit, R: 20 kali/menit, S: 36,5°C. Sedangkan pada pasien dua klien mengatakan apabila nyeri perineumnya timbul maka ia melakukan relaksasi nafas dalam secara mandiri. Data objektif yang didapatkan yaitu hasil TTV : TD : I20/100, N: 88 kali/menit, R: 20 kali/menit, S: 36,3°C.

Hasil evaluasi untuk pasien 1 yang mengalami masalah keperawatan hipertermi, setelah diberikan tindakan keperawatan manajemen hipertermi yaitu kompres dingin pada dahi klien mengatakan demamnya sudah turun. Kemudian dilakukan pengukuran suhu pada axila didapatkan hasil 36.5°C.

Selanjutnya, untuk masalah keperawatan resiko infeksi pada kedua pasien. Hasil evaluasi sumatif pada pasien 1 dan 2, pasien masih mengeluh nyeri pada perineum setelah buang air kecil, sehingga diperlukan edukasi

untuk pencegahan infeksi dengan tujuan infeksi tidak terjadi pada kedua pasien.

5.2 Analisis Intervensi EBP

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah ketidaknyamanan pasca partum menggunakan intervensi *Massage effleurage*. Perasaan tidak nyaman yang dialami ibu post partum merupakan salah satu perubahan fisiologis yaitu adanya kontraksi uterus sebagai salah satu proses involusi uterus, kontraksi uterus akan menyebabkan nyeri yang biasa disebut dengan nyeri susulan atau his royang (Fasikhatun, Sulistyowati, 2019). Terapi yang biasa diberikan pada ibu post partum dengan masalah nyeri yaitu terapi farmakologis dan nonfarmakologis (Irda Novrida Ashar dan Achmad Suardi, 2018).

Terapi farmakologis berupa obat analgesik atau opioid untuk meringankan nyeri dapat menimbulkan efek samping dari penggunaan obat. Terapi non-farmakologis yang dapat diberikan salah satunya yaitu terapi massage. Terapi massage ini dapat meminimalisir bahkan menekan nyeri dengan minim efek samping bahkan tidak ada efek samping, salah satunya dengan menggunakan teknik *effleurage massage*.

Effleurage massage merupakan salah satu teknik relaksasi yang paling mudah dilakukan untuk memberikan rasa nyaman pada ibu postpartum. Pijat *effleurage* adalah suatu teknik pemijatan dengan menggunakan kedua telapak tangan yang diletakkan pada perut ibu dengan gerakan yang melingkar kearah pusat dan simpisis atau dengan menggunakan satu telapak dengan gerakan melingkar dan searah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah

dan menghangatkan abdomen serta meningkatkan rileksasi fisik dan mental (Harista, 2021)

Stimulasi kulit dengan tehnik effleurage dapat menghasilkan impuls yang dikirim melalui serabut saraf besar yang terletak dipermukaan kulit. serabut saraf besar ini yang akan menutup gerbang sehingga otak tidak menerima pesan nyeri karena sudah diblokir oleh stimulasi kulit dengan tehnik effleurage ini, maka akibatnya persepsi nyeri akan berubah dan membuat ibu merasa nyaman (Irda Novrida Ashar dan Achmad Suardi, 2018)

Hal tersebut sejalan dengan teori Kolcaba yang mengedepankan kenyamanan sebagai kebutuhan semua manusia. Kenyamanan ialah kebutuhan yang diperlukan pada rentang sakit hingga sehat dan kenyamanan merupakan label tahap akhir dari tindakan terapeutik perawat kepada pasien. Kolcaba memandang bahwa kenyamanan merupakan kebutuhan dasar seorang individu yang bersifat holistik, meliputi kenyamanan fisik, psikospiritual, sosiokultural, lingkungan. Sehingga peneliti berasumsi bahwa terapi *massage effleurage* dapat digunakan sebagai intrervensi untuk meningkatkan kenyamanan pada pasien post partum dengan masalah nyeri afterpain

5.3 Keterbatasan

Keterbatasan yang peneliti alami dalam melakukan penelitian ini yaitu bagi responden tehnik *effleurage massage* merupakan ilmu baru bagi mereka, sehingga perlu pendekatan dan penjelasan sebaik mungkin agar responden paham akan manfaat yang didapatkan dari *effleurage massage* dan ada minat untuk

mrelakukannya sebagai penanganan non-farmakologis dalam manajemen nyeri *afterpains* yang ibu rasakan pada masa nifas tanpa adanya paksaan dari siapapun.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Pengkajian Keperawatan

Pada pengkajian status kenyamanan, ditemukan bahwa kedua pasien mengalami ketidaknyamanan pasca partum, begitu pula pada pengkajian status nyeri ditemukan bahwa kedua pasien mengalami masalah keperawatan nyeri akut.

Selanjutnya pada pengkajian proteksi dan keamanan didapatkan bahwa pasien 1 mengalami hipertermi. Sedangkan pada pasien 2 tidak mengalami masalah keperawatan hipertermia. Kemudian masih pada pengkajian proteksi dan keamanan, didapatkan bahwa kedua pasien mengalami masalah keperawatan resiko infeksi.

6.1.2 Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data didapatkan 4 diagnosis keperawatan pada pasien 1 dan 2. Diagnosis pada pasien 1 yaitu ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan involusi uterus, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, hipertermi berhubungan dengan respon trauma, dan resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasive.

Diagnosis keperawatan berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data pada pasien 2 yaitu ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan

involusi uterus, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, dan resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasive.

6.1.3 Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan pada diagnosis ketidaknyamanan pasca partum yaitu terapi pijatan (terapi *massage effleurage*), kemudian untuk diagnosis nyeri akut diberikan intervensi manajemen nyeri, untuk diagnosis hipertermi diberikan intervensi manajemen hipertermi, dan untuk diagnosis keperawatan resiko infeksi diberikan intervensi pencegahan infeksi.

6.1.4 Implementasi Keperawatan

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien 1 dan 2 dilakukan diwaktu yang sama yaitu pada pasien pertama dilakukan 2 hari perawatan pada tanggal 06 sampai 07 Juni 2022. Sedangkan pada pasien 2 hanya dilakukan 1 hari perawatan yaitu pada tanggal 06 Juni 2022. Keduanya dilakukan di ruang Masa Nifas Al-Ghaniyyuh RSIA Sitti Khadijah Makassar. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI yang kemudian didukung oleh beberapa jurnal penelitian.

6.1.5 Evaluasi Keperawatan

Evaluasi pada pasien 1 dan 2 masalah keperawatan ketidaknyamanan pasca partum belum teratasi namun untuk evaluasi skala nyeri kedua pasien mengalami penurunan nyeri setelah diberikan terapi *massage effleurage*. Penurunan skala nyeri yang dirasakan pasien 1 dan 2 berbeda, karena

frekuensi pemberian pada pasien 1 dilaksanakan selama 2 hari sedangkan pada pasien 2 hanya dilakukan 1 hari perawatan.

6.1.6 Evaluasi EBP

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada ibu partum dengan nyeri afterpains menggunakan intervensi *massage effleurage*. *Massage effleurage* merupakan tehnik pemijatan yang dilakukan untuk memberikan efek nyaman pada ibu post partum yang mengalami nyeri afterpains. Dalam menyelesaikan masalah yang dialami pasien, penulis membantu memberikan terapi untuk masalah psikologis sehingga ibu post partum dapat merasakan kenyamanan.

6.2. Saran

6.2.1. Bagi Mahasiswa

Sebelum melakukan terapi *massage effleurage* ini baiknya, lingkungan sekitar klien di perhatikan agar privacy tetap terjaga, dan memperhatikan indikasi dan kontraindikasi dari pemberian terapi ini.

6.2.2. Bagi perawat

Penerapan terapi *massage effleurage* ini dapat diberikan 2 sampai 3 kali pada ibu post partum selama kontraksi berlangsung dengan memperhatikan indikasi dan kontraindikasi serta SOP dari pemberian terapi ini.


DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. N., & Nilasari, I. (2018). *Manajemen nyeri dengan kombinasi tehnik relaksasi napas dalam dan pemberian analgetik dalam menurunkan nyeri pada cedera kepala ringan. Jurnal Keperawatan CARE.*.
- Aldina, N., Indah, R., Sari, K., & Astuti, W. (2022). *The Effect Of The Use Of Bengkung And Parturition Gymnastic On The Reduction Of Back Pain Intensity At Primary Health Care Of Gang Sehat I Puskesmas Gang Sehat Pontianak Selatan. 1(2), 60–66.*
- Andarmoyo, S. (2013). *Konsep Dan Proses Keperawatan Nyeri. Yogyakarta: Ar-Ruzz.*
- Asih Yusari & Risneni. (2016). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Jakarta: CV. Trans Info Media.*
- Fasikhatun, Sulistyowati, L. (2019). *Gambaran Nyeri Sebelum Dan Sesudah Di Lakukan Tindakan Effleurage massage Kepada Ibu Post Partum Primipara Di Rsud Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Journal of Nursing and Health.*
- Gadysa, G. (2010). *Persepsi Ibu Tentang Metode Massage. Jakarta : EGC.*
- Harista, D. R. (2021). *Penerapan Prosedur Terapi Effleurage massage Pada Ibu Dengan Ketidaknyamanan Pasca Partum: Literature Review. 1(2), 60–64.*
- Haryani, S., Waluyo, U. N., & Spontan, P. P. (2022). *Pengelolaan Ketidaknyamanan Pasca Partum pada Ibu Post Partum Spontan dengan Episiotomy. 4(2), 246–260.*
- Hidayat. (2019). *Pembahasan studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian. August.*
- Irda Novrida Ashar dan Achmad Suardi. (2018). *Pengaruh Effleurage massage Terhadap Penurunan Rasa Nyeri Pada Ibu Postpartum Multipara.*
- Kolcaba, K. T. D. (2012). *. Comfort Theory a Unifying Framework in Enhance Practice Environment. The Jurnal of Nursing Administration.*
- Mulati, T. S. (2019). *Nyeri Perineum Berdasarkan Karakteristik Pada Ibu Post Partum. Jurnal Involusi Kebidanan, 7, 41–50.*
- Nugroho, T. (2014). *Buku Ajar Askeb1 Kehamilan. Yogyakarta: Nuha Medika.*
- Nurarif, A. H., & Kusuma, H. (2015). *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis & NANDA NIC-NOC Jilid 1. Jogjakarta: Medication.*

- Nursalam, Kusnanto, M.Has, E. M., Yusuf, A., Kurniawati, N. D., Sukartini, T., Efendi, F., & Kusumaningrum, T. (2020). *Pedoman Penyusunan Skripsi - Literature Review Dan Tesis - Systematic Review*.
- Oktarina, M. (2015). *Buku ajar asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Deepublish*.
- Parulian, TS. Sitompul, J. O. (2014). *Pengaruh Teknik Effflurage Massage Terhadap Perubahan Nyeri Pada Ibu Post Partum Di Rumah Sakit Sarininggih Bandung. Bandung*.
- Parulian, T. S., Sitompul, J., & Oktrifiana, A. N. (2013). *Pengaruh teknik*.
- Purwanto & Rahayu. (2018). *Asuhan kebidanan Nifas dan Menyusui. Cetakan ke. Ngestiningrum AH, editor. surabaya*.
- Risnah, et al. (2022). *Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia*.
- Saleha, S. (2018). *Asuhan Keperawatan Pada Masa Nifas. Jakarta: Salemba Medika*.
- Setiadi. (2012). *Konsep & Penulisan Dokumentasi Asuhan Keperawatan Teori dan Praktik. Yogyakarta : Graha Ilm*.
- Sitorus, H. &. (2020). . *Pengaruh Teknik Effleurage massage Terhadap Nyeri Afterpains Pada Ibu NifasMultipara di BPM Wanti dan BPM Sartika di Kota Medan Tahun 2020. Jurnal Health Reproductive, 5(1), 7-16*.
- Sulfianti. (2021). *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas. Yayasan Kita Menulis*.
- Teli, M. (2018). *Pedoman Asuhan Keperawatan Komunitas. Kupang: Lima Bintang*.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Edisi 1. Jakarta: DPP PPNI*.
- Utami, T., & Triana, N. Y. (2021). *Asuhan Keperawatan pada Ny . W dengan Risiko Infeksi Luka Robekan Perineum Ibu Post Partum di RSUD dr . R Goeteng Taroenadibrata. 324–329*.
- Vitani, R. A. I. (2019). *Tinjauan Literatur: Alat Ukur Nyeri Untuk Pasien Dewasa. Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan, 3(1), 1–7*.
- Walyani Elisabeth Siwi. (2017). *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan. 2nd ed. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru;*
- Zubaidah et al. (2021). *Zubaidah, S. S. T., Rusdiana, N., Kep, M., Raihana*

*Norfitri, S. S. T., Keb, M., Iis Pusparina, S. S. T., & Kes, M. M. (2021).
Asuhan Keperawatan Nifas. Deepublish.*





SOP EFFLEURAGE MASSAGE

Pengertian	Massage effleurage yaitu suatu metode non farmakologis yang paling efektif untuk menghilangkan rasa nyeri. Massage effleurage adalah manipulasi sistematis jaringan lunak terutama otot, kulit, dan tendon
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan efek relaksasi 2) Mengurangi rasa nyeri kontraksi uterus yang dirasakan 3) Bisa melancarkan sirkulasi darah 4) Dapat menurunkan ketegangan otot - otot
Indikasi	Ibu post partum tanpa komplikasi
Kontraindikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat luka pada area yang akan dilakukan massage 2) Terdapat penyakit pada kulit 3) Tidak boleh dilakukan pada kondisi ruptur uterus
Alat dan bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bantal untuk menyanggah kaki ibu 2) Baby oil untuk massage 3) Tisu untuk membersihkan area abdomen setelah tindakan
Cara dan prosedur tindakan	<p>Fase Orientasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berikan salam 2) Perkenalkan diri 3) Identifikasi pasien 4) Kontrak waktu 5) Jelaskan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan, berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan jawab seluruh pertanyaan pasien, berikan <i>informed consent</i>. <p>Fase kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Langkah pertama: Pilih kata atau ungkapan singkat yang mencerminkan keyakinan pasien. Anjurkan pasien untuk memilih ungkapan yang memiliki arti khusus seperti tenang dan lain-lain. 2) Langkah kedua: Atur posisi tidur ibu dengan posisi tidur terlentang. Kemudian minta ibu untuk rileks. Kemudian tindakan dilakukan dengan cara menggunakan 1 atau 2 bantal, kaki dengan kedua lutut fleksi yang membentuk sudut 450' 3) Langkah ketiga : Pada waktu timbulnya kontraksi maka kaji respon fisiologis dan psikososial ibu kemudian tanyakan kualitas nyeri yang dirasakan berdasarkan dengan skala nyeri 4) Cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, kemudian berikan baby oil pada telapak tangan orang yang melakukan massage 5) Lakukan tindakan dengan cara yaitu letakkan kedua telapak tangan diatas simpisis pubis secara perlahan, lalu usapkan kedua telapak tangan yang sudah diberikan baby oil dengan tekanan yang tegas, ringan, dan konstan yang dimulai dari abdomen bagian bawah di atas simpisis pubis kemudian arahkan ke samping area abdomen, lalu menuju ke arah fundus uteri, setelah sampai di fundus uteri seiring dengan ekspirasi pelan-pelan usapkan kedua telapak tangan tersebut kemudian turun ke samping area abdomen yang lain setelah itu kembali lagi ke perut bagian bawah diatas simpisis pubis. 6) Tindakan <i>massage effleurage</i> ini dilakukan selama \pm 5 menit. Lakukan gerakan ini secara berulang – ulang selama kontraksi rasa nyeri muncul setidaknya sebanyak 2 hingga 3 kali 7) Sesudah dilakukan tindakan tersebut maka kaji respon psikologis dan fisiologis ibu serta tanyakan kualitas nyeri yang dirasakan berdasarkan skala nyeri setelah tindakan selesai dilakukan 8) Setelah tindakan selesai maka atur kembali posisi ibu dengan posisi terlentang, kemudian ambil bantal yang ada pada kaki ibu setelah itu

	<p>luruskan kembali kaki ibu yang tadi fleksi.</p> <p>Fase Terminasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Beritahu pasien bahwa tindakan telah selesai dilakukan 2) Evaluasi tindakan 3) Beri <i>reinforcement</i> positif pada pasien.
Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kaji respon klien 2) Massage dilakukan dengan benar 3) Rentang skala nyeri yang dirasakan klien menurun
Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tindakan apa yang dilakukan 2) Catat respon klien selama tindakan yang dilakukan berlangsung 3) Catat tanggal dan waktu pemberian tindakan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fauziah Ayu Pratiwi, lahir di Bulukumba pada tanggal 12 April 1999. Penulis merupakan anak ke-2 dari pasangan Bapak (Alm) Agussalim dan Ibu Erniati. Penulis dengan panggilan akrab Fauziah mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2005 di SDN 238 Mattoanging dan selesai pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2011 di SMP Negeri 16 Bulukumba dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2014 di SMA Negeri 2 Bulukumba dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu, ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan di salah satu Universitas Negeri yang ada di kota Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tepatnya di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan program studi S1 Keperawatan. Selanjutnya ditahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan Profesi Ners dikampus yang sama. Ucapan syukur Alhamdulillah sampai saat ini penulis masih diberi kesehatan sehingga mampu sampai pada tahap akhir penyelesaian yang disertai dengan doa dan restu dari berbagai pihak, terutama orang tua penulis, keluarga, kerabat dan rekan yang membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun karya tulis ilmiah (KTI) sebagai salah satu syarat dalam menempuh pendidikan profesi ners dengan judul “Analisis Asuhan Keperawatan pada pasien post partum dengan nyeri *Afterpains* menggunakan Terapi *Effleurage Massage* diruang masa nifas Al-Ghaniyyuh RSIA Sitti Khadijah Makassar”. Penulis juga bergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan UIN Alauddin Makassar tepatnya di bidang Sanggar Seni Rufaidah periode 2017.

Jurnal rujukan utama

GAMBARAN NYERI SEBELUM DAN SESUDAH DI LAKUKAN TINDAKAN EFFLEURAGE MASSAGE KEPADA IBU POST PARTUM PRIMIPARA DI RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA

Efa Fasikhatus¹, Priyanti Sulistyowati², Zuhrotul Laylyyah¹
¹Politeknik Yakpermas Banyumas Program Studi Keperawatan
²Dosen Keperawatan Di Politeknik Yakpermas Banyumas
 E-mail: efafasikhatus@gmail.com¹, sulistyowati.yakpermas@gmail.com²,
 .zuhrotul@gmail.com¹

ABSTRAK

Latar Belakang Masa nifas (post partum) dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu berikutnya. Perubahan fisiologis maupun fisiologi yang dialami oleh ibu post partum, salah satunya adalah kontraksi uterus. Kontraksi uterus ini terjadi secara fisiologis dan menyebabkan nyeri yang dapat mengganggu kenyamanan ibu selama setelah melahirkan/post partum. Strategi penyelesaian nyeri adalah suatu tindakan untuk mengurangi rasa nyeri menggunakan teknik effleurage massage dengan menggunakan telapak tangan yang memberikan tekanan lembut ke atas permukaan tubuh dengan arah sikular secara beraturan.

Tujuan Untuk mengetahui atau menguji testing pengaruh teknik effleurage massage dalam menurunkan nyeri pada ibu post partum. Telah dilakukan tindakan dengan pemberian teknik effleurage massage kepala kedua responden ibu post partum, pada responden pertama dengan usia 28 tahun, parity primipara, dengan partus normal, dan dilakukan Tindakan effleurage massage sebanyak 5 kali, sebelum dilakukan Tindakan skala nyeri 4 dan sesudah Tindakan skala nyeri menjadi 1, sedangkan pada responden kedua dengan usia 25 tahun, parity primipara, dengan partus normal, dan dilakukan Tindakan effleurage massage sebanyak 3 kali, sebelum dilakukan Tindakan skala nyeri 4 dan sesudah Tindakan skala nyeri menjadi 0.

Kesimpulan setelah dilakukan Tindakan effleurage massage pada kedua responden, responden pertama sebelum dilakukan Tindakan effleurage massage skala nyeri 4 dan sesudah Tindakan skala nyeri menjadi 1 sedangkan pada responden kedua sebelum dilakukan Tindakan effleurage massage skala nyeri 4 dan sesudah Tindakan skala nyeri menjadi 0.

Saran agar para ibu post partum melaksanakan teknik effleurage massage ini secara mandiri guna mempertahankan kenyamanan bagi diri sendiri.

Kata Kunci: Ibu Post Partum, Nyeri, Effleurage Massage

ABSTRACT

Background The puerperium period (post partum) starts a few hours after the birth of the placenta until the next 6 weeks. Physiological and psychological changes experienced by post partum mothers, one of which is uterine contractions. These uterine contractions occur physiologically and cause pain that can disturb the comfort of the mother in the postpartum period.

Purpose The pain management strategy is an action to reduce pain using the effleurage massage technique using the palms of the hands that apply gentle pressure to the surface of the body in a circular direction repeatedly. To understand or study the effect of effleurage massage techniques in reducing pain in post partum mothers. Actions have been taken by giving effleurage massage techniques to the two postpartum respondent mothers, the first respondent with age 28 years, parity primipara, with normal labor, and performed effleurage massage action for 5 times, before doing the scalp pain action 4 and after the pain scale action is 1, while in the second respondent with the age of 25 years, parity primipara, with normal delivery, and effleurage massage action 3 times, before the pain scale action 4 and after the pain scale action is 0. Effleurage massage on the two respondents.

Conclusion the first respondent before the effleurage massage action on the pain scale 4 and after the pain scale action became 1 while in the second respondent before the effleurage massage action was carried out the pain scale was 4 and after the action the pain scale became 0.

Suggestion for post partum mothers to carry out this effleurage massage technique independently in order to maintain comfort for themselves.

Keywords: Post Partum Mother, Pain, Effleurage Massage

PENDAHULUAN

Masa nifas (post partum) dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu berikutnya (Baihyatun, 2009), sedangkan menurut Rini dan Kamala, (2016) masa nifas (puerperium) dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari). Masa nifas merupakan masa setelah melahirkan bayi yaitu masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra hamil.

Perubahan fisiologis maupun psikologis yang dialami oleh ibu post partum, salah satunya adalah kontraksi uterus. Intensitas kontraksi uterus meningkat secara bermakna setelah persalinan bayi, yang merupakan respon segera untuk mengurangi jumlah volume intra uterus atau biasa disebut dengan involusi uterus. Invulsi uterus mengakibatkan terjadinya pengeluaran hormon oksitoksin yang dilepaskan oleh kelenjar hipofisis yang dapat memperkuat dan mengatur kontraksi uterus, mengkompresi pembuluh darah dan membantu proses hemostatis. Kontraksi uterus dapat diperkuat pada saat proses menyusui karena oksitoksin dapat dapat dilepaskan ketika bayi menghisap ASI (Maryunani, 2009).

Kontraksi uterus ini terjadi secara fisiologis dan menyebabkan nyeri yang dapat mengganggu kenyamanan ibu di masa setelah melahirkan post partum. Rasa sakit (after pain) seperti mulas-mulas disebabkan karena kontraksi uterus yang berlangsung 2-4 hari post 1 value partum, sehingga ibu perlu mendapatkan pengertian mengenai nyeri yang dirasakan (Maryunani, 2009).

Nyeri adalah pengalaman pribadi, subjektif, berbeda antara satu orang dengan orang lain dan dapat juga berbeda pada orang sama di waktu berbeda (Reeder, 2011), sedangkan menurut Andarmoyo, (2013) nyeri yang diakibatkan oleh kontraksi uterus menimbulkan berbagai penanganan untuk meminimalkan rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu sehingga kenyamanan ibu dapat kembali. Peran seorang perawat pada kondisi tersebut adalah membantu meredakan nyeri ibu post partum dengan memberikan intervensi dalam meredakan nyeri.

Strategi penatalaksanaan nyeri adalah suatu tindakan untuk mengurangi rasa nyeri, diantaranya dapat dilakukan dengan terapi farmakologis maupun non-farmakologis (Andarmoyo, 2013). Menurut Reeder, (2011) ada beberapa penatalaksanaan nyeri non farmakologis yaitu yang pertama ada sistem motivasi-afektif berupa relaksasi, yang kedua sistem kognitif-evaluatif yaitu ada teknik pernafasan, memusatkan perhatian, imajinasi, pergerakan fisik berpola, musik, hipnosis dan distraksi, yang ketiga sistem sensori-diskriminatif yaitu ada pengaturan posisi, stimulasi kutaneus, kompres panas dingin dan massage, diantaranya didukung oleh beberapa penelitian yaitu ada teknik kompres yang dilakukan penelitian oleh Wahyuni, (2014) tentang pengaruh pemberian kompres hangat terhadap penurunan skala nyeri pada ibu bersalin di RH, Ananda Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, sebelum dilakukan teknik kompres hangat nilai rata-rata adalah 6.27 dan setelah dilakukan kompres hangat nilai rata-rata adalah 4,77. Maka ada pengaruh kompres hangat terhadap penurunan nyeri yaitu rata-rata adalah 1,5. Penelitian lain yang dilakukan oleh Paulina, (2014) dengan pengaruh teknik effleurage massage terhadap perubahan nyeri pada ibu post partum di RS Sariningih Bandung, sebelum dilakukan teknik effleurage massage ibu post partum mengalami nyeri kontraksi uterus rata-rata skala nyeri adalah 5,00, dan setelah dilakukan teknik effleurage massage nyeri kontraksi uterus rata-rata skala nyeri adalah 3,05. Jadi ada pengaruh teknik effleurage massage terhadap perubahan nyeri pada ibu post partum yaitu rata-rata adalah 1,95. Dari hasil penelitian diatas bahwa pemberian terapi effleurage massage lebih efektif menurunkan nyeri dibandingkan dengan kompres hangat. Massage dipilih karena diketahui dapat meningkatkan relaksasi, mengurangi nyeri dan stress. Mempunyai banyak manfaat serta efektif mempercepat pemulihan dan meningkatkan keseimbangan hormonal.

Effleurage adalah bentuk massage dengan menggunakan telapak tangan yang memberi tekanan lembut ke atas permukaan tubuh