

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA YANG
MENGALAMI *ISOLATION/DEPRESSION* DENGAN
MASALAH ANSIETAS MENGGUNAKAN
RELAKSASI ZIKIR DI SENTRA
GAU MABAJI GOWA**



INDRIYANTI ARIMURTI PUTRI

NIM: 70900121014

**ALAUDDIN
M A K A S S A R**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA YANG
MENGALAMI *ISOLATION/DEPRESSION* DENGAN
MASALAH ANSIETAS MENGGUNAKAN
RELAKSASI ZIKIR DI SENTRA
GAU MABAJI GOWA**



Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

INDRIYANTI ARIMURTI PUTRI

NIM: 70900121014

**JURUSAN KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indriyanti Arimurti Putri
NIM : 70900121014
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 29 Maret 1999
Jurusan/Prodi/Konsentrasi: Profesi Ners/Keperawatan Gerontik
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. A. P. Pettarani 2 Lr. 11 No.5
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Lansia Yang Mengalami *Isolation/Depression* Dengan Masalah Ansietas Menggunakan Relaksasi Zikir Di Sentra Gau Mabaji Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 02 Januari 2023

Penyusun,

Indriyanti Arimurti Putri
NIM: 70900121014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara (i) Indriyanti Arimurti Putri, S.Kep NIM: 70900121014, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “*Analisis Asuhan Keperawatan pada Lansia Yang Mengalami Isolation/Depression dengan Masalah Ansietas Menggunakan Relaksasi Zikir Di Sentra Gau Mabaji Gowa*”, memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 02 Januari 2023



Aidah Fitriani, S.Kep., Ns., M.Kep
Pembimbing I



Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J
Pembimbing II






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas akhir Ners yang berjudul, "*Analisis Asuhan Keperawatan pada Lansia yang Mengalami Isolation/Depression dengan Masalah Ansietas Menggunakan Relaksasi Zikir Di Sentra Gau Mabaji Gowa*", yang disusun oleh Indriyanti Arimurti Putri, S.Kep. Nim : 70900121014, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 M. bertepatan dengan 12 Jumadil Akhir 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi Profesi Ners, Jurusan Keperawatan

Gowa, 05 Januari 2023 M
12 Jumadil Akhir 1444 H

DEWAN PENGUJI


Ketua : Dr. dr. Syatirah Jalaluddin. Sp.,A., M.Kes ()
Sekretaris : Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kes ()
Munaqisy I : Rasdiyana, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom ()
Munaqisy II : Titi Mildawati, S.Pd.I., M.Pd.I ()
Pembimbing I : Aidah Fitriani, S.Kep., Ns., M.Kep ()
Pembimbing II : Hj. Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J ()

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar,




Dr. dr. Syatirah Jalaluddin. Sp.,A., M.Kes
NIP : 198007012006042002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nyalah yang tercurah, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “Asuhan Keperawatan pada Lansia yang Mengalami *Isolation/Depression* dengan Masalah Ansietas Menggunakan Relaksasi Zikir Di Sentra Gau Mabaji Gowa” guna memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ners dalam program studi Profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Tidak lupa pula, sholawat serta salam kita curahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabiullah Muhammad saw, beserta para sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak, yang telah mengajarkan kita akan indahnya rasa cinta dan kasih, iman dan Islam, pembawa kebenaran dan teladan umat manusia.

Penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, kata sempurna sangat jauh dari penyusunan laporan penelitian ini. Berbagai hambatan, tantangan, keterbatasan dan kekurangan yang hadir dalam penyelesaian penelitian ini merupakan refleksi dari ketidaksempurnaan penulis sebagai manusia. Oleh karena itu, berbagai saran dan kritikan yang dapat membangun demi penyempurnaan karya tulis ilmiah selanjutnya sangat penulis harapkan.

Dalam pembuatan laporan penelitian ini, penulis banyak menerima bantuan moril, saran-saran, bimbingan dan dorongan serta arahan dari berbagai pihak. Tidak ada kata lain selain terima kasih sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan untuk segala dukungan, perhatian, apresiasi, senyuman, kehangatan, persahabatan, obrolan-obrolan yang menyenangkan sekaligus menenangkan, pesan-pesan dan harapan dari orang-orang yang selama ini turut andil membantu penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian ini. Terlebih karena atas izin Allah SWT, almarhum kedua Orang Tua, Kakak, Om dan Tante berkat dukungan, semangat dan

bantuan moril maupun meterial dari beliau, penulis selalu merasa akan berhasil melakukan hal-hal yang tidak mungkin sekalipun, sehingga mengantarkan penulis untuk dapat menyelesaikan amanah akademik dan dapat meraih gelar Sarjana Keperawatan.


Tak lupa pula penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA. PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta staf dan seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin. Sp.,A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan, serta seluruh Staf Akademik.
3. Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kes selaku ketua program studi profesi ners dan Hj. Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J selaku sekretaris program studi profesi ners yang telah menerima penulis menjadi bagian dari program studi profesi ners.
4. Aidah Fitriani, S.Kep., Ns., M.Kep selaku Pembimbing I dan Hj. Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu kepada penulis dan telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun laporan ini dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Rasdiyanah, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom selaku Penguji I dan Titi Mildawati, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Penguji II yang bersedia meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan tanggapan yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
6. Para dosen dan seluruh staf program studi profesi ners yang telah membagikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis dalam proses pendidikan.
7. Kepada keluarga besar dan teman-teman seangkatan program profesi ners angkatan XX yang telah memberikan *support*, dan senantiasa selalu bersama selama menempuh pendidikan profesi ners.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang kesehatan.

Gowa, 02 Januari 2023


Indriyanti Arimurti Putri
70900121014



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR DIAGRAM	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Konsep Teori Sindrom Geriatri.....	5
2.2 Konsep Keperawatan.....	10
2.3 Pendekatan Teori yang Digunakan.....	27
2.4 Evidence Based Practice In Nursing.....	28
2.5 Kecemasan dalam Perspektif Islam.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Rancangan Studi Kasus.....	32
3.2 Subyek Studi Kasus.....	32
3.3 Fokus Studi Kasus.....	32
3.4 Instrumen Studi Kasus.....	32
3.5 Prosedur Pengambilan Data.....	33
3.6 Tempat/Waktu Pengambilan Data.....	34
3.7 Analisis Data dan Penyajian Data.....	34
3.8 Etika Studi Kasus.....	34
BAB IV LAPORAN KASUS	36
4.1 Pengkajian.....	36
4.2 Diagnosis.....	56
4.3 Intervensi.....	59


4.4 Implementasi	65
4.5 Evaluasi	65
BAB V PEMBAHASAN	87
5.1 Analisis Asuhan Keperawatan	87
5.2 Keterbatasan.....	95
5.3 Kecemasan dalam Perspektif Islam	114
BAB VI PENUTUP	116
6.1 Kesimpulan.....	116
6.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	122



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 5.1 Perubahan Skala Depresi	96
---	----



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zṣ	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وَـ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَـ / اَـ ...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِـ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وِـ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). kalau pada kata yang berakhir *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf konsonan ganda yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf ّ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

6. kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

9. *Lafz al-Jalālah* (هَلَال)

Kata "Allah" yang didahului partikel hruuf seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.


10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

B. Daftar Singkatan

swt.	= <i>subhānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhū 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= 'alaihi al-salām
SM	= sebelum masehi
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4
HR	= Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Indriyanti Arimurti Putri
NIM : 70900121014
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Lansia Yang Mengalami *Isolation/Depression* Dengan Masalah Ansietas Menggunakan Relaksasi Zikir Di Sentra Gau Mabaji Gowa

Latar Belakang: sindrom *Isolation/Depression* pada lansia dengan masalah ansietas/depresi dapat mempengaruhi kehidupannya karena menimbulkan hilangnya selera makan, pusing, tekanan darah tinggi, mudah marah, sedih, sulit berkonsentrasi, dan tidak bisa tidur. Salah satu jenis terapi yang dapat menurunkan ansietas adalah relaksasi zikir.

Tujuan Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *isolation/depression* dengan masalah ansietas menggunakan intervensi zikir di Sentra Gau Mabaji Gowa pada tahun 2022.

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan metode studi kasus. Subyek yang digunakan adalah individu/pasien yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu format proses asuhan keperawatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan terapi zikir, pengakajian pengukuran skala depresi. Analisis data disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta dijadikan dalam bentuk teks dan dijelaskan secara naratif.

Hasil pemberian *terapi zikir* dilakukan selama 5 hari pada tanggal 27 September- 03 Oktober 2022 di Sentra Gau Mabaji Gowa dan didapatkan hasil tingkat depresi pasien menurun dari 13 (depresi) menjadi 7 (kemungkinan depresi).

Kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi kasus dinyatakan bahwa terapi zikir efektif menurunkan tingkat depresi

Kata Kunci : *Isolation/Depression*, Ansietas, Terapi zikir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Name : Indriyanti Arimurti Putri

NIM : 70900121014

Title : *Analysis of Nursing Care for Elderly People Experiencing Isolation/Depression with Anxiety Problems Using Dhikr Relaxation at Sentra Gau Mabaji Gowa*

Background *Isolation/Depression syndrome in the elderly with anxiety/depression problems can affect their life because it causes loss of appetite, dizziness, high blood pressure, irritability, sadness, difficulty concentrating, and unable to sleep. One type of therapy that can reduce anxiety is dhikr relaxation.*

The purpose *To analyze nursing care for the elderly experiencing isolation/depression with anxiety problems using dhikr intervention at the Gau Mabaji Gowa Sentra in 2022.*

Method *used is a descriptive approach with a case study method. The subjects used were individuals/patients who met the inclusion and exclusion criteria. The instruments used in this case study were the format of the nursing care process and Standard Operating Procedures (SOP) in conducting dhikr therapy, studying depression scale measurements. Data analysis is presented textually with facts put in text form and explained narratively.*

Result *of giving dhikr therapy were carried out for 5 days from 27 September to 03 October 2022 at Sentra Gau Mabaji Gowa and the results showed that the patient's depression level decreased from 13 to 7.*

Conclusion *based on the results of the case evaluation stated that dhikr therapy was effective in reducing depression levels*

Keywords: *Isolation/Depression, Anxiety, dhikr therapy.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Besarnya jumlah penduduk lansia menjadi beban jika lansia memiliki masalah penurunan kesehatan yang mengakibatkan terjadi peningkatan biaya pelayanan kesehatan, tidak berdaya, peningkatan disabilitas, tidak adanya dukungan sosial dan lingkungan yang tidak ramah pada lansia (Livana et al., 2018). Masalah lain yang akan muncul akibat dari peningkatan jumlah penduduk lansia adalah munculnya masalah kesehatan lansia baik fisik maupun psikososial seperti depresi (Dwi Prasetyo & Amalia, 2019).

Populasi lanjut usia tersebar disemua daerah dan negara di dunia (Novayanti et al., 2020). Di Indonesia peningkatan Usia Harapan Hidup akan menyebabkan meningkatnya jumlah lanjut usia. Berdasarkan data proyeksi penduduk, diperkirakan peningkatan jumlah lansia pada tahun 2025 (33,69 juta), tahun 2030 (40,95 juta) dan tahun 2035 (48,19 juta) (Kemenkes RI, 2021). Menurut *World Health Organization* (2022), di kawasan Asia Tenggara populasi Lansia sekitar 142 juta jiwa atau sebesar 8%. kemudian tahun 2024 diperkirakan mencapai 28,800,000 (11,34%) jumlah lansia dari total populasi. Jumlah lansia di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 26,82 juta jiwa atau 9,92% dari total penduduk Indonesia, diperkirakan pada tahun 2050 populasi lansia meningkat 3 kali lipat dari tahun ini. Jumlah lansia di provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 849.960 jiwa (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2021). Tahun 2020

Kabupaten Gowa memiliki jumlah lanjut usia yaitu sebanyak 6847 jiwa (Puspitha, A., Nurdin, N., & Saleh, 2021).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (2021) Prevalensi depresi pada populasi lansia diperkirakan 1-2%, laki-laki 0,4% dan prevalensi perempuan 1,4%. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa prevalensi depresi yang terjadi pada lansia antara 0,5-35%, rata-rata prevalensi depresi mayor 1,9%, depresi minor 9,7%, dan gejala klinis depresi nyata 13,7% (Hsu et al., 2022). Sekitar 16% lanjut usia tidak menunjukkan gejala depresi yang jelas dan depresi terjadi lebih banyak pada lansia yang memiliki penyakit medis (Irawan, 2021).

Menurut Permenkes (2015) yang dimaksud dengan sindrom geriatri isolasi/depresi adalah menarik diri dari lingkungan sekitar. Penyebab yang sering terjadi diakibatkan karena depresi dan pikiran/keadaan fisik yang berat. Keadaan yang berlanjut akan memunculkan kecenderungan untuk bunuh diri baik pasif maupun aktif.

Depresi pada lansia masa dimana terganggunya fungsi dalam diri manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih serta gejala yang menyertainya. Dengan kata lain depresi merupakan gangguan perasaan hati dengan ciri merasa sendirian, sedih, putus asa, rendah diri, biasanya disertai dengan tanda-tanda retardasi psikomotor atau kadang-kadang agitasi, menarik diri dan terdapat gangguan vegetatif seperti insomnia dan anoreksia (Wicaksana & Widiarta, 2021). Depresi yang dialami lansia lebih sulit untuk dideteksi diakibatkan usia yang lanjut dan sering menutupi kesepian serta rasa

sedih dengan justru lebih aktif dalam mengikuti kegiatan (Aisyatin Kamila, 2022).

Depresi yang dirasakan oleh lanjut usia dapat mempengaruhi kehidupannya karena dapat menimbulkan hilangnya selera makan, bicara berlebihan atau juga menarik diri, gejala muka yang memerah atau tubuh yang menggigil, kedinginan, dan masih banyak lagi. Stres dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya: pusing, tekanan darah tinggi, mudah marah, sedih, sulit berkonsentrasi, nafsu makan berubah dan tidak bisa tidur (Prabhaswari & Putu Ariastuti, 2020). Beberapa kondisi lingkungan juga berkaitan dengan tingkat depresi lebih besar, orang yang tinggal di kota dua kali lebih depresi dibandingkan di pedesaan. Kondisi ekonomi miskin, orang yang tinggal sendiri, tidak punya tempat tinggal, orang yang bercerai dan tidak bekerja lebih tiga kali lebih sering depresi dibanding populasi umum (Ristiawan, 2022).

Berbagai penelitian telah dilakukan melalui terapi psikoterapi zikir pada diri seseorang. Tria Widyastuti, dkk (2019), melakukan penelitian bahwa terapi zikir mampu menurunkan gangguan kecemasan pada lansia. Zikir didefinisikan sebagai upaya mengingat Tuhan dan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam (abdul aziz azari, mohammad ilham zururi, 2021) telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28,

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya : (Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat

Allah hati akan selalu tenang (Kemenag, 2019) Dari ayat tersebut dapat di jelaskan bahwa zikir adalah sebuah metode yang bersumber langsung dari Tuhan (Aizid, 2015). zikir disini diposisikan sebagai kehidupan yang mampu menenangkan gejala kejiwaan yang dialami seseorang (Aisyatin Kamila, 2022).

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh peneliti di Sentra Gau Mabaji Gowa pada tanggal 24 September 2022 di dapatkan data lansia merasa cemas, takut jika sakitnya bertambah parah dan tidak suka sendiri lansia tampak menunjukkan mimik sedih, cemas dan tegang. Oleh sebab itu penyebab utama yang lebih mengarah pada adanya kecemasan, diperlukan pendekatan secara psikologis dalam menangani lansia. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis lansia yang mengalami *Isolation/Depression* dengan masalah ansietas dan dapat dilakukan dengan terapi zikir di Sentra Gau Mabaji Gowa.

1.2. Rumusan Masalah

Peningkatan angka depresi pada lansia diikuti dengan peningkatan kasus ditiap tahunnya menjadi perhatian utama yang memerlukan penanganan segera untuk menurunkan angka depresi pada lansia yang dapat berakibat hingga kematian, oleh sebab itu maka dirumuskan masalah bagaimana “Asuhan Keperawatan pada Lansia yang Mengalami *Isolation/Depression* dengan Masalah Ansietas Menggunakan Relaksasi Zikir Di Sentra Gau Mabaji Gowa”?

1.3. Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami isolation/depression dengan masalah ansietas menggunakan intervensi zikir di Sentra Gau Mabaji Gowa?

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada lansia yang mengalami *Isolation/depression*
2. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada lansia yang mengalami *Isolation/depression*
3. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada lansia yang mengalami *Isolation/depression*
4. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada lansia yang mengalami *Isolation/depression*
5. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada lansia yang mengalami *Isolation/depression*
6. Untuk menganalisis penerapan intervensi Evidance Base Practice In Nursing (EBPN) terapi zikir dengan masalah ansietas

1.4. Manfaat


1.4.1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ilmiah ini diharapkan menjadi bahan referensi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis asuhan keperawatan dan menambah wawasan keilmuan dalam

keperawatan pada lansia yang mengalami *Isolation/depression* dengan masalah ansietas

1.4.2. Manfaat Aplikatif

Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian EBNP dalam pemberian asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *Isolation/depression* dengan masalah ansietas menggunakan terapi zikir pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori Lansia dengan Sindrom Geriatri *Isolation/depression*

2.1.1. Definisi

Lanjut usia atau biasa disebut lansia adalah seseorang yang kondisi fisiknya biasanya lemah, kondisi psikis sering merasa kesepian dan ditinggalkan (Shosuke Satake, MD & Koichi Kozaki, MD, 2018). Lanjut usia merupakan seseorang yang usianya mendekati 65 tahun atau lebih, diusia ini daya pikir dan fisik mulai mengalami penurunan (Martono HH., 2013). Sedangkan menurut *World Health Organization* seseorang dapat disebut lanjut usia jika sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Ketika memasuki fase usia lanjut usia maka akan terjadi proses yang disebut dengan *aging process* atau proses penuaan.

Proses penuaan ini terjadi secara degeneratif yang berakibat terjadi perubahan-perubahan pada diri manusia seperti perubahan fisik, kognitif, perasaan, sosial dan seksual (Marcus M dkk, 2018). Salah satu keluhan yang paling umum dijumpai pada lansia adalah depresi/kecemasan (Azizah, 2015) seseorang yang berusia lebih dari 50 tahun keatas mempunyai keluhan pada dirinya, misalnya: kecemasan akibat penyakit degeneratif, ketakutan menjalani hidup sendiri (Darmojo, 2013) Ansietas dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap kualitas hidup seperti menyebabkan penurunan nafsu makan, isolasi sosial, gangguan

tidur dan depresi (Miller, 2015) Pada perubahan yang terjadi dapat membuat lansia mengalami sindrom geriatri yaitu sindrom *issolation/depression*.

Sindrom geriatri merupakan sekumpulan tanda dan gejala dari satu atau beberapa penyakit yang sering dikeluhkan oleh lansia (Mauk, 2014) penyebab utama depresi pada lanjut usia adalah kehilangan seseorang yang disayangi, pasangan hidup, anak, bahkan binatang peliharaan

Syamsu Yusuf (2019) mengemukakan *anxiety* (cemas) merupakan ketidakberdayaan neurotik, rasa tidak aman, tidak matang, dan kekurangmampuan dalam menghadapi tuntutan realitas (lingkungan), kesulitan dan tekanan kehidupan sehari-hari. Dikuatkan oleh Kartini Kartono (2020) bahwa cemas adalah bentuk ketidakberanian ditambah kerisauan terhadap hal-hal yang tidak jelas. Senada dengan itu, Sarlito Wirawan Sarwono (2021) menjelaskan kecemasan merupakan takut yang tidak jelas objeknya dan tidak jelas pula alasannya.

Adapun Klasifikasi sindrom geriatri menurut (Amha et al., 2020) *Immobility* (kurang bergerak), *Incontinence* (Inkontinensia Urin dan Alvi), *Instability* (Instabilitas dan Jatuh), *Inlektual Impairment* (gangguan Intelektual seperti Demensia dan Delirium), Isolasi (Depresi), *Infection* (Infeksi), *Impairment of hearing, vision and smell* (Gangguan pendengaran, penglihatan, dan penciuman), *Iatrogenic* (penyakit karena pemakaian obat-obatan), *Inanition* (malnutrisi), *Impecunity* (kemiskinan), *Insomnia* (Sulit tidur), *Impaction* (sulit buang air besar) dan

Immunodeficiency (Penurunan system kekebalan tubuh), *Impotency* (Impotensi).

2.1.2. Etiologi Sindrom Geriatri *Isolation/Depression*

Penyebab utama depresi pada usia lanjut adalah kehilangan seseorang yang disayangi, pasangan hidup, anak, bahkan binatang peliharaan. Selain itu, kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan, menyebabkan dirinya terisolasi dan menjadi depresi. Keluarga yang mulai mengacuhkan karena merasa direpotkan menyebabkan pasien akan merasa hidup sendiri dan menjadi depresi. Beberapa orang dapat melakukan usaha bunuh diri akibat depresi yang berkepanjangan (Gasril, 2022).

2.1.3. Manifestasi Klinis Sindrom Geriatric *Isolation/Depression*

Menurut Sadock B, n.d. dalam Darmojo (2013) Manifestasi klinis sindrom *Isolation/Depression*, biasanya dialami selama 2 minggu serta setidaknya menimbulkan 4 dari daftar gejala pada pasien, yaitu:

- a. Perubahan nafsu makan dan berat badan
- b. Perubahan tidur dan aktivitas
- c. Kekurangan energi
- d. Memiliki perasaan bersalah
- e. Gangguan berpikir dan membuat keputusan
- f. Timbulnya pemikiran berulang tentang kematian atau bunuh diri

Selain itu, (Sadock B, n.d.) menambahkan bahwa terdapat juga tanda dan gejala lain yang menimbulkan perubahan fungsi pada seseorang yang mengalami depresi seperti:

- a. Penurunan mood (*depressed mood*), yang diketahui dari keluhan pasien secara subjektif seperti merasa sedih, kosong dan tidak mempunyai harapan. Dalam hal ini, orang lain melihat pasien tampak menangis. Sedangkan pada kasus anak dan remaja gejala yang tampak adalah mudah tersinggung atau marah
- b. Hilang minat dalam hampir semua aktivitas sepanjang hari, baik berdasarkan laporan klien atau pengamatan orang lain.
- c. Penurunan dan peningkatan berat badan atau nafsu makan
- d. Mengalami gangguan tidur seperti insomnia dan hipersomnia hampir setiap hari
- e. Agitasi ataupun retardasi psikomotorik hampir setiap hari
- f. Kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari
- g. Perasaan tidak berharga dan rasa bersalah yang berlebihan (kemungkinan bersifat delusi) hampir setiap hari
- h. Hilangnya kemampuan berpikir dan berkonsentrasi serta memiliki keraguan hampir setiap hari
- i. Timbulnya pemikiran tentang kematian secara terus-menerus dan keinginan bunuh diri (Ghina)

2.1.4. Pemeriksaan Diagnostik Sindrom Geriatri *Isolation/Depression*

Pemeriksaan diagnostik sindrom geriatrik *Isolation/Depression* yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengkajian atau anamnesis secara menyeluruh, sebagai berikut :

- a. Riwayat psikiatri : Riwayat psikiatri yang lengkap termasuk identifikasi (nama, umur, jenis kelamin, status marital), keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat kepribadian, dan riwayat keluarga. Data tentang pengobatan pasien yang didapat selama ini dan sebelumnya.
- b. Pemeriksaan Status Mental : Pemeriksaan status mental yang dilakukan pada saat pasien datang menunjukkan bagaimana lansia berpikir, merasakan, dan berperilaku selama pemeriksaan. Pengulangan pemeriksaan status mental perlu dilakukan karena terjadi perubahan fluktuasi pada keluarga pasien.
- c. Deskripsi Umum : Deskripsi umum pada pasien meliputi penampilan, aktivitas psikomotor, sikap saat pemeriksaan dan aktivitas berbahasa.
- d. *Functional Assesment* : Pasien yang berumur diatas 65 tahun sebaiknya dievaluasi untuk kemandirian dan dapat beraktifitas sehari-hari dalam kehidupannya, yang meliputi BAK, makan, memakai baju dll. Derajat kemandirian sangat penting untuk menentukan rencana pengobatan yang akan diberikan.
- e. Mood, perasaan dan afek : Kesendirian adalah alasan paling sering untuk kejadian bunuh diri pada geriatri. Perasaan kesepian, tidak ada harapan adalah gejala dari depresi yang memberikan risiko tinggi untuk terjadinya bunuh diri.

- f. Sensorium dan Kognisi. Sensorium berfokus pada fungsi dari perasaan yang khusus, sedangkan kognisi berfokus pada proses informasi dan intelektual. Meliputi :
- a) Kesadaran
 - b) Orientasi : waktu, tempat dan orang
 - c) Memori : jangka pendek dan jangka panjang
 - d) Intelektual, informasi dan intelegensi
 - e) Membaca dan menulis
 - f) *Judgment* : kapasitas untuk mengambil keputusan pada situasi tertentu (Spar JE., 2013).

2.1.5. Penatalaksanaan Sindrom Geriatri *Isolation/Depression*

Penatalaksanaan sindrom geriatri *Isolation/Depression* dibagi menjadi dua yaitu dengan cara farmakologis dan nonfarmakologis, sebagai berikut :

a. Farmakologis

Secara umum, dalam memberikan obat kepada pasien geriatri, mengikuti aturan, “*start low, go slow*”. Memulai pengobatan dengan tidak lebih dari setengah dari dosis maksimum dewasa muda, menetapkan dosis dengan pelan dan pemberian obat jangka pendek. Karena jika pemakaian lebih lanjut akan menyebabkan ketergantungan dan potensi dari gejala lepas obat. Pemberian obat Clorpromazin sebagai antiemetic dan antipsikotik. Obat haloperidol sebagai antipsikotik,

neuroleptic, butirofenon dan Trihexypenidil sebagai antiparkinson (Daniel J. Taylor et al, 2019).

b. Nonfarmakologis

Salah satu cara nonfarmakologis yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kecemasan lansia dengan terapi zikir. Melakukan terapi zikir secara rutin dianggap mampu menghempaskan gangguan-gangguan psikis pada individu seperti depresi, stres dan termasuk juga gangguan kecemasan (Nida, 2020). Ditinjau dari segi kesehatan jiwa, zikir dan doa mengandung unsur psikoterapi yang mendalam. Psikoreligius terapi ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan psikoterapi psikiatrik karena mengandung kekuatan spiritual kerohanian yang membangkitkan rasa percaya diri dan rasa optimisme (harapan kesembuhan). Dua hal ini, yaitu rasa percaya diri dan optimisme, merupakan dua hal yang amat esensial bagi penyembuhan suatu penyakit di samping obat-obatan dan tindakan medis yang diberikan (Kristianto & Wibowo, 2019).

2.2 Konsep Keperawatan

2.2.1 Pengkajian

Pengkajian keperawatan pada lansia merupakan pengkajian yang dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek biologis, psikologis, social serta spiritual lansia. Data pengkajian dapat diperoleh baik dari data subyektif (data yang didapatkan/disampaikan langsung oleh lansia) data obyektif (data yang perawat dapatkan melalui observasi dan

hasil pemeriksaan terhadap pasien (Aspiani, 2014). Adapun hal-hal yang perlu dikaji pada pengkajian asuhan keperawatan adalah:

2.2.1.1. Data Demografi : Pada data demografi, berisi data-data terkait tentang identitas pasien seperti nama pasien, usia, jenis kelamin, agama, dan alamat pasien. Kemudian berisi tentang jumlah keturunan pasien seperti jumlah anak dan cucu pasien beserta data tentang nama suami/istri dan umurnya.

2.2.1.2. Pengkajian Fisik

Data yang dapat dikaji melalui wawancara yaitu :

- a. Pandangan lanjut usia terkait kesehatannya
- b. Kegiatan yang masih mampu dilakukan lanjut usia
- c. Kebiasaan lansia dalam merawat diri sendiri
- d. Kekuatan fisik lanjut usia
- e. Kebiasaan makan, minum. Istirahat/tidur, buang air besar/buang air kecil
- f. Kebiasaan gerak badan/olahraga/senam lanjut usia
- g. Perubahan-perubahan pada fungsi tubuh yang paling bermakna dirasakan
- h. Kebiasaan lanjut usia dalam memelihara kesehatannya serta kebiasaannya dalam minum obat
- i. Masalah seksual yang dirasakan lansia

Pemeriksaan fisik

Data yang dapat dikaji melalui pemeriksaan inspeksi, auskultasi, palpasi dan perkusi dengan cara *Head to toe* yaitu sebagai berikut :

- a. Temperatur, hasil diperoleh dari suhu tubuh pasien
- b. *Pulse*/denyut nadi : kecepatan, irama dan tempat pengukuran
- c. *Respirasi*/pernapasan : kecepatan, irama, kedalaman serta bunyi pernapasan
- d. Tekanan darah, pengukuran harus dilampirkan posisi pengukuran tekanan darah
- e. Berat dan tinggi badan terakhir beserta IMT
- f. Tingkat orientasi yaitu mengkaji mengenai waktu, tempat dan orang
- g. *Memory*/ingatan
- h. Tidur, yang dikaji yaitu kuantitas atau lama tidur, kualitas dan pola tidur
- i. Istirahat, yang dikaji kuantitas atau lama tidur, kualitas dan pola tidur
- j. Penyesuaian psikososial

Pengkajian sistem persyarafan :

Kesimetrisan raut wajah , tingkat kesadaran: apakah lansia mengalami *snile* (pikun) atau terjadi penurunan data ingat, mata: pergerakan, penglihatan, dan penyakit penyerta, pupil: kesamaan; isokor/anisokor, ketajaman penglihatan: jangan diuji didepan jendela, penggunaan gambar dan tangan, cek kondisi kacamata. *sensory deprivation* (gangguan sensori), ketajaman pendengaran: apakah menggunakan alat

bantu dengar, tinitus, dan serumen serta mengkaji rasa sakit atau nyeri:

PQRST.

Sistem kardiovaskuler :

Sirkulasi perifer: warna, waktu dan akral, denyut nadi apical, pembengkakan vena jugularis, pusing, nyeri dada dan edema.

Sistem gastrointestinal :

Status gizi: pemasukan diet, anoreksia, mual, muntah, mengunyah dan menelan, keadaan gigi, rahang, rongga mulut, keadaan perut: auskultasi bising usus, palpasi apakah perut kembung atau pelebaran kolon, konstipasi (sembelit), diare dan inkontinensia alvi.

Sistem genitourinarius :

Warna dan bau urine, distensi kandung kemih, inkontinensia, frekuensi, tekanan/desakan, pemasukan cairan, pengeluaran cairan, dysuria dan seksualitas: minat untuk melakukan hubungan seks dan adanya kecacatan social yang mengarah ke aktivitas seksual

Sistem kulit : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kulit: temperature, tingkat kelembaban, keadaan luka dan turgor (kekenyalan kulit), jaringan parut, keadaan kuku, keadaan rambut, gangguan-gangguan umum

System musculoskeletal

- a. Kontraktur : otot, tendon, gerakan sendi
- b. Tingkat mobilisasi : ambulasi, gerakan, kekuatan otot dan kemampuan melangkah atau berjalan

- c. Pemeriksaan sendi
- d. Paralisis/kelumpuhan
- e. Kifosis/bungkuk

2.2.1.3. Pengkajian Psikologis :

- a. Pengenalan masalah-masalah utama lansia,
- b. Bagaimana sikap lansia terhadap proses penuaan
- c. Apakah dirinya merasa dibutuhkan atau tidak
- d. Pandangan lansia terhadap kehidupan
- e. Bagaimana mengatasi stress yang di alami
- f. Apakah mudah dalam menyesuaikan diri
- g. Apakah lansia sering mengalami kegagalan
- h. Harapan saat ini dan harapannya yang akan datang
- i. Fungsi kognitif : daya ingat, proses piker, alam perasaan, orientasi, kemampuan dalam penyelesaian masalah

2.2.1.4. Sosial Ekonomi :

- a. Dari mana sumber keuangan lansia
- b. Apa saja kesibukan dalam mengisi waktu luang lansia
- c. Dengan siapa lansia tinggal
- d. Kegiatan organisasi apa yang diikuti lansia
- e. Bagaimana pandangan lansia terhadap lingkungannya
- f. Siapa saja yang biasa mengunjunginya
- g. Apakah dapat menyalurkan hobi/kegiatan sesuai fasilitas yang ada

2.2.1.5. Spiritual :

- a. Agama yang dianut lansia
- b. Kegiatan ibadah lansia
- c. Kegiatan keagamaan yang dilakukan
- d. Cara lanjut usia menyelesaikan masalahnya
- e. Penampilan lansia

2.2.1.6. Psikososial :

- a. Tingkat ketergantungan lansia
- b. Fokus diri
- c. Perhatian
- d. Rasa kasih kasih sayang yang dirasakan.

2.2.1.7. Pengkajian status fungsional dengan menggunakan Indeks Katz yang terdiri dari 6 pertanyaan untuk mencocokkan kondisi lansia dengan skor yang diperoleh

2.2.1.8. Pengkajian status kognitif dan afektif dengan *Short Portable Mental Status Questionnaire* (SPMSQ) yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan interpretasi kesalahan 0-2 : fungsi intelektual utuh, kesalahan 3-4 : fungsi intelektual ringan, kesalahan 5-7 : fungsi intelektual sedang dan kesalahan 8-10 : fungsi intelektual berat

2.2.1.9. Pengkajian skala depresi geriatric (Geriatric Depression Scale/GDS) dengan *Short Form* yang terdiri dari 15 pertanyaan

dengan interpretasi 0-5 : normal, 6-10 : kemungkinan depresi dan >10 : depresi

2.2.1.10. Pengkajian skala jatuh morse (*Morse Fall Scale/MFS*) yang terdiri dari 6 pertanyaan. Adapun interpretasinya yaitu tidak berisiko jatuh : 0-24, berisiko rendah : 25-50 dan berisiko tinggi ≥ 51

2.2.1.11. Pengkajian status sosial dengan menggunakan APGAR keluarga yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan total skor 10. Adapun interpretasi penilaiannya 0-5 : fungsi sosial kurang dan 6-10 : fungsi sosial baik

2.2.1.12. Pengkajian Barthel Indeks yang terdiri dari 13 pertanyaan. Interpretasi penilaiannya lansia mandiri : 130, lansia ketergantungan sebagian : 60-125 dan lansia ketergantungan total : 55


2.2.1.13. Penilaian potensi dekubitus (Skor Norton) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan interpretasi 15-20 : kecil sekali/tidak terjadi, 12-15 : kemungkinan kecil terjadi dan <12 : kemungkinan besar terjadi

2.2.1.14. Identifikasi aspek kognitif dan fungsi mental dengan menggunakan MMSE (*Mini Mental Status Exam*) dengan mengkaji orientasi, registrasi, perhatian, kalkulasi dan mengingat kembali

2.2.1.15. Pengkajian Keseimbangan yang terdiri dari beberapa pertanyaan dengan melakukannya secara langsung. Adapun interpretasinya 0-

5 : risiko jatuh rendah, 6-10 : risiko jatuh sedang dan 11-15 : risiko jatuh tinggi

2.2.1.16. Pengkajian waktu duduk dan berdiri pasien, interpretasinya ≤ 10 detik : risiko jatuh rendah, 11-19 detik : risiko jatuh sedang, 20-29 detik : risiko jatuh tinggi dan ≥ 30 detik : gangguan mobilitas dan risiko jatuh tinggi.



2.2.2 Diagnosis Keperawatan

Diagnosis Keperawatan yang dapat terjadi pada lanjut usia dengan sindrom geriatric *Isolation/depression* menurut Barker,


(2019) disesuaikan dengan SDKI (2016), SLKI (2019) dan SIKI (2018) yaitu :

DIAGNOSIS	LUARAN	INTERVENSI	RASIONAL
<p>Ansietas Definisi: Kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Batasan Karakteristik Gejala dan Tanda Mayor Subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merasa Bingung 2. Merasa khawatir dengan akibat dan kondisi yang dihadapi <p>Objektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulit berkonsentrasi 2. Tampak Gelisah 3. Tampak Tegang 4. Sulit Tidur <p>Gejala dan Tanda Minor Subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluh Pusing 2. Anoreksia 3. Palpitasi 4. Merasa tidak berdaya <p>Objektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Frekuensi napas meningkat 	<p>Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan tingkat ansietas (L.09093) menurun dengan Kriteria Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Verbalisasi kebingungan menurun (1 ke 5) b. Verbalisasi khawatir akibat menurun (1 ke 5) c. kondisi yang dihadapi menurun (1 ke 5) d. Perilaku gelisah menurun (1 ke 5) e. Perilaku tegang menurun (1 ke 5) f. Keluhan pusing menurun (1 ke 5) g. Anoreksia menurun (1 ke 5) h. Palpitasi menurun (1 ke 5) i. Frekuensi pernapasan menurun (1 ke 5) j. Frekuensi nadi menurun (1 ke 5) k. Tekanan darah menurun (1 ke 5) l. Diaforesis menurun (1 ke 5) m. Tremor menurun (1 ke 5) n. Pucat menurun (1 ke 5) o. Konsentrasi membaik p. Pola tidur membaik q. Perasaan keberdayaan membaik r. Kontak mata membaik 	<p>Terapi relaksasi Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, atau gejala lain yang mengganggu kemampuan 2. Identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan 3. Identifikasi kesediaan, kemampuan, dan penggunaan teknik sebelumnya 4. Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah latihan 5. Monitor respons terhadap terapi relaksasi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang nyaman, jika memungkinkan 7. Berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui hal yang mengganggu kemampuan 2. Agar klien merasa lebih tenang 3. Untuk mengetahui pemberian teknik relaksasi 4. Untuk mengetahui frekuensi nadi, TD, suhu, sebelum dan sesudah diberikan terapi relaksasi 5. Untuk mengetahui respon klien selama diberikan terapi relaksasi 6. Agar klien merasa nyaman Agar klien dapat memahami tindakan apa yang diberikan 7. Agar klien lebih mengerti 8. Agar klien merasa lebih tenang 9. Agar klien lebih focus 10. Agar klien bisa melakukan dengan mandiri 11. Agar klien dapat memahami tindakan apa yang diberikan 12. Agar klien merasa lebih tenang 13. Agar klien lebih focus 14. Agar klien bisa melakukan dengan mandiri

<ol style="list-style-type: none"> 2. Frekuensi nadi meningkat 3. Tekanan darah meningkat 4. Deaforesis 5. Tremor 6. Muka tampak pucat 7. Suara bergetar 8. Kontak mata buruk 9. Sering berkemih <p>Berorientasi pada masa lalu</p>	<ol style="list-style-type: none"> s. Pola berkemih membaik t. Orientasi membaik 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Gunakan pakaian longgar 9. Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Jelaskan tujuan manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia (mis. musik, meditasi, napas dalam, relaksasi otot progresif) 11. Jelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih 12. Anjurkan mengambil posisi nyaman 13. Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi 14. Anjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih 15. Demonstrasikan dan latih teknik relaksasi (mls. napas dalam, peregangan, atau imajinasi terbimbing) 	<ol style="list-style-type: none"> 15. Mengurangi ansietas klien
<p>Distres Spiritual (D.0003) Kategori: Subkategori: Psikologis Integritas Ego Definisi : makna dan tujuan hidup melalui hubungan dengan diri, orang lain Gangguan pada keyakinan atau sistem nilai berupa kesulitan merasakan lingkungan atau tuhan. Penyebab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelang ajal 2. Kondisi penyakit kronis 3. Kematian orang terdekat 4. Perubahan pola hidup 	<p>Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan status spiritual (L. 09091) membaik dengan Kriteria Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Verbalisasi makna dan tujuan hidup meningkat (1 ke 5) b. Verbalisasi kepuasan terhadap makna hidup meningkat (1 ke 5) c. Verbalisasi perasaan keberdayaan meningkat (1 ke 5) d. Verbalisasi perasaan tenang meningkat (1 ke 5) 	<p>Dukungan spiritual (I.09276) Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi perasaan khawatir, kesepian dan ketidakberdayaan 2. Identifikasi pandangan tentang hubungan antara spiritual dan kesehatan 3. Identifikasi ketaatan dalam beragama 4. Identifikasi harapan dan kekuatan pasien <p>Terapeutik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu mengidentifikasi tingkat kebutuhan pasien 2. Mengetahui pandangan pasien tentang makna spiritual dalam proses penyembuhan 3. Mengetahui tingkat ketaatan pasien dalam beragama 4. Mengetahui harapan dan kekuatan pasien dalam menjalani kehidupannya

<p>5. Kesepian 6. Pengasingan diri 7. Pengasingan sosial 8. Gangguan sosio-kultural 9. Peningkatan ketergantungan pada orang lain 10. Kejadian hidup yang tidak diharapkan</p> <p>Gejala dan Tanda Mayor Subjektif</p> <p>1. Mempertanyakan makna/tujuan hidupnya 2. Menyatakan hidupnya terasa tidak/kurang bermakna 3. Merasa menderita/tidak berdaya</p> <p>Objektif</p> <p>1. Tidak mampu beribadah 2. Marah pada tuhan</p> <p>Gejala dan Tanda Minor Subjektif</p> <p>1. Menyatakan hidupnya terasa tidak/kurang tenang 2. Mengeluh tidak dapat menerima (kurang pasrah) 3. Merasa bersalah 4. Merasa terasing 5. Menyatakan telah diabaikan</p> <p>Objektif</p> <p>1. Menolak berinteraksi dengan orang terdekat/pemimpin spiritual 2. Tidak mampu berkreativitas (mis. menyanyi, mendengarkan musik, menulis) 3. Koping tidak efektif</p>	<p>e. Verbalisasi penerimaan meningkat (1 ke 5) f. Verbalisasi percaya pada orang lain meningkat (1 ke 5) g. Perilaku marah pada Tuhan menurun (1 ke 5) h. Verbalisasi perasaan bersalah menurun (1 ke 5) i. Verbalisasi perasaan asing menurun (1 ke 5) j. Verbalisasi perasaan diabaikan menurun (1 ke 5) k. Verbalisasi menyalahkan diri sendiri menurun (1 ke 5) l. Mimpi buruk Perasaan takut menurun (1 ke 5) m. Penghindaran aktivitas. tempat, orang terkait trauma menurun (1 ke 5) n. Kewaspadaan berlebihan menurun (1 ke 5) o. Perilaku merusak diri menurun (1 ke 5)</p>	<p>5. Berikan kesempatan mengekspresikan perasaan tentang penyakit dan kematian 6. Berikan kesempatan mengekspresikan dan meredakan marah secara tepat 7. Yakinkan bahwa perawat bersedia mendukung selama masa ketidakberdayaan 8. Sediakan privasi dan waktu tenang untuk aktivitas spiritual 9. Diskusikan keyakinan tentang makna dan tujuan hidup, Jika perlu Fasilitasi melakukan kegiatan ibadah</p> <p>Edukasi</p> <p>10. Anjurkan berinteraksi dengan keluarga, teman, dan/atau orang lain 11. Anjurkan berpartisipasi dalam kelompok pendukung 12. Ajarkan metode relaksasi, meditasi, dan imajinasi terbimbing</p> <p>Kolaborasi</p> <p>13. Atur kunjungan dengan rohaniawan (mis. ustadz, pendeta, romo, biksu)</p>	<p>5. Agar klien dapat mengekspresikan pandangan tentang penyakit dan kematian 6. Agar klien dapat mengontrol marah secara tepat 7. Menumbuhkan rasa kepercayaan pasien dan perawat 8. Agar pasien lebih fokus 9. Agar klien tidak merasa kehilangan arah dalam menjalani kehidupannya 10. Agar klien tidak merasa diasingkan dan tidak dibutuhkan oleh keluarga 11. Menumbuhkan kembali rasa dibutuhkan oleh kelompok 12. Membantu mengatasi masalah distress spiritual yang dialami klien 13. Membantu meningkatkan spiritual klien</p>
--	---	---	---

<p>4. Tidak berminat pada alam/literatur spiritual</p> <p>Kondisi Klinis Terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyakit kronis (mis. arthritis rheumatoid, sklerosis multipel) 2. Penyakit terminal (mis. kanker) 3. Retardasi mental 4. Kehilangan bagian tubuh 5. <i>Sudden infant death syndrome</i> (SIDS) 6. kelahiran mati, kematian janin, keguguran 7. kemandulan 8. gangguan psikiatrik 			
<p>Gangguan Pola Tidur (D.0055)</p> <p>Kategori: Fisiologis</p> <p>Subkategori: Aktivitas/Istirahat</p> <p>Definisi : Gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal.</p> <p>Penyebab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hambatan lingkungan (mis, kelembapan lingkungan sekitar, suhu lingkungan, pencahayaan, kebisingan, bau tidak sedap, jadwal pemantauan/pemeriksaan/tindakan) 2. Kurang kontrol tidur 3. Kurang privasi 4. Restraint fisik 5. Ketiadaan teman tidur 6. Tidak familiar dengan peralatan tidur <p>Gejala dan Tanda Mayor</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan dukungan tidur 3x24 jam diharapkan pola tidur (L.05045) membaik dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keluhan sulit tidur menurun (1 ke 5) b. Keluhan sering terjaga menurun (1 ke 5) c. Keluhan tidak puas tidur menurun (1 ke 5) d. Keluhan pola tidur berubah menurun (1 ke 5) e. Keluhan istirahat tidak cukup menurun (1 ke 5) f. Kemampuan beraktivitas meningkat (1 ke 5) 	<p>Dukungan Tidur (I. 05174)</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pola aktivitas dan tidur 2. Identifikasi faktor pengganggu tidur (Fisik atau psikologis) <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. modifikasi lingkungan (mis, pencahayaan, kebisingan, suhu, dan tempat tidur) 4. batasi waktu tidur siang, jika perlu 5. fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit 7. Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur 	<p>Dukungan Tidur Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pola aktivitas klien agar penyebab gangguan tidurnya dapat diketahui 2. faktor pengganggu dapat mempengaruhi pola tidur <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. lingkungan sekitar dapat membantu klien merasa nyaman dalam tidur 4. Tidur siang yang lama juga mempengaruhi pola tidur malam 5. Menghilangkan stress sebelum tidur bisa mengalihkan rasa cemasnya salah stau contohnya dengan mendengarkan music <p>Edukasi</p>

<p>Subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluh sulit tidur 2. Mengeluh sering terjaga 3. Mengeluh tidak puas tidur 4. Mengeluh pola tidur berubah 5. Mengeluh istirahat tidak cukup <p>Objektif (tidak tersedia)</p> <p>Gejala dan Tanda Minor Subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluh kemampuan beraktivitas menurun <p>Objektif (tidak tersedia)</p> <p>Kondisi Klinis Terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nyeri/kolik 2. Hipertiroidisme 3. Kecemasan 4. Penyakit paru obstruktif kronis 5. Kehamilan 6. Periode pasca partum 7. Kondisi pasca operasi 		<ol style="list-style-type: none"> 8. Ajarkan Teknik relaksasi autogenic atau cara nonfarmakologi lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Mengetahui efek dari pola tidur yang buruk 7. Kebiasaan tidur yang baik dapat dilakukan secara berulang 8. Penggunaan cara nonfarmakologi ini dapat menurunkan atau mengalihkan rasa cemas pada klien
<p>Defisit Nutrisi</p> <p>a. Defenisi Asupan nutrisi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016).</p> <p>b. Penyebab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketidakmampuan menelan makanan.. 2) Ketidakmampuan mencerna makanan. 	<p>Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan status nutrisi (L.03030) membaik dengan Kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Porsi makanan yang dihabiskan meningkat (1 ke 5) b. Kekuatan otot pengunyah meningkat (1 ke 5) c. Kekuatan otot menelan meningkat (1 ke 5) 	<p>Manajemen Nutrisi Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi alergi dan intoleransi makanan 2. Identifikasi makanan yang disukai 3. Identifikasi status nutrisi 4. Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien 5. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik 6. Monitor asupan makanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. nutrisi berperan dalam penyediaan sumber energi, pengaturan metabolisme tubuh, dan membangun jaringan tubuh. 2. Dengan konsultasi, kita dapat menentukan metode diet yang memenuhi asupan kalori dan nutrisi yang optimal. 3. Faktor-faktor seperti nyeri, kelemahan, penggunaan

<p>3) Meningkatnya kebutuhan metabolisme tubuh.</p> <p>4) Ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi.</p> <p>5) Faktor ekonomi.</p> <p>6) Faktor psikologis.</p> <p>c. Gejala dan tanda mayor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subjektif (tidak tersedia). 2) Objektif (penurunan berat badan minimal 10 % di bawah rentang ideal). <p>d. Gejala dan tanda minor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subjektif <ol style="list-style-type: none"> a) Merasa cepat kenyang. b) Nyeri/kram abdomen. c) Penurunan nafsu makan. 2) Objektif <ol style="list-style-type: none"> a) Bising usus hiperaktif. b) Otot pengunyah lemah. c) Otot menelan lemah. d) Membran mukosa pucat. e) Sariawan. f) Penurunan serum albumin. g) Rambut rontok. h) Diare. <p>e. Kondisi klinis terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Parkinson. 2) Stroke. 3) Mobius sindroma. 4) Cerebral palsy. 5) Clept lip. 6) Clept palate. 7) Amyotropic lateral sclerosis. 8) Kerusakan neuromuskular. 	<ol style="list-style-type: none"> d. Serum albumin meningkat (1 ke 5) e. Verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat (1 ke 5) f. Pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat meningkat (1 ke 5) g. Pengetahuan tentang pilihan minuman yang sehat meningkat(1 ke 5) h. Pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat meningkat (1 ke 5) i. Penyiapan dan penyimpanan makanan yang aman meningkat (1 ke 5) j. Sikap terhadap makanan/minuman sesuai dengan tujuan kesehatan meningkat (1 ke 5) k. Perasaan cepat kenyang menurun (1 ke 5) l. Nyeri abdomen menurun (1 ke 5) m. Sariawan menurun (1 ke 5) n. Rambut rontok menurun (1 ke 5) o. Diare menurun (1 ke 5) p. Berat badan menurun (1 ke 5) q. Indeks Massa Tubuh (IMT) membaik (1 ke 5) r. Frekuensi makan membaik (1 ke 5) s. Nafsu makan membaik (1 ke 5) t. Bising usus membaik (1 ke 5) 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Monitor berat badan 8. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu 10. Fasilitasi menentukan pedoman diet (mis. piramida makanan) 11. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai 12. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi 13. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein 14. Hentikan pemberian makan melalui selang nasogatrik jika asupan oral dapat ditoleransi 15. Berikan suplemen makanan, jika perlu <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. Anjurkan posisi duduk, jika mampu 17. Ajarkan diet yang diprogramkan <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan (mis. pereda nyeri, antilemetik), jika perlu 19. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan, jika perlu 	<p>analgesik, dan imobilitas dapat menyebabkan anorexia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kondisi yang lemah lebih lanjut dapat menurunkan keinginan dan kemampuan klien anorexia untuk makan. 5. Distribusi total asupan kalori yang merata sepanjang hari membantu mencegah distensi lambung sehingga selera makan mungkin akan meningkat. 6. Pembatasan asupan cairan saat makan membantu mencegah distensi lambung. 7. Kurangnya kebersihan mulut menyebabkan bau tidak sedap dan menurunkan nafsu makan 8. Menyediakan makanan TKTP saat lapar memungkinkan klien mengkonsumsi kalori dan protein yang adekuat. 9. Dapat meningkatkan keinginan untuk makan 10. Menentukan jenis nutrisi 11. Untuk meningkatkan nafsu makan 12. Makanan tinggi serat dapat membantu memperlancar buang air besar 13. Dapat memberikan tenaga tambahan dan mencukupi kebutuhan protein harian 14. Melatih makan via oral
--	--	--	--

<p>9) Kanker. 10) Luka bakar. 11) Infeksi. 12) AIDS. 13) Penyakit Cron's</p>	<p>u. Tebal lipatan kulit trisep membaik (1 ke 5) v. Membran mukosa membaik(1 ke 5)</p>		<p>15. Membantu meningkatkan kebutuhan makanan 16. Membantu mempercepat proses makanan 17. Menentukan jumlah kalori sesuai kebutuhan pasien 18. Menekan ketidakinginan untuk makan 19. Untuk memenuhi kebutuhan kalori protein pasien</p>
<p>Gangguan Mobilitas Fisik (D.0054) Definisi : Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Penyebab : a.Kerusakan integritas struktur tulang b.Perubahan metabolisme c.Ketidakbugaran fisik d.Penurunan kendali otot e.Penurunana massa otot f.Penurunan kekuatan otot g.Keterlambatan perkembangan h.Kekakuan sendi i.Kontraktur j.Malnurisi k.Gangguan muskuloskeletal l.Gangguan neuromuskular m.Indeks massa tubuh di atas persentil ke-75 sesuai usia n.Efek agen farmakologis o.Program pembatasan gerak p.Nyeri q.Kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik</p>	<p>Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan Kriteria hasil : a. Pergerakan ekstremitas meningkat (1 ke 5) b. Kekuatan otot meningkat (1 ke 5) c. Rentang gerak (ROM) meningkat (1 ke 5) d. Nyeri menurun (1 ke 5) e. Kecemasan menurun (1 ke 5) f. Kaku sendi menurun (1 ke 5) g. Gerakan tidak terkoordinasi menurun (1 ke 5) h. Gerakan terbatas menurun (1 ke 5) i. Kelemahan fisik menurun (1 ke 5)</p>	<p>Observasi : 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. Identifikasi toleransi fisik melalui pergerakan 3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi 4. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi Teraupetik : 5. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu 6. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu 7. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan Edukasi : 8. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi 9. Anjurkan melakukan mobilisasi dini</p>	<p>1. Untuk mengurangi cedera pada bagian tubuh lain 2. Untuk meminimalkan gerakan pada bagian tersebut 3. Untuk mengidentifikasi faktor resiko terkena penyakit lain 4. Untuk menghindari terjadinya komplikasi 5. Untuk memudahkan proses mobilisasi 6. Agar memudahkan melakukan pergerakan 7. Untuk membantu proses mobilisasi tersebut 8. Agar pasien paham mengenai prosedur tindakan yang diberikan 9. Untuk meminimalisir pergerakan mobilisasi yang banyak 10. Agar pasien dan keluarga dapat melakukannya dengan individu</p>

<p>r. Kecemasan s. Gangguan kognitif t. Keengganan melakukan pergerakan u. Gangguan sensori persepsi Batasan Karakteristik</p> <p>Gejala dan Tanda Mayor Subjektif</p> <p>1. Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas</p> <p>Objektif</p> <p>1. Kekuatan otot menurun 2. Rentang gerak (ROM) menurun</p> <p>Gejala dan Tanda Minor Subjektif</p> <p>1. Nyeri saat bergerak 2. Enggan melakukan pergerakan 3. Merasa cemas saat bergerak</p> <p>Objektif</p> <p>1. Sendi kaku 2. Gerakan tidak terkoordinasi 3. Gerakan terbatas 4. Fisik lemah</p>		<p>10. Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (mis. duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi)</p>	
<p>Risiko Defisit Nutrisi Beresiko mengalami asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme</p> <p>Faktor Risiko</p> <p>a. Ketidakmampuan menelan makanan b. Ketidakmampuan mencerna makanan c. Ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi</p>	<p>Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan status nutrisi (L.03030) membaik dengan Kriteria hasil :</p> <p>a. Porsi makanan yang dihabiskan meningkat (1 ke 5) b. Kekuatan otot pengunyah meningkat (1 ke 5) c. Kekuatan otot menelan meningkat (1 ke 5) d. Serum albumin meningkat (1 ke 5)</p>	<p>Manajemen Nutrisi Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi alergi dan intoleransi makanan 2. Identifikasi makanan yang disukai 3. Identifikasi status nutrisi 4. Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi 5. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik 6. Monitor asupan makanan 7. Monitor berat badan 	<ol style="list-style-type: none"> 11. nutrisi berperan dalam penyediaan sumber energi, pengaturan metabolisme tubuh, dan membangun jaringan tubuh. 12. Dengan konsultasi, kita dapat menentukan metode diet yang memenuhi asupan kalori dan nutrisi yang optimal. 13. Faktor-faktor seperti nyeri, kelemahan, penggunaan analgesik, dan imobilitas dapat menyebabkan anorexia.

<p>d. Peningkatan kebutuhan metabolisme</p> <p>e. Faktor ekonomi (mis. finansial tidak mencukupi)</p> <p>f. Faktor psikologis (mis. stres, keangasan untuk makan)</p> <p>Kondisi Klinis Terkait</p> <p>a. Stroke</p> <p>b. Parkinson</p> <p>c. Mobius Syndrome</p> <p>d. Cerebral palsy</p> <p>e. Cleft lip</p> <p>f. Cleft palate</p> <p>g. Amyotrophic lateral sclerosis</p> <p>h. Kerusakan neuromuskular</p> <p>i. Luka bakar</p> <p>j. Kanker</p> <p>k. Infeksi</p> <p>l. AIDS</p> <p>m. Penyakit Crohn's</p> <p>n. Enterokolitis</p> <p>o. Fibrosis kistik</p>	<p>e. Verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat (1 ke 5)</p> <p>f. Pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat meningkat (1 ke 5)</p> <p>g. Pengetahuan tentang pilihan minuman yang sehat meningkat (1 ke 5)</p> <p>h. Pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat meningkat (1 ke 5)</p> <p>i. Penyiapan dan penyimpanan makanan yang aman meningkat (1 ke 5)</p> <p>j. Sikap terhadap makanan/minuman sesuai dengan tujuan kesehatan meningkat (1 ke 5)</p> <p>k. Perasaan cepat kenyang menurun (1 ke 5)</p> <p>l. Nyeri abdomen menurun (1 ke 5)</p> <p>m. Sariawan menurun (1 ke 5)</p> <p>n. Rambut rontok menurun (1 ke 5)</p> <p>o. Diare menurun (1 ke 5)</p> <p>p. Berat badan menurun (1 ke 5)</p> <p>q. Indeks Massa Tubuh (IMT) membaik (1 ke 5)</p> <p>r. Frekuensi makan membaik (1 ke 5)</p> <p>s. Nafsu makan membaik (1 ke 5)</p> <p>t. Bising usus membaik (1 ke 5)</p> <p>u. Tebal lipatan kulit trisep membaik (1 ke 5)</p>	<p>8. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium</p> <p>Terapeutik</p> <p>9. Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu</p> <p>10. Fasilitasi menentukan pedoman diet (mis. piramida makanan)</p> <p>11. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai</p> <p>12. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi</p> <p>13. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein</p> <p>14. Hentikan pemberian makan melalui selang nasogatrik jika asupan oral dapat ditoleransi</p> <p>15. Berikan suplemen makanan, jika perlu</p> <p>Edukasi</p> <p>16. Anjurkan posisi duduk, jika mampu</p> <p>17. Ajarkan diet yang diprogramkan</p> <p>Kolaborasi</p> <p>18. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan (mis. pereda nyeri, antilemetik), jika perlu</p> <p>19. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan, jika perlu</p>	<p>14. Kondisi yang lemah lebih lanjut dapat menurunkan keinginan dan kemampuan klien anorexia untuk makan.</p> <p>15. Distribusi total asupan kalori yang merata sepanjang hari membantu mencegah distensi lambung sehingga selera makan mungkin akan meningkat.</p> <p>16. Pembatasan asupan cairan saat makan membantu mencegah distensi lambung.</p> <p>17. Kurangnya kebersihan mulut menyebabkan bau tidak sedap dan menurunkan nafsu makan</p> <p>18. Menyediakan makanan TKTP saat lapar memungkinkan klien mengkonsumsi kalori dan protein yang adekuat.</p> <p>19. Dapat meningkatkan keinginan untuk makan</p> <p>20. Menentukan jenis nutrisi</p> <p>21. Untuk meningkatkan nafsu makan</p> <p>22. Makanan tinggi serat dapat membantu memperlancar buang air besar</p> <p>23. Dapat memberikan tenaga tambahan dan mencukupi kebutuhan protein harian</p> <p>24. Melatih makan via oral</p> <p>25. Membantu meningkatkan kebutuhan makanan</p>
---	---	--	---

	v. Membran mukosa membaik(1 ke 5)		26. Membantu mempercepat proses makanan 27. Menentukan jumlah kalori sesuai kebutuhan pasien 28. Menekan ketidakinginan untuk makan 29. Untuk memenuhi kebutuhan kalori protein pasien
<p>Risiko Jatuh (D.0143) Kategori: Lingkungan Subkategori: Keamanan dan Proteksi Definisi : Berisiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh.</p> <p>Faktor Risiko 1. Usia >65 tahun (pada dewasa) atau ≤2 tahun (pada anak) 2. Riwayat jatuh 3. Anggota gerak bawah prosthesis (buatan) 4. Penggunaan alat bantu berjalan 5. Penurunan tingkat kesadaran 6. Perubahan fungsi kognitif 7. Lingkungan tidak aman (mis. licin, gelap, lingkungan asing) 8. Kondisi pasca operasi 9. Hipotensi ortostatik 10. Perubahan kadar glukosa 11. Anemia 12. Kekuatan otot menurun 13. Gangguan pendengaran 14. Gangguan keseimbangan</p>	<p>Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan tingkat jatuh (L.14138) menurun dengan kriteria hasil :</p> <p>1. Jatuh dari tempat tidur menurun (1 ke 5) 2. Jatuh saat berdiri menurun (1 ke 5) 3. Jatuh saat duduk menurun (1 ke 5) 4. Jatuh saat berjalan menurun (1 ke 5) 5. Jatuh saat dipindahkan menurun (1 ke 5) 6. Jatuh saat di kamar mandi menurun (1 ke 5)</p>	<p>I.14540 Pencegahan Jatuh Observasi 1. Identifikasi faktor risiko jatuh 2. Identifikasi risiko jatuh setidaknya sekali setiap shift atau sesuai dengan kebijakan institusi 3. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh 4. Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala 5. Monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya</p> <p>Terapeutik 6. Orientasikan ruangan pada pasien dan keluarga 7. Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci 8. Pasang handrall tempat tidur 9. Tempatkan pasien berisiko tinggi jatuh dekat dengan pantauan dari nurse station 10. Dekatkan bel pemanggil dalam jangkauan pasien</p> <p>Edukasi</p>	<p>1. Mengenal perilaku dan faktor-faktor yang berpotensi mengakibatkan jatuh 2. Memonitor adanya risiko jatuh guna melakukan pencegahan 3. Mengenal keadaan lingkungan sekitar yang berkontribusi pada risiko jatuh 4. Mengetahui tingkat risiko jatuh 5. Untuk meningkatkan keamanan dan kemandirian pasien 6. Untuk mengenal ruangan dan mengidentifikasi tempat yang memiliki risiko jatuh 7. Meminimalisir risiko jatuh dari tempat tidur atau kursi roda 8. Dapat menciptakan aktivitas yang mandiri dengan aman dan nyaman 9. Memudahkan perawat untuk mengawasi pasien dengan risiko jatuh 10. Membuat pasien memiliki rasa aman, dapat mengatur diri dan mengurangi ketakutan karena ditinggal sendiri 11. Menurunkan risiko terjatuh</p>

<p>15. Gangguan penglihatan (mis. glaukoma, katarak, ablasio retina, neuritis optikus)</p> <p>16. Neuropati</p> <p>17. Efek agen farmakologis (mis. sedasi, alkohol, anastesi umum)</p> <p>Kondisi Klinis Terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Osteoporosis 2. Kejang 3. Penyakit sebrovaskuler 4. Katarak 5. Glaukoma 6. Demensia 7. Hipotensi 8. Amputasi 9. Intoksikasi 10. Preeklamsi 		<ol style="list-style-type: none"> 11. Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah 12. Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin 13. Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh 14. Anjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri 15. Ajarkan cara menggunakan bel untuk memanggil perawat 	<ol style="list-style-type: none"> 12. Membantu pasien berjalan dengan langkah tetap untuk mempertahankan keseimbangan diri dan mencegah terjadinya kaki terkilir 13. Meminimalisir risiko jatuh 14. Meminimalisir risiko jatuh 30. Membuat pasien memiliki rasa aman dan mengurangi ketakutan karena ditinggal sendiri
---	--	---	---

2.2.3 Implementasi Keperawatan

Implementasi Keperawatan adalah suatu ide dari rencana tindakan dalam membantu mencapai tujuan secara khusus. Proses pelaksanaannya diawali penyusunan rencana tindakan dan ditujukan kepada perintah keperawatan (*nursing orders*) dalam membantu klien mencapai tujuan yang diinginkan (Awaludin et al, 2018)

2.2.4 Evaluasi Keperawatan

Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam proses tindak lanjut. Langkah evaluasi ini akan menilai keberhasilan tindakan yang telah dilakukan. Indikatornya adalah kriteria hasil yang telah ditulis ke dalam tujuan selama pengembangan rencana aksi. Evaluasi dikatakan berhasil jika tujuan tercapai. Pada asuhan keperawatan catatan perkembangan berupa laporan implementasi setiap intervensi terdiri dari:

1. Data subyektif (S)

Data subyektif merupakan ungkapan secara subyektif pasien setelah dilakukan intervensi, misalnya pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sudah berkurang.

2. Data obyektif (O)

Data obyektif merupakan data yang dapat dilihat secara obyektif atau secara langsung, data ini merupakan hasil pemeriksaan atau observasi, dan hasil pemeriksaan penunjang. Contohnya tekanan darah klien 120/80 mmHg.

3. Analisis (A)

Analisis hasil yang diperoleh dengan mengacu pada tujuan yang relevan dengan diagnosis keperawatan. Analisis ini kesimpulan dari pencapaian indikator outcome.

4. Perencanaan (P)

Perencanaan merupakan tindakan lanjutan apabila indikator hasil belum tercapai maka dapat melakukan modifikasi intervensi, atau dapat melanjutkan intervensi selanjutnya jika indikator hasil tercapai.

Langkah-langkah evaluasi bisa formatif dan sumatif. Evaluasi formatif merupakan hasil asesmen yang dilakukan selama proses keperawatan, yang menjabarkan evaluasi pelaksanaan setiap intervensi. Evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada akhir asuhan keperawatan secara keseluruhan (Sutioningsih et al., 2019).

2.3 Pendekatan Teori yang Digunakan

Penggunaan Teori *Comfort* Kolcaba terhadap teori keperawatan dalam memperoleh kenyamanan. Rasa nyaman merupakan bagian dari perawatan yang sangat penting untuk diperhatikan. Teori yang dikembangkan oleh Kolcaba ini menekankan bahwa kenyamanan merupakan prioritas utama dalam menerapkan proses keperawatan. Kolcaba menjelaskan bahwa kenyamanan holistik merupakan kenyamanan yang menyeluruh seperti kenyamanan fisik, psikospiritual, lingkungan dan psikososial. Tingkat kenyamanan ini terbagi menjadi tiga yaitu: relief adalah pasien membutuhkan kenyamanan yang spesifik, ease adalah pasien terbebas dari rasa ketidaknyamanan atau rasa nyaman meningkat, dan transcendence yaitu pasien mampu mentoleransi atau

mampu beradaptasi dengan ketidaknyamanan yang dirasakan (Kolcaba, K., & DiMarco, 2005).

Teori *Comfort* Kolcaba memaparkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan yang holistik diperlukan kerja sama antara tenaga perawat dan keluarga pasien. Keterlibatan keluarga mutlak diperlukan pada perawatan karena keluarga adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari anggota keluarga yang sakit. Anggota keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan atau kesejahteraan pasien. Keluarga juga merupakan sumber utama dalam memberikan kekuatan dan dukungan (Neal, et al 2007). Sesuai dengan studi kasus ini bahwa pasien memerlukan keterlibatan perawat dalam melakukan terapi zikir nonfarmakologi untuk meningkatkan kenyamanan yang holistik. Kenyamanan holistik ini berpengaruh pada persepsi pasien dalam menangani ansietas sehingga ansietas yang dirasakan akan berkurang, hilang atau pasien juga mampu meningkatkan coping positif terhadap ansietas yang dirasakan (Muhith A &Siyoto S., 2016).

2.4 Evidence Based Practice In Nursing

2.4.1 Pengertian

Terapi zikir merupakan upaya perlakuan yang mencakup aktivitas mengingat, menyebut nama, dan keagungan Allah SWT secara berulang, yang disertai kesadaran akan Allah SWT dengan tujuan untuk menyembuhkan keadaan patologis (Rofiqah, 2017). Terapi zikir dalam penelitian ini terdiri dari empat pertemuan. Pertemuan pertama yaitu pemberian materi mengenai makna zikir, bacaan zikir beserta artinya, pelaksanaan zikir, dan manfaat zikir. Pertemuan kedua, ketiga, dan keempat

yaitu praktik zikir bersama. Pada praktik zikir, subjek dipandu untuk mengucapkan zikir, subjek diberi pemahaman mengenai arti bacaan zikir yang diucapkan. Subjek juga diberi tugas untuk melakukan zikir setiap selesai salat dan sebelum tidur (Widyastuti et al., 2019).

2.4.2 Tujuan

Terapi zikir dapat menurunkan skala depresi seseorang (Miftakurrosyidin & Wirawati, 2022). Terapi zikir juga dapat merilekskan otot-otot sehingga mampu menimbulkan perasaan tenang dan nyaman. Manfaat zikir bagi manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran, hadis Nabi saw, dan juga pengalaman para ulama. Di dalam salah satu ayat Al-Quran Allah berfirman: “Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku, dan yang akan mematikanku, kemudian akan menghidupkanku (kembali)” (Dr.dr.Arman Yurisaldi Saleh, MS, 2018).

2.4.3 Indikasi

1. pasien lansia yang beragama islam
2. pasien lansia yang bersedia menjadi responden
3. pasien lansia yang mengalami kecemasan.

2.4.4 Kontraindikasi

Pemberian terapi zikir tidak menimbulkan efek samping apapun (Basri, N. B. et al, 2020)

2.4.5 Prosedur pemberian dan rasionalisasi

Langkah-langkah terapi zikir menurut (Sulistiyawati et al., 2019) adalah sebagai berikut:

1. Fase Orientasi

- a. Berikan salam
- b. Perkenalkan diri
- c. Identifikasi pasien
- d. Kontrak waktu
- e. Jelaskan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan, berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan jawab seluruh pertanyaan pasien, berikan *informed consent*.

2. Fase Kerja

- a. Langkah pertama: pasien percaya bahwa zikir dapat membuat hati menjadi tenang sehingga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan pasien.
- b. Langkah kedua: Atur posisi yang nyaman. Pilih posisi yang nyaman untuk duduk, baik itu diatas lantai dengan bersila atau pun di atas kursi. Namun jika sedang sakit, bisa dengan posisi berbaring disunnahkan ketika berzikir menghadap kiblat.
- c. Langkah ketiga : Tenangkan diri sampai nyaman (rileks). Lalu mulailah menyebut kata atau kalimat dengan tenang dan perlahan. dimulai dengan menyebut *Bismillahirrahmanirrahim* (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). Kemudian dilanjutkan dengan bacaan Istighfar pendek: *Astaghfirullah* (aku mohon ampun kepada Allah) sebanyak 33 kali. zikir Tasbih: *Subhanallah* (Maha Suci Allah) sebanyak 33 kali. Takbir: *Allahu Akbar* (Allah Maha Besar) sebanyak 33 kali. Tahmid: *Alhamdulillah* (Segala Puji Bagi Allah) sebanyak 33 kali.

- d. Langkah keempat: lakukan teknik relaksasi dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan dalam waktu 10-20 menit. Pasien dapat dianjurkan untuk sering mengulang.
3. Fase Terminasi
 - a. Beritahu pasien bahwa tindakan telah selesai dilakukan
 - b. Evaluasi tindakan
 - c. Beri *reinforcement* positif pada pasien.

2.4.6 Kriteria evaluasi

Setelah dilakukan intervensi tingkat depresi berat menurun menjadi tingkat depresi sedang atau tingkat ringan dan tingkat depresi sedang menurun menjadi tidak depresi (Putri & Nurhidayati, 2022).

2.4.7 Artikel utama & pendukung

1. Artikel utama
Penulis : Rosa Isnaini Putri, Tri Nurhidayati
Judul : Penerapan slow deep breathing dan zikir terhadap tingkat kecemasan penderita hipertensi pada lansia
Sumber : Google Scholar, Ners Muda
2. Artikel utama
Penulis : Ririn Afrian Sulistyawati, Probosuseno, Sri Setiyarini
Judul : *Dhikr Therapy for Reducing Anxiety in Geriatric Patients*
Sumber : ScienceDirect, *Asia-Pacific Journal of Nursing*
3. Artikel pendukung
Penulis : Tria Widyastuti, Moh. Abdul Hakim, Salmah Lilik

Judul : Terapi Zikir sebagai Intervensi untuk Menurunkan Kecemasan pada Lansia

Sumber : Neliti, Gadjah Mada *Journal Of Professional Psychology*.

4. Artikel pendukung

Penulis : Miftakurrosyidin, Maulidta Karunianingtyas Wirawati

Judul : Penerapan Terapi Zikir Untuk Menurunkan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Lansia Di Desa Baleadi

Sumber : Google Scholar, Jurnal Ners Widya Husada.

5. Artikel pendukung (M.D. et al. 2012)

Penulis : Lauren Fields M.D. Daniel Shalev M.D. Mark Nathanson M.D. & Peter A. Shapiro M.D.

Judul : *Palliative Care Training for Geriatric Psychiatry Fellows: A National Survey Project*

Sumber : ScienceDirect, *The American Journal of Geriatric Psychiatry*

2.5 Kecemasan dalam Perspektif Islam

Dalam islam kecemasan bisa juga diartikan sebagai gelisah, gelisah merupakan salah satu penyakit hati yang harus segera diobati seperti halnya penyakit lain. Apabila penyakit hati ini tidak segera diobati maka akan timbul penyakit-penyakit yang lain yang jauh lebih berbahaya. Banyak hal negatif yang timbul dari dampak penyakit gelisah tersebut, apabila orang tersebut tidak segera mengambil tindakan yang tepat dan tidak dibekali iman yang kuat, bisa jadi ia akan menjadi malas dalam belajar, kesedihan berlarut-larut untuk menghilangkan kegelisahan dalam hatinya tersebut. Allah berfirman dalam Surah Al-Hajr/15:54-56 :

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تَبَشِّرُونَ قَالُوا بِبَشْرِكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ
الْفٰطِنِينَ قَالَ وَمَنْ يَّقْنِظُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ

Terjemahnya :

(54) Dia (Ibrahim) berkata, “Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut. Maka, dengan (cara) apa kamu memberi kabar gembira?” (55) Mereka menjawab, “Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka, janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.” (56) Dia (Ibrahim) berkata, “Adakah orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya selain orang yang sesat?” (Kemenag 2019)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya manusia tidak perlu merasa cemas dan putus asa dengan segala apa yang menimpa kepada dirinya, karena sesungguhnya Allah memberikan cobaan maupun ujian sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing.

Depresi pada lansia masa dimana terganggunya fungsi dalam diri manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih serta gejala yang menyertainya. Dengan kata lain depresi merupakan gangguan perasaan hati dengan ciri merasa sendirian, sedih, putus asa, rendah diri, biasanya disertai

dengan tanda-tanda retardasi psikomotor atau kadang-kadang agitasi, menarik diri dan terdapat gangguan begetatif seperti insomnia dan anoreksia (Wicaksana & Widiarta, 2021).

وَمَنْ تُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

“Siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami balik proses penciptaannya (dari kuat menuju lemah). Maka, apakah mereka tidak mengerti?” (Kemenag, 2019)

Jika ditinjau dalam perspektif islam, kecemasan ini muncul akibat adanya ketakutan akan suatu ujian yang akan diberikan oleh Allah swt. Penelitian oleh Tria Widyastuti, dkk (2019) bahwa terapi zikir mampu menurunkan gangguan kecemasan pada lansia. Zikir didefinisikan sebagai upaya mengingat Tuhan dan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya :

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenang (Kemenag, 2019)

Dari ayat tersebut dapat di jelaskan bahwa zikir adalah sebuah metode yang bersumber langsung dari Tuhan (Aizid, 2015). zikir disini diposisikan sebagai kehidupan yang mampu menenangkan gejala kejiwaan yang dialami seseorang (Aisyatin Kamila, 2022). Al-Qur'an menjelaskan di dalam surah QS Al. Baqarah 2:195 dimana ayat ini memberi pelajaran untuk menjaga kesehatan bagaimana gangguan mental berupa kekhawatiran dan kesedihan akan jauh dari kehidupan.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Kemenag, 2019)

Lanjut usia atau biasa disebut lansia adalah seseorang yang kondisi fisiknya biasanya lemah, kondisi psikis sering merasa kesepian dan diterlantarkan (Shosuke Satake, MD & Koichi Kozaki, MD, 2018). Lanjut usia merupakan seseorang yang usianya mendekati 65 tahun atau lebih, diusia ini daya pikir dan fisik mulai mengalami penurunan (Martono HH., 2013). Allah berfirman dalam surah Al-Isra/17:23 untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya.

❖ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا


Terjemahnya :

23. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.426)

426) Sekadar mengucapkan kata ah (atau kata-kata kasar lainnya) kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi memperlakukan mereka dengan lebih kasar. (Kemenag, 2019)

Tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa Tuhanmu telah menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepada-Nya dan berbakti kepada kedua orangtua dengan sebaik-baiknya. Apabila keduanya atau salah satunya dalam keadaan lemah atau berusia lanjut, maka janganlah kamu bantah ucapan dan

sikap mereka dengan suara yang menunjukkan marah. Dan jangan sekali-kali kamu menghardik keduanya. Akan tetapi berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, lembut dan penuh dengan kebaikan serta penghormatan kepada keduanya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus Hidayat (2019) mendefinisikan studi kasus yaitu bagian dari metode penelitian yang memberikan kerangka tertentu pada tahapan prosesnya dengan menentukan tema dan subjek penelitian, menentukan tempat, menentukan metode yang akurat, menentukan teknik pengumpulan data yang relevan, menganalisis hasil data, membuat kesimpulan dan laporan dari penelitian.

3.2. Subyek Studi Kasus

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah pasien atau individu yang mengalami gangguan kecemasan/ansietas, berusia >60 tahun bersedia menjadi responden dan tidak sedang mengalami gangguan pendengaran.

3.3. Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus ini adalah melakukan asuhan keperawatan terhadap masalah yang dikaji secara mendalam yaitu asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *Isolation/depression* dengan masalah ansietas melalui intervensi terapi zikir.

3.4. Instrumen Studi Kasus

Instrumen yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu format proses asuhan keperawatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan terapi zikir, perlu dilakukan pengakajian depresi seperti : pengenalan masalah-masalah utama lansia, Bagaimana sikap lansia terhadap

proses penuaan, Apakah dirinya merasa dibutuhkan atau tidak, Pandangan lansia terhadap kehidupan, Bagaimana mengatasi stress yang di alami, Apakah mudah dalam menyesuaikan diri, Apakah lansia sering mengalami kegagalan, Harapan saat ini dan harapannya yang akan datang dan Fungsi kognitif : daya ingat, proses pikir, alam perasaan, orientasi, kemampuan dalam penyelesaian masalah.

Berdasarkan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh (Widyastuti et al., 2019) menggunakan metode *rating question* untuk mengukur depresi yang dirasakan responden, kuesioner yang berjumlah 15 pertanyaan dengan 3 kategori interpretasi : 0 – 5 : Normal, 6 – 10 : Kemungkinan depresi, >10 : Depresi. Jika responden yang tidak mampu mengisi kuesioner, maka penulis membantu mengisi kuesioner responden tersebut.

No	Pertanyaan	Ya	Tdk
1	Apakah pada dasarnya anda puas dengan kehidupan anda?	0	1
2	Apakah anda telah banyak meninggalkan kegiatan dan minat/kesenangan anda?	1	0
3	Apakah anda merasa kosong dengan kehidupan yang dijalani saat ini?	1	0
4	Apakah anda sering bosan?	1	0
5	Apakah anda mempunyai semangat yang baik setiap waktu?	0	1
6	Apakah anda takut sesuatu akan terjadi pada anda?	1	0
7	Apakah anda merasa bahagia di setiap waktu ?	0	1
8	Apakah anda merasa tidak berdaya?	1	0
9	Apakah anda lebih suka tinggal di rumah pada malam hari, daripada pergi dan melakukan sesuatu yang baru?	1	0
10	Apakah anda memiliki banyak masalah dengan daya ingat dibandingkan kebanyakan orang?	1	0
11	Apakah anda berpikir sangat menyenangkan hidup sekarang ini?	0	1
12	Apakah anda merasa saya sangat tidak berharga/berguna?	1	0
13	Apakah anda merasa penuh semangat?	0	1
14	Apakah anda merasa tidak memiliki harapan?	1	0
15	Apakah anda berpikir keadaan orang lain lebih baik daripada anda?	1	0
	Total Skor	15	

Penilaian :

0 – 5 : Normal

6 – 10 : Kemungkinan depresi

>10 : Depresi

3.5. Prosedur Pengambilan Data

Prosedur penelitian berisi tentang uraian proses dalam melakukan studi kasus yang terdiri dari beberapa tahap antara lain:

3.5.1. Persiapan

Persiapan yang dilakukan meliputi pengajuan judul studi kasus.

3.5.2. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi dan wawancara.

3.5.3. Penyusunan Laporan

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah.

3.6. Tempat dan Waktu Pengambilan

Penelitian ini dilakukan di Sentra Gau Mabaji di Kab. Gowa yang dilaksanakan dua pekan pada tanggal mulai pengkajian yaitu 24 September 2022 sampai dengan 07 Oktober 2022.

3.7. Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subyek studi kasus yaitu dengan menggunakan lima proses keperawatan dalam hal ini pengkajian, diagnosis, intervensi dan evaluasi keperawatan, pengolahan data yang sudah didapatkan dari hasil pengkajian dari proses wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi kemudian memasukan data yang telah didapatkan kedalam tabel analisa data dan kemudian dilakukan kategorisasi data untuk menentukan diagnosis keperawatan yang sesuai dengan keadaan pasien berdasarkan Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI),

menentukan rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) dan menentukan kriteria hasil yang ditetapkan berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) kemudian melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana yang ditetapkan dan yang terakhir mengevaluasi respon pasien menggunakan format SOAP setelah dilakukan tindakan khususnya pemberian terapi benson, penyajian data disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan serta menggambarkan bagaimana hasil pengkajian sampai dengan evaluasi.

3.8. Etika Studi Kasus

Menurut Hidayat (2019) etika penelitian yang harus diperhatikan yaitu:

3.8.1. *Informed consent*/persetujuan


Sebelum melakukan pengkajian penulis terlebih dahulu melakukan *informed consent* pada klien. *Informed consent* adalah suatu bentuk persetujuan antara penulis dan pasien, *informed consent* bertujuan untuk mengetahui maksud, tujuan serta dampak intervensi yang ingin diberikan, dalam studi kasus ini penulis telah mendapat persetujuan pasien untuk diberikan intervensi.

3.8.2. *Anomity* (Tidak Menyebutkan Nama)

Anonimity ini berhubungan dengan penyebutan nama pasien dimana didalamnya tidak diperbolehkan mencantumkan nama pasien saat pendokumentasian, cukup dengan menuliskan kode atau inisial nama pasien pada lembar dokumentasi. Dalam studi kasus ini penulis hanya menuliskan nama pasien menggunakan inisial.

3.8.3. *Confidentially* (Kerahasiaan)

Confidentiality berhubungan dengan jaminan kerahasiaan. Dalam studi kasus ini penulis menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dan menjelaskan kepada klien bahwa semua data-data klien akan dirahasiakan.



BAB IV

LAPORAN KASUS

4.1 Pengkajian

Data Demografi

Nama Lansia : Ny. P

Umur : 101 tahun

Alamat : Pangkep

Jenis Kelamin : Perempuan

Jumlah Keturunan

- Anak : 1 (1 laki-laki, meninggal)

- Cucu : -

Nama Suami : Meninggal

Umur : -

Tgl Pengkajian : 27 September 2022

1. Pengkajian Fisik

Wawancara

Pandangan lanjut usia tentang kesehatannya:

Klien mengatakan jika seseorang sudah tua, akan mudah terkena penyakit. Klien mengatakan menerima masa tuanya

Kegiatan yang mampu dilakukan lanjut usia:

Klien mengatakan sebelum sakit, masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Klien mengatakan sering membersihkan rumah seperti menyapu, melakukan kegiatan lainnya seperti mandi, makan dan aktivitas ringan lainnya. Namun saat sakit, klien dibantu sebagian

Kebiasaan lanjut usia merawat diri sendiri:

Klien mengatakan mandi 1 kali sehari, sikat gigi 1 kali sehari dan mencuci rambut 1 kali dalam 2 hari, dan mencuci baju

Kekuatan fisik lanjut usia:

klien mengatakan merasa fisiknya melemah, dan tidak mampu melakukan kegiatan semasa muda, klien dibantu sebagian

❑ ***Kekuatan otot dan sendi:***

Klien mengatakan fungsi ototnya menurun dan mengeluh kedua kakinya sudah tidak bisa berjalan, klien mengatakan ada riwayat jatuh seminggu yang lalu sebelum pengkajian pada tanggal 20/09/22 dikamar

mandi
$$\begin{array}{r|l} 3 & 3 \\ \hline 1 & 1 \end{array}$$

❑ ***Penglihatan dan pendengaran:***

Penglihatan : klien mengatakan mampu melihat jelas dengan jarak dekat, meskipun sudah tidak terlalu baik. Klien mengalami penurunan fungsi penglihatan, terutama untuk penglihatan jarak jauh.

Pendengaran: klien mengatakan masih dapat mendengar dengan baik. Saat diajak bicara, klien dapat berkomunikasi dengan baik

❑ ***Kebiasaan makan, minum, istirahat/tidur, buang air besar/kecil:***

Klien mengatakan makan 3 kali dalam sehari, yakni pada saat pagi, siang dan malam hari. Klien mengatakan pilih-pilih makanan, klien mengatakan kurang nafsu makan, klien tampak tidak menghabiskan porsi makannya setiap hari selama pengkajian. Klien menghabiskan ½ porsi makannya. Klien tampak perlahan saat mengunyah makanan. minum 5-7 gelas dalam sehari, klien mengatakan istirahatnya kurang berkualitas, waktu tidur klien antara pukul 22:00-05:00 WITA, namun dalam rentang waktu tersebut klien sering terbangun tanpa hal yang jelas, klien mengatakan susah untuk tidur kembali. klien mengatakan tidur lagi saat pagi pukul 10.00-11.00 wita karena merasa tidur malamnya kurang. Klien tampak tidur terduduk saat pagi hari. intensitas buang air besar 1 kali/hari, kadang juga 1 kali/2 hari, buang air kecil ±4-5 kali/hari.

❑ ***Kebiasaan gerak badan/olahraga/senam lanjut usia:***

Klien mengatakan memiliki kebiasaan membersihkan kamar dan mencuci pakaian, aktivitas itu dianggap sebagai olahraga.

❑ Perubahan-perubahan fungsi tubuh yang sangat bermakna dirasakan:

Klien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah otot dan sendi pada tangan. Klien mengatakan jika dulu dia masih merasa mampu bergerak, akan tetapi semakin bertambahnya umur, klien tampak kesulitan bergerak, klien tampak gerak terbatas.

❑ Kebiasaan lanjut usia dalam memelihara kesehatan dan kebiasaan dalam minum obat:

Klien mengatakan suka makan kue. Klien mengatakan tidak memperhatikan kesehatannya karena kadang lupa minum obat jika sakit

❑ Masalah-masalah seksual yang dirasakan: Klien mengatakan tidak memiliki masalah

Pemeriksaan Fisik

- ❑ Pemeriksaan dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi untuk mengetahui perubahan sistem tubuh
- ❑ Pendekatan yang digunakan dalam pemeriksaan fisik, yaitu:
 - *Head to toe*
 - **Sistem tubuh**

1. Temperatur : 36,5°C

- Tempat pengukuran : Pada aksila

2. *Pulse (denyut nadi)*

- Kecepatan : 88x/menit
- Irama : Reguler

Tempat pengukuran : Arteri Radialis pada pergelangan tangan

3. Respirasi (Pernapasan)

- Kecepatan : 20x/menit
- Irama : Teratur
- Kedalaman : Dada bergerak secara simetris
- Bunyi : Vesikuler

4. Tekanan darah : 150/80 mmHg

Posisi pengukuran : Klien dalam posisi duduk, pemeriksaan pada lengan atas sebelah kiri

5. Berat dan tinggi badan terakhir : BB sulit dievaluasi, TB 155 cm

6. Tingkat orientasi

- a. Waktu : Saat ditanya tanggal, bulan dan tahun berapa hari ini, klien tidak mampu menjawab karena tidak pernah melihat kalender
- b. Tempat : Saat ditanya klien berada dimana sekarang, di ruang apa, di daerah mana, klien menjawab di Gau Mabaji tepatnya di Asrama 1 dan berada di daerah Gowa
- c. Orang : Saat klien ditanya siapa nama perawat yang sedang bersamanya, klien mengatakan Indi.

7. Memory (ingatan) : Ingatan klien masih bagus, masih mampu bercerita tentang masa lalunya

8. Tidur :

- a. Kuantitas (lama tidur) : Klien mengatakan pada malam hari \pm 4-5 jam/hari, sedangkan pada siang hari klien tidur 10.00-11.00 wita, klien tampak lesu
- b. Kualitas : Kualitas tidur kurang baik
- c. Pola : Pola tidur tidak teratur

9. Istirahat

- a. Kuantitas (lama tidur) : Malam 4-5 jam
- b. Kualitas : kurang baik
- c. Pola : tidak teratur

10. Penyesuaian psikososial : Klien mengatakan merasa cemas akan kehidupannya karena tidak dapat berjalan dan menggerakkan kedua kakinya sama sekali sejak lahir. Klien takut jika sakitnya bertambah parah. Klien tampak cemas. Klien tampak tegang. Klien mengatakan tidak memiliki siapapun, klien hidup sebatang kara sejak tahun 1989, klien mengatakan tidak suka sendiri, klien selalu meminta untuk ditemani bercerita.

Sistem Persyarafan

1. Kesimetrian raut wajah : Raut wajah klien tampak penuh dengan kerutan
2. Tingkat kesadaran:
 - Snile (pikun) : Klien tidak mengalami pikun
 - Daya ingat : Klien memiliki daya ingat yang baik dan mampu mengingat masa lalunya
3. Mata
 - Pergerakan : Baik dan normal
 - Penglihatan : Klien mampu melihat jelas dengan jarak dekat, meskipun sudah tidak terlalu baik,
 - Penyakit penyerta : Tidak ada
 - Mata klien tampak sayu, terdapat kehitaman area sekitar bawah mata
4. Pupil
 - Kesamaan : Isokor
5. Ketajaman penglihatan : Kurang baik karena hanya mampu melihat jelas objek yang dekat
6. Sensori *deprivation* (gangguan sensorik) : Tidak ada gangguan
7. Ketajaman pendengaran
 - Apakah menggunakan alat bantu dengar : Tidak
 - Tinitus : Tidak
 - Serumen : Tidak
8. Rasa sakit dan nyeri : Klien tidak mengeluh nyeri

Sistem Kardiovaskuler

1. Sirkulasi perifer
 - Warna : Merah muda
 - Waktu : 2 detik
2. Denyut nadi apikal : Normal
3. Pembengkakan vena jugularis : Tidak ada pembengkakan
4. Pusing : Tidak mengalami pusing
5. Nyeri dada : Tidak ada nyeri dada
6. Edema : Tidak ada edema

Sistem Gastrointestinal

1. Status gizi : Baik
2. Pemasukan diet : Klien dianjurkan diet rendah garam
3. Anoreksia : Tidak
4. Mual : Tidak
5. Muntah : Tidak
6. Mengunyah dan menelan : Klien mampu menelan tidak ada gangguan saat menelan, klien tampak kesusahan mengunyah, akibat gigi yang kurang
7. Keadaan gigi : Gigi klien yang tersisa ± 3 buah gigi, 2 gigi depan atas, 1 gigi bawah, klien tidak menggunakan gigi palsu
8. Rahang : Normal, tidak ada kelainan pada rahang
9. Rongga mulut : Normal, tidak terdapat stomatitis
10. Keadaan perut : Baik, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada pembengkakan
11. Konstipasi (sembelit) : Klien mengatakan sudah BAB pagi tadi
12. Diare : Tidak mengalami diare
13. Intontinesia alvi : klien tidak mengalami inkontinensia alvi

Sistem Genitourinarius

1. Warna dan bau urin : Berwarna kuning jernih dan bau khas urin
2. Distensi kandung kemih : Tidak ada distensi kandung kemih
3. Inkontinensia : Tidak terjadi inkontinensia
4. Frekuensi : Klien mengatakan 4-5 kali sehari
5. Tekanan/desakan : Tidak ada tekanan atau desakan
6. Pemasukan cairan : 5-7 gelas
7. Pengeluaran cairan : 4 kali sehari
8. Disuria : Tidak mengalami disuria
9. Seksualitas
 - Minat melaksanakan hubungan seks : Klien mengatakan sudah tua.
Klien lebih senang bercerita dengan orang-orang

Sistem Kulit

1. Kulit

- Temperatur : 36,5°C
 - Tingkat kelembaban : Kulit teraba hangat
 - Keadaan luka : Tidak ada luka
 - Turgor (kekenyalan kulit) : Kulit tampak keriput dan kering
2. Jaringan parut : Tidak ada jaringan parut
 3. Keadaan kuku : Pendek dan bersih
 4. Keadaan rambut : cepak, tipis dan putih
 5. Gangguan-gangguan umum : Tidak ada

Sistem Muskuloskeletal

1. Kontraktur
 - Otot : Mengalami penurunan kekuatan otot
 - Tendon : Terjadinya penurunan fungsi tendon
 - Gerakan sendi : Mengalami penurunan fungsi sendi, sendi mengalami kekakuan
2. Tingkat mobilisasi
 - Ambulasi : Klien mengatakan tidak dapat berjalan dan tidak dapat menggerakkan kakinya sejak lahir, klien hanya menggeser kakinya dengan menggunakan tangannya
 - Gerakan : Lambat
 - Kekuatan otot : Melemah/menurun $\frac{3}{1} \mid \frac{3}{1}$
 - Kemampuan melangkah atau berjalan : Klien tidak mampu berjalan dan berdiri, klien menggunakan alat bantu kursi roda untuk bergerak, klien tampak hanya menggeser badannya
3. Pemeriksaan sendi : Tidak ditemukan adanya krepitasi pada kedua lutut. Lutut klien tidak bengkak, tidak ditemukan deformitas. Klien juga mengatakan jika berpindah tempat, klien terlebih dahulu menapak dengan kuat menggunakan lutut dan tangannya sebelum menaiki kursi roda
4. Paralisis : Tidak
5. Kifosis : Tidak

B. Pengkajian Psikologis

- ❑ Pengenalan masalah-masalah utama : Klien menyadari bahwa kedua kakinya sudah tidak dapat digerakkan
- ❑ Sikap terhadap proses penuaan : Klien mengatakan bahwa penyakit yang dideritanya karena dirinya sudah tua. Klien menyadari hal tersebut dan mengatakan merasa khawatir jika kekuatan ototnya semakin menurun
- ❑ Perasaan dibutuhkan : Klien mengatakan saat suami keduanya masih hidup, klien sangat dibutuhkan karena klien sangat perhatian pada suaminya dan mampu melakukan pekerjaan IRT
- ❑ Pandangan terhadap kehidupan : Klien tampak kurang bersemangat dalam menjalani kehidupannya karena klien menyadari kondisinya yang semakin tua. Klien tampak sering menunjukkan mimik sedih, kontak mata kurang
- ❑ Koping stressor : Klien mengatakan ketika lelah langsung beristirahat dan ketika klien memiliki masalah, klien akan menceritakan pada orang-orang yang merawatnya
- ❑ Penyesuaian diri : Klien mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik
- ❑ Kegagalan : Klien mengatakan pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan pertamanya. Klien mengatakan 2x menikah, klien tampak sedih saat bercerita
- ❑ Harapan saat ini dan yang akan datang : Klien berharap agar mahasiswa yang praktik selanjutnya dapat mengurus dan menyayangi dirinya
- ❑ Fungsi kognitif
 - Daya ingat : Klien mampu mengingat kejadian di masa lalunya
 - Proses pikir : Pembicaraan klien dapat dipahami dengan baik
 - Alam perasaan : Sedih
 - Orientasi : Klien tidak mampu mengetahui bulan apa ini, klien mampu mengetahui bahwa dia berada dibalai sentra gau mabaji dan klien mampu mengingat nama mahasiswa

- Kemampuan dalam penyelesaian masalah : Klien mengatakan penyelesaian masalah tidak dibantu siapapun. Klien mengatakan terbiasa menyelesaikan masalah sendirian

C. Sosial Ekonomi

- Sumber keuangan
Klien mengatakan sejak tinggal di BRSLU, hidupnya dibiayai pemerintah
- Kesibukan dalam mengisi waktu luang
Membersihkan tempat tidur, menonton TV dan melihat lingkungan sekitar BRSLU
- Teman tinggal
Tinggal bersama beberapa orang lansia
- Kegiatan organisasi
Tidak ada
- Pandangan terhadap lingkungannya
Klien mengatakan suka dengan lingkungannya
- Yang biasa mengunjungi
Tidak ada
- Penyaluran hobi/kegiatan sesuai fasilitas yang ada :
Klien hobi menjahit menggunakan tangan

D. Spiritual

- Agama : Islam
- Kegiatan ibadah : Klien mengatakan masih mengingat tuhan
- Kegiatan keagamaan : Klien mengatakan sudah tidak mampu salat.
- Cara lanjut usia menyelesaikan masalah : Klien menyelesaikan masalah dengan berdoa dan menceritakan pada orang-orang yang merawatnya
- Penampilan lansia : Klien tampak rapi. Klien mengatakan bahwa dirinya dahulu sangat cantik dan banyak yang menyukainya

E. Psikososial

- Tingkat ketergantungan : Klien dalam melakukan aktivitas dibantu sebagian
- Perhatian : Klien mampu memperhatikan diri maupun lingkungannya

- Rasa kasih sayang : Klien menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada orang lain

PENGAJIAN STATUS FUNGSIONAL

INDEKS KATZ	
SCORE	KRITERIA
A	Kemandirian dalam hal makan, kontinen, berpindah, ke kamar kecil, berpakaian, dan mandi
√	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali satu dari fungsi tersebut (berpindah)
C	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi dan satu fungsi tambahan
D	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian dan satu fungsi tambahan
E	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil dan satu fungsi tambahan
F	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian, berpindah dan satu fungsi Tambahan
G	Ketergantungan pada enam fungsi tersebut

Interpretasi : Beri tanda (√) pada point yang sesuai kondisi klien

Analisis Hasil : Mandiri semuanya kecuali salah satu saja dari fungsi di atas

PENGAJIAN STATUS KOGNITIF DAN AFEKTIF

<i>Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ)</i>				
Score		No	Pertanyaan	Jawab
+	-			
	-	1	Tanggal berapa hari ini ?	Klien tidak tahu
	-	2	Hari apa sekarang ini ? (hari, tanggal, tahun)	Klien tidak tahu
+		3	Apa nama tempat ini ?	Balai Gau Mabaji
	-	4a	Berapa nomor telpon anda ?	Tidak punya
	-	4b	Dimana alamat anda ? (tanyakan hanya bila klien tidak mempunyai no.telepon)	Klien tidak tahu
	-	5	Berapa umur anda ?	Klien tidak tahu
	-	6	Kapan anda lahir ?	Klien mengatakan lupa
+		7	Siapa presiden sekarang ?	Klien menjawab Jokowi Dodo
+		8	Siapa presiden sebelumnya ?	Klien mengatakan SBY
+		9	Siapa nama kecil ibu anda ?	Klien menjawab Puji
	-	10	Kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap angka baru, semua secara menurun	Klien tidak tahu

Penilaian :

- Kesalahan 0– 2 fungsi intelektual utuh
- Kesalahan 3– 4 fungsi intelektual ringan
- Kesalahan 5– 7 fungsi intelektual sedang
- Kesalahan 8– 10 fungsi intelektual berat

Hasil : kesalahan total nilai 7 dengan gangguan fungsi intelektual sedang

**SKALA DEPRESI GERIATRIK
(GERIATRIC DEPRESSION SCALE / GDS)
(Short Form)**

No	Pertanyaan	Ya	Tdk
1	Apakah pada dasarnya anda puas dengan kehidupan anda?	0	1√
2	Apakah anda telah banyak meninggalkan kegiatan dan minat/kesenangan anda?	1√	0
3	Apakah anda merasa kosong dengan kehidupan yang dijalani saat ini?	1√	0
4	Apakah anda sering bosan?	1√	0
5	Apakah anda mempunyai semangat yang baik setiap waktu?	0	1√
6	Apakah anda takut sesuatu akan terjadi pada anda?	1√	0
7	Apakah anda merasa bahagia di setiap waktu ?	0	1√
8	Apakah anda merasa tidak berdaya?	1√	0
9	Apakah anda lebih suka tinggal di rumah pada malam hari, daripada pergi dan melakukan sesuatu yang baru?	1√	0
10	Apakah anda memiliki banyak masalah dengan daya ingat dibandingkan kebanyakan orang?	1	0√
11	Apakah anda berpikir sangat menyenangkan hidup sekarang ini?	0	1√
12	Apakah anda merasa saya sangat tidak berharga/berguna?	1√	0
13	Apakah anda merasa penuh semangat?	0	1√
14	Apakah anda merasa tidak memiliki harapan?	1	0√
15	Apakah anda berpikir keadaan orang lain lebih baik daripada anda?	1√	0
	Skor	13	

Penilaian :

0 – 5 : Normal

6 – 10 : Kemungkinan depresi

>10 : Depresi

Hasil : total skor 13 dengan interpretasi depresi

SKALA JATUH MORSE (MORSE FALL SCALE/ MFS)

No.	Item	Skala		Skor
1	Riwayat jatuh Apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir?	Tidak	0	25
		Ya	25	
2	Diagnosis sekunder Apakah lansia memiliki lebih dari satu penyakit?	Tidak	0	15
		Ya	15	
3	Alat bantu pergerakan <i>Bed rest</i> /dibantu perawat		0	15
	Walker/kruk/tongkat		15	
	Berpegangan pada benda sekitar (kursi, meja, lemari)		30	
4	Terapi intravena: Apakah saat ini lansia terpasang infus?	Tidak	0	0
		Ya	20	
5	Gaya berjalan/cara berpindah	Normal	0	20
		Lemah	10	
		Gangguan/tidak normal	20	
6	Status mental	Lansia menyadari kondisinya	0	0
		Lansia mengalami keterbatasan daya ingat	15	
Total nilai				75

Keterangan:

Tingkat Risiko	Nilai MPS	Tindakan
Tidak berisiko	0 -24	Perawatan dasar
Risiko rendah	25 – 50	Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh standar
Risiko tinggi	≥ 51	Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi

Hasil : total nilai 75 dengan interpretasi risiko jatuh tinggi dengan pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGKAJIAN STATUS SOSIAL

APGAR Keluarga					
No	Fungsi	Uraian	Selalu	Kadang	Hampir tidak pernah
			2	1	0
1	Adaptasi	Saya puas bahwa saya dapat kembali pada keluarga (teman-teman) saya untuk membantu pada waktu sesuatu menyusahkan saya	√		
2	Hubungan	Saya puas dengancara keluarga (teman-teman) saya membicarakan sesuatu dengan saya dan mengungkapkan masalah dengan saya	√		
3	Pertumbuhan	Saya puas bahwa keluarga (teman-teman) saya menerima dan mendukung keinginan saya untuk melakukan aktivitas atau arah baru	√		
4	Afeksi	Saya puas dengan cara keluarga (teman-teman) saya mengekspresikan afek dan berespons terhadap emosi-emosi saya, seperti marah, sedih atau mencintai	√		
5	Pemecahan	Saya puas dengan cara teman-teman saya dan saya menyediakan waktu bersama-sama	√		
SKOR			10		

Penilaian :

0 – 5 :Fungsi sosial kurang

6 – 10 : Fungsi sosial baik

Hasil : total skor 10, klien berada di fungsi social baik

BARTHEL INDEKS

No	Kriteria	Dengan Bantuan	Mandiri	Keterangan
1	Makan	5	10	Frekuensi : 3 kali Jumlah : Sedang Jenis : Sayuran, nasi, ikan dan kue
2	Minum	5	10	Frekuensi : 5-7 kali Jumlah : Sedang Jenis : Air putih
3	Berpindah dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya	5 – 10	15	Mandiri
4	Personal toilet (cuci muka, menyisir rambut, gosok gigi)	0	5	Frekuensi : Setiap hari
5	Keluar masuk toilet (membuka pakaian, menyeka tubuh, menyiram)	5	10	Dengan bantuan
6	Mandi	5	15	Frekuensi : 1 kali sehari
7	Jalan di permukaan datar	0	5	Tidak mampu
8	Naik turun tangga	5	10	Tidak mampu
9	Mengenakan pakaian	5	10	Dengan bantuan
10	Kontrol bowel (BAB)	5	10	Frekuensi : 1 kali sehari, kadang 1 kali/2 hari
11	Kontrol bladder (BAK)	5	10	Frekuensi : 5 kali sehari
12	Olahraga/latihan	5	10	Membersihkan tempat tidur, mencuci pakaian
13	Rekreasi/pemanfaatan waktu luang	5	10	Melihat pemandangan sekitar BRSLU
Total			100	

Keterangan :

- 130 : Mandiri
- 60-125 : Ketergantungan sebagian
- 55 : Ketergantungan total

Hasil : total skor BI klien adalah 100 dengan ketergantungan sebagian

PENILAIAN POTENSI DEKUBITUS (SKOR NORTON)

Interpretasi :

Kondisi Fisik Umum: lumayan

Baik 4

Lumayan 3

Buruk 2

Sangat buruk 1

Kesadaran : kompos mentis

a) Kompos mentis 4

b) Apatis 3

c) Sopor 2

d) Koma 1

Aktivitas : ambulan dengan bantuan

a) Ambulan 4

b) Ambulan dengan bantuan 3

c) Hanya bisa duduk 2

d) Tiduran 1

Mobilitas : sedikit terbatas

Bergerak bebas 4

Sedikit terbatas 3

Sangat terbatas 2

Tidak bisa bergerak 1

Inkontinen: tidak

a) Tidak 4

b) Kadang-kadang 3

c) Sering Inkontinesia urin 2

d) Inkontinensia alvi 1

15-20 : Kecil sekali/tak terjadi

12-15 : Kemungkinan kecil terjadi

< 12 : Kemungkinan besar terjadi


Hasil : total skor Norton 17 dengan penilaian potensi dekubitus interpretasi kecil sekali/tak terjadi



Identifikasi aspek kognitif dan fungsi mental dengan menggunakan MMSE
(Mini Mental Status Exam)

- Orientasi
- Registrasi
- Perhatian
- Kalkulasi
- Mengingat kembali

No.	Aspek Kognitif	Nilai Maks	Nilai Klien	Kriteria
1	Orientasi Waktu	5	1	Menyebutkan dengan benar : (Nilai 1 untuk tiap jawaban) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tahun : 2022 ▪ Bulan : tidak tahu ▪ Hari : tidak tahu ▪ Musim : tidak tahu ▪ Tanggal : tidak tahu
	Orientasi Tempat	5	3	Dimana kita sekarang berada? (Nilai 1 untuk setiap jawaban) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kota : Makassar ▪ Propinsi/Kabupaten/Kecamatan:tidak tahu ▪ Di ruangan mana : asrama 1 ▪ Di lantai berapa : tidak tahu ▪ Nama wisma : gau mabaji
2	Registrasi	3	3	Sebutkan nama 3 obyek/benda (oleh pemeriksa), 1 detik untuk menyebutkan masing-masing obyek. Kemudian tanyakan kepada klien ketiga obyek yang disebutkan tadi. (Nilai 1 untuk setiap jawaban) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Obyek : radio ▪ Obyek : pemanas ▪ Obyek : ranjang
3	Perhatian dan kalkulasi	5	0	Minta klien mengeja 5 kata dari belakang, misal "BAPAK" <ul style="list-style-type: none"> • K • A • P • A • B Minta klien hitung mundur dari 100 ke bawah dengan pengurangan 5. Berhenti setelah mendapat nilai 75. (Nilai 1 setiap jawaban benar)
4	Mengingat	3	3	Minta klien untuk mengulangi ketiga obyek pada No.2 (registrasi) tadi. Bila benar, 1 poin untuk masing-masing obyek.

				<ul style="list-style-type: none"> • Radio • Ranjang • Tempat masak nasi
5	Bahasa (9) Menamai	2	2	Tunjukkan pada klien suatu benda dan tanyakan namanya pada klien. <ul style="list-style-type: none"> ▪ jam tangan ▪ cincin
	Pengulangan	1	1	Minta klien untuk mengulang kata berikut : “Tak ada jika, dan, atau, tetapi.” Bila benar, nilai satu poin. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pernyataan benar 1 : tidak ada
	Pemahaman	3	0	Minta klien untuk mengikuti perintah berikut yang terdiri dari 3 langkah : Ambil kertas di tangan anda, lipat dua, dan taruh di lantai.” <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klien tidak mampu
	Membaca	1	1	Perintahkan pada klien untuk hal Berikut (bila aktivitas sesuai perintah nilai 1 point) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutup mata
	Menulis	1	0	Perintahkan pada klien untuk menulis satu kalimat dan menyalin gambar. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulis satu kalimat
	Menggambar	1	0	Perintahkan klien untuk menggambar, gambar di bawah ini : 

Interpretasi hasil : klien berada pada total skor 14 artinya klien mengalami kelainan fungsi kognitif ringan

Pengkajian Keseimbangan

Pengkajian keseimbangan dinilai dari dua komponen utama dalam bergerak, dari kedua komponen tersebut dibagi dalam beberapa gerakan yang perlu di observasi oleh perawat. Kedua komponen tersebut adalah:

1) Perubahan posisi atau gerakan keseimbangan

Beri nilai 0 jika klien tidak menunjukkan kondisi di bawah ini, dan 1 bila menunjukkan kondisi berikut ini.

- *Bangun dari tempat duduk (dimasukkan dalam analisis) dengan mata terbuka*

Tidak bangun dari tempat tidur dengan sekali gerakan, akan tetapi lansia mendorong tubuhnya ke atas dengan tangan atau bergerak ke bagian depan kursi terlebih dahulu, tidak stabil pada saat berdiri pertama kali (1)

- *Duduk ke kursi (dimasukkan ke dalam analisis) dengan mata terbuka*

Menjatuhkan diri ke kursi, tidak duduk di tengah kursi (1)

- *Bangun dari tempat duduk (dimasukkan ke dalam analisis) dengan mata tertutup*

Tidak bangun dari tempat duduk dengan sekali gerakan, akan tetapi lansia mendorong tubuhnya ke atas dengan tangan atau bergerak ke bagian depan kursi terlebih dahulu, tidak stabil pada saat berdiri pertama kali (1)

- *Duduk ke kursi (dimasukkan ke dalam analisis) dengan mata tertutup*

Menjatuhkan diri ke kursi, tidak duduk ke tengah kursi (1)

Keterangan : Kursi harus yang keras tanpa lengan

- *Menahan dorongan pada sternum (Pemeriksa mendorong sternum sebanyak 3 kali dengan hati-hati) dengan mata terbuka*

Klien menggerakkan kaki, memegang objek untuk dukungan, kaki tidak menyentuh sisi-sisinya (1)

- *Menahan dorongan pada sternum (pemeriksa mendorong sternum sebanyak 3 kali dengan hati-hati) dengan mata tertutup*
Klien menggerakkan kaki, memegang objek untuk dukungan, kaki tidak menyentuh sisi-sisinya (1)
- *Perputaran leher (klien sambil berdiri)*
Menggerakkan kaki, menggenggam objek untuk dukungan kaki; keluhan vertigo, pusing, atau keadaan tidak stabil (1)
- *Gerakan menggapai sesuatu*
Tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi sepenuhnya sementara berdiri pada ujung-ujung jari kaki, tidak stabil memegang sesuatu untuk dukungan (1)
- *Membungkuk*
Tidak mampu membungkuk untuk mengambil objek-objek kecil (misalnya pulpen) dari lantai, memegang objek untuk bisa berdiri lagi, dan memerlukan usaha-usaha yang keras untuk bangun (1)

2) Komponen gaya berjalan atau pergerakan

Beri nilai 0 jika klien tidak menunjukkan kondisi di bawah ini, atau beri nilai 1 jika klien menunjukkan salah satu dari kondisi di bawah ini :

- *Minta klien untuk berjalan ke tempat yang ditentukan*
Ragu-ragu, tersandung, memegang objek untuk pegangan (1)
- *Ketinggian langkah kaki (mengangkat kaki saat melangkah)* Kaki tidak naik dari lantai secara konsisten (menggeser atau menyeret kaki), mengangkat kaki terlalu tinggi (> 5 cm) (1)
- *Kontinuitas langkah kaki (lebih baik diobservasi dari samping klien)*
Setelah langkah-langkah awal menjadi tidak konsisten, memulai mengangkat satu kaki sementara kaki yang lain menyentuh lantai (1)
- *Kesimetrisan langkah (lebih baik diobservasi dari samping klien)*
Langkah tidak simetris, terutama pada bagian yang sakit (1)

- *Penyimpangan jalur pada saat berjalan (lebih baik diobservasi dari samping kiri klien)*

Tidak berjalan dalam garis lurus, bergelombang dari sisi ke sisi
(1)

- *Berbalik*

Berhenti sebelum mulai berbalik, jalan sempoyongan, bergoyang, memegang objek untuk dukungan (1)

Interpretasi hasil: nilai yang diperoleh adalah 15 dan masuk ke dalam risiko jatuh tinggi

Jumlahkan semua nilai yang diperoleh klien, kemudian diinterpretasikan sebagai berikut : 0 – 5 risiko jatuh rendah

6 – 10 risiko jatuh sedang

11 – 15 risiko jatuh tinggi

Waktu duduk dan berdiri klien

No	Langkah
1.	Posisi klien duduk di kursi
2.	Minta klien berdiri dari kursi, berjalan 10 langkah (3 meter), kembali ke kursi, ukur waktu dalam detik

Interpretasi : Klien tidak mampu berdiri, sehingga pemeriksaan tidak dilakukan, hasil risiko jatuh tinggi

≤ 10 detik : Risiko jatuh rendah

11-19 detik : Risiko jatuh sedang

20-29 detik : Risiko jatuh tinggi

≥ 30 detik : Gangguan mobilitas dan risiko jatuh tinggi

4.2 Analisis Data


NO.	DATA	ETIOLOGI	MASALAH KEPERAWATAN
1.	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengatakan merasa cemas akan kehidupannya karena tidak dapat berjalan dan menggerakkan kedua kakinya sama sekali sejak lahir. 2. Klien mengatakan takut jika sakitnya bertambah parah 3. Klien mengatakan tidak memiliki siapapun, klien hidup sebatang kara sejak tahun 1989, 4. klien mengatakan tidak suka sendiri, klien selalu meminta untuk ditemani. 5. Klien mengatakan pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan pertamanya. Klien mengatakan 2x menikah 6. Klien berharap agar mahasiswa yang praktik selanjutnya dapat mengurus dan menyanggahi dirinya 7. Klien mengatakan tidak ada yang mengunjungi 8. Klien mengatakan sudah tidak mampu sholat. 9. klien mengeluh istirahatnya kurang berkualitas <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. klien tampak sering menunjukkan mimik sedih 2. Klien tampak cemas. 3. Klien tampak tegang. 4. Klien tampak kurang bersemangat dalam menjalani kehidupannya. 5. Alam perasaan : sedih 6. klien tampak sedih saat bercerita 7. Pengkajian skala depresi geriatrik dengan total skor 13 dengan interpretasi depresi 8. klien tampak lesu 9. klien tampak kurang bersemangat 10. kontak mata kurang 11. Tekanan darah : 150/80 mmHg 	Krisis maturasioal	Ansietas
2.	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. klien mengeluh istirahatnya kurang berkualitas 2. klien mengeluh sulit tidur 3. Klien mengatakan pola tidurnya tidak teratur 4. waktu tidur klien antara pukul 22:00-05:00 WITA, namun dalam rentang waktu itu klien sering terbangun tanpa hal yg jelas, 5. klien mengatakan susah untuk tidur kembali 	Kurang kontrol tidur	Gangguan pola tidur

	<p>6. klien mengatakan tidur lagi saat pagi pukul 10.00-11.00 wita karena merasa tidur malamnya kurang.</p> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak tidur terduduk saat pagi hari. 2. klien tampak lesu 3. Mata klien tampak sayu 4. terdapat kehitaman area sekitar bawah mata 5. klien tampak kurang bersemangat 						
3.	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengatakan fungsi ototnya menurun dan mengeluh kedua kakinya sudah tidak bisa berjalan 2. Klien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah otot dan sendi pada tangan. 3. Klien mengatakan tidak dapat berjalan dan tidak dapat menggerakkan kakinya sejak lahir 4. Klien menyadari hal tersebut dan mengatakan merasa khawatir jika kekuatan ototnya semakin menurun <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan klien tampak lambat 2. klien tampak kesulitan bergerak, 3. klien tampak gerak terbatas. 4. Kekuatan otot tampak melemah/menurun 5. klien hanya menggeser kakinya dengan menggunakan tangannya <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">3</td> <td style="padding: 0 10px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">1</td> <td style="padding: 0 10px;">1</td> </tr> </table>	3	3	1	1	Penurunan kekuatan otot	Gangguan mobilitas fisik
3	3						
1	1						
4.	<p>Faktor risiko :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tidak mampu berjalan dan berdiri 2. klien menggunakan alat bantu kursi roda untuk bergerak 3. klien mengatakan pernah jatuh seminggu yang lalu sebelum pengkajian tanggal 20/09/22 dikamar mandi 4. klien tampak hanya menggeser badannya 5. Klien mengalami penurunan fungsi penglihatan, terutama untuk penglihatan jarak jauh. 6. klien Mengalami penurunan kekuatan otot 7. klien Mengalami penurunan fungsi sendi, sendi mengalami kekakuan <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">3</td> <td style="padding: 0 10px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">1</td> <td style="padding: 0 10px;">1</td> </tr> </table> <ol style="list-style-type: none"> 8. klien tampak terbatas dalam melakukan aktifitas 9. Gerakan klien tampak lambat 10. Kekuatan otot tampak melemah/menurun 11. Tingkat ketergantungan : Klien dalam melakukan aktivitas dibantu sebagian 	3	3	1	1	Usia <65 tahun dan riwayat jatuh	Risiko jatuh
3	3						
1	1						

	<p>12. Pengkajian status fungsional : Mandiri semuanya kecuali salah satu saja dari fungsi di atas</p> <p>13. Pada pengkajian barthel indeks Total skor klien adalah 100 dengan ketergantungan sebagian</p> <p>14. Pengkajian skala morse dengan total nilai 75 dengan interpretasi risiko jatuh tinggi dengan pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi.</p> <p>15. Pengkajian Keseimbangan Klien tidak mampu berdiri, sehingga pemeriksaan tidak dilakukan, hasil risiko jatuh tinggi</p>		
5.	<p>Faktor risiko :</p> <p>1. Klien mengatakan pilih-pilih makanan,</p> <p>2. klien mengatakan kurang nafsu makan,</p> <p>3. klien tampak tidak menghabiskan porsi makannya setiap hari selama pengkajian.</p> <p>4. Klien tampak perlahan saat mengunyah makanan.</p> <p>5. BB klien sulit dievaluasi</p> <p>6. Klien dianjurkan diet rendah garam</p> <p>7. klien tampak kesusahan mengunyah</p> <p>8. Gigi klien yang tersisa ±3 buah gigi, 2 gigi depan atas, 1 gigi bawah</p>	Faktor psikologis (keengganan untuk makan)	Risiko defisit nutrisi


4.3 Intervensi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Kriteria Evaluasi	Intervensi	Rasional
1	<p>Ansietas (D.0080) berhubungan dengan Krisis maturasioal dibuktikan dengan :</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien mengatakan merasa cemas akan kehidupannya karena tidak dapat berjalan dan menggerakkan kedua kakinya sama sekali sejak lahir. Klien mengatakan takut jika sakitnya bertambah parah Klien mengatakan tidak memiliki siapapun, klien hidup sebatang kara sejak tahun 1989, klien mengatakan tidak suka sendiri, klien selalu meminta untuk ditemani. Klien mengatakan pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan pertamanya. Klien mengatakan 2x menikah Klien berharap agar mahasiswa yang praktik selanjutnya dapat mengurus dan menyayangi dirinya Klien mengatakan yang mengunjungi Tidak ada 	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam maka diharapkan tingkat ansietas (L.09093) menurun dengan kriteria hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun (2 ke 4) Perilaku tegang menurun (3 ke 4) Kontak mata membaik (3 ke 5) Tekanan darah menurun (2 ke 3) Pola tidur membaik (2 ke 4) 	<p>Terapi Relaksasi (I.09326)</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan Monitor respon terhadap terapi relaksasi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman Gunakan pakaian longgar Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi (terapi zikir) Jelaskan secara rinci intervensi yang dipilih Anjurkan mengambil posisi nyaman Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi Anjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih Demonstrasikan dan latih teknik relaksasi 	<ol style="list-style-type: none"> Jika klien mengalami penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu, maka klien akan sulit melakukan teknik relaksasi tersebut Mengetahui apakah ada perubahan pada otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan Membandingkan perasaan sebelum dan setelah terapi Untuk memberikan perasaan yang tenang dan nyaman pada saat klien sedang latihan terapi relaksasi Agar klien lebih mudah bergerak Untuk memberikan perasaan tenang pada klien Untuk memberikan informasi terkait tindakan jenis relaksasi Agar klien memahami intervensi Untuk memberikan rasa nyaman pada saat diberikan intervensi Sebagai penunjang agar bisa merasakan ketenangan Untuk membuat klien mudah mengingat dan menerapkan intervensi Untuk memudahkan klien melakukan intervensi

	<p>8. Klien mengatakan sudah tidak mampu salat.</p> <p>9. klien mengeluh istirahatnya kurang berkualitas</p> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. klien tampak sering menunjukkan mimik sedih 2. Klien tampak cemas. 3. Klien tampak tegang. 4. Klien tampak kurang bersemangat dalam menjalani kehidupannya. 5. klien tampak sedih saat bercerita 6. Pengkajian skala depresi geriatrik dengan total skor 13 dengan interpretasi depresi 7. klien tampak lesu 8. klien tampak kurang bersemangat 9. kontak mata kurang 10. Tekanan darah : 150/80 mmHg 			
2.	<p>Gangguan pola tidur (D.0055) berhubungan Kurang kontrol tidur dengan dibuktikan dengan :</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. klien mengeluh istirahatnya kurang berkualitas 2. klien mengeluh sulit tidur 3. Klien mengatakan pola tidurnya tidak teratur 4. waktu tidur klien antara pukul 22:00-05:00 WITA, namun 	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan dukungan tidur 3x24 jam diharapkan pola tidur (L.05045) membaik dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> g. Keluhan sulit tidur menurun (3 ke 4) h. Keluhan sering terjaga menurun (3 ke 4) 	<p>Dukungan Tidur (I. 05174)</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pola aktivitas dan tidur 2. Identifikasi faktor pengganggu tidur (Fisik atau psikologis) <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. modifikasi lingkungan (mis, pencahayaan, kebisingan, suhu, dan tempat tidur) 4. batasi waktu tidur siang, jika perlu 	<p>Dukungan Tidur</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pola aktivitas klien agar penyebab gangguan tidurnya dapat diketahui 2. faktor pengganggu dapat mempengaruhi pola tidur <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. lingkungan sekitar dapat membantu klien merasa nyaman dalam tidur

	<p>dalam rentang waktu itu klien sering terbangun tanpa hal yg jelas,</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. klien mengatakan susah untuk tidur kembali 6. klien mengatakan tidur lagi saat pagi pukul 10.00-11.00 wita karena merasa tidur malamnya kurang. <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak tidur terduduk saat pagi hari. 2. klien tampak lesu 3. Mata klien tampak sayu 4. terdapat kehitaman area sekitar bawah mata 5. klien tampak kurang bersemangat 	<ol style="list-style-type: none"> i. Keluhan tidak puas tidur menurun (3 ke 4) j. Keluhan istirahat tidak cukup menurun (3 ke 4) k. Kemampuan beraktivitas meningkat (3 ke 4) 	<ol style="list-style-type: none"> 5. fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit 7. Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur 8. Ajarkan Teknik relaksasi autogenic atau cara nonfarmakologi lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tidur siang yang lama juga mempengaruhi pola tidur malam 5. Menghilangkan stress sebelum tidur bisa mengalihkan rasa cemasnya salah stau contohnya dengan mendengarkan music <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Mengetahui efek dari pola tidur yang buruk 7. Kebiasaan tidur yang baik dapat dilakukan secara berulang 8. Penggunaan cara nonfarmakologi ini dapat menurunkan atau mengalihkan rasa cemas pada klien
3.	<p>Gangguan mobilitas fisik (D.0054) berhubungan dengan Penurunan kekuatan otot dibuktikan dengan :</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengatakan fungsi ototnya menurun dan mengeluh kedua kakinya sudah tidak bisa berjalan 2. Klien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah otot dan sendi pada tangan. 3. Klien mengatakan tidak dapat berjalan dan tidak dapat 	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan – dukungan mobilisasi selama 3x24jam pertemuan, diharapkan mobilitas fisik (L. 05042) meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pergerakan ekstremitas meningkat (3 ke 4) b. kekuatan otot cukup meningkat (3 ke 4) c. kaku sendi menurun (3 ke 4) d. gerakan terbatas menurun (2 ke 3) 	<p>Dukungan mobilisasi (I. 05173)</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi 4. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (Pagar tempat tidur) 6. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu 	<p>Dukungan mobilisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui apabila adanya nyeri dan keluhan fisik lainnya 2. Mengetahui adanya keterbatasan dalam melakukan aktivitas 3. Mengetahui frekuensi jantung dan tekanan darah pasien 4. Mengetahui kondisi umum pasien untuk memberikan dukungan mobilisasi 5. Memasang pagar pengaman tempat tidur untuk mencegah terjadinya insiden 6. Memfasilitasi pergerakan apabila mampu

	<p>menggerakkan kakinya sejak lahir</p> <p>4. Klien menyadari hal tersebut dan mengatakan merasa khawatir jika kekuatan ototnya semakin menurun</p> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan klien tampak lambat 2. klien tampak kesulitan bergerak, 3. klien tampak gerak terbatas. 4. Kekuatan otot tampak melemah/menurun 5. klien hanya menggeser kakinya dengan menggunakan tangannya <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	3	3	1	1		<ol style="list-style-type: none"> 7. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan <p>Edukasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi 9. Anjurkan melakukan mobilisasi dini 10. Anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (Duduk di tempat tidur) 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Libatkan keluarga untuk membantu mobilisasi pasien 8. Perlunya Pendidikan bahwa mobilisasi dini perlu diberikan kepada pasien 9. Mobilisasi dini diperlukan untuk menghindari terjadinya kekakuan pada sendi 10. Mobilisasi sederhana ditempat tidur dapat dilakukan seperti miring kiri dan miring kanan
3	3							
1	1							
4.	<p>Risiko jatuh (D.0143) dibuktikan dengan Usia <65 tahun dan riwayat jatuh</p> <p>Faktor risiko :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tidak mampu berjalan dan berdiri 2. klien menggunakan alat bantu kursi roda untuk bergerak 3. klien mengatakan pernah jatuh seminggu yang lalu sebelum pengkajian tanggal 20/09/22 dikamar mandi 4. klien tampak hanya menggeser badannya 	<p>Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan tingkat jatuh (L.14138) menurun dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jatuh saat duduk menurun (2 ke 4) b. Jatuh saat dipindahkan menurun (2 ke 5) c. Jatuh saat di kamar mandi menurun (2 ke 5) 	<p>Pencegahan Jatuh</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi faktor risiko jatuh 2. Identifikasi risiko jatuh setidaknya sekali setiap shift atau sesuai dengan kebijakan institusi 3. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh 4. Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala 5. Monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Orientasikan ruangan pada pasien dan keluarga 	<p>Pencegahan Jatuh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal perilaku dan faktor-faktor yang berpotensi mengakibatkan jatuh 2. Memonitor adanya risiko jatuh guna melakukan pencegahan 3. Mengenal keadaan lingkungan sekitar yang berkontribusi pada risiko jatuh 4. Mengetahui tingkat risiko jatuh 5. Untuk meningkatkan keamanan dan kemandirian pasien 6. Untuk mengenal ruangan dan mengidentifikasi tempat yang memiliki risiko jatuh 7. Meminimalisir risiko jatuh dari tempat tidur atau kursi roda 				

<p>5. Klien mengalami penurunan fungsi penglihatan, terutama untuk penglihatan jarak jauh.</p> <p>6. klien Mengalami penurunan kekuatan otot</p> <p>7. klien Mengalami penurunan fungsi sendi, sendi mengalami kekakuan</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table> <p>8. klien tampak terbatas dalam melakukan aktifitas</p> <p>9. Gerakan klien tampak lambat</p> <p>10. Kekuatan otot tampak melemah/menurun</p> <p>11. Tingkat ketergantungan : Klien dalam melakukan aktivitas dibantu sebagian</p> <p>12. Pengkajian status fungsional : Mandiri semuanya kecuali salah satu saja dari fungsi di atas</p> <p>13. Pada pengkajian barthel indeks Total skor klien adalah 100 dengan ketergantungan sebagian</p> <p>14. Pengkajian skala morse dengan total nilai 75 dengan interpretasi risiko jatuh tinggi dengan pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi.</p> <p>15. Pengkajian Keseimbangan Klien tidak mampu berdiri,</p>	3	3	1	1	 <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN M A K A S S A R</p>	<p>7. Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci</p> <p>8. Pasang handrall tempat tidur</p> <p>9. Tempatkan pasien berisiko tinggi jatuh dekat dengan pantauan dari nurse station</p> <p>10. Dekatkan bel pemanggil dalam jangkauan pasien</p> <p>Edukasi</p> <p>10. Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah</p> <p>11. Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin</p> <p>12. Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh</p> <p>13. Anjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri</p> <p>14. Ajarkan cara menggunakan bel untuk memanggil perawat</p>	<p>8. Dapat menciptakan aktivitas yang mandiri dengan aman dan nyaman</p> <p>9. Memudahkan perawat untuk mengawasi pasien dengan risiko jatuh</p> <p>10. Membuat pasien memiliki rasa aman, dapat mengatur diri dan mengurangi ketakutan karena ditinggal sendiri</p> <p>11. Menurunkan risiko terjatuh</p> <p>12. Membantu pasien berjalan dengan langkah tetap untuk mempertahankan keseimbangan diri dan mencegah terjadinya kaki terkilir</p> <p>13. Meminimalisir risiko jatuh</p> <p>14. Membuat pasien memiliki rasa aman dan mengurangi ketakutan karena ditinggal sendiri</p>
3	3						
1	1						

	sehingga pemeriksaan tidak dilakukan, hasil risiko jatuh tinggi			
5.	<p>Risiko defisit nutrisi (D.0032) dibuktikan dengan Faktor psikologis (keengganan untuk makan)</p> <p>Faktor risiko :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengatakan pilih-pilih makanan, 2. klien mengatakan kurang nafsu makan, 3. klien tampak tidak menghabiskan porsi makannya setiap hari selama pengkajian. 4. Klien tampak perlahan saat mengunyah makanan. 5. BB klien sulit dievaluasi 6. Klien dianjurkan diet rendah garam 7. klien tampak kesusahan mengunyah 8. Gigi klien yang tersisa ± 3 buah gigi, 2 gigi depan atas, 1 gigi bawah 	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam maka diharapkan status nutrisi (L.03030) membaik menurun dengan kriteria hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Porsi makan yang dihabiskan meningkat (2 ke 3) b. Verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat (1 ke 3) c. Kekuatan otot mengunyah meningkat (2 ke 3) d. Nafsu makan membaik (3 ke 4) 	<p>Manajemen Nutrisi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi makanan yang disukai 2. Monitor berat badan 3. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu 5. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai 6. Berikan makan tinggi serat untuk mencegah konstipasi <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Anjurkan posisi duduk, jika mampu 8. Ajarkan diet yang diprogramkan 	<p>Manajemen Nutrisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar nafsu makan klien meningkat 2. Untuk memantau peningkatan atau penurunan berat badan 3. Untuk memantau peningkatan atau penurunan albumin 4. Agar nafsu makan klien meningkat 5. Untuk memberikan ketertarikan pasien terhadap makanannya 6. Agar klien tidak mengalami konstipasi 7. Untuk mempermudah klien dalam menelan 8. Agar klien paham diet yang dijalani

4.4 Implementasi Keperawatan dan Evaluasi Keperawatan

Hari/Tgl/Waktu	Diagnosis Keperawatan	Implementasi Keperawatan	Evaluasi Keperawatan	Pelaksana
Rabu, 28-09-2022 07.35 WITA	Ansietas	Terapi Relaksasi Observasi 1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif Hasil: Klien tampak tegang dan sering menunjukkan mimik sedih, tetapi tidak sulit berkonsentrasi sehingga terapi relaksasi bisa diberikan	13.00 WITA S: 1. Klien mengatakan merasa cemas akan kehidupannya karena tidak dapat berjalan dan menggerakkan kedua kakinya sama sekali sejak lahir 2. Klien selalu meminta untuk ditemani 3. Klien mengeluh istirahatnya kurang berkualitas 4. Klien menyadari bahwa dirinya semakin tua dan mengatakan merasa khawatir jika kekuatan ototnya semakin menurun O: 1. Klien tampak cemas. 2. Klien tampak tegang. 3. klien tampak lesu 4. alam perasaan : sedih 5. kontak mata kurang 6. klien tampak sedih saat bercerita 7. Tekanan darah : 140/90 mmHg 8. GDS : Total skor 13 dengan interpretasi depresi A: Masalah ansietas belum teratasi P: Lanjutkan intervensi	Indri
07.40 WITA		2. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan Hasil: Sebelum latihan didapatkan kekuatan otot menurun dimana anggota gerak bagian atas dapat menahan tahanan minimal sedangkan anggota gerak bagian bawah hanya bisa menggerakkan ujung jari, frekuensi nadi 88x/menit, tekanan darah 130/60 mmHg dan suhu 36,5°C		
07.45 WITA		3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi Hasil: Klien mengatakan bersedia diberikan terapi relaksasi (terapi zikir)		
08.00 WITA		Terapeutik 4. Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman Hasil: Pintu kamar dibuka sehingga udara menjadi sejuk dan pencahayaan cukup. Klien tampak rileks		
08.05 WITA		5. Menggunakan pakaian longgar Hasil:	1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif	

08.10 WITA		<p>Perawat mengganti sprengi dan pakaian klien. Klien tampak nyaman</p> <p>6. Menggunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama</p> <p>Hasil: Klien memberi respon dengan baik dan mampu berkomunikasi secara kooperatif</p>	<p>2. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan</p> <p>3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi</p> <p>7. Menjelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi (terapi zikir)</p> <p>8. Menjelaskan secara rinci intervensi yang dipilih</p> <p>9. Menganjurkan mengambil posisi nyaman</p> <p>10. Menganjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi</p> <p>11. Menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih</p> <p>12. Mendemonstrasikan dan latih teknik relaksasi</p>	
<p>Rabu, 28-09-2022 09.00 WITA</p> <p>09.05 WITA</p> <p>09.10 WITA</p>	Gangguan Pola tidur	<p>Dukungan Tidur</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur Hasil : Klien mengatakan pola tidurnya tidak teratur, waktu tidur klien antara pukul 22:00-05:00 WITA, namun dalam rentang waktu itu klien sering terbangun tanpa hal yg jelas dan susah untuk tidur kembali, klien mengatakan aktivitas sebelum tidur sering membenahi barang disamping tempat tidur</p> <p>2. Mengidentifikasi faktor pengganggu tidur Hasil : klien mengatakan tidurnya kurang nyenyak karena memikirkan hal yang berkaitan penyakitnya, klien mengatakan senang mengobrol saat malam hari dengan teman sebayanya.</p> <p>Terapeutik</p> <p>3. Memodifikasi lingkungan (pencahayaan, kebisingan, suhu, dan tempat tidur) Hasil : pintu dalam keadaan tertutup sehingga meminimalisir suara dan serangga yang masuk kedalam</p>	<p>13.01 WITA</p> <p>S:</p> <p>1. Klien mengatakan sering terbangun saat malam hari tanpa alasan yang jelas</p> <p>2. Klien mengatakan sulit untuk tidur kembali</p> <p>3. Klien mengeluh sulit tidur</p> <p>O:</p> <p>1. Klien tampak lesu</p> <p>2. Klien tampak tidur terduduk saat pagi hari</p> <p>3. Klien tampak mampu mengikuti kegiatan TAK di Aula Gau Mabaji</p> <p>A: gangguan pola tidur belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p>1. Mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur</p> <p>3. Memodifikasi lingkungan</p> <p>4. Membatasi waktu tidur siang</p> <p>5. Memfasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur</p>	Indri

12.00 WITA		<p>kamar yang menyebabkan tidur terganggu, lampu kamar diredupkan, meminimalisir aktivitas yang mengganggu jam tidur.</p> <p>4. Membatasi waktu tidur siang Hasil : siang hari klien diajak berbicara oleh perawat mengobrol seputar masa lalu klien sehingga saat malam hari klien tidak merasa terjaga</p> <p>Edukasi</p> <p>5. Memfasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur Hasil : pendingin ruangan dinyalakan, membatasi mengobrol saat malam hari dengan penghuni balai yang lain, menganjurkan mengurangi aktivitas berbenah saat malam hari, menjauhkan peralatan yang memungkinkan kualitas tidur kurang.</p> <p>6. Menjelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit Hasil : klien paham pentingnya tidur cukup, untuk meningkatkan imun tubuh, memperbaiki suasana hati, memberi energi lebih untuk melakukan aktivitas sehari-hari.</p> <p>7. Menganjurkan menepati kebiasaan waktu tidur Hasil : klien mengerti untuk tidur tepat waktu antara pukul 09.00-10.00 wita demi mendapatkan tidur yang cukup</p>		
09.20 WITA				
09.25 WITA				
09.30 WITA				
<p>Rabu, 28-09-2022 10.00 WITA</p> <p>10.06 WITA</p>	<p>Gangguan mobilitas fisik</p>	<p>Dukungan Mobilisasi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya Hasil: klien mengatakan tidak nyeri, klien mengeluh fungsi ototnya menurun dan mengeluh kakinya sudah tidak mampu berjalan</p> <p>2. Mengidentifikasi toleransi fisik melalui pergerakan Hasil: Gerakan terbatas Kekuatan otot : lemah</p> <p>3 3</p>	<p>13.00 WITA</p> <p>S:</p> <p>1. Klien mengatakan fungsi ototnya menurun 2. Klien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah otot dan sendi</p> <p>O:</p> <p>1. Gerak klien tampak lambat 2. Klien tampak kesulitan bergerak 3. Sendi tampak kaku 4. Klien tampak gerak terbatas 5. Kekuatan otot tampak melemah</p>	<p>Indri</p>

10.10 WITA		1 1 Klien tampak tidak mampu berdiri dan berjalan Klien mampu berpindah perlahan dari tempat tidur ke kursi roda Klien tampak bertumpu pada tangan	3 3 1 1	
10.15 WITA		3. Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi Hasil: TD: 130/80 mmHg Nadi : 96 x / menit	A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi P: Lanjutkan intervensi	
10.20 WITA		4. Memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi Hasil: keadaan umum klien tampak baik, klien tampak siap dilakukan intervensi, klien tampak mengikuti instruksi dengan baik.	1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah seelum memulai mobilisasi 4. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi 6. Anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (rom aktif)	
11.00 WITA		5. Menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi Hasil: klien paham tujuan mobilisasi yaitu untuk Mempertahankan fungsi tubuh. Memperlancar peredaran darah, Mempertahankan tonus otot.		
		6. Menganjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan Hasil: Klien dibantu oleh perawat untuk melakukan rom aktif		
Rabu, 28-09-2022 11.05 WITA	Risiko jatuh	Pencegahan Jatuh Observasi 1. Mengidentifikasi faktor risiko jatuh Hasil: Klien berumur 101 tahun, klien tidak mampu berdiri, klien menggunakan kursi roda sehari-hari, klien ada riwayat jatuh seminggu yang lalu dikamar mandi	13.00 WITA S: 1. Klien berumur 101 tahun 2. Klien mengatakan seminggu yang lalu pernah jatuh dikamar mandi 3. Klien mengatakan tidak mampu berdiri	Indri
11.10 WITA		2. Mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh Hasil: klien melakukan kegiatan secara mandiri, lantai kamar mandi yang licin, alat mandi yang susah diraih klien menggunakan kursi roda sebagai alat bantu	O: 1. Tingkat ketergantungan : Klien dalam melakukan aktivitas dibantu sebagian	
11.30 WITA		3. Menghitung risiko jatuh dengan menggunakan skala		

11.35 WITA		<p>Hasil: Pengkajian skala morse dengan total nilai 75 dengan interpretasi risiko jatuh tinggi dengan pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi.</p> <p>4. Memonitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya Hasil: Klien mampu berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya tanpa dengan bantuan</p>	<p>2. Pengkajian status fungsional : Mandiri semuanya kecuali salah satu saja dari fungsi di atas</p> <p>3. Pada pengkajian barthel indeks Total skor klien adalah 100 dengan ketergantungan sebagian</p> <p>4. Pengkajian skala morse dengan total nilai 75 dengan interpretasi risiko jatuh tinggi dengan pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi.</p> <p>5. Pengkajian Keseimbangan Klien tidak mampu berdiri, sehingga pemeriksaan tidak dilakukan, hasil risiko jatuh tinggi A: Risiko jatuh tidak terjadi P: Lanjutkan intervensi Terapeutik :</p> <p>5. Mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh</p> <p>6. Menghitung risiko jatuh dengan menggunakan skala</p> <p>6. Memastikan roda kursi roda selalu dalam kondisi terkunci</p>	
<p>Rabu, 28-09-2022 11.40 WITA</p> <p>11.45 WITA</p> <p>11.50 WITA</p>	Risiko defisit nutrisi	<p>Manajemen Nutrisi Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi makanan yang disukai Hasil: Klien mengatakan menyukai makan sambal manga dengan nasi, klien menyukai makan burasa</p> <p>2. Memonitor berat badan Hasil : BB klien sulit dievaluasi</p> <p>Terapeutik</p> <p>3. melakukan oral hygiene sebelum makan Hasil : gigi klien tinggal 3 buah, klien diajarkan minum air putih terlebih dahulu</p>	<p>13.05 WITA</p> <p>S:</p> <p>1. Klien mengatakan kurang nafsu makan</p> <p>2. Klien mengatakan pilih-pilih jenis makanan</p> <p>3. Klien mengatakan tidak suka makan bubur</p> <p>O:</p> <p>1. BB klien sulit dievaluasi</p> <p>2. Klien tampak tidak menghabiskan porsi makannya setiap hari</p> <p>3. Klien tampak kesusahan mengunyah</p> <p>4. Gigi klien tersisa 3 buah</p>	Indri

11.55 WITA		4. menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai Hasil : makanan disajikan dalam keadaan hangat oleh pegawai balai, dengan lauk yang bervariasi tiap hari lengkap dengan buah dan sayur	A: Defisit nutrisi belum teratasi P: Intervensi dilanjutkan	
12.00 WITA		5. Memberikan makan tinggi serat untuk mencegah konstipasi Hasil : 1 porsi makanan yang disediakan lengkap dengan sayur sehingga mencegah konstipasi pada pasien	3. Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu 4. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai 5. Berikan makan tinggi serat untuk mencegah konstipasi	
12.10 WITA		6. Mengajarkan posisi duduk, jika mampu Hasil : Klien mampu duduk, klien makan di atas kursi rodanya		
12.15 WITA		7. Mengajarkan diet yang diprogramkan Hasil : Klien memiliki riwayat hipertensi, klien dianjurkan diet rendah garam, klien dibatasi mengonsumsi garam berlebih		
Kamis, 29-09-2022 07.35 WITA	Ansietas	Terapi Relaksasi Observasi 1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif Hasil: Klien tampak tegang dan sering menunjukkan mimik sedih, tetapi tidak sulit berkonsentrasi sehingga terapi relaksasi bisa diberikan	13.00 WITA S: 1. Klien mengatakan merasa cemas akan kehidupannya karena tidak dapat berjalan dan menggerakkan kedua kakinya sama sekali sejak lahir 2. Klien selalu meminta untuk ditemani 3. Klien mengeluh istirahatnya kurang berkualitas 4. Klien menyadari bahwa dirinya semakin tua dan mengatakan merasa khawatir jika kekuatan ototnya semakin menurun O: 1. Klien tampak cemas. 2. Klien tampak tegang. 3. klien tampak lesu 4. alam perasaan : sedih	Indri
07.40 WITA		2. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan Hasil: Sebelum latihan didapatkan kekuatan otot menurun dimana anggota gerak bagian atas dapat menahan tahanan minimal sedangkan anggota gerak bagian bawah hanya bisa menggerakkan ujung jari, frekuensi nadi 88x/menit, tekanan darah 130/60 mmHg dan suhu 36,5°C		

07.45 WITA	3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi Hasil: Klien mengatakan bersedia diberikan terapi relaksasi (terapi zikir) Terapeutik	5. kontak mata kurang 6. klien tampak sedih saat bercerita 7. Tekanan darah : 140/90 mmHg 8. GDS : Total skor 12 dengan interpretasi depresi
08.00 WITA	4. Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman Hasil: Pintu kamar dibuka sehingga udara menjadi sejuk dan pencahayaan cukup. Klien tampak rileks	A: Masalah ansietas belum teratasi P: Lanjutkan intervensi
08.05 WITA	5. Menggunakan pakaian longgar Hasil: Perawat mengganti pakaian klien. Klien tampak nyaman	1. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan
08.10 WITA	6. Menggunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama Hasil: Klien memberi respon dengan baik dan mampu berkomunikasi secara kooperatif	3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi 7. Menganjurkan mengambil posisi nyaman 8. Menganjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi 9. menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih
	7. Menjelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi (terapi zikir) Hasil : Tujuan pemberian terapi zikir sebagai terapi yang memiliki tujuan pengobatan serta menumbuhkan rasa ikhlas sehingga klien mampu menerima kondisinya dan bangkit dari kondisi tersebut. Manfaat terapi zikir dapat Menghilangkan rasa takut, Menenteramkan dan membuat hati menjadi damai, dan Menambah keyakinan, terapi zikir dapat dilakukan saat pagi dan petang.	
	8. Menganjurkan mengambil posisi nyaman Hasil : pasien nyaman dengan posisi duduk diatas tempat tidur Menganjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi Hasil : pasien memegang tasbih, dimulai dari membaca ta'awudz kemudian dilanjut beristighfar, lalu mengucapkan kalimat zikir Subhanallah 33x,	

		walhamdulillah 33x, wala ilaha illallah 33x, wallahu akbar 33x. 9. menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih hasil : klien mengerti untuk sering menerapkan dan mengulangi terapi zikir untuk menurunkan kecemasan yang ia alami		
Kamis, 29-09-2022 09.00 WITA	Gangguan Pola tidur	Dukungan Tidur Observasi 1. Mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur Hasil : Klien mengatakan pola tidurnya tidak teratur, waktu tidur klien antara pukul 22:00-05:00 WITA, namun dalam rentang waktu itu klien sering terbangun tanpa hal yg jelas dan susah untuk tidur kembali, klien mengatakan aktivitas sebelum tidur sering membenahi barang disamping tempat tidur	13.01 WITA S: 1. Klien mengatakan sering terbangun saat malam hari tanpa alasan yang jelas 2. Klien mengatakan sulit untuk tidur kembali 3. Klien mengeluh sulit tidur O: 1. Klien tampak lesu 2. Klien tampak tidur terduduk saat pagi hari 3. Klien tampak mampu mengikuti kegiatan TAK di Aula Gau Mabaji A: gangguan pola tidur belum teratasi P: Lanjutkan intervensi 1. Mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur 3. Memodifikasi lingkungan 4. Membatasi waktu tidur siang 5. Memfasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur	Indri
09.05 WITA		2. Mengidentifikasi faktor pengganggu tidur Hasil : klien mengatakan tidurnya kurang nyeyak karena memikirkan hal yang berkaitan penyakitnya, klien mengatakan senang mengobrol saat malam hari dengan teman sebayanya.		
09.10 WITA		Terapeutik 3. Memodifikasi lingkungan (pencahayaan, kebisingan, suhu, dan tempat tidur) Hasil : pintu dalam keadaan tertutup sehingga meminimalisir suara dan serangga yang masuk kedalam kamar yang menyebabkan tidur terganggu, lampu kamar diredupkan, meminimalisir aktivitas yang mengganggu jam tidur.		
12.00 WITA		4. Membatasi waktu tidur siang Hasil : siang hari klien diajak berbicara oleh perawat mengobrol seputar masa lalu klien sehingga saat malam hari klien tidak merasa terjaga Edukasi		

09.20 WITA		5. Memfasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur Hasil : pendingin ruangan dinyalakan, membatasi mengobrol saat malam hari dengan penghuni balai yang lain, menganjurkan mengurangi aktivitas berbenah saat malam hari, menjauhkan peralatan yang memungkinkan kualitas tidur kurang.						
09.25 WITA		6. Menjelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit Hasil : klien paham pentingnya tidur cukup, untuk meningkatkan imun tubuh, memperbaiki suasana hati, memberi energi lebih untuk melakukan aktivitas sehari-hari.						
09.30 WITA		7. Menganjurkan menepati kebiasaan waktu tidur Hasil : klien mengerti untuk tidur tepat waktu antara pukul 09.00-10.00 wita demi mendapatkan tidur yang cukup						
Kamis, 29-09-2022 10.00 WITA	Gangguan mobilitas fisik	Dukungan Mobilisasi Observasi 1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya Hasil: klien mengatakan tidak nyeri, klien mengeluh fungsi ototnya menurun dan mengeluh kakinya sudah tidak mampu berjalan 2. Mengidentifikasi toleransi fisik melalui pergerakan Hasil: Gerakan terbatas Kekuatan otot : lemah <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">3</td><td style="padding: 0 5px;">3</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</td><td style="padding: 0 5px;">1</td></tr> </table> Klien tampak tidak mampu berdiri dan berjalan Klien mampu berpindah perlahan dari tempat tidur ke kursi roda Klien tampak bertumpu pada tangan	3	3	1	1	13.02 WITA	Indri
3	3							
1	1							
10.06 WITA			S: 1. Klien mengatakan fungsi ototnya menurun 2. Klien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah otot dan sendi O: 1. Gerak klien tampak lambat 2. Klien tampak kesulitan bergerak 3. Sendi tampak kaku 4. Klien tampak gerak terbatas 5. Kekuatan otot tampak melemah <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">3</td><td style="padding: 0 5px;">3</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</td><td style="padding: 0 5px;">1</td></tr> </table>	3	3	1	1	
3	3							
1	1							
10.10 WITA		3. Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi Hasil:	A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi P: Lanjutkan intervensi 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya					

10.15 WITA		TD: 130/80 mmHg Nadi : 96 x / menit	2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan	
10.20 WITA		4. Memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi Hasil: keadaan umum klien tampak baik, klien tampak siap dilakukan intervensi, klien tampak mengikuti instruksi dengan baik.	3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah seelum memulai mobilisasi	
11.00 WITA		5. Menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi Hasil: klien paham tujuan mobilisasi yaitu untuk Mempertahankan fungsi tubuh. Memperlancar peredaran darah, Mempertahankan tonus otot.	4. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi	
		6. Menganjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan Hasil: Klien dibantu oleh perawat untuk melakukan rom aktif	6. Anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (rom aktif)	
Jumat, 30-09-2022 07.35 WITA	Ansietas	Terapi Relaksasi Observasi 1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif Hasil: Klien tampak tegang dan sering menunjukkan mimik sedih, tetapi tidak sulit berkonsentrasi sehingga terapi relaksasi bisa diberikan	13.02 WITA S: 5. Klien mengatakan merasa cemas akan kehidupannya karena tidak dapat berjalan dan menggerakkan kedua kakinya sama sekali sejak lahir 6. Klien selalu meminta untuk ditemani 7. Klien mengeluh istirahatnya kurang berkualitas 8. Klien menyadari bahwa dirinya semakin tua dan mengatakan merasa khawatir jika kekuatan ototnya semakin menurun	Indri
07.40 WITA		2. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan Hasil: Sebelum latihan didapatkan kekuatan otot menurun dimana anggota gerak bagian atas dapat menahan tahanan minimal sedangkan anggota gerak bagian bawah hanya bisa menggerakkan ujung jari, frekuensi nadi 88x/menit, tekanan darah 130/60 mmHg dan suhu 36,5°C	O: 1. Klien tampak cemas. 2. Klien tampak tegang. 3. klien tampak lesu 4. alam perasaan : sedih 5. kontak mata kurang 6. klien tampak sedih saat bercerita 7. Tekanan darah : 130/60 mmHg	
07.45 WITA		3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi Hasil:		

08.00 WITA		<p>Klien mengatakan bersedia diberikan terapi relaksasi (terapi zikir)</p> <p>Terapeutik</p> <p>4. Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman Hasil:</p>	8. GDS : Total skor 11 dengan interpretasi depresi A: Masalah ansietas belum teratasi P: Lanjutkan intervensi	
08.05 WITA		<p>Pintu kamar dibuka sehingga udara menjadi sejuk dan pencahayaan cukup. Klien tampak rileks</p> <p>5. Menggunakan pakaian longgar Hasil:</p>	1. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan	
08.10 WITA		<p>Perawat mengganti sprengi dan pakaian klien. Klien tampak nyaman</p> <p>6. Menggunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama Hasil:</p> <p>Klien memberi respon dengan baik dan mampu berkomunikasi secara kooperatif</p> <p>7. Mengajarkan mengambil posisi nyaman Hasil : pasien nyaman dengan posisi duduk diatas tempat tidur Mengajarkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi Hasil : pasien memegang tasbeeh, dimulai dari membaca ta'awudz kemudian dilanjut beristighfar, lalu mengucapkan kalimat zikir Subhanallah 33x, walhamdulillah 33x, wala ilaha illallah 33x, wallahu akbar 33x.</p> <p>8. menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih hasil : klien mengerti untuk sering menerapkan dan mengulangi terapi zikir untuk menurunkan kecemasan yang ia alami</p>	3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi 9. Menganjurkan mengambil posisi nyaman 10. menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih	
Jumat, 30-09-2022 09.00 WITA	Gangguan Pola tidur	<p>Dukungan Tidur Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur</p>	S: 13.03 WITA	Indri

09.05 WITA	<p>Hasil : Klien mengatakan pola tidurnya tidak teratur, waktu tidur klien antara pukul 22:00-05:00 WITA, namun dalam rentang waktu itu klien sering terbangun tanpa hal yg jelas dan susah untuk tidur kembali, klien mengatakan aktivitas sebelum tidur sering membenahi barang disamping tempat tidur</p>	<p>1. Klien mengatakan sering terbangun saat malam hari tanpa alasan yang jelas</p> <p>2. Klien mengatakan sulit untuk tidur kembali</p> <p>3. Klien mengeluh sulit tidur</p>
09.10 WITA	<p>2. Mengidentifikasi faktor pengganggu tidur</p> <p>Hasil : klien mengatakan tidurnya kurang nyeyak karena memikirkan hal yang berkaitan penyakitnya, klien mengatakan senang mengobrol saat malam hari dengan teman sebayanya.</p> <p>Terapeutik</p>	<p>O:</p> <p>1. Klien tampak lesu</p> <p>2. Klien tampak tidur terduduk saat pagi hari</p> <p>3. Klien tampak mampu mengikuti kegiatan TAK di Aula Gau Mabaji</p> <p>A: gangguan pola tidur belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p>
12.00 WITA	<p>3. Memodifikasi lingkungan (pencahayaan, kebisingan, suhu, dan tempat tidur)</p> <p>Hasil : pintu dalam keadaan tertutup sehingga meminimalisir suara dan serangga yang masuk kedalam kamar yang menyebabkan tidur terganggu, lampu kamar diredupkan, meminimalisir aktivitas yang mengganggu jam tidur.</p>	<p>2. Mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur</p> <p>6. Memodifikasi lingkungan</p> <p>7. Membatasi waktu tidur siang</p> <p>8. Memfasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur</p>
09.20 WITA	<p>4. Membatasi waktu tidur siang</p> <p>Hasil : siang hari klien diajak berbicara oleh perawat mengobrol seputar masa lalu klien sehingga saat malam hari klien tidak merasa terjaga</p> <p>Edukasi</p>	
09.25 WITA	<p>5. Memfasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur</p> <p>Hasil : pendingin ruangan dinyalakan, membatasi mengobrol saat malam hari dengan penghuni balai yang lain, menganjurkan mengurangi aktivitas berbenah saat malam hari, menjauhkan peralatan yang memungkinkan kualitas tidur kurang.</p>	
09.30 WITA	<p>6. Menganjurkan menepati kebiasaan waktu tidur</p> <p>Hasil : klien mengerti untuk tidur tepat waktu antara pukul 09.00-10.00 wita demi mendapatkan tidur yang cukup</p>	

<p>Jumat, 30-09-2022 10.00 WITA</p> <p>10.06 WITA</p> <p>10.10 WITA</p> <p>10.15 WITA</p> <p>10.20 WITA</p> <p>11.00 WITA</p>	<p>Gangguan mobilitas fisik</p>	<p>Dukungan Mobilisasi Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya Hasil: klien mengatakan tidak nyeri, klien mengeluh fungsi ototnya menurun dan mengeluh kakinya sudah tidak mampu berjalan</p> <p>2. Mengidentifikasi toleransi fisik melalui pergerakan Hasil: Gerakan terbatas Kekuatan otot : lemah</p> <table border="1" data-bbox="672 606 851 686"> <tr> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Klien tampak tidak mampu berdiri dan berjalan Klien mampu berpindah perlahan dari tempat tidur ke kursi roda Klien tampak bertumpu pada tangan</p> <p>3. Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi Hasil: TD: 130/80 mmHg Nadi : 96 x / menit</p> <p>4. Memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi Hasil: keadaan umum klien tampak baik, klien tampak siap dilakukan intervensi, klien tampak mengikuti instruksi dengan baik.</p> <p>5. Menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi Hasil: klien paham tujuan mobilisasi yaitu untuk Mempertahankan fungsi tubuh. Memperlancar peredaran darah, Mempertahankan tonus otot.</p> <p>6. Menganjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan Hasil: Klien dibantu oleh perawat untuk melakukan rom aktif</p>	3	3	1	1	<p>S:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien mengatakan fungsi ototnya menurun Klien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah otot dan sendi <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gerak klien tampak lambat Klien tampak kesulitan bergerak Sendi tampak kaku Klien tampak gerak terbatas Kekuatan otot tampak melemah <table border="1" data-bbox="1344 638 1523 718"> <tr> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi P: Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah seelum memulai mobilisasi Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi Anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (rom aktif) 	3	3	1	1	<p>Indri</p>
3	3											
1	1											
3	3											
1	1											
<p>Sabtu,</p>	<p>Ansietas</p>	<p>Terapi Relaksasi</p>	<p>13.04 WITA</p>	<p>Indri</p>								

01-10-2022 07.35 WITA		<p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif Hasil: Klien tampak tegang dan sering menunjukkan mimik sedih, tetapi tidak sulit berkonsentrasi sehingga terapi relaksasi bisa diberikan</p>	<p>S:</p> <p>1. Klien mengatakan merasa cemas akan kehidupannya karena tidak dapat berjalan dan menggerakkan kedua kakinya sama sekali sejak lahir</p>
07.40 WITA		<p>2. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan Hasil: Sebelum latihan didapatkan kekuatan otot menurun dimana anggota gerak bagian atas dapat menahan tahanan minimal sedangkan anggota gerak bagian bawah hanya bisa menggerakkan ujung jari, frekuensi nadi 88x/menit, tekanan darah 130/60 mmHg dan suhu 36,5°C</p>	<p>2. Klien selalu meminta untuk ditemani</p> <p>3. Klien mengeluh istirahatnya kurang berkualitas</p> <p>4. Klien menyadari bahwa dirinya semakin tua dan mengatakan merasa khawatir jika kekuatan ototnya semakin menurun</p>
07.45 WITA		<p>3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi Hasil: Klien mengatakan bersedia diberikan terapi relaksasi (terapi zikir)</p>	<p>O:</p> <p>1. Klien tampak cemas.</p> <p>2. Klien tampak tegang.</p> <p>3. klien tampak lesu</p> <p>4. alam perasaan : sedih</p> <p>5. kontak mata kurang</p> <p>6. klien tampak sedih saat bercerita</p> <p>7. Tekanan darah : 130/60 mmHg</p> <p>8. GDS : total skor 9 dengan interpretasi kemungkinan depresi</p>
08.00 WITA		<p>Terapeutik</p> <p>4. Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman Hasil: Pintu kamar dibuka sehingga udara menjadi sejuk dan pencahayaan cukup. Klien tampak rileks</p>	<p>A: Masalah ansietas belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p>2. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan</p>
08.05 WITA		<p>5. Menggunakan pakaian longgar Hasil: Perawat mengganti sprei dan pakaian klien. Klien tampak nyaman</p>	<p>3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi</p> <p>4. Mengajukan mengambil posisi nyaman</p> <p>5. Mengajukan rileks dan merasakan sensasi relaksasi</p>
08.10 WITA		<p>6. Menggunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama Hasil:</p>	<p>6. menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih</p> <p>10. Mendemonstrasikan dan latih teknik relaksasi</p>

		<p>Klien memberi respon dengan baik dan mampu berkomunikasi secara kooperatif</p> <p>7. Menjelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi (terapi zikir) Hasil : Tujuan pemberian terapi zikir sebagai terapi yang memiliki tujuan pengobatan serta menumbuhkan rasa ikhlas sehingga klien mampu menerima kondisinya dan bangkit dari kondisi tersebut. Manfaat terapi zikir dapat Menghilangkan rasa takut, Menenteramkan dan membuat hati menjadi damai, dan Menambah keyakinan, terapi zikir dapat dilakukan saat pagi dan petang.</p> <p>8. Menganjurkan mengambil posisi nyaman Hasil : pasien nyaman dengan posisi duduk diatas tempat tidur Menganjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi Hasil : pasien memegang tasbih, dimulai dari membaca ta'awudz kemudian dilanjut beristighfar, lalu mengucapkan kalimat zikir Subhanallah 33x, walhamdulillah 33x, wala ilaha illallah 33x, wallahu akbar 33x.</p> <p>9. menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih hasil : klien mengerti untuk sering menerapkan dan mengulangi terapi zikir untuk menurunkan kecemasan yang ia alami</p> <p>10. mendemonstrasikan dan latih teknik relaksasi hasil : duduk dengan santai, menutup mata jika perlu, rilekskan seluruh otot-otot badan, bernapas secara alami dan mulai mengucapkan Tahlil, Tasbih, Tahmid, Takbir, dan Istighfar yang dibaca secara berulang-ulang</p>		
Sabtu, 01-10-2022 11.05 WITA	Risiko jatuh	Pencegahan Jatuh Observasi	S: 13.02 WITA	Indri

11.10 WITA		1. Mengidentifikasi faktor risiko jatuh Hasil: Klien berumur 101 tahun, klien tidak mampu berdiri, klien menggunakan kursi roda sehari-hari, klien ada riwayat jatuh seminggu yang lalu dikamar mandi	1. Klien berumur 101 tahun	
11.30 WITA		2. Mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh Hasil: klien melakukan kegiatan secara mandiri, lantai kamar mandi yang licin, alat mandi yang susah diraih klien menggunakan kursi roda sebagai alat bantu	2. Klien mengatakan seminggu yang lalu pernah jatuh dikamar mandi	
11.35 WITA		3. Menghitung risiko jatuh dengan menggunakan skala Hasil: Pengkajian skala morse dengan total nilai 75 dengan interpretasi risiko jatuh tinggi dengan pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi.	3. Klien mengatakan tidak mampu berdiri	
		4. Memonitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya Hasil: Klien mampu berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya tanpa dengan bantuan	O: 1. Tingkat ketergantungan : Klien dalam melakukan aktivitas dibantu sebagian 2. Pengkajian status fungsional : Mandiri semuanya kecuali salah satu saja dari fungsi di atas 3. Pada pengkajian barthel indeks Total skor klien adalah 100 dengan ketergantungan sebagian 4. Pengkajian skala morse dengan total nilai 75 dengan interpretasi risiko jatuh tinggi dengan pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi. 5. Pengkajian Keseimbangan Klien tidak mampu berdiri, sehingga pemeriksaan tidak dilakukan, hasil risiko jatuh tinggi	
			A: Risiko jatuh tidak terjadi P: Lanjutkan intervensi Terapeutik : 5. Mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh 6. Menghitung risiko jatuh dengan menggunakan skala 7. Memastikan roda kursi roda selalu dalam kondisi terkunci	
Sabtu, 01-10-2022 11.40 WITA	Risiko defisit nutrisi	Manajemen Nutrisi Observasi 1. Mengidentifikasi makanan yang disukai	13.02 WITA S: 1. Klien mengatakan kurang nafsu makan 2. Klien mengatakan pilih-pilih jenis makanan	Indri


11.45 WITA		Hasil: Klin mengatakan menyukai makan sambal manga dengan nasi, klien menyukai makan burasa	3. Klien mengatakan tidak suka makan bubur	
11.50 WITA		2. Memonitor berat badan Hasil : BB klien sulit dievaluasi	O: 1. BB klien sulit dievaluasi 2. Klien tampak tidak menghabiskan porsi makannya setiap hari	
11.55 WITA		3. melakukan oral hygiene sebelum makan Hasil : gigi klien tinggal 3 buah, klien diajarkan minum air putih terlebih dahulu	3. Klien tampak kesusahan mengunyah 4. Gigi klien tersisa 3 buah	
12.00 WITA		4. menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai Hasil : makanan disajikan dalam keadaan hangat oleh pegawai balai, dengan lauk yang bervariasi tiap hari lengkap dengan buah dan sayur	A: Risiko Defisit nutrisi belum teratasi P: Intervensi dilanjutkan 3. Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu 4. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai	
12.10 WITA		5. Memberikan makan tinggi serat untuk mencegah konstipasi Hasil : 1 porsi makanan yang disediakan lengkap dengan sayur sehingga mencegah konstipasi pada pasien	5. Berikan makan tinggi serat untuk mencegah konstipasi	
12.15 WITA		6. Mengajarkan posisi duduk, jika mampu Hasil : Klien mampu duduk, klien makan di atas kursi rodanya		
		7. Mengajarkan diet yang diprogramkan Hasil : Klien memiliki riwayat hipertensi, klien dianjurkan diet rendah garam, klien dibatasi mengonsumsi garam berlebih		
Senin, 03-10-2022 07.35 WITA	Ansietas	Terapi Relaksasi Observasi 1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif Hasil: Klien tampak tegang dan sering menunjukkan mimik sedih, tetapi tidak sulit berkonsentrasi sehingga terapi relaksasi bisa diberikan	13.05 WITA S: 1. Klien mengatakan merasa cemas akan kehidupannya karena tidak dapat berjalan dan menggerakkan kedua kakinya sama sekali sejak lahir 2. Klien selalu meminta untuk ditemani 3. Klien mengeluh istirahatnya kurang berkualitas	Indri

07.40 WITA		2. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan Hasil: Sebelum latihan didapatkan kekuatan otot menurun dimana anggota gerak bagian atas dapat menahan tahanan minimal sedangkan anggota gerak bagian bawah hanya bisa menggerakkan ujung jari, frekuensi nadi 88x/menit, tekanan darah 130/60 mmHg dan suhu 36,5°C	4. Klien menyadari bahwa dirinya semakin tua dan mengatakan merasa khawatir jika kekuatan ototnya semakin menurun	
07.45 WITA		3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi Hasil: Klien mengatakan bersedia diberikan terapi relaksasi (terapi zikir) Terapeutik	O: 1. Klien tampak tegang berkurang 2. alam perasaan : sedih 3. kontak mata baik 4. klien tampak berkumpul bersama perawat 5. Tekanan darah : 130/80 mmHg 6. GDS : total skor 7 dengan interpretasi kemungkinan depresi A: Masalah ansietas teratasi P: Lanjutkan intervensi	
08.00 WITA		4. Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman Hasil: Pintu kamar dibuka sehingga udara menjadi sejuk dan pencahayaan cukup. Klien tampak rileks	10. menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih	
08.05 WITA		5. Menggunakan pakaian longgar Hasil: Perawat mengganti sprengi dan pakaian klien. Klien tampak nyaman		
08.10 WITA		6. Menggunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama Hasil: Klien memberi respon dengan baik dan mampu berkomunikasi secara kooperatif		
		7. menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih hasil : klien mengerti untuk sering menerapkan dan mengulangi terapi zikir untuk menurunkan kecemasan yang ia alami		
Senin, 03-10-2022	Gangguan Pola tidur	Dukungan Tidur Observasi	S:	13.06 WITA Indri

09.00 WITA	1. Mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur Hasil : Klien mengatakan pola tidurnya tidak teratur, waktu tidur klien antara pukul 22:00-05:00 WITA, namun dalam rentang waktu itu klien sering terbangun tanpa hal yg jelas dan susah untuk tidur kembali, klien mengatakan aktivitas sebelum tidur sering membenahi barang disamping tempat tidur	1. Klien mengatakan sering terbangun saat malam hari tanpa alasan yang jelas 2. Klien mengatakan sulit untuk tidur kembali O: 1. Klien tampak lesu 2. Klien tampak tidur terduduk saat pagi hari 3. Klien tampak mampu mengikuti kegiatan TAK di Aula Gau Mabaji
09.05 WITA	2. Mengidentifikasi faktor pengganggu tidur Hasil : klien mengatakan tidurnya kurang nyeyak karena memikirkan hal yang berkaitan penyakitnya, klien mengatakan senang mengobrol saat malam hari dengan teman sebayanya.	A: gangguan pola tidur belum teratasi P: Lanjutkan intervensi
09.10 WITA	3. Memodifikasi lingkungan (pencahayaan, kebisingan, suhu, dan tempat tidur) Hasil : pintu dalam keadaan tertutup sehingga meminimalisir suara dan serangga yang masuk kedalam kamar yang menyebabkan tidur terganggu, lampu kamar diredupkan, meminimalisir aktivitas yang mengganggu jam tidur.	3. Mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur 9. Memodifikasi lingkungan 10. Membatasi waktu tidur siang 11. Memfasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur
12.00 WITA	4. Membatasi waktu tidur siang Hasil : siang hari klien diajak berbicara oleh perawat mengobrol seputar masa lalu klien sehingga saat malam hari klien tidak merasa terjaga	
09.20 WITA	5. Memfasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur Hasil : pendingin ruangan dinyalakan, membatasi mengobrol saat malam hari dengan penghuni balai yang lain, menganjurkan mengurangi aktivitas berbenah saat malam hari, menjauhkan peralatan yang memungkinkan kualitas tidur kurang.	
09.25 WITA	6. Menjelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit Hasil : klien paham pentingnya tidur cukup, untuk meningkatkan imun tubuh, memperbaiki suasana hati,	

09.30 WITA		<p>memberi energi lebih untuk melakukan aktivitas sehari-hari.</p> <p>7. Menganjurkan menepati kebiasaan waktu tidur Hasil : klien mengerti untuk tidur tepat waktu antara pukul 09.00-10.00 wita demi mendapatkan tidur yang cukup</p>										
<p>Senin, 03-10-2022 10.00 WITA</p> <p>10.06 WITA</p> <p>10.10 WITA</p> <p>10.15 WITA</p> <p>10.20 WITA</p>	Gangguan mobilitas fisik	<p>Dukungan Mobilisasi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya Hasil: klien mengatakan tidak nyeri, klien mengeluh fungsi ototnya menurun dan mengeluh kakinya sudah tidak mampu berjalan</p> <p>2. Mengidentifikasi toleransi fisik melalui pergerakan Hasil: Gerakan terbatas Kekuatan otot : lemah</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">3</td> <td style="padding: 0 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</td> <td style="padding: 0 5px;">1</td> </tr> </table> <p>Klien tampak tidak mampu berdiri dan berjalan Klien mampu berpindah perlahan dari tempat tidur ke kursi roda Klien tampak bertumpu pada tangan</p> <p>3. Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi Hasil: TD: 130/80 mmHg Nadi : 96 x / menit</p> <p>4. Memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi Hasil: keadaan umum klien tampak baik, klien tampak siap dilakukan intervensi, klien tampak mengikuti instruksi dengan baik.</p> <p>5. Menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi</p>	3	3	1	1	<p style="text-align: center;">13.04 WITA</p> <p>S:</p> <p>1. klien mengatakan dapat menggerakkan tangannya secara perlahan-lahan</p> <p>O:</p> <p>1. Gerak klien tampak lambat 2. Klien bertumpu pada tangan 3. Sendi kaki dan tangan tampak tidak kaku kaku 4. Klien tampak gerak terbatas pada ekstremitas bawah</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">3</td> <td style="padding: 0 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</td> <td style="padding: 0 5px;">1</td> </tr> </table> <p>A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi P: Lanjutkan intervensi</p> <p>11. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 12. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 13. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah seelum memulai mobilisasi 14. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi 15. Anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (rom aktif)</p>	3	3	1	1	Indri
3	3											
1	1											
3	3											
1	1											


11.00 WITA		<p>Hasil: klien paham tujuan mobilisasi yaitu untuk Mempertahankan fungsi tubuh. Memperlancar peredaran darah, Mempertahankan tonus otot.</p> <p>6. Menganjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan</p> <p>Hasil: Klien dibantu oleh perawat untuk melakukan rom aktif</p>		
------------	--	---	--	--



4.5 Analisis Evidence Based Practice in Nursing


Pelaksanaan analisis asuhan keperawatan dengan intervensi terapi zikir ini melibatkan 1 lansia yang tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa dengan lansia berusia > 65 tahun dan skor depresi ≥ 5 , Pengukuran skala depresi menggunakan instrumen *The Geriatric Depression Scale-Short Form* (GDS-SF) yang terdiri dari 15 pertanyaan dengan 10 pertanyaan mengindikasikan depresi apabila dijawab “YA” sedangkan sisanya 5 pertanyaan akan mengindikasikan depresi apabila dijawab “TIDAK”(Greenberg, 2019). Pre tes dilakukan pada hari pertama yaitu pengukuran tingkat depresi dengan menggunakan instrument GDS-SF. Relaksasi zikir dilaksanakan dalam lima sesi pertemuan dalam waktu sekitar 10-20 menit selama 2 minggu. Pada hari terakhir dilakukan post test yaitu pengukuran kembali tingkat depresi dengan menggunakan instrument GDS-SF yang sama.

Diagram 5.1 Perubahan Skala Depresi



Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa pada hari pertama sebelum diberikan intervensi skala depresi didapatkan dengan total skor 13, sedangkan setelah pemberian terapi zikir didapatkan skor sama dengan nilai 13. Pada hari kedua sebelum diberikan intervensi skala depresi didapatkan dengan total skor 13, sedangkan setelah pemberian terapi zikir menurun menjadi 12. Kemudian pada hari

ketiga sebelum diberikan intervensi skala depresi didapatkan dengan total skor 12, sedangkan setelah pemberian terapi zikir menurun menjadi 11. Selanjutnya pada hari keempat sebelum diberikan intervensi skala depresi didapatkan dengan total skor 11, sedangkan setelah pemberian terapi zikir menurun menjadi 9. Intervensi terakhir pada hari kelima sebelum diberikan intervensi skala depresi didapatkan dengan total skor 9, sedangkan setelah pemberian terapi zikir menurun menjadi 7. Maka dapat disimpulkan bahwa terapi zikir efektif dalam menurunkan ansietas pada lansia.



BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan

5.1.1 Analisis Pengkajian

Pengkajian pada Ny. P dilakukan pada tanggal 27 September 2022 di Sentra Gau Mabaji Gowa. Umur Ny. P saat ini 101 Tahun dengan keluhan merasa cemas akan kehidupannya dan takut jika sakitnya bertambah parah, hal ini sejalan dengan penelitian Sutioningsih et al., (2019) yang menemukan bahwa tubuh manusia menderita berbagai kondisi yang memburuk dari sudut pandang fisik serta mental, sosial, emosional, dan spiritual dikarenakan seiring bertambahnya usia. Oleh sebab itu, faktor usia berperan penting dalam kesehatan lansia. Ny. P juga mengeluhkan dirinya kurang nafsu makan dan tampak tidak menghabiskan porsi makannya setiap hari selama pengkajian. Hal ini sejalan dengan teori Alam et al., (2021) yang mengatakan, asupan dan nafsu makan dipengaruhi oleh depresi. Dalam depresi, biologis dan psikofarmakologis menunjukkan mekanisme perubahan dalam nafsu makan. Pada lansia yang depresi, suasana hati yang tertekan, perubahan nafsu makan dan gangguan kebiasaan tidur, terlihat karena rendahnya kadar serotonin dan perubahan dopamin.

Keluhan sulit tidur juga dirasakan pada Ny. P dan mengatakan istirahatnya kurang berkualitas, dalam penelitian Yusfar & Hani (2021) mengatakan salah satu masalah kesehatan paling umum yang dihadapi

lansia adalah gangguan tidur. Situasi ini membuat pertimbangan yang serius. Karena buruknya kualitas tidur lansia dikarenakan berkurangnya efisiensi tidur, dan terbangun lebih awal akibat proses penuaan. Proses tersebut di atas mengakibatkan gangguan fungsi neurotransmitter yang ditandai dengan distribusi norepinefrin yang menurun. Ny. P mengatakan fungsi ototnya menurun dan mengeluh kedua kakinya sudah tidak bisa berjalan. Pengkajian uji kekuatan otot pada Ny.P didapatkan bahwa pasien mengalami penurunan kekuatan otot dimana kaki sebelah kiri dan kanan pasien hanya ada sedikit gerakan (skor 1). Sedangkan pada kedua ekstremitas atas pasien mampu melakukan gerakan mengangkat ekstremitas atas tetapi tidak mampu melawan tahanan sedang (skor 3). Sesuai dengan teori yang dijelaskan (Widiantari, 2019) bahwa salah satu manifestasi klinis sindrom *immobility* yaitu penurunan massa otot.

Kien mengatakan riwayat jatuh seminggu yang lalu sebelum pengkajian pada tanggal 20/09/22 dikamar mandi sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aminia et al., (2022) Faktor risiko jatuh pada lansia diakibatkan beberapa faktor yang secara umum diakibatkan oleh faktor usia, jenis kelamin, dan faktor fisiologis (vestibular, muskuloskeletal, neuromuskular, kekuatan otot, keseimbangan, visual), kondisi medis (patologis), lingkungan, dan psikologis (kecemasan dan ketakutan untuk jatuh).

Maka kesimpulan penulis mengenai keluhan subjektif serta objektif yang terjadi pada Ny.P dengan teori menurut beberapa penelitian sesuai

antara teori dan fakta. Kesimpulan yang didapat dari data pengkajian pasien hampir keseluruhan sesuai dengan teori.

5.1.2 Analisis Diagnosis

Setelah dilakukan pengkajian didapatkan 5 diagnosis yang ditetapkan pada pasien. Diagnosis utama pada kasus ini adalah ansietas/kecemasan. Berikut definisi ansietas berdasarkan buku SDKI (2016) adalah kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Masalah ini ditemukan penulis sejak hari pertama dilakukannya pengkajian. Tanda dan gejala yang ditemukan pada Ny.P adalah klien merasa cemas dan tampak sering menunjukkan mimik sedih dan tegang. Hal tersebut seiring dengan penelitian oleh Wicaksana & Widiarta, (2021) yang menyebutkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari ansietas yang dialami lansia adalah masalah seperti kesepian dan perasaan sedih. Diperkuat dengan buku SDKI (2016) gejala dan tanda mayor subyektif adalah merasa khawatir dan tidak berdaya, sedangkan gejala dan tanda mayor objektif tampak gelisah dan tegang.

Diagnosis kedua ialah gangguan pola tidur dikarenakan Ny. P mengeluh istirahatnya kurang berkualitas, sulit tidur dan pola tidurnya tidak teratur. Kemudian, terlihat saat pengkajian Ny. P tampak tidur terduduk saat pagi hari, lesu dan kurang bersemangat, sejalan dengan buku SDKI (2016) yang menyebutkan bahwa gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal. Kemudian, tanda dan gejala yang

dialami oleh Ny. P tertuang di dalam buku SDKI (2016) disebutkan bahwa gejala dan tanda mayor subjektif dari gangguan pola tidur adalah mengeluh sulit tidur, mengeluh sering terjaga, mengeluh tidak puas tidur dan mengeluh istirahat tidak cukup.

Diagnosis ketiga ialah gangguan mobilitas fisik ditandai dengan Ny. P mengeluhkan fungsi ototnya menurun dan mengeluh kedua kakinya sudah tidak bisa berjalan dan merasakan perubahan pada otot dan sendi kedua tangan, juga tampak gerakan klien lambat, mengalami kesulitan bergerak, tampak gerak terbatas, Kekuatan otot tampak melemah/menurun dan klien hanya menggeser kakinya dengan menggunakan tangannya, Hal ini sesuai dengan buku SDKI (2016) yang menjelaskan bahwa gangguan mobilitas fisik adalah keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Tanda dan gejalanya yang dialami oleh Ny.P sesuai dengan buku SDKI (2016) bahwa gejala dan tanda mayor subjektif adalah mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, sedangkan gejala dan tanda mayor objektif adalah kekuatan otot menurun dan rentang gerak (ROM) menurun. Gejala dan tanda minor subjektif adalah sulit menggerakkan kaki, sedangkan gejala dan tanda minor objektif adalah sendi kaku

Kemudian pada diagnosis risiko jatuh didapatkan klien tidak mampu berjalan dan berdiri, klien menggunakan alat bantu kursi roda untuk bergerak dan klien mengatakan pernah jatuh seminggu yang lalu sebelum pengkajian tanggal 20/09/22 dikamar mandi. Sesuai dengan teori Nermien Naim Adly, (2020) yang menyebutkan bahwa risiko jatuh dapat

disebabkan karena keadaan tubuh yang sedang mengalami sakit terutama yang sedang mengalami gangguan diekstremitas sehingga mengalami keterbatasan gerak, hampir semua yang mengalami risiko jatuh tinggi dikarenakan melakukan aktivitas mandiri tanpa meminta bantuan, kurangnya pengawasan, dan psuing. Sejalan dengan penelitian Penelitian Deborah J. Bolding & Ellen Corman, (2019) menjelaskan bahwa kekuatan otot pada ekstremitas sangat mempengaruhi kejadian jatuh, perawat dapat melakukan penilaian risiko jatuh pada tiap pasien dewasa dengan menggunakan Skala Jatuh Morse (*Morse Fall Scale*) dan Humpy Dumpty pada pasien anak-anak, pada hasil pengkajian kasus Ny.P dengan menggunakan skala morse ditemukan skor 75 dengan interpretasi pasien mengalami risiko jatuh tinggi.

Diagnosis kelima risiko defisit nutrisi dibuktikan dengan Klien mengatakan pilih-pilih makanan, kurang nafsu makan, dan klien tampak tidak menghabiskan porsi makannya setiap hari selama pengkajian. Dijelaskan Amran et al. (2012) dalam buku *Geriatric 2 (2021)* bahwa gangguan pada saluran pencernaan, infeksi, gangguan penyerapan makanan dan peningkatan metabolisme dapat menyebabkan kekurangan nafsu makan. Berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa penyakit penyerta menjadi salah satu faktor penyebab pada kurangnya pemenuhan nutrisi pada lansia. Faktor yang juga menyebabkan penurunan pada nafsu makan lansia ialah depresi yang dimana dapat menyebabkan penurunan keinginan untuk makan hal kebanyakan terjadi pada lansia perempuan.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dengan kasus Ny.P yang mengalami *isolation/depression* dengan masalah ansietas.

5.1.3 Analisis Intervensi

Intervensi yang dapat diberikan dalam mengatasi ansietas berdasarkan buku SIKI (2018) adalah terapi relaksasi dengan rencana intervensi yang dapat dilakukan berupa identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif dan periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan terakhir monitor respon terhadap terapi relaksasi (Sutioningsih et al., 2019).

Intervensi yang dapat diberikan dalam mengatasi gangguan pola tidur berdasarkan buku SIKI (2018) adalah dukungan tidur dengan rencana tindakan berupa observasi pola aktivitas dan tidur, faktor pengganggu tidur, terapeutik dengan modifikasi lingkungan, batasi waktu tidur siang, fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur dan edukasi mengenai pentingnya tidur cukup selama sakit, menepati kebiasaan waktu tidur dan mengajarkan teknik relaksasi autogenic atau cara nonfarmakologi lainnya hal ini sejalan dengan penjelasan Merdekawati et al., (2021) bahwa Relaksasi otot progresif yang dilakukan di area kepala, leher, lengan, dan punggung dapat memusatkan perhatian pada suatu aktifitas otot, kemudian menurunkan ketegangan dengan teknik relaksasi untuk mendapatkan perasaan relaks, melancarkan peredaran darah sehingga membuat kualitas tidur lebih baik.

Intervensi yang dapat diberikan dalam mengatasi gangguan mobilitas fisik berdasarkan buku SIKI (2018) adalah dukungan mobilisasi, dengan rencana tindakan berupa observasi monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi, monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi, terapeutik fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, edukasi: jelaskan tujuan prosedur mobilisasi dan anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan teori Milyati dkk (2021) yang menyatakan bahwa Latihan ROM membantu mempertahankan fleksibilitas sendi dan kekuatan otot serta merupakan latihan isotonik yang mampu meningkatkan atau mempertahankan daya tahan dan kekuatan otot serta dapat mencegah perburukan kapsul sendi, kontraktu dan ankilosis,. Lingkup mobilisasi itu sendiri mencakup *exercise* atau *range of motion* (ROM), ambulasi, *body mechanic* Kozier (2004) Pada kasus Ny.P salah-satunya rencana yang akan dilakukan adalah meningkatkan pergerakan dan pemberian mobilisasi ROM secara mandiri, ROM adalah salah-satu bentuk intervensi mandiri perawat pada masalah keperawatan tersebut.

Penurunan ROM disebabkan oleh tidak adanya aktivitas dan latihan untuk mempertahankan kenormalan ROM, sendi dan otot dengan maksimum dan dilakukan secara teratur sehingga terjadi degenerasi, erosi, dan kalsifikasi pada kartilago dan kapsul sendi. Sendi kehilangan fleksibilitasnya sehingga terjadi penurunan luas gerak sendi Sehingga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Dwi Nur Aini, (2022).

Terbukti bahwa latihan ROM aktif ini dapat meningkatkan rentang gerak sendi pada lansia yang telah mengalami immobilitas fisik maupun keterbatasan gerak walaupun memang berdasarkan hasil penelitian ini tidak semua rentang gerak sendi berada pada level normal, namun setidaknya setiap item gerakan/latihan terutama pada sendi lutut dan ankle yang dilakukan latihan semuanya mengalami peningkatan rentang gerak sendi (Setyorini & Setyaningrum, 2019).

Intervensi yang dapat diberikan dalam mengatasi risiko jatuh berdasarkan buku SIKI (2018) adalah pencegahan jatuh dengan rencana tindakan observasi: identifikasi risiko jatuh setidaknya sekali setiap shift atau sesuai dengan kebijakan institusi, hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala morse, terapeutik: pastikan roda kursi roda selalu dalam kondisi terkunci, edukasi: memberikan anjuran memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah. Pada kasus Ny.P salah-satu rencana yang akan dilakukan adalah identifikasi risiko jatuh dengan menggunakan skala morse, skala morse merupakan instrumen penilaian risiko jatuh yang dirancang untuk mengantisipasi pasien jatuh karena kondisi fisiologis Harun dkk (2021)

Intervensi yang dapat diberikan dalam mengatasi risiko difisit nutrisi berdasarkan buku SIKI (2018) Identifikasi makanan yang disukai, Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu, Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, Berikan makan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, Anjurkan makan posisi duduk, sejalan dengan pendapat Amran et al. (2012) dalam buku *Geriatric 2 (2021)* bahwa

makanan yang disediakan dengan penampilan menarik menjadi faktor yang dominan untuk dapat meningkatkan nafsu makan pada lansia dan makanan yang di dalamnya terdapat serat penting yang berguna untuk proses metabolisme dalam tubuh.

5.1.4 Analisis Implementasi

Pada proses implementasi keperawatan pada Ny. P diberikan sebanyak 5 hari dimulai dari senin 28 November 2022 hingga jumat 03 Oktober 2022 dengan melaksanakan intervensi yang telah disusun. Diagnosis pertama yaitu ansietas telah diberikan implementasi dengan terapi relaksasi dengan cara mengidentifikasi penurunan tingkat energi, memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan, memonitor respon terhadap terapi relaksasi. Terapeutik dengan melaskan tujuan, manfaat, batasan dan memberi teknik non farmakologi terapi zikir. Relaksasi terapi zikir yang dilakukan selama 5 hari berturut-turut membuat tingkat depresi menjadi menurun dimana sebelum dilakukan terapi zikir nilai GDS (*geriatric depression scale*) pasien dengan interpretasi nilai 13 (depresi), setelah pemberian intervensi terjadi penurunan tingkat depresi dengan interpretasi nilai 7 (kemungkinan depresi). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Astuti et al., (2019) bahwa Tingkat kecemasan pasien sebelum diberikan terapi zikir diperoleh gambaran deskriptif dari nilai mean sebesar 21,75 dengan nilai median sebesar 21, kemudian Tingkat kecemasan pasien sesudah diberikan terapi zikir diperoleh gambaran deskriptif dari nilai mean sebesar 11,83 dengan nilai median sebesar 12. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian intervensi terapi zikir terhadap tingkat depresi pada lansia di Uptd Sosial Tresna werdha Nirwana Puri Samarinda. Sejalan dengan penelitian Widyastuti et al., (2019) yang menunjukkan bahwa terapi zikir ini dapat menurunkan skala depresi berat dan sedang menjadi normal.

Diagnosis kedua yaitu gangguan pola tidur peneliti memberikan intervensi dukungan tidur dengan mengobservasi pola aktivitas dan tidur, faktor pengganggu tidur, memodifikasi lingkungan dan pemberian teknik relaksasi autogenic relaksasi otot progresif. Relaksasi oto progresif merupakan tindakan *massage* pada punggung atau bahu yang akan memberikan efek rileks. Efek yang ditimbulkan saat dilakukan intervensi mengurangi keluhan gangguan pola tidur dimana memperbaiki peredaran darah dan terjadi vasodilatasi pembuluh darah di dalam jaringan. Sejalan dengan penelitian Shinta (2014) menyatakan bahwa relaksasi otot progresif akan memberikan dampak pada peningkatan sirkulasi, memperbaiki sifat otot dan memberikan efek relaksasi dimana relaksasi otot progresif mampu memberikan efek relaksasi yang mendalam, mengurangi kecemasan, mengurangi rasa sakit, ketidaknyamanan secara fisik, dan meningkatkan tidur pada seseorang (Paramurthi et al., 2019).

Diagnosis ketiga yaitu gangguan mobilitas fisik peneliti memberikan intervensi dukungan mobilisasi dengan mengobservasi tekanan darah sebelum memulai mobilisasi, monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi, pemberian ROM dan melibatkan pasien

dalam meningkatkan pergerakan, menjelaskan tujuan prosedur mobilisasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Rahmadani dan Rustandi, 2019) yang menjelaskan bahwa ada pengaruh *range of motion* (ROM) terhadap peningkatan kekuatan otot ekstremitas pasien. Penelitian Setyorini & Setyaningrum, (2019) juga menyatakan bahwa setelah dilakukan latihan Range Of Motion, diketahui terdapat pengaruh latihan Range Of Motion terhadap kekuatan otot ekstremitas atas pada lansia.

Diagnosis risiko jatuh peneliti telah memberikan implementasi dengan cara menghitung risiko jatuh menggunakan skala morse, memastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci, pasang *handrell* tempat tidur, mengedukasi untuk memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah.

Diagnosis risiko defisit nutrisi diberikan implementasi manajemen nutrisi dengan cara mengidentifikasi makanan yang disukai melakukan oral hygiene sebelum makan, memonitor berat badan pasien, menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai memberikan makan tinggi serat untuk mencegah konstipasi dan menganjurkan makan dalam posisi duduk, mengedukasi dan nutrisi mengenai diet seimbang dan asupan yang adekuat dapat menjadi hal yang efektif dalam memperbaiki status nutrisi lansia. Selain itu, dukungan keluarga, perawat dan lingkungan dalam mempersiapkan variasi makanan yang baik dan seimbang sangatlah penting. Penilaian kebiasaan makan juga diperlukan untuk mencegah masalah nutrisi pada lansia (Tirtadjaja et al., 2022). Penilaian nutrisi secara berkala sangat penting bagi seluruh lansia yang tinggal di panti

werdha dan pemantauan secara lebih intensif diperlukan bagi penghuni panti werdha dengan risiko malnutrisi untuk merencanakan program nutrisi secara individual. Setelah perencanaan nutrisi dilaksanakan, pengkajian ulang perlu dilakukan (misalnya dengan menimbang berat badan setiap minggu) (Sudargo et al., 2021).

5.1.5 Analisis Evaluasi

Hasil evaluasi pada diagnosis pertama selama pemberian implementasi didapatkan bahwa terjadi penurunan tingkat depresi yang dirasakan oleh pasien, sebelum diberikan intervensi pasien mengalami tingkat depresi dengan skor 13 (depresi) setelah diberikan intervensi terapi zikir terjadi penurunan tingkat depresi dengan skor 7 (kemungkinan depresi). Ny. P juga mengatakan cemas berkurang tegang menurun dan kontak mata membaik verbalisasi khawatir dengan keadaanya juga menurun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi zikir efektif dalam menurunkan depresi lansia. Ny.P mampu melakukan terapi zikir secara mandiri

Hasil evaluasi pada diagnosis kedua Ny.P mengatakan nyaman saat dilakukan relaksasi otot progresif, pasien juga tampak mampu mengikuti kegiatan di Aula Gau Mabaji yang dilaksanakan oleh mahasiswa, Ny. P juga paham untuk membatasi tidur siang agar tidur malam dapat lebih berkualitas.

Hasil evaluasi pada diagnosis ketiga adalah Ny.P mengatakan ia dapat menggerakkan tangannya secara perlahan-lahan dan meningkatkan kekuatan otot pasien diperoleh hasil sebelum diberikan intervensi

kekuatan otot tangan pasien dengan skor 3 setelah diberikan intervensi dengan skor 3. Ny. P tampak bertumpu pada tangan, sendi kaki dan tangan tampak tidak kaku kaku. Ny.P mampu mengetahui pengertian, tujuan dan pergerakan ROM aktif.

Hasil evaluasi pada diagnosis keempat adalah tidak terjadi jatuh pada pasien selama perawatan, Ny.P mengatakan ia telah mengetahui dan mampu menerapkan intervensi pencegahan jatuh dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan hasil evaluasi pada diagnosis keempat didapatkan hasil bahwa tidak terjadi defisit nutrisi selama perawatan.

5.1.6 Analisis EBP

Perioritas masalah dari kasus Ny.P adalah ansietas, dengan intervensi utama berupa terapi relaksasi dengan tindakan teknik non farmakologis dengan terapi zikir untuk mengurangi tingkat depresi pasien berdasarkan *evidence based nursing*. Terapi zikir adalah pengobatan psikologis dengan mengingat Allah dengan cara membaca lafal tertentu dan disertai dengan perenungan terhadap petunjuk yang Allah tampilkan (Ayu, K. P., Wulandari, R., & Latif, 2020). Hal ini sesuai dengan teori dalam Astuti et al., (2019) yang menyatakan bahwa zikir memiliki daya relaksasi yang dapat mengurangi kecemasan dan mendatangkan ketenangan jiwa. Religiusitas ditemukan memiliki hubungan yang negatif dengan kecemasan (Suparyanto & Rosad, 2020). Aspek spiritual yang terpenuhi menumbuhkan sikap yang positif sehingga dapat meminimalisasi kecemasan. Oleh karena itu, penanganan kecemasan dengan terapi zikir dipandang tepat. Hal ini didukung penelitian Abidin

(2006) yang menemukan bahwa zikir memberikan ketenangan pikiran dan perasaan, serta keikhlasan (Widyastuti et al., 2019).

Pemberian relaksasi zikir pada hari pertama sebelum diberikan intervensi, skala depresi didapatkan dengan total skor 13, sedangkan setelah pemberian terapi zikir didapatkan skor sama dengan nilai 13. Pada hari kedua sebelum diberikan intervensi skala depresi didapatkan dengan total skor 13, sedangkan setelah pemberian terapi zikir menurun menjadi 12. Kemudian pada hari ketiga sebelum diberikan intervensi skala depresi didapatkan dengan total skor 12, sedangkan setelah pemberian terapi zikir menurun menjadi 11. Selanjutnya pada hari keempat sebelum diberikan intervensi skala depresi didapatkan dengan total skor 11, sedangkan setelah pemberian terapi zikir menurun menjadi 9. Intervensi terakhir pada hari kelima sebelum diberikan intervensi skala depresi didapatkan dengan total skor 9, sedangkan setelah pemberian terapi zikir menurun menjadi 7. Maka dapat disimpulkan bahwa terapi zikir efektif dalam menurunkan ansietas pada lansia.

Pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani penyakit seperti kasus di atas yaitu teori *comfort* Kolcaba. Kolcaba berasumsi bahwa pada dasarnya semua manusia membutuhkan kenyamanan sebagai kebutuhan dasar. Kolcaba memandang bahwa teori kenyamanan menjadi salah satu pilihan teori keperawatan yang dapat diaplikasikan langsung di lapangan karena bersifat universal dan tidak terhalang budaya masyarakat (Kolcaba, K., & DiMarco, 2005) Sesuai dengan teori Kolcaba, kondisi pasien pada kasus di atas perlu dipenuhi kebutuhan akan kenyamanan psikisnya dimana

pasien berada dalam perasaan cemas, takut ditinggal sendiri karena ansietas sehingga perawat memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan akan psikisnya.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan penulis selama penelitian terkendala pada pola komunikasi yang kurang efektif sehingga perlu pengulangan kata/kalimat oleh lansia. Juga keterbatasan pada karya tulis ini perlunya pemberian intervensi dengan rentang waktu yang cukup lama agar keefektifan dalam pemberian intervensi dapat berpengaruh dengan maksimal. Keterbatasan selama penelitian seperti kurangnya *caregiver* dalam mendampingi kehidupan lansia sehingga merasa kesepian dan mudah mengalami depresi.

5.3 Kecemasan dalam Perspektif Islam

Setiap bacaan zikir mengandung makna yang sangat dalam, bacaan yang pertama yaitu *Laillahailallah* memiliki artinya tiada tuhan yang disembah kecuali Allah SWT, adanya pengakuan bertuhan hanya kepada Allah dalam sebuah keyakinan. memiliki keyakinan yang kuat akan tuhanNya. Bacaan Zikir membuat tubuh mengalami keadaan santai (relaksasi), tenang dan damai. Keadaan ini mempengaruhi otak yaitu menstimulasi aktivitas hipotalamus sehingga menghambat pengeluaran hormone corticotropin-releasing factor (CRF), dan mengakibatkan kelenjar anterior pituitary terhambat mengeluarkan adrenocorticotrophic hormone (ACTH) sehingga menghambat produksi hormone kortisol, adrenalin, dan noradrenalin. Hal ini menghambat pengeluaran hormone tiroksin oleh kelenjar tiroid terhambat. Menurut Yurisaldi (2010) kalimat yang mengandung huruf jahr, seperti kalimat

tauhid dan istighfar, dapat meningkatkan pembuangan karbondioksida dalam paru-paru. Manfaat lainnya disebutkan oleh Rasulullah saw. “barangsiapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, memberikan kelapangan dari kesusahan dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tak disangka-sangka” (Kumala, O. D., Kusprayogi, Y., & Nashori, 2021).

Terapi zikir merupakan intervensi non farmakologi dan sebagai ikhtiar untuk membantu lansia proteksi dampak buruk dari ansietas dan depresi yang diharapkan memberikan efek yang positif bagi kesehatan dengan izin Allah swt. seperti firman Allah dalam QS Al-Syu'ara /26: 80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

“dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku” (QS Al-Syu'ara /26: 80).

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menandakan bahwa sakit merupakan keniscayaan hidup manusia yang harus dicari kesembuhannya. Nabi Ibrahim a.s. menegaskan bahwa penyerahan diri kepada Allah terhadap suatu penyakit yang diderita bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Sekian banyak hadis Nabi saw. yang memerintahkan untuk berobat. Ucapan Nabi Ibrahim a.s. itu hanya bermaksud menyatakan bahwa sebab dari segala sebab adalah Allah swt (Shihab, 2014). Maksud ayat diatas adalah segala penyakit yang diderita pasti akan disembuhkan oleh-Nya.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi kasus yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa :

6.1.1 Hasil pengkajian Hasil pengkajian yang dilakukan pada Ny.P di Sentra Gau Mabaji Gowa didapatkan bahwa Ny.P mengalami *Isolation/depression* yang disebabkan karena krisis maturasional.

6.1.2 Diagnosis keperawatan yang didapatkan pada Ny.P, yaitu : ansietas, gangguan pola tidur, gangguan mobilitas fisik, risiko jatuh dan risiko defisit nutrisi.

6.1.3 Intervensi keperawatan yang akan diterapkan pada Ny.P, yaitu : terapi relaksasi : terapi zikir, dukungan tidur, dukungan mobilisasi, pencegahan jatuh dan manajemen nutrisi

6.1.4 Implementasi keperawatan yang telah diterapkan pada Ny.P dilakukan selama 5x24 jam dan semua implementasi yang diterapkan sesuai dengan intervensi yang telah disusun.

6.1.5 Hasil evaluasi keperawatan pada Ny.P di dapatkan bahwa diagnosis keperawatan ansietas, gangguan pola tidur dan gangguan mobilisasi hasilnya belum teratasi. Sedangkan diagnosis keperawatan risiko jatuh dan risiko defisit nutrisi hasilnya faktor resiko tidak terjadi.

6.1.6 Hasil analisis terapi zikir sebelum diberikan intervensi skala depresi didapatkan dengan total skor 13, sedangkan setelah pemberian terapi zikir

menurun menjadi 7. Maka dapat disimpulkan bahwa terapi zikir efektif dalam menurunkan ansietas pada lansia.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Institusi

Karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam memberikan asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *Isolation/depression*.

6.2.2 Bagi Pelayanan Kesehatan

Karya tulis ini dapat menjadi bahan referensi bagi para perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *Isolation/depression*, dan mengetahui tentang keefektifan pemberian terapi zikir dalam mengatasi ansietas.



DAFTAR PUSTAKA

- ABDUL AZIZ AZARI, MOHAMMAD ILHAM ZURURI. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Depresi Pada Lansia. *Medical Jurnal of Al Qodiri*, 6(2), 66–72.
- Aisyatin Kamila. (2022). Psikoterapi Zikir Dalam Menangani Kecemasan. *Happiness, Journal of Psychology and Islamic Science*, 4(1), 40–49.
- Aizid, R. (2015). *Melawan Stres & Depresi*. Saufa.
- Alam, M. R., Karmokar, S., Reza, S., Kabir, M. R., Ghosh, S., & Mamun, M. A. Al. (2021). Geriatric malnutrition and depression: Evidence from elderly home care population in Bangladesh. *Preventive Medicine Reports*, 23, 101478.
- Amha, H., Fente, W., Sintayehu, M., Tesfaye, B., & Yitayih, M. (2020). Depression and associated factors among old age population in Dega damot district, North West Ethiopia. A cross-sectional study. *Journal of Affective Disorders Reports*, 2(October), 100034.
- Aminia, T. P., Yuliadarwati, N. M., & Utami, K. P. (2022). Hubungan Balance Confidence dengan Risiko Jatuh pada Lansia : Studi Literatur. *Jurnal Psysiotherapy Health Science*, 4(1), 43–51.
- Aspiani, R. Y. (2014). *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Gerontik*. Trans Info Media.
- Astuti, D., Hartinah, D., & Permana, D. R. A. (2019). Pengaruh Pemberian Terapi Zikir Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Sc. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 10(2), 307.
- Awaludin, S., A, A. C. N., & Sekarwati, W. (2018). (2018). HUBUNGAN KECEMASAN DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN POST CORONARY ARTERY BAYPASS GRAFT (CABG) DI RUANG REHABILITASI JANTUNG RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 1(1), 243–247.
- Ayu, K. P., Wulandari, R., & Latif, N. (2020). *PENGARUH TERAPI ZIKIR TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PADA LANSIA DI POSYANDU LANSIA MOJOSARI KELURAHAN KETITANG KECAMATAN NOGOSARI (Doctoral dissertation, STIKES' Aisyiyah Surakarta)*.
- Azizah Lilik Ma'rifatul. (2015). *Keperawatan Lanjut Usia Edisi 1*. Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. (2021). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2021 dan 2020*.
- Barker, S. (2019). *Caring for Older People in Nursing* (T. WA (ed.)). Learning Matters Ltd an imprint of SAGE Publication Ltd.
- Basri, N. B., Hong, G. C., Oon, N. L., & Kumagai, S. (2020). Islamic Religiosity, Depression and Anxiety among Muslim Patients. *IAFOR Journal of Psychology & the Behavioral Sciences*, 1(1).
- Daniel J. Taylor, Kenneth L. Lichstein, H. Heith Durrence, B. W. R., & Andrew J. Bush. (2019). *Epidemiology of Insomnia, Depression, and Anxiety*. *Sleep*, 28, 1457–1464.
- Darmojo, B. (2013). *Buku ajar geriatrik: Ilmu kesehatan usia lanjut, edisi 4 cetakan. 3*. Balai Penerbit FKUI.
- Deborah J. Bolding, P., & Ellen Corman. (2019). *Falls in the Geriatric Patient*. volume 35(issue 1).

- Djoar, R. K., & Anggarani, A. P. M. (2021). *Geriatric 2* (P. Asadani (ed.)). SYIAH JUALA UNIVERSITY PRESS.
- Dr.dr.Arman Yurisdaldi Saleh, MS, S. . (2018). *Berzikir Untuk Kesehatan Syaraf*. Hikaru Publishing.
- Dwi Nur Aini, Nana Rohana, E. W. (2022). Pengaruh Latihan Range of Motion Pada Ekstremitas Atas Dengan Bola Karet Terhadap Kekuatan Otot Pasien Stroke RSUD Dr. H. Soewondo Kendal. In *Proceeding Book: Vol. XV* (Issue 1).
- Dwi Prasetyo, A., & Amalia, N. (2019). Hubungan Konsep Diri Dengan Kejadian Stress pada Lansia di Uptd Sosial Tresna werdha Nirwana Puri Samarinda 2019. *Borneo Student Research, 1*(3), 2020.
- Gasril, P. (2022). Peran Keluarga Dalam Mencegah Risiko Depresi Pada Lansia Bersama Bkkbn. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI, 6*(1), 130–134.
- Hsu, C. W., Tseng, W. T., Wang, L. J., Yang, Y. H., Kao, H. Y., & Lin, P. Y. (2022). Comparative effectiveness of antidepressants on geriatric depression: Real-world evidence from a population-based study. *Journal of Affective Disorders, 296*, 609–615.
- INDONESIA, P. M. K. R. (2015). PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. In *Teaching and Teacher Education* (Vol. 12, Issue 1).
- Irawan. (2021). Gangguan Depresi pada Lanjut Usia Tapin RSUD Datu Tanggul. *Cermin Dunia Kedokteran, 40*(11), 815–819.
- Kemendes RI. (2021). *Hasil Utama Riskesdas 2021, Kemendes RI: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*.
- Kolcaba, K., & DiMarco, M. (2005). *Comfort Theory and Its Application to Pediatric Nursing*. Pediatric Nursing.
- Kumala, O. D., Kusprayogi, Y., & Nashori, F. (2021). Efektivitas pelatihan zikir dalam meningkatkan ketenangan jiwa pada lansia penderita hipertensi. *Psychopathic: Jurnal Ilmiah Psikologi, 4*(1).
- Livana, Susanti, Y., Darwati, L. E., & Anggraeni, R. (2018). Gambaran Tingkat Depresi Lansia. *Jurnal Keperawatan Dan Pemikiran Ilmiah, 80–93*.
- M. Quraish Shihab. (2014). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Qur'an*. Lentera Hati.
- M.D., L. F., Daniel ShalevM.D., M.D., M. N., & M.D., P. A. S. (2022). Palliative Care Training for Geriatric Psychiatry Fellows: A National Survey Project. *The American Journal of Geriatric Psychiatry, 3*(4), Pages 504-510.
- Marcus M, Yasamy MT, van Ommeren M, Dan Chisholm D, & S. S. (2018). *Depression: A global public health concern*. WHO Department of Mental Health and Substance Abuse. c2018.
- Martono HH. (2013). *Aspek Gerontologi dan Pengantar Geriatri*. In *Buku ajar Geriatri*. Balai Penerbit FK UI.
- Mauk, K. L. (2014). *Gerontological nursing: Competencies for care, Edisi 3*.
- Merdekawati, R., Komariah, M., & Sari, E. A. (2021). Intervensi Non Farmakologis untuk Mengatasi Gangguan Pola Tidur pada Pasien Hipertensi: Studi Literatur. *Jurnal Keperawatan BSI, 9*(2), 225–233.
- Miftakurrosyidin, M., & Wirawati, M. K. (2022). Penerapan Terapi Zikir Untuk Menurunkan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Hipertensi Di Desa Baleadi. *Jurnal Ners Widya Husada*.

- Miller, C. A. (2015). *Nursing for Wellness in Older Adults. (7th ed.)*. Wolters Kluwer Health.
- Muhith A & Siyoto S. (2016). *Pendidikan Keperawatan Gerontik*. ANDI.
- Nermien Naim Adly, W. M. A.-E.-G. & R. M. A.-H. (2020). Relationship between malnutrition and different fall risk assessment tools in a geriatric in-patient unit. *Aging Clinical and Experimental Research*, volume 32, pages 1279–1287.
- Nida, F. L. K. (2020). Zikir Sebagai Psikoterapi Dalam Gangguan Kecemasan Bagi Lansia. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(1), 133–150.
- Novayanti, P. E., Adi, M. S., & Widyastuti, R. H. (2020). Tingkat Depresi Lansia yang Tinggal di Panti Sosial. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 8(2), 117.
- Ns. Kristianto Dwi Nugroho, M. K., & Wibowo, S. Kep., Ns., M. B. (2019). *Buku Ajar : Keperawatan pada Lansia (Dasar)* (T. M. Publishing (ed.); pp. 55–60). MNC Publishing.
- Paramurthi, I. A. P., Tri, K., & Suparwati, A. (2019). Efektifitas Slow Stroke Back Massage Terhadap Peningkatan Kualitas Tidur Pada Lansia. *Bali Health Journal*, 3(2).
- Prabhaswari, L., & Putu Ariastuti, N. L. (2020). Gambaran Kejadian Depresi Pada Lanjut Usia Di Wilayah Kerja Puskesmas Petang I Kabupaten Badung Bali 2020. *Intisari Sains Medis*, 7(1), 47.
- Puspitha, A., Nurdin, N., & Saleh, U. (2021). *Pendampingan Posyandu Lanjut Usia*. 2(1).
- Putri, R. I., & Nurhidayati, T. (2022). Penerapan slow deep breathing dan zikir terhadap tingkat kecemasan penderita hipertensi pada lansia. *Ners Muda*, 3(2).
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2021). *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI tahun 2021*.
- Ristiawan, E. (2022). *Bimbingan rohani islam melalui metode do'a dan zikir bagi penderita stres di panti sosial bina insan bangun daya 2 cipayung skripsi*.
- Rofiqah, T. (2017). Konseling Religius: Mengatasi Rasa Kecemasan Dengan Mengadopsi Terapi Zikir Berbasis Religiopsikoneuroimunologi Religious Counseling: Overcoming Anxiety with the Adoption of Religiopsikoneuroimunologi Based Remembrance Therapy. *KOPASTA: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling*, 3(2).
- Setyorini, A., & Setyaningrum, N. (2019). Pengaruh Latihan Range of Motion (Rom) Aktif Assitif Terhadap Rentang Gerak Sendi Pada Lansia Yang Mengalami Immobilisasi Fisik. *Surya Medika: Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Dan Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 13(2), 96–103.
- Shosuke Satake, MD, P., & Koichi Kozaki, MD, P. (2018). Cognitive Frailty in Geriatrics. *Clinics in Geriatric Medicine*, Volume 34(ISSUE 4), P667-675.
- Spar JE. (2013). *Clinical Manual of Geriatric Psychiatry*. American Psychiatry Publishing Inc.
- Sudargo, T., Aristasari, T., Aulia, Arif, A., Aninda, F., & Putri, R. (2021). *ASUHAN GIZI PADA LANJUT USIA*.
- Sulistiyawati, R., Probosuseno, & Setiyarini, S. (2019). Dhikr Therapy for Reducing Anxiety in Patients. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 6(4), 411–416. https://doi.org/10.4103/apjon.apjon_33_19
- Suparyanto dan Rosad. (2020). Islamic Religiosity, Depression and Anxiety among Muslim Cancer Patients. *Suparyanto Dan Rosad*, 5(3), 248–253.

- Sutioningsih, S., Suniawati, S., & Hamsanikeda, S. (2019). Pengaruh Terapi Meditasi (Zikir) terhadap Tingkat Stres pada Lansia. *Jurnal Keperawatan Profesional*, 7(1).
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2016). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia* (Edisi 1). DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia : Defenisi dan Tindakan Keperawatan* (Edisi 1 Ce). DPP PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia : Definisi dan Kreteria Hasil Keperawatan* (Edisi 1 Ce). DPP PPNI.
- Tirtadaja, D. A., Apandi, M., & Dwipa, L. (2022). Perbedaan Adekuasi Asupan Nutrisi Lansia Sarkopenia dengan dan Tanpa Sarkopenia di Panti Werdha Bandung. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 8(4), 163.
- Videbeck, S. L. (2015). *Psychiatric mental health nursing (edition five)*. Lippincott Williams & Wilkins Inc.
- Wicaksana, I. G. A. T., & Widiarta, M. B. O. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ansietas Lansia. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKI)*, 9(2), 349–358.
- Widiantari, R. (2019). *Asuhan Keperawatan Pada Klien Ny.D Dengan Sindrom Geriatri + Anoreksia Di Ruang Rawat Inap Interne Ambun Suri Lantai 3 Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2019. Skripsi : Stikes Perintis Padang.*
- Widyastuti, T., Hakim, M. A., & Lilik, S. (2019). Terapi Zikir sebagai Intervensi untuk Menurunkan Kecemasan pada Lansia. *Gadjah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP)*, 5(2), 147.
- World Health Organization. (2022). *World health statistics 2022 (Monitoring health of the SDGs)*.
- Yusfar, & Hani. (2021). Hubungan Perilaku Zikir Dengan Kualitas Tidur Pada Lanjut Usia Di Desa Cempakamulya. *Healthy Journal*, 9(1), 11–18.

L

A

M

P

I

R

A

N




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Lampiran 1 : Pathway



Lampiran 2 : Jurnal Rujukan Utama



Studi Kasus

Penerapan *slow deep breathing* dan dzikir terhadap tingkat kecemasan penderita hipertensi pada lansia

Rosa Isnaini Putri¹, Tri Nurhidayati¹

¹ Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

- Submit 25 September 2021
- Diterima 2 Agustus 2022
- Diterbitkan 20 Agustus 2022

Kata kunci:

Tingkat Kecemasan;
Hipertensi; Lansia; *Slow Deep Breathing*; Dzikir

Abstrak

Hipertensi adalah keadaan dimana terjadinya peningkatan tekanan darah diatas batas normal. Batasan pada lansia yang berusia diatas 60 tahun bila sudah lebih dari 140/90 mmHg. Kondisi tubuh lansia yang mengalami hipertensi dapat kembali membaik, akan tetapi faktor-faktor psikologis lansia sangat berpengaruh terhadap proses penanganan masalah hipertensi. Hal ini dapat menyebabkan lansia mengalami gangguan psikis seperti kecemasan. Penanganan kecemasan dapat dilakukan dengan jenis psikoterapi yaitu dengan *slow deep breathing* dan dzikir. Studi ini bertujuan untuk mengetahui penurunan tingkat kecemasan dengan pemberian terapi *slow deep breathing* dan dzikir pada responden lansia dengan hipertensi. Studi ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan proses asuhan keperawatan. Subjek studi kasus adalah lansia dengan tingkat kecemasan pada penderita hipertensi. Subjek studi kasus berjumlah 2 orang, didapatkan secara purposive sampling. Instrumen yang digunakan kuesioner GAS (Geriatric Anxiety Scale) terdapat 30 pertanyaan. Data hasil




Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Indriyanti Arimurti Putri, lahir di Makassar pada tanggal 29 Maret 1999. Penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara, dari pasangan Alm. Bapak Umar Mury dan Almh. Ibu Wahidah. Penulis menempuh pendidikan di TK Aisyah Panakukang kota Makassar, Sekolah Dasar (SD) Inpres Tamamaung 1 Makassar lulus tahun 2011, melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 08 Makassar lulus tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) MAN 2 Kota Makassar lulus tahun 2017. S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) melalui jalur UMPTKIN, di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dengan Jurusan Keperawatan. Selanjutnya penulis melanjutkan kuliah Profesi Ners di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM). Syukur *Alhamdulillah* penulis sangat berterimakasih masih diberi kesehatan sehingga dapat mampu melewati ujian-ujian. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan selesai menyusun karya tulis ilmiah dengan judul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Lansia yang Mengalami *Isolation/Depression* dengan Masalah Ansietas Menggunakan Relaksasi Zikir Di Sentra Gau Mabaji Gowa”.

Lampiran 4 : Hasil Uji Turnitin



Lampiran 5 : Dokumentasi

