

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN TYPHOID
DENGAN MASALAH HIPERTERMI MENGGUNAKAN
TEPID SPONGE WATER DI RUANG RAWAT INAP
PUSKESMAS BONTOMARANNU**



Tugas Akhir Profesi Ners

Oleh :

SRI WAHYUNINGSIH

NIM: 70900121028

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN
ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN TYPHOID
DENGAN MASALAH HIPERTERMI MENGGUNAKAN
TEPID SPONGE WATER DI RUANG RAWAT INAP
PUSKESMAS BONTOMARANNU**



Tugas Akhir Profesi Ners

Oleh :

SRI WAHYUNINGSIH

NIM: 70900121028

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN
ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

ERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuningsih, S. Kep
NIM : 70900121028
Tempat/Tgl. Lahir : Takalar, 11 Oktober 1999
Jurusan/Prodi/Konsentrasi: Keperawatan/Ners/Keperawatan Anak
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Dusun Batunapara, Desa Panyangkalang,
Kec.Mangarabombang, Kab. Takalar
Judul : “Analisis Asuhan Keperawatan Pasien Typhoid
Dengan Masalah Hipertermi Menggunakan *Tepid Sponge Water* Di Ruang Rawat
Inap Puskesmas Bontomarannu”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Profesi Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 04 Januari 2023

Penyusun,


Sri Wahyuningsih
70900121028

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan tugas akhir profesi ners Saudara (i) Sri Wahyuningsih NIM: 70900121028, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pasien Typhoid Dengan Masalah Hipertermi Menggunakan Kompres *Tepid Sponge Water* Di Ruang Rawat Inap Puskesmas Bontomarannu", memandang bahwa tugas akhir profesi ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 04 Januari 2023



Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes
Pembimbing I



Muthahharah, S.Kep., Ns., M.Kep
Pembimbing II


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul, "Analisis Asuhan Keperawatan Pasien Typhoid Dengan Masalah Hipertermi Menggunakan *Tepid Sponge Water* Di Ruang Rawat Inap Puskesmas Bontomarannu", yang disusun oleh Sri Wahyuningsih, NIM: 70900121028, mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, Kamis tanggal 04 Januari 2023 M, bertepatan dengan 11 Jumaidil Akhir 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan.


Gowa, 04 Januari 2023 M.
11 Jumaidil Akhir 1444 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M. Kes	()
Sekretaris	: Dr. Patima, S. Kep., Ns., M. Kep	()
Munaqisy I	: Eka Hadrayani, S.Kep.,Ns.,M.Kep	()
Munaqisy II	: Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I.,M.Th.I	()
Pembimbing I	: Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes	()
Pembimbing II	: Muthahharah, S.Kep.,Ns.,M.Kep	()

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

()
Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M. Kes.
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warah,atullahi Wabarakatuh.

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah swt. karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang masih terlimpahkan kepada penulis sehingga Karya Tulis Akhir (KTA) yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pasien Typhoid Dengan Masalah Hipertermi Menggunakan Terapi *Tepid sponge water* Di Ruang Rawat Inap Puskesmas Bontomarannu“, alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik, dan tak lupa pula penulis kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti saat sekarang ini.

Tujuan dari penyusunan Karya Tulis Akhir (KTA) ini adalah untuk memenuhi syarat penyelesaian pendidikan pada program studi Profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2022.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak hambatan, kekurangan pengalaman dan ilmu pengetahuan penulis selama penyusunan yang pada akhirnya Karya Tulis Akhir (KTA) ini bisa terselesaikan, adapun beberapa pihak yang terlibat turut andil dalam Karya Tulis Akhir (KTA) ini. Karena hal demikian, dengan rasa hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih, serta penghargaan yang setinggi-tingginya untuk orangtua tercinta, Ayahanda tercinta Bapak Dahlan, S.E dan Ibunda tercinta Hj. Fatmawati, Terimakasih atas segala kasih sayang yang sangat besar kepada penulis, terimakasih untuk doa, dukungan dan semangat yang tak pernah putus kepada penulis serta bantuan moril dan materinya, sehingga penulis bisa sampai ditahap ini. Serta untuk terkhusus kepada kakak penulis satu satunya Muhammad Ruslan, S.H dan keluarga besar penulis sepupu, om, tante, yang terus menerus memberikan motivasi dan dukungan

materi yang lebih dari cukup kepada penulis dalam menjalani pendidikan. Serta tak lupa pula keponakan penulis Aisyah Nur Zahira yang menjadi motivasi penulis untuk tetap semangat dalam menjalani profesi ners ini.

Ucapan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi penulis, dengan segala rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya dan seluruh staf karena telah memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga pada saat menimba ilmu di kampus peradaban ini.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag. wakil rektor I bidang Akademik Pengempungan Lembaga
3. Dr. Wahyuddin, M.Hum, wakil rektor II bidang Akademik Umum dan Perencanaan Keuangan
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag wakil rektor III bidang Kemahasiswaan
5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag wakil rektor IV bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga
6. Dr. dr., Syatirah Jalaludin, Sp., A.,M.Kes., Selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta para wakil dekan dan Staf akademik yang telah membantu penulis dalam mengurus dan mengatur proses administrasi selama menjalani pendidikan.
7. Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Ketua Prodi Profesi Ners dan Hj. Sysnawati., S.Kep., Ns., M.Kes., Sp. Kep.J selaku sekretaris jurusan Profesi Ners beserta dosen dan staf pengajar yang selalu membantu penulis,

memberikan motivasi dan ilmu selama proses penyusunan Karya Tulis Akhir (KTA)

8. Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes selaku pembimbing I serta Mutahharah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku pembimbing II saya. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga yang sudah dengan sabar dan ikhlas untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran, serta arahan nya yang begitu membangun dan berharga bagi saya.
9. Eka Hadrayani., S.Kep., Ns., M.Kep selaku penguji I dan Dr. H. Muhammad Irham S.Th.I., M.Th.I selaku penguji agama. Terimakasih telah memberikan masukan, kritik dan saran yang sangat mendukung dan membangun kepada penulis dalam penyelesaian Karya Tulis Akhir ini.
10. Pimpinan, perawat, beserta staf Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa yang telah membantu penulis dari awal penelitian membantu memenuhi segala sesuatu yang penulis butuhkan, membantu dalam melakukan penelitian hingga akhirnya sampai pada tahap ini.
11. Kepada teman-teman dan sahabat-sahabat saya terimakasih atas segala bantuannya, serta selalu meluangkan waktunya untuk selalu terus bersama dalam bertukar pikiran dalam penyusunan Karya Tulis Akhir (KTA).

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja selama penulis menjalani pendidikan di kampus peradaban. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Karya Tulis Akhir (KTA) masih jauh dari kata sempurna, untuk hal tersebut besar harapan penulis kepada pembaca untuk ikut andil dalam memberikan kontribusi nya baik itu berupa masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan dari Karya Tulis Akhir (KTA) ini, karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah swt.

Sekian dan Terima Kasih,

Samata, 04 Januari 2023

Penulis

Sri Wahyuningsih
70900121028



ABSTRAK

Nama : Sri Wahyuningsih
Nim : 70900121028
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pasien Typhoid Dengan Masalah Hipertermi Menggunakan *Tepid Sponge Water*

Latar Belakang: Typhoid merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian di Indonesia. Menurut data terbaru dari WHO (World Health Organisation) sendiri, diperkirakan bahwa setiap tahun diseluruh dunia terdapat antara 11 - 21 juta kasus demam tifoid dengan insiden kematian sebanyak 128.000 hingga 161.000. Demam tifoid disebabkan oleh organisme *Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi* (*Salmonella Typhi*), infeksi sistematis yang ditularkan terutama melalui air atau makanan yang terkontaminasi oleh kotoran manusia. Penyakit tifoid merupakan penyakit yang berbahaya karena dapat berdampak pada kematian jika tidak segera ditangani. Penanganan awal dari gejala penyakit typhus yang berupa gejala peningkatan suhu tubuh atau hipertermia sangat diperlukan. Penyakit tifoid yang berkepanjangan akan menyebabkan infeksi dan dapat menyerang organ dalam tubuh manusia. Untuk menangani masalah demam pada typhoid maka dibutuhkan intervensi nonfarmakologis. Salah satunya adalah *Tepid sponge water*. *Tepid sponge water* ini dapat menurunkan demam dengan menggunakan kompres hangat. **Tujuan:** untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami demam typhoid dengan masalah keperawatan hipertermia dengan menggunakan kompres *Tepid sponge water* di Puskesmas Bontomarannu. **Metode:** metode yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara kepada keluarga pasien, melakukan observasi, pemeriksaan fisik serta pendokumentasian. Pemberian kompres *tepid sponge water* diberikan selama 1 kali dalam 3 hari pemberian. **Hasil:** berdasarkan evaluasi keperawatan yang didapatkan pada hari pertama sampai hari ketiga masalah hipertermia teratasi. Setelah pemberian kompres *Tepid sponge water* pada hari pertama didapatkan suhu pasien menurun menjadi 38,7°C, hari kedua 37,2°C, kemudian hari ketiga didapatkan 37,1°C. Kesimpulan: Pemberian *tepid sponge water* bisa menjadi salah satu intervensi rujukan untuk mengatasi demam pada anak khususnya demam yang dialami oleh pasien dengan penyakit Typhoid.

Kata Kunci: Demam Typhoid, Hipertermia, *Tepid sponge water*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Name : Sri Wahyuningsih

NIM : 70900121028

Title : Nursing Care Analysis of Typhoid Patients with Hyperthermia Problems Using Tepid Sponge Water

Background: Typhoid is a disease that causes death in Indonesia. According to the latest data from the WHO (World Health Organization) itself, it is estimated that every year around the world there are between 11-21 million cases of typhoid fever with an incidence of 128,000 to 161,000 deaths. Typhoid fever is caused by the organism *Salmonella enterica* subspecies *enterica* serovar Typhi (*Salmonella* Typhi), a systematic infection that is transmitted primarily through water or food contaminated with human feces. Typhoid is a dangerous disease because it can result in death if not treated immediately. Early treatment of the symptoms of typhus in the form of symptoms of increased body temperature or hyperthermia is very necessary. Prolonged typhoid disease will cause infection and can attack organs in the human body. To deal with the problem of typhoid fever, non-pharmacological interventions are needed. One of them is the Tepid Sponge Water. This tepid sponge water can reduce fever by using warm compresses. **Purpose:** to analyze nursing care for patients with typhoid fever with hyperthermia nursing problems using a tepid sponge water compress at the Bontomarannu Health Center. **Method:** the method used is a case study with data collection techniques through interviews with the patient's family, observation, physical examination and documentation. Giving a tepid sponge water compress is given for 1 time in 3 days of administration. **Results:** based on the nursing evaluation obtained on the first day to the third day the hyperthermia problem was resolved. After giving the Tepid sponge water compress on the first day, the patient's temperature decreased to 38.7°C, the second day was 37.2°C, then the third day was 37.1°C. **Conclusion:** The provision of tepid sponge water can be one of the referral interventions to treat fever in children, especially fever experienced by patients with typhoid disease.

Keywords: Typhoid fever, hyperthermia, Tepid sponge water.



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	xi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusah Masalah.....	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Konsep Medis	8
2.1.1 Definisi.....	8
2.1.2 Etiologi Demam Typhoid.....	9
2.1.3 Patofisiologi Demam Typhoid	11
2.1.4 Manifestasi Klinis Demam Typhoid	12
2.1.5 Komplikasi Demam Typhoid.....	14
2.1.6 Pencegahan Demam Typhoid	14
2.1.7 Penatalaksanaan Demam Typhoid	15
2.1.8 Pemeriksaan Penunjang.....	17
2.2 Konsep Asuhan	18
2.2.1 Pengkajian Keperawatan.....	18
2.2.2 Diagnosis Keperawatan.....	25
2.2.3 Intervensi Keperawatan.....	32
2.2.4 Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan	39
2.2.5 Evidence Based Practice In Nursing.....	45
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	48

3.1	Rancangan Studi Kasus	48
3.2	Subjek Studi Kasus	48
3.3	Fokus Studi Kasus	49
3.4	Instrumen Studi Kasus	49
3.5	Prosedur Pengambilan Data.....	50
3.6	Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus	50
3.7	Analisa Data dan Penyajian Data.....	50
3.8	Etika Studi Kasus.....	51
BAB IV LAPORAN KASUS.....		53
4.1	Asuhan Keperawatan	53
BAB V PEMBAHASAN		85
5.1	Analisis Asuhan Keperawatan	85
5.2	Analisis Diagnosis Keperawatan	86
5.3	Analisis Intervensi Keperawatan	88
5.4	Analisis Implementasi Keperawatan	92
5.5	Analisis Evaluasi Keperawatan	98
5.6	Analisis EBPN	99
5.7	Keterbatasan Penelitian.....	104
BAB VI PENUTUP		105
6.1	Kesimpulan	105
6.2	Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....		107
LAMPIRAN.....		12

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Thypoid merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian di Indonesia. Demam tifoid disebabkan oleh organisme *Salmonella enterica* *subspesies enterica serovar Typhi* (*Salmonella Typhi*), infeksi sistematik yang paling sering menyebar melalui makanan yang telah terkontaminasi oleh kotoran manusia (Birkhold, Crump, & Marchello, 2020). Gejala yang ditunjukkan biasanya tidak spesifik bahkan cenderung mirip dengan gejala demam lain sehingga sulit untuk dibedakan. Mamun kasus yang memberat bisa menimbulkan komplikasi yang serius bahkan hingga menyebabkan kematian. (Desli Sumarni, 2021)

WHO (*World Health Organisation*) memperkirakan bahwa diseluruh dunia kasus demam typoid akan meningkat setiap tahunnya yang berkisar antara 11-21 juta dengan insiden kematian sebanyak 128.000 hingga 161.000 (WHO, 2018). Diperkirakan setiap tahun terdapat 26 juta kasus demam typoid dan 5 juta kasus demam paratifoid diseluruh dunia yang mengakibatkan 215.000 kasus kematian. Dari jumlah tersebut, 80% kasus demam tifoid didapat dari wisatawan Asia Selatan (terutama India, Pakistan, atau Bangladesh). Daerah lain dengan risiko tinggi terjadinya demam tifoid termasuk Afrika dan Asia Tenggara; kawasan berisiko rendah termasuk Asia Timur, Amerika Selatan, dan Karibia (Manalu & Rantung, 2021)

Demam tifoid di Indonesia bersifat endemis yang sering ditemukan di kota besar. Dimana demam tifoid yang terjadi di Indonesia sekitar 350-810/100.000 penduduk, prevalensi yang didapat ialah sebesar 1,6% dan demam tifoid ada pada urutan ke-5 penyakit menular yang terjadi pada seluruh golongan usia di Indonesia (6,0%), kemudian urutan yang ke-15 sebagai penyebab kematian diseluruh usia (1,6%). Insiden demam tifoid pada anak usia < 5 tahun cukup tinggi, insiden semakin tinggi sesuai dengan bertambahnya usia. (Khairunnisa *et al.*, 2020)

Fenomena yang penulis temukan ketika melakukan praktik klinik pada bulan Juli 2022 di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa, Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu kepala ruangan perawatan Pkm Bontomarannu didapatkan bahwa penyakit yang paling sering ditemui pada anak di Pkm Bontomarannu adalah penyakit Diare dan demam Typhoid. Dan dari hasil observasi yang didapatkan saat menjalani dinas di Pkm Bontomarannu terdapat 3 orang anak yang rawat dengan masalah kesehatan demam Typoid dan salah satu pasien anak usia 6 tahun dengan diagnosis medis Typhoid. Saat dilakukan pengkajian pada An. M adapun data yang diperoleh yaitu ibu pasien mengatakan anaknya mengalami demam yang dialami sudah 4 hari diantar ke Puskesmas sampai saat ini yang disertai mual, sakit kepala, dan menggigil.

Demam typoid dapat membahayakan tubuh apabila timbul demam tinggi. Salah satunya adalah kejang dapat terjadi sebagai akibat dari demam tinggi yang tidak ditangani secara dini sehingga menimbulkan hipoksia jaringan otak dan pada akhirnya terjadi kerusakan otak. Suhu badan yang tinggi

menyebabkan otak menjadi sensitif dan mudah mengalami kematian sel. Suhu tubuh tinggi berbahaya karena mengakibatkan perdarahan lokal dan degenerasi parenkimatososa di seluruh tubuh, gangguan ini akan menyebabkan terganggunya fungsi sel (Wulandari *et al.*, 2022)

Tindakan mandiri yang dilakukan perawat dalam menurunkan suhu tubuh secara nonfarmakologis dapat dilakukan dengan cara *Tepid sponge water*. Dimana *Tepid sponge water* merupakan salah satu terapi nonfarmakologis yang dapat digunakan untuk menurunkan demam dengan menggunakan air hangat. Penggunaan *Tepid sponge water* ini diterapkan dibagian dahi, lipatan axila, lipatan pangkal paha selama 15-20 menit. Kompres dengan menggunakan *Tepid sponge water* akan lebih efektif dalam mempercepat pengeluaran tubuh karena Water Tepid Sponge dapat merangsang vasodilatasi sehingga mempercepat proses evaporasi dan konduksi, yang pada akhirnya dapat menurunkan suhu tubuh yang tinggi. *Tepid sponge water* bermanfaat mendorong darah kepermukaan tubuh sehingga darah dapat mengalir dengan lancar, dan memberikan sinyal ke hipotalamus anterior yang nanti akan merangsang sistem efektor dan memberikan sinyal pada kelenjar keringat untuk melepaskan keringat sehingga diharapkan dapat menurunkan suhu tubuh pada anak. (Suprapti *et al.*, 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiyaningsih & Nurhidayati (2021) dalam penelitiannya terdapat 2 responden anak usia 7-8 tahun yang mengalami typoid dengan diberikan intervensi *Tepid sponge water* selama selama 20 menit didapatkan hasil yaitu *Tepid sponge water* efektif untuk

menurunkan suhu tubuh pada pasien dengan masalah keperawatan Hipertermia, karena terjadi penurunan suhu tubuh pada pasien kasus I hari pertama dari 39,50C menjadi 38,70C, hari kedua dari 38,50C menjadi 380C, hari ketiga dari 37,80C menjadi 37,30C dan kasus II hari pertama dari 39,20C menjadi 38,50C, hari kedua dari 38,30C menjadi 37,80C, hari ketiga dari 37,70C menjadi 37,20C (Kristiyaningsih & Nurhidayati, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Hayani (2018) yang melakukan penelitian pemberian *Tepid sponge water* terhadap 60 responden anak usia 1-6 tahun dengan hasil penelitian terjadinya penurunan suhu tubuh yaitu hasil suhu sebelum dilakukan tepid sponge sebagian besar berada pada suhu 38-39 °C dan suhu tubuh setelah dilakukan tepid sponge sebagian besar berada pada suhu 37 -38 °C, yang menunjukkan terjadi penurunan suhu sebesar 1 °C. (Haryani *et al.*, 2018)

Pemberian kompres *Tepid sponge water* juga diteliti oleh Rifaldi & Wulandari yang membandingkan intervensi *Tepid sponge water* dengan intervensi kompres bawang merah, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan demam pada anak menggunakan intervensi *Tepid sponge water* yaitu 36,5°C, sedangkan kompres bawang menunjukkan hasil penurunan demam 37,15°C, dapat disimpulkan bahwa pemberian kompres *Tepid sponge water* lebih efektif diberikan daripada kompres bawang merah. (Rifaldi & Wulandari, 2020).

Penyakit tifoid atau yang sering dikenal dengan penyakit typhus ini merupakan penyakit yang berbahaya karena dapat berdampak pada kematian jika tidak segera ditangani. Penanganan awal dari gejala penyakit typhus yang

berupa gejala peningkatan suhu tubuh atau hipertermia sangat diperlukan. Penyakit tifoid yang berkepanjangan akan menyebabkan infeksi dan dapat menyerang organ dalam tubuh manusia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan intervensi kompres *Tepid sponge water* pada anak yang mengalami Typhoid dengan masalah keperawatan hipertermi di Puskesmas Bontomarannu Gowa.

1.2 Rumusah Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penulisan karya tulis ilmiah ini salah bagaimana pelaksanaan intervensi kompres *tepid sponge water* pada anak yang mengalami demam Typhoid dengan masalah keperawatan Hipertermia di Puskesmas Bontomarannu kabupaten Gowa.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

Untuk menganalisis Asuhan keperawatan pada anak Typhoid dengan masalah keperawatan Hipertermia dengan pemberian intervensi keperawatan terapi *Tepid sponge water* di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Untuk menganalisis pengkajian pada pasien dengan Typhoid dengan masalah keperawatan Hipertermia di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa.

1.3.2.2 Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien dengan Typhoid dengan masalah keperawatan Hipertermia di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa.

1.3.2.3 Untuk menganalisis intervensi pada pasien dengan Typhoid dengan masalah keperawatan Hipertermia di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa.

1.3.2.4 Untuk menganalisis implementasi pada pasien dengan Typhoid dengan masalah keperawatan Hipertermia di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa

1.3.2.5 Untuk menganalisis evaluasi pada pasien dengan Typhoid dengan masalah keperawatan Hipertermia di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa

1.3.2.6 Untuk menganalisis Asuhan keperawatan pada pasien dengan Hipertermia menggunakan intervensi Terapi *Tepid sponge water* berdasarkan Evidence Based Practice in Nursing di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Tteoritis

Tugas Akhir profesi ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien anak dengan Typhoid di Puskesmas Bontomarannu kabupaten Gowa.

1.4.2 Manfaat Aplikatif

1.4.2.1 Manfaat bagi perawat

Tugas Akhir Prosesi Ners ini diharapkan dapat digunakan oleh perawat agar bisa dijadikan referensi intervensi untuk mengatasi masalah keperawatan hipertermia yang bisa saja dialami oleh pasien dengan Typhoid.

1.4.2.2 Manfaat bagi masyarakat

Tugas Akhir Prosesi Ners ini diharapkan dapat menjadi edukasi kepada masyarakat untuk bisa lebih mengenal teknik nonfarmakologis yang dapat digunakan untuk menurunkan suhu tubuh pada pasien yang mengalami typoid.

1.4.2.3 Manfaat bagi institusi

Tugas Akhir Prosesi Ners diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi institusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang intervensi nonfarmakologis yang dapat digunakan untuk mengurangi efek efek samping pemberian obat farmakologis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Medis

2.1.1 Definisi

Demam tifoid adalah penyakit infeksi bakteri yang menyerang sistem pencernaan manusia yang disebabkan oleh *Salmonella typhi* dengan gejala demam satu minggu atau lebih disertai gangguan pada saluran pencernaan dan dengan atau tanpa gangguan kesadaran. (Ulfa & Handayani, 2018)

Demam tifoid merupakan penyakit infeksi akut sistem pencernaan yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi* atau *Salmonella paratyphi*. Demam tifoid ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri *Salmonella typhi*, selain itu penyakit ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan feses, urin atau sekret penderita demam tifoid. Dengan kata lain hygiene sanitasi adalah faktor utama penularannya. (Levani & Prastya, 2020)

Typhoid adalah penyakit infeksi akut usus halus yang disebabkan oleh kuman *salmonella thypi* dan *salmonella paratyphi A, B, C*. sinonim dari penyakit ini adalah Typhoid dan juga paratyphoid abdominalis. (Noer, 2015).

Demam typhoid merupakan penyakit infeksi sistemik bersifat akut yang disebabkan oleh *salmonellathypi*. Penyakit ini ditandai oleh panas berkepanjangan, ditopang dengan bakteremia tanpa keterlibatan struktur endothelia /endokardial dan juga invasi bakteri sekaligus

multiplikasi kedalam sel fagosit monocular dari hati, limpa, kelenjar limfe usus dan peyer's patch dan juga dapat menular pada orang lain melalui makanan /air yang terkontaminasi (Nurarif & Kusuma, 2015)

Menurut (Pohan, 2011) Demam tifoid adalah suatu infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri *S typhi*. Bakteri lain yang dapat menyebabkan demam tifoid adalah *Salmonella enterica* serovar paratyphi A, B, dan C, penyakit ini disebut demam paratifoid. Demam tifoid dan paratifoid termasuk ke dalam demam enterik. Pada daerah endemik, sekitar 90% dari demam enterik adalah demam tifoid. (Saputra, 2021)

2.1.2 Etiologi Demam Typhoid

Penyakit tifoid disebabkan oleh *Salmonella typhi* yaitu bakteri enterik gram negatif berbentuk basil dan bersifat patogen pada manusia. Penyakit ini mudah berpindah dari satu orang ke orang lain yang kurang menjaga kebersihan diri dan lingkungannya yaitu penularan secara langsung jika bakteri ini terdapat pada feses, urine atau muntahan penderita dapat menularkan kepada orang lain dan secara tidak langsung melalui makanan atau minuman. *Salmonella typhi* berperan dalam proses inflamasi lokal pada jaringan tempat bakteri berkembang biak dan merangsang sintesis dan pelepasan zat pirogen dan leukosit pada jaringan yang meradang sehingga terjadi demam.

Jumlah bakteri yang banyak dalam darah (bakteremia) menyebabkan demam makin tinggi. Penyakit typhoid ini mempunyai hubungan erat dengan

lingkungan terutama pada lingkungan yang penyediaan air minumnya tidak memenuhi syarat kesehatan dan sanitasi yang buruk pada lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit typhoid tersebar yaitu polusi udara, sanitasi umum, kualitas air temperatur, kepadatan penduduk, kemiskinan dan lain-lain. beberapa penelitian di seluruh dunia menemukan bahwa laki-laki lebih sering terkena demam tifoid, karena laki-laki lebih sering bekerja dan makan di luar rumah yang tidak terjamin kebersihannya. Tetapi berdasarkan daya tahan tubuh, wanita lebih berpeluang untuk terkena dampak yang lebih berat atau mendapat komplikasi dari demam tifoid. Salah satu teori yang menunjukkan hal tersebut adalah ketika *Salmonella typhi* masuk ke dalam sel-sel hati, maka hormon estrogen pada wanita akan bekerja lebih berat. (Ardiaria, 2019).

Akibat infeksi oleh *salmonellathypi*, pasien membuat antibodi atau aglutinin yaitu :

1. AglutininO (antigen somatik) yang dibuat karena rangsangan antigen O (berasal dari tubuh kuman).
2. AglutininH (antigen flagela) yang dibuat karena rangsangan antigenH (berasal dari flagel kuman). AglutininVi (envelope) terletak pada kapsul yang dibuat karena rangsangan antigenVi (berasal dari simpai kuman)

Dari ketiga aglutinin tersebut hanya aglutininO dan jugaH yang ditentukan titernya untuk diagnosa, makin tinggi titernya makinbesar pasien menderita tifoid (Aru & Sudoyo, 2009)

2.1.3 Patofisiologi Demam Typhoid

Bakteri *Salmonellatyphi* bersama makanan atau minuman masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Pada saat melewati lambung dengan suasana asam ($\text{pH} < 2$) banyak bakteri yang mati. Keadaan-keadaan seperti aklorhidria, gastrektomi, pengobatan dengan antagonis reseptor histamin H₂, inhibitor pomproton /antasida dalam jumlah besar, akan mengurangi dosis infeksi. Bakteri yang masih hidup akan mencapai usus halus. Di usus halus, bakteri melekat pada sel-sel mukosa dan juga kemudian menginvasi mukosa dan menembus dinding usus, tepatnya di ileum dan jejunum. Sel-selM, sel epitel khusus yang melapisi Peyer's patch, merupakan tempat internalisasi *Salmonellatyphi*. Bakteri mencapai folikel limfe usus halus, mengikuti aliran kelenjar limfe mesenterika bahkan ada yang melewati sirkulasi sistemik sampai ke jaringan RES di organ hati dan limpa. *Salmonella typhi* mengalami multiplikasi di dalam sel fagosit mononuklear di dalam folikel limfe, kelenjar limfe mesenterika, hati dan limfe (Soedarmo *et al.*, 2008)

Setelah melalui periode waktu tertentu (periode inkubasi) yang lamanya ditentukan oleh jumlah dan virulensi kuman serta respons imun pejamu maka *Salmonella typhi* akan keluar dari habitatnya dan melalui duktus torasikus masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Dengan cara ini organisme dapat mencapai organ manapun, akan tetapi tempat yang disukai oleh *Salmonellatyphi* adalah hati, limpa, sumsum tulang belakang, kandung empedu dan Peyer's patch dari ileum terminal. Invasi

kandung empedu dapat terjadi baik secara langsung dari darah/penyebaran retrograd dari empedu. Ekskresi organisme diempedu dapat menginvasi ulang dinding usus /dikeluarkan melalui tinja. Peran endotoksin dalam patogenesis demam tifoid tidak jelas, hal tersebut terbukti dengan tidak terdeteksinya endotoksin dalam sirkulasi penderita melalui pemeriksaan limulus. Diduga endotoksin dari *Salmonella typhi* menstimulasi makrofag di dalam hati, limpa, folikel limfoma usus halus dan juga kelenjar limfe mesenterika untuk memproduksi sitokin dan zat-zat lain. Produk dari makrofag inilah yang dapat menimbulkan nekrosis sel, sistem vaskular yang tidak stabil, demam, depresi sumsum tulang belakang, kelainan pada darah dan juga menstimulasi sistem imunologik (Soedarmo *et al.*, 2008)

2.1.4 Manifestasi Klinis Demam Typhoid

1. Gejala pada anak : inkubasi antara 5-40 hari dengan rata-rata 10- 14 hari
2. Demam meninggi sampai akhir minggu pertama
3. Demam turun pada minggu keempat, kecuali demam tidak tertangani akan menyebabkan syok, stupor, dan koma
4. Ruam muncul pada hari ke 7-10 hari dan bertahan selama 2-3 hari
5. Nyeri kepala, nyeri perut
6. Kembung, mual muntah, diare, konstipasi
7. Pusing, bradikardi, nyeri otot
8. Batuk

9. Epiktaksis
10. Lidah yang berselaput
11. Hepatomegali, splenomegali, meteorismus
12. Gangguan mental berupa somnolen
13. Delirium / psikosis
14. Dapat timbul gejala yang tidak tipikal terutama pada bayi muda sebagai penyakit demam akut dengan disertai syok dan hipotermia

Periode infeksi demam thypoid, gejala dan tanda :

Minggu	Keluhan	Gejala	Patologi
Minggu 1	Panas berlangsung insidious, tipe panas stepladder yang mencapai 39-40° c, menggigil, nyeri kepala	Gangguan Saluran cerna	Bakteremia
Minggu 2	Rash, nyeri abdomen, diare atau konstipasi, delirium	Rose sport, splenomegali, hepatomegali	Vaskulitis, hiperplasi pada peyer's patches, nodul typhoid pada limpa dan hati
Minggu 3	Komplikasi : perdarahan saluran cerna, perforasi dan syok	Melena, ilius, ketegangan abdomen, koma	Ulserasi pada payer's patches, nodul tifoid pada limpa dan hati
Minggu 4	Keluhan menurun, relaps, penurunan berat badan	Tampak sakit berat, kakeksia	Kolelitiasis, carrier kronik

Sumber (Nurarif & Kusuma, 2015).

2.1.5 Komplikasi Demam Typhoid

1. Perdarahan usus

Bila sedikit, hanya ditemukan jika dilakukan pemeriksaan tinja dengan benzidin. Jika perdarahan banyak, maka terjadi melena yang dapat disertai nyeri perut dengan tanda-tanda renjatan.

2. Perforasi usus

Timbul biasanya pada minggu ketiga /setelahnya dan terjadi pada bagian distal ileum.

3. Peritonitis

Biasanya menyertai perforasi, tetapi dapat terjadi tanpa perforasi usus. Ditemukan gejala abdomen akut, yaitu nyeri perut hebat, dinding abdomen tegang, dan nyeri tekan

4. Komplikasi diluar usus

Terjadi karena lokalisasi peradangan akibat sepsis, yaitu meningitis, kolesistitis, ensefalopati, dan lain-lain (Nursalam *et al.*, 2015)

2.1.6 Pencegahan Demam Typhoid

Menurut Inawati (2017) melakukan pencegahan untuk penderita demam thypoid, yaitu:

1. Vaksin parenteral

Vaksin demam thypoid biasanya diberikan dalam serangkaian dua suntikan subkutan 0,5 ml diberikan pada empat interval mingguan. Tingkat perlindungan adalah 70%. Dosis booster

dianjurkan setiap 3 tahun di daerah endemis tifus, ini tidak boleh diberikan kepada ibu hamil dan merupakan kontraindikasi dalam pemulihan mereka dari penyakit serius.

2. Vaksin oral

Vaksin hidup ini diberikan secara lisan dalam bentuk tiga kapsul diambil pada hari ke 1, 3, dan 5, dengan dosis booster setelah 3 tahun. Tidak harus diberikan sampai setidaknya seminggu telah berlalu sejak pasien telah diambil setiap antibiotik yang efektif terhadap salmonella.

Bentuk oral paling tidak sama efektifnya dengan (dan dalam beberapa kasus lebih efektif dari pada) vaksin yang disuntikan.

2.1.7 Penatalaksanaan Demam Typhoid

1. Medis

a. Anti Biotik (Membunuh Kuman) :

Di daerah endemik, 60 sampai 90% kasus demam tifoid dapat ditangani dengan pemberian antibiotik dan istirahat di rumah.

Pada awalnya, antibiotik kloramfenikol merupakan pilihan terapi utama demam tifoid. Namun pada tahun 1990an, terjadi resistensi bakteri *Salmonella typhi* terhadap antibiotik kloramfenikol. Saat ini, antibiotik golongan fluoroquinolon dianggap merupakan pilihan utama dalam mengatasi demam tifoid. Pada sebuah studi, ditemukan bahwa antibiotik golongan fluoroquinolon memiliki lama waktu terapi yang relatif pendek

(3 – 7 hari) dan memiliki tingkat kesembuhan sebesar 96%. Antibiotik golongan fluoroquinolon menunjukkan lebih cepat dan lebih efektif menurunkan jumlah bakteri *Salmonella typhi* di feses bila dibandingkan terapi lini pertama seperti kloramfenikol dan trimetoprim-sulfametoksazol. Selain antibiotika golongan fluoroquinolon, antibiotika golongan cefalosporin generasi ketiga (ceftriakson, cefiksim dan cefoperazon) dan azitromisin juga terbukti efektif dalam mengatasi demam tifoid. Pada sebuah studi ditemukan pemberian antibiotik ceftriakson dan cefiksim dapat menurunkan gejala demam dalam waktu 1 minggu pengobatan. Antibiotik kloramfenikol, amoksisilin dan trimetoprim sulfametoksazol masih bisa diberikan pada daerah yang tidak memiliki resistensi terhadap obat ini atau bila obat antibiotik golongan fluoroquinolon tidak dapat ditemukan. (Saputra, 2021)

b. Antipiretik (Menurunkan panas) :

1) Paracetamol

2. Keperawatan

a. Observasi dan pengobatan

b. Pasien harus tirah baring absolute sampai 7hari bebas demam atau kurang lebih dari selam 14hari. Maksud tirah baring adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi perforasi usus.

- c. Mobilisasi bertahap bila tidak panas, sesuai dengan pulihnya kekuatan pasien.
- d. Pasien dengan kesadarannya yang menurun, posisi tubuhnya harus diubah pada waktu-waktu tertentu untuk menghindari komplikasi pneumonia dan juga dekubitus.
- e. Defekasi dan buang air kecil perlu diperhatikan karena kadang-kadang terjadi konstipasi dan diare.
- f. Diet
 - 1) Diet yang sesuaicukup kalori dan tinggi protein.
 - 2) Pada penderita yang akut dapat diberi bubur saring.
 - 3) Setelah bebas demam diberi bubur kasar selama 2 hari lalu nasi tim
 - 4) Dilanjutkan dengan nasi biasa setelah penderita bebas dari demam selama 7 hari. (Smeltzer & Bare, 2014)

2.1.8 Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang menurut (Nurarif & Kusuma, 2015) yaitu:

1. Pemeriksaan darah perifer lengkap Dapat ditemukan leukopeni, dapat pula leukositosis atau kadar leukosit normal. Leukositosis dapat terjadi walaupun tanpa disertai infeksi sekunder
2. Pemeriksaan SGOT dan SGPT SGOT dan SGPT sering meningkat, tetapi akan kembali normal setelah sembuh. Peningkatan SGOT dan juga SGPT ini tidak memerlukan penanganan khusus

3. Pemeriksaan uji widal Uji widal dilakukan untuk mendeteksi adanya antibody terhadap bakteri salmonella typhi. Uji widal dimaksudkan untuk menentukan adanya agglutinin dalam serum penderita demam tifoid. Akibat adanya infeksi oleh salmonella typhi maka penderita membuat antibody (agglutinin)
4. Kultur
 - a. Kultur darah : bisa positif pada minggu pertama
 - b. Kultur urine : bisa positif pada akhir minggu kedua
 - c. Kultur feses : bisa positif dari minggu kedua hingga minggu ketiga
 - d. Anti salmonella typhi igM Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi secara dini infeksi akut salmonella typhi, karena antibody igM muncul pada hari ke 3 terjadinya demam.

2.2 Konsep Asuhan

2.2.1 Pengkajian Keperawatan

1. Pengkajian

- a. Biodata Pasien dan penanggungjawab (nama, usia, jenis kelamin, agama, alamat)

- b. Riwayat Kesehatan

- 1) Keluhan utama

Biasanya pasien dirawat di rumah sakit dengan keluhan sakit kepala, demam, nyeri dan juga pusing

- 2) Riwayat Kesehatan Sekarang

Biasanya pasien mengeluh kepala terasa sakit, demam, nyeri dan juga pusing, berat badan berkurang, pasien mengalami mual, muntah dan anoreksia, pasien merasa sakit diperut dan juga diare, pasien mengeluh nyeri otot.

3) Riwayat Kesehatan Dahulu

Kaji adanya riwayat penyakit lain/ pernah menderita penyakit seperti ini sebelumnya

4) Riwayat Kesehatan Keluarga

Kaji adanya keluarga yang menderita penyakit yang sama (penularan).

c. Pemeriksaan Fisik

1) Pengkajian umum

a) Tingkat kesadaran: composmentis, apatis, somnolen, supor, dan koma

b) Keadaan umum : sakit ringan, sedang, berat

c) Tanda-tanda vital, normalnya:

Tekanan darah : 95 mmHg

Nadi : 60-120 x/menit

Suhu : 34,7-37,3

Pernapasan : 15-26 x/menit

2. Pengkajian sistem tubuh

a. Pemeriksaan kulit dan rambut

Kaji nilai warna, turgor, tekstur dari kulit dan rambut pasien

b. Pemeriksaan kepala dan leher

Pemeriksaan mulai dari kepala, mata, hidung, telinga, mulut dan leher. Kaji kesimetrisan, edema, lesi, maupun gangguan pada indera

c. Pemeriksaan dada

1) Paru-paru

Inspeksi : kesimetrisan, gerak napas

Palpasi : kesimetrisan taktil fremitus

Perkusi : suara paru (pekak, redup, sono, hipersonor, timpani)

Auskultasi : suara paru

2) Jantung

Inspeksi : amati iktus cordis

Palpasi : raba letak iktus cordis

Perkusi : batas-batas jantung

Auskultasi : bunyi jantung

3) Pemeriksaan abdomen

Inspeksi : keadaan kulit, besar dan bentuk abdomen, gerakan

Palpasi : hati, limpha teraba/tidak, adanya nyeri tekan Perkusi : suara peristaltic usus

Auskultasi : frekuensi bising usus

4) Pemeriksaan ekstremitas

Kaji warna kulit, edema, kemampuan gerakan dan adanya alat bantu.

d. Pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan

- 1) Riwayat prenatal : ibu terinfeksi TORCH selama hamil, preeklamsi, BB ibu tidak naik, pemantauan kehamilan secara berkala. Kehamilan dengan resiko yang tidak dipantau secara berkala dapat mengganggu tumbanganak
- 2) Riwayat kelahiran : cara melahirkan anak, keadaan anak saat lahir, partus lamadan anak yang lahirdengan bantuan alat/ forcep dapat mengganggu tumbang kembang anak
- 3) Pertumbuhan fisik : BB (1,8-2,7kg), TB (BB/TB, BB/U, TB/U), lingkarkepala (49-50cm), LILA, lingkar dada, lingkar dada > dari lingkar kepala
- 4) pemeriksaan fisik : bentuk tubuh, keadaan jaringan otot (cubitan tebal untuk pada lengan atas, pantat dan juga paha mengetahui lemak subkutan), keadaan lemak (cubitan tipis pada kulit dibawah tricep dan subskapular), tebal/ tipis dan juga mudah / tidak akarnya dicabut, gigi (14- 16 biji), ada tidaknya udem, anemia dan gangguan lainnya.
- 5) Perkembangan : melakukan aktivitas secara mandiri (berpakaian), kemampuan anak berlari dengan seimbang, menangkap benda tanpa jatuh, memanjat, melompat, menaiki tangga,menendang bola dengan seimbang, egosentris dan menggunakan kata ” Saya”, menggambar lingkaran, mengerti

dengan kata kata, bertanya, mengungkapkan kebutuhan dan keinginan, menyusun jembatan dengan kotak –kotak.

- e. Riwayat imunisasi
- f. Riwayat sosial: bagaimana pasien berhubungan dengan orang lain.
- g. Tumbuh kembang

Pada anak usia 6-12 tahun Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran berbagai organ fisik berkaitan dengan masalah perubahan dalam jumlah, besar, ukuran atau dimensi tingkat sel. Pertambahan berat badan 2 – 4 Kg / tahun dan pada anak wanita sudah mulai mengembangkan ciri sex sekundernya.

- h. Perkembangan menitik beratkan pada aspek diferensiasi bentuk dan fungsi termasuk perubahan sosial dan emosi.

1) Motorik kasar

- a) Loncat tali
- b) Badminton
- c) Memukul

d) Motorik kasar di bawah kendali kognitif dan berdasarkan secara bertahap meningkatkan irama dan kehalusan

2) Motorik halus

- a) Menunjukkan keseimbangan dan koordinasi mata dan tangan
- b) Dapat meningkatkan kemampuan menjahit, membuat model dan bermain alat music

3) Kognitif

- a) Dapat berfokus pada lebih dan satu aspek dan situasi
- b) Dapat mempertimbangkan sejumlah alternatif dalam pemecahan masalah
- c) Dapat membelikan cara kerja dan melacak urutan kejadian kembali sejak awal
- d) Dapat memahami konsep dahulu, sekarang dan yang akan datang

4) Bahasa

- a) Mengerti kebanyakan kata-kata abstrak
- b) Memakai semua bagian pembicaraan termasuk kata sifat, kata keterangan, kata penghubung dan kata depan
- c) Menggunakan bahasa sebagai alat pertukaran verbal
- d) Dapat memakai kalimat majemuk dan gabungan

5) Pengkajian Pola Fungsional Gordon

- a) Pola persepsi kesehatan manajemen kesehatan

Yang perlu dikaji adalah bagaimana pola sehat – sejahtera yang dirasakan, pengetahuan tentang gaya hidup dan berhubungan dengan sehat, pengetahuan tentang praktik kesehatan preventif, ketaatan pada ketentuan media dan keperawatan. Biasanya anak-anak belum mengerti tentang manajemen kesehatan, sehingga perlu perhatian dari orang

- b) Pola nutrisi metabolik

Yang perlu dikaji adalah pola makan biasa dan masukan cairan pasien, tipe makanan dan cairan, peningkatan / penurunan berat badan, nafsu makan, pilihan makan.

c) Pola eliminasi

Yang perlu dikaji adalah pola defekasi pasien, berkemih, penggunaan alat bantu, penggunaan obat-obatan.

d) Pola aktivitas latihan

Yang perlu dikaji adalah pola aktivitas pasien, latihan dan rekreasi, kemampuan untuk mengusahakan aktivitas sehari-hari (merawat diri, bekerja), dan respon kardiovaskuler serta pernapasan saat melakukan aktivitas.

e) Pola istirahat tidur

Yang perlu dikaji adalah bagaimana pola tidur pasien selama 24 jam, bagaimana kualitas dan kuantitas tidur pasien, apa ada gangguan tidur dan penggunaan obat-obatan untuk mengatasi gangguan tidur.

f) Pola kognitif persepsi

Yang perlu dikaji adalah fungsi indra pasien dan kemampuan persepsi pasien.

g) Pola persepsi diri dan konsep diri

Yang perlu dikaji adalah bagaimana sikap pasien mengenai dirinya, persepsi pasien tentang kemampuannya, pola emosional, citra diri, identitas diri, ideal diri, harga diri dan

peran diri. Biasanya anak akan mengalami gangguan emosional seperti takut, cemas karena dirawat di RS.

h) Pola peran hubungan

Kaji kemampuan pasien dalam berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kemampuan dalam menjalankan perannya.

i) Pola reproduksi dan seksualitas Kaji adakah efek penyakit terhadap seksualitas anak.

j) Pola koping dan toleransi stress

Yang perlu dikaji adalah bagaimana kemampuan pasien dalam menghadapi stress dan juga adanya sumber pendukung. Anak belum mampu untuk mengatasi stress, sehingga sangat dibutuhkan peran dari keluarga terutama orangtua untuk selalu mendukung anak.

k) Pola nilai dan kepercayaan

Kaji bagaimana kepercayaan pasien. Biasanya anak-anak belum terlalu mengerti tentang kepercayaan yang dianut.

Anak-anak hanya mengikuti dari orang tua.

2.2.2 Diagnosis Keperawatan

Penilaian klinis mengenai respon pasien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialami baik secara aktual maupun potensial disebut sebagai diagnosis keperawatan. Diagnosa keperawatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi respons yang terjadi pada pasien terhadap situasi yang berhubungan dengan kesehatan (Awaludin *et al.*,

2018). adapun masalah keperawatan yng biasa muncul adalah (SDKI, 2017) :

1. Diagnosis 1 : Hipertermi

a. **Definisi** : Suhu tubuh meningkat diatas rentang normal tubuh

b. **Penyebab** :

- 1) dehidrasi,
- 2) terpapar lingkungan panas
- 3) proses penyakit (mis. penyakit, kanker
- 4) ketidaksesuaian pakaian dengan suhu lingkungan
- 5) peningkatan laju metabolisme
- 6) respon trauma
- 7) aktivitas berlebihan
- 8) penggunaan inkubator

c. Batasan Karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif
(tidak tersedia)

Objektif
suhu tubuh diatas nilai normal

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif
(tidak tersedia)

Objektif
kulit merah
kejang
takikardi
takipnea
kulit terasa panas

2. Diagnosis 2 : Nyeri Akut

a. **Defenisi** :Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan

b. Penyebab :

- 1) Agen pencedera fisiologis (mis. infarmasi, lakemia, neoplasma)
- 2) Agen pencedera kimiawi (mis. terbakar, bahan kimia iritan)
- 3) Agen pencedera fisik (mis.abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan).

c. Batasan Karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
1) Mengeluh nyeri	1) Tampak meringis 2) Bersikap protektif (mis. waspada, posisi menghindari nyeri) 3) Gelisah 4) Frekuensi nadi meningkat 5) Sulit tidur
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
(tidak tersedia)	(tidak tersedia)

3. Diagnosis 3 : Hipovolemi

a. **Defenisi** : peningkatan volume cairan intravascular, interstisial, dan atau intraseluler

b. Penyebab

- 1) Kehilangan cairan aktif
- 2) Kegagalan mekanisme regulasi
- 3) Peningkatan permeabilitas kapiler
- 4) Kekurangan intake cairan
- 5) Evaporasi

c. Batasan Karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

(Tidak tersedia)

Objektif

- 1) Frekuensi nadi meningkat
- 2) Nadi teraba lemah
- 3) Tekanan darah menurun
- 4) Tekanan Nadi menyempit
- 5) Turgor kulit menyempit
- 6) Membran mukosa kering
- 7) Voluem urin menurun
- 8) Hemoatokrit meningkat

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

- 1) Merasa lemah
- 2) Mengeluh haus

Objektif

- 1) Pengisian vena menurun
- 2) Status mental berubah
- 3) Suhu tubuh meningkat
- 4) Konsentrasi urin meningkat
- 5) Berat badan turun tiba-tiba

d. Kondisi Klinis terkait

1. Penyakit Addison
2. Trauma/pendarahan
3. Luka bakar

4. AIDS
5. Penyakit Crohn
6. Muntah
7. Diare
8. Kolitis ulseratif
9. Hipoalbuminemia

4. **Diagnosis 5 : Gangguan Pola Tidur**

- a. Defenisi : Gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal
- b. Penyebab :
 - 1) Hambatan lingkungan (mis. Kelembapan lingkungan sekitar, suhu lingkungan, pencahayaan, kebisingan, bau tidak sedap, jadwal pemantauan/pemeriksaan/tindakan
 - 2) Kurang kontrol tidur
 - 3) Kurang privasi
 - 4) Restraint fisik
 - 5) Ketiadaan teman tidur
 - 6) Tidak familiar dengan peralatan tidur

c. **Batasan Karakteristik**

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

1. Mengeluh sulit tidur
2. Mengeluh sering terjaga
3. Mengeluh tidak puas tidur
4. Mengeluh pola tidur berubah
5. Mengeluh istirahat tidak cukup

Objektif

(tidak tersedia)

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif	Objektif
1) Mengeluh kemampuan beraktivitas menurun	(tidak tersedia)

5. **Diagnosis 6 : Konstipasi**

a. **Defenisi** : penurunan defekasi normal yang disertai pengeluaran feses sulit dan tidak tuntas serta feses kering dan berminyak.

b. **Penyebab:**

Fisiologis

Faktor Risiko

1) Fisiologis

- a) Penurunan motilitas gastrointestinal
- b) Pertumbuhan gigi tidak adekuat
- c) Ketidacukupan diet
- d) Ketidacukupan asupan serat
- e) Ketidacukupan asupan cairan
- f) Aganglionik (mis. penyakit Hirschsprung)
- g) Kelemahan otot abdomen

2) Psikologis

- a) Konfusi
- b) Depresi
- c) Gangguan emosional

3) Situasional

- a) Perubahan kebiasaan makan (mis. jenis makanan, jadwal makan)
- b) Ketidakadekuatan toileting

- c) Aktivitas fisik harian kurang dari yang dianjurkan
- d) Penyalahgunaan laksatif
- e) Efek agen farmakologis
- f) Ketidakteraturan kebiasaan defekasi
- g) Kebiasaan menahan dorongan defekasi
- h) Perubahan lingkungan

c. Batasan Karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
1. (Defekasi kurang dari 2 kali seminggu	1) Feses keras
2. Pengeluaran feses lama dan sulit	2) Peristaltik usus meningkat
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
2) Mengejan saat defekasi	1) distensi abdomen
	2) kelemahan umum
	3) teraba massa pada rektal

2.2.3 Intervensi Keperawatan

NO	Diagnosis	Kriteria Hasil (SLKI, 2019)	Tindakan Keperawatan	Rasional
1	Hipertermi	Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan termogulasi membaik dengan Kriteria Hasil: 1) Menggigil menurun 2) Kulit merah menurun 3) Kejang menurun 4) Akrosianosis menurun 5) Konsumsi oksigen menurun 6) Piloereksi menurun 7) Vasokonstriksi perifer menurun 8) Kutis memorata menurun 9) Pucat menurun 10) Takikardi menurun 11) Takipnea menurun 12) Bradikardi menurun 13) Dasar kuku sianolik membaik 14) Hipoksia membaik 15) Suhu tubuh membaik 16) Suhu kulit membaik 17) Kadar glukosa darah membaik 18) Pengisian kapiler membaik 19) Ventilasi membaik 20) Tekanan darah membaik	Manajemen Hipertermia Observasi a. Identifikasi penyebab hipertermia (mis. dehidrasl, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator) b. Monitor suhu tubuh c. Monitor kadar elektrolit d. Monitor keluaran urine e. Monitor komplikasi akibat hipertermia Terapeutik a. Sediakan lingkungan yang dingin b. Longgarkan atau lepaskan pakaian c. Basahi dan kipasi permukaan tubuh d. Berikan cairan oral e. Ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis (keringat berlebih) f. Lakukan pendinginan eksternal (mis. selimut hipotermia atau kompras dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, aksila) g. Hindari pemberian antipiretik atau aspirin h. Berikan oksigen, jika perlu Edukasi Anjurkan tirah baring Kolaborasi Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu	a. Untuk mengetahui adanya tanda-tanda hipertermia b. Untuk mengetahui normal suhu tubuh c. Untuk mengetahui kadar elektrolit dalam tubuh d. Untuk mengetahui seberapa banyak urine keluar e. Untuk mengetahui terjadinya komplikasi a. Untuk menurunkan suhu tubuh pasien b. Agar pasien merasa lebih nyaman c. Untuk mrurunkan suhu tubuh d. Menyeimbangkan kebutuhan cairan e. Agar pasien merasa lebih nyaman f. Untuk menurunkan suhu tubuh g. Aspirin dan antipiretik dapat membuat jantung berdebar-debar h. Agar kadar oksigen dalam tubuh terpenuhi i. Meminimalisir kegiatan pasien j. Membantu menurunkan suhu tubuh dengan farmakologis

2 Nyeri Akut Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 x 24 jam, diharapkan Nyeri akut menurun dengan Kriteria hasil : a) Keluhan nyeri menurun b) Meringis menurun c) Sikap protektif menurun d) Gelisah menurun e) Frekuensi nadi membaik f) Kesulitan tidur menurun g) Tekanan darah membaik h) Pola napas membaik i) Nafsu makan membaik j) Proses berfikir membaik k) Menarik diri menurun l) Berfokus pada diri sendiri menurun Diaforesis menurun	Manajemen Nyeri Observasi a. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri b. Identifikasi skala nyeri c. Identifikasi respon nyeri non verbal d. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri e. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri f. Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri g. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup h. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan i. Monitor efek samping penggunaan analgetik Terapeutik a. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aroma terapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain) b. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) c. Fasilitasi istirahat dan tidur d. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri Edukasi a. Untuk mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri b. Untuk mengetahui skala nyeri c. Untuk mengetahui mimik wajah yang diperlihatkan pasien saat nyeri muncul d. Untuk mengetahui apa saja yang memperberat dan memperingan keadaan nyeri e. Untuk mengetahui pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri f. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya terhadap respon nyeri g. Untuk mengetahui pengaruh nyeri pada kualitas hidup h. Untuk mengetahui keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan i. Untuk mengetahui efek samping penggunaan analgetik j. Untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien k. Untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien dan memberikan kenyamanan l. Untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien m. Agar strategi yang diberikan bisa efektif dalam meredakan nyeri n. Untuk memberikan pemahaman agar pasien tidak gelisah saat nyeri timbul o. Untuk mengontrol mengatasi nyeri ketika nyeri muncul
---	---

		a. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri b. Jelaskan strategi meredakan nyeri c. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri d. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat e. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri	p. Untuk manajemen nyeri secara mandiri q. Penggunaan analgetik yang tepat dapat mengurangi rasa nyeri r. Untuk menghindari peningkatan nyeri s. Untuk membantu menekan rasa nyeri
		Kolaborasi	
		Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu	
3	Konstipasi	Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan eliminasi fekal membaik dengan Kriteria hasil : a. Kontrol pengeluaran feses Meningkat b. Keluhan defekasi lama dan sulit Mengejan saat defekasi menurun c. Distensi abdomen menurun d. Teraba massa pada rektal menurun e. Urgency menurun f. Nyeri abdomen menurun g. Kram abdomen menurun h. Konsistensi feses membaik i. Frekuensi defekasi membaik j. Peristaltik usus membaik	Manajemen Konstipasi Observasi a. Periksa tanda dan gejala konstipasi b. Periksa pergerakan usus c. karakteristik feses (konsistensi, bentuk, volume, dan warna) d. Identifikasi faktor risiko konstipasi (mis. obat-obatan, tirah baring, dan diet rendah serat) Terapeutik a. Anjurkan diet tinggi serat b. Lakukan masase abdomen, jika perlu Edukasi a. Anjurkan peningkatan asupan cairan, jika tidak ada kontraindikasi b. Latih buang air besar secara teratur Kolaborasi a. Untuk mencegah terjadinya konstipasi b. Mengetahui bising usus pasien c. Untuk mengetahui penyebab konstipasi d. Dapat melancarkan proses BAB e. Dapat melancarkan sistem pencernaan f. Untuk membantu melancarkan bab g. Memberikan pemahaman mengenai latihan BAB secara teratur h. Obat pencahar dapat membantu pasien dalam mengeluarkan feses

			a. Kolaborasi penggunaan obat pencahar, jika perlu	
4	Hipovolemia	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam diharapkan status cairan dapat membaik dengan Kriteria Hasil : - Turgor kulit membaik - Output urine membaik - Berat badan meningkat - Perasaan lemah menurun - Membran mukosa membaik - Kadar Hb membaik - Kadar Ht membaik - Suhu tubuh membaik	Manajemen hipovolemia Observasi a. Periksa tanda dan gejala hipovolemia (mis. Frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, hematokrit meningkat, haus, lemah) b. Monitor intake dan output cairan Terapeutik a. Hitung kebutuhan cairan b. Berikan asupan cairan c. Berikan posisi modified Trendelenburg Edukasi a. Anjurkan memperbanyak asupan cairan oral b. Anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak Kolaborasi: a. Kolaborasi pemberian cairan IV isotonic (mis. RL) b. Kolaborasi pemberian cairan IV hipotonis (mis.glukosa 2,5%, Nacl 0,4%) - Kolaborasi pemberian cairan koloid (mis.albumin, plasmaneta) c. Kolaborasi pemberian produk darah	a. Untuk mengetahui adanya gejala hipovolemia b. untuk mengetahui cairan yang masuk dan keluar dalam tubuh pasien untuk mengetahui kebutuhan cairan yang diperlukan oleh pasien d. dapat memperbaiki hemodinamik pasien dalam pemberian cairan e. agar pasien tidak merasa lemas f. dapat membantu pemenuhan cairan dalam tubuh pasien g. agar pasien tidak merasa lemas
5	Gangguan Pola Tidur	Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan pola tidur membaik dengan Kriteria hasil : e. Keluhan sulit tidur menurun f. Keluhan sering terjaga menurun	Dukungan Tidur Observasi a. Identifikasi pola aktivitas dan tidur b. Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik dan/ psikologis)	a. Untuk mengetahui pola aktivitas yang dilakukan pasien sebelum tidur b. Untuk mengidentifikasi faktor yang mengganggu tidur, agar bisa diantisipasi

g. Keluhan tidak puas tidur menurun	c. Identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur (mis. kopi, teh, alkohol, makan mendekati waktu tidur, minum banyak air sebelum tidur)	c. Untuk menghindari makanan yang dapat membuat pola tidur tidak efektif
h. Keluhan pola tidur berubah menurun	d. Identifikasi obat tidur yang dikonsumsi	d. Untuk meminimalisir gangguan tidur akibat obat-obatan yang dikonsumsi
i. Keluhan istirahat tidak cukup menurun	Terapeutik	e. Untuk dapat mendukung proses yang dapat mempercepat tidur
j. Kemampuan beraktivitas meningkat	a. Modifikasi lingkungan (mis. Pencahayaan, kebisingan, suhu, matras dan tempat tidur)	f. Agar malam hari bisa cepat tidur
	b. Batasi waktu tidur siang, jika perlu	g. Agar tidak memiliki beban pada saat tidur
	c. Fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur	h. Agar dapat menciptakan tidur yang efektif
	d. Tetapkan jadwal tidur rutin	i. Agar dapat meningkatkan kenyamanan dalam tidur
	e. Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (mis. Pijat, pengaturan posisi, terapi akupresur) - Sesuaikan jadwal pemberian obat dan/atau tindakan untuk menunjang siklus tidur terjaga	j. Agar proses pemberian obat tidak mengganggu proses tidur pasien
	Edukasi	k. Untuk mengedukasi pasien mengetahui pentingnya tidur
	a. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit - Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur	l. Agar jadwal tidur selalu terkontrol baik
	b. Anjurkan menghindari makanan/minuman yang mengganggu tidur	m. Agar tidak mengganggu waktu tidur
	c. Anjurkan penggunaan obat tidur yang tidak mengandung supresor terhadap tidur REM	n. Agar pasien mengetahui faktor-faktor yang memicu gangguan pola tidur
	d. Ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur (mis. psikologis, gaya hidup, sering berubah shift bekerja)	o. Agar mendapatkan kualitas tidur yang lebih nyaman
	e. Ajarkan relaksasi otot autogenik atau cara non farmakologi lainnya	

6	Defisit Nutrisi	Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan Kriteria hasil : a. Porsi makanan yang dihabiskan meningkat b. Kekuatan otot pengunyah meningkat c. Kekuatan otot menelan meningkat d. Serum albumin meningkat e. Verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat f. Pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat meningkat g. Pengetahuan tentang pilihan minuman yang sehat meningkat h. Pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat meningkat k. Penyiapan dan penyimpanan makanan yang aman meningkat l. Sikap terhadap makanan/minuman sesuai dengan tujuan kesehatan meningkat m. Perasaan cepat kenyang menurun n. Nyeri abdomen menurun o. Sariawan menurun p. Rambut rontok menurun q. Diare menurun r. Berat badan menurun s. Indeks Massa Tubuh (IMT) membaik t. Frekuensi makan membaik u. Nafsu makan membaik v. Bising usus membaik w. Tebal lipatan kulit trisep membaik	Manajemen Nutrisi	
			Observasi	
			a. Identifikasi alergi dan intoleransi makanan b. Identifikasi makanan yang disukai c. Identifikasi status nutrisi d. Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien e. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik f. Monitor asupan makanan g. Monitor berat badan h. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium	a. nutrisi berperan dalam penyediaan sumber energi, pengaturan metabolisme tubuh, dan membangun jaringan tubuh. b. Dengan konsultasi, kita dapat menentukan metode diet yang memenuhi asupan kalori dan nutrisi yang optimal. c. Faktor-faktor seperti nyeri, kelemahan, penggunaan analgesik, dan imobilitas dapat menyebabkan anorexia. d. Kondisi yang lemah lebih lanjut dapat menurunkan keinginan dan kemampuan pasien anorexia untuk makan.
			Terapeutik	
			a. Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu b. Fasilitasi menentukan pedoman diet (mis. piramida makanan) c. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai d. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi e. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein f. Hentikan pemberian makan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi g. Berikan suplemen makanan, jika perlu	e. Distribusi total asupan kalori yang merata sepanjang hari membantu mencegah distensi lambung sehingga selera makan mungkin akan meningkat. f. Pembatasan asupan cairan saat makan membantu mencegah distensi lambung. g. Kurangnya kebersihan mulut menyebabkan bau tidak sedap dan menurunkan nafsu makan h. Menyediakan makanan TKTTP saat lapar memungkinkan pasien mengkonsumsi kalori dan protein yang adekuat.
			Edukasi	
			a. Anjurkan posisi duduk, jika mampu b. Ajarkan diet yang diprogramkan	

x. Membran mukosa membaik

Kolaborasi

- c. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan (mis. pereda nyeri, antilemetik), jika perlu
 - d. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan, jika perlu
-

2.2.4 Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan

1. Konsep Utama

Menurut Risnah & muhammad (2021), terdapat 4 konsep pokok berdasarkan konsep Levine:

- a. Orang, merupakan makhluk holistik yang terus berusaha meningkatkan keutuhan atau integritas dan satu “yang hidup, berpikir, berorientasi masa depan, dan sadar pada masa lalu”.
- b. Lingkungan, keutuhan individu dapat dilengkapi oleh lingkungan. Lingkungan dibagi menjadi 2 di antaranya: lingkungan internal dan eksternal, lingkungan internal merupakan sebuah integrasi pada sebuah kegunaan tubuh yang serupa dengan homeorhesis dibandingkan dengan homeostasis, serta merupakan bentuk energi yang patuh dengan tantangan dari lingkungan eksternal, sedangkan lingkungan persepsi, operasional, dan konseptual merupakan bagian dari lingkungan eksternal.
- c. Kesehatan, suatu persatuan dan kesatuan dan “merupakan adaptasi sebuah keutuhan dan kesuksesan” diartikan sebagai sebuah kesehatan tersirat. Meningkatkan kesehatan merupakan salah satu dari tujuan keperawatan. Levine mengemukakan pemahaman tentang arti kesehatan sebagai: "jalan kembali ke kegiatan sehari-hari yang dikompromikan oleh kesehatan yang buruk. Hal ini tidak hanya penghinaan atau cedera yang diperbaiki tetapi oleh dirinya sendiri. Ini bukan hanya penyembuhan bagian tertindas. Ini agak kembali ke

diri sendiri, dimana dapat menyisihkan perambahan kecacatan dan individu bebas tanpa kendala untuk mengejar sekali lagi atau kepentingannya sendiri".

Perawatan, mempromosikan adaptasi dan memelihara keutuhan (kesehatan) merupakan salah satu dari tujuan keperawatan. Telah dipaparkan sebelumnya, cara dimana orang dan lingkungan menjadi kongruen dari waktu ke waktu merupakan pembahasan dari Levine yaitu Model Konservasi. Hal itu merupakan pemahaman bahwa adanya kesulitan pada waktu dan ruang memungkinkan terjadinya berbagai tingkatan molekul, fisiologis, emosi, psikologis dan sosial merupakan hasil dari konservasi yang merupakan respon adaptif spesifik. ada tiga faktor yang mendasari pendapat diatas di antaranya historisitas, spesifisitas dan redundansi

2. Konsep Dasar Model Konservasi Levine

Teorinya memaparkan bahwa seorang klien adalah makhluk hidup yang mengalami integrasi dan saling melakukan interaksi serta dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, Levine juga mengatakan bahwa intervensi keperawatan adalah bagian dari aktivitas konservasi, pertimbangan sehat tidaknya seseorang dapat dilihat pada konservasi energinya. Pada model konservasi Levine, menggunakan prinsip bahwa kesehatan dan penyembuhan klien berfokus pada pelestarian energinya. Berikut ini dipaparkan empat prinsip konservasi yang telah diterapkan Levien pada model konservasi keperawatan.

- a. Konservasi energi, keseimbangan energi pada makhluk individu sangat dibutuhkan, selain itu memperbarui energi secara terus menerus juga dilakukan agar dapat terus meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk itu, konservasi energi sangat perlu digunakan selama praktek keperawatan.
- b. Konservasi integritas struktur, sebuah proses pergantian yang bersumber pada integritas struktur disebut penyembuhan. Perubahan fungsi dan intervensi sangat dibutuhkan untuk dipahami oleh perawat agar dapat memberi batasan pada jumlah jaringan yang terlibat dengan penyakit.
- c. Konservasi integritas personal, seorang pasien yang dipanggil dengan menyebut namanya akan dapat terlihat lebih dihargai oleh perawat. Proses nilai personal yang memberikan privasi terhadap klien selama perawatan dapat diartikan sebagai sikap menghargai.
- d. Konservasi integritas sosial, kehidupan dapat dipahami sebagai interaksi sosial yang ada dalam kehidupan, sedangkan kesehatan adalah keadaan sosial yang telah ditentukan. Untuk itu, peran perawat dibutuhkan agar dapat memberikan kebutuhan yang diperlukan sebuah keluarga, kehidupan religious dan hubungan interpersonal untuk konservasi integritas sosial juga harus diperhatikan.

3. Konsep Utama Dari Model Konservasi

- a. *Wholeness* (keutuhan), Levine menyatakan bahwa “interaksi terus-menerus dari organisme individu dengan lingkungannya merupakan sistem yang ‘terbuka dan cair’, Erikson dalam Levine mengatakan bahwa” sistem terbuka dianggap sebagai *wholeness* yaitu keutuhan yang menekankan pada suara, organik, mutualitas progresif antara fungsi yang beragam dan bagian-bagian dalam keseluruhan serta batas-batas yang terbuka”
- b. Adaptasi, adalah suatu proses yang dihadapi oleh individu untuk mempertahankan integritas individual terhadap lingkungan baru yang mereka hadapi baik dari segi eksternal maupun internalnya adapun hasil dari adaptasi disebut dengan konservasi. Secara umum, adaptasi yang dilakukan oleh individu dapat dianggap baik dan berhasil.
- c. Lingkungan, menurut pandangan Levine, setiap individu mempunyai kehidupannya masing-masing baik pada lingkungan internal maupun pada lingkungan eksternal.
- d. Respon organisme, merupakan suatu hal yang dilakukan oleh individu dalam beradaptasi dengan lingkungannya, yang terdiri dari *fight* atau *flight*, respon inflamasi, respon terhadap stress, serta kewaspadaan persepsi.

4. Aplikasi dalam keperawatan

- a. Pengkajian, penggunaan prinsip konservasi dapat digunakan untuk

mengumpulkan data provokasi dengan metode observasi dan wawancara. Perawat melakukan observasi dengan mengamati penyakit dengan melihat respon organisme, menganalisa catatan medis, evaluasi hasil diagnosa serta melakukan interaksi dengan pasien terhadap keutuhannya. Hal ini dilakukan melalui prinsip konservasi perawat dengan melakukan pengkajian terhadap lingkungan eksternal serta lingkungan internal pada pasien. Berikut beberapa faktor provokasi yang dapat dikaji oleh perawat: adanya keseimbangan terhadap suplay energi yang dibutuhkan, sistem pertahanan tubuh, harga diri, keseimbangan suplai dan kebutuhan energi, sistem pertahanan tubuh, harga diri, kesiapan seseorang dalam berpartisipasi dalam sosial system

- b. Keputusan Tropihicognosis, tropihicognosis merupakan istilah lain dalam pengambilan keputusan tersebut. Pada diagnosa keperawatan fakta provokatif sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Fakta provaktif menunjukkan segala hal kemungkinan yang terjadi pada pasien dan disusun sedemikian rupa. Dari hal tersebut akan diambil sebuah keputusan terkait pertolongan apa saja yang harus diberikan kepada pasien.
- c. Hipotesis, hal ini merupakan salah satu dari rencana keperawatan yang membantu dalam memenuhi suatu kebutuhan dan promosi adaptasi dengan tujuan mengarahkan intervensi keperawatan terkait masalah yang terjadi pada pasien, kemudian memaparkan

tentang hipotesis yang diambil terkait masalah serta memberikan solusi.

- d. Intervensi, ini akan dilakukan berdasarkan pedoman konservasi. Beberapa prinsip konservasi yang diterapkan selama intervensi diantaranya konservasi struktur, energi, personal dan sosial. Pada pendekatan ini dituntut agar dapat menjaga keutuhan dan promosi adaptasi.
- e. Evaluasi, merupakan tindakan observasi yang dilakukan pada respon individu terhadap hasil intervensi yang telah diberikan tujuannya untuk melakukan kajian terhadap respon individu terkait hipotesis yang telah dilakukan berhasil atau tidak.

5. Hubungan Teori Levine dengan Studi Kasus

Melalui asuhan keperawatan berdasarkan model konservasi levine, kebutuhan proses pemulihan dan tumbuh kembang pada anak dapat difasilitasi secara holistik. Model konservasi levine merupakan model praktik keperawatan yang berfokus pada pemeliharaan energi untuk mengoptimalkan proses penyembuhan dan pertumbuhan anak (Kurniawan *et al.*, 2017)

Teori Levine dalam konservasi integritas struktur, sebuah proses pergantian yang bersumber pada integritas struktur disebut penyembuhan. Perubahan fungsi dan intervensi sangat dibutuhkan untuk dipahami oleh perawat agar dapat memberi batasan pada jumlah jaringan yang terlibat dengan penyakit sehingga sebagai perawat perlu

untuk memberikan intervensi dalam mengurangi hipertermi pada anak seperti memberikan intervensi kompres *tepid sponge water*. (Risnah & Irwan, 2021).

2.2.5 Evidence Based Practice In Nursing

1. Pengertian

Kompres *tepid sponge water* adalah sebuah teknik kompres hangat yang menggabungkan teknik kompres blok pada pembuluh darah supervisial dengan teknik seka. Kompres tepid sponge ini hampir sama dengan kompres air hangat biasa, akan tetapi terdapat perbedaan dari keduanya yakni *Tepid sponge water* mengompres pada lima titik (leher, 2 ketiak, 2 pangkal paha) ditambah menyeka bagian perut dan dada atau diseluruh badan dengan kain. Basahi lagi kain bila kering. Tepid sponge merupakan kombinasi teknik blok dengan seka. Teknik ini menggunakan kompres blok tidak hanya disatu tempat saja, melainkan langsung dibeberapa tempat yang memiliki pembuluh darah besar. Suhu yang digunakan untuk airnya yaitu 30-35°C, untuk pelaksanaannya dilakukan dalam kurung waktu 15-20 menit. Pada saat pemberian tepid water sponge otak akan menyangka bahwa suhu diluar panas, sehingga otak akan segera memproduksi dingin dan terjadilah penurunan suhu tubuh (Mulyani, 2020).

Teknik kompres tepid water sponge lebih cepat memberikan rangsangan atau sinyal ke hipotalamus melalui sumsum tulang belakang. Ketika reseptor yang peka terhadap panas di hipotalamus

dirangsang, sistem efektor mengeluarkan sinyal melalui berkeringat dan vasodilatasi perifer. Perubahan pembuluh darah diatur oleh pusat vasometer pada medulla oblongata dari tangkai otak di bawah pengaruh hipotalamus bagian anterior sehingga terjadi vasodilatasi. Dengan terjadinya vasodilatasi ini menyebabkan pembuangan atau kehilangan energi panas melalui kulit meningkat (yang ditandai dengan tubuh mengeluarkan keringat), kemudian suhu tubuh dapat menurun atau normal (Rahayu & Muhsinin, 2022).

2. Tujuan

Adapun tujuan dari terapi *Tepid sponge water* yaitu:

- a. Menurunkan suhu tubuh
- b. Melancarkan sirkulasi darah
- c. Memberikan rasa hangat, nyaman pada pasien
- d. Mengurangi nyeri (Irlianti *et al.*, 2021)

3. Indikasi

- a. Pasien yang mengalami demam $>37,5^{\circ}\text{C}$ (Suntari *et al.*, 2019)

4. Kontraindikasi

- a. Terdapat luka pada daerah yang akan dilakukan kompres
- b. Pasien yang mengalami komplikasi dari penyakit seperti kejam demam, menggigil.

5. Prosedur Intervensi pemberian dan rasionalisasi

- a. Cuci tangan
- b. Identifikasi pasien

- c. Jelaskan pada pasien dan keluarga prosedur tindakan yang akan dilakukan
- d. Atur posisi pasien senyaman mungkin
- e. Ukur suhu tubuh pasien sebelum dilakukan tindakan intervensi
Tepid sponge water
- f. Cuci tangan kemudian masukan washlap/kain kasa kedalam kom/baskom yang berisi air hangat lalu peras sampai lembab
- g. Letakkan washlab/kain kasa tersebut pada area yang akan dikompres yaitu pada dahi, axila, lipatan paha, dan diusapkan keseluruh tubuh
- h. Lakukan kompres selama 15-20 menit
- i. Kemudian ganti washlab/kain kasa yang sudah terpakai dan rendam kembali kedalam air hangat
- j. Ulangi prosedur intervensi sampai suhu tubuh menurun
- k. Rapikan pasien dan bereskan alat
- l. Cuci tangan kembali
- m. Kemudia ukur suhu tubuh pasien setelah 15-20 menit pemberian kompres *Tepid sponge water*. (Agustina *et al.*, 2021).

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

2.1 Rancangan Studi Kasus

Studi kasus merupakan obyek penelitian yang menjelaskan, memahami dan mengeksplorasi suatu sistem secara metodologis tentang peristiwa (event) yang terjadi berkembang dalam obyek penelitian. Studi kasus analisisnya berupa pembuatan deskripsi detail tentang kasus tersebut dan settingnya. Jika kasus tersebut menyajikan kronologi peristiwa, direkomendasikan untuk menganalisis beragam sumber data untuk menentukan bukti pada tiap langkah atau fase dalam evolusi kasus menentukan bukti pada tiap langkah atau fase dalam evolusi kasus tersebut. Lebih lanjut, masalah setting atau lingkungan sangat penting. (Prihatsanti *et al.*, 2018)

Studi kasus merupakan penelitian mendalam tentang masalah penelitian tertentu, bukan survey statistik atau pertanyaan komparatif. Studi kasus bagian dari metode penelitian yang memberikan kerangka tertentu pada tahapan prosesnya dengan menentukan tema dan subjek penelitian, menentukan tempat, menentukan metode yang akurat, menentukan teknik pengumpulan data yang relevan, menganalisis hasil data, membuat kesimpulan dan laporan dari penelitian. (Nurdin, 2019)

2.2 Subjek Studi Kasus

Subjek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah anak yang mengalami typhoid dengan masalah keperawatan Hipertermia.

2.3 Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus ini adalah melakukan asuhan keperawatan terhadap masalah yang dikaji secara mendalam yaitu asuhan keperawatan prioritas masalah Hipertermia melalui intervensi terapi *Tepid sponge water* untuk menurunkan demam pada anak.

2.4 Instrumen Studi Kasus

Alat dan instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian adalah format asuhan keperawatan (pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi), alat perlindungan diri (*handscoon* dan masker), baby oil/minyak telon yang digunakan untuk pijat, serta alat pemeriksaan fisik (termometer, arloji dengan detik).

1. Format pengkajian keperawatan terdiri dari: identitas pasien, identifikasi penanggung jawab, riwayat kesehatan, kebutuhan dasar, pemeriksaan fisik, data psikologis, data ekonomi sosial, data spritual, lingkungan tempat tinggal, pemeriksaan laboratorium dan program pengobatan.
2. Format analisa data terdiri: nama pasien, data, masalah dan etiologi.
3. Format diagnosa keperawatan terdiri dari: diagnosis keperawatan, faktor penyebab dan tanda dan gejala berdasarkan buku SDKI
4. Format intervensi asuhan keperawatan terdiri dari: diagnosis keperawatan, Luaran kepearawatan berdasarkan buku SLKI, intervensi keperawatan berdasarkan buku SIKI. Dan rasional setiap tindakan

5. Format implementasi keperawatan terdiri dari: nomor diagnosis, hari, tanggal dan jam, implementasi keperawatan, dan paraf yang dilakukan implementasi keperawatan.
6. Format evaluasi keperawatan terdiri dari : hari dan tanggal, diagnosis keperawatan, evaluasi keperawatan, dan paraf yang melakukan tindakan evaluasi keperawatan

2.5 Prosedur Pengambilan Data

Proses dalam melakukan studi kasus ini terdiri dari beberapa tahap antara lain persiapan dengan konsultasi kasus kemudian dilakukan pengumpulan data dengan wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi dan kemudian dilakukan penyusunan laporan studi kasus.

2.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Penelitian ini dilakukan di Ruang perawatan Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 Juli 2022.

2.7 Analisa Data dan Penyajian Data

Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subyek studi kasus yaitu dengan menggunakan lima proses keperawatan dalam hal ini pengkajian, diagnosis, intervensi dan evaluasi keperawatan, pengolahan data yang sudah didapatkan dari hasil pengkajian dari proses wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi kemudian memasukan data yang telah didapatkan kedalam tabel analisa data.

Diagnosis keperawatan ditentukan sesuai dengan keadaan pasien berdasarkan Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, menentukan rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan menentukan kriteria hasil yang ditetapkan berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia kemudian melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana yang ditetapkan dan yang terakhir mengevaluasi respon pasien menggunakan format SOAP setelah dilakukan tindakan khususnya pemberian terapi Pijat pada pasien, penyajian data disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan serta menggambarkan bagaimana hasil pengkajian sampai dengan evaluasi.

2.8 Etika Studi Kasus

Etika merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan terutama saat penelitian, dikarenakan penelitian keperawatan ini berhubungan langsung dengan manusia, menurut Hidayat (2019), etika penelitian yang harus diperhatikan yaitu:

1. *Informed consent* (persetujuan)

Informed consent merupakan suatu bentuk persetujuan antara peneliti dan responden dengan memberikan lembar persetujuan sebelum dilakukan penelitian terhadap responden, *informed consent* ini bertujuan agar responden mengetahui maksud dan tujuan dilakukan suatu penelitian atau tindakan dan mengetahui dampaknya, dalam studi kasus ini penulis telah mendapat persetujuan pasien untuk diberikan tindakan serta menjelaskan maksud dan tujuan dari prosedur yang diberikan.

2. *Anonimity* (Tidak menyebutkan nama)

Anonimity ini berhubungan dalam menyebutkan nama responden dimana didalamnya tidak diperbolehkan mencantumkan nama responden pada pendokumentasian, cukup dengan menuliskan kode atau inisial nama pasien pada lembar dokumentasi penelitian yang akan disajikan.

3. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Confidentiality berhubungan dengan jaminan kerahasiaan hasil penelitian baik dari informasi/respon maupun masalah-masalah yang didapatkan pada penelitian, hanya kelompok atau data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil penelitian.

BAB IV

LAPORAN KASUS

4.1 Asuhan Keperawatan

4.1.1 Pengkajian

1. Biodata

a. Identitas pasien :

- 1) Nama / Nama Panggilan : An. M
- 2) Tempat tgl lahir/usia : Sungguminasa, 29/06/2016
- 3) Jenis kelamin : Perempuan
- 4) Agama : Islam
- 5) Pendidikan :
- 6) Alamat : Borong Kaluku
- 7) Tanggal masuk : 10/07/2022
- 8) Tanggal pengkajian : 11/07/2022
- 9) Diagnosa medik : Typhoid

b. Identitas orang tua

1) Ayah :

- a) Nama : Tn. A
- b) Usia : 35 Tahun
- c) Pendidikan : SMA
- d) Pekerjaan : Wiraswasta
- e) Agama : Islam
- f) Alamat : BorongkalukuIbu

- a) Nama :Ny. H
- b) Usia :32 tahun
- c) Pendidikan :Islam
- d) Pekerjaan :IRT
- e) Agama :Islam
- f) Alamat :Borongkaluku

c. Identitas saudara kandung

No	Saudara kandung	Usia	Hubungan	Status kesehatan
1.	Irsan	4	Kandung	Sehat
2.	Nurain	2	Kandung	Sehat

1. Keluhan utama / alasan masuk rumah sakit :

Ibu pasien mengatakan anaknya demam disertai nyeri kepala

2. Riwayat kesehatan :

a. Kesehatan sekarang :

Ibu pasien mengatakan anaknya demam hari ke 4 diantar kerumah sakit yang disertai mual, sakit perut, dan menggigil, ibu pasien mengatakan demam anaknya memberat pada malam hari. Pasien tampak gelisah, dan tampak menggigil, ibu pasien mengatakan anaknya selalu terbangun pada malam hari karena suhu ruangan yang terlalu dingin, serta pasien ibu pasien mengeluh anaknya terbangun karena nyeri kepala sehingga sulit untuk tidur kembali. Serta ibu pasien mengatakan anaknya kurang nafsu makan, porsi makan anaknya tidak dihabiskan hanya makan 1-2 sendok makan saja, serta makan hanya sesuai keinginannya.

b. Riwayat kesehatan lalu

(khusus untuk anak usia 0-5 tahun)

1) Prenatal care

- a) Pemeriksaan kehamilan: $\pm$ 8 kali di Puskesmas Bontomarannu
- b) Keluhan selama hamil : Ibu pasien mengatakan selama awal kehamilan ia mengalami mual dan terkadang sampai muntah
- c) Riwayat terkena sinar : tidak pernah terapi obat: tidak ada
- d) Kenaikan BB selama hamil : 5 kg
- e) Imunisasi TT : 1 kali
- f) Golongan darah ibu : B golongan darah ayah : A

2) Natal

- a) Tempat melahirkan : $\checkmark$ RS Syekh Yusuf
- b) Lama dan jenis persalinan : $\checkmark$ Persalinan Normal
- c) Penolong persalinan : $\checkmark$ Dokter
- d) Cara untuk memudahkan persalinan : $\checkmark$ obat perangsang 1 kali
- e) Komplikasi waktu lahir : Ibu pasien mengatakan tidak ada robekan perineum, tidak ada infeksi nifas

3) Post natal

- a) Kondisi bayi : BB lahir : 2.800 gram, PB : 45 cm
- b) Apakah anak mengalami : penyakit kuning : (-), kebiruan : (-), kemerahan: (-), problem menyusui: (-), BB tidak stabil: (-)


Untuk semua usia

- 1) Penyakit yang pernah dialami : (batuk ✓ /demam ✓/ diare/ kejang/
lain-lain) : Ibu pasien mengatakan anaknya pernah mengalami demam
demam sejak umur 1 tahun
- 2) Kecelakaan yang pernah dialami: Ibu pasien mengatakan anaknya
tidak pernah mengalami kecelakaan sebelumnya
- 3) Pernah elergi: makanan (-), /obat-obatan(-), /zat (-), /substansi kimia(-),
/ tekstil(-).
- 4) Konsumsi obat-obatan bebas : (-)
- 5) Perkembangan anak dibanding saudara-saudaranya : (-)
(lambat/sama/cepat)

c. Riwayat kesehatan keluarga

- 1) Penyakit anggota keluarga: alergi (-), asma(-), TBC (-), Hipertensi(-),
penyakit jantung(-), stroke(-), anemia (-), hemophilia(-), artritis (-),
migraine (-), DM (✓), kanker (-) , jiwa (-)/

2) Genogram



Keterangan :

□ : laki-laki | : garis keturunan - - - - - : garis serumah

○ : perempuan — : garis pernikahan

↗ : pasien ? : umur yang tidak diketahui

GI : ibu pasien mengatakan orangtuanya sudah meninggal, dan tidak memiliki riwayat penyakit keturunan, sama seperti bapak pasien, orangtuanya sudah meninggal tanpa sebab yang diketahui dan tidak memiliki riwayat keturunan

GII : Ibu Pasien mengatakan saudaranya dan saudara suaminya tidak memiliki riwayat penyakit keturunan/menular

GIII : Ibu Pasien mengatakan bahwa pasien anak pertama

3) Riwayat imunisasi

No	Jenis imunisasi	Usia pemberian	Reaksi setelah pemberian
1	BCG	1 bulan	Lebam bekas suntik
2	DPT (I, II, III)	2,3,4 bulan	Demam Ringan
3	Polio (I, II, III, IV)	2,3,4 bulan	Bengkak bekas suntik
4	Campak	9 bulan	Demam ringan
5	Hepatitis	Newborn	Demam

3. Riwayat tumbuh kembang

a. Pertumbuhan fisik

- 1) Berat badan : Sebelum sakit 23 kg setelah sakit 21,4 kg
- 2) Tinggi badan : 114 cm
- 3) IMT : Sebelum sakit 17, 7 setelah sakit 15,4
- 4) Waktu tumbuh gigi : 10 bulan

b. Perkembangan tiap tahap usia anak saat ini

- 1) Berguling :6 bulan
- 2) Duduk :9 bulan
- 3) Merangkap :10 Bulan
- 4) Berdiri :12 Bulan
- 5) Berjalan :13 Bulan
- 6) Senyum kepada orang lain pertama kali :6 bulan
- 7) Bicara pertama kali :8 bulan
- 8) Berpakaian tanpa bantuan :Umur 4 tahun

4. Riwayat Nutrisi

a. Pemberian ASI

- 1) Pertama kali disusui :Ibu pasien mengatakan memberikan ASI sejak lahir
- 2) Cara pemberian :Ibu pasien mengatakan dengan menyusui anaknya
- 3) Lama pemberian :Ibu pasien mengatakan hanya sampai 1 tahun 11 bulan

b. Pemberian susu formula

- 1) Alasan pemberian : Ibu pasien mengatakan memberikan susu formula karena anaknya sudah tidak mau ASI
- 2) Jumlah pemberian : Ibu pasien mengatakan susu formula sampai usia 5 tahun
- 3) Cara pemberian : ibu pasien mengatakan menggunakan dot

c. Pola perubahan nutrisi tiap tahap usia sampai nutrisi saat ini

Usia	Jenis nutrisi	Lama pemberian
0-4 bulan	ASI	Usia 1 tahun 11 Bulan
4-12 bulan	Bubur SUN , ASI	Usian 1 tahun 11 bulan
Saat ini	Nasi, Susu	Sampai sekarang

5. Riwayat psikososial

- a. Anak tinggal serumah di : Ibu pasien mengatakan anaknya tinggal bersamanya dan ayahnya serta adaik-adiknya
- b. Lingkungan berada di : Ibu pasien mengatakan di setengah kota, rumahnya berdekatan dengan sekolah dan terdapat beberapa warung didekat rumahnya, anaknya sering jajan sembarangan dan makanan jajanannya dimakan tanpa mencuci tangan, ibu pasien mengatakan anaknya sering main diluar rumah,
- c. Apakah rumah : dekat dengan sekolah: iya, memiliki ruang bermain: : tidak ada, memiliki kamar tidur sendiri : tidak ada
- d. Apakah ada tangga yang bisa membahayakan anak : Ibu pasien mengatakan rumahnya merupakan rumah batu permanen lantai 1 dan tidak memiliki tangga
- e. Hubungan antar anggota keluarga: Ibu pasien mengatakan harmonis
- f. Pengasuh anak : Ibu pasien mengatakan ia mengasuh anaknya sendiri tapi terkadang juga diasuh oleh neneknya

6. Riwayat spiritual

- a. Support sistem dalam keluarga : Ibu pasien mengatakan support sistem anaknya adalah kedua orangtuanya
- b. Kegiatan keagamaan : Ibu pasien mengatakan anaknya sering kali mengikuti kegiatan mengaji didekat rumahnya, akan tetapi saat sakit kegiatan spiritual sudah tidak dilakukan lagi

7. Reaksi hospitalisasi

a. Keluarga tentang sakit dan rawat inap

- 1) Mengapa ibu membawa anaknya ke RS : Ibu pasien mengatakan anaknya demam hari ke 4 diantar kerumah sakit yang disertai mual, sakit perut, dan menggigil. Pasien tampak gelisah, dan tampak menggigil, ibu pasien mengatakan anaknya selalu terbangun pada malam hari karena suhu ruangan yang terlalu dingin, serta pasien ibu pasien mengeluh anaknya terbangun karena nyeri kepala sehingga sulit untuk tidur kembali. Serta ibu pasien mengatakan anaknya kurang nafsu makan, porsi makan anaknya tidak dihabiskan hanya makan 1-2 sendok makan saja, serta makan hanya sesuai keinginannya.
- 2) Apakah dokter menceritakan tentang kondisi anak : ibu pasien mengatakan dokter menjelaskan tentang penyakit yang dialami anaknya, dokter mengatakan penyakit yang dialami anaknya bisa saja karena faktor lingkungannya
- 3) Bagaimana perasaan orang tua saat ini : Ibu pasien mengatakan ia merasa cemas tentang penyakit yang dialami anaknya, serta ibu pasien

mengatakan merasa cemas karena memikirkan anak bungsunya yang masih berusia 1 tahun ditinggal dirumah karena ibunya harus menjaga pasien An. M dirumah sakit.

- 4) Apakah orang tua akan selalu berkunjung : Ibu pasien mengatakan suami yang selalu berkunjung kerumah sakit untuk menanyakan kondisi anaknya.
 - 5) Siapa yang akan tinggal dengan anak : Ibu pasien mengatakan anaknya tinggal bersamanya dan ayah serta adik-adiknya
- b. Pengalaman anak tentang sakit dan rawat inap
- 1) Mengapa keluarga/ orang tua membawa kamu ke RS : Pasien mengataka ia dibawa ke rumah sakit karena ia mengalami demam dan sakit kepala
 - 2) Menurutmu apa penyebab kamu sakit : Pasien mengatakan ia tidak tau
 - 3) Apakah dokter menceritakan keadaanmu : Pasien mengatakan iya, dokter mengatakan bisa saja penyebab dari penyakitnya karena faktor lingkungannya dan makan makanan sembarangan, serta jarang mencuci tangan.
 - 4) Bagaimana rasanya dirawat di RS : Pasien mengatakan ia merasa bosan dan tidak sabar ingin cepat keluar dari rumah sakit

8. Aktivitas sehari-hari

a. Nutrisi

Kondisi	Sebelum sakit	Saat ini
1) Selera makan	Nafsu makan baik	Menurun karena tidak mau makan
2) Menu makan	Nasi, Ikan, Sayur	Bubur
3) Frekuensi makanan	3 x sehari	Sesuai keinginan anak
4) Makanan pantangan	Tidak ada	Tidak ada
5) Pembatasan pola makan	Tidak ada	Tidak ada
6) Cara makan	Sendiri	Disuapi ibu
7) Ritual saat makan	Berdo'a sebelum makan	Tidak pernah berdo'a

b. Cairan

Kondisi	Sebelum sakit	Saat ini
a. jenis minuman	Air putih	Air putih 6-8 gelas perhari
b. Frekuensi minuman	6-8 gelas sehari	Tercukupi/terpasang infus RL
c. Kebutuhan cairan	Tercukupi	Minuman+Cairan RL
d. Cara pemenuhan	Melalui oral	

c. Eliminasi BAB dan BAK

Kondisi	Sebelum sakit	Saat ini
BAB (Buang air besar)		
a. Tempat pembuangan	Toilet	Belum pernah BAB
b. Frekuensi (waktu)	± 1 kali sehari	Belum pernah BAB
c. konsistensi	Kuning, lembek	Tidak ada
d. kesulitan	Tidak ada	Tidak ada kesulitan
e. obat pencahar	Tidak ada	Tidak ada
BAK (Buang air kecil)		
a. Tempat pembuangan	Toilet	Popok
b. Frekuensi	BAK 5-6 kali sehari	Sedikit pekat
c. Warna dan bau urine	Kuning dan bau khas urine	Kuning, bau khas
d. Volume	Tidak ada	Tidak ada
e. Kesulitan		

d. Istirahat tidur

Kondisi	Sebelum sakit	Saat ini
a. jam tidur		
1) siang	Paisen tidur siang jam 13-15:30	Tidur siang pasien tidak menentu Pasien
2) malam	Pasien tidur malam jam 20:30-06:00	tidur malam pukul 24:00 sering terbangun pukul 02:00
b. pola tidur	Tidur jam 20:300	Tidak teratur
c. kebiasaan sebelum tidur	Selalu berdo'a sebelum tidu	Tidak ada
d. kesulitan tidur	Tidak ada kesulitan	Kesulitan tidur, sering terbangun

e. Olahraga

Kondisi	Sebelum sakit	Saat ini
a. program olahraga	Senam saat disekolah	Tidak ada
b. jenis dan frekuensi	Senam, kadang dilakukan	
c. kondisi setelah olahraga	1x selama seminggu Badan terasanya nyaman	Tidak ada
		Tidak pernah olahraga

f. Personal Hygiene

Kondisi	Sebelum sakit	Saat ini
a. mandi		
1) cara	Mandi sendiri	Washlap
2) frekuensi	2 kali sehari	2 kali sehari
3) alat mandi	Sabun , sampo,	Washlap/tissue basah
b. cuci rambut	3 kali seminggu	Belum pernah cuci rambut
1) frekuensi	Menggunakan	
2) cara	sampo	
c. gunting kuku	Setiap kali panjang	Ibu pasien mengatakan ia mengguntingkan kuku anaknya
1) frekuensi	Dipotong sendiri	1x selama sakit
2) cara		Gosok gigi dibantu ibunya
d. gosok gigi	Sebelum tidur dan sebelum mandi pagi	
1) frekuensi		
2) cara		

g. Aktivitas/ mobilitas fisik

Kondisi	Sebelum sakit	Saat ini
a. kegiatan sehari-hari	Bersekolah dan bermain	Tidak ada
b. pengaturan jadwal harian	Tidak ada	Tidak ada
c. penggunaan alat bantu aktivitas	Tidak ada	Tidak ada
d. kesulitan	Tidak ada	Tidak ada

h. Rekreasi

Kondisi		Sebelum sakit	Saat ini
a.	perasaan saat sekolah	Selalu merasa senang Hanya menonton tv	Ingin cepat kembali ke sekolah
b.	waktu luang	Bahagia dan merasa senang	Tidak ada
c.	perasaan setelah rekreasi	Ketika weekend	Tidak ada
d.	waktu senggang keluarga	Nonton TV	Tidak ada
e.	kegiatan waktu libur		Tidak ada

9. pemeriksaan fisik

a. Keadaan umum pasien : Pasien tampak lemah

b. Tanda-tanda vital

1) suhu : 39.5° C

2) nadi : 88x/ menit

3) respirasi : 20 x/ menit

4) tekanan darah : - mmHg

c. Antropometri

1) tinggi badan : 114 cm

2) berat badan : 23 kg sebelum sakit, setelah sakit 21,4 kg

3) lingkar lengan atas : 16 cm

4) lingkar kepala : 49 cm

5) lingkar dada : 48 cm

6) lingkar perut : 47 cm

7) skin fold : Tidak dikaji

d. Sistem pernapasan

1) hidung : Lubang hidung simetris, tidak ada pernafasan cuping hidung, tidak ada sekrét, tidak ada polip

2) leher : Tidak ada pembesaran kelenjer dan tumor

3) dada

bentuk dada : Normal

gerakan dada : Simetris

suara napas : Vesikuler

4) apakah ada clubbing finger : Tidak ada

e. Sistem kardiovaskuler

1) conjungtiva : Tampak tidak anemis, bibir tampak pucat arteri corotis kuat

2) ukuran jantung normal : Normal

3) arteri carotis : Kuat

4) tekanan vena jugularis : Tidak meninggi

5) ukuran jantung : Normal

6) suara jantung : s1 s2 reguler, tidak ada bising aorta

7) capillary refilling time : <3 detik

f. Sistem pencernaan

1) bibir : Kering, Tidak Ada Labio Skizis

2) mulut : tampak normal, lembab, terdapat bercak putih pada lidah

3) jumlah gigi : 2

4) kemampuan menelan: Baik

5) gaster : Tidak kembung, gerakan peristaltik 6 x/ menit

6) abdomen : Tidak ada pembesaran hati, lien, ginjal, ada nyeri tekan pada abdomen,

7) anus : Tidak ada lecet dan tidak ada hemoroid

g. Sistem indra

1) mata

sklera : Tidak Ikterus

kelopak mata : Tampak tidak ada oedema, bulu mata normal, alis normal, mata tampak cekung,

bulu mata : Tampak bulu mata tipis

konjungtiva : Merah muda

refleksi pupil : Normal

visus : Tidak dikaji

lapang pandang : Tidak dikaji

2) hidung

penciuman baik, perih dihidung : (-), trauma (-), mimisan : (-)

secret yang menghalangi penciuman : Tidak ada

3) telinga

keadaan daun telinga : Tampak simetris

kanal auditoris : Tampak bersih

fungsi pendengaran : Pasien mendengar dengan baik

h. Sistem saraf

1) Fungsi cerebral

- a) Status mental : Orientasi normal, daya ingat baik, perhatian dan perhitungan baik, bahasa pasien menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Makassar
- b) Kesadaran : Eyes 4 motorik 6 verbal 5 dengan GCS 15 (composmentis)
- c) Bicara : Ekspesif

2) Fungsi cranial

- a) NI (olfaktorius) : Sulit dikaji
- b) NII (Optikus) : Pupil bulat, isokor, refleks cahaya (+)
- c) N III, IV, VI (okulomotoris, troklearis, abduksen) : pergerakan bola mata kesegala arah
- d) N V (trigeminus) : Refleks kornea positif
- e) N VII(facialis) : Pasien dapat mengekspresikan wajahnya
- f) N VIII(vestibuloklerais) : Pandangan normal
- g) N IX(glossopharingeus) : Refleks menelan ada
- h) N X (vagus) : Refleks muntah ada
- i) N XI (aksesorius) : Pasien mampu melawan tahanan pada dada
- j) N XII (hopoglosus) : Deviasi lidah tidak ada

3) Fungsi motorik

- Kekuatan otot : Massa otot normal, tonus otot normal, Kekuatan otot 5/5,5/5

- 4) Fungsi sensorik : Suhu 39.5°C tidak ada nyeri, tidak ada tremor
- 5) Cerebellum : Kondisi baik, keseimbangan normal
- 6) Refleks : Bisep (+), trisep (+), patella (+), babinski(+)
- 7) Iritasi meningen : Kaku kuduk (-), laseque sign (-), brudzinkski I/II (-)

i. Sistem muskuloskeletal

- 1) Kepala : Bentuk kepala bulat, gerakan : rotasi, bebas
- 2) Vertebrae : ROM aktif, fungsi gerak baik
- 3) Pelvis : Gerakan aktif
- 4) Lutut : Tidak ada bengkak, gerakan bebas, fleksi dan ekstensi
- 5) Kaki : Tidak ada bengkak, gerakan bebas, fleksi dan ekstensi
- 6) Tangan : Tidak ada bengkak, gerakan bebas, fleksi dan ekstensi

j. Sistem integumen

- 1) Rambut : Warna hitam, tidak mudah dicabut
- 2) Kulit : Kulit pasien sawomatang, suhu 39,5 ° C, kulit terasa hangat, turgor kulit menurun, kulit tampak kemerahan
- 3) Kuku : Warna pink pucat, permukaan kuku agak cembung, tidak mudah patah, panjang dan kotor

k. Sistem endokrin

- 1) Kelenjer thyroid : Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid
- 2) Eksresi urine berlebihan (-), polidipsi (-), poliphagi (-)
- 3) Suhu tubuh yang tidak seimbang (+) keringat berlebihan (-)
- 4) Riwayat bekas air seni dikelilingi semut : Tidak ada

l. Sistem perkemihan

- 1) Tidak ada oedema palpebra, tidak ada moon face, oedema anasarka tidak ada
- 2) Keadaan kadung kemih : baik
- 3) Nocturi (-), dysuria (-), kencing batu (-)

m. Sistem reproduksi

Wanita :

- a. Payudara : -
- b. Labia Mayora dan minora : Bersih tidak ada secret dan tidak ada bau

n. sistem imun

- 1) Alergi : Ibu pasien mengatakan anaknya tidak alergi
- 2) Penyakit yang berhubungan dengan perubahan cuaca : Ibu pasien mengatakan anaknya terkadang flu ringan ketika terjadi pergantian cuaca

10. Pemeriksaan tingkat perkembangan

0-6 tahun keatas

- a. Perkembangan kognitif : Baik
- b. Perkembangan psikoseksual : Baik
- c. Perkembangan psikososial : Baik

11. Tes Diagnostik

Hasil Laboratorium

12 Juli 2022

Jenis Pemeriksaan		Hasil	Nilai Rujukan	Waktu
Widal	O	1/320	Negatif	30 menit
	AH	1/160	Negatif	
	BH	1/88	Negatif	



DATA FOKUS

Data Subjektif	Data Objektif
- Ibu klien mengatakan anaknya demam	- Keadaan umum : Lemah
- ibu pasien mengatakan demam anaknya memberat pada malam hari	- Kulit teraba hangat, serta menggigil
- Ibu klien mengatakan anaknya demam disertai mual, sakit perut dan menggigil	- Kulit tampak kemerahan
- Ibu pasien mengatakan anaknya selalu terbangun pada malam hari karena suhu ruangan yang terlalu dingin	- Pasien tampak gelisah
- Ibu pasien mengatakan anaknya terbangun karena nyeri kepala	- Bibir tampak kering, lidah tampak kotor dan tampak kemerahan disekitar lidah pasien
- Ibu pasien tidur siang anaknya tidak menentu, tidur malam pukul 24:00 serta sering terbangun pada malam hari pukul 02:00	- Pasien tampak pucat
- Ibu pasien mengatakan anaknya kesulitan tidur kembali ketika terbangun	- Mata tampak cekung
- Ibu pasien mengatakan anaknya kurang nafsu makan	- Bibir tampak kering
- Ibu pasien mengatakan anaknya makan hanya sesuai keinginannya, makan hanya 1-2 sendok makan saja	- Bb sebelum sakit 23 setelah sakit 21,4 kg IMT 15,4
	- Pasien tampak pucat
	- Porsi makan tampak tidak dihabiskan
	- Ttv : N :88X/menit RR : 20x/menit S : 39,5°C
	- Hasil pemeriksaan Lab : Widal : O : 1/320 AH : 1/160 BH :1/88

ANALISIS DATA

No	Data	Etiologi	Masalah
1.	DS : - Ibu klien mengatakan anaknya demam - ibu pasien mengatakan demam anaknya memberat pada malam hari - Ibu klien mengatakan anaknya demam disertai mual, sakit perut dan menggigil DO : - Keadaan umum : Lemah - Kulit teraba hangat, serta menggigil - Kulit tampak kemerahan - Pasien tampak gelisah - Bibir tampak kering, lidah tampak kotor dan tampak kemerahan disekitar lidah pasien - Ttv : N :88X/menit RR : 20x/menit S : 39,5°C - Hasil pemeriksaan Lab : Widal : O : 1/320 AH : 1/160 BH :1/88	Salmonella Thyposa ↓ Masuk kedalam darah ↓ Bakteri mengeluarkan endotoksin ↓ Peradangan local meningkat ↓ Gangguan pada pusat termoregulasi ↓ Hipertermi	Hipertermi
2.	DS : - Ibu pasien mengatakan anaknya selalu terbangun pada malam hari karena suhu ruangan yang terlalu dingin - Ibu pasien mengatakan anaknya terbangun karena nyeri kepala	Salmonella Thyposa ↓ Masuk kedalam darah ↓ Bakteri mengeluarkan endotoksin ↓	Gangguan Pola Tidur

- Ibu pasien tidur siang anaknya tidak menentu, tidur malam pukul 24:00 serta sering terbangun pada malam hari pukul 02:00	Peradangan local meningkat ↓ Gangguan rasa nyaman ↓
- Ibu pasien mengatakan anaknya kesulitan tidur kembali ketika terbangun	Sulit Tidur ↓ Gangguan Pola Tidur
DO : - Pasien tampak pucat - Mata tampak cekung - Bibir tampak kering - Ttv : N :88X/menit RR : 20x/menit S : 39,5°C	
3. DS : - Ibu pasien mengatakan anaknya kurang nafsu makan - Ibu pasien mengatakan anaknya makan hanya sesuai keinginannya, makan hanya 1-2 sendok makan saja	Salmonella Thyposa ↓ Masuk kedalam saluran gastrointestinal ↓ Inflamasi usus halus ↓ gangguan saluran pencernaan ↓ peningkatan saluran asam lambung ↓ mual multah ↓ Penurunan nafsu makan ↓ Defisit Nutrisi
DO : - Bibir tampak kering - Bb sebelum sakit 23 setelah sakit 21,4 kg IMT 15,4 - Pasien tampak pucat - Porsi makan tampak tidak dihabiskan - Ttv : N :88X/menit RR : 20x/menit S : 39,5°C	

Diagnosis Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan
1.	Hipertermi berhubungan dengan Proses penyakit dibuktikan dengan : DS : - Ibu klien mengatakan anaknya demam - ibu pasien mengatakan demam anaknya memberat pada malam hari - Ibu klien mengatakan anaknya demam disertai mual, sakit perut dan menggigil DO : - Keadaan umum : Lemah - Kulit teraba hangat, serta menggigil - Kulit tampak kemerahan - Pasien tampak gelisah - Bibir tampak kering, lidah tampak kotor dan tampak kemerahan disekitar lidah pasien - Ttv : N :88X/menit RR : 20x/menit S : 39,5°C - Hasil pemeriksaan Lab : Widal : O : 1/320 AH : 1/160 BH :1/88
2.	Gangguan Pola Tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur dibuktikan dengan : DS : - Ibu pasien mengatakan anaknya selalu terbangun pada malam hari karena suhu ruangan yang terlalu dingin - Ibu pasien mengatakan anaknya terbangun karena nyeri kepala - Ibu pasien tidur siang anaknya tidak menentu, tidur malam pukul 24:00 serta sering terbangun pada malam hari pukul 02:00 - Ibu pasien mengatakan anaknya kesulitan tidur kembali ketika terbangun DO : - Pasien tampak pucat - Mata tampak cekung - Bibir tampak kering - Ttv :

N :88X/menit

RR : 20x/meRR : 20x/menit

S : 39,5°C

3. Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan dibuktikan dengan :

DS :

- Ibu pasien mengatakan anaknya kurang nafsu makan
- Ibu pasien mengatakan anaknya makan hanya sesuai keinginannya, makan hanya 1-2 sendok makan saja

DO :

- Bibir tampak kering
- Bb sebelum sakit 23 setelah sakit 21,4 kg IMT 15,4
- Pasien tampak pucat
- Porsi makan tampak tidak dihabiskan
- Ttv :

N :88X/menit

RR : 20x/menit

S : 39,5°C

Intervensi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Luaran Keperawatan	Intervensi	Rasional
1.	Hipertermi berhubungan dengan Proses penyakit dibuktikan dengan : DS : - Ibu klien mengatakan anaknya demam - ibu pasien mengatakan demam anaknya memberat pada malam hari - Ibu klien mengatakan anaknya demam disertai mual, sakit perut dan menggigil DO : - Keadaan umum : Lemah - Kulit teraba hangat, serta menggigil - Kulit tampak kemerahan - Pasien tampak gelisah - Bibir tampak kering, lidah tampak kotor dan tampak kemerahan disekitar lidah pasien - Ttv : N :88X/menit RR : 20x/menit S : 39,5°C - Hasil pemeriksaan Lab : Widal : O : 1/320 AH : 1/160 BH :1/88	Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam diharapkan termoregulasi membaik dengan kriteri hasil : - Suhu tubuh membaik, menjadi normal S: 37,0°C - Suhu kulit membaik	Manajemen Hipertermi Observasi : - Identifikasi penyebab hipertermia - Monitor suhu tubuh - Monitor komplikasi akibat hipertermia Terapeutik : - Longgarkan atau lepasakan pakaian - Berikan cairan oral - Lakukan pendinginan eksternal (Kompres <i>tepid sponge water</i>) Edukasi : - Anjurkan tirah baring Kolaborasi : - Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena	Manajemen Hipertermi Observasi : - Untuk mengetahui adanya tanda-tanda hipertermi - Untuk mengetahui normal suhu tubuh - Untuk mengetahui adanya komplikasi Terapeutik - Menyeimbangkan kebutuhan cairan - Untuk menurunkan suhu tubuh Edukasi : - Meminimalisir kegiatan pasien Kolaborasi : - Membantu menurunkan suhu tubuh dengan farmakologi
2.	Gangguan Pola Tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur dibuktikan dengan : DS :	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam maka pola tidur	Manajemen Pola Tidur Observasi : - Identifikasi pola dan aktifitas tidur	Manajemen Pola Tidur Observasi : - Untuk mengetahui pola aktifitas tidur

- Ibu pasien mengatakan anaknya selalu terbangun pada malam hari karena suhu ruangan yang terlalu dingin - Ibu pasien mengatakan anaknya terbangun karena nyeri kepala - Ibu pasien tidur siang anaknya tidak menentu, tidur malam pukul 24:00 serta sering terbangun pada malam hari pukul 02:00 - Ibu pasien mengatakan anaknya kesulitan tidur kembali ketika terbangun DO : - Pasien tampak pucat - Mata tampak cekung - Bibir tampak kering - Ttv : N :88X/menit RR : 20x/meRR : 20x/menit S : 39,5°C	membai, dengan kriteria hasil : - Kesulitan tidur menurun - Keluhan sering terjaga menurun	- Identifikasi makanan dan minuman yang memperberat tidur - Identifikasi faktor pengganggu tidur Terapeutik : - Modifikasi lingkungan - Batasi waktu tidur siang - Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (Misalnya terapi pijat) Edukasi : - Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit - Anjurkan menghindari makanan dan minuman yang mengganggu tidur	- Untuk menghindari makanan yang dapat memicu pola tidur yang tidak efektif - Untuk mengantisipasi faktor yang mengganggu tidur Terapeutik : - Untuk dapat mendukung proses yang dapat mempercepat tidur - Agar bisa tidur cepat pada malam hari - Agar dapat meningkatkan kenyamanan Edukasi : - Untuk mengedukasi pasien pentingnya tidur - Agar tidak mengganggu waktu tidur
3. Defesit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan dibuktikan dengan : DS : - Ibu pasien mengatakan anaknya kurang nafsu makan - Ibu pasien mengatakan anaknya makan hanya sesuai keinginannya, makan hanya 1-2 sendok makan saja DO : - Bibir tampak kering - Bb sebelum sakit 23 setelah sakit 21,4 kg IMT 15,4	Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan Kriteria hasil : - Porsi makanan yang dihabiskan meningkat - Nyeri abdomen menurun - Berat badan meningkat - Indeks Massa Tubuh (IMT) membaik	Manajemen Nutrisi Observasi - Identifikasi alergi dan intoleransi makanan - Identifikasi makanan yang disukai - Identifikasi status nutrisi - Monitor berat badan Terapeutik - Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai	Manajemen Nutris : Observasi : - Untuk mengetahui penyebab konstipasi - nutrisi berperan dalam penyediaan sumber energi, pengaturan metabolisme tubuh, dan membangun jaringan tubuh. - Pentingnya diketahui BB untuk mengetahui status nutrisi Terapeutik - Untuk meningkatkan nafsu makan anak

- Pasien tampak pucat	- Frekuensi makan membaik	- Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi	- Untuk membantu melancarkan BAB
- Porsi makan tampak tidak dihabiskan	- Nafsu makan membaik	- Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein	Edukasi :
- Ttv : N :88X/menit RR : 20x/menit	- Bising usus membaik	Edukasi	- Menghindari terjadinya mual muntah pada saat makan
- S : 39,5°C		- Anjurkan posisi duduk, jika mampu	

Implementasi dan Evaluasi

No	Diagnosis Keperawatan	Implementasi Keperawatan			Evaluasi Keperawatan		
1.	Hipertermi berhubungan dengan Proses penyakit dibuktikan dengan : DS : - Ibu klien mengatakan anaknya demam - ibu pasien mengatakan demam anaknya memberat pada malam hari - Ibu klien mengatakan anaknya demam disertai mual, sakit perut dan menggigil DO : - Keadaan umum : Lemah - Kulit teraba hangat, serta menggigil - Kulit tampak kemerahan - Pasien tampak gelisah - Bibir tampak kering, lidah tampak kotor dan tampak kemerahan	Hari 1 Manajemen Hipertermi Observasi : - Mengidentifikasi penyebab hipertermia Hasil : Proses penyakit typoid - Memonitor suhu tubuh Hasil : suhu tubuh An. M 39,5°C Kulit teraba hangat serta tampak kemerahan - Memonitor komplikasi akibat hipertermi Hasil : tidak ada tanda-tanda komplikasi hipertermi Terapeutik : - Melonggarkan atau lepasakan pakaian Hasil : Pakaian An. M dilonggarkan - Memberikan cairan oral Hasil : An. M diberikan cairan oral berupa air mineral	Hari 2 Manajemen Hipertermi Observasi : - Memonitor suhu tubuh Hasil : suhu tubuh An. M 38,6°C Kulit teraba hangat Terapeutik : - Memberikan cairan oral Hasil : An. M diberikan cairan oral berupa air mineral Tampak An. M minum air putih mineral - Melakukan kompres <i>tepid sponge water</i> Hasil : diberikan kompres <i>Tepid sponge water</i> didaerah dahi, ketiak dan lipatan paha, serta melakukan teknik seka pada An. M	Hari 3 Manajemen Hipertermi Observasi : - Memonitor suhu tubuh Hasil : Suhu tubuh An. M 37,4°C Terapeutik : - Memberikan cairan oral Hasil : An. M diberikan air minum berupa air mineral - Melakukan kompres <i>tepid sponge water</i> Hasil : diberikan kompres <i>tepid sponge water</i> didaerah dahi, ketiak dan lipatan paha serta melakukan teknik seka pada An. M Kolaborasi : - Melakukan kolaborasi pemberian cairan	Hari 1 Selasa, 12 Juli 2022 Pukul 14 : 00 WITA S : - Ibu pasien mengatakan anaknya masih demam dan sakit kepala O : - Kulit teraba hangat - 38,7°C - Kulit tampak kemerahan A : - Masalah Hipertermi belum teratasi P : - Lanjutkan intervensi manajemen hipertermi - Monitor suhu tubuh - Lakukan kompres <i>tepid sponge water</i> - Kalaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena	Hari 2 Rabu, 12 Juli 2022 Pukul 14 : 00 WITA S : - Ibu pasien mengatakan suhu tubuhnya anaknya masih naik turun O : - Kulit teraba hangat - 37,2°C A : - Masalah Hipertermi belum teratasi P : - Lanjutkan intervensi manajemen hipertermi - Monitor suhu tubuh - Lakukan pendinginan eksternal - Kalaborasi pemberian cairan	Hari 3 Kamis, 12 Juli 2022 Pukul 14 : 00 WITA S : - Ibu pasien mengatakan suhu tubuhnya anaknya sudah mulai membaik akan tetapi masih teraba hangat O : - Suhu 37,1°C A : - Masalah Hipertermi terasi P : Optimalkan intervensi

	disekitar lidah pasien - Ttv : N :88X/menit RR : 20x/menit S : 39,5°C - Hasil pemeriksaan Lab : Widal : O : 1/320 AH : 1/160 BH :1/88	Tampak An. M minum air putih mineral - Melakukan kompres <i>Tepid sponge water</i> Hasil: diberikan kompres <i>Tepid sponge water</i> didaerah dahi, ketiak dan lipatan paha, serta dilakukan tehnik seka pada An. M Edukasi : - Menganjurkan tirah baring Hasil : tampak An. M tirah baring Kolaborasi : - Melakukan kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena Hasil : diberikan paracetamol drips melalui IV	Kolaborasi : - Melakukan kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena Hasil : diberikan paracetamol drips melalui IV	dan elektrolit intravena Hasil : diberikan paracetamol drips melalui IV	dan elektrolit intravena		
2.	Gangguan Pola Tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur dibuktikan dengan : DS : - Ibu pasien mengatakan anaknya selalu terbangun pada malam hari karena suhu ruangan yang terlalu dingin	Hari 1 Manajemen Pola Tidur Observasi : - Mengidentifikasi pola dan aktifitas tidur Hasil : Ibu pasien mengatakan tidur anaknya tidak teratur dan kesulitan untuk memulai tidur serta sering terbangun pada malam hari	Hari 2 Manajemen Pola Tidur Observasi : - Mengidentifikasi pola dan aktifitas tidur Hasil : Ibu pasien mengatakan tidur anaknya sudah mulai membaik	Hari 3 Manajemen Pola Tidur Observasi : - Mengidentifikasi pola dan aktifitas tidur Hasil : Ibu pasien mengatakan tidur anaknya sudah membaik	Hari 1 Rabu, 12 Juli 2022 Pukul 07 : 42 WITA S : - Ibu pasien mengatakan tidur anaknya masih terganggu dan sering terbangun serta tidak bisa untuk	Kamis, 14 Juli 2022 Pukul 07:42 WITA S : - Ibu pasien mengatakan tidur anaknya sudah mulai membaik - Ibu pasien mengatakan anaknya tidur mulai pukul 21:25	Jum'at, 15 Juli 2022 Pukul08:02WITA S : - Ibu pasien mengatakan tidur anaknya sudah membaik - Ibu pasien mengatakan anaknya tidur mulai pukul

- Ibu pasien mengatakan anaknya terbangun karena nyeri kepala - Ibu pasien tidur siang anaknya tidak menentu, tidur malam pukul 24:00 serta sering terbangun pada malam hari pukul 02:00 - Ibu pasien mengatakan anaknya kesulitan tidur kembali ketika terbangun DO : - Pasien tampak pucat - Mata tampak cekung - Bibir tampak kering - Ttv : N :88X/menit RR : 20x/meRR : 20x/menit S : 39,5°C	Ibu pasien mengatakan anaknya tidur biasanya jam 24:15 - Mengidentifikasi makanan dan minuman yang memperberat tidur Hasil : Ibu pasien mengatakan tidak ada makanan dan minuman yang mengganggu pola tidur anaknya - Mengidentifikasi faktor pengganggu tidur Hasil : Ibu pasien mengatakan anaknya terbangun ketika tengah malam demam anaknya naik serta ketika ketika merasa dingin karena ac ruangan dan tidak bisa tidur kembali Terapeutik : - Memodifikasi lingkungan Hasil : Pasien mengatakan ia lebih nyaman dalam posisi supinasi	Ibu pasien mengatakan anaknya tidur mulai pukul 21:25 dan hanya terbangun sekali selama semalam Terapeutik : - Memodifikasi lingkungan Hasil : Pasien mengatakan ia lebih nyaman ketika dalam posisi supinasi Ibu pasien mengatakan anaknya menggunakan selimut pada malam hari - Melakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (Misalnya terapi pijat) Hasil : Pasien tampak merasa nyaman Pasien mengatakan merasa lebih nyaman ketika dipijat	Ibu pasien mengatakan anaknya tidur mulai pukul 21:00 dan sudah tidak terbangun lagi Mengidentifikasi faktor pengganggu tidur Hasil : Ibu pasien mengatakan anaknya menggunakan selimut dan merasa nyaman karena sudah dilakukan pemijatan Terapeutik : - Memodifikasi lingkungan Hasil : Pasien mengatakan ia lebih nyaman ketika dalam posisi supinasi Ibu pasien mengatakan anaknya menggunakan selimut pada malam hari - Melakukan prosedur untuk	memulai tidur kembali - ibu pasien mengatakan tidur pukul 24:15 O : - Pasien tampak nyaman setelah diberikan intervensi terapi pijat A : - Masalah gangguan pola tidur belum teratasi P : - Lanjutkan intervensi manajemen pola tidur - Modifikasi lingkungan Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (misalnya terapi pijat)	dan hanya terbangun sekali selama semalam - Ibu pasien mengatakan anaknya menggunakan selimut dan merasa nyaman karena sudah dilakukan pemijatan - Pasien mengatakan merasa lebih nyaman ketika dipijat O : - Pasien tampak nyaman setelah diberikan intervensi terapi pijat A : - Masalah gangguan pola tidur belum teratasi P : - Optimalkan intervensi manajemen pola tidur	21:00 dan sudah tidak terbangun lagi - Ibu pasien mengatakan anaknya menggunakan selimut dan merasa nyaman karena sudah dilakukan pemijatan - Pasien mengatakan merasa lebih nyaman ketika dipijat O : - Pasien tampak nyaman setelah diberikan intervensi terapi pijat A : - Masalah gangguan pola tidur belum teratasi P : - Optimalkan intervensi manajemen pola tidur
---	---	--	--	---	--	---

		Pasien mengatakan ia lebih nyaman ketika ruangan dimatikan - Mematasi waktu tidur siang Hasil : Ibu pasien mengatakan akan membatasi waktu tidur siang anaknya - Melakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (Misalnya terapi pijat) Hasil : Pasien tampak merasa nyaman Pasien mengatakan merasa lebih nyaman ketika dipijat Edukasi : - Menjelaskan pentingya tidur cukup selama sakit Hasil : Ibu pasien mengatakan mengerti tentang edukasi yang diberikan	meningkatkan kenyamanan (Misalnya terapi pijat) Hasil : Pasien tampak merasa nyaman Pasien mengatakan merasa lebih nyaman ketika dipijat	- Modifikasi lingkungan - Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (misalnya terapi pijat)	- Modifikasi lingkungan - Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (misalnya terapi pijat)		
3.	Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan dibuktikan dengan : DS :	Hari 1 Manajemen Nutrisi Observasi - Mengidentifikasi alergi dan intoleransi makanan	Hari 2 Manajemen Nutrisi Observasi - Mengidentifikasi makanan yang disukai	Hari 3 Manajemen Nutrisi Observasi - Memonitor berat badan Hasil : 21,7 kg Terapeutik	Hari 1 Rabu, 13 Juli 2022 S : - ibu klien mengatakan anaknya menghabiskan	Hari 2 Kamis, 14 Juli 2022 S : - ibu klien mengatakan anaknya	Hari 3 Jum'at 15 Juli 2022 S : - ibu klien mengatakan anaknya

- Ibu pasien mengatakan anaknya kurang nafsu makan - Ibu pasien mengatakan anaknya makan hanya sesuai keinginannya, makan hanya 1-2 sendok makan saja DO : - Bibir tampak kering - Bb sebelum sakit 23 setelah sakit 21,4 kg IMT 15,4 - Pasien tampak pucat - Porsi makan tampak tidak dihabiskan - Ttv : N :88X/menit RR : 20x/menit S : 39,5°C	Hasil : Ibu klien mengatakan tanaknya tidak memiliki alergi - Mengidentifikasi makanan yang disukai Hasil : ibu klien mengatakan anaknya suka makan buah seperti apel, pisang, dan pepaya - Mengidentifikasi status nutrisi Hasil : status nutrisi kurang - Memonitor berat badan Hasil : 21,4 kg Terapeutik - Menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai Hasil : disajikan bubur dan buah buahan, pasien makan dengan lahap makanan yang disajikan - Memberikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi Hasil : anak diberikan buah apel, pepaya - Memberikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein Hasil : Diberikan bubur dan telur sebagai lauk	Hasil : ibu klien mengatakan suka makan buah seperti apel, pisang, dan pepaya - Memonitor berat badan Hasil : 21,4 kg Terapeutik - Menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai Hasil : disajikan bubur dan buah buahan, pasien makan dengan lahap makanan yang disajikan - Memberikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi Hasil : anak diberikan buah apel, pepaya - Memberikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein Hasil : anak makan dalam posisi semifowler	- Menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai Hasil : disajikan bubur dan buah buahan, pasien makan dengan lahap makanan yang disajikan - Memberikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi Hasil : anak diberikan buah apel, pepaya - Memberikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein Hasil : Diberikan bubur dan telur sebagai lauk Edukasi - Mengajarkan posisi duduk, jika mampu Hasil : anak makan dalam posisi semifowler	makanan setengah porsi dari yang disajikan - ibu klien mengatakan anaknya makan buah yang disajikan O : - tampak pasien makan bah yang disajikan - berat badan 21,4 - tampak pasien makan bubur setengah porsi dari yang disajikan A : - Masalah defisit nutrisi belum teratasi P : - Intervensi dilanjutkan - Memonitor berat badan Memberikan makanan tinggi serat unntuk mencegah konstipas Memberikan makanan tinggi	menghabiskan makanan porsi dari yang disajikan - ibu klien mengatakan anaknya makan buah yang disajikan dengan lahap dan dihabiskan O : - tampak pasien makan buah yang disajikan - tampak pasien makan bubur yang disajikan dengan lahap - 21,7 kg A : - Masalah defisit nutrisi belum teratasi P : - Intervensi dilanjutkan	menghabiskan makanan porsi dari yang disajikan - ibu klien mengatakan anaknya makan buah yang disajikan dengan lahap dan dihabiskan O : - tampak pasien makan buah yang disajikan - tampak pasien makan bubur yang disajikan dengan lahap A : - Masalah defisit nutrisi teratasi P : - Optimalkan intervensi
--	--	--	--	--	--	--

Edukasi

- Menganjurkan posisi duduk, jika mampu

Hasil : anak makan dalam posisi semifowler

Hasil : Diberikan bubur dan telur sebagai lauk

Edukasi

- Menganjurkan posisi duduk, jika mampu

Hasil : anak makan dalam posisi semifowler

kalori dan tinggi protein

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan

Pada laporan akhir kasus ini pasien mengalami typhoid dengan masalah hipertermi. Demam typhoid merupakan penyakit demam akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Salmonella enterica* khususnya turunan *Salmonella typhi*. Demam disebabkan karena *salmonella typhi* dan endotoksinya merangsang sintesis dan pelepasan zat pirogen oleh leukosit pada jaringan yang meradang. *Salmonella typhi* disebarkan melalui rute fekal-oral yang memiliki potensi epidemi. (Andayani & Ika Fibriana, 2018)

Adapun hasil pengkajian yang dilakukan pada An. M yang berusia 6 tahun dimana pasien masuk puskesmas dengan keluhan utamanya demam dan riwayat penyakit saat ini Ibu pasien mengatakan anaknya demam hari ke 4 diantar kerumah sakit yang disertai mual, sakit perut, sakit kepala dan menggigil. Keadaan umum tampak lemah, pasien tampak gelisah, dan tampak menggigil, serta anaknya mengalami kesulitan tidur, sering terbangun pada malam hari serta mengalami penurunan nafsu makan, pada saat dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan hasil Frekuensi nadi 88x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu 39,5°C, kulit teraba hangat, kulit klien tampak kemerahan. Menurut (Teana & Utami, 2022) Demam tipoid lebih sering terjadi pada anak – anak di indonesia terjadi pada usia 1 – 5 tahun, yang merupakan penyakit infeksi akut pada usus halus dengan gejala peningkatan suhu lebih dari satu minggu,

gejalanya berupa demam berangsur naik, terutama pada sore dan malam hari dengan keluhan dan gejala demam, nyeri otot, nyeri kepala.

Kasus Typoid diatas juga ditunjang dari hasil laboratorium dimana hasilnya menunjukkan pemeriksaan Widal bernilai positif, hasil pemeriksaan darah pada tanggal 12 Juli 2022: Widal: O: 1/320, AH: 1/160, BH: 1/88. Nilai laboratorium widal tersebut sebagai indikator infeksi dan gejala klinis yang perlu diperhatikan dalam perawatan anak dengan Typoid. Hal ini sejalan dengan penelitian Uji serologi widal mendeteksi adanya antibodi aglutinasi terhadap antigen O yang berasal dari somatik dan antigen H yang berasal dari flagella *Salmonella typhi*. Diagnosis demam tifoid dapat ditegakkan apabila ditemukan titer O aglutinin sekali periksa mencapai $\geq 1/200$ atau terdapat kenaikan 4 kali pada titer sepasang. Apabila hasil tes widal menunjukkan hasil negatif, maka hal tersebut tidak menyingkirkan kemungkinan diagnosis demam tifoid (Renowati & Soleha, 2019).

5.2 Analisis Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan adalah sebuah konsep kritis untuk mamndu proses pengkajian dan intervensi. Diagosis jua menjadi komunikasi dan basis ilmu keperawatan dalam interaksinya dengan disiplin ilmu lain. Diagnosis keperwatan merupakan penilaian perawat berdasarkan respon pasien secara holistik (bio-psiko-sosio-spiritual) terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang dialaminya. (Koerniawan *et al.*, 2020)

Diagnosis keperawatan yang sering muncul pada pasien Typoid menurut SDKI salah satunya adalah Hipertermia. Berdasarkan hasil pengkajian dan

analisa data didapatkan diagnosis keperawatan utama yang ditegakkan pada pasien An. M pada saat dirawat di Puskesmas Bontomarannu yaitu hipertermia berhubungan dengan proses inflamasi. Hipertermia adalah keadaan suhu tubuh meningkat di atas rentang normal tubuh (Awaludin *et al.*, 2018). Diagnosis hipertermia berhubungan dengan proses inflamasi pada klien An M sudah berdasarkan buku SDKI. Berdasarkan buku (Awaludin *et al.*, 2018), diagnosis keperawatan hipertermia tanda/gejala utamanya ialah Suhu tubuh di atas nilai normal, sedangkan gejala dan tanda minornya yaitu kulit merah, kejang, takikardi, takipnea, kulit terasa hangat. Pada hasil pengkajian pasien An. M dibuktikan dengan ibu pasien mengatakan anaknya demam, suhu 39,5°C, kulit terasa hangat, kulit tampak kemerahan serta keadaan umum pasien tampak lemah, hasil pemeriksaan widal O: 1/320 H:1/160 BH:1/88.

Adapun diagnosis kedua yang diangkat dalam kasus ini adalah gangguan pola tidur. Gangguan pola tidur adalah gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal (SDKI, 2017). Diagnosis keperawatan gangguan pola tidur tanda/gejala utamanya adalah mengeluh sulit tidur, mengeluh sering terjaga, mengeluh tidak puas tidur, mengeluh pola tidur berubah, sedangkan tanda/gejala minornya yaitu mengeluh kemampuan beraktivitas menurun. Pada hasil pengkajian klien An. M dibuktikan dengan ibu klien mengatakan Ibu pasien mengatakan anaknya selalu terbangun pada malam hari karena suhu ruangan yang terlalu dingin, ibu pasien mengatakan anaknya terbangun karena nyeri kepala, ibu pasien tidur siang anaknya tidak menentu, tidur malam pukul

24:00 serta sering terbangun pada malam hari pukul 02:00, pasien tampak pucat, mata tampak cekung.

Adapun diagnosis ketiga yang diangkat dalam kasus ini adalah defisit nutrisi. Defisit nutrisi adalah asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dengan tanda/gejala utamanya berat badan menurun minimal 10% dibawah rentang ideal, nafsu makan menurun, nyeri abdomen. Pada hasil pengkajian ibu pasien mengatakan anaknya kurang nafsu makan, ibu pasien mengatakan anaknya makan hanya sesuai keinginannya, makan hanya 1-2 sendok makan saja, bibir tampak kering, Bb sebelum sakit 23 setelah sakit 21,4 kg IMT 15, pasien tampak pucat, porsi makan tampak tidak dihabiskan.

5.3 Analisis Intervensi Keperawatan

Untuk menyembuhkan suatu penyakit maka kita harus berobat, karena setiap penyakit Allah swt.. sudah menjamin obatnya. Sebagaimana Hadist Riwayat Abu Hurairah ra. Nabi Saw. Bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Terjemahnya:

“Allah swt. akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan penawar baginya”. (HR.Al Bukhari).

Rencana tindakan keperawatan untuk mengatasi diagnosis pertama hipertermi pada klien An. M dilakukan 3x24 jam, dengan tujuan suhu tubuh dalam batas normal dengan kriteria hasil suhu tubuh 36- 37.5°C, tidak ada perabaan, dan tindakan keperawatan identifikasi penyebab hipertermia, monitor suhu tubuh, monitor haluaran urine, longgarkan atau lepasakan pakaian, berikan

cairan oral, lakukan pendinginan eksternal, anjurkan tirah baring, kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena.

Dimana pada kasus Typhoid masalah yang sering muncul adalah hipertemi dimana intervensi yang dilakukan sesuai dengan buku standar intervensi keperawatan Indonesia (SIKI) yaitu : identifikasi penyebab hipertermia, monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor haluaran urine, monitor komplikasi akibat hipertermia, sediakan lingkungan yang nyaman, longgarkan atau lepaskan pakaian, basahi dan kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral, ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis, lakukan pendinginan eksternal, hindari pemberian antipiretik atau aspirin, berikan oksigen, anjurkan tirah baring, kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena.

Pada kasus An. M intervensi yang dilakukan untuk mengatasi masalah hiperterminya adalah kolaborasi pemberian cairan berupa RL 24xptm dan pemberian paracetamol drips. Serta dilakukan pendinginan eksternal berupa kompres *tepid sponge water* sebagai EBN. *Tepid sponge* merupakan salah satu cara metode fisik untuk menurunkan demam yang bersifat nonfarmakologi. Teknik ini dilakukan dengan melakukan kompres air hangat dengan cara mengompres pada lima titik (leher, 2 ketiak, 2 pangkal paha) ditambah menyeka bagian perut dan dada atau diseluruh badan dengan kain. Basahi lagi kain bila kering, yang dilakukan selama 15-20 menit. Suhu air untuk mengompres antara 30- 35°C. Tepid sponge bertujuan menurunkan suhu permukaan tubuh. Turunnya suhu terjadi lewat panas tubuh yang digunakan untuk menguapkan

air pada kain kompres. Air hangat membantu darah tepi di kulit melebar sehingga pori-pori menjadi terbuka dan memudahkan pengeluaran panas dari dalam tubuh.

Sebagaimana dalam Al-quran dan hadist :

الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ

Terjemahnya :

“sesungguhnya demam adalah sebagian dari aroma neraka jahannam, maka dinginkanlah ia dengan air” (HR.Muslim).

Hadis tersebut merupakan salah satu dari cara pengobatan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. yang diutarakan dengan kalimat” Fabruduha Bi al-Mai” (dinginkanlah dengan air), air yang dimaksud dalam sabda beliau adalah semua jenis air (Al-Jauziyah, 2020). Pandangan ini terlihat mempunyai kesesuaian dengan dunia medis, kedokteran, dan ilmu kesehatan yang juga menerapkan cara meredakan suhu yang panas dengan air atau dikompres (Rahmawati & Purwanto, 2020).

Kemudian untuk diagnosis kedua yaitu Gangguan kualitas tidur sering terjadi pada An. M yang mengalami Typhoid, dimana intervensi yang dilakukan sesuai dengan buku standar intervensi keperawatan Indoneisa (SIKI) yaitu : Identifikasi pola dan aktifitas tidur, Identifikasi makanan dan minuman yang memperberat tidur, Identifikasi faktor pengganggu tidur, Batasi waktu tidur siang, lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (Misalnya terapi pijat). (SIKI, 2018)

Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan pola tidur bersumber dari buku Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2018) salah satunya adalah lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan. Prosedur untuk meningkatkan kenyamanan yaitu terapi pijat. Teknik pijat ini merupakan tindakan pijatan yang memberikan efek menenangkan yang dilakukan secara lembut. Kebanyakan pemijatan pada anak merupakan bentuk tekanan yang lembut. Gerakan yang lembut menunjukkan kasih sayang dimana pada saat bersamaan reaksi syaraf juga dapat dirangsang. Teknik pijat dilakukan dengan menekan dan menggerakkan tangan secara berputar diseluruh tubuh termasuk bagian tangan dan kaki. Teknik pemijatan akan meningkatkan tonus vagal sehingga merangsang saraf vagus. Rangsangan pada saraf vagus (saraf parasimpatis) akan merangsang sel enterochromaffin dalam saluran gastrointestinal untuk mengeluarkan hormon serotonin. Serotonin dapat menginduksi rasa kantuk dan memberikan ketenangan (Yulianingsih & Rasyid, 2020)

Untuk diagnosis ketiga yaitu Defisit nutrisi, penurunan nafsu makan merupakan salah satu tanda dan gejala dari demam typoid. Salah satu intervensi yang diberikan untuk mengatasi masalah nafsu makan menurun bersumber dari buku Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2018) salah satunya adalah manajemen nutrisi yaitu memberikan makanan tinggi serat kepada anak serta menyajikan makanan kesukannya untuk meningkatkan nafsu makannya. (SDKI, 2017)

5.4 Analisis Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan yang diberikan pada An.M sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan berfokus pada EBP. Yang dimana selama tiga hari berturut-turut peneliti melakukan implementasi Pemberian kompres *tepid sponge water* terhadap diagnosis hipertermi. Penatalaksanaan atau intervensi yang dilakukan untuk penurunan suhu tubuh menggunakan tindakan nonfarmakologis, sesuai dengan intervensi keperawatan manajemen hipertermi yaitu diberikan pendinginan eksternal berupa kompres *tepid sponge water*.

Pemberian *tepid sponge water* ke tubuh akan memberikan sinyal ke hipotalamus melalui sumsum tulang belakang. Ketika reseptor yang peka terhadap panas di hipotalamus distimulasi, sistem efektor mengeluarkan sinyal yang mulai berkeringat dan terjadi vasodilatasi perifer. Perubahan ukuran pembuluh darah diatur oleh pusat vasomotor medulla oblongata batang otak, dibawah pengaruh hipotalamus anterior menyebabkan vasodilatasi. Vasodilatasi inilah yang akan menimbulkan efek panas yaitu tubuh akan berkeringat, maka terjadi penurunan suhu tubuh sehingga mencapai keadaan normal. Jika suhu tubuh naik maka pusat pengaturan suhu berusaha menurunkannya. (D. Hastuti *et al.*, 2021)

Pada implementasi hari pertama pada tanggal ibu pasien mengatakan anaknya masih demam, dengan hasil observasi didapatkan suhu tubuh sebelum diberikan intervensi 39,5°C kulit teraba hangat serta tampak kemerahan, kemudian setelah diberikan intervensi kompres *tepid sponge water* perlakuan selama 15 menit terjadi penurunan suhu menjadi 38,7°C. Kemudian untuk

implementasi hari kedua sebelum diberikan kompres *tepid sponge water* ibu pasien mengatakan anaknya masih demam dan kulit pasien masih terasa hangat akan tetapi sudah tidak seperti sebelum hari pertama pengkajian, yaitu sebelum diberikan intervensi suhu 38,5°C setelah diberikan intervensi didapatkan penurunan suhu tubuh menjadi 37,9°C. Kemudian hari ketiga implementasi sebelum diberikan perlakuan ibu pasien mengatakan suhu tubuh anaknya 37,4°C. Kemudian dilakukan implementasi terjadi penurunan suhu tubuh menjadi 37,1°C serta ibu pasien mengatakan suhu tubuh anaknya sudah membaik akan tetapi masih kulitnya masih sedikit terasa hangat.

Tabel Analisis Perkembangan Suhu Pasien

Hari	Pre Intervensi	Post Intervensi
Hari pertama	39,5°C	S : 38,7°C
Hari kedua	38,6°C	S : 37,2°C
Hari ketiga	37,4°C	S : 37,1°C

Dari tabel diatas menunjukkan terjadinya penurunan suhu tubuh pasien selama 3 hari pemberian kompres *tepid sponge water* dimana pada hari pertama terjadi penurunan suhu tubuh sebanyak 0,8°C, hari kedua terjadi penurunan suhu 1,4°C, dan hari terakhir pemberian terjadi penurunan suhu sebanyak 0,3°C. Hal ini sejalan dengan penelitian (Y. B. Fitri, 2017) hasil penelitian yang di dapatkan pada 32 anak umur 1-5 tahun yang mengalami demam di Rumah Sakit Umum Pringadi Medandidapatkan rata-rata suhu tubuh sebelum diberikan tepid sponging 38.7°C, rata-rata suhu tubuh setelah diberikan tepid sponging adalah 37.8°C, dan rata-rata jumlah penurunan suhu tubuh adalah 1.5°C.

Hal ini sejalan dengan (Hendrawati & Elvira, 2019) Rata-rata penurunan suhu tubuh dengan menggunakan hangat sponging adalah $1,09^{\circ}\text{C}$, sedangkan kompres plester adalah $0,06^{\circ}\text{C}$. Ditemukan bahwa penggunaan tepid sponging lebih efektif dalam menurunkan suhu tubuh, karena memberikan efek yang besar pada kulit manusia dibandingkan dengan kompres plester yang terfokus pada satu titik. Seperti halnya pendapat yang dikemukakan oleh (Faradilla & Abdullah, 2020) dalam penelitiannya tindakan *tepid sponge water* dilakukan dengan menyeka bagian tubuh terutama di lipatan-lipatan tubuh.

Dalam penanganan hipertermi pada kasus Typoid ini juga dilakukan tindakan kalaborasi yaitu pemberian cairan dan elektrolit intravena, dan pemberian obat, selama 3 hari pemberian intervensi pemberian cairan melalui intravena terpasang pada tangan kanan pasien dengan jenis cairan RL 24x tetes/menit, dan untuk pemberian obat diberikan yaitu paracetamol drips yang dialirkan melalui IV sebagai obat penurun demam. Dalam penanganan hipertermia dilakukan terapi obat seperti paracetamol. (Sudibyo *et.al.*, 2020).

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. AL-Anbiya/69:21

فَلَنَّا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

Terjemahnya:

“Kami (Allah) berfirman, “Wahai api! Jadilah kamu dingin, dan penyelamat bagi Ibrahim”. (Kementrian Agama, RI)

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa tindakan Allah swt. Untuk melindungi dan menolong Ibrahim dari kekejaman kaumnya, yaitu membakar Ibrahim dalam api yang sedang berkobar-kobar. Sebagaimana diketahui bahwa

Allah telah memberikan sifat-sifat tertentu bagi setiap makhluk-Nya. Sifat itu tetap berlaku baginya sebagai Sunnah Allah di dunia. Antara lain ialah api, yang bersifat panas dan membakar, sehingga logam-logam yang amat kuat pun dapat dicairkan dengan api, apalagi tubuh manusia. Maka Allah melindungi Ibrahim dari panas api tersebut dengan cara mencabut sifat panas dan membakar, dari api yang sedang menyala sehingga Ibrahim tidak merasa panas ketika dibakar dan tidak terbakar dalam api unggun yang menyala-nyala. Surah An-Nabiya' ini juga bisa dijadikan sebagai panawar demam yang bisa menjadi dingin dengan cara pemberian air.

Nabi Muhammad Saw. menyampaikan bahwa demam itu berasal dari semburan panas neraka Jahannam, maka panas yang dirasakan oleh orang yang sakit, itu berasal darinya. Sehingga panas itu dapat dihilangkan dengan air. *Tepid Water Sponge* merupakan teknik kompres dengan menggunakan air untuk menurunkan suhu tubuh.

Salah satu model keperawatan yang telah dikembangkan dalam tata layanan keperawatan adalah model konservasi yang dikembangkan oleh Mira. E., Levine. Berdasarkan model konservasi Levine, kebutuhan proses pemulihan dan tumbuh kembang pada anak dapat difasilitasi secara holistik. Model konservasi Levine merupakan model praktik keperawatan yang berfokus pada pemeliharaan energi untuk mengoptimalkan proses penyembuhan dan pertumbuhan anak. Selain itu, model ini juga bertujuan untuk meningkatkan adaptasi dan mempertahankan keutuhan seorang individu. Keutuhan tersebut

diapai dengan mempertahankan integritas struktur, integritas personal, dan integritas sosial pada pasien anak dan keluarga. (A. Fitri *et al.*, 2021)

Konsep utama model Levine terdiri dari wholism (menyeluruh/integritas), adaptasi dan konservasi. Sehat yang wholism (menyeluruh) adalah sesuatu yang bersifat organik, mengalami perubahan/kemajuan, saling menguntungkan antara perbedaan fungsi dan bagian yang ada di dalam tubuh, bersifat terbuka dan saling mempengaruhi dengan lingkungan sekitar. Secara umum, individu akan melakukan adaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Adaptasi adalah proses perubahan agar individu dapat mempertahankan integritas dalam lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Kondisi peningkatan suhu tubuh memerlukan adaptasi lingkungan internal tubuh maupun eksternal agar mampu mempertahankan dan mengembalikan kondisi homeostasis tubuh.

Model konservasi memungkinkan perawat anak dapat membantu seorang anak mencapai integritas dirinya. Model ini memberikan panduan tentang bagaimana hubungan perawat – klien dengan berfokus pada pengaruh dan respon klien untuk mempromosikan integritas klien melalui prinsip konservasi. Intervensi untuk mempertahankan integritas jaringan, konservasi energi, integritas personal dan psikososial yang terjadi pada anak dengan penyakit infeksi yang mengalami demam sangat penting (Kurniawan *et al.*, 2017).

Dalam kondisi demam, anak perlu mempertahankan konservasi energi untuk keseimbangan energi dan menghasilkan energi yang konstan untuk

menjalani kehidupan. Energi diperlukan untuk penyembuhan dan pertumbuhan. Pada kondisi peningkatan suhu tubuh (demam), agar klien dapat mempertahankan integritas struktur, perawat harus melakukan intervensi keperawatan dengan mengacu pada satu bagian prinsip konservasi.

Berdasarkan Model Levine, perawat harus mempertahankan integritas personal klien, selalu edukasi pengetahuan dan kekuatan sehingga individu dan keluarga dapat hidup mandiri. Perawat dapat mempertahankan konservasi integritas sosial anak melalui hubungan interpersonal, walaupun dalam kondisi anak sedang sakit. Perawat dapat mempertahankan konservasi energi misalnya dengan memberikan kompres pada anak, kondisi demam dan hipertermia membutuhkan intervensi keperawatan yang tetap berfokus pada tujuan intervensi keperawatan pada klien dengan peningkatan suhu tubuh yaitu untuk memberikan kenyamanan bagi klien dengan melakukan suatu upaya untuk mengembalikan suhu normal tubuh. Mengenai demam dan hipertermia adalah upaya untuk memperbaiki integritas struktur diharapkan klien dapat mengkonservasi energi untuk penyembuhannya.

Menurut Levine tugas perawat berpartisipasi secara aktif pada setiap lingkungan klien dan memberikan dukungan dalam penyesuaian diri klien terhadap kondisi yang sulit akibat penyakit. Model interaksi dan intervensi keperawatan ditujukan untuk peningkatan kemampuan adaptasi dan mempertahankan kesehatan secara keseluruhan. Intervensi keperawatan adalah mendorong adaptasi yang baik dari klien/keluarga atau menjadi lebih baik secara sosial, kemudian perawat melakukan tindakan terapeutik ketika respon

klien kurang baik, perawat menyediakan dukungan bagi klien. Pengobatan difokuskan pada manajemen dari respon ini terhadap penyakit.

Hal ini sesuai dengan teori Levine pada kasus An. M diberikan beberapa intervensi untuk mengatasi masalah hipertermi yang dialami anak, yaitu dengan pemberian kompres *tepid sponge water*, serta keluarga diberikan edukasi mengenai cara pemberian kompres *tepid sponge water* dan menganjurkan keluarga untuk mengompres anaknya sesuai dengan cara pelaksanaan intervensi yang telah diajarkan jika anaknya mengalami demam. Serta selama pemberian intervensi penulis tetap memperhatikan hubungan personal antara keluarga dengan perawat dengan baik.

5.5 Analisis Evaluasi Keperawatan

Dari hasil pemberian tindakan keperawatan berupa intervensi untuk manajemen hipertermia pada An. M yang dilakukan selama 3 hari hari evaluasi yang didapatkan pada hari pertama sampai hari ketiga yaitu hipertermia pasien dapat teratasi. Dimana suhu tubuh di hari pertama setelah diberikan kompres *Tepid sponge water* yaitu 39,5°C dan pada hari ketiga pemberian intervensi didapatkan hasil penurunan suhu tubuh menjadi 37,1°C. Dan saat hari pertama keadaan umum pasien tampak lemah dan pada hari ketiga pasien terlihat menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian terjadi penurunan suhu tubuh setelah diberikan intervensi tepid water sponge yaitu didapatkan hasil rata-rata suhu tubuh sebelum tindakan yaitu 38,6°C dan rata-rata suhu 30 menit setelah dilakukan tindakan kompres tepid water sponge yaitu menjadi 37,6°C.

5.6 Analisis EBPN

Analisis intervensi dengan masalah keperawatan utama yaitu hipertermia dengan pemberian intervensi berbasis EBPN dengan melakukan kompres *tepid sponge water*. Hasil dari intervensi selama 3 hari didapatkan penurunan suhu tubuh. Pada hari pertama pemberian intervensi suhu tubuh dari 39,5°C menjadi 38,7°C, hari kedua dari 38,6°C menjadi 37,2°C, pada hari ketiga yaitu dari 37,4°C menjadi 37,1°C. dengan kompres *tepid sponge water* dibeberapa titik tertentu yang memiliki pembuluh darah besar menyebabkan diluaran akan terjadi hangat, sehingga tubuh akan merespon bahwa suhu tubuh diluaran sudah cukup panas, sehingga tubuh akan menurunkan kontrol pengatur suhu yang ada di otak supaya tidak terjadi peningkatan suhu dipengatur suhu, dengan suhu diluaran hangat maka akan membuat pembuluh darah tepi dikulit melebar dan mengalami vasodilatasi sehingga pori-pori kulit akan membuka dan mempermudah pengeluaran panas. Sehingga akan terjadi perubahan suhu tubuh.

Teknik seka pada intervensi *tepid sponge water* ini dapat mempercepat pelebaran pembuluh darah perifer diseluruh tubuh sehingga proses penguapan panas dari kulit ke lingkungan sekitar akan lebih cepat dibandingkan dengan kompres hangat yang hanya di satu titik saja, sehingga hal inilah yang menjadi keunggulan dari intervensi *Tepid sponge water* dalam mempercepat proses penurunan suhu tubuh.

Tepid sponge water adalah sebuah teknik kompres hangat yang menggabungkan teknik kompres blok pada pembuluh darah supervisial dengan

teknik seka. Pada proses pemberian kompres tepid sponge ini mekanisme kerja pada kompres tersebut memberikan efek adanya penyaluran sinyal ke hipotalamus melalui keringat dan vasodilatasi perifer sehingga proses perpindahan panas yang diperoleh dari kompres tepid sponge ini berlangsung melalui dua proses yaitu konduksi dan evaporasi dimana proses perpindahan panas melalui proses konduksi ini dimulai dari tindakan mengompres anak dengan waslap dan proses evaporasi ini diperoleh dari adanya seka pada tubuh saat pengusapan yang dilakukan sehingga terjadi proses penguapan panas menjadi keringat. (Haryani *et al.*, 2018)

Dari hasil penelitian (W. Hastuti *et al.*, 2020) Hasil penelitian menunjukkan suhu tubuh anak sebelum teknik tepid sponge memiliki suhu terendah 37,8°C dan suhu tertinggi 39°C. Sedangkan suhu tubuh anak setelah teknik tepid sponge memiliki suhu terendah 37,5°C dan suhu tertinggi 38,7°C. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara suhu tubuh anak sebelum dan sesudah dilakukan “*tepid sponge technique*”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Karra *et al.*, 2020) terhadap 20 responden dengan menggunakan teknik kompres hangat konvensional dan teknik tepid sponge, distribusi responden berdasarkan tingkat demam, untuk kompres hangat konvensional pada pengukuran pre-test berada pada tingkat demam tertinggi yaitu 38,5°C. Nilai subfebril tertinggi adalah 37,9°C. Untuk teknik tepid sponge skor tertinggi 38,6°C dan subfebris tertinggi 38,20°C. Temperatur kompresi tertinggi pada penelitian ini adalah 38,6°C dengan teknik tepid sponge. Hasil penelitiannya menunjukkan untuk kompres

hangat kompres hangat konvensional pada menit ke 15 setelah kompres menyebabkan penurunan suhu tubuh. Pada menit ke 30 didapatkan nilai p 0,78 ($p > \alpha$) atau $0,78 > 0,05$ yang berarti tidak terjadi penurunan suhu tubuh bahkan cenderung meningkat dari nilai pre test. Sedangkan Perubahan suhu antara pre-test dan post-test pada kelompok kompres hangat untuk teknik tepid sponge adalah sebagai berikut. Pada 5 menit setelah pengompresan didapatkan nilai p sebesar $0,01 < 0,05$ yang berarti teknik tepid sponge berpengaruh terhadap penurunan suhu tubuh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa terjadinya penurunan suhu tubuh dengan pemberian kompres *tepid sponge water* selama 5 menit sudah terjadi penurunan suhu tubuh dibandingkan dengan pemberian kompres air hangat selama 15-30 menit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Mulyani, 2020) yang mengatakan bahwa *tepid sponge water* dilakukan dalam waktu 15 sampai 20 menit dalam 1 kali pelaksanaan menunjukkan hasil yang signifikan untuk penurunan suhu tubuh.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fajarawati & Mardiana, 2023) menyatakan bahwa rata rata suhu tubuh anak demam berdarah *dengue* sebelum diberikan terapi *tepid sponge water* adalah $38,2^{\circ}\text{C}$. Setelah diberikan *tepid sponge water*, nilai rata rata suhu tubuh anak demam berdarah *dengue* mengalami penurunan menjadi $37,6^{\circ}\text{C}$. Hasil uji *dependent test (paired t-test)* didapatkan nilai $p\text{-value} = 0,009 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian terapi *tepid sponge water* untuk mengatasi hipertermi pada pasien demam berdarah *dengue* di ruang anak RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh (Iskandar & Indaryani, 2022) hasil penelitiannya menemukan adanya penurunan rata-rata suhu tubuh anak sebelum dilakukan terapi *tepid sponge* (37,7°C) dengan setelah dilakukan terapi *tepid sponge* (37,1°C) dengan $p\text{ value} = 0,001$ yang berarti ada hubungan signifikan antara sebelum dilakukan terapi *tepid sponge* dan setelah dilakukan terapi *tepid sponge* pada responden (anak) yang mengalami demam.

Didukung dengan hasil penelitian oleh penelitian (Aini, *et. al.* 2022) yang menyatakan bahwa tindakan tepid sponge water yang dilakukan selama 10-15 menit, dengan cara menyeka seluruh permukaan tubuh dengan menggunakan washlap yang sudah di rendam di air hangat. Didapatkan hasil penurunan suhu tubuh sebesar 1°C. Tindakan pemberian tepid sponge water dapat dijadikan tindakan mandiri perawat dalam mengatasi masalah hipertermia. Seperti halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Haryani, *et. al.* 2018) menyatakan bahwa tepid sponge water berpengaruh terhadap penurunan suhu tubuh, sebelum dilakukan tepid sponge water sebagian besar (73,34%) anak berada pada suhu 38-39°C. Suhu tubuh setelah dilakukan tepid sponge water sebagian besar anak (63%) berada pada suhu 37-38°C. Perbedaan suhu tubuh anak pada uji T berpasangan untuk kelompok intervensi diperoleh nilai signifikansi 0.000 ($p\text{value} < 0,05$) artinya terjadi perbedaan yang signifikan antara sebelum dilakukan terapi dan setelah dilakukan terapi *tepid sponge water*.

Teknik kompres tepid water sponge dapat mempercepat vasodilatasi pembuluh darah perifer di seluruh tubuh sehingga pengeluaran panas dari tubuh

melalui kulit lebih cepat dibandingkan teknik kompres air hangat yang hanya pada daerah tertentu. Teknik kompres tepid water sponge lebih cepat memberikan rangsangan atau sinyal ke hipotalamus melalui sumsum tulang belakang. Ketika reseptor yang peka terhadap panas di hipotalamus dirangsang, sistem efektor mengeluarkan sinyal melalui berkeringat dan vasodilatasi perifer. Perubahan pembuluh darah diatur oleh pusat vasometer pada medulla oblongata dari tangkai otak di bawah pengaruh hipotalamus bagian anterior sehingga terjadi vasodilatasi. Dengan terjadinya vasodilatasi ini menyebabkan pembuangan atau kehilangan energi panas melalui kulit meningkat (yang ditandai dengan tubuh mengeluarkan keringat), kemudian suhu tubuh dapat menurun atau normal (Puspitasari *et al.*, 2022).

Terapi Tepid Sponge dilakukan dengan menggunakan air hangat dengan suhu 30-40°C, suhu air disesuaikan dengan suhu anak pada saat mengalami demam, semakin tinggi demam maka suhu air sebaiknya lebih ditinggikan, hal ini bertujuan untuk lebih mempercepat pelepasan panas melalui konduksi, konveksi, radiasi dan evaporasi. (Iskandar & Indaryani, 2022)

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur'an Q.S. Asy-Syu'raa/26:80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”
(Kementrian Agama, RI).

Allah swt. yang berkuasa dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita oleh manusia. Maka dari itu seseorang baiknya mencari tahu apa yang harus dilakukan dalam mencapai kesembuhan tersebut. Dalam tafsirannya Imam Jamaluddin al-Qasimi menjabarkan bahwa yang dimana ayat ini menceritakan gambaran tentang tata susila manusia kepada Tuhannya. Dikarenakan penyakit terkadang datang karena perbuatan hambanya sendiri, misalnya karena pola hidup sehari-hari yang tidak baik, pelanggaran terhadap norma-norma kesehatan maka dari itu mucullah penyakit dari tubuh manusia itu sendiri. Dan sebaliknya penyembuh yang sebaik-baiknya itu datangnya dari Allah swt. Apabila seseorang sakit maka ia sangat merasakan waktu ia diberikan cobaan kepada Allah, dan jika ia sembuh maka seseorang akan menghayati pula kenikmatan yang diberikan oleh Allah swt. (Kementrian Agama, RI).

5.7 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak melakukan pengukuran secara murni terkait pemberian kompres *tepid sponge water* terhadap pasien, dikarenakan adanya kalaborasi pemberian obat antipirek yaitu pemberian paracetamol sesuai dengan anjuran dokter yang harus dipatuhi jadwal pemberian obatnya.

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Pengkajian

Berdasarkan data pengkajian yang didapatkan pada pasien dengan demam typoid dengan masalah hipertermia adalah: keadaan umum tampak lemah, kulit pasien teraba hangat, kulit wajah tampak kemerahan, saat dilakukan pemeriksaan fisik suhu tubuh didapatkan 39,5°C. dan ibu pasien mengatakan anaknya demam 4 hari saat masuk dipuskesmas, dengan pemeriksaan laboratorium menunjukan Widal positif dengan nilai rujukan O : 1/320, AH 1/160, BH: 1/88

6.1.2 Diagnosis keperawatan

Diagnosis keperawatan dengan kasus yang ditemui secara langsung yaitu didapatkan data pada pasien dengan Typhoid yaitu Hipertermia

6.1.3 Intervensi keperawatan

Dalam kasus ini, perencanaan yang disusun untuk klien disesuaikan dengan masalah keperawatan yang telah ditegakkan pada klien telah mengacu pada standar intervensi dan standar luaran keperawatan Indonesia dengan menggunakan kompres Tepid sponge water untuk mengatasi masalah Hipertermia

6.1.4 Implementasi keperawatan

Tindakan keperawatan yang dilakukan disesuaikan dengan rencana tindakan yang telah penulis susun, implementasi yang dilakukan

berdasarkan pada rencana keperawatan yang telah dibuat sesuai dengan kondisi pasien. Dalam implementasi selama 3 hari dengan pemberian intervensi tepid sponge water efektif dalam menurunkan hipertermia pada pasien Typoid yaitu dari suhu 39,5°C menjadi 37,1°C.

6.1.5 Evaluasi keperawatan

Dari hasil perkembangan kondisi pasien selama 3 hari perawatan dengan menggunakan kompres tepid sponge water ternyata terjadi penurunan suhu tubuh.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi perawat

Intervensi dapat didiskusikan dengan perawat pelaksana di ruangan agar dapat dievaluasi kembali keefektifan intervensi yang diberikan

6.2.2 Bagi institusi

Diharapkan laporan seminar akhir ini dapat menjadi acuan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien Typhoid perlu dilakukannya penelitian yang lebih lanjut dengan kasus yang lain.

6.2.3 Bagi mahasiswa

Sebelum melakukan intervensi kompres *tepid sponde water* sebaiknya memberikan informed consent yang baik, serta dapat membina hubungan saling percaya dengan pasien khususnya pada pasien anak-anak, agar pasien dapat tertarik dan bisa kooperatif saat pemberian intervensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N., Nurhaeni, N., & Wanda, D. (2021). Kompres Dengan Teknik Warm Water Sponge Pada Pasien Anak Yang Mengalami Demam. *The Indonesian Journal Of Infectious Diseases*, 7(2), 20. <https://doi.org/10.32667/Ijid.V7i2.119>
- Aini, L., Astuti, L., Suswitha, D., & Arindari, D. R. (2022). Implementasi Tepid Water Sponge Dalam Mengatasi Masalah Hipertemia Pada Penderita Demam Berdarah Dangu. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, 9(2).
- Andayani, & Ika Fibriana, A. (2018). *Kejadian Demam Tifoid Di Wilayah Kerja Puskesmas Karangmalang*. 2(1), 57–68.
- Ardiaria, M. (2019). *Epidemiologi, Manifestasi Klinis, Dan Penatalaksanaan Demam Typhoid*. 7(2), 32–38. <https://doi.org/10.26222/2622-8483>; P ISSN: 2338-3380
- Aru, & Sudoyo. (2009). *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam* (V). Interna Publishing.
- Awaludin, S., A, A. C. N., & Sekarwati, W. (2018). Hubungan Kecemasan Dengan Kualitas Hidup Pasien Post Coronary Artery Bypass Graft (Cabg) Di Ruang Rehabilitasi Jantung Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 1(1), 243–247.
- Desli Sumarni. (2021). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Terhadap Perawat Demam Thypoid Pada Anak Di RSUD Pariaman. *Initium Medica Journal*, 1(1), 2.
- Faradilla, F., & Abdullah, R. (2020). *The Effectiveness Of The Water Tepid Sponge To Decrease The Body Temperature In Children With Febrile Seizure*. *Jurnal Kesehatan Pasak Bumi Kalimantan*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.30872/J.Kes.Pasmi.Kal.V3i2.4935>
- Fajarwati, E., & Nurvianananda, R., Mardiana, N., (2023) Pengaruh Pemberian Terapi Tepid Sponge Water Untuk Mengatasi Hipertermi Pada Pasien Demam Berdarah Dengue. Bangka Belitung. e-ISSN 2715-6885; p-ISSN 2714-9757
- Fitri, A., Nani, N., & Wanda, D. (2021). *Fluid And Electrolyte; Infectious Disease; Levine; S Conservation Model*. 2013–2015.
- Fitri, Y. B. (2017). Pengaruh Tepid Sponge Terhadap Penurunan Demam Pada Anak Usia 1-5 Tahun Di Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan. *Jurnal Keperawatan Flora*, 10(1), 14–20.
- Haryani, S., Adimayanti, E., & Astuti, A. P. (2018). Pengaruh Tepid Sponge Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak Pra Sekolah Yang Mengalami

- Demam Di Rsud Ungaran. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 7(1), 44. <https://doi.org/10.31596/Jcu.V0i0.212>
- Hastuti, D., Kulsum, D. U., Ismuhu, S. R., & Ropei, O. (2021). Effectiveness Of Tepid Sponge Compresses And Plaster Compresses On Child Typhoid Patients With Fevers. *Kne Life Sciences*, 2021(2014), 1078–1087. <https://doi.org/10.18502/Kls.V6i1.8784>
- Hastuti, W., Sari, N. M., & Wulaningsih, I. (2020). Tepid Sponge And Sponge Bath To Change Body Temperature Children With Dengue Fever. *South East Asia Nursing Research*, 2(2), 15. <https://doi.org/10.26714/Seanr.2.2.2020.15-18>
- Hendrawati, & Elvira, M. (2019). Effect Of Tepid Sponge On Changes In Body Temperature In Children Under Five Who Have Fever In Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Hospital. *Enfermeria Clinica*, 29, 91–93. <https://doi.org/10.1016/J.Enfcli.2018.11.029>
- Irlianti, E., Immawati, & Nurhayati, S. (2021). Penerapan Tepid Sponge Terhadap Masalah Keperawatan Hipertermi Pada Pasien Anak Demam Usia Toddler (1 – 3 Tahun) The Application Of Tepid Sponge To Hypertermi Nursing Problems In Patients Children Of Toddler Age. *Jurnal Cendekia Muda*, 1(3)
- Iskandar, S., & Indaryani, (2022). Efektifitas Terapi Tepid Sponge Water Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak Demam Di Wilayah Kerja Puskesmas Lingkar Barat Kota Bengkulu.
- Karra, A. K. D., Anas, M. A., Hafid, M. A., & Rahim, R. (2020). The Difference Between The Conventional Warm Compress And Tepid Sponge Technique Warm Compress In The Body Temperature Changes Of Pediatric Patients With Typhoid Fever. *Jurnal Ners*, 14(3), 321–326. <https://doi.org/10.20473/Jn.V14i3.17173>
- Khairunnisa, S., Hidayat, E. M., & Herardi, R. (2020). Hubungan Jumlah Leukosit Dan Persentase Limfosit Terhadap Tingkat Demam Pada Pasien Anak Dengan Demam Tifoid Di RSUD Budhi Asih Tahun 2018 – Oktober 2019. *Seminar Nasional Riset Kedokteran (SENSORIK)*, 60–69.
- Koerniawan, D., Daeli, N. E., & Srimiyati, S. (2020). Aplikasi Standar Proses Keperawatan: Diagnosis, Outcome, Dan Intervensi Pada Asuhan Keperawatan. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 3(2), 739–751. <https://doi.org/10.31539/Jks.V3i2.1198>
- Kristiyaningsih, K., & Nurhidayati, T. (2021). Penerapan Water Tepid Sponge Pada Anak Demam di Puskesmas Pringsurat Kabupaten Temanggung.
- Kurniawan, D. E., Kristianto, H., & Suharsono, T. (2017). Aplikasi Model Konservasi Levine Dalam Asuhan Keperawatan Pasien Selulitis. *Prosiding Seminar Nasional Dan Workshop Publikasi Ilmiah*, 1, 40–48.
- Levani, Y., & Prastya, A. D. (2020). Demam Tifoid: Manifestasi Klinis, Pilihan Terapi Dan Pandangan Dalam Islam. *Al-Iqra Medical Journal : Jurnal*

Berkala Ilmiah Kedokteran, 3(1), 10–16.
<https://doi.org/10.26618/Aimj.V3i1.4038>

- Manalu, T. N., & Rantung, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Demam Tifoid. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 3(November), 653–660.
- Mulyani, E. . N. E. L. (2020). Efektifitas Tepid Water Sponge Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak Dengan Masalah Keperawatan Hipertermia: Studi Kasus. *Perilaku Pencegahan Penyakit Tidak Menular Pada Remaja Ambon*, 2(1), 16.
- Nurarif, A. H., & Kusuma, H. (2015). *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosis Medis & NANDA NIC-NOC*. Mediaaction.
- Nursalam, Rekawati, S., & Utrami, S. (2015). *Asuhan Keperawatan Bayi Dan Anak (Untuk Perawat Dan Bidan)*. Salemba Medika.
- Prihatsanti, U., Suryanto, S., & Hendriani, W. (2018). Menggunakan Studi Kasus Sebagai Metode Ilmiah Dalam Psikologi. *Buletin Psikologi*, 26(2), 126.
<https://doi.org/10.22146/Buletinpsikologi.38895>
- Puspitasari, R. . H., Handayani, D., Nastiti, A. D., & Kusuma, E. (2022). *INDONESIAN JOURNAL OF COMMUNITY EFFECT OF TEPID SPONGE ON CHANGES IN BODY TEMPERATUR IN*. 11–17.
<https://doi.org/10.20473/Ijchn.V7i1.37886>
- Rahayu, S. F., & Muhsinin. (2022). *Penerapan Tepid Sponge Water Untuk Meningkatkan Demam Pada Anak Dengan Kejang Demam Di RSUD DR.H.Moch Ansari Saleh Banjarmasin*. 3(2), 36–40.
- Rahmawati, I., & Purwanto, D. (2020). Efektifitas Perbedaan Kompres Hangat Dan Dingin Terhadap Perubahan Suhu Tubuh Pada Anak Di RSUD DR. M. Yunus Bengkulus. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 8(2), 246–255.
- Renowati, & Soleha, M. S. (2019). Hubungan Uji Diagnostik Widal Salmonella Typhi Dengan Hitung Leukosit Pada Suspek Demam Tifoid. *Prosiding Seminar Kesehatan Perintis*, 2(1), 1–6.
- Rifaldi, I., & Wulandari, D. K. (2020). Efektifitas Pemberian Kompres Tepid Water Sponge Dan Pemberian Kompres Bawang Merah Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Anak Demam Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, 5(2), 175–181.
<https://doi.org/10.51143/Jksi.V5i2.247>
- Risnah, & Irwan, M. (2021). *Falsafah Dan Teori Keperawatan Dalam Integrasi Keilmuan*. Alauddin University.
- Saputra, D. A. (2021). *Terapi Pada Demam Typoid Tanpa Komplikasi*. 3, 213–222.
[https://doi.org/E-ISSN 2715-6885; P-ISSN 2714-9757](https://doi.org/E-ISSN%202715-6885;P-ISSN%202714-9757)
- SDKI. (2017). *Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia*. Dewan Pengurus Pusat.


- SIKI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, Defenisi Dan Tindakan Keperawatan* (Edisi 1).
- SLKI, P. D. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi Dan Kriteria Hasil Keperawatan* (Edisi 1).
- Smeltzer, & Bare. (2014). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddart* (8 Vol3). EGC.
- Soedarmo, S, S., & Poorwo. (2008). *Buku Ajar Infeksi Dan Pediatri Tropis*, (Kedua). Badan Penerbit IDAI.
- Suntari, N. Y. C., Astini, P. S. N., & Sugiani, N. M. D. (2019). Pengaturan Suhu Tubuh Dengan Metode Tepid Water Sponge Dan Kompres Hangat Pada Balita Demam. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 10. <https://doi.org/10.26630/Jk.V10i1.897>
- Suprpti, A, R., & A.M, L. (2020). Pengaruh Tepid Sponge Dalam Menurunkan Suhu Tubuh Anak Usia Pra Sekolah Yang Mengalami Demam Di Rumah Sakit Tentara Bhakti Wira Tamtama Semarang. *Jurnal Keperawatan Sisthana*, 5(2), 1–6.
- Teana, R. I. I., & Utami, R. D. Pu. (2022). *Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan Demam Tifoid Dalam Pemenuhan Kebutuhan Termogulasi*. 8.5.2017, 2003–2005.
- Ulfa, F., & Handayani, O. W. K. (2018). Kejadian Demam Tifoid Di Wilayah Kerja Puskesmas Pagiyanten. *HIGEIA (Journal Of Public Health Research And Development)*, 2(2), 227–238. <https://doi.org/10.15294/Higeia.V2i2.17900>
- Wulandari, Y., Nuriman, A., Keperawatan Bunda Delima Bandar Lampung Jl Bakau No, A., & Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung, T. (2022). Efektifitas Kompres Hangat Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak Dengan Typhoid. *Agustus*, 4(2), 44–54.
- Yulianingsih, E., & Rasyid, P. S. (2020). Pijat Bayi Berpengaruh Terhadap Kuantitas Tidur Bayi Usia 3-6 Bulan. *JIDAN (Jurnal Ilmiah Bidan)*, 7(1), 20–28. <https://doi.org/10.47718/Jib.V7i1.1089>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pathway Demam Thypoid

Menurut (Nurarif & Kusuma, 2015)



Lampiran 2 jurnal utama



EFFECT OF TEPID SPONGE ON CHANGES IN BODY TEMPERATUR IN CHILDREN

R.A.Helda Puspitasari¹, Dwining Handayani², Ayu Dewi Nastiti, and Erik Kusuma³

Faculty of Nursing, University of Jember, Jember, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received: 05 October 2022

Accepted: 14 August 2022

CONTACT

R.A. Helda Puspitasari
helda.akper@unej.ac.id
D3 Nursing Study Program,
Faculty of Nursing, University of
Jember, Indonesia

ABSTRACT

Introduction: Fever is a state of body temperature above normal as a result of an increase in temperature control in the hypothalamus. Most children have fever due to thermoregulation in the hypothalamus. The purpose of literature review is to explore the effect of giving a water tepid sponge on reducing fever in children.

Method: This study uses the literature review with article searches conducted on the electronic databases of Science Direct, Garuda and Google Scholar. There were 543 articles on Science Direct, Garuda and Google Scholar but only 10 articles that met all the inclusion criteria and were reviewed

Results: There is an effect on reducing fever in children by using a water tepid sponge.

Conclusion: Based on the results of a review of 10 literatures on reviewed the characteristics of study respondents aged 1-12 years. Respondents who experienced hyperthermia/increased body temperature there was an influence of changes/decreased body temperature by giving water tepid sponge an average repeatedly so that the body temperature becomes 100% normal. The average temperature of children with fever in the 10 literatures is 38.5°C, the result with p value = 0.001 on the tepid water sponge which means that there is an effect of decreasing body temperature with the action of the water tepid sponge.

Keywords: Tepid Sponge; Body Temperature

Cite as:

Puspitasari, R., A., H. Handayani, D., Nastiti, A., D., and Kusuma, E. (2022). *The Effect Of Tepid Sponge On Changes In Body Temperatur In Children: A Literature Review*. *Indonesian J. of Community Health Nurs.*, 7(1), 11-17. Doi: 10.20473/ijchn.v7i1.37886

INTRODUCTION

Fever is a state of body temperature above

Cases of fever in children in Asia, Japan are 20%, South America and Europe are 3-4%, then in India

Lampiran 3

Jurnal Pendukung

Jurnal Ners
Vol. 14, No. 3, Special Issue 2019
[http://dx.doi.org/10.20473/jn.v14i3\(si\).17173](http://dx.doi.org/10.20473/jn.v14i3(si).17173)

This is an Open Access article distributed
under the terms of the [Creative Commons](#)
[Attribution 4.0 International License](#)



Original Research

The Difference Between the Conventional Warm Compress and Tepid Sponge Technique Warm Compress in the Body Temperature Changes of Pediatric Patients with Typhoid Fever

Aulya Kartini Dg Karra¹, Muh. Aswar Anas², Muh. Anwar Hafid², and Rosdiana Rahim²

¹Faculty of Nursing, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

²Faculty of Medicine and Health Sciences, Alauddin State Islamic University Makassar, South Sulawesi, Indonesia

ABSTRACT

Introduction: The use of warm compresses and warm sponge techniques as a modality therapy for the management of fever in typhoid children has a good influence. The purpose of this research was to learn of the differences between conventional warm compress and the tepid sponge technique as related to the body temperature changes of pediatric patients with typhoid fever. A fever that does not get a good standard of treatment can cause dehydration, neurological damage and febrile seizures.

Methods: The research design was quasi-experiment with two groups pre-post test. The population was taken from the Kampili Community Health Center while the 20 samples were taken using the purposive sampling technique. Conventional warm compresses were placed on the forehead, while warm tepid sponges were compressed and placed on the forehead, armpits and the folds of the thighs simultaneously.

Results: The data of the results were significance tested using the General linear model repeated measure (p value 0.03 for conventional warm compresses and p value 0.01 on a warm compress tepid sponge technique).

Conclusion: Statistically, the warm compress tepid sponge technique is more meaningful and qualitatively, the temperature change is better after the compression.

ARTICLE HISTORY

Received: Dec 26, 2019

Accepted: Dec 31, 2019

KEYWORDS

typhoid; children; warm; compresses; warm sponge; fever

CONTACT

Aulya Kartini Dg Karra

✉ aulya.kartini.dg-2018@fkn.unair.ac.id

✉ Faculty of Nursing, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Lampiran 4

Riwayat Hidup



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Sri Wahyuningsih, lahir di Takalar pada tanggal 11 Oktober 1999. Penulis merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara dari pasangan bapak Dahlan S.E dan Ibu Fatmawati. Penulis dengan yang akrab dipanggil Ningsih ini mulai menggeluti bangku pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2005 di SD 123 Inpres Garonggong dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mangarabombang dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Takalar dan selesai pada tahun 2017. Setelah menempuh pendidikan SMA di tahun yang sama penulis memasuki bangku perkuliahan yang merupakan salah satu Universitas Negeri yang ada di Kota Makassar, yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan pada tahun 2017-2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di program studi Profesi Ners, tak henti-hentinya penulis mengucapkan syukur karena sampai saat ini masih diberi kesehatan sehingga bisa melewati segala rintangan yang disertai dengan perjuangan dan doa dari kedua orang tua penulis, seluruh keluarga, serta rekan-rekan seperjuangan yang selalu siap untuk bertukar pikiran dan dapat membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pasien Typhoid Dengan Masalah Hipertermia Menggunakan *Tepid Sponge Water* Di Ruang Rawat Inap Puskesmas Bontomarannu”.

Lampiran 5

Turnitin

Sri 02/1/23			
ORIGINALITY REPORT			
21 %	22 %	3 %	9 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repositori.uin-alaudidin.ac.id Internet Source	8 %	
2	repo.stikesperintis.ac.id Internet Source	5 %	
3	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1 %	
4	eprints.kertacendekia.ac.id Internet Source	1 %	
5	vdocs.tips Internet Source	1 %	
6	repository.poltekkes-kaltim.ac.id Internet Source	1 %	
7	Submitted to Seoul Venture University Student Paper	1 %	
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %	
9	drdicoret.blogspot.com Internet Source	1 %	
10	perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id Internet Source	1 %	
11	www.scribd.com Internet Source	1 %	
12	ejurnal.poltekkes-manado.ac.id Internet Source	1 %	
Exclude quotes 0%			
Exclude bibliography 0%			
Exclude matches 0%			