

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN
HEMORRHAGIC STROKE DENGAN PENURUNAN
KAPASITAS ADAPTIF INTRAKRANIAL MENGGUNAKAN
INTERVENSI MOBILISASI PROGRESIF LEVEL 1
DI RUANGAN ICU RSUP.DR WAHIDIN
SUDIROHUSODO MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Oleh:

GHINA SYAFIRA YULIANTI SYAM, S.KEP
NIM: 70900122030

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN
HEMORRHAGIC STROKE DENGAN PENURUNAN
KAPASITAS ADAPTIF INTRAKRANIAL MENGGUNAKAN
INTERVENSI MOBILISASI PROGRESIF LEVEL 1
DI RUANGAN ICU RSUP.DR WAHIDIN
SUDIROHUSODO MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

GHINA SYAFIRA YULIANTI SYAM, S.KEP
NIM: 70900122030

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ghina Syafira Yulianti Syam, S.Kep
NIM : 70900122030
Tempat/Tgl.Lahir : Sengkang, 12 Juli 2000
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Hemorrhagik Stroke* dengan Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial Menggunakan Intervensi Mobilisasi Progresif Level 1 Di Ruang ICU RSUP.Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Mei 2023

Penyusun,

Ghina Syafira Yulianti Syam, S.Kep
NIM:70300122030


PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Ghina Syafira Yulianti Syam, S.Kep NIM: 70300122030, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Hemorrhagic Stroke* dengan Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial Menggunakan Intervensi Mobilisasi Progresif Level 1 Di Ruang ICU RSUP. Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar”, memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 12 Juni 2023


Ilhamsyah, S.Kep.,Ns.,M.Kep
Pembimbing I


Eva Yustilawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep
Pembimbing II

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Hemorrhagic Stroke* dengan Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial Menggunakan Intervensi Mobilisasi Progresif Level 1 Di Ruang ICU RSUP. Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar”, yang disusun oleh Ghina Syafira Yulianti Syam, S.Kep, NIM: 70900122030, mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada 16 Juni 2023, bertepatan dengan 16 Dzulkaidah 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, Juni 2023 M
Zulqaida 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	:	Dr.dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	:	Dr. Patima S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy I	:	Andi Budiyanto Adi Putra, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy II	:	Dr. Muhaemin, S.Ag.,M.Th.I.,M.Ed	(.....)
Pembimbing I	:	Ilhamsyah, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Pembimbing II	:	Eva Yustilawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar



Dr.dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 00

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Shalawat beserta salam kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Hemorrhagic Stroke* dengan Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial Menggunakan Intervensi Mobilisasi Progresif Level 1 Di Ruang ICU RSUP. Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar” ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan di Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.


Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr.dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Kepala Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ilhamsyah, S.Kep.,Ns.,M.Kep dan Eva Yustilawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini.
4. Seluruh Dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Keluarga tercinta terimakasih yang tak terhingga atas doa dan dukungannya selama ini.
6. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu dalam penyusunan proposal tugas akhir ners ini.

Penulis mengharapkan tugas ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Makassar, Juni 2023

Penulis.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-5
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6-30
A. Konsep medis	6
1. Definisi	6
2. Etiologi	6
3. Klasifikasi.....	10
4. Patofisiologi.....	11
5. Manifestasi Klinis.....	12
6. Penatalaksanaan.....	14
7. Pemeriksaan Penunjang.....	15
8. Komplikasi	15
9. Penyimpangan KDM.....	17

B.	Konsep Asuhan Keperawatan	19
1.	Pengkajian	19
2.	Diagnosis Keperawatan	20
3.	Rencana/Intervensi Keperawatan	21
4.	Implementasi Keperawatan	26
5.	Evaluasi Keperawatan	26
C.	Evidence Based Practice in Nursing	28
1.	Pengertian	28
2.	Tujuan	29
3.	Indikasi	29
4.	Kontraindikasi	29
5.	Prosedur Pemberian	29
6.	Kriteria Evaluasi	29
7.	Artikel Utama dan Pendukung	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		31-33
A.	Rancangan Studi Kasus	31
B.	Subyek Studi Kasus	31
C.	Fokus Studi Kasus	31
D.	Instrumen Studi Kasus	31
E.	Prosedur Pengambilan Data	32
F.	Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus	32
G.	Analisis Data dan Penyajian Data	32
H.	Etika Studi Kasus	33
BAB IV LAPORAN KASUS		35-77
A.	Pengkajian	35
B.	Rencana Tindakan Keperawatan	60

C. Implementasi Dan Evaluasi	77
BAB V PEMBAHASAN	94-116
A. Analisis Asuhan Keperawatan	94
1. Analisis Pengkajian Keperawatan	94
2. Analisis Diagnosis keperawatan.....	95
3. Analisis Intervensi Keperawatan.....	97
4. Analisis Implementasi Keperawatan	104
5. Analisis Evaluasi Keperawatan	106
B. Analisis Intervensi EBPN	109
C. Keterbatasan.....	116
BAB VI PENUTUP	117-118
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119
Lampiran Jurnal Utama	124
Lampiran Dokumentasi Implementasi	125

DAFTAR TABEL

Table 1 Perbedaan PIS dan PSA	14
Table 2 Rencana Tindakan Keperawatan.....	25
Table 3 Hasil Pemeriksaan Laboratorium.....	48
Table 4 Scoring Dekubitus.....	50
Table 5 Barthel Index.....	51
Table 6 Analisis Data	59
Table 7 Rencana Tindakan Keperawatan.....	67
Table 8 Implementasi dan Evaluasi	93



ABSTRAK

Nama : Ghina Syafira Yulianti Syam
NIM : 70900122030
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Hemorrhagic Stroke* dengan Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial Menggunakan Intervensi Mobilisasi Progresif Level 1 Di Ruang ICU RSUP. Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar.

Latar Belakang: Prevalensi stroke yang didiagnosis dokter di Indonesia pada tahun 2018 berusia ≥ 15 tahun (10,9%) atau diperkirakan sebanyak 2.120.362 orang. Sulawesi Selatan memiliki prevalensi stroke tertinggi berdasarkan diagnosis dan gejala yang dilaporkan oleh tenaga kesehatan. Stroke hemoragik adalah stroke yang diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak, yang mengakibatkan iskemia dan hipoksia hilir. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi penurunan kapasitas adaptif intrakranial adalah dengan melakukan mobilisasi progresif level 1. **Tujuan** penulisan adalah Melaksanakan Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Hemorrhagic Stroke* dengan Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial Menggunakan Intervensi Mobilisasi Progresif Level 1 Di Ruang ICU RSUP. Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar. **Metode** yang digunakan adalah studi kasus dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Penatalaksanaan mobilisasi progresif level 1 satu kali dalam sehari selama 3 hari pemberian. **Hasil** penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi progresif level 1 satu kali dalam sehari selama 3 hari sebelum dan sesudah intervensi didapatkan bahwa mobilisasi progresif level 1 dapat digunakan untuk menstabilkan tekanan darah, tingkat kesadaran dan saturasi oksigen. **Kesimpulan** berdasarkan hasil studi kasus yang dilakukan menyatakan bahwa penerapan mobilisasi progresif level 1 yang dilaksanakan satu kali dalam sehari, menunjukkan bahwa pada hari pertama sampai hari ketiga implementasi terjadi peningkatan status hemodinamik dalam hal ini tekanan darah membaik, saturasi oksigen meningkat dan tingkat kesadaran meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa mobilisasi progresif level 1 efektif dilakukan pada pasien yang mengalami masalah terhadap penurunan kapasitas adaptif intracranial.

Kata Kunci: *Hemorrhagic Stroke*, Mobilisasi Progresif Level 1, Saturasi Oksigen, Tekanan darah,

ABSTRACT

Name : Ghina Syafira Yulianti Syam
NIM : 70900122030
Title : *Analysis of Nursing Care in Hemorrhagic Stroke Patients with Decreased Intracranial Adaptive Capacity Using Level 1 Progressive Mobilization Intervention in the ICU Room of RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.*

Background: The prevalence of stroke diagnosed by doctors in Indonesia in 2018 was aged ≥ 15 years (10.9%) or an estimated 2,120,362 people. South Sulawesi has the highest prevalence of stroke based on diagnosis and symptoms reported by health workers. Hemorrhagic stroke is a stroke caused by rupture of a blood vessel in the brain, which results in downstream ischemia and hypoxia. One of the interventions that can be done to overcome the decrease in intracranial adaptive capacity is to perform stage progressive mobilization. **The purpose** of writing is to Implement Nursing Care in Hemorrhagic Stroke Patients with Decreased Intracranial Adaptive Capacity Using Level 1 Progressive Mobilization Interventions in the ICU Room of RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. **The method** used is a case study with data collection techniques through observation, interviews, physical examination and documentation. Management of level 1 progressive mobilization once a day for 3 days of administration. **The results** showed that level 1 progressive mobilization once a day for 3 days before and after the intervention found that level 1 progressive mobilization could be used to stabilize blood pressure, level of consciousness and oxygen saturation. **The conclusion** based on the results of the case studies conducted stated that the implementation of level 1 progressive mobilization which was carried out once a day, showed that on the first day to the third day of implementation there was an increase in hemodynamic status in this case the blood pressure improved, oxygen saturation increased and the level of consciousness increased. This indicates that level 1 progressive mobilization is effective in patients who have problems with decreased intracranial adaptive capacity.

Keywords: Blood Pressure, Hemorrhagic Stroke, , Level 1 Progressive Mobilization, Oxygen Saturation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Intensif Care Unit (ICU) adalah unit perawatan intensif yang disediakan oleh rumah sakit untuk merawat pasien dengan keadaan khusus yang memerlukan kondisi pasien tersebut. Ini memiliki peralatan medis canggih yang dipantau 24 jam sehari oleh perawat, dokter jaga, dan staf lainnya. (Erna Satwika, 2022)

Stroke merupakan penyebab kematian ketiga di negara industri setelah penyakit arteri koroner (13%) dan kanker (12%). Prevalensi stroke bervariasi di berbagai belahan dunia (Mutiarasari, 2019). Jumlah orang yang menderita stroke di seluruh dunia meningkat setiap tahunnya, dengan satu dari empat orang mengalami stroke dalam hidup mereka. Data dari *World Stroke Organization* menunjukkan terdapat 13,7 juta kasus stroke baru dan 5,5 juta kematian setiap tahunnya (Organization, 2021). Prevalensi stroke yang didiagnosis dokter di Indonesia tahun 2018 pada penduduk usia ≥ 15 tahun (10,9%), atau diperkirakan 2.120.362 orang (Kemenkes RI, 2019). Dan Prevalensi stroke berdasarkan diagnosis nakes dan gejala tertinggi terdapat di Sulawesi Selatan (17,9%), diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta (16,9%). Prevalensi penyakit stroke tertinggi di Indonesia yaitu Sulawesi Selatan berdasarkan gejala dan diagnosis oleh tenaga kesehatan pada tahun 2007 sebesar 7,4% dan terjadi peningkatan drastis pada tahun 2013 yaitu 17,9% RISKESDAS 2013 dalam (Nurhikmah et al., 2021).

Stroke yang tiba-tiba dapat menyebabkan kecacatan fisik dan mental serta kematian, baik pada usia produktif maupun pada usia lanjut. Stroke terbagi menjadi stroke iskemik dan stroke hemoragik. Secara umum, sekitar 50% stroke hemoragik berakibat fatal, sementara hanya 20% stroke iskemik yang berakibat fatal. Stroke hemoragik terjadi karena pembuluh darah bocor (berdarah) di otak.

Tekanan darah tinggi/hipertensi merupakan faktor resiko terpenting dalam hal keparahan resiko stroke. Faktor lain termasuk merokok, hiperlipidemia, fibrilasi atrium, penyakit jantung iskemik, penyakit katup jantung dan diabetes. (Hutagalung, 2019). Menurut Setiawan, (2020), Stroke hemoragik dapat terjadi melalui berbagai mekanisme. Stroke hemoragik dapat terjadi melalui berbagai mekanisme. Stroke hemoragik yang berhubungan dengan hipertensi terjadi pada

stroke dalam yang berasal dari arteri tembus seperti basal ganglia (50%), lobus otak (10% sampai 20%), talamus (15%), pons, dan batang otak (10% sampai 20%).) dan serebelum (10%), stroke lobus yang terjadi pada pasien usia lanjut dikaitkan dengan angiopati amiloid serebral.

Tanda atau gejala klinis yang biasa adalah defisit neurologis vokal yang muncul tiba-tiba. Kehilangan kesadaran, muntah, sakit kepala, kejang, dan tekanan darah yang sangat tinggi dapat mengindikasikan stroke hemoragik. Sakit kepala adalah gejala awal yang paling umum pada pasien, seiring dengan perluasan hematoma, menyebabkan peningkatan TIK dan massa otak. Gejala lain yang mungkin terjadi antara lain kekakuan leher yang disebabkan oleh perdarahan di thalamus, caudate, dan cerebellum (Setiawan, 2020).

Pasien stroke yang menderita kondisi gawat darurat memerlukan pemantauan status hemodinamik, seperti pemantauan kebugaran fungsi kardiovaskular. Hasil pengukuran hemodinamik ini dapat digunakan untuk menilai kondisi pasien secepat mungkin sehingga caregiver dapat memutuskan tindakan yang tepat untuk pasien. (Astuti et al., 2022).

Allah juga sudah menyempurnakan fungsi tubuh manusia dengan proses metabolisme tubuh yang seimbang, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al Infithar Ayat 7 yang berbunyi:

Terjemahan:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang.” (QS. Al Infithar: 7)

Bukti keseimbangan tubuh bisa jadi kita mati di aliran darah. Keseimbangan darah, saat keluar dari jantung, saat masuk ke dalam jantung dan seterusnya, semuanya telah diatur dengan sangat sempurna oleh Allah.

Tafsir Ibnu Katsir apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. (Al-Infithar: 7), Yaitu yang telah menjadikanmu sempurna, tegak mempunyai tinggi yang seimbang dengan bentuk yang paling baik dan paling rapi. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Mughirah, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepadaku Abdur Rahman ibnu

Maisarah, dari Jubair ibnu Nasir dari Bisyr ibn Jahhasy Al-Qurasyi, bahwa di suatu hari Rasulullah Saw. meludah pada telapak tangannya sendiri, lalu meletakkan telunjuknya pada ludahnya itu seraya bersabda: Allah Swt. berfirman, "Hai anak Adam, mana bisa engkau selamat dari (azab)-Ku, Aku telah menciptakanmu dari sesuatu seperti ini (hina seperti ludah ini). hingga manakala engkau telah Kusempurnakan bentukmu dan Aku jadikan engkau berdiri tegak, lalu engkau dapat berjalan dengan mengenakan sepasang kain burdah, sedangkan di bumi engkau telah mempunyai tempat kuburan, kemudian kamu menghimpun harta benda dan enggan memberinya. Hingga manakala roh sampai di tenggorokanmu, baru kamu katakan, "Aku akan bersedekah, " maka dimanakah masa untuk bersedekah (saat itu)?" Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, dari Yazid ibnu Harun, dari Jarir ibnu Usman dengan sanad yang sama. Guru kami Al-Hafiz Abul Hajjaj Al-Mazi mengatakan bahwa hal yang sama telah diikuti oleh Yahya ibnu Hamzah, dari Saur ibnu Yazid, dari Abdur Rahman ibnu Maisarah (Syaiikh, 2015).

Salah satu intervensi yang dapat menstabilkan hemodinamik adalah mobilisasi progresif Level I, dimana intervensi ini terbukti memberikan hasil yang sangat baik dalam meningkatkan status klinis pasien stroke dan pasien sakit kritis yang dirawat di *Intensif Care Unit* (ICU). hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti., et al (2022) menyebutkan bahwa Intervensi untuk mengontrol tekanan darah dan saturasi oksigen pada pasien stroke dapat dilakukan dengan menggunakan mobilisasi Level 1 progresif yang mencakup elevasi kepala 30⁰, kemiringan kanan dan kiri, dan rentang gerak pasif.

Posisi *head of bed* akan meningkatkan aliran darah dari area bawah ke atrium kanan. Hal ini karena resistensi pembuluh darah dan tekanan di atrium kanan berada dalam batas normal, menyebabkan jumlah darah yang masuk ke atrium kanan (*venous return*) dan tekanan pengisian ventrikel kanan (*preload*) juga meningkat, menyebabkan perubahan pada stroke menghasilkan volume dan curah jantung. Perubahan posisi lateral atau oblik mengakibatkan perubahan aliran balik vena ke jantung dan mempengaruhi hemodinamik. Dan untuk mengurangi efek stroke, Anda dapat menggunakan ROM (*range of motion*) untuk mengubah saturasi

oksigen dan meningkatkan kewaspadaan serta kelenturan sendi tungkai pada pasien. (Suyanti et al., 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat, umumnya perawat melakukan tindakan penurunan tekanan darah dengan menggunakan obat penghambat saluran kalsium seperti *nifedipine*, *angiotensin converting enzyme* (ACE) inhibitor seperti *captopril*, dan antidiuretik seperti LASIK. Terapi non Farmakologi sudah diterapkan akan tetapi penerapannya belum maksimal sesuai dengan penerapan mobilisasi progresif level 1.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan Intervensi mobilisasi progresif level I untuk menstabilkan tekanan darah dan saturasi oksigen pada pasien stroke hemoragik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena terkait mobilisasi progresif level 1 yang terdapat pada latar belakang diatas maka rumusan masalah pada Karya Tulis Ilmiah: Studi Kasus ini adalah Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada pasien stroke hemoragik dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan intervensi mobilisasi progresif level 1 di ruangan ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien stroke hemoragik dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan intervensi mobilisasi progresif level 1 di ruangan ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar?

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien stroke hemoragik dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial
- b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien stroke hemoragik dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial
- c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien stroke hemoragik dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial

- d. Untuk menganalisis Implementasi keperawatan pada pasien stroke hemoragik dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial
- e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien stroke hemoragik dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial
- f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien stroke hemoragik dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan intervensi mobilisasi progresif level 1

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran melakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien stroke hemoragik dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial (tekanan darah dan saturasi oksigen) menggunakan intervensi mobilisasi progresif level 1 di ruangan ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

2. Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian intervensi EBPN dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien stroke hemoragik dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial (tekanan darah dan saturasi oksigen) menggunakan intervensi mobilisasi progresif level 1 pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep medis

1. Definisi

Stroke adalah adanya gejala klinis yang berkembang pesat akibat disfungsi otak vokal (global), dengan gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih, dan mengakibatkan kematian tanpa penyebab yang jelas selain penyebab vaskular. (Lingga, 2013).

Stroke hemoragik adalah stroke yang terjadi karena pembuluh darah di otak pecah, mengakibatkan iskemia dan hipoksia hilir. Di antara penyebab stroke hemoragik adalah: tekanan darah tinggi, pecahnya aneurisma, malformasi arteriovenosa. Biasanya terjadi saat melakukan aktivitas atau aktivitas fisik, tetapi juga bisa terjadi saat istirahat. Kesadaran pasien umumnya menurun (Batticaca, 2018).

Stroke hemoragik terjadi karena pembuluh darah yang menyebabkan otak bocor (berdarah). Kebocoran disebabkan oleh peningkatan tekanan secara tiba-tiba di otak, sehingga pembuluh darah yang tersumbat tidak dapat lagi menahan tekanan tersebut, akhirnya pecah dan menyebabkan pendarahan. Bocor menyebabkan darah gagal mencapai tujuannya, yaitu sel-sel otak yang membutuhkan suplai darah. Saat suplai darah terhenti, bisa dipastikan suplai oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan otak juga akan terhenti dan akhirnya sel-sel otak akan mati (Lingga, 2013).

Dapat disimpulkan bahwa stroke hemoragik adalah jenis stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga darah tidak dapat mengalir dengan baik, sehingga terjadi hipoksia di otak dan mengakibatkan kelumpuhan berakhir.

2. Etiologi

Penyumbatan suplai darah ke otak pada stroke hemoragik disebabkan oleh pecahnya arteri yang memasok darah ke otak. Misalnya, tiba-tiba menyebabkan tekanan darah tinggi dan/atau penderitaan mental yang parah. Peningkatan tekanan darah yang tiba-tiba juga dapat disebabkan oleh trauma kepala atau peningkatan tekanan lainnya seperti aktivitas, batuk, angkat berat,

dll. Pecahnya pembuluh darah, biasanya karena arteri dengan dinding tipis berbentuk balon, disebut aneurisma, atau abrasi arteri akibat plak aterosklerotik. (Irwan, 2018).

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, ada faktor lain yang menyebabkan stroke (Irwan, 2018) diantaranya :

a. Faktor resiko medis

Faktor resiko medis yang memperburuk stroke adalah:

- 1) *Arteriosklerosis* (pengerasan pembuluh darah)
- 2) Adanya penyakit stroke dalam keluarga (faktor keturunan)
- 3) *Migraine* (sakit kepala unilateral)

b. Faktor resiko bagi pelaku

Stroke sendiri dapat terjadi karena faktor resiko penyebab. Para pelaku mengadopsi kebiasaan makan dan hidup yang tidak sehat. Ini bisa dilihat di:

- 1) merokok
- 2) Mengonsumsi minuman bersoda dan alkohol
- 3) Suka makan *fast food/junk food*
- 4) Kurang berolahraga
- 5) Suasana hati yang tidak menyenangkan, seperti sering marah tanpa alasan yang jelas

Dalam firmannya pada surat Al Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Abidin, 2021).

Di dalam ash-Shabibain telah diriwayatkan, dari Umar bin-al-Khaththab, bahwa ia pernah berkata dalam khutbahnya di atas mimbar Rasulullah “hai sekalian manusia, sesungguhnya telah turun ayat yang mengharamkan khamr, yaitu yang terbuat dari lima hal: anggur, kurma, madu, biji gandum, dan gandum. Dan khamr adalah minuman yang dapat menutupi akal (Syaikh, 2015).

Efek dari konsumsi alkohol sangat buruk dan dapat menyebabkan kecanduan. Dan jika Anda mengkonsumsi overdosis, Anda akan overdosis, yang dapat menyebabkan kematian. Allah pun memerintahkan untuk menjauhi minuman yang mengandung khamr atau alkohol

c. Faktor resiko yang dapat dimodifikasi

1) Hipertensi (tekanan darah tinggi)

Tekanan darah tinggi adalah resiko stroke terbesar. Tekanan darah tinggi menyebabkan aliran darah yang buruk, yang menyebabkan pembuluh darah menyusut dan menurunkan aliran darah ke otak. Berkurangnya aliran darah ke otak menyebabkan kekurangan oksigen dan glukosa di otak, dan seiring berjalannya waktu jaringan otak akan mati.

2) Penyakit jantung

Penyakit jantung seperti serangan jantung dan *infark miokard* (kematian otot jantung) merupakan faktor terpenting terjadinya stroke. Jantung merupakan pusat aliran darah dalam tubuh. Jika pusat pengatur rusak, maka aliran darah dalam tubuh terganggu, termasuk aliran darah di otak. Gangguan aliran darah dapat menyebabkan kematian jaringan otak secara tiba-tiba atau bertahap.

3) Diabetes mellitus

Pembuluh darah penderita diabetes melitus seringkali lebih kaku atau kurang lentur. Ini dilakukan dengan naik atau turunnya kadar gula darah secara tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian otak.

4) Hiperkolesterolemia

Hiperkolesterolemia adalah suatu kondisi di mana kadar kolesterol dalam darah terlalu tinggi. Kelebihan LDL menyebabkan pembentukan plak di pembuluh darah. Kondisi seperti ini pada akhirnya mempengaruhi aliran darah, termasuk aliran darah ke otak.

5) Obesitas

Obesitas, atau kelebihan berat badan (*overweight*), merupakan salah satu faktor terjadinya stroke. Ini terkait dengan kadar kolesterol darah yang tinggi. Pada orang dengan obesitas, kadar LDL (*low-density*

lipoprotein) seringkali lebih tinggi daripada kadar HDL (*high-density lipoprotein*). Menurut standar Indonesia, seseorang dianggap obesitas jika indeks massa tubuhnya melebihi 25 kg/m². Sebenarnya ada dua jenis obesitas atau kegemukan yaitu obesitas perut dan obesitas perifer. Obesitas perut didefinisikan sebagai ukuran pinggang lebih dari 102 cm pada pria dan 88 cm pada wanita.

6) Merokok

Menurut berbagai penelitian, diketahui bahwa perokok memiliki kadar fibrinogen yang lebih tinggi dalam darahnya dibandingkan bukan perokok. Peningkatan kadar fibrinogen mendorong pembuluh darah menebal, menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih sempit dan kaku. Saat pembuluh darah menjadi sempit dan kaku, aliran darah bisa terganggu.

d. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi

1) Usia

Semakin tua usia Anda, semakin besar resiko stroke. Ini terkait dengan degenerasi alami (penuaan). Pada orang tua, pembuluh darah lebih kaku karena penumpukan plak yang berlebihan. Penumpukan plak yang berlebihan menyebabkan berkurangnya aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk otak.

2) Jenis kelamin

Pria cenderung memiliki resiko lebih tinggi menderita stroke dibandingkan dengan wanita. Hal ini terkait dengan fakta bahwa laki-laki cenderung merokok. Bahaya terbesar merokok adalah merusak pembuluh darah di dalam tubuh.

3) Riwayat keluarga

Jika salah satu anggota keluarga menderita stroke, maka kemungkinan dari keturunan keluarga tersebut dapat mengalami stroke. Orang dengan riwayat stroke pada keluarga memiliki resiko lebih besar untuk terkena stroke dibanding dengan orang yang tanpa riwayat stroke pada keluarganya.

4) Perbedaan ras

Bukti terbaru menunjukkan bahwa stroke adalah sekitar dua kali lebih umum di antara penduduk Afro-Karibia dibandingkan penduduk non-Karibia. Ini dimungkinkan karena tekanan darah tinggi dan diabetes lebih umum di antara orang Afro-Karibia daripada orang Karibia non-Afrika. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan.

3. Klasifikasi

Klasifikasi stroke hemoragik dibagi menjadi dua kategori, yaitu (Muttaqin, 2020):

a. Perdarahan Intraserebral (PIS)


Perdarahan Intraserebral disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah intraserebral, sehingga darah keluar dari pembuluh darah dan kemudian masuk ke dalam jaringan otak. Penyebab PIS biasanya disebabkan oleh tekanan darah tinggi dalam jangka Panjang, yang kemudian menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah, termasuk munculnya mikroaneurisma. pemicu lainnya adalah stress fisik, kegembiraan, peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba, yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Sekitar 60-70% PIS disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Penyebab lainnya adalah malformasi vaskular kongenital dan gangguan koagulasi. Faktanya, 70% kasus berakibat fatal, terutama jika perdarahannya meluas (masif).

b. Perdarahan subarachnoid (PSA)

Dalam perdarahan subarachnoid, darah memasuki ruang subarachnoid dari tempat lain (perdarahan subarachnoid sekunder) dan sumber perdarahan berasal dari ruang subarachnoid itu sendiri (perdarahan subarachnoid primer). Sebagian besar kasus PSA terjadi tanpa penyebab eksternal, namun sepertiga kasus terkait dengan stres psikologis dan fisik. Aktivitas fisik yang keras seperti mengangkat beban, membungkuk, batuk atau bersin berlebihan, aktivitas fisik, dan berhubungann seks terkadang dapat menjadi penyebab.

4. Patofisiologi

Ada dua bentuk CVA bleeding (Dewanto et al., 2019)



c. Perdarahan intraserebral

Pecahnya pembuluh darah di otak, terutama karena tekanan darah tinggi, menyebabkan darah masuk ke jaringan otak dan membentuk massa atau memar yang menekan jaringan otak dan menyebabkan edema di sekitar otak. Peningkatan TIK yang terjadi dengan cepat dapat menyebabkan kematian mendadak akibat peristiwa otak. Perdarahan intraserebral umumnya terjadi di putamen, talamus, sub korteks, nukleus berekor, pon, dan otak kecil. Hipertensi kronis menyebabkan perubahan struktur dinding pembuluh darah berupa *lipohyalinosis* atau nekrosis fibrinoid..

d. Perdarahan sub arachnoid

Pecahnya pembuluh darah karena aneurisma atau AVM. Aneurisma paling sering terjadi di cabang pembuluh besar sistem peredaran darah Willis. AVM dapat ditemukan di jaringan otak pada permukaan piameter dan ventrikel serebral, atau di ventrikel serebral dan ruang subarachnoid. Pecahnya arteri dan kebocoran darah ke dalam ruang subarachnoid menyebabkan peningkatan TIK secara tiba-tiba, yang meregangkan struktur peka nyeri dan menyebabkan sakit kepala parah. Leher kaku dan tanda-tanda lain dari iritasi pada lapisan otak sering terjadi. Peningkatan TIK yang tiba-tiba juga menyebabkan perdarahan retina subhyaloid dan kehilangan kesadaran. Perdarahan subaraknoid dapat menyebabkan vasospasme serebral. Vasospasme ini sering terjadi 3 sampai 5 hari setelah perdarahan dimulai, memuncak pada hari ke 5 sampai 9, dan dapat mereda 2 sampai 5 minggu. Terjadinya vasospasme diyakini karena

interaksi antara bahan yang berasal dari darah dan dilepaskan ke dalam cairan serebrospinal dan arteri ruang subarachnoid. Vasospasme ini dapat mengakibatkan disfungsi otak global (sakit kepala, penurunan kesadaran) atau vokal (hemiparesis, hemisensori, afasia, dan lain-lain). Saat otak hipoksia, tubuh berusaha mencari O₂ melalui proses metabolisme anaerobik, yang dapat menyebabkan pembuluh darah di otak melebar.

5. Manifestasi Klinis

Menurut Batticaca (2018), Manifestasi klinis stroke tergantung pada sisi atau bagian yang terkena, kecepatan serangan, ukuran lesi, dan adanya sirkulasi kolateral. Gejala klinis stroke hemoragik meliputi:

- a. Kelumpuhan tiba-tiba pada wajah atau ekstremitas (hemiparesis) atau hemiplegia (kelumpuhan).

Kelumpuhan terjadi akibat kerusakan area motorik pada korteks frontal, kerusakan ini bersifat kontralateral, yaitu jika kerusakan terjadi pada hemisfer kanan maka kelumpuhan otot terjadi pada bagian kiri. Pasien juga kehilangan kendali atas otot-otot rentan dan sensorik, membuatnya tidak dapat meregang atau menekuk.

- b. Gangguan sensorik pada satu atau lebih ekstremitas

Gangguan sensorik diakibatkan oleh kerusakan sistem saraf otonom dan gangguan pada saraf sensorik.

- c. Penurunan kesadaran (kebingungan, delirium, letargi, stupor, atau koma), terjadi akibat perdarahan, kerusakan otak yang kemudian menekan batang otak atau terjadinya kelainan metabolisme pada otak akibat hipoksia

- d. Afasia (kesulitan dalam berbicara)

Afasia adalah defisit dalam keterampilan komunikasi verbal, termasuk membaca, menulis, dan pemahaman bahasa. Afasia terjadi ketika area pusat bicara utama di belahan otak kiri rusak dan biasanya terjadi pada stroke yang melibatkan arteri median kiri. Afasia dibagi menjadi tiga kategori: afasia motorik, afasia sensorik, dan afasia global. Afasia motorik atau ekspresif terjadi ketika area tersebut berada di area Broca, yang terletak di lobus frontal otak. Dengan bentuk afasia ini, pasien dapat memahami orang lain tetapi tidak dapat mengungkapkannya dan kesulitan

mengungkapkan diri secara verbal.

Afasia sensorik terjadi akibat kerusakan pada area *Wernicke*, yang terletak di lobus temporal. Pada afasia sensorik, pasien tidak dapat menerima rangsangan pendengaran tetapi dapat mengungkapkan ucapan. Dengan demikian, respon bicara pasien tidak nyambung atau koheren. Pada afasia global, pasien dapat merespons bahasa dengan menerima atau mengekspresikan bahasa.

e. Disartria (Ucapan cadel atau pelo)

Kesulitan berbicara, terutama dalam artikulasi, sehingga ucapan menjadi tidak jelas. Namun, pasien dapat memahami berbicara, menulis, mendengarkan dan membaca. Disartria

terjadi akibat kerusakan saraf kranial, yang menyebabkan kelemahan otot bibir, lidah, dan laring. Pasien juga mengalami kesulitan mengunyah dan menelan.

f. Gangguan penglihatan, diplopia

Pasien mungkin kehilangan penglihatan atau memiliki penglihatan ganda dan cacat bidang visual unilateral. Hal ini karena kerusakan lobus temporal atau parietal dapat menghambat serabut saraf optik di korteks oksipital. Gangguan penglihatan juga dapat disebabkan oleh kerusakan saraf kranial III, IV, dan VI.

g. Disfagia

Disfagia atau disfagia terjadi akibat kerusakan saraf kranial IX. Selama menelan, bolus didorong oleh lidah, glotis menutup, dan makanan masuk ke kerongkongan.

h. Inkontinensia

Inkontinensia usus dan kandung kemih sering terjadi karena gangguan saraf yang mempersarafi kandung kemih dan usus

i. Pusing, mual, muntah, sakit kepala yang disebabkan oleh peningkatan tekanan intrakranial, edema serebral

Tabel perbedaan PIS dan PSA

Gejala dan tanda	PIS	PSA
Kelainan / defisit	Hebat	Ringan
Sakit kepala	Hebat	Sangan Hebat
Kaku kuduk	Jarang	Biasanya ada
Kesadaran	Terganggu	Terganggu sebentar
Hipertensi	Selalu ada	Biasanya tidak ada
Lemah sebtelah tubuh	Ada sejak awal	Awalnya tak ada
LCS	Eritrosit > 5000/mm ³	Eritrosit . 25.000/mm ³
Angiografi	Shift ada	Shift tidak ada
CT-Scan	Area putih	Kadang normal

Table 1 Perbedaan PIS dan PSA

(Y Yueniwati, 2016)

6. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan untuk stroke hemoragik, antara lain (Padang, 2019):

- a. Menurunkan kerusakan iskemik serebral
Infark serebral terdapat kehilangan secara mantap inti central jaringan otak, sekitar daerah itu mungkin ada jaringan yang masih bisa diselamatkan, tindakan awal difokuskan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin area iskemik dengan memberikan O₂, glukosa dan aliran darah yang adekuat dengan mengontrol / memperbaiki disritmia (irama dan frekuensi) serta tekanan darah.
- b. Mengendalikan hipertensi dan menurunkan TIK
Dengan meninggikan kepala 15-30 menghindari flexi dan rotasi kepala yang berlebihan, pemberian dexamethasone.
- c. Pengobatan
 - 1) Anti koagulan: Heparin untuk menurunkan kecenderungan perdarahan pada fase akut.
 - 2) Obat antitrombotik: Pemberian ini diharapkan mencegah peristiwa trombolitik/emobolik.
 - 3) Diuretika : untuk menurunkan edema serebral

d. Penatalaksanaan Pembedahan

Endarterektomi karotis dilakukan untuk memperbaiki peredaran darah otak. Penderita yang menjalani tindakan ini seringkali juga menderita beberapa penyulit seperti hipertensi, diabetes dan penyakit kardiovaskular yang luas. Tindakan ini dilakukan dengan anestesi umum sehingga saluran pernapasan dan kontrol ventilasi yang baik dapat dipertahankan

7. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien dengan stroke hemoragik adalah sebagai berikut (Radaningtyas et al., 2018).

a. Angiografi serebral

Membantu menentukan penyebab spesifik stroke, mis. B. perdarahan arteriovenosa atau adanya ruptur, dan lokasi sumber perdarahan, mis. B. aneurisma atau malformasi vaskular.

b. Lumbal punksi

Tekanan tinggi dengan bercak darah pada cairan lumbal menunjukkan perdarahan subaraknoid atau perdarahan intrakranial.

c. CT scan

Pemindai ini secara akurat menunjukkan lokasi edema, hematoma, adanya infark atau iskemia jaringan otak dan lokasi persisnya.

d. MRI (Magnetic Imaging Resonance)

Menggunakan gelombang magnetik untuk menentukan lokasi dan ukuran pendarahan otak. Hasil yang didapatkan adalah area lesi dan infark akibat perdarahan.

e. EKG

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji masalah yang muncul dan dampak jaringan yang rusak pada pelemahan impuls listrik di jaringan otak.

8. Komplikasi

Stroke hemoragik dapat menyebabkan (Kurniati et al., 2013)

a. Infark Serebri

b. Hidrosefalus yang sebagian kecil menjadi Hidrosefalus normotensif


c. Fistula carotid cavernosa


d. Epistaksis

e. Peningkatan TIK, tonus otot abnormal



9. Penyimpangan KDM





B. Konsep Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian

a. Primer

1) *Airway* Adanya sumbatan / obstruksi jalan nafas oleh adanya penumpukan sekret akibat kelemahan reflek batuk. Jika obstruksi maka lakukan :

a) *Chin lift / jaw thrust*

b) *Suction / hisap*

c) *Guedel airway*

d) Intubasi trakea dengan leher ditahan (imobilisasi) pada posisi netral

2) *Breathing*

Menelan yang buruk/batuk/saluran nafas terlindungi, mengi dan/atau pernapasan tidak teratur, suara nafas terdengar

3) *Circulation*

Tekanan darah mungkin normal atau meningkat, hipotensi stadium lanjut, takikardia, bunyi jantung normal stadium awal, aritmia jantung, pucat pada kulit dan selaput lendir, pilek, sianosis stadium lanjut.

4) *Disability*

Kaji kesadaran dengan cepat jika Anda sadar hanya sebagai respons terhadap rasa sakit atau jika Anda sama sekali tidak sadar. Tidak disarankan untuk mengukur GCS.

Cara yang paling jelas dan tercepat adalah:

Terbangun: A

Tanggapan Suara: V

Respon Nyeri : P

Tidak ada jawaban :U

5) *Exposure*

Lepaskan pakaian dan pelindung tubuh pasien untuk memeriksa cedera. Jika diduga cedera leher atau tulang belakang, maka imobilisasi *in line* harus dikerjakan.

b. Sekunder

Penilaian sekunder meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik. Riwayat dapat menggunakan format AMPLE (*Alergi, Medikasi, Post illness, Last meal, dan Event/ Environment* yang berhubungan dengan kejadian). Pemeriksaan fisik dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki dan juga dapat ditambahkan ke tes diagnostik.

2. **Diagnosis Keperawatan**

Berdasarkan (PPNI, 2017) beberapa diagnosis keperawatan yang sesuai dengan kondisi klinis *hemorrhagic stroke* yaitu:

- a. Bersihan Jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan disfungsi neuromuskuler
- b. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan Hambatan upaya nafas
- c. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dan stroke hemoragik
- d. Termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan proses penyakit (infeksi)
- e. Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi serebral
- f. Defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan
- g. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot
- h. Defisit Nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan
- i. Resiko gangguan integritas kulit/jaringan ditandai dengan penurunan mobilitas
- j. Resiko luka tekan ditandai dengan penurunan mobilitas
- k. Resiko Aspirasi ditandai dengan penurunan tingkat kesadaran

3. Rencana/Intervensi Keperawatan

NO	Rencana tindakan keperawatan		
	Diagnosis	Tujuan dan kriteria hasil	Intervensi
1	Bersihan Jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan disfungsi neuromuskuler	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x ... jam diharapkan bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil: <ul style="list-style-type: none"> - Produksi sputum menurun - Sulit bicara menurun - Frekuensi nafas membaik - Pola nafas membaik 	I.01011 Manajemen jalan nafas Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pola nafas - Monitor bunyi nafas tambahan - Monitor sputum Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Posisikan semi fowler atau fowler - Lakukan Penghisapan lendir kurang dari 15 detik - berikan oksigen Edukasi <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari Kolaborasi <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik
2	Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan Gangguan neurologis	L.01004 Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ...x... diharapkan Pola nafas membaik dengan kriteria hasil <ul style="list-style-type: none"> - Diameter thorax anterior posterior meningkat - Tekanan ekspirasi meningkat - tekanan inspirasi meningkat - dyspnea menurun - Penggunaan otot bantu nafas menurun - Frekuensi nafas membaik 	Manajemen jalan nafas I.01011 Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas) - Monitor bunyi nafas tambahan Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Posisikan semi-fowler atau fowler - Berikan oksigen, jika perlu Edukasi <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, jika tidak terjadi kontraindikasi
3	Penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dan stroke hemoragik	Setelah dilakukan Intervensi keperawatan selama ... x jam diharapkan kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan Kriteria hasil : <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesadaran meningkat - Postur desebrasi (ekstensi) menurun 	Manajemen peningkatan tekanan intrakranial Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penyebab peningkatan TIK (mis. gangguan metabolisme, lesi, edema serebral) - monitor tanda dan gejala peningkatan TIK (mis. tekanan darah meningkat,

		<ul style="list-style-type: none"> - papiledema menurun - tekanan darah membaik - tekanan nadi membaik 	<p>tekanan nadi melebar, bradikardia, pola nafas ireguler, kesadaran menurun)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor status pernapasan <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang - berikan posisi semi fowler - atur ventilator agar PaCo2 optimal <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian sedasi dan anti konvulsan, jika perlu
4	Termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan proses penyakit (infeksi)	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama ... x jam, diharapkan termoregulasi membaik dengan Kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - takikardi menurun - takipnea menurun - suhu tubuh membaik - tekanan darah membaik 	<p>Regulasi temperatur</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitor tekanan darah frekuensi pernapasan dan nadi - monitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - pasang alat pemantau suhu jika perlu - tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian antipiretik, jika perlu
5	Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi serebral	<p>Tujuan: setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x jam maka kommunikasi verbal meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan berbicara meningkat - Kemampuan mendengar meningkat - Kesesuaian ekspresi wajah/tubuh meningkat 	<p>Promosi komunikasi: defisit bicara</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor kecepatan, tekanan, kuantitas, volume, dan diksi bicara - Monitor proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berkaitan dengan bicara - Monitor frustrasi, marah, depresi, atau hal lain yang mengganggu bicara - Identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi <p>Terapeutik</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Gunakan metode komunikasi alternative - Sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan - Ulangi apa yang disampaikan pasien <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan berbicara perlahan
6	Defisit perawatan diri berhubungann dengan kelemahan	<p>Tujuan: settelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x jam maka perawatan diri meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan mandi meningkat - Kemampuan mengenakan pakaian meningkat - Kemampuan makan meningkat - Kemampuan ke toilet meningkat 	<p>Dukungan perawatan diri</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia - Monitor tingkat kemandirian - Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sediakan lingkungan yang terapeutik - Siapkan keperluan pribadi - Damping dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan
7	Gangguan mobilitas fisik berhubungann dengan penurunan kekuatan otot	<p>Tujuan: settelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x jam maka mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pergerakan ekstremitas meningkat - Kekuatan otot meningkat - Rentang gerak (ROM) meningkat 	<p>Dukungan mobilisasi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya - Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan - Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi melakukan pergerakan <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi

			<ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan melakukan mobilisasi dini
8	Defisit Nutrisi berhubungann dengan ketidakmampuan mencerna makanan	<p>Tujuan: setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x jam maka status nutrisi membaik dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porsi makanan yang dihabiskan meningkat - Berat badan membaik - Indeks massa tubuh (IMT) membaik - Frekuensi makan membaik - Nafsu makan membaik 	<p>Manajemen nutrisi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi status nutrisi - Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrient - Monitor asupan makanan - Monitor berat badan <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi - Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajarkan diet yang diprogramkan <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan
9	Resiko gangguan integritas kulit/jaringan ditandai dengan penurunan mobilitas	<p>Tujuan: setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x jam maka integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan jaringan menurun - Kerusakan lapisan kulit menurun 	<p>Perawatan integritas kulit</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring - Lakukan pemijatan pada area penonjolan tulang <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan menggunakan pelembab - Anjurkan minum air yang cukup - Anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrem
10	Resiko luka tekan ditandai dengan penurunan mobilitas	<p>Tujuan: setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x jam maka integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elastisitas meningkat - perfusi jaringan meningkat - suhu kulit membaik 	<p>Pencegahan luka tekan</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa luka tekan menggunakan skala Imis. Norton, Skala Braden) - Periksa adanya luka tekan sebelumnya - Monitor suhu kulit yang tertekan - Monitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi

			<ul style="list-style-type: none"> - Monitor mobilitas dan aktivitas individu <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air - Ubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam - buat jadwal perubahan posisi - Jaga Sprei tetap kering, bersih dan tidak ada kerutan atau lipatan - Hindari menggunakan air hangat dan sabun keras saat mandi - Berikan asupan makanan yang cukup terutama protein, vitamin B dan c, zat besi dan kalori. <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan tanda-tanda kerusakan kulit - anjurkan melapor jika menemukan tanda-tanda kerusakan kulit - Ajarkan cara merawat kulit
11	Resiko aspirasi ditandai dengan penurunan tingkat kesadaran	<p>Tujuan: setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x jam maka tingkat aspirasi dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesadaran meningkat - Kemampuan menelan meningkat - Dyspnea menurun - Kelemahan otot menurun - Akumulasi secret menurun 	<p>Pencegahan aspirasi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tingkat kesadaran, batuk, muntah dan kemampuan menelan - Monitor status pernapasan - Monitor bunyi nafas, terutama setelah makan/minum - Pertahankan kepatenan jalan nafas <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan makan secara perlahan <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajarkan teknik mengunyah atau menelan

Table 2 Rencana Tindakan Keperawatan

(PPNI, 2018), (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018)

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi juga diartikan sebagai tindakan nyata dari perawat dalam melaksanakan intervensi keperawatan yang dituangkan dalam rencana asuhan keperawatan. Implementasi adalah saat perawat menindaklanjuti rencana tindakan yang telah diputuskan. Rencana ini khusus untuk setiap pasien dan berfokus pada hasil yang dapat dicapai. Tindakan yang terlibat dalam rencana asuhan keperawatan meliputi pemantauan pasien untuk tanda-tanda perubahan atau perbaikan, langsung merawat pasien atau melakukan tugas medis diperlukan, mendidik dan menginstruksikan pasien tentang manajemen kesehatan lebih lanjut, dan merujuk atau menghubungi pasien untuk tindak lanjut. Implementasi ini dapat berlangsung selama berjam-jam, sehari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan (Yunike et al., 2022).

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses keperawatan. Perawat mengkaji ulang kondisi klien dengan mempertimbangkan bagaimana kondisi klien sebelum dan setelah dilakukan intervensi. Perawat juga melakukan penilaian terhadap respon klien untuk menentukan apakah rencana perawatan klien perlu diubah atau tidak. Bagian penting dari evaluasi adalah dokumentasi (Yunike et al., 2022).

Langkah-langkah dalam melakukan evaluasi keperawatan menurut (Yunike et al., 2022).

evaluasi keperawatan meliputi:

a. Pengumpulan data

Perawat mengumpulkan kembali data sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang apakah tujuan telah terpenuhi. Biasanya penting untuk mengumpulkan data objektif dan subjektif. Data harus didokumentasikan secara ringkas dan akurat untuk memfasilitasi bagian selanjutnya dari proses evaluasi

b. Membandingkan data yang dikumpulkan dengan hasil yang diinginkan

Sasaran yang didokumentasikan dari rencana asuhan keperawatan menjadi standar atau kriteria yang digunakan untuk mengukur kemajuan klien apakah

hasil yang diinginkan telah terpenuhi, sebagian terpenuhi, atau tidak terpenuhi.

- 1) Tujuan tercapai, bila respon klien sama dengan hasil yang diinginkan
 - 2) Tujuan tercapai sebagian, ketika hasil jangka pendek tercapai tetapi tujuan jangka Panjang tidak tercapai, atau tujuan yang diinginkan tidak tercapai secara sempurna
 - 3) Tujuan tidak terpenuhi
- c. Menganalisis respon klien yang berkaitan dengan aktivitas keperawatan
Hal ini juga sangat penting untuk menentukan apakah kegiatan keperawatan memiliki hubungan dengan hasil apakah dicapai atau tidak.
- d. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan rencana keperawatan
Diperlukan untuk mengumpulkan lebih banyak data untuk mengkonfirmasi apakah rencana itu berhasil atau gagal. Faktor yang berbeda dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan. Misalnya, keluarga klien mendukung atau tidak, atau klien mungkin tidak kooperatif untuk melakukan aktivitas tersebut.
- e. Melanjutkan, memodifikasi, atau mengakhiri rencana asuhan keperawatan dan
Proses keperawatan bersifat dinamis dan siklis. Jika tujuan tidak mencukupi, proses keperawatan dimulai lagi dari langkah pertama. Saat klien menyelesaikan tujuan mereka, Tujuan baru ditetapkan. Jika tujuan tetap tidak terpenuhi, perawat harus mengevaluasi alasan tujuan ini tidak dicapai dan merekomendasikan revisi rencana asuhan keperawatan.
- f. Merencanakan asuhan keperawatan di masa depan/Perencanaan Pulang
perencanaan pulang adalah proses transisi pasien dari satu tingkat perawatan ke tingkat berikutnya. Rencana pemulangan adalah instruksi individual yang diberikan saat klien dipersiapkan untuk perawatan lanjutan di luar fasilitas kesehatan atau untuk hidup mandiri di rumah.

C. Evidence Based Practice in Nursing

1. Pengertian

Mobilisasi progresif level 1 adalah aktivitas yang dilakukan dengan langkah-langkah berurutan, dimulai dengan posisi ujung kepala 30°, kemudian melakukan ROM pasif atau aktif dan memposisikan pasien menyamping ke kiri dan ke kanan (Astuti et al., 2022). Mobilisasi adalah kegiatan fundamental keperawatan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan secara efektif untuk pasien sakit kritis. Mobilisasi dapat menghasilkan outcome yang baik bagi pasien seperti meningkatkan pertukaran gas, mengurangi angka *ventrikel atrial pressure* (VAP), mengurangi durasi penggunaan ventilator, dan meningkatkan kemampuan fungsional jangka panjang (Mobiliu & Tomayahu, 2021).

Letak mempengaruhi perubahan tekanan darah dan tekanan vena sentral Pada bagian kepala tempat tidur menunjukkan aliran balik darah dari bagian bawah ke atrium kanan cukup baik karena resistensi vaskular dan tekanan pada atrium kanan tidak terlalu tinggi. , sehingga volume darah yang masuk (*venous return flow*) tidak terlalu banyak. Ketika atrium kanan cukup baik, bias ventrikel kanan meningkat, yang dapat menyebabkan peningkatan volume sekuncup dan curah jantung. Perubahan posisi lateral atau miring mempengaruhi aliran balik darah ke jantung dan mempengaruhi hemodinamik (Mobiliu & Tomayahu, 2021).

Saat diberikan ROM pasif pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah maka pembuluh darah menjadi elastis dan terjadi fase dilatasi pada pembuluh darah maka aliran darah menuju ke jantung menjadi lancar yang menyebabkan kerja jantung stabil sehingga kemampuan jantung dalam memompa darah meningkat kemudian terjadi peningkatan tekanan darah. Perubahan posisi lateral atau miring mempengaruhi aliran balik darah yang menuju ke jantung sehingga terjadi peningkatan volume jantung oleh karena itu kemampuan jantung dalam memompa darah meningkat (Hartoyo et al., 2017).

2. Tujuan

Mobilisasi progresif level 1 bertujuan untuk mencegah komplikasi pada pasien stroke dengan menstabilkan tekanan darah dan saturasi oksigen sebagai terapi obat bersamaan. (Astuti et al., 2022). Pemberian mobilisasi progresif harus digunakan sebagai rehabilitasi bagi pasien dengan gangguan kesadaran yang menderita imobilitas karena kondisinya. Mobilisasi progresif dapat membuat pasien tetap aktif untuk menjaga kekuatan otot dan mencegah perubahan yang tidak diinginkan pada respons kardiovaskular (Mobiliu & Tomayahu, 2021).

3. Indikasi

Beberapa kondisi yang diperbolehkan untuk melakukan mobilisasi progresif level 1 adalah sebagai berikut:

- a. Pasien stroke
- b. Pasien dengan tekanan darah >120 mmHg
- c. Pasien dengan ketidaksadaran

4. Kontraindikasi

Terdapat kondisi yang membuat mobilisasi progresif tidak dapat dilakukan yaitu apabila pasien mengalami fraktur servikal.

5. Prosedur Pemberian

Prosedur pemberian mobilisasi progresif level 1 diawali dengan tekanan darah dan saturasi oksigen, dilanjutkan dengan gerakan bedhead selama 30 menit, dilanjutkan dengan ROM pasif selama 10 menit, kemudian pasien berbelok ke kanan secara diagonal selama satu jam dan ke belakang secara diagonal selama satu jam ke kiri. jam. dan ini terjadi dua kali sehari, pagi dan sore. Anda kemudian mengukur tekanan darah dan saturasi oksigen lagi menggunakan sphygmomanometer dan oksimetri nadi (Astuti et al., 2022).

6. Kriteria Evaluasi

Mengikuti operasi mobilisasi progresif level 1 (*Head Of Bed 30⁰*, ROM pasif dan miring kanan dan miring kiri) bertujuan untuk mencegah komplikasi pada pasien stroke dengan menstabilkan tekanan darah dan saturasi oksigen darah sebagai terapi tambahan farmakologi dengan kriteria hasil:

- a. Tingkat kesadaran meningkat
- b. tekanan darah membaik
- c. tekanan nadi membaik

7. Artikel Utama dan Pendukung

- a. Artikel utama (Ani Astuti, Rasyidah AZ, Satria Akbar Wibowo, 2022, Mobilisasi Progresif Level 1 Menstabilkan Tekanan Darah dan Saturasi Oksigen Pasien Stroke, *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*)
- b. Artikel Pendukung (Suwaly Mobiliu, Mansur Tomayahu, 2021, Pengaruh Mobilisasi Progresif Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Pasien Stroke di Ruang ICU, *Jambura Journal: Of Health Sciences and Research*)
- c. Artikel Pendukung (Afif Mustikarani, Akhmad Mustofa, 2020, Peningkatan Saturasi Oksigen Pada Pasien Stroke Melalui Pemberian Posisi *Head Up*, Ners Muda)
- d. Artikel Pendukung (Wahyu Rima Agustin, Gatot Suparmanto, Wahyuningsih Safitri, 2020, Pengaruh Mobilisasi Progresif Terhadap Status Hemodinamik Pada Pasien Kritis Di Intensif Care Unit, *Journal Of Health Research*)
- e. Artikel Pendukung (Mugi Hartoyo, Shobirun, Budiyati, Rizqi Rachmilia, 2017, Pengaruh Mobilisasi Progresif Level 1 Terhadap Tekanan Darah dan Saturasi Oksigen Pasien Kritis dengan Penurunan Kesadaran, *Jurnal Perawat Indonesia*)



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Nursalam (2017) studi kasus adalah penelitian yang mencakup pengkajian yang bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian dalam metode studi kasus ini dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh klien dengan cara sistematis.

B. Subyek Studi Kasus

Subjek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah individu atau klien yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi pada kasus ini yaitu:

1. Pasien dengan diagnosis Medis Stroke Hemoragik
2. Jenis Kelamin Laki-Laki
3. Usia 20-60 Tahun
4. Memiliki riwayat tekanan darah >120 mmHg
5. Pasien dengan penurunan kesadaran
6. pasien terpasang ventilasi mekanik

Adapun Kriteria Eksklusi pada studi kasus yaitu

1. pasien dengan fraktur dengan Batasan mobilisasi
2. Pasien dengan post op abdomen

C. Fokus Studi Kasus

Melakukan proses asuhan keperawatan pada pasien stroke hemoragik dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan intervensi Mobilisasi progresif level 1

D. Instrumen Studi Kasus

Instrumen studi kasus ini berupa format asuhan keperawatan

E. Prosedur Pengambilan Data

Prosedur penelitian menggambarkan proses studi kasus yang terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

1. Persiapan

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengajuan judul studi kasus dan pencarian literatur

2. Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya yaitu menyusun melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dan pengumpulan data base melalui internet.

3. Penyusunan Laporan

Langkah terakhir yaitu penyusunan laporan dengan melakukan pengkajian dari data objektif dan subjektif serta wawancara. Kemudian, penegakan diagnosis, dan menyusun perencanaan intervensi yang telah dilakukan, implementasi serta evaluasi, dan terakhir dilakukan pendokumentasian dalam bentuk laporan karya tulis ilmiah. Laporan ditulis berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah sesuai panduan karya tulis akhir profesi ners UIN Alauddin Makassar 2022.

F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Pengambilan data dan observasi serta wawancara pada keluarga pasien dilakukan pada tanggal 7 Maret 2023 di Ruang ICU RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar.

G. Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis dan penyajian data pada kasus ini berupa kajian khusus yang didapatkan secara fakta dan dituangkan dalam teks dan bersifat sistematis. Analisis data pada kasus ini yaitu pasien memiliki riwayat stroke sejak tahun 2020 dengan keluhan badan terasa lemas secara tiba tiba dan terdapat kelemahan fungsi pada sisi tubuh sebtelah kanan setelah melakukan pengobatan pasien berangsur-angsur membaik dan pada saat itu pasien hanya dapat berbicara 1 atau 2 kata. Sebelum pasien dirujuk ke RS Wahidin, pasien pernah dirawat di RS faisal dengan keluhan yang sama (Stroke ke 2) dengan riwayat kejang secara tiba tiba. setelah itu pasien sempat dipulangkan ke rumah untuk melakukan pengobatan rawat jalan akan tetapi pada saat

sehari pulang kerumah pasien tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran pada saat berbaring dan pasien dirujuk ke RS Wahidin dan dibawa ke IGD dan dilakukan pemeriksaan serta pemasangan oksigen NRM (10L). setelah dari IGD pasien dipindahkan ke HCU saraf dan pada tanggal 28 februari pasien dipindahkan ke ruang ICU untuk melakukan perawatan yang lebih intensif dan di ICU pasien dipasang ventilator karena pasien mengalami gagal nafas, dipasang OPA, ETT dan NGT.

Riwayat hipertensi sudah ada sejak lama dan pasien mengkonsumsi obat Amlodipine 10 mg.

Riwayat Kesehatan Keluarga : keluarga pasien mengatakan adik kandung pasien menderita penyakit diabetes melitus dan hanya pasien yang menderita penyakit hipertensi.

Saat ini pasien dalam keadaan tersedasi, Tekanan Darah :164/117 mmHg, Nadi: 118 x/menit, Pola Nafas Tidak Teratur, akral teraba dingin, Pergerakan Ekstremitas (pasif), GCS stupor E2 M2 Vx (ETT), Tingkat Kesadaran : Stupor, nampak lesi pada mata, Riwayat penyakit hipertensi, riwayat stroke ke 3, Riwayat hemiparese

MSCT Scan Kepala

Kesan:

- Pendarahan pada spongs, thalamus kanan dan nucleus lentiformis kiri
- Infark corona radiata bilateral, lobus frontal kiri dan thalamus kiri
- Brain atrofi disertai ventriculomegaly ex vacuo
- Concha bullosa media bilateral

Hasil pemeriksaan lab

Natrium 156 Mmol/l (136-145)

H. Etika Studi Kasus

Setiap penelitian kesehatan yang melibatkan relawan sebagai subyek penelitian harus dilandasi oleh tiga prinsip etika (*basic moral principle*), yaitu:

1. *Respect of Persons (Others)* memiliki tujuan mendasar untuk mempertahankan otonomi, pengambilan keputusan independen (penentuan nasib sendiri) dan perlindungan kelompok yang bergantung atau rentan dari penyalahgunaan.

Pengasuh dapat menginformasikan pasien bahwa mereka dalam kondisi baik, meskipun ada beberapa gangguan.

2. *Beneficence & Non Maleficence*: Prinsip berbuat baik, memberikan keuntungan maksimum dan resiko minimum. Misalnya, jika ada resiko, itu harus masuk akal (*reasonable*). Perawat dapat merekomendasikan olahraga untuk meningkatkan kesehatan pasien, jika olahraga dilakukan dapat menimbulkan resiko kekambuhan penyakit. Dengan rancangan penelitian ilmiah, peneliti mampu melakukannya dengan baik, mengikuti prinsip jangan merugikan (*no harm, no evil*)
3. Prinsip etika keadilan (*Justice*): Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan sesuatu sesuai dengan haknya dalam arti keadilan distributif dan pemerataan. Jangan biarkan kelompok rentan memiliki masalah yang tidak adil. Pada prinsipnya sponsor dan peneliti tidak bertanggung jawab atas perlakuan tidak adil tersebut. Misalnya, jika seorang pasien baru saja dirawat inap dan ada pasien lain, perawat mempertimbangkan beberapa faktor dan kemudian bertindak dengan cara yang adil sehingga pasien lain tidak merasa dikucilkan atau diakali.



BAB V
LAPORAN KASUS

A. Pengkajian

ASSESSMENT		
Nama Pasien : Tn. Z	Umur : 49 Tahun	Jenis kelamin: (L) P No Rm: 01011419
Nama Keluarga	: Tn. F ...	
Agama	: Islam	
Pekerjaan	: Wirausaha	
Alamat Rumah	: Jln. Batua Raya II	
Telp/Hp	:	
Diagnosa Medis	: Hemoragik Stroke	
Tanggal Masuk ICU : Minggu, 5 Maret 2023		
Datang Tanggal : 28 Februari 2023 Pukul: 15:30 WITA Asal Ruangan: HCU Saraf		
Alat Terpasang : <input checked="" type="checkbox"/> Infus <input checked="" type="checkbox"/> Kateter <input type="checkbox"/> Lainnya..... <input checked="" type="checkbox"/> Ventilator <input checked="" type="checkbox"/> Monitor <input checked="" type="checkbox"/> NGT <input checked="" type="checkbox"/> CVC <input type="checkbox"/> Transfusi		
KATEGORI MASUK ICU : Prioritas 2		

Keluhan Utama : Pasien Gagal Nafas

Riwayat Penyakit/ Mekanisme Cedera : pasien memiliki riwayat stroke sejak tahun 2020 dengan keluhan badan terasa lemas secara tiba tiba dan terdapat kelemahan fungsi pada sisi tubuh sebtelah kanan settelah melakukan pengobatan pasien berangsur-angsur membaik dan pada saat itu pasien hanya dapat berbicara 1 atau 2 kata. Sebelum pasien dirujuk ke RS Wahidin, pasien pernah dirawat di RS faisal dengan keluhan yang sama (Stroke ke 2) dengan riwayat kejang secara tiba tiba. settelah itu pasien sempat dipulangkan ke rumah untuk melakukan pengobatan rawat jalan akan tetapi pada saat sehari pulang kerumah pasien tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran pada saat berbaring dan pasien dirujuk ke RS Wahidin dan dibawa ke IGD dan dilakukan pemeriksaan serta pemasangan oksigen NRM (10L). settelah dari IGD pasien dipindahkan ke HCU saraf dan pada tanggal 28 february pasien dipindahkan ke ruang ICU untuk melakukan perawatan yang lebih intensif dan di ICU PASIEN dipasangkan ventilator karena pasien mengalami gagal nafas, dipasangkan OPA, ETT dan NGT.

Riwayat hipertensi sudah ada sejak lama dan pasien mengkonsumsi obat Amlodipine 10 mg

Riwayat Kesehatan Keluarga : keluarga pasien mengatakan adik kandung pasien menderita penyakit diabetes melitus dan hanya pasien yang menderita penyakit hipertensi.

Orientasi tempat, waktu, dan orang) : Tidak dapat dikaji

**COMPREHENSIVE ASSESSMENT
& ONGOING ASSESSMENT**

Riwayat Kesehatan Lalu :

SAMPLE

S (Sign & Simptom) = pasien memiliki riwayat hipertensi, TD: 164/ 117 mmHg, Keluarga pasien mengatakan sebelumnya pasien sering mengeluh pusing, pasien tidak dapat menggerakkan tangan kanan sebtelah kanan, kekuatan otot menurun, berbicara hanya 1 atau 2 kata, terdengar bunyi suara nafas tambahan Ronchi.

A (Allergies) = tidak ada riwayat alergi

M (Medications) = pasien memiliki riwayat hipertensi sejak lama dan mengkonsumsi amlodipine 10 mg

P (Past Illness) = Pasien memiliki riwayat Hipertensi

L (Last Meal) = pasien terakhir makan bubur saring melalui NGT

E (Event Leading) = Awalnya pasien sudah dipulangkan dari rawat inap RS Faisal, tetapi pada saat dibangunkan pasien sudah tidak membuka mata dan tidak merespon. pasien dirawat di RS Faisal selama 2 minggu dengan keluhan yang sama (Stroke ke 2)

AIUEO

A (Alkohol): Pasien tidak mengkonsumsi alkohol

I (Insulin): Tidak pernah mengkonsumsi insulin

U (Uremia): tidak ada

E (Epilepsi): tidak ada

O (Over dosis): tidak ada

Pengkajian B1-B6

B1 (Breathing)

- Bentuk dada Normochest
- RR : 16 x/menit
- Pola Nafas ireguler
- Terpasang OPA (+), NPA (-), *Endotrakeal Tube* (+)

- Penggunaan Otot Bantu Nafas (+)
- Pernapasan cuping hidung (-)
- Penggunaan Alat Bantu Pernapasan Ventilator mode SIMV
BB;50 Kg,VT;510, Peep;6, T.Insp;1:2, f tot: 16,
- Suara Nafas (Ronchi).
- Suara nafas tambahan :Wheezing (-),Ronchi (+), Gargling (-)

Masalah : Ya

- *Bersihan jalan nafas tidak efektif*

B2 (Circulation)

- Tekanan Darah :164/117 mmHg
- Nadi: 118 x/menit
- Suhu: 37.3 0C
- CRT :< 3 detik
- Sianosis (-)
- Konjungtiva berwarna merah

Masalah : Ya

B3 (Neurologi)

- Tingkat Kesadaran : Stupor
- GCS : Stupor E2 M2 Vx (ETT)
- Refleks Kornea (+/+)
- Refleks Cahaya (+/+)
- Reflek Pupil (+/+)
Ukuran Pupil (isokor) ukuran (2.5 mm/2.5 mm)
- Refleks Motorik (bisep +/- trisep +/- patella +/-) : Sulit dikaji
- Refleks Nervus Kranialis (Jabarkan 12 Nervus Kranialis dengan singkat): Sulit dikaji

Masalah : Ya/Tidak

Penurunan kapasitas adaptif intrakranial

B4 (Bladder)

- Edema Vagina/Scrotum (+/-) : Tidak ada
 - Produksi Urine 350 cc/7jam /50 ml / jam
 - Warna Urine Kuning
 - Bau Urine Ammonia
 - Sedimen Urine (-), darah (-)
 - Distensi Uretra (-)
 - Terpasang kateter Urine (+), Jenis: Silicon
 - Balance Cairan/24 Jam : 1182/24 J
 - NaCl 0.9 % 1000 mg
 - Fentanyl 30 mg
 - Midazolam 3 mg
 - Atracurium 30 mg
 - Perdipine 2 mg
 - Citicolin 500 mg
 - Omeprazole 40 mg
 - Metamizole 19 mg
 - Meropenem 19 mg
 - Atorvastatin 20 mg
 - Mecobalamin 500 mg
 - Feniton 100 mg
 - Mannitol 150 mg
 - Dexmedetomidine 50 mg
- Jumlah Input: 2462 cc/24 J
- Jumlah Output: 1280 cc/24 J

Masalah : Ya/Tidak

B5 (Bowel)

- Terpasang NGT (+), ukuran 18 Fr
- Kebutuhan Cairan 1508 cc/24 J
- Kebutuhan Nutrisi Parenteral 650 kkal/24 J, Jenis: susu dan bubur saring
- Restriksi Cairan (-) tidak ada
- Bentuk Abdomen (simetris),
- Distensi Abdomen (-),
- Asites (-),
- Mual (-),
- Muntah (-),
- Peristaltik Usus 7 x/menit


Masalah : Ya/Tidak

B6 (Bone)

- Warna Kulit sawo matang
- Dekubitus (-) tidak ada
- Pergerakan Ekstremitas (pasif)
- Kekuatan Otot sulit dikaji
- Lesi (-)
- Fraktur (-)
- Dekubitus (-), Luka terbuka (-), Luka Post Operasi (-),

Ukuran : tidak ada

Area :



Keterangan Gambar :

Pengkajian Rasa Aman dan Nyaman

- a. Apakah ada rasa nyeri? Di bagian mana ? jelaskan secara rinci:
PQRST.
Pasien tampak gelisah
Tampak pasien di restrain
Pasien jika batuk badannya ikut bergerak
Kaki kanan ditekuk
Skala nyeri 4 BPS
- b. Apakah mengganggu aktivitas?
Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur
- c. Apakah yang dilakukan untuk mengurangi / menghilangkan nyeri?
Pasien tersedasi dan terpasang fentanyl 30 mg/jam, midazolam 3mg /jam, atracurium 30 mg/jam
- d. Apakah cara yang digunakan untuk mengurangi nyeri efektif?
Pasien tersedasi
- e. Apakah ada riwayat pembedahan ?
Tidak ada

Pengkajian Aktivitas,Istirahat dan Tidur

a. AKTIVITAS

Apakah klien selalu berolahraga? Jenis OR? Keluarga pasien mengatakan pasien jarang berolahraga

Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktivitas? Pasien tidak menggunakan alat bantu aktivitas

Apakah ada gangguan aktivitas? Keluarga pasien mengatakan pasien sulit menggerakkan sisi tubuh sebtelah kanan

Bagaimana aktivitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah perlu bantuan? Jelaskan secara Rinci.

Selama sakit klien tidak bisa beraktivitas karena klien mengalami penurunan Kesadaran, klien hanya mampu berbaring ditempat tidur, dan klien tidak mampu Merawat dirinya sendiri, seluruh aktivitas dibantu oleh perawat.

b. ISTIRAHAT

Kapan dan berapa lama klien beristirahat? Keluarga pasien mengatakan pasien istirahat tidak menentu

Apa kegiatan untuk mengisi waktu luang?

Apakah klien menyediakan waktu khusus untuk istirahat? Keluarga pasien mengatakan pasien tidak memiliki waktu khusus untuk istirahat

Apakah pengisian waktu luang sesuai hobi? Keluarga kurang mengetahui hobi pasien

Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini? Saat ini klien hanya berbaring ditempat tidur

c. TIDUR

Bagaimana pola tidur klien? (jam, berapa lama, nyenyak/tidak?)

Keluarga pasien mengatakan Pola tidur pasien sebelum sakit tidak menentu

Apakah kondisi saat ini mengganggu klien? Sulit dikaji

Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur?

Tidak

Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur? Keluarga pasien mengatakan tidak ada kegiatan khusus yang dilakukan sebelum tidur

Bagaimana kebiasaan tidur? Kebiasaan tidur pasien terlentang

Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya ? Sebelum sakit pasien tidak suka begadang , kualitas tidur pasien baik.

Apakah klien sering terjaga saat tidur? Keluarga pasien mengatakan pasien terbangun jika buang air kecil

Pernahkan mengalami gangguan tidur? Jenis nya? Tidak pernah

Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut? Tidak ada

Pengkajian Riwayat Sosial :

- a. Apakah klien mempunyai teman dekat? Keluarga pasien mengatakan kurang mengetahui siapa teman yang paling didekati
- b. Siapa yang dipercaya klien? Anak dan istrinya
- c. Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat? Keluarga pasien mengatakan pasien sering ikut dalam kegiatan gotong royong, maupun kegiatan masyarakat lainnya
- d. Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai kemampuan? Pasien sekarang bekerja sebagai wirausaha dan sesuai dengan kemampuannya

Pengkajian Riwayat Psikologi:

- a. Status Emosi.
 1. Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya? Sulit dikaji
 2. Bagaimana suasana hati klien? Sulit dikaji
 3. Bagaimana perasaan klien saat ini? Sulit dikaji
 4. Apa yang dilakukan bila suasana hati sedih, marah, gembira? Sulit dikaji
- b. Konsep diri:

1. Bagaimana klien memandang dirinya? Sulit dikaji
2. Hal – hal apa yang disukai klien? Sulit dikaji
3. Bagaimana klien memandang diri sendiri ? Sulit dikaji
4. Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan yang ada pada dirinya? Sulit dikaji pasien dalam keadaan tersedasi dan penurunan kesadaran
5. Hal – hal apa yang dapat dilakukan klien saat ini? Tidak ada. Pasien hanya terbaring di tempat tidur

Pengkajian Riwayat Spiritual :

1. Apakah klien menganut satu agama? Ya pasien menganut agama islam
2. Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan ibadah? Saat ini pasien tidak pernah menjalankan ibadah hanya terbaring di tempat tidur dan pasien dalam penurunan kesadaran
3. Bagaimana hubungan antara manusia dan Tuhan dalam agama sulit dikaji

Pemeriksaan Tanda Vital

• **TANDA VITAL**

TD : 164/117 mmHg

HR : 118 x/menit

RR : 16 x/menit

SUHU : 37.2 0C

NYERI (+)

Behavioral Pain Scale: BPS 4

Parameter	1	2	3	4
Face (Wajah)	Tenang/rileks	Mengerutkan alis	Kelopak mata tertutup	Meringis
Anggota Badan	Tidak ada pergerakan	Sebagian ditekuk	Sepenuhnya ditekuk dengan	Retraksi permanen

Sebelum Atas			fleksi jari-jari	
Ventilasi	Pergerakan dapat ditoleransi	Batuk dengan pergerakan	Melawan ventilator	Tidak dapat mengontrol dengan ventilasi

Pemeriksaan Fisik

- **Kepala dan Leher**

- Inspeksi : bentuk normal, rambut warna hitam campur putih, rambut tidak mudah rontok

Telinga ; bentuk simetris, tidak ada cairan darah dari telinga

Mata ; mata simetris, sclera warna merah, konjungtiva anemis, pupil isokor, refleks Cahaya ; +/+, refleks pupil +/+ , kedua mata tertutup, terdapat lesi pada mata

Hidung; bentuk simetris, tidak ada massa, tidak ada sekret, tidak ada lesi, tidak ada darah tampak terpasang NGT, Terdapat lendir kental berwarna putih yang berasal dari cannula trakea dan dari oral klien.

Mulut ; mukosa bibir agak kering, tidak ada luka/ lesi , nampak terpasang ETT dan OPA, terdapat sekret pada mulut dan ETT, tidak ada tonsillitis, gigi putih

Leher : tidak ada pembengkakan kelenjar dan peningkatan JVP

- Palpasi : tidak ada nyeri tekan

- **Thorax**

- Inspeksi : bentuk dada normal, pergerakan dada ada, simetris kiri dan kanan, Tidak ada massa dan jejas, nampak penggunaan otot bantu saat bernafas, Nampak Retraksi dinding dada saat bernafas Terpasang CVC di subclavia dextra.

- Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi

- Perkusi : suara sonor
- Auskultasi : Ronchi, terdengar bunyi nafas tambahan
- **Pelvis**
 - Inspeksi : sulit dikaji
 - Palpasi : Tidak ada nyeri tekan
- **Ekstremitas atas/bawah**
 - Inspeksi :
 - Atas: nampak kedua tangan di restrain, nampak oedem kedua jari dan telapak tangan, pasien tidak menggerakkan kedua tangannya
 - Bawah: terdapat kontraksi otot pada kakinya namun tidak ada gerakan nampak terpasang tensi pada pergelangan kaki kiri, kuku kaki nampak panjang
 - Palpasi :
 - Atas : akral teraba dingin
 - Bawah: akral teraba dingin
 - Kekuatan otot: pasien dalam keadaan tersedasi
- **Punggung**
 - Inspeksi : Tampak datar, tidak ada jejas, tidak ada luka tekan
 - Palpasi : Punggung teraba hangat
- **Genitalia**
 - Inspeksi : tampak terpasang kateter
 - Palpasi: tidak dikaji

Pemeriksaan Diagnostik

RONTGEN CT-SCAN USG EKG ENDOSKOPI Lain-lain, ...

Hasil:

Tanggal Pemeriksaan: 28 Februari 2023

MSCT Scan Kepala

Kesan:

- Pendarahan pada spons, thalamus kanan dan nucleus lentiformis kiri

- Infark corona radiata bilateral, lobus frontal kiri dan thalamus kiri
- Brain atrofi disertai ventriculomegaly ex vacuo
- Concha bullosa media bilateral

Foto Thorax AP (asimetris) (7 februari 2023)

Kesan:

- Pneumonia dextra
- Cardiomegaly disertai dilation aortae

Pemeriksaan Laboratorium

Parameter	Nilai normal	Satuan	Hasil	Ket
Hasil laboratorium waktu protrombin (PT)				
INR			1.08	
PT	10-14	detik	11.6	Normal
Hasil pemeriksaan laboratorium GPT				
SGPT	<41	u/L	81	Sirosis
Pemeriksaan laboratorium APTT				
APTT	22.0-30.0	detik	23.0	Normal
Hasil pemeriksaan laboratorium albumin				
Albumin	3.5-5.0	Gr/dl	3.1	
Hasil pemeriksaan laboratorium glukosa sewaktu				
GDS	140	Mg/dl	146	
Hasil pemeriksaan laboratorium D Drimer				
D Drimer	< 0.5		1.36	Gumpalan darah di daerah paru
Hasil pemeriksaan ureum				
Ureum	10-50	Mg/dl	112	Uremia
Hasil pemeriksaan laboratorium elektrolit				
Natrium	136-145	Mmol/l	156	Hipernatremia
Kalium	3.5-5.1	Mmol/l	4.0	Normal
Klorida	97-111	Mmol/l	124	Hiperkloremia
Hasil pemeriksaan laboratorium Kreatinin				
Kreatinin	L(<1,3);P(<1,1)	Mg/dl	1.39	
Hasil pemeriksaan CRP Kuantitatif				
CRP Kuantitatif	<5	Mg/l	>130.0	Peradangan
Hasil pemeriksaan bilirubin total				
Bilirubin total	Dewasa (<1.1) Neonatus(<11.0)	Mg/dl	0.67	Normal
Hasil pemeriksaan prokalsitonin				
Prokalsitonin	<0,05	Mg/ml	1.50	Sepsis
Hasil pemeriksaan bilirubin Direk				
Bilirubin Direk	Dewasa (<0.30) Neonatus(<3.0)	Mg/dl	0.34	
Hasil pemeriksaan laboratorium hematologi rutin				
WBC	4.00-10.0	10 ³ /ul	11.7	Leukositosis
RBC	4.00-6.00	10 ⁶ /ul	4.41	Normal
HGB	12.0-16.0	Gr/dl	12.9	Normal

HCT	37.0-48.0	%	42	Normal
MCV	80.0-97.0	fl	95	Normal
MCH	26.5-33.5	pg	29	Normal
MCHC	31.5-35.0	Gr/dl	31	Normal
PLT	150-400	10 ³ /ul	403	Normal
RDW-SD	37.0-54.0	fl	49.1	Normal
RDW-CV	10.0-15.0	%	14.0	Normal
PDW	10.0-18.0	fl	10.1	Normal
MPV	6.50-11.0	fl	9.8	Normal
P-LCR	13.0-43.0	%		
PCT	0.15-0.50	%	0.00	Normal
NEUT	52.0-75.0	%	94.0	Leukositosis/peradangan
LYMPH	20.0-40.0	%	4.0	Limfopenia/infeksi
MONO	2.0-8.00	%	1.8	Leukositopenia
EO	1.00-3.00	10 ³ /ul	0.0	Eosinofilik /infeksi
BASO	0.00-0.10	%	0.2	Normal
LED I	(L<10,P<20)	mm	54	peradangan
Hasil pemeriksaan Analisa gas darah				
PH	7.35-7.45		7.51	alkalosis
PO2	80.0-100.0	mmHg	87.7	Normal
PCO2	35.0-45.0	mmHg	33.3	Respiratorik
SO2	95-98	%	97.4	
Hco3	22-26	Mmol/l	27.0	metabolik
BE	-2 s/d +2	Mmol/l	3.8	
CtO2	15.8-22.3		19.0	
Ctco2	23-27	Mmol/l	28.0	
Table 3 Hasil Pemeriksaan Laboratorium				

SKORING DEKUBITUS

Nama Pasien : Tn. Z

No. Rm : 1011419

Tgl Lahir : 30-12-1973

Ruangan : ICU

No		Skor	Skroring
1	(PERBANDINGAN BB/TB) a. Rata-rata b. >rata-rata c. Obesitas d. <rata-rata	0 1 2 3	0
2	(KONTINENSIA) a. terpasang kateter b. kadang-kadang c. inkontinensia fekal d. inkontinensia ganda	0 1 2 3	0
3	(JENIS KULIT) a. sehat b. tipis c. kering d. edema e. lembab f. pucat g. pecah-pecah	0 1 1 1 1 2 3	1
4	(MOBILITAS) a. penuh b. gelisah c. apatis d. terbatas e. kaku f. dengan kursi roda	0 1 2 3 4 5	3
5	(JENIS KELAMIN) a. laki-laki b. perempuan	1 2	1
6	(UMUR) a. 14-49 b. 50-64 c. 65-74 d. 75-80 e. <80	1 2 3 4 5	1
7	(NAFSU MAKAN) a. rata-rata b. buruk c. NGT d. anoreksia	0 1 2 3	2
8	(OBAT) Steroid sitotoksik anti inflamasi	4	-

9	(MALNUTRISI JARINGAN) a. terminal b. gagal jantung c. penyakit pd. perifer d. anemia e. merokok	8 5 5 2 1	-
10	MOTORIK/SENSORIK	4-6	5
11	SPINAL	5	-
12	DI ATAS MEJA OPERASI	5	-
TOTAL			13

Table 4 Scoring Dekubitus

keterangan:

skor 10-15 beresiko

skor 15-20 beresiko tinggi

skor >20 beresiko sangat tinggi



BARTHEL INDEX

No	Fungsi	Skor	Keterangan	Nilai skor	
				Sebelum sakit	Saat di RS
1	Mengendalikan rangsangan defekasi	0	Tak terkendali/tak teratur (perlu bantuan)		0
		1	Kadang-kadang tidak terkendali		
		2	Mandiri	2	
2	Mengendalikan rangsangan berkemih	0	Tak terkendali/ pakai kateter		0
		1	Kadang-kadang tidak terkendali (1x24 jam)		
		2	Mandiri	2	
3	Membersihkan diri (seka muka, sisir rambut, sikat gigi)	0	Butuh pertolongan orang lain		0
		1	Mandiri	1	
4	Penggunaan jamban, masuk dan keluar	0	Tergantung pertolongan orang lain		0
		1	Perlu pertolongan pada beberapa kegiatan tetapi dapat mengerjakan sendiri kegiatan lain		
		2	Mandiri	2	
5	Makan	0	Tidak mampu		0
		1	Perlu ditolong memotong makanan		
		2	Mandiri	2	
6	Berubah sikap dari berbaring ke duduk	0	Tidak mampu		0
		1	Perlu bantuan orang untuk bisa duduk (2 orang)		
		2	Bantuan minimal 2 orang		
		3	Mandiri	3	
7	Berpindah / berjalan	0	Tidak mampu		0
		1	Bisa (berpindah) dengan kursi		
		2	Berjalan dengan bantuan 1 orang		
		3	Mandiri	3	
8	Memakai baju	0	Bergantung pada orang lain		0
		1	Sebagian dibantu (mis mengancing baju)		
		2	Mandiri	2	
9	Naik turun tangga	0	Tidak mampu		0
		1	Butuh pertolongan		
		2	Mandiri	2	
10	Mandi	0	Tergantung		0
		1	Mandiri	1	
Total skor				20	0

Table 5 Barthel Index

Keterangan :

20 ; mandiri


5-8 : ketrgantungan berat


12-19 : ketergantungan ringan

0-4 : ketergantungan total



PENYIMPANGAN KDM





ANALISIS DATA

No	Data	Etiologi	Masalah Keperawatan
1.	<p>DS: Sulit dikaji</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RR : 16 x/menit - Pola Nafas ireguler - Terpasang OPA (+) - <i>Endotracheal Tube</i> (+) - Penggunaan Otot Bantu Nafas (+) - Suara nafas tambahan Ronchi (+) - Terdapat lendir kental berwarna putih yang berasal dari cannula trakea dan dari oral klien - Auskultasi :Ronchi , terdengar bunyi nafas tambahan 	<p style="text-align: center;">Penurunan kesadaran</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Refleks menelan terganggu</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Hipersekresi mucus</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Secret tertahan di saluran nafas</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Penumpukan secret/mucus</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bersihan jalan nafas tidak efektif</p>	<p>Bersihan jalan nafas tidak efektif</p>
2	<p>DS: - Sulit dikaji</p> <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - RR : 16 x/menit - Penggunaan Alat Bantu Pernapasan Ventilator mode SIMV BB;50 Kg,VT;510, Peep;6, T.Insp;1:2, f tot: 16 - Auskultasi : Ronchi, terdengar bunyi nafas tambahan <p>Foto Thorax AP (asimetris)</p> <p>Kesan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pneumonia 	<p style="text-align: center;">terganggunya difusi (pertukaran O2 dan Co2)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">kerusakan alveolus dan atau kapiler</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Menurunnya suplai O2</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Gangguan pertukaran gas</p>	<p>Gangguan Pertukaran Gas</p>

	<p>dextra</p> <p>Hasil pemeriksaan lab</p> <ul style="list-style-type: none"> - D Dimer 1.36 (< 0.5) <p>Hasil pemeriksaan AGD</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH : 7.51 - PCO2 : 33.3 mmHg - Po2 : 87.7 mmHg - So2 : 97.4 % - HCO3 : 27.0 mmol/l <p>Interpretasi nilai AGD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alkalosis respiratorik dan metabolik 		
<p>3</p>	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulit dikaji <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekanan Darah :164/117 mmHg - Nadi: 118 x/menit - Pola Nafas Tidak Teratur - akral teraba dingin - Pergerakan Ekstremitas (pasif) - GCS stupor E2 M2 Vx (ETT) - Tingkat Kesadaran : Stupor - nampak lesi pada mata - Riwayat penyakit hipertensi - riwayat stroke ke 3 - Riwayat hemiparese <p>MSCT Scan Kepala</p> <p>Kesan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendarahan pada spons, thalamus 	<pre> graph TD A[Hipertensi] --> B[Thrombus, emboli, perdarahan serebral] B --> C[Pecahnya pembuluh darah otak] C --> D[Perdarahan intrakranial] D --> E[Darah merembes kedalam parenkim otak] E --> F[Penekanan pada jaringan otak] F --> G[Peningkatan tekanan intrakranial] G --> H[Penurunan kapasitas intrakranial] </pre>	<p>Penurunan kapasitas adaptif intrakranial</p>

	<p>kanan dan nucleus lentiformis kiri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infark corona radiata bilateral, lobus frontal kiri dan thalamus kiri - Brain atrofi disertai ventriculomegaly ex vacuo - Concha bullosa media bilateral <p>Hasil pemeriksaan lab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Natrium 156 Mmol/l (136-145) 		
4	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulit dikaji <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur - Kekuatan otot sulit dikaji - Pergerakan Ekstremitas (pasif) - Barthel index :0 (kebutuhan total) - Diagnosis medis: Hemoragik Stroke - riwayat stroke ke 3 <p>Hasil pemeriksaan lab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ureum 112 Mg/dl (10-50) 	<p>Hipertensi</p> <p>↓</p> <p>Thrombus, emboli, perdarahan serebral</p> <p>↓</p> <p>Gangguan aliran darah ke otak</p> <p>↓</p> <p>Kerusakan neuromotorik</p> <p>↓</p> <p>Transmisi impuls UMN ke LMN terganggu</p> <p>↓</p> <p>Kelemahan otot progresif</p> <p>↓</p> <p>Mobilitas terganggu</p> <p>↓</p> <p>Gangguan mobilitas fisik</p>	Gangguan mobilitas fisik
5	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulit dikaji <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pergerakan Ekstremitas (pasif) - GCS E2 M2 Vx (ETT) 	<p>Hipertensi</p> <p>↓</p> <p>Thrombus, emboli, perdarahan serebral</p> <p>↓</p> <p>Gangguan aliran darah ke</p>	Defisit perawatan diri

	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran : Stupor - Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur - terdapat lesi pada mata - mukosa bibir agak kering - nampak oedem kedua jari dan telapak tangan - kuku kaki nampak panjang - Barthel index :0 (kebutuhan total) 	<p style="text-align: center;">otak</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Kerusakan neuromotorik</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Transmisi impuls UMN ke LMN terganggu</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Kelemahan otot progresif</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Mobilitas terganggu</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Gangguan mobilitas fisik</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">ADL dibantu</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Defisit perawatan diri</p>	
<p>6</p>	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulit dikaji <p>Do</p> <ul style="list-style-type: none"> - suhu : 37.2 0C - akral teraba dingin <p>Hasil pemeriksaan laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none"> - SGPT 81 u/L (<41) - CRP Kuantitatif >130.0 (<5) - Prokalsitonin 1.50 Mg/ml (<0,05) - WBC 11.7 10³/ul (4.00-10.0) - NEUT 94.0 % - LYMPH 4.0 % - MONO 1.8 % - EO 0.0 10³/ul - LED I 54 mm <p>MSCT Scan Kepala</p> <p>Kesan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendarahan pada spons, thalamus 	<p style="text-align: center;">Metabolism anaerob meningkat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tekanan darah meningkat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Volume darah ke otak meningkat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pembuluh darah otak berdilatasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pembuluh darah pecah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Edema serebral</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Peningkatan TIK</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tekanan pada lobus temporalis otak bawah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Herniasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p style="text-align: center;">Resiko Termoregulasi tidak efektif</p>

	<p>kanan dan nucleus lentiformis kiri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infark corona radiata bilateral, lobus frontal kiri dan thalamus kiri - Brain atrofi disertai ventriculomegaly ex vacuo - Concha bullosa media bilateral 	<p>Hipotalamus</p> <p>↓</p> <p>Gangguan mekanisme termoregulasi</p> <p>↓</p> <p>Termoregulasi tidak efektif</p>	
7	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnosis medis: Hemoragik stroke - nampak kedua tangan di restrain - Punggung terasa hangat - Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur - Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur - Pergerakan Ekstremitas (pasif) - Barthel index :0 (kebutuhan total) - skoring dekubitus : 13 (beresiko) <p>Hasil pemeriksaan lab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Albumin 3.1 Gr/dl 	<p>Hipertensi</p> <p>↓</p> <p>Thrombus, emboli, perdarahan serebral</p> <p>↓</p> <p>Gangguan aliran darah ke otak</p> <p>↓</p> <p>Kerusakan neuromotorik</p> <p>↓</p> <p>Transmisi impuls UMN ke LMN terganggu</p> <p>↓</p> <p>Kelemahan otot progresif</p> <p>↓</p> <p>Mobilitas terganggu</p> <p>↓</p> <p>Pasien bedrest</p> <p>↓</p> <p>Penekanan yang lama pada daerah punggung dan bokong</p> <p>↓</p> <p>Suplai nutrisi dan o₂ ke daerah tertekan berkurang</p> <p>↓</p> <p>Resiko Luka Tekan</p>	Resiko Luka tekan

Table 6 Analisis Data

B. Rencana Tindakan Keperawatan

NO	DIAGNOSIS KEPERAWATAN	LUARAN KEPERAWATAN	INTERVENSI KEPERAWATAN	RASIONAL
1	<p>Bersihan Jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan disfungsi neuromuskuler dibuktikan dengan:</p> <p>DS: Sulit dikaji</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RR : 16 x/menit - Pola Nafas ireguler - Terpasang OPA (+) - Endotracheal Tube (+) - Penggunaan Otot Bantu Nafas (+) - Suara nafas tambahan Ronchi (+) - Terdapat lendir kental berwarna putih yang berasal dari cannula trakea dan dari oral klien - Auskultasi : Ronchi , terdengar bunyi nafas tambahan 	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 x 24 jam diharapkan</p> <p>bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produksi sputum menurun - Sulit bicara menurun - Frekuensi nafas membaik - Pola nafas membaik 	<p>I.01011 Manajemen jalan nafas</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pola nafas - Monitor bunyi nafas tambahan - Monitor sputum <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posisikan semi fowler atau fowler - Lakukan Penghisapan lendir kurang dari 15 detik - berikan oksigen <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui frekuensi, kedalaman dan irama nafas - Mengetahui adanya sumbatan jalan nafas atau ketidakefektifan jalan nafas - Mengetahui produksi sputum yang berlebihan dapat mengakibatkan obstruksi jalan nafas - Duduk tinggi memungkinkan ekspansi paru dan mempermudah pernapasan - Penghisapan yang lama dapat mengakibatkan Hipoksia - Menambah pergantian parenteral terhadap cairan yang hilang - Membantu mengencerkan dahak sehingga mudah untuk dikeluarkan

2	<p>Gangguan pertukaran gas berhubungann dengan ketidakseimbangan ventilasi-perfusi dibuktikan dengan :</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulit dikaji <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - RR : 16 x/menit - Penggunaan Alat Bantu Pernapasan Ventilator mode SIMV BB;50 Kg,VT;510, Peep;6, T.Insp;1:2, f tot: 16 - Auskultasi : Ronchi, terdengar bunyi nafas tambahan <p>Foto Thorax AP (asimetris)</p> <p>Kesan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pneumonia dextra <p>Hasil pemeriksaan lab</p> <ul style="list-style-type: none"> - D Drimer 1.36 (< 0.5) <p>Hasil pemeriksaan AGD</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH : 7.51 - PCO2 : 33.3 mmHg - Po2 : 87.7 mmHg - So2 : 97.4 % - HCO3 : 27.0 mmol/l <p>Interpretasi nilai AGD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alkalosis respiratorik dan metabolik 	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesadaran membaik - Pola nafas membaik - PCO2 membaik - PO2 membaik - PH arteri membaik 	<p>Pemantauan Respirasi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas - Monitor pola nafas (seperti bradipnea, takipnea,hiperventilasi, kussmaul, cheyne-stokes,biot,ataksik) - Monitor kemampuan batuk efektif - Monitor adanya produksi sputum - Monitor adanya sumbatan jalan nafas - Auskultasi bunyi nafas - Monitor SPO2 <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi - Dokumentasikan hasil pemantauan <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan tujuan dari pemantauan - Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 	<p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penurunan bunyi nafas dapat menunjukkan atelectasis, ronchi mengi menunjukkan akumulasi secret - Untuk mengetahui perkembangan status kesehatan pasien - Batuk efektif dapat mengeluarkan dahak - Untuk memastikan adanya sputum di saluran nafas dan mengetahui seberapa parah kondisi pasien - Mengetahui adanya suara nafas tambahan dan keefektifan jalan nafas - Mengetahui adanya suara nafas tambahan - Mengetahui adanya perubahan nilai SPO2 - Untuk mengukur jumlah oksigen dan karbondioksida dalam darah dan menentukan tingkat keasaman atau pH darah <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui keadaan nafas pasien apakah teratur atau tidak - Sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan
---	--	---	--	--

3	<p>Penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungann dengan peningkatan tekanan darah dan stroke hemoragik dibuktikan dengan</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulit dikaji <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekanan Darah :164/117 mmHg - Nadi: 118 x/menit - Pola Nafas Tidak Teratur - akral teraba dingin - Pergerakan Ekstremitas (pasif) - GCS stupor E1 M3 V1(ETT) - Tingkat Kesadaran : Stupor - nampak lesi pada mata - Riwayat penyakit hipertensi - riwayat stroke ke 3 - Riwayat hemiparese <p>MSCT Scan Kepala</p> <p>Kesan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendarahan pada spons, thalamus kanan dan nucleus lentiformis kiri - Infark corona radiata bilateral, lobus frontal kiri dan thalamus kiri 	<p>Setelah dilakukan Intervensi keperawatan selama 3x24 jam diharapkan kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan</p> <p>Kriteria hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesadaran meningkat - Postur desebrasi (ekstensi) menurun - papiledema menurun - tekanan darah membaik - tekanan nadi membaik 	<p>Manajemen peningkatan tekanan intrakranial</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penyebab peningkatan TIK (mis. gangguan metabolisme, lesi, edema serebral) - monitor tanda dan gejala peningkatan TIK (mis. tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardia, pola nafas ireguler, kesadaran menurun) - Monitor status pernapasan <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang - berikan posisi semi fowler - atur ventilator agar PaCo2 optimal <p>Berdasarkan intervensi EBPN menurut (Astuti et al., 2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan posisi <i>Head Up</i> 30° - Berikan ROM pasif - Atur posisi MIKA MIKI setiap 2 jam <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian sedasi dan anti konvulsan, jika perlu 	<p>Manajemen peningkatan tekanan Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk mengetahui peningkatan TIK - untuk mendeteksi tanda-tanda bahaya <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - lingkungan yang tenang dapat memberikan kenyamanan pada pasien - meningkatkan ekspansi paru dan memudahkan pernapasan - dimana bila PaCO2 meningkat terjadi vasodilatasi pembuluh darah vaskuler - Posisi head of bed menunjukkan aliran balik darah dari bagian bagian inferior menuju ke atrium kanan cukup baik karena resistensi pembuluh darah dan tekanan atrium kanan tidak terlalu tinggi, sehingga volume darah yang masuk (venous return) ke atrium kanan cukup baik dan tekanan pengisian ventrikel kanan (preload) meningkat, yang dapat mengarah pada peningkatan stroke volume dan cardiac output. - ROM pasif pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. pembuluh darah menjadi elastis dan terjadi fase dilatasi pada pembuluh
---	---	--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Brain atrofi disertai ventriculomegaly ex vacuo - Concha bullosa media bilateral <p>Hasil pemeriksaan lab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Natrium 156 Mmol/l (136-145)Mmol/l (136-145) 			<p>darah maka aliran darah menuju ke jantung menjadi lancar yang menyebabkan kerja jantung stabil sehingga kemampuan jantung dalam memompa darah meningkat kemudian terjadi peningkatan tekanan darah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan posisi lateral atau miring, mempengaruhi aliran balik darah yang menuju ke jantung sehingga terjadi peningkatan volume jantung oleh karena itu kemampuan jantung dalam memompa darah meningkat <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai terapi anti kejang.
4.	<p>Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulit dikaji <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur - Kekuatan otot sulit dikaji - Pergerakan Ekstremitas (pasif) - Barthel index :0 (kebutuhan total) - Diagnosis medis: Hemoragik Stroke 	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pergerakan ekstremitas meningkat - Kekuatan otot meningkat - Rentang gerak (ROM) meningkat - Gerakan terbatas menurun - Kelemahan fisik menurun 	<p>Dukungan Mobilisasi Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya - Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan - Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi - Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. pagar tempat tidur) - Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu - Libatkan keluarga untuk membantu 	<p>Dukungan Mobilisasi Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui faktor penyebab keterbatasan gerak - Menentukan batas gerakan yang akan dilakukan - Mengetahui perkembangan klien - Mengetahui perkembangan klien <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membantu pasien agar mudah dalam melakukan aktivitas - Gerakan tubuh aktif atau pasif untuk mempertahankan atau memperbaiki fleksibilitas sendi - Membantu pasien agar

	<ul style="list-style-type: none"> - riwayat stroke ke 3 <p>Hasil pemeriksaan lab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ureum 112 Mg/dl (10-50) 		<p>pasien dalam meningkatkan pergerakan</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi - Anjurkan melakukan mobilisasi dini - Anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan 	<p>mudah dalam melakukan aktivitas</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman mengenai manfaat tindakan yang akan dilakukan - Untuk meminimalkan kekakuan sendi Ambulasi dini baik bagi sirkulasi, pemulihan peristaltik usus, dan mempercepat proses penyembuhan luka
5.	<p>Defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan dibuktikan dengan DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulit dikaji <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pergerakan Ekstremitas (pasif) - GCS E2 M2 Vx (ETT) - Kesadaran : Stupor - Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur - terdapat lesi pada mata - mukosa bibir agak kering - nampak oedem kedua jari dan telapak tangan - kuku kaki nampak panjang - Barthel index :0 (kebutuhan total) 	<p>Tujuan: setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam maka perawatan diri meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan mandi meningkat - Kemampuan mengenakan pakaian meningkat - Kemampuan makan meningkat - Kemampuan ke toilet meningkat 	<p>Dukungan perawatan diri Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia - Monitor tingkat kemandirian - Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sediakan lingkungan yang terapeutik - Siapkan keperluan pribadi - Dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri <p>Edukasi</p> <p>Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan</p>	<p>Dukungan Perawatan Diri Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui kegiatan perawatan diri yang dilakukan - Mengetahui kemampuan perawatan diri sendiri - Mengetahui kebutuhan alat perawatan diri <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kenyamanan pada pasien - Untuk mempersiapkan kebutuhan pribadi - Untuk membantu melakukan perawatan diri <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk melatih melakukan perawatan diri secara mandiri
6	<p>Termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan proses penyakit (infeksi) dibuktikan</p>	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan termoregulasi</p>	<p>Regulasi temperatur Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitor tekanan darah frekuensi pernapasan dan nadi 	<p>Pencegahan Infeksi Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui perkembangan ada tidaknya peningkatan tekanan intrakranial

	<p>dengan DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulit dikaji <p>Do</p> <ul style="list-style-type: none"> - suhu : 37.2 OC - akral teraba dingin <p>Hasil pemeriksaan laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none"> - SGPT 81 u/L (<41) - CRP Kuantitatif >130.0 (<5) - Prokalsitonin 1.50 Mg/ml (<0,05) - WBC 11.7 10³/ul (4.00-10.0) - NEUT 94.0 % - LYMPH 4.0 % - MONO 1.8 % - EO 0.0 10³/ul - LED I 54 mm <p>MSCT Scan Kepala</p> <p>Kesan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendarahan pada spons, thalamus kanan dan nucleus lentiformis kiri - Infark corona radiata bilateral, lobus frontal kiri dan thalamus kiri - Brain atrofi disertai ventriculomegaly ex vacuo - Concha bullosa media bilateral 	<p>membalik dengan Kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - takikardi menurun - takipnea menurun - suhu tubuh membaik - tekanan darah membaik 	<ul style="list-style-type: none"> - monitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - pasang alat pemantau suhu jika perlu - tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian antipiretik, jika perlu 	<ul style="list-style-type: none"> - mencegah terjadinya pasien kedinginan <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - memudahkan memantau suhu tubuh pasien - minuman berkarbonat untuk mengganti natrium dan kalium ... <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hipertermia harus dikenali dan diobati dengan tepat untuk menghindari komplikasi yang serius
7	<p>Resiko luka tekan ditandai dengan penurunan mobilitas ditandai dengan faktor resiko :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnosis 	<p>Tujuan: setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam maka integritas kulit dan</p>	<p>Pencegahan luka tekan Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa luka tekan menggunakan skala Imis. 	<p>Pencegahan luka tekan Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norton scale merupakan alat penilaian resiko ulkus luka tekan pertama yang

<p>medis: Hemoragik stroke</p> <ul style="list-style-type: none"> - nampak kedua tangan di restrain - Punggung teraba hangat - Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur - Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur - Pergerakan Ekstremitas (pasif) - Barthel index :0 (kebutuhan total) - skoring dekubitus : 13 (beresiko) <p>Hasil pemeriksaan lab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Albumin 3.1 Gr/dl 	<p>jaringan meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elastisitas meningkat - perfusi jaringan meningkat - suhu kulit membaik 	<p>Norton, Skala Braden)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa adanya luka tekan sebelumnya - Monitor suhu kulit yang tertekan - Monitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi - Monitor mobilitas dan aktivitas individu <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air - Ubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam - buat jadwal perubahan posisi - Jaga Sprei tetap kering, bersih dan tidak ada kerutan atau lipatan - Hindari menggunakan air hangat dan sabun keras saat mandi - Berikan asupan makanan yang cukup terutama protein, vitamin B dan c, zat besi dan kalori. <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan tanda-tanda kerusakan kulit - anjurkan melapor jika menemukan 	<p>dapat dijadikan sebagai alat untuk memantau kejadian luka tekan</p> <ul style="list-style-type: none"> - melihat tanda dan gejala dekubitus - suhu kulit yang panas dapat menyebabkan terjadinya luka dekubitus - mengidentifikasi terjadinya luka tekan - melihat kondisi mobilitas pasien <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - lotion dapat melembabkan kulit - mengubah posisi dapat memperlancar peredaran darah sehingga tidak terjadi luka tekan akibat kekurangan o2 dan nutrisi - untuk memantau kondisi pasien - agar tidak menimbulkan terjadinya luka tekan akibat seprei yang lembab - air hangat dapat membuat kulit menjadi lebih mudah iritasi - dengan asupan makanan yang cukup dapat meningkatkan sistem imun dan nutrisi pada jaringan kulit
---	---	--	---

			tanda-tanda kerusakan kulit - Ajarkan cara merawat kulit	
--	--	--	---	--

Table 7 Rencana Tindakan Keperawatan



C. Implementasi Dan Evaluasi

HARI/TANGGAL/ JAM	IMPLEMENTASI	EVALUASI	PARAF & NAMA
Selasa/ 07 maret 2023 14.30	<p>Diagnosis 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor pola nafas Hasil : pola nafas tidak teratur - Memonitor bunyi nafas tambahan Hasil: ada bunyi nafas tambahan (Ronchi) - Memonitor sputum Hasil : ada lendir kental berwarna putih - memosisikan semi fowler atau fowler Hasil: pasien dalam posisi semi fowler - melakukann Penghisapan lendir kurang dari 15 detik Hasil : pasien di suction saat ada lendir yang keluar di ETT, saat sesak dan sebelum diberikan makan dan tampak lendir berwarna putih. - memberikan oksigen Hasil : pasien terpasang ventilator mode SIMV. VT : 510 PEEP : 6 T.insp 1:2 F tot : 16 	<p>S :-</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola nafas tidak teratur - Ada bunyi nafas tambahan (Ronchi) - Ada lendir kental berwarna putih - Pasien terpasang ventilator mode SIMV. VT : 510 PEEP : 6 T.insp 1:2 F tot : 16 - RR: 20 x/menit - intake/ 24 jam : 2246 cc/ 24 jam <p>A: masalah bersihan jalan nafas tidak efektif tida teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitor pola nafas - monitor bunyi nafas tambahan - monitor sputum - posisikan semi fowler atau fowler - lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik 	
	<p>Diagnosis 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas Hasil : RR : 16 x/ menit. Pola nafas tidak teratur, pasien menggunakan pernapasan dada - Memonitor pola nafas Hasil : pola nafas tidak teratur, takipnea - Memonitor kemampuan batuk efektif Hasil : pasien tidak mampu melakukann batuk efektif karena pasien kesadaran menurun - Memonitor adanya produksi sputum 	<p>S :-</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RR : 16 x/ menit. Pola nafas tidak teratur - Pasien kesadaran menurun (tersedasi) - terdapat lendir/ sputum kental berwarna putih - terdengar bunyi Ronchi - AGD : pH : 7,51 PCO₂ : 33,3 HCO₃ : 27.0 (alkalosis respiratorik da metabolik) <p>A: masalah gangguan pertukaran gas tidak teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor frekuensi, irama da upaya nafas - Monitor pola nafas 	

	<p>Hasil : terdapat lendir/sputum kental berwarna putih</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengauskultasi bunyi nafas <p>Hasil : terdengar bunyi Ronchi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor SPO2 <p>Hasil : 97 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor hasil AGD : <p>Hasil : pH : 7,51 PCO2 : 33,3 HCO3 : 27.0 (alkalosis respiratorik dan metabolik)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi <p>Hasil: pemantauan respirasi dilakukan setiap jam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasikan hasil pemantauan <p>Hasil: Pukul 14:00 pola nafas takipnea, menggunakan pernapasan dada dan sesekali pernapasan perut, TD: 164/112 mmHg, N: 105x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,8 0C. Pukul 15:00 pola nafas takipnea,TD: 142/90 mmHg, N: 115x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,8 0C. Pukul 16:00 pola nafas takipnea, TD: 145/92 mmHg, N: 100x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,8 0C. Pukul 17:00 pola nafas takipnea, TD: 144/99 mmHg, N: 110x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,8 0C. Pukul 18:00 pola nafas takipnea, TD: 139/94 mmHg, N: 114x/menit, RR: 20x/menit, S: 36,2 0C. Pukul 19:00 pola nafas takipnea, TD: 139/90</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitor kemampuan batuk efektif - Monitor hasil AGD - monitor SPO2 - Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi - Dokumentasikan hasil pemantauan 	
--	--	--	--

	<p>mmHg, N: 112x/menit, RR: 19x/menit, S: 36,2 0C.</p> <p>Pukul 20:00 pola nafas takipnea, menggunakan pernapasan dada dan sesekali pernapasan perut, TD: 139/92 mmHg, N: 115x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,8 0C.</p> <p>Pukul 21:00 pola nafas takipnea, menggunakan pernapasan dada, TD: 128/89 mmHg, N: 119x/menit, RR: 20x/menit, S: 36,6 0C.</p> <p>Pukul 22:00 pola nafas takipnea, TD: 144/83 mmHg, N: 113x/menit, RR: 20x/menit, S: 39,6 0C.</p>		
	<p>Diagnosis 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK (mis. gangguan metabolisme, lesi, edema serebral) <p>Hasil: terdapat lesi pada mata, dan hasil MSCT Scan Kepala</p> <p>Kesan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendarahan pada spongia, thalamus kanan dan nucleus lentiformis kiri - Infark corona radiata bilateral, lobus frontal kiri dan thalamus kiri - Brain atrofi disertai ventriculomegaly ex vacuo - Concha bullosa media bilateral - Memonitor tanda dan gejala peningkatan TIK (mis. tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardia, pola nafas ireguler, kesadaran menurun) 	<p>S :-</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TD: 144/83 mmHg - kesadaran menurun (dalam keadaan tersedasi) - Kesadaran stupor - GCS: E2 M2 Vx (ETT) - ekstremitas tampak kaku - tampak adanya lesi pada mata - N: 113 x/menit <p>A: masalah Penurunan kapasitas adaptif intrakranial belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitor tanda dan gejala peningkatan TIK - Monitor status pernapasan 	

	<p>Hasil: TD: 164/112 mmHg, pola nafas ireguler, pasien dalam kesadaran menurun (tersedasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor status pernapasan Hasil: pernapasan takipnea - meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang Hasil: dalam ruangan ICU tidak ada penjaga dan diusahakan keadaan lingkungan untuk tetap tenang agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan tenang - Memberikan posisi semi fowler Hasil: pasien dalam keadaan semi fowler - Mengatur ventilator agar PaCo2 optimal Hasil: pasien terpasang ventilator mode SIMV. VT : 510 PEEP : 6 T.insp 1:2 F tot : 16 - Memberikan posisi <i>Head Up</i> 30° Hasil: pasien diberikan posisi <i>Head Up</i> 30° - Memberikan ROM pasif Hasil: pasien diberikan ROM pasien dan belum mampu bergerak aktif secara mandiri - Mengatur posisi MIKA MIKI setiap 2 jam Hasil: Dilakukan MIKA MIKI tiap 2 jam - Kolaborasi pemberian fentanyl, midazolam, Dexmedetomidine Hasil: pasien diberikan fentanyl 300 mg/jam IV-Sp Midazolam 3 mg/jam IV-SP Dexmedetomidine 0.2 mg/jam IV-SP 		
	Diagnosis 4	S : -	

	<ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya Hasil : pasien penurunan kesadaran - Mengidentifikasi toleransi fisik melakukann pergerakan Hasil : pasien dengan GCS E2 M2 VX (ETT) dan hanya terbaring di tempat tidur - Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi Hasil : TD 164/117 mmHg Kekuatan otot : pasien dalam keadaan tersedasi - Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. Pagar tempat tidur) Hasil : tempat tidur pasien terpasang pembatas atau pagar - Memfasilitasi melakukann pergerakan, Hasil : membantu pasien MIKA MIKI dan membantu melakukan ROM pasif pada kedua ekstremitasnya 	<p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pasien penurunan kesadaran - pasien dengan GCS E2 M2 VX (ETT) dan hanya terpabring di tempat tidur - TD 164/117 mmHg - Rentang gerak pasien (ROM) pasif - Kekuatan otot pasien dalam keadaan tersedasi <p>A: masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya - Identifikasi toleransi fisik - Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah - Fasilitasi melakukan pergerakan 	
	<p>Diagnosis 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia Hasil : pasien dibantu oleh perawat untuk mandi karena pasien kesadaran menurun - Memonitor tingkat kemandirian Hasil : pasien dibantu total oleh perawat - Mengidentifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan 	<p>S: -</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien penurunan kesadaran - Pasien dibantu total oleh perawat terkait personal hygienenya - Pasien mandi 1 kali sehari <p>A : masalah defisit perawatan diri teratasi</p> <p>P : pertahankan intervensi</p>	

	<p>Hasil : kebutuhan personal hygiene pasien di urus oleh perawat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan lingkungan yang terapeutik <p>Hasil : saat melakukan kebersihan pasien dijaga privasinya</p>		
	<p>Diagnosis 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tekanan darah frekuensi pernapasan dan nadi <p>Hasil: td: 164/112 mmhg, rr: 16x/menit, n: 113x/menit <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia <p>Hasil: hasil flowseet/hemodinamik pasien menunjukkan suhu yang tidak stabil, tampak terjadi peningkatan suhu tubuh <ul style="list-style-type: none"> - Memasang alat pemantau suhu jika perlu <p>Hasil: pasien terpasang alat pemantau suhu yang terhubung dengan monitor <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian obat meropenem, metamizole <p>Hasil: pasien diberikan meropenem 1 gr/8 jam /IV Metamizole 1 gram/8 jam/IV </p></p></p></p>	<p>S: -</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RR: 16 x /menit, N: 113 x/menit - pernapasan takipnea - suhu tubuh 39,6 0C <p>A: masalah Termoregulasi tidak efektif belum teratasi</p> <p>P: lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitor tekanan darah frekuensi pernapasan dan nadi - monitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia - Kolaborasi pemberian antipiretik, jika perlu 	
	<p>Diagnosis 7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa luka tekan menggunakan skala Imis. Norton, Skala Braden) <p>Hasil: hasil skor norton 7 (<14) beresiko tinggi terjadinya dekubitus <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa adanya luka tekan sebelumnya <p>Hasil: pasien tidak memiliki luka tekan sebelumnya </p></p>	<p>S: -</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keadaan kulit kering - pasien dalam penurunan kesadaran (tersedasi) dan hanya terbaring di tepat tidur - suhu kulit pada daerah tertekan teraba hangat <p>A: masalah resiko luka tekan belum teratasi</p> <p>P: lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor suhu kulit yang tertekan - Monitor kulit di atas tonjolan tulang atau 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Memonitor suhu kulit yang tertekan Hasil: suhu kulit tertekan teraba hangat - Memonitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi Hasil: pada saat mengubah posisi kondisi kulit yang tertekan tampak baik - Memonitor mobilitas dan aktivitas individu Hasil: pasien dalam penurunan kesadaran (tersedasi) dan hanya terbaring di tempat tidur - Menggunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air Hasil: setiap habis mandi pasien diberikan handbody dan minyak zaitun pada seluruh tubuhnya - Mengubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam Hasil: pasien diubah posisinya MIKA MIKI setiap pagi dan sore - Membuat jadwal perubahan posisi Hasil: Perubahan posisi setiap pagi dan sore hari - Menjaga Sprei tetap kering, bersih dan tidak ada kerutan atau lipatan Hasil: pasien ganti spreii setiap hari apabila selesai mandi dan apabila spreii dalam keadaan basah - Menghindari menggunakan air hangat dan sabun keras saat mandi 	<p>titik tekan saat mengubah posisi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor mobilitas dan aktivitas individu - Gunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air - Ubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam 	
--	---	--	--

	<p>Hasil: pasien dimandikan menggunakan air dingin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan asupan makanan yang cukup terutama protein, vitamin B dan c, zat besi dan kalori. <p>Hasil: pasien setiap harinya diberikan makanan bubur saring dan susu setiap 3 kali sehari serta diberikan obat Vit. B complex serta obat albumin</p>		
Rabu , 08 maret 2023 22.30	<p>Diagnosis 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor pola nafas Hasil : pola nafas tidak teratur - Memonitor bunyi nafas tambahan Hasil: ada bunyi nafas tambahan (Ronchi) - Memonitor sputum Hasil : ada lendir kental berwarna putih - memosisikan semi fowler atau fowler Hasil: pasien dalam posisi semi fowler - melakukann Penghisapan lendir kurang dari 15 detik Hasil : pasien di suction saat ada lendir yang keluar di ETT, saat sesak dan sebelum diberikan makan dan tampak lendir berwarna putih. 	<p>S : -</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola nafas tidak teratur - Ada bunyi nafas tambahan (Ronchi) - Ada lendir kental berwarna putih - Pasien terpasang ventilator mode SIMV. VT : 510 PEEP : 6 T.insp 1:2 F tot : 16 - RR: 18 x/menit - intake/ 24 jam : 1122 cc/ 24 jam <p>A: masalah bersihan jalan nafas tida efektif tidak teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitor pola nafas - monitor bunyi nafas tambahan - monitor sputum - posisikan semi fowler atau fowler - lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik 	
	<p>Diagnosis 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas Hasil : RR : 20 x/ menit. Pola nafas tidak teratur, pasien menggunakan pernapasan dada - Memonitor pola nafas 	<p>S : -</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RR : 20 x/ menit. Pola nafas tidak teratur - Pasien kesadaran menurun (tersedasi) - terdapat lendir/ sputum kental berwarna putih - terdengar bunyi Ronchi 	

	<p>Hasil : pola nafas tidak teratur, takipnea</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor kemampuan batuk efektif <p>Hasil : pasien tidak mampu melakukann batuk efektif karena pasien kesadaran menurun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor adanya produksi sputum <p>Hasil : terdapat lendir/ sputum kental berwarna putih <ul style="list-style-type: none"> - mengauskultasi bunyi nafas <p>Hasil : terdengar bunyi Ronchi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor SPO2 <p>Hasil : 97 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor hasil AGD : <p>Hasil : pH : 7,51 PCO2 : 33,3 HCO3 : 27.0 (alkalosis respiratorik dan metabolik)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi <p>Hasil: pemantauan respirasi dilakukan setiap jam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasikan hasil pemantauan <p>Hasil: Pukul 22:00 pola nafas takipnea, menggunakan pernapasan dada dan sesekali pernapasan perut, TD: 157/94 mmHg, N: 105x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,7 0C. Pukul 23:00 pola nafas takipnea,TD: 164/108 mmHg, N: 104x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,9 0C. Pukul 00:00 pola nafas takipnea, TD: 163/100 mmHg, N: 104x/menit, RR: 16x/menit, S: 37,1 0C. Pukul 01:00 pola nafas</p> </p>	<ul style="list-style-type: none"> - AGD : pH : 7,51 PCO2 : 33,3 HCO3 : 27.0 (alkalosis respiratorik da metabolik) <p>A: masalah gangguan pertukaran gas tidak teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor frekuensi, irama da upaya nafas - Monitor pola nafas - Monitor kemampuan batuk efektif - Monitor hasil AGD - monitor SPO2 - Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi - Dokumentasikan hasil pemantauan 	
--	--	---	--

	<p>takipnea, TD: 166/123 mmHg, N: 102x/menit, RR: 16x/menit, S: 37,0 OC.</p> <p>Pukul 02:00 pola nafas takipnea, TD: 159/110 mmHg, N: 100x/menit, RR: 20x/menit, S: 37,2 OC.</p> <p>Pukul 03:00 pola nafas takipnea, TD: 130/100 mmHg, N: 102x/menit, RR: 19x/menit, S: 37,0 OC.</p> <p>Pukul 04:00 pola nafas takipnea, menggunakan pernapasan dada dan sesekali pernapasan perut, TD: 150/115 mmHg, N: 102/menit, RR: 16x/menit, S: 36,9 OC.</p> <p>Pukul 05:00 pola nafas takipnea, menggunakan pernapasan dada, TD: 151/115 mmHg, N: 119x/menit, RR: 20x/menit, S: 37 OC.</p> <p>Pukul 06:00 pola nafas takipnea, TD: 148/100 mmHg, N: 113x/menit, RR: 16x/menit, S: 37,0 OC.</p> <p>Pukul 07:00 pola nafas takipnea, TD: 150/100 mmHg, N: 102x/menit, RR: 16x/menit, S: 37,0 OC.</p> <p>Pukul 08:00 pola nafas takipnea, TD: 140/90 mmHg, N: 90x/menit, RR: 16x/menit, S: 37,0 OC.</p>		
	<p>Diagnosis 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tanda dan gejala peningkatan TIK (mis. tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardia, pola nafas ireguler, kesadaran menurun) <p>Hasil: TD: 157/94 mmHg, pola nafas</p>	<p>S :-</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kesadaran stupor - GCS: E2 M3 Vx (ETT) - TD: 148/100 mmHg - ekstremitas tampak kaku - tampak adanya lesi pada mata 	

	<p>ireguler, pasien dalam kesadaran menurun (tersedasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor status pernapasan <p>Hasil: pernapasan takipnea</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan posisi <i>Head Up 30°</i> <p>Hasil: pasien diberikan posisi <i>Head Up 30°</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan ROM pasif <p>Hasil: pasien diberikan ROM pasien dan belum mampu bergerak aktif secara mandiri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur posisi MIKA MIKI setiap 2 jam <p>Hasil: Dilakukan MIKA MIKI tiap 2 jam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian fentanyl, midazolam, Dexmedetomidine <p>Hasil: pasien diberikan fentanyl 300 mg/jam IV-Sp Midazolam 3 mg/jam IV-SP Dexmedetomidine 0.2 mg/jam IV-SP</p>	<ul style="list-style-type: none"> - N: 113 x/menit <p>A: masalah Penurunan kapasitas adaptif intrakranial belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitor tanda dan gejala peningkatan TIK - Monitor status pernapasan - Kolaborasi pemberian fentanyl, midazolam, Dexmedetomidine 	
	<p>Diagnosis 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya <p>Hasil : pasien penurunan kesadaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi toleransi fisik melakukann pergerakan <p>Hasil : pasien dengan GCS E2 M2 Vx (ETT) dan hanya terbaring di tempat tidur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi <p>Hasil : TD: 157/94 mmHg N: 105x/menit Kekuatan otot : pasien dalam keadaan tersedasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi melakukan pergerakan, 	<p>S :-</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pasien penurunan kesadaran - pasien dengan GCS E2 M3 Vx (ETT) dan hanya terpabring di tempat tidur - TD: 148/100 mmHg - Rentang gerak pasien (ROM) pasif - Kekuatan otot pasien dalam keadaan tersedasi <p>A: masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya - Identifikasi toleransi fisik - Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah 	

	<p>Hasil : membantu pasien MIKA MIKI dan membantu melakukan ROM pasif pada kedua ekstremitasnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi melakukan pergerakan 	
	<p>Diagnosis 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tekanan darah frekuensi pernapasan dan nadi <p>Hasil: TD: 157/94 mmHg, N: 105x/menit, RR: 16x/menit <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia <p>Hasil: hasil flowsheet/hemodinamik pasien menunjukkan suhu yang tidak stabil, tampak terjadi peningkatan suhu tubuh <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian obat meropenem, metamizole <p>Hasil: pasien diberikan meropenem 1 gr/8 jam /IV Metamizole 1 gram/8 jam/IV</p> </p></p>	<p>S: -</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TD: 148/100 mmHg, N: 113x/menit, RR: 20x/menit - pernapasan takipnea - S: 37,0 0C <p>A: masalah Termoregulasi tidak efektif belum teratasi</p> <p>P: lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitor tekanan darah frekuensi pernapasan dan nadi - monitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia - Kolaborasi pemberian antipiretik, jika perlu 	
	<p>Diagnosis 7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor suhu kulit yang tertekan <p>Hasil: suhu kulit tertekan teraba hangat <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi <p>Hasil: pada saat mengubah posisi kondisi kulit yang tertekan tampak baik <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor mobilitas dan aktivitas individu <p>Hasil: pasien dalam penurunan kesadaran (tersedasi) dan hanya terbaring di tempat tidur <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air <p>Hasil: setiap habis mandi pasien diberikan handbody</p> </p></p></p>	<p>S: -</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keadaan kulit kering - pasien dalam penurunan kesadaran (tersedasi) dan hanya terbaring di tempat tidur - suhu kulit pada daerah tertekan teraba hangat <p>A: masalah resiko luka tekan belum teratasi</p> <p>P: lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor suhu kulit yang tertekan - Monitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi - Monitor mobilitas dan aktivitas individu - Gunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air - Ubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam 	

	<p>dan minyak zaitun pada seluruh tubuhnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam <p>Hasil: pasien diubah posisinya MIKA MIKI setiap pagi dan sore</p>		
<p>Sabtu , 10 maret 2023 09.00</p>	<p>Diagnosis 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor pola nafas Hasil : pola nafas tidak teratur - Memonitor bunyi nafas tambahan Hasil: ada bunyi nafas tambahan (Ronchi) - Memonitor sputum Hasil : ada lendir kental berwarna putih - memposisikan semi fowler atau fowler Hasil: pasien dalam posisi semi fowler - melakukan Penghisapan lendir kurang dari 15 detik Hasil : pasien di suction saat ada lendir yang keluar di ETT, saat sesak dan sebelum diberikan makan dan tampak lendir berwarna putih. 	<p>S :-</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola nafas tidak teratur - Ada bunyi nafas tambahan (Ronchi) - Ada lendir kental berwarna putih - Pasien terpasang ventilator mode SIMV. VT : 510 PEEP : 6 T.insp 1:2 F tot : 16 - RR: 20 x/menit - intake/ 24 jam : 1134 cc/ 24 jam <p>A: masalah bersihan jalan nafas tidak efektif tidak teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitor pola nafas - monitor bunyi nafas tambahan - monitor sputum - posisikan semi fowler atau fowler - lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik 	
	<p>Diagnosis 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas Hasil : RR : 18 x/ menit. Pola nafas tidak teratur, pasien menggunakan pernapasan dada - Memonitor pola nafas Hasil : pola nafas tidak teratur, takipnea - Memonitor kemampuan batuk efektif Hasil : pasien tidak mampu melakukan batuk 	<p>S :-</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RR : 20 x/ menit. Pola nafas tidak teratur - Pasien kesadaran menurun (tersedasi) - terdapat lendir/ sputum kental berwarna putih - terdengar bunyi Ronchi - AGD : pH : 7,51 PCO₂ : 33,3 HCO₃ : 27.0 (alkalosis respiratorik da metabolik) <p>A: masalah gangguan pertukaran gas tidak teratasi</p>	

	<p>efektif karena pasien kesadaran menurun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor adanya produksi sputum <p>Hasil : terdapat lendir/sputum kental berwarna putih</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengauskultasi bunyi nafas <p>Hasil : terdengar bunyi Ronchi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor SPO2 <p>Hasil : 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor hasil AGD : <p>Hasil : pH : 7,51 PCO2 : 33,3 HCO3 : 27.0 (alkalosis respiratorik dan metabolik)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi <p>Hasil: pemantauan respirasi dilakukan setiap jam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasikan hasil pemantauan <p>Hasil: Pukul 07:00 pola nafas takipnea, menggunakan pernapasan dada dan sesekali pernapasan perut, TD: 125/79 mmHg, N: 82 x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,5 0C. Pukul 08:00 pola nafas takipnea,TD: 139/92 mmHg, N: 85 x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,6 0C. Pukul 09:00 pola nafas takipnea, TD: 131/86 mmHg, N: 86 x/menit, RR: 16x/menit, S: 37,1 0C. Pukul 10:00 pola nafas takipnea, TD: 125/80 mmHg, N: 86 x/menit, RR: 16x/menit, S: 37,0 0C. Pukul 11:00 pola nafas takipnea, TD: 132/88 mmHg, N: 86 x/menit,</p>	<p>P : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor frekuensi, irama dan upaya nafas - Monitor pola nafas - Monitor kemampuan batuk efektif - Monitor hasil AGD - monitor SPO2 - Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi - Dokumentasikan hasil pemantauan 	
--	--	---	--

	<p>RR: 20x/menit, S: 37,7 0C. Pukul 12:00 pola nafas takipnea, TD: 156/98 mmHg, N: 92 x/menit, RR: 19x/menit, S: 37,8 0C. Pukul 13:00 pola nafas takipnea, menggunakan pernapasan dada dan sesekali pernapasan perut, TD: 155/101 mmHg, N: 92/menit, RR: 20x/menit, S: 38.0 0C.</p>		
	<p>Diagnosis 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tanda dan gejala peningkatan TIK (mis. tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardia, pola nafas ireguler, kesadaran menurun) Hasil: TD: 125/79 mmHg, pola nafas ireguler, pasien dalam kesadaran menurun (tersedasi) - Memonitor status pernapasan Hasil: pernapasan takipnea - Memberikan posisi <i>Head Up</i> 30° Hasil: pasien diberikan posisi <i>Head Up</i> 30° - Memberikan ROM pasif Hasil: pasien diberikan ROM pasien dan belum mampu bergerak aktif secara mandiri - Mengatur posisi MIKA MIKI setiap 2 jam Hasil: Dilakukan MIKA MIKI tiap 2 jam - Kolaborasi pemberian fentanyl, midazolam, Dexmedetomidine Hasil: pasien diberikan fentanyl 300 mg/jam IV-Sp Midazolam 3 mg/jam IV-SP 	<p>S : - O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kesadaran Stupor - GCS: E3 M3 Vx (ETT) - TD: 155/101 mmHg - ekstremitas tampak kaku - tampak adanya lesi pada mata - N: 92 x/menit <p>A: masalah Penurunan kapasitas adaptif intrakranial belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitor tanda dan gejala peningkatan TIK - Monitor status pernapasan - Kolaborasi pemberian fentanyl, midazolam, Dexmedetomidine 	

	Dexmedetomidine 0.2 mg/jam IV-SP		
	<p>Diagnosis 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya Hasil : pasien penurunan kesadaran - Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan Hasil : pasien dengan GCS E2 M3 Vx (ETT) dan hanya terbaring di tempat tidur - Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi Hasil : 131/86 mmHg, N: 86 x/menit Kekuatan otot : pasien dalam keadaan tersedasi - Memfasilitasi melakukan pergerakan, Hasil : membantu pasien MIKA MIKI dan membantu melakukan ROM pasif pada kedua ekstremitasnya 	<p>S : - O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pasien penurunan kesadaran - pasien dengan GCS: E3 M3 Vx (ETT) - dan hanya terbaring di tempat tidur - TD: 155/101 mmHg - Rentang gerak pasien (ROM) pasif - Kekuatan otot pasien dalam keadaan tersedasi <p>A: masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi P : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya - Identifikasi toleransi fisik - Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah - Fasilitasi melakukan pergerakan 	
	<p>Diagnosis 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tekanan darah frekuensi pernapasan dan nadi Hasil: 149/101 mmHg, N: 86 x/menit, RR: 10 x/menit - Memonitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia Hasil: hasil flowsheet/hemodinamik pasien menunjukkan suhu yang tidak stabil, tampak terjadi peningkatan suhu tubuh - Kolaborasi pemberian obat meropenem, metamizole Hasil: pasien diberikan meropenem 1 gr/8 jam /IV Metamizole 1 gram/8 jam/IV 	<p>S: - O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TD: 155/101 mmHg, N: 92/menit, RR: 20x/menit - pernapasan takipnea - S: 38.0 OC <p>A: masalah Termoregulasi tidak efektif belum teratasi P : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitor tekanan darah frekuensi pernapasan dan nadi - monitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia - Kolaborasi pemberian antipiretik, jika perlu 	
	<p>Diagnosis 7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor suhu kulit yang tertekan 	<p>S: - O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - keadaan kulit kering 	

	<p>Hasil: suhu kulit tertekan teraba hangat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi <p>Hasil: pada saat mengubah posisi kondisi kulit yang tertekan tampak baik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor mobilitas dan aktivitas individu <p>Hasil: pasien dalam penurunan kesadaran (tersedasi) dan hanya terbaring di tempat tidur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air <p>Hasil: setiap habis mandi pasien diberikan handbody dan minyak zaitun pada seluruh tubuhnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam <p>Hasil: pasien diubah posisinya MIKA MIKI setiap pagi dan sore</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pasien dalam penurunan kesadaran (tersedasi) dan hanya terbaring di tempat tidur - suhu kulit pada daerah tertekan teraba hangat <p>A: masalah resiko luka tekan belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor suhu kulit yang tertekan - Monitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi - Monitor mobilitas dan aktivitas individu - Gunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air - Ubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam 	
--	--	--	--

Table 8 Implementasi dan Evaluasi

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Asuhan Keperawatan

1. Analisis Pengkajian Keperawatan

Pengkajian ini dilakukan diruang ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 6 maret 2023 pada pukul 14.20 WITA. Pengkajian ini dilakukan pada Tn. Z dengan diagnosis medis hemoragik stroke. Pasien mengalami penurunan kesadaran sejak 25 februari 2023 yang dirasakan secara tiba-tiba pada saat berbaring

a. B1

Pasien dengan penurunan kesadaran dengan terpasang ventilator, nampak penggunaan otot bantu nafas, pola nafas tidak teratur, dari hasil pengkajian baik secara teori maupun kasus dapat disimpulkan bahwa ada kesinambungan antara teori dan kasus sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Padila, 2013) dimana pada saat dilakukan pengkajian secara inspeksi didapatkan data adanya penggunaan otot bantu pernapasan, peningkatan produksi sputum, sesak nafas. Kemudian pada auskultasi terdengar suara nafas tambahan dengan peningkatan produksi secret dan kemampuan batuk yang menurun yang sering didapatkan pada pasien dengan penurunan tingkat kesadaran.

b. B2

Pada teori didapatkan adanya peningkatan TIK yaitu peningkatan tekanan darah pada pasien yang sering terjadi pada pasien dengan stroke. Pada kasus didapatkan adanya peningkatan tekanan darah yaitu 164/112 mmHg, akral teraba dingin. Sehingga kembali disimpulkan bahwa adanya kesinambungan antara kasus dan teori yang telah dikemukakan oleh (Padila, 2013).

c. B3

Pada teori yang dikemukakan (Padila, 2013) dikemukakan bahwa adanya keluhan nyeri hebat, periksa adanya pupil unilateral, observasi tingkat kesadaran, kaji status mental, kaji fungsi intelektual, kaji kemampuan bicara. Pada kasus dan teori tidak dapat disimpulkan adanya kesinambungan ataupun

kesenjangan karena pada kasus ini pasien dalam kondisi tingkat kesadaran tersedasi

d. B4

Teori yang dikemukakan oleh Padila (2013) untuk mengkaji tanda-tanda inkontinensia akibat ketidakmampuan mengendalikan kandung kemih. Pada kasus didapatkan pasien nampak terpasang kateter urine yang artinya dapat dinilai ahwa ada kesinambungan antara kasus dan teori

e. B5

Pada pasien didapatkan nampak terpasang NGT, Peristaltik 7x/mnt, tidak ada mual dan muntah , serta pasien dalam kondisi tersedasi sehingga sulit dijabarkan apakah ada kesinambungan ataukah kesenjangan antara kasus dan teori sesuai yang dikemukakan Padila (2013) yang mengemukakan bahwa pasien dengan *hemorrhagic stroke* terdapat kesulitan menelan nafsu makan menurun

f. B6

Pasien dalam kondisi tersedasi, kekuatan otot menurun sehingga segala kebutuhan aktivitas pasien dibantu sepenuhnya oleh perawat.

2. Analisis Diagnosis keperawatan

Keluhan utama pasien adalah gagal nafas dengan penurunan kesadaran dengan data pasien menggunakan alat bantu nafas menggunakan ventilator mode SIMV, tingkat kesadaran stupor, GCS: E2 M Vx (ETT). Gagal nafas merupakan suatu kondisi dimana sistem respirasi gagal untuk melakukan fungsi pertukaran gas, pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida (Saputra et al., 2023). Pengertian lain gagal nafas merupakan kondisi klinis yang terjadi ketika sistem pernapasan gagal mempertahankan fungsi utamanya, yaitu pertukaran gas oksigenasi dan eliminasi karbondioksida, dimana PaCO₂ lebih tinggi dari 50 mmHg (Firmansyah et al., 2021).

Diagnosis utama dalam kasus ini adalah berkurangnya kemampuan beradaptasi intrakranial. Masalah ini muncul dari hasil pengkajian pasien. Penurunan kemampuan adaptasi intrakranial merupakan gangguan pada

mekanisme dinamika intrakranial untuk mengkompensasi rangsangan yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial. (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Masalah ini didapatkan pada saat selesai pengkajian pada pasien saat dirawat di Ruang ICU dengan data terdapat TD: 164/117 mmHg, N: 118 x/menit, pasien memiliki riwayat hipertensi, pasien memiliki riwayat stroke ke 3, memiliki riwayat hemiparese, hasil CT scan kepala terdapat perdarahan pada spongs, thalamus kanan dan nucleus lentiformis kiri, infark corona radiata bilateral, lobus frontal kiri dan thalamus kiri. Hal ini sejalan dengan Libeskind 2018 yang menuliskan bahwa perdarahan terjadi akibat proses trauma yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah otak.

Diagnosis selanjutnya pada kasus ini adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Masalah ini didapatkan pada saat pengkajian. hasil data yang didapatkan RR: 16x/menit, pola nafas ireguler. terpasang OPA, terpasang ETT, penggunaan otot bantu nafas, terdengar suara nafas tambahan ronchi, terdapat lendir kental berwarna putih yang berasal dari kanul trakea dan dari oral klien. Bersihan jalan nafas tidak efektif merupakan ketidakmampuan membersihkan secret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). bersihan produksi secret yang berlebih menyebabkan tertutupnya jalan nafas, oleh karena itu fungsi pernapasan tidak bekerja dengan baik akibat tertutupnya jalan nafas yang diakibatkan oleh secret berlebih.

Diagnosis keperawatan lainnya yang terdapat pada kasus ini adalah gangguan pertukaran gas masalah ini didapatkan pada saat pasien masuk di ruangan ICU. Hasil data yang didapatkan RR: 16x/menit, penggunaan alat bantu pernapasan ventilator mode SIMV, hasil foto thorax didapatkan kesan pneumonia dextra hasil AGD dengan Ph: 7,51, PCO₂: 3,3 mmHg, Po₂: 97,4%, HCO₃: 27,0 mmol/l, dengan interpretasi hasil AGD alkalosis respiratorik dan metabolik. Gangguan pertukaran gas merupakan kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbondioksida pada membran alveolus-kapiler paten (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Terjadinya gangguan pertukaran gas ini menunjukkan kapasitas difusi menurun, antara lain disebabkan oleh penurunan luas permukaan

difusi, penebalan membran alveolar kapiler, terganggunya pengangkutan O₂ dari paru ke jaringan akibat rasio ventilasi perfusi tidak baik, anemia, keracunan O₂ dan terganggunya aliran darah (Azwardi, 2022). Hal ini sesuai dengan data yang menunjukkan hasil lab pasien menunjukkan alkalosis respiratorik dan metabolik.

Diagnosis keperawatan selanjutnya yang ditemukan pada kasus ini adalah gangguan mobilitas fisik. Data ini didapatkan pada saat dilakukannya pengkajian pada pasien. Data menunjukkan pasien memiliki pergerakan ekstremitas pasif, pasien dengan kebutuhan total, diagnosis medis: hemoragik stroke. Gangguan mobilitas fisik merupakan keterbatasan dalam gerak fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). hal ini sejalan dengan teori yang menjelaskan bahwa beberapa gejala yang dialami pada penderita stroke meliputi adanya kelemahan atau kelumpuhan lengan, atau tungkai atau salah satu sisi tubuh (Arum, 2015). Oleh karena itu pada pasien penderita stroke hemoragik mengalami gangguan pada fungsi tubuh tergantung letak daerah otak yang terkena.

Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit seperti pada kasus sebelumnya adalah teori perawatan diri. Pada prinsipnya setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk mengurus dirinya sendiri dan berhak untuk mengurus dirinya sendiri secara mandiri, kecuali jika orang tersebut tidak mampu melakukannya. Menurut Dorothea Orem (2001), perawatan diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan hidup, kesehatan dan kesejahteraan seseorang dalam keadaan sehat dan sakit. Menurut teori Orem, pada kasus di atas kondisi pasien merupakan salah satu kebutuhan kompensasi dimana pasien tidak mampu melakukan aktivitas perawatan diri, sehingga *caregiver* dan pasien memiliki peran yang sama dalam melakukan perawatan diri. (Cholorany, 2020)

3. Analisis Intervensi Keperawatan

Berdasarkan beberapa diagnosis keperawatan yang telah ditegakkan, maka dibuatlah rencana keperawatan

1. Untuk masalah bersihan Jalan nafas tidak efektif diberikan intervensi manajemen jalan nafas

Rata-Rata pasien di ruang *intensif care unit* mengalami gangguan bersihan jalan nafas tidak efektif. Pada kasus ini untuk masalah bersihan jalan nafas tidak efektif, pasien diberikan intervensi manajemen jalan nafas. Menurut (Tim Pokja SIKI, 2018) Manajemen jalan nafas merupakan mengidentifikasi dan mengelola kepatenan jalan nafas. Hal ini dilakukan untuk memastikan jalan nafas pada pasien tidak mengalami hambatan agar oksigen dan karbon dioksida dapat tersuplai dengan baik. Adapun kriteria hasil yang diharapkan untuk intervensi ini adalah Produksi sputum menurun, Sulit bicara menurun, Frekuensi nafas membaik, Pola nafas membaik (Tim Pokja SLKI, 2019).

Pada kasus ini intervensi yang diberikan adalah pemberian posisi semi fowler, Suction dan pemberian oksigen. Pemberian posisi diharapkan dapat memperbaiki pola nafas pada pasien, dan suction digunakan untuk menghilangkan sputum yang mengganggu jalan nafas pasien, sehingga kebutuhan oksigen dalam tubuh menjadi terhambat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Silfiah et al., 2020) diperoleh hasil bahwa Ada pengaruh suction dan posisi semi fowler terhadap perubahan saturasi oksigen pada pasien yang terpasang endotracheal tube di ICU Rumah Sakit Omni Alam Sutra, dengan nilai $p: 0,000 (<0,05)$. Perawat dapat melakukan tindakan suction dan pemberian posisi semi fowler pada pasien dengan masalah penyerta pada sistem pernapasan, khususnya pasien dengan bersihan jalan nafas tidak efektif.

2. Untuk masalah gangguan pertukaran gas diberikan intervensi pemantauan respirasi

Selain masalah bersihan jalan nafas, masalah gangguan pertukaran gas juga sering dialami oleh pasien-pasien yang di rawat di ruang ICU. Dalam kasus ini. Intervensi yang diberikan pada gangguan pertukaran gas yang dialami oleh pasien ini adalah pemantauan respirasi. Menurut (Tim Pokja SIKI, 2018) Pemantauan respirasi adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data untuk memastikan kepatenan jalan nafas dan keefektifan pertukaran gas.

Adapun kriteria hasil yang ingin dicapai adalah tingkat kesadaran membaik, pola nafas membaik, PCO₂ membaik, PO₂ membaik, PH arteri membaik (Tim Pokja SLKI, 2019).

Pada kasus ini, pemantauan respirasi dilakukan untuk melihat keefektifan penggunaan ventilator yang diberikan pada pasien untuk menunjang pasokan oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh, sehingga dapat memperbaiki pertukaran O₂ dan CO₂ dalam tubuh. Pasien terpasang ventilator perlu dilakukan perawatan dan pemantauan yang intensif, diantaranya dengan pemeriksaan analisis gas darah indicator diantaranya nilai saturasi oksigen. Pemantauan nilai saturasi oksigen dapat diukur secara invasif (pemeriksaan analisis gas darah) dan non invasif (*pulse oximetry*). Pemantauan saturasi oksigen dengan *pulse oximetry* yang kontinyu dapat membantu mengobservasi kestabilan pasien setiap saat dan dengan analisis gas darah juga dapat memberi informasi langsung mengenai fungsi paru. Nilai saturasi oksigen penting untuk dipantau karena dapat menunjukkan keadekuatan oksigenasi atau perfusi jaringan pasien (Andriani & Hartono, 2013)

3. Untuk masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan intervensi manajemen peningkatan tekanan intrakranial

Pada diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan intervensi manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Menurut (Tim Pokja SIKI, 2018) manajemen peningkatan tekanan intrakranial adalah untuk mengidentifikasi dan mengelola peningkatan tekanan di rongga tengkorak. Kriteria hasil yang diinginkan adalah peningkatan tingkat kesadaran, penurunan postur otak, penurunan papilledema, peningkatan tekanan darah, dan peningkatan tekanan nadi.. (Tim Pokja SLKI, 2019).

Untuk manajemen peningkatan tekanan intrakranial diperlukan pemantauan memonitor tanda dan gejala peningkatan TIK, Seperti tekanan darah, nadi, pernapasan, dan tingkat kesadaran. Menurut (Amri, 2017) Pemantauan TIK diperlukan untuk menghindari transisi dari fase kompensasi ke fase dekompensasi. Pemantauan TIK dapat dilakukan dengan menggunakan

monitor, pencitraan, pengukuran non-invasif (TCD) dan tindak lanjut dengan berbagai modalitas. Dengan adanya monitoring TIK, pengelolaan menjadi lebih optimal. Manajemen peningkatan TIK meliputi manajemen umum dan manajemen khusus. Ada dua metode pemantauan TIK, yaitu metode invasif (langsung) dan metode non invasif (tidak langsung). Metode non-invasif (tidak langsung) dilakukan dengan memantau kondisi klinis, neuroimaging dan neurosonologi (*transcranial Doppler ultrasound/TCD*). Sedangkan metode invasif (langsung) dapat dilakukan dengan rute intraventrikuler, intraparenkim, subarachnoid/subdural dan epidural. Metode yang paling umum digunakan adalah intraventrikular dan intraparenkim (sensor mikro transduser), karena lebih tepat tetapi karena pemasangannya, resiko perdarahan dan infeksi harus diperhitungkan. Melalui pemantauan TIK, kami juga dapat menentukan nilai CPP yang sangat penting, yang menunjukkan apakah aliran darah serebral dan oksigenasi serebral tercapai atau tidak.

4. Untuk masalah gangguan mobilitas fisik diberikan intervensi dukungan mobilisasi

Pada diagnosis gangguan mobilitas fisik diberikan intervensi dukungan mobilitas dengan memberikan pasien fasilitas melakukan pergerakan, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, menjelaskan tujuan prosedur mobilisasi serta menganjurkan melakukan mobilisasi dini dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas, rentang gerak, kaku sendi dan gerakan terbatas meningkat. Intervensi spesifik yang diberikan pada pasien pada pasien dengan intervensi dukungan mobilisasi yaitu ROM (*Range Of Motion*) diberikan pada pasien yaitu latihan yang dilakukan untuk meningkatkan massa otot, tonus otot dan meningkatkan rentang gerak pada pasien. ROM dilakukan dengan menggerakkan masing-masing persendian secara normal.

Berdasarkan hasil penelitian (Daulay et al., 2021) tentang pengaruh latihan ROM terhadap kekuatan otot dan rentang gerak sendi pada ekstremitas menunjukkan ada pengaruh menunjukkan adanya pengaruh latihan ROM pasif

terhadap kekuatan otot dengan p-value sebesar 0,001 pada ekstremitas atas dan p-value sebesar 0,001 pada ekstremitas bawah. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh latihan ROM pasif terhadap rentang gerak sendi dengan p-value sebesar 0,001 pada ekstremitas atas dan p-value sebesar 0,001 pada ekstremitas bawah. Sedangkan dalam penelitian (Andrianti et al., 2020) tentang pengaruh ROM (*Range Of Motion*) aktif dan pasif terhadap rentang gerak pada lansia menunjukkan hasil penelitiannya terdapat pengaruh range of motion yang dilakukan cara aktif, pasif terhadap rentang gerak pada lansia yang mengalami artritis reumatoid di Kota Bengkulu dengan p-value < 0,005.

Latihan ROM aktif yaitu latihan isotonik yang mampu mempertahankan atau meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot serta dapat mencegah perburukan kapsul sendi, ankilosis, dan kontraktur. Lansia mengalami kemunduran pada sistem muskuloskeletal, pada lansia penurunan fungsi sendi dan otot serta beberapa penyakit yang menyerang persendian pada lansia, akibat dari penyakit tersebut lansia mengalami nyeri sehingga lansia takut melakukan pergerakan yang akan mengakibatkan terjadi kekakuan dan penurunan pada rentang gerak. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kekakuan dan meningkatkan rentang gerak dilakukan Range of Motion (ROM) baik secara aktif maupun pasif (Andrianti et al., 2020).

5. Untuk masalah defisit perawatan diri diberikan intervensi dukungan perawatan diri

Pada diagnosis defisit perawatan diri intervensi yang diberikan adalah Dukungan Perawatan Diri . Menurut (Tim Pokja SIKI, 2018) Dukungan Perawatan Diri adalah memfasilitasi pasien dalam pemenuhan kebutuhan perawatan diri. Adapun kriteria hasil yang diharapkan setelah memberikan intervensi yaitu kemampuan mandi meningkat dan kemampuan mengenakan pakaian meningkat. Di ruangan ICU pasien pasien dalam kondisi darurat dan kesadaran menurun, untuk itu perawatan diri pasien khususnya mandi dan *oral hygiene* dilakukan oleh perawat.

Berdasarkan hasil penelitian (Roslianti et al., 2020) tentang hubungan personal hygiene perawat terhadap kepuasan pasien di unit perawatan intensif RSUD Ciamis, hasil uji statistik Korelasi menunjukkan nilai signifikansi $p\text{-value} = 0,000 < \alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara personal hygiene perawat dengan kepuasan pasien di unit perawatan intensif RSUD Ciamis. Personal hygiene management memegang peranan penting dalam pelayanan di Intensif Care Unit (ICU). Pasien yang dirawat di ruang Intensif Care Unit (ICU) berada dalam kondisi kritis sehingga membutuhkan bantuan dalam melakukan perawatan diri sehingga peran perawat sangat dibutuhkan oleh pasien ICU. Perawatan di ICU juga akan mempengaruhi kepuasan pasien sehingga dapat menjadi ukuran kualitas pelayanan perawatan di rumah sakit.

6. Untuk masalah termoregulasi tidak efektif diberikan intervensi regulasi temperature

Pada diagnosis termoregulasi tidak efektif intervensi yang diberikan regulasi temperature. Regulasi temperatur adalah mempertahankan suhu tubuh dalam rentang normal. Adapun kriteria hasil yang diharapkan adalah takikardi menurun, takipnea menurun, suhu tubuh menurun, tekanan darah menurun. Di ruangan ICU termoregulasi perlu dipantau.

Menurut (Fauzi et al., 2022) Beberapa masalah bisa terjadi setelah serangan stroke. Diantaraya penurunan kesadaran, memburuknya keadaan umum, penyakit sistemik lain yang sudah terjadi sebelumnya, demam dan infeksi. Saat terjadi hipertermi akan diikuti dengan peningkatan nadi dan respirasi sebagai mekanisme kompensasi tubuh. Berdasarkan hasil penelitian (Fauzi et al., 2022) data dapat diketahui bahwa nilai $p\text{-value} 0,000(p < 0,05)$, maka ada hubungan suhu tubuh dengan GCS pasien stroke. Terdapat hubungan suhu tubuh dengan GCS. pasien stroke disebabkan demam merupakan komplikasi yang sering pada stroke, dimana pada umumnya kenaikan suhu terkait dengan proses inflamasi dan infeksi karena pasien

stroke, kebutuhan metabolisme meningkat, kebutuhan oksigen bertambah sehingga dapat terjadi hipoksia, serta tekanan intrakranial juga meningkat.

Untuk itu perlu pemantauan suhu tubuh pasien agar tidak memperparah serangan stroke. Jika suhu tubuh meningkat perawat berperan penting untuk menurunkan suhu tubuh pasien bisa dengan menggunakan teknik farmakologis seperti memberikan obat paracetamol ataupun teknik non farmakologi seperti kompres air hangat.

7. untuk masalah resiko luka tekan diberikan intervensi pencegahan luka tekan

Pada diagnosis resiko luka tekanan intervensi yang diberikan adalah pencegahan luka tekan. Menurut (Tim Pokja SIKI, 2018) pencegahan luka tekan merupakan mengidentifikasi dan menurunkan resiko kematian jaringan pada area penonjolan tulang akibat tekanan atau gesekan. Adapun kriteria hasil yang diharapkan pada diagnosis ini yaitu elastisitas meningkat, perfusi jaringan meningkat, suhu kulit membaik. Salah satu intervensi yang diberikan pada pasien yaitu ubah posisi tiap 1- 2 jam pada pasien tirah baring.

Salah satu intervensi yang dapat diberikan yaitu pengaturan posisi. Pengaturan posisi yang dapat diberikan seperti miring kanan dan miring kiri. Berdasarkan hasil penelitian dari (Simanjuntak & Purnama, 2020) hasil uji statistik menggunakan Independent didapatkan nilai $p=0,004$, berarti ada pengaruh mobilisasi miring kiri miring kanan dalam upaya pencegahan *pressure injury*/ luka tekan pada pasien sepsis di Ruang Instalasi Pelayanan Intensif.

Salah satu intervensi keperawatan yang sering dilakukan pada pasien dengan bedrest total adalah pengaturan posisi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya *pressure injury*. Pencegahan merupakan hal yang penting pada pasien sepsis dengan imobilisasi, upaya untuk tersebut, salah satunya adalah dengan cara memiringkan badan pasien secara teratur, menjaga kebersihan kulit. Salah satu tindakan untuk menurunkan angka kejadian *pressure injury*/luka tekan adalah dengan pemberian posisi miring yang bertujuan untuk mempertahankan *body alignment* atau keseimbangan tubuh,

mengurangi komplikasi akibat imobilisasi dan meningkatkan rasa nyaman (Simanjuntak & Purnama, 2020).

4. Analisis Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Ukuran intervensi keperawatan yang diberikan kepada klien terkait dengan dukungan, pengobatan, tindakan untuk memperbaiki kondisi, pendidikan untuk klien-keluarga, atau tindakan untuk mencegah masalah kesehatan yang muncul di kemudian hari. Untuk kesuksesan implementasi keperawatan agar sesuai dengan intervensi, perawat harus memiliki kemampuan kognitif (intelektual), kemampuan dalam hubungan interpersonal dan keterampilan dalam melakukan tindakan. Proses pelaksanaan implementasi harus berpusat kepada kebutuhan klien, faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan keperawatan. (Supratti & Ashriady, 2016)

Implementasi yang dilakukan pada Tn. Z diberikan implementasi yang dilakukan selama 3 hari dalam 3x24 jam pada hari Selasa, 7 Maret 2023 sampai hari Kamis, 9 Maret 2023 dengan melaksanakan intervensi yang telah disusun yaitu melakukan mobilisasi progresif level 1, manajemen jalan nafas, pemantauan respirasi, Dukungan mobilisasi, dukungan perawatan diri, regulasi temperatur, dan pencegahan luka tekan.

Masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial yang dialami pasien berikan implementasi berupa mobilisasi progresif level 1: posisi *head up* 30⁰, ROM pasif, dan MIKA-MIKI sesuai dengan intervensi EBPN. Menurut Astuti et al. (2022) intervensi ini sangat berpengaruh untuk menstabilkan tekanan darah dan saturasi oksigen pada pasien dengan stroke hemoragik.

Berdasarkan diagnosa keperawatan awal bersihan jalan nafas tidak efektif, maka dilakukan penatalaksanaan jalan nafas dengan tujuan untuk mengontrol patensi jalan nafas.. Menurut Hammad et al. (2020) Pasien dengan gangguan kesadaran tidak memiliki refleks batuk yang efektif untuk membersihkan sekret, sehingga terjadi penumpukan sekret di saluran nafas berupa dahak atau phlegm.

Implementasi yang diberikan adalah monitor pola nafas tidak teratur dan suara nafas tambahan, monitor dengkur, monitor sputum, lendir putih kental, dan tempatkan pasien pada posisi setengah fowler. Asumsi posisi setengah fowler dianggap cara yang paling efektif untuk meningkatkan ekspansi paru dan menurunkan laju pernapasan, dan posisi ini juga membantu mengembangkan otot pernapasan lebih optimal. (Yusnita et al., 2022). Selanjutnya dilakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik pada pasien saat ada lendir yang keluar di ETT, saat sesak dan sebelum diberikan makan dan tampak lendir berwarna putih, dan memberikan oksigen dengan pasien terpasang ventilator mode SIMV. VT : 510, PEEP : 6, T.insp 1:2 F tot : 16.

Pada diagnosis kedua gangguan pertukaran gas, diberikan implementasi pemantauan respirasi untuk memastikan kepatenan jalan nafas dan keefektifan pertukaran gas dilakukan memonitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas dengan nilai RR dari 16X/I menjadi 18x/I, dan pasien menggunakan pernapasan dada. Memonitor pola nafas tidak teratur, takipnea. Memonitor kemampuan batuk efektif, pasien tidak mampu melakukan batuk efektif karena pasien kesadaran menurun. Memonitor adanya produksi sputum, terdapat lendir/ sputum kental berwarna putih. Mengauskultasi bunyi nafas, terdengar bunyi ronchi. Memonitor SPO2 dari 97% menjadi 100%, memonitor hasil AGD, alkalosis respiratorik dan metabolik, mengatur interval pemantauan respirasi setiap jam, dan mendokumentasikan hasil pemantauan.

Jika mobilitas fisik terbatas didiagnosis, penerapan tindakan dukungan untuk mobilisasi diberikan. Salah satu gejala yang dialami penderita stroke hemoragik adalah kelumpuhan anggota tubuh (hemiparesis). Kelumpuhan tersebut disebabkan oleh kerusakan pada area motorik korteks frontal, kerusakan ini bersifat kontralateral, yaitu jika belahan otak kanan rusak, kelumpuhan otot terjadi di bagian kiri dan sebaliknya. (Tarwoto, 2013). Pasien mengalami kerusakan pada hemisfer kiri sehingga ekstremitas sebelah kanan atas dan bawah tidak bisa digerakkan. Salah satu implementasi yang diberikan yaitu ROM Pasif.

Pada diagnosis kelima defisit perawatan diri berhubungan, diberikan implementasi Dukungan perawatan diri dengan mengidentifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri, pasien dibantu oleh perawat untuk mandi, memonitor tingkat kemandirian pasien dibantu total oleh perawat, mengidentifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan pasien. Menyediakan lingkungan yang terapeutik dengan cara menjaga privasi pasien.

Pada diagnosis keenam termoregulasi tidak efektif berhubungan, diberikan implementasi Regulasi temperatur dengan memonitor tekanan darah frekuensi pernapasan dan nadi yaitu TD 164/112 mmHg menjadi 149/101 mmHg, RR: 16x/I menjadi 10x/i, nadi 113x/I menjadi 86x/i. Memonitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia pasien didapatkan hasil flowsheet/hemodinamik pasien menunjukkan suhu yang tidak stabil, tampak terjadi peningkatan suhu tubuh dan mengkolaborasi pemberian obat meropenem, metamizole.

Pasien mengalami kerusakan pada hemisfer kiri sehingga ekstremitas kanan atas dan bawah tidak dapat bergerak. Salah satu implementasi yang diberikan adalah *Passive ROM*. (Primalia & Hudiyawati, 2020), Implementasi yang dilakukan yaitu melakukan pengkajian resiko dekubitus dengan Norton scale, pengkajian dan perawatan kulit, pengaturan posisi seperti elevasi kepala 30 derajat, mengubah posisi secara berkala.

5. Analisis Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan yang dilakukan pada studi kasus ini dilakukan selama 3 hari pada tanggal 7 -9 Maret 2023. Evaluasi keperawatan merupakan kegiatan dalam menilai tindakan keperawatan yang telah ditentukan, untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Penilaian keberhasilan adalah tahap yang menentukan apakah tujuan tercapai. Tahap evaluasi keperawatan merupakan mengkaji respon klien terhadap tindakan keperawatan yang telah diberikan oleh perawat dengan mengacu pada standar atau kriteria hasil yang telah ditetapkan pada rumusan tujuan. Evaluasi dibagi menjadi 2 bagian yaitu evaluasi proses atau formatif dilakukan setiap selesai melaksanakan tindakan dan evaluasi hasil atau sumatif dilakukan dengan

membandingkan respon klien pada tujuan khusus dan umum yang telah ditentukan. (Supratti & Ashriady, 2016).

1) Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial

Pada diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial di awal pengkajian diperoleh data bahwa pasien mengalami penurunan kapasitas adaptif intrakranial akibat dari diagnosis medis yaitu hemoragik stroke. Setelah dilakukan implementasi hari pertama, hasil evaluasi menunjukkan bahwa TD menunjukkan hasil abnormal yaitu 164/112 mmHg, pernapasan takipnea, dan pasien penurunan kesadaran Stupor GCS E2 M2 Vx (ETT). Hasil Ct Scan kepala menunjukkan adanya Pendarahan pada spon, thalamus kanan dan nucleus lentiformis kiri, Infark corona radiata bilateral, lobus frontal kiri dan thalamus kiri, Brain atrofi disertai ventriculomegaly ex vacuo, Concha bullosa media bilateral. Hasil data tersebut menunjukkan pasien masih mengalami penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Evaluasi hari kedua menunjukkan TD: 154/94 pola nafas ireguler, pasien dalam kesadaran Stupor GCS E2 M2 Vx (ETT). Hal ini menunjukkan terjadi penurunan tekanan darah dibanding hari pertama meskipun masih dalam batas abnormal. Adapun evaluasi hari ketiga menunjukkan hasil TD 125/79 mmHg, pola nafas ireguler, pasien dalam kesadaran Stupor GCS E3 M3 Vx (ETT). Hal ini menunjukkan terjadi penurunan tekanan darah dalam batas normal adapun keluhan lainnya belum teratasi sehingga masalah ini belum data teratasi selama 3 hari implementasi.

2) Bersihan jalan nafas tidak efektif

Pada diagnosis ini disebabkan karena proses penyakit. Setelah dilakukan implementasi hari pertama hasil evaluasi didapatkan pola nafas tidak teratur, terdengar bunyi nafas tambahan (Ronchi), terdapat lendir kental berwarna putih. Pada hari kedua didapatkan RR: 18x/ menit dengan terpasang ventilator, pola pernapasan tidak teratur dan masih terdapat lendir kental berwarna putih sehingga terdengar suara nafas tambahan ronchi. Adapun evaluasi pada implementasi hari ketiga yang didapatkan pasien RR: 20x/menit, pola nafas tidak teratur dan masih terdapat lendir kental berwarna putih. sehingga pada saat

3 hari implementasi yang dilakukan masalah bersihan jalan nafas tidak efektif belum teratasi

3) Gangguan Pertukaran gas

Pada diagnosis ini pasien mengalami penurunan kesadaran sehingga pasien terpasang ventilator mode SIMV. Evaluasi yang didapatkan pada saat implementasi hari pertama sampai dengan hari ketiga pasien tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan hasil lab masih menunjukkan alkalosis respiratorik dan metabolik dengan pasien penurunan kesadaran (tersedasi), kesadaran stupor.

4) Gangguan Mobilitas Fisik

Hal ini menunjukkan adanya faktor dari proses penyakit yang dimana pasien yang menderita stroke hemoragik mengalami penurunan pada kekuatan ototnya yang dimana hasil evaluasi pada saat implementasi hari pertama sampai dengan hari ketiga didapatkan rentang gerak pasif, pasien dalam keadaan penurunan kesadaran dan hanya terbaring di tempat tidur. Hal ini menunjukkan belum ada peningkatan kekuatan otot pada ekstremitas yang mengalami kelemahan. Hal ini Karena keefektifan dari pemberian terapi ROM pasif dapat dilihat setelah pemberian ≥ 1 bulan. Hosseini et al. (2019) menyatakan bahwa terdapat peningkatan fungsi motorik pada ekstremitas atas dan bawah setelah pemberian terapi ROM pasif yang mulai terlihat di bulan pertama dan terus meningkat sampai bulan ketiga dilakukannya observasi.

5) Defisit Perawatan Diri

Pada diagnosis ini ditemukan akibat dari pasien mengalami kelemahan dengan kebutuhan total care sehingga pasien tidak dapat melakukan *personal hygiene* secara mandiri. maka dari itu setelah dilakukan implementasi pada hari pertama menunjukkan pasien tampak bersih, pasien dibantu total oleh perawat untuk *personal hygiene*, pasien masih 1 kali sehari. Dalam hal ini masalah tersebut teratasi dan intervensi dipertahankan

6) Termoregulasi Tidak efektif


Diagnosis ini ditemukan akibat dari proses penyakit (infeksi) yang menunjukkan adanya perdarahan pada Pendarahan pada spon, thalamus kanan dan nucleus lentiformis kiri dan hasil lab menunjukkan terjadi peningkatan infeksi sehingga hasil evaluasi pertama pada saat dilakukan implementasi menunjukkan suhu tubuh $39,6^{\circ}\text{C}$ dan N: 113x/menit. pada hari kedua menunjukkan suhu tubuh 37°C , N; 113x/menit dan pada hari ketiga menunjukkan S: $38,0^{\circ}\text{C}$, N: 92x/menit. hal ini menunjukkan pada hari pertama sampai hari ketiga terjadi termoregulasi tidak efektif sehingga masalah tersebut belum teratasi.

7) Resiko Luka Tekan

Diagnosis ini didapatkan akibat dari pasien dalam keadaan tersedasi dengan tirah baring lama beresiko mengalami luka tekan. Maka hasil implementasi pada hari pertama sampai hari ketiga didapatkan keadaan kulit pasien kering, suhu kulit belakang teraba hangat sehingga masalah belum teratasi. akan tetapi tidak terdapat luka tekan sehingga resiko tidak terjadi, masalah teratasi.


B. Analisis Intervensi EBP

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien Tn. Z dengan masalah *hemorrhagic stroke* dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan intervensi mobilisasi progresif level 1 selama 3 hari implementasi. Intervensi ini diberikan 1 kali sehari dengan diawali pengukuran tekanan darah dan tingkat kesadaran pasien selanjutnya dilakukan intervensi dengan memberikan posisi *head of bed 30^{\circ}* selama 30 menit, kemudian diberikan ROM pasif selama 10 menit selanjutnya memposisikan pasien dengan miring kanan selama 1 jam dan miring kiri selama 1 jam. Hal ini dilakukan satu kali sehari pada saat dinas. Durasi waktu pemberian intervensi ini kepada pasien selama 160 menit atau 2 jam 40 menit. dengan hasil pemantauan terjabarkan pada diagram berikut ini:




	TD Sistolik	TD Diastolik	SPO2	GCS
Sebelum dilakukan intervensi H1	164	112	97	4
Sesudah dilakukan intervensi H1	142	92	98	4

Berdasarkan diagram diatas, presentase penurunan dan peningkatan tiap komponen sebelum dan sesudah dilakukan intervensi yaitu TD Sistolik terjadi sebesar 13,4%, TD Diastolik sebesar 17,8%, SPO2 mengalami peningkatan sebesar 1% dan GCS tidak terjadi peningkatan.



	TD Sistolik	TD Diastolik	SPO2	GCS
Sebelum dilakukan intervensi H2	148	100	99	4
Sesudah dilakukan intervensi H2	140	90	99	5

Berdasarkan diagram diatas, presentase penurunan dan peningkatan tiap komponen sebelum dan sesudah dilakukan intervensi yaitu TD Sistolik terjadi sebesar 5,4%, TD Diastolik sebesar 10%, SPO2 tidak mengalami peningkatan dan GCS terjadi peningkatan sebesar 1%.



	TD Sistolik	TD Diastolik	SPO2	GCS
Sebelum dilakukan intervensi H3	139	92	98	5
Sesudah dilakukan intervensi H3	125	80	99	6

Berdasarkan diagram di atas, presentase penurunan dan peningkatan tiap komponen sebelum dan sesudah dilakukan intervensi yaitu TD Sistolik terjadi sebesar 10%, TD Diastolik sebesar 13%, SPO2 mengalami peningkatan sebesar 1% dan GCS terjadi peningkatan sebesar 1%

Dari hasil analisis diatas klien mengalami perubahan pada status hemodinamik yaitu tekanan darah, saturasi oksigen dan tingkat kesadaran seiring dengan berjalannya terapi farmakologi yang diberikan dan didukung dengan intervensi mobilisasi progresif level 1. Setelah diberikan intervensi berupa mobilisasi progresif level 1 dari hari

pertama sampai hari ketiga didapatkan tekanan darah membaik yaitu TD: 164/112 mmHg, SpO₂: 97% dan GCS: E2 M2 Vx (ETT) menjadi TD 125/80 mmHg, SpO₂: 99% dan GCS: E3 M3 Vx (ETT). Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kapasitas adaptif intrakranial pada klien membaik. salah satu indikator terhadap penilaian penurunan kapasitas adaptif intracranial yaitu tingkat kesadaran membaik, tekanan darah membaik, dan saturasi oksigen membaik (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016).

Akan tetapi, dalam kasus ini tidak terjadi perubahan yang signifikan mengenai tingkat kesadaran, hal ini dikarenakan mengalami kontraindikasi yaitu pasien dalam kondisi trauma kapitis berat dan pasien dalam dalam kondisi tersedasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartoyo et al. (2017) bahwa dalam pemberian intervensi mobilisasi progresif level 1 ini sebagai pemberian aktivitas fisik kepada pasien yang dapat mempengaruhi tekanan darah dan tingkat kesadaran. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti et al. (2022) bahwa mobilisasi progresif ini dapat menstabilkan tekanan darah dan saturasi oksigen pasien stroke.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti et al. (2022) mobilisasi progresif level 1 merupakan tindakan yang dilakukan secara bertahap berurutan dengan posisi awal Head of Bed 30° selanjutnya pasien diberikan ROM pasif dan diposisikan miring ke kiri dan ke kanan. Tindakan ini memberikan dampak yang positif pada berbagai sistem tubuh. Mobilisasi dapat meningkatkan fungsi sistem respirasi seperti frekuensi dan kedalaman pernapasan, Mobilisasi dapat meningkatkan fungsi sistem respirasi seperti frekuensi dan kedalaman pernapasan, memaksimalkan ventilasi alveolar, menormalkan kerja pernapasan dan pengembangan diafragma. Hal ini membawa pengaruh terhadap transpor oksigen ke seluruh tubuh pasien (Agustin et al., 2020)

Sejalan pula dengan hasil penelitian Hartoyo et al. (2017), menunjukkan bahwa ada pengaruh mobilisasi progresif level 1 terhadap tekanan darah pada pasien kritis dengan penurunan kesadaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mustikarani & Mustofa (2020) bahwa pemberian posisi *Head up* 30⁰ terbukti efektif dalam menaikkan kadar saturasi pasien stroke hemoragik di RSUP. dr. Kariadi Semarang. Tekanan darah sebelum dan sesudah intervensi terdapat perbaikan. dan saturasi oksigen

sebelum dan sesudah dilakukan terdapat peningkatan. Adapun intervensi ini telah diberikan kepada Tn. Z yang menderita *hemorrhagic stroke* dengan keluhan pasien gagal nafas/penurunan kesadaran selama 3 hari pemberian intervensi terjadi peningkatan tekanan darah mulai stabil, dan saturasi meningkat.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu dan studi kasus yang dilakukan, pemberian intervensi mobilisasi progresif level 1 efektif dalam menstabilkan status hemodinamik pasien pada pasien stroke hemoragik. Untuk itu pada pasien stroke hemoragik, mobilisasi progresif level 1 penting dilakukan secara kontinyu, karena jika dibiarkan dengan posisi yang sama dalam waktu yang lama akan menyebabkan menetapnya gravitasi equilibrium dari waktu ke waktu, akibatnya, pasien menjadi semakin kesulitan menyesuaikan perubahan posisi (Astuti et al., 2022).

Dengan demikian peneliti berasumsi bahwa terjadi perubahan status hemodinamik yaitu tekanan darah pada pasien *Hemorrhagic Stroke* dengan pasien penurunan kesadaran menggunakan intervensi mobilisasi progresif level 1 selama tiga hari berturut-turut.

Secara fisiologis, latihan mobilisasi progresif level 1 untuk mempertahankan keseimbangan kardiovaskular, melalui beberapa proses yaitu:

1. Pada hari pertama tubuh beradaptasi dengan perlakuan intervensi mobilisasi progresif level 1.
2. Pada hari ke-dua sistem kardiovaskular biasanya akan beradaptasi dengan merubah volume plasma yang berperan mengirim transmisi pesan kepada sistem saraf autonomic agar merubah elastisitas pembuluh darah, atau telinga bagian dalam akan berespon yang disebut respon vestibular yang mempengaruhi sistem kardiovaskular selama terjadinya perubahan posisi (Mobiliu & Tomayahu, 2021).

Dalam pemberian intervensi mobilisasi progresif level 1 terdapat beberapa aktivitas diantaranya:

1. Posisi *head of bed* menunjukkan aliran balik darah dari bagian bagian inferior menuju ke atrium kanan cukup baik karena resistensi pembuluh darah dan tekanan atrium kanan tidak terlalu tinggi, sehingga volume darah yang masuk (venous return) ke atrium kanan cukup baik dan tekanan pengisian ventrikel kanan

(preload) meningkat, yang dapat mengarah pada peningkatan stroke volume dan *cardiac output*.

2. ROM pasif pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. pembuluh darah menjadi elastis dan terjadi fase dilatasi pada pembuluh darah maka aliran darah menuju ke jantung menjadi lancar yang menyebabkan kerja jantung stabil sehingga kemampuan jantung dalam memompa darah meningkat kemudian terjadi peningkatan tekanan darah.
3. Perubahan posisi lateral atau miring, mempengaruhi aliran balik darah yang menuju ke jantung sehingga terjadi peningkatan volume jantung oleh karena itu kemampuan jantung dalam memompa darah meningkat (Mustikarani & Mustofa, 2020).

Dalam kaitannya intervensi mobilisasi progresif level 1 dengan integrasi keislaman bahwasanya penyakit stroke atau rihul ahmar adalah penyakit berbahaya yang bisa merusak tubuh. Kita perlu berdoa kepada Allah agar terhindar dari penyakit ini.

Dalam sebuah riwayat, cucu Nabi Muhammad SAW pernah terkena angin rihul ahmar sehingga keluar darah dari rongga hidungnya. Kemudian Malaikat Jibril datang menghampiri beliau. Akan tetapi saat Nabi SAW bertanya tentang adanya angin rihul ahmar, malaikat Jibril tidak menjawab dan malah menghilang.

Lantas Rasulullah SAW bersabda: " Barang siapa membaca doa Rihul Ahmar, walau sekali dalam seumur hidupnya, maka ia akan dijauhkan dari penyakit angin ahmar atau stroke."

Beberapa saat kemudian, Malaikat Jibril datang lagi mengajari doa rihul ahmar kepada Nabi SAW. Doa itu kemudian dibacakan kepada sang cucu. Atas izin Allah SWT, cucu Nabi SAW tersebut sembuh seketika.

Berikut bacaan doa rihul ahmar yang diajarkan Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk menyembuhkan cucu beliau SAW:

اللهم إني أعوذ بك من الريح الأحمر والدم الأسود والداء الأكبر

Terjemahnya:

" Ya Allah ya Tuhanku, lindungi aku dari angin merah dan lindungi aku dari darah hitam (stroke) dan dari jenis penyakit berat lainnya."

Stroke merupakan gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan pembuluh darah di otak yang sifatnya *irreversible*. Yang artinya sifat sel tidak akan kembali ke fungsi normal, akan tetapi dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satu cara untuk menjaga kualitas hidup pasien stroke yaitu dengan sering melakukan aktivitas fisik. Hal ini masuk kedalam proses rehabilitasi medik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasien dengan stroke memerlukan kesabaran dalam melakukan aktivitas fisik dalam hal ini mobilisasi progresif level 1. Agama juga mengajarkan kepada kita bahwa seseorang harus bersabar dalam setiap proses yang kita jalani dalam hal ini dalam melakukan aktivitas mobilisasi progresif level 1 dengan proses perubahan yang dialami yaitu dapat menstabilkan tekanan darah, tingkat kesadaran dan saturasi oksigen. Sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam QS. Asy-Syura/42:32-33

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنَّ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَلْنَ رَوَاكِدَ عَالِي طَنْجُرٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

Terjemahnya:

"Dan, diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah kapal-kapal (yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung. Jikalau dia menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bagi setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur"

Allah berfirman bahwa di antara ayat-ayat-Nya yang menunjukkan keperkasaan-Nya yang hebat, dan kekuasaan-Nya adalah ditundukkan-Nya lautan agar kapal-kapal dapat berlayar sesuai dengan perintah-Nya: كَالْأَعْلَامِ ("seperti gunung-gunung") demikian yang dikatakan oleh Mujahid, al-Hasan, as-Suddi dan adl-Dlahhak. Maksudnya kapal-kapal di lautan itu seperti gunung-gunung di daratan (Syaikh, 2015)

Menurut Sahla, sabar adalah mengharapkan kebahagiaan dari Allah dan sesuatu yang paling mulia juga utama. Menurut sufi lain, sabar adalah berlaku sabar dengan kesabaran dengan artian tidak mencari kebahagiaan dan kesenangan dalam bersabar. Sedangkan, menurut pendapat Abu Ismail al Harawi dalam Kitab "Manazil as- Sairin", sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disenangi dan menahan lisan agar tidak mengeluh dan sabar yang paling lemah adalah sabar karena Allah. Meski demikian, Ibnu Taimiyah mengatakan sabar dalam menghadapi musibah merupakan sikap sabar yang paling mendominasi. Jika seseorang memiliki stres, risih, resah, dan susah maka sebaik-baiknya senjata adalah bersabar (KEMENAG, 2022).

C. Keterbatasan

Keterbatasan dalam studi kasus ini yaitu kurangnya interaksi langsung dengan pasien karena kondisi pasien dalam keadaan tersedasi sehingga kami tidak mengetahui respon langsung yang dirasakan klien setelah dilakukan intervensi. Adapun keterbatasan lain dari studi kasus ini yaitu hanya dilakukan pada satu pasien dan sebaiknya intervensi ini dilakukan dari awal pasien masuk di ruangan sampai dengan pasien keluar untuk melihat efektivitas dari pemberian intervensi ini.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada Tn . Z dengan intervensi utama pemberian intervensi mobilisasi progresif level 1 dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial, maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan pengkajian yang didapatkan pasien atas nama Tn.Z dengan diagnosis *hemorrhagic stroke* usia 49 tahun berjenis kelamin laki-laki Pasien penurunan kesadaran sejak tanggal 25 Februari 2023 dirasakan secara tiba-tiba pada saat berbaring. Awalnya pasien sudah dipulangkan dari rawat inap, tetapi pada saat dibangunkan pasien sudah tidak membuka mata dan tidak merespon. pasien dirawat di RS Faisal selama 2 minggu dengan keluhan tiba-tiba badan pasien terasa lemas lalu kejang. Pasien memiliki riwayat stroke (serebral infark) pada tahun 2020 dengan kelemahan pada sisi tubuh sebtelah kanan, setelah terapi pasien berangsur-angsur membaik, selain itu pasien hanya bisa bicara satu atau dua kata. Riwayat hipertensi sudah ada sejak lama dan pasien mengkonsumsi obat Amlodipine 10 mg.
2. Diagnosis keperawatan yang didapatkan pada kasus ini yaitu Bersihan Jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan disfungsi neuromuskuler, Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidak seimbangan ventilasi-perfusi, Penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dan stroke hemoragik, Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, Defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan, Resiko Termoregulasi Tidak Efektif berhubungan dengan proses penyakit (infeksi), Resiko luka tekan ditandai dengan penurunan mobilitas.
3. Intervensi Keperawatan, pada kasus ini yaitu pada Bersihan jalan nafas tidak efektif diberikan manajemen jalan nafas, pada gangguan pertukaran gas diberikan pemantauan respirasi, pada penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan manajemen peningkatan tekanan intrakranial, pada gangguan mobilitas fisik diberikan dukungan mobilisasi, pada defisit perawatan diri diberikan dukungan

perawatan diri, pada risiko termoregulasi diberikan regulasi temperature, pada risiko luka tekan diberikan pencegahan luka tekan. dan dilakukan intervensi berbasis EBPN terkait pemberian mobilisasi progresif level 1.

4. Implementasi keperawatan dilakukan selama 3 hari, yaitu pada hari senin 6 Maret sampai hari rabu 8 maret 2023. pemberian intervensi mobilisasi progresif level 1 lebih difokuskan pada penelitian ini.
5. Evaluasi Keperawatan dilakukan pada setiap akhir dinas dan dari ketujuh diagnosis yang diangkat hanya Defisit Perawatan Diri yang dapat teratasi dan faktor risiko luka tekan tidak terjadi sehingga intervensi dipertahankan. Pada saat pemberian intervensi mobilisasi progresif level 1 terjadi kestabilan status hemodinamik pasien
6. terjadi penurunan tekanan darah saturasi dan peningkatan tingkat kesadaran pada Tn. z. Setelah pemberian intervensi mobilisasi progresif level 1 pada tanggal 7-9 Maret 2023.

B. Saran

1. Bagi profesi keperawatan karya akhir ini bisa dijadikan bahan referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi non farmakologis pada pasien hemoragik stroke.
2. Bagi institusi Pendidikan penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien hemoragik stroke. Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut dengan kasus lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, I. (2017). Pengelolaan Peningkatan Tekanan Intrakranial. *Jurnal Ilmiah Kedokteran*, 4(3), 2–17.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/MedikaTadulako/article/view/9288>
- Andriani, A., & Hartono, R. (2013). Saturasi Oksigen Dengan Pulse Oximetry Dalam 24 Jam Pada Pasien Dewasa Terpasang Ventilator Di Ruang Icu Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. In *Jendela Nursing Journal* (Vol. 2, Issue 1, pp. 257–263).
- Asri Kussyani. (2022). *Asuhan Keperawatan Stroke Untuk Mahasiswa dan Perawat Profesional*. Guepedia.
- Abidin, F. A. (2021). *Kitab Tauhid*. Firanda Official.
- Agustin, W. R., Suparmanto, G., & Safitri, W. (2020). PENGARUH MOBILISASI PROGRESIF TERHADAP STATUS HEMODINAMIK PADA PASIEN KRITIS DI INTENSIF CARE UNIT. *Journal of Health Research*, 3(1), 20–27.
- Amri, I. (2017). Pengelolaan Peningkatan Tekanan Intrakranial. *Jurnal Ilmiah Kedokteran*, 4(3), 2–17.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/MedikaTadulako/article/view/9288>
- Andriani, A., & Hartono, R. (2013). Saturasi Oksigen Dengan Pulse Oximetry Dalam 24 Jam Pada Pasien Dewasa Terpasang Ventilator Di Ruang Icu Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. In *Jendela Nursing Journal* (Vol. 2, Issue 1, pp. 257–263).
- Arum. (2015). *STROKE, Kenali, Cegah dan Obati*. Notebook.
- Astuti et al. (2022). Mobilisasi Progresif Level I Menstabilkan Tekanan Darah dan Saturasi Oksigen Pasien Stroke. *Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 7(October), 599–606.
- Azwaldi. (2022). *Konsep Kebutuhan Dasar Manusia, Kebutuhan Oksigenasi, Eliminasi dan Rasa Aman dan Nyaman (Terintegrasi SDKI,SLKI,SIKI dan SPO PPNI)*. Lembaga Chakra Brahmada Lentera.
- Batticaca, F. B. (2018). *Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem*

Persarafan. Salemba Medika.

- Cholorany, S. (2020). *Gambaran Self Efficacy Pada Pasien Diabetes Tipe 2*. 3(2), 42–48.
- Daulay, N. M., Hidayah, A., & Snatoso, H. (2021). Pengaruh Latihan Range Of Motion (ROM) Pasif Terhadap Kekuatan Otot dan Rentang Gerak Sendi Ekstremitas Pada Pasien Pasca Stroke . Nanda Masraini Daulay , Arinil Hidayah , Hari Santoso Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan Padangsidimpuan. *Jurnal Kesehatan Ilmia Indonesia*, 6(1).
- Dewanto, G., Suwono, W. J., Riyanto, B., & Turama, Y. (2019). *Panduan Praktis Diagnosis dan tatalaksana Penyakit Saraf*. EGC.
- Dewi Silfiah, Hariza Pertiwi, & Widanarti Setyaningsih. (2020). Pengaruh Suction Dan Posisi Semi Fowler Terhadap Perubahan Saturasi Oksigen Pada Pasien Yang Terpasang Endotrakeal Tube. *Binawan Student Journal*, 2(3), 347–352. <https://doi.org/10.54771/bsj.v2i3.174>
- Fauzi, A., Putri, P., & Afandi, A. T. (2022). Hubungan Tanda-tanda Vital dengan GCS Pasien Stroke. *Jurnal Keperawatan Malang*, 7(1).
- Firmansyah, H., Nurwidiyanti, E., Ching Cing, M. T. G., Dewi, C. F., Vidigal, J. N. M., & Dewi, E. U. (2021). *Keperawatan Kegawatdaruratan dan Kebencanaan*. Media Sains Indonesia.
- Hammad, H., Rijani, M. I., & Marwansyah, M. (2020). Perubahan Kadar Saturasi Oksigen pada Pasien Dewasa yang Dilakukan Tindakan Suction Endotrakeal Tube di Ruang ICU RSUD Ulin Banjarmasin. *Bima Nursing Journal*, 1(1), 82. <https://doi.org/10.32807/bnj.v1i2.466>
- Hartoyo, M., Shobirun, S., Budiyati, B., & Rachmilia, R. (2017). Pengaruh Mobilisasi Progresif Level I Terhadap Tekanan Darah Dan Saturasi Oksigen Pasien Kritis Dengan Penurunan Kesadaran. *Jurnal Perawat Indonesia*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.32584/jpi.v1i1.3>
- Hosseini, Z.-S., Peyrovi, H., & Gohari, M. (2019). The Effect of Early Passive Range of Motion Exercise on Motor Function of People with Stroke: a Randomized Controlled Trial. *Journal of Caring Sciences*, 8(1), 39–44.

- <https://doi.org/10.15171/jcs.2019.006>
- Hutahalung, M. S. (2019). *Panduan Lengkap Stroke Mencegah, Mengobati dan Menyembuhkan* (Nusa Media).
- Irwan. (2018). *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*. CV Budi Utama.
- KEMENAG. (2022). *Al-Quran KEMENAG*. quran.kemenag.go.id
- Kemenkes RI. (2019). Profil Kesehatan Indonesia. In *Health Statistics*.
<https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2018.pdf>
- Kurniati, U. A., Muhammad, J., & Bararah, T. (2013). *Asuhan keperawatan panduan lengkap menjadi perawat profesional jilid 2*. Prestasi Pustakarya.
- Lingga, L. (2013). *All About Stroke Hidup Sebelum dan Pasca Stroke*. PT Alex Media Komputindo.
- Mobiliu, S., & Tomayahu, M. (2021). Effect of Progressive Mobilization on Blood Pressure Changes in Stroke Patients in Icu Room. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, 3(2), 195–205. <https://doi.org/10.35971/jjhsr.v3i2.10133>
- Mustikarani, A., & Mustofa, A. (2020). Peningkatan Saturasi Oksigen Pada Pasien Stroke melalui Pemberian Posisi Head Up. *Ners Muda*, 1(2), 114. <https://doi.org/10.26714/nm.v1i2.5750>
- Mutiarasari, D. (2019). Ischemic Stroke: Symptoms, Risk Factors, and Prevention. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Medika Tandulako*, 1(1), 60–73.
- Muttaqin, A. (2020). *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem Pernapasan*. Salemba Medika.
- Nurhikmah, N., Sudarman, S., & Aswadi, A. (2021). Hubungan Pola Makan Dan Perilaku Dengan Kejadian Stroke di RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto. *Al GIZZAI: PUBLIC HEALTH NUTRITION JOURNAL*, 1(2), 111–123. <https://doi.org/10.24252/algizzai.v1i2.22370>
- Nursalam. (2017). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Edisi 4 (By S)*. Salemba Medika.
- Organization, W. H. (2021). *Annual Report 2021*. 0(0), 260. <https://www.nampower.com.na/Media.aspx?m=Annual+Reports>

- Padang, J. R. P. (2019). *Asuhan Keperawatan Pasien Dengan Srtoke Hemorargik Di Ruang Stroke Center RSUD Abdul Wahab Sjahrane Samarinda*. Keperawatan Samarinda.
- Padila. (2013). *Asuhan Keperawatan Penyaki Dalam*. Nuha Medika.
- PPNI, T. P. S. D. (2017). *Standar Diagnosai Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Diagnostik*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- PPNI, T. P. S. D. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia:Definisi dan Tindakan Keperawatan*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Primalia, P., & Hudiyawati, D. (2020). Pencegahan dan Perawatan Luka Tekan di Ruang ICU. *Jurnal Berita Ilmu Keperawatan*, 13(2), 110–116.
- Radaningtyas, D. A., Try, M., & Indrwati, U. (2018). *Accident Hemoragik Dengan Masalah Keperawatan*. 1–4.
- Roslianti, E., Apipudin, A., Hendriyana, Y., Fitriani, A., & Hidayat, N. (2020). Relationship Of Personal Hygiene by Nurses With Patient Satisfaction In Intensif Care Unit at Ciamis Hospital. *Jurnal VNUS*, 2(2).
- Saputra, F. K., Asman, A., Faizah, A., Faradinah, E. D., & Oktabina, R. W. (2023). *Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana*. Pradina Pustaka.
- Setiawan, P. A. (2020). Diagnosis Dan Tatalaksana Stroke Hemoragik. *Jurnal Medika Utama*, 02(01), 402–406.
- Simanjuntak, T. R., & Purnama, A. (2020). Efektivitas Mobilisasi Miring Kiri Miring Kanan dalam Upaya Pencegahan Pressure Injury Pada Pasien Sepsis di Ruangan Instalasi Pelayanan Intensif. *Jurnal Keperawatan Komprehensif*, 6(1).
- Suyanti, S., Iswari, M. F., & Ginanjar, M. R. (2019). Pengaruh Mobilisasi Progresif Level 1 Terhadap Tekanan Darah Dan Saturasi Oksigen Pasien Dengan Penurunan Kesadaran. *Indonesian Journal for Health Sciences*, 3(2), 57. <https://doi.org/10.24269/ijhs.v3i2.1837>
- Syaikh, A. bin M. A. (2015). *Lulabut Tafsir Min Katsir Pentahqiq/Peneliti*. Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo.

- Tarwoto. (2013). *Keperawatan Medikal Bedah Gangguan Sistem Persarafan*. Sagung Seto.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2016). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia : Definisi dan Indikator Diagnostik*. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Komunitas Indonesia: Defenisi dan Tindakan Keperawatan*. DPP PPNI.
- Tim Pokja SLKI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. DPP PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan, Edisi 1*. Dewan Pengurus Pusat.
- Y Yueniwati. (2016). *Pencitraan Pada Stroke*. UB Press.
- Yunike, Kusumawaty, I., & Ramadhanti, N. (2022). *Buku Ajar Metodologi Keperawatan*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Yusnita, E. D., Darliana, D., & Amalia, R. (2022). Manajemen Keperawatan Pada Pasien Stroke Hemoragik Di Ruang Saraf : Suatu Studi Kasus. *JIM Fkep*, 1(2), 10–17.



MOBILISASI PROGRESIF LEVEL I MENSTABILKAN TEKANAN DARAH DAN SATURASI OKSIGEN PASIEN STROKE

Ani Astuti^{1*}, Rasyidah AZ², Satria Akbar Wibowo³
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi
*Email Korespondensi: astutiastuti89@gmail.com

Submitted :05-10-2022, Reviewed:23-10-2022, Accepted:06-11-2022

DOI: <http://doi.org/10.22216/jen.v7i3.1618>

ABSTRACT

Stroke is a neurological disease which if not handled properly will cause disability or even death. Hemodynamic instability is one of the causes of the worsening of post-stroke patients. For this reason, appropriate nursing intervention is needed to address it. This study aims to determine the effect of progressive mobilization of level I on blood pressure and oxygen saturation in stroke patients. The study design used a one-group pre-test and post-test design in which post-stroke patients were given progressive level mobilization treatment. Samples numbered 44 people with a consecutive sampling technique. Data collection by measuring blood pressure with a sphygmomanometer and oxygen saturation with oximetry. The results of the study using the Wilcoxon test showed that there was an effect of progressive mobilization of level I on blood pressure and oxygen saturation with a p-value of 0.00. Thus the blood pressure and oxygen saturation of stroke patients can be stabilized with progressive mobilization level I nursing interventions.

Keywords: *Progressive Level I Mobilization, Blood Pressure, Oxygen Saturation, Stroke*

ABSTRAK

Stroke merupakan salah satu penyakit neurologi yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sehingga kecacatan atau bahkan kematian dapat dihindari. Ketidakstabilan hemodinamik menjadi salah satu penyebab perburukan pasien stroke pasca serangan. Untuk itu diperlukan intervensi keperawatan yang tepat untuk mengatasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh mobilisasi progresif level I terhadap tekanan darah dan saturasi oksigen pada pasien stroke. Disain penelitian menggunakan rancangan one group pre-test and post-test design dimana pada pasien pasca serangan stroke diberikan perlakuan mobilisasi progresif level I. Sampel berjumlah 44 orang dengan teknik pengambilan sampel consecutive sampling. Data dikumpulkan dengan melakukan pengukuran tekanan darah dengan sphygmomanometer dan saturasi oksigen dengan oxymetri. Hasil penelitian dengan menggunakan uji wilcoxon menunjukkan bahwa mobilisasi progresif level I berpengaruh menurunkan tekanan darah dan meningkatkan saturasi oksigen pada pasien stroke dengan p-value 0,00. Dengan demikian Tekanan Darah dan saturasi oksigen pasien stroke dapat distabilkan dengan intervensi keperawatan progressive mobilisasi level I.

Kata Kunci: *Mobilisasi Progresif Level I, Tekanan Darah, Saturasi Oksigen, Stroke*

Lampiran Kokumentasi Implementasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ghina Syafira Yulianti Syam anak kedua dari empat bersaudara Lahir dari buah cinta dan kasih sayang antara Ayahanda **Ir. Syamsul Umar** dengan Ibunda **Ir. Husriah**. Lahir Pada 12 Juli 2000 di Sengkang, Sulawesi Selatan. Ttelah menempuh pendidikan di TK Melati Sacharina pada tahun 2005-2006 kemudian lanjut di SD Yayasan PG. Camming pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP PP.Puteri Ummul Mukminin pada tahun 2012-2015, dan selanjutnya SMA PP.Puteri Ummul Mukminin pada tahun 2015-2018. Pada tahun 2018 peneliti lulus lewat jalur UMM pada Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN), Program Strata Satu (S1) dan pada tahun 2022 melanjutkan jenjang Pendidikan profesi Ners UIN Alauddin Makassar. Syukur alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT, perjuangan keras dan disertai iringan doa dari kedua orang tua, keluarga serta rekan-rekan yang dapat membantu penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil dan berhasil menyusun Karya Tulis Akhir (KTA) Profesi Ners yang berjudul “**Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Hemorrhagic Stroke dengan Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial Menggunakan Intervensi Mobilisasi Progresif Level 1 di Ruang ICU RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar**”. Penulis tidak begitu banyak aktif dalam organisasi, pada masa SMA penulis bergabung di IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah). Saat di perguruan tinggi penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan UIN Alauddin Makassar sebagai Wakil Sekretaris Umum pada periode 2020-2021, Sekretaris bidang IMM Komisariat FKIK pada tahun 2020-2022 dan Wakil Ketua Senat Mahasiswa FKIK pada tahun 2021.