

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN POST
LAPARATOMI EC PERFORASI GASTER DENGAN MASALAH NYERI
MENGUNAKAN TERAPI MUROTAL AL-QUR'AN DI RUANG ICU
RSUP WAHIDIN SUDIRO HUSODO**



Tugas Akhir Ners

Oleh :

MUH. FADLI RAJAB MINHADJ, S.Kep

NIM: 70900121010

**ALAUDDIN
MAKASSAR**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN POST
LAPARATOMI EC PERFORASI GASTER DENGAN MASALAH NYERI
MENGUNAKAN TERAPI MUROTTAL AL-QUR'AN DI RUANG ICU
RSUP WAHIDIN SUDIRO HUSODO**



Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Ners Jurusan Keperawatan

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MUH. FADLI RAJAB MINHADI, S.Kep

NIM: 70900121010

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**


2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Muh. Fadli Rajab Minhadj, S.Kep NIM: 70900121010, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pasien Post Laparatomi EC Perforasi Gaster dengan Masalah Nyeri Menggunakan Intervensi perawatan luka dan Terapi Murottal Al-Qur’an di Ruang ICU RSUP Wahidin Sudiro Husodo”, memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 30 Juni 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Ardian Adhiwijaya, S.Kep.,Ns.,M.Kep
Pembimbing I



Ilhamsyah, S.Kep.,Ns.,M.Kep
Pembimbing II

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Pasien Post Laparatomi Ec Perforasi Gaster Dengan Masalah Nyeri Menggunakan Terapi Murottal Al-Qur’an Di Ruang Icu Rsup Wahidin Sudiro Husodo” yang disusun oleh Muh. Fadli Rajab Minhadj, S.Kep, NIM: 70900121010, Mahasiswa Jurusan Profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 4 Juli 2022 M bertepatan dengan 4 Dzulhijjah 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Profesi Ners.

Gowa, 04 Juli 2022
4 Dzulhijjah 1443 h

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Eva Yustilawati, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muhaemin, M.Th.i., M.Ed	(.....)
Pembimbing I	: Ardian Adhiwijaya, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamina segala puji hanya milik Allah swt., Tuhan semesta alam yang telah memberi banyak berkah kepada penyusun, diantaranya keimanan dan kesehatan serta kesabaran sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Salam dan shalawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai karena penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners yang berjudul "Kombinasi Intervensi perawatan luka dan Terapi Murottal Al-Qur'an" ini dibuat memenuhi syarat ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN alauddin Makassar.

Dalam penyusunan tugas akhir ners ini, penulis dihadapkan dengan berbagai hambatan dan tantangan, namun atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, doa restu orang tua serta izin Allah swt., akhirnya hambatan dan tantangan tersebut dapat diatasi serta mencapai tahap penyelesaian.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, beserta seluruh jajarannya yang telah memberi penulis kesempatan dalam menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp.A., M.Kes, para wakil dekan, dan seluruh staf akademik yang memberikan bantuan kepada penyusun selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar .

3. Ibu Dr.Patimah,S.Kep.,Ns.,M.Kes, selaku Ketua Program Studi Profesi Ners Keperawatan UIN Alauddin Makassar
4. Ns. Ardian Adhiwijaya, S.Kep.,M.Kep dan Ns. Ilhamsyah, S.Kep., M.Kep selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini
5. Ns. Eva Yustilawati, S.Kep.,M.Kep selaku Penguji utama dan Bapak Dr. Muhaemin, S.Ag., M.Th.I., M.Ed selaku Penguji agama atas saran, kritik, arahan dan bimbingannya yang diberikan sehingga penulis dapat menghasilkan karya terbaik yang dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain.
6. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang begitu banyak membantu dalam penyusunan tugas akhir ners ini.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ners ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis sadar bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya tulis ini. Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis memohon do'a dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian di masyarakat nantinya. Jazakumullahu khairon. Wassalamu'Alaikum Wr. Wb..

Makassar, Juli 2022

Muh. Fadli Rajab Minhadj. S.Kep

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Konsep Medis.....	9
B. Konsep Keperawatan.....	19
C. Pendekatan Teori Keperawatan Yang Digunakan.....	29
D. Evidence Based Practice Nursing (EBPN).....	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	56
A. Rancangan Studi Kasus.....	56
B. Subyek Studi Kasus.....	56
C. Fokus Studi Kasus.....	56
D. Instrumen Studi Kasus.....	57
E. Prosedur Studi Kampus.....	57
F. Tempat Dan Waktu Pengambilan Data/ Studi Kampus	58
G. Analisis Data Dan Penyajian Data	58
H. Etika Studi Kasus	59
BAB IV LAPORAN KASUS	61
A. Pengkajian	61
B. Diagnosis Keperawatan.....	75
C. Intervensi Keperawatan.....	75
D. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan.....	80
E. Evaluasi	93

BAB V PEMBAHASAN	100
A. Analisis Asuhan Keperawatan.....	101
B. Analisis Intervensi EPBN.....	101
C. Keterbatasan	105
BAB VI PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perforasi adalah ancaman abdominal dan indikasi bahwa pembedahan diperlukan (Brunner & Suddarth, 2001). Perforasi dalam bentuk apapun yang terjadi dan mengenai saluran pencernaan merupakan salah satu kasus kegawat daruratan terutama dalam kegawatan bedah. Penatalaksanaan bedah yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah laparotomi eksplorasi. (Warsinggih, 2016). Perforasi gaster adalah suatu penetrasi yang kompleks dari dinding lambung, usus besar, usus halus akibat dari bocornya isi dari usus ke dalam rongga perut. Perforasi dari lambung berkembang menjadi suatu peritonitis kimia yang disebabkan karena kebocoran asam lambung dalam rongga perut (Warsinggih, 2018)

Laparotomi merupakan suatu bentuk pembedahan mayor dengan, melakukan pengayatan pada lapisan lapisan dinding abdomen untuk mendapatkan bagian organ yang mengalami masalah (hemoragi, perforasi, kanker dan obstruksi). Laparotomi dilakukan pada kasus seperti apendicitis hernia inguinalis, kanker lambung, kanker kolon dan rectum, obstruksi usus, inflamasi usus kronis, kolestisitis dan peritonitis. World Health Organization (WHO) menguraikan pasien laparotomi di dunia meningkat setiap tahunnya

sebesar 10%. Angka jumlah pasien laparatomi mencapai peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018 laparatomi sendiri menempati peringkat ke 5, tercatat jumlah keseluruhan tindakan operasi terdapat terdapat 1,2 juta jiwa dan diperkirakan 42% diantaranya merupakan tindakan pembedahan laparatomi (Pranowo et al, 2020).

Hasil penelitian (Amelia & Saputri, 2020) menunjukkan rata-rata skala nyeri pasien post operasi laparatomi adalah 4,70. Hasil penelitian (Marliyana, 2018) menunjukkan bahwa rata-rata skala nyeri pasien post operasi laparatomi yaitu 9,25. Sedangkan penelitian (Anwar et al., 2020) menunjukkan bahwa rata-rata skala nyeri pasien post operasi laparatomi yaitu 8,50. Dampak nyeri post laparatomi mempunyai kecenderungan tidak bisa melakukan mobilisasi, serta tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan perawat, bahkan bisa melakukan tindakan percobaan bunuh diri dikarenakan tidak tahannya mereka dengan rasa nyeri yang diderita (Amelia & Saputri, 2020).

Dampak tersebut perlu dicegah dengan upaya penatalaksanaan nyeri yang dapat dilakukan secara farmakologi dan non farmakologi. Terapi farmakologi dilakukan dengan memberikan obat-obatan analgetik sedangkan terapi non farmakologi dapat dilakukan dengan bermacam cara antara lain stimulasi dan masase, kompres dingin dan hangat, distraksi, teknik relaksasi, dan hipnotis. Tugas seorang perawat adalah membantu memenuhi kebutuhan secara bio- psiko-spiritual. Salah satunya yaitu dalam pemberian intervensi keperawatan

menggunakan tehnik non farmakologi untuk menurunkan nyeri. Tujuannya agar pasien dapat melakukan pengobatan secara mandiri dan mengurangi beban kerja ginjal dalam toksik obat-obatan. Penatalaksanaan nyeri akut pasien post operasi melalui bacaan Al-Quran dapat menstimulasi neuropeptide dan stimulasi pengeluaran opioid endogen natural. Keterlibatan pasien post operasi dalam mengatasi nyeri secara aktif melalui rangsangan bacaan Al-Quran dapat menurunkan ketegangan sistem saraf dan membuat relaksasi. Pemberian terapi bacaan Al-Quran berdampak pada ketenangan, perubahan sel-sel tubuh dan menjadi modalitas pilihan dalam memicu opioid endogen serta sebagai kesembuhan penyakit jasmani dan rohani (Afdaleli W.F 2017).

Murottal yaitu terapi suara dan alunan murottal seperti halnya musik merupakan salah satu bentuk distraksi karena memiliki irama dan aturan tersendiri sehingga bekerja atau berperan dalam susunan syaraf pusat dengan bekerja sesuai teori gate control yang dapat menyebabkan gerbang sumsum tulang menutup sehingga memodulasi dan mencegah input nyeri untuk masuk ke pusat otak yang lebih tinggi untuk diinterpretasikan sebagai pengalaman nyeri. Terapi murrotal Al-Quran tidak mempunyai dampak negatif dan kekurangan. Hanya ditemukan keterbatasandari terapi murrotal yaitu penggunaannyaterbatas pada komunitas muslim, artinya hanya bisa diterapkan pada pasien yang beragama Islam, dan yang tidak mempunyai gangguan pendengaran (Geraldina, 2017).

Perkembangan globalisasi dan perubahan gaya hidup manusia berdampak terhadap perubahan pola penyakit. Beberapa tahun terakhir masyarakat Indonesia mengalami perkembangan dan peningkatan angka kesakitan dan kematian. Untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit, mulai dari tindakan yang paling ringan yaitu secara konservatif atau non bedah sampai tindakan yang paling berat yaitu operatif atau tindakan bedah. Data WHO menunjukkan bahwa selama lebih dari satu abad, perawatan bedah telah menjadi komponen penting dari perawatan kesehatan. Di perkirakan setiap tahun ada 230 juta tindakan bedah dilakukan. Menurut Hadi 2013 Nyeri pada saat dilakukan perawatan luka setelah diberikan terapi murotal Qur'an Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa nyeri pasien saat dilakukan perawatan luka setelah dilakukan terapi murotal Qur'an pada pasien post op laparotomi di ruang kutilang RS.Dr.Hi.Abdul Moeloek Provinsi Lampung memiliki rata-rata 0,68 , dan berada pada rentan nyeri ringan. Menurut salah satu metode mengurangi nyeri adalah dengan distraksi/mengalihkan perhatian pasien ke hal yang lain dan dengan demikian menurunkan kewaspadaan terhadap nyeri bahkan meningkatkan toleransi terhadap nyeri. Menurut (Utami, S. 2016)

Tujuan terapi murotal Qur'an yaitu menurunkan hormon-hormon stress, mengaktifkan hormon edorfin alami, meningkatkan perasaan rileks, mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas, dan rasa sakit. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ada pengaruh pemberian terapi murotal Qur'an terhadap

penurunan skala nyeri pada pasien post op laparotomi yang sedang dilakukan perawatan luka di ruang kutilang RS.Dr.Hi.Abdul Moeloek Provinsi Lampung tahun 2017 (p-value=0,000).

Terapi murotal Al-Qur'an atau bacaan Al-Qur'an dengan keteraturan irama dan bacaan yang benar juga merupakan sebuah musik, Al-Qur'an mampu mendatangkan ketenangan dan meminimalkan kecemasan 97% bagi mereka yang mendengarnya. Hasil ini tercatat dan terukur secara kuantitatif dan kualitatif oleh sebuah alat yang berbasis komputer. Ketenangan jiwa ini menimbulkan relaksasi bagi tubuh. Relaksasi ini mempengaruhi terbentuknya gelombang teta pada otak dimana frekuensinya 5-8 Hz. Gelombang ini mampu mempengaruhi produksi hormon endorfin yang menghambat aktifitas triggercell. Ketika aktifitas trigger cell dihambat, gerbang pada Substansia Gelatinosa menutup dan impuls nyeri berkurang atau sedikit ditransmisikan ke otak (Istikhomah, 2019).

Membaca atau mendengarkan Al-Quran akan memberikan efek relaksasi, sehingga pembuluh darah nadi dan denyut jantung mengalami penurunan. Bagian sel tubuh yang sakit, kemudian diperdengarkan bacaan Al-Quran, akan mempengaruhi gelombang dalam tubuh dengan cara merespon suara dengan getaran-getaran sinyalnya dikirimkan ke sistem saraf pusat. Terapi bacaan Al-Quran ketika diperdengarkan pada orang atau pasien akan membawa gelombang suara dan mendorong otak untuk memproduksi zat kimia yang disebut neuropeptide.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah dengan pertanyaan berikut: “Bagaimanakah cara intervensi Perawatan Luka dan Terapi Murottal AL-Qur’an pada Pasien Post Laparatomi dengan kasus ec perforasi gaster?

C. Tujuan

1. Tujuan umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien post laparatomi dengan masalah gangguan pemenuhan kebutuhan dasar nyaman (nyeri) di ruang *intensive care unit* (ICU) RSUP Wahidin Sudiro husodo.

2. Tujuan khusus

- a. mampu melakukan pengkajian pada pasien post laparatomi dengan gangguan nyeri akut di ruang *intensive care unit* (ICU) RSUP wahidin sudirohusodo.
- b. Mampu menetapkan diagnosis keperawatan pada pasien post laparatomi dengan gangguan nyeri akut di ruang *intensive care unit* (ICU) RSUP wahidin sudirohusodo.

- c. Mampu menyusun rencana tindakan keperawatan pada pasien post laparatomi dengan gangguan nyeri akut di ruang *intensive care unit* (ICU) RSUP wahidin sudirohusodo.
- d. Mampu melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien post laparatomi dengan gangguan nyeri akut di ruang *intensive care unit*(ICU) RSUP wahidin sudirohusodo.
- e. Mampu melakukan evaluasi terhadap tindakan keperawatan pada pasien post laparatomi dengan gangguan nyeri akut di ruang *intensive care unit* (ICU) RSUP wahidin sudirohusodo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dalam tugas akhir Ners diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti khususnya pemberian intervensi perawatan luka dan terapi murotal Al-Qur'an pada pasien nyeri post laparatomi. Disamping itu penelitian ini juga berfungsi sebagai bahan referensi penunjang dan dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan pada ranah konsep dan intervensi yang bisa diberikan pada penelitian selanjutnya yang bisa diterapkan pada pasien post laparatomi yang mengalami nyeri.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan sumber informasi bagi institusi dan pendidikan dan mahasiswa yang berkaitan dengan pemberian intervensi perawatan luka dan terapi murottal Al-Qur'an pada pasien nyeri post laparatomi.

2. Manfaat praktis

Penelitian tugas akhir ners ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi perawat yang ada dirumah sakit saat memberikan intervensi keperawatan dengan masalah nyeri pada pasien post laparatomi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Medis

1. Definisi Laparatomi pada ec perforasi gaster

Laparotomi merupakan salah satu prosedur pembedahan mayor, dengan melakukan penyayatan pada lapisan-lapisan dinding abdomen untuk mendapatkan bagian organ abdomen yang mengalami masalah (hemoragi, perforasi, kanker, dan obstruksi) Laparatomi juga dilakukan pada kasus-kasus digestif dan kandungan seperti apendiksitis, perforasi, hernia inguinalis, kanker lambung, kanker colon dan rectum, obstruksi usus, inflamasi usus kronis, kolestisitis dan peritonitis (Sjamsuhidajat & Jong, 2005). Jumlah pasien dengan tindakan operasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dapat mempengaruhi peningkatan komplikasi pasca operasi seperti resiko terjadinya infeksi luka operasi (ILO) dan infeksi nosokomial (Haryati Dkk 2018).

Pasca pembedahan (pasca operasi) pasien merasakan nyeri hebat dan 75% penderita mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan akibat pengelolaan nyeri yang tidak adekuat (Purwandari dkk, 2014). Adanya luka yang menyebabkan nyeri tersebut membuat pasien merasa cemas untuk melakukan mobilisasi dini sehingga pasien cenderung untuk berbaring. Nyeri akut setelah pembedahan mayor setidaknya-tidaknnya mempunyai fungsi fisiologis positif,

berperan sebagai peringatan bahwa perawatan khusus harus dilakukan untuk mencegah trauma lebih lanjut pada daerah tersebut. Komplikasi pada pasien post laparatomi adalah nyeri yang hebat, perdarahan, bahkan kematian. Pasien pasca operasi yang melakukan tirah baring terlalu lama juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kekakuan atau penegangan otot-otot di seluruh tubuh, gangguan sirkulasi darah, gangguan pernafasan dan gangguan peristaltik maupun berkemih bahkan terjadinya dekubitus atau luka tekan (Kartawijaya 2017).

2. Etiologi

Laparotomi dilakukan karena disebabkan beberapa hal yaitu adanya masalah hemoragi, perforasi, kanker dan obstruksi seperti disebabkan:

- A. Trauma abdomen
- B. Peritonitis
- C. Perdarahan saluran cerna
- D. Sumbatan pada usus halus dan usus besar
- E. Massa pada abdomen

3. Klasifikasi

a. Mid-line incision

Metode insisi yang paling sering digunakan, karena sedikit perdarahan, eksplorasi dapat sedikit lebih luas, cepat dibuka dan ditutup, serta tidak memotong ligamen dan saraf. Namun demikian, kerugian jenis insisi ini adalah terjadi hernia cicatrisis, indikasinya pada eksplorasi gaster, pankreas, hepar, dan klien serta di bawah umbilikus untuk eksplorasi ginekologis, restosigmoid dan organ dalam pelvis.

b. Paramedian

Yaitu; sedikit ke tepi dari garis tengah (2,5cm), panjang (12,5cm), terbagi menjadi dua yaitu paramedian kanan dan kiri, dengan indikasi jenis operasi lambung, eksplorasi pankreas, organ pelvis, usus bagian bawah serta plenektomi.

c. Transverse upper abdomen incision

Yaitu; insisi bagian atas misalnya pembedahan colesistotomy dan splenektomy.

d. Transverse lower abdomen incision

Yaitu; insisi melintang dibagian bawah 4cm diatas anterior spinailiaka, misalnya pada operasi apendectomy. Latihan-latihan fisik seperti latihan napas dalam, batuk efektif, menggerakkan otot kaki, menggerakkan otot bokong, latihan alih baring dan turun dari tempat tidur. semuanya dilakukan hari ke-2 post operasi.

4. Patofisiologi

Trauma adalah cedera / rudapaksa atau kerugian psikologis atau emosional. Trauma adalah luka atau cedera fisik lainnya atau cedera fisiologis akibat gangguan emosional yang hebat. Trauma adalah penyebab kematian paling utama pada anak dan orang dewasa kurang dari 44 tahun. Penyalagunaan alkohol adalah obat yang telah menjadi faktor komplikasi pada trauma tumpul dan tembus serta trauma yang disengaja atau tidak disengaja. trauma abdomen adalah cedera pada abdomen, dapat berupa trauma tumpul dan tembus serta gtrauma yang disengaja atau tidak disengaja.

Trauma abdomen merupakan luka pada isi rongga perut bisa terjadi dengan atau tanpa tembusnya dinding perut dimana pada penanganan /penatalaksanaan dapat bersifat kedaruratan dapat pula dilakukan tindakan laparatomi. tusukan / tembakan, pukulan, benturan, ledakan, deselerasi, kompresi atau sabuk pengaman dapat mengakibatkan terjadinya trauma abdomen sehingga

harus dilakukan laparatomi. Trauma tumpul abdomen dapat mengakibatkan individu kehilangan darahmemar / jejas pada dinding perut, kerusakan oragan organ nyeri, iritasi cairan usus. Sedangkan trauma tembus abdomen dapat mengakibatkan hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, respon stres simpatis, perdarahan atau pembekuan darah, kontaminasi bakteri, kematian sel. Hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ dan respon stres dari saraf simpatis akan menyebabkan terjadinya kerusakan integritas kulit, syok dan perdarahan, kerusakan pertukaran gas, resiko tinggi terhadap infeksi, nyeri akut (Dorland 2010).

5. Manifestasi klinis

- a. Nyeri tekan pada area insisi pembedahan
- b. Perubahan tekanan darah, nadi dan pernafasan
- c. Kelemahan
- d. Gangguan integumen dan jaringan subkutan
- e. Konstipasi
- f. Mual dan muntah, anoreksia

6. Penatalaksanaa

Pemeriksaan rektum :

adanya darah menunjukkan kelaina pada usus besar;
kuldosentesi, kemungkinan adanya darah dalam lambung; dan

katerisasi, adanya darah menunjukkan adanya lesi pada saluran kencing.

- Laboratorium: hemoglobin, hematokrit, leukosit, analisis urine.
- Radiologik: bila diindikasikan untuk dilakukan laparatomi
- IVP / sistogram: hanya dilakukan bila ada kecurigaan pada traumasaluran kencing.

Parasentesis perut:

tindakan ini dilakukan pada trauma tumpul perut yang diragukan adanya kelainan pada rongga perut yang disertai dengan trauma kepala yang berat, dilakukan dengan menggunakan jarum pungsi no 18 atau 20 yang ditusukan melalui dinding perut di daerah kuadran bawah atau digaris tengah dibawah pusat dengan menggosokan buli-buli terlebih dahulu.

Lavase peritoneal:

fungsi dan aspirasi atau bilasan rongga perut dengan memasukan cairan garam fisiologis melalui kanula yang dimasukan kedalam rongga peritoneum.

Perlengkapan yang dilakukan pada pasien post laparatomi adalah :

- A. Respiratory: bagaimana saluran pernapasan, jenis pernapasan, bunyi pernapasan.
- B. Sirkulasi: tensi, nadi, respirasi, dan suhu waran kulit, refil kapiler.
- C. Persyarafan: tingkat kesadaran.
- D. Balutan: apakah ada drainase? apakah ada tanda-tanda infeksi, bagaimana proses penyembuhannya?
- E. Peralatan: monitor yang terpasang, cairan infus dan transfusi.
- F. Rasa nyaman: rasa sakit, mual, muntah, posisi pasien dan status ventilasi.
- G. Psikologis : kecemasan, suasana hati setelah operasi

7. Pemeriksaan penunjang

- A. Pemeriksaan usg dengan posisi simetris, foto polos abdomen 3 posisi didapatkan hasil bayangan udara bebas subdiafragma sesuai gambar pneumoperitonium
- B. Pemeriksaan foto thorax dengan kesan
 - terpasang CVC pada hemithorax dextra melalui subelavia dextra dengan dip setinggi T7 kesan pada cavoatrial junction
 - pneumonia bilateral (dibandingkan foto

- efusi pleura dextra

8. Komplikasi

Komplikasi penyembuhan luka meliputi infeksi, perdarahan, dehiscence dan eviscerasi.

1. Infeksi

Invasi bakteri pada luka dapat terjadi pada saat trauma, selama pembedahan atau setelah pembedahan. Gejala dari infeksi sering muncul dalam 2 – 7 hari setelah pembedahan. Gejalanya berupa infeksi termasuk adanya purulent, peningkatan drainase, nyeri, kemerahan dan bengkak di sekeliling luka, peningkatan suhu, dan peningkatan jumlah sel darah putih (Sjamsurihidayat dan Jong, 2010).

2. Perdarahan


Perdarahan dapat menunjukkan suatu pelepasan jahitan, sulit membeku pada garis jahitan, infeksi, atau erosi dari pembuluh darah oleh benda asing (seperti drain). Hipovolemia mungkin tidak cepat ada tanda. Sehingga balutan (dan luka di bawah balutan) jika mungkin harus sering dilihat selama 48 jam pertama setelah pembedahan dan tiap 8 jam setelah itu. Jika perdarahan berlebihan terjadi, penambahan tekanan balutan luka steril mungkin diperlukan. Pemberian cairan dan intervensi pembedahan mungkin diperlukan (Sjamsurihidayat dan Jong, 2010).

3. Dehiscence dan Eviscerasi

Dehiscence dan eviscerasi adalah komplikasi operasi yang paling serius. Dehiscence adalah terbukanya lapisan luka partial atau total. Eviscerasi adalah keluarnya pembuluh melalui daerah irisan. Sejumlah faktor meliputi, kegemukan, kurang nutrisi, multiple trauma, gagal untuk menyatu, batuk yang berlebihan, muntah, dan dehidrasi, mempertinggi resiko klien mengalami dehiscence luka. Dehiscence luka dapat terjadi 4 –5 hari setelah operasi sebelum kollagen meluas di daerah luka. Ketika dehiscence dan eviscerasi terjadi luka harus segera ditutup dengan balutan steril yang lebar, kompres dengan normal saline. Klien disiapkan untuk segera dilakukan perbaikan pada daerah luka (Sjamsurihidayat dan Jong, 2010)



9. Penyimpanan KDM



B. Konsep Asuhan Keperawatan

1. Konsep Teori Comfort Kolcaba

Theory of Comfort dari Katherine Kolcaba merupakan salah satu Middle Range Theory keperawatan yang menekankan kesempurnaan praktik keperawatan melalui kenyamanan hidup (Alligood & Tomey, 2006). Pada teori tersebut terdapat variabel intervensi yang merupakan interaksi berbagai kekuatan yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap kenyamanan secara keseluruhan yaitu pengalaman masa lalu, umur, sikap, status emosional, sistem pendukung, prognosis penyakit dan keuangan (Kolcaba, 2003). Kenyamanan telah menjadi tujuan utama dari keperawatan, sebab dengan kenyamanan kesembuhan dapat diperoleh (Agritubella, 2018).

Kolcaba Mengemukakan bahwa kenyamanan adalah suatu konsep yang mempunyai suatu hubungan yang kuat dengan ilmu perawatan. Perawat menyediakan kenyamanan ke pasien dan keluarga-keluarga mereka melalui intervensi dengan prioritas pengukuran kenyamanan. Hubungan antara intervensi dengan teori yang dikemukakan yaitu memberikan rasa aman nyaman nyeri terhadap keluhan yang dirasakan pasien dengan memberikan tindakan keperawatan terapi Murottal guna menurunkan nyeri akut pada pasien dengan menekan nilai- nilai keislaman (Risnah & Irwan, 2021).

Kolcaba menyatakan bahwa kebutuhan kenyamanan klien dan keluarga merupakan hal yang penting. Terdapat empat konsep dalam Theory

of Comfort yaitu fisik, psikospiritual, sosiokultural, dan lingkungan. Berikut penjelasan empat konsep :

a. Kebutuhan Kenyamanan Fisik

Resiko gangguan atau gangguan aktual mekanisme fisiologis akibat dari penyakit atau prosedur invasif. Kebutuhan fisik yang tidak disadari 36 klien dan keluarga seperti keseimbangan cairan dan elektrolit, oksigenasi, termoregulasi, nutrisi, imunitas, kimia darah, istirahat dan tidur (Kolcaba, 1992). Kebutuhan fisik yang nyata seperti nyeri, mual-muntah, menggigil, gatal yang mudah diintervensi dengan atau tanpa obat.

b. Kebutuhan Kenyamanan Psikospiritual

Kebutuhan akan rasa percaya diri, motivasi, dan kepercayaan untuk anak dan keluarga agar lebih damai menghadapi prosedur yang menimbulkan trauma, ketidaknyamanan, dan nyeri yang mana tidak dapat segera sembuh. Kebutuhan ini dapat diatasi dengan intervensi comfort food for the soul seperti kompres hangat/ dingin, perawatan mulut, kunjungan dari orang yang spesial, sentuhan, kata-kata bijak (Kolcaba, 1992).

c. Kebutuhan Kenyamanan Sosiokultural

Merupakan kebutuhan untuk jaminan kebudayaan yang sensitif, bahasa tubuh yang positif, dan caring. Kebutuhan ini terpenuhi dengan pembinaan, yang mencakup perilaku “bisa melakukan”, pesan kesehatan, dan dukungan semangat. Hubungan yang baik dengan perawat, dan pemberian informasi yang tepat untuk setiap prosedur tindakan.

Kebutuhan sosial juga termasuk kebutuhan keluarga akan keuangan, penghormatan terhadap tradisi budaya.

d. Kebutuhan Kenyamanan Lingkungan

Termasuk ketertiban, ketenangan, perbotan yang nyaman, bau yang minimal, dan keamanan. Termasuk juga perhatian terhadap seting ruangan perawatan. Jika perawat tidak bisa maksimal dalam menyediakan lingkungan yang nyaman, maka perawat dapat melakukan hal dalam mengurangi kebisingan, pencahayaan, dan menjaga kenyamanan tidur.

2. Konsep Teori Nyeri

a. Definsi Nyeri

Menurut International Association for the Study of Pain (IASP) dalam buku “Classification of Chronic Pain, Second Edition (Revised)” tahun 2011, nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial, atau dijelaskan dalam hal kerusakan tersebut. Ketidak-mampuan untuk berkomunikasi secara verbal tidak meniadakan kemungkinan bahwa seseorang mengalami rasa sakit dan membutuhkan perawatan penghilang rasa sakit yang tepat. Nyeri merupakan pengalaman yang subjektif, samahalnya saat seseorang mencium bau harum atau busuk, mengecap manis atau asin, yang kesemuanya merupakan persepsi panca indera dan dirasakan manusia sejak lahir. Walau demikian, nyeri berbeda dengan stimulus panca indera, karena stimulus nyeri merupakan suatu hal yang

berasal dari kerusakan jaringan atau yang berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan. Meskipun nyeri adalah suatu sensasi, nyeri memiliki komponen kognitif dan emosional yang digambarkan dalam suatu bentuk penderitaan. Nyeri juga berkaitan dengan reflex menghindar dan perubahan output otonom (Bahrudin, 2017).

b. Fisiologi Nyeri

Mekanisme timbulnya nyeri didasari oleh proses multipel yaitu nosisepsi, sensitisasi perifer, perubahan fenotip, sensitisasi sentral, eksitabilitas ektopik, reorganisasi struktural, dan penurunan inhibisi. Antara stimulus cedera jaringan dan pengalaman subjektif nyeri terdapat empat proses tersendiri : transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi.

1) Transduksi

Transduksi adalah suatu proses dimana akhiran saraf aferen menerjemahkan stimulus (misalnya tusukan jarum) ke dalam impuls nosiseptif. Ada tiga tipe serabut saraf yang terlibat dalam proses ini, yaitu serabut A-beta, A-delta, dan C. Serabut yang berespon secara maksimal terhadap stimulasi non noksius dikelompokkan sebagai serabut penghantar nyeri, atau nosiseptor. Serabut ini adalah A-delta dan C. Silent nociceptor, juga terlibat dalam proses transduksi, merupakan serabut saraf aferen yang tidak berespon terhadap stimulasi eksternal tanpa adanya mediator inflamasi.

2) Transmisi

Transmisi adalah suatu proses dimana impuls disalurkan menuju kornu dorsalis medulla spinalis, kemudian sepanjang traktus sensorik menuju otak. Neuron aferen primer merupakan pengirim dan penerima aktif dari sinyal elektrik dan kimiawi. Aksonnya berakhir di kornu dorsalis medulla spinalis dan selanjutnya berhubungan dengan banyak neuron spinal.

3) Modulasi

Modulasi adalah proses amplifikasi sinyal neural terkait nyeri (pain related neural signals). Proses ini terutama terjadi di kornu dorsalis medulla spinalis, dan mungkin juga terjadi di level lainnya. Serangkaian reseptor opioid seperti mu, kappa, dan delta dapat ditemukan di kornu dorsalis. Sistem nosiseptif juga mempunyai jalur descending berasal dari korteks frontalis, hipotalamus, dan area otak lainnya ke otak tengah (midbrain) dan medulla oblongata, selanjutnya menuju medulla spinalis. Hasil dari proses inhibisi descending ini adalah penguatan, atau bahkan penghambatan (blok) sinyal nosiseptif di kornu dorsalis.

4) Persepsi nyeri

Persepsi nyeri adalah kesadaran akan pengalaman nyeri. Persepsi merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi, modulasi, aspek psikologis, dan karakteristik individu lainnya. Reseptor nyeri

adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsang nyeri. Organ tubuh yang berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung syaraf bebas dalam kulit yang berespon hanya terhadap stimulus kuat yang secara potensial merusak. Reseptor nyeri disebut juga Nociseptor. Secara anatomis, reseptor nyeri (nociseptor) ada yang bermielin dan ada juga yang tidak bermielin dari syaraf aferen. (Bahrudin, 2017).

c. Etiologi

1) Faktor resiko

Nyeri akut

- a) Melaporkan nyeri secara verbal dan non verbal
- b) Menunjukkan kerusakan
- c) Posisi untuk mengurangi nyeri
- d) Muka dengan ekspresi nyeri
- e) Respon otonom (penurunan tekanan darah, suhu, nadi)
- f) Tingkah laku ekspresif (gelisah, merintih, nafas panjang, mengeluh)

Nyeri kronis

- a) Perubahan berat badan
- b) Melaporkan secara verbal dan non verbal
- c) Menunjukkan gerakan melindungi, gelisah, depresi, focus pada diri sendiri
- d) Kelelahan

- e) Perubahan pola tidur
- f) Takut cedera
- g) Interaksi dengan orang lain menurun

2) Factor predisposisi

- a) Trauma
- b) Peradangan
- c) Trauma psikologis

3) Factor presipitasi

- a) Lingkungan
- b) Suhu ekstrim
- c) Kegiatan
- d) Emosi (Asmadi, 2012)

d. Mengkaji Intensitas

1) Verbal Descriptif Scale (VDS)


Skala deskriptif verbal (VDS) adalah garis yang terdiri tiga hingga lima kata deskripsi yang tersusun di sepanjang garis. Pendeskripsiannya dimulai dari “tidak nyeri” hingga ke “nyeri yang tidak tertahankan”. Perawat akan memberikan skala tersebut kepada pasien dan pasien akan memilih intensitas nyeri yang dirasakan (Potter & Perry, 2010).

2) Numerical Rating Scale (NRS)

Numerical rating scale (NRS) atau skala penilaian numerik.


Biasa digunakan untuk mengganti alat pendeskripsian kata, pasien akan di minta menilai nyeri dengan menggunakan skala 0-10 (Potter & Perry, 2010). Beberapa contoh alat pengukur nyeri :

a) Anak-anak




b) Dewasa

Skala intensitas nyeri deskriptif



Skala identitas nyeri numeric



e. Penatalaksanaan Nyeri

1) Penatalaksanaan Nyeri Nonfarmakologis

Manajemen nyeri nonfarmakologis merupakan tindakan menurunkan respons nyeri tanpa menggunakan agen farmakologi. Dalam melakukan intervensi keperawatan, manajemen nyeri nonfarmakologi merupakan tindakan independent dari seorang perawat dalam mengatasi respons nyeri klien. Manajemen nyeri nonfarmakologi sangat beragam. Andarmoyo (2017) dalam buku “Konsep dan Proses Keperawatan Nyeri” membahas beberapa mengenai tindakan-tindakan peredaan nyeri tersebut.

- a) Bimbingan Antisipasi
- b) Terapi Murottal
- c) Terapi Es dan Panas/Kompres Panas dan Dingin.
- d) Stimulasi Saraf Elektris Transkutan/TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)
- e) Distraksi
- f) Relaksasi
- g) Imajinasi Terbimbing
- h) Hipnosis
- i) Akupunktur
- j) Masase

2) Penatalaksanaan Nyeri Farmakologis

a) Analgesik non-narkotik dan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID)

NSAID Non-narkotik umumnya menghilangkan nyeri ringan dan nyeri sedang, seperti nyeri yang terkait dengan arthritis rheumatoid, prosedur pengobatan gigi, dan prosedur bedah minor, episiotomy, dan masalah pada punggung bagian bawah. Satu pengecualian, yaitu ketorolac (Toradol), merupakan agens pertama yang dapat diinjeksikan yang kemanjurannya dapat dibandingkan dengan morfin. Kebanyakan NSAID bekerja pada reseptor saraf perifer untuk mengurangi transmisi dan resepsi stimulus nyeri. Tidak seperti opiate, NSAID tidak menyebabkan sedasi atau depresi pernafasan juga tidak mengganggu fungsi berkemih atau defekasi (Andarmoyo, 2017).

Ketorolac, telah diakui oleh ahli bedah maupun anesthesiologi dapat dipergunakan untuk analgesic pasca bedah. Keaktifan ketorolac 30 mg intramuscular ekuivalen dengan 10 mg morfin atau 100 mg petidin. Efek analgesia dimulai 10 menit setelah penyuntikan dan berlangsung sampai 4-6 jam (Sugiyono, 2016)

b) Analgesik narkotik atau opiate

Analgesik narkotik atau opiate umumnya diresepkan dan digunakan untuk nyeri sedang sampai berat, seperti pasca operasi

dan nyeri maligna. Analgesik ini bekerja pada system saraf pusat untuk menghasilkan kombinasi efek mendepresi dan menstimulasi (Andarmoyo, 2017).

c) Obat tambahan (Adjuvan)

Adjuvan seperti sedative, anticemas, dan relaksasi otot meningkatkan kontrol nyeri atau menghilangkan gejala lain yang terkait dengan nyeri seperti mual dan muntah. Agen tersebut diberikan dalam bentuk tunggal atau disertai dengan analgesic. Sedatif sering kali diresepkan untuk penderita nyeri kronik. Obat-obatan ini dapat menimbulkan rasa kantuk dan kerusakan koordinasi, keputusan dan kewaspadaan mental (Andarmoyo, 2017).

3. Pengkajian Keperawatan

a. Identitas

1) Identitas pasien: Nama, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, suku/bangsa, agama, status perkawinan, tanggal masuk rumah sakit (MRS), nomor rekam medik dan diagnosa medis

2) Identitas penanggung jawab: Nama, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, serta status hubungan dengan pasien

b. Pengkajian Umum

1. Keluhan utama yang lazim didapatkan adalah nyeri, nyeri pada perut

sebelah kiri.

2. Pengkajian riwayat penyakit dahulu, perawat menanyakan faktor predisposisi yang berhubungan dengan laparatomi, seperti adanya kelurga yang mengalami laparatomi sebelumnya, riwayat peradangan pada usus, dan riwayat diet rendah serat.

3. Pada pengkajian psikososial akan didapatkan peningkatan kecemasan, serta perlunya pemenuhanin formasi, intervensi keperawatan, pengobatan, dan rencana pembedahan.

4. Pemeriksaan survei umum bisa terlihat sakit ringan, sampai gelisah akibat menahan sakit. TTV bisa normal atau bisa didapatkan perubahan, seperti takikardi, peningkatan pernapasan.

5. Perawatan luka biasa dilakukan untuk melihat adanya infeksi pada abdomen, kebersihan dan adanya perdarahan di sekitar luka abdomen.

c. Pengkajian Primer (Primary Survey)

1) Airway (Jalan napas) dengan control cervical

a) Kaji ada tidaknya sumbatan jalan napas

Sumbatan jalan napas total :

- Pasien sadar : memegang leher, gelisah, sianosis
- Pasien tidak sadar : tidak terdengar suara napas, mendengkur

Sumbatan jalan napas parsial :

- Tampak kesulitan bernapas

- Retraksi supra sterna
- Masih terdengar suara sursling, snoring, atau stridor

b) Distress pernapasan

c) Kemungkinan fraktur cervical

2) Breathing (Pernapasan)

a) Kaji frekuensi napas

b) Suara napas

c) Adanya udara keluar dari jalan napas

Cara pengkajian : look (lihat pergerakan dada, kedalaman, simetris atau tidak), listen (suara napas dengan atau tanpa stetoskop), feel (rasakan hembusan napas, atau dengan perkusi dan palpasi)

3) Circulation (Sirkulasi)

a) ada tidaknya denyut nadi karotis

b) Ada tidaknya tanda-tanda syok

c) Ada tidaknya perdarahan eksternal

4) Disability (Tingkat Kesadaran)

Tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan dari lingkungan, tingkat kesadaran dibedakan menjadi :

- a) Compos Mentis (conscious), yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya.
- b) Apatis, yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh
- c) Delirium, yaitu gelisah, disorientasi (orang, tempat, waktu), memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, kadang berhayal.
- d) Somnolen (Obtundasi, Letargi), yaitu kesadaran menurun, respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang (mudah dibangunkan) tetapi jatuh tertidur lagi, mampu memberi jawaban verbal.
- e) Stupor (soporo koma), yaitu keadaan seperti tertidur lelap, tetapi ada respon terhadap nyeri.
- f) Coma (comatose), yaitu tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun (tidak ada respon kornea maupun reflek muntah, mungkin juga tidak ada respon pupil terhadap cahaya).

Tingkat kesadaran ini bisa dijadikan salah satu bagian dari vital sign. GCS (Glasgow Coma Scale) yaitu skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien, (apakah pasien dalam kondisi koma atau tidak) dengan menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan.

Tabel 2.1 Tingkat Kesadaran Glasgow Coma Scale

Jenis Pemeriksaan	Nilai
Respon buka mata (Eye opening/E)	
1. Spontan	4
2. Terhadap suara	3
3. Terhadap nyeri	2
4. Tidak ada respon	1
Respon motorik terbaik (M)	
1. Ikut perintah	6
2. Melokalisir nyeri	5
3. Fleksi normal (Menarik anggota yang dirangsang)	4
4. Fleksi abnormal (Dekortikasi)	3
5. Ekstensi abnormal (Deserebsasi)	2
6. Tidak ada respon (Flasib)	1
Respon verbal	
1. Berorientasi baik	5
2. Berbicara mengacau (Bingung)	4
3. Kata-kata tidak teratur	3
4. Suara tidak jelas	2
5. Tidak ada respon	1

- 5) Exposure (control pada kasus trauma, dengan membuka pakaian pasien tetapi cegah hipotermi)

d. Pemeriksaan Head to Toe

1) Kepala

A. Rambut

Rambut klien bersih, rambut hitam, bentuk kepala simetris, tidak ada benjolan maupun lesi, tidak ada kelainan lain di kepala.

B. Mata

Bentuk kedua bola mata simetris, kelopak mata simetris, bulu mata ada, konjungtiva pucat, reflek pupil normal, terbukti saat memakai cahaya penlight didekatkan pupil mengecil dan saat cahaya dijauhkan pupil kembali membesar. Pergerakan bola mata pasien normal terbukti saat mata pasien saat mata pasien

mengikuti arah jari pemeriksa. Ketajaman penglihatan klien sudah rabun terbukti saat klien dianjurkan membaca klien tidak tepat membaca kalimat tersebut. Saat dilakukan palpasi tidak ditemukan kelainan.

C. Telinga

Kedua telinga simetris, telinga bersih tidak ada sekret/kotoran maupun perdarahan, tidak ada lesi maupun massa, tidak ada peradangan, pendengaran pasien terganggu, terbukti saat pemeriksa berbicara pelan/normal klien kurang mendengar dan harus diulangi dengan suara sedikit lebih keras.

D. Hidung

Bentuk tulang hidung simetris, tidak ada pembengkakan, terpasang selang NGT, tidak ada massa dan nyeri di daerah hidung, penciuman klien normal, terbukti saat klien dianjurkan mencium wewangian (parfum, kayu putih, sabun) dan klien menjawab dengan tepat.

E. Mulut, lidah, gigi bibir simetris, warna bibir hitam pucat, mulut terpasang selang ETT, bibir kering, tidak ada lesi, mulut tidak ada lesi, mulut kotor, gigi sudah tidak utuh, warna gigi kekuningan, ada karies, keadaan gigi kotor, tidak ada lesi di daerah gusi, tidak ada pembengkakan dan nyeri di daerah gusi. Bentuk lidah normal, warna lidah pucat, tidak ada kelainan di lidah. Saat dilakukan

palpasi di rongga mulut tidak ada pembengkakan maupun nyeri tekan. Indra perasa klien masih normal, terbukti saat pemeriksa memberikan perasa dan klien menjawab dengan tepat. Saraf kranial hipoglosal klien normal, terbukti saat klien dapat mengeluarkan dan menggerakkan lidah. Gerak otot rahang klien masih bekerja dengan baik.

2) Leher

Bentuk leher normal, tidak ada pembengkakan, tidak ada massa, reflek menelan klien baik, saraf kranial asesori klien baik, terbukti saat klien diminta untuk menengok ke kiri / kanan kemudian ditahan oleh pemeriksa.

3) Dada, Payudara, dan Ketiak

a. Terdapat luka sayatan di daerah dada, bentuk dada simetris, ekspansi dada seimbang, terbukti saat pemeriksa merasakan getaran dan keseimbangan di punggung klien saat klien bernafas. Traktil fremitus klien seimbang. Suara pernafasan tidak jelas karena klien terpasang ett, tidak ada suara tambahan, irama nafas klien teratur dan normal.

b. Tidak ada suara tambahan pada jantung, irama jantung teratur dan normal.

c. Tidak ada edema di daerah payudara, bentuk payudara simetris, tidak ada massa dan lesi, tidak ada keluaran di daerah puting.

d. Tidak ada edema, massa maupun lesi di daerah ketiak, tidak ada kelainan lain, tidak ada nyeri tekan.

4) Abdomen

- a) Bentuk perut datar, simetris, terdapat luka post operasi, terdapat nyeri tekan di daerah perut, terdapat selang drein, bising usus klien sulit dikaji, perut tidak kembung.
- b) Posisi umbilikal tidak normal, terdapat luka post operasi luka insisi pada umbilikal, keadaan umbilikal tidak bersih, terdapat benang jahit pada umbilikal.

5) Genitalia

- a). Genetalia terpasang kateter urine, bentuk simeris tidak ada varises, edema, tumor/ benjolan, infeksi, luka atau iritasi, pengeluaran cairan ditampung pada bak urinari.
- b). Pada pemeriksaan rektum normalnya tidak ada nyeri, tidak terdapat edema/hemoroid/polip tanda-tanda infeksi dan pendarahan tetapi pada dan pendarahan tetapi pada pasien dengan laparatomi di temukan pembesaran pembuluh darah balik (vena) pada anus, terdapat benjolan pada anus, nyeri pada anus.

6) Kulit dan Kuku

Warna kulit pucat, tidak ada lesi maupun edema, warna kuku pucat hampir berwarna berwarna putih, bentuk kuku normal, normal, kuku

tebal, tekstur kuku kotor, kelembapan kulit kurang, turgor kulit normal, pengisian kapiler / capillary refill lambat yaitu lebih dari 3 detik.

7) Ekstermitas

a) Atas

Bentuk kedua tangan simetris, tidak ada kelainan lain, reflek bisept dan trisept klien normal, terbukti saat dilakukan ketukan di lekukan sikut dan di sikut menggunakan reflek hammer adanya gerakan spontan di ujung ekstermitas. Tangan kanan klien terpasang infus, ingkat kekuatan otot atas otot klien 4 dari 5 (cukup kuat tetapi tidak dengan kekuatan penuh dan dapat menahan tahanan)

b) Bawah

Bentuk kedua kaki simetris, tidak ada kelainan lain, reflek patella normal terbukti saat dilakukan ketukan di lutut menggunakan reflek hammer adanya gerakan spontan di ujung ekstermitas. Reflek achilles normal terbukti saat dilakukan ketukan dipergelangan kaki dan kemudian adanya gerakan spontan pada kaki. Reflek plantar / babinski normal terbukti saat telapak kaki di sentuh klien merasa geli. Tingkat kekuatan otot kaki klien yaitu 5 dari 5 (kekuatan kontraksi penuh dan dapat menahan tahanan dengan baik).

e. Pengkajian Sekunder (Secondary Survey)

Survey sekunder merupakan pemeriksaan secara lengkap yang dilakukan secara head to toe, dari depan hingga belakang. Secondary survey hanya dilakukan setelah kondisi pasien mulai stabil, dalam artian tidak mengalami syok atau tanda-tanda syok telah mulai membaik.

Anamnesis juga harus meliputi riwayat AMPLE yang bisa didapat dari pasien dan keluarga (Emergency Nursing Association, 2007):

A: Alergi (adakah alergi pada pasien, seperti obat-obatan, plester, makanan)

M: Medikasi/obat-obatan (obat-obatan yang diminum seperti sedang menjalani pengobatan hipertensi, kencing manis, jantung, dosis, atau penyalahgunaan obat.

P : Pertinent medical history (riwayat medis pasien seperti penyakit yang pernah diderita, obatnya apa, berapa dosisnya, penggunaan obat-obatan herbal)

L : Last meal (obat atau makanan yang baru saja dikonsumsi, dikonsumsi berapajam sebelum kejadian, selain itu juga periode menstruasi termasuk dalam komponen ini)

E : Events, hal-hal yang bersangkutan dengan sebab cedera (kejadian yang menyebabkan adanya keluhan utama)

Akronim PQRST ini digunakan untuk mengkaji keluhan nyeri pada pasien yang meliputi :

- 1) Provokes/palliates : apa yang menyebabkan nyeri? Apa yang membuat nyerinya lebih baik? apa yang menyebabkan nyerinya lebih buruk? apa yang anda lakukan saat nyeri? apakah rasa nyeri itu membuat anda terbangun saat tidur?
- 2) Quality : bisakah anda menggambarkan rasa nyerinya?apakah seperti diiris, tajam, ditekan, ditusuk tusuk, rasa terbakar, kram, kolik, diremas? (biarkan pasien mengatakan dengan kata-katanya sendiri.
- 3) Radiates: apakah nyerinya menyebar? Menyebar kemana? Apakah nyeri terlokalisasi di satu titik atau bergerak?
- 4) Severity : seberapa parah nyerinya? Dari rentang skala 0-10 dengan 0 tidak ada nyeri dan 10 adalah nyeri hebat
- 5) Time : kapan nyeri itu timbul? Apakah onsetnya cepat atau lambat? Berapa lama nyeri itu timbul? Apakah terus menerus atau hilang timbul? Apakah pernah merasakan nyeri ini sebelumnya?apakah nyerinya sama dengan nyeri sebelumnya atau berbeda?

Setelah dilakukan anamnesis, maka langkah berikutnya adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda tanda vital meliputi suhu, nadi, frekuensi nafas, saturasi oksigen, tekanan darah, berat badan, dan skala nyeri.

3. Diagnosa Keperawatan

Adapun diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien dengan Laparatomi yaitu
(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017):

Pre Operasi

- a. Risiko Perdarahan
- b. Risiko Konstipasi
- c. Risiko Ketidakseimbangan Cairan

Post Operasi

- a. Ansietas
- b. Intoleransi Aktivitas
- c. Risiko Infeksi
- d. Nyeri Akut



- Anjurkan segera melapor jika terjadi perdarahan
- Kolaborasi
- Kolaborasi pemberian obat pengontrol perdarahan, jika perlu
 - Anjurkan pemberian produk darah, jika perlu
 - Anjurkan pemberian pelunak tinja, jika perlu



2). Risiko konstipasi

Diagnosa Keperawatan	Perencanaan Keperawatan					
	Tujuan & Kriteria Hasil					Intervensi
Risiko Perdarahan D.0012	Tingkat Perdarahan					Pencegahan Perdarahan Observasi: <ul style="list-style-type: none"> Monitor tanda dan gejala perdarahan Monitor nilai hemoglobin/hematokrit sebelum dan setelah kehilangan darah Monitor tanda-tanda vita ortostatik Monitor koagulasi Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> Batasi tindakan invasif, jika perlu Pertahankan bedrest selama perdarahan Gunakan kasur pencegah dekubitus Hindari pengukuran suhu rektal Edukasi <ul style="list-style-type: none"> Jelaskan tanda dan gejala perdarahan Anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi Anjurkan menghindari aspirin atau antikoagulan Anjurkan meningkatkan asupan makan dan vitamin K Anjurkan segera melapor jika terjadi perdarahan Kolaborasi <ul style="list-style-type: none"> Kolaborasi pemberian obat pengontrol perdarahan, jika perlu Anjurkan pemberian produk darah, jika perlu Anjurkan pemberian pelunak tinja, jika perlu
Pengertian :	Kriteria Hasil:					
Berisiko mengalami kehilangan darah baik internal (terjadi di dalam tubuh) maupun eksternal (terjadi hingga keluar tubuh)	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik	
	1	2	3	4	5	
	1	2	3	4	5	
	1	2	3	4	5	
	1	2	3	4	5	
	Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun	Menurun	
1	1	2	3	4	5	

3). Risiko ketidakseimbangan cairan

Diagnosa Keperawatan	Perencanaan Keperawatan					
	Tujuan & Kriteria Hasil					Intervensi
Risiko Perdarahan D.0012	Tingkat Perdarahan					Pencegahan Perdarahan Observasi: <ul style="list-style-type: none"> Monitor tanda dan gejala perdarahan Monitor nilai hemoglobin/hematokrit sebelum dan setelah kehilangan darah Monitor tanda-tanda vita ortostatik Monitor koagulasi Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> Batasi tindakan invasif, jika perlu Pertahankan bedrest selama perdarahan Gunakan kasur pencegah dekubitus Hindari pengukuran suhu rektal Edukasi <ul style="list-style-type: none"> Jelaskan tanda dan gejala perdarahan Anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi Anjurkan menghindari aspirin atau antikoagulan Anjurkan meningkatkan asupan makan dan vitamin K Anjurkan segera melapor jika terjadi perdarahan Kolaborasi <ul style="list-style-type: none"> Kolaborasi pemberian obat pengontrol perdarahan, jika perlu Anjurkan pemberian produk darah, jika perlu Anjurkan pemberian pelunak tinja, jika perlu
Pengertian :	Kriteria Hasil:					
Berisiko mengalami kehilangan darah baik internal (terjadi di dalam tubuh) maupun eksternal (terjadi hingga keluar tubuh)	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik	
	1	2	3	4	5	
	1	2	3	4	5	
	1	2	3	4	5	
	1	2	3	4	5	
	Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun	Menurun	
1	1	2	3	4	5	

4). Ansietas

Diagnosa Keperawatan	Perencanaan Keperawatan						
	Tujuan & Kriteria Hasil					Intervensi	
Ansietas	Tingkat Ansietas					Reduksi Ansietas Observasi: <ul style="list-style-type: none"> Identifikasi saat tingkat ansietas berubah Identifikasi kemampuan mengambil keputusan Monitor tanda-tanda ansietas Terapeutik: <ul style="list-style-type: none"> Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan Temani pasien untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan Pahami situasi yang membuat ansietas Dengarkan dengan penuh perhatian Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan Edukasi <ul style="list-style-type: none"> Jelaskan prosedur, termasuk sensasi yang mungkin dialami Informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis Anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan Latih teknik relaksasi 	
D.0080	Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan tingkat ansietas menurun						
Pengertian :	Kriteria Hasil:						
Kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman		Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Menurun		Menurun
	1	Konsentrasi					
		1	2	3	4		5
	2	Pola tidur					
		1	2	3	4		5
		Meningkat	Cukup Meningkatkan	Sedang	Cukup Menurun		Menurun
	3	Perilaku gelisah					
		1	2	3	4	5	
	4	Verbalisasi kebingungan					
		1	2	3	4	5	
	5	Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi					
		1	2	3	4	5	
6	Perilaku tegang						
	1	2	3	4	5		

B. Post operasi

1). Intoleransi aktivitas

Diagnosa Keperawatan		Perencanaan Keperawatan						
		Tujuan & Kriteria Hasil			Intervensi			
Intoleransi aktivitas	Toleransi Aktivitas						Manajemen Energi	
D.0056	Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan toleransi aktivitas meningkat.						Observasi:	
Pengertian :	Kriteria Hasil:						<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan Monitor pola dan jam tidur Monitor kelelahan fisik dan emosional 	
Ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari		Menurun	Cukup Menurun	Sedang	Cukup Meningkat	Meningkat	Edukasi	
	1	Kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari	1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> Anjurkan tirah baring Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap
	2	Kekuatan tubuh bagian atas dan bawah	1	2	3	4	5	Terapeutik:
			Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun	<ul style="list-style-type: none"> Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus Lakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan
	3	Keluhan lelah	1	2	3	4	5	Kolaborasi
	4	Dispnea saat aktivitas	1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan

2). Risiko infeksi

Diagnosa Keperawatan		Perencanaan Keperawatan																																														
Tujuan & Kriteria Hasil		Intervensi																																														
Risiko Infeksi	Tingkat Infeksi	Pencegahan infeksi																																														
D.0142	Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam glukosa derajat infeksi menurun.	Observasi:																																														
Pengertian :	Kriteria Hasil:	<ul style="list-style-type: none"> Monitor tanda gejala infeksi lokal dan sistemik 																																														
Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Meningkat</th> <th>Cukup Meningkat</th> <th>Sedang</th> <th>Cukup Menurun</th> <th>Menurun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Demam</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2 Kemerahan</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3 Nyeri</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>4 Bengkak</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Memburuk</td> <td>Cukup Memburuk</td> <td>Sedang</td> <td>Cukup Membaik</td> <td>Membaik</td> </tr> <tr> <td>5 Kadar sel darah putih</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun	1 Demam	1	2	3	4	5	2 Kemerahan	1	2	3	4	5	3 Nyeri	1	2	3	4	5	4 Bengkak	1	2	3	4	5		Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik	5 Kadar sel darah putih	1	2	3	4	5	Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> Batasi jumlah pengunjung Berikan perawatan kulit pada daerah edema Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi Edukasi <ul style="list-style-type: none"> Jelaskan tanda dan gejala infeksi Ajarkan cara memeriksa luka Anjurkan meningkatkan asupan cairan Kolaborasi <ul style="list-style-type: none"> Kolaborasi pemberian imunisasi, Jika perlu 				
	Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun																																											
1 Demam	1	2	3	4	5																																											
2 Kemerahan	1	2	3	4	5																																											
3 Nyeri	1	2	3	4	5																																											
4 Bengkak	1	2	3	4	5																																											
	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik																																											
5 Kadar sel darah putih	1	2	3	4	5																																											

3). Nyeri akut

Diagnosa Keperawatan		Perencanaan Keperawatan				
		Tujuan & Kriteria Hasil			Intervensi	
Nyeri Akut	Tingkat Nyeri	Manajemen Nyeri				
D.0077	Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun	Observasi:				
Pengertian :	Kriteria Hasil:	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Identifikasi skala nyeri Identifikasi respons nyeri non verbal Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup Monitor efek samping penggunaan analgetik 				
Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang dialami kurang dari 3 bulan.		Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik
	1	Frekuensi nadi				
		1	2	3	4	5
	2	Pola nafas				
		1	2	3	4	5
		Meningkat	Cukup Meningkatkan	Sedang	Cukup Menurun	Menurun
	3	Keluhan nyeri				
		1	2	3	4	5
	4	Meringis				
		1	2	3	4	5
	5	Gelisah				
		1	2	3	4	5
	6	Kesulitan tidur				
	1	2	3	4	5	
		Terapeutik: <ul style="list-style-type: none"> Berikan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi rasa nyeri Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri Fasilitasi istirahat dan tidur Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri 				
		Edukasi <ul style="list-style-type: none"> Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri Jelaskan strategi meredakan nyeri Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 				
		Kolaborasi <ul style="list-style-type: none"> Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu 				

5. Implementasi

Implementasi keperawatan ialah proses pelaksanaan dari rencana atau intervensi keperawatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditentukan sebelumnya. Tahapan ini dimulai setelah rencana intervensi disusun dan menjadi tujuan pada nursing order untuk membantu pasien dalam mencapai tujuan proses keperawatan yang diharapkan. Oleh sebab itu, implementasi sebagai manifestasi pelaksanaan intervensi yang spesifik, dilakukan untuk memodifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan (Nursalam, 2017).

6. Evaluasi

Evaluasi adalah fase kelima dan fase terakhir proses keperawatan. Dalam konteks ini, evaluasi adalah aktivitas yang direncanakan, berkelanjutan, dan terarah ketika pasien dan profesional kesehatan menentukan kemajuan pasien menuju pencapaian tujuan/hasil, dan keefektifan rencana asuhan keperawatan. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pencapaian tujuan pada rencana keperawatan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi variabel-variabel yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan, dan mengambil keputusan apakah rencana keperawatan diteruskan, modifikasi atau dihentikan.

Dokumentasi pada tahap evaluasi adalah membandingkan secara sistematis dan terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada pada pasien, dilakukan

dengan cara bersinambungan dengan melibatkan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan yang berguna apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lain (Nursalam, 2017).

C. Evidence based practice in nursing

Judul artikel: Pemberian Terapi Murottal Al-Qur'an terhadap Nyeri saat Perawatan Luka Post Laparatomi di ruang kutilang RS. Dr. H Abdul Moeloek Provinsi Lampung

Kata kunci: Nyeri, murottal al-qur'an, post laparatomi

Penulis: Marliyana

Publisher: Jurnal Kesehatan Panca Bhakti Lampung, Volume VI, No 2, Oktober 2018



1. Pengertian

Nyeri merupakan gejala sisa yang diakibatkan oleh operasi pada regio intra abdomen, sekitar 60% pasien menderita nyeri yang hebat, 25% nyeri sedang dan 15% nyeri ringan. Metode penatalaksanaan nyeri mencakup pendekatan farmakologis dan non farmakologis. Salah satu pendekatan non-farmakologis adalah distraksi. Distraksi mengalihkan perhatian pasien ke hal yang lain. dan dengan demikian menurunkan kewaspadaan terhadap nyeri bahkan meningkatkan toleransi terhadap Salah satu tehnik distraksi untuk pereda nyeri adalah terapi murotal Qur'an. Murrotal Qur'an adalah terapi bacaan Al Qur'an yang merupakan terapi religi dimana seseorang dibacakan ayat-ayat Al- Qur'an.

2. Tujuan

Tujuan dari pemberian murottal dapat memberikan efek penurunan nyeri seperti yang telah dijelaskan dalam teori Gate Control, dimana kesan yang muncul bahwa transmisi dari hal yang berpotensi sebagai impuls nyeri bisa dimodulasikan oleh “*cellular gating mechanism*” ditemukan di *spinal cord*. *Gate Control Theory* menyatakan bahwa sinyal nyeri yang ditransmisikan dari bagian yang mengalami cedera melalui reseptor-reseptor nervus di spinal, lalu sinaps-sinaps menyampaikan informasi ke otak.

3. Indikasi

1. pasien yang tidak memiliki gangguan pendengaran
2. pasien dalam kesadaran composmentis
3. pasien yang sedang menjalani perawatan luka
4. pasien dengan nyeri ringan hingga sedang (3-7)

4. Kontraindikasi

Kontraindikasi terapi murottal yaitu pasien non muslim

5. Prosedur pemberian

Prosedur perawatan yang dilakukan pemberian perawatan luka dan terapi murottal untuk menurunkan nyeri

1. Pre interaksi:

a. Siapkan alat dan bahan

- 1) Sarung tangan steril 1 pasang
- 2) Sarung tangan nonsteril 1 pasang
- 3) Pinset anatomis
- 4) Gunting hecting
- 5) Kasa steril secukupnya
- 6) Bak instrumen
- 7) Mangkok/kom kecil

- 8) Gunting balutan
- 9) Plaster
- 10) Nierbekken
- 11) Alcohol swab
- 12) Handphone yang berisi murottal Al-Qur'an

b. Identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontraindikasi.

2. Tahap orientasi

- a. Beri salam dan panggil pasien dengan namanya dan periksa gelang identitas pasien
- b. Perkenalan nama perawat yang menangani
- c. Jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada pasien dan keluarga

3. Tahap Kerja

- a. Berikan kesempatan klien/keluarga bertanya sebelum kegiatan dilakukan
- b. Menanyakan keluhan/kondisi klien
- c. Jaga privasi pasien. memulai kegiatan dengan cara yang baik
- d. Mendekatkan alat dan bahan
- e. Mencuci tangan
- f. Dekatkan handpone ke telinga pasien
- g. Pilih surah yang akan di perdengarkan ke klien
- h. Pastikan volume sesuai dan tidak terlalu keras

- i. Durasi terapi murottal 15-25 menit
- j. Sembari mendengarkan murottal, atur posisi klien saat proses perawatan luka dengan posisi terlentang (posisi Supinasi)
- k. Buka pembalut dan buang pada tempatnya serta kaji luka/jahitan yang ada
- l. Bila ada jahitan yang ingin dilepas maka lakukan menarik simpul jahitan keatas secara hati-hati menggunakan pinset anatomis.
- m. Bila ada drein maka lakukan, mengkaji banyaknya jumlah cairan pada botol penampung drein, membuang cairan dalam botol drain, mengolesi daerah drain dengan bethadin 2%, tutup drein dengan kasa dengan cara melingkari selang drein.
- n. Disinfeksi sekitar luka dengan alcohol swab dari arah dalam keluar
- o. Buanglah alcohol swab pada tempatnya
- p. Olesi luka dengan bethadin 2% lalu tutup luka dengan kasa steril
- q. Plester kembali luka dengan verban atau kasa
- r. Rapihkan pasien
- s. Bereskan alat-alat dan simpan pada tempatnya.

4. Terminasi

- a. Evaluasi hasil kegiatan (kenyamanan pasien)
- b. Simpulkan hasil kegiatan
- c. Berikan umpan balik positif
- d. Kontrak pertemuan selanjutnya
- e. Akhiri kegiatan dengan cara yang baik

f. Bereskan alat

g. Cuci tangan

5. Dokumentasi

a. Catat hasil kegiatan di dalam catatan keperawatan

1) Nama , Umur, Jenis Kelamin, dll

2) Keluhan Utama

3) Tindakan yang dilakukan perawatan luka dan terapi murottal

4) Lama tindakan

5) Jenis terapi murottal yang diberikan

6) Reaksi selama, setelah terapi pemberian perawatan luka dan terapi murottal

7) Respon pasien

8) Nama perawat

9) Tanggal pemeriksaan

6. Kriteria evaluasi

a. Intensitas nyeri berkurang

b. Meringis menurun

c. Gelisah berkurang

7. Artikel utama dan pendukung


1). Artikel utama: marliyana (2018) “pemberian terapi murottal al-qur’an terhadap nyeri saat perawatan luka post op laparatomi di ruang kutilang Rs.Dr.H. Abdul moelock provinsi lampung”

2). Artikel pendukung: suko pronowo, asditya kesuma darma, kasron (2021)“perbedaan efektifitas terapi murottal dengan kompres dingin terhadap respon nyeri pasien post operasi laparatomi di rumah sakit islam (RSI) fatimah cilacap”

3). Bhakti permana,nunung nurhayati,citra nurintan amelia,linlin lindayani (2021) *“the efectiveness of al-qur’an murottal therapy on reducing pain among post operative patient”*

4). El rahmayanti, raihan hardiansyah, nurhayati (2018) “pengaruh aromaterapi lemon terhadap penurunan skala nyeri pasien post operasi laparatomi”

5) Yorpina, ani syafriati (2020) “pengaruh terapi dzikir dalam menurunkan nyeri pada pasien post operasi”



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Kasus Study

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang mencakup pengkajian bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian dalam metode studi kasus ini dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh klien dengan cara sistematis (Nursalam, 2016).

Penelitian ini adalah penelitian untuk menganalisis masalah asuhan keperawatan pada pasien post laparotomi dengan masalah nyeri di Ruang ICU RSUP Wahidin Sudiro Husodo.

B. Subyek studi kasus

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini pasien EC Perforasi Gaster Post Laparotomi dan bersedia menjadi responden.

C. Fokus studi kasus

Asuhan Keperawatan Pasien EC Perforasi Gaster Post Laparotomi dengan Masalah Nyeri Menggunakan Intervensi dan Terapi Murottal Al-Qur'an.

D. Instrumen studi kasus

Instrumen studi kasus ini berupa format proses asuhan keperawatan, instrumen yang digunakan untuk menilai hasil dari intervensi yaitu Numerical Rating Scale (NRS) yaitu alat untuk menilai nyeri dengan menggunakan skala 0-10.

E. Prosedur pengambilan data

Prosedur penelitian berisi tentang uraian proses dalam melakukan studi kasus yang terdiri dari beberapa tahap antara lain:

1. Persiapan

- a. Mencari literatur-literatur terkait masalah apa yang sering di dapatkan di ruangan ICU
- b. Mencari solusi yang mampu meminimalisir komplikasi yang terjadi sesuai dengan masalah yang ditemukan
- c. Melakukan pengajuan judul studi kasus dan intervensi yang akan diberikan sesuai dengan masalah yang ditemukan.
- d. Mendapatkan persetujuan dari pembimbing untuk melakukan intervensi sesuai dengan masalah yang ditemukan

2. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data studi kasus ini yaitu melakukan screening pasien yang memiliki masalah kesehatan yang perlu ditangani di ruangan tempat pengambilan data dan terdapat tiga tahapan saat mengumpulkan data yaitu: data dikumpulkan dari hasil WOD (wawancara, observasi,

dokumen), data yang dikumpulkan terkait dengan data pengkajian, diagnosis, perencanaan, tindakan, implementasi dan evaluasi.

3. Penyusunan Laporan

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah yang telah ditetapkan sebagai pedoman.

F. Tempat dan waktu pengambilan data studi kasus

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan diruang ICU RSUP Wahidin Sudiro Husodo

2. Waktu Pengambilan Data Kasus

Pembuatan karya tulis ilmiah ini dimulai pada bulan maret 2021 sampai bulan juli 2021, penelitian dimulai tanggal 7-10 maret 2021 pada pasien post laparatomi dengan masalah nyeri

G. Analisis data dan penyajian data

Analisis data dilakukan sejak peneliti sedang melakukan praktik klinik di RSUP Wahidi Sudiro Husodo, analisa data ini dilakukan dengan mengemukakan fakta yang selanjutnya akan menjadi perbandingan dengan teori yang sudah ada lalu disimpulkan dalam bentuk pendapat serta pembahasan. Teknik analisa data dilakukan dengan cara menarasikan seluruh jawaban-jawaban yang diperoleh dari wawancara untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian. Data yang telah dikumpulkan terkait dengan data pengkajian, diagnosis, perencanaan, tindakan/ implementasi dan evaluasi.

Penyajian data dilakukan dengan menggunakan tabel, gambar, bagan maupun teks bersifat naratif. Selanjutnya data dibahas dan dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya dan secara teoritis dengan perilaku kesehatan. Kerahasiaan dari responden akan dijamin dengan cara menggunakan inisial identitas dari responden tersebut.

H. Etika studi kasus

Etika menggambarkan aspek-aspek etik yang dipergunakan menjadi pertimbangan dalam memberikan asuhan keperawatan bagi pasien sampai dengan proses dokumentasi yang dilakukan. Etika penelitian adalah suatu bentuk sopan santun, tata susila dan budi pekerti dalam pelaksanaan penelitian. Etika penelitian merupakan hal penting karena menggunakan subjek manusia. Pada penelitian keperawatan hampir 90% subjek yang dipergunakan adalah manusia (Nursalam, 2016). Beberapa prinsip etika yang dipergunakan dalam pemberian asuhan keperawatan adalah voluntary (keiklasan), dan confidentially (kerahasiaan), anonymity, informed consent.

1. Keiklasan (voluntary)

Klien mempunyai hak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi subjek atau tidak, peneliti tidak berhak memaksa untuk menjadi subjek penelitian yang bertentangan dengan keinginannya (Nursalam, 2016).

2. Kerahasiaan (confidentially)

Peneliti harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan subjek, menggunakan informasi tersebut hanya untuk kegiatan penelitian. Peneliti harus meyakinkan subjek penelitian bahwa semua hasil tidak akan

dihubungkan dengan mereka serta informasi yang telah diberikan, tidak akan dipergunakan dalam hal-hal yang dapat merugikan subjek (Nursalam, 2016).

3. Anonymity

Klien mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan harus dirahasiakan, untuk itu perlu adanya tanpa nama, data cukup dengan menggunakan inisial atau kode sehingga karakteristik pribadi menjadi tidak dikenali (Nursalam, 2016).

4. Informed consent

Klien harus mendapatkan informasi secara lengkap tentang tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Pada informed consent juga dicantumkan bahwa data yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu (Nursalam, 2016)

ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB IV

LAPORAN KASUS

A. Pengkajian keperawatan

Identitas Klien



Nama inisial klien : Tn. M
Umur : 45 Tahun
Alamat : Arallae Kec, Kahu Kab, Bone
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Tanggal masuk RS : 28 Februari 2022
Nomor Rekam Medis : 968842

Diagnosa Medis : Perforasi Gaster

Pengkajian Umum

1. Keluhan utama klien masuk ICU : Nyeri Abdomen Post Laparatomi
2. Riwayat Penyakit Sekarang : Keluarga pasien mengatakan pasien masuk RS dengan keluhan nyeri pada perut sejak 1 minggu yang lalu, awalnya pasien sulit BAB. Pasien mengeluh nyeri pada bagian perut, saat itu keluarga membawa klien di rs sinjai untuk pemeriksaan lebih lanjut dan didapatkan hasil klinis abdominal pain ec susp peritonitis, didapatkan didalam abdomen klien terlihat

61

bayangan udara bebassubdiagrafma sesuai gambar pneumo peritonium, sehingga hasil tersebut klien dirujuk ke rsup wahidin

untuk pemeriksaan lebih akurat dan perawatan lebih baik, nyeri dirasakan seperti tertusuk-usuk dengan skala nyeri 7 hilang timbul.

Pengkajian Nyeri:

P (Problem) : Pasien mengatakan nyeri pada bagian abdomen bekas operasi

Q (Quality) : Pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk


R (Region) : Nyeri pada bagian abdomen

S (Skala) : Skala nyeri 7 NRS






T (Time) : Nyeri timbul terus

3. Riwayat Penyakit Dahulu : Tidak ada
4. Apakah klien pernah dirawat di Rumah Sakit : Keluarga pasien mengatakan bahwa sebelumnya pasien pernah dirawat di rumah sakit sinjai sebelum dirujuk ke RSUP Wahidin Sudiro Husodo
5. Riwayat Sosial :
 - a. Apakah klien merokok : Ya
 - b. Apakah klien mengkonsumsi analgetik : Tidak
6. Riwayat Penyakit Keluarga : Tidak ada

Genogram



Keterangan:

-  : laki-laki
-  : Perempuan
-  : Garis Pernikahan
-  : Garis keturunan
-  : Klien
- ? : Tidak diketahui
- x : Meninggal
- : Garis serumah

GI : Generasi pertama adalah kakek dan nenek pasien sudah meninggal dengan penyakit yang tidak di ketahui

GII : Generasi kedua adalah pasien yang merupakan anak ke-2 dari 5 bersaudara dan tidak ada keluarga yang memiliki penyakit yang sama dengan pasien

GIII : Generasi ketiga adalah anak keturunan dari pasangan Tn. M

7. Tanda-tanda vital

- a. Tekanan darah : 145/90 mmHg
- b. Suhu : 36°C
- c. Nadi : 90x/i
- d. Pernapasan : 26x/i
- e. SpO2 : 98%

Pemeriksaan Fisik Khusus

1. Airway

- a. Bebas : Ya
- b. Sumbatan (benda asing, sputum, darah, lendir) : Sputum
- c. Suara nafas : Tidak ada
- d. Kejang : Tidak

Masalah Keperawatan: Tidak terdapat masalah keperawatan

2. Breathing

- a. Spontan : Ya
- b. Takipnea (Nafas cepat) : Tidak Ada
- c. Wheezing (mengi) : Tidak Ada
- d. Apnea(henti nafas sementara) : Tidak Ada
- e. Dispnea (susah nafas) : Tidak ada
- f. Lain-lain : Tidak ada

Masalah Keperawatan: Tidak ada masalah keperawatan

3. Circulation

- a. Nadi : Teraba kuat
- b. Irama : Reguler
- c. Frekuensi : 90x/i
- d. Kulit : Tidak pucat
- e. Sianosis : Tidak
- f. Turgor : Elastis
- g. CRT : 2x/detik

Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan

4. Disability

- a. GCS : 15 (E4V6M5)
- b. Kesadaran : composmentis
- c. Pupil : isokor 2,5 mm/ 2,5 mm (normal)

a. Reflek cahaya : (+/+)

a. Kekuatan otot : lemah

Masalah Keperawatan: tidak ada masalah keperawatan

5. Exposure

- a. Deformitas : Tidak ada
- b. Contusio : Tidak ada
- c. Abrasi : Tidak ada
- d. Penetrasi : tidak ada
- e. Laserasi : Tidak ada
- f. Edema : Tidak ada

g. Masalah keprawatan : Tidak ada masalah keprawatan

Pemeriksaan Fisik Umum (Kepala dan Leher)

1. Bagian kepala atas

- a. Hematom/post trauma : tidak ada
- b. Tipe rambut : Gelombang
- c. Warna rambut : Hitam
- d. Distribusi rambut : Normal
- e. Alopesia/Kebotakan : Tidak ada

2. Mata

- a. Pupil isokor (diameter kedua pupil sama) : 2,5/2,5 mm
- b. Sklera ikterik (kekuningan) : tidak
- c. Conjunctiva anemis (pucat) : Ya (+/+)

1. Telinga

- a. Cerumen : Tidak ada
- b. Terpasang alat bantu dengar : Tidak

2. Hidung

- a. Nafas cuping hidung : Tidak
- b. Pilek : Tidak
- c. Terpasang alat bantu nafas: Tidak

3. Bibir dan Mulut

- a. Sianosis : Tidak
- b. Sariawan : Tidak
- c. Gigi palsu : Tidak

d. Mukosa bibir : Lembab

e. Gangguan gigi dan gusi : Tidak

4. Leher

a. Pembesaran kelenjar tiroid (gondok) : Tidak

b. Limfonodi (kelenjar limfe) : Teraba

c. Nadi karotis : Teraba

Pemeriksaan Fisik Umum (Thoraks)

1. Inspeksi : Bentuk dada simetris antara kiri dan kanan, tidak ada kelainan bentuk, pergerakan pernapasan normal

2. Auskultasi : Vesikuler

3. Perkusi : Sonor

4. Palpasi : Ekspansi dada simetris, tidak ada nyeri tekan

Pemeriksaan Fisik Umum (Abdomen)

Inspeksi : Simetris antara kiri dan kanan, warna kulit coklat, terdapat luka post operasi, nampak warna kemerahan, nampak terpasang verban, pasien nampak meringis kesakitan dan gelisah

1. Auskultasi : Peristaltik usus 16x/i

2. Perkusi : Tidak ada penumpukan cairan, tidak ada massa/tumor

3. Palpasi : Tidak ada massa, tidak ada pembesaran hepar/hernia

Pemeriksaan Fisik Umum (Genetalia)

Inspeksi : Terpasang kateter urine

Pemeriksaan Fisik Umum (Ekstrimitas)

1. Superior (atas):

- a. Edema : tidak
 - b. Infus
 - a) Terpasang : Di lengan dextra dan sinistra
 - b) Jenis infus : Ringer laktat 5%
 - c) Faktor tetesan : 20 tetes/menit
 - d) Nyeri di area tusukan infus : tidak
 - c. Nadi radialis (pergelangan tangan): 86x/menit
 - d. CRT (capillary refill time) < 3 detik : Ya
 - e. Deformitas (kelainan bentuk) : tidak
 - f. Fraktur : tidak
2. Inferior (bawah):
- a. Edema : tidak
 - b. Deformitas (kelainan bentuk) : tidak
 - c. Fraktur : tidak

Pengkajian Nutrisi

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Februari 2022

1. A (Antropometri)

BB : 60 Kg

TB : 165 cm

IMT 22

2. B (Biochemical)

HGB : 15,6 g/dl dengan nilai rujukan : 14,0-17,5 g/dl

3. C (Clinical)

Rambut : Hitam

Turgor kulit : Elastis

Mukosa bibir : Kering terdapat lendir yang menempel dibibir

Conjungtiva : Anemis

4. D (Diet)

Tidak ada program diet

5. E (Energy)

Keluarga pasien mengatakan aktivitas pasien terbatas, selama di rawat aktivitas pasien dibantu oleh anaknya, pasien nampak lemah

6. F (Factor)

Pasien dirawat di rumah sakit karena telah dilakukan operasi laparatomi dan membutuhkan pemantauan dan perawat

Obat-obatan


Nama obat	Dosis	Rute
Fentanyl	30mg/8 jam	Intravena
Asam tranexamat	500mg/12 jam	Intravena
Ceftriaxone	2 gr/24 jam	Intravena
Metronidazole	500mg/8 jam	Intravena
Arawalium	10 mg/12 jam	Intravena
Norepinefrin	1mg/12 jam	Intravena
Hidrokortison	100mg/8 jam	Intravena
Combivent	1mg/8 jam	Intravena
Clopidogrel	300mg/12 jam	Intravena
Arixtra	2,5mg/8 jam	Intravena

Pemeriksaan Penunjang

09/03/2022

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
Darah Rutin			


WBC	13.8	(4,11-11,30)	10 ³ /uL
RBC	3,42	(4,50-5,90)	10 ⁶ /uL
HGB	11,1	(14,0-17,5)	g/dL
HCT	35	(80,0-96,4)	%
MCV	101	(27,5-33,2)	fL
MCH	32	(33,4-33,5)	Pg
MCHC	32	(4,50-5,90)	g/dL
PLT	292	(172-450)	10 ³ /uL
RDW-SD	12.6	(37,0-54,0)	fL
RDW-CV	16.5	(11,6-14,6)	%
PDW	9,0	(9,0-17,0)	fL
MPV	8,9	(9,0-13,0)	fL
P-CLR	0,26	(13,0-43,0)	%
PCT	87.2	(0,17-0,35)	%
NEUT	6.3	(1,80-7,70)	10 ³ /uL
LYMPH	5.4	(1,00-4,80)	10 ³ /uL
MONO	1,08	(0,00-0,80)	10 ³ /uL
EO	0,07	(0,00-0,60)	10 ³ /uL
BASO	0,04	(0,00-0,20)	10 ³ /uL
IG	0,02	(0,00-7,00)	10 ³ /uL
Kimia Darah			
Ureum	43	7-23	Iu/dL
Kreatinin	0,40	L: 0,7-1,1, P : 0,6-0,9	mg/dL
GDS		<200	mg/dL
Immunologi			
HbsAg	Reaktif	Non reaktif	





Analisa data

Data Subjektif	Data Objektif
<p>1. Pasien mengeluh nyeri bekas operasi</p> <p>2. Pasien mengatakan nyeri pada abdomen bekas operasi</p> <p>3. Pengkajian PQRST</p> <p>P : pasien megatakan neri pada bagian abdomen bekas operasi</p> <p>Q : pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk</p> <p>R : nyeri pada bagian abdomen</p> <p>S : skala nyeri 7</p> <p>T : nyeri timbul terus</p> <p>4. Pasien mengatakan aktivitasnya terbatas, segeala aktivitas dibantu</p> <p>5. Keluarga pasien mengatakan aktivitas pasien selama di RS dibantu oleh anaknya, misalnya apabila pasien ingin mengganti pakaian dan perawatan diri pasien</p> <p>6. Pasien mengatakan dirinya lemah</p> <p>7. Pasien mengatakan jika dia ingin bergerak takut alat yang terpasang ditubuhnya lepas</p>	<p>1. Pasien nampak meringis kesakitan</p> <p>2. Pasien nampak gelisah</p> <p>3. Nampak luka bekas operasi pada abdomen</p> <p>4. Nampak berwarna kemerahan</p> <p>5. Nampak terpasang verban dan drein pada abdomen</p> <p>6. Aktivitas sehari-hari nampak dibantu perawat dan keluarga</p> <p>7. Pasiennampak lemah</p> <p>8. Kekuatan otot : 4,4,4,4</p> <p>9. Tanda-tanda vital TD : 145/90 mmHg S: 36°C N: 90x/i P: 26x/1 SpO2 : 98%</p> <p>10. Terpasang NGT</p> <p>11. Terpasang kateter urin7e4</p> <p>12. Terpasang drainase</p>

No	Data	Etiologi	Masalah keperawatan
1.	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengeluh nyeri bekas operasi - Pasien mengatakan nyeri pada bagian abdomen bekas operasi, pengkajian PQRST P : pasien megatakan nyeri pada bagian abdomen bekas operasi Q : pasien mengatakan nyeri seperti Tertusuk tusuk R : nyeri pada bagian abdomen S : skala nyeri 7 T : nyeri timbul terus <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien nampak meringis kesakitan - Pasien nampak gelisah 	<p>Perforasi gaster</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Trauma perut</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Laparatomi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Insisi jaringan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Terputusnya inkontinuitas jaringan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Perdarahan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Nyeri akut</p> 	Nyeri akut

2.	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan aktivitasnya terbatas, segala aktivitas dibantu - Keluarga pasien mengatakan aktivitas pasien selama di RS dibantu oleh anaknya, misalnya apabila pasien ingin mengganti pakaian dan perawatan diri pasien. <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aktivitas sehari-hari nampak dibantu perawat dan keluarga - Pasiennampak lemah - Kekuatan otot : 4,4,4,4 - Terpasang NGT - Terpasang kateter urine - Terpasang drainase 	<p>Perforasi gaster</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Trauma perut</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Laparotomi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Terputusnya inkontinuitas jaringan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Perdarahan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Luka infasif post pembedahan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kelemahan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Manajemen energi</p>	Intoleransi aktifitas
----	--	---	-----------------------



<p>3.</p>	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan nyeri pada abdomen bekas operasi <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nampak luka bekas operasi pada abdomen - Nampak berwarna kemerahan - Nampak terpasang verban dan drein pada abdomen 	<p>Perforasi gaster</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Trauma perut</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Laparotomi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Insisi jaringan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Terputusnya inkontinuitas jaringan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Perdarahan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Luka infasif post pembedahan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Resiko infeksi</p>	<p>Resiko infeksi</p>
-----------	--	---	-----------------------

B. Diagnosis keperawatan

- a. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik
- b. Intoleransi aktivitas
- c. Resiko infeksi

C. Intervensi keperawatan

A. Intervensi Keperawatan



No.	Diagnosa Keperawatan	Luaran Keperawatan	Intervensi	Rasional
1.	Nyeri Akut D.0077	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan nyeri pasien berkurang dengan kriteria hasil : 1. Keluhan nyeri menurun 2. Meringis menurun	Manajemen Nyeri (I.08238) <u>Observasi:</u> <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri- Identifikasi skala nyeri- Identifikasi faktor yang memperberat dan	Manajemen Nyeri <u>Observasi:</u> <ul style="list-style-type: none">- Mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri dari pasien- Mengetahui tingkat nyeri yang

			<p>memperingan nyeri</p> <p><u>Terapeutik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an) - Kontrol lingkungan yang memperberat nyeri - Fasilitasi istirahat dan tidur <p><u>Edukasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan penyebab dan periode dan pemicu nyeri - Anjurkan monitor nyeri secara mandiri - Ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p><u>Kolaborasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu 	<p>dirasakan pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui hal-hal yang dapat memperberat ataupun memperingan nyeri yang dirasakan pasien <p><u>Terapeutik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi tingkat nyeri pasien/mengalihkan pasien dari rasa nyerinya - Mengurangi resiko faktor yang dapat memperberat nyeri/menimbulkan nyeri - Mengalihkan dan memenuhi kebutuhan istirahat pasien <p><u>Edukasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi terkait nyeri yang dirasakan pasien - Pasien dapat mengetahui sendiri karakteristik, penyebab, lokasi saat nyeri muncul - Memudahkan pasien untuk mengontrol nyeri dengan cara sederhana
--	--	--	--	--

				<u>Kolaborasi</u> - Mengurangi/menghilangkan rasa nyeri
2.	Intoleransi aktivitas D.0056	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan toleransi aktivitas pasien meningkat dengan kriteria hasil : 1. Kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat 2. Kekuatan tubuh bagian atas dan bawah meningkat 3. Keluhan lelah menurun	Manajemen Energi Observasi: - Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan - Monitor pola dan jam tidur - Monitor kelelahan fisik dan emosional Edukasi - Anjurkan tirah baring - Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap Terapeutik: - Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus - Lakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif - Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan - Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak	Manajemen energi Observasi: - Mengetahui fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan - Mengetahui jam tidur pasien baik pagi hingga malam hari - Mengetahui tingkat kelelahan fisik dan emosional pasien Edukasi: - Memberikan informasi ke pasien untuk selalu tirah baring ketika nyerinya muncul - Pasien mampu melakukan rentang gerak pasif dan aktif secara bertahap. Terapeutik

			<p>dapat berpindah atau berjalan</p> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan 	<ul style="list-style-type: none"> -Untuk membantu ketenangan pasien dalam proses perawatan serta pola tidur yang teratur serta istirahat yang cukup -Pasien mampu menggerakkan lengan dan kakinya secara bertahap -Pasien diberikan terapi murottal untuk mengingat kepada sang pencipta dan mengalihkan fokus nyeri yang dirasakan -Pasien belum mampu duduk di sisi tempat tidur <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Agar asupan nutrisi dan gizi pasien selalu baik dalam proses perawatan.
3.	Resiko infeksi D.0142	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan tingkat infeksi pasien menurun dengan kriteria hasil : 1. Kemerahan menurun	<p>Pencegahan infeksi</p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tanda gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batasi jumlah pengunjung - Berikan perawatan kulit pada daerah edema 	<p>Pencegahan infeksi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mengetahui gejala infeksi lokal dan sistemik pada luka pasien <p>Terapeutik</p>

		<p>2. Nyeri menurun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien - Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan tanda dan gejala infeksi - Ajarkan cara memeriksa luka - Anjurkan meningkatkan asupan cairan <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian imunisasi, Jika perlu 	<ul style="list-style-type: none"> -Mengurangi resiko infeksi serta bakteri yang dibawa oleh pengunjung -Mengurangi terjadinya infeksi pada luka dan munculnya luka baru pada pasien. -Untuk mengurangi penumpukan bakteri yang berada pada tangan perawat. -Mengurangi resiko yang mungkin terjadi pada pasien. <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Memberikan informasi terkait tanda dan gejala infeksi yang mungkin muncul -Agar pasien mengetahui sendiri, lokasi, karakter, dan dampak pada lukanya. -Memberikan informasi pentingnya menjaga asupan nutrisi <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Membantu menjaga daya tahan tubuh.
--	--	-------------------------	--	--

D. Implementasi keperawatan

B. Implementasi Keperawatan

No .	Diagnosis Keperawatan	Hari, Tgl/jam	Implementasi	Nama Jelas
1.	<p>Nyeri Akut berhubungan dengan agen pencedera fisik</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengeluh nyeri bekas operasi - Pasien mengatakan nyeri pada bagian abdomen bekas operasi - Pengkajian PQRST <p>P : pasien megatakan nyeri pada bagian abdomen bekas operasi</p> <p>Q : pasien mengatakan nyeri seperti tertusuktusuk</p> <p>R : nyeri pada bagian anus</p> <p>S : skala nyeri 7</p>	<p>Rabu, 09 Februari 2021</p> <p>10: 30 WITA</p>	<p>Manajemen Nyeri</p> <p><u>Observasi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri <p>Hasil:</p> <p>P : Pasien mengatakan nyeri pada luka post operasi bagian abdomen</p> <p>Q : nyeri seperti tertusuk-tusuk</p> <p>R : nyeri pada bagian anus</p> <p>S : 7 (Berat)</p> <p>T : nyeri timbul terus</p> <p>Mengidentifikasi skala nyeri</p> <p>Hasil: Skala nyeri : 7 (Berat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri <p>Hasil: Pasien mengatakan mendengarkan murottal Al-Qur'an ketika nyerinya datang</p>	Muh Fadli


			<p>mengontrol, memonitor nyeri sendiri</p> <p><u>Kolaborasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian analgesic <p>Hasil: Di berikan Obat Dextofen 1 amp /IV/8 jam</p>	
2.	<p>Nyeri Akut berhubungan dengan agen pencedera fisik</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengeluh nyeri bekas operasi - Pasien mengatakan nyeri pada bagian abdomen bekas operasi - Pengkajian PQRST <p>P : pasien megatakan nyeri pada bagian abdomen bekas operasi</p> <p>Q : pasien mengatakan nyeri seperti tertusuktusuk</p> <p>R : nyeri pada bagian anus</p>	<p>Kamis, 09 September 2021</p> <p>14:45 WITA</p>	<p>Manajemen Nyeri</p> <p><u>Observasi:</u></p> <p>Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri</p> <p>Hasil:</p> <p>P : Pasien mengatakan nyeri pada luka post operasi bagian anus</p> <p>Q : nyeri seperti tertusuk-tusuk</p> <p>R : nyeri pada bagian anus</p> <p>S : 4 (sedang)</p> <p>T : nyeri timbul terus</p> <p>Mengidentifikasi skala nyeri</p> <p>Hasil: Pasien mengatakan skala nyeri : 4 (sedang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri <p>Hasil: Pasien mengatakan mendengarkan murottal</p>	Muh Fadli

	<p>S : skala nyeri 7 T : nyeri timbul terus</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien nampak meringis kesakitan - Pasien nampak gelisah 	<p>15:30WITA</p> <p>16:45 WITA</p>	<p>ketika nyeri muncul</p> <p><u>Terapeutik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (perawatan luka, kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an) <p>Hasil: Pasien dilakukan perawatan luka, dan diberikan kompres dingin, evaluasi: pasien mengatakan merasa lebih nyaman dan jadi lebih tenang, nyeri sedikit berkurang setelah di kompres, skala nyeri: 3 (ringan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi istirahat dan tidur <p>Hasil: Pasien sambil beristirahat dan mendengarkan murottal</p> <p><u>Edukasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan penyebab dan periode dan pemicu nyeri <p>Hasil: Pasien mengerti tentang nyeri yang dirasakan dan apa yang telah di jelaskan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajarkan teknik non farmakologis untuk mengruangi rasa nyeri <p>Hasil: Telah di adukasi keluarga terkait kompres dingin dan edukasi terkait aplikasi SINC untuk terapi murottal</p>	<p>Muh Fadli</p> <p>Muh Fadli</p>
--	---	------------------------------------	---	-----------------------------------

	<p>- Terpasang drainase</p>	<p>10: 40 WITA</p> <p>11:15 WITA</p>	<p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan tirah baring <p>Hasil: pasien dalam kondisi berbaring</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap <p>Hasil: Pasien mulai berani menggerakkan tangan dan kakinya untuk melatih kekuatan otot dan kakinya.</p> <p>Terapeutik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus <p>Hasil: Kondisi lingkungan saat ini tenang, dan keluarga pasien dibatasi dan dilarang untuk sering mengunjungi klien, kecuali dibutuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif <p>Hasil: klien mampu menggerakkan kaki dan lengannya secara bertahap.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan <p>Hasil: Pasien diberikan terapi murottal al-quran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan <p>Hasil: Pasien mampu secara bertahap duduk di tempat</p>	<p>Muh Fadli</p>
--	-----------------------------	--------------------------------------	---	------------------

		14:00 WITA	<p>tidur namun harus selalu dalam pemantauan perawat.</p> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan <p>Hasil: pola makan pasien teratur dan menu makanannya selalu bervariasi sesuai dengan kebutuhan gizi pasien</p>	
4.	<p>Intoleransi aktivitas</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan aktivitasnya terbatas, segeala aktivitas dibantu - Keluarga pasien mengatakan aktivitas pasien selama di RS dibantu oleh anaknya, misalnya apabila pasien ingin mengganti pakaian dan perawatan diri pasien. <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aktivitas sehari-hari nampak dibantu perawat dan keluarga - Pasiennampak lemah - Kekuatan otot : 4,4,4,4 	<p>Kamis, 09 September 2021</p> <p>14:45 WITA</p>	<p>Manajemen Energi</p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan <p>Hasil: Pasien mengetahui tubuhnya telah dilakukan operasi pada bagian abdomen. Yang membuat dia nyeri serta lemah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pola dan jam tidur <p>Hasil: Pasien tidur malam saat jam -- 22.00 dan Siang jam 12.00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor kelelahan fisik dan emosional <p>Hasil: Pasien mengatakan saat tidur malam jika nyeri</p>	Muh Fadli

	<ul style="list-style-type: none"> - Terpasang NGT - Terpasang kateter urine - Terpasang drainase 	<p>15:30WITA</p> <p>16:45 WITA</p>	<p>pada perutnya muncul dia terbangun, dan saat tidur siang ketika mendengarkan suara bisings pasien lain atau keluarga pasien dia terbangun.</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan tirah baring <p>Hasil: pasien dalam kondisi berbaring</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap <p>Hasil: Pasien mulai berani menggerakkan tangan dan kakinya untuk melatih kekuatan otot dan kakinya</p> <p>Terapeutik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus <p>Hasil: Kondisi lingkungan saat ini tenang, dan keluarga pasien dibatasi dan dilarang untuk sering mengunjungi klien, kecuali dibutuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif <p>Hasil: klien mampu menggerakkan kaki dan lengannya secara bertahap.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan <p>Hasil: pasien diberikan terapi murottal al-quran</p>	<p>Muh Fadli</p> <p>Muh Fadli</p>
--	--	------------------------------------	---	-----------------------------------

		<p>10: 40 WITA</p> 	<p>Hasil: Pengunjung tidak dapat masuk di icu jika tidak dibutuhkan dan dipanggil langsung oleh tenaga kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan perawatan kulit pada daerah edema <p>Hasil: Kaki dan lengan pasien dalam kondisi baik dan normal, serta tidak terjadi edema</p> <p>Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</p> <p>Hasil: Selalu dilaksanaklan kebersihan diri sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi <p>Hasil: Diruangan diterapkan tehnik aseptik agar proses pemulihan pasien dapat segera teratasi.</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan tanda dan gejala infeksi <p>Hasil: Pasien tiap hari dilakukan personal higine, cairan dan alat terutama suction tiap 2 hari sekali diganti, dan perawatan luka tiap pagi dilakukan.</p>	<p>Muh Fadli</p>
--	--	--	--	------------------

		<p>11:15 WITA</p> <p>14:00 WITA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ajarkan cara memeriksa luka <p>Hasil: Pasien belum berani melihat secara langsung kondisi lukanya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan meningkatkan asupan cairan <p>Hasil: Pasien diberikan cairan pengganti makanan yang isinya sama dengan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan pada pasien.</p> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian imunisasi, Jika perlu <p>Hasil: tidak dilakukan.</p>	
6.	<p>Resiko infeksi</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan nyeri pada abdomen bekas operasi <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nampak luka bekas operasi pada abdomen - Nampak berwarna kemerahan 	<p>Kamis, 09 September 2021</p> <p>14:45 WITA</p>	<p>Pencegahan infeksi</p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tanda gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Hasil: Perawat mendampingi pasien setiap saat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Serta setiap pagi, siang, sore, dan malam dilakukan pemantauan kondisi pasien dan tiap pagi dilakukan perawatan luka serta oral haigin.</p> <p>Terapeutik</p>	Muh Fadli

		16:45 WITA	<p>diganti, dan perawatan luka tiap pagi dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajarkan cara memeriksa luka <p>Hasil: Pasien belum berani melihat secara langsung kondisi lukanya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan meningkatkan asupan cairan <p>Hasil: Pasien diberikan cairan pengganti makanan yang isinya sama dengan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan pada pasien.</p>	
		20 :10 WITA	<p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian imunisasi, Jika perlu <p>Hasil: tidak dilakukan.</p>	



E. Evaluasi keperawatan

No	Diagnosis	Hari, Tgl./ Jam	Evaluasi	Nama Jelas
1	Nyeri Akut berhubungan dengan agen pencedera fisik	Rabu 09 Februari 2021 13.00 WITA	<p><u>Subjektif:</u></p> <p>P : Pasien mengatakan nyeri pada luka post operasi bagian abdomen</p> <p>Q : nyeri seperti tertusuk-tusuk</p> <p>R : nyeri pada bagian abdomen</p> <p>S : 4 (sedang)</p> <p>T : nyeri timbul terus</p> <p><u>Objektif:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tampak masih meringis 2. Kesadaran: Composmentis 3. TTV <p>TD : 145/90 mmHg</p> <p>S: 36°C</p> <p>N: 86x/i</p> <p>P: 18x/i</p> <p>SpO2 : 98%</p>	Muh Fadli

			<p>4. Skala nyeri : 4</p> <p><u>Assesment:</u> Masalah nyeri akut belum teratsi</p> <p><u>Planning:</u> Lanjutkan Intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor skala nyeri 2. Berikan kompres dingin dan terapi murottal 3. Obsevasi KU TTV pasien/ jam 4. Tindakan kolaborasi analgesic dextofen 1amp/IV/8 jam 	
2	Nyeri Akut berhubungan dengan agen pencedera fisik	<p>Kamis,</p> <p>09 September 2021</p> <p>Jam 18.20 WITA</p>	<p><u>Subjektif:</u></p> <p>P : Pasien mengatakan nyeri pada luka post operasi bagian abdomen</p> <p>Q : nyeri seperti tertusuk-tusuk</p> <p>R : nyeri pada bagian abdomen</p> <p>S : 3 (ringan)</p> <p>T : nyeri hilang timbul</p> <p><u>Objektif:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran: Composmentis 2. TTV <p>TD : 120/80 mmHg</p> <p>S: 36,2°C</p>	Muh Fadli

			<p>N: 80x/i</p> <p>P: 20x/i</p> <p>SpO2 : 98%</p> <p>3. Skala nyeri : 3 (ringan)</p> <p><u>Assesment:</u> Masalah nyeri akut mulai teratasi</p> <p><u>Planning:</u> Lanjutkan Intervensi</p> <p>1. Monitor skala nyeri</p> <p>2. Berikan kompres hangat</p> <p>3. Obsevasi KU TTV pasien/ jam</p> <p>4. Tindakan kolaborasi analgesik dextofen 1 amp/IV/8 jam</p>	
3.	Intoleransi aktivitas	Rabu 09 Februari 2021 13.15 WITA	<p>Subjektif</p> <p>1. Pasien mengatakan selang infus, kateter, dan alat ekg yang terpadang dibadannya mengganggu untuk bergerak</p> <p>2. Pasien mengatakan dirinya selalu haus, dan ingin minum melalui mulutnya.</p> <p>Objektif</p> <p>1. kesadaran (composmentis)</p> <p>2. TTV</p>	Muh Fadli

			<p>TD: 111/62</p> <p>S: 36,2°C</p> <p>N: 85x/i</p> <p>P:20x/i</p> <p>SpO2: 98%</p> <p>3. Pasien mampu menggerakkan lengan dan kakinya namun terganggu dengan alat-alat medis yang terpasang di tubuhnya</p> <p><u>Assesment:</u> Masalah intoleransi aktivitas belum teratasi</p> <p><u>Planning:</u> Lanjutkan Intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor toleransi aktivitas pasien, kemampuan pasien. 2. Berikan kompres hangat 3. Obsevasi KU TTV pasien/ jam 4. Tindakan kolaborasi dengan pihak gizi 	
4.	Intoleransi aktivitas	<p>Kamis,</p> <p>09 September 2021</p> <p>Jam 18.30 WITA</p>	<p>Subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengatakan selang ettnya sudah di cabut. <p>Pasien mampu sedikit demi sedikit menggerakkan badannya, seperti mika-miki dan duduk dikasur namun posisi semi fowler.</p>	Muh Fadli

			<p>Objektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kesadaran (composmentis) 2. TTV <ul style="list-style-type: none"> TD: 106/60 S: 36,2°C N: 85x/i P:20x/i SpO2: 98% 4. Pasien mampu menggerakkan lengan dan kakinya namun dan duduk di bed dalam posisi semi fowler <p><u>Assesment:</u> Masalah intoleransi aktivitas mulai teratasi</p> <p><u>Planning:</u> Lanjutkan Intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor skala kemampuan rentan kegak pasien 2. Berikan kompres hangat. 3. Obsevasi KU TTV pasien/ jam 	
5.	Resiko infeksi	Rabu, 08 September 2021	<p>Subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengeluh nyeri pada perutnya 2. Pasien mengeluh saat di suction rasanya ingin muntah 3. Psien mengatakan selama diberikan makanan melalui 	Muh Fadli

		Jam 08.20 WITA	<p>NGT belum pernah diganti selangnya.</p> <p>Objektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien nampak nyeri saat dilakukan perawatan luka 2. Pasien nampak meringis saat buka verban pada abdomen dan saat dibersihkan lendir sekitar selang drain. <p><u>Assesment:</u> Masalah risiko infeksi belum teratasi</p> <p><u>Planning:</u> Lanjutkan Intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor kondisi pasien dan lanjutkan perawatan luka pasien. 2. Berikan terapi muottal saat melakukan perawatan luka pada pasien untuk mengalihkan fokus nyeri. 3. Obsevasi KU TTV pasien/ jam pada monitor pasien 	
6.	Resiko infeksi	<p>Rabu,</p> <p>08 September 2021</p> <p>Jam 08.30 WITA</p>	<p>Subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengeluh nyeri pada perutnya 2. asien mengeluh saat di suction rasanya ingin muntah 3. Psien mengatakan selama diberikan makanan melalui NGT belum pernah diganti selangnya. <p>Objektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien nampak nyeri saat dilakukan perawatan luka 2. Pasien nampak meringis saat buka verban pada abdomen 	Muh Fadli

			<p>dan saat dibersihkan lendir sekitar selang drein.</p> <p><u>Assesment:</u> Masalah risiko infeksi mulai teratasi</p> <p><u>Planning:</u> Lanjutkan Intervensi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Monitor keadaan pasien dan lanjutkan perawatan luka pasien2. Berikan terapi murottal saat melakukan perawatan luka pada pasien untuk mengalihkan fokus nyeri.3. Obsevasi KU TTV pasien/ jam	
--	--	--	---	--

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Asuhan Keperawatan

Pasien laki-laki dengan inisial Tn. M berusia 45 tahun, masuk RS dengan keluhan nyeri pada perut, akan tetapi nyeri dirasakan +- 1 minggu sakitnya tak kunjung hilang, nyeri dirasakan seperti tertusuk-tusuk dengan skala nyeri 7, nyeri dirasakan hilang timbul. Keluarga pasien mengatakan bahwa sebelumnya pasien pernah dirawat di rumah sakit sinjai dengan hasil pemeriksaan klinis, dengan masalah abdominal pain ec susp peritonitis Pasien merupakan perokok aktif, dan peminum minuman keras dalam jangka panjang (-+ 10 tahun yang lalu). sehingga klien dirujuk dari rs sinjai ke rsup wahidin sudiro husodo untuk pemeriksaan lebih akurat dan perawatan lebih baik.

Keluhan utama yang disampaikan pasien adalah nyeri pada daerah luka post operasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Utami & Ganik Sakitri (2020), menyatakan bahwa nyeri post operasi disebabkan oleh adanya stimulus mekanik akibat kerusakan jaringan dari prosedur pembedahan yaitu luka (insisi), sehingga akan merangsang mediator-mediator zat kimia dari nyeri. Post operasi membuat kulit terbuka dan terluka sehingga menstimulus impuls nyeri ke saraf sensoris dan teraktivasi di transmisikan ke kornus posterior di korda spinalis. Saraf aferen akan menyampaikan persepsi nyeri ke otak.

B. Analisis intervensi EBPN

Intervensi utama yang telah peneliti berikan untuk mengatasi nyeri pada pasien psot laparatomi untuk mengatasi masalah nyerinya yaitu terapi perawatan luka kompres dingin dan terapi murottal (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). Kompres dingin merupakan suatu prosedur menempatkan suatu benda dingin pada tubuh bagian luar. Dampak fisiologisnya adalah vasokonstriksi pada pembuluh darah, mengurangi rasa nyeri, dan menurunkan aktifitas ujung saraf pada otot. Penggunaan kompres dingin terbukti dapat menghilangkan nyeri, terapi dingin menimbulkan efek analgetik dengan memperlambat kecepatan hantaran saraf sehingga impuls nyeri yang mencapai otak lebih sedikit (Tri Utami & Ganik Sakitri, 2020). Penelitian lain yang sejalan dilakukan oleh Rohmani (2018) mengatakan bahwa kompres dingin dapat menurunkan transmisi nyeri melalui serabut A-delta dan serabut C yang berdiameter kecil serta mengaktifasi transmisi serabut saraf A-beta yang lebih cepat dan besar.

Pada penelitian (Suwardi & Rahayu, 2019) mengatakan salah satu teknik relaksasi yang dapat menurunkan ketegangan fisiologis sehingga dapat menurunkan nyeri yaitu terapi murottal, berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan terapi murottal menunjukkan hasil bahwa tingkat nyeri mengalami penurunan yang drastis dari nyeri berat ke nyeri ringan. Hal tersebut dikarenakan terapi murottal memberikan nilai spiritual yang membuat

jiwa menjadi tenang dengan mengeluarkan tetesan air mata serta rileks yang begitu dalam dan seakan merasakan ada energi baru pada tubuhnya. Selain itu surat ar-rahman juga memiliki karakter ayat yang pendek serta terdapat beberapa pengulangan ayat sehingga surat ini bisa mudah dipahami. Hal tersebut didukung oleh pendapat Rahayu, Hidayati & Imam (2018). menyatakan bahwa setelah diberikan terapi murottal tingkat depresi sedang turun menjadi tingkat depresi ringan. Selain itu hasil penelitian Faradisi & Aktifah (2018) tentang pengaruh pemberian terapi murottal terhadap penurunan kecemasan post operasi didapatkan hasil secara statistic dengan $p = 0,004$ artinya adanya pengaruh pemberian terapi murottal terhadap penurunan kecemasan post operasi (Suwardi & Rahayu, 2019).

Suara pada murottal dapat menurunkan kadar hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon endorphin alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasat akut, cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernapasan, detak jantung dan aktivitas gelombang otak. Keadaan rileks tersebut mampu mendistraksi nyeri sehingga nyeri yang dirasakan berkurang (Siswantinah, 2011; Mulyani et al., 2019).

Keterikatan dan keterkaitan intervensi evidence based practice nursing dengan Murottal Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an memiliki berbagai faedah

termasuk bagi kesehatan Manfaat mendengarkan Murottal yaitu membuat perasaan rileks, memberikan perubahan fisiologis, terapi murottal secara teratur adalah obat nomor satu dalam menyembuhkan berbagai penyakit, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-isra:82

وَوَدَّعَيْنَا لَآءِ يَوْمِئِذٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ أَزْوَاجًا مُّشَابِهَةً
 لِّأَزْوَاجِهِمْ يَتَزَوَّجُوكُم بِأَهْلِكُمْ وَلَهُنَّ فِيهَا مَنَازِلٌ مُّشَابِهَةٌ
 لِّمَنَازِلِهِمْ فِيهَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ فِي مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ

Terjemahnya :

Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi obat (penawar) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian (QS. Al-Isra 17 : 82).

Tafsir QS. Surat Al-Isra (17): 82 Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Dan kami turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai nabi Muhammad, sebagai obat penawar berbagai macam penyakit hati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman yang mengamalkan tuntunannya, sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian disebabkan oleh kekufuran mereka. Setiap kali mendengar bacaan alqur'an semakin bertambah kekufurannya. Dan apabila kami berikan kenikmatan kepada manusia, seperti kesehatan atau kekayaan niscaya dia berpaling tidak bersyukur kepada Allah dan menjauhkan diri dari mengingat Allah dengan

sombong; dan apabila dia ditimpa kesusahan, seperti sakit atau kemiskinan



niscaya dia berputus asa kehilangan harapan dari rahmat Allah(Kementerian Agama RI, 2019).

Terapi murottal ini menggunakan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlash, surah an-nas, ayat kursi, surah Ar-Rahman, surah Yasin ayat 58 dan surah Al-An'am ayat 1-3 dan 13 dalam surah ini dapat mengaktifkan energi ilaiyah dan dapat merangsang sistem endokrin serta dipercaya sebagai ayat yang dapat mengusir segala penyakit dan rasa sakit yang diderita (Sulistiyawati & Widodo, 2020).

Salah satu surah dalam Al Al Qur'an yang berfungsi sebagai obat dan dapat digunakan sebagai terapi Murottal adalah surah Ar-Rahman Surat Ar Rahman terdiri atas 78 ayat, semua ayatnya mempunyai karakter ayat pendek sehingga nyaman didengarkan dan dapat menimbulkan efek relaksasi bagi pendengar yang masih awam sekalipun, bentuk gaya bahasanya yaitu terdapat 31 ayat yang diulang-ulang (Salim, 2014). Terapi murottal surah Ar-Rahman akan merdu jika pembacanya tartil (sesuai dengan pembacaan Al-Qur'an yang benar), surah Ar Rahman juga memiliki banyak ayat yang dibaca berulang-ulang sehingga mampu memberikan penekanan/penegasan alunan suara bagi pendengarnya (Gunawan, 2017). Terapi lantunan Murottal Al-Qur'an yang dibacakan kepada orang yang sakit selain bacaan yang diulang-ulang beberapa kali hingga datanglah kesembuhan atas izin Allah Swt. Ketahuilah bahwa Al-

Qur'an adalah penyembuh untuk setiap penyakit dan Allah SWT membuat ayat-ayat dalam Al -Qur'an dengan bahasa yang menakjubkan yang bisa dipahami (Ridaryani, 2020).

Selain pemberian perawatan luka kompres dingin dan terapi murottal, klien dan keluarga juga di edukasi terkait aplikasi SINC yang lengkap berisi doa, dzikir dan lantunan ayat suci al-quran yang dapat pasien gunakan jika ingin melakukan terapi murottal secara mandiri, juga dapat menerapkannya sendiri ketika pulang di rumah (Risnah et al., 2021).

C. Keterbatasan

- 1) Saat melakukan implementasi terapi murottal pada pasien peneliti tidak menggunakan headset/earphone sehingga saat implementasi kemungkinan pasien lebih khidmat mendengarkan murottal menggunakan headset/earphone dibandingkan yang tidak menggunakan headset/earphone.
- 2) Jumlah sampel yang digunakan hanya 1 sampel

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemberian intervensi pada pasien post Laparatomi dengan dengan masalah nyeri akut mulai teratasi dengan teknik non farmakologi yaitu pemberian intervensi perawatan luka dengan dan terapi murottal Al-Qur'an selama 2 hari, maka masalah yang terjadi dapat teratasi dengan hasil:

1. Keluhan nyeri menurun di tandai dengan:

- a. Hari Pertama : pada tanggal 09 Maret 2022 jam 08.20 WITA didapatkan hasil pasien mengatakan nyeri agak berkurang setelah dilakukan perawatan luka dan merasa lebih rileks dan nyaman setelah mendengarkan murottal, skala nyeri berkurang dari skala 7 nyeri berat menjadi skala 4 nyeri sedang, tampak meringis menurun.
- b. Hari kedua : tanggal 10 Maret 2022 jam 09.20 WITA, dapatkan hasil: pasien mengatakan nyeri pada perut luka post operasi sudah berkurang setelah diberikan perawatan luka dan pasien merasa lebih nyaman dan tenang setelah mendengarkan terapi murottal, nyeri berkurang dari skala nyeri 4 berkurang menjadi nyeri skala 3 yaitu nyeri ringan, tampak meringis menurun

2. Terjadi perubahan status hemodinamik setiap setelah diberikan intervensi yaitu tekanan darah sebelum dilakukan intervensi perawatan luka dan terapi murottal yaitu 145/90 mmHg, nadi: 90x/i, hari pertama dilakukan implementasi didapatkan hasil tekanan darah 1180/62 mmHg, nadi 86x/i, dan hari ke 2 implementasi di dapatkan hasil tekanan darah 112/69mmHg dan nadi 82x/i.
3. Terdapat perbedaan tingkat nyeri yang di rasakan oleh pasien setelah diberikan intervensi perawatan luka dengan kombinasi terapi murottal Al-Qur'an selama 2 hari dari skala nyeri 7 menjadi skala nyeri 3 yaitu skala nyeri ringan.
4. Intervensi perawatan luka dan terapi murottal Al-Qur'an efektif dalam menurunkan nyeri pada pasien ec perforasi gaster post operasi laparatomi.
5. Pemberian intervensi ini sekaligus dapat mengatasi beberapa masalah keperawatan yang ada yaitu nyeri akut, gangguan pola tidur, dan ansietas yang di sebabkan oleh nyeri yang dirasakan pasien. Dapat simpulkan tindakan implementasi yang dilakukan berhasil memperbaiki keadaan pasien dan mengatasi masalah yang pada pasien

B. SARAN

1. Bagi Profesi Keperawatan

Penulisan karya akhir ini bisa dijadikan bahan referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dalam pemberian terapi non farmakologi khususnya pada pasien nyeri post laparotomi

2. Bagi Pelayanan Rumah Sakit

Penulisan karya akhir dapat menjadi bahan masukan dibidang keperawatan serta memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien post laparotomi dengan masalah nyeri dan melihat keefektifan pemberian perawatan luka dengan terapi murottal Al-Qur'an dalam mengatasi nyeri

3. Bagi Institusi Pendidikan

Penulisan karya akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan serta dapat memberikan informasi sehingga menambah pengetahuan bagi pembaca tentang pemberian terapi nonfarmakologis perawatan luka dan terapi murottal Al-Qur'an terhadap penurunan tingkat nyeri pasien post laparotomi.

BIODATA



Muh. Fadli Rajab Minhadj nama penulis Karya Tulis Akhir ini ,penulis lahir dari pasangan Bapak H. Abd Rajab Minhadj dan Ibu Hj. Saenab S.Pd yang merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Penulis dilahirkan di sebuah kota kecil tepatnya di Kab. Jeneponto pada 01 November 1999. Penulis beralamat di Tanrusampe Barat, Kel. Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, provinsi Sulawesi Selatan. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di SDN 23 Pattontongan namun sekarang berubah menjadi SDN 5 Jeneponto, dan melanjutkan sekolah ke SMP 7 Binamu namun sekarang berubah menjadi SMP 7 Jeneponto dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMA 1 Jeneponto. Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan Pendidikan Strata (S1) Keperawatan yang alhamdulillah mendapat gelar sarjana strata satu. Tahun ini dengan usaha dan do'a Insy Allah mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Ners. Berkat doa dari kedua orang tua dan saudara serta kaka ipar saya dan dukungan dari dosen pembimbing 1&2 serta penguji saya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, W., & Saputri, D . (2020). *Efektifitas Hand Massage Terhadap Skala Nyeri Pada Pasien Post Operasi Laparatomi di RS. DR. Reksodiwiryo Padang*. Jurnal Kesehatan MIDWINERSLION
- Afdaleli, W. F. (2017). *Pengaruh Kompres Hangat Aromaterapi Lavender terhadap Penurunan Skala Nyeri Pasien Rematik (Osteoarthritis) pada Lansia Di Panti Kasih Sayang Ibu Batusangkar Tahun 2016*. Jurnal Kesehatan Stikes Prima Nusantara Bukittinggi, Vol. 8 No 1, 69-74.
- Agritubella, S. M. 2018. *Kenyamanan Dan Kepuasan Pasien Dalam Proses Interaksi Pelayanan Keperawatan Di Rsud Petala Bumi*. Jurnal Endurance, 3(1), p. 42.
- Andarmoyo, S. 2017. *Konsep dan Proses Keperawatan Nyeri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bahrudin, Mochamad ;. (2017). *Patofisiologi Nyeri (PAIN)*. e-Journal UMM. XIII(1), 7-13.
- Dorland, W.A. Newman. *Kamus Kedokteran Dorland. ed.31*. Jakarta. EGC; 2010.
- Geraldina, A. M. (2017). *Terapi Musik : Bebas Budaya atau Terikat Budaya*. *Buletin Psikologi*, 25(1), 45-53.
<https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.27193>
- Haryati. 2018. *Pengaruh Aromaterapi Lemon Terhadap Penurunan Skala Nyeri Pasien Post Operasi Laparatomi*. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
- Kartawijaya, Y. 2017. *Hubungan antara Karakteristik Demografi dengan Pengetahuan Mobilisasi Dini pada Pasien Post Operasi Laparatomi di RS PKU Muhammadiyah Bantul*. <https://anzdoc.com/bab-i-pendahuluan-perubahan-fisiologis-tubuh-dan-mempengaruhi.html> (Diakses pada Februari 2018).
- Purwandari, Atik., Iyam Manueke, dan Ririn Anggraini. 2014. *Studi Kasus Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny. D.N Dengan Persalinan Bedah Caesar Di Puskesmas Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado*. Jurnal Ilmiah Bidan. Vol.2 No. 1. J

- Potter, Perry. (2010). *Fundamental Of Nursing: Consep, Proses and Practice*. Edisi 7. Vol. 3. Jakarta : EGC
- Pronowo S, Dkk. 2021. *Perbedaan Efektivitas Terapi Murotal Dengan Kompres Terhadap respon Nyeri Pasien Post Operasi Laparatomi Di Rumah Sakit Islam (RSI) Fatimah Cilacap*. Universitas Al- Irsyad Cilacap.
- Risnah, & Irwan, M. (2021). *Falsafah Dan Teori Keperawatan Dalam Integrasi Keilmuan*. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17880/1/Buku_Falsafah Dan Teori Keperawatan Dalam Integrasi Keilmuan.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17880/1/Buku_Falsafah%20Dan%20Teori%20Keperawatan%20Dalam%20Integrasi%20Keilmuan.pdf)
- Stiqomah, Zainul Hidayat, and Ainun Jariah. “*Analisis Pengaruh Kepercayaan, Iklan Dan Persepsi Resiko Terhadap Keputusan Pembelian Di Situs Shopee Di Kota Lumajang.*” *Transformation of Accounting & Business in Era Revolution Industri 2*, no. 1 (2019): 558.
- Sjamsuhidajat, R. & Wim de Jong, 2005. *Buku Ajar Ilmu Bedah*. Jakarta : EGC
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan r&d*. Bandung, Alfabeta.
- (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018; Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018)



Lampiran I





RSUP DR. P. W. HASAN SAHIB
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

MR. 24/R/IC/2023

Nama: MARSURI
 Tgl. Lahir: 07/01/1983

LAPORAN OPERASI

Tempat: ...

Nama Operator: ...
 Nama Ahli Anestesi: ...

Jenis Anestesi: ...
 Golongan Operasi: Mayor / Eksplorasi

Diagnosis Pra Bedah: PERITONITIS GENERALISATA BC PERFORASI HOLLOW VISCUS
 Diagnosis Pasca Bedah: PERITONITIS GENERALISATA BC PERFORASI GASTER

Indikasi Operasi: Life Saving
 Nama Operasi: Laparotomi Eksplorasi + Omental Patch Perforasi Gaster

Jaringan yang diekisi: Tidak ada
 Pemeriksaan PA: Ya

Menggunakan Implant: Tidak
 Jenis Implant: Tidak ada

Nomor Seri Implant: Tidak ada

Tanggal Operasi	Jam Operasi Mulai	Jam Operasi Selesai	Durasi Operasi
2022-03-01	14:00:00	15:30:00	01:30

Komplikasi Operasi: Tidak ada
 Jumlah Pendarahan: 100 cc
 Transfusi: Tidak ada

Perawatan Pasca Operasi: ICU

Laporan Operasi:
 - Pasien berbaring supine di bawah pengaruh anestesi umum
 - Disinfeksi dan drapping lapangan operasi (abdomen)
 - Insisi midline 1 jari di bawah processus xiphoideus hingga 1 jari di bawah umbilicus, perdalam hingga peritoneum
 - Buka peritoneum, terlihat udaran dan tampak cairan ascites kekuningan kurang lebih 300cc, tampak perforasi omentum di area gaster, bebaskan peritoneotomi.
 - Identifikasi daerah antrum gaster, lampik perforasi gaster dengan ukuran 3x1 cm, dorong NGT sampai tip mencapai antrum sebagai feeding dan dipasang NGT dengan tip di gaster sebagai dekompresi
 - Dilakukan eksplorasi tidak didapatkan perforasi dibagian lain, tidak ada nodul pada hepar.
 - Cuci rongga abdomen dengan NaCl 0,9% berulang-ulang hingga kean bersih
 - Jahit luka operasi lapis demi lapis dengan meninggalkan dua buah drain pada cavum Retzii dan subhepatal
 - Operasi selesai

Makassar, 01-03-2022 16:12:02
 Tanda Tangan Operator:
 Dr. dr. Warsinggih, Sp.B-KRD
 Bagian / SMF : OK IGD / Bedah Digestif