

**HUBUNGAN STATUS GIZI IBU HAMIL BERDASARKAN LILA
DENGAN KEJADIAN BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)
DI KABUPATEN MAROS PERIODE JANUARI-DESEMBER TAHUN
2019**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kedokteran Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

MUHAMMAD ZULFIKAR

NIM: 70600117007

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zulfikar
NIM : 70600117007
Tempat/Tgl Lahir : Maros, 9 Maret 1999
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumnas Tumalia Blok E 89, Kabupaten Maros
Judul : Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LILA Dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember Tahun 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Maros, 9 Februari 2021

Penyusun



Muh. Zulfikar
NIM:70600117007

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI


JUDUL : HUBUNGAN STATUS GIZI IBU HAMIL BERDASARKAN LILA
DENGAN KEJADIAN BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI
KABUPATEN MAROS PERIODE JANUARI-DESEMBER TAHUN 2019

TELAH DISETUJUI OLEH PEMBIMBING UNTUK DIAJUKAN DALAM
SEMINAR HASIL KARYA TULIS ILMIAH (KTI) MAHASISWA
KEDOKTERAN

MAROS, 9 FEBRUARI 2021

PEMBIMBING 1

PEMBIMBING 2



dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes



dr. Utami Murti Pratiwi, M. Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LILA Dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember Tahun 2019**”, yang disusun oleh Muhammad Zulfikar, NIM 70600117007, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 17 Februari 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 26 Februari 2021
14 Rajab 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes (.....)

Sekretaris : dr. Rini Fitriani, M.Kes (.....)


Pembimbing I : dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes (.....)

Pembimbing II: dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes (.....)

Penguji I : dr. Raully Rahmadahni, M.Kes (.....)

Penguji II : Dr. Fatmawaty Hilal, M.Ag (.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan limpahan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga skripsi dengan judul, **"Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LILA Dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember Tahun 2019"** dapat terselesaikan. Salam serta shalawat tiada henti dicurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan dunia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini.


Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak hanya semata-mata dari usaha penulis sendiri. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Orangtuaku yang tercinta, sebagai penyemangat dan sumber inspirasi terbesarku **ayahanda (Alm) DRS. Mukramin, ibunda DRA. Arika, saudara-saudara saya** atas cinta kasih, doa restu, bimbingan, dukungan, serta motivasi yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.

Demikian juga penulis ucapkan terima kasih yang tulus, rasa hormat, dan penghargaan yang tak terhingga, kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof.Hamdan Juhannis M.A, Ph.D beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr.dr.Syatirah Jalaluddin Sp.A, M.Kes.
3. dr.Darmawansyih, M.Kes selaku Ketua Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. dr. Dewi Setiawati Sp.OG, M.Kes selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan, arahan dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.

5. dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes selaku pembimbing II dan juga sebagai penasehat akademik yang telah memberikan masukan, arahan dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
6. dr. Raully Rahmadahni, M.Kes selaku penguji I yang telah memberikan masukan, arahan dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. Fatmawaty Hilal, M.Ag selaku penguji II yang telah memberikan masukan, arahan dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada para sejawat Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
9. Kepada seluruh ibu bidan dan staff di puskesmas dan poskesdes di Kabupaten Maros, yang telah sabar dan tulus membantu saya selama meneliti.

Maros, Februari 2021


Muhammad Zulfikar

NIM : 70600117007

UIN
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Hipotesis.....	6
D. Definisi Operasional	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	11
A. Status Gizi Ibu Hamil.....	11
1. Penilaian Status Gizi Ibu Hamil.....	12
2. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil	14
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gizi Ibu Hamil.....	18
4. Akibat Kekurang Gizi Pada Ibu Hamil	19
B. Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	19
1. Definisi	19
2. Klasifikasi BBLR.....	20
3. Epidemiologi BBLR.....	20
4. Etiologi dan Faktor Resiko BBLR	21

5. Diagnosis	25
6. Penatalaksanaan BBLR	25
C. Kerangka Teori.....	27
D. Kerangka Konsep	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Desain Penelitian.....	29
B. Populasi dan Sampel.....	29
C. Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi.....	30
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
E. Variabel Penelitian.....	31
F. Pengumpulan data dan cara penelitian	31
G. Pengolahan Data.....	31
I. Analisis Data.....	32
J. Etika Penelitian.....	32
K. Alur Penelitian.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	35
1. Analisa Univariat	35
2. Analisa Bivariat.....	43
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
RIWAYAT HIDUP	58

DAFTAR SINGKATAN

AKB	: Angka kematian bayi
ANC	: Antenatal Care
APGAR	: Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASI	: Air Susu Ibu
BBLR	: Berat Badan Lahir Rendah
BBL	: Bayi Baru Lahir
BBLSR	: Berat Badan Lahir Sangat Rendah
BBLASR	: Berat Badan Lahir Amat Sangat Rendah
DEPKES	: Departemen Kesehatan
Dkk	: Dan Kawan-Kawan
Ha	: Hipotesis Alternatif
HB	: Hemoglobin
HCG	: Human Chorionic Gonadotropin
HKD	: Hipertensi Dalam Kehamilan
Ho	: Hipotesis Nol
IMT	: Indeks Massa Tubuh
IUGR	: Intrauterina Growth Retardation
KEK	: Kekurangan Energi Kronik
Kemkes RI	: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Kg	: Kilogram
KIA	: kesehatan Ibu dan Anak
Kkal	: Kilokalori
KPD	: Ketuban Pecah Dini
LC-PUFA	: Long Chain Polyunsaturated Fatty Acid
LILA	: Lingkar Lengan Atas
Mg	: Miligram
NICU	: Neonatal Intensive Care Unit
RISKESDA	: Riset Kesehatan Dasar
RSIA	: Rumah Sakit Ibu dan Anak
SPSS	: Statistical Package For the Social Sciences
UNICEF	: United Nations Children's Fund
WHO	: World Health Organization
WUS	: Wanita Usia Subur

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan LILA Ibu dan Berat Badan Lahir Bayi di Kabupaten Maros.....	36
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Berat Badan Lahir Bayi dan LILA Ibu di Kabupaten Maros.....	37
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia Ibu dan Status Gizi Ibu di Kabupaten Maros.....	39
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan ibu dengan Status Gizi Ibu Responden di Kabupaten Maros.....	40
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Paritas Ibu dan Status Gizi Ibu di Kabupaten Maros.....	42
Tabel 4.6 Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LILA Dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember 2019.....	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Korelasi Pearson.....	45
Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Pearson.....	45
Tabel 4.9 Hubungan Paritas Ibu Dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember 2019.....	49
Tabel 4.10 Hasil Uji Korelasi Pearson.....	50
Tabel 4.11 Hasil Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Pearson.....	50

HUBUNGAN STATUS GIZI IBU HAMIL BERDASARKAN LILA DENGAN KEJADIAN BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)

Muhammad Zulfikar⁽¹⁾, Dewi Setiawati⁽²⁾, Utami Murti Pratiwi⁽³⁾,

Rauly Rahmadahni⁽⁴⁾, Fatmawaty Hilal⁽⁵⁾

*Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

ABSTRAK

Kejadian BBLR pada Bayi Baru Lahir (BBL) atau neonatus pada periode 2005-2010 sebesar 15%. WHO melaporkan bayi dengan berat <2500 gram berkontribusi sebanyak 60-80% dari seluruh kematian neonatus, dan memiliki resiko kematian 20 kali lebih besar dibanding dengan bayi dengan berat badan lahir normal. Tujuan: untuk mengetahui Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LILA Dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember Tahun 2019. Metode: Penelitian ini adalah observasional analitik dimana peneliti hanya melakukan observasi terhadap objek yang diteliti tanpa melakukan perlakuan dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang melahirkan di Kabupaten Maros dengan melahirkan bayi BBLR yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan jumlah sampel 200 sampel. Sampel diambil menggunakan data sekunder dan kemudian dianalisa dengan menggunakan uji *Chi-Square* dengan tingkat kemaknaan sebesar 5% ($\alpha=0,05$) dan uji korelasi pearson. Hasil: Uji hipotesis dengan menggunakan *Chi-Square* dengan tingkat kemaknaan sebesar 5% ($\alpha=0,05$), diperoleh nilai *p-value* adalah 0,000 ($P<0,05$) dan analisis data Uji Korelasi *Pearson* diperoleh Nilai *r* Hitung 0.265 lebih besar dari *r table* 0.138 untuk $N = 200$, dan Nilai signifikansi *p-value* <0.005 (0.408), yang berarti terdapat hubungan antara status gizi (LILA) dengan kejadian BBLR di Kabupaten Maros periode Januari-Desember tahun 2019. Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi ibu berdasarkan (LILA) dengan Kejadian BBLR di Kabupaten Maros periode Januari-Desember tahun 2019.

Kata Kunci: *Status Gizi, LILA, BBLR, Hubungan Status Gizi dengan BBLR.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kesehatan global di bidang gizi kesehatan ibu dan anak (KIA) yang menjadi target perbaikan *World Health Organization* (WHO) dan juga *United Nations Children's Fund* (UNICEF) adalah tingginya angka kejadian *stunting*, anemia, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), *overweight*, *wasting*, dan rendahnya jumlah anak yang memperoleh Air Susu Ibu (ASI) eksklusif (WHO,2016). Data Organisasi kesehatan dunia (WHO) terkait kondisi gizi kesehatan ibu dan anak menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. WHO melaporkan bahwa pada tahun 2017, 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami *stunting*. Pada tahun 2016, jumlah anak menderita *stunting* sebesar 155 juta, dengan 56% berada di Asia. Kejadian BBLR pada Bayi Baru Lahir (BBL) atau neonatus pada periode 2005-2010 sebesar 15%.

Permasalahan gizi yang sering terjadi pada ibu hamil selain dari anemia pada kehamilan adalah Kekurangan Energi Kronik (KEK), data Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi resiko Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil sebesar 17,3% dimana kisaran presentase tertinggi ditemukan pada wanita hamil dengan rentang usia 15-34 tahun. Data tersebut menandakan bahwa kondisi kesehatan di Indonesia ditinjau dari aspek gizi belum dalam keadaan baik (Kemenkes,RI, 2018). Kekurangan energi kronis adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan asupan nutrisi antara protein dan energi, sehingga nutrisi yang diperlukan oleh tubuh tidak terpenuhi (Kemenkes RI, 2016). Kehamilan dengan status gizi buruk atau mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK) cenderung melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). (Permatasari, 2008)

Status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang dikandung. Jika status gizi ibu normal pada periode sebelum dan selama kehamilan akan melahirkan bayi yang sehat, cukup bulan

dengan berat badan normal. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan asupan makanan yang kita konsumsi setiap harinya baik sebelum dan terlebih lagi selama kehamilan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S: Al Maidah Ayat : 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahannya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Dalam buku Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa di sini ditegaskannya perintah memakan makanan yang halal, dan dengan demikian, menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang halal. Dengan perintah ini tercegah pulalah praktek-praktek keberagamaan yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal, yakni yang bukan haram lagi, baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah telah rezezikkan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas kamu yang kamu terhadap-Nya adalah mu'minin, yakni orang-orang yang mantap keimanannya. Yang dimaksud dengan kata makan dalam ayat ini, adalah segala aktivitas manusia. Pemilihan kata makan, di samping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas. Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 68, penulis antara lain mengemukakan bahwa, tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, yaitu: wajib, sunnah, mubah dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, yaitu pemutusan hubungan. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau pun baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan adalah yang halal lagi baik.

Disini pandangan saya terkait ayat dan tafsiran pada buku almisbah tersebut bahwa Allah swt memerintahkan agar memakan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan-Nya. Yang dimaksud dengan halal dalam ayat ini identik dengan pengertian yang telah disebutkan pada ayat 168 Surah Al-Baqorah, yaitu halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan toyyib (baik) adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu bermanfaat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein, dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang, karena makanan yang tidak baik atau yang diharamkan, jika dikonsumsi akan merusak, seperti makanan yang sudah kadaluarsa, mengandung formalin, atau mengandung racun dan lain-lain.

Untuk mengetahui status gizi ibu hamil dapat ditentukan dengan parameter (Berat Badan, Hemoglobin (Hb), dan Lingkar Lengan Atas (LILA)). Salah satu cara untuk mengetahui apakah seorang wanita hamil menderita KEK atau tidak bila ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) kurang dari 23,5 cm, maka ibu hamil tersebut dikatakan KEK atau kurang gizi dan beresiko melahirkan dengan BBLR (Maryanda,2017).

Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang baru lahir dengan berat badan < 2500 gram. BBLR merupakan salah satu indikator untuk melihat bagaimana derajat atau status kesehatan anak, sehingga berperan penting untuk memantau bagaimana status kesehatan anak sejak dilahirkan, apakah anak tersebut status kesehatannya baik atau tidak. Bayi BBLR terutama Bayi Berat Badan Lahir Sangat Rendah (BBLSR) memiliki risiko yang lebih besar terhadap kelainan kognitif, gangguan perilaku, gangguan tumbuh kembang. Untuk mengoptimalkan tumbuh kembang pada bayi BBLR serta mencegah dampak yang buruk di masa yang akan datang, maka hal yang terpenting adalah pemberian nutrisi yang adekuat untuk meningkatkan pertumbuhan bayi. Hal ini berhubungan dengan pemberian nutrisi yang tepat secara dini, dimulai sejak di Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Nutrisi yang tepat adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI), susu formula BBLR, dan nutrisi parenteral lainnya. Pemberian ASI sangat bermanfaat karena mengandung nutrisi penting seperti Long Chain

Polyunsaturated Fatty Acid (LC-PUFA). Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S: Al Ahqaf Ayat : 15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Terjemahannya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan”

Dalam buku Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Ayat di atas tidak menyifati kata insan manusia dengan satu sifat pun, demikian juga al-walidain, kedua orang tua. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kemanusiaan mengharuskannya berbakti kepada kedua orang tua dan bahwa bakti tersebut harus tertuju kepada kedua orang tua - dalam kedudukannya sebagai ibu bapak - betapapun keadaan mereka. Itu sebabnya al-Qur'an mewasiatkan untuk berbuat kepada keduanya - paling tidak dalam kehidupan dunia ini - walaupun mereka kafir. Kemudian pada Firman-Nya: *wahamluhu wafishaluhu tsalatsuna syahran*, kandungan dan penyapihannya adalah tiga puluh bulan, mengisyaratkan bahwa masa kandungan minimal adalah enam bulan, karena pada QS. al- Baqarah [2]: 233 telah dinyatakan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun yakni 24 bulan. Di sisi lain dapat dikatakan bahwa penyusuan minimal adalah sembilan bulan, karena masa kandungan yang normal adalah sembilan bulan. Betapapun, ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya ibu menyusukan anak dengan ASI.

BBLR menjadi masalah kesehatan masyarakat karena merupakan salah satu penyebab tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) (Sistriani, 2008). Yang dimana berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam waktu 1 (satu) jam pertama baru lahir. WHO melaporkan bayi dengan berat <2500 gram berkontribusi sebanyak 60-80% dari seluruh kematian neonatus, dan memiliki resiko kematian 20 kali lebih besar dibanding dengan bayi dengan berat yang

lahir badan normal. Di negara ASEAN Indonesia menempati urutan kedua dengan prevalensi BBLR tertinggi diantara negara ASEAN lainnya setelah Filipina (21,2%) (Supiati,2016). Untuk kejadian BBLR di Provinsi Sulawesi-Selatan menempati urutan ke tujuh tertinggi dari 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan presentase kejadian BBLR sebesar 12%, dengan Provinsi tertinggi angka kejadian BBLR yaitu Sulawesi Tengah (16,9%) dan terendah di Sumatra Utara (7,2%) (Dinkes,2014).

Menurut profil kesehatan Provinsi Sulawesi-Selatan tahun 2015 jumlah bayi lahir hidup sebesar 149.929, bayi lahir hidup ditimbang sebesar 120,293 dengan jumlah BBLR yaitu 9.783 kasus (8,13%) dan tertinggi di kota Makassar sebesar 690 kasus (Profil Kesehatan Prov.Sul-Sel,2016). Dan berdasarkan data profil kesehatan kabupaten Maros tahun 2017, Jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Maros tahun 2017 sebanyak 5.638 kelahiran hidup dan ditemukan 238 bayi (4,2%) yang mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (Profil Kesehatan Kab Maros, 2017).

Faktor resiko Bayi BBLR di pegaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor Ibu, Faktor obstetri, Faktor janin dan plasenta, dan Faktor lingkungan. Untuk faktor ibu itu sendiri meliputi usia ibu, status gizi ibu, status antenatal care, penyakit medis ibu, status ekonomi, pekerjaan, pendidikan, paritas dan jarak kehamilan. Untuk faktor janin yaitu infeksi dalam rahim, kelainan kongenital, dan jenis kelamin janin (Proverawati, 2010). Penyebab BBLR salah satunya adalah Kekurang Energi Kronik (KEK), karena berat janin dipengaruhi pula oleh status gizi ibu pada saat konsepsi dan melahirkan yang dapat disebabkan oleh kekurangan gizi selama hamil, sehingga suplai zat gizi pada janin pun berkurang. Akibat KEK pertumbuhan dan perkembangan janin terhambat sampai terjadi BBLR (Arisman, 2010).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengajukan judul “Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LILA Dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember Tahun 2019”.

B. Rumusan Masalah

“Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan status gizi ibu hamil berdasarkan LILA dengan kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember Tahun 2019?”

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (Ho)

Tidak ada hubungan antara status gizi ibu hamil berdasarkan LILA dengan kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah.

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

Terdapat hubungan antara status gizi ibu hamil berdasarkan LILA dengan kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah.

D. Definisi Operasional

1. Status Gizi Ibu Hamil

a. **Definisi** : Status gizi ibu hamil dalam penelitian ini adalah status gizi yang diukur melalui LILA pada ibu hamil saat Antenatal Care (ANC).

b. **Alat ukur** : Lingkar Lengan Atas (LILA) yang tercantum di rekam medik

c. **Interpretasi** : Status Gizi Baik LILA \geq 23,5 cm

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Status Gizi KEK jika LILA $<$ 23,5 cm

2. Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

a. **Definisi** : Bayi lahir hidup dengan berat badan $<$ 2500 gram tanpa memandang usia gestasi gestasi (Proverawati A. 2010).

a. **Alat ukur** : Rekam medik (Berat lahir)

b. **Interpretasi** : Bayi dengan berat badan $<$ 2500 gram

E. Kajian Pustaka

No	Penelitian / Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Cara Pengukuran	Hasil	Perbedaan
1.	Hasriyani, Suharyo Hadisaputro, Kamilah Budhi, Mexitalia Setiawati, Henry Setyawan (2018)	Berbagai Faktor Risiko Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) (Studi di Beberapa Puskesmas Kota Makassar)	Observasional analitik dengan desain case control dilengkapi analisis kualitatif dengan indepth interview	69 Sampel	Menggunakan kuesioner	Didapatkan bahwa status gizi kurang, dan penyakit kehamilan merupakan faktor risiko terhadap kejadian BBLR	Pada Penelitian hasriyani dkk dilakukan pengukuran dengan cara kuesioner sedangkan pada penelitian saya dilakukan dengan cara melihat rekam medik
2.	Siti Idrawati, Suratini (2015)	Hubungan status gizi ibu hamil dengan kejadian BBLR di wilayah Puskesmas Minggir	<i>Deskriptif korelasi, dengan Desain penelitian case control</i>	102 Sampel	Menggunakan data sekunder yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari orang lain atau data rekam medik dan laporan KIA yang ada di Puskesmas Minggir	Didapatkan bahwa terdapat hubungan antara status gizi ibu hamil dengan kejadian BBLR.	Desain penelitian yg saya pakai dan penelitian Siti Idrawati berbeda, penelitian saya memakai observasional analitik dan penelitian Siti Idrawati menggunakan case control. Pada penelitian Siti Idrawati mengambil sampel penelitian yakni bayi yang BBLR sedangkan penelitian saya mengambil sampel yakni seluruh ibu hamil. Pada

							penelitian Siti Idrawati menggunakan cara pengukuran yg didapatkan dari orang lain dan dari data rekam medik sedangkan cara pengukuran yang saya ambil hanya data rekam medik
3.	Vinta Mayanda (2017)	Hubungan status gizi ibu dengan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) RSIA Mutia Sari Kecamatan Mandau	Kuantitatif dengan pendekatan <i>survey cross sectional</i>	105 Sampel	Menggunakan data Rekam Medik RSIA Mutia Sari	Didapatkan bahwa ibu dengan LILA yang tidak normal beresiko 5 kali melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan dengan LILA ibu yang normal	Pada penelitian Vinta Mayanda Peneliti mengambil sampel sebanyak 105 responden sedangkan pada penelitian saya sampel yang saya ambil sebanyak 100 responden
4.	Elisa Murti Puspitaningrum (2018)	Hubungan status gizi ibu dengan kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di RSIA Annisa Kota Jambi Tahun	<i>Deskriptif analitik</i> , menggunakan metode <i>retrospektif</i> dengan rancangan <i>case control</i>	84 Sampel	Menggunakan data sekunder, yaitu berdasarkan pada catatan medis	Terdapat hubungan antara status gizi ibu hamil dengan kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Metode penelitian yg digunakan pada penelitian Elisa Murti menggunakan metode retrospektif dengan menggunakan rancangan case control sedangkan

		2018					metode yg saya gunakan observasi analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Kemudian Populasi yg di ambil adalah seluruh bayi yang lahir di RSIA Annisa sedangkan populasi yg saya ambil yakni seluruh ibu hamil (namun untuk pengambilan sampel tetap memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi)
5.	Lina Widi Astuti (2012)	Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Dengan Kejadian BBLR di RB Karya Rini Magelang	Deskriptif analitik dengan pendekatan waktu <i>cross sectional</i>	167 Sampel	Menggunakan data rekam medik	Terdapat hubungan bermakna antara status gizi ibu hamil dengan kejadian BBLR	Pada penelitian Lina Widi Astuti Pengambilan sampel yang digunakan yakni sistematis random sampling sedangkan pada penelitian saya pengambilan sampel yang saya gunakan yakni purposive sampling

F. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LILA Dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember Tahun 2019.

b. Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui status gizi ibu hamil di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember Tahun 2019.
- 2) Mengetahui kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember Tahun 2019.

G. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian serta menerapkan ilmu yang telah didapat selama studi khususnya mengenai Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LILA Dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember Tahun 2019.

b. Bagi Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, bahan acuan, dan menambah pengetahuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang kesehatan ibu dan anak.

c. Bagi Instansi

Sebagai bahan informasi bagi instansi kesehatan dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak mengenai pentingnya memperhatikan status gizi ibu untuk mencegah terjadinya Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Status Gizi Ibu Hamil

Status gizi dapat diartikan sebagai keadaan tubuh sebagai akibat dari mengonsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Status gizi ibu pada waktu pembuahan dan selama kehamilan berpengaruh terhadap pertumbuhan janin dalam kandungan (Sulistyoningsih, 2012. Pudjiadi, 2003.) Status gizi dapat diklasifikasikan menjadi status gizi normal dan malnutrisi.

1. Status gizi normal

Keadaan tubuh yang mencerminkan keseimbangan antara konsumsi dan penggunaan gizi oleh tubuh (adekuat)

2. Malnutrisi

Keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif maupun absolut satu atau lebih zat gizi. Terdapat empat bentuk malnutrisi, yaitu:

- a) *Under nutrition* : kekurangan konsumsi pangan secara relatif atau absolut untuk periode tertentu.
- b) *Spesific deficiency* : kekurangan zat gizi tertentu.
- c) *Over nutrition* : kelebihan konsumsi pangan untuk periode tertentu.
- d) *Imbalance* : Keadaan disproporsi zat gizi (Hasdianah, 2014).

Potongan ayat : 6, Q.S At-Tahrim

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Terjemahannya : “Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa hendaknya kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari segala sesuatu yang berdampak negatif. Demikian pula yang kita bahas sekarang ini, hendaknya kita menjaga calon bayi yang akan kita lahirkan nanti agar terhindar dari bayi BBLR. Caranya adalah hendaknya ibu yang

mengandung bayinya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, memenuhi kebutuhan gizinya dan menjaga berat badannya agar supaya bayi yang akan dilahirkan nanti bisa lahir dalam keadaan sehat.

Apabila ibu mengalami kekurangan gizi sebelum hamil atau selama minggu pertama kehamilan memiliki resiko lebih tinggi melahirkan bayi yang mengalami kerusakan otak dan sumsum tulang karena pembentukan sistem saraf sangat peka pada 2-5 minggu pertama. Ketika ibu yang sedang hamil mengalami kekurangan gizi, maka cenderung akan melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (<2500 gram), hal ini dikarenakan pada masa ini janin akan tumbuh dengan sangat cepat dan terjadi penimbunan jaringan lemak (Sulistyoningsih, 2012).

1. Penilaian Status Gizi Ibu Hamil

Penilaian status gizi pada ibu hamil dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan memantau pertambahan berat badan selama hamil (IMT), mengukur Lingkar Lengan Atas (LILA), dan mengukur kadar Hb. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) merupakan metode penilaian status gizi yang umum dilakukan pada ibu hamil karena pada wanita hamil dengan malnutrisi (gizi kurang atau lebih) kadang-kadang menunjukkan edema tapi jarang mengenai lengan atas (Ferial, 2011).

Lingkar lengan atas (LILA) merupakan gambaran keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. LILA mencerminkan tumbuh kembang jaringan lemak dan otot yang tidak berpengaruh oleh cairan tubuh. Ukuran LILA digunakan untuk skrining kekurangan energi kronis yang digunakan untuk mendeteksi ibu hamil dengan risiko melahirkan BBLR. Pengukuran LILA ditujukan untuk mengetahui apakah ibu hamil atau Wanita Usia Subur (WUS) menderita kurang energi kronis (KEK) (Kemenkes RI, 2014).

Alat yang digunakan merupakan suatu pita pengukur yang terbuat dari *fiberglass* atau jenis ukuran kertas tertentu berlapis plastik. Cara mengukurnya yaitu:

1. Yang diukur pertengahan lengan atas sebelah kiri (tangan yang tidak aktif). Pertengahan ini dihitung jarak dari siku sampai batas lengan kemudian dibagi dua.
2. Lengan dalam keadaan bergantung bebas, tidak tertutup kain atau pakaian.
3. Pita dilingkarkan pada pertengahan lengan tersebut sampai cukup terukur keliling lingkaran lengan, tetapi pita jangan terlalu kuat ditarik atau terlalu longgar (Supariasa, 2016).

Pengukuran LILA pada kelompok Wanita Usia Subur (WUS) menurut adalah salah satu cara deteksi dini yang mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat awam, untuk mengetahui kelompok berisiko Kekurangan Energi Kronis (KEK). Wanita usia subur adalah wanita usia 15-45 tahun. Adapun tujuan Pengukuran LILA pada kelompok WUS tersebut:

- a. Mengetahui risiko KEK Wanita Usia Subur (WUS), baik ibu hamil maupun calon ibu, untuk menapis wanita yang mempunyai risiko melahirkan bayi BBLR.
- b. Meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat agar lebih berperan dalam pencegahan dan penanggulangan KEK.
- c. Mengembangkan gagasan baru di kalangan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.
- d. Meningkatkan peran serta petugas lintas sektoral dalam upaya perbaikan gizi Wanita Usia Subur (WUS) yang menderita KEK.
- e. Mengerahkan pelayanan kesehatan pada kelompok sasaran Wanita Usia Subur (WUS) yang menderita KEK (Supariasa, 2016)

Ambang batas LILA dengan risiko KEK di Indonesia adalah 23,5 cm. Apabila ukuran LILA kurang dari 23,5 cm atau dibagian merah pita LILA, artinya wanita tersebut mempunyai risiko KEK dan diperkirakan akan melahirkan BBLR (Putri, 2012).

Penambahan berat badan selama hamil menurut Institute of Medicine adalah 11,3 -15,9 kg, pada ibu hamil dengan IMT rendah (<

18,5) kenaikan berat badan antara 12,5 kg sampai dengan 18 kg, ibu hamil dengan IMT sedang (18,5 -25,0) kenaikan berat badan 12 kg sampai dengan 16 kg, ibu hamil dengan IMT tinggi (> 25) sebesar 7 kg sampai dengan 11,5 kg dan untuk IMT obesitas (> 30) sebesar 5 kg sampai dengan 9 kg. Adapun untuk kategori ambang batas IMT untuk Indonesia yaitu Kekurangan Berat Badan Tingkat Berat < 17,0, Kekurangan Berat Badan Tingkat Ringan 17,0 – 18,5, normal >18,5- 25,0, Kelebihan berat badan tingkat ringan >25,0- 27,0 , Kelebihan berat badan tingkat berat >27.

2. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil

Kebutuhan nutrisi seorang ibu hamil meningkat selama kehamilan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin, bersama-sama dengan perubahan-perubahan yang berhubungan pada struktur dan metabolisme yang terjadi pada ibu. Perubahan anatomi, fisiologi, dan biokimia pada tubuh ibu berdampak terhadap diet dan kebutuhan nutrisinya. Perubahan ini berguna untuk mengatur metabolisme ibu, mendukung pertumbuhan janin, persiapan ibu untuk melahirkan, kelahiran, dan menyusui (Arisman, 2009).

Kebutuhan energi untuk kehamilan yang normal perlu tambahan kira-kira 80.000 kalori selama masa kurang lebih 280 hari. Hal ini berarti perlu tambahan ekstra sebanyak kurang lebih 300 kalori setiap hari selama hamil. Kebutuhan energi pada trimester I meningkat secara minimal. Kemudian sepanjang trimester II dan III kebutuhan energi terus meningkat sampai akhir kehamilan. Energi tambahan selama trimester II diperlukan untuk pemekaran jaringan ibu seperti penambahan volume darah, pertumbuhan uterus, dan payudara, serta penumpukan lemak. Selama trimester III energi tambahan digunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta (Zulhaida, 2003).

Perubahan kebutuhan gizi ibu hamil tergantung dari kesehatannya. Dasar pengaturan gizi pada saat kehamilan adalah adanya penyesuaian faal selama kehamilan itu sendiri, yaitu:

1. Peningkatan basal metabolisme dan kebutuhan kalori. Metabolisme basal pada masa 4 bulan pertama mengalami peningkatan kemudian menurun 20-25% pada minggu terakhir.
2. Perubahan fungsi alat pencernaan karena perubahan hormonal, peningkatan HCG, estrogen, progesteron, menimbulkan berbagai perubahan seperti mual muntah, motilitas lambung sehingga penyerapan makanan lebih lama, peningkatan absorpsi nutrient, dan motilitas usus sehingga timbul masalah obstipasi.
3. Peningkatan fungsi ginjal sehingga banyak cairan yang disekresikan pada pertengahan kehamilan dan sedikit cairan di ekskresi pada bulan-bulan terakhir kehamilan.
4. Peningkatan volume dan plasma darah hingga 50%, jumlah eritrosit 20-30% sehingga terjadi penurunan hemodilulusi dan konsentrasi hemoglobin (Kusmiyati, 2009)

Kebutuhan gizi ibu hamil menurut Arisman (2009) adalah

1. Cukup kalori, protein yang bernilai biologi tinggi, vitamin, dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu, janin dan plasenta.
2. Makanan padat kalori lebih banyak membentuk jaringan tubuh bukan lemak.
3. Cukup kalori dan zat gizi untuk memenuhi pertambahan berat badan selama hamil.
4. Perencanaan penambahan gizi yang memungkinkan ibu hamil untuk memenuhi dan mempertahankan status gizi optimal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan aman dan berhasil, melahirkan bayi dengan potensi fisik dan mental yang baik, dan memperoleh cukup energi untuk menyusui serta merawat bayi.
5. Perawatan gizi yang dapat membantu pengobatan yang terjadi selama kehamilan.
6. Mendorong ibu hamil sepanjang waktu untuk mengembangkan kebiasaan makan yang baik (gizi seimbang) (Arisman, 2009).

Zat-zat gizi penting yang dibutuhkan ibu selama hamil sebesar 2500 kalori perhari yang terdiri dari:

1. Karbohidrat (Energi)

Karbohidrat merupakan zat gizi sumber utama, pada umumnya kandungan karbohidrat berkisar antara 60-70% dari total konsumsi energi. Pada ibu hamil kebutuhan energinya lebih banyak dari kebutuhan energi sebelum hamil berkisar antara 300 sampai 500 kkal. Energi tambahan ini dapat memenuhi metabolisme basal yang meningkat, aktivitas fisik yang banyak menghabiskan energi, dan untuk cadangan energi (Wahyuni, 2008). Kebutuhan energi pada trimester I secara minimal. Kebutuhan tambahan energi pada trimester II diperlukan untuk penambahan volume darah, pemekaran jaringan tubuh, pertumbuhan uterus dan payudara, serta penumpukan lemak. Pada trimester III, penambahan energi digunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Karena banyaknya perbedaan kebutuhan energi selama hamil, WHO menganjurkan jumlah tambahan energi pada trimester I sebanyak 150 kkal, trimester II dan III sebanyak 350 kkal (Arisman, 2009). Contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat seperti beras, jagung, ubi jalar, gandum dll.

2. Protein

Protein merupakan komponen terbesar dalam tubuh setelah air. Protein adalah zat pembangun atau pembentuk jaringan baru. Kekurangan asupan protein pada saat hamil dapat menghambat pertumbuhan janin (Wahyuni, 2008). Protein yang dibutuhkan ibu hamil ditambah dengan kebutuhan pertumbuhan dan remodelling janin, uterus, plasenta, mammae, serta penambahan volume darah ibu (Cunningham, 2017). Contoh bahan makanan yang mengandung protein seperti ikan, udang, telur ayam, tahu, tempe dan udang.

3. Lemak

Lemak merupakan sumber energi terbesar dalam tubuh. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi bagi tubuh pada saat ibu

melahirkan, sebagai pelarut asam lemak dan pelarut vitamin A, D, E, K. Asam lemak omega tiga dan enam juga diperlukan untuk pertumbuhan otak bayi, perkembangan sistem saraf, fungsi penglihatan, dan bantalan bagi organ-organ tertentu seperti ginjal dan biji mata. Mengonsumsi lemak dianjurkan tidak melebihi 25% dari total kebutuhan energi dalam mengonsumsi makanan sehari-hari (Wahyuni, 2008). Contoh bahan makanan yang mengandung lemak seperti daging sapi, mentega, keju, kacang-kacangan dan minyak kelapa sawit.

4. Kalsium

Dalam kehamilan ibu dan bayi membutuhkan kalsium dalam menunjang pertumbuhan tulang, gigi, dan persendian janin (Wahyuni, 2008). Ibu hamil menahan sekitar 30 gram kalsium, yang sebagian besar disalurkan ke janin pada tahap lanjut kehamilan. Jumlah ini hanya menggambarkan 2,5% dari kalsium total ibu. Sehingga ibu hamil membutuhkan suplementasi 1,-2,0 gram kalsium per hari (Cunningham, 2017). Contoh bahan makanan yang mengandung kalsium seperti susu sapi, yogurt, keju, kacang almond.

5. Zat Besi

Zat besi diperlukan untuk memproduksi hemoglobin (protein di sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh). Pada saat kehamilan kebutuhan zat besi bertambah dua kali lipat dibandingkan jika tidak hamil yaitu sekitar 56 mg perhari, hal ini dikarenakan bertambahnya volume darah untuk menampung perubahan tubuh ibu dan pasokan darah bagi janin (Almatsier, 2004). Contoh bahan makanan yang mengandung zat besi seperti bayam, kacang merah, brokoli, tahu.

6. Asam Folat

Suplementasi asam folat terbukti telah menurunkan kejadian cacat tabung saraf pada janin. Asam folat juga diperlukan bagi pematangan sel. Jumlah yang dibutuhkan oleh ibu hamil ialah 400 miligram

perhari (Cunningham,2017). Contoh bahan makanan yang mengandung asam folat seperti telur ayam, jeruk, hati ayam, hati sapi, dan alpukat.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gizi Ibu Hamil

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi gizi pada ibu hamil yaitu:

1. Umur

Umur ibu pada saat hamil berpengaruh terhadap status gizi ibu, Hal ini dikarenakan semakin tua umur seseorang pada saat hamil, maka semakin tinggi energi yang dibutuhkan.

2. Berat Badan

Berat badan ibu sebelum hamil akan menentukan seberapa banyak asupan makanan yang harus dikonsumsi sewaktu hamil untuk memenuhi kebutuhan gizi janin sehingga bayi yang lahir memiliki berat badan yang normal.

3. Aktivitas

Jika Ibu yang memiliki aktivitas yang tinggi, maka kebutuhan energi yang dibutuhkan juga lebih tinggi.

4. Kondisi Kesehatan

Asupan makanan ibu sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatannya. Ibu hamil yang sedang sakit cenderung memiliki nafsu makan yang menurun. Dan ibu hamil yang sedang sakit memerlukan tambahan suplemen seperti protein, suplemen zat gizi, kalsium dan buah-buahan agar kebutuhan gizi ibu pada saat hamil tetap terpenuhi.

5. Pengetahuan Mengenai Gizi Kehamilan

Pengetahuan ibu tentang gizi kehamilan sangat diperlukan agar ibu hamil dapat mengatur dan memperhatikan asupan makanannya pada saat hamil.

6. Kadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi keluarga akan mempengaruhi kualitas dan jenis makanan yang dikonsumsi ibu hamil (Wibisono dan Ayu, 2008).

4. Akibat Kekurang Gizi Pada Ibu Hamil

Bila ibu mengalami kekurangan gizi selama hamil akan menimbulkan masalah, baik pada ibu maupun janin, seperti diuraikan berikut ini.

1. Terhadap Ibu

Gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu antara lain: anemia, pendarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi.

2. Terhadap Persalinan

Pengaruh gizi kurang terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (*premature*), pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat.

3. Terhadap Janin

Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan kegururan, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intra partum (mati dalam kandungan), lahir dengan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (Sulistyoningsih, 2012).

B. Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

1. Definisi

Berat badan merupakan hasil pengukuran antropometri yang paling sering dilakukan dan sangat berguna untuk mengetahui apakah bayi lahir dengan berat badan normal atau mengalami Bayi Berat Badan Lahir Rendah (Depkes RI, 2003).

Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah suatu kondisi di mana berat bayi yang baru lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang usia gestasi (Arda, 2015). BBLR di bedakan menjadi 2 kategori yaitu bayi berat lahir rendah karena *premature*, (Umur kehamilan kurang dari 37 minggu) atau BBLR karena *Intrauterina Growth Retardation* (IUGR) yaitu bayi cukup bulan tetapi memiliki berat

badan kurang untuk ukuran berat badan normal pada umumnya (Depkes RI,2003)

2. Klasifikasi BBLR

BBLR diklasifikasikan atas dua bagian yaitu berdasarkan berat badan bayi dan usia kehamilan. Berdasarkan berat badan bayi adalah sebagai berikut :

- a. Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yaitu bayi yang lahir dengan berat badan lahir 1.500 - 2.500 gram
- b. Bayi Berat Badan Lahir Sangat Rendah (BBLSR) adalah bayi yang lahir dengan berat badan 1.000-1.500 gram
- c. Bayi Berat Badan Lahir Amat Sangat Rendah (BBLASR) adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 1.000 gram (Arda, 2015).

BBLR berdasarkan usia kehamilan adalah sebagai berikut:

- a. Prematuritas murni yaitu bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu dengan berat badan sesuai dengan berat badan untuk usia kehamilan.
- b. Dismaturitas yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari berat badan untuk usia kehamilan, yang berada di bawah persentil berat pada kurva pertumbuhan intrauterin. Biasanya disebutkan dengan bayi kecil untuk kehamilan (Arda, 2015).

3. Epidemiologi BBLR

WHO melaporkan Bayi dengan berat <2500 gram berkontribusi sebanyak 60-80% dari seluruh kematian neonatus, dan memiliki resiko kematian 20 kali lebih besar dibanding dengan bayi dengan berat yang lahir badan normal.

Adapun presentase BBLR di negara berkembang adalah 16,5% yang dua kali lebih besar dibandingkan dengan negara maju (7%). Di negara-negara berkembang Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan prevalensi BBLR tertinggi (11,1%), setelah india (27,6%), dan Afrika Selatan (13,2%). Selain itu, untuk di negara ASEAN

Indonesia menempati urutan kedua dengan prevalensi BBLR tertinggi diantara negara ASEAN lainnya setelah Filipina (21,2%) (Supiati,2016).

Di Indonesia kematian neonatus terbanyak di Indonesia disebabkan oleh asfiksia (37%), Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan prematuritas (34%), sepsis (12%), hipotermi (7%), ikterus neonatorum (6%), *postmatur* (3%), dan kelainan kongenital (1%) per 1.000 kelahiran hidup (Ratuain,dkk, 2015). Menurut profil kesehatan Provinsi Sulawesi-Selatan tahun 2015 jumlah bayi lahir hidup sebesar 149.929, bayi lahir hidup ditimbang sebesar 120,293 dengan jumlah BBLR yaitu 9.783 kasus (8,13%) dan tertinggi di kota Makassar sebesar 690 kasus (Profil Kesehatan Prov.Sul-Sel,2016)

Untuk kejadian BBLR di Provinsi Sulawesi-Selatan menempati urutan ke tujuh tertinggi dari 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan presentase kejadian BBLR sebesar 12%, dengan Provinsi tertinggi angka kejadian BBLR yaitu Sulawesi Tengah (16,9%) dan terendah di Sumatra Utara (7,2%) (Dinkes,2014). Dan berdasarkan data profil kesehatan kabupaten Maros tahun 2017, Jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Maros tahun 2017 sebanyak 5.638 kelahiran hidup dan ditemukan 238 bayi (4,2%) yang mengalami BBLR (Bayi Berat Badan Lahir Rendah). (Profil Kesehatan Kab Maros, 2017)

4. Etiologi dan Faktor Resiko BBLR

Menurut teori ada beberapa factor-faktor penyebab Bayi Berat Badan Lahir Rendah

1. Faktor ibu
 - a. Status gizi ibu hamil

Status gizi sangat berpengaruh terhadap ibu hamil untuk pertumbuhan janin dalam kandungan. Karena apabila status gizi buruk saat sebelum atau selama hamil akan memberikan dampak pada anak yakni BBLR, dapat juga menghambat pertumbuhan otak janin, anemia pada bayi baru lahir, bayi baru lahir akan mudah

terkena infeksi, abortus, dan lainnya. Sehingga sebelum atau selama kehamilan, ibu sebaiknya memeriksakan diri secara berkala agar baik ibu maupun janin dapat sehat dan lahir dengan baik.

b. Sosial ekonomi rendah

Kejadian tertinggi terhadap golongan sosial ekonomi yang terendah, disebabkan oleh keadaan gizi dan pengawasan yang kurang baik. Namun hal ini tidak dapat dijadikan acuan karena, pada ekonomi yang baikpun masih dapat terjadi BBLR. Kondisi sosial ekonomi yang kurang dapat mempengaruhi kecukupan asupan nutrisi bagi ibu selama hamil dan dapat juga menurunkan kualitas lingkungan sosial di sekitar ibu hamil. Hasil Riskesdas (2010), menunjukkan bahwa menurut tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan dan status ekonomi, semakin rendah persentase berat badan lahir <2500 gram.

c. Paritas

Pada umumnya BBLR meningkat sesuai dengan meningkatnya paritas ibu. Dimana paritas primipara, yaitu wanita yang pernah melahirkan bayi dengan berat jenis di atas 2500 gram pada umur kehamilan 37 sampai 42 minggu memiliki risiko 1,32 kali lebih besar untuk terjadi BBLR. Paritas yang berisiko yaitu paritas nol yaitu ibu pertama kali hamil dan paritas lebih dari empat. Dimana komplikasi-komplikasi yang akan muncul pada ibu golongan paritas tinggi akan mempengaruhi perkembangan janin. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan plasenta dan sirkulasi darah ke janin, sehingga pertumbuhan bayi terhambat.

d. Kelainan bentuk uterus /*serviks incompeten*

Keadaan ini dapat menjadi faktor pemicu terjadinya kelahiran premature karena berkaitan dengan kontraksi uterus. Keadaan ini dihubungkan dengan kejadian premature dengan kelainan uterus karena kelainan bentuk tersebut dapat menjadi suatu keadaan yang

membuat perkembangan bayi menjadi tidak normal dan menjadi pencetus untuk terjadinya kelahiran premature, walaupun keadaan ini jarang terjadi. Serviks inkompeten dapat juga menjadi penyebab abortus selain *partus preterm*.

e. Penyakit menahun/diderita ibu

Apabila ibu menderita suatu penyakit, maka akan mempengaruhi janin yang ada dalam kandungannya, sehingga diperlukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat serta khusus. Adapun penyakit yang dapat memperburuk ibu maupun janin yaitu hipertensi kronik, diabetes, asma, dll.

2. Faktor obstetric

a. Kehamilan ganda

Kehamilan ganda atau gemelli dapat membawa risiko bagi janin, bahaya bagi ibu tidak begitu besar, tetapi wanita dengan kehamilan kembar memerlukan perawatan yang khusus. Pada kehamilan kembar ini, berat badan janin dapat lebih rendah dibandingkan kehamilan tunggal walaupun umur gestasi sama antara ibu yang hamil kembar dengan ibu yang hamil tunggal. Semakin banyak jumlah bayi, maka semakin besar pula derajat reterdasi pertumbuhan. Derajat reterdasi pertumbuhan lebih besar jika dua atau lebih janin berasal dari ovum tunggal daripada jika setiap janin berasal dari ovum yang berbeda.

b. Komplikasi kehamilan

Komplikasi yang dapat atau sering terjadi selama kehamilan ibu ialah KPD, perdarahan antepartum (plasenta previa, solusio plasenta), HDK dengan atau tanpa edema pretibial, ancaman persalinan premature dan infeksi berat dalam kehamilan.

- Ketuban pecah dini: merupakan penyebab persalinan prematur dimana ketuban pecah sebelum waktunya. Hal ini disebabkan karena berkurangnya kekuatan membrane atau meningkatnya tekanan intrauterine atau oleh kedua faktor tersebut.

Berkurangnya kekuatan ini dapat disebabkan karena infeksi selama janin berada dalam rahim ibu.

- Hipertensi dalam kehamilan : hipertensi pada ibu hamil cenderung akan mempengaruhi timbulnya *uteroplacental insufficiency* yang menyebabkan kekurangan zat asam (anorexia) pada janin dalam masa sebelum atau sewaktu dilahirkan yang dapat menyebabkan kematian perinatal dan BBLR.

3. Faktor janin dan plasenta

a. Infeksi dalam rahim, kelainan kromosom, dan cacat bawaan

Cacat bawaan yang terjadi dapat membuat persalinan menjadi premature, keguguran, lahir mati, atau kematian pada bayi setelah persalinan pada minggu pertama. Kelainan ini berkontribusi sebesar 20% terhadap kematian BBLR. Kelainan ini dapat terjadi karena kebiasaan atau gaya hidup ibu yang mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan serta infeksi sebelum atau pada saat hamil. Bayi yang mengalami kelainan congenital berisiko 2,4 kali untuk lahir BBLR.

b. Polihidramnion

Merupakan keadaan dimana banyaknya air ketuban melebihi 2000 cc, pada keadaan normal banyak air ketuban dapat mencapai 1000 cc dan akan menurun setelah minggu ke-38 sehingga hanya tinggal beberapa ratus cc saja. Keadaan ini sangat berbahaya bagi ibu dan anak, karena dapat membuat uterus renggang sehingga menyebabkan partus premature.

c. Pertumbuhan janin terhambat (IUGR)

Pertumbuhan janin terhambat dapat terjadi karena pemasokan oksigen dan makanan kurang adekuat dan hal inipun dapat mendorong untuk dilakukannya terminasi kehamilan lebih dini. Terdapat dua bentuk:

- *Proportionate IUGR*; janin yang menderita distress yang lama dimana gangguan pertumbuhan terjadi berminggu-minggu sampai bulan sebelum bayi lahir, sehingga berat, panjang, dan lingkaran kepala dalam proporsi yang seimbang tetapi keseluruhan masih dibawah masa gestasi sebenarnya.
- *Disproportionate IUGR*: dapat terjadi akibat distress sub akut dan terjadi beberapa minggu sampai beberapa hari sebelum janin lahir. Pada keadaan ini panjang dan lingkaran kepala normal akan tetapi berat tidak sesuai dengan masa gestasi.

5. Diagnosis

Diagnosis pasti dari BBLR ini membutuhkan 2 pemeriksaan yaitu pemeriksaan haid pertama haid terakhir dan juga pemeriksaan berat badan bayi dimana jika didapatkan berat badan bayi kurang dari 2500 gram saat lahir dan usia gestasi baik preterm, aterm maupun posterm maka bayi tersebut dikategorikan ke dalam BBLR (Proverawati A, 2010). Adapun gejala - gejala yang sering muncul adalah berat badan saat lahir kurang dari 2500 gram, kepala lebih besar dari tubuh, kulit tipis, lemak subkutan tipis, fontanella dan sutura melebar, dan APGAR skor biasanya rendah (Darmi A, 2015).

6. Penatalaksanaan BBLR

Tatalaksana pada bayi BBLR harus dilaksanakan sedini mungkin sejak bayi masih di NICU, salah satunya dengan memberikan cairan infus glukosa pada saat lahir dengan kecepatan 4 mg/kg/menit dan kecepatan ditingkatkan perhari selama euglikemia terjaga. Hal terpenting dalam perawatan dini bayi BBLR adalah pemberian nutrisi yang adekuat sehingga dapat terjadi peningkatan berat badan pada bayi BBLR (Septira, 2016).

Energi tambahan yang dibutuhkan untuk bayi BBLR adalah 90-100 kkal/kg/hari untuk mengejar pertumbuhannya. Pemberian nutrisi dapat dilakukan dengan ASI, susu formula BBLR, dan nutrisi parenteral. Nutrisi parenteral yang dapat diberikan adalah glukosa, protein, lipid, dan


zat besi. Pemberian nutrisi parenteral dikarenakan imaturitas dari traktus gastrointestinal. Namun, pemberian nutrisi enteral juga penting untuk maturitas system gastrointestinal bayi (Septira,2016)

Asupan dini tinggi protein dengan memberikan lebih dari 2 g/kg/hari asam amino sejak hari pertama kelahiran dapat mendorong peningkatan berat badan, pertumbuhan, dan meningkatkan sekresi insulin endogen dan gluconeogenesis yang meningkatkan toleransi glukosa dan mencegah hiperglikemia. Asupan asam amino ditingkatkan sampai 3,5-4 g/kg/hari diakhir minggu pertama dan dibarengi dengan emulsi lipid intravena (Septira,2016)

Selain kekurangan gizi makro, defisiensi gizi mikro misalnya kekurangan zat besi (anemia dalam kehamilan) juga dapat berhubungan dengan hambatan pertumbuhan janin karena asupan atau pasokan oksigen kejanin kurang (Fajriana A, 2018).




C. Kerangka Teori



D. Kerangka Konsep

Variabel Independen

Variabel Dependen



Keterangan :



: Variabel Independen



: Variabel yang tidak diteliti



: Penghubung Variabel



: Variabel Dependen



: Saling berhubungan namun tidak diteliti



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dimana peneliti hanya melakukan observasi terhadap objek yang diteliti tanpa melakukan perlakuan dengan pendekatan cross sectional dimana data yang diambil secara bersamaan baik untuk data variabel dependen Bayi Berat Badan Lahir Rendah maupun independen status gizi ibu hamil.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang melahirkan di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember Tahun 2019.

2. Sampel

Dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan teknik *non-probability sampling* yaitu *purposive sampling*. Semua populasi penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Pengambilan sampel penelitian ini, jika subjeknya kurang dari 100 orang, maka sebaiknya semuanya diambil, jika subjek lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15 % atau 20-25% atau lebih.

Dengan Rumus *Slovin* :

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat signifikansi (p)

$$n = \frac{6721}{1 + 6721(0,1^2)}$$

n = 98,53 sampel dibulatkan menjadi 99 sampel.

C. Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi

1. Kriteria Inklusi

- a. Ibu hamil yang memiliki Riwayat LILA normal pada saat ANC dengan Bayi Berat Badan Lahir Rendah di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember 2019.
- b. Ibu hamil yang memiliki riwayat LILA rendah pada saat ANC dengan Bayi Berat Badan Lahir Rendah di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember 2019.
- c. Ibu hamil yang memiliki riwayat LILA rendah pada saat ANC dengan Bayi Berat Badan Lahir Normal di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember 2019.
- d. Kehamilan tunggal.
- e. Kehamilan aterm.

2. Kriteria Eksklusi

- a. Kelainan Bentuk Uterus
- b. Penyakit Menahun
- c. Preeklampsia
- d. Hipertensi Gestasioal
- e. KPD
- f. Infeksi Dalam Rahim
- g. Polihidramnion
- h. Pertumbuhan Janin Terhambat
- i. Anemia

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Maros

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2021

E. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan pada penelitian berjumlah 2 variabel yakni variabel dependen dan variabel independent sebagai berikut :

1. Variabel independent

Variabel independent merupakan variabel stimulus, dimana variabel ini mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independent dari penelitian ini adalah status gizi ibu hamil.

2. Variabel dependen

Variabel dependent merupakan variabel *output*, dimana variabel ini menjadi akibat dari variabel independent/stimulus. Variabel dependent dari penelitian ini adalah Bayi Berat Badan Lahir Rendah.

F. Pengumpulan data dan cara penelitian

1. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data rekam medik (data sekunder) Januari – Desember 2019 yang mana ibu yang melahirkan di Kabupaten Maros memiliki riwayat pemeriksaan LILA.

2. Cara Penelitian

Peneliti mengumpulkan data rekam medik (data sekunder) di Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, lalu peneliti mengolah data sekunder tersebut.

G. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas *editing, coding, tabulating* dan analisis data.

I. Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel disertai penjelasan serta disusun dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian. Pengolahan data dilakukan setelah pencatatan rekam medik dan datanya diolah menggunakan program computer *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) dan uji korelasi pearson. Adapun data yang dianalisis sebagai berikut :

1. Data Univarian

Analisa univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dengan cara mendeskripsikan tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melihat gambaran distribusi frekuensinya. Membuat tabel distribusi frekuensi dan presentasi dari masing-masing frekuensi.

2. Data Bivarian

Pada tahap ini dilakukan analisis pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Untuk menetapkan ada tidaknya pengaruh antara variabel independen dan dependen digunakan rumus berdasarkan skala pengukuran variabel yang digunakan.


Analisa data yang digunakan adalah *chi square* dalam uji X² digunakan untuk menguji kebebasan antara dua variabel yang disusun dalam tabel baris dan kolom dengan $\alpha = 0.05$, maknanya hipotesis nol (H₀) ditolak jika p value $< \alpha$ yang artinya ada pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen.

J. Etika Penelitian


Hal-hal yang terkait dengan etika penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai permohonan izin untuk melakukan penelitian.
2. Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penelitian yang dilakukan.
3. Menyampaikan tujuan penelitian dengan ramah kepada subjek penelitian.

4. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait sesuai dengan manfaat penelitian yang telah disebutkan sebelumnya.



K. Alur Penelitian



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Jumlah populasi seluruh ibu yang melahirkan di Kabupaten Maros, pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Non-Probability Sampling* yaitu *Purposive sampling* dengan jumlah sebesar 200 sampel. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data rekam medik. Pengumpulan data dilakukan mulai Januari-Februari 2021. Data terkumpul selanjutnya di editing, coding, tabulasi dan dianalisis. Hasil penelitian ini berupa hasil analisis univariat dari masing-masing variabel yang diteliti, analisis bivariat berupa korelasi antara masing-masing variabel dependen dan variabel independen.

1. Analisa Univariat

Analisa univariat dilakukan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel yang diteliti. Pada analisa univariat ini data kategori dapat dijelaskan dengan angka atau nilai jumlah data persentase setiap kelompok.

a. Distribusi frekuensi responden berdasarkan LILA


Tabel 4.1

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan LILA Ibu dan Berat Badan Lahir Bayi di Kabupaten Maros

Status Gizi (LILA)	Berat Badan Lahir				Total	
	BBLR		BBLN			
	N	%	n	%	n	%
Gizi KEK (<23,5 CM)	30	15	9	4,5	39	19,5
Gizi Baik (≥23,5 CM)	70	35	91	45,5	161	80,5
Total	100	50	100	50	200	100

Sumber : Data Sekunder, Februari, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa Sebagian besar responden gizi baik dengan BBLN sebanyak 91 responden (45,5%).



Pada penelitian ini didapatkan data Ibu yang mengalami gizi KEK (<23,5 cm) dengan BBLR sebanyak (15%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrida (2019), yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran LILA ibu maka berat badan lahir bayi akan semakin bertambah dan lingkaran lengan atas yang rendah pada ibu hamil akan menjadi faktor terjadinya bayi lahir dengan BBLR. Maka dari hal ini terdapat hubungan antara status gizi berdasarkan LILA dengan kejadian BBLR.

b. Distribusi frekuensi responden berdasarkan Berat Badan Lahir


Tabel 4.2

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Berat Badan Lahir Bayi dan LILA Ibu di Kabupaten Maros

Berat Badan Lahir	Status Gizi (LILA)				Total	
	Gizi KEK (<23,5 CM)		Gizi Baik (≥23,5 CM)		n	%
	n	%	n	%		
BBLR	30	15	70	35	100	50
BBLN	9	4,5	91	45,5	100	50
Total	39	19,5	161	80,5	200	100

Sumber : Data Sekunder, Februari, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa Sebagian besar responden BBLN dengan gizi baik sebanyak 91 responden (45,5%).



Pada penelitian ini didapatkan bayi lahir dengan BBLR yang mengalami gizi KEK sebanyak (15%) dan bayi lahir dengan BBLR gizi baik sebanyak (35%). Hal ini sejalan dengan penelitian Nirbita (2012), pada penelitiannya hasil yang didapatkan terdapat (50%) bayi yang terlahir dengan BBLR. BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan <2500 gram, faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain faktor keturunan, Nutrisi, faktor penyakit ibu, infark plasenta, infeksi virus, bakteri, protozoa.

c. Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia


Tabel 4.3

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia Ibu dan Status Gizi Ibu di Kabupaten Maros

Usia	Gizi KEK ($<23,5$ CM)		Gizi Baik ($\geq 23,5$ CM)		Total	
	N	%	n	%	n	%
<20	7	3,5	5	2,5	12	6
20-35	25	12,5	138	69	163	81,5
>35	7	3,5	18	9	25	12,5
Total	39	19,5	161	80,5	200	100

Sumber : Data Sekunder, Februari, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berumur 20-35 dengan gizi baik sebanyak 138 responden (69%).



Usia memiliki pengaruh terhadap status gizi ibu hamil. Pada penelitian ini ibu yang mengalami gizi KEK sebanyak (3,5%) pada ibu usia <20 tahun, (12,5%) pada ibu usia 20-35 tahun dan (3,5%) pada ibu usia >35 tahun.

Ibu yang memiliki umur tidak beresiko (20-35 tahun) lebih banyak yang melahirkan bayi dengan BBLR artinya tidak selamanya usia berbanding lurus dengan kejadian BBLR. (Juliansyah, dan Noni, 2017).

d. Distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan


Tabel 4.4

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan ibu dengan Status Gizi Ibu Responden di Kabupaten Maros

Pekerjaan	Gizi KEK (<23,5 CM)		Gizi Baik (≥23,5 CM)		Total	
	N	%	n	%	n	%
IRT	37	18,5	157	78,5	194	97
ASN	1	0,5	3	1,5	4	2
Pedagang	1	0,5	-	-	1	0,5
Honorar	-	-	1	0,5	1	0,5
Total	39	19,5	161	80,5	200	100

Sumber : Data Sekunder, Februari, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa Sebagian besar responden IRT dengan gizi baik sebanyak 157 responden (78,5%).



Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan terdapat ibu yang bekerja sebagai IRT, ASN, Pedagang, dan Honoror sebanyak (19,5%) ibu yang mengalami KEK.

Pekerjaan dengan status gizi memiliki keterkaitan, sebab saat melakukan aktivitas ibu hamil akan memerlukan energi sehingga apabila makin banyak suatu aktivitas maka bertambah banyak pula energi yang diperlukan, oleh karena itu nutrisi yang dikonsumsi ibu hamil akan terbagi selama bekerja. Apabila nutrisi tidak terpenuhi selama masa kehamilan maka hal tersebut akan menjadi faktor penyebab terjadinya BBLR. (Nirbita, 2012)

e. Distribusi frekuensi responden berdasarkan paritas

Tabel 4.5


Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Paritas Ibu dan Status Gizi Ibu di Kabupaten Maros

Paritas	Gizi KEK ($<23,5$ CM)		Gizi Baik ($\geq 23,5$ CM)		Total	
	N	%	n	%	n	%
1	19	9,5	53	26,5	72	36
2-4	19	9,5	94	47	113	56,5
>4	1	0,5	14	7	15	7,5
Total	39	19,5	161	80,5	200	100

Sumber : Data Sekunder, Februari, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden paritas 2-4 dengan gizi baik sebanyak 94 responden (47%).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Pada penelitian ini didapatkan ibu yang primigravida melahirkan dengan gizi KEK sebanyak (9,5%) dan ibu dengan multigravida yang melahirkan dengan gizi KEK sebanyak (9,5%).

Pada ibu yang primigravida kejadian BBLR biasanya disebabkan karena pada ibu yang hamil untuk pertama kalinya memiliki kecendrungan gizi yang kurang sebab kurangnya persiapan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu saat kehamilannya. (Nirbita, 2012).

Pada ibu yang multigravida BBLR terjadi disebabkan oleh adanya faktor resiko paritas karena sistem reproduksi ibu yang mengalami penipisan akibat sering melahirkan. Hal ini terjadi karena kualitas endometrium semakin menurun, kehamilan yang berulang akan mempengaruhi sirkulasi nutrisi ke janin yang mana pada hal ini jumlah nutrisi akan berkurang dibandingkan saat kehamilan sebelumnya (Mahayana, 2015).

2. Analisa Bivariat

a. Hubungan Status Gizi Ibu Berdasarkan LILA Dengan BBLR

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel *independent* (Status gizi) dan variabel *dependent* (Bayi Berat Badan Lahir Rendah) dengan uji statistik dengan menggunakan uji *Chi-Square* dengan tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$.

Hubungan status gizi ibu hamil berdasarkan LILA dengan kejadian bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros periode Januari-Desember 2019.

Tabel 4.6

Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LILA Dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember 2019

Status Gizi	Berat Badan Lahir				Total		Syimmetric Measures
	BBLR		BBLN		n	%	
	N	%	n	%			n
Gizi KEK	30	15	9	4,5	39	19,5	P-Value 0,000
Gizi Baik	70	35	91	45,5	161	80,5	
Total	100	50	100	50	200	100	

Sumber : Data Sekunder, Februari, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 200 responden yang memiliki LILA <23,5 (KEK) sebanyak 30 responden (15%) ibu yang melahirkan dengan BBLR dan 9 responden (4,5%), sedangkan ibu yang memiliki LILA >23,5 (Gizi baik) yang melahirkan dengan BBLR sebanyak 70 responden (35%) dan ibu yang memiliki gizi baik yang melahirkan dengan BBLN sebanyak (45,5%).

Berdasarkan hasil uji *Chi-Square*, di dapatkan nilai *Significancy* nilai *P- value* $0,000 < \alpha (0,05)$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara status gizi ibu dengan berat badan lahir anak.

Tabel 4.7

Hasil Uji Korelasi Pearson

Correlations			
		Status Gizi (LILA)	BBLR
Status Gizi (LILA)	Pearson Correlation	1	0,265
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	200	200
BBLR	Pearson Correlation	0,265	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	200	200

**** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**

Dari analisis korelasi pearson didapat korelasi antara status gizi ibu berdasarkan lila dengan BBLR adalah 0,265. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antar status gizi berdasarkan LILA Ibu dengan BBLR karena dari hasil analisis data Uji Korelasi Pearson diperoleh Nilai r Hitung 0.265 lebih besar dari r table 0.138 untuk N = 200, dan Nilai signifikansi p-value <0.005 (0.408).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tabel 4.8

Hasil Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Pearson

Variabel	r_{xy} Hitung	r_{xy} Tabel	Kesimpulan
Gizi (LILA)- BBLR	0.265	0,138	Ada Hubungan

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Gizi (LILA) terhadap BBLR diperoleh $r_{xy} \text{ Hitung} > r_{xy} \text{ Tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima,

yang berarti bahwa ada hubungan status gizi ibu berdasarkan LILA dengan kejadian BBLR di Kabupaten Maros periode Januari-Desember 2019.

Pada penelitian ini di dapatkan hasil menunjukkan bahwa dari 100 responden yang memiliki gizi KEK memiliki anak berat badan lahir normal sebanyak 9 anak (4,5%), dan anak yang berat badan lahir rendah sebanyak 30 anak (15%) sedangkan ibu dengan gizi baik memiliki anak dengan berat badan lahir normal sebanyak 91 anak (45,5%) dan anak dengan berat badan lahir rendah sebanyak 70 anak (35%).

Berdasarkan hasil uji *Chi-Square*, di dapatkan nilai *Significancy* nilai P $0,000 < \alpha$ (0,05). Dan pada ujia korelasi terdapat hubungan yang positif dan signifikan antar LILA Ibu dengan BBLR karena dari hasil analisis data Uji Korelasi Pearson diperoleh Nilai r Hitung 0.265 lebih besar dari r table 0.138 untuk $N = 200$, dan Nilai signifikansip-value < 0.005 (0.408)

Penyebab terjadinya BBLR secara umum bersifat multifaktorial, sehingga kadang mengalami kesulitan untuk melakukan tindakan pencegahan. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin antara lain BBLR, terhambatnya perkembangan otak, bayi lahir dengan kurang darah (anemia), bayi mudah terkena infeksi, dan dapat menyebabkan abortus (Nirbita, 2012).

Hubungan status gizi dengan kejadian BBLR merupakan hal yang sangat penting karena pada masa kehamilan kebutuhan nutrisi meningkat, nutrisi ibu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi janin yang sedang tumbuh dan berkembang. Kondisi kehamilan yang disertai dengan kekurangan energi kronis (KEK) akan meningkatkan resiko kelahiran bayi dengan berat lahir rendah. Masalah KEK sering terjadi pada masa kehamilan dan merupakan masalah yang penting yang harus diatasi. Pengukuran status gizi pada masa kehamilan dilakukan dengan melakukan pengukuran lingkaran lengan atas (LILA), pengukuran ini merupakan cara untuk mendeteksi terjadinya kekurangan energi protein secara kronis. (Afrida, 2019).

Berat badan bayi merupakan cerminan dari status kesehatan dan gizi ibu selama hamil serta pelayanan antenatal yang diterima ibu. Ibu yang hamil dengan kondisi yang normal, tidak sering menderita sakit dan tidak ada gangguan gizi pada masa pra hamil maupun saat hamil. Lingkaran lengan atas (LILA) ibu hamil sangat mempengaruhi kesempurnaan perkembangan janin selama dalam kandungannya lingkaran lengan atas hanya dapat digunakan untuk kebutuhan *screening* dalam mengidentifikasi wanita hamil yang beresiko tinggi melahirkan bayi BBLR. (Putri, 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan Evasari (2016) terdapat hubungan antara status gizi ibu dengan kejadian BBLR karena selama hamil janin memperoleh nutrisi dari ibunya. Oleh sebab itu status gizi

ibu merupakan faktor penting yang mempengaruhi berat bayi pada saat dilahirkan karena begitu terjadi kehamilan mulai dari pembuahan saat itu juga janin yang disebut embrio akan tumbuh dan berkembang dengan cepat oleh karena itu apa yang terjadi pada janin tergantung dari suplai gizi yang baik dari ibu.

Menurut asumsi peneliti ada hubungan yang signifikan antara hubungan status gizi Ibu hamil berdasarkan LILA dengan kejadian bayi berat badan lahir rendah (BBLR) di Kabupaten Maros periode januari-desember tahun 2019. BBLR merupakan bayi yang lahir dengan berat badan lebih rendah dari berat bayi rata-rata. Bayi dinyatakan mengalami BBLR jika beratnya <2500 gram. Terlepas dari hal tersebut banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya BBLR salah satunya yakni status gizi yang kurang pada ibu selama hamil. Menurut Putri (2020), terdapat pengaruh status gizi ibu hamil dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dengan ($P\ value = 0,001$). Hasil ini membuktikan bahwa ada hubungan antara pengaruh status gizi ibu hamil dengan kejadian berat badan lahir rendah dengan hasil yang di dapatkan dalam penelitiannya menunjukkan 69,4% ibu mengalami KEK selama hamil pada kelompok kasus atau ibu yang melahirkan BBLR sedangkan pada kelompok kontrol atau ibu yang tidak melahirkan BBLR status gizi kurang Selama hamil sebanyak 30,6%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase ibu yang KEK atau kurang gizi selama hamil.

Dari hasil penelitian Sengkey (2017), hasil penelitian yang didapatkan terdapat hubungan signifikan ($p = 0,000$) antara status gizi ibu berdasarkan pengukuran LILA dengan kejadian BBLR. Oleh karena itu sangat penting bagi ibu hamil untuk rutin melakukan pemeriksaan ANC dan selalu memantau status gizi selama kehamilan sehingga risiko terjadinya BBLR bisa lebih dihindari.

Dari table 4.6 diatas juga didapatkan bahwa terdapat 70 sampel yang gizi baik dan mengalami BBLR, salah satu faktor yang mungkin berperan dalam hal ini adalah tingkat pendidikan ibu. Dalam penelitian Pelagia dkk (2013) menjelaskan bahwa terdapat hubungan Pendidikan ibu yang bersalin di RS Pusura Surabaya dengan kejadian BBLR.

b. Hubungan Paritas Ibu Dengan BBLR

Tabel 4.9

Hubungan Paritas Ibu Dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember 2019

Paritas					Total		Symmetric Measures <i>P-Value</i> (0.175)
	BBLR		BBLN				
	N	%	n	%	n	%	
1	41	20,5	31	15,5	72	36	
2-4	50	25	63	31,5	113	56,5	
>4	9	4,5	6	3	15	7,5	
Total	100	50	100	50	200	100	

Sumber : Data Sekunder, Februari, 2021

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Paritas Ibu dengan BBLR karena dari hasil analisis data Uji Chi Square didapatkan $p\text{-value} > 0.05$ (0.175)

Tabel 4.10

Hasil Uji Korelasi Pearson

		Correlations	
		Paritas Ibu	Berat Badan Lahir
Paritas Ibu	Pearson	1	0,059
	Correlation		0,408
	Sig. (2-tailed)		200
	N	200	
Berat Badan Lahir	Pearson	0,059	1
	Correlation	,408	
	Sig. (2-tailed)	200	200
	N		200

Dari analisis korelasi pearson tidak didapat korelasi antara paritas ibu dengan BBL adalah 0,059. Tidak terdapat hubungan yang positif antar paritas ibu dengan BBL karena dari hasil analisis data Uji Korelasi Pearson diperoleh Nilai r Hitung 0.059 lebih kecil dari r table 0.138 untuk $N = 200$, dan Nilai signifikansi $p\text{-value} > 0.005$ (0.408).

Tabel 4.11

Hasil Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Pearson

Variabel	r_{xy} Hitung	r_{xy} Tabel	Kesimpulan
Paritas-Berat Badan Lahir	0.059	0,138	Tidak Ada Hubungan

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel paritas terhadap BBL diperoleh $r_{xy} \text{ Hitung} < r_{xy} \text{ Tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa tidak ada hubungan paritas dengan BBL di Kabupaten Maros periode Januari-Desember 2019.

Dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, di dapatkan data (20,5%) jumlah paritas 1, (25%) jumlah paritas 2-4, dan (4,5%) jumlah paritas >4. Dengan nilai *P value* yakni (0,175) dan hasil analisis data Uji Korelasi Pearson diperoleh Nilai *r* Hitung 0.059 lebih kecil dari *r* table 0.138 untuk $N = 200$, dan Nilai signifikansi *p-value* >0.005 (0.408) . Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara Paritas dengan kejadian BBLR. Hal ini sejalan dengan penelitian Perwiraningtyas (2020), dimana pada penelitiannya nilai signifikan yang didapatkan (1,000) >0,05. Jumlah tersebut terdistribusi berbeda jauh sehingga sehingga tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian BBLR. Hasil tersebut bertentangan dengan teori yang menyatakan adanya hubungan antara paritas dengan BBLR.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang hubungan status gizi ibu berdasarkan LILA dengan kejadian BBLR dan hubungan paritas dengan BBLR maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada hubungan antara status gizi ibu hamil dengan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros periode Januari-Desember 2019
2. Berat badan lahir bayi di Kabupaten Maros periode Januari-Desember 2019 sebagian lahir dengan BBLR
3. Tidak ada hubungan antara paritas dengan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros periode Januari-Desember 2019

B. Saran

1. Bagi peneliti
Diharapkan dapat mengembangkan pola berpikir yang ilmiah serta berpikir kritis dalam menerapkan ilmu yang telah didapat selama studi serta menambah pengetahuan dan pengalaman membuat skripsi pada bidang kesehatan. Diharapkan juga agar penelitian selanjutnya agar dapat meneliti terkait hubungan status gizi berdasarkan IMT dengan kejadian BBLR.
2. Bagi responden
Diharapkan dapat lebih memperhatikan konsumsi makanan dan asupan nutrisi selama kehamilannya agar anak yang kelak lahir, dapat lahir secara sehat.
3. Bagi tempat penelitian saya
Diharapkan agar bisa rutin melakukan penyuluhan mengenai pentingnya konsumsi nutrisi yang seimbang dan bergizi guna melahirkan anak yang sehat dan dengan berat badan lahir yang normal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida. (2019). *Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Aterm Dengan Berat Badan Lahir Bayi*. Jurnal Akademika Baiturrahim 8(2):153-156.
- [Almatsier S.\(2004\). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.](#)
- [Arisman. \(2009\). *Gizi Daur Kehidupan*. Jakarta: EGC.](#)
- Arisman. (2010). *Gizi dalam daur kehidupan*. Jakarta: EGC.
- Arda, Darmi. (2015). *Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Di Ruang PNC RSUD Kota Makassar*. Jurnal Kesehatan 2(1):841-851.
- Astuti., dkk. (2012). “*Hubungan Antara Status Gizi Ibu Hamil Dengan Kejadian BBLR di RB Karya Rini Magelang*”. Skripsi. Stikes Jendral Ahmad Yani, Yogyakarta
- Cunningham., & Garry, F. (2017). *Obstetri Williams Edisi 21 Vol 2*. Jakarta: EGC.
- [Depkes, RI. \(2003\). *Program Penanggulangan Gizi Pada Wanita Umur Subur \(WUS\)*. Direktorat gizi masyarakat dan Binkesmas. Jakarta: Depkes RI.](#)
- Dinkes, RI. (2014). *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2014*. Jakarta : Kementrian Republik Indonesia.
- Dinkes. (2017). "*Profil Kesehatan Kabupaten Maros 2017*". Maros: Dinas Kesehatan
- Ekawanti. (2017). “*Hubungan Anemia Dalam Kehamilan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Puskesmas Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Hingga 2016*”. Skripsi. Jurusan Kebidanan, Politeknik Ilmu Kesehatan, Kendari.
- Evasari, Erlyna., & Elsa Nurmala. (2016). *Hubungan Umur, Paritas dan Status Gizi Ibu Dengan Kejadian BBLR*. Jurnal Obstetrika Scientia 4(20):15-16.

- Fajriana, Amima., & Annas Buanasita. (2018). *Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah Di Kecamatan Semampir Surabaya*. Media Gizi Indonesia: 13(1): 71-80.
- Ferial, E.W. (2011). *Hubungan Antara Status Gizi Ibu Berdasarkan Ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) dengan Bayi Berat Badan Lahir Rendah di RSUD Daya Kota Makassar*. Jurnal Alam dan Lingkungan. Vol(23).
- Hasdianah, H.R., et al. (2013). *Pemanfaatan Gizi, Diet, dan Obesitas*. Yogyakarta: Muha Medika.
- Hasdianah. (2014). *Pemanfaatan Gizi, Diet dan Obesitas*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Hasriyani, Hasriyani., et al. (2018). *Berbagai Faktor Risiko Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah*. Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas 3.(2):91-101.
- Indrawati, Siti., & Suratini Suratini. (2015). *Hubungan Status Gizi Ibu Hamil dengan Kejadian BBLR di Wilayah Puskesmas Minggir Kabupaten Sleman*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah, Yogyakarta.
- Karasahin E., dkk, (2012). *Maternal Anemia and Perinatal Out Come*. Perinatal Journal Vol:15(3):129.
- Kemenkes, RI. (2018). “Riset Kesehatan Dasar Badan Litbangkes Kemenkes RI”. <http://www.litbang.kemendes.go.id>. Diakses 29 September 2020.
- Kemenkes. (2016). “Profil kesehatan Indonesia Tahun 2016. Kemenkes RP”. <http://pusdatin.kemendes.go.id//article/view>. Diakses 29 September 2020.
- Kemenkes. (2016). “Infodatin Pust Data dan Informasi Kementrian Kesehatan ri: Situasi dan Analisis Gizi Pusdatin Kemenkes RI”. <http://pusdatin.kemendes.go.id/folder/view>. Diakses 30 September 2020.
- Mayanda, Vinta. (2017). *Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Dengan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) RSIA Mutia Sari Kecamatan Mandau*. Jurnal Manara Ilmu. 11(1):74.

- Merzalia, Nita. (2012). *Determinan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2011*. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
- Moore, V.M., dkk. (2004). Dietary composition of pregnant woman is related to size of the baby at birth. *Journal Of Nutrition*. 134(7):1820-1826.
- Nirbita, Elga Mia. (2012). *Hubungan Antara Status Gizi Ibu Hamil Dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Di Puskesmas Bangsal Mojokerto*. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya.
- Permatasari, Dian A. (2008). "*Hubungan Status Gizi ibu hamil dengan Berat Badan Lahir Bayi di RSUD DR.Mewardi Surakarta*". Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Pranoto, Heni Hirawati., & Hapsari Hindayanti. (2018). *Efektivitas Metode Kantong Plastik Dalam Pencegahan Hipotermi Pada BBLR Di Kabupaten Semarang*. *Indonesian Journal Of Midwivery* 1(1):54
- Prawirohardjo, Sarwono. (2008). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Bina Pustaka.
- Proverawati, Atika., & Cahyo, Ismawati. (2010). *Bayi Berat Badan Lahir Rendah*. Yogyakarta: Nuha Media.
- Pudjiadi S. (2003). *Ilmu Gizi Klinik Pada Anak*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia.
- Puspitaningrum, Elisa Murti. (2018). "*Hubungan Status Gizi Ibu Hamil dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di RSIA Annisa Kota Jambi Tahun 2018*". *Scientia Journal* 7.2 (2018): 1-7.
- Putri AR., & Muqsith A. (2015). *Hubungan Lingkar Lengan Atas Ibu Hamil dengan Berta Badan Bayi di Rumah Sakit Umum Cut Muetiah Kabupaten Aceh Utara dan Rumah Sakit TK.IV IM.07.01 Lhokseumawe*

- Tahun 2015. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*. 2(1):3-6.
- Putri, Satrianti. (2020). *Pengaruh Status Gizi Ibu Hamil Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang*. *Jurnal Literasi*.
- Ratuain, M. O., dkk. (2015). *Hubungan antara masa gestasi dengan kejadian ikterus neonatorum. Kesehatan Ibu dan Anak*. *Jurnal Kesehatan*7(1) 51–54.
- Sengkey, Claudia Stefanni. (2017). “*Hubungan Status Gizi Berdasarkan Pengukuran LILA Dengan Terjadinya BBLR Di RSUD Dr.M.Soewandhie 2017*”. Skripsi. Fakultas Kedokteran. Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya
- Septa Wira, Darmawan MTS. (2011). *Faktor Resiko Bayi Bayi Berat Badan Lahir Rendah Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2010*. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*.3(8).
- Septira S. (2016). “*Nutrisi Bagi Bayi-Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) untuk Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Majority*”. *Jurnal Kedokteran* 5(3):151-154.
- Sistriani, C. (2008). “*Faktor Maternal dan Kualitas Pelayanan Antenatal yang Berisiko terhadap Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Studi pada Ibu yang Periksa Hamil Ke Tenaga Kesehatan dan Melahirkan di RSUD Banyumas*”. Tesis. Fakultas Kesehatan Masyarakat Kota Semarang, Universitas Diponegoro.
- Strategi, K. D. A. N. (2019). “*Gizi Masyarakat FGD Skrining Malnutrisi Pada Anak Di Rumah Sakit Hotel Luwansa 22 Februari 2019 Kebijakan Dan Strategi Penanggulangan Stunting Di Indonesia*”. Diakses 5 Oktober 2020. <https://www.persi.or.id/images/2019/data>.
- Supiati. (2016). *Karakteristik Ibu kaitannya dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah*. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional*, 1(1): 1-99.

Sulistyoningsih, Haryani. (2012). *Gizi Untuk Kesehatan Ibu dan Anak*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Supriasa. (2016). *Penilaian Status Gizi*. Jakarta. EGD.

Supriasa, I.N. (2016). *Penilaian Status Gizi*. Jakarta:EGC.

United Nations. (2015). International Strategy for Disaster Reduction. Secretariat *Global*

Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015. Emergency Journal 19(1):3-5.

Wahyuni, S. (2008). "Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Gizi dengan Status Gizi Ibu Hamil di Puekesmas Nusukan Nusantara". Karya Tulis Ilmiah. Fakultas Kedokteran Sebelas Maret, Surakarta.

WHO. (2016). *"Ambition and Action in Nutrition"*. Retrieved from" Diakses 11 Oktober 2020. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/>

Zulhaida, L. (2003). "Status Gizi Ibu Hamil Serta Pengaruh pada Bayi yang Dilahirkan". Jakarta: Gramedia Pustaka.



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Muhammad Zulfikar
2. NIM : 70600117007
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Alamat : Perumnas Tumalia Blok E 89, Kabupaten Maros
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : DRS. Mukramin (ALM)
 - b. Ibu : DRA. Arika

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD 60 Inpres Perumnas Tumalia
2. SMP : SMP Negeri 1 Maros
3. SMA : SMA Negeri 1 Belang
4. Tahun 2017 melanjutkan pendidikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar