

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
PADA NY “N” DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN
DI RSU BAHAGIA MAKASSAR
TAHUN 2022**



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh:

ALAUDDIN
M A K A S S A R

NURHAFNI
NIM. 70400118064

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhafni
NIM : 70400118064
Tempat/Tgl.lahir : Pinrang, 04 November 1999
Jurusan/Fakultas : DIII Kebidanan/Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny "N" Dengan Preeklampsia Ringan Di RSUD Bahagia Makassar Tahun 2022”.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sepuh hati bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar yang merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari ternyata merupakan duplikat, plagiat atau seluruhnya atau sebagian dibuat oleh orang lain, maka karya tulis ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, Maret 2023

Penulis

NURHAFNI
NIM: 70400118064

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH


Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny "N" Dengan Preeklampsia Ringan Di RSUD Bahagia Makassar Tahun 2022" Yang disusun oleh Nurhafni Nim: 70400118064, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 30 Maret 2023, bertepatan dengan Tanggal 08 Ramadhan 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Mahdya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 30 Maret 2023
08 Ramadhan 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Firdayanti, S.SiT., M.Keb	(.....)
Sekretaris	: Anieq Mumthi'ah Al Kautzar S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Penguji I	: A. Dian Diarfah, M.Psi., Psikolog	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Kasjim Salenda, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH


Nama : Nurhafni
Nim : 70400118064
Judul : MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
PADA NY "N" DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN DI RSU
BAHAGIA MAKASSAR TAHUN 2022


Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, Kamis 30 Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb
NIP. 19870924 201903 2 012


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dan diusahakan bernilai ibadah di sisi-Nya. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. Nabi yang telah memeberikan pencerahan dan petunjuk kebenaran kepada Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny “N” Dengan Preeklampsia Ringan Di RSUD Bahagia Makassar Tahun 2022”** Karya Tulis Ilmiah ini di susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya Kebidanan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun dari penyajiannya. Oleh karena itu, saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan oleh penulis guna memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada dalam Karya Tulis Ilmiah ini. Oleh karena itu ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya penulis sampaikan kepada:

1. Kepada kedua Orang tua, Ayahanda tercinta Sabri yang sangat menyayangi saya sampai sekarang, yang selalu berjuang mencari nafkah untuk keluarga dan Ibu tercinta Suharni yang memberikan kasih sayang


yang tiada henti mengasuh, mendidik dan membina penulis dengan ikhlas, penuh pengorbanan baik lahiriah maupun batin serta senantiasa selalu sabar dalam mengajarkan banyak hal kepada penulis dan kekhusyukan do'a yang selalu terucap dalam setiap sholat beliau untuk penulis yang tiada hentinya, tanpa kalian penulis tidak akan bisa dan sampai pada titik seperti ini.

2. Kepada Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A,Ph.D. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Kepada Ibunda Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang telah menuntun, mengajar dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa di Fakultas selama masa Pendidikan.
4. Ibunda Firdayanti, S.Si.T.,M.Keb. Selaku ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibunda Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST., M.Keb. selaku Sekretaris Prodi jurusan Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibunda Ferawati Taherong, S.ST.,M.Keb. Selaku pembimbing I yang telah membimbing Karya Tulis Ilmiah dan telah menuntun, mendidik,

mengajarkan, dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah studi kasus laporan tugas akhir ini.

7. Ibunda A. Dian Diarfah, M.Psi., Psikolog Selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Ustadz Prof. Dr. Kasjim Salenda, M.Ag. Selaku penguji agama yang senantiasa memberikan tambahan ilmu agama serta memberikan masukan, kritik, dan saran yang bersifat islamiah pada Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi
10. Gubernur Sulawesi Selatan / Badan Peneliti dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Kepala RSUD Bahagia Makassar dan para stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.
12. Kepada semua teman-teman Kebidanan 2018 khususnya kelas B yang telah memberi dukungan, motivasi, dan warna di bangku perkuliahan serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pengembangan ilmu di bidang kebidanan pada umumnya. Penulis menyadari kekurangan yang tak dapat dihindari pada Karya Tulis Ilmiah ini, sehingga kritik dan saran yang membangun dari segala pihak guna untuk kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini. Terima Kasih.



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Ruang lingkup pembahasan.....	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Metode penelitian	8
F. Sistematika penulis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Khusus Tentang Kehamilan	11
1. Kehamilan.....	11
2. Proses Trejadinya Kehamilan	12
3. Perubahan dan adaptasi psikologi dalam masa kehamilan	15
4. Tanda-tanda kehamilan.....	16
5. Kebutuhan Nutrisi Ibu Hamil Trimester I, II, III Yang Disertai Dengan Preeklampsia	19
B. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi dalam Kehamilan.....	21
1. Pengertian	21
C. Tinjauan Umum Tentang Preklamansia	24
1. Defenisi.....	24
2. Faktor Resiko.....	25
3. Patofisiologi.....	28
4. Klasifikasi Preeklampsia	36
5. Diagnosis Preeklampsia.....	37

6. Komplikasi Preeklampsia	37
7. Penatalaksanaan Preeklampsia	42
D. Tinjauan Manajemen Asuhan	44
1. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	44
2. Pendokumentasian asuhan kebidanan (SOAP).....	53
BAB III STUDI KASUS	55
A. Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 7 Langkah Varney	55
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	78
BAB IV PEMBAHASAN	103
A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar	103
B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual	108
C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial	111
D. Langkah IV : Identifikasi Tindakan Segera/Kolaborasi.....	115
E. Langkah V : Rencana Tindakan	115
F. Langkah VI : Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan	119
G. Langkah VII : Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan	121
H. Pendokumentasian.....	123
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	130
PENDOKUMENTASIAN	134
LAMPIRAN.....	135
RIWAYAT HIDUP	139

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH TAHUN 2022

Nurhafni, 70400118064

Pembimbing I : Ferawati, S.ST,M.Keb

Pembimbing II : Dr. dr. Syatirah, SP.A,M.kes

Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny "N" Dengan Preeklampsia Ringan Di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar

Hipertensi dalam kehamilan merupakan salah satu tanda dari kejadian preeklampsia. Di Indonesia kematian ibu pernah menduduki peringkat pertama disebabkan oleh preeklampsia 30% dan komplikasi/perdarahan yaitu 31%. Hipertensi pada kehamilan masih merupakan penyebab utama kematian maternal dan perinatal terutama di negara berkembang diperkirakan 15-40% kematian maternal berhubungan langsung dengan hipertensi pada kehamilan dan sampai 30% janin meninggal khususnya eklampsia.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan kebidanan Antenatal pada Ny "N" dengan Preeklampsia di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar Tanggal 31 November 2021 sampai 04 Februari 2022. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus sesuai dengan diterapkan 7 Langkah Varney dan SOAP Kunjungan Rumah.

Berdasarkan penelitian studi kasus dengan Manajemen Asuhan kebidanan 7 Langkah Varney didapatkan hasil bahwa ibu dengan Preeklampsia Ringan yang berusia 37 tahun mengeluh sakit kepala yang disertai dengan rasa pusing sejak tanggal 29 November 2021 dengan hasil ttv tekanan darah 150/100. Asuhan kebidanan yang dilakukan adalah beri obat nivedipine 10 (2x1) sesuai dengan intruksi dari dokter, jelaskan tanda bahaya kehamilan, memberikan helalth education pada ibu, anjurkan ibu tentang diet seimbang dan makan makanan yang tinggi protein, menganjurkan ibu untuk ke fasilitas kesehatan apabila mengalami kelainan, dan menganjurkan keluarga mempersiapkan untuk persalinan dan kelahiran bayinya.

Kesimpulan dari hasil studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian. Asuhan menunjukkan bahwa ibu sudah dalam keadaan umum baik, kesadaran composmentis, dan TTV dalam batas normal. Asuhan yang telah diberikan ditandai dengan semua tindakan yang telah direncanakan dan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan.

Kata Kunci : Antenatal Pada Ny "N" Dengan Preeklampsia Ringan



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, YEAR 2022

Nurhafni, 70400118064

Supervisor I : Ferawati, S.ST., M.Keb

Supervisor II : Dr. dr. Syatirah, SP.A., M.kes

The Antenatal Midwifery Care Management on Mrs “N” with the Case of Mild Preeclampsia at Bahagia General Hospital of Makassar

Hypertension in pregnancy is one of the major signs of preeclampsia. In Indonesia, the main causes of maternal mortality have been preeclampsia cases (30%) and complications/bleeding (31%). Hypertension in pregnancy is still a major cause of maternal and perinatal death, especially in developing countries. It revealed that 15-40% of maternal deaths are directly related to hypertension in pregnancy, and up to 30% of fetal deaths was caused by eclampsia.

The major purpose of this research was to conduct antenatal midwifery care management on Mrs “N” with the case of mild preeclampsia at Bahagia general hospital of Makassar. The study was conducted on November 31st to February 4th 2022. The methodological approach used in this research was a case study approach. Moreover, the 7-stage of Varney management approach and SOAP documentation procedure were also employed in this study.

This research indicated that the patient, aged 37 years old, had complained of headaches and dizziness since November 29th, 2021 with the initial TTV blood pressure results of 150/100. The midwifery care treatment was given was according to the doctor's instructions in the form of nivedipine 10 (2x1). The patient was also informed about the danger signs of pregnancy. In addition, the patient was advised to have a balanced diet and eat foods with high protein. Eventually, she was also encouraged to come back to the hospital if any problems occurred.

This research concluded that the patient's condition was considered to be good, especially after the treatments were given. The patient was in a composmental awareness, and her TTV level was within normal limits. It could be suggested that all the treatments were properly given without any particular obstacles.

Key Words: Antenatal Care, Mild Preeclampsia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan merupakan fertilisasi atau bertemunya sel telur (ovum) wanita dengan sel benih (spermatozoa) pria. Penyatuan dari spermatozoa dan ovum dilanjutkan dengan pembelahan sel (zigot). Setelah terjadinya pembelahan sel maka akan terjadi nidasi atau implantasi pada lapisan endometrium dinding kavum uteri. Pertumbuhan dan perkembangan zigot–embrio–janin menjadi bakal individu baru (Setiawati, 2013: 7).

Janin yang bakal menjadi individu baru akan terus bertumbuh dan berkembang sesuai usia kehamilan. Jika proses pertumbuhan dan perkembangan janin tidak berjalan dengan normal maka akan menyebabkan masalah pada kehamilan yang diawali dari hasil bertemunya sperma dengan ovum yang tidak menempel dengan sempurna ke rahim, kemungkinan pertumbuhan janin yang terhambat berbagai macam penyakit ibu yang mengancam kehamilan, hingga proses kelahiran yang juga mempunyai resiko tersendiri. Salah satu penyakit yang sering mengancam kehamilan adalah hipertensi dalam kehamilan (Kaimudin, 2018: 3).

Hipertensi dalam kehamilan merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering muncul selama kehamilan dan dapat menimbulkan komplikasi pada 2–3% kehamilan. Kejadian hipertensi pada kehamilan sekitar 5-5%, dan merupakan satu di antara 3 penyebab morbiditas dan mortalitas ibu bersalin di samping infeksi dan perdarahan. Frekuensi komplikasi pada kehamilan dan persalinan juga meningkat

pada ibu hamil yang mengalami hipertensi. Dampak dari hipertensi kehamilan lebih lanjut antara lain risiko kematian maternal, angka prematuritas, berat badan bayi lahir rendah, dan angka kematian perinatal meningkat (Cory, dkk, 2016: 69).

Peningkatan angka kematian perinatal dan ibu jika hipertensi dalam kehamilan tidak segera ditangani. Hipertensi dalam kehamilan merupakan 5-15 % penyulit kehamilan dan cukup tinggi. Hal ini disebabkan selain oleh etiologi tidak jelas, juga oleh perawatan dalam persalinan yang masih ditangani oleh petugas non medik dan sistem rujukan yang belum sempurna. Hipertensi dalam kehamilan dapat dialami oleh semua kalangan ibu hamil baik itu yang primigravida maupun yang multiparitas sehingga pengetahuan tentang pengelolaan hipertensi dalam kehamilan harus benar-benar dipahami oleh semua tenaga medik baik di pusat maupun di daerah (Uli, dkk, 2017: 18).

Tenaga medik pusat maupun daerah harus memahami betul Manajemen Asuhan Kebidanan sehingga dapat mencegah berbagai macam masalah dalam kehamilan seperti kematian pada ibu. Menurut data *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2018 banyak wanita yang menderita dan meninggal karena masalah serius selama kehamilan dan persalinan. Pada 2015, diperkirakan 303.000 wanita diseluruh dunia meninggal karena komplikasi dalam kehamilan. Hampir semua kematian ini (99%) terjadi di dataran rendah negara berpenghasilan menengah. Untuk mengurangi kematian ibu dilakukan perawatan berkualitas sebelum, selama dan setelah melahirkan. WHO merekomendasikan wanita hamil itu memulai kontak perawatan antenatal pertama pada trimester pertama kehamilan. Perawatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini kondisi yang mungkin

berdampak buruk pada kehamilan yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian (WHO, 2018).

Kematian ibu di Indonesia didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan infeksi. Namun proporsinya telah berubah, dimana perdarahan dan infeksi cenderung mengalami penurunan sedangkan hipertensi dalam kehamilan proporsinya semakin meningkat. Lebih dari 25% kematian ibu di Indonesia pada tahun 2013 disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan (Uli, dkk, 2017: 9).

Hipertensi dalam kehamilan merupakan salah satu tanda dari kejadian preeklampsia. Di Indonesia kematian ibu pernah menduduki peringkat pertama disebabkan oleh preeklampsia 30% dan komplikasi/perdarahan yaitu 31%. Hipertensi pada kehamilan masih merupakan penyebab utama kematian maternal dan perinatal terutama di negara berkembang diperkirakan 15-40% kematian maternal berhubungan langsung dengan hipertensi pada kehamilan dan sampai 30% janin meninggal khususnya eklampsia (Ardhiyanti, 2018: 59).

Eklampsia merupakan salah satu penyumbang angka kematian ibu di tahun 2017 berkurang 41 kasus, dibanding dengan tahun 2016. Penurunannya sebesar 26 persen dan pada tahun 2018 tercatat jumlah kematian ibu di provinsi Sulawesi Selatan mencapai 115 kasus. Kasus tersebut dijumpai di Rumah Sakit Umum dengan presentase 79,13% atau sebanyak 91 kasus. Kemudian terjadi di rumah dengan 9 kasus atau sekitar 7,83%, lalu ditemukan di puskesmas dengan 7 kasus atau 6,08%, di jalan 5 kasus atau 4,35%, dipustu 2 kasus atau 1,74% dan rumah bersalin 1 kasus atau 0,87%. Berdasarkan data Dinkes Sulawesi Selatan

terdapat 11 kabupaten yang angka kematian ibu dan bayi tertinggi yakni Gowa di urutan pertama, Bone posisi kedua, Jeneponto posisi ketiga dan Bulukumba, Pangkep dan Luwu adalah posisi ke empat. Lalu posisi ke lima ada Sinjai, Maros, Toraja sedangkan Luwu utara dan Makassar merupakan urutan ke enam. Salah satu penyebab kematian ibu di Sul-Sel disebabkan oleh preeklampsia (Dinkes Sul-Sel, 2018).

Preeklampsia berdampak pada kehamilan ibu. Preeklampsia berat akan memicu terjadinya eklampsia yang dapat mengakibatkan kejang pada saat kehamilan. Pada teori *Intoleransi Immunologi* preeklampsia akan berpengaruh antara ibu dan janin apabila resiko preeklampsia meningkat jika terjadi gangguan pembentukan blocking antibodies terhadap plasenta (bersifat antigenetik) seperti pada kehamilan pertama, kehamilan kembar (dimana jumlah antigen yaitu plasenta melebihi jumlah antibody). Pada preeklampsia terjadi penurunan jumlah human leukocyte antigen-G (HLA-G), atau plasenta memproduksinya dalam bentuk lain sehingga terjadi intoleransi ibu terhadap plasenta (Ayu, dkk: 2020: 2).

Preeklampsia juga akan mengakibatkan sindrom maternal yang merupakan tahap simptomatis yang umumnya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu ditandai dengan hipertensi, kerusakan ginjal dengan endoteliosis glomerulus yang menyebabkan proteinuria, eklampsia, sindroma hemolisis, peningkatan enzim liver, dan trombositopenia (HELLP) dan kerusakan organ-organ lainnya. Gejala klinis tersebut disebabkan oleh aktivitas sel-sel endotel yang telah terjadi pada tahap pertama dengan respon inflamasi sistemik di seluruh organ tubuh yang

ditandai dengan peningkatan permeabilitas vaskuler serta hipoperfusi organ (Ayu, dkk: 2020: 3).

Komplikasi preeklampsia berat bagi janin dapat menyebabkan *Intrauterine fetal growth restriction* (IUGR), solusio plasenta, prematuritas, sindroma distress napas, dan kematian janin intrauterine, hipoksia pada janin intrauteri, kemudian komplikasi bagi ibu adalah perdarahan intrakranial, gagal ginjal akut, dan edema paru, trombositopenia (Prawirohardjo, 2014).

Berdasarkan laporan data rekam medik Rumah sakit Bahagia Makassar tentang jumlah preeklampsia berat pada tahun 2018 sebanyak 12 kasus, tahun 2019 sebanyak 10 kasus, dan pada tahun 2020 meningkat drastis sebanyak 12 kasus. dan pada tahun 2021 pada bulan januari sampai february terdapat 8 kasus (Rekam Medik RSU Bahagia Makassar, 2021).

Melihat kasus preeklampsia setiap tahun semakin meningkat yang dapat menimbulkan komplikasi yang lebih berat dan mempengaruhi status kesehatan ibu dan anak, maka peran bidan sangat penting terutama dalam hal pemberian pendidikan kesehatan tentang pola istirahat yang dibutuhkan ibu hamil dengan kasus hipertensi dan mampu memberikan asuhan pada ibu agar dapat mengurangi keluhan yang dialami. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan preeklampsia”.

B. Ruang lingkup pembahasan

Berdasarkan latar belakang di atas maka ruang lingkup yang ingin di angkat oleh penulis adalah: "Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal dengan Preeklampsia di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar tahun 2021.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dapat mengetahui asuhan kebidanan yang di berikan pada ibu hamil dengan Preeklampsia di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar tahun 2021.

2. Tujuan khusus

1. Dilaksanakannya pengkajian pada ibu hamil dengan Preeklampsia di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar tahun 2021.
2. Dirumuskan diagnosa/masalah aktual yang terjadi pada ibu hamil dengan Preeklampsia di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar tahun 2021
3. Dirumuskan diagnosa/masalah potensial yang terjadi pada ibu hamil dengan Preeklampsia di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar tahun 2021
4. Dilakukan tindakan atau kolaborasi pada ibu hamil dengan Preeklampsia di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar tahun 2021

5. Ditetapkannya rencana asuhan kebidanan yang akan di berikan kepada ibu hamil dengan Preeklampsia di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar tahun 2021
6. Dilaksanakan asuhan kebidanan yang telah di susun pada ibu hamil dengan Preeklampsia di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar tahun 2021
7. Diketuainya hasil evaluasi asuhan kebidanan yang telah di berikan pada ibu hamil dengan Preeklampsia di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar tahun 2021
8. Didokumentasikan semua hasil tindakan asuhan kebidanan yang telah di berikan pada ibu hamil dengan Preeklampsia di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar tahun 2021

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Ilmiah

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan tentang komplikasi kehamilan khususnya Preeklamsia.

2. Manfaat bagi Institusi

Diharapkan penelitian ini bisa di jadikan sumber ilmu tambahan bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa kebidanan agar mampu memberikan asuhan kebidanan yang tepat pada ibu dengan komplikasi kehamilan terutama preeklamsia. Selain itu, dapat pula menjadi tambahan informasi dan untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan beberapa metode.

1. Metode Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, jurnal dan literatur yang berhubungan dengan Preeklampsia.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi: indentifikasi data dasar, indentifikasi diagnosa/masalah aktual, indentifikasi diagnosa/masalah potensial, melakukan tindakan segera/kolaborasi, merenvanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, evaluasi asuhan kebidanan dan melakukan dokumentasi asuhan kebidanan.

3. Studi Pendokumentasian

Membaca dan mempelajari status kesehatan yang berhubungan dengan keadaan ibu melalui buku status pasien yang dapat memberikan informasi mengenai asuhan kebidanan yang di lakukan pada ibu dengan Preeklampsia.

4. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan ibu serta keluarga ibu dan melakukan diskusi dengan pembimbing Institusi dan pembimbing lahan yang membantu dalam penyusunan karya tulis ilmiah.

F. Sistematika Penulisan


Adapun sistematika penulisan yang di gunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri dari Bab 1 pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisa serta sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pusataka yang akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang kehamilan, tinjauan umum tentang hipertensi dalam kehamilan, tinjauan khusus tentang preeklampsia, tinjauan kehamilan menurut pandangan islam, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Kemudian pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnose/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di RSUD Bahagia Makassar dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan preeklampsia.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan.

1. Kehamilan

Masa kehamilan yaitu dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus adalah kira-kira 280 hari, dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu). Kehamilan 40 minggu ini disebut matur (cukup bulan). Bila kehamilan lebih dari 43 minggu disebut kehamilan postmatur. Kehamilan antara 28 dan 36 minggu disebut kehamilan prematur (Nadyah, 2013: 37).

Masa kehamilan di mulai dari konsepsi sampai lahirnya janin adalah kira-kira 280 hari (40 minggu) dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu). Kehamilan di bagi menjadi tiga triwulan II dari 12 sampai 28 minggu dan triwulan III dari sampai 40 minggu (Marmi, 2011:101).

Kehamilan adalah bagian dari tahapan atau siklus hidup seorang wanita. Perubahan fisik maupun psikologis yang terjadi selama kehamilan bersifat fisiologis bukan patologis. Asuhan yang diberikan diupayakan untuk membantu ibu beradaptasi dengan perubahan selama hamil dan mengantisipasi keadaan abnormal dari perubahan fisik maupun psikologis ibu (Bartini, 2012: 6).

2. Proses Terjadinya Kehamilan

Fertilisasi (pembuahan) adalah persatuan ovum (oosit sekunder) dan spermatozoa yang biasanya berlangsung di ampula tuba. Fertilisasi meliputi penetrasi spermatozoa ke dalam ovum, fusi spermatozoa dan ovum diakhiri dengan fusi materi genetik. Hanya satu spermatozoa yang telah mengalami proses kapasitas mampu melakukan penetrasi membran sel ovum. Untuk mencapai ovum spermatozoa harus melewati korona radiata yaitu dua lapisan yang menutupi dan mencegah ovum mengalami fertilisasi lebih dari satu spermatozoa. Suatu molekul komplemen khusus dipermukaan kepala spermatozoa kemudian mengikat ZP3 glikoprotein di zona pelusida. Pengikatan ini memicu akrosom melepaskan enzim yang membantu spermatozoa menembus zona pelusida (Prawirohardjo, 2014: 139-146).

Dari beberapa jam setelah pembuahan terjadi, mulailah pembelahan zigot. Hal ini dapat berlangsung oleh karena sitoplasma ovum mengandung banyak zat asam amino dan enzim. Segera setelah pembelahan ini terjadi, pembelahan–pembelahan selanjutnya berjalan dengan lancar, dan dalam 3 hari terbentuk suatu kelompok sel yang sama besarnya. Hasil konsepsi berada dalam stadium morula. Energi untuk pembelahan ini diperoleh dalam vitelus, sehingga volume vitelus semakin berkurang dan terisi seluruhnya oleh morula. Dengan demikian, zona pelusida tetap utuh, atau dengan perkataan lain, besarnya hasil konsepsi tetap sama. Dalam ukuran yang sama ini hasil konsepsi disalurkan terus ke pars ismika dan pars interstisial tuba (bagian–bagian tuba yang sempit) dan terus disalurkan ke arah kavum uteri oleh arus

serta gerakan silia pada permukaan sel-sel dan kontaksi tuba (Prawirohardjo, 2014: 139-146).

Selanjutnya pada hari keempat hasil konsepsi mencapai stadium blastula disebut blastokista, suatu bentuk yang di bagian luarnya adalah trofoblas dan dibagian dalamnya disebut massa *inner cell*. Massa *inner cell* ini berkembang menjadi janin dan trofoblas akan berkembang menjadi plasenta. Dengan demikian, blastokista diselubungi oleh suatu simpai yang disebut dengan keberhasilan nidasi (implantasi), produksi hormon kehamilan, proteksi imunitas bagi janin, peningkatan aliran darah maternal ke dalam plasenta, dan kelahiran bayi, sejak trofoblas terbentuk, produksi hormon *Human Chorionic Gonadotropin* (hCG) dimulai, suatu hormon yang memastikan bahwa endometrium akan menerima (reseptif) dalam proses kehamilan (Prawirohardjo, 2014: 139-146).

Nidasi diatur oleh proses yang kompleks antara trofoblas dan endometrium. Di satu sisi trofoblas mempunyai kemampuan invasif yang kuat, disisi lain endometrium mengontrol invasi trofoblas dengan menyekresi faktor-faktor yang aktif plasentasi yang normal adalah hasil keseimbangan proses antara trofoblas dan endometrium (Prawirohardjo, 2014: 139-146).

Invasi trofoblas diatur oleh pengaturan kadar hCG. Sinsiotrofoblas menghasilkan hCG yang akan mengubah sitotrofoblas menyekresikan hormon yang noninvasif. Trofoblas yang semakin dekat dengan endometrium menghasilkan kadar hCG yang semakin rendah, dan membuat trofoblas berdiferensiasi dalam sel-sel jangkar yang menghasilkan protein perekat

placenta yaitu *troobouteronectin*. Trofoblas-trofoblas invasif lain lepas dan bermigrasi kedalam endometrium dan miometrium akan menghasilkan protease dan inhibitor protease yang diduga memfasilitasi proses invasi kedalam jaringan maternal (Prawirohardjo, 2014: 139-146).

Kelainan dalam optimalisasi aktivitas trofoblas dalam proses nidasi akan berlanjut dengan berbagai macam penyakit dalam kehamilan. Apabila invasi trofoblas ke arteri spiralis maternal lemah atau tidak terjadi maka arus darah uteroplacenta rendah dan menimbulkan sindrom preeklampsia. Kondisi ini juga akan menginduksi placenta menyekresikan substansi vasoaktif yang memicu hipertensi maternal. Kenaikan tekanan darah ibu dapat merusak arteri spiralis dan tersumbat, sehingga terjadi infark placenta. Sebaliknya invasi trofoblas yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyakit trofoblas gestasional seperti mola hidatidosa dan kariokarsinoma (Prawirohardjo, 2014, 139-146).

Selanjutnya pembentukan struktur dan jenis placenta. Setelah nidasi embrio kedalam endometrium, plasentasi di mulai. Pada manusia plasentasi berlangsung sampai 12-18 minggu setelah fertilisasi. Dalam 2 minggu pertama perkembangan hasil konsepsi, trofoblas invasif telah melakukan penetrasi ke pembuluh darah endometrium. Terbentuklah sinus intertrofobalstik yaitu ruangan–ruangan yang berisi darah maternal dari pembuluh–pembuluh darah yang dihancurkan. Pertumbuhan ini berjalan terus, sehingga timbul ruangan–ruangan interviler dimana vili korialis seolah-olah terapung–apung di antara

ruangan–ruangan tersebut sampai terbentuknya plasenta (Prawirohardjo, 2014, 139-146).

3. Perubahan dan adaptasi psikologi dalam masa kehamilan

a. Pada Trimester 1

Trimester pertama sering sekali di anggap sebagai periode penyesuaian. Penyesuaian yang di lakukan wanita adalah terhadap kenyataan bahwa ia sedang mengandung. Penerimaan terhadap kenyataan dan arti semua ini bagi dirinya merupakan tugas psikologis yang paling penting bagi dirinya. Dalam trimester ini wanita menjadi ambivalen. Kurang lebih 80% wanita mengalami kekecewaan, penolakan, kecemasan, depresi, dan kesedihan. Akan tetapi bagi wanita terutama mereka yang telah merencanakan kehamilan atau telah berusaha keras untuk hamil, merasa suka cita sekaligus tidak percaya bahwa dirinya telah hamil dan mencari bukti kehamilan pada setiap jengkal tubuhnya (Marmi, 2011: 963-965).

b. Pada Trimester II

Trimester kedua sering dikenal sebagai periode kesehatan yang baik, yakni periode ketika wanita merasa nyaman dan bebas dari segala rasa ketidaknyamanan yang normal di alami oleh ibu hamil. Trimester kedua di bagi menjadi dua fase yakni fase pra-quickening dan pasca quickening. Quickening menunjukkan kenyataan adanya kehidupan yang terpisah, yang menjadi dorongan bagi wanita dalam melaksanakan tugas psikologis utamanya pada trimester ini yakni

mengembangkan identitas sebagai ibu bagi dirinya yang berbeda dari ibunya (Marmi, 2011: 963-965).

c. Pada Trimester III

Trimester ketiga ini sering disebut periode penantian dengan penuh kewaspadaan. Ia mulai menyadari kehadiran bayi sebagai makhluk yang terpisah sehingga ia tidak sabar menantikan kelahiran sang bayi dan dalam trimester ini merupakan waktu persiapan yang aktif menantikan kelahiran bayinya. Hal ini membuat ia berjaga-jaga dan menunggu tanda dan gejala persalinan. Sejumlah ketakutan ada pada trimester ini yaitu merasa cemas dengan kehidupan bayinya dan dirinya sendiri (Marmi, 2011: 963-965).

4. Tanda–Tanda Kehamilan

a. Tanda Yang Tidak Pasti/Tanda Mungkin Kehamilan

1) Amenorhea

Bila seorang wanita dalam masa mampu hamil, apabila sudah kawin mengeluh terlambat haid, maka perkiraan bahwa dia hamil, meskipun keadaan stress, obat-obatan, penyakit kronis dapat pula mengakibatkan terlambat haid.

2) Mual dan muntah

Mual dan muntah merupakan gejala umum, mulai dari rasa tidak enak sampai muntah yang berkepanjangan. Dalam kedokteran sering dikenal dengan *morning sickness* karena munculnya seringkali di pagi hari. Mual dan muntah diperberat oleh makanan yang baunya

menusuk dan juga oleh emosi penderita yang tidak stabil. Untuk mengatasi penderita diberi makanan-makanan ringan, mudah dicerna.

3) Mastodinia

Mastodinia adalah rasa kencang dan sakit pada payudara disebabkan payudara membesar. Pembesaran payudara disebabkan oleh stimulasi hormon estrogen, progesteron, hormon plasenta laktogen (hPL) dan sedikit prolaktin yang mengakibatkan bertambahnya vaskularisasi dan proliferasi asinus dan duktus kelenjar mammae. Mastodinia dapat pula terjadi pada masa pra-menstruasi

4) *Quickening*

Quickening adalah persepsi gerakan janin pertama, biasanya disadari oleh wanita pada kehamilan 18-20 minggu.

5) Keluhan kencing

Frekuensi kencing bertambah dan sering kencing malam, disebabkan karena desakan uterus yang membesar dan tarikan oleh uterus ke *cranial*.

6) Konstipasi

Ini terjadi karena efek relaksasi progesterone yang menyebabkan relaksasi otot polos, termasuk otot polos usus, menyebabkan tonus otot polos berkurang, suka kontraksi sehingga sukar buang air besar. Konstipasi juga dapat berubah karena pola makanan.

7) Perubahan berat badan

Pada kehamilan 2-3 bulan sering terjadi penurunan berat badan karena nafsu makan menurun dan muntah-muntah. Pada bulan selanjutnya berat badan akan terus meningkat sampai stabil menjelang aterm.

8) Perubahan temperatur basal

Kenaikan temperatur basal lebih dari 3 minggu biasanya merupakan tanda telah terjadinya kehamilan

9) Perubahan warna kulit

Perubahan ini antara lain *chloasma* yakni warna kulit yang kehitam-hitaman pada dahi, punggung, hidung dan daerah tulang pipi, terutama pada wanita warna kulit tua. Biasanya muncul pada usia kehamilan 16 minggu. Pada daerah dan puting payudara, warna kulit menjadi lebih hitam. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh stimulasi *melanocyte stimulating hormone* (MSH)

10) Perubahan payudara

Akibat stimulasi prolaktin dan HPL, payudara mensekresi kolostrum, biasanya setelah kehamilan lebih dari 16 minggu.

11) Perubahan uterus

Uterus mengalami perubahan pada ukuran, bentuk dan konsistensi. Uterus berubah menjadi lunak, bentuknya globular. Teraba balotement, tanda ini muncul pada minggu ke 16-20 minggu, setelah rongga rahim mengalami obliterasi dan cairan amnion cukup banyak.

12) Tanda piskacek

Terjadinya pertumbuhan yang asimetris pada bagian uterus yang dekat dengan implantasi plasenta (Pantiawati, 2010: 75-78).

b. Tanda Pasti Kehamilan

1) Denyut jantung janin (DJJ)

2) Palpasi yang akan jelas setelah minggu ke 22. Gerakan janin dapat dirasakan sangat jelas setelah 24 minggu.

3) Ultrasonografi (USG)

4) Rontgenografi

Gambaran tulang-tulang janin tampak setelah minggu ke 12 sampai 14.

Pemeriksaan ini boleh dikerjakan bila terdapat keraguan dalam diagnosa kehamilan dan atas indikasi yang mendesak sekali, sebab janin sangat peka terhadap sinar X.

5) *Fetal electrocardiografi* (ECG) dapat direkam pada minggu ke 12.

6) Tes laboratorium bertujuan untuk mendeteksi adanya hCG dalam urin (Pantiawati, 2010: 75-78).

5. Kebutuhan Nutrisi Ibu Hamil Trimester I, II, III Yang Disertai Dengan Preeklampsia

Sangat penting untuk memperhatikan kebutuhan nutrisi seorang ibu hamil. Karena makanan yang dikonsumsi ibu bukanlah untuk ibu sendiri tetapi juga untuk sang jabang bayi. Sehingga ibu wajib memperhatikan kebutuhan nutrisinya. Kebutuhan nutrisi ibu hamil trimester I, II, III berbeda-beda sesuai

dengan kebutuhannya. Berikut ini merupakan informasi kebutuhan nutrisi ibu hamil yang sering di kaitkan dengan hipertensi.

1. Lemak

Lemak dapat membantu tubuh untuk menyerap banyak nutrisi. Lemak juga menghasilkan energi dan menghemat protein untuk dimanfaatkan dalam fungsi-fungsi pertumbuhan. Namun demikian, dalam keadaan hamil sekalipun ibu hamil harus membatasi asupan lemak karena kebiasaan makan-makanan berlemak sering dihubungkan dengan tekanan darah karena mengonsumsi lemak berlebih dapat memicu penebalan pada dinding arteri (*ateroklerosis*) yang merupakan faktor penyebab terjadinya hipertensi. Makanan yang tinggi lemak antara lain daging berlemak, susu, keju, mentega, margarin dan minyak (Sukfitrianty, dkk, 2016: 75).

2. Garam

Garam dapat membantu mengatur air dalam darah. Kebutuhan tubuh akan garam sedikit, sekitar 2000 hingga 8000 mg perhari. Beberapa ibu terkena tekanan darah tinggi karena mengonsumsi garam berlebih yang menyebabkan sirkulasi darah terganggu sehingga jantung akan bekerja lebih kuat dan akhirnya tekanan darah seseorang akan tinggi (Corry, dkk, 2016: 72).

3. Kolesterol

Kolesterol memang diperlukan oleh tubuh kita, namun bila di konsumsi berlebihan akan mendatangkan gangguan kesehatan seperti terjadinya penyumbatan darah sehingga jantung akan bekerja lebih kuat

dalam memompa darah. Ada pun makanan yang tinggi kolesterol antara lain hati sapi, lobster, daging merah, ayam goreng, kentang goreng, dan kuning telur (Sukfitrianty, dkk, 2016: 85).

B. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi Dalam Kehamilan

1. Pengertian

Kehamilan merupakan suatu keadaan fisiologi, tetapi ada beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kehamilan penuh dengan ancaman. Salah satu penyakit yang sering mengancam kehamilan adalah hipertensi dalam kehamilan keadaan ini dapat menyebabkan morbiditas pada janin (termasuk pertumbuhan janin terhambat didalam rahim, kematian janin dalam rahim dan kekahiran prematur) serta morbiditas pada ibu (termasuk kejang preeklampsia, pendarahan otak, edema paru, gagal ginjal akut dan penggumpalan darah) bahkan menyebabkan kematian ibu (Kaimmudin, dkk, 2018: 2).

Hipertensi merupakan salah satu masalah medis yang sering muncul selama kehamilan dan dapat menimbulkan komplikasi pada 2-3 persen kehamilan. Hipertensi pada kehamilan dapat menyebabkan morbiditas/kesakitan pada ibu termasuk kejang eklampsia, pendarahan otak, edema paru (cairan dalam paru), gagal ginjal akut, dan penggumpalan/pengentalan darah didalam pembuluh darah. Serta morbiditas pada janin salah satunya yaitu pertumbuhan janin terhambat di dalam rahim, kematian janin di dalam rahim, solusio plasenta/plasenta terlepas dari tempat melekatnya di rahim, dan kelahiran prematur (Fadlun, 2014: 49).

Hipertensi dalam kehamilan adalah tekanan darah yang lebih tinggi dari 140/90 mmHg yang disebabkan karena kehamilan itu sendiri, memiliki potensi yang menyebabkan gangguan serius pada kehamilan. Nilai normal tekanan darah seseorang yang disesuaikan dengan tingkat aktifitas dan kesehatan secara umum adalah 120/80 mmHg. Tetapi secara umum, angka pemeriksaan tekanan darah menurun saat tidur dan meningkat diwaktu beraktivitas dan berolahraga (Rukiyah, 2010: 167).

Selama kehamilan, pembuluh darah menjadi rileks (mengendur) karena pengaruh hormon progesteron. Pengaruh hormon ini juga turut meningkatkan elastisitas dan menurunkan tekanan darah pada perempuan. Secara normal, tekanan darah sedikit meningkat selama 12 minggu pertama masa kehamilan. Kemudian, tekanan darah akan menurun lagi sekitar minggu ke 12 sampai minggu ke 28. Inilah alasan mengapa wanita hamil sering merasa pusing.

Selama kehamilan, volume komponen dari cairan darah (yang disebut plasma) meningkat hingga 50%. Peningkatan jumlah cairan ini berakibat pada makin enceranya darah menurun, khususnya selama 32 minggu pertama masa kehamilan. Jumlah darah (volume darah) juga meningkat sampai 50% selama 32 minggu pertama masa kehamilan.

Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan tekanan darah secara dramatis yang mendorong “efek rileks” dari hormon progesteron dan proses “pengenceran” darah seiring dengan perkembangan janin. Begitu tekanan darah meningkat, tekanan darah akan mulai kembali turun (biasanya selama 12 minggu akhir masa kehamilan), dan sering kembali ke tingkat tekanan

sebagaimana yang dialami oleh si ibu sebelum hamil atau bahkan sedikit lebih tinggi (Ana, 2010: 33-34).

Diagnosis hipertensi dalam kehamilan dapat didefinisikan yaitu tekanan diastolik 15 mmHg diatas hasil pemeriksaan sebelumnya atau tekanan darah sistolik 30 mmHg diatas hasil pengukuran sebelumnya. Atau tekanan darah diastolik diatas 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan interval waktu empat jam atau lebih atau tekanan darah diastolik.

Keadaan hipertensi pada ibu hamil dapat timbul baik itu sebagai komplikasi kehamilan yang didapat oleh ibu dalam kehamilannya, ataupun hipertensi yang telah dialami ibu sejak sebelum hamil dan berlanjut selama kehamilan. Berdasarkan klarifikasi pada ibu hamil ditemukan 4 kelompok hipertensi dalam kehamilan:

- a. Hipertensi kronik: keadaan hipertensi yang muncul sebelum kehamilan atau pada kehamilan sebelum usia 20 minggu dapat timbul sebagai hipertensi sekunder yang biasanya jarang ditemukan pada ibu hamil dan disebabkan oleh penyakit kronik seperti penyakit ginjal menahun, penyakit revaskuler, dan penyakit endokrin, namun dapat juga timbul sebagai hipertensi esensial (primer) yakni hipertensi yang tidak jelas etiologinya, baik itu faktor genetik maupun faktor lingkungan.
- b. Preeklampsia dan eklampsia: hipertensi yang muncul pada usia kehamilan >20 minggu disertai dengan protein urin dan edema. Preeklampsia yang disertai dengan kejang disebut dengan eklampsia (Darmawansyih, 2014: 89-93).

- c. *Superimposed preeklampsia* adalah hipertensi kronik disertai dengan tanda-tanda preeklampsia atau hipertensi kronik disertai protein urin (Prawirohardjo, 2014: 531).
- d. Hipertensi gestasional merupakan hipertensi yang berkembang pada bagian akhir kehamilan, tidak berhubungan dengan protein urin atau gambaran preeklampsia dan akan menghilang setelah 12 minggu postpartum. Keadaan ini bisa menandakan akan terjadi hipertensi kronik pada masa yang akan datang, tetapi mempunyai hubungan dengan hasil yang baik terhadap ibu dan janin (Fitriani, 2014: 162).

C. Tinjauan Khusus Tentang Preeklampsia

1. Defenisi

Preeklampsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan pada trimester I dan II. Ini adalah suatu kondisi medis dimana timbul hipertensi dalam kehamilan pada usia kehamilan 20 minggu dan ditemukannya protein dalam urin. Gejala-gejalanya berupa peningkatan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg dan disertai proteinuria. Disinilah diperlukan control kehamilan, karena terkadang munculnya penyakit ini tidak disadari. Bila penyakit ini tidak terkontrol, maka dapat timbul gejala-gejala seperti sakit kepala dibagian depan yang terus menerus, pandangan mata kabur, nyeri ulu hati, dan muntah (Setiawati, 2013: 139).

Preeklampsia adalah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, proteinuria dan oedema yang timbul karena kehamilan. Penyakit ini umumnya terjadi dalam triwulan ke 3 pada kehamilan, tetapi dapat terjadi sebelumnya.

Preeklampsia juga kumpulan gejala yang timbul pada ibu hamil, ibu bersalin dan dalam masa nifas yang terdiri dari trias yaitu hipertensi, proteinuria dan oedema yang kadang-kadang di serati konvulsi sampai koma, ibu tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan vascular atau hipertensi sebelumnya (Rukiyah, 2014: 172).

Preeklampsia adalah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, oedema, dan proteinuria yang timbul karena kehamilan. Penyakit ini biasanya timbul pada triwulan ke 3 kehamilan. Akan tetapi dapat timbul sebelumnya (Marmi, 2011: 66).

2. Faktor Resiko

Terdapat banyak faktor risiko untuk terjadi preeklampsia yang dapat dikelompokkan dalam faktor risiko yaitu:

a. Primigravida

Ibu hamil yang masuk dalam primigravida dianggap sebagai salah satu faktor risiko untuk mengalami preeklampsia menurut teori yang mengatakan bahwa angka kejadian untuk primigravida, muda maupun tua lebih tinggi. Adapun teori intoleransi imunologik yang menjelaskan hal tersebut bahwa dugaan faktor imunologik berperan terhadap terjadinya preeklampsia terbukti dengan fakta bahwa primigravida mempunyai risiko lebih besar terjadinya preeklampsia jika dibandingkan dengan multigravida. Hal ini karena adanya respons imun menolak adanya hasil konsepsi yang bersifat asing. Sehingga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya hipertensi gestasional (Jumaiza, dkk, 2018: 113).

b. Hiperplasentosis

Pada kehamilan normal plasenta juga melepaskan debris trofoblas sebagai sisa-sisa proses apoptosis trofoblas, akibat reaksi stres oksidatif. Berbeda dengan proses apoptosis pada preeklampsia, dimana pada preeklampsia terjadi peningkatan stres oksidatif, sehingga produksi debris apoptosis juga meningkat. Makin banyak sel trofoblas plasenta misalnya mola hidatidosa, kehamilan multipl, diabetes melitus, hidrops fetalis, bayi besar, maka stres oksidatif akan sangat meningkat, sehingga jumlah sisa debris trofoblas juga makin meningkat sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala preeklampsia (Prawirohardjo, 2014: 536-537).

c. Umur yang ekstrim

Faktor usia berpengaruh terhadap kemampuan rahim untuk menerima bakal janin. Pada usia di atas 35 tahun, organ reproduksi sudah mengalami penurunan fungsi, jaringan rongga panggul dan otot-ototnya sudah melemah sejalan dengan penambahan usia. Hal ini membuat rongga panggul dan otot-ototnya sudah melemah sejalan dengan penambahan usia. Hal ini membuat rongga panggul tidak mudah lagi menghadapi dan mengatasi komplikasi yang berat sehingga usia di atas 35 tahun beresiko mengalami partus lama. Selain partus lama usia di atas 35 tahun dapat menyebabkan hipertensi, sedangkan pada umur di bawah 20 tahun, rahim dan panggul belum tumbuh mencapai ukuran dewasa, akibatnya ibu bisa terjadi komplikasi seperti hipertensi (Nadyah, 2013: 76).

Dengan bertambahnya umur, resiko terkena hipertensi menjadi lebih besar sehingga prevalensi hipertensi dikalangan usia lanjut cukup tinggi. Tingginya hipertensi sejalan dengan bertambahnya umur, hal ini disebabkan oleh perubahan struktur pada pembuluh darah menjadi lebih kaku, sebagai akibat adalah meningkatnya tekanan darah sistolik (Sukfitrianty, dkk, 2016: 83).

d. Riwayat keluarga yang pernah mengalami preeklampsia dan eklampsia

Hipertensi seperti banyak kondisi kesehatan lain, terjadi dalam keluarga. Jika salah satu (dua orang dari) orang tua atau saudara kandung menderita hipertensi maka peluang untuk terjadinya hipertensi sangat besar. Penelitian menunjukkan bahwa 25% dari kasus hipertensi esensial dalam keluarga mempunyai dasar genetik. Namun demikian, hal ini tidak berarti sesuatu yang pasti. Beberapa kesamaan yang tampak pada banyak keluarga justru mungkin merupakan dampak pengaruh lingkungan, pola makan dan keterampilan dalam menghadapi masalah (Casey, 2010: 19).

e. Penyakit Ginjal

Hipertensi dalam kehamilan mengakibatkan perubahan pada beberapa organ tidak terkecuali pada organ ginjal. Secara umum hipertensi dalam kehamilan menyebabkan terganggunya fungsi ginjal baik prerenal ataupun direnal. Pada hipertensi dalam kehamilan terjadi vasokonstriksi, yang mengakibatkan terjadinya penurunan aliran darah ke ginjal, sehingga laju filtrasi glomerulus (LFG) menurun dan laju ekskresi kreatinin dan urea juga menurun. Selain itu, pada bagian renal terjadi perubahan

parenkim ginjal, mengalami pembesaran glomerulus yang diikuti dengan pembengkakan sel endotel dan hilangnya fenestra endotel glomerulus. Kedua hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya akumulasi kreatin dan urea dalam cairan tubuh dan meningkatkan konsentrasinya dalam plasma (Casey, 2010: 18).

f. **Obesitas**

Kelebihan berat badan (obesitas) dan hipertensi sering beriringan, karena kenaikan berat badan pada ibu hamil melebihi 10-15 kg berat badan normal akan membuat jantung bekerja lebih keras. Obesitas akan membawa resiko penyakit yang lain seperti preeklampsia, diabetes gestasional, dan hipertensi gestasional. Obesitas yang terjadi pada saat kehamilan beresiko tinggi mempunyai peluang 5.140 kali mengalami hipertensi pada kehamilan dibandingkan dengan ibu yang tidak obesitas pada saat kehamilan (Uli, dkk, 2017: 12).

3. Patofisiologi

Meskipun patofisiologi preeklampsia hingga kini belum jelas, namun timbulnya hipertensi ini telah terbukti dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin (Darmawansyih, 2014: 93).

Banyak teori telah ditemukan tentang terjadinya hipertensi dalam kehamilan, tetapi tidak ada satu pun teori tersebut yang dianggap mutlak benar. Teori–teori sekarang banyak yang dianut. Beberapa teori diantaranya.

a. Teori kelainan vaskularisasi plasenta

Pada kehamilan normal, rahim dan plasenta mendapatkan aliran darah dari cabang-cabang arteri uterina dan arteria ovarika. Kedua pembuluh darah tersebut menembus miometrium berupa arteri arkuata dan arteri arkuata memberi cabang arteria radialis. Arteria radialis menembus endometrium menjadi arteri basalis dan arteri basalis memberi cabang arteria spiralis.

Pada hamil normal, dengan sebab yang belum jelas, terjadi invasi trofoblas ke dalam lapisan otot arteria spiralis, yang menimbulkan degenerasi lapisan otot tersebut sehingga terjadi dilatasi arteri spiralis. Invasi trofoblas juga memasuki jaringan sekitar arteri spiralis, sehingga jaringan matriks menjadi gembur dan memudahkan lumen arteri spiralis mengalami distensi dan dilatasi. Distensi dan vasodilatasi lumen arteri spiralis ini memberi dampak penurunan tekanan darah, penurunan resistensi vaskular, dan peningkatan aliran darah pada daerah utero plasenta. Akibatnya, aliran darah kejanin cukup banyak dan perfusi jaringan juga meningkat, sehingga dapat menjamin pertumbuhan janin dengan baik. Proses ini dinamakan "*remodeling arteri spiralis*".

Pada hipertensi dalam kehamilan tidak terjadi invasi sel-sel trofoblas pada lapisan otot arteri spiralis dan jaringan matriks sekitarnya. Lapisan otot arteri spiralis menjadi tetap kaku dan keras sehingga lumen arteri spiralis tidak memungkinkan mengalami distensi dan vasodilatasi. Akibatnya arteri spiralis relatif mengalami vasokonstriksi, dan terjadi

kegagalan “*remodeling arteri spiralis*”, sehingga aliran darah uteroplasenta menurun, dan terjadilah hipoksia dan iskemia plasenta. Dampak iskemia plasenta akan menimbulkan perubahan–perubahan yang dapat menjelaskan patogenesis HDK selanjutnya.

b) Teori iskemia plasenta, radikal bebas dan disfungsi endotel.

1) Iskemia plasenta dan pembentukan oksidan/radikal bebas

Plasenta yang mengalami hipoksia akan mengalami oksidan (radikal bebas). Oksidan atau radikal bebas adalah senyawa penerima elektron atau atom/molekul yang mempunyai elektron yang tidak terpasang.

Salah satu oksidan penting yang dihasilkan plasenta iskemia adalah radikal hidroksil yang sangat toksis, khususnya terhadap membran sel endotel pembuluh darah. Sebenarnya produksi oksidan pada manusia adalah suatu proses normal, karena oksidan memang dibutuhkan untuk perlindungan tubuh. Adanya radikal hidroksil dalam darah mungkin dahulu dianggap sebagai bahan toksin yang beredar dalam darah, maka dulu hipertensi dalam kehamilan disebut “*toxaemia*”. Radikal hidroksil akan merusak membran sel, yang mengandung banyak asam lemak tidak jenuh menjadi peroksida lemak selain akan merusak membran produksi oksidan (radikal bebas) dalam tubuh yang bersifat toksis, selalu diimbangi dengan produksi antioksidan (Pantiawati, 2010: 103-105).

2) Peroksida lemak sebagai oksidan dalam hipertensi dalam kehamilan

Pada hipertensi dalam kehamilan telah terbukti bahwa kadar oksidan khususnya peroksida lemak meningkat sedangkan antioksidan, misalnya vitamin E pada hipertensi dalam kehamilan menurun, sehingga terjadi dominasi kadar oksidan peroksida lemak yang relatif tinggi

Peroksida lemak sebagai oksidan/radikal bebas yang sangat toksis ini akan beredar di seluruh tubuh dalam aliran darah dan akan merusak membran sel endotel. Membran sel endotel lebih mudah mengalami kerusakan oleh peroksida lemak, karena letaknya langsung berhubungan dengan aliran darah dan mengandung banyak asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh sangat rentan terhadap oksidan radikal hidroksil, yang akan berubah menjadi peroksida lemak (Pantiawati, 2010: 103-105).

3) Disfungsi sel endotel

Akibat sel endotel terpapar terhadap peroksida lemak, maka terjadi kerusakan sel endotel yang kerusakannya dimulai dari membran sel endotel. Kerusakan membran sel endotel mengakibatkan terganggunya fungsi endotel, bahkan rusaknya seluruh struktur endotel. Keadaan ini disebut disfungsi endotel. Pada waktu terjadinya kerusakan endotel yang mengakibatkan disfungsi sel endotel, maka akan terjadi:

- a) Gangguan metabolisme prostaglandin, karena salah satu fungsi sel endotel, adalah memproduksi prostaglandin, yaitu menurunnya produksi prostasiklin (PGE₂) suatu vasodilatator kuat.
 - b) Agregasi sel-sel trombosit pada daerah endotel yang mengalami kerusakan. Agregasi sel trombosit ini adalah untuk menutup tempat-tempat dilapisan endotel yang mengalami kerusakan. Agregasi trombosit memproduksi tromboksan (TXA₂) suatu vasokonstriktor kuat.
 - c) Perubahan khas pada sel endotel kapilar glomerulus (*Glomerular Endotheliosis*)
 - d) Peningkatan permeabilitas kapilar.
 - e) Peningkatan produksi bahan-bahan vasopresor yaitu endotelin. Kadar NO (vasodilatator) menurun, sedangkan endotelin (vasokonstriktor) meningkat.
 - f) Peningkatan faktor koagulasi (Pantiawati, 2010: 103-105).
- b. Teori intoleransi imunologik antara ibu dan janin
- Dugaan bahwa faktor imunologik berperan terhadap terjadinya hipertensi dalam kehamilan terbukti dengan fakta sebagai berikut.
- 1) Primigravida mempunyai resiko lebih besar terjadinya hipertensi dalam kehamilan jika dibandingkan dengan multigravida.
 - 2) Ibu multipara yang kemudian menikah lagi mempunyai resiko lebih besar terjadinya hipertensi dalam kehamilan jika dibandingkan dengan suami sebelumnya.

- 3) Seks oral mempunyai resiko lebih rendah terjadinya hipertensi dalam kehamilan ialah makin lama periode ini, makin kecil terjadinya hipertensi dalam kehamilan (Prawirohardjo, 2014: 532-537).

Pada perempuan hamil normal, respons imun tidak menolak adanya hasil konsepsi yang bersifat asing. Hal ini disebabkan adanya *Human Leukocyte Antigen Protein G* (HLA-G), yang berperan penting dalam modulasi respons imun, sehingga si ibu tidak menolak hasil konsepsi (plasenta). Adanya HLA-G pada plasenta dapat melindungi trofoblas janin dan lisis oleh sel *Natural Killer* (NK) ibu (Prawirohardjo, 2014: 532-537).

Selain itu, adanya HLA-G akan memudahkan invasi sel trofoblas kedalam jaringan desidua ibu. Jadi HLA-G merupakan prakondisi untuk terjadinya invasi trofoblas ke dalam jaringan desidua ibu, disamping untuk menghadapi sel *Natural Killer*. Pada plasenta hipertensi dalam kehamilan, terjadi penurunan ekspresi HLA-G. Berkurangnya HLA-G di desidua daerah plasenta, menghambat invasi trofoblas kedalam desidua. Invasi trofoblas sangat penting agar jaringan desidua menjadi lunak, dan gembur sehingga memudahkan terjadinya dilatasi arteri spiral. HLA-G juga merangsang produksi sitikon, sehingga memudahkan terjadinya reaksi inflamasi. Kemudian terjadi *Immune-Maladaptation* pada preeklampsia (Prawirohardjo, 2014: 532- 537).

c. Teori adaptasi kardiovaskuler

Pada hamil normal pembuluh darah refrakter terhadap bahan-bahan vasopresor. Refrakter, berarti pembuluh darah tidak peka terhadap rangsangan bahan vasopresor, atau dibutuhkan kadar vasopresor yang lebih tinggi untuk menimbulkan respons vasokonstriksi. Pada kehamilan normal terjadinya refrakter pembuluh darah terhadap bahan vasopresor adalah akibat dilindungi oleh adanya sintesis prostaglandin pada sel endotel pembuluh darah. Hal ini dibuktikan bahwa daya refrakter terhadap bahan vasopresor akan hilang bila diberi prostaglandin ini kemudian hari ternyata adalah prostasiklin.

Pada hipertensi dalam kehamilan hilangnya daya refrakter terhadap bahan vasokonstriktor dan ternyata terjadi peningkatan kepekaan terhadap bahan-bahan vasopresor. Artinya daya refrakter pembuluh darah terhadap bahan vasopresor hilang hingga pembuluh darah menjadi sangat peka terhadap bahan vasopresor. Banyak peneliti telah membuktikan bahwa peningkatan kepekaan terhadap bahan-bahan vasopresor pada hipertensi dalam kehamilan sudah terjadi pada trimester 1. Peningkatan kepekaan pada kehamilan yang akan menjadi hipertensi dalam kehamilan, sudah dapat ditemukan pada kehamilan dua puluh minggu. Fakta ini dapat dipakai sebagai prediksi akan terjadinya hipertensi dalam kehamilan (Prawirohardjo, 2014: 532- 537).

d. Teori genetik


Ada faktor keturunan dan familial dengan model gen tunggal. Genotipe ibu lebih menentukan terjadinya hipertensi dalam kehamilan secara familial jika dibandingkan dengan genotipe janin (Prawirohardjo, 2014: 532- 537).

e. Teori stimulus inflamasi

Teori ini berdasarkan fakta bahwa lepasnya debris trofoblas didalam sirkulasi darah merupakan rangsangan utama terjadinya proses inflamasi. Pada kahamilan normal plasenta juga melepaskan debris trofoblas sebagai sisa-sisa proses apoptosis trofoblas, akibat reaksi stres oksidatif (Prawirohardjo, 2014: 532- 537).

Bahan–bahan ini sebagai bahan asing yang kemudian merangsang timbulnya proses inflamasi. Pada kehamilan normal, jumlah debris trofoblas masih dalam batas wajar, sehingga reaksi inflamasi juga msih dalam batas normal. Berbeda dengan proses apoptosis pada preeklampsia, dimana pada preeklampsia terjadi peningkatan stres oksidatif, sehingga produksi debris apoptosis dan nekrotik trofoblas juga meningkat. Makin banyak sel trofoblas plasenta, misalnya pada plasenta besar, pada hamil ganda, maka reaksi stres oksidatif akan sangat meningkat, sehingga jumlah sisa debris trofoblas juga makin meningkat. Keadaan ini akan mengaktivasi sel endotel, dan sel–sel magrofag/granulosit, yang lebih besar pula sehingga terjadi reaksi sistemik inflamasi yang menimbulkan gejala-gejala preeklampsia pada ibu (Prawirohardjo, 2014: 532- 537).

Patofisiologi



Gambar 2.1 patofisiologi preeklampsia
(Sumber: Asyifa Adawiyah, 2015)

4. Klasifikasi Preeklampsia

Preeklampsia di bagi menjadi 2 golongan yaitu:

a. Preeklampsia Berat

Preeklampsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi 150/110 mmHg atau lebih disertai proteinuria dan oedema pada kehamilan 20 minggu atau lebih

b. Preeklampsia Ringan

Preeklampsia ringan adalah timbulnya hipertensi di sertai proteinuria dan oedema setelah umur kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Gejala ini dapat timbul sebelum umur kehamilan 20 minggu pada penyakit trofoblas (Pudiastuti, 2012:163 dan 165).

5. Diagnosis Preeklampsia

a. Preeklampsia Ringan

- 1) Kehamilan lebih 20 minggu
- 2) Kenaikan tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih dengan pemeriksaan 2 kali selang 6 jam dalam keadaan istirahat (untuk pemeriksaan pertama dilakukan setelah istirahat 10 menit).
- 3) Oedema tekan pada tungkai (pretibial), dinding perut, lumbosakral, wajah atau tungkai.
- 4) Proteinuria lebih 0,3 gram/liter/24 jam kualitatif (++) (Pudiastuti, 2012:164)

b. Preeklampsia Berat

- 1) Tekanan darah 160/110 mmHg
- 2) Oligouria dan urin kurang dari 400 cc/24 jam
- 3) Proteinuria lebih dari 3 gr/liter
Keluhan subjektif seperti nyeri epigastrium, gangguan penglihatan, nyeri kepala, oedema paru dan sianosis, gangguan kesadaran.
- 4) Pemeriksaan kadar ezim hati meningkat di sertai ikterus, perdarahan pada retina, trombosit kurang dari 100.000/mm
(Norma, 2013: 61).

6. Komplikasi Preeklampsia

a. Kematian janin dalam rahim (KJDR)

Kematian janin dalam rahim terjadi akibat efek kerusakan yang terjadi pada pembuluh darah ibu hamil yang akan merusak sistem

vaskularisasi darah, sehingga mengganggu pertukaran oksigen dan nutrisi melalui plasenta dari ibu ke janin.

b. Persalinan prematur

Pada kasus preeklampsia dapat menyebabkan kelahiran prematur. Sebab, pada ibu hamil dengan tekanan darah tinggi, pembuluh daranya akan menyempit. Sehingga suplai oksigen ke organ-organ tubuh berkurang. Begitu pun suplai oksigen ke janin juga berkurang.

c. Pertumbuhan janin terhambat (IUGR).

Preeklampsia akan mempengaruhi pembuluh darah arteri yang mengalir darah ke plasenta, jika plasenta tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup maka bayi akan kekurangan oksigen dan nutrisi. Hal ini akan mengakibatkan pertumbuhan janin terhambat.

d. Solusio plasenta

Solusio plasenta adalah suatu keadaan dalam kehamilan, dimana plasenta yang tempat implantasinya normal (pada fundus atau korpus uteri) terkelupas atau terlepas sebelum kala III.

e. Penyakit kardiovaskular

Wanita yang mengalami preeklampsia ditandai dengan tingginya tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg untuk pertama kalinya dalam kehamilan di atas 20 minggu kehamilan dan terdapat protein urine beresiko mengalami peningkatan penyakit kardiovaskuler di masa yang akan datang, meskipun fakta menunjukkan bahwa tekanan darah akan kembali normal setelah melahirkan.

f. Penyakit pembuluh darah otak

Kondisi ini ditandai dengan pecahnya pembuluh darah otak akibat tingginya tekanan dalam pembuluh darah. Ibu hamil yang mengalami pendarahan di otak akan mengalami kerusakan karena adanya penekanan dari gumpalan darah, dan juga karena tidak mendapatkan pasokan oksigen akibat terputusnya aliran darah.

g. Gagal organ

Akibat sel endotel terpapar terhadap peroksida lemak, maka terjadi kerusakan sel endotel yang kerusakannya dimulai dari membran sel endotel. Kerusakan membran sel endotel mengakibatkan terganggunya fungsi endotel yang mengakibatkan disfungsi sel endotel.

h. Kematian atau henti nafas

Preeklampsia dapat mengakibatkan kematian yaitu dengan cara merusak organ terlebih dahulu seperti gagal jantung. Ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh, tekanan darah yang tinggi membuat jantung kerja lebih keras. Jantung harus melawan tekanan darah yang tinggi yang lama kelamaan akan membuat otot jantung menjadi lebih besar. Otot jantung yang membesar itu akan membuat jantung menjadi kaku dan bengkak (Situmorang, 2018: 3).

Dalam kasus ibu hamil dengan preeklampsia akan mengalami kelainan-kelainan selama kehamilannya yang bisa membuat tubuhnya semakin lemah. Sesuai dengan firman Allah swt pada surah Al-luqman: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿٨٨﴾

Terjemahan:

“Dan telah Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, dan hanya kepada Ku-lah kembalimu”.

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa manusia harus berbakti kepada orangtuanya, maksudnya kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya (ibunya telah mengandungnya) dengan susah payah (dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah) ia lemah karena mengandung, lemah sewaktu mengeluarkan bayinya, dan lemah sewaktu mengurus anaknya di kala bayi (dan menyapihnya) tidak menyusuinya lagi (dalam dua tahun, hendaknya) Kami katakan kepadanya (bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada Akulah kembalimu) yakni kamu akan kembali.

Al-Quran surah Al-maidah ayat:88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahan:

”Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Ayat tersebut diatas jelas-jelas telah menyuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lain sebagainya (Zulaekah S, dkk, 2015 :26).

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Terjemahan:

“Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya.” (HR Bukhari).”

Ini merupakan metode para ulama *ahlussunnah wal jama'ah* dalam menjawab pertanyaan. Sebelum dirinci, disebutkan terlebih dahulu dalil secara umum. Bahwa setiap penyakit ada obatnya dari sisi Allah *subhanahu wa ta'ala*. Jadi kita tidak perlu khawatir. Penyakit dalam urusan-urusan badan manusia saja Allah turunkan obatnya, apalagi penyakit hati yang berhubungan dengan benarnya keimanan seseorang yang mempengaruhi cinta, takut dan berharapnya kepada Allah. Tidak mungkin Allah melupakan bagi manusia.

Banyak angka kematian ibu yang disebabkan oleh suatu komplikasi pada saat kehamilan maupun persalinan yang menunjukkan bagaimana perjuangan seorang ibu atau orang tua seperti yang disebutkan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah Maryam:14

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾

Terjemahan:

"Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka"

Ini merupakan anjuran atau perintah untuk berbakti kepada kedua orangtuanya, taat dan patuh kepada mereka, dan dia bukanlah orang yang angkuh untuk taat kepada tuhan, juga untuk taat kepada kedua orangtuanya. Dia tidak durhaka kepada tuhan dan kepada kedua orangtuanya.

7. Penatalaksanaan Preeklampsia

a. Preeklampsia Ringan

Penatalaksanaan rawat jalan pasien preeklampsia ringan dengan cara ibu di anjurkan banyak istirahat (berbaring tidur/miring), diet cukup protein, rendah karbohidrat, lemak dan garam, pemberian sedativaringan: tablet Phenobarbital 3x30 mg atau diazepam 3x2 mg per oral selama 7 hari (atas instruksi dokter), roborantia, kunjungan ulang setiap 1 minggu, pemeriksaan laboratorium: hemoglobin, hemotokrit, trombosit, urin lengkap, asam urat darah, fungsi hati dan fungsi ginjal (Nugroho, 2012:7).

Penatalaksanaan rawat tinggal pasien preeklampsia ringan berdasarkan kriteria: setelah 2 minggu pengobatan rawat jalan tidak menunjukkan adanya perbaikan dari gejala-gejala perminggu selama 2 kali berturut-turut (2 minggu): timbul salah satu atau lebih gejala atau tanda-tanda preeklampsia berat (Nugroho, 2012: 7).

Bila setelah 1 minggu perawatan diatas tidak ada perbaikan maka Preeklampsia ringan dianggap sebagai preeklampsia berat. Jika dalam perawatan dirumah sakit sudah ada perbaikan sebelum 1 minggu dan kehamilan masih preterm maka penderita tetap dirawat selama 2 hari lagi baru di pulangkan. Perawatan lalu disesuaikan dengan perawatan rawat jalan (Nugroho, 2012:7).

Pada penderita preeklampsia dengan usia kehamilan <37 minggu bila desakan darah mencapai normotensif selama perawatan, persalinan di tunggu sampai aterm, Bila desakan darah turun tetapi belum mencapai normotensif selama perawatan maka kehamilannya dapat diakhiri pada umur kehamilan 37 minggu atau lebih. Kehamilan aterm (37 minggu atau lebih) persalinan di tunggu sampai terjadi onset persalinan atau dipertimbangkan untuk melakukan persalinan pada taksiran tanggal persalinan. Cara persalinan dapat di lakukan secara spontan bila perlu mempendek kala II (Rukiyah, 2014:176).

b. Preeklampsia Berat

Pada Preeklampsia berat, pengobatan yang dapat dilakukan secara medikal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Segera rujuk ke rumah sakit
- 2) Tirah baring ke kiri secara intermitten
- 3) Infus Ringer Laktat atau Ringer Dekstrose 5%
- 4) Pemberian anti kejang/ anti kovulsan magnesium sulfan ($MgSO_4$) sebagai pencegahan dan mengatasi kejang pada preeklampsia berat dan eklampsia. Syarat Pemberian $MgSO_4$:

- (a) Frekuensi pernafasan minimal 16x/menit
 - (b) Refleks patella (+)
 - (c) Urin minimal 30 ml/jam dalam 4 jam terakhir atau 0,5 ml/kgBB/jam
 - (d) Siapkan ampul Kalsium Glukonas 10% dalam 10 ml
- 5) Anti hipertensi di berikan bila tensi $> 180/110$ mmHg atau MAP >126
- (a). Obat nivedipine 10-20 mg/oral, diulangi setelah 20 menit maksimal pemberian obat 120 mg dalam 24 jam. Nifedipine tidak dibenarkan sublingual karena absorpsi yang terbaik adalah melalui saluran pencernaan makanan.
 - (b). Tekanan darah di turunkan secara bertahan, penurunan awal 25% dari sistolik, tekanan darah diturunkan mencapai $<160/105$ mmHg atau MAP <125 (Nugroho, 2012:7).

D. Tinjauan Manajemen Asuhan

Menurut Helen Varney (1997) bahwa Manajemen Asuhan Kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang ditemukan oleh perawat dan bidan pada awal 1970-an.

1. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

Tujuh langkah Manajemen Kebidanan menurut Varney yaitu:

a. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar)

Pada langkah ini adalah pengumpulan data, pada langkah ini yang dilakukan adalah mengumpulkan, pengolahan analisis data atau fakta untuk merumuskan masalah. Pada langkah ini dilakukan

wawancara dan pemeriksaan fisik untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dari anamnesa yang didapatkan dari klien bahwa klien mengeluh dengan kenaikan tekanan darah, terjadi pembengkakan pada tungkai, kadang mengalami pusing dan sakit kepala serta mengalami penglihatan kabur kadang-kadang (Saminem,2008)

Pemeriksaan fisik yang di lakukan berupa, pemeriksaan laboratorium serta laporan keterangan tambahan lain hubungan dengan kondisi klien yang didapatkan. Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidan adalah kenaikan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg dan $\leq 160/110$ mmHg, pemeriksaan tes celup urin dengan proteinuria menunjukkan ≥ 300 mg/24 jam atau +1, kenaikan berat badan 1 kg dalam seminggu bengkak pada wajah atau tungkai timbul salah satu atau lebih gejala atau tanda-tanda preeklampsia berat.

Penderita preeklampsia biasanya memiliki faktor resiko yang berbeda- beda. Faktor resiko pada preeklampsia dipengaruhi oleh umur, status gravida, riwayat keturunan, pemeriksaan antenatal, riwayat preeklampsia dan riwayat hipertensi.

b. Langkah II (Identifikasi Diagnosia/Masalah Aktual)

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang dikumpulkan akan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosis yang spesifik (Saminem, 2008).

Setelah melakukan pemeriksaan maka akan didapatkan kesimpulan bahwa ibu hamil yang usia kehamilannya diatas 20 minggu yang mengalami kenaikan tekanan darah $\geq 140/90$ mmhg atau lebih pada pemeriksaan selang 6 jam, oedema pada tungkai dan wajah serta proteinuria +1 maka akan didiagnosa bahwa ibu mengalami preeklampsia ringan.

c. Langkah III (Merumuskan Diagnosis/Masalah Potensial Yang Membutuhkan Antisipasi Masalah Potensial)

Pada langkah ini bidan mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, jika memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati kondisi klien bidan diharapkan dapat bersiap jika diagnosis atau masalah potensial benar-benar terjadi (Saminem, 2008).

Pada kasus preeklampsia ringan atau berat, seorang Bidan atau tenaga kesehatan lain dapat mengantisipasi kelainan yang akan terjadi pada saat rawat jalan atau rawat inap karena pada kasus preeklampsia kemungkinan ibu akan mengalami syok atau kejang, dapat terjadi kematian ibu, kelahiran prematur dan kelahiran BBLR.

Pada kasus preeklampsia ringan seorang Bidan atau tenaga kesehatan lain dapat mengantisipasi terjadi preeklampsia ringan menjadi preeklampsia berat dimana terjadi kenaikan tekanan darah $\geq 160/110$ mmHg dengan proteinuria $>+2$ dan gejala yang ada

kaitannya dengan ginjal, otak, hepar dan sistem kardiovaskuler, sakit kepala, yang parah dan hiperrefleksia.

Pada penderita preeklampsia memiliki komplikasi yang berbeda-beda. Komplikasi yang terjadi adalah eklampsia, perdarah otak, sindrom HELLP, ruptur/infark hati, solusio plasenta, koagulasi intravaskular diseminata (KID), kerusakan ginjal, oedema paru, dan pertumbuhan janin terhambat.

d. Langkah IV (Penetapan Kebutuhan Tindakan Segera)

Pada langkah ini bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien dan perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien (Saminem, 2008).

Pada kasus preeklampsia ringan tidak membutuhkan tindakan segera. Tetapi jika tekanan darah 160/110 mmHg atau melebihi 160/110 mmHg serta proteinuria +2 dan atau tidak ada tanda-tanda kejang atau syok jika telah melakukan kunjungan antenatal selama 2 minggu berturut-turut. Jika pasien telah mengalami syok atau kejang maka akan dilakukan tindakan segera dengan berkolaborasi dengan dokter dengan melakukan tindakan emergensi atau melakukan rujukan. Namun sebelum melakukan rujukan, tenaga kesehatan dapat melakukan tindakan pemberian obat MgSO₄ pada pasien preeklampsia

atau eklampsia sebagai tindakan awal untuk mencegah terjadinya kejang atau pun kejang yang berulang.

Jika hasil pemeriksaan kondisi janin mengalami gangguan dengan umur kehamilan yang belum aterm maka melihat kondisi ibu dan janin, apakah masih bisa dilanjutkan kehamilan sampai aterm atau mengakhiri kehamilan sebelum umur kehamilan aterm dengan kondisi ibu yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan kehamilan, dan harus mengakhiri. Namun ada juga kemungkinan yang dapat terjadi yaitu ibu bisa saja mengalami syok atau kejang pada ibu dengan preeklampsia berat, kematian Ibu, kelahiran prematur, resiko terjadinya bayi berat lahir rendah (BBLR).

e. Langkah V (Rencana asuhan)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah diidentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan. Semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan menyeluruh ini harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori up to date serta sesuai dengan susmsi tentang apa yang akan atau tidak akan dilakukan klien (Saminem, 2008).

Pada kasus preeklampsia ringan cukup dilakukan rawat jalan dengan menganjurkan pasien untuk melakukan kunjungan antenatal setiap minggu. Namun jika perawatan jalan tidak mengalami perubahan maka akan dilakukan rawat inap dengan kriteria bahwa setelah 2 minggu pengobatan rawat jalan tidak mengalami perubahan, kenaikan berat badan ibu 1 kg atau lebih per minggu selama 2 minggu berturut-turut, ataupun timbul salah satu atau lebih gejala preeklampsia berat.

Bila setelah 1 minggu menjalani perawatan namun tidak mengalami perubahan maka preeklampsia ringan dianggap menjadi preeklampsia berat. Bila dalam perawatan sudah ada perbaikan sebelum 1 minggu dan kehamilan masih preterm maka penderita tetap dirawat selama 2 hari lagi baru dipulangkan. Perawatan akan berlanjut dengan rawat jalan.

Sedangkan pada ibu yang mengalami preeklampsia berat maka akan dilakukan tindakan segera masuk ke rumah sakit, pemberian anti kejang/anti konvulsan magnesium sulfat ($MgSO_4$) sebagai pencegahan dan terapi kejang. $MgSO_4$ merupakan obat pilihan untuk mencegah dan mengatasi kejang pada preeklampsia berat dan eklampsia. Sambil menunggu rujukan, mulai dosis rumatan 6 gram $MgSO_4$ dalam 6 jam sesuai prosedur yaitu: Ambil 6 gram $MgSO_4$ (15 ml larutan $MgSO_4$ 40%) dan larutkan dalam 500 ml larutan Ringer Laktat/ringer Asetat, lalu berikan secara IV dengan kecepatan 28 tetes/menit selama 6 jam,

dan diulang hingga 24 jam setelah persalinan atau kejang berakhir (bila eklampsia).

Melakukan pemeriksaan fisik tiap jam, meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi pernafasan, refleks patella dan jumlah urin, bila frekuensi pernafasan <16x/menit, dan atau tidak didapatkan reflex tendon patella dan atau oliguria (produksi urin <0,5 ml/kg BB/jam), segera hentikan pemberian MgSO₄, jika terjadi depresi nafas, berikan cairan glukosa 1 gram secara IV (10 ml larutan 10 %) bolus dalam 10 menit, selama ibu dengan preeklampsia dan eklampsia dirujuk pantau dan nilai adanya perburukan preeklampsia.

Pada masa nifas pasein dengan preeklampsia di lakukan kunjungan rumah dengan melakukan pemantauan tanda-tanda vital, pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi serta memantau gejala atau komplikasi yang ditakutkan dapat terjadi pada pasien.

f. Langkah VI (Pelaksanaan Asuhan)

Dikerjakan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilaksanakan oleh klien sendiri. Implementasi yang efektif dapat mengurangi biaya perawatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada klien. Pada kasus ibu hamil yang mengalami preeklampsia ringan maka akan dianjurkan melakukan kunjungan antenatal setiap minggu. Namun jika selama 2 minggu menjalani rawat jalan namun tidak ada perubahan maka akan dilakukan rawat inap dengan kriteria tidak ada perubahan setelah 2 minggu menjalani rawat jalan, kenaikan berat badan ibu 1 kg

atau lebih per minggu selama 2 minggu berturut-turut, ataupun timbul salah satu atau lebih gejala preeklampsia berat.

Bila setelah 1 minggu menjalani perawatan namun tidak mengalami perubahan maka preeklampsia ringan dianggap menjadi preeklampsia berat. Bila dalam perawatan sudah ada perbaikan sebelum 1 minggu dan kehamilan masih preterm maka penderita tetap dirawat selama 2 hari lagi baru dipulangkan. Perawatan akanberlanjut dengan rawat jalan. Pada kasus ibu hamil yang mengalami preeklampsia berat maka akan dilakukan segera masuk ke rumah sakit, pemberian anti kejang/anti konvulsan magnesium sulfat ($MgSO_4$) sebagai pencegahan dan terapi kejang.

$MgSO_4$ merupakan obat pilihan untuk mencegah dan mengatasi kejang pada preeklampsia berat dan eklampsia. Sambil menunggu rujukan, mulai dosis rumatan 6 gram $MgSO_4$ dalam 6 jam sesuai prosedur dengan cara: Ambil 6 gram $MgSO_4$ (15 ml larutan $MgSO_4$ 40%) dan larutkan dalam 500 ml larutan Ringer Laktat/ringer Asetat, lalu berikan secara IV dengan kecepatan 28 tetes/menit selama 6 jam, dan diulang hingga 24 jam setelah persalinan atau kejang berakhir (bila eklampsia).

Melakukan pemeriksaan fisik tiap jam, meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi pernafasan, refleks patella dan jumlah urin, bila frekuensi pernafasan $<16x$ /menit, dan atau tidak didapatkan refleks tendon patella dan atau oliguria (produksi urin $<0,5$ ml/kg

BB/jam), segera hentikan pemberian MgSO₄, jika terjadi depresi nafas, berikan cairan glukosa 1 gram secara IV (10 ml larutan 10 %) bolus dalam 10 menit, selama ibu dengan preeklampsia dan eklampsia dirujuk pantau dan nilai adanya perburukan preeklampsia.

Apabila terjadi eklampsia, lakukan penilaian awal dan tatalaksana kegawatdaruratan. Berikan kembali MgSO₄ 2 gram secara IV perlahan-lahan (15-20 menit). Bila setelah pemberian MgSO₄ ulang masi terdapat kejang, dapat dipertimbangkan untuk pemberian diazepam 10 mg secara IV selama 2 menit.

Pada langkah ini pasien akan diberi tahu bahwa akan di lakukan pemantauan selama dilaksanakan asuhan kebidanan pada penderita preeklampsia sampai adanya perubahan atau hasil dari dari asuhan tersebut.

Pada Masa nifas pasien diberi tahu akan dilakukan pemantaun masa nifas dengan memantau tanda-tanda vital untuk mengantisipasi terjadinya preeklampsia berkelanjutan serta untuk menghindari terjadinya komplikasi berat pada pasien dengan preeklampsia.

g. Langkah VII (Evaluasi Asuhan Kebidanan)

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan meliputi kebutuhan bantuan yang diidentifikasi dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika pelaksanaannya efektif. Ada kemungkinan rencana tersebut efektif sedangkan sebagian lainnya belum efektif. Mengingat proses

manajemen asuhan ini merupakan suatu kontinum, perlu mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui proses manajemen untuk mengidentifikasi mengapa proses manajemen tidak efektif serta melakukan penyesuaian pada rencana asuhan tersebut (Saminem, 2008).

Pada langkah ini adalah evaluasi terhadap asuhan yang diberikan, dengan melakukan pemeriksaan laboratorium dan tidak adanya proteinuria dalam darah, tidak terdapat oedema pada wajah atau tungkai dan pemeriksaan tekanan darah dibawah batas normal atau di bawah dari 140/90 mmHG.

2. Pendokumentasian

Varney menyatakan bahwa alur berfikir bidan saat menghadapi klien meliputi tujuh langkah, agar diketahui orang lain apa yang telah dilakukan oleh seseorang bidan melalui proses berfikir sistematis, maka dilakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yaitu:

a. Subjektif (S)

Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa.

b. Objektif (O)

Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien (keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik), hasil laboratorium dan uji diagnosis lain yang merumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan.

c. *Assessment (A)*

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan juga data objektif dalam suatu identifikasi.

- 1) Diagnosis masalah.
- 2) Antisipasi diagnosis/masalah potensial.
- 3) Tindakan segera.

d. *Planning (P)*

Pendokumentasian tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assessment*.



BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
PADA NY “N” DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN
DI RUMAH SAKIT UMUM BAHAGIA MAKASSAR
TANGGAL 30 NOV 2021- 04 FEB 2022

No. Register : 069XXX
Tanggal Masuk : 30 November 2021 Pukul : 11.05 wita
Tanggal Pengkajian : 30 November 2021 Pukul : 11.05 wita
Pengkaji : Nurhafni

Langkah I: Identifikasi Data Dasar

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “N” / Tn “H”
Umur : 37 tahun / 43 tahun
Nikah/lamanya: 1X /±20 tahun
Suku : Makassar / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jn. Bonto Majannang

B. Riwayat Keluhan

1. Keluhan utama : ibu datang ke RSUD Bahagia Makassar dengan keluhan sakit kepala yang disertai dengan rasa pusing sejak tanggal 29 November 2021
2. Riwayat keluhan utama : ibu mengatakan telah mengalami sakit kepala yang disertai dengan rasa pusing sejak 1 hari yang lalu yaitu tanggal 29 November 2021

C. Riwayat Kehamilan Sekarang

1. Ibu mengatakan kehamilan yang kedua dan tidak pernah mengalami keguguran sebelumnya.
2. HPHT tanggal 20 Mei 2021
3. Ibu mengatakan usia kehamilan ± 7 bulan
4. Pergerakan janin mulai dirasakan sejak awal bulan September 2021
5. Ibu mengatakan pergerakan janin kuat dirasakan pada perut bagian kanan ibu
6. Ibu melakukan kunjungan *Antenatal Care* sebanyak 3 kali dan telah mendapat 1 kali imunisasi *Tetanus Toksoid* pada 11 Oktober 2021
 - a. Kunjungan I tanggal 11 Juni 2021 dengan keluhan ibu tidak ada, berat badan 52 Kg dan tekanan darah 120/70 mmHg.
 - b. Kunjungan II tanggal 28 Juli 2021 dengan keluhan ibu tidak ada, berat badan 53 Kg dan tekanan darah 120/80 mmHg.
 - c. Kunjungan III tanggal 11 Oktober 2021 dengan tekanan darah 120/80 mmHg dengan berat badan 56 Kg.

D. Riwayat Menstruasi

Haid pertama ibu saat usia ± 13 tahun, siklus haid biasanya 28-30 hari, haid biasanya dialami 5-7 hari dan tidak pernah mengalami *dismenorrhea* pada saat haid.

E. Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas Yang Lalu

Ibu melahirkan anak pertama tahun 2018 dengan kehamilan aterm, persalinan normal di puskesmas dan ditolong oleh bidan dengan jenis kelamin perempuan, BB: 3500 gram. Selama kehamilan ibu tidak pernah menderita penyakit hipertensi dan tidak ada kelainan selama nifas dan ASI eksklusif ± 2 tahun.

F. Riwayat Keluarga Berencana

Ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan setelah anak pertama lahir sampai tahun awal tahun 2020 dan tidak ada kelainan selama menjadi akseptor KB.

G. Riwayat Kesehatan yang Lalu

1. Tidak ada riwayat penyakit menular dan turunan
2. Tidak ada riwayat penyakit asma, DM, dan jantung
3. Tidak ada alergi terhadap makanan dan obat-obatan
4. Tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya dan tekanan darah sebelum hamil dalam batas normal yaitu tekanan sistol 100-120 mmHg dan diastole 70-80 mmHg
5. Tidak ada riwayat ketergantungan obat-obat terlarang, alkohol ataupun rokok

H. Riwayat Sosial Budaya

Ini merupakan pernikahan pertama, keluarga sangat mendukung kehamilan ibu yang sekarang dan sangat diharapkan terutama suami. Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami. Ibu merasa cemas dengan keadaannya dan keadaan bayinya ketika melakukan pemeriksaan kehamilan.

I. Riwayat Spiritual

Ibu dan keluarga selalu berdoa kepada Allah SWT, agar ibu dan janin diberi kesehatan selama proses kehamilan hingga persalinan, serta ibu selalu sabar dan tabah dalam menghadapi kehamilannya.

J. Riwayat Sosial Ekonomi

Ini merupakan pernikahan yang pertama, keluarga dan suami mendukung kehamilan ibu yang sekarang. Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami. Pekerjaan suami adalah pegawai swasta sehingga pendapatan tidak menentu.

K. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1. Nutrisi

Sebelum hamil ibu memiliki pola makan yang teratur atau cukup seperti makan 3 kali sehari dengan jenis makanan seperti nasi, sayur dan lauk bahkan sering diganti dengan mengkonsumsi makanan siap saji dengan frekuensi minum 6-8 gelas per hari dan tidak ada masalah, sedangkan selama hamil frekuensi makan ibu sebanyak 1-2 kali sehari dengan nasi, sayur dan lauk dan lebih sering makan makanan siap saji seperti bakso, pangsit dan mie instan dengan frekuensi minum 6-8 gelas perhari dengan nafsu makan yang kurang.

2. Eliminasi

Sebelum hamil ibu BAK 3-4 kali sehari dengan warna bening, bau amoniak dan BAB 1 kali sehari konsistensi padat dengan warna kuning tua, sedangkan selama hamil ibu BAK 4-5 kali dengan warna bening dan BAB 1-2 kali sehari konsistensi padat dengan warna kuning tua tidak ada masalah.

3. Kebutuhan istirahat/tidur

Sebelum hamil tidur siang tidak teratur, tidur malam 6 - 8 jam, sedangkan selama hamil tidur siang tidak teratur, tidur malam berkurang 5 – 6 jam .

4. Aktivitas

Sebelum hamil ibu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, menyapu, mengepel, memasak dll. Sedangkan selama hamil melakukan pekerjaan rumah rumah tangga seperti mencuci, menyapu, mengepel, memasak dll, tidak ada masalah.

5. *Personal hygiene*

Sebelum hamil ibu mandi 2 kali sehari dengan menggunakan sabun mandi, sikat gigi 2 kali sehari, keramas 3 kali seminggu dengan shampoo, ganti pakaian 2 kali sehari sedangkan selama hamil mandi 2 kali sehari dengan menggunakan sabun mandi, sikat gigi 2 kali sehari, keramas 3 kali seminggu dengan shampoo dan ganti pakaian 2 kali sehari.

I. Pemeriksaan Fisik Umum

1. Keadaan ibu tampak lemah
2. Kesadaran komposmentis

3. Tanda-tanda vital (TTV)

Tekanan darah : 150/100 mmHg

Nadi : 82x/menit

Suhu : 36.5°C

Pernapasan : 22x/menit

4. TB : 153 cm

5. LILA : 24 cm

6. BB sebelum hamil 49 kg, BB sekarang 56 kg

7. Pemeriksaan Fisik

8. *Head To Toe*

a. Wajah : Simetris kiri dan kanan, ekspresi wajah ibu tampak cemas, tidak tenang dan tampak lesu, tidak ada *cluasma gravidarum*, tidak ada edema dan nyeri tekan

b. Mata : Kedua konjungtiva mata tidak anemis dan ikterus.

c. Mulut : Bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada *caries* pada gigi

d. Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar limfe, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis

e. Payudara : Simetris kiri dan kanan, hiperpigmentasi pada *areola mammae*, puting susu menonjol, tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

f. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, terdapat linea nigra, striae alba, dan pembesaran perut sesuai usia kehamilan serta pada pemeriksaan leopold didapatkan hasil:

Leopold I : TFU pertengahan *Prosesus Xiploideus* dan pusat, 24 cm teraba bokong

Leopold II : Punggung kiri

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 94 cm

TBJ : $TFU \times LP = 24 \text{ cm} \times 94 \text{ cm} = 2256 \text{ gram}$

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/menit.

g. Genitalia : tidak ada kelainan, tidak ada pembengkakan dan nyeri tekan

h. Anus : tidak ada hemoroid pada anus

i. Ekstremitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices, ada edema, refleks patella kiri (+) kanan (+)

9. Pemeriksaan Penunjang

a. Pemeriksaan laboratorium

Hb : 14,5 gr%

Albumin : Positif (+) 1

Reduksi : Negatif (-)

HbsAg : Negatif (-)

VCT : Negatif (-)

Golongan darah : O

b. Pemeriksaan USG

Hasil USG : tunggal, hidup, presentase kepala, usia kehamilan
27-29 minggu, JK = laki-laki, TBJ: 1980 gram

Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

G2P1A0, gestasi 27 minggu 5 hari, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan preeklampsia ringan.

1. GIPIA0

Data Dasar :

DS : Ibu mengatakan hamil kedua dan tidak pernah keguguran, ibu merasakan adanya pergerakan janin pada usia kehamilan 4 bulan

DO : Tampak pembesaran perut sesuai usia kehamilan, tampak striae alba, linia nigra, dan otot perut tampak kendur.

Analisa dan Interpretasi Data

Pada pemeriksaan kulit perut ibu tampak adanya linea nigra dan striae alba yang menandakan kehamilan kedua, terdapat denyut jantung janin dan terabanya janin pada saat dipalpasi hal ini merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan serta otot perut sudah menandakan perut ibu sudah pernah mengalami peregangan sebelumnya (Prawirohaedjo, 2014: 179).

2. Gestasi 27-29 minggu

Data Dasar :

DS : Ibu mengatakan HPHT tanggal 20 Mei 2021, ibu mengatakan umur kehamilan sekarang ± 7 bulan

DO : Pemeriksaan Leopold 1, tinggi fundus pertengahan antara pusat dan *Xipoidesus*, taksiran persalinan tanggal 27 Februari 2022 berdasarkan rumus *Naegle*

Analisa dan Interpretasi Data

Dari hasil pemeriksaan dilihat dengan menggunakan rumus *Naegle* dimulai dari HPHT tanggal 20 Mei 2021, sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 27 minggu 5 hari (Fajar, 2016: 232).

3. Situs Memanjang

Data Dasar :

DS : Ibu mengatakan pergerakan janin kuat disebelah kanan perut ibu

DO : Pada palpasi Leopold didapatkan hasil:

Leopold I : TFU pertengahan *Prosesus Xipoidesus* dan pusat, 24 cm teraba bokong

Leopold II : punggung kiri

Leopold III : kepala

Leopold IV : BAP

DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/menit

Analisa dan Interpretasi Data

Dengan teraba bagian besar janin yaitu bokong di fundus dan kepala bagian terendah, DJJ terdengar jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dan gerakan janin yang dirasakan ibu pada salah satu sisi perut ibu menunjukkan bahwa sumbu panjang janin sejajar dengan sumbu panjang ibu (Prawirohaedjo, 2014: 205-206).

4. Intrauterin

Data Dasar :

DS : Ibu mengatakan pergerakan janin kuat terutama pada bagian sebelah kanan

DO : Ibu tidak merasakan nyeri perut ketika di palpasi, TFU sesuai usia kehamilan dan pada palpasi leopard teraba bagian-bagian janin yaitu:

Leopold I : TFU pertengahan *Prosesus Xipoides* dan pusat 24 cm, teraba bokong

Leopold II : Punggung kiri

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

Analisa dan Interpretasi Data

Kehamilan intrauterin sejak hamil muda dapat dipastikan, yaitu perkembangan rahim sesuai dengan usia kehamilan, janin teraba intrauterin dan janin di dalam rahim (Chandranita, dkk 2010: 131).

5. Tunggal

Data Dasar:

DS : Ibu mengatakan pergerakan janin kuat pada satu sisi perut yaitu sisi perut bagian kanan

DO : Pada palpasi abdomen didapatkan hasil leopard yaitu

Leopold III : teraba bagian bulat dan melenting (kepala) pada auskultasi hanya terdapat satu denyut jantung janin (DJJ) yaitu terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/menit, serta tinggi fundus uteri sesuai dengan umur kehamilan.

Analisa dan Interpretasi Data

Di dalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu ke/pala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu (Mangkuji, dkk, 2012: 10-11).

6. Hidup

Data Dasar:

DS : Ibu merasakan pergerakan janinnya aktif dan kuat pada usia kehamilan ± 4 bulan sampai sekarang dan ibu merasakan pergerakan janinnya 10-12 kali.

DO : Pada auskultasi DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/menit.

Analisa dan Interpretasi Data

Dalam menegakkan diagnosa janin dalam keadaan hidup, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai dasar yaitu DJJ terdengar jelas dan teratur dengan frekuensi 120-160x/menit, selain itu rahim membesar seiring dengan bertambahnya TFU, pada saat dilakukan palpasi teraba bagian-bagian janin serta ibu merasakan gerakan janin 10 gerakan per 12 jam (Prawirohaedjo, 2014: 285).

7. Keadaan Janin Baik

Data Dasar:

DS : Ibu merasakan pergerakan janin kuat dan biasanya bergerak 10-12 kali per 12 jam.

DO : Auskultasi DJJ terdengar jelas kuat dan jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/menit secara teratur

Analisa dan Interpretasi Data

Pada primigravida pergerakan janin dirasakan pada usia kehamilan 18-20 minggu sedangkan pada multigravida dapat dirasakan lebih awal yaitu 16 minggu dan frekuensi DJJ adalah 120-160 kali permenit (Pantiawati, 2010: 101-103).

8. Preeklamsia ringan

Data Dasar:

DS : Ibu mengeluh kadang mengalami sakit kepala yang disertai dengan rasa pusing, ibu mengatakan tidak ada riwayat hipertensi dan ibu juga tidak memiliki riwayat penyakit keturunan seperti hipertensi dalam keluarga serta ibu mengalami kenaikan tekanan darah pada usia kehamilan ± 7 bulan.

DO : Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil TD= 150/100 mmHg, albumin positif 1 (+1), edema (+)

Analisa dan Interpretasi Data

Didapatkan tekanan darah 140/90mmHg atau lebih, atau kenaikan diastolik 15 mmHg atau lebih, dan kenaikan sistolik 30 mmHg atau lebih, edema pada kaki, jari tangan, dan wajah atau kenaikan BB 1 Kg atau lebih per minggu. Proteinuria kuantitatif 0,3 gram atau lebih perliter =, kualitatif 1+ atau 2+ pada urine kateter atau mid stream. (Setiawati, 2013: 142).

Langkah III: Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial

Potensial terjadi

1. Preeklampsia berat
2. Pertumbuhan janin terhambat

DS : Ibu mengatakan usia kehamilan \pm 7 bulan

DO : Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil TD 150/100 mmHg dan terdapat albumin pada pemeriksaan laboratorium

Analisis dan Interpretasi Data

Preeklampsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi 160/110 mmHg atau lebih disertai proteinuria dan edema pada kehamilan 20 minggu atau lebih (Pudiastuti, 2012:163 dan 165).

Pertumbuhan janin terhambat ditentukan bila berat janin kurang dari 10% dari berat badan yang diharuskan dicapai pada usia kehamilan tertentu. Biasanya perkembangan yang terhambat diketahui setelah 2 minggu tidak ada

pertumbuhan. Pertumbuhan janin terhambat yang disebabkan oleh preeklampsia ringan (Prawirohaedjo, 2014: 697).

Langkah IV: Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi

Pada kasus ini saya membutuhkan kolaborasi dengan tenaga kesehatan dan dokter untuk pemberian perawatan preeklamsia ringan yang tidak membutuhkan tindakan segera. Tetapi jika tekanan darah 160/110 mmHg atau melebihi 160/110 mmHg serta proteinuria $\leq +2$ dan atau tidak ada tanda-tanda kejang atau syok. Jika pasien telah mengalami syok atau kejang maka akan dilakukan tindakan segera dengan berkolaborasi dengan dokter dengan melakukan tindakan emergensi atau melakukan rujukan. Namun sebelum melakukan rujukan, tenaga kesehatan dapat melakukan tindakan pemberian obat MgSO₄ pada pasien preeklamsia atau eklamsia sebagai tindakan awal untuk mencegah terjadinya kejang atau pun kejang yang berulang.

Langkah V: Rencana Tindakan

Tanggal 30 November pukul 11:20 wita

1. Tujuan

- 1) Preeklampsia ringan teratasi
- 2) Kehamilan berlangsung normal sampai dengan aterm

2. Kriteria

a. Tanda-tanda vital normal

- 1) Tekanan darah : Sistolik 100-130 mmHg :

Diastolik 60-90 mmHg

- 2) Nadi : 60-100x/menit

3) Pernafasan : 16-24x/menit

4) Suhu : 36,5-37,5°C

b. Tidak ditemukannya protein urine

c. Preeclampsia dapat teratasi yang ditandai dengan tekanan darah dalam batas normal dan tidak adanya protein urine serta tidak ada tanda-tanda bahaya baik bagi ibu maupun janinnya

d. DJJ dalam batas normal antara 120-160x/menit

e. Keluhan ibu yang dirasakan menghilang atau berkurang.

3. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

1. Sampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu hasil pemeriksaan dan menjelaskan hal-hal yang dianggap penting seperti peningkatan tekanan darah dan protein urin.

Rasional : Penyampaian dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kepada ibu sangat penting agar ibu dapat mengetahui perkembangan kehamilannya serta merupakan tujuan utama pemeriksaan antenatal yang berkualitas.

2. Berikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan pasien.

Rasional : Dukungan psikologis dan keterlibatan suami atau keluarga merupakan salah metode dalam perawatan pasien sehingga dapat membantu dalam proses penyembuhan. Disamping itu agar ibu lebih optimis

dalam menghadapi kehamilannya dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Berikan pendidikan kesehatan tentang preeklampsia ringan dan cara mengatasi serta memantau preeklampsia berat.

Rasional : Dengan ibu mengetahui tentang preeklampsia ringan maka ibu dapat mengerti dengan kondisi yang sekarang dialaminya dan cara mengatasi apabila ada tanda-tanda yang mengarah ke preeklampsia berat.

4. Anjurkan kepada ibu untuk melakukan pemeriksaan denyut jantung janin (DJJ) secara rutin

Rasional : Dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui kesehatan ibu dan perkembangan janin dalam rahim

5. Pemberian obat nifedipin 10 mg (1x1).

Rasional : Obat nifedipin adalah obat anti hipertensi yang aman bagi ibu hamil dan tidak mengganggu pertumbuhan janin.

6. Berikan health education pada ibu tentang:

- a. Istirahat yang cukup

Rasional : Adanya peningkatan fungsi-fungsi fisiologis tubuh diperlukan istirahat yang cukup untuk memberikan relaksasi yang cukup pada otot serta mengurangi beban kerja jantung.

- b. Diet seimbang dalam kehamilan terhadap makanan yang mengandung karbohidrat, tinggi protein, rendah lemak dan rendah garam.

Rasional : Ibu hamil tetap membutuhkan makanan bergizi dan tinggi protein termasuk pada ibu yang mengalami preeklampsia ringan akan tetapi pada ibu hamil yang mengalami preeklampsia ringan harus memperhatikan asupan makanan seperti mengurangi mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, rendah lemak dan pembatasan cairan serta garam karena hal ini dapat mencegah terjadinya preeklampsia.

- c. Menjaga personal hygiene dalam kehamilan

Rasional : Menjaga personal hygiene sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi pada klien dan dapat memberikan rasa nyaman pada ibu.

7. Jelaskan pada ibu 10 tanda bahaya pada kehamilan

Rasional : Dengan memberitahu ibu tentang tanda bahaya kehamilan, ibu akan mengerti dan melaksanakan anjuran yang diberikan sehingga jika ibu mengalami salah satu dari 10 tanda bahaya pada kehamilannya ibu dapat segera ke tenaga kesehatan terdekat sehingga ibu bisa mendapatkan pertolongan pertama dari segala hal yang mengancam keselamatan ibu dan janinnya.

8. Anjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan janinnya.

Rasional : Dengan mengajarkan ibu cara menghitung gerakan janinnya ibu dapat memantau sendiri kondisi janinnya secara objektif sekaligus meningkatkan pengetahuan ibu tentang kehamilan.

9. Ajarkan ibu untuk memantau tanda-tanda preeklampsia berat yaitu sakit kepala, rasa nyeri pada perut bagian atas, gangguan penglihatan, pembengkakan pada telapak kaki, wajah.

Rasional : Agar ibu mengerti dan dapat mengambil keputusan klinik yang tepat jika mengalami tanda-tanda preeklampsia berat.

10. Anjurkan ibu untuk melakukan USG

Rasional : Ultrasonografi (USG) merupakan suatu metode diagnostik dengan menggunakan gelombang ultrasonik, untuk mempelajari struktur jaringan berdasarkan gambaran ultrasonik yang dipantulkan oleh jaringan, yang manfaatnya untuk memantau keadaan janin.

11. Diskusi dengan ibu untuk mempersiapkan persalinan dan kelahiran bayinya.

Rasional : Dengan adanya diskusi antara ibu dan keluarga baik secara fisik maupun psikis dan finansial akan siap

menghadapi persalinan dan kelahiran bayinya tanpa rasa cemas yang berlebihan.

12. Anjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ANC secara teratur dan datang kembali untuk memeriksakan kehamilannya 1 minggu kedepan yaitu tanggal 8 desember 2021 dan bila ada tanda-tanda bahaya kehamilan segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat.

Rasional : Kunjungan ANC yang teratur dapat mendeteksi adanya komplikasi yang memperburuk keadaan ibu hamil. Disamping itu dengan menganjurkan ibu datang 1 minggu kedepan untuk dapat mengetahui keadaanya serta keadaan janinya sehingga bila ada hal-hal yang membahayakan ibu dan janinnya dapat segera diberi pertolongan.

13. Anjurkan ibu untuk membaca surah-surah al-quran terkait doa-doa pada saat hamil.

Rasional : Ibu dianjurkan membaca surah-surah al-quran untuk kebaikan ibu dan janinnya. Berikut bacaan surah-surah al-quran yang diberikan kepada ibu seperti surat Ali Imran ayat 38 dan surat Ash Saffat ayat 100.

Langkah VI: Implementasi Asuhan Kebidanan

Tanggal 30 November pukul 11:25 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada bahwa ibu dalam keadaan preeclampsia ringan yaitu hipertensi yang diakibatkan oleh kehamilan.

2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan pasien.
3. Memberikan ibu pendidikan kesehatan preeklampsia ringan
4. Memberikan obat nifedifin 10 mg (1x1).
5. Memberikan HE pada ibu tentang:
 - a. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari minimal 1 jam dan pada malam hari minimal 6 jam
 - b. Menganjurkan kepada ibu tentang diet seimbang dalam kehamilan dengan makan makanan yang tinggi protein, rendah lemak seperti putih telur dan rendah garam seperti daging, ikan segar dan keju serta memperbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan dan banyak minum air putih.
 - c. *Hygiene* dalam kehamilan seperti mengganti pakaian dalam tiap kali lembab.
6. Menjelaskan pada ibu tentang 10 tanda bahaya dalam kehamilan
 - a. Sakit kepala yang menetap
 - b. Gangguan penglihatan
 - c. Mual muntah yang berlebihan
 - d. Nyeri perut yang hebat
 - e. Edema pada wajah dan tungkai
 - f. Pergerakan janin berkurang atau tidak ada
 - g. Pendarahan pervaginam
 - h. Ketuban pecah dini

- i. Kejang
 - j. Demam yang hebat
7. Menganjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan janin.
 - a. Waktu menghitung gerakan dilakukan sekali dalam sehari.
 - b. Dihitung hingga 10 kali gerakan dengan sekurang-kurangnya 10 gerakan dalam 10 jam.
 - c. Ibu harus segera memberitahu bidan/dokter jika gerakan janinnya kurang dari 10 kali dalam 10 jam.
8. Menganjurkan pada ibu untuk memantau tanda-tanda terjadinya preeklampsia berat yaitu sakit kepala, rasa nyeri di daerah perut, penglihatan kabur dan terdapat protein urin pada saat pemeriksaan laboratorium.
9. Mendiskusikan dengan ibu tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya seperti memilih tempat persalinan, penolong persalinan dan pendamping pada saat persalinan serta mempersiapkan pakaian ibu dan bayi.
10. Menganjurkan ibu untuk melakukan USG.
11. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ANC secara teratur serta menganjurkan ibu untuk datang untuk memeriksakan kehamilannya tanggal 8 Desember 2021 dan bila ada tanda bahaya pada kehamilan segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat.

12. Anjurkan ibu untuk membaca surat-surat Al-Quran terkait doa-doa pada ibu hamil seperti surah-surah Al-Quran yang diberikan kepada ibu seperti surat Ali Imran ayat 38 dan surat Ash Saffat ayat 100. Berikut bacaan-bacaan surat Al-Quran yang diberikan:

Surat Ali Imran ayat 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.

Surat Ash Saffat ayat 100

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

Terjemahannya :

Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.

Langkah VII: Evaluasi Asuhan Kebidanan

Tanggal 30 November 2021 pukul 11:30 wita

1. Keadaan ibu dengan preeklampsia teratasi dan keadaan janin baik dengan
 - a. Tekanan darah : 150/100 mmHg
 - b. Albumin : Positif 1 (+1)
 - c. DJJ : Terdengar kuat dan jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/menit secara teratur.

2. Ibu merasa tenang dengan kehamilan yang dialaminya dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Ibu telah mengerti apa itu preeklampsia ringan yang sedang dialaminya.
4. Ibu telah mendapat obat nifedifin
5. *Health education* telah diberikan pada ibu.
6. Ibu telah mengerti tanda-tanda bahaya pada kehamilan.
7. Ibu telah mengerti cara menghitung pergerakan janinnya.
8. Tidak terjadi preeklampsia yang ditandai dengan
 - a. Tekanan darah : 120/90 mmHg
 - b. Albumin : Negatif (-)
9. Ibu telah mempersiapkan semua peralatan untuk persalinan dan peralatan bayinya.
10. Ibu telah melakukan USG
11. Ibu mau melakukan kunjungan ANC secara teratur dan akan memeriksakan kehamilannya pada tanggal 0 Desember 2021.
12. Ibu telah mengerti dan mau membaca surah-surah yang telah diberitahukan.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
PADA NY “N” DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN
DI RUMAH SAKIT UMUM BAHAGIA MAKASSAR
TANGGAL 30 NOVEMBER 2021**

No. Register : 069XXX
 Tanggal Masuk : 30 November 2021 Pukul : 11.05 wita
 Tanggal Pengkajian : 30 November 2021 Pukul : 11.05 wita
 Pengkaji : Nurhafni

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “N” / Tn “H”
 Umur : 37 tahun / 43 tahun
 Nikah/lamanya: 1X /±20 tahun
 Suku : Makassar / Bugis
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SMP / SMA
 Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
 Alamat : Jn. Bonto Majannang

Data Subjektif (S)

9. Ibu mengatakan HPHT 20 Mei 2021
10. Ibu mengatakan hamil kedua dan tidak pernah keguguran
11. Ibu mengatakan umur kehamilannya sekarang ±7 bulan
12. Ibu mengatakan mulai merasakan pergerakan janinnya sejak awal bulan
September 2021
13. Ibu mengatakan merasakan pergerakan janinnya kuat disebelah kanan

14. Ibu mengatakan selama hamil tidak ada nyeri perut
15. Ibu mengatakan telah mendapat imunisasi TT 1 kali selama kehamilannya di puskesmas
16. Ibu mengatakan kadang mengalami pusing dan penglihatan kabur
17. Ibu mengatakan khawatir dengan kehamilannya
18. Ibu tidak ada riwayat hipertensi, asma, jantung, DM, penyakit menular atau turunan

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HTP 27 Februari 2022
4. Gestasi 27 minggu 5 hari
5. Tinggi badan 153 cm
6. Berat badan sebelum hamil : 49 kg
7. Berat badan sekarang : 56 kg
8. LILA : 24 cm
9. Tanda-tanda vital
 - Tekanan darah : 150/100 mmHg
 - Nadi : 82x/menit
 - Suhu : 36.5 °c
 - Pernapasan : 22x/menit
10. Pemeriksaan fisik head to toe

- a. Wajah : Simetris kiri dan kanan, ekspresi wajah ibu tampak cemas, tidak tenang dan tampak lesu, tidak ada *cluasma gravidarum*, tidak ada edema dan nyeri tekan
- b. Mata : Kedua konjungtiva mata tidak anemis dan ikterus.
- c. Mulut : Bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada *caries* pada gigi
- d. Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar limfe, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis
- e. Payudara : Simetris kiri dan kanan, hiperpigmentasi pada *areola mammae*, puting susu menonjol, tidak ada benjolan dan nyeri tekan.
- f. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, terdapat linea nigra, striae alba, dan pembesaran perut sesuai usia kehamilan serta pada pemeriksaan leopold didapatkan hasil:

Leopold I : TFU pertengahan *Prosesus Xipioideus* dan pusat,
24 cm teraba bokong

Leopold II : Punggung kiri

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 94 cm

TBJ : $TFU \times LP = 24 \text{ cm} \times 94 \text{ cm} = 2256 \text{ gram}$

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/menit.

- g. Genetalia : tidak ada kelainan, tidak ada pembengkakan dan nyeri tekan
- h. Anus : tidak ada hemoroid pada anus
- i. Ekstremitas: simetris kiri dan kanan, tidak ada varices, ada edema, refleks patella kiri (+) kanan (+)
- j. Pemeriksaan laboratorium
- a. Hb : 14,5 gr%
- b. Albumin : Positif 1 (+1)
- c. Reduksi : Negatif (-)
- d. HbsAg : Negatif (-)
- e. VCT : Negatif (-)
- f. Golongan darah : O
- k. Pemeriksaan USG

Hasil USG : tunggal, hidup, presentase kepala, usia kehamilan 27-29 minggu, JK = laki-laki, TBJ: 1980 gram

Assesment (A)

Diagnosa Aktual : GIIPIA0, gestasi 27-29 minggu, situs memanjang intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan preeklampsia ringan.

Diagnosa Potensial : Antisipasi terjadinya preeklampsia berat dan pertumbuhan janin terhambat.

Planning (P)

Tanggal 30 November 2021 pukul 11:30 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa ibu dalam keadaan preeklampsia ringan

Hasil : Ibu telah mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan

2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga

Hasil : Ibu merasa tenang dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3. Memberikan obat nifedifin 10 mg (1x1) dengan instruksi dari dokter dan menganjurkan ibu untuk meminum setiap hari dan teratur dengan jadwal minum yang telah diberikan

Hasil : Ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang telah diberikan yaitu meminum obat yang telah diresepkan sesuai jadwal yang telah diberikan

4. Memberikan HE pada ibu tentang:
 - a. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup yaitu pada siang hari minimal 1 jam dan pada malam hari minimal 7 jam.
 - b. Menganjurkan kepada ibu tentang diet seimbang dalam kehamilan dengan makan makanan yang tinggi protein, rendah lemak seperti putih telur dan rendah garam seperti daging, ikan segar dan keju serta memperbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan dan banyak minum air putih.

- c. *Hygiene* dalam kehamilan seperti mengganti pakaian dalam tiap kali lembab

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

5. Menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan denyut jantung janin (DJJ) secara rutin agar dapat mengetahui perkembangan janin dalam rahim

Hasil : ibu bersedia melakukan pemeriksaan DJJ secara rutin

6. Menganjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan janinnya

- a. Waktu menghitung gerakan dilakukan sekali dalam sehari
- b. Dihitung hingga 10 kali gerakan dengan sekurang-kurangnya 10 gerakan dalam 10 jam
- c. Ibu harus segera memberitahu bidan/dokter jika gerakan janinnya kurang dari 10 kali dalam 10 jam

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mengerti cara menghitung gerakan janinnya

7. Menjelaskan pada ibu tentang 10 tanda bahaya dalam kehamilan:

- a. Sakit kepala yang menetap
- b. Gangguan penglihatan
- c. Mual muntah yang berlebihan
- d. Nyeri perut yang hebat
- e. Edema pada wajah dan tungkai
- f. Pergerakan janin berkurang atau tidak ada
- g. Pendarahan pervaginam

- h. Ketuban pecah dini
- i. Kejang
- j. Demam yang hebat

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

8. Menganjurkan pada ibu untuk memantau tanda-tanda terjadinya preeklampsia berat yaitu sakit kepala, rasa nyeri di daerah perut, penglihatan kabur dan terdapatnya proteinurin pada saat pemeriksaan laboratorium

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mau ke fasilitas kesehatan terdekat apabila terjadi tanda-tanda preeklampsia

9. Mengajarkan ibu untuk melakukan USG


Hasil : ibu telah melakukan pemeriksaan USG, pada hasil pemeriksaan USG ibu dan janinnya dalam keadaan baik

10. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ANC secara teratur serta menganjurkan ibu untuk datang memeriksakan kehamilannya tanggal 08 Desember 2021 dan apabila ada tanda bahaya pada kehamilan segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat

Hasil : ibu mengerti dan mau melakukan kunjungan ulang pada tanggal 08 Desember 2021 dan apabila ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan akan segera ke fasilitas kesehatan terdekat

11. Anjurkan ibu untuk membaca surat-surat Al-Quran terkait doa-doa pada saat ibu hamil seperti surat Ali Imran ayat 38 dan surat Ash Saffat ayat 100 untuk kebaikan ibu dan janinnya

Hasil : ibu mengerti dan mau membaca surah-surah yang telah diberitahukan.



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
PADA NY “N” DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN
DI RUMAH PASIEN DI JALAN BONTO MAJJANA
TANGGAL 22 DESEMBER 2021**

Tanggal Kunjungan : 22 Desember 2021 pukul : 10.00 wita

Tanggal Pengkajian : 22 Desember 2021 pukul : 10.00 wita

Nama Pengkaji : Nurhafni

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengeluh masih merasakan sedikit pusing dan sakit kepala
2. Ibu mengatakan HPHT tanggal 20 Mei 2021
3. Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat di sebelah kanan
4. Ibu mengatakan selama hamil tidak ada nyeri perut
5. Ibu mengatakan sudah mengkomsumsi makanan bergizi sesuai anjuran yang telah diberikan
6. Ibu mengatakan tidak teratur meminum obatnya
7. Ibu mengatakan tidak melakukan aktivitas berat

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. GIPIA0
4. HTP 27 Februari 2022
5. Gestasi 30 minggu 6 hari
6. Tanda-tanda vital

- Tekanan darah : 140/90 mmHg
- Nadi : 80x/menit
- Suhu : 36.5°c
- Pernapasan : 20x/i
7. Berat badan : 56 kg
8. Pemeriksaan fisik
- a. Wajah : tidak ada edema
 - b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda dan sklera putih
 - c. Abdomen : terdapat linea nigra, striae alba dan tidak terdapat luka bekas operasi dan pembesaran perut sesuai usia kehamilan, pada pemeriksaan leopard didapatkan hasil:
 - Leopold I : TFU pertengahan *Prosesus Xipioideus* dan pusat, 26 cm teraba bokong
 - Leopold II : punggung kiri
 - Leopold III : kepala
 - Leopold IV : BAP
- Lp : 95 cm
- TBJ : TFU x LP
- : 26 x 95 cm = 2470 gram
- Auskultasi : DJJ terdengar jelas kuat dan jelas dikuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit secara terarur.

- d. Eksremitas : tidak ada varices, ada edema pada kedua kaki, refleks patella kiri (+) kanan (+)

Assesment (A)

Diagnosa Aktual : GIIPIA0, gestasi 30-32 minggu, situs memanjang, intauterin, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan preeklampsia ringan

Diagnosa Potensial : Antisipasi terjadinya preeklampsia berat dan pertumbuhan janin terhambat

Planning (p)

Tanggal 22 Desember 2021 pukul 10:20 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan bahwa ibu masih mengalami preeklampsia ringan yaitu hipertensi akibat kehamilan dan keadaan janin baik menunjukkan bahwa DJJ dalam batas normal yaitu 140x/i.

Hasil : ibu telah mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

2. Mengingatkan ibu tentang tanda bahaya pada kehamilan dan menganjurkan ibu ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan.

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya

3. Mengingatkan kembali pada ibu untuk tetap rutin mengonsumsi obat yang telah diberikan sesuai jadwal dan aturan minum yang telah dijelaskan

Hasil : ibu bersedia melakukannya demi kesehatan diri dan janinnya

4. Mengingatkan ibu untuk tetap melaksanakan *Health Education* (HE)

- a. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup yaitu pada siang hari minimal 1 jam dan pada malam hari minimal 7 jam.
- b. Menganjurkan kepada ibu tentang diet seimbang dalam kehamilan dengan makan makanan yang tinggi protein, rendah lemak seperti putih telur dan rendah garam seperti daging, ikan segar dan keju serta memperbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan dan banyak minum air putih.
- c. *Hygiene* dalam kehamilan seperti mengganti pakaian dalam tiap kali lembab

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mau melaksanakan anjuran yang diberikan

5. Menganjurkan ibu untuk ke fasilitas kesehatan apabila ibu mengalami kelainan dalam kehamilannya

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

6. Menganjurkan ibu untuk segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami pusing, sakit kepala dan penglihatan kabur

Hasil : ibu bersedia datang ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami hal tersebut

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
PADA NY “N” DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN
DI RUMAH SAKIT UMUM BAHAGIA MAKASSAR
TANGGAL 20 JANUARI 2022**

Tanggal Kunjungan : 20 Januari 2022 pukul : 09.30 wita

Tanggal Pengkajian : 20 Januari 2022 pukul : 09.30 wita

Nama Pengkaji : Nurhafni

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan masih merasakan sedikit pusing
2. Ibu mengatakan sudah bisa tidur nyenyak pada malam hari meskipun masih merasa pusing
3. Ibu mengatakan sudah melakukan aktivitas seperti biasanya dan tidak melakukan aktivitas yang berat
4. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat di bagian perut sebelah kanan
5. Ibu mengatakan sudah teratur meminum obat yang diberikan
6. Ibu mengatakan masih cemas dengan kehamilannya

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Gestasi 35 minggu 0 hari
4. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah : 130/90 mmHg

Nadi : 82x/menit

- Suhu : 36.6°c
- Pernapasan : 20x/menit
5. Berat badan : 58 kg
6. Pemeriksaan fisik
- a. Wajah : tidak ada edema
 - b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda dan sklera putih
 - c. Abdomen : terdapat linea nigra, striae alba dan tidak terdapat luka bekas operasi dan pembesaran perut sesuai usia kehamilan, pada pemeriksaan leopold didapatkan hasil:
 - Leopold I : TFU 2 jari bawah *Prosesus Xiploideus* (26 cm), teraba bokong
 - Leopold II : punggung kiri
 - Leopold III : kepala
 - Leopold IV : BDP
 - Lp : 95 cm
 - TBJ : TFU x LP
: 26 x 95 cm = 2470 gram
- Auskultasi : DJJ terdengar jelas kuat dan jelas dikuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 142x/menit secara teratur.
- d. Eksremitas : tidak ada varices, ada edema pada kedua kaki, refleks patella kiri (+) kanan (+)

Assessment (A)

Diagnosa Aktual : GIIP1A0, gestasi 35-37 minggu, situs memanjang, intrauterin, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan preeklampsia ringan

Planning (P)

Tanggal 20 Januari 2022 pukul 09:45 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kehamilannya normal dan keadaan janinnya dalam kondisi baik

Hasil : ibu telah mengerti dan merasa tenang

2. Menjelaskan kepada ibu tentang preeklampsia ringan, tanda dan gejala preeklampsia berat yaitu sakit kepala, rasa nyeri diperut, penglihatan kabur, mual sampai muntah dan penglihatan kabur.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan segera ke fasilitas kesehatan terdekat.

3. Menjelaskan 10 tanda bahaya kehamilan

- a) Sakit kepala yang menetap
- b) Gangguan penglihatan
- c) Oedema pada wajah dan tungkai
- d) Mual dan muntah yang berlebihan
- e) Nyeri perut yang hebat
- f) Penurunan gerakan janin
- g) Ketuban pecah dini
- h) Pendarahan pervaginaam


i) Demam yang hebat

j) Kejang

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Mengajarkan ibu untuk senantiasa berdoa dan berdzikir Kepada Tuhan Yang Maha Esa agar proses operasinya berjalan dengan lancar serta keadaan ibu dan bayinya dalam keadaan normal

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
PADA NY “N” DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN
DI RUMAH SAKIT UMUM BAHAGIA MAKASSAR
TANGGAL 04 FEBRUARI 2022**

Tanggal Kunjungan : 04 Februari 2022 pukul : 09.30 wita

Tanggal Pengkajian : 04 Februari 2022 pukul : 09.30 wita

Nama Pengkaji : Nurhafni

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan sakit kepala sudah berkurang dan sudah tidak merasa pusing lagi
2. Ibu mengatakan sudah melakukan aktifitas seperti biasanya tetapi tidak melakukan aktifitas yang berat
3. Ibu mengatakan pergerakan janin kuat dirasakan sebelah kanan
4. Ibu mengatakan selama hamil tidak pernah merasakan nyeri perut

Data objektif(O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. HTP 27 Februari 2022
4. Gestasi 37 minggu 1 hari
5. BB selama hamil: 62 kg
6. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 120/80 mmHg

Nadi : 80x/menit

Suhu : 36,8°C

Pernapasan : 24x/menit

7. Pemeriksaan fisik

a. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda dan sklera putih

b. Abdomen : terdapat linea nigra, striae alba dan tidak terdapat luka bekas operasi dan pembesaran perut sesuai usia kehamilan, pada pemeriksaan leopold didapatkan hasil:

Leopold I : TFU 2 jari bawah *Prosesus Xiploideus* (31 cm),
teraba bokong

Leopold II : punggung kiri

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP

Lp : 101 cm

TBJ : TFU x LP

: 31 x 101 cm = 3131 gram

Auskultasi : DJJ terdengar jelas kuat dan jelas
dikuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi

142x/menit secara terarur.

c. Eksremitas : tidak ada varices, tidak ada edema pada kedua kaki, refleks patella kiri (+) kanan (+)

d. Pemeriksaan laboratorium

Hb : 13,5 gr%

Albumin : Negatif (-)

Reduksi : Negatif (-)

HbsAg : Negatif (-)

VCT : Negatif (-)

Golongan darah : O

1. Pemeriksaan USG

Hasil USG : tunggal, hidup, presentase kepala, usia kehamilan 37-39 minggu, JK = laki-laki, TBJ: 3060 gram.

Assesment (A)

GIPIAO, gestasi 37-39 minggu, intrauterin, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik.

Planning (P)

Tanggal 04 Februari 2022 pukul 09. 50 wita

1. Menyampaikan kepada ibu hasil pemeriksaan dengan keadaan ibu dan janin baik

Hasil : Ibu telah mengerti dan merasa senang dengan penjelasan yang diberikan

2. Menganjurkan ibu dan keluarga mempersiapkan untuk persalinan dan kelahiran bayinya.


Hasil : ibu telah mempersiapkan semua keperluan persalinan dan kelahiran bayinya

5. Menjelaskan pada pasien tentang metode kontrasepsi, kelebihan-keterbatasan serta efek samping

Hasil : pasien tetap memilih alat kontrasepsi suntik 3 bulan

3. Menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan ANC secara teratur dan menganjurkan ibu untuk datang melakukan pemeriksaan kehamilan pada tanggal 24 Februari 2022 dan apabila ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan segera memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan terdekat.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia datang kembali.



Dari hasil pemantauan pada kasus Ny “N” dapat disimpulkan melalui tabel sebagai berikut:

No	Tanggal kunjungan	Hasil pemeriksaan tekanan darah, nadi pernapasan dan suhu	Keluhan	Tempat kunjungan	Intervensi	Rasional
1.	Kunjungan 1 Tanggal 30 November 2021 pukul 11.05 WITA	TD: 150/100 mmHg N: 82x/i S: 36.5°C P: 22x/menit Protein urin: (+1)	Sakit kepala disertai rasa pusing	RSUD Bahagia Makassar	1.Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, Menganjurkan kepada ibu tentang diet seimbang dalam kehamilan dengan makan makanan yang tinggi protein, rendah lemak seperti putih telur dan rendah garam seperti daging, ikan segar dan keju serta memperbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan dan banyak minum air putih untuk kesehatan ibu dan janinya. 2.Mengajarkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan janinnya a.Waktu menghitung gerakan dilakukan sekali dalam sehari b.Dihitung hingga 10 kali gerakan dengan sekurang-kurangnya 10 gerakan dalam 10 jam c.Ibu harus segera memberitahu	1. Ibu mengerti dan bersedia untuk istirahat yang cukup dan ibu bersedia menjaga pola makan sesuai dengan apa yang telah dianjurkan. 2. Ibu mengerti dengan apa yang dijelaskan dan sudah mengetahui cara menghitung gerakan janinnya dalam sehari. 3. Ibu mengerti dengan apa yang telah dijelaskan dan bersedia datang ke fasilitas kesehatan terdekat apabila terjadi tanda-tanda preeklampsia berat 4. Ibu bersedia melakukan pemeriksaan DJJ secara rutin. 5. Ibu telah melakukan pemeriksaan USG dan tidak ditemukan kelainan. 6. ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang telah diberikan yaitu meminum obat yang telah diresepkan sesuai jadwal yang telah diberikan 7. ibu mengerti dan mau membaca

				<p>bidan/dokter jika gerakan janinnya kurang dari 10 kali dalam 10 jam.</p> <p>3.menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan DJJ secara rutin untuk mengetahui perkembangan janin di dalam rahim</p> <p>4.Menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan USG</p> <p>5.Menganjurkan pada ibu untuk memantau tanda-tanda terjadinya preeklampsia ringan yaitu sakit kepala, rasa nyeri di daerah perut, penglihatan kabur dan terdapatnya proteinuria pada saat pemeriksaan laboratorium</p> <p>6.Memberikan obat nifedifin 10 mg (2x1) dengan instruksi dari dokter dan menganjurkan ibu untuk meminum setiap hari dan teratur dengan jadwal minum yang telah diberikan</p> <p>7.Anjurkan ibu untuk membaca surat-surat Al-Quran terkait doa-doa pada saat ibu hamil seperti surat Ali Imran ayat 38 dan surat Ash Saffat ayat 100 untuk kebaikan ibu dan janinnya</p> <p>8.Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ANC secara</p>	<p>surah-surah yang telah diberitahukan.</p> <p>8. ibu mengerti dan mau melakukan kunjungan ulang pada tanggal 7 juni 2021 dan apabila ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan akan segera ke fasilitas kesehatan terdekat</p>
--	--	--	--	---	--

					teratur serta menganjurkan ibu untuk datang memeriksakan kehamilannya tanggal 08 Desember 2021 dan apabila ada tanda bahaya pada kehamilan segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat	
2.	Kunjungan II Tanggal 22 Desember 2022 pukul 10.00 WITA	TD: 140/100 mmHg N: 80x/menit P: 20x/menit S: 35.5°C	Sakit kepala disertai dengan sedikit pusing	Rumah pasien di Jl. Bonto majjana	1. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk tetap melaksanakan HE 2. Mengingatkan kembali pada ibu untuk tetap rutin mengkonsumsi obat yang telah diberikan sesuai jadwal dan aturan minum yang telah dijelaskan 3. Menganjurkan ibu untuk ke fasilitas kesehatan apabila ibu mengalami kelainan dalam kehamilannya 4. Menganjurkan ibu untuk segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami pusing, sakit kepala dan penglihatan kabur	1. Ibu mengerti dan mau tetap melaksanakan anjuran yang diberikan 2. Ibu bersedia mengkonsumsi obat yang telah dianjurkan dari dokter sesuai jadwal yang telah diberikan. 3. Ibu bersedia ke fasilitas kesehatan apabila terjadi kelainan pada kehamilannya. 4. Ibu mengerti dengan anjuran yang telah diberikan dan mau ke fasilitas kesehatan terdekat apabila terjadi tanda-tanda tersebut.
3.	Kunjungan III Tanggal 20 Januari 2022	TD: 130/90 mmHg N: 82x/menit S: 36.4°C P: 18x/menit	Sedikit rasa pusing	RSU Bahagia Makassar	1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kehamilannya normal dan keadaan janinnya dalam kondisi baik 2. Menjelaskan kepada ibu tentang preeklamsia ringan,	1. Ibu telah mengerti dan merasa tenang 2. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan segera ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

					<p>tanda dan gejala preeklamsia berat yaitu sakit kepala, rasa nyeri diperut, penglihatan kabur, mual sampai muntah dan penglihatan kabur.</p> <p>3. Menjelaskan 10 tanda bahaya kehamilan</p> <p>4. Menganjurkan ibu untuk senantiasa berdoa dan berdzikir Kepada Tuhan Yang Maha Esa agar proses operasinya berjalan dengan lancar serta keadaan ibu dan bayinya dalam keadaan normal</p>	4. Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan
4.	<p>Kunjungan IV</p> <p>Tanggal 04 Februari 2022 pukul 09.30 wita</p>	<p>TD: 120/80 mmHg</p> <p>N: 80x/menit</p> <p>S: 36.8°C</p> <p>P: 24x/menit</p>	<p>Sakit kepala sudah berkurang dan tidak merasa pusing</p>	<p>RSU Bahagia Makassar</p>	<p>1. Menyampaikan kepada ibu hasil pemeriksaan dengan keadaan ibu dan janin baik</p> <p>2. Menganjurkan ibu dan keluarga mempersiapkan untuk persalinan dan kelahiran bayinya.</p> <p>3. Menjelaskan pada pasien tentang metode kontrasepsi, kelebihan-keterbatasan serta efek samping</p> <p>4. Menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan ANC secara teratur dan</p>	<p>1. Ibu telah mengerti dan merasa senang dengan penjelasan yang diberikan</p> <p>2. Ibu telah mempersiapkan semua keperluan persalinan dan kelahiran bayinya</p> <p>3. Pasien tetap memilih alat kontrasepsi suntik 3 bulan</p> <p>4. Ibu mengerti dan bersedia datang kembali.</p>

					menganjurkan ibu untuk datang melakukan pemeriksaan kehamilan pada tanggal 24 Februari 2022 dan apabila ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan segera memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan terdekat.	
--	--	--	--	--	---	--

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang asuhan kebidanan pada Ny “N” dengan preeklampsia ringan di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar. Asuhan ini dilakukan selama ± 3 bulan yang dimulai saat pasien masuk di Rumah Sakit Umum Bahagia sampai kunjungan rumah pasien.

Dalam hal ini pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan 7 langkah varney yaitu: pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien, riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium. Pada langkah ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Pada langkah ini, bidan mengumpulkan data dasar awal secara lengkap (Manguji, 2012: 5)

Kegiatan pengumpulan data dimulai saat klien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan berlangsung. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat memberikan informasi paling akurat yang dapat

diperoleh secepat mungkin dan upaya sekecil mungkin. Pasien adalah sumber informasi yang paling akurat dan ekonomis yang disebut dengan sumber data primer. Sumber data alternatif atau sumber data sekunder adalah data yang sudah ada, praktikan kesehatan lain dan anggota keluarga (Asri, 2010: 27-28).

Ny "N" usia 37 tahun GIPIA0, datang ke Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar, pada tanggal 30 November 2021 pukul 11.05 wita, dengan keluhan sakit kepala yang disertai dengan rasa pusing sejak tanggal 29 November 2021, pasien mengatakan selama hamil pergerakan janinnya kuat dan bergerak pada bagian kanan perut ibu, pasien mengatakan telah melakukan kunjungan antenatal care sebanyak 3 kali di Rumah Sakit Umum Bahagia, pasien mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 20 Mei 2021, pasien mengatakan usia kehamilannya ± 7 bulan, pasien mengatakan selama hamil ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat.

Pasein mengatakan tidak pernah mengalami penyulit selama kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu. Pasien tidak memiliki riwayat seperti hipertensi, asma, jantung, DM dan penyakit menular lainnya. Pasien tidak memiliki riwayat mengkonsumsi obat-obatan selama hamil tanpa resep bidan atau dokter, pasien mengatakan pernah menggunakan alat kontrasepsi jenis suntik 3 bulan, pasien tidak pernah mengalami penyakit yang serius dan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit atau Puskesmas, selama hamil pola makan pasien kurang baik dimana pasien sering mengkonsumsi makanan yang tinggi garam dan lemak, istirahat pasien kurang baik dikarenakan pasien terlalu sibuk dengan pekerjaannya.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran komposmentis, keadaan umum ibu tampak lemas, Tekanan Darah: 150/100 mmHg, N: 82x/menit, S: 36.5°C, P: 22x/menit, ekspresi wajah ibu tampak cemas, tidak tenang dan tampak lesuh, kedua konjungtiva mata tidak anemis dan tidak ikterus, tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid dan vena jugularis, payudara tampak simetris, tampak hiperpigmentasi areola mammae, pada pemeriksaan abdomen didapatkan yaitu TFU pertengahan *Prosesus Xipoides* dan pusat, 24 cm, teraba bokong pada fundus dan sesuai usia kehamilan 27 minggu 5 hari, punggung kiri, presentase kepala, situs memanjang, bergerak atas panggul (BAP), pada auskultasi terdengar denyut jantung janin dengan frekuensi 145x/menit janin intrauterin, tunggal dan hidup, pada pemeriksaan penunjang didapatkan hasil laboratorium Homoglobin 14.5gr%, albumin (+1) positif dan terdapat protein urine pada ibu, reduksi (-). Dari hasil pemeriksaan USG didapatkan: tunggal, hidup, presentase kepala, usia kehamilan 27-29 minggu, Jk: laki-laki, TBJ: 1980 gram.

Hasil usia kehamilan dilihat dengan menggunakan rumus *Naegele*, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 27 minggu 5 hari (Prawirohaedjo, 2014: 279). Pada pemeriksaan abdomen tampak linea nigra dan striae alba yang menandakan kehamilan lebih dari satu kali dan otot perut sudah kendur, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat di palpasi merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan (Prawirohaedjo, 2014: 179).

Pada pemeriksaan leopold untuk menentukan tinggi fundus uteri dilakukan pada uterus tidak sedang berkontraksi, dengan posisi ibu yang baring, lalu mulai

melakukan pengukuran dengan menempelkan ujung pita dari tepi atas simpisis pubis dan puncak fundus uteri, hal tersebut dilakukan untuk menilai tinggi fundus uteri apakah tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan atau tidak, dan untuk menentukan presentasi janin dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk, ukuran dan kepadatan bagian tersebut, jika dalam perabaan pada fundus uteri teraba lunak dan kurang melenting maka dapat dikatakan sebagai presentasi bokong, atau jika pada bagian fundus uteri teraba bulat, keras dan melenting maka dapat dikatakan presentasi kepala (Nurasiah, dkk, 2012: 76).

Untuk menilai penurunan kepala janin dilakukan dengan hitungan perlimaan bagian terbawah janin yang bisa di palpasi diatas simpisis dan dapat diukur dengan meraba bagian janin yang ada di bawah. Jika teraba kepala tempatkan kedua tangan di arah yang berlawanan di bagian bawah. Jika kedua tangan konvergen (dapat saling bertemu) berarti kepala belum masuk panggul. Namun jika tangan divergen (tidak beremu berarti kepala sudah masuk panggul (Jannah, 2012: 127).

Di dalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba 2 bagian besar janin yaitu kepala dan bokong. Terdengar 1 denyut jantung janin (DJJ) pada satu titik bagian perut ibu (Chandranita, 2010: 129). Adanya gerakan janin dan denyut janin (DJJ) merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat bunyi DJJnya teratur dan frekuensinya 120-160x/menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam

atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohaedjo, 2014: 285).

Preeklampsia ringan adalah timbulnya hipertensi di sertai proteinuria dan edema setelah umur kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Gejala ini dapat timbul sebelum umur kehamilan 20 minggu pada penyakit trofoblas (Prawirohaedjo, 2014: 531-532).

Faktor yang mempengaruhi preeklampsia ringan yaitu kebanyakan dipengaruhi oleh pola makan baik di konsumsi oleh ibu hamil seperti yang mengandung lemak berlebihan, penggunaan minyak bekas goreng yang berulang-ulang, konsumsi makanan yang berbahan pengawet dan penggunaan garam atau natrium yang berlebihan pada masakan.

Kebiasaan makan makanan yang berlemak dan bergaram sering dihubungkan dengan tekanan darah karena konsumsi lemak berlebihan dapat memicu aterosklerosis yang merupakan faktor penyebab terjadinya hipertensi sedangkan konsumsi garam berlebih dapat meningkatkan timbunan cairan dalam darah (diuretik) yang menyebabkan sirkulasi darah terganggu sehingga jantung akan bekerja lebih kuat dan akhirnya tekanan darah seseorang akan tinggi. Aterosklerosis menyebabkan penebalan pada dinding arteri sehingga jantung akan bekerja lebih kuat dalam memompa darah dan pada akhirnya tekanan darah seseorang akan tinggi sesuai dengan aktivitas jantungnya dalam memompa darah. Dalam hasil penelitian yang mengenai hubungan pola makan dan istirahat dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat

hubungan antara pola makan dan pola istirahat dengan preeklampsia ringan (Cory, dkk, 2016: 72).

Peningkatan tekanan darah cenderung terjadi pada orang-orang yang kurang tidur. Karena, jika kurang tidur hormon stress pada tubuh akan meningkat dan juga terjadi peningkatan peradangan. Faktor lama tidur tidak saja menjadi penyebab adanya hubungan dengan tekanan darah, tetapi juga ada faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan tekanan darah yaitu faktor yang tidak dapat dimodifikasi seperti umur, jenis kelamin, dan genetik (Cory, dkk, 2016: 73).

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan pada kunjungan rumah tanggal 22 desember 2021 dengan kasus preeklampsia ringan pada Ny "N" didapatkan data subjektif ibu mengeluh masih merasakan sedikit sakit kepala dan pusing, ibu mengatakan ini kehamilan yang kedua dan tidak pernah mengalami keguguran sebelumnya, ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat, ibu mengatakan sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi sesuai anjuran yang telah diberikan, ibu mengatakan tidak melakukan aktifitas yang berat lagi.

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada preeklampsia ringan. Hal ini membuktikan tidak ditemukan adanya kesejangan antara teori dan kasus.

B. Langkah II: Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan semua data yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosa atau masalah. Diagnosis yang dirumuskan adalah diagnosis dalam lingkup praktik kebidanan yang tergolong pada nomenklatur standar diagnosis, sedangkan perihal yang

berkaitan dengan pengalaman klien ditemukan hasil pengkajian (Mangkuji, 2012: 5)

Hasil pengkajian data subjektif dan objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosis preeklampsia ringan dimana pasien datang pada tanggal 30 November 2021 pukul 11.05 WITA, dengan keluhan sakit kepala yang disertai dengan pusing. Kehamilan ibu adalah kehamilan yang kedua dan tidak pernah keguguran sebelumnya, ibu mengatakan usia kehamilannya sekarang sudah mencapai ± 7 bulan.

Riwayat kesehatan yang lalu Ny "N" tidak pernah mengalami penyakit yang serius dan dirawat di rumah sakit ataupun di puskesmas. Pemeriksaan abdomen didapatkan kesan yaitu tinggi fundus uteri (TFU) pertengahan antara *Prosesus Xipoides* dan pusat 24 cm, sesuai dengan usia kehamilan 27 minggu 5 hari, punggung kiri presentasi kepala. Situs memanjang bergerak atas panggul (BAP), terdengar DJJ dengan frekuensi 145x/menit, janin intrauteri, tunggal dan hidup. Pada pemeriksaan laboratorium, didapatkan Hb 14.5 gr%, albumin positif 1, reduksi negatif.

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa preeklampsia ringan didefinisikan sebagai kenaikan tekanan darah yang melebihi batas normal yaitu sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg (Prawirohaedjo, 2014: 572). Umumnya pasien hipertensi akan mengeluh sakit kepala yang disertai dengan rasa pusing, hal disebabkan karena terjadinya perubahan pada neurologik yang disebabkan oleh hiperperfusi pada otak (Prawirohaedjo, 2014: 532).

Pada pemeriksaan Leopold untuk menentukan tinggi fundus uteri dilakukan pada uterus tidak berkontak, dengan posisi ibu berbaring dan kaki sedikit ditekuk, lalu memulai pengukuran dengan menempelkan ujung pita dari tepi atas simfisis pubis dan puncak fundus uteri, hal tersebut dilakukan untuk menilai tinggi fundus uteri apakah tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan atau tidak dan untuk menentukan presentasi janin dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk, ukuran dan kepadatan bagian tersebut, jika dalam perabaan pada fundus uteri bulat, keras dan melenting maka dapat dilakukan sebagai presentasi bokong karena kepala janin berada pada bagian fundus, atau jika pada bagian fundus uteri teraba lunak, kurang melenting, dapat dikatakan presentasi kepala (Nursiah, dkk, 2014: 75-76).

Untuk menilai penurunan kepala janin dilakukan dengan hitungan perlimaan bagian terbawah janin yang bisa di palpasi di atas simfisis dan dapat diukur dengan meraba bagian janin yang ada di bawah. Jika teraba kepala tempatkan kedua tangan di arah yang berlawanan di bagian bawah. Jika kedua tangan konvergen (dapat saling bertemu) berarti kepala belum masuk panggul. Namun jika tangan divergen (tidak bertemu) berarti kepala sudah masuk panggul (Jannah, 2012: 127).

Di dalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba 2 bagian besar janin yaitu kepala dan bokong. Terdengar 1 denyut jantung janin (DJJ) pada satu titik bagian perut ibu (Chandranita, 2010: 129). Adanya gerakan janin dan denyut janin (DJJ) merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat bunyi

DJJnya teratur dan frekuensinya 120-160x/menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohaedjo, 2014: 285).

Berdasarkan uraian diatas maka diagnosis pada kasus preeklampsia ringan tersebut adalah GIPIA0, gestasi 27-29 minggu, presentasi kepala, situs memanjang, bergerak atas panggul (BAP), intrauterin, tunggal, hidup, dengan preeklampsia ringan. Demikian penerapan tinjauan pustaka pada kasus Ny "N" secara garis besar tampak adanya persamaan antara teori dengan diagnosis aktual yang ditegakan sehingga memudahkan pemberian tindakan selanjutnya.

C. Langkah III: Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini merupakan langkah ketika bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan harus waspada menghadapi diagnosis/masalah potensial yang benar-benar terjadi (Jannah, 2012: 206-207).

Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman. Dalam mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dilakukan pengantisipasi penanganannya yang kemungkinan muncul pada preeklampsia ringan yaitu preeklampsia ringan, pertumbuhan janin terhambat yang mengakibatkan kelahiran prematur.

Preeklampsia merupakan salah satu penyakit yang langsung disebabkan oleh kehamilan yang hingga kini penyebabnya masih belum pasti, yang ditandai

dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi, edema dengan protein urin yang masih merupakan sebab utama kematian ibu dan sebab kematian perinatal yang tinggi. Tingginya angka kejadian preeklampsia yang menimpa ibu hamil memberikan dampak negatif terhadap janin yang di kandung ibu dalam kehamilan dan persalinan (Idealistiana, 2018: 143).

Preeklampsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi 160/110 mmHg atau lebih disertai proteinuria dan oedema pada kehamilan 20 minggu atau lebih (Pudiastuti, 2012:163 dan 165).

Etiologi pasti penyebab gangguan ini masih belum jelas. Seperti diketahui bahwa permulaan penyakit adalah saat trimester pertama dan kedua kehamilan dengan masalah plasentasi serta endotelium ibu sebagai sel target yang memicu manifestasi klinik penyakit. Walaupun demikian mekanisme yang menyebabkan disfungsi endotel dan hubungannya dengan plasenta masih tidak jelas. Terdapat beragam komplikasi preeklampsia termasuk abrupsi plasenta, keterbatasan pertumbuhan intrauteri, sindrom HELLP (*Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets count*), kelahiran prematur, kegagalan multi-organ serta kematian (Robson, 2011: 32).

Preeklampsia merupakan sindrom hipertensi kehamilan tertentu dengan kondisi multisistem dengan multifaktorial penyebab, unik untuk manusia yang berhubungan secara signifikan terhadap angka kematian dan kesakitan maternal dan perinatal. Kondisi kompleks ini berhubungan dengan perubahan patologis yang signifikan dari pembuluh darah ibu dan janin serta plasenta, termasuk arteriopathy desidua, infark, perubahan iskemik dan abruption, oleh karena itu

tidak mengherankan bahwa hasil perinatal dipengaruhi oleh preeklampsia, khususnya dalam konteks penyakit berat.

Penyebab preeklampsia umumnya terkait dengan lesi plasenta. Manifestasi vaskular yang mendasari dan adanya stres oksidatif dan kerusakan endotel, mempengaruhi sistem uteroplasenta dan dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan janin dengan hipoksia yang mendasari dan asidosis yang bisa menyebabkan terjadinya kelahiran prematuritas yang memberikan dampak terjadinya asfiksia, berat badan lahir rendah serta komplikasi-komplikasi lain yang berakibat kematian sedangkan pada ibu preeklampsia dapat menyebabkan terjadinya eklampsia yang berujung pada kematian (Yuniarti, 2018: 3-4).

Pada hipertensi dalam kehamilan tidak terjadi invasi sel-sel trofoblas pada lapisan otot arteri spiralis dan jaringan matriks sekitarnya. Lapisan otot arteri spiralis menjadi tetap kaku dan keras sehingga lumen arteri spiralis tidak memungkinkan mengalami distensi dan vasodilatasi. Akibatnya arteri spiralis relatif mengalami vasokonstriksi, dan terjadi kegagalan “remodeling arteri spiralis”, sehingga aliran darah uteroplasenta menurun, dan terjadilah hipoksia dan iskemia plasenta. Dampak iskemia plasenta akan menimbulkan perubahan-perubahan yang dapat menjelaskan patogenesis hipertensi dalam kehamilan selanjutnya.

Sebagaimana dijelaskan pada teori invasi trofoblas, pada hipertensi dalam kehamilan terjadi kegagalan “*remodeling arteri spiralis*”, dengan akibatnya plasenta mengalami iskemia. Plasenta yang mengalami hipoksia akan mengalami

oksidan (radikal bebas). Oksidan atau radikal bebas adalah senyawa penerima elektron atau atom/molekul yang mempunyai elektron yang tidak terpasang.

Salah satu oksidan penting yang dihasilkan plasenta iskemia adalah radikal hidroksil yang sangat toksis, khususnya terhadap membran sel endotel pembuluh darah. Sebenarnya produksi oksidan pada manusia adalah suatu proses normal, karena oksidan memang dibutuhkan untuk perlindungan tubuh. Adanya radikal hidroksil dalam darah mungkin dahulu dianggap sebagai bahan toksin yang beredar dalam darah, maka dulu hipertensi dalam kehamilan disebut “toxaemia” (Prawirohaedjo, 2014: 533-534).

Pada kelainan sirkulasi uteroplasenta akibat dari perkembangan plasenta yang abnormal, pasokan oksigen, masukan nutrisi dan pengeluaran hasil metabolik menjadi abnormal. Janin menjadi kekurangan oksigen dan nutrisi pada trimester akhir sehingga timbul pertumbuhan janin terhambat yang asimetrik yaitu lingkaran perut yang jauh lebih kecil dibandingkan lingkaran kepala. Pada keadaan yang parah mungkin akan terjadi kerusakan tingkat seluler berupa kelainan nukleus dan mitokondria. Pada keadaan hipoksia, produksi radikal bebas di plasenta menjadi sangat banyak dan antioksidan yang relatif kurang akan menjadi sangat banyak dan antioksidan yang relatif kurang. Penyebab pertumbuhan janin terhambat sistemik adalah faktor janin atau lingkungan uterus yang kronik seperti diabetes dan hipertensi dalam kehamilan (Prawirohaedjo, 2014: 697).

Pada kasus Ny ”N” penulis tidak menemukan kelainan dan komplikasi pada ibu maupun pada janin yang mungkin bisa terjadi pada kasus preeklampsia ringan karena telah dilakukan penanganan preeklampsia ringan pada ibu sesuai

dengan teori sehingga tidak ada diagnosa potensial dan tidak ada kesenjangan antara kasus dengan teori.

D. Langkah IV: Identifikasi Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi

Pada langkah ini, yang dilakukan oleh bidan adalah mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk konsultasi atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi klien. Ada kemungkinan, data yang kita peroleh memerlukan tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan, sementara kondisi yang lain masih bisa menunggu beberapa waktu lagi (Mangkuji, 2012: 6).

Pada langkah ini bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. Pada langkah ini, mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien (Jannah, 2012: 208).

Pada studi kasus Ny "N" tidak ada tindakan segera yang dilakukan karena tekanan darah masih dalam batas preeklamsia ringan dan tidak ada tanda-tanda terjadinya preeklamsia berat. Tindakan segera atau kolaborasi akan segera dilakukan jika pasien telah mengalami sakit kepala secara terus menerus dan pada pemeriksaan laboratorium terdapat protein urin $\geq +2$ dan terdapat tanda-tanda seperti kejang dan syok.

E. Langkah V: Rencana Tindakan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh berdasarkan langkah sebelumnya. Semua perencanaan yang dibuatkan harus berdasarkan

pertimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, teori *Up To Date*, perawatan berdasarkan bukti (*evidence based care*). Dalam menyusun rencana sebaiknya pasien dilibatkan karena pada akhirnya pengambilan keputusan dalam melaksanakan suatu rencana asuhan harus disetujui oleh pasien. Untuk menghindari perencanaan asuhan yang tidak terarah, maka dibuat terlebih dahulu pola pikir sebagai berikut. Tentukan tujuan tindakan tindakan yang akan dilakukan, meliputi sasaran dan target hasil yang akan dicapai. Tentukan rencana tindakan sesuai dengan masalah dan tujuan yang akan dicapai. Kaji ulang apakah rencana asuhan sudah meliputi semua aspek kesehatan terhadap wanita (Jannah, 2012: 208-209).

Bila diagnosis asuhan preeklampsia ringan ditegakkan, rencana asuhan yang diberikan adalah memberitahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan, melakukan pemantauan tanda-tanda vital ulang setiap 2 sampai 4 jam untuk mengetahui keadaan tekanan darah pada ibu, melakukan perencanaan pada ibu untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dan USG untuk memastikan tidak adanya protein urin dan juga untuk memastikan bahwa keadaan janin dalam kandungan ibu dalam keadaan baik, memberikan dukungan psikologis pada ibu, menjaga privasi dan kebersihan ibu, serta menjelaskan pada ibu tanda-tanda bahaya dalam kehamilan.

Penatalaksanaan pada kasus preeklampsia ringan yaitu dilakukan secara konsisten dan sistemik menggunakan praktik pencegahan dengan memberikan asuhan secara rutin selama ± 3 bulan sampai tekanan darah ibu berada dalam batas normal, setiap tindakan yang dilakukan dapat berupa asuhan yang terfokus seperti

dengan penerapan asuhan sayang ibu yang dialkukan secara rutin selama pemantauan, termasuk menjelaskan pada ibu dan keluarganya mengenai segala tindakan dan tujuan yang akan dilakukan dalam pemeriksaan.

Rencana asuhan pada kasus Ny “N” disusun berdasarkan teori dengan melihat kondisi dari kebutuhan pasien. Hasil pengkajian anamnesis, pemeriksaan fisik dan pada pasien yaitu Ny “N” datang dengan keluhan sakit kepala yang disertai dengan rasa pusing pada tanggal 30 November 2021 pada pukul: 11.05 wita. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran komposmentis, keadaan umum ibu tampak lemas, TD: 150/100 mmHg, N: 82x/menit, S: 36,5°C, P: 22x/menit, ekspresi wajah ibu tampak cemas, tidak tenang dan tampak lesuh, kedua konjungtiva mata tidak anemis dan ikterus, tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid dan vena jugularis, payudara tampak simetris, tampak hiperpigmentasi areola mammae, pada pemeriksaan abdomen didapatkan kesan yaitu: TFU pertengahan *Prosesus Xipoideus* dan pusat, 24 cm, teraba bokong pada fundus dan sesuai usia kehamilan 27 minggu 5 hari, punggung kiri, presentasi kepala, situs memanjang, bergerak atas panggul (BAP), pada auskultasi terdengar denyut jantung janin dengan frekuensi 145x/menit, janin intrauterin, tunggal dan hidup, pada pemeriksaan penunjang didapatkan hasil laboratorium Hb: 14.5, albumin: Positif (+) terdapat protein dalam urin ibu, reduksi (-) negatif. Dari hasil pemeriksaan USG didapatkan: tunggal, hidup, presentase kepala, usia kehamilan 27-29 minggu, JK: laki-laki, TBJ: 1980 gram.

Rencana tindakan yang telah disusun yaitu: sapa ibu dan keluarga untuk meningkatkan rasa percaya sehingga ibu menjadi lebih koperatif dengan petugas,

beritahu hasil pemeriksaan, menganjurkan keluarga untuk memberikan support dan semangat kepada ibu, memberikan konseling informasi dan edukasi (KIE) tentang istirahat yang cukup, diet seimbang dan menjaga *personal hygiene* dalam kehamilan, minta persetujuan ibu dan keluarga untuk melakukan inform consent, melaksanakan tindakan sesuai dengan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) preeklampsia ringan di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar, dan memberikan terapi obat-obatan seperti nifedifin 10 mg (1x1).

Rencana tindakan pada kasus Ny “N” adalah melakukan pemantau tekanan darah yang dilakukan selama ± 3 bulan yang dimulai pada tanggal 30 November 2021. Rencana asuhan yang diberikan yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada ibu untuk memastikan pertambahan atau penurunan tekanan darah pada ibu, menjelaskan pada ibu penyebab terjadinya hipertensi, menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola makan dengan makan makanan yang bergizi dan sedikit mengonsumsi natrium yang berupa garam, makanan yang berlemak, serta menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola tidur dimana ibu harus lebih banyak beristirahat dan tidak terlalu banyak pikiran atau stres, menganjurkan ibu untuk mengonsumsi obat-obatan yang telah diberikan sesuai dengan instruksi bidan/dokter.

Rencana asuhan kebidanan yang telah disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial, hal ini tidak ada kesenjangan antara teori dengan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi menunjukkan kasus di lahan praktek.

F. Langkah VI: Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang diuraikan pada langkah kelima di atas dilaksanakan secara efisien dan aman. Realisasi dari perencanaan dapat dilakukan oleh bidan, pasien, atau anggota keluarga lain. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab atas terlaksananya seluruh perencanaan (Jannah, Nurul, 2012: 209).

Pada studi kasus Ny “N” dengan preeklampsia ringan, semua tindakan yang direncanakan terlaksana dengan baik. Seperti dengan menyampaikan hasil pemeriksaan pada pasien dengan baik, memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya apabila ada hal yang tidak dia mengerti, memberikan dukungan moril kepada ibu dan keluarga untuk mengambil keputusan penting dalam setiap tindakan yang akan dilakukan seperti dengan pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan USG. Penjelasan telah disampaikan, pasien dan keluarga mengerti dengan keadaannya, memberikan dukungan psikologis kepada ibu, memberikan pengetahuan kepada ibu tentang pentingnya *health education* selama kehamilan seperti pada pola istirahat yang cukup, pola makan yang seimbang/diet seimbang dalam kehamilan terutama dengan menghindari makanan yang tinggi kadar garam, lemak dan makanan yang banyak mengandung bahan pengawet, serta memberikan terapi obat-obatan pada ibu yang dapat menurunkan tekanan darah berupa nifedifin 10 mg yang diminum sesuai dengan intruksi bidan atau dokter yaitu diminum 2 kali dalam sehari.

Pemantauan selanjutnya yang dilakukan di rumah ibu pada tanggal 22 Desember 2021 yaitu ibu merasakan sakit pada kepala dan merasa pusing,

keadaan umum ibu baik, tampak cemas dengan keadaannya, pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil tekanan darah 140/100 mmHg, nadi 80x/menit, suhu 36.5°C dan pernapasan 20x/menit

Tindakan yang dilakukan dalam rencana tindakan pada pemantauan 22 Desember 2021 yaitu dengan menjelaskan penyebab nyeri kepala yang disertai rasa pusing pada ibu, menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola makan dan istirahat serta tidak terlalu banyak pikiran, mengajurkan pada ibu untuk dapat mengenali tanda-tanda preeklampsia yaitu sakit kepala, rasa nyeri di daerah perut, penglihatan kabur, terdapat proteinuria, menjelaskan pada ibu tentang 10 tanda bahaya dalam kehamilan, mengajurkan ibu untuk tetap rutin melakukan kunjungan antenatal care agar kesehatan ibu dan janinnya dapat dipantau dengan baik.

Pemantauan selanjutnya yaitu pemantauan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar pada tanggal 20 Januari 2022, pemantauan ini dilakukan dengan mengobservasi kembali tanda-tanda vital ibu untuk memastikan tekanan darah ibu bertambah atau berkurang dan pada hasil pemeriksaan didapatkan hasil tekanan darah yaitu 130/90 mmHg, keadaan ibu baik dan masih merasa sedikit pusing. Setelah dilakukan pemeriksaan mengajurkan ibu tetap mengatur pola makan dan pola istirahatnya agar tekanan darah bisa kembali normal, serta menganjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi obat yang diberikan sesuai dengan instruksi bidan/dokter.

Pemantauan selanjutnya yaitu pemantauan dilakukan di Rumah Sakit Umum Bahagia pada tanggal 04 Februari 2022, pemantauan yang dilakukan

dengan mengobservasi kembali tanda-tanda vital ibu pada hasil pemeriksaan didapatkan hasil tekanan darah 120/80 mmHg, keadaan ibu dalam keadaan baik tapi ibu tapi ibu merasa masih pusing. Menganjurkan kembali ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang yaitu makanan yang rendah garam dan rendah lemak. Menganjurkan ibu dan keluarga mempersiapkan untuk persalinan dan kelahiran bayinya dan menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan ANC secara teratur dan menganjurkan ibu untuk datang melakukan pemeriksaan kehamilan pada tanggal 24 Februari 2022 dan apabila ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan segera memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan terdekat.

Setelah dilakukan pemantauan ± 3 bulan, meminta ibu untuk tetap mempertahankan pola makan dan pola istirahat yang sekarang agar tidak terjadi lagi peningkatan tekanan darah, memberikan KIE pada ibu mengenai *health education*, mengajurkan ibu untuk menghindari aktivitas yang dapat membuat tubuhnya mudah lelah.

Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena seluruh tindakan yang dilakukan sudah berorientasi pada kebutuhan klien.

G. Langkah VII: Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan dimana pada tahap ini ditemukan kemajuan atau keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien. Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan, pada tahap ini penulis tidak mendapatkan

permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi. Hasil anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan USG, diagnosa yang ditegakkan pada Ny “N” adalah preeklampsia ringan. Rencana asuhan yang telah disusun berorientasi sesuai dengan kebutuhan pasien dan dilaksanakan secara menyeluruh. Adanya kerjasama antara pasien dan petugas kesehatan sehingga tidak ditemukan hambatan pada saat pelaksanaan asuhan.

Diet yang seimbang dan istirahat yang cukup merupakan penanganan sederhana yang dilakukan dalam kasus preeklampisa ringan, dimana pola makan yang tidak seimbang seperti tingginya mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak, banyak mengonsumsi garam dan juga banyak mengonsumsi makanan yang mengandung pengawet dapat mempengaruhi tekanan darah dimana tekanan darah dapat menjadi meningkat melebihi batas normal, sehingga dapat membahayakan ibu maupun janinnya. Pemberian terapi obat-obatan yang berupa nifedipin yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter juga dapat membantu menurunkan tekanan darah apabila dikonsumsi dengan teratur. Selain pemberian obat-obatan, ibu dan keluarga diberikan dukungan dengan menganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap bersabar dan meyakinkan ibu bahwa kejadian yang dialami adalah kehendak Allah SWT.

Tindakan akhir untuk mencegah terjadinya preeklampsia berat dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan tidak ada atau tidak adanya protein dalam urin. Serta dilakukan kolaborasi dengan dokter obgyn/ahli kandungan dalam pemeriksaan USG untuk memastikan bahwa keadaan janin dalam keadaan

baik dan sehat serta tidak ada kelainan. Selama pemantauan berlangsung, ibu telah diberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan ibu dan mendapatkan pendampingan oleh keluarga maupun bidan. Keadaan psikososial ibu baik, meskipun masih merasa cemas, akan tetapi ibu dalam keadaan baik, ditandai dengan keadaan tanda-tanda vital yang sudah kembali normal dan meminta ibu tetap berserah diri kepada Allah SWT. Agar ibu tetap dalam keadaan sehat.

Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari pemantauan pertama sampai pemantauan terakhir, semuanya berlangsung dengan baik, tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu maupun janin. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan.

H. Pendokumentasian

Pada hari pertama, ibu datang pada tanggal 30 November 2021 dan dilakukan pengumpulan data mulai dari riwayat kehamilan sekarang dan persalinan yang lalu, riwayat kesehatan, riwayat sosial ekonomi, riwayat psikososial, riwayat spiritual, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Ibu mengatakan sakit kepala yang disertai rasa pusing sejak tanggal 29 November 2021 HPHT tanggal 20 Mei 2021 usia kehamilan 27 minggu 5 hari, ibu mengatakan tidak ada riwayat hipertensi sebelum hamil.

Dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan didapatkan hasil pemeriksaan tekanan darah 150/100 mmHg, pemeriksaan laboratorium ditemukan protein dalam urin, TFU pertengahan pusat dan *prosesus xipodeus*, teraba bagian-

bagian janin dan terdengar denyut jantung janin. Pada kasus Ny “N” hasil pengkajian menunjukkan diagnosis hipertensi gestasional.

Pemantauan selanjutnya yang dilakukan di rumah ibu pada tanggal 22 Desember 2021 yaitu ibu merasakan sakit pada kepala dan merasa pusing, keadaan umum ibu baik, tampak cemas dengan keadaannya, pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil tekanan darah 140/100 mmHg, nadi 80x/menit, suhu 36.5°C dan pernapasan 20x/menit

Tindakan yang dilakukan dalam rencana tindakan pada pemantauan 22 Desember 2021 yaitu dengan menjelaskan penyebab nyeri kepala yang disertai rasa pusing pada ibu, menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola makan dan istirahat serta tidak terlalu banyak pikiran, mengajurkan pada ibu untuk dapat mengenali tanda-tanda preeklampsia yaitu sakit kepala, rasa nyeri di daerah perut, penglihatan kabur, terdapat proteinuria, menjelaskan pada ibu tentang 10 tanda bahaya dalam kehamilan, mengajurkan ibu untuk tetap rutin melakukan kunjungan antenatal care agar kesehatan ibu dan janinnya dapat dipantau dengan baik.

Pemantauan selanjutnya yaitu pemantauan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar pada tanggal 20 Januari 2022, pemantauan ini dilakukan dengan mengobservasi kembali tanda-tanda vital ibu untuk memastikan tekanan darah ibu bertambah atau berkurang dan pada hasil pemeriksaan didapatkan hasil tekanan darah yaitu 130/90 mmHg, keadaan ibu baik dan masih merasa sedikit pusing. Setelah dilakukan pemeriksaan mengajurkan ibu tetap mengatur pola makan dan pola istirahatnya agar tekanan darah bisa kembali

normal, serta menganjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi obat yang diberikan sesuai dengan instruksi bidan/dokter.

Pemantauan selanjutnya yaitu pemantauan dilakukan di Rumah Sakit Umum Bahagia pada tanggal 04 Februari 2022, pemantauan yang dilakukan dengan mengobservasi kembali tanda-tanda vital ibu pada hasil pemeriksaan didapatkan hasil tekanan darah 120/80 mmHg, keadaan ibu dalam keadaan baik tapi ibu merasa masih pusing. Menganjurkan kembali ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang yaitu makanan yang rendah garam dan rendah lemak. Menganjurkan ibu dan keluarga mempersiapkan untuk persalinan dan kelahiran bayinya dan menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan ANC secara teratur dan menganjurkan ibu untuk datang melakukan pemeriksaan kehamilan pada tanggal 24 Februari 2022 dan apabila ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan segera memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan terdekat.

Hasil dari kasus yang dialami Ny "N" dengan preeklampsia ringan diatasi dengan membantu ibu untuk memperbaiki pola makan, pola istirahatnya dan menganjurkan ibu untuk tidak terlalu stres, sakit kepala yang disertai rasa pusing teratasi dan tanda-tanda vital ibu kembali normal, serta ibu tampak sudah tenang.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung dilahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan pada Ny “N” dengan Asuhan Kehamilan di Rumah Sakit Umum Bahagia, maka bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Asuhan kebidanan pada Ny “N” dengan preeklampsia ringan dilakukan dengan teknik pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dari pengkajian dan analisa data dasar, pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan pengumpulan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, mulai dari anamnesis riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan keterangan tambahan yang menyangkut atau yang berhubungan dengan kondisi klien.
2. Diagnosa Ny “N” dengan preeklampsia ringan ditegakkan berdasarkan adanya keluhan yaitu nyeri pada kepala yang disertai dengan adanya rasa pusing dan dari hasil pemeriksaan tekanan darah didapatkan hasil yaitu tekanan darah 150/100 mmHg.
3. Pada Ny “N” masalah yang mungkin muncul terjadinya preeklampsia berat dan gangguan pertumbuhan pada janin.
4. Pada Ny “N” diperlukan tindakan segera, kolaborasi atau rujukan apabila terjadi masalah dalam persalinan tersebut.

5. Rencana tindakan yang telah disusun pada Ny “N” bertujuan agar ibu mendapatkan penanganan yang bersih dan aman, sesuai dengan kondisinya dan mencegah terjadinya komplikasi serta mencegah terjadinya trauma berat pada ibu dan janinnya.
6. Tindakan yang dilakukan bertujuan agar rencana yang disusun tercapai dengan adanya kerjasama antara bidan dan petugas lainnya agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan pasien.
7. Tindakan evaluasi pada Ny “N” dengan preeklampsia ringan telah diberikan semaksimal mungkin dan sesuai standar pelayanan/rencana asuhan kebidanan serta komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dapat teratasi.
8. Pendokumentasian dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021 s/d 04 Februari 2022 di Rumah Sakit Umum Bahagia sampai dengan kunjungan rumah. Pengkajian dilakukan mulai dari pasien datang sampai tekanan darah pasien kembali dalam keadaan normal.

B. Saran

1. Bagi klien
 - a. Menganjurkan pada ibu agar banyak beristirahat
 - b. Menganjurkan ibu untuk selalu memperhatikan keadaannya dan kesehatan janinnya.
 - c. Menganjurkan kepada ibu untuk mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang.

- d. Menganjurkan kepada ibu untuk mengonsumsi obat secara teratur sesuai instruksi yang diberikan
2. Saran untuk bidan
 - b. Bidan sebagai tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang profesional sehingga dapat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian prenatal (AKP). Oleh karena itu bidan harus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, melalui program pendidikan, pelatihan-pelatihan, seminar agar menjadi bidan yang berkualitas sesuai dengan perkembangan IPTEK.
 - c. Bidan harus memberikan asuhan sesuai wewenang untuk itu manajemen kebidanan perlu dikembangkan karena merupakan alat yang mendasari bagi bidan untuk memecahkan masalah klien dan berbagai kasus.
 - d. Seorang bidan hendaknya menganggap bahwa semua ibu hamil mempunyai resiko untuk komplikasi yang dapat mengancam jiwa ibu dan janin, oleh karena itu bidan diharapkan mampu mendeteksi secara dini adanya tanda-tanda bahaya kehamilan dan menganjurkan ibu dan keluarga segera ke pelayanan bila mengalami hal tersebut.
3. Saran untuk institusi kebidanan
 - a. Untuk mendapatkan hasil manajemen asuhan kebidanan yang baik perlu menyediakan tenaga bidan yang profesional untuk menunjang pelaksanaan tugas

- b. Untuk pelayanan yang lebih berkualitas sesuai dengan kemajuan teknologi, sebaiknya bidan yang sudah bertugas diberi kesempatan untuk melanjutkan atau semacam pelatihan-pelatihan
- c. Demi mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan perlu kiranya penyediaan fasilitas/alat-alat yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kebidanan dan untuk meningkatkan keterampilan bidan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


DAFTAR PUSTAKA

- Ana, Soumy (2010). *Lengkap Segala Hal Trimester Pertama Kehamilan Anda fase-fase Paling Mendebarkan*. Jogjakarta: Buku Biru.
- Ani, dkk (2020). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Berat Pada Ibu Bersalin Di Ruang Kebidanan RSUD HM. Ryacudu Kota Bumi Lampung Utara Tahun 2018*. Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak Akademi Kebidanan An-Nur.
- Asghari, E., et al. *The Effect of Cognitive Behavioural Therapy on Anxiety, Depression and Stress in Women with Preeclampsia*. Journal of Clinical & Diagnostic Research.
- Asri, Dewi dan Clervo, Cristine. *Asuhan Persalinan Normal*. Yogyakarta: Nuha Offset, 2010
- Ayu, dkk (2020). *Hubungan Riwayat Preeklampsia dengan Kejadian Preeklampsia pada Ibu Hamil*. Mutu Pelayanan Kebidanan
- Chandranita Manuaba, Ida Ayu, dkk. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: Buku kedokteran EGC, 2010.
- Casey, Aggif dan Benson (2010). *Menurunkan Tekanan Darah*. Jakarta.
- Corry Sihotang, Pesta, dkk (2016). *Hubungan Pola Makan dan Kecukupan Istirahat Tidur dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Biromaru*. Jurnal Kesehatan Tadulako Vol. 2 No. 1, Januari.
- Darmawansyih (2011). *Farmakologi Kebidanan*. Makassar-Gowa: Alauddin University press.
- Darmawansyih (2014). *Penyakit Kronik Dalam Kehamilan*. Makassar-Gowa: Alauddin University press.
- Dian (2020). *Hubungan indeks massa tubuh dengan kejadian preeklampsia*. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Fadlun, Achmad (2014). *Asuhan Kebidanan Patologi*. Jakarta: Salemban Medika.
- Fajar, Hajriah dan Suharyanto. *Aplikasi Pengetahuan Kehamilan dan Perhitungan Masa Kehamilan Berbasis Android Menggunakan Metode Algoritma Naegle*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer Volume 4 Nomor 2, Februari. ejournal.nusamandiri.ac.id/ejurnal/index.php/jitk/article/view/951, 2019.

- Fatkhiyah (2018). *Determinan Maternal Kejadian Preeklampsia: Studi Kasus di kabupaten Tegal, Jawa Tengah*. Jurnal Keperawatan Soedirman,
- Fitriani, Rini (2014). *Penyakit Sistemik pada Kehamilan*. Makassar-Gowa: Alauddin University Press.
- Idealistiana, Lia. *Hubungan Preeklampsia dan Faktor Lain Dengan Kejadian Bayi Berat lahir Rendah (BBLR)*. Jurnal Antara Kebidanan. ojs.abdinusantara.ac.id/index.php/antarakebidanan/article/view/19, 2018.
- Jannah, Nurul. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012
- Jumaiza, dkk (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Trimester III*. Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan Volume 4. Nomor 2 Januari.
- Kaimmudin, Liawati, dkk (2018). *Hubungan Usia Ibu Hamil Dengan Kejadian Hipertensi Di RSUD Gmim Pancaran Kasih Manado*. e-Journal Keperawatan (e-Kp) Volume 1.
- Kementerian Kesehatan RI (2019). *Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial*. Jakarta : Kementerian Kesehatan.
- Kementrian Kesehatan RI. *Profil Kesehatan Indonesia 2017*.
- Kemenkes RI. 2018. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- Mangkuji, Betty, dkk. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah Soap*. Jakarta: EGC, 2012
- Marmi (2011). *Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil*. Yogyakarta: Penerbit Pelajar.
- Maria (2020). *Karakteristik ibu hamil dengan pre eklampsia di rumah sakit umum umi barokah boyolali*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nadyah. *Kegawatdaruratan Neonatal, Anak Dan Maternal*. Makassar-Gowa: Alauddin University Press, 2013.
- Norma Nita, Dwi Mustika (2013). *Asuhan Kebidanan Patologi*. Yogyakarta : Nuha Medika. 2013
- Nugroho, dkk (2015). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan 3 Nifas*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Nugroho, Taufan (2012). *Patologi Kebidanan*. Yogyakarta : Nuha Medika.

- Nurasiah, Ai, dkk. *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Pantiawati, Ika, dkk (2010). *Asuhan Kebidanan (Kehamilan)*. Yogyakarta: Luha Medika.
- Prawirohardjo, Sarwono (2014). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Edisi Keempat.
- Pudiastuti, Ratna Dewi (2012). *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Normal Dan Patologi*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Rekam Medik RSU Bahagia Makassar, 2021.
- Robson, Elizabeth dan Waugh, Jason. *Patologi Pada Kehamilan Manajemen dan Asuhan Kebidanan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2010
- Rohmani (2015). *Faktor resiko kejadian hipertensi dalam kehamilan*. Jurnal Kedokteran Muhammadiyah.
- Rukiyah, Ai (2012). *Asuhan Kebidanan Patologi Kebidanan 4*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saminem, S. (2009). *kehamilan Normal*. Jakarta:Lentera Hati
- Setiawati, Dewi. *Kehamilan dan Pemeriksaan Kehamilan*. Makassar-Gowa: Alauddin University Press, 2013.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Situmorang, Ronalen dan Elis (2018). *Asuhan Kebidanan Pada Ny” P” Umur 32 Tahun G3P2A0 Dengan Hipertensi Gestasional Di Poli Kebidanan Rumah SakitM.Yunus Bengkulu Tahun 2018*. Jurnal Of Midwifery Volume 6.
- Sukfitrianty, dkk (2016). *Fakor-Faktor Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar*. Public Health Science Journal Volume 8 Nomor 1.
- Uli Basana, Lely Desi, dkk (2017). *Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Hipertensi Pada Kehamilan Studicase Controldi Wilayah Kerja Puskesmas Poriaha Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017*. Jurnal Ilmiah Kohesi Volume 1. Nomor 3 Oktober.
- Walyani E.S., Purwoastuti E (2015). *Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan menyusui*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

WHO (2020). *Maternal Mortality The Sustainable Development Goals and the Global Strategy for Women's, Children's and Adolescent's Health.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENDOKUMENTASIAN

1. Pemeriksaan Tekanan Darah



2. Pemeriksaan Urin



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

DDIN

S S A R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-15357 Un.06-FKIK/PP.00.9/04/ 2022 Gowa, 4 April 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nurhafni
N I M : 70400118064
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Preeklampsia di Rumah Sakit Bahagia."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Ferawati, S.ST., M.Keb.
2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Bahagia terhitung mulai tanggal 31 November 2021- 4 Februari 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.



Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 29425/S.01/PTSP/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
 Direktur RSU Bahagia Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1535/Un4-FKIK/PP.00.9/04/2022 tanggal 06 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURHAFNI**
 Nomor Pokok : 70400118064
 Program Studi : Kebidanan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA NY "X" DENGAN PREEKLAMPSIA
 DI RUMAH SAKIT BAHAGIA "**

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 April s/d 07 Mei 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 07 April 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal*

SIMAP PTSP 07-04-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231





Rumah Sakit Umum
Bahagia
Makassar

SURAT KETERANGAN

Nomor : 659/S.KET/RSU-B/MKS/III/2023

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Nomor. 29425/S.01/PTSP/2022 Tanggal 07 April 2022, Direktur Rumah Umum Bahagia Makassar menerangkan bahwa

Nama : NURHAFNI
NIM : 70400118064
Program Studi : Kebidanan
Judul : "Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny
"X" Dengan Preeklampsia Di RSU Bahagia
Makassar Tabun"

Telah melakukan Penelitian di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar pada Tanggal 07 April s/d 07 Juli 2022.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 02 Maret 2023

Direktur RSU Bahagia,


[Handwritten Signature]
SUKMAWATI DAHLAN, MM

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
2. Arsip



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

No.D.054/KEPK/FKIK/III/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : NURHAFNI
 Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Name of the Institution

Dengan judul:
 Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL DENGAN PREEKLAMPSIA DI RSU
 BAHAGIA MAKASSAR"**

**"MANAGEMENT OF ANTENATAL MIDWIFERY CARE WITH PREECLAMPSIA AT THE BAHAGIA
 GENERAL HOSPITAL IN MAKASSAR"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
 This declaration of ethics applies during the period March 9, 2022 until March 9,2023

9 Maret 2022
 Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
 Professor and Chairperson,

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama : Nurhafni

Nim : 70400118064

Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 04 November 1999

Suku : Bugis

Agama : Islam

Alamat : Perumahan Bukit Graha Garaganti Blok G
No 6

Nama Orang Tua

Ayah : Sabri

Ibu : Suharni

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006 - 2012 SD Negeri 122 Patampanua
2. Tahun 2012 - 2015 SMP Negeri 1 Patampanua
3. Tahun 2015 - 2018 SMA Negeri 5 Pinrang
4. Tahun 2018 - 2023 UIN Alauddin Makassar