

**ANALISIS KEMURNIAN JAHE MERAH (*Zingiber officinale var
rubrum*) DENGAN MENGGUNAKAN METODE SPEKTROKOPI
FTIR DAN KEMOMETRIK**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

CITRA NURUL SAPUTRI

70100118002

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Citra Nurul Saputri

Nim : 70100118002

Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 11 Mei 2001

Jurusan : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Btn Pao-Pao Permai

Judul : Analisis Kemurnian Jahe Merah (*Zingiber officinale*
var rubrum) dengan Menggunakan Metode
Spektroskopi FTIR dan Kemometrik

Menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 2023

Penulis

Citra Nurul Saputri
NIM. 70100118002

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “ *ANALISIS KEMURNIAN JAHE MERAH (ZINGIBER OFFICINALE VAR. RUBRUM) DENGAN MENGGUNAKAN METODE SPEKTROSKOPI FTIR DAN KEMOMETRIK*” yang disusun oleh CITRA NURUL SAPUTRI NIM: 70100118002, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 21 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 27 Juli 2023
*Kalender Hijriah

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr., dr., Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dra. Audah Mannan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: apt. Alwiyah Nur Syarif, S.Farm., M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

احمد هلل رب العالمني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
واملرسلني وعلى اله وصحبه أجمعني. اما بعد

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW yang telah menyingkap kegelapan wawasan umat manusia kearah yang lebih beradab dan manusiawi.

Skripsi yang berjudul “Analisis Kemurnian Jahe Merah (*Zingiber officinale var rubrum*) Dengan Menggunakan Metode Spektroskopi FTIR Dan Kemometrik” disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Terkhusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Orang tua saya, ayah saya Ir. M. Amir Yunus dan ibu saya Haryani, Sp yang tak henti-hentinya memanjatkan do'a memberikan motivasi dengan seluruh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuh, baik berupa moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Buat Saudara-saudara saya yaitu Muhammad Fadhil Amir, Nayla Anzaria,

Muhammad Fikri Amir, serta keluarga besarku tercinta yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta para wakil Rektor yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I (bidang akademik) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. Faris Satrinegara, SKM., MARS selaku Wakil Dekan II (bidang administrasi dan keuangan) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III (bidang kemahasiswaan) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
6. Ibu Surya Ningsi, S.Si.,M.Si.,Apt selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Farmasi selaku Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

8. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing, memberikan motivasi dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Ibu apt. Alwiyah Nur Syarif, S.Farm., M.Si. selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing, memberikan motivasi dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Ibu apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si. selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
11. Ibu Dra. Audah Mannan, M.Ag. selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
12. Seluruh Dosen, Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.
13. Kepada Kakanda Supardi yang selalu menyemangati, mendukung, membantu, serta mendo'akan hingga dapat berada pada tahap penyelesaian studi ini.
14. Seluruh teman-teman keluarga besar "SUSPENSI" Farmasi UIN Alauddin Makassar angkatan 2018 yang telah ikut serta dalam memberikan support hingga terselesaikannya skripsi ini.
15. Begitu pula teman-teman yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan, dukungan, kerjasama dan do'anya.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Gowa, 2023

Penulis

Citra Nurul Saputri
NIM : 70100118002




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	5
C. <i>Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian</i>	5
1. Definisi Operasional	5
2. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. <i>Kajian Pustaka</i>	6
E. <i>Tujuan Penelitian</i>	12
F. <i>Manfaat Penelitian</i>	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. <i>Uraian Tanaman</i>	13
B. <i>Spektrofotometri FTIR</i>	18
C. <i>Kemometrik</i>	20
D. <i>Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tanaman Sebagai Obat</i>	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. <i>Jenis dan Lokasi Penelitian</i>	25
B. <i>Pendekatan Penelitian</i>	25
C. <i>Alat dan Bahan</i>	25
D. <i>Cara Kerja</i>	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28

A. Hasil Penelitian	28
B. Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	61
RIWAYAT HIDUP	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (<i>Zingiber officinale</i> var <i>rubrum</i>) Mamuju	28
Tabel 2.	Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (<i>Zingiber officinale</i> var <i>rubrum</i>) Bone	28
Tabel 3.	Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (<i>Zingiber officinale</i> var <i>rubrum</i>) Sinjai	28
Tabel 4.	Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (<i>Zingiber officinale</i> var <i>rubrum</i>) Luwu	29
Tabel 5.	Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (<i>Zingiber officinale</i> var <i>rubrum</i>) Maros	29
Tabel 6.	Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (<i>Zingiber officinale</i> var <i>rubrum</i>) Enrekang	29
Tabel 7.	Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (<i>Zingiber officinale</i> var <i>rubrum</i>) Bulukumba	30
Tabel 8.	Hasil ekstraksi herba Jahe Gajah (<i>Zingiber officinale</i> var. <i>Officinale</i>) Bone	30
Tabel 9.	Hasil ekstraksi herba Jahe Gajah (<i>Zingiber officinale</i> var. <i>Officinale</i>) Sinjai	30
Tabel 10.	Hasil ekstraksi herba Jahe Gajah (<i>Zingiber officinale</i> var. <i>Officinale</i>) Luwu	30
Tabel 11.	Hasil ekstraksi herba Jahe Emprit (<i>Zingiber officinale</i> var. <i>Amarum</i>) Bone	31
Tabel 12.	Hasil ekstraksi herba Jahe Emprit (<i>Zingiber officinale</i> var. <i>Amarum</i>) Enrekang	31
Tabel 13.	Hasil ekstraksi herba Jahe Emprit (<i>Zingiber officinale</i> var. <i>Amarum</i>) Luwu	31
Tabel 14.	Data Analisis Spektrum FTIR dari Beberapa Jenis Jahe	50
Tabel 15.	Data Analisis Jahe Emprit Enrekang, Bone, dan Luwu	51
Tabel 16.	Data Analisis Jahe Gajah Bone, Luwu, dan Sinjai	52
Tabel 17.	Kandungan Jahe Merah	55
Tabel 18.	Kandungan Jahe Emprit	55
Tabel 19.	Kandungan Jahe Gajah	56

DAFTAR GAMBAR


Gambar 4. 1. Spektrum Jahe Merah (Zingiber officinale var rubrum) Bone....	32
Gambar 4. 2. Spektrum Jahe Merah (Zingiber officinale var rubrum) Mamuju	32
Gambar 4. 3. Spektrum Jahe Merah (Zingiber officinale var rubrum) Luwu...	33
Gambar 4. 4. Spektrum Jahe Merah (Zingiber officinale var rubrum) Sinjai...	33
Gambar 4. 5. Spektrum Jahe Merah (Zingiber officinale var rubrum) Maros.	34
Gambar 4. 6. Spektrum Jahe Merah (Zingiber officinale var rubrum) Enrekang	34
Gambar 4. 7. Spektrum Jahe Gajah (Zingiber officinale var. Officinale) Bone	35
Gambar 4. 8. Spektrum Jahe Merah (Zingiber officinale var rubrum) Bulukumba	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 9. Spektrum Jahe Gajah (Zingiber officinale var. Officinale) Sinjai	36
Gambar 4. 10. Spektrum Jahe Gajah (Zingiber officinale var. Officinale) Luwu	36
Gambar 4. 11. Spektrum Jahe Emprit (Zingiber officinale var. Amarum) Bone	37
Gambar 4. 12. Spektrum Jahe Emprit (Zingiber officinale var. Amarum) Enrekang	37
Gambar 4. 13. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Bulukumba dan Jahe Emprit Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu	38
Gambar 4. 14. Spektrum Jahe Emprit (Zingiber officinale var. Amarum) Luwu	38
Gambar 4. 15. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Maros dan Jahe Emprit Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu	39
Gambar 4. 16. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Mamuju dan Jahe Emprit Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu	39
Gambar 4. 17. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Enrekang dan Jahe Emprit Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu	40
Gambar 4. 18. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Luwu dan Jahe Emprit Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu	40
Gambar 4. 19. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Sinjai dan Jahe Emprit Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu.	41
Gambar 4. 20. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Bone dan Jahe Emprit Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu	41
Gambar 4. 21. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Mamuju dan Jahe Gajah Bone, Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai	42
Gambar 4. 22. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Bulukumba dan Jahe Gajah Bone, Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai.....	42

Gambar 4. 23. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Luwu dan Jahe Gajah Bone, Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai	43
Gambar 4. 24. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Maros dan Jahe Gajah Bone, Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai	43
Gambar 4. 25. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Bone dan Jahe Gajah Bone, Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai	44
Gambar 4. 26. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Enrekang dan Jahe Gajah Bone, Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai	44
Gambar 4. 27. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Sinjai dan Jahe Gajah Bone, Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai	45
Gambar 4. 28. Score Plot PCA PC-1 dan PC-2 Jahe Merah dan Jahe Emprit Kombinasi	46
Gambar 4. 29. Score Plot PCA PC-1 dan PC-2 Jahe Murni	46
Gambar 4. 30. Score Plot PCA PC-1 dan PC-2 Jahe Merah dan Jahe Gajah Kombinasi	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Prosedur Kerja..... 61
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian 62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : CITRA NURUL SAPUTRI
Nim : 70100118002
Judul : Analisis Kemurnian Jahe Merah (*Zingiber officinale var rubrum*) dengan Menggunakan Metode Spektroskopi FTIR dan Kemometrik

Aplikasi kombinasi spektrum FTIR telah digunakan dengan metode kemometrik yang luas, termasuk kadar senyawa obat aktif atau kelompok tanaman, metode deteksi pemalsuan atau karakterisasi bahan baku makanan atau obat herbal. Salah satu tanaman yang berpotensi dipalsukan sebagai bahan baku obat tradisional adalah jahe merah. Jahe merah memiliki harga lebih tinggi dibandingkan jahe lain, jahe merah sulit dibedakan dengan jenis jahe lain apabila dalam bentuk bubuk dan hampir identik satu sama lain sehingga jahe lain berpotensi menjadi pemalsu jahe merah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemurnian jahe (*Zingiber officinale var rubrum*) menggunakan Spektroskopi FTIR yang dikombinasikan dengan Kemometrik dengan metode PCA (*Principal Component Analysis/Analisis Komponen Utama*). Spektrum sidik jari FTIR yang dihasilkan merupakan informasi data yang sangat kompleks sehingga dapat sepenuhnya menggambarkan sifat kimia sampel. Kemometrik adalah penerapan prosedur matematika untuk memproses, mengevaluasi, dan menafsirkan data dalam jumlah besar. Ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Serta Kombinasi jahe dilakukan dengan mencampurkan masing-masing sampel. Pengukuran spektrum inframerah menggunakan alat FTIR. Hasil data FTIR diolah menggunakan metode PCA (*Principal Component Analysis*) dengan menggunakan software The Unscrambler® X 10.4. Adapun hasil penelitian menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA) menunjukkan bahwa sampel Kombinasi Jahe Merah Mamuju dan Jahe Gajah Sinjai yang berada pada kuadran yang sama dengan sampel Jahe Merah Mamuju Murni. Oleh karena itu hasil analisis menggunakan metode Kemometrik ini tidak dapat membedakan kemurnian Jahe Merah.

Kata Kunci : FTIR, Kemometrik, PCA, Jahe Merah

ABSTRACK

Nama : CITRA NURUL SAPUTRI
Nim : 70100118002
Title : Analysis of Purity of Red Ginger (*Zingiber officinale var rubrum*) Using FTIR Spectroscopy and Chemometric Methods

The combined application of FTIR spectra has been used with a wide range of chemometric methods, including assays of active drug compounds or plant groups, counterfeiting detection methods or characterization of food raw materials or herbal medicines. One of the plants that has the potential to be counterfeited as a raw material for traditional medicine is red ginger. Red ginger has a higher price than other gingers, red ginger is difficult to distinguish from other types of ginger when it is in powder form and is almost identical to one another so that other gingers have the potential to become red ginger counterfeiters. This study aims to analyze the purity of ginger (*Zingiber officinale var rubrum*) using FTIR spectroscopy combined with chemometrics using the PCA (Principal Component Analysis) method. The resulting FTIR fingerprint spectrum is very complex data information so that it can fully describe the chemical properties of the sample. Chemometrics is the application of mathematical procedures to process, evaluate and interpret large amounts of data. Extraction was carried out by maceration using 96% ethanol solvent. And the combination of ginger is done by mixing each sample. Infrared spectrum measurement using the FTIR tool. The results of FTIR data were processed using the PCA (Principal Component Analysis) method using The Unscrambler® X 10.4 software. The results of the study using Principal Component Analysis (PCA) showed that the Mamuju Red Ginger and Gajah Sinjai Combination samples were in the same quadrant as the Pure Mamuju Red Ginger samples. Therefore the results of the analysis using the chemometric method cannot distinguish the purity of Red Ginger.

Keywords: FTIR, Chemometrics, PCA, Red Ginger

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Obat tradisional merujuk kepada unsur atau elemen yang dimanfaatkan dalam pengobatan secara turun-temurun, seperti bahan tumbuhan, unsur dari dunia hewan, material mineral, ekstrak yang diolah secara tradisional, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dapat digunakan sesuai norma dan aturan yang berlaku dalam Masyarakat (KEMENKES, 2016).

Di seluruh dunia, obat tradisional sangat populer, dan sekitar 80% penduduk di beberapa negara melindungi kesehatan mereka dengan menggunakannya. Obat tradisional telah diterima dengan baik di hampir setiap negara, baik pada negara berkembang maupun negara maju. Peningkatan penggunaan jamu di negara maju dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya jumlah penyakit kronik, kurangnya penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu, dan luasnya akses informasi tentang jamu. Karena banyaknya perbedaan dalam penyiapan bahan alam, produksi obat tradisional terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk memudahkan pengawasan dan perizinan, FDA mengklasifikasikan obat tradisional menjadi sediaan herbal, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka (DEWI, 2019).

Jahe, juga dikenal dengan nama ilmiah *Zingiber officinale*, adalah tumbuhan obat yang berasal dari Asia Selatan dan saat ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pemanfaatan pertama jahe sebagai ramuan herbal dicatat dalam pengobatan mabuk perjalanan di zaman kuno Yunani. Di wilayah Asia secara luas, jahe telah menjadi bahan rempah-rempah dalam masakan serta memiliki penggunaan dalam pengobatan tradisional selama ribuan tahun. Dalam industri farmasi, varietas jahe yang paling umum digunakan adalah jahe sunti,

yang memiliki kandungan minyak atsiri antara 2,58 hingga 2,72%. Diikuti oleh jahe gajah, dengan kandungan minyak atsiri antara 0,82 hingga 1,68%, dan jahe emprit, yang mengandung 1,5 hingga 3,3% minyak atsiri. Minyak atsiri yang aktif, seperti shogaol, gingerol, dan zingerone, bersama dengan antioksidan alami lainnya, memiliki potensi dalam mencegah dan merawat berbagai macam penyakit, mulai dari yang ringan hingga yang lebih serius. Ini mencakup kondisi seperti pilek, batuk, sakit kepala, nyeri otot, serta ketidaknyamanan dan rasa pegal pada tubuh (Redi Aryanta, 2019).

Di Indonesia, Jahe merah termasuk dalam kategori jahe yang sering dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional serta sebagai tambahan dalam suplemen makanan. Selain itu, di Indonesia, terdapat dua varietas jahe yang lebih umum dikenal, yaitu jahe emprit dan jahe gajah. Perbedaan utama dari ketiga jenis jahe ini terletak pada bentuk dan rasa yang dimiliki. Rasa pedas jahe merah lebih intens daripada rasa jahe gajah. Jahe kasar memiliki akar dengan banyak ruas kecil berwarna putih atau kuning, sementara jahe merah memiliki akar dengan ruas-ruas kecil berwarna merah. Di sisi lain, jahe gajah memiliki akar dengan segmen yang lebih besar. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa ada hubungan antara aktivitas biologis dan kadar beberapa senyawa pada ketiga jenis jahe tersebut. Di pasar tradisional Indonesia, Harga jahe merah umumnya lebih tinggi daripada jahe gajah. Namun, perlu diingat bahwa ada risiko adanya jahe gajah atau jahe merah palsu karena perbedaan harga ini. Faktor tambahannya adalah ketiga jenis jahe tersebut bisa sangat mirip satu sama lain saat dijual dalam bentuk bubuk atau polos. Oleh karena itu, untuk memastikan keaslian, kualitas, keamanan, dan manfaat sebelum dibuat menjadi produk akhir, sangat penting untuk membedakan jahe merah dengan jahe jenis lain yang dibalut dalam bentuk polos atau bubuk (Purwakusumah et al., 2014).

Spektrofotometer FT-IR memiliki kemampuan untuk menganalisis banyak komponen secara bersamaan, memungkinkannya mengukur sampel dengan cepat dan aman. Meskipun demikian, penggunaan FT-IR untuk menganalisis tanaman masih terbatas karena struktur dan spektrum yang dihasilkan memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Spektrum sidik jari FT-IR mengandung informasi data yang sangat kompleks, yang mampu menggambarkan sifat kimia suatu sampel secara komprehensif. Perubahan posisi dan intensitas pita pada spektrum FT-IR memiliki korelasi dengan perubahan komposisi kimia sampel tersebut. Oleh karena itu, spektrum FT-IR memiliki potensi untuk membedakan satu jenis tanaman dari jenis lainnya (Syahrani et al., 2016). Spektrum FTIR ini memiliki kemampuan untuk dianalisis dengan cepat, tidak merusak dan memerlukan preparasi sampel yang sederhana (Risal, 2020).

Interaksi antara bahan kimia dalam matriks sampel yang kompleks menyebabkan spektrum FT-IR. Spektrum ultra FT-IR kaya memberikan informasi struktur molekul melalui satu set pita serapan khusus untuk setiap molekul. Ini digunakan untuk membedakan suatu zat kriteria yang memiliki karakteristik yang sama. Keunggulan teknologi spektroskopi FT-IR adalah kemampuan untuk digunakan secara langsung pada sampel tanpa melakukan langkah pemisahan pertama (Indonesian Journal of Chemical, 2016). Preparasi sampel lebih cepat dan mudah melalui analisis yang dilakukan dengan metode ini. Selain itu, spektrofotometer FTIR dapat digunakan untuk mengidentifikasi komponen obat herbal. Ini karena kemajuan dalam instrumen dapat menghasilkan jumlah data yang besar dengan hanya perbedaan kecil antara sampel, yang dapat berdampak signifikan pada perbedaan tanaman herbal (Shafirany et al., 2019).

Kemometrik adalah penerapan prosedur matematika untuk memproses, mengevaluasi, dan menafsirkan data dalam jumlah besar (Indonesian Journal of Chemical, 2016). Penentuan multivariat untuk menunjukkan hubungan antara sampel dan variabel yang berbeda adalah Salah satu teknik kemometrik yang populer saat ini adalah digunakan dalam menganalisis kesamaan antara karakteristik dari berbagai zat kimia. Kemometrik merupakan aplikasi minitab yang menggabungkan kimia dan statistik (Risal, 2020). Kemometrik adalah analisis data kimia (pendeteksian gugus fungsi) menggunakan radiasi infra merah secara statistik dan matematis. Beberapa teknik pengukuran kimia yang digunakan untuk mengklasifikasikan minyak adalah PCA (analisis komponen utama), CA (analisis massa), dan LDA (analisis diskriminan linier) (Alfonita, 2018).

Salah satu metode analisis multivariat adalah Analisis Komponen Utama (PCA), yang bertujuan untuk menyederhanakan variabel-variabel yang diamati dengan mengurangi dimensinya. PCA adalah teknik yang umum digunakan dalam memproses data multivariat ketika karakteristik sampelnya tidak diketahui sebelumnya (Shafirany et al., 2019). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa data FTIR yang diolah dengan PCA dan LDA memiliki hasil yang baik. Penggunaan FTIR dengan metode PCA dan LDA biasanya memerlukan sampel padatan (Alfonita, 2018).

Aplikasi kombinasi spektrum FTIR telah digunakan dengan metode kemometrik yang luas, termasuk model klasifikasi untuk wilayah Meniran, kadar senyawa obat aktif atau kelompok tanaman, metode untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi bahan baku makanan atau obat herbal, serta memproyeksikan kapasitas antioksidan total minuman anggur. Ini digunakan secara luas karena memberikan hasil yang akurat dan cukup akurat (Syahrani et al., 2016).

Berdasarkan penjelasan yang diberikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat kemurnian jahe merah. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti akan menggunakan teknik spektroskopi FTIR dan kemometrik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Bagaimanakah model profil Spektrum FTIR pada ketiga jahe dan kombinasi jahe merah dan jahe gajah, dan kombinasi jahe merah dan jahe emprit?
2. Bagaimana hasil analisis grafik pada analisis kemurnian Jahe Merah dengan metode PCA (*Principal Component Analysis/ Analisis Komponen Utama*) yang akan dilakukan?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Analisis Kemurnian adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan hasil spektrum dan kemometrik untuk memastikan apakah sampel jahe merah dan sampel jahe jenis lain bercampur.
- b. Jahe adalah sejenis rempah yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, terutama dalam konteks kesehatan. Tanaman jahe juga digunakan sebagai tanaman obat yang memiliki ciri khas setengah batang.
- c. Apabila dibandingkan dengan varietas jahe lain, jahe merah memiliki rasa yang lebih intens pedas dan pahit. Ketika jahe merah dimakan, kulitnya berwarna merah muda menjadi warna jingga yang cerah, dan daging buahnya sedikit berwarna coklat. Jahe merah biasa digunakan sebagai

bumbu masakan, dan juga digunakan secara eksperimental dalam berbagai jamu.

- d. *Fourier transform infrared* (FT-IR) merupakan salah satu alat yang paling populer untuk mengukur getaran molekul dan dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana struktur suatu senyawa kimia akan terbentuk.
- e. Kemometrik adalah metode matematika yang digunakan untuk memproses, mengevaluasi, dan menafsirkan sejumlah besar data adalah statistik.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini terfokus pada analisis kemurnian pada jahe merah yang akan dikombinasikan dengan jenis jahe lainnya. Penelitian ini akan melibatkan analisis spektrum FTIR (*Fourier Transform Infrared*) untuk mengidentifikasi pola spektrum unik pada masing-masing jenis jahe. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan teknik kemometrik untuk mereduksi dimensi data dan menginterpretasi hasil spektrum FTIR yang telah diperoleh. Hal ini bertujuan untuk memahami kemurnian jahe merah dan mengidentifikasi perbedaan dan kemiripan antara jenis jahe yang berbeda setelah dikombinasikan.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Djauhari Purwakusumah dan timnya pada tahun 2014 berjudul "Identifikasi dan Verifikasi Jahe Merah Menggunakan Kombinasi Spektroskopi FTIR dan Pengukuran Kimiawi" telah berhasil menggabungkan spektroskopi FTIR dengan analisis komponen utama dan analisis diskriminan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dua spesies yang berkerabat dengan jahe merah dan gajah serta untuk memeriksa perbedaan jahe merah dengan jenis lainnya. Pada penelitian ini, seluruh sampel dianalisis menggunakan spektrum FTIR dalam rentang panjang gelombang 4000-400 cm^{-1} setelah

mendapatkan pra-perlakuan berupa normalisasi dan koreksi awal. Hasil analisis spektrum FTIR kemudian dianalisis melalui metode pengukuran kimia, termasuk Analisis Komponen Utama dan Analisis Karakteristik, untuk membedakan antara ketiga jenis jahe. Melalui analisis diskriminan, dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kultivarnya. Metode yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki potensi untuk digunakan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi jahe merah secara efektif. Penting untuk dicatat bahwa hasil penelitian ini memberikan informasi yang berharga dalam pemahaman tentang perbedaan dan kemiripan antara jenis jahe yang berbeda, khususnya jahe merah, dan memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut terkait dengan jahe merah dan jenis jahe lainnya (Purwakusumah et al., 2014).

Perbedaan utama antara penelitian yang disebutkan sebelumnya dan penelitian yang baru disebutkan adalah pada jenis jahe yang diteliti. Pada penelitian pertama, fokus utamanya adalah pada identifikasi dan verifikasi jahe merah, sedangkan pada penelitian terakhir, fokusnya adalah pada identifikasi dan validasi jahe merah dari dua spesies jahe yang berkerabat dekat, yaitu jahe effervescent dan jahe gajah. Sedangkan pada penelitian ini, metode kombinasi Spektroskopi FTIR dan Kemometrik yang menggunakan metode analisis komponen utama digunakan untuk mengidentifikasi kemurnian jahe merah dengan menggunakan jahe jenis lain yakni jahe emprit dan jahe gajah yang akan dikombinasikan dengan jahe merah, dan pada penelitian ini juga mengambil sampel dari beberapa daerah di Sulawesi yaitu Mamuju, Bone, Sinjai, Luwu, Enrekang, Bulukumba, dan Maros.

2. Hasil penelitian (I Wayan Redi Aryanta, 2019) dengan judul “Manfaat Jahe untuk Kesehatan” menyatakan bahwa Jahe, yang juga dikenal sebagai *Zingiber officinale*, telah lama digunakan sebagai obat tradisional dan sebagai minuman. Akar jahe digunakan untuk pengobatan luar, masalah rematik, dan lemah syahwat. Jahe secara umum mengandung nutrisi dan senyawa kimia aktif yang membantu dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Rimpang jahe memiliki kandungan nutrisi yang beragam dan penting, termasuk kalori, karbohidrat, serat, protein, sodium, magnesium, fosfor, seng, vitamin C, vitamin B6, vitamin A, riboflavin, dan niacin. Minyak atsiri yang terdapat dalam jahe mengandung beberapa senyawa kimia aktif seperti zingiberin, kamfena, lemonin, borneol, shogaol, sineol, fellandren, zingiberol, gingerol, dan zingeron, yang memiliki dampak farmakologis yang bermanfaat bagi kesehatan. Jahe telah digunakan secara tradisional untuk mengobati berbagai masalah kesehatan, termasuk masalah lemah syahwat, batuk, rasa nyeri, sakit kepala, rematik, sakit pinggang, masuk angin, bronkitis, gangguan perut, nyeri otot, pusing, mual selama kehamilan, peradangan sendi, gangguan pencernaan, nyeri saat menstruasi, kadar kolesterol dan trigliserida tinggi dalam darah, kanker, penyakit jantung, masalah fungsi otak, Alzheimer, penyakit menular, dan asma (Redi Aryanta, 2019).

Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan jurnal I Wayan Redi Aryanta tahun 2019 yakni pada penelitian tersebut menyatakan bahwa banyaknya manfaat jahe untuk kesehatan tentunya sangat berpengaruh dengan bermunculannya produk-produk atau sediaan yang berhubungan dengan jahe terutama banyak dijadikan minuman kesehatan atau

pengobatan. Maka dari itu, penelitian ini mengidentifikasi kemurnian jahe merah jika telah diserbukkan.

3. Hasil penelitian (Abd. Halim Umar, dkk, 2016) dengan judul "Determinasi dan Analisis Finger Print Tanaman Murbei (*Morus alba Lour*) Sebagai Bahan Baku Obat Tradisional dengan Metode Spektroskopi FTIR dan Kemometrik" menunjukkan bahwa spektrum FTIR tanaman murbei (*Morus alba Lour*) diperoleh melalui penggunaan metode kemometrik dengan menggunakan program Minitab versi 16 dan The Unscrambler 9.7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa spektrum yang hampir identik ditemukan pada sembilan kategori sampel yang berasal dari berbagai wilayah. Kategori tersebut meliputi 1 (Cendana), 2 (Baraka dan Palangga), 3 (Kalambe dan Cina), 4 (Tikala dan Bori), 5 (Lemo), dan 6 (Solie). Ini menunjukkan bahwa ada kemiripan spektrum FTR pada sampel-sampel tersebut, meskipun berasal dari wilayah yang berbeda. Hasil ini memberkan wawasan tentang kesamaan komposisi kimia antara berbagai varietas tanaman murbei yang dianalisis dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana nilai karakteristik yang membedakan berpengaruh pada setiap variasi individu (Syahrani et al., 2016).

Perbedaan antara penelitian ini dan jurnal yang dilakukan oleh Abd. Halim Umar pada tahun 2016 adalah dalam fokus dan tujuan penelitiannya. Penelitian Abd. Halim Umar bertujuan untuk menggabungkan metode Spektroskopi FTIR dengan Kemometrik untuk mengukur bobot nilai karakteristik pembeda dalam pemisahan individu pada tanaman murbei. Dalam penelitian ini, metode yang sama yaitu kombinasi Spektroskopi FTIR dan Kemometrik, digunakan untuk

menghasilkan hasil grafik yang dapat mengidentifikasi kemurnian Jahe Merah.

4. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Rafi dan rekannya pada tahun 2016 dengan judul "Potensi Spektroskopi FT-IR-ATR dan Kemometrik untuk Membedakan Rambut Babi, Kambing, dan Sapi," penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penggunaan spektroskopi Fourier transform infrared-attenuated total reflectance (FTIR-ATR) dan kemometrik dalam membedakan jenis rambut babi, kambing, dan sapi. Dalam penelitian ini, analisis klustering (gerombol), analisis komponen utama (AKU), dan analisis diskriminan (AD) digunakan untuk membedakan sampel-sampel berdasarkan jenis rambutnya. Hasil dari model diskriminasi yang menggunakan AKU dan AD menunjukkan bahwa ketiga jenis rambut hewan tersebut dapat dibedakan satu sama lain. Dengan demikian, penggunaan spektroskopi FT-IR-ATR yang dikombinasikan dengan metode kemometrik seperti AKU dan AD terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan membedakan jenis rambut babi, kambing, dan sapi. (Indonesian Journal of Chemical, 2016).

Perbedaan antara studi ini dan penelitian yang dijelaskan dalam artikel karya Mohamad Rafi dkk. (2016), misalnya terletak pada pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya, digunakan analisis spektroskopi FTIR yang dipasangkan dengan metode kemometrik. Tujuannya adalah untuk mengembangkan teknik identifikasi dan pemisahan antara rambut babi, kambing, dan sapi. Sedangkan pada penelitian ini penggunaan spektroskopi FTIR yang dikombinasikan dengan metode kemometrik dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi

kemurnian jahe merah dengan menggunakan metode analisis komponen utama.

5. Hasil penelitian (Risal, 2020) dengan judul “Analisis Kemometrik Senyawa Inhibitor Tirosinase Menggunakan Spektrofotometer IR (FTIR)” menunjukkan bahwa dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap persamaan dan ciri-ciri khas dari berbagai bahan penghambat tirosinase. Dalam penelitian ini, digunakan spektrofotometer infra merah (FTIR) untuk mengenali senyawa-senyawa pengambat tirosinase seperti arbutin dan asam kojik. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kemometrik, termasuk analisis komponen utama (PCA) dan analisis kelompok (CA). Penggunaan metode PCA dan CA bertujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat dibandingkan (Risal, 2020).

Untuk membedakan penelitian ini dari jurnal Risal tahun 2020, yaitu pada penelitian tersebut dalam menganalisis kesamaan senyawa dan karakteristik yang khas dari beberapa senyawa inhibitor tirosinase penelitian tersebut menggunakan metode spektrofotometer IR yang selanjutnya diolah dengan metode kemometrik PCA (*Principal Component Analysis*) dan CA (*Cluster Analysis*). Sedangkan pada penelitian ini, dalam menganalisis kemurnian jahe merah dilakukan dengan menggunakan metode Kombinasi Spektrofotometri FTIR dan Kemometri Analisis Komponen Utama.

6. Hasil penelitian (Abdul Rohman, dkk, 2021) dengan judul “*The Use of Chemometrics for Classification of Sidaguri (Sida rhombifolia) Based on FTIR Spectra and Antiradical Activities*” menyatakan bahwa Tujuan penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan sidaguri dari beberapa

daerah yang diamati berdasarkan spektrum FTIR dan kemometrik menggunakan metode Analisis Komponen Utama. Selain itu, metode PLSR (Partial Least Square Regression) digunakan untuk mengkorelasikan aktivitas antiradikal dengan spektrum FTIR (Rohman et al., 2021).

Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan jurnal Abdul Rohman tahun 2021 tersebut yakni pada penelitian tersebut bertujuan mengklasifikasikan sidaguri dari beberapa daerah dengan berdasarkan spektrum FTIR dan Kemometrik. Sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan jahe merah dari beberapa daerah dengan berdasarkan spektrum FTIR dan Kemometrik.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pola spektrum FTIR dari Jahe Merah, Jahe Emprit, Jahe Gajah, serta kombinasi Jahe Merah dan Jahe Gajah, dan juga kombinasi Jahe Merah dan Jahe Emprit; dan
2. Untuk mengetahui hasil analisis grafik pada analisis kemurnian Jahe Merah dengan menggunakan metode PCA (*Principal Component Analysis/Analisis Komponen Utama*).

F. Manfaat Penelitian

Harapannya, hasil dari penelitian ini akan memiliki dampak positif bagi lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam hal menyediakan metode analisis yang simpel dan efisien untuk menilai kemurnian jahe merah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman

1. Deskripsi dan Klasifikasi Jahe Merah

a. Nama Lokal

Jahe dikenal sebagai "jae" di wilayah Jawa dan Bali, "jhai" di Madura, serta "jae" di Kangean. Di berbagai daerah lainnya, tanaman ini juga dikenal dengan sebutan seperti "halia" di Aceh, "beuing" di Gayo, "bahing" di Karo, "pege" di Toba, "sipode" di Mandailing, "lahia" di Nias, "sipodeh" di Minangkabau, "page" di Lubu, dan "danjahi" di Lampung. Selain itu, nama-nama lain untuk tanaman jahe termasuk "layu" di Mongondow, "moyuman" di Poros, "melito" di Gorontalo, "yuyo" di Buol, "siwei" di Barea, "laia" di Makasar, "pace" di Bugis, "reja" di Bima, "alia" di Sumba, "lea" di Flores, "lai" di Dayak, "tipakan" di Banjarmasin, "hairalo" di Amahai, "pusu," "seeia," dan "sehi" di Ambon dan Hila, "sehil" di Nusalaut, "siwew" di Buns, "garaka" di Ternate, "gora" di Tidore, "laian" di Aru, serta "tali" di Kalanapat dan "marman" di Kapaur (Nurliani Bermawie, n.d.).

b. Klasifikasi Jahe Merah (Kusuma, 2019).

- a. Regnum : Plantae
- b. Divisi : Spermatophyta
- c. Sub divisi : Angiospermae
- d. Kelas : Magnoliopsida/Dikoti
- e. Sub Kelas : Zingiberidae
- f. Ordo : Zingiberales
- g. Famili : Zingiberaceae
- h. Genus : Zingiber

- i. Spesies : *Zingiber officinale var. Rubrum*

c. Klasifikasi Jahe Emprit (Kusuma, 2019).

- a. Regnum : *Plantae*
 b. Divisi : *Spermatophyta*
 c. Sub divisi : *Angiospermae*
 d. Kelas : *Magnoliopsida/ dikotil*
 e. Sub Kelas : *Zingiberidae*
 f. Ordo : *Zingiberales*
 g. Famili : *Zingiberaceae*
 h. Genus : *Zingiber*
 i. Spesies : *Zingiber officinale var. Amarum*

d. Klasifikasi Jahe Gajah (Kusuma, 2019)

- a. Regnum : *Plantae*
 b. Divisi : *Spermatophyta*
 c. Sub divisi : *Angiospermae*
 d. Kelas : *Magnoliopsida/Dikotil*
 e. Sub Kelas : *Zingiberidae*
 f. Ordo : *Zingiberales*
 g. Famili : *Zingiberaceae*
 h. Genus : *Zingiber*
 i. Spesies : *Zingiber officinale var. Officinale*

2. Morfologi Jahe

Jahe merupakan tumbuhan tahunan tak sebenarnya yang tumbuh tegak dan bisa mencapai tinggi mencapai 0,75 meter. Tumbuhan ini terdiri dari beragam elemen morfologi seperti akar, rimpang, batang, daun, bunga, dan komponen lainnya.

Sistem akar pada tanaman jahe terdiri dari akar tunggal yang berkembang seiring bertambahnya usia, membentuk rimpang dan tunas yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Akar ini tumbuh dari bagian bawah rimpang, sementara tunas muncul dari bagian atas rimpang.

Batang jahe adalah batang yang sebenarnya merupakan pseudostem, tumbuh tegak, pipih, tanpa cabang, dan terbentuk oleh pelepah-pelepah yang bersatu dan mengelilingi batang. Batang hijau pucat, biasanya basa kemerahan hingga berwarna, dengan banyak air atau sukulan di bagian luarnya yang berlilin dan mengkilat. Bagian batang di tanah berdaging, besar, dan bercabang.

Bagian depan dan belakang adalah daunnya. Untuk membentuk batang, lembaran daun diikat antara satu sama lain. Daun jahe tersusun secara berselang-seling, berbentuk lanset dengan struktur tipis, memiliki urat yang sangat terlihat, tersusun sejajar, serta menampilkan garis hijau tua di bagian atas dan warna yang lebih terang di pangkal daun. Panjang daun berkisar antara 5 hingga 25 cm, lebar sekitar 0,8 hingga 2,5 cm. Bagian ujung daun agak tumpul, dengan panjang lidah atas sekitar 0,3 hingga 0,6 cm. Bulu di permukaan daun berwarna putih. Alas lembaran datar atau bulat, dan ujungnya berbentuk kerucut. Lidah daun terletak di antara pelepah dan helaian daun. Apabila ada pasokan air yang cukup, bagian pangkal daun ini dapat mengembangkan tunas dan menghasilkan rimpang baru (Supriadi et al, 2011).

Rimpang jahe adalah hasil modifikasi dari struktur batang, dengan daun-daun tipis yang berbentuk sisik yang disusun dalam lingkaran di bagian luar rimpang tersebut. Bagian yang memiliki nilai penting pada tanaman jahe adalah rimpangnya. Rimpang ini memiliki berbagai kegunaan, termasuk sebagai rempah-rempah, bumbu masak, bahan dalam pengobatan tradisional, bahan

tambahan pada makanan dan minuman, serta sebagai komponen dalam pembuatan parfum (Supriadi et al, 2011)

Di ketiak daun pelindung terdapat bunga tanaman jahe. Bunga memiliki berbagai bentuk, seperti panjang, lonjong, runcing, atau tumpul. Bunga jahe memiliki ukuran panjang sekitar 2 hingga 2,5 cm dan lebar sekitar 1 hingga 1,5 cm. Bentuk bunganya menyerupai paku panjang dengan panjang sekitar 30 cm, berwarna putih kekuningan, dan dihiasi dengan bintik-bintik merah ungu di sekitarnya. Dikatakan oleh Rugayah bahwa bunga jahe berasal secara langsung dari rimpangnya, yang tersusun dalam rangkaian bulir (Spica) dengan bentuk silinder. Daun pelindung hijau, oval, atau jorong melindungi setiap bunga. Jahe adalah tanaman hermaphrodit. Setiap bunga memiliki ovarium, dua kepala sari, dan dua kepala sari. Butiran serbuk sari memiliki diameter sekitar 77-104 mikrometer dengan dinding yang tebal. Putik bagian atas memiliki bentuk bulat dengan lubang berdiameter 0,5 mm, yang dikelilingi oleh rambut-rambut halus yang sedikit kaku. Penting untuk dicatat bahwa bentuk jahe itu sendiri tidak cocok dengan struktur ini, dan stigmanya memiliki ukuran yang lebih tinggi daripada kepala serbuk sari. Sistem penyerbukan jahe menyebabkan struktur penyerbukan silang ini. Hasilnya berwarna merah elips dengan kulit tipis dan memiliki tiga ruang dengan banyak bakal biji hitam dan selaput biji di dalamnya. Tapi karena serbuk sari jahe steril, tanaman jahe komersial jarang menghasilkan buah dan biji (Supriadi et al, 2011).

3. Kandungan Kimia Jahe

Rimpang jahe mengandung dua komponen utama, yaitu komponen volatil dan non-volatil. Oleoresin (sekitar 4,0-7,5% kandungannya) adalah bagian yang bersifat volatile dan memberikan cita rasa jahe (disebut juga minyak atsiri) yang terdiri dari unsur utama seperti zingiberen dan zingiberol. Minyak

atsiri ini, yang juga dikenal dengan sebutan minyak terbang, minyak esensial, minyak eteris, atau minyak atsiri, mengandung berbagai jenis minyak tumbuhan yang berbentuk cairan kental dan mudah menguap pada suhu ruangan, memberikan aroma yang khas. Minyak atsiri jahe, yang memiliki warna bening hingga kuning tua, memiliki nilai tinggi karena digunakan luas dalam industri kosmetik, parfum, dasar pembuatan obat, farmasi, dan sebagai bahan perasa. Rasa pedas jahe disebabkan oleh sifatnya yang tidak mudah menguap, salah satunya adalah gingerol. Gingerol memiliki rumus kimia 1-[4-hidroksi-3-metoksifenil]-5-hidroksi-alkan-3-ol, dengan beberapa rantai samping. Jahe memiliki sifat penyembuhan karena keberadaan gingerol, yang merupakan senyawa yang khas untuk tanaman tersebut. Jahe mengandung gingerol, yang dikenal memiliki sifat anti-inflamasi, antipiretik, gastroprotektif, kertonik dan antiepotoksik, antioksidan, antikanker, antiinflamasi, anangiogenik, dan antiartherosklerotik. Jahe mengandung banyak nutrisi baik, termasuk vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak, meskipun komponennya volatil dan non-volatil (Supriadi et al, 2011).

Kandungan kimia jahe merah, yang paling banyak digunakan dalam industri farmasi, berkisar antara 2,58 dan 2,72% minyak atsiri. Jahe gajah mengandung 0,82 hingga 1,68% minyak atsiri, dan jahe emprit mengandung 1,5 hingga 3,3% minyak atsiri (Redi Aryanta, 2019).


Rimpang jahe merah mengandung sifat-sifat yang beragam, termasuk antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, antikarsinogenik, antimutagenik, dan antitumor. Komponen-komponen ini dapat ditemukan dalam rimpang tersebut. Metabolit sekunder tanaman jahe secara utama terdiri dari senyawa-senyawa seperti flavonoid, fenol, terpenoid, dan minyak atsiri (Handrianto, 2016)

B. Spektrofotometri FTIR

Spektrofotometer adalah alat yang dapat mendeteksi dan mengkarakterisasi tingkat penyerapan suatu larutan atau campuran suatu zat kimia. Saat ini, detektor chemiluminescence yang paling banyak digunakan adalah meter inframerah transformasi Fourier, seperti yang terlihat pada Gambar 1. Perangkat ini mampu menghasilkan jejak sesuai dengan desain optik, yang kita sebut interferogram. Interferogram adalah sinyal yang kompleks, tetapi mengandung informasi frekuensi yang dapat dideteksi oleh spektrum inframerah.



Gambar 1.1. FTIR Spektrofotometer (Rahmat & Suwarno, 2020)



Gambar 1.2. FTIR Spektrometer (Rahmat & Suwarno, 2020)

Spektrofotometer mampu mendeteksi spektrum larutan atau campuran

yang berbeda mulai dari 500 cm^{-1} hingga 6000 cm^{-1} . Kelebihan dari alat ini adalah dapat menampilkan sebuah interferogram dalam waktu kurang dari 1 detik, sehingga interferogram tersebut dapat dikumpulkan dalam memori komputer yang lebih besar. Hasil pengujian FTIR ditunjukkan dalam grafik yang menunjukkan persentase transmitansi inframerah pada panjang gelombang tertentu. Pada grafik sumbu vertikal FTIR, %T menyatakan persentase transmitansi, yaitu rasio cahaya inframerah yang tidak diserap oleh sampel yang diuji untuk menerangi radiasi inframerah yang ditransmisikan ke sampel. Pada sumbu mendatar, bilangan gelombang dinyatakan dalam satuan $1/\text{cm}$. Rentang infra merah yang digunakan adalah pada rentang 4000 – 500 $1/\text{cm}$. Senyawa H₂ tidak dapat dideteksi pada daerah transmisinya karena tidak menyerap radiasi infra merah (Rahmat & Suwarno, 2020)

Ada dua jenis spektrofotometer inframerah, yaitu spektrofotometer dispersif dan spektrofotometer FTIR. Dua jenis spektrofotometer dapat menghasilkan spektrum yang identik, tetapi spektrofotometer FTIR mampu menghasilkan spektrum inframerah lebih cepat daripada spektrofotometer dispersi. Prinsip dasar spektroskopi FTIR adalah bahwa radiasi berinteraksi dengan dua berkas untuk menghasilkan pola interferensi, yang merupakan sinyal yang berubah sesuai dengan panjang lintasan antara dua berkas. Transformasi Fourier adalah proses matematis untuk membalikkan dua domain, yaitu frekuensi dan jarak (Benjamin, 2019).

Spektrum inframerah menunjukkan intensitas penyerapan dibandingkan dengan jumlah gelombang, yang disebut sebagai jumlah gelombang dalam satuan cm^{-1} . Spektrum juga menunjukkan panjang gelombang dan energi yang diserap oleh suatu bahan. (Assifa, 2013).

Ada 3 jenis spektrometer getaran yang banyak digunakan dalam bidang

farmasi, yaitu spektroskopi inframerah dekat, spektroskopi inframerah tengah, dan spektroskopi Raman. Area penting untuk analisis kualitatif sistem organik adalah inframerah menengah, banyak getaran telah ditemukan sejak itu. Rata-rata IR yang umum digunakan dalam sebagian besar analisis terletak dengan spektrum bilangan gelombang 4000-670 cm^{-1} . Rentang spektrum Raman sama dengan rentang inframerah tengah. Di daerah inframerah dekat umumnya digunakan untuk stabilitas struktur kimia dan dalam kasus radiasi inframerah penggunaannya sangat terbatas (Benjamin, 2019).

Keunggulan utama dari teknologi FTIR adalah rentang pita bilangan gelombang yang luas yang dapat dicakup oleh inframerah, serta resolusi tinggi dan karakteristik pemindaian cepat dari perangkat modern. Selanjutnya teknik ini bersifat non-destruktif (*non-destructive*), artinya Seperti metode analisis lainnya, sampel yang diuji dengan spektrofotometri FTIR dapat dibandingkan dengan metode analisis lainnya. Selain itu, metode FTIR dapat memberikan hasil yang cepat dan juga dapat digunakan tanpa tahapan pretreatment sampel, yang berarti tidak perlu menjalani prosedur pengolahan yang panjang seperti dalam teknik kromatografi, yang membutuhkan prosedur preparasi yang panjang (Benjamin, 2019).

C. Kemometrik

Metode matematika untuk memproses, mengevaluasi, dan menginterpretasikan volume besar data dikenal sebagai kemometrik. Analisis spektroskopi dan kemometri yang dikombinasikan telah banyak digunakan dalam pembuatan metode analisis halal. Selain itu, teknologi kombinasi ini telah digunakan dalam identifikasi dan diskriminasi (Nurzakiyah, 2021).

Principal Component Analysis (PCA) merupakan metode kemometrik. PCA adalah teknik multivariat yang digunakan untuk mengurangi data ketika

ada hubungan antar variabel. Untuk perakitan, PCA dapat digunakan pada sampel yang mengandung lebih dari satu komponen utama (komponen utama, PC) dan memiliki karakteristik fisik dan kimia yang sebanding. Dalam titrasi multivariat, PCA dapat digunakan sebagai variabel. Sulit untuk menggunakan data multivariat karena sulit untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam setiap data. Akibatnya, beberapa metode analisis multivariat bertujuan untuk mengamati hubungan antar variabel, meskipun beberapa informasi tidak diperlukan. Teknik PCA mengurangi jumlah data yang ada ketika ada korelasi antara data (Rohman et al., 2014).

D. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tanaman Sebagai Obat

Ajaran Islam diberikan untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ada pendapat bahwa syariat Islam dianggap sebagai yang paling sempurna di antara agama-agama lainnya. Dalam pandangan ini, penyakit dianggap sebagai ujian dari Allah. Salah satu tujuan dari ujian ini adalah untuk mengingatkan setiap individu bahwa manusia, sebagai hamba-hamba Allah, tidak dapat lepas dari kuasa-Nya. Hanya Allah yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan hamba-hamba-Nya yang sakit.

Terlepas dari kualitas obat yang diberikan dan keterampilan dokter yang merawatnya, tidak semua pasien sembuh dari penyakitnya. Ini adalah inti dari perenungan yang dilakukan oleh setiap hambaNya: ada kekuatan abstrak yang mahakuasa dan mahatahu dalam segala hal.

Pandangan Islam mengajarkan bahwa segala yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki tujuan dan manfaatnya yang tersebar di seluruh bumi. Salah satu bentuk manfaat ini adalah dalam bentuk komponen-komponen yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Penduduk sering memanfaatkan berbagai

jenis tumbuhan sebagai bahan obat. Konsep ini juga tercermin dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-An'am/6 : 99 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ۖ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا
قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ
انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ۙ ٩٩

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” (Kementrian Agama RI, 2018).

Maksud dari ayat ini adalah untuk menguatkan keyakinan akan keesaan Tuhan Yang Maha Esa. Ayat ini menjelaskan bagaimana Tuhan menurunkan air hujan dari langit, yang kemudian mengakibatkan tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan. Ayat tersebut menegaskan kekuasaan Allah dalam menciptakan dan mengatur proses alam, serta menunjukkan hubungan erat antara air, tumbuhan, dan keberagaman ciptaan-Nya, kemudian Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang menghijau, kemudian Dia mengeluarkan dari tumbuh-tumbuhan yang hijau itu banyak bulir-bulir, padahal sebelumnya hanya ada satu benih atau hanya satu biji. Jadi perhatikan buah saat berbuah dan perhatikan juga proses pematangan buahnya. Dalam terlihat tanda-tanda kekuasaan Allah kepada orang beriman. Dalam Al-Qur'an jahe disebut dengan *zanjabil*, Sebagaimana telah disebutkan dalam QS. Al-Insan (76) : 11-18 yaitu:

فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝ ١١ وَجَزَّاهُمْ بِمَا
صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝ ١٢ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۝ لَا يَرَوْنَ
فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا ۝ ١٣ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا
١٤ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَيَّةٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ فَوَارِيرًا ۝ ١٥
قَوَارِيرًا ۝ مِّنْ فَضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝ ١٦ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا
زَنْجَبِيلًا ۝ ١٧ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۝ ١٨

Terjemahnya :

Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya (berupa) surga dan (pakaian) sutera. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan, di sana mereka tidak melihat (merasakan teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan (pepohonan)nya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik (buahnya). Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal, kristal yang jernih terbuat dari perak, mereka tentukan ukurannya yang sesuai (dengan kehendak mereka). Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. (Yang didatangkan dari) sebuah mata air (di surga) yang dinamakan Salsabil.” (Kementrian Agama RI, 2018).

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa dia di surga dimanjakan oleh beberapa jenis minuman termasuk jahe. Di sana mereka diberi secangkir ginger ale, yang rasanya pasti berbeda dengan jahe di dunia. Karena air minum berasal dari mata air di surga bernama Salsabil.

Dalam pelayanan kesehatan, apabila terjadi suatu penyakit maka masyarakat dianjurkan untuk berobat, obat tradisional atau sintetik dapat digunakan karena terapi adalah jalan menuju penyembuhan (Amaliyyah, 2021).

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami ‘Umar bin Sa’id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku ‘Atha’ bin Abu Rabah dari Abu Hurairah Radiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga” (H.R. Bukhari No. 5246)

Hadits di atas mengungkapkan bahwa segala jenis penyakit yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang Mahasuci-Nya. Dengan kehendak-Nya, Dia juga menyediakan pengobatannya. Semua jenis penyakit berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pasti terdapat penawarnya, dan dengan izin Allah, pengobatan akan tersedia.

Arti penting dari hadits ini adalah bahwa Rasulullah, semoga doa dan damai Allah besertanya, mengungkapkan bahwa (untuk setiap penyakit ada obatnya) pemberdayaan spiritual harus diberikan kepada pasien dan petugas kesehatan yang merawat mereka dan mereka. harus didorong untuk mencari dan belajar kedokteran. Ketika seorang pasien percaya bahwa ada obat yang dapat menyembuhkan penyakitnya, pintu harapan terbuka di hadapannya dan keputusan menghilang dari dalam. Saat semangat ini meningkat, maka sistem imun yang mendukung tubuh pun meningkat sehingga mampu mengatasi bahkan melawan penyakit. Hal yang sama berlaku untuk dokter itu sendiri, jika dia benar-benar mempercayainya. Jika ada obat untuk setiap penyakit, pencarian obat untuk penyakit itu akan terus berlanjut dan pencarian akan terus berlanjut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memiliki karakteristik kualitatif, dimaksudkan untuk memahami pola profil spektrum IR serta pendekatan kemometrik yang akan dihasilkan guna mengidentifikasi tingkat kemurnian jahe merah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dijalankan di fasilitas laboratorium kimia analitik yang terletak di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta di laboratorium kimia otomasi yang berada di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Waktu Penelitian

Studi ini dilakukan pada bulan September 2022-Februari 2023.

B. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan analisis tingkat kemurnian jahe merah. Pendekatan yang digunakan melibatkan penggunaan spektroskopi FTIR serta pengukuran kemometrik (Nuryadi et al., 2017)

C. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan mencakup blender, lemari pengering, pencacah serba guna, pengayak mesh 35, sendok tanduk, spektroskopi FTIR, *vacum rotary evaporator* IKA® RV 10 basic dan vial.

2. Bahan

Bahan yang digunakan adalah aquadest, etanol 96%, jahe emprit (Bone), jahe emprit (Enrekang), jahe emprit (Luwu), Jahe Gajah (Sinjai), jahe gajah (Bone), jahe gajah (Luwu), jahe merah (Mamuju), jahe merah (Bone), jahe merah (Sinjai), jahe merah (Luwu), jahe merah (Maros), jahe merah (Enrekang), jahe merah (Bulukumba), kertas perkamen dan n-hexan.

D. Cara Kerja

1. Penyiapan Sampel

Dalam penelitian ini, terdapat tiga contoh sampel yang meliputi jahe merah, jahe gajah, dan jahe emprit. Sampel akar jahe merah dikumpulkan dari tujuh pusat tanaman jahe yang tersebar di beberapa kabupaten. Sementara itu, jahe gajah dan jahe emprit dikumpulkan dari tiga pusat tanaman yang terletak di berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi.

2. Ekstraksi Sampel

Sejumlah sampel jahe dipotong kecil-kecil kemudian dikeringkan dan diolah menjadi serbuk ukuran partikel 35 mesh kemudian diekstrak yang dibuat dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol 96% selama 3×24 jam. Ekstrak yang diperoleh berupa ekstrak cair sehingga perlu dipekatkan dengan *rotary evaporator* dan dikeringkan dengan *steam cup* (Andriansyah et al., 2021).

3. Pembuatan Kombinasi Sampel

Ekstrak yang telah menguap ditimbang dengan ketelitian 1 gram per sampel. Kemudian sebanyak 15 mL dilarutkan dalam gelas kimia yang berisi etanol 96%. Setelah masing-masing sampel meleleh, masing-masing sampel dari masing-masing area ditempatkan ke dalam vial kosong 1 mL.

4. Pengujian dengan Spektroskopi FTIR

Sampel diteteskan sebagai ekstrak pada pelat kristal, kemudian ditambahkan KBr 200 mg, diratakan dan dihaluskan, dibentuk menjadi film, kemudian diuji dengan FTIR. Spektrum FTIR direkam dengan bilangan gelombang 4000-4000 cm^{-1} . Setelah setiap pengukuran, pelat dibersihkan dua kali dengan n-heksana sampai tidak ada sampel yang tersisa dan kemudian dikeringkan dengan kain (Purwakusumah et al., 2014).

5. Analisis data menggunakan kemometrik

Data yang diperoleh dari spektroskopi FTIR didasarkan pada penyerapan radiasi elektromagnetik infra merah berupa data spektral transmitansi dan absorbansi. Spektra yang diperoleh dari FTIR yang diperoleh selanjutnya diproses dengan program analisis kimia dengan analisis komponen utama (Purwakusumah et al., 2014).



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Herba

a. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (*Zingiber officinale var rubrum*)

Mamuju

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Merah (*Zingiber officinale var rubrum*) Mamuju ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 1. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah Mamuju

No.	Pelarut	Berat Simplisia (g)	Berat Ekstrak (g)	Rendamen %
1	Etanol 96%	100	18.1789	18.1789

b. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (*Zingiber officinale var rubrum*)

Bone

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Merah (*Zingiber officinale var rubrum*) Bone ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 2. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah Bone

No.	Pelarut	Berat Simplisia (g)	Berat Ekstrak (g)	Rendamen %
1	Etanol 96%	100	14.6822	14.6822

c. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (*Zingiber officinale var rubrum*)

Sinjai

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Merah (*Zingiber officinale var rubrum*) Sinjai ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 3. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah Sinjai

No.	Pelarut	Berat Simplisia (g)	Berat Ekstrak (g)	Rendamen %
1	Etanol 96%	100	17.4739	17.4739

d. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (*Zingiber officinale var rubrum*) Luwu

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Merah (*Zingiber officinale var rubrum*) Luwu ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 4. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah Luwu

No.	Pelarut	Berat Simplisia (g)	Berat Ekstrak (g)	Rendamen %
1	Etanol 96%	100	14.8439	14.8439

e. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (*Zingiber officinale var rubrum*) Maros

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Merah (*Zingiber officinale var rubrum*) Maros ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 5. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah Maros

No.	Pelarut	Berat Simplisia (g)	Berat Ekstrak (g)	Rendamen %
1	Etanol 96%	100	18.7791	18.7791

f. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (*Zingiber officinale var rubrum*) Enrekang

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Merah (*Zingiber officinale var rubrum*) Enrekang ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 6. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah Enrekang

No.	Pelarut	Berat Simplisia (g)	Berat Ekstrak (g)	Rendamen %
1	Etanol 96%	100	16.7462	16.7462

g. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (*Zingiber officinale var rubrum*) Bulukumba

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Merah (*Zingiber officinale var rubrum*) Bulukumba ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 7. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah Bulukumba

No.	Pelarut	Berat Simplisia (g)	Berat Ekstrak (g)	Rendamen %
1	Etanol 96%	100	19.2426	19.2426

h. Hasil ekstraksi herba Jahe Gajah (*Zingiber officinale* var. *Officinale*) Bone

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Gajah (*Zingiber officinale* var. *Officinale*) Bone ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 8. Hasil ekstraksi herba Jahe Gajah Bone

No.	Pelarut	Berat Simplisia (g)	Berat Ekstrak (g)	Rendamen %
1	Etanol 96%	100	14.2913	14.2913

i. Hasil ekstraksi herba Jahe Gajah (*Zingiber officinale* var. *Officinale*) Sinjai

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Gajah (*Zingiber officinale* var. *Officinale*) Sinjai ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 9. Hasil ekstraksi herba Jahe Gajah Sinjai

No.	Pelarut	Berat Simplisia (g)	Berat Ekstrak (g)	Rendamen %
1	Etanol 96%	100	16.4575	16.4575

j. Hasil ekstraksi herba Jahe Gajah (*Zingiber officinale* var. *Officinale*) Luwu

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Gajah (*Zingiber officinale* var. *Officinale*) Luwu ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 10. Hasil ekstraksi herba Jahe Gajah Luwu

No.	Pelarut	Berat Simplisia (g)	Berat Ekstrak (g)	Rendamen %
1	Etanol 96%	100	17.6663	17.6663

k. Hasil ekstraksi herba Jahe Emprit (*Zingiber officinale* var. *Amarum*) Bone

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Emprit (*Zingiber officinale* var. *Amarum*) Bone ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 11. Hasil ekstraksi herba Jahe Emprit Bone

No.	Pelarut	Berat Simplisia (g)	Berat Ekstrak (g)	Rendamen %
1	Etanol 96%	100	16.6826	16.6826

l. Hasil ekstraksi herba Jahe Emprit (*Zingiber officinale* var. *Amarum*) Enrekang

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Emprit (*Zingiber officinale* var. *Amarum*) Enrekang ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 12. Hasil ekstraksi herba Jahe Emprit Enrekang

No.	Pelarut	Berat Simplisia (g)	Berat Ekstrak (g)	Rendamen %
1	Etanol 96%	100	16.5876	16.5876


m. Hasil ekstraksi herba Jahe Emprit (*Zingiber officinale* var. *Amarum*) Luwu

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Emprit (*Zingiber officinale* var. *Amarum*) Luwu ditunjukkan pada table berikut :


Tabel 13. Hasil ekstraksi herba Jahe Emprit Luwu

No.	Pelarut	Berat Simplisia (g)	Berat Ekstrak (g)	Rendamen %
1	Etanol 96%	100	14.8196	14.8196


2. Hasil Analisis menggunakan spektrum FTIR




Gambar 4. 1. Spektrum Jahe Merah Mamuju




Gambar 4. 2. Spektrum Jahe Merah Bone




Gambar 4. 3 Spektrum Jahe Merah Sinjai




Gambar 4. 4. Spektrum Jahe Merah Luwu




Gambar 4. 5. Spektrum Jahe Merah Maros




Gambar 4. 6. Spektrum Jahe Merah Enrekang




Gambar 4. 7 Spektrum Jahe Gajah Bone




Gambar 4. 8. Spektrum Jahe Merah Bulukumba




Gambar 4. 9. Spektrum Jahe Gajah Sinjai




Gambar 4. 10. Spektrum Jahe Gajah Luwu




Gambar 4. 11. Spektrum Jahe Emprit Bone




Gambar 4. 12. Spektrum Jahe Emprit Enrekang




Gambar 4. 13. Spektrum Jahe Emprit Luwu




Gambar 4. 14. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Bulukumba dan Jahe Emprit Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu




Gambar 4. 15. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Mamuju dan Jahe Emprit Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu




Gambar 4. 16. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Maros dan Jahe Emprit Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu




Gambar 4. 17. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Luwu dan Jahe Emprit Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu




Gambar 4. 18. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Enrekang dan Jahe Emprit Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu




Gambar 4. 19. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Bone dan Jahe Emprit Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu




Gambar 4. 20. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Sinjai dan Jahe Emprit Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu.




Gambar 4. 21. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Bulukumba dan Jahe Gajah Bone, Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai




Gambar 4. 22. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Mamuju dan Jahe Gajah Bone, Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai




Gambar 4. 23. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Maros dan Jahe Gajah Bone, Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai




Gambar 4. 24. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Luwu dan Jahe Gajah Bone, Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai



Gambar 4. 25. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Enrekang dan Jahe Gajah Bone, Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai



Gambar 4. 26. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Bone dan Jahe Gajah Bone, Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai



Gambar 4. 30. Score Plot PCA PC-1 dan PC-2 Jahe Merah dan Jahe Gajah Kombinasi

B. Pembahasan

Al- Qur'an dan hadist merupakan pedoman ummat manusia dalam melakukan berbagai pengobatan agar sesuai syariat islam. Dalam hal ini, terapi pengobatan dan doa tidak dapat dipisahkan untuk kesembuhan sebenarnya bersumber dari-Nya. Satu dari beberapa pilihan pengobatan yang bisa dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut adalah melalui pengobatan tradisional atau pengobatan medis.

Penyakit yang diberikan Allah swt kepada manusia pasti didalamnya ada hikmah dan tidak diluar kemampuan manusia itu sendiri. Maka dari itu, Allah swt memberikan suatu penyakit pasti menyertakan obatnya. Salah satu ciptaan Allah swt yang dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan adalah tumbuhan. Dalam konteks ini, terdapat tanaman-tanaman yang memiliki manfaat yang signifikan untuk kehidupan sehari-hari dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat. Salah satu contoh tanaman herbal yang memiliki manfaat penting adalah jahe. Jahe adalah salah satu tumbuhan yang disebutkan dalam sumber-sumber agama, termasuk Al-Qur'an. Jahe diakui dapat memberikan energi serta kekuatan dalam melawan

berbagai bakteri patogen, berfungsi sebagai benteng pertahanan dalam tubuh manusia. Firman-Nya dalam Surah Al-Insan (76) : 17-18 yaitu:

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَجْجِيًّا ۖ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ۚ

“.....Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. (Yang didatangkan dari) sebuah mata air (di surga) yang dinamakan Salsabil.” (Kementrian Agama RI, 2018).

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki tujuan tertentu dalam penyebarannya di dunia. Salah satu tujuannya adalah sebagai sumber bahan obat. Keanekaragaman tumbuhan telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat-obatan. Salah satu contoh dari tumbuhan yang memiliki keistimewaan adalah jahe. Jahe dianggap sebagai minuman yang diperoleh oleh penghuni surga. Ini terkait dengan air minum yang diberikan dari mata air di surga yang disebut Salsabil. Air ini memiliki manfaat kesehatan dan bisa digunakan sebagai pengobatan. Oleh karena itu, semua yang telah diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini memiliki tujuan dan makna, tidak ada yang sia-sia.

Di wilayah Asia, terdapat tiga variasi jahe yang dikenal: jahe merah, jahe gajah, dan jahe emprit. Secara tradisional, perbedaan antara ketiga jenis jahe tersebut terlihat dari intensitas rasa pedas pada jahe merah, aroma yang lebih kuat pada jahe gajah, dan karakteristik fisik rimpang masing-masing jenis jahe. Jahe merah memiliki akar yang berwarna merah dengan serpihan kecil, jahe gajah memiliki rimpang yang berwarna putih atau kuning dengan serpihan kecil, sedangkan jahe emprit memiliki rimpang yang berwarna putih atau kuning dengan serpihan yang lebih besar. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam kandungan senyawa pada ketiga jenis jahe, yang berkaitan dengan aktivitas

biologis yang dihasilkan. Di pasar tradisional Indonesia, umumnya harga jahe merah lebih tinggi dibandingkan dengan jahe murni dan jahe gajah. Fenomena ini dapat memicu potensi munculnya jahe murni atau jahe gajah palsu yang dijual sebagai jahe merah.

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan melibatkan rimpang dari tiga jenis jahe yang berbeda: jahe merah (*Zingiber officinale var rubrum*) yang dikumpulkan dari beberapa wilayah, termasuk Enrekang, Luwu, Bone, Sinjai, Mamuju, Bulukumba, dan Maros; jahe gajah (*Zingiber officinale var officinale*) yang diambil dari beberapa wilayah, termasuk Luwu, Sinjai, dan Bone; dan jahe emprit (*Zingiber officinale var amarum*) yang diambil dari beberapa wilayah, termasuk Bone, Enrekang, dan Luwu.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah persiapan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan rimpang dari tiga jenis jahe yang berbeda: jahe merah yang diambil dari beberapa wilayah seperti Enrekang, Luwu, Bone, Sinjai, Mamuju, Bulukumba, dan Maros; jahe gajah yang diambil dari beberapa wilayah seperti Luwu, Sinjai, dan Bone; dan jahe emprit yang diambil dari beberapa wilayah seperti Bone, Enrekang, dan Luwu.

Tahap selanjutnya yaitu ekstraksi sampel yang dilakukan dengan teknik maserasi. Sebelum dilakukan maserasi, beberapa sampel jahe dicincang, dikeringkan dan ditumbuk menjadi bubuk dengan ukuran partikel 35 mesh, kemudian direndam. Metode perendaman ini dilaksanakan selama tiga kali selama 24 jam setiap kali, karena semakin lama durasi perendaman, semakin besar interaksi antara pelarut dan bahan yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan meningkatkan jumlah zat aktif yang terlarut. Proses perendaman dimulai dengan mencampurkan 100 gram jahe sederhana dengan menggunakan etanol 96% sebagai pelarut sebanyak 200 ml. Etanol dipilih sebagai pelarut karena memiliki kemampuan penyerapan yang baik dan kendala kelarutan yang terbatas. Setelah

1516.02	1516.28	1516.29	1515.54	1515.97	1516.59	1516.69	C=C Aromatis
1376.66	1376.96	1376.34	1373.71	1376.77	1377.64	1376.72	C-X Fluorida
1269.59	1269.70	1270.29	1268.85	1269.42	1270.27	1270.42	C-O Alkohol
0.00	0.00	1238.70	1238.60	0.00	0.00	0.00	C-O Alkohol
1153.66	1153.55	1154.40	1153.46	1153.25	1154.04	1153.77	C-O Alkohol
1124.26	1125.04	1123.40	1123.61	1125.00	1124.58	1124.85	C-O Alkohol
1079.47	0.00	1079.46	1082.29	1078.90	1078.94	1077.69	C-O Alkohol
1035.08	1035.08	1035.79	1034.53	1035.63	1035.67	1035.41	C-O Alkohol
0.00	0.00	888.07	0.00	0.00	886.01	0.00	C-H Aromatis (tekuk, keluar bidang)
851.48	842.00	0.00	853.27	851.30	0.00	850.60	C-H Aromatis (tekuk, keluar bidang)
815.48	816.18	815.75	815.61	815.70	815.88	815.07	C-H Aromatis (tekuk, keluar bidang)
729.47	0.00	728.15	730.41	728.11	727.48	727.15	C-X Klorida
633.24	0.00	630.45	631.37	632.12	631.31	630.13	C-X Klorida
561.93	0.00	559.67	561.63	561.54	560.41	560.21	C-X Klorida

Tabel 15. Data Analisis Jahe Emprit Enrekang, Bone, dan Luwu

Jahe Emprit Enrekang	Jahe Emprit Bone	Jahe Emprit Luwu	Gugus Fungsi
3410.83	3420.28	3405.47	N-H Amida
2927.73	2928.34	2927.74	C-H Alkana (Ulur)
2857.21	2857.92	2857.55	C-H Alkana (Ulur)
1707.51	1705.09	1706.29	C=O Keton
1604.28	0.00	0.00	C=C Alkena
0.00	1571.53	1567.39	N-H Ulur
1379.58	1380.24	1378.71	C-X Fluorida
1270.40	1269.69	1269.62	C-O Alkohol

1154.12	1152.53	1153.32	C-X Fluorida
1124.09	1124.86	1124.70	C-X Fluorida
1079.21	1080.28	1081.35	C-O Alkohol
1035.39	1035.11	1034.75	C-O Alkohol
850.96	0.00	0.00	C-H Aromatis (tekuk, keluar bidang)
815.14	813.44	814.61	C-H Aromatis (tekuk, keluar bidang)
727.19	725.11	727.32	C-X Klorida
0.00	651.22	0.00	C-X Bromida
561.84	0.00	0.00	C-X Bromida

Tabel 16. Data Analisis Jahe Gajah Bone, Luwu, dan Sinjai

Jahe Gajah Bone	Jahe Gajah Luwu	Jahe Gajah Sinjai	Gugus Fungsi
3421.74	3417.91	3422.29	N-H Amida
2927.28	2927.47	2927.72	C-H Alkana (Ulur)
2856.90	2857.26	2857.27	C-H Alkana (Ulur)
0.00	1707.13	1705.72	C=O Keton
1638.41	0.00	0.00	C=O Amida
0.00	0.00	1606.21	C=C Alkena
1565.36	1565.81	0.00	N-H Ulur
1385.19	1381.25	1376.90	C-X Fluorida
1271.03	1269.63	1270.33	C-N Amina
1154.31	1153.75	1153.38	C-N Amina
1125.98	1125.33	1124.33	C-N Amina
0.00	1083.52	1080.39	C-N Amina

Berdasarkan tabel diatas, Pada penelitian ini Gugus Fungsi yang khas pada jahe merah yaitu N-H (Amida), C=O (Keton), C=C (Aromatis), dan C-X (Fluorida) yang terdeteksi pada semua sampel jahe merah disetiap daerah. Gugus fungsi C=O (Amida) yang terdapat pada sampel jahe merah sinjai. Gugus fungsi X=C=Y (Alena) yang terdapat pada sampel jahe merah maros, jahe merah bone, dan jahe merah sinjai.

Gugus fungsi yang khas pada jahe emprit yaitu N-H (Amida), C=O (Keton), C=C (Alkena), N-H (Ulur), dan C-X (Klorida) yang ada pada semua sampel Jahe Emprit disetiap daerah.

Gugus Fungsi yang khas pada jahe gajah yaitu N-H (Amida) dan C-X (Fluorida) yang terdapat pada semua sampel jahe gajah disetiap daerah. Gugus fungsi C=O (Keton) yang terdapat pada sampel jahe gajah luwu dan sinjai. Gugus fungsi C=O (Amida) yang terdapat pada sampel jahe gajah bone. Gugus fungsi C=C (Alkena) yang terdapat pada sampel jahe gajah sinjai. Gugus fungsi N-H (Ulur) yang terdapat pada sampel jahe gajah bone dan luwu.

Tinggi tempat merupakan salah satu variabel yang memainkan peran penting dalam perkembangan tumbuhan. Ketinggian yang berbeda diyakini memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Akibatnya, serangkaian proses metabolisme dalam tumbuhan juga akan terpengaruh, mengingat bahwa senyawa yang dihasilkan melalui proses-proses tersebut kemungkinan akan berbeda pada setiap tingkat ketinggian yang berbeda (Katuuk et al., 2019)

Berdasarkan pola spektrum yang dihasilkan terdapat pola spektrum yang identik atau mirip. Ini karena adanya senyawa yang hampir identik. Sehubungan dengan perbedaan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman akibat ketinggian yang berbeda, diperlukan pendekatan kimia tertentu untuk membedakan ketiga jenis tanaman tersebut. Metode kimia dapat digunakan untuk menganalisis senyawa-senyawa kimiawi yang hadir dalam tumbuhan pada tingkat ketinggian yang berbeda. Ini dapat melibatkan teknik seperti analisis spektroskopi, kromatografi, atau pengujian reaksi kimia khusus. Dengan menggunakan metode kimia, kita dapat mengidentifikasi perbedaan dalam komposisi senyawa-senyawa

kimia di dalam tanaman dari lokasi ketinggian yang berbeda. Ini memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana perubahan lingkungan, seperti ketinggian, dapat mempengaruhi biosintesis senyawa-senyawa dalam tumbuhan.

Pengelompokan jahe menggunakan metode Analisis Komponen Utama (PCA) direpresentasikan dalam bentuk plot nilai komponen utama (PC). Plot ini menggambarkan informasi mengenai pola yang ditemukan dalam data. Histogram untuk dua nilai komponen utama awal sering kali menjadi sangat bermanfaat dalam analisis, karena kedua komponen utama ini mengandung variasi data yang paling signifikan. Semakin dekat suatu sampel dengan sampel lainnya pada plot tersebut, semakin tinggi kemiripan antara sampel-sampel tersebut.

Gambar 4.28 memperlihatkan grafik nilai Komponen Utama kedua (PC dua) dan nilai asli Komponen Utama pada sampel Jahe Murni, termasuk jahe merah, jahe gajah, dan jahe emprit. Grafik ini menggambarkan bahwa ketiga jenis jahe dapat dikelompokkan sesuai dengan jenisnya berdasarkan analisis PCA. Meskipun demikian, terdapat perhatian pada sampel jahe merah mamuju yang terlihat berada jauh dari kumpulan sampel Jahe Merah lainnya. Demikian pula, pada sampel jahe emprit enrekang terlihat jauh dari kumpulan sampel jahe emprit lainnya dalam grafik tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa ada variasi yang signifikan dalam komposisi senyawa-senyawa pada sampel-sampel tertentu, seperti jahe merah mamuju dan jahe emprit enrekang, yang membedakannya dari jenis jahe yang sejenis. Ini menunjukkan kemungkinan adanya faktor-faktor lingkungan atau genetik yang mempengaruhi perbedaan komposisi kimia pada sampel-sampel tersebut.

Pada gambar 4.29 menunjukkan plot PC dua dan PC awal pada sampel Jahe Kombinasi dan Jahe Murni Merah dan Jahe Emprit menunjukkan bahwa kombinasi sampel tersebut tidak ada yang berdekatan dengan ketiga sampel murni.

Pada gambar 4.30 menunjukkan plot PC dua dan PC awal pada sampel Jahe Kombinasi dan Jahe Murni Merah dan Jahe Gajah menunjukkan bahwa kombinasi antara Jahe Merah Mamuju dengan Jahe Gajah Sinjai berdekatan dengan plot Jahe Merah Murni Mamuju.

Daftar Kandungan Senyawa berdasarkan dengan kajian literatur :

a. Jahe Merah

Tabel 17. Kandungan Jahe Merah

No.	Senyawa	Bagian Tanaman	Aktivitas Farmakologis	Referensi
1.	Oleoresin	Rimpang Jahe	Komponen pemberi rasa pedas dan pahit	(Lamtiur, 2015)
2.	Gingerol	Rimpang Jahe	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas Antioksidan, Antiinflamasi, Anti Karsinogenik, Antitumor, Antibakteri, Dan Antimutagenic - Analgesik - Antihepatotoksik terhadap ccl4 dan galaktosamin penyebab sitotoksik pada hati tikus. selain itu, senyawa gingerol, diketahui dapat mengurangi aktivitas kardio-tonik 	(Natasya Et Al., 2022) (Febriani Et Al., 2018) (Srikandi Et Al, 2020)
3.	Minyak Atsiri	Rimpang Jahe	Komponen pemberi aroma yang khas pada jahe	(Lamtiur, 2015)
4.	Shogaol	Rimpang Jahe	Antiinflamasi	(Sabina et al., 2010)

b. Jahe Emprit

Tabel 18. Kandungan Jahe Emprit

No.	Senyawa	Bagian Tanaman	Aktivitas Farmakologis	Referensi
1.	Minyak Atsiri	Rimpang Jahe	Komponen pemberi aroma yang khas pada jahe	(Lamtiur, 2015)
2.	Shogaol	Rimpang Jahe	Anti kanker dan Anti tumor	(Abdullah et al., 2010)
3.	Oleoresin	Rimpang Jahe	Yang memberi rasa pedas dan pahit yang khas pada jahe.	(Araona, et al., 1999).

C. Jahe Gajah

Tabel 19. Kandungan Jahe Gajah

No.	Senyawa	Bagian Tanaman	Aktivitas Farmakologis	Referensi
1.	Minyak Atsiri	Rimpang Jahe	Komponen pemberi aroma yang khas pada jahe	(Lamtiur, 2015)
2.	Shogaol	Rimpang Jahe	Anti kanker dan Anti tumor	(Abdullah et al., 2010)
3.	Oleoresin	Rimpang Jahe	Yang memberi rasa pedas dan pahit yang khas pada jahe.S	(Araona, et al., 1999).



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari 13 sampel Jahe Murni dan 42 Sampel Jahe Kombinasi, hanya kombinasi jahe merah Mamuju dan jahe gajah Sinjai yang berada pada kuadran yang sama dengan sampel jahe merah Mamuju Murni

2. Hasil analisis menggunakan metode Kemometrik tidak dapat membedakan kemurnian Jahe Merah.

B. Saran

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan menganalisis sampel Jahe Merah, Jahe Emprit dan Jahe Gajah di lokasi yang berbeda dari penelitian ini. Dan disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan aplikasi kemometrik jenis lain.



DAFTAR PUSTAKA


- Alfonita, F. (2018). Analisis Kemometrik menggunakan PCA (*Principal Component Analysis*) dan LDA (*Linear Deskriminan Analysis*) pada sampel minyak babi dan minyak zaitun berbasis data FTIR-Spectroscopy. *Computers and Industrial Engineering*, 2(January), 6.
- Amaliyyah, R. (2021). *Studi Literatur Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis)*. 6.
- Andriansyah, I., Wijaya, H. N. M., & Purwaniati, P. (2021). Analisis Adulteran Pada Kopi Luwak Dengan Metode Fourier Transform Infrared (FTIR). *Jurnal Kimia Riset*, 6(1), 26.
- Assifa, P. (2013). *Dengan Menggunakan Spektroskopi Fourier Transform Infrared (Ftir) Dengan Menggunakan Spektroskopi Fourier Transform Infrared (Ftir)*.
- Benjamin, W. (2019). *Penetapan Kadar Parasetamol Dan Ibuprofen Dalam Tablet Secara Simultan Dengan Metode Spektroskopi Ftir (Fourier Transform Infrared) Kombinasi Kemometrik*, 3, 1–9.
- DEWI, R. S. (2019). Penggunaan Obat Tradisional Oleh Masyarakat di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia*, 8(1), 41–45.
- Febriani, Y., Riasari, H., Winingsih, W., Aulifa, L., & Permatasari, A. (2018). The Potential Use of Red Ginger (*Zingiber officinale* Roscoe) Dregs as Analgesic. In *Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology Journal Homepage* (Issue 1).
- Handrianto, P. (2016). Uji Antibakteri Ekstrak Jahe Merah *Zingiber officinale* var . *Rubrum* Terhadap *Staphylococcus Aureus* Dan *Escherichia Coli*. *Uji Antibakteri Ekstrak Jahe Merah Zingiber Officinale Var . Rubrum Terhadap Staphylococcus Aureus Dan Escherichia Coli*, 2(1), 1–4.
- Indonesian Journal of Chemical. (2016). Potensi Spektroskopi Ftir-Atr Dan Kemometrik Untuk Membedakan Rambut Babi, Kambing, Dan Sapi. *Indonesian Journal of Chemical Science*, 5(3), 229–234.
- Katuuk, R. H. H., Wanget, S. A., & Tumewu, P. (2019). *The Effect Of Differences In Site Height On The Content Of Secondary Metabolites Of Babadotan Weeds (Ageratum conyzoides L.)*.

- KEMENKES. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016. *Euphytica*, 18(2), 22280.
- Kusuma, M. A. A. (2019a). Pengaruh Ekstrak Jahe Merah (*Zingiber Officinale* Rosc.Var. Rubrum) Terhadap Kadar Sitokin Interlukin 1 β Pada Tikus Putih (*Rattus Norvegicus* Strain Wistar) Yang Diinduksi Dengan Pirazinamid, Levofloksasin, Dan Etambutol. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Kusuma, M. A. A. (2019b). Pengaruh Ekstrak Jahe Merah (*Zingiber Officinale* Rosc.Var. Rubrum) Terhadap Kadar Sitokin Interlukin 1 β Pada Tikus Putih (*Rattus Norvegicus* Strain Wistar) Yang Diinduksi Dengan Pirazinamid, Levofloksasin, Dan Etambutol. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Lamtiur, T. (2015). *Manfaat Jahe Merah (Zingiber officinale Roscoe) terhadap Kadar Asam Urat Benefit of Red Ginger (Zingiber officinale Roscoe) against Levels of Uric Acid.*
- Natasya, P., Siregar, B., Imaculata, K., Pedha, T., Floransia, K., Resmianto, W., Chandra, N., Maharani, V. N., Dika, F., & Riswanto, O. (2022). Review: Kandungan Kimia Jahe Merah (*Zingiber officinale* var. Rubrum) dan Pembuktian In Silico sebagai Inhibitor SARS-CoV-2. *Jurnal Pharmascience*, 9(2), 185–200.
- Nurliani Bermawie. (n.d.). *Jahe merah*. 41–45.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). *Buku ajar dasar-dasar statistik penelitian.*
- Nurzakiyah. (2021). *Analisis Kandungan Minyak Babi Pada Krim Pelembab Wajah Yang Mengandung Minyak Zaitun Menggunakan Metode Spektroskopi FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy).* 6.
- Purwakusumah, E. D., Rafi, M., Safitri, U. D., Nurcholis, W., & Adzkiya, M. A. Z. (2014). Identifikasi Dan Autentikasi Jahe Merah Menggunakan Kombinasi Spektroskopi Ftir Dan Kemometrik (Identification and Authentication of Jahe Merah Using Combination of FTIR Spectroscopy and Chemometrics). *Jurnal Agritech*, 34(01), 82–87.
- Rahmat, S., & Suwarno, S. (2020). Analisa Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier dan Gas Terlarut Terhadap Perubahan Gugus Fungsi Komposisi Minyak Ester. *Infotekmesin*, 11(1), 14–23.

- Redi Aryanta, I. W. (2019). Manfaat Jahe Untuk Kesehatan. *Widya Kesehatan*, 1(2), 39–43.
- Risal, Y. (2020). Analisis Kemometrik Senyawa Inhibitor Tirosinase Menggunakan Spektrofotometer IR (FTIR). *Majalah Farmasi Dan Farmakologi*, 24(2), 59–62.
- Rohman, A., Gupitasari, I., Purwanto, Triyana, K., Rosman, A. S., Ahmad, S. A. S., & Yusof, F. M. (2014). Quantification of lard in the mixture with olive oil in cream cosmetics based on FTIR spectra and chemometrics for Halal authentication. *Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering)*, 69(1), 113–119.
- Rohman, A., Ikhtiarini, A. N., Setyaningsih, W., Rafi, M., Aminah, N. S., Insanu, M., Irnawati, I., & Santosa, D. (2021). The Use of Chemometrics for Classification of Sidaguri (*Sida rhombifolia*) Based on FTIR Spectra and Antiradical Activities. *Indonesian Journal of Chemistry*, 21(6), 1568–1576.
- Shafirany, M. Z., Susilawati, Y., & Musfiroh, I. (2019). Aplikasi Kemometrik dalam Penentuan Mutu Tumbuhan Obat. *Pharmauho: Jurnal Farmasi, Sains, Dan Kesehatan*, 4(2).
- Srikandi, M. H. R. (2020). Kandungan Gingeroldanshogaoldari Ekstrak Jahe Merah (*Zingiber Officinaleroscoe*) Dengan Metode Maserasi Bertingkat.
- Supriadi et al. (2011). *Zingiber officinale Rosc.* In *SpringerReference*.
- Syahrani, R., Burhan, A., Maryam, F., & Masero, L. R. (2016). Determinasi Dan Analisis Finger Print Tanaman Murbei (*Morus Alba Lour*) Sebagai Bahan Baku Obat Tradisional Dengan Metode Spektroskopi Ft-Ir Dan Kemometrik. *Pharmacon*, 5(1), 78–90.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Prosedur Kerja



Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

1. Preparasi Sampel



Gambar 1. 1. Jahe Emprit Luwu



Gambar 1. 2. Jahe Gajah Bone



Gambar 1. 3. Jahe Emprit Enrekang



Gambar 1. 4. Jahe Gajah Luwu



Gambar 1. 5. Jahe Merah Maros



Gambar 1. 6. Jahe Gajah Sinjai



Gambar 1. 7. Jahe Merah Enrekang



Gambar 1. 8. Jahe Merah Bulukumba



Gambar 1. 9. Jahe Emprit Bone




Gambar 1. 10. Jahe Merah Mamuju



Gambar 1. 11. Jahe Merah Sinjai



Gambar 1. 12. Jahe Merah Luwu



Gambar 1. 13. Jahe Merah Bone



Gambar 1. 14. Perajangan Sampel



Gambar 1. 15. Hasil Rajang



Gambar 1. 16. Pengeringan Sampel



Gambar 1. 17. Hasil Pengeringan



Gambar 1. 18. Penyerbukan Sampel



Gambar 1. 19. Pengayakan Sampel



Gambar 1. 20. Penimbangan Sampel

2. Ekstraksi Sampel



Gambar 1. 21. Penambahan Etanol 96%



Gambar 1. 22. Perendaman Sampel



Gambar 1. 23. Penyaringan Sampel



Gambar 1. 24. Hasil Ekstraksi



Gambar 1. 25. Hasil Ekstraksi



Gambar 1. 26. Dilakukan Evaporator



Gambar 1. 27. Ekstrak Sampel 1



Gambar 1. 28. Ekstrak Sampel 2

3. Pembuatan Kombinasi Sampel



Gambar 1. 29. Penimbangan Ekstrak Sampel



Gambar 1. 30. Penambahan Etanol 96%



Gambar 1. 31. Hasil Kombinasi Sampel

4. Pengujian menggunakan Spektroskopi FTIR



Gambar 1. 32. FTIR



Gambar 1. 33. KBr



Gambar 1. 34. Film yang terbentuk



Gambar 1. 35. Pengujian FTIR

RIWAYAT HIDUP



Citra Nurul Saputri dilahirkan di Kota Palopo pada tanggal 11 Mei 2001, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ir. M. Amir Yunus dan Ibu Haryani, SP, Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDN Pao-Pao dan Tamat pada Tahun 2012; Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 13 Makassar dan Tamat pada tahun 2015; Setelah itu pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 Model Makassar dan tamat pada tahun 2018; dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi dan tamat pada tahun 2023.

Dengan ketekunan, Motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan terutama bidang kesehatan.

Akhir Kata penulis ucapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Analisis Kemurnian Jahe Merah (*Zingiber Officinale Var Rubrum*) dengan menggunakan Metode Spektroskopi FTIR dan Kemometrik**”.