

**ANALISIS KANDUNGAN ZAT GIZI BAKPAO ABON IKAN KEMBUNG
JANTAN (*Rastrelliger Kanagurta*) DENGAN SUBSTITUSI RUMPUT LAUT
MERAH (*Eucheuma Cottonii*)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

MUNJIYAH HM MUSTADIR

70200111048

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2015

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan nikmat, karunia serta hidayah-Nya, terutama nikmat iman, islam serta nikmat kesehatan yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Kandungan Zat Gizi Bakpao Abon Ikan Kembung Jantan (*Rastrelliger Kanagurta*) Dengan Subtitusi Rumput Laut Merah (*Eucheuma Cottonii*)**”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Salam dan Shalawat semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa setia dalam menyebarkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi banyak pihak terutama dari orangtua penulis, Ayahanda **Drs. Mustadir H** dan ibunda **Misnah M** yang tak hentinya memberikan do’a, kasih sayang, motivasi, serta dukungan moril maupun materil kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pembimbing, **Dwi Santy Damayati, SKM.,M.Kes** selaku pembimbing **I** dan **Emmi Bujawati, SKM.,M.Kes** selaku pembimbing **II** yang dengan tulus dan ikhlas dan penuh


kesabaran telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan arahan kepada penulis mulai dari awal hingga selesainya penulisan ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Musafir Pabbabari M.Si.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. **DR. Dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan fasilitas serta bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
3. **Hasbi Ibrahim, SKM.,M.Kes,** selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. **Syarfaini, SKM.,M.Kes,** dan **Dr. H. Burhanuddin Lc,Mth.I** selaku penguji kompetensi dan penguji integrasi keislaman. Terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan demi perbaikan skripsi ini.
5. Saudara-saudara saya yang telah memberikan dukungan dan semangat.
6. Segenap dosen program studi Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan dan seluruh staf / karyawan Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian administrasi.
7. Keluarga besar **Hero Of Hygeia kesehatan masyarakat** angkatan 2011 yang selalu memberikan support.
8. Teman-teman sesama peminatan **Gizi** terkhusus kepada **Musyrihah Waris, Kasmiaty, Sukarni** yang telah banyak membantu penulis baik berupa waktu, fikiran dan tenaga selama proses penelitian.

9. Senior kesehatan masyarakat angkatan 010 **Akmal Novrian, Fadillah, Raihana Tahrir** yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan pengarahan dalam penelitian ini.
10. Segenap pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar khususnya bagian Kimia Kesehatan yang telah banyak membantu selama proses penelitian.
11. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa atas partisipasi dan kerjasamanya dalam penelitian ini.
12. Serta pihak-pihak yang turut andil membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Hanya rasa terima kasih dan do'a yang penulis dapat panjatkan, semoga Allah swt berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan akademik pada bidang kesehatan, khususnya dalam bidang Gizi Kesehatan Masyarakat.




Samata-Gowa, November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-13
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	14-34
A. Tinjauan Umum tentang Rumput Laut Merah	14
B. Tinjauan Umum tentang Ikan Kembung Jantan.....	22
C. Tinjauan Umum tentang Bakpao.....	29
D. Tinjauan Umum tentang Uji Organoleptik.....	32
E. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35-46
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Objek Penelitian	36
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Instrumen penelitian	37

F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen	43
G. Teknik Pengambilan data dan analisis data	44
H. Alur Penelitian.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47-63
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan.....	53
C. Keterbatasan Penelitian.....	63
BAB V PENUTUP.....	64-65
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Kimiawi dari Beberapa Jenis Rumput Laut	18
Tabel 2.2	Komposisi Daging Ikan Kembung (<i>Rastrelliger Kanagurta sp</i>) per 100 gram.....	25
Tabel 2.3	Komposisi Kimia Ikan Kembung Segar	26
Tabel 4.1	Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Dalam 50 Gram Bakpao 1:1 Tahun 2015	48
Tabel 4.2	Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Dalam 50 Gram Bakpao 1:3 Tahun 2015	48
Tabel 4.3	Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Dalam 50 Gram Bakpao 3:1 Tahun 2015	49
Tabel 4.4	Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Dalam 50 Gram Bakpao Abon Ikan Kembung Tahun 2015	49
Tabel 4.5	Perbandingan Hasil Analisis Bakpao Abon Ikan Kembung dan Subtitusinya	50
Tabel 4.6	Hasil Analisis Organoleptik pada Bakpao dan Subtitusinya berdasarkan Warna, Rasa, Aroma dan Tekstur Tahun 2015.....	51
Tabel 4.14	Hasil Rekapitulasi Analisis Organoleptik pada Bakpao dan Subtitusinya Tahun 2015	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Eucheuma Cottonii.....	18
Gambar 2.2	Eucheuma Spinosum.....	18
Gambar 2.3	Hypnea sp.....	18
Gambar 2.4	G. Gigas	19
Gambar 2.5	G. Verrucosa	19
Gambar 2.6	Lichenoides	19
Gambar 2.7	Gelidium sp.....	19
Gambar 2.8	Polifolium.....	19
Gambar 2.9	Crassifolium	19
Gambar 2.10	Ikan Kembung Jantan (<i>Rastrelliger Kanagurta</i>)	23
Gambar 2.11	Perbedaan Ikan Kembung Jantan (<i>Rastrelliger Kanagurta</i>) dan Betina (<i>Rastrelliger Brachysoma</i>)	24



ABSTRAK

Nama : Munjiyah HM Mustadir
NIM : 70200111048
Konsentrasi : Gizi Kesehatan Masyarakat
Judul : Analisis Kandungan Zat Gizi Bakpao Rumput Laut Merah (*Eucheuma Cottonii*) Dengan Substitusi Abon Ikan Kembung Jantan (*Rastrelliger Kanagurta*)

Bakpao adalah makanan khas Tionghoa yang juga sangat digemari di Indonesia, tersaji dalam beragam rasa seperti coklat, kacang hijau, kacang hitam dan daging. Meskipun makanan ini bukan berasal dari daerah Indonesia, namun menu makanan ini sudah banyak digemari masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan zat gizi pada bakpao dan substitusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen, dengan menggunakan desain pra-eksperimen, Model pra-eksperimen yang digunakan yaitu *One Shot Case Study*. Dalam rancangan ini, suatu kelompok subjek dikenakan perlakuan tertentu, lalu setelah itu dilakukan pengukuran terhadap variabel tertentu. Lokasi penelitian ini di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dan Universitas Negeri Makassar. Objek dalam penelitian ini adalah abon ikan kembung jantan (*rastrelliger kanagurta*) dan rumput laut merah (*eucheuma cottonii*) yang kemudian dijadikan bakpao dengan formula, bakpao substitusi 1:1 yaitu terigu 30 gram, abon ikan 10 gram dan rumput laut 10 gram. Formula pada bakpao 1:3 yaitu terigu 30 gram, abon ikan 5 gram, rumput laut 15 gram. Formula pada bakpao 3:1 yaitu terigu 30 gram, abon ikan 15 gram, rumput laut 5 gram. Formula bakpao abon ikan kembung yaitu 30 gram terigu, 20 gram abon ikan kembung. Parameter pengamatan yaitu karbohidrat, protein, lemak dan vitamin A juga dilakukan uji organoleptik.

Hasil penelitian menunjukkan kandungan gizi pada bakpao substitusi 1:1 sebesar: karbohidrat 32,74%, protein 13,30%, lemak 5,96% dan vitamin A 9,20 µg/gr. Pada bakpao substitusi 1:3 yaitu karbohidrat 7,30%, protein 9,62%, lemak 1,70% dan vitamin A 8,43 µg/gr. Pada bakpao substitusi 3:1 yaitu karbohidrat 17,83%, protein 13,72%, lemak 8,39% dan vitamin A 9,86 µg/gr. Sedangkan pada bakpao abon ikan kembung yaitu karbohidrat 22,60%, protein 13,07%, lemak 6,00% dan vitamin A 7,12 µg/gr. Pada uji organoleptik bakpao dan substitusinya, bakpao dengan nilai rata-rata tingkat kesukaan tertinggi terdapat pada bakpao substitusi 1:3 sebesar 72,5%, kemudian bakpao substitusi 1:1 sebesar 62,5%. Kemudian bakpao substitusi 3:1 dan bakpao abon ikan kembung dengan nilai yang sama sebesar 61,25%.

Kata Kunci : Zat Gizi, Bakpao, Rumput Laut Merah, Ikan Kembung.
Daftar Pustaka : 31 (1985 – 2014)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Swastika (2011), Indonesia berpotensi besar untuk memproduksi pangan dalam jumlah yang cukup. Hal ini disebabkan Indonesia mempunyai kekayaan sumberdaya hayati yang sangat besar yang dapat mendukung diversifikasi pangan nasional sehingga mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri merupakan sebuah keniscayaan. Akan tetapi, upaya tersebut tidaklah mudah untuk dicapai (Purnomo B.H, 2012).

Berdasarkan data produksi tahunan dari Ditjen Perikanan dapat dijadikan gambaran potensi produksi rumput laut di Indonesia. Apabila dilihat dari data tersebut bahwa produksi rumput laut *Eucheuma cottoni* pada tahun 1979 sampai tahun 1983 mengalami peningkatan sebesar 732,4 ton setiap tahunnya (Desi Puspitasari, 2008).

Adapun provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam daerah penghasil rumput laut. Daerah yang banyak menghasilkan rumput laut basah di kabupaten Bantaeng dengan jumlah 85.509.988 dan mengambil rumput laut merah di daerah Pajukukang dimana produksi rumput laut basah mencapai 49.738.641 (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng, 2013). Adapun rumput laut merah (*eucheuma cottonii*) di kabupaten Bantaeng dimana jumlah produksi mencapai 104,421.8 dan merupakan daerah yang mempunyai rumput laut *eucheuma cottonii*

paling banyak (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar, 2013). Selain itu menurut Yunizal, 2011 mengatakan bahwa kandungan karbohidrat *eucheuma cottonii* merupakan rumput laut yang memiliki karbohidrat paling tinggi.

Alga laut (*Eucheuma sp.*) merupakan salah satu sumberdaya alam hayati Indonesia. Tumbuhan ini mempunyai nilai ekonomis yang penting dalam industri kosmetik, pangan dan lain-lain (Nursanto, 2004 dalam Evi Fitriyani, 2012). Rumput laut merah (*eucheuma cottoni*) mempunyai nilai gizi makro yang banyak seperti karbohidrat 57,52%, protein 3,46%, lemak 0,93% dibandingkan dengan jenis rumput laut yang lain.

Salah satu komoditas pangan hewani yang sangat potensial di Indonesia adalah ikan. Komoditas ini menjadi sumber protein hewani utama bagi masyarakat. Sekitar 65% protein hewani dikonsumsi oleh masyarakat berasal dari berbagai jenis ikan dan makanan laut (*seafood*), sedangkan konsumsi protein dari daging, telur dan susu hanya sekitar 35% (Purnomo B.H, 2012).

Pada tahun 2007 tingkat konsumsi ikan per kapita masyarakat Indonesia sekitar 24,3 kg/tahun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan konsumsi per kapita sumber protein hewani lainnya, seperti daging sapi (1,87 kg/tahun), telur (4,96 kg/tahun), daging ayam ras (4,33 kg/tahun) dan susu (8,9 kg/tahun) (BPS, 2009). Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri, terutama dalam pemenuhan kebutuhan protein, maka pemerintah harus dapat menjaga ketersediaan ikan secara berkelanjutan, baik dalam bentuk segar maupun olahan (Purnomo B.H, 2012). Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nahl/16:14 sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْثًا تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ
وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2014).

Ayat di atas menjelaskan bahwa *Dan Dia*, yakni Allah swt. yang menundukkan lautan dan sungai serta menjadikannya arena hidup binatang dan tempatnya tumbuh berkembang serta pembentukan aneka perhiasan. Itu dijadikan demikian *agar kamu dapat* menangkap hidup-hidup atau yang mengapung dari ikan-ikan dan sebangsanya yang berdiam disana sehingga kamu dapat *memakan darinya daging yang segar*, yakni binatang-binatang laut itu, *dan kamu* dapat mengeluarkan, yakni mengupayakan dengan cara bersungguh-sungguh untuk mendapatkan *darinya*, yakni dari laut dan sungai itu *perhiasan yang kamu pakai*, seperti permata, mutiara, merjan dan semacamnya (Shihab, Quraish, 2012).

Ikan dikenal sebagai suatu komoditi yang mempunyai nilai gizi tinggi namun mudah busuk karena mengandung kadar protein yang tinggi dengan kandungan asam amino bebas yang digunakan untuk metabolisme mikroorganisme, produksi amonia, biogenik amine, asam organik, ketone dan komponen sulfur (Lu *et al.*, 2010; Delgaard *et al.*, 2006 dalam Agustini T.W, 2011).

Ikan cepat menjadi busuk dan rusak apabila dibiarkan begitu saja di udara terbuka (kira-kira 5-8 jam setelah ikan tertangkap). Hal ini disebabkan karena semua

proses pembusukan memerlukan air, sementara 80% tubuh ikan terdiri dari air. Dengan penyusutan/habisnya kadar air, bakteri pembusuk tidak akan aktif lagi. Batas kadar air yang diperlukan yaitu 30% sampai 40% supaya perkembangan bakteri pembusuk dapat terhambat sehingga ikan dapat dipertahankan agar tetap dalam keadaan awet.

Ikan kembung merupakan jenis ikan ekonomis penting yang banyak ditangkap maupun dikonsumsi di Indonesia. Setiap 100 g daging ikan kembung mengandung 6,7 g protein, 2,5 g lemak, 1,5 g mineral (Sugiarto, 1986 dalam Agustini T.W, 2011).

Sumber daya ikan kembung (*Rastrelliger sp.*) disukai masyarakat karena bernilai gizi tinggi karena mengandung minyak omega-3 yang sangat tinggi dibandingkan ikan salmon, dagingnya lembut, mudah diperoleh karena tersedia mulai dari pasar tradisional hingga supermarket, harga terjangkau dan tidak menimbulkan alergi (Santoso *et al.* 1997 dalam Indaryanto F.R, 2014).

Di provinsi Sulawesi Selatan produksi ikan kembung jantan sebanyak 13.988.81, adapun daerah Makassar merupakan produksi ikan kembung jantan tertinggi ke empat dari provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 822.6 sedangkan produksi pada ikan kembung betina sebanyak 165.8 (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2013).

Ikan kembung jantan (*Rastrelliger Kanagurta*) harganya yang relatif ekonomis dan umumnya disukai oleh masyarakat. Ikan kembung jantan dijadikan abon karena bertekstur kering maka dapat menyatu pada bahan utama seperti terigu sehingga tidak mengurangi jumlah pemakaian air yang tepat untuk adonan, selain itu

jika dijadikan abon maka bau ikan akan semakin berkurang sehingga tidak terlalu menyengat untuk dimakan.

Abon ikan yang baik mempunyai rasa yang khas, tidak berbau amis atau anyir. Dengan rasa khas inilah, abon ikan mudah diterima oleh konsumen. Apalagi dibandingkan dengan ikan segar, abon ikan mempunyai kandungan protein lebih tinggi dan dapat disimpan lebih lama tanpa mengalami perubahan kualitas (Eddy Afrianto, Evi Liviawaty, 1989).

Bakpao merupakan makanan khas Tionghoa namun sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Metode memasak dengan cara mengukus kandungan gizi yang hilang relatif lebih kecil, dapat menjaga kesegaran bahan makanan yang dimasak serta mampu mempertahankan warna, rasa dan bau asli dari bahan makanan yang dimasak.

Takaran bakpao yang digunakan adalah 50 gram dengan perbandingan 1:1 (10 gram abon ikan dan 10 gram rumput laut), 1:3 (5 gram abon ikan dan 15 rumput laut), 3:1 (15 gram abon ikan dan 5 gram rumput laut) dan bakpao abon ikan kembung (20 gram abon ikan) dengan masing-masing perbandingan menggunakan 30 gram terigu agar diharapkan terigu tidak mempengaruhi nilai yang dihasilkan lebih tinggi atau lebih rendah. Berdasarkan riset sebelumnya telah dilakukan beberapa kali uji coba perbandingan agar mendapatkan bakpao yang tepat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Analisis Kandungan Zat Gizi Bakpao Abon Ikan Kembung Jantan (*Rastrelliger Kanagurta*) Dengan Substitusi Rumput Laut Merah (*Eucheuma Cottonii*) ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Zat Gizi

Zat gizi (*Nutrient*) merupakan ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. (Hariza Adnani, 2011)

Definisi Operasional : pada penelitian ini dilakukan analisis kadar zat gizi abon ikan kembung dengan substitusi rumput laut merah pada produk Bakpao, dengan melihat kadar Karbohidrat, Protein, Lemak dan Vitamin A yang dianalisis secara kuantitatif di Laboratorium Kesehatan dengan

Kriteria Objektif sebagai berikut:

1) Kadar Karbohidrat

Kadar karbohidrat merupakan jumlah karbohidrat total pada bakpao abon ikan kembung substitusi rumput laut merah, yang dianalisis menggunakan metode *Luff Schoorl*

2) Kadar Lemak

Kadar lemak merupakan jumlah lemak total pada bakpao abon ikan kembung substitusi rumput laut merah, yang dianalisis menggunakan metode *Gravimetri*

3) Kadar Protein

Kadar protein merupakan jumlah protein total pada bakpao abon ikan kembung substitusi rumput laut merah, yang dianalisis dengan menggunakan metode *Kjehdal*

4) Kadar Vitamin A

Kadar vitamin A merupakan jumlah Vitamin A total pada bakpao abon ikan kembung substitusi rumput laut merah, yang dianalisis dengan menggunakan metode *Spektrofotometri*

b. Bakpao

Definisi Operasional: Bakpao sebagai makanan tambahan yang terbuat dari abon ikan kembung substitusi rumput laut merah lalu dikukus.

c. Ikan Kembung

Definisi Operasional: dalam penelitian ini, ikan kembung yang digunakan adalah ikan kembung jantan yang disebut banyara (*Rastrelliger Kanagurta*) bagian dagingnya untuk dijadikan abon ikan.

d. Rumput Laut

Definisi Operasional: Dalam penelitian ini rumput laut yang digunakan adalah rumput laut merah (*Eucheuma Cottoni*) yang diperoleh dari Bantaeng. Alasan peneliti mengambil daerah Bantaeng karena banyaknya

petani rumput laut di kabupaten tersebut yang mengelola rumput laut untuk diperjual belikan dan yang paling banyak terdapat rumput laut merah jenis *Eucheuma Cottoni*.

e. Uji Organoleptik

Definisi Operasional: Uji organoleptik atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk.

Kriteria Objektif: Untuk menentukan interval persentase dan Kriteria kesukaan

- 1) 81-100 = sangat suka
- 2) 61-80 = suka
- 3) 41-60 = tidak suka
- 4) 21-40 = sangat tidak suka



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen pada produk bakpao abon ikan kembung dan bakpao abon ikan kembung substitusi rumput laut merah.

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis kadar zat gizi pada objek penelitian yang meliputi kadar karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin A. Dalam menentukan kadar dari masing-masing zat gizi tersebut dilakukan dengan metode yang berbeda. Untuk analisis kadar karbohidrat menggunakan metode Luff Schoorl, analisis kadar lemak menggunakan metode Gravimetri,

analisis kadar protein menggunakan metode Titrimetrik, dan analisis kadar vitamin A menggunakan metode Spektrofotometrik . Kemudian pada penelitian ini juga dilakukan uji organoleptik yaitu uji hedonik atau tingkat kesukaan. Uji hedonik ini dilakukan di Universitas Negeri Makassar dengan menggunakan panelis ahli sebanyak 5 orang yang merupakan dosen pada jurusan Tata Boga, Universitas Negeri Makassar.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang peneliti gunakan sebagai referensi awal dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Listiyana, 2014 Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Subtitusi Tepung Rumput Laut (*Eucheuma Cottonii*) Pada Pembuatan Ekado Sebagai Alternatif Makanan Tinggi Yodium Pada Anak Sekolah”. Pada penelitian ini dilakukan penambahan tepung rumput laut pada pembuatan ekado agar dapat dijadikan alternatif inovasi produk baru sebagai makanan tambahan anak sekolah yang bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan yodium anak Indonesia sehingga dapat menurunkan angka prevalensi Penyakit Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Hasil analisis menunjukkan semakin banyak presentase substitusi tepung rumput laut pada pembuatan ekado maka menghasilkan kadar yodium yang semakin tinggi. Adapun korelasi antara penelitian

tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan rumput laut namun analisis kandungan zat gizi berbeda. Sama-sama menggunakan cara dengan dikukus namun penelitian di atas kadar yodium tidak selalu tetap akibat terjadinya proses pemanasan sedangkan kandungan yodium akan hilang apabila terjadi pemanasan yang cukup lama. Kemudian pada penelitian ini, sampel dibuat dalam bentuk bakpao.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Puspitasari, Mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “Kajian Substitusi Tapioka Dengan Rumput Laut (*Eucheuma Cottoni*) Pada Pembuatan Bakso”. Pada penelitian ini dilakukan produk bakso hasil substitusi tapioka dengan rumput laut *Eucheuma cottoni* dan dianalisis sifat kimia yang meliputi analisis kadar air, kadar protein, kadar lemak dan kadar abu. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan rumput laut *Eucheuma Cottoni* dan semakin sedikit penambahan tapioka pada pembuatan bakso menyebabkan kadar air, protein, lemak dan kadar abu semakin meningkat. Adapun korelasi dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang sama-sama menggunakan rumput laut *Eucheuma cottoni* dan dibuat menjadi suatu produk namun analisis yang dilakukan berbeda.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Estiningtyas (2014) Mahasiswi Program Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Kandungan Gizi Sosis Substitusi Tepung Tempe Dengan

Bahan Pengisi Tepung Ubi Jalar Kuning (*Ipomea Batatas*) Dan Bahan Penstabil Ekstrak Rumpun Laut (*Eucheuma Cottonii*) Untuk PMT Ibu Hamil”. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah semakin tinggi substitusi tepung tempe kadar protein, zat besi, dan β -karoten sosis semakin meningkat sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin menurun. Adapun korelasi dengan penelitian ini yaitu pemberian produk yang berbeda namun diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai pemberian makanan tambahan terhadap ibu hamil.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hartati M.E, 2011 yang berjudul “Pengaruh Rumpun Laut *Eucheuma Cottonii* Sebagai Bahan Pengenyal Alami Terhadap Kualitas Bakso Daging Sapi”. Pada penelitian ini rumput laut *eucheuma cottonii* digunakan sebagai bahan pengenyal alami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan rumput laut *Eucheuma cottonii* yang digunakan terhadap kualitas produk bakso daging sapi yang dihasilkan. Maka hasil yang diperoleh bahwa bahan pengenyal rumput laut *eucheuma cottonii* memberikan pengaruh nyata terhadap warna, rasa dan tekstur. Dari uji organoleptik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa yang paling disukai panelis adalah pada prosentase penambahan rumput laut *eucheuma cottonii* 2,50% (perlakuan E). Hasil uji parameter kimia rata-rata pada perlakuan tersebut adalah: kadar air 68,05% b/b, protein 9,97% b/b, lemak 1,98% b/b dan hasil uji kekenyalan 3,85 kgf. Adapun korelasi dengan penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan rumput laut *eucheuma cottonii* sebagai bahan olahan produk namun hasil uji yang berbeda.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui kandungan zat gizi pada produk bakpao abon ikan kembung dan bakpao abon ikan kembung substitusi rumput laut dengan melihat jumlah yang sama (berat gram) namun komposisi berbeda.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui kadar karbohidrat pada produk bakpao abon ikan kembung dan bakpao abon ikan kembung substitusi rumput laut.
- 2) Untuk mengetahui kadar lemak pada produk bakpao abon ikan kembung dan bakpao abon ikan kembung substitusi rumput laut.
- 3) Untuk mengetahui kadar protein pada abon ikan kembung dan bakpao abon ikan kembung substitusi rumput laut.
- 4) Untuk mengetahui kadar vitamin A pada produk abon ikan kembung dan bakpao abon ikan kembung substitusi rumput laut.
- 5) Untuk mengetahui tingkat daya terima produk bakpao abon ikan kembung dan bakpao abon ikan kembung substitusi rumput laut

melalui penilaian uji kesukaan terhadap penampilan warna, rasa, aroma dan tekstur.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi langsung dengan pengembangan akademik, sebagai bahan informasi untuk memperluas wawasan ilmu kesehatan masyarakat khususnya dibidang gizi dan diharapkan mampu memberikan pengetahuan islam bagi para pembaca.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya produk bakpao rumput laut dengan substitusi abon ikan kembung yang dapat diberikan kepada anak balita kurang energi protein, ibu hamil kurang energi kronik, anak sekolah yang anemia, serta sebagai masukan bagi instansi kesehatan mengenai produk ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Tentang Rumput Laut Merah (*Eucheuma Cottonii*)

Akhir-akhir ini perhatian terhadap rumput laut sebagai sumber pangan semakin besar. Bahkan Chapman (2010) menyatakan rumput laut merupakan tanaman paling penting di dunia, meskipun pada awalnya dianggap masalah bagi manusia, karena sifatnya yang mudah menyebar dari satu perairan ke perairan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi rumput laut di alam, baik sebagai penyeimbang lingkungan, sumber oksigen, rantai makanan primer, bahan pangan manusia maupun potensinya sebagai bahan bakar alternatif masa depan. Biomassa alga diperkirakan mencapai 10 kali biomassa seluruh tanaman darat (Dwisitno, 2014).

Rumput laut *Eucheuma cottonii* merupakan tumbuhan tingkat rendah yang mempunyai kandungan nilai gizi yang tinggi. Salah satu kandungannya yang berperan dalam pembentukan tekstur adalah karagenan (Winarno, 1996 dalam Desi Puspitasari, 2008).

Selain itu pemilihan rumput laut *Eucheuma cottonii* sebagai bahan pensubstitusi tepung tapioka, dikarenakan jumlahnya yang melimpah di perairan Indonesia. Berdasarkan data produksi tahunan dari Ditjen Perikanan dapat dijadikan gambaran potensi produksi rumput laut di Indonesia. Daerah yang mempunyai

potensi sebagai penghasil rumput laut bernilai ekonomis adalah perairan pantai Kepulauan Riau, pantai barat Sumatra, Bangka Belitung, perairan pantai sebelah barat dan selatan Jawa, bagian timur Madura, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Apabila dilihat dari data tersebut bahwa produksi rumput laut *Eucheuma cottoni* pada tahun 1979 sampai tahun 1983 mengalami peningkatan sebesar 732,4 ton setiap tahunnya (Desi Puspitasari, 2008). Hal ini termaktub dalam Q.S Al-Isra/17:66 sebagai berikut :

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَؤُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya :

Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2014).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan Pemelihara dan yang selalu berbuat baik kepada kamu adalah hanya Dia saja yang berkuasa melayarkan secara mudah kapal-kapal di lautan dan sungai-sungai untuk kemanfaatan kamu dengan jalan menciptakan hukum-hukum alam sehingga kapal-kapal dapat berlayar agar kamu mencari secara sungguh-sungguh sebagian dari karunia-Nya yang melimpah dan yang tidak dapat atau sulit kamu temukan di darat, seperti ikan dan mutiara, dan supaya kamu memperoleh kemudahan transportasi dan perdagangan. Sesungguhnya Dia khususnya terhadap kamu, wahai orang-orang mukmin adalah Maha Penyayang (Shihab, Quraish, 2012).

Eucheuma cottonii merupakan salah satu jenis rumput laut merah (*Rhodophyceae*) dan berubah nama menjadi *Kappaphycus alvarezii* karena karaginan yang dihasilkan termasuk fraksi kappa-karaginan. Maka jenis ini secara taksonomi disebut *Kappaphycus alvarezii*. Klasifikasi *Eucheuma cottonii* menurut Rachmat (1999) adalah sebagai berikut :

Kingdom : *Plantae*

Divisi : *Rhodophyta*

Kelas : *Rhodophyceae*

Ordo : *Gigartinales*

Famili : *Solieracea*

Genus : *Eucheuma*

Species : *Eucheuma alvarezii* Doty



Ciri fisik *Eucheuma cottonii* adalah mempunyai thallus silindris, permukaan licin, cartilogeneus. Keadaan warna tidak selalu tetap, kadang-kadang berwarna hijau, hijau kuning, abu-abu atau merah. Perubahan warna sering terjadi hanya karena faktor lingkungan. Kejadian ini merupakan suatu proses adaptasi kromatik yaitu penyesuaian antara proporsi pigmen dengan berbagai kualitas pencahayaan (Prasetyowati dkk, 2008).

Beberapa jenis *Eucheuma* mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan internasional sebagai penghasil ekstrak karaginan. Kadar karaginan dalam setiap spesies *Eucheuma* berkisar antara 54 – 73 % tergantung pada jenis dan lokasi tempat tumbuhnya. Karaginan sangat penting peranannya sebagai stabilizer (penstabil), thickener (bahan pengentalan), pembentuk gel, pengemulsi dan lain-lain. Sifat ini banyak dimanfaatkan dalam industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi dan industri lainnya . Selain itu juga berfungsi sebagai *penstabil*, *pensuspensi*, *pengikat*, *protective* (melindungi kolid), *film former* (mengikat suatu bahan), *syneresis inhibitor* (mencegah terjadinya pelepasan air) dan *flocculating agent* (mengikat bahan-bahan).

Penggunaan jenis rumput laut *Eucheuma cottonii* tidak hanya terbatas sebagai makanan utama pada industri karagenan, tetapi juga dapat digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan makanan, karena merupakan sumber gizi yang baik selain itu juga merupakan sumber mineral yang baik (Yunizal, 2011).

Habitat rumput laut *Eucheuma cottonii* memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Oleh karena itu, rumput laut ini hanya mungkin hidup pada lapisan fotik, yaitu kedalaman sejauh sinar matahari masih mampu mencapainya. Kandungan *dietary fiber* dan nutrisinya bermanfaat sebagai antioksidan, antimutagenic, anti koagulan, anti tumor, dan metabolisme lipid. Rumput laut juga sebagai sumber iodium alami yang terbaik (Zada, 2009 dalam Evi Fitriyani, 2012).

Rumput laut adalah tumbuhan tingkat rendah yang tidak dapat dibedakan antara bagian akar, batang, dan daun. Semua bagian tumbuhannya disebut *thallus*. Secara keseluruhan, tumbuhan ini mempunyai morfologi yang mirip, walaupun sebenarnya berbeda. Makroalgae bentuknya yang seperti rumput terutama yang berukuran besar dan hidupnya di laut, sehingga orang awam terutama kaum usahawan menyebutnya rumput laut. Sedangkan di kalangan ilmuwan atau akademisi, rumput laut dikenal dengan nama algae (Susanto, 2003 dalam Tri Handayani, 2006).

Tabel 2.1
Komposisi kimiawi dari beberapa jenis rumput laut

Jenis Rumput Laut	Karbohidrat (%)	Protein (%)	Lemak (%)	Air (%)	Abu (%)	Serat Basah (%)
<i>E. Cottoni</i>	57,52	3,46	0,93	14,96	16,05	7,08
<i>Sargassum sp</i>	19,06	5,53	0,74	11,71	34,57	28,39
<i>Turbinaria sp</i>	44,90	4,79	1,66	9,73	33,54	16,38
<i>Glacelaria sp</i>	41,68	6,59	0,68	9,38	32,76	8,92

Sumber: Yunizal, 2011

Klasifikasi rumput laut sebagai berikut :

1. *Eucheuma*



Gambar 2.1 *Eucheuma Cottonii*



Gambar 2.2 *Eucheuma Spinosum*


2. *Hypnea sp*



Gambar 2.3 *Hypnea sp*



3. *Glacelaria*



Gambar 2.4 *G. Gigas*



Gambar 2.5 *G. Verrucosa*



Gambar 2.6 *G.Lichenoides*

4. *Gelidium*



Gambar 2.7 *Gelidium sp*

5. *Sargassum*



Gambar 2.8 *Polifolium*



Gambar 2.9 *Crassifolium*

Rumput laut adalah alga yang berukuran makroskopik dan dengan mudah dapat dikenali secara visual. Kelompok ini terdiri atas alga hijau (*Chlorophyta*), alga merah (*Rhodophyta*), dan alga coklat (*Phaeophyta*). Alga-alga ini dapat hidup di perairan laut, sungai, danau, maupun kolam-kolam. Beberapa contoh rumput laut yang memiliki nilai ekonomis penting dan telah dibudidayakan maupun dimanfaatkan antara lain *Gracilaria* sp., *Gelidium* sp., *Eucheuma cottonii*, *E. spinosum*, dan

Porphyra sp. dari kelompok rumput laut merah serta *Sargassum* sp., dan *Turbinaria* sp. dari kelompok rumput laut coklat. Kedua kelompok rumput laut ini hidup di perairan laut atau payau (Chapman, 2010 dalam Dwiwitno, 2011).

Rumput laut mengandung hidrokoloid dan senyawa farmasetikal, karena itu rumput laut telah lama dimanfaatkan oleh nelayan dan masyarakat sebagai makanan sehari-hari, seperti di Jepang ada *nori* (*Porphyra* spp.), *wakame* (*Undaria fimaatifida*), dan *kombu* (*Laminaria digitata*) serta di beberapa negara Eropa dikenal *dulse* (*Palmaria palmate*), *laver* (*Porphyra* spp.), *sea lettuce* (*Ulva* spp.), *sea spaghetti* (*Himanthalia elongata*), dan *carrageen* (*Chondrus crispus*) (Chapman, 2010 dalam Dwiwitno, 2011).

Konsumsi serat pangan yang direkomendasikan untuk orang dewasa umumnya 25–35 g/hari. Beberapa negara memberikan anjuran yang lebih spesifik. Sebagai contoh di Amerika minimal konsumsi serat yang dianjurkan adalah 25 g/hari atau 15 g/1.000 kkal menu, dengan kandungan serat larut tidak kurang dari 0,6 g setiap kali makan (Wisten & Messner, 2005 dalam Dwiwitno, 2011).

Sumberdaya rumput laut dimanfaatkan untuk makanan dan produk sayuran laut. Di beberapa negara Asia, rumput laut sering dikonsumsi sebagai sayuran laut, bahkan orang-orang Jepang mengkonsumsi sayuran laut rata-rata 1,6 kg (berat kering) per tahun per kapita (Fujiwara-Arasaki *Et Al.* Dalam Fleurence, 1999). Diketahui kurang lebih 25% dari makanan yang dikonsumsi di Jepang adalah

mengandung rumput laut yang dipersiapkan dan disimpan dalam beberapa bentuk dan menjadi sumber penghasilan utama bagi nelayan di sana. Di Malaysia, pemanfaatan rumput laut sebagai makanan tidak seperti di Jepang dan Cina. Meskipun demikian, pada kenyataannya rumput laut hanya dikonsumsi di daerah pantai khususnya sepanjang pantai timur Peninsula Malaysia dan di Malaysia Timur, rumput laut dimakan sebagai salad (Norziah & And Ching, 2000). Sedangkan di Indonesia, rumput laut banyak dimanfaatkan penduduk pantai untuk sayur dan lalapan, bahkan beberapa jenis rumput laut banyak dijual di pasar-pasar tradisional (Tri Handayani, 2006).

Sampai saat ini, masih sedikit sekali informasi mengenai aspek biokimia dan komposisi nutrisi dari rumput laut yang menunjang pemanfaatannya sebagai sumber makanan yang bernilai gizi. Oleh karena itu aspek biokimia dan nutrisi rumput laut yang saya tulis diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pemanfaatan rumput laut menjadi meluas, tidak hanya dinikmati masyarakat sekitar pantai tetapi juga oleh masyarakat umum (Tri Handayani, 2006).

Alga laut (*Eucheuina sp.*) merupakan salah satu sumberdaya alam hayati Indonesia. Tumbuhan ini mempunyai nilai ekonomis yang penting dalam industri kosmetik, pangan dan lain-lain. Rumput laut banyak diolah dalam bentuk kering setelah melalui proses penjemuran atau diolah menjadi makanan siap konsumsi, seperti: dodol, manisan dan minuman. Saat ini kebanyakan makanan siap konsumsi yang dijual masyarakat adalah minuman sari buah, tetapi untuk minuman dari rumput

laut jarang ditemui dilingkungan masyarakat (Nursanto, 2004 dalam Evi Fitriyani, 2012).

Kabupaten bantaeng merupakan sentra pengolahan rumput laut melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengolahahn dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor: KEP.08/DJP2HP/2009, dan menjadi salah satu dari 15 sentra pengembangan industri perikanan di Indonesia (Fachry,2009 dalam Jasrah S..R, 2014).

B. Tinjauan Tentang Ikan Kembang Jantan (*Rastrelliger Kanagurta*)

Perairan Indonesia adalah salah satu pusat dari biodiversitas ikan di dunia yang memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional (Dahuri, 2003). Ikan kembang lelaki (*Rastrelliger Kanagurta*) merupakan salah satu spesies andalan produk sektor perikanan di Propinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari jumlah produksinya yang cukup tinggi selain ikan layang (*Duopetesia sp*) dan ikan tembang (*Sardinella spp.*) sejak tahun 2002-2006. Menurut data statistik Dinas Perikanan Sulawesi Selatan, ikan kembang merupakan salah satu dari lima jenis ikan pelagis kecil yang memiliki tangkapan yang cukup tinggi. Kelima jenis ikan pelagis tersebut adalah ikan kembang, layang, tembang, lemuru dan selar (BPS Sulsel 2007 dalam Sabrun Jamil dkk, 2010).

Gambar 2.10
Ikan Kembang Jantan (*Rastrelliger Kanagurta*)



Ciri-ciri tubuh dari ikan banyar adalah badan agak langsing panjang kepala lebih tinggi dari tinggi kepala. Seluruh tubuh tertutup sisik halus dan terdapat *corselet* di belakang sirip dada. Terdapat selaput lemak pada kelopak mata. Usus 1,3-3,7 kali panjang badan. Tapisan insang panjang jelas tampak bila mulut dibuka dengan jumlah sebanyak 30-46 buah, sisik garis rusuk berjumlah 120-150 buah, sirip punggung kedua berjari-jari keras berjumlah 10 buah, sirip punggung kedua berjari-jari lemah 11-12 sirip dubur berjari-jari lemah sebanyak 11-12 buah. Di belakang sirip punggung dan dubur terdapat 5-6 buah *finlet* (Murniyati 2004, dalam Yunizal, 2011).

Ikan kembang banyar memiliki warna biru kehijauan di bagian atas dan bagian bawah berwarna putih kekuningan. Dua baris totol-totol hitam pada punggung, satu totol hitam dekat sirip dada. Ban warna gelap memanjang di atas garis rusuk, dua ban warna keemasan di bawah garis rusuk. Sirip punggung abu-abu kekuningan. Sirip ekor dan dada kekuningan. Sirip-sirip lain bening kekuningan. Ikan

ini memiliki panjang maksimum 35 cm dengan panjang rata-rata 20-25 cm (Murniyati 2004, dalam Yunizal 2011).

Gambar 2.11
Perbedaan Ikan Kembung Jantan (*Rastrelliger Kanagurta*) dan Betina
(*Rastrelliger Brachysoma*)



Tampak pada bagian mata, ikan kembung betina (atas) memiliki mata yang lebih besar dibandingkan dengan ikan kembung jantan (bawah)



Sirip ikan kembung betina (atas) tampak lebih panjang dibandingkan dengan sirip ikan kembung jantan (bawah).



Pada ikan kembung betina (atas) tidak memiliki tulang tambahan tutup insang sedangkan pada ikan kembung jantan (bawah) memiliki tulang tambahan tutup insang.



Komposisi daging ikan kembung (*Rastreliger Kanagurta sp*) per 100 gram

Komposisi	Satuan	Jumlah
Kalori	Kal	103,00
Protein	Gram	22,00
Lemak	Gram	1,00
Kalsium	Mg	20,00
Besi	Mg	1,50
Vitamin A	SI	30,00
Air	Gram	76,00

Yunizal, 2011

Ikan dikenal sebagai suatu komoditi yang mempunyai nilai gizi tinggi namun mudah busuk karena mengandung kadar protein yang tinggi dengan kandungan asam

amino bebas yang digunakan untuk *metabolisme mikroorganisme, produksi amonia, biogenik amine, asam organik, ketone dan komponen sulfur* (Lu *et al.*, 2010; Delgaard *et al.*, 2006 dalam Agustini T.W, 2011).

Tabel 2.3
Komposisi Kimia Ikan Kembung Segar

Komponen	Jumlah
Air	60,0 - 84%
Protein	18,0 - 30,0%
Lemak	0,1 - 2,2%
karbohidrat	0 - 1,0%
Vitamin	3,0 - 4,5%
Mineral	2,0 - 2,52%

Yuzuv, 2009 dalam Dian, 2011

Di beberapa negara maju, ikan telah dikenal sebagai suatu komoditi yang populer karena eksotik, memiliki rasa yang enak, ringan dan bagus untuk kesehatan. Ikan merupakan sumber asam lemak tak jenuh, taurin dan asam lemak omega-3, terutama untuk jenis ikan seperti tuna, tongkol, kembung dan lemuru dimana komponen tersebut telah terbukti efektif untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah (*arteriosclerosis*), oleh karena itu banyak orang berpendapat untuk meningkatkan konsumsi protein harian (*daily protein intake*) terutama yang berasal dari ikan dan konsumsi ikan yang paling bagus adalah ikan yang memiliki mutu kesegaran terbaik, dimana hal tersebut sangat terkait dengan teknik penanganan ikan setelah ditangkap (Agustini T.W, 2011). Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Fathir/35:12 sebagai berikut :

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمَنْ كُلَّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ
حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لِنَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2014).

Ayat di atas menjelaskan bahwa *Dan*, di antara bukti kuasa Allah adalah penciptaan dua laut yakni sungai dan laut. *Tidak sama* antara *dua laut* itu; *yang ini* yakni air sungai, *tawar, segar, sangat sedap diminum* dan *yang ini*, yakni laut, *asin lagi pahit*. Kendati keduanya berdampingan *dan dari masing-masing* laut dan sungai itu *kamu dapat memakan daging yang segar* dari binatang yang hidup disana walau di air asin itu *dan*, disamping makanan tersebut, *kamu juga dapat* secara bersungguh-sungguh *mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya* seperti mutiara dan marjan, *dan* pada masing-masing laut dan sungai itu *kamu* dapat senantiasa melihat *kapal berlayar membelah* lautan dengan cepat *supaya* kamu dengan kemudahan-kemudahan yang dianugerahkan Allah itu *dapat mencari karunia-Nya* dan supaya kamu *bersyukur* (Shihab, Quraish, 2012).

Ikan cepat menjadi busuk dan rusak apabila dibiarkan begitu saja di udara terbuka (kira-kira 5-8 jam setelah ikan tertangkap). Hal ini disebabkan karena semua proses pembusukan memerlukan air, sementara 80% tubuh ikan terdiri dari air. Dengan penyusutan/habisnya kadar air, bakteri pembusuk tidak akan aktif lagi. Batas

kadar air yang diperlukan yaitu 30% sampai 40% supaya perkembangan bakteri pembusuk dapat terhambat sehingga ikan dapat dipertahankan agar tetap dalam keadaan awet.

Ikan merupakan pangan yang sangat mudah membusuk berbicara tentang mutu ikan berarti merujuk pada kesegaran ikan. Ikan segar adalah ikan yang baru saja ditangkap dan diawetkan dengan cara apapun kecuali semata-mata didinginkan dengan es, ikan yang belum banyak mengalami perubahan baik secara kimiawi, fisik maupun biologis meskipun telah mengalami pengawetan atau pembekuan (Rusni, 2003).

Ikan kembung jantan hidup diperairan pantai dan tersebar diwilayah indo-pasifik barat dengan suhu perairan kurang lebih 17°C. Ikan kembung jantan banyak ditemukan di lepas pantai dan pesisir yang dalam. Ikan ini memakan plankton dan biasa ditemukan bergerombol di kolom di kolom perairan. Ikan kembung jantan cenderung berenang mendekati permukaan air pada waktu malam hari dan siang hari turun ke lapisan yang lebih dalam (Nurqaderianie A.S, 2014).

Abon merupakan salah satu jenis produk olahan makanan kering berbentuk khas yang dibuat dari daging yang direbus dan disayat-sayat dan diberi bumbu, digoreng kemudian dipres. Pada prinsipnya abon merupakan suatu proses pengawetan yaitu kombinasi antara perebusan dan penggorengan dengan menambahkan bumbu-bumbu. Produk yang dihasilkan mempunyai tekstur, aroma dan

rasa yang khas. Selain itu proses pembuatan abon merupakan proses pengurangan kadar air dalam bahan daging untuk memperpanjang proses penyimpanan (Mustar, 2013).

Abon merupakan salah satu jenis makanan awetan berasal dari daging sapi, kerbau, ataupun ikan laut yang disuwir dengan berbentuk serabut atau dipisahkan dari seratnya kemudian ditambahkan dengan bumbu-bumbu selanjutnya digoreng. Abon adalah suatu jenis makanan kering berbentuk khas, dibuat dari daging, direbus disayat-sayat, dibumbui, digoreng dan dipres. Abon dibuat dari daging yang diolah sedemikian rupa sehingga memiliki karakteristik kering, renyah dan gurih. Pada umumnya daging yang digunakan dalam pembuatan abon yaitu daging sapi atau kerbau. Abon ikan merupakan jenis makanan olahan ikan, melalui kombinasi proses penggilingan, penggorengan, pengeringan dengan cara menggoreng, serta penambahan bahan pembantu dan bahan penyedap terhadap daging ikan (Mustar, 2013).



Abon ikan yang bermutu baik adalah abon ikan yang terbuat dari ikan yang baik. Ikan yang baik adalah ikan yang masih segar. Ikan segar adalah ikan yang memiliki sifat sama dengan ikan yang masih hidup baik rupa, bau, aroma, rasa dan tekstur (Mustar, 2013).

C. Tinjauan Umum Tentang Bakpao

Pada jaman sekarang Bakpao sudah menjadi kudapan yang jamak ditemui. Bakpao adalah makanan khas Tionghoa yang juga sangat digemari di Indonesia, tersaji dalam beragam rasa seperti coklat, kacang hijau, kacang hitam dan daging. Perbedaan akan rasa biasanya ditunjukkan akan warna titik yang berbeda di atas bakpao (Azis Hendradi, 2012).

Bakpao (Hanzi: , hokkian: *bakpao*, hanyupinyin: *roubao*) merupakan makanan tradisional Tionghoa. Dikenal sebagai *bakpao* di Indonesia karena diserap dari bahasa Hokkian yang dituturkan mayoritas orang Tionghoa di Indonesia. *Pao* itu berarti "bungkusan", dan *bak* itu artinya daging, jadi *bakpao* berarti "bungkusan (berisi daging)" (Azis Hendradi, 2012).

Membuka usaha kue bakpao yang khas namun dengan ketersediaan bahan yang tidak sulit didapat menjadi salah satu pertimbangan yang penting. Nama kue bakpao yang di dalamnya berisi selak kacang tanah atau kacang ijo, ada pula isi daging ayam atau sapi. Meskipun makanan ini bukan berasal dari daerah Indonesia, namun menu makanan ini sudah banyak digemari masyarakat. Sehingga target pasar yang bisa Anda bidik juga sangat luas, mencakup semua kalangan masyarakat di berbagai daerah. Karena makanan tersebut cukup bersahabat dengan konsumen menengah ke atas, maupun konsumen menengah ke bawah (Azis Hendradi, 2012).

Pembuatan bakpao sendiri tidak sulit hanya memerlukan beberapa tahap saja. Kulit bakpao dibuat dari adonan tepung terigu diberi ragi untuk mengembangkan adonan, setelah diberikan isian, adonan dibiarkan sampai mengembang lalu di kukus sampai matang. Untuk membedakan isi bakpao, tanpa daging (*vegetarian*) biasanya di atas bakpao diberi titikan warna, demikian juga dengan isian yang lain diberi tanda warna yang berbeda-beda (Azis Hendradi, 2012).

Karena makanan tersebut sudah cukup terkenal di kalangan konsumen tingkat menengah keatas maupun tingkat menengah kebawah, pemasarannya juga tidak sulit. Bakpao dapat di pasarkan di pasar, sekolah, kampus, ataupun mall. Kita juga dapat mengiklankan melalui berbagai macam, seperti pamflet, brosur, dan yang paling ekonomis adalah promosi dari mulut kemulut (Azis Hendradi, 2012).

Dalam bisnis makanan yang terpenting adalah menjaga mutu dan cita rasa produk. Oleh karena itu, ciprakan yang benar-benar nikmat. Dan juga harus berinovasi pada produk bakpao itu sendiri, tanpa menghilangkan bakpao yang menjadi ciri khas. Banyak pilihan dari bakpao yang menarik dan unik tentunya semakin menarik minat konsumen yang mudah bosan dengan produk yang itu-itu saja (Azis Hendradi, 2012).

Seiring dengan aktivitas yang semakin sibuk dan kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan bergizi, maka bakpao merupakan pilihan makanan alternatif disegala kondisi waktu dan makan (Novita Iswanti, 2012).

Produk bakpao harganya yang relatif ekonomis sehingga daya jualnya lebih tinggi dan harganya lebih murah, sederhana dalam pengolahannya, bakpao dapat juga menjadi pilihan makanan di segala kondisi waktu dan dapat dikonsumsi oleh siapa saja dengan masa umur produk yang mampu bertahan sehari, pengolahan dengan cara dikukus kandungan gizinya tidak banyak berkurang dan berbeda dengan bakpao biasa dijual karena bakpao ini merupakan diversifikasi pangan dengan menciptakan sesuatu yang baru sehingga jika dijual maka masyarakat tertarik untuk membelinya.

Produk/makanan dengan cara dikukus maka kandungan gizinya tidak banyak berkurang, berbeda dengan cara digoreng maka kandungan gizinya banyak berkurang.

D. Tinjauan Uji Organoleptik

Uji organoleptik atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Jenis uji organoleptik yang digunakan adalah uji kesukaan atau hedonik menyatakan suka atau tidaknya suatu produk.

Dalam penilaian organoleptik dikenal tujuh macam panel, yaitu panel perseorangan, panel terbatas, panel terlatih, panel agak terlatih, panel tidak terlatih, panel konsumen dan panel anak-anak. Perbedaan ketujuh panel tersebut didasarkan pada keahlian dalam melakukan penilaian organoleptik.

1. Panel Perseorangan

Panel perseorangan adalah orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifik yang sangat tinggi yang diperoleh karena bakat atau latihan-latihan yang sangat intensif. Panel perseorangan sangat mengenal sifat, perannya dan cara pengolahan bahan yang akan dinilai dan menguasai metode-metode analisa organoleptik dengan sangat baik.

2. Panel Terbatas

Panel terbatas adalah terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai kepekaan tinggi sehingga bias lebih dapat dihindari. Panelis ini mengenal dengan baik faktor-faktor dalam penelitian organoleptik.

3. Panel Terlatih

Panel terlatih terdiri atas 15-25 orang yang mempunyai kepekaan cukup baik.



4. Panel Agak Terlatih

Panel tidak terlatih terdiri atas 15-25 orang yang sebelumnya dilatih untuk mengetahui sifat-sifat tertentu. Panel agak terlatih dapat dipilih dari kalangan terbatas.

5. Panel Tidak Terlatih.

Panel tidak terlatih terdiri dari 25 orang awam yang dapat dipilih berdasarkan jenis suku, bangsa, tingkat sosial dan pendidikan.

6. Panel Konsumen

Panel konsumen terdiri dari 30 hingga 100 orang yang tergantung pada target pemasaran komoditi.

7. Panel Anak-anak


Panel yang khas adalah panel menggunakan anak-anak berusia 3-10 tahun. Biasanya anak-anak digunakan sebagai panelis dalam penilaian produk-produk pangan yang disukai anak-anak seperti roti, permen, es krim dan lain-lain.

E. Kerangka Pikir

Seiring dengan semakin banyaknya produk olahan yang beredar di masyarakat namun masih terdapat produk yang belum memperhatikan kandungan gizi suatu makanan, maka dengan itu peneliti mengambil inisiatif untuk membuat produk bakpao, dimana bakpao merupakan makanan yang sangat mudah dijumpai oleh masyarakat.



Berikut merupakan kerangka pikir pada penelitian ini, yaitu :



Keterangan:

: Variabel Independen

: Variabel Dependen

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena data pada penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada bagian Biokimia. Sedangkan untuk uji organoleptik dilakukan di Universitas Negeri Makassar jurusan Tata Boga.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen, dengan menggunakan desain pra-eksperimen, dikatakan pra-eksperimen karena desain penelitian ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen.

Model pra-eksperimen yang digunakan yaitu *One Shot Case Study*. Dalam rancangan ini, suatu kelompok subjek dikenakan perlakuan tertentu, lalu setelah itu dilakukan pengukuran terhadap variabel tertentu (Suryabrata, 2010).

C. Objek penelitian

Adapun objek yang diteliti pada penelitian ini adalah bakpao ikan kembang jantan, bakpao rumput laut + ikan kembang jantan 1:1, 1:3, 3:1. Adapun rumput laut yang digunakan sebagai sampel adalah rumput laut merah yang masih segar kemudian dikeringkan oleh sinar matahari sampai berwarna putih dan direndam dengan air beras agar bau dari rumput laut berkurang setelah itu dicuci bersih dengan air mengalir.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen baik berupa catatan, buku maupun didokumentasikan lewat foto.

2. Uji Laboratorium

Uji laboratorium atau riset laboratorium adalah melakukan eksperimen melalui percobaan tertentu dengan menggunakan alat-alat atau fasilitas yang tersedia di laboratorium penelitian. Uji laboratorium pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah total atau kadar zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin A) dengan menggunakan metode tertentu pada produk bakpao dan substitusinya. Dalam penelitian ini, analisis kadar karbohidrat



menggunakan metode *Luff Schoorl*, analisis kadar protein menggunakan metode *Kjehdal*, analisis kadar vitamin A menggunakan metode *Spektrofotometrik*.

E. Instrumen Penelitian

1. Instrumen yang Digunakan Untuk Pembuatan Sampel

a. Bakpao Abon Ikan Kembung

1) Alat

Alat yang digunakan untuk pembuatan sampel yaitu pisau, talenan, panci, saringan panci, baskom kecil, piring

2) Bahan

Bahan yang digunakan untuk membuat sampel yaitu 30 gram terigu, 20 gram abon ikan kembung, dan 20 ml air.

b. Bakpao Rumput Laut Dengan Substitusi Abon Ikan Kembung

1) Alat

Alat yang digunakan untuk pembuatan sampel yaitu pisau, talenan, panci, saringan panci, baskom kecil, piring

2) Bahan

Bahan yang digunakan untuk membuat bakpao substitusi 1:1 yaitu 30 gram terigu, 10 gram abon ikan kembung, 10 gram rumput laut dan 20 ml air. Bakpao substitusi 1:3 yaitu 30 gram terigu, 5 abon ikan kembung, 15 gram rumput laut dan 20 ml air. Bakpao

substitusi 3:1 yaitu 30 gram terigu, 15 gram abon ikan kembung, 5 gram rumput laut dan 20 ml air. Bakpao abon ikan kembung yaitu 30 gram terigu, 20 gram abon ikan kembung dan 20 ml air.

2. Instrumen yang Digunakan untuk Analisis Kadar Zat Gizi

a. Analisis Kadar Karbohidrat

1) Alat

Peralatan yang digunakan untuk analisis kadar karbohidrat dengan metode *Luff Schoorl* yaitu erlenmeyer, pipet tetes, pipet gondok, labu ukur, kertas saring dan corong.

2) Bahan

Bahan yang digunakan untuk analisis kadar karbohidrat dengan metode *Luff Schoorl* yaitu HCl 3%, indikator pp 0,1%, NaOH 30%, asam asetat glacial 3%, aquades, KI 20%, H₂SO₄ 25%, dan amilum 0,5 %.

3) Prosedur Kerja

- a) Homogenkan sampel
- b) Sampel ditimbang dalam erlenmeyer masing-masing 5 gram
- c) Tambahkan 100 ml HCl 3%, didihkan selama 3 jam dengan pendingin tegak
- d) Dinginkan, tambahkan 2 tetes indikator pp 0,1% lalu netralkan dengan NaOH 30%
- e) Tambahkan sedikit asam asetat glacial 3% agar suasana larutan sedikit asam

- f) Pindahkan ke labu ukur 500 ml tepatkan volume dengan aquades, homogenkan lalu saring
- g) Pipet 10 ml filtrate ke dalam erlemeyer 500 ml. Tambahkan 25 ml larutan luff, 15 ml aquades
- h) Panaskan dengan suhu yang tetap (mendidih dalam waktu 3 menit) selama 10 menit
- i) Segera dinginkan di dalam bak berisi es
- j) Tambahkan 15 ml KI 20% dan 25 ml H₂SO₄ 25% perlahan-lahan
- k) Titrasi secepatnya dengan natrium tiosulfat 0,1 N (gunakan indikator amilum 0,5%)
- l) Tambahkan 25 ml luff dan 15 ml aquades ke dalam erlemeyer (blanko karbohidrat)
- m) Panaskan selama 2 menit
- n) Tambahkan KI 20% 15 ml dan H₂SO₄ 25 ml kemudian titrasi
- o) Hasil yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam rumus:

Volume titrasi = volume titrasi blanko – volume titrasi sampel

Konversi volume titrasi ke Tio 0,1 N

$$= \frac{\text{volume titrasi (ml)} \times \text{normalitas tio}}{0,1 N} = \dots ml$$

Hasil perhitungan konversi volume dicocokkan dengan tabel luff school

.... ml ~ ... mg glukosa = ml selisih volume

=.... mg selisih bobot glukosa

mg glukosa = mg glukosa + (selisih volume x selisih bobot glukosa)

$$\text{Kadar glukosa (\%)} = \frac{\text{mg glukosa} \times \text{faktor}}{\text{bobot sampel (mg)}} \times 100$$

Kadar karbohidrat (%) = kadar glukosa (%) x 0,90

b. Analisis Kadar Lemak

1) Alat

Alat yang digunakan untuk analisis kadar lemak dengan metode gravimetri yaitu *drying oven*, neraca analitik, desikator, dan *hot plate*.

2) Bahan

Bahan yang digunakan untuk analisis kadar lemak dengan metode gravimetri yaitu N-hexane.

3) Prosedur Kerja

- a) Gerus sampel hingga halus dan homogen
- b) Timbang 5 gram sampel tambahn N-hexane 20 ml
- c) Siapkan wadah lain untuk di oven selama 2 jam, kemudian dimasukkan ke dalam desikator dan timbang
- d) Pindahkan ekstrak lemak ke dalam wadah yang telah di oven dan uapkan
- e) Labu lemak berisi lemak dikeringkan dalam oven suhu 105°C selama 2 jam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

MAKASSARA

f) Masukkan ke dalam desikator dan timbang

g) Hasil yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam rumus:

$$\text{Lemak}(\%) = \frac{\text{bobot wadah berisi lemak} - \text{bobot wadah kosong (g)}}{\text{bobot sampel (g)}} \times 100$$

c. Analisis Kadar Protein

1) Alat

Peralatan yang digunakan untuk analisis kadar protein dengan metode *Kjedahl / titrimetrik* yaitu labu destilasi, alat distilasi lengkap dengan erlenmeyer berpenampung berukuran 250 ml dan pipet volum.

2) Bahan

Bahan yang digunakan untuk analisis kadar protein dengan metode *Kjedahl* yaitu *selen reagent mixture*, H_2SO_4 p.a, aquades, indikator pp, NaOH, asam borat, indikator *Bromcresol Green*, dan HCl 0,1

3) Prosedur Kerja

- a) Gerus sampel hingga halus dan homogen
- b) Timbang 0,5 gram selen reagent mixture
- c) Tambahkan 25 ml H_2SO_4 p.a
- d) Panaskan di hotplate suhu 350°C dalam lemari asam selama 1 jam, hingga asap putih dan ekstrak jernih
- e) Angkat dan dinginkan dalam lemari asam
- f) Tambah aquades 250 ml

- g) Tambah indikator pp 1 ml dan dinginkan, masukkan NaOH.
- h) Pindahkan ke dalam labu destilasi lalu dipanaskan
- i) Siapkan erlenmeyer ukuran 250 ml masukkan asam borat 1% 20 ml
- j) Panaskan protein dan sambungkan dengan erlenmeyer yang berisi asam borat sampai batas 100
- k) Titrasi HCl 0,1 hasil uap protein ditambahkan 2-3 tetes indikator *Bromocresol Green* hingga berwarna ungu
- l) Untuk membuat blanko protein (gunakan cara dari f-k)
- m) Hasil yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam rumus:

$$- \% N = \frac{(titrasi\ sampel - titrasi\ blanko) \times NHCl \times BAN}{berat\ sampel\ (mg)} \times 100$$

$$- \% Protein = N (\%) \times F. konveksi$$

d. Analisis Kadar Vitamin A

1) Alat

Alat yang digunakan untuk analisis kadar Vitamin A dengan metode *Spektrofotometrik* yaitu gelas ukur, corong pisah, labu ukur 50 ml

2) Bahan

Bahan yang digunakan untuk analisis kadar Vitamin A dengan metode *Spektrofotometrik* yaitu aceton, KOH alkohol, N-hexane

3) Prosedur Kerja

- a) Gerus sampel dan homogenkan
- b) Timbang 25 gram sampel

- c) Maserasi dengan aseton
- d) Pindahkan ekstrak vitamin A ke dalam gelas ukur dan uapkan
- e) Tambah KOH alkohol 1 ml
- f) Diamkan selama 2 jam
- g) Ekstraksi dengan N-hexane (pengocokan pelan) secara berulang sampai ekstrak N-hexane tidak berwarna
- h) Gunakan labu ukur 50 ml masukkan cairan N-hexane yang telah di ekstraksi, sampai batas volume.
- i) Hasil yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam rumus:

$$\text{Vit. A } (\mu\text{g/g}) = \frac{\text{konsentrasi vit A } (\mu\text{g/ml}) \times \text{vol.sampel (ml)}}{\text{bobot sampel}}$$

F. Validasi Data dan Reliabilitas Instrumen

1. Validasi

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala atau instrumen dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.

Pada penelitian ini, alat-alat yang digunakan khususnya dalam melakukan berbagai analisis kandungan zat gizi menggunakan peralatan laboratorium yang sudah sesuai standar serta metode yang digunakan merupakan metode yang telah baku. Sedangkan pengukur dalam penelitian

ini merupakan orang-orang yang telah ahli dalam melakukan analisis kandungan zat gizi.

2. Reliabilitas

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran alat tersebut dapat dipercaya. Reliabilitas dalam penelitian ini sesuai dengan prosedur kerja, termasuk alat yang digunakan, sehingga konsentrasi dari bahan yang digunakan sesuai dengan metode yang ada. Selain itu, sebelum melakukan uji laboratorium, peneliti melakukan beberapa kali percobaan dalam pembuatan bakpao abon ikan kembung substitusi rumput laut, sehingga diperoleh takaran-takaran pembuatan bakpao yang tepat.




G. Teknik Pengambilan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengambilan Data

Data dapat diperoleh setelah melakukan uji laboratorium. Uji laboratorium adalah melakukan eksperimen melalui percobaan tertentu dengan menggunakan alat-alat atau fasilitas yang tersedia di laboratorium penelitian. Uji laboratorium pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah total atau kadar zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, Fe dan Iodium) pada produk bakpao abon ikan kembung substitusi rumput laut


2. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah diperoleh hasil dari penelitian laboratorium dan hasil uji organoleptik. Hasil penelitian laboratorium yang diperoleh kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang ada. Sedangkan data uji organoleptik diolah dengan menggunakan uji *Deskriptif Persentase*.



H. Alur Penelitian

Berikut merupakan alur pada penelitian ini, sebagai berikut :



Keterangan:

RL = Rumput Laut

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar bagian kimia kesehatan, pada tanggal 27 Agustus s/d 17 September 2015. Penelitian ini menggunakan abon ikan kembung, abon ikan kembung substitusi rumput laut 1:1, 1:3, 3:1 sebagai objek penelitian. Keempat objek ini kemudian dianalisis kadar zat gizinya.

Untuk menjaga agar Bakpao dalam keadaan mutu yang baik, maka proses pembuatannya dilakukan pada saat sebelum dibawa ke laboratorium untuk kemudian dianalisis. Adapun kandungan zat gizi yang dianalisis yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin A.

Selain dilakukan uji laboratorium, dalam penelitian ini juga dilakukan uji organoleptik. Uji organoleptik merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk mengetahui daya penerimaan terhadap produk yang digunakan adalah uji kesukaan atau hedonik dengan menyatakan suka atau tidak suka suatu produk. Uji organoleptik ini dilakukan di Universitas Negeri Makassar dengan menggunakan panelis ahli sebanyak 5 orang yang merupakan dosen pada Jurusan Tata Boga.

Berikut ini merupakan hasil uji laboratorium dan uji organoleptik pada Bakpao dan substitusinya:

1. Uji Laboratorium

a. Bakpao Substitusi 1:1

Tabel 4.1
Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi
Dalam 50 gram Bakpao 1:1 Tahun 2015

Sampel	Parameter			
	Karbohidrat (%)	Protein (%)	Lemak (%)	Vitamin A ($\mu\text{g/g}$)
Bakpao 1:1	32,74	13,30	5,96	9,20

Sumber: Data primer, 2015.

Data tabel 4.1 pada bakpao substitusi 1:1 terdapat kandungan karbohidrat sebanyak 32,74%, protein sebanyak 13,30%, lemak sebanyak 5,96%, dan vitamin A sebanyak 9,20 $\mu\text{g/g}$.

b. Bakpao Substitusi 1:3

Tabel 4.3
Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi
Dalam 50 gram Bakpao Substitusi 1:3 Tahun 2015

Sampel	Parameter			
	Karbohidrat (%)	Protein (%)	Lemak (%)	Vitamin A (μg)
Bakpao Substitusi 3:1	7,30	9,62	1,70	8,43

Sumber: Data primer, 2015.

Data tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada bakpao substitusi 1:3 terdapat kandungan karbohidrat sebanyak 7,30%, protein sebanyak 9,62%, lemak sebanyak 1,70%, dan vitamin A sebanyak 8,43 μ g/g.

c. Bakpao Substitusi 3:1

Tabel 4.2
Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi
Dalam 50 gram Bakpao Substitusi 3:1 Tahun 2015

Sampel	Parameter			
	Karbohidrat (%)	Protein (%)	Lemak (%)	Vitamin A (μ g)
Bakpao Substitusi 1:3	17,83	13,72	8,39	9,86

Sumber: Data primer, 2015.

Data tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada bakpao perbandingan 3:1 terdapat kandungan karbohidrat sebanyak 17,83%, protein sebanyak 13,72%, lemak sebanyak 8,39%, dan vitamin A sebanyak 9,86 μ g/g.

d. Bakpao Abon Ikan Kembung

Tabel 4.4
Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi
Dalam 50 gram Bakpao Abon Ikan Kembung Tahun 2015

Sampel	Parameter			
	Karbohidrat (%)	Protein (%)	Lemak (%)	Vitamin A (μ g)
Bakpao Abon Ikan Kembung	22,60	13,07	6,00	7,12

Sumber: Data primer, 2015.

Data tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada bakpao abon ikan kembung terdapat kandungan karbohidrat sebanyak 22,60 %, protein sebanyak 13,06%, lemak sebanyak 6,00%, dan vitamin A sebanyak 7,12 μ g/g.

e. Perbandingan Hasil Analisis Bakpao Abon Ikan Kembung dan Subtitusinya

Tabel 4.5
Perbandingan Hasil Analisis
Bakpao dan Subtitusinya Tahun 2015

Parameter	Sampel			
	Bakpao Subtitusi 1:1	Bakpao subtitusi 1:3	Bakpao subtitusi 3:1	Bakpao Abon Ikan Kembung
Karbohidrat (%)	32,74	7,30	17,83	22,60
Protein (%)	13,30	9,62	13,72	13,06
Lemak (%)	5,96	1,70	8,39	6,00
Vitamin A (μ g)	9,20	8,43	9,86	7,12

Sumber: Data Primer, 2015.

Berdasarkan tabel 4.5 kandungan karbohidrat tertinggi terdapat pada bakpao subtitusi 1:1 (32,74%), kandungan protein tertinggi terdapat pada bakpao subtitusi 3:1 (13,72%), kandungan lemak tertinggi terdapat pada bakpao subtitusi 3:1 (8,39%) dan kandungan vitamin A tertinggi terdapat pada bakpao subtitusi 3:1 (9,86%).

2. Uji Organoleptik

Berikut ini merupakan hasil uji organoleptik pada bakpao dan substitusinya:

Tabel 4.6
Hasil Analisis Organoleptik Pada Bakpao Dan Subtitusinya Berdasarkan
Warna, Rasa, Aroma Dan Tekstur Tahun 2015

Kategori	Bakpao Subtitusi 1:1	Bakpao Subtitusi 1:3	Bakpao Subtitusi 3:1	Bakpao Abon Ikan Kembang
Warna	70	80	60	50
Rasa	55	70	60	80
Aroma	70	65	70	60
Tekstur	65	75	75	55
Rata-Rata	65	72,5	61,25	61,25

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari ke empat bakpao yang dilakukan uji organoleptik, nilai rata-rata skor tertinggi terdapat pada bakpao substitusi 1:3 dengan nilai 72,5% dan terendah terdapat pada bakpao substitusi 3:1 dan bakpao ikan kembang dengan nilai yang sama yaitu sebesar 61,25%.

Tabel 4.7
Hasil Rekapitulasi Analisis Organoleptik pada Bakpao dan Subtitusinya Tahun 2015

Hedonik	Bakpao Subtitusi 1:1				Bakpao Subtitusi 1:3				Bakpao Subtitusi 3:1				Bakpao Abon Ikan Kembung			
	Warna	Rasa	Aroma	Tekstur	Warna	Rasa	Aroma	Tekstur	Warna	Rasa	Aroma	Tekstur	Warna	Rasa	Aroma	Tekstur
Sangat Suka	20	-	20	20	40	20	-	40	-	-	20	-	-	40	20	-
Suka	30	30	30	15	30	45	45	15	30	45	45	15	30	30	15	30
Tidak Suka	20	20	20	30	10	-	20	20	30	10	-	40	10	10	20	20
Sangat Tidak Suka	-	5	-	-	-	5	-	-	-	5	5	-	10	-	5	5
Total	70	55	70	65	80	70	65	75	60	60	70	55	50	80	60	55
Rata-rata	65				72,5				61,25				61,25			

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dari keempat bakpao yang dilakukan uji organoleptik, skor tertinggi terdapat pada bakpao substitusi 1:3 dengan rata-rata nilai kesukaan sebesar 72,5%, kemudian bakpao substitusi 1:1 sebesar 65% dan bakpao substitusi 3:1 mempunyai nilai yang sama dengan bakpao abon ikan kembung sebesar 61,25%.



B. Pembahasan

Pada uji laboratorium, penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian yang telah baku, misalnya pada analisis kadar karbohidrat menggunakan metode *Luff Schoorl*, analisis kadar protein menggunakan metode *Titrimetrik*, analisis kadar lemak menggunakan metode *Gravimetri*, dan analisis kadar vitamin A menggunakan metode *Spektrofotometrik*.

Pada uji organoleptik, dilakukan dengan menggunakan panelis ahli yang berprofesi sebagai tenaga pengajar program studi Tata Boga Universitas Negeri Makassar yang berjumlah 5 orang.

Berikut merupakan pembahasan hasil uji laboratorium dan uji organoleptik bakpao dan substitusinya:

1. Pembahasan Tentang Zat Gizi Bakpao dan Subtitusinya

a. Karbohidrat

Menurut Endang L. Achadi, 2007 tanaman merupakan sumber karbohidrat yang utama, melalui proses fotosintesis senyawa air dari tanah dan karbon dioksida dari udara bereaksi dengan bantuan sinar matahari dan pigmen klorofil menghasilkan glukosa dan oksigen. Energi yang terbentuk disimpan dalam daun, batang, akar, biji, maupun buah yang akan dilepaskan melalui proses oksidasi makanan dalam tubuh.

Karbohidrat merupakan sumber energi yang tersedia dengan mudah disetiap makanan, dan zat gizi ini harus tersedia dalam yang cukup karena apabila terjadi kekurangan karbohidrat sebanyak 15% dari kalori yang ada,

dapat menyebabkan kelaparan dan berat badan menurun. Sebaliknya, apabila jumlah kalori yang tersedia atau yang berasal dari karbohidrat dalam jumlah yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan berat badan (obesitas). Sumber karbohidrat yang cukup didapatkan dari susu, padi-padian, buah-buahan, sukrosa, sirup, tepung dan sayur-sayuran (Adnani, Hariza, 2011).

Pada penelitian ini, kandungan karbohidrat yang paling banyak terdapat pada bakpao substitusi 1:1 sebanyak 32,74% ini berarti dalam 100 gram bakpao terdapat 32,74 gram karbohidrat sedangkan dalam 50 gram sebanyak 16,37 gr/50 gram dan yang terendah terdapat pada bakpao substitusi 1:3 sebanyak 7,30% ini berarti dalam 100 gram bakpao terdapat 7,30 gram karbohidrat sedangkan dalam 50 gram sebanyak 3,65 gr/50 gram. Komposisi utama dari rumput laut yang dapat digunakan sebagai bahan pangan adalah karbohidrat. Akan tetapi, karena kandungan karbohidrat sebagian besar terdiri dari senyawa gumi, maka hanya sebagian kecil saja dari kandungan karbohidrat tersebut yang dapat diserap dalam pencernaan manusia (Loupatty V.D, 2010). Bila karbohidrat dipecah menjadi galaktosa maka sekitar 50% jumlah karbohidrat tersebut dapat dicerna. Jadi, nilai gizinya memang sangat rendah (M. Ghufran H, 2011), maka semakin banyak penambahan rumput laut semakin menurun kadar karbohidratnya dengan adanya substitusi dan perbandingan yang sama maka kadar karbohidratnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bakpao lainnya yang memiliki perbandingan yang

berbeda karena rumput laut dapat berkontribusi terhadap peningkatan kadar karbohidrat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nina Sakinah, 2012 dalam penelitiannya pengaruh substitusi tepung terigu dengan tepung rumput laut *Sargassum sp* terhadap kandungan zat gizi dan kesukaan MP-ASI biskuit kaya zat besi menyatakan bahwa kadar karbohidrat MP-ASI biskuit dengan substitusi tepung rumput laut *Sargassum sp* memenuhi persyaratan SNI 01-7111.2-2005, karena syarat untuk kadar karbohidrat minimal MP-ASI biskuit usia 12-24 bulan adalah 30%. Berdasarkan hasil analisis kandungan gizi tepung rumput laut, tepung rumput laut *Sargassum sp* memiliki kadar karbohidrat yang cukup tinggi sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kadar karbohidrat.

Karbohidrat, merupakan senyawa organik yang terdiri dari serat kasar dan bahan bebas nitrogen (nitrogen free extract). Jadi unsur-unsur karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dalam perbandingan yang berbeda. Karbohidrat dalam bentuk sederhana umumnya lebih mudah larut dalam air daripada lemak atau protein. Komposisi utama rumput laut yang dapat digunakan sebagai bahan pangan adalah karbohidrat (Evi Fitriani, 2012).

Pada prinsipnya, pendekatan gizi masyarakat berfokus pada peningkatan kesehatan baik melalui gizi dan pencegahan primer (serta sekunder) penyakit yang berkaitan dengan gizi di dalam populasi. Masalah

gizi, meskipun sering berkaitan dengan masalah kekurangan pangan, peningkatannya tidak selalu berupa peningkatan produksi dan pengadaan pangan. Pada kasus tertentu, seperti dalam keadaan krisis (bencana kekeringan, perang dll.), masalah gizi muncul akibat masalah ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, yaitu kemampuan rumah tangga memperoleh makanan untuk semua anggotanya. Menyadari hal itu, peningkatan status gizi masyarakat memerlukan kebijakan yang menjamin setiap anggota masyarakat untuk memperoleh makanan yang cukup jumlah dan mutunya (Supariasa, dkk., 2012). Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. ‘Abasa/80:24.



فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2014).

Ayat diatas menjelaskan bahwa hendaklah manusia mau memikirkan tentang kejadian dirinya dan makanan yang dimakannya. Bagaimana hal itu diciptakan dan disediakan untuknya sehingga bisa dijadikan makanan yang menunjang kelangsungan hidupnya. Disamping itu ia pun bisa merasakan kelezatan makanan yang menunjang kekuatan tubuhnya agar tetap terjaga sampai batas umur yang telah ditentukan untuknya (Al-Maraghi, 1985).

Dalam ayat lain, Allah swt. berfirman QS. Al-Baqarah/2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2014).

Ayat diatas memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dan makanan yang baik. Tidak semua makanan halal otomatis baik dan tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada halal yang baik untuk si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu dan ada juga yang kurang baik untuknya walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal tapi tidak bergizi dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat tersebut adalah yang halal lagi baik (Shihab, 2002: 457).

b. Protein

Protein merupakan zat gizi dasar yang berguna dalam pembentukan protoplasma sel, selain itu tersedianya protein dalam jumlah yang cukup penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel jaringan dan sebagai larutan untuk keseimbangan osmotik.

Jumlah protein dalam tubuh tersebut harus tersedia dalam jumlah yang cukup, karena apabila jumlahnya kurang dapat menyebabkan kelemahan, edema, kwashiorkor (apabila kekurangan protein saja), atau marasmus (jika kekurangan protein dan kalori) komponen zat gizi protein banyak diperoleh dari susu, telur, daging, ikan, unggas, keju, kedele, kacang, buncis dan padi-padian.

Protein mempunyai fungsi sebagai bagian kunci semua pembentukan jaringan tubuh, yaitu dengan mensintesisnya dari makanan. Pertumbuhan dan pertahanan hidup terjadi pada manusia bila protein cukup dikonsumsi. Pembentukan berbagai macam jaringan vital tubuh seperti enzim, hormone, antibodi, juga bergantung tersedianya protein. Cairan tubuh pengatur keseimbangan juga memerlukan protein. Seperti diketahui pengaturan tersebut termasuk asam-basa, baik di dalam maupun di luar sel, serta aliran darah. Asam dan basa tidak dibentuk dari protein. Protein dapat berbagi tugas dengan lemak, karbohidrat, untuk menghasilkan energi.

Pada penelitian ini, kandungan protein yang paling banyak terdapat pada bakpao substitusi 3:1 sebanyak 13,72% ini berarti dalam 100 gram bakpao terdapat 13,72 gram protein sedangkan dalam 50 gram sebanyak 6,86 gr/50gram dan yang terendah terdapat pada bakpao substitusi 1:3 sebanyak 9,62% ini berarti dalam 100 gram bakpao terdapat 9,62 gram protein sedangkan dalam 50 gram sebanyak 4,81 gr/50 gram. Dapat diketahui bahwa protein pada ikan kembung jantan sebanyak 18,0 – 30,0% dan rumput laut *eucheuma cottonii* sebanyak 3,46%. Menurut Eddy Afrianto, 1989 abon ikan mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi, dengan demikian apabila semakin tinggi substitusi pada abon akan meningkat kandungan proteinnya, sedangkan rumput laut mengalami proses penjemuran dan pengukusan yang dapat menjadi salah satu faktor terjadinya penurunan kadar protein. Maka semakin tinggi presentase substitusi rumput laut, kadar proteinnya semakin

menurun. Hal ini dapat terjadi karena protein dari rumput laut memiliki senyawa nitrogen yang bersifat volatil, sehingga menguap saat pemanasan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Dian Estiningtyas, 2014 dalam penelitiannya kandungan gizi sosis substitusi tepung tempe dengan bahan pengisi tepung ubi jalar kuning (*ipomea batatas*) dan bahan penstabil ekstrak rumput laut (*eucheuma cottonii*) untuk PMT ibu hamil menyatakan bahwa kadar protein tertinggi pada sosis substitusi tempe 60% sebesar 23,24%. Semakin tinggi substitusi tepung tempe, maka kadar protein sosis semakin meningkat secara signifikan ($p=0,000$). Hal ini disebabkan kadar protein pada sosis dipengaruhi oleh substitusi tepung tempe dengan kandungan protein sebesar 45,7% yang lebih tinggi daripada kadar protein sosis kontrol berupa daging dengan kandungan protein sebesar 18,8%.

c. Lemak

Lemak merupakan zat gizi yang berperan dalam pengangkut vitamin A,D,E,K yang larut dalam lemak. Lemak merupakan sumber yang kaya akan energi, sebagai pelindung organ tubuh seperti pembuluh darah, saraf, organ dan lain-lain terhadap suhu tubuh, dapat membantu rasa kenyang (penundaan waktu pengosongan lambung), komponen lemak dalam tubuh harus tersedia dalam jumlah yang cukup sebab kekurangan lemak akan menyebabkan terjadinya perubahan kulit khususnya asam linoleat yang rendah, berat badan yang kurang. Sumber lemak yang cukup dapat diperoleh dari susu, mentega,

kuning telur, daging, ikan, keju, kacang-kacangan, dan minyak sayur (Adnani, Hariza, 2011).

Hasil analisis kadar lemak terhadap bakpao substitusi 3:1 sebanyak 8,39% ini berarti dalam 100 gram bakpao terdapat 8,39 gram lemak sedangkan dalam 50 gram sebanyak 4,19 gr/50gram dan yang terendah terdapat pada bakpao 1:3 sebanyak 1,70% ini berarti dalam 100 gram bakpao terdapat 1,70 gram lemak sedangkan dalam 50 gram sebanyak 0,85 gr/50 gram, ini dikarenakan kandungan lemak (0,1-2,2%) dari ikan kembung lebih tinggi dibandingkan kandungan lemak (0,93%) dari rumput laut merah, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin ditambahkan abon ikan pada bakpao dengan penambahan rumput laut maka kadar lemak menjadi semakin meningkat. Peningkatan kadar lemak bakpao berasal dari meningkatnya konsentrasi abon ikan yang digunakan pada formulasi. Selain itu, asam lemak yang sebagian kecil terkandung di dalam rumput laut dapat juga mempengaruhi kadar lemak pada bakpao.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nina Sakinah, 2012 dalam penelitiannya pengaruh substitusi tepung terigu dengan tepung rumput laut *Sargassum sp* terhadap kandungan zat gizi dan kesukaan MP-ASI biskuit kaya zat besi menyatakan bahwa hasil analisis kadar lemak MP-ASI biskuit dengan substitusi tepung rumput laut *sargassum sp* adalah 23,67-26,67%. Kadar lemak MP-ASI biskuit berdasarkan SNI 01-7111.2-2005 adalah minimal 6%,

sehingga semua perlakuan variasi biskuit dengan substitusi tepung rumput laut *sargassum sp* memenuhi persyaratan tersebut.

d. Vitamin A

Istilah vitamin pertama kali digunakan Cashimir Funk (Polandia) tahun 1912. Penemu zat dalam dedak beras dapat menyembuhkan beri-beri zat tersebut dibutuhkan oleh tubuh untuk hidup “vita” dan mengandung unsure N (amine), sehingga diberi istilah vitamin. Pemberian nama vitamin dilakukan menurut abjad, yaitu A,B,C,D,E dan K.

Vitamin merupakan zat organik yang umumnya tidak dapat dibentuk dalam tubuh. Vitamin berperan sebagai katalisator organik, mengatur proses metabolisme dan fungsi normal tubuh. Di tubuh vitamin mempunyai peran utama sebagai zat pengatur dan pembangun bersama zat gizi lain melalui pembentukan enzim, antibody, dan hormon. Masing-masing vitamin mempunyai peranan khusus yang tidak dapat digantikan oleh vitamin atau zat gizi lain. Oleh karena itu, meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit dalam satuan milligram atau microgram, jumlah kecil itu sangat penting (Endang L Achadi, 2007).

Vitamin A pertama kali ditemukan sebagai vitamin larut lemak dan digunakan sebagai nama generik untuk retinol dan semua provitamin. Vitamin A banyak digunakan sebagai fortifikan dan suplemen. Berbagai penelitian dilakukan untuk melihat adanya kemungkinan vitamin A (Endang L Achadi, 2007).

Hasil analisis kadar vitamin A yang paling banyak terdapat pada bakpao substitusi 3:1 sebanyak 9,86% ini berarti dalam 100 gram bakpao terdapat 9,86 gram vitamin A sedangkan dalam 50 gram sebanyak 4,93 g/50 gram dan yang terendah terdapat pada bakpao abon ikan kembung sebanyak 7,12% ini berarti dalam 100 gram bakpao terdapat 7,12 gram vitamin A sedangkan dalam 50 gram sebanyak 3,56 gr/50 gram. Vitamin A merupakan vitamin yang bersifat larut lemak, ikan kembung memiliki kadar vitamin A yang tinggi sehingga mampu meningkatkan kadar vitamin A setelah proses penggorengan hal ini dikarenakan minyak goreng mengandung vitamin A sehingga saat dipanaskan vitamin A pada minyak terserap oleh daging ikan. Penambahan bahan dari rumput laut dan ikan kembung dapat meningkatkan kadar vitamin A.

Hal ini sejalan dengan penelitian Dian Estiningtyas, 2014 dalam penelitiannya kandungan gizi sosis substitusi tepung tempe dengan bahan pengisi tepung ubi jalar kuning (*ipomea batatas*) dan bahan penstabil ekstrak rumput laut (*eucheuma cottonii*) untuk PMT ibu hamil menyatakan bahwa kadar beta karoten tertinggi pada kelompok perlakuan substitusi tepung tempe, maka kadar beta karoten sosis semakin meningkat secara signifikan ($p=0.000$). hal ini disebabkan, sosis dengan bahan pengisi ubi jalar kuning mengandung beta karoten 250-500 $\mu\text{g}/100$ gr. Lalu disubstitusi dengan tepung tempe yang berbahan dasar kedelai dengan kadar beta karoten meningkat hingga 30% karena pengaruh metabolisme mikroorganisme saat fermentasi.

2. Pembahasan Tentang Uji Organoleptik

Pada uji organoleptik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji berupa warna, ras, aroma dan tekstur. Adapun skala hedonik yang digunakan yaitu mulai dari sangat suka (4), suka (3), tidak suka (2) dan sangat tidak suka (1). Berikut merupakan pembahasan hasil uji organoleptik bakpao dan substitusinya.

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui hasil analisis organoleptik pada bakpao dan substitusinya berdasarkan warna skor tertinggi terdapat pada bakpao substitusi 1:3 16(80%), dan skor terendah terdapat pada bakpao ikan kembung 10(50%).

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui hasil analisis organoleptik pada bakpao dan substitusinya berdasarkan rasa skor tertinggi terdapat pada bakpao abon ikan kembung 16(80%) dan skor terendah terdapat pada bakpao substitusi 1:1 9(45%).


Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui hasil analisis organoleptik pada bakpao dan substitusinya berdasarkan aroma skor tertinggi terdapat pada bakpao substitusi 1:1 dan 3:1 14(70%) dan skor terendah terdapat pada bakpao abon ikan kembung 12(60%).

Berdasarkan tabel 4.7 hasil analisis organoleptik pada bakpao dan substitusinya berdasarkan tekstur skor tertinggi terdapat pada bakpao substitusi 1:3 15(75%) dan skor terendah terdapat pada bakpao substitusi 3:1 dan bakpao abon ikan kembung 11(55%).

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini, yaitu:

1. Pada penelitian ini hanya menggunakan metode replikasi.
2. Menggunakan kompor yang tidak memiliki suhu. Dengan suhu yang tidak terkontrol, maka bisa saja merusak kandungan zat gizi pada bakpao dan substitusinya.
3. Tidak memeriksa kandungan gizi abon terlebih dahulu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kandungan zat gizi (karbohidrat) pada bakpao substitusi 1:1 sebanyak 32,74%, bakpao substitusi 1:3 7,30%, bakpao substitusi 3:1 sebanyak 17,83%, dan bakpao abon ikan kembung 22,60%.
2. Kandungan zat gizi (protein) pada bakpao substitusi 1:1 sebanyak 13,30%, bakpao substitusi 1:3 9,62%, bakpao substitusi 3:1 sebanyak 13,72% dan bakpao abon ikan kembung 13,06%.
3. Kandungan zat gizi (lemak) pada bakpao substitusi 1:1 sebanyak 5,96%, bakpao substitusi 1:3 1,70%, bakpao substitusi 3:1 sebanyak 8,39% dan bakpao abon ikan kembung 6,00%.
4. Kandungan zat gizi (vitamin A) pada bakpao substitusi 1:1 sebanyak 9,20 µg/gr, bakpao substitusi 1:3 8,43 µg/gr, bakpao substitusi 3:1 9,86 µg/gr dan bakpao abon ikan kembung 7,12 µg/gr.
5. Pada uji organoleptik bakpao dan substitusinya, bakpao dengan nilai rata-rata tingkat kesukaan tertinggi terdapat pada bakpao substitusi 1:3 sebesar 72,5%, kemudian bakpao substitusi 1:1 sebesar 62,5%, bakpao substitusi 3:1 dan bakpao abon ikan kembung dengan nilai yang sama sebesar 61,25%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dalam pemenuhan kebutuhan zat gizi, disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mempunyai nilai gizi yang tepat. Seperti pada bakpao substitusi 1:1 Dan 3:1 mempunyai nilai gizi makro yang tinggi dapat diberikan kepada remaja maupun ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronik), selain itu bakpao 3:1 dapat diberikan kepada remaja maupun bayi yang kekurangan vitamin A dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan.
2. Perlu penelitian lebih lanjut agar meneliti kandungan zat gizi lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, A. Musthafa.1985.*Terjemah Tafsir Al-Maraghi*.CV. Toha Putra.Semarang
- Al-Qur'an dan Terjemahnya.2014.Penerbit Sahifa.Jakarta
- Azis Hendradi.2012.*Peluang Bisnis Usaha Bakpao*.Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer.AMIKOM Yogyakarta
- A Sri Nurqaderianie.2014.*Tingkat Kesegaran Ikan Kembung Lelaki (Rastrelliger Kanagurta) Yang Dijual Eceran Keliling Di Kota Makassar*.Jurusan Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.Universitas Hasanuddin Makassar
- Bambang Herry Purnomo.2012.*Peranan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Untuk Menunjang Ketahanan Pangan di Indonesia*.Jurusan Teknologi Hasil Pertanian,Fakultas Teknologi Pertanian.Universitas Jember
- Desi Puspitasari.2008.*Kajian Subtitusi Tapioka dengan Rumput Laut (Eucheuma cottoni) Pada Pembuatan Bakso*.Fakultas Pertanian.Universitas Sebelas Maret.Surakarta
- Dian Aprianti.2011.*Aktivitas Antibakteri Ekstrak Biji Picung(Pangium edule Reinw) dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Fisiko Kimia, Mikrobiologi dan Sensori Ikan Kembung (Rastrelliger neglectus)*.Fakultas Sains dan Teknologi.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Dian Estiningtyas.2014.*Kandungan Gizi Sosis Subtitusi Tepung Tempe Dengan Bahan Pengisi Tepung Ubi Jalar Kuning (Ipomoea Batatas) dan Bahan Penstabil Ekstrak Rumput Laut (Eucheuma Cottonii) Untuk PMT Ibu Hamil*.Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran.Universitas Diponegoro.Semarang
- Dina Listiyana.2014.*Subtitusi Tepung Rumput Laut (Eucheuma cottonii) Pada Pembuatan Ekado Sebagai Alternatif Makanan Tinggi Yodium Pada Anak Sekolah*.Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan.Universitas Negeri Semarang
- Dr.Ir. Tri Winarni Agustini, MSc, dkk.Laporan Penelitian Hibah Bersaing XVI. Paket Teknologi Penanganan Ikan Segar Dengan Pemanfaatan Bahan Alami.Universitas Diponegoro.Semarang

- Dwiyitno.2011.*Rumput Laut Sebagai Sumber Serat Pangan Potensial*.Peneliti pada Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan.Squalen Vol.6 No.1
- Eko Susanto,Tri W Agustini, dkk.2011.*Pemanfaatan Alami Untuk Memperpanjang Umur Simpan Ikan Kembung (Rastrelliger Neglectus)*.Jurnal Perikanan (Journal of Fisheries Sciences) XIII (2):60-69 ISSN: 0853-6384
- Endang L. Achadi.2007.*Gizi dan Kesehatan Masyarakat*.PT Raja Grafindo Persada.Jakarta
- Hariza Adnani.2011.*Ilmu Kesehatan Masyarakat*.Muha Medika.Yogyakarta
- Ir. Eddy Afrianto dan Ir. Evi Liviawaty.1989.*Pengawetan Dan Pengolahan Ikan*.Kanisius.Yogyakarta
- Indaryanto, Forcep Rio, dkk.2014.*Struktur Komunitas pada Ikan Kembung (Rastrelliger spp.) di Perairan Teluk Banten dan Pelabuhan Ratu*.Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia.Vol. 19: 1-8
- Kementrian Agama Republik Indonesia.2010.*Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*.Jakarta
- Lukas Wibowo dan Evi Fitriyani.2012.*Pengolahan Rumput Laut (Euचेuma Cottoni) Menjadi Serbuk Minuman Instan*.Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan.Politeknik Negeri Pontianak. Volume 8,Nomor 2.Hal 101-109
- M.E Hartati.2011.*Pengaruh Rumput Laut Euचेuma Cottonii Sebagai Bahan Pengenyal Alami Terhadap Kualitas Bakso Daging Sapi*.Volume XL VII, No.2
- M. Ghufrani H.Kordi K.2011.*Kiat Sukses Budi Daya Rumput Laut Di Laut & Tambak*.Lili Publisher.Yogyakarta
- Prasetyowati,Corrine Jasmine A.,Devy Agustawan.2008.*Pembuatan Tepung Karaginan Dari Rumput Laut (Euचेuma Cottonii) Berdasarkan Metode Pengendapan*.
- Rusni.2003.*Aspek Reproduksi Pada Ikan Kembung Lelaki (Rastrelliger Kanagurta) di Perairan Pulau-Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*.Jurusan Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan.Universitas Hasanuddin Makassar
- Sabrun Jamil, dkk.2010.*Penentuan Daerah Konsentrasi Ikan Kembung Lelaki (Rastrelliger kanagurta) dengan Menggunakan Metode kinesis di Perairan*

Pantai Barat Sulawesi Selatan.Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari.Vol. 1
No. 1 Tahun 2010.No. ISSN, 2087-3522

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera hati, 2002

Sitti Radiah Jasrah.2014.*Aplikasi Citra Landsat -8 Untuk Estimasi Potensi Produksi Rumput Laut Di Kabupaten Bantaeng*.Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan.Universitas Hasanuddin Makassar

Statistik Perikanan Tangkap Sulawesi Selatan 2013.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi SulSel.Makassar

Supariasa, Nyoman,dkk.2012.*Penilaian Status Gizi*.Buku Kedokteran EGC.Jakarta

Tri Handayani.2006.*Protein Pada Rumput Laut*.Oseana,Volume XXXI,Nomor 4:23-30

Voulda D. Loupatty.2010.kajian senyawa metabolit primer dan sekunder dari rumput laut sebagai bahan baku industri

Yohana Christiani Ayu W, dkk.*Mempelajari Pengaruh Perbandingan Terigu Dan Ubi Jalar Ungu (Ipomoea Batatas Var Ayamurasaki) Terhadap Karakteristik Bakpao*.Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian.UNUD

Yunizal.2011.Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.Jakarta



L

A



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

A

N

RESEP PEMBUATAN BAKPAO

Alat :

1. Mangkuk
2. Timbangan kue
3. Panci
4. Wadah tertutup

Bahan :

1. Terigu 30 gram
2. Permifan 1/3 sdt
3. Gula 1/3 sdt
4. Mentega ¼ sdt
5. Air 25 ml
6. Rumput laut (10 gram, 5 gram, 15 gram)
7. Abon ikan (10 gram, 5 gram, 15 gram)




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Cara Membuat :

1. Masukkan terigu, mentega, gula, rumput laut, abon ikan, permifan
2. Jika bahan telah dimasukkan kemudian kalis sampai merata
3. Masukkan air ke dalam adonan lalu aduk
4. Setelah itu adonan dimasukkan ke dalam wadah tertutup sekitar 20 menit
(sampai mengembang)

5. Ambil kembali adonan lalu remas-remas hingga gas dalam adonan keluar kemudian bentuk bulat dan diamkan di udara terbuka sampai mengembang
6. Kukus dengan api sedang sekitar 20 menit.



HASIL PERHITUNGAN

Karbohidrat

Sampel Bakpao 1:1

Percobaan 1

Volume titrasi = volume Titrasi blanko - volume Titrasi sampel (ml)

Konversi volume Titrasi ke tio 0,1 N = $\frac{\text{volume titrasi (ml)} \times \text{normalitas tio}}{0,1 N} = \dots$

... ml ~... mg glukosa = ... ml selisih volume — ... mg selisih bobot glukosa

mg glukosa = mg glukosa + (selisih volume x selisih bobot glukosa)

Kadar glukosa (%) = $\frac{\text{mg glukosa} \times \text{faktor}}{\text{bobot sampel (mg)}} \times 100$

Kadar karbohidrat (%) = kadar glukosa (%) x 0,90

➤ Volume titrasi K1 = 25,5 - 11 = 14,5 ml

$$\frac{14,5 \times 0,09693 N}{0,1} = 14,05485$$

14 ~ 35,7 mg glukosa

Selisih volume = 0,05485 ml — Selisih mg glukosa = 2,8 mg

35,7 mg + (0,05485 x 2,8) = 35,85358 mg glukosa

$$\frac{35,85358 \text{ mg} \times \frac{500}{10}}{5084,31 \text{ mg}} \times 100 = 35,259$$

= 35,26% x 0,90 = 31,734 %

Percobaan 2

Volume titrasi = volume Titrasi blanko - volume Titrasi sampel (ml)

Konversi volume Titrasi ke tio 0,1 N = $\frac{\text{volume titrasi (ml)} \times \text{normalitas tio}}{0,1 N} = \dots$

... ml ~... mg glukosa = ... ml selisih volume — ... mg selisih bobot glukosa

mg glukosa = mg glukosa + (selisih volume x selisih bobot glukosa)

Kadar glukosa (%) = $\frac{\text{mg glukosa} \times \text{faktor}}{\text{bobot sampel (mg)}} \times 100$

Kadar karbohidrat (%) = kadar glukosa (%) x 0,90

➤ Volume titrasi K2 = 25,5 - 10,3 = 15,2 ml

$\frac{15,2 \times 0,09693 N}{0,1} = 14,73336$

14 ~ 35,7 mg glukosa

Selisih volume = 0,73336 ml — Selisih mg glukosa = 2,8 mg

35,7 mg + (0,73336 x 2,8) = 37,753408 mg glukosa

$\frac{37,753408 \text{ mg} \times \frac{500}{10}}{5092,22 \text{ mg}} \times 100 = 37,069$

= 37,07% x 0,90 = 33,363 %

Percobaan 3

Volume titrasi = volume Titrasi blanko - volume Titrasi sampel (ml)

Konversi volume Titrasi ke tio 0,1 N = $\frac{vol.titrasi (ml) \times normalitas\ tio}{0,1\ N} = \dots$

... ml ~... mg glukosa = ... ml selisih volume — ... mg selisih bobot glukosa

mg glukosa = mg glukosa + (selisih volume x selisih bobot glukosa)

Kadar glukosa (%) = $\frac{mg\ glukosa \times faktor}{bobot\ sampel\ (mg)} \times 100$

Kadar karbohidrat (%) = kadar glukosa (%) x 0,90

➤ Volume titrasi K3= 25,5-10,4= 15,1 ml

$\frac{15,1 \times 0,09693\ N}{0,1} = 14,63643$

14~35,7 mg glukosa

Selisih volume =0,63643 ml — Selisih mg glukosa =2,8 mg

35,7 mg + (0,63643 x 2,8) = 37,482004 mg glukosa

$\frac{37,482004\ mg \times \frac{500}{10}}{5091,22\ mg} \times 100 = 36,8104$

=37,81% x 0,90= 33,129 %

Sampel Bakpao 1:3

Percobaan 1

Volume titrasi = volume Titrasi blanko - volume Titrasi spl (ml)

Konversi volume Titrasi ke tio 0,1 N = $\frac{\text{volume titrasi (ml)} \times \text{normalitas tio}}{0,1 N} = \dots$

... ml ~... mg glukosa = ... ml selisih volume — ... mg selisih bobot glukosa

mg glukosa = mg glukosa + (selisih volume x selisih bobot glukosa)

Kadar glukosa (%) = $\frac{\text{mg glukosa} \times \text{faktor}}{\text{bobot sampel (mg)}} \times 100$

Kadar karbohidrat (%) = kadar glukosa (%) x 0,90

➤ Volume titrasi K1 = 25,5 - 21,6 = 3,9 ml

$$\frac{3,9 \times 0,09693 N}{0,1} = 3,78027$$

3~7,2 mg glukosa

Selisih volume = 0,78027 ml — Selisih mg glukosa = 2,5 mg

7,2 mg + (0,78027 x 2,5) = 9,150675 mg glukosa

$$\frac{9,150675 \text{ mg} \times \frac{500}{10}}{5046,20 \text{ mg}} \times 100 = 9,0668$$

= 9,07% x 0,90 = 8,154 %

M A K A S S A R

Percobaan 2

Volume titrasi = volume Titrasi blanko - volume Titrasi sampel (ml)

Konversi volume Titrasi ke tio 0,1 N = $\frac{\text{volume titrasi (ml)} \times \text{normalitas tio}}{0,1 N} = \dots$

... ml ~... mg glukosa = ... ml selisih volume — ... mg selisih bobot glukosa

mg glukosa = mg glukosa + (selisih volume x selisih bobot glukosa)

Kadar glukosa (%) = $\frac{\text{mg glukosa} \times \text{faktor}}{\text{bobot sampel (mg)}} \times 100$

Kadar karbohidrat (%) = kadar glukosa (%) x 0,90

➤ Volume titrasi K2 = 25,5 - 20,3 = 5,2 ml

$$\frac{5,2 \times 0,09693 N}{0,1} = 5,04036$$

5 ~ 7,2 mg glukosa

Selisih volume = 0,04036 ml — Selisih mg glukosa = 2,5 mg

7,2 mg + (0,04036 x 2,5) = 7,3009 mg glukosa

$$\frac{7,3009 \text{ mg} \times \frac{500}{10}}{5086,10 \text{ mg}} \times 100 = 7,1773$$

= 7,18% x 0,90 = 6,462 %

Percobaan 3

Volume titrasi = volume Titrasi blanko - volume Titrasi sampel (ml)

Konversi volume Titrasi ke tio 0,1 N = $\frac{\text{volume titrasi (ml)} \times \text{normalitas tio}}{0,1 N} = \dots$

... ml ~... mg glukosa = ... ml selisih volume — ... mg selisih bobot glukosa

mg glukosa = mg glukosa + (selisih volume x selisih bobot glukosa)

Kadar glukosa (%) = $\frac{\text{mg glukosa} \times \text{faktor}}{\text{bobot sampel (mg)}} \times 100$

Kadar karbohidrat (%) = kadar glukosa (%) x 0,90

➤ Volume titrasi K3 = 25,5 - 22 = 3,5 ml

$$\frac{3,5 \times 0,09693 N}{0,1} = 3,39255$$

3 ~ 7,2 mg glukosa

Selisih volume = 0,39255 ml — Selisih mg glukosa = 2,5 mg

7,2 mg + (0,39255 x 2,5) = 8,181375 mg glukosa

$$\frac{8,181375 \text{ mg} \times \frac{500}{10}}{5060,53 \text{ mg}} \times 100 = 8,083516$$

= 8,09% x 0,90 = 7,281 %

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Sampel Bakpao 3:1

Percobaan 1

Volume titrasi = volume Titrasi blanko - volume Titrasi sampel (ml)

$$\text{Konversi volume Titrasi ke tio } 0,1 \text{ N} = \frac{\text{volume titrasi (ml)} \times \text{normalitas tio}}{0,1 \text{ N}} = \dots$$

... ml ~... mg glukosa = ... ml selisih volume — ... mg selisih bobot glukosa

mg glukosa = mg glukosa + (selisih volume x selisih bobot glukosa)

$$\text{Kadar glukosa (\%)} = \frac{\text{mg glukosa} \times \text{faktor}}{\text{bobot sampel (mg)}} \times 100$$

Kadar karbohidrat (%) = kadar glukosa (%) x 0,90

➤ Volume titrasi K1 = 25,5 - 17,5 = 8 ml

$$\frac{8 \times 0,09693 \text{ N}}{0,1} = 7,7544$$

7 ~ 17,2 mg glukosa

Selisih volume = 0,7544 ml — Selisih mg glukosa = 2,6 mg

17,2 mg + (0,7544 x 2,6) = 19,16144 mg glukosa

$$\frac{19,16144 \text{ mg} \times \frac{500}{10}}{5089,58 \text{ mg}} \times 100 = 18,82418$$

= 18,82% x 0,90 = 16,938 %

M A K A S S A R

Percobaan 2

Volume titrasi = volume Titrasi blanko - volume Titrasi sampel (ml)

Konversi volume Titrasi ke tio 0,1 N = $\frac{\text{volume titrasi (ml)} \times \text{normalitas tio}}{0,1 N} = \dots$

... ml ~... mg glukosa = ... ml selisih volume — ... mg selisih bobot glukosa

mg glukosa = mg glukosa + (selisih volume x selisih bobot glukosa)

Kadar glukosa (%) = $\frac{\text{mg glukosa} \times \text{faktor}}{\text{bobot sampel (mg)}} \times 100$

Kadar karbohidrat (%) = kadar glukosa (%) x 0,90

➤ Volume titrasi K2 = 25,5 - 17,1 = 8,4 ml

$$\frac{8,4 \times 0,09693 N}{0,1} = 8,14212$$

8 ~ 19,8 mg glukosa

Selisih volume = 0,14212 ml — Selisih mg glukosa = 2,6 mg

19,8 mg + (0,14212 x 2,6) = 20,169512 mg glukosa

$$\frac{20,169512 \text{ mg} \times \frac{500}{10}}{5084,90 \text{ mg}} \times 100 = 19,832752$$

= 19,83% x 0,90 = 17,847 %

Percobaan 3

Volume titrasi = volume Titrasi blanko - volume Titrasi sampel (ml)

Konversi volume Titrasi ke tio 0,1 N = $\frac{\text{volume titrasi (ml)} \times \text{normalitas tio}}{0,1 N} = \dots$

... ml ~... mg glukosa = ... ml selisih volume — ... mg selisih bobot glukosa

mg glukosa = mg glukosa + (selisih volume x selisih bobot glukosa)

Kadar glukosa (%) = $\frac{\text{mg glukosa} \times \text{faktor}}{\text{bobot sampel (mg)}} \times 100$

Kadar karbohidrat (%) = kadar glukosa (%) x 0,90

➤ Volume titrasi K3 = 25,5 - 16,7 = 8,8 ml

$\frac{8,8 \times 0,09693 N}{0,1} = 8,52984$

8 ~ 19,8 mg glukosa

Selisih volume = 0,52984 ml — Selisih mg glukosa = 2,6 mg

19,8 mg + (0,52984 x 2,6) = 21,177584 mg glukosa

$\frac{21,177584 \text{ mg} \times \frac{500}{10}}{5088,40 \text{ mg}} \times 100 = 20,80966$

= 20,80% x 0,90 = 18,72 %

Sampel Bakpao Ikan Kembung

Percobaan 1

Volume titrasi = volume Titrasi blanko - volume Titrasi sampel (ml)

Konversi volume Titrasi ke tio 0,1 N = $\frac{\text{volume titrasi (ml)} \times \text{normalitas tio}}{0,1 N} = \dots$

... ml ~... mg glukosa = ... ml selisih volume — ... mg selisih bobot glukosa

mg gluk. = mg glukosa + (selisih volume x selisih bobot glukosa)

Kadar glukosa (%) = $\frac{\text{mg glukosa} \times \text{faktor}}{\text{bobot sampel (mg)}} \times 100$

Kadar karbohidrat (%) = kadar glukosa (%) x 0,90

➤ Volume titrasi K1 = 25,5 - 15,4 = 10,1 ml

$$\frac{10,1 \times 0,09693 N}{0,1} = 9,78993$$

9 ~ 22,4 mg glukosa

Selisih volume = 0,78993 ml — Selisih mg glukosa = 2,6 mg

22,4 mg + (0,78993 x 2,6) = 24,611804 mg glukosa

$$\frac{24,611804 \text{ mg} \times \frac{500}{10}}{5083,91 \text{ mg}} \times 100 = 24,205586$$

= 24,20% x 0,90 = 21,78 %

Percobaan 2

Volume titrasi = volume Titrasi blanko - volume Titrasi sampel (ml)

Konversi volume Titrasi ke tio 0,1 N = $\frac{\text{volume titrasi (ml)} \times \text{normalitas tio}}{0,1 N} = \dots$

... ml ~... mg glukosa = ... ml selisih volume — ... mg selisih bobot glukosa

mg glukosa = mg glukosa + (selisih volume x selisih bobot glukosa)

Kadar glukosa (%) = $\frac{\text{mg glukosa} \times \text{faktor}}{\text{bobot sampel (mg)}} \times 100$

Kadar karbohidrat (%) = kadar glukosa (%) x 0,90

➤ Volume titrasi K2 = 25,5 - 14,6 = 10,9 ml

$$\frac{10,9 \times 0,09693 N}{0,1} = 10,56537$$

10~25,0 mg glukosa

Selisih volume = 0,56537 ml — Selisih mg glukosa = 2,6 mg

25,0 mg + (0,56537 x 2,6) = 26,469962 mg glukosa

$$\frac{26,469962 \text{ mg} \times \frac{500}{10}}{5087,26 \text{ mg}} \times 100 = 26,015932$$

= 26,01% x 0,90 = 23,409 %

Percobaan 3

Volume titrasi = volume Titrasi blanko - volume Titrasi sampel (ml)

Konversi volume Titrasi ke tio 0,1 N = $\frac{\text{volume titrasi (ml)} \times \text{normalitas tio}}{0,1 N} = \dots$

... ml ~... mg glukosa = ... ml selisih volume — ... mg selisih bobot glukosa

mg glukosa = mg glukosa + (selisih volume x selisih bobot glukosa)

Kadar glukosa (%) = $\frac{\text{mg glukosa} \times \text{faktor}}{\text{bobot sampel (mg)}} \times 100$

Kadar karbohidrat (%) = kadar glukosa (%) x 0,90

➤ Volume titrasi K3 = 25,5 - 21,3 = 4,2 ml

$\frac{4,2 \times 0,09693 N}{0,1} = 4,07106$

4 ~ 9,7 mg glukosa

Selisih volume = 0,07106 ml — Selisih mg glukosa = 2,5 mg

9,7 mg + (0,07106 x 2,5) = 9,87765 mg glukosa

$\frac{9,87765 \text{ mg} \times \frac{500}{10}}{5087,32 \text{ mg}} \times 100 = 9,708108$

= 9,70% x 0,90 = 8,73 %

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Protein

Sampel Bakpao 1:1

Percobaan 1

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(\text{vol.titrasi spl} - \text{vol.Titrasi blanko}) \times \text{N.Hcl} \times \text{BA Nitrogen}}{\text{bobot spl (mg)}} \times 100$$

$$\text{Protein (\%)} = \text{nitrogen (\%)} \times \text{F. Konveksi}$$

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(9,1-0) \times 0,09804 \times 14,007}{571,71} \times 100 = 2,185818$$

$$\text{Protein (\%)} = 2,185818 \times 6,25\% = 13,66136$$

Percobaan 2

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(\text{vol.titrasi spl} - \text{vol.Titrasi blanko}) \times \text{N.Hcl} \times \text{BA Nitrogen}}{\text{bobot spl (mg)}} \times 100$$

$$\text{Protein (\%)} = \text{nitrogen (\%)} \times \text{F. Konveksi}$$

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(9,4-0) \times 0,09804 \times 14,007}{586,89} \times 100 = 2,19947$$

$$\text{Protein (\%)} = 2,19947 \times 6,25\% = 13,74668$$

Percobaan 3

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(\text{vol.titrasi spl} - \text{vol.Titrasi blanko}) \times \text{N.Hcl} \times \text{BA Nitrogen}}{\text{bobot spl (mg)}} \times 100$$

$$\text{Protein (\%)} = \text{nitrogen (\%)} \times \text{F. Konveksi}$$

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(8-0) \times 0,09804 \times 14,007}{550,83} \times 100 = 1,99443$$

$$\text{Protein (\%)} = 1,99443 \times 6,25\% = 12,46524$$

Sampel Bakpao 3:1

Percobaan 1

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(\text{vol.titrasi spl} - \text{vol.Titrasi blanko}) \times \text{N.Hcl} \times \text{BA Nitrogen}}{\text{bobot spl (mg)}} \times 100$$

$$\text{Protein (\%)} = \text{nitrogen (\%)} \times \text{F. Konveksi}$$

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(8,3-0) \times 0,09804 \times 14,007}{505} \times 100 = 2,25701$$

$$\text{Protein (\%)} = 2,25701 \times 6,25\% = 14,10636$$

Percobaan 2

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(\text{vol.titrasi spl} - \text{vol.Titrasi blanko}) \times \text{N.Hcl} \times \text{BA Nitrogen}}{\text{bobot spl (mg)}} \times 100$$

$$\text{Protein (\%)} = \text{nitrogen (\%)} \times \text{F. Konveksi}$$

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(8,8-0) \times 0,09804 \times 14,007}{566,31} \times 100 = 2,13391$$

$$\text{Protein (\%)} = 2,13391 \times 6,25\% = 13,33696$$

Percobaan 3

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(\text{vol.titrasi spl} - \text{vol.Titrasi blanko}) \times \text{N.Hcl} \times \text{BA Nitrogen}}{\text{bobot spl (mg)}} \times 100$$

$$\text{Protein (\%)} = \text{nitrogen (\%)} \times \text{F. Konveksi}$$

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(4-0) \times 0,09804 \times 14,007}{512,2} \times 100 = 1,07243$$

$$\text{Protein (\%)} = 1,07243 \times 6,25\% = 6,70268$$

Sampel Bakpao 1:3



Percobaan 1

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(\text{vol.titrasi spl} - \text{vol.Titrasi blanko}) \times \text{N.Hcl} \times \text{BA Nitrogen}}{\text{bobot spl (mg)}} \times 100$$

$$\text{Protein (\%)} = \text{nitrogen (\%)} \times \text{F. Konveksi}$$

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(5,8-0) \times 0,09804 \times 14,007}{581,63} \times 100 = 1,36939$$

$$\text{Protein (\%)} = 1,36939 \times 6,25\% = 8,55868$$

Percobaan 2

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(\text{vol.titrasi spl} - \text{vol.Titrasi blanko}) \times \text{N.Hcl} \times \text{BA Nitrogen}}{\text{bobot spl (mg)}} \times 100$$

$$\text{Protein (\%)} = \text{nitrogen (\%)} \times \text{F. Konveksi}$$

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(8-0) \times 0,09804 \times 14,007}{589,87} \times 100 = 1,86243$$

$$\text{Protein (\%)} = 1,86243 \times 6,25\% = 11,64018$$

Percobaan 3

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(\text{vol.titrasi spl} - \text{vol.Titrasi blanko}) \times \text{N.Hcl} \times \text{BA Nitrogen}}{\text{bobot spl (mg)}} \times 100$$

$$\text{Protein (\%)} = \text{nitrogen (\%)} \times \text{F. Konveksi}$$

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(5,8-0) \times 0,09804 \times 14,007}{572,99} \times 100 = 1,39004$$

$$\text{Protein (\%)} = 1,39004 \times 6,25\% = 8,68775$$

Sampel Bakpao Ikan Kembang

Percobaan 1

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(\text{vol.titrasi spl} - \text{vol.Titrasi blanko}) \times \text{N.Hcl} \times \text{BA Nitrogen}}{\text{bobot spl (mg)}} \times 100$$

$$\text{Protein (\%)} = \text{nitrogen (\%)} \times \text{F. Konveksi}$$

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(9,3-0) \times 0,09804 \times 14,007}{580,82} \times 100 = 2,19882$$

$$\text{Protein (\%)} = 2,19882 \times 6,25\% = 13,74263$$

Percobaan 2

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(\text{vol.titrasi spl} - \text{vol.Titrasi blanko}) \times \text{N.Hcl} \times \text{BA Nitrogen}}{\text{bobot spl (mg)}} \times 100$$

$$\text{Protein (\%)} = \text{nitrogen (\%)} \times \text{F. Konveksi}$$

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(8,2-0) \times 0,09804 \times 14,007}{582,77} \times 100 = 1,93225$$

$$\text{Protein (\%)} = 1,93225 \times 6,25\% = 12,07661$$

Percobaan 3

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(\text{vol.titrasi spl} - \text{vol.Titrasi blanko}) \times \text{N.Hcl} \times \text{BA Nitrogen}}{\text{bobot spl (mg)}} \times 100$$

$$\text{Protein (\%)} = \text{nitrogen (\%)} \times \text{F. Konveksi}$$

$$\text{Nitrogen (\%)} = \frac{(9,2-0) \times 0,09804 \times 14,007}{590,74} \times 100 = 2,13865$$

$$\text{Protein (\%)} = 2,13865 \times 6,25\% = 13,36656$$

Lemak

Sampel Bakpao 1:1

Percobaan 1

$$\text{Kadar lemak (\%)} = \frac{\text{bobot wada h berisi lemak} - \text{bobot wada h kosong (g)}}{\text{bobot spl (g)}} \times 100$$

$$\text{LI} = \frac{70,37514 - 70,06854}{5,07560} \times 100 = 6,04066$$

Percobaan 2

$$\text{Kadar lemak (\%)} = \frac{\text{bobot wada h berisi lemak} - \text{bobot wada h kosong (g)}}{\text{bobot spl (g)}} \times 100$$

$$\text{LII} = \frac{64,74011 - 64,45977}{5,04443} \times 100 = 5,55741$$

Percobaan 3

$$\text{Kadar lemak (\%)} = \frac{\text{bobot wada h berisi lemak} - \text{bobot wada h kosong (g)}}{\text{bobot spl (g)}} \times 100$$

$$\text{LIII} = \frac{60,10155 - 59,78552}{5,04302} \times 100 = 6,26668$$

Sampel Bakpao 3:1

Percobaan 1

$$\text{Kadar lemak (\%)} = \frac{\text{bobot wada h berisi lemak} - \text{bobot wada h kosong (g)}}{\text{bobot spl (g)}} \times 100$$

$$\text{LI} = \frac{60,19909 - 59,7847}{5,0745} \times 100 = 8,166125$$

Percobaan 2

$$\text{Kadar lemak (\%)} = \frac{\text{bobot wada h berisi lemak} - \text{bobot wada h kosong (g)}}{\text{bobot spl (g)}} \times 100$$

$$\text{LII} = \frac{57,05886 - 56,6283}{5,0475} \times 100 = 8,530163$$

Percobaan 3

$$\text{Kadar lemak (\%)} = \frac{\text{bobot wada h berisi lemak} - \text{bobot wada h kosong (g)}}{\text{bobot spl (g)}} \times 100$$

$$\text{LIII} = \frac{58,16997 - 57,7447}{5,0340} \times 100 = 8,447954$$

Sampel Bakpao 1:3

Percobaan 1

$$\text{Kadar lemak (\%)} = \frac{\text{bobot wada h berisi lemak} - \text{bobot wada h kosong (g)}}{\text{bobot spl (g)}} \times 100$$

$$\text{LI} = \frac{73,32328 - 73,28040}{5,07612} \times 100 = 0,8462551$$

Percobaan 2

$$\text{Kadar lemak (\%)} = \frac{\text{bobot wada h berisi lemak} - \text{bobot wada h kosong (g)}}{\text{bobot spl (g)}} \times 100$$

$$\text{LII} = \frac{56,76683 - 56,63266}{5,07612} \times 100 = 2,643161$$

Percobaan 3

$$\text{Kadar lemak (\%)} = \frac{\text{bobot wada h berisi lemak} - \text{bobot wada h kosong (g)}}{\text{bobot spl (g)}} \times 100$$

$$\text{LIII} = \frac{57,82893 - 57,74630}{5,04712} \times 100 = 1,637171$$



Sampel Bakpao Ikan Kembung

Percobaan 1

$$\text{Kadar lemak (\%)} = \frac{\text{bobot wada h berisi lemak} - \text{bobot wada h kosong (g)}}{\text{bobot spl (g)}} \times 100$$

$$\text{LI} = \frac{64,11534 - 63,80120}{5,08052} \times 100 = 6,183225$$

Percobaan 2

$$\text{Kadar lemak (\%)} = \frac{\text{bobot wada h berisi lemak} - \text{bobot wada h kosong (g)}}{\text{bobot spl (g)}} \times 100$$

$$\text{LII} = \frac{62,26685 - 61,99254}{5,08533} \times 100 = 5,394144$$

Percobaan 3

$$\text{Kadar lemak (\%)} = \frac{\text{bobot wada h berisi lemak} - \text{bobot wada h kosong (g)}}{\text{bobot spl (g)}} \times 100$$

$$\text{LIII} = \frac{59,00179 - 58,67439}{5,08110} \times 100 = 6,443487$$

Vitamin A

Sampel Bakpao 1:1

Percobaan 1

$$\text{Vit. A (\text{µg/g})} = \frac{\text{konsentrasi vit.A (\text{µg/g})} \times \text{volume spl (ml)}}{\text{bobot sampel (g)}}$$

$$\text{V1} = \frac{4,290 \times 50}{25,05192} = 8,56221$$

Percobaan 2

$$\text{Vit. A } (\mu\text{g/g}) = \frac{\text{konsentrasi vit.A } (\mu\text{g/g}) \times \text{volume spl (ml)}}{\text{bobot sampel (g)}}$$

$$\text{VII} = \frac{4,682 \times 50}{25,0501} = 9,33748$$

Percobaan 3

$$\text{Vit. A } (\mu\text{g/g}) = \frac{\text{konsentrasi vit.A } (\mu\text{g/g}) \times \text{volume spl (ml)}}{\text{bobot sampel (g)}}$$

$$\text{VIII} = \frac{4,864 \times 50}{25,0501} = 9,70854$$

Sampel Bakpao 1:3

Percobaan 1

$$\text{Vit. A } (\mu\text{g/g}) = \frac{\text{konsentrasi vit.A } (\mu\text{g/g}) \times \text{volume spl (ml)}}{\text{bobot sampel (g)}}$$

$$\text{VI} = \frac{4,447 \times 50}{25,0728} = 8,86817$$

Percobaan 2

$$\text{Vit. A } (\mu\text{g/g}) = \frac{\text{konsentrasi vit.A } (\mu\text{g/g}) \times \text{volume spl (ml)}}{\text{bobot sampel (g)}}$$

$$\text{VII} = \frac{4,255 \times 50}{25,0822} = 8,48211$$

Percobaan 3

$$\text{Vit. A } (\mu\text{g/g}) = \frac{\text{konsentrasi vit.A } (\mu\text{g/g}) \times \text{volume spl (ml)}}{\text{bobot sampel (g)}}$$

$$\text{VIII} = \frac{3,987 \times 50}{25,0626} = 7,95408$$

Sampel Bakpao 3:1

Percobaan 1

$$\text{Vit. A } (\mu\text{g/g}) = \frac{\text{konsentrasi vit.A } (\mu\text{g/g}) \times \text{volume spl (ml)}}{\text{bobot sampel (g)}}$$

$$\text{VI} = \frac{5,151 \times 50}{25,0520} = 10,28061$$

Percobaan 2

$$\text{Vit. A } (\mu\text{g/g}) = \frac{\text{konsentrasi vit.A } (\mu\text{g/g}) \times \text{volume spl (ml)}}{\text{bobot sampel (g)}}$$

$$\text{VII} = \frac{4,756 \times 50}{25,0431} = 9,49562$$

Percobaan 3

$$\text{Vit. A } (\mu\text{g/g}) = \frac{\text{konsentrasi vit.A } (\mu\text{g/g}) \times \text{volume spl (ml)}}{\text{bobot sampel (g)}}$$

$$\text{VIII} = \frac{4,906 \times 50}{25,0370} = 9,79749$$

Percobaan 1

$$\text{Vit. A } (\mu\text{g/g}) = \frac{\text{konsentrasi vit.A } (\mu\text{g/g}) \times \text{volume spl (ml)}}{\text{bobot sampel (g)}}$$

$$\text{VI} = \frac{3,461 \times 50}{25,08061} = 6,89975$$

Percobaan 2

$$\text{Vit. A } (\mu\text{g/g}) = \frac{\text{konsentrasi vit.A } (\mu\text{g/g}) \times \text{volume spl (ml)}}{\text{bobot sampel (g)}}$$

$$\text{VII} = \frac{3,303 \times 50}{25,08310} = 6,58411$$

Percobaan 2

$$\text{Vit. A } (\mu\text{g/g}) = \frac{\text{konsentrasi vit.A } (\mu\text{g/g}) \times \text{volume spl (ml)}}{\text{bobot sampel (g)}}$$

$$\text{VIII} = \frac{3,956 \times 50}{25,09754} = 7,88126$$

HASIL UJI ORGANOLEPTIK

a. Bakpao Subtitusi 1:1

Hasil Uji Daya Terima Bakpao Subtitusi 1:1 Tahun 2015

Kategori	Warna		Rasa		Aroma		Tekstur	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sangat Suka	1	20	-	-	1	20	1	20
Suka	2	40	2	40	2	40	1	20
Tidak Suka	2	40	2	40	2	40	3	60
Sangat Tidak suka	-	-	1	20	-	-	-	-
Total	5	100	5	100	5	100	5	100

Sumber: Data Primer, 2015.

Pada tabel diatas berdasarkan hasil uji daya terima bakpao subtitusi

1:1, terdapat 2 (40%) responden yang suka dan tidak suka warna, rasa dan

aroma bakpao substitusi 1:1, sedangkan pada tekstur terdapat 3 (60%) responden yang tidak suka.

b. Bakpao Substitusi 3:1

Hasil Uji Daya Terima Bakpao Substitusi 3:1 Tahun 2015

Kategori	Warna		Rasa		Aroma		Tekstur	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sangat Suka	-	-	-	-	1	20	-	-
Suka	2	40	3	60	3	60	1	20
Tidak Suka	3	60	1	20	-	-	4	80
Sangat Tidak suka	-	-	1	20	1	20	-	-
Total	5	100	5	100	5	100	5	100

Sumber: Data Primer, 2015.

Pada tabel diatas berdasarkan hasil uji daya terima bakpao substitusi 3:1 terdapat 3 (60%) responden yang tidak suka warna dari bakpao substitusi 3:1, pada rasa dan aroma terdapat 3 (60%) responden yang suka, sedangkan pada tekstur terdapat 4 (80%) responden yang tidak suka.

c. Bakpao Substitusi 1:3

Hasil Uji Daya Terima Bakpao Substitusi 1:3 Tahun 2015

Kategori	Warna		Rasa		Aroma		Tekstur	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sangat Suka	2	40	1	20	-	-	2	40
Suka	2	40	3	60	3	60	1	20
Tidak Suka	1	20	-	-	2	40	2	40
Sangat Tidak suka	-	-	1	20	-	-	-	-
Total	5	100	5	100	5	100	5	100

Sumber: Data Primer, 2015.

Pada tabel diatas berdasarkan hasil uji daya terima bakpao substitusi 1:3 terdapat 2 (40%) responden yang sangat suka dan suka warna dari bakpao substitusi 1:3, pada rasa dan aroma terdapat 3 (60%) responden yang suka, sedangkan pada tekstur terdapat masing-masing 2 (40%) responden yang sangat suka dan tidak suka.

d. Bakpao Abon Ikan Kembang

**Hasil Uji Daya Terima
Bakpao Abon Ikan Kembang Tahun 2015**

Kategori	Warna		Rasa		Aroma		Tekstur	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sangat Suka	-	-	2	40	1	20	-	-
Suka	2	40	2	40	1	20	2	40
Tidak Suka	1	20	1	20	2	40	2	40
Sangat Tidak suka	2	40	-	-	1	20	1	20
Total	5	100	5	100	5	100	5	100

Sumber: Data Primer 2015.

Pada tabel diatas hasil uji daya terima bakpao abon ikan kembang terdapat 2 (40%) responden masing-masing suka dan sangat tidak suka warna dari bakpao abon ikan kembang, pada rasa terdapat 2 (40%) responden yang sangat suka dan suka, sedangkan pada aroma terdapat 2 (40%) responden yang tidak suka dan pada tekstur terdapat 2 (40%) masing-masing responden suka dan tidak suka.

**Hasil Analisis Organoleptik pada Bakpao dan Subtitusinya
berdasarkan Warna tahun 2015**

Hedonik	Bakpao Subtitusi 1:1			Bakpao Subtitusi 3:1			Bakpao Subtitusi 1:3			Bakpao Abon Ikan Kembung		
	Panelis	Skor	%	Panelis	Skor	%	Panelis	Skor	%	Panelis	Skor	%
Sangat Suka	1	4	20	-	-	-	2	8	40	-	-	-
Suka	2	6	30	2	6	30	2	6	30	2	6	30
Tidak Suka	2	4	20	3	6	30	1	2	10	1	2	10
Sangat Tidak Suka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10
Total	5	14	70	5	12	60	5	16	80	5	10	50

Sumber: Data Primer, 2015.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa total skor tertinggi dalam uji organoleptik berdasarkan warna pada bakpao dan subtitusinya terdapat pada bakpao subtitusi 1:3 dengan skor 16 (80%) dengan kriteria sangat suka.



**Hasil Analisis Organoleptik Pada Bakpao dan Subtitusinya
Berdasarkan Rasa Tahun 2015**

Hedonik	Bakpao Subtitusi 1:1			Bakpao Subtitusi 3:1			Bakpao Subtitusi 1:3			Bakpao Abon Ikan Kembung		
	Panelis	Skor	%	Panelis	Skor	%	Panelis	Skor	%	Panelis	Skor	%
Sangat Suka	-	-	-	-	-	-	1	4	20	2	8	40
Suka	2	6	30	3	9	45	3	9	45	2	6	30
Tidak Suka	2	4	20	1	2	10	-	-	-	1	2	10
Sangat Tidak Suka	1	1	5	1	1	5	1	1	5	-	-	-
Total	5	11	55	5	12	60	5	14	70	5	16	80

Sumber: Data Primer, 2015.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa total skor tertinggi dalam uji organoleptik berdasarkan rasa pada bakpao dan subtitusinya terdapat pada bakpao abon ikan kembung 16 (80%) dengan kriteria sangat suka.



**Hasil Analisis Organoleptik pada Bakpao Dan Subtitusinya
Berdasarkan Aroma Tahun 2015**

Hedonik	Bakpao Subtitusi 1:1			Bakpao Subtitusi 3:1			Bakpao Subtitusi 1:3			Bakpao Abon Ikan Kembung		
	Panelis	Skor	%	Panelis	Skor	%	Panelis	Skor	%	Panelis	Skor	%
Sangat Suka	1	4	20	1	4	20	-	-	-	1	4	20
Suka	2	6	30	3	9	45	3	9	45	1	3	15
Tidak Suka	2	4	20	-	-	-	2	4	20	2	4	20
Sangat Tidak Suka	-	-	-	1	1	5	-	-	-	1	1	5
Total	5	14	70	5	14	70	5	13	65	5	12	60

Sumber: Data Primer, 2015.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui total skor tertinggi pada uji organoleptik berdasarkan aroma pada bakpao dan subtitusinya terdapat pada bakpao subtitusi 1:1 14 (70%) dan bakpao subtitusi 3:1 14 (70%) dengan kriteria suka.



**Hasil Analisis Organoleptik pada Bakpao Dan Subtitusinya
Berdasarkan Tekstur Tahun 2015**

Hedonik	Bakpao Subtitusi 1:1			Bakpao Subtitusi 3:1			Bakpao Subtitusi 1:3			Bakpao Abon Ikan Kembung		
	Panelis	Skor	%	Panelis	Skor	%	Panelis	Skor	%	Panelis	Skor	%
Sangat Suka	1	4	20	-	-	-	2	8	40	-	-	-
Suka	1	3	15	1	3	15	1	3	15	2	6	30
Tidak Suka	3	6	30	4	8	40	2	4	20	2	4	20
Sangat Tidak Suka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
Total	5	13	65	5	11	55	5	15	75	5	11	55

Sumber: Data Primer, 2015.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui total skor tertinggi pada uji organoleptik berdasarkan tekstur pada bakpao dan subtitusinya terdapat pada bakpao subtitusi 1:3 15(75%) dengan kriteria sangat suka.



**FORMULIR
UJI KESUKAAN**

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Tlp/HP :
Pekerjaan :
Tanggal :

Petunjuk

1. Dihadapan Anda terdapat empat jenis bakpao (pawa) yaitu bakpao A, bakpao B, Bakpao C, dan Bakpao D. Anda diminta untuk mencicipi dan merasakan ke-empat jenis bakpao tersebut.
2. Sebelum merasakan bakpao yang berikutnya, Anda diminta untuk minum air mineral yang telah disediakan. Tunggu sekitar 1 – 2 menit setelah minum air mineral sebelum melanjutkan mencicipi dan merasakan bakpao yang berikutnya.
3. Berikan penilaian untuk masing-masing bakpao tersebut, seperti pada tabel di bawah ini.
4. Setelah selesai, berikan komentar anda dalam ruang yang telah disediakan.

No	Karakteristik	Kode Sampel			
		Bakpao A	Bakpao B	Bakpao C	Bakpao D
1.	Warna				
2.	Rasa				
3.	Aroma				
4.	Tekstur				

Keterangan :

- Sangat suka : 4
- Suka : 3
- Tidak suka : 2
- Sangat tidak suka : 1

Komentar :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

A. ANALISIS KADAR KARBOHIDRAT



Penimbangan sampel dan dimasukkan ke dalam labu destilasi



Homogenkan lalu saring.



Didihkan selama 3 jam dengan pendingin tegak kemudian dinginkan dalam bak berisi es.



SITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY
KASSAR



titrasi menggunakan natrium tiosulfat 0,1 N

B. ANALISIS KADAR LEMAK



Timbang 5 gram sampel tambah N-hexane 20 ml dan rendam kemudian uapkan.

Siapkan wadah lain untuk di oven selama 2 jam



labu lemak berisi lemak dikeringkan dalam oven suhu 105°C selama 2 jam dan dimasukkan ke dalam desikator selama 2 jam setelah itu timbang.

C. ANALISIS KADAR PROTEIN



Penambahan selen reagent mixture dan H_2SO_4 , kemudian panaskan di hotplate dalam lemari asam sampai ekstrak jernih, angkat dan dinginkan.




Tambah indikator pp 1 ml dan NaOH sampai berwarna pink kemudian panaskan, siapkan erlemeyer untuk penguapan yang ditambah asam borat 1% 20 ml.





Pembuatan blanko protein sampai berwarna ungu.

D. ANALISIS KADAR VITAMIN A



Maserasi dengan aseton kemudian pindahkan ekstrak vitamin A ke dalam gelas kimia dan uapkan.



Ekstraksi dengan N-hexane (pengocokan pelan) secara berulang sampai ekstrak N-hexane tidak berwarna. Kemudian masukkan di labu ukur 50 ml, tambahkan N-hexane sampai batas volume labu ukur.





Sampel vitamin A kemudian dimasukkan ke dalam alat spektrofotometer untuk mengetahui kadar vitamin A.

E. UJI ORGANOLEPTIK





MAKASSAR



RIWAYAT HIDUP



Munjyah HM Mustadir, lahir di Palopo pada tanggal 04 April 1993 anak dari pasangan Bapak Drs. Mustadir H dan Ibu Misnah M. Peneliti merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara. Kini peneliti bertempat tinggal di BTN Pao-Pao Permai Blok H2 No. 2 Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu dimulai dari SD Inpres Mallengkeri Bertingkat lulus pada tahun 2005, MTs. Madani Alauddin Pao-Pao lulus tahun 2008, MA Madani Alauddin Pao-Pao lulus tahun 2011, dan pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan pada Program S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Adapun riwayat organisasi peneliti selama masih kuliah yaitu pernah menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kesehatan Masyarakat, Anggota Darul Qur'an Makassar, Anggota English Mania Meeting Club (EM2C) UIN Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R